

中華民國五年冬月鐫版定價每冊

角四

周氏易簡方
集驗方
合刻全

紹興醫藥學報社發行

讀醫藥學報於中國岐黃家言兼綜條
貫所刊叢書亦多醫林祕籍自頃中醫
日竄歐化東漸物競爭存駸駸有喧奪
之勢作者軒中輕西期以保存國粹意
甚盛也然欲攻人之短必先知人之長
欲伸己之長亦必知己之短吾國醫學

軒岐而後仲聖實集大成然傷寒金匱
兩書章次凌亂已非原書泥古之失豪
釐千里宋元學者門戶分歧溫補清涼
有如聚訟承學之士靡所適從且六淫
之氣與時變遷今病古方不無鑿柄古
之名醫多自採藥後漢韓康賣藥長安

市中所謂賣藥者卽爲人治病前清乾隆中葉吳門葉天士薛生白猶自市藥今世藥品取諸一閩之市審別不確炮製失宜方是藥非誤人尤甚凡此數端皆中醫所短不能自諱其本無學術託此罔利者又無論矣西醫以解剖爲實

序
二
驗臟腑部位已較中國古書爲確分化
藥品精益求精不似吾國藥肆之草草
從前以中西體質不同猶多扞格近日
體驗益真成效大著且多以中國藥品
別爲炮製知西方學者於吾國本草諸
書已極研究吾國學者倘未能深窺彼

之堂奧而徒欲抑人伸已恐西醫竊笑
其後也今欲保存舊學唯有舉吾國歷
驗不爽之舊說參以新理融會貫通其
卮言駢枝概從摒棄庶與西醫驂靳并
行不致爲天演所淘汰若遽欲拔趙幟
立漢幟竊恐無是事也作者宜勉之

之堂奧而徒欲抑人伸己恐西醫竊笑
其後也今欲保存舊學唯有舉吾國歷
驗不爽之舊說參以新理融會貫通其
卮言駢枝概從摒棄庶與西醫驟靳并
行不致爲天演所淘汰若遽欲拔趙幟
立漢幟竊恐無是事也作者宜勉之

醫藥叢書第一集凡例

一是書專刻先輩遺稿近賢新著並已行亡版之孤本期於流通不致湮沒四方同志有以藏書見惠酬答從豐

一近時書籍多用石印鉛印及洋紙形式既不樸質藏晒尤難經久故本書不惜工本純用木刻中紙古式精裝爲完全藏書格式且爲完全國貨

一是集所採各書共計六種皆爲極有價值之書閱者自能賞鑑
一叢書體例常見數種小冊合訂一本是書概以按種分訂俾無力全購者得以指購單種

一本集有未及刊完之書必於下集續刊決不間斷致使閱者盼望

一是書無論統購全集或指購單種除預約半價外照定價均無折扣但書業報社代售者另議

一凡各處圖書館閱報社報館學校本會會員本社社友如同時并購全集二

醫藥叢書第一集總目

- 第一種 莫枚士研經言卷一
- 第二種 周氏易簡方集驗方合刻全
- 第三種 羅謙甫治驗案卷上
- 第四種 吳氏醫案卷一
- 第五種 惜分陰軒醫案卷一
- 第六種 重刻人參考全

周氏集驗方目錄

避山 賦 謝華農婦題

喉舌門

潤口行世養聖效五瀉要

急救門

時日論生畏前將字相效權三定尚官論時始本乘效風候阻

傷科門

正通痰烈平日隨中難出一再理效式道風入

眼科門

婚樹式同邑聖聖祖刻文真驗之式文自舉甘交中患遠盛香香

內症門

探亦社神如味長效治四世備門國烈之言開機一二以五谷難

婦科門

奉代聖效驗要式醫入

兒科門

雲中解代氏泉取飲感神於主麻糖十二餅之一前由藥香開

瘡毒門

式效領香首

對舌菌小補其式大難效果效其中餅式且不進良因或平如並其效

一量流細門四選張養藥神書給小兒同門常護藏冬文與藥根銀三海

周氏集驗方目錄

衛生易簡方目錄

內症門

急救門

傷科門

眼目門

喉症門

婦科門

幼科門

瘡毒門

衛生諸法

部者當加贈一部

一凡同時并購上百部者不拘全集單種准可附印只收工料但不得另行翻刻

一購書者將書價及郵費一併用郵匯最爲妥便不通郵匯之處以郵票代銀亦可但須固封函內掛號直寄紹興城中醫藥學報社收當班奉書不悞

一 下集所採書書目莫氏研經言羅氏治驗案吳氏醫案惜分陰軒醫案皆續刻外爲市隱廬醫學襍著李冠仙知醫必辨幅頁加增定價照前並仍准預約五十部郵費一角六分書價對折作八角限滿截止

後大蘇 重賤人參香全

漢正齋 甜公劉神醫奈香

漢四齋 吳丹齋奈香

漢三齋 羅慈甫命記奈香

漢二齋 周丹長命記奈香

漢一齋 莫對士命記奈香

習藥雜書後一製藥目

周氏易簡方集驗方合刊序

古今中外方書夥矣吾國自鷄矢禮數方傳於內經已具醫方之雛形至仲景祖述一百十三方以治傷寒雜病則方學興於是千金也外台也咸以蒐輯羣方從事洎夫太平聖惠方惠民和濟局方聖濟總錄攝生衆妙方等出一書採至萬方或數千方者可謂集方之大成矣私家小冊尤難枚舉其最流行者莫如驗方新編幾於家置一編然欲求其輕而易舉使人人力所能及並徵諸衆驗使方方投無不效者尠也美之洪士提反萬國藥方日之恩田重信醫方一萬集胥同病也無錫周莘農先生有集驗方易簡方二書刊行其集驗方多採諸家經驗能使方方投無不效其易簡方都爲貧者着想能使人人力所能及又經哲嗣伯華君編次門類俾易於索檢元以同社得蒙其見贈而讀之會同人有流通醫藥書籍之謀先刻醫藥叢書因見二書之足以利濟貧病請合刻於叢書第一集中又蒙見許則賢喬梓同具一片婆心有令人欽佩不已也

爰記之以誌不忘民國五年冬吉生裘慶元拜序

式與心育令人竟爾不日

同人等前此習業唐詩之於九族齊學兼書因長二書之足以既格其

公又惡其國命華書諸大門誠惟長於家題云以同植粉寔其良韻而

科帶承縣錄猶刻式式好無不效其長簡式楷道資香普思誦與人

一海其若同前此無異以非異式三不異式式於前人一書式下走

式與動式式好無不效其長簡式楷道資香普思誦與人

式與動式式好無不效其長簡式楷道資香普思誦與人

式與動式式好無不效其長簡式楷道資香普思誦與人

式與動式式好無不效其長簡式楷道資香普思誦與人

式與動式式好無不效其長簡式楷道資香普思誦與人


式與動式式好無不效其長簡式楷道資香普思誦與人

式與動式式好無不效其長簡式楷道資香普思誦與人

乙巳選輯衛生易簡方庚戌續刊周氏集驗方原屬與人方便詎以得之太易
不甚重視置良方於高閣殊非刊贈之本旨噫前賢實驗國粹堪珍千金有方
失傳可惜今與 紹興醫學會社裘君吉生商定二集合刊廉價出售藉爲傳
世行遠起見應誌緣由於此

中華民國五年丙辰春月

無錫周憬誠於惜分陰軒



學學與國五平內氣春良

貴行靈鼓良顯高懸出外此

夫附可計今與 際與靈學會加壽春吉主兩宮二梨合既氣動出善壽顯期

不甚重撫置買衣杖高閣聚非既顯之亦自勳補習質變隨外氣每千金首衣

乙日雙博衛主長簡衣東與難伴周共美氣衣烈顯與人衣與臨以轉之大良

衛生易簡方序

許胤宗曰藥之於病有正相當者止須一味藥力既純病卽立愈此單方之所由來也溯自東晉范汪東陽方後歷唐宋元明以迄我

朝屢有驗方傳世顧卷帙浩繁每苦難以檢索余素好岐黃課讀之暇曾亦涉

獵及之祇以質本駑鈍又因飢驅奔走四方忽忽念餘載未能得其要領癸卯

秋來游滬上獲交周君小農傾蓋相交遂成莫逆小農別署伯崑爲錫山張聿

青先生高足潛心力學深得岐黃奧旨甲辰夏以毛世洪先生經驗集見贈集

後附刊急救方受而讀之已欽其用心之細好善之誠乙巳夏復出其尊甫華

農先生平日所錄以濟人確有經驗者彙成一集分列八門末附戒烟少飲節

慾諸條顏曰衛生易簡方將梓而行世間序於余披閱一過見其條分縷晰意

簡言賅聞附評註亦復精切洵衛生之至寶簡便易行窮鄉僻壤之間苟能家

置一編審病檢方獲益豈淺鮮哉卽間有貴重之品爲急救所必需尤望

衛生易簡方自叙

余素喜驗方承良朋鈔贈旬儲月積數十年來哀然成集顧以古今世運不同氣體各異因宗費氏和緩之旨命長子錡廣稽羣籍參合時宜由博返約彙訂八門並自行付梓先印千部繼有同邑尤君心柏諸友附印五百部均爲分送遠鄉僻壤並不射利倘蒙樂善君子印送或流布並加校對幸甚茲於鋟工之歲也述其緣起如此

光緒三十一年歲次乙巳秋八月

錫山周憬識於滬南惜分陰軒

三十一 平九之曰天尺氏

此世與長壽賦也

此世與進不長味附蒙

應自行行料表明于希繼育同包式孫心前前文同同直直不

因宗費天所辨之育命具下

余 案書經大承氣賦後報百論八前幾十平來與與與與與以古今世豈不同

南生長壽賦自序

岐山風烈辨外新國計尺創碑

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

錫山周 憬莘農選輯

同社裴慶元吉生校刊

內症門

傷寒結胸熨法 ● 一切寒結熱結食結痰結痞結水結胸膈不寬作痛並中氣

虛弱不堪攻擊內消者此法熨之滯行邪散葱白頭一大把老生薑二大塊生蘿

蔔四箇如無以子一合代之三味共搗爛炒熱用布作兩包輪換久久罨熨心胸脇下痛


處熨宜隔單衣無不豁然自開汗出而愈如乾則烹之以酒若大便閉塞兼熨臍

腹痰結可加橘皮熱結加薄荷冰片

傷寒夾陰 ● 其症身熱足冷面赤陽縮溫病兼此難治宜用薑汁一大碗將腎囊

浸入其中汁自收乾即愈再用陽和膏藥一箇麝香三厘貼於臍中外用艾

絨灸之已痛即愈



虛體感寒外治 ● 胡椒丁香粒 各七 研末葱白 三杪 打和塗兩手心合掌握定夾

於兩大腿內側溫覆取汗

腹脇痞塊 ● 雄黃 一兩 白礬 一兩 為末麪糊調膏攤貼未效再貼數月必愈

又方 ● 陳核桃燒灰存性如患痞者小兒每歲一厘十歲以上只服一分 大人

滾湯調服服至二三次便瀉黑糞十日後必鼻血一次患者勿懼此藥驗也

待黑糞變黃痞漸消然後停藥百發百中

預免瘧疾 ● 三伏時取生薑 半觔 煎湯薰洗腿彎兩腳

瘧疾外治 ● 胡椒硫黃 各三 研末以一半摻膏藥上貼背脊之對正肚臍眼處

隔日瘧 ● 發日用劉寄奴 一錢 泡湯代茶兩服止

又方 ● 旱蓮草研末蘇葉包 男左女右 塞鼻孔半日即出清涕愈

年老身弱患瘧 ● 黃丹 五錢 生明礬 三錢 胡椒 一錢 麝香 五厘 研末臨發前對

太陽坐定將米醋調藥 男左女右 敷掌心外加布紮待藥力熱方可行走以出汗

爲度

又方新瘡風寒未清不宜即用

常山二兩爲粗末鴨蛋七枚

同藥末入砂鍋煮極熱病發

時取蛋握於手中冷則更換仍將握過之蛋再煮再握俟瘡止方住不傷元氣而瘡自愈

小兒患瘡●用雞內金一具

煨研男用雌女用雄

白冰糖湯調服神效

小兒瘡癩●但熱不寒不止者黃丹二分

蜜水調服

治臟方●雄猪肚一箇

入大蒜四兩

煮爛食五六箇忌鹽醬醋百日自消

氣鼓方●陳久大麥芽煎湯服漸消

治單腹脹●不受穀食諸藥不效者用木瓜三錢

廣皮二錢

取好酒隔水煮一

炷香入春梅花數十枝浸泡每日分兩次服完半月即消奇方也

水腫脹滿●腫從腳起入腹則殺人赤小豆一升

煮爛温漬足脛若已入腹

食小豆粥勿雜食亦愈

藥店內赤小豆不可用要鄉下米赤豆方可

衛生易簡方

內症門

水腫尿澁●腹脹甚者用大蒜三枚田螺五箇車前子末三錢同搗貼臍中以

布束縛水從小便下腫漸退又加雄黃一錢甘遂末一錢同貼臍亦妙

十種水氣●黑魚一觔煮汁和冬瓜葱白作羹食加黑豆皮綠豆皮各五錢

氣虛水腫●滁州陳通水腫垂死一嫗令以大蒜打如泥入蛤粉丸梧子大每

白湯服廿丸小便下水數桶而愈

溼熱腫脹●出了子蘿蔔名地骷髏煎濃飲五六箇煎湯服百日自愈

又方●鄉農夏末受溼熱之氣漸成胸滿肚大如鼓用大麥稈二兩烏豇豆二

合四兩煮熟食之七日愈

治腳腫●黑豆一兩甘草五錢煎湯服

腳氣痺弱走痛●蘿蔔煎湯洗之仍用蘿蔔片曬乾鋪襪內或土法不覺示

腳氣攻注轟熱●急用大田螺數箇搗爛敷於兩足底心便覺冷趨至足而安

沙木腿腫●並治腳氣杉木鏹花多煎濃湯日日浸洗自能漸愈試之甚效加

入生礬花椒蔥薑亦妙

寒溼脚氣●腫痛者樟腦二兩烏豆三兩為末醋糊丸如彈子大每置一丸於

足心下以微火烘之衣被圍蓋凡至汗出如涎為度或放在鞋內常用亦可

豨桐丸●地梧桐俗謂臭梧桐不論花葉梗子俱可採取切碎晒乾炒磨末一斤豨莶草炒磨末八兩二味

和勻煉蜜丸如桐子大早晚以白滾湯送下四錢忌食猪肝羊血山芋治男

婦感受風溼或嗜飲冒風內溼外邪傳於四肢脈絡壅塞不通以致兩足痠

軟疼痛不可步履或兩手牽絆不能仰舉凡辛苦勞役人常患此症狀似瘋

癱服此立愈煎湯洗手足亦可

周益公陰騭丸一名退黃丸●治黃痺水腫腹脹溏泄青礬二兩入陳黃米四升用

醋拌勻慢火炒令煙盡入平胃散六兩同炒少頃去火毒醋糊丸梧子大每

服七十丸空心臨臥米飲下忌糯米油麵生冷硬物此方青礬乃銅之精液

愈於針砂針砂要忌鹽防復發青礬醋製平肝甚妙

又治黃瘰●每日空心吃生豆腐漿一碗四五次愈忌蘿蔔

秋燥乾咳無痰●梨一只去核入白蜜填滿飯上蒸熟待溫食之沸熱則傷肺

痰喘氣急●梨一枚剉空納小黑豆令滿留蓋係定飯上蒸熟每日食之神效

鹽哮●豆腐漿點糖少許每早服一碗不間斷過百日自愈

治吼病●經霜絲瓜藤四兩水三碗煎一碗早晚二服自愈

又治寒痰喘咳●白鳳仙花根葉熬濃汁擦背脊上極熱再用白芥子三兩白

芷三錢輕粉三錢研蜜調作餅貼背梁第三骨節雖熱極炙痛切弗揭動此

正是拔動病根去盡全愈不論寒熱虛實鹽醬哮喘並治如神

說話無音●雄雞心一箇瓦焙研末陳酒調服發汗即愈服藥後聲音粗大無

妨再服即愈

勞嗽方●大白蘿蔔一箇挖空入白洋糖填滿紮緊取秋露水露以芭蕉荷葉上者為妙

三碗煮極爛再露一宿燙溫空心食甚效

勞症服藥少效●宜用建蓮淮山藥二味共磨粉以人乳牛乳猪脊髓蒸熟調

食大能補土生金惟泄瀉者二乳宜少用

痰嗽帶血●用大柿餅一枚飯上蒸熟批開摻淨青黛一錢卧時食之薄荷湯

吐血方●用雞子一枚打開和真三七末一錢藕汁一小杯隔湯蒸熟食之不過

二三枚自愈

又方●用茅根一握煎濃磨金墨一杯沖服

吐血兼嗽●生西瓜子一二升淘淨泥灰大鍋濃煎濾清加入蜜糖少許代茶飲

之能化痰清營久則除根喉不停物毫髮必效血既滲入愈效愈滲此方百

無一失

吐血玫瑰膏救牛●玫瑰花一百初開者去心蒂河水二碗煎半濾汁再用河

水一碗煎半去渣和勻煎至一碗入上白糖二兩收膏不時服之吐血之後

血海驟虛無不面青唇白宜乎養血瓊玉膏之外此為最善瓊玉膏內有加

沈香者忌

又方

專治咳嗽帶紅

●雄猪肺

一具

須不見水入童便浸一晝夜取出再用藕汁人乳

梨汁帶皮蘿蔔汁北杏仁汁

各一碗

代水入瓦罐用炭火罔圖煮爛去筋絡將

炒米粉收乾為丸每晨服三錢凡吐血症面色不赤足暖身無灼熱冷汗心

中不悶者必止若躁悶刺脹火升足冷氣覺衝上宜防大吐血暴湧喉中汨

汨不止火勢上衝宜熱童便或藕汁飲之愈多愈妙吐血證脾不統血者少

肺虛火旺者多最忌服當歸煮酒方當時雖定每變衝血誤事不少救治不

及也

傷風咳嗽易變勞說

徐靈胎先生法

●傷風咳嗽人多忽之不知此乃難治之疾治之

不當或純用溫燥傷肺不知風為陽邪者又有誤投麥冬五味補住風火痰

涎咳久音啞咯血喉癰甚者數月而死如嗜酒食辣酷愛甘酸治雖得法亦

每纏綿初起用桑葉

一錢

芥穗

八分

象貝

三錢

前胡

一錢

大力子

二錢

冬瓜

角三錢 雷丸二錢 芝蔴二錢 亂髮灰四錢 櫻櫚灰四錢 苦棟根四錢 研細入

乳香一錢 麝香四分 研勻酒糊丸桐子大每十五丸 溫酒送服日二次

痔漏外敷坊前倪氏 ○腳上雞眼一錢煨存性 加兒茶冰片各二分研細塞管內 二十日愈

又方○用刺蝟皮象牙末推車蟲琥珀等分研摻并能退管生肌

肛門腫痛及脫肛徐子昭 ○生苧蘇煎湯洗 吳門崇素氏方○無花果清水磨塗

菱湖諸氏方○猪膽一枚灌入綠礬數粒勿漏胆汁少頃塗肛門即收

楊梅瘡毒方張舜欽試驗 ○葎草一名葛勒蔓錫名葛人初出時嫩頭打取鮮汁內

服外敷神驗

腳趾縫溼爛藥○龍眼核燒灰摻之立效

又方○鷺掌皮燒灰研末摻之亦效

子三錢 水煎卧服吐痰不爽加瓜裏皮三錢 杏仁泥三錢 喜飲食辣咽癢作

痛者加青蛤散三錢 馬勃一錢 白殭蠶一錢五分 淡芩八分 川百合三錢 陳芽茶

一錢 風傷營絡見紅者用黑山梔二錢 竹茹一錢 絲瓜絡三錢 當歸炭一錢

五分 茜草炭一錢 枇杷葉四片 拭絹包茅根去心五錢 藕汁一杯 沖血多用十灰

丸三錢 開水送下血症因傷風而起十常八九血易止而咳留戀津化為痰

日就損怯蓋風邪傷陰則動血血虧肺枯則為勞不比寒邪傷肺之氣陰猶

丙充至數十年而尙存也

鎮按滬俗感風咳嗽每服川貝燉雪梨風邪未撤易於纏緜子師張聿青先

生嘗教病家用甜水梨一枚 剗去核填入霜桑葉象貝母各一錢 飯上蒸熟

日食一枚其桑葉象貝尙可沖飲代茶輕揚散風風去肺寧輕者勿藥而愈

誠良方也

鼻衄不止欲絕 茅花一大把 山茶花十朵 水二碗 煎濃汁一碗待微熱分兩服

衛生易簡方 丙症門 五

又方●蘿蔔纓一兩猪精肉半觔同煮食之外用蘿蔔汁或藕汁滴鼻亦妙

臂竅出血●一人右臂出血頃刻一盆晝夜常流面白身倦後用穿山甲炙研

末罨上以帛紮之隨服補血湯數劑而愈後有老農腎囊出血治之亦定補

血湯炙黃耆一兩當歸三錢沈香末三分煎加童便九竅出血亦治

便血連旬●由酒毒者留葉蘿蔔并水煮入淡醋少許食之

又方●葶薺搗汁大斗入酒少許燉温空心服之

又方●用西瓜子殼四兩濃煎服之亦效

腸風下血●木耳納連肛猪大腸內五味煮空心食神效

外痔疼痛下血●宜戒酒節勞服此得便瀉卽止痛麒麟菜一兩洗去灰天泉

水煮烱和白糖少許食之成管者蜣螂一枚入冰片少許爲末搥之卽生肉

臟毒下血●昔有一人患臟毒下血數年自分必死得一方只以乾柿餅燒灰

米飲調服二錢漸愈一通判病此十年得此方一服而愈

澀血熱痛●藕汁一鍾調血餘灰二錢空心服之三日血止

血淋沙石淋●用川牛膝一兩加乳香一錢水煎服連服卽定如夢遺滑精者

不宜多服

盜汗方●經霜桑葉研末糯米湯服錢半諸藥不效者均止

鎮按體虛者感風熱暑溼之類不易外達或伏而爲盜汗統以涼營固表治

之則非惟汗不得止且邪不底澈久之弄假成真液耗成怯者甚多

又方●馬料豆三錢浮小麥五錢糯稻根四錢碧桃乾三枚蓮心七粒燈心三

尺臨卧煎服

盜汗外治●五倍子爲末津唾和爲餅臨卧貼臍外罨膏藥以布束之二日止

肺癰初起●綠橘葉洗絞汁一盞薏苡仁五錢煎濃汁和服吐出膿血卽愈

肺癰天蘿水●又治乳蛾能清內熱化痰爲水立秋後擇粗大絲瓜藤掘起根

三四寸剪斷插瓶中一夜其根中汁滴入瓶內年久彌佳每服一杯三服全愈

有心者宜備之方便

又方●川貝母一味竹瀝和丸每服三錢名聚貝丸病痊煮肺頭蘸苡米末服

以填其肺

噎膈胸痛●食入卽吐葑汁入梅鹵汁細呷之得入漸加得吐稠涎數升卽愈

又方●硃砂牛黃木香蜣螂貝母沈香玄明粉青黛各二分共研每服三分萬年

青汁三白酒各半杯調服藥一次開關三次全愈

噎膈有蟲●驢屎稍稍飲之神效凡病膈食胸前生二小骨漸漸交合則不能

食法用生鷲血或鴨血飲之數次胸前二骨自化

反胃利膈湯●養脾胃進食飲一名甘露湯神授方也乾錫糟六兩生薑四兩

同搗餅或焙或曬入炙草末二兩鹽少許點湯服之

又方●柳樹葷五七煎湯服卽愈此病宜食乾飯柿餅勿用水飲雜食

反胃吐食●諸藥不愈白水牛喉一具去膜及兩頭鬚炙爲末每服一錢

又方●刺猬皮炙研一兩 雞內金十具 研末每服二錢橘皮湯下

偏正頭痛●生薑薑汁一壳 蜆病者仰卧隨左右注鼻移時即愈

又方●芒硝研末吹鼻內即愈

注船頭暈欲吐●蕃薯俗名山芋不拘生熟食少許即安

一切牙痛●靛鹽火硝硼砂樟腦各一錢 共為末擦上立止

牙痛灸法●以獨蒜一枚 輕粉一錢 同搗盪寸關脈後即大指盡處男左女右 蜆殼

紫任少頃覺辣即揭去隨起一泡立時痛止有終身不發者

齒中出血●川芎麥冬煎水漱口自止

胃氣痛●急切無藥以食鹽一撮 放刀口上炭火燒紅淬入水中乘熱飲之吐

痰愈

蟲積心痛●海螵蛸一塊 以醋磨濃頓服即愈

又方●百藥不效者白馬尿或驢尿飲之神效人稱心氣痛即胃脘痛也脾痛

衛生易簡方 內症門

也若真心痛則手足青不可治也

厥逆腹痛 ● 雞子七枚 連殼煮熟對切開對臍眼覆之稍冷即換七枚徧覆陰

氣盡收入雞子內即愈

腰閃作痛 ● 及手足青紫內傷先以葱白搗爛炒熱將痛處擦熱隨以生大黃

研末薑汁調敷半年不愈者皆神效

諸疝初起 ● 必發寒熱疼痛欲成囊癰者用新鮮地骨皮生薑各四兩共搗如泥

以絹包擦囊上其癢異常一夜即消屬寒者煨牡蠣一錢良薑五分津唾調

塗即消

陰腫如斗 ● 生諸葛菜洗去泥搗爛封之即消無鮮者以乾者水浸搗塗

消斗大疝氣 ● 並治寒疝偏墜沈香紫蘇各五錢老香櫟二箇以雄豬尿泡一箇

洗淨入藥於內好酒四五煮爛麪糊丸桐子大酒送下四五十丸藥完病愈

腎陰腫大 ● 荔枝核燒研末蜜調敷并調服二錢即愈

男女小便不通腹脹如鼓●大田螺一箇鹽半匙生搗敷臍下一寸三分即通加冰

片二分麝香三厘尤妙

又方●取數年陳麥柴煎湯頻飲必通

二便脹閉不通●葱鬚頭一觔帶泥不洗生薑一大淡豆豉一撮食鹽一匙同

搗作餅烘熱安肚臍上以帛束定逾時自通否則再換一箇必通

紅白痢●紅麴五錢金銀花五錢陳皮五錢荷葉蒂四箇各炒過煎湯服立愈

又方●端午日薺菜花曬乾不拘幾稜煎服

治痢初起●不問妊娠小兒均治白蘿蔔二三觔洗連皮放石臼內搗碎絞取濃

汁如十歲以內小兒每日吃一飯碗大人每日吃兩三飯碗隔水溫熱不見

火忌量腥雜味並治疫痢如神

又方●福州糖鹽橄欖各九枚入茶壺開水泡停一時將橄欖湯服之再用開水沖

少時將橄欖如數服完將湯送下安睡片時大便傾瀉如膠如漆病即滅如

腹痛未除再服一劑

痢疾神散

此藥舍間夏末施送

●生軍

一兩五錢

熟軍

一兩五錢

茅朮

四兩

查

一兩五錢

羌活

二兩

川烏頭

一兩

裹煨

草烏頭

一兩

小兒減半孕婦忌服赤痢

燈心湯下

白痢

生薑湯下

赤白痢

燈心生薑並用水瀉調服

陳火腿骨

煎湯調服

久虛痢瀉忌之

鎮按近年暑毒熱痢為多減烏頭加銀花

二兩

山梔仁

一兩五錢

痢疾飲食不下●名噤口蜜蘿蔔入口噙之噤汁味淡再換久則自然思食再

進稀粥則下矣外用黃丹同蒜搗封臍內亦妙

又方●糯米

一升

炒出白花去殼用薑汁拌溼再炒為末每服一匙濃煎玫瑰

湯下一方五穀蟲焙研末每服三錢米飲下

噤口外治良方●木鼈子仁

六箇

研泥作二分麪燒餅切兩片只用半餅作一

竅納藥覆病人臍停一時再換即痢爽思食

久痢二三年●名休息痢虎骨炙焦搗末米湯調服二錢每日三服四十歲以內不宜用

又方●經年不愈積滯在腸中屈曲之處也桂圓肉包苦參子十四粒空心白水

吞下食醋煎豆腐壓之積下如猫屎即愈

休息經年垂危●海參每日煎湯服不數日愈

暴瀉不止●車前子一味研末米飲服二錢感暑者荷花湯下

又方●葦葉作羹粥任意食之

久瀉不止●猪腎一枚批開摻骨碎補末三錢煨熟食之

遺精方●蘇梗二錢煎湯沖潔白糖霜服之最靈

遺精貼臍●五倍子去蛀炙乾三分龍骨五分同研細用唾津調糊填臍上舊

膏藥貼之神效非常

白濁方●用雞蛋五枚須頭生者開一小孔每箇入生白果肉二粒飯上蒸熟

空心每服一箇

急救門

救荒方

一料可濟萬人

黃豆 七斗 芝麻 三斗

淘過即蒸不可多浸蒸過即曬乾去

殼再蒸三蒸三曬搗丸如胡桃大每服一丸可三日不飢

守山糧

有心有力者不可不知

用堅實蘿蔔

不拘赤白洗淨蒸熟俟半乾搗爛再以糯米

春白浸透蒸二飯搗如糊

物等分同杵勻泥竹壁待其自乾愈久愈佳不蛀不爛如遇兵荒鑿下掌大一塊可煎成稀粥

大鍋食之耐飢或做成土坯式砌牆亦可

又方 ● 黑豆

五升洗淨蒸三遍曬乾去皮為末

火麻仁

三升湯浸一宿撈出曬乾用牛皮膠水洒上再曬去壳蒸三遍

石臼搗

漸下黑豆末和勻作團入釜蒸初更進火子時止寅時取出曬乾研末乾服

以飽為度不得食一切諸物第一頓七日不飢二頓四十九日不飢三頓三

百日不飢令人強壯容貌不憔悴口渴研火麻仁漿飲更潤藏府若欲食物用葵

子三合

煎湯服開導胃脘取下藥如金色以薄粥飲數次然後食諸物並無

所損

熱痧 王孟英 病前見物如紅火腹痛吐瀉溺赤便臭睛紅唇絳神情悶亂急

偵探是痧與否試痧法生黃豆嚼之不腥而香甜者痧也生芋嚼之不麻口

者亦痧又解髮細察有赤色者拔去看胸背如有長毛盡行拔去用青錢蘸

油刮胸背肩頸 刮宜 以下以紅紫色統為度再取卧龍丹或飛龍奪命丹嗅鼻有

嚏者輕無嚏痧邪內閉遷延脈伏熱極似寒多見肢冷冷汗有一毫口渴即

是熱症大忌薑湯米湯宜用針挑手大指甲外側少商穴兩臂彎曲池穴兩

膝彎委中穴每見針科亂挑不知此要故及之再癆螺寒熱均有不可泥定

是寒外受暑穢晴紅唇絳口渴悶亂腹痛吐瀉溺赤便臭用炒香鼓 三錢 黑

梔 二錢 滑石 四錢 石菖蒲 八分 竹茹 一錢 金銀花 二錢 綠豆衣 三錢 左金丸

六分 無溺加通草 一錢 有痰加橘紅 一錢 若腹堅痛為食積加真建曲 三錢

萊菔縷 三錢 大腹皮 二錢 中虛加扁豆 三錢 井河水各半煎倘委中刺血紫

黑加蒲公英地丁 各三 肝火鬱勃按腹不堅腹痛者淡海蜇 一兩 地粟 十枚

煎烱服之吐卽定 姪婦犯者痧藥少嗅內服亦忌上方滑石通草石菖蒲亦

忌挾寒加晚蠶沙四錢 紫蘇一錢五分 香附二錢 外用焙荷葉五錢 蚌粉五錢 研

末井水調塗腹上凡熱霍亂脈伏無噎疼痛冷汗沖服行軍散一二分甚者

奪命丹一二分外用立效丹放膏藥貼於臍上

立效丹●治穢熱霍亂氣閉脈伏吹鼻外兼以封臍硃砂三兩 明雄黃礞砂各

兩八 梅冰當門子各九錢 火硝六錢 葷撥牛黃各三錢 研細密貯每用三分封臍

孕婦忌貼此方與回陽膏均須預合有力者鑒之

冷痧●腹痛喜熱按唇口刮白忌針宜灸須偵探寒否神清嚼薑不辣者真寒

症也炒鹽一旬 熨其腹又取鹽填臍上用艾灸之內服藿梗陳皮各四錢 烏藥

二錢 蘇梗三錢 熱痧方中除滑石銀花綠豆蒲公英地丁皆可加用重則回

陽膏貼臍上

回陽膏●治中寒霍亂肢冷脈微用二三分安臍上膏藥封之若口渴苔黃下

痢極熱雖肢冷脈伏爲熱痧勿貼孕婦忌生香附九錢母丁香六錢上桂心

四錢倭硫黃二錢五分當門子二錢共研密貯四肢厥冷者辣蓼草合六神曲所用之草入兩

木瓜四兩桑皮五兩大蒜梗六兩陳蘇袋一方約尺許煎水一鍋入陳酒一觔煎

熱揩熨四肢偏身煎水一鍋入陳酒一觔煎

絞腸痧●發則脹滿昏亂腹痛脈伏冷汗上不得吐下不得瀉卽是用鹽一撮

井河水煎服得吐下卽鬆不應以太乙丹二分或飛龍奪命丹二分沖服救

之內服方如前忌扁豆外用針法

飛龍奪命丹●治穢惡瘴疫痧脹絞痛轉筋厥冷瞽亂神昏有斬關奪隘起死

回生之功硃砂飛淨二兩明雄黃飛燈心灰各一兩人中白漂淨各八錢明礬青黛飛淨各五錢

麻黃去節四錢梅冰四錢真珠牙皂當門子蓬砂各三錢西黃二錢杜蟾酥火硝各

錢五飛真金三百十六味研細以少許吹鼻再用開水調服一分

弔腳痧●足筋抽痛有寒有熱轉筋入腹者危覺轟熱者木瓜煎湯青布浸擦

之筋堅者鹽滷浸搽軟散爲度挾寒足冷者吳茱萸研末一兩鹽滷塗足心

又方●樟腦一兩布包浸燒酒由背順擦至尾閭骨數十次即鬆

又方●兩足大指聚筋上切蒜片安艾灸六七次內服清初銅錢四十枚木瓜五錢

炙烏梅五箇左金丸一錢煎服無溺木瓜減半加絲瓜絡六錢晚蠶沙

四錢生薏仁五錢通草一錢加減同前清末藥水制銅幣有毒勿用

霍亂欲脫●膏汗如珠躁欲入水吐多氣短兩目無神咽中怯力不欲言爲脫

證痧藥開竅不可再服急用附子末二兩醋調塗足心外用好醋二三鐵器

或炭燒紅頻淬醋使病人嗅之內服方高麗參一錢起碼重再加開水磨好待沖桂

枝白芍湯炒五分煎湯和勻灌之汗不止再加煨龍骨六錢煨牡蠣八錢瀉

仍未止加赤石脂禹餘糧各三錢此方非真脫症不可輕用入刺

斷疫不染●取病人所著衣服蒸過則闔家不染平日忌食鱧鱉酒蟹冰水果

品宜食綠豆黃豆故者菴絲瓜青葡萄等

堂勿睡露下用銀花佛手代茶胃寒用藿梗橘白稍覺不舒飲真建曲湯

染痧忌食●吐瀉未止五六日不食亦不妨弗謂七日不食而危也如覺飢者
煮冬瓜或蘿蔔食之或綠豆米仁湯或筍湯煮北方掛麩食之吐瀉已定週
時內亦忌食穀

中暑卽死●熱天受熱倒地不省人事是也用生礬半觔水煮熟待微溫浸足卽
甦甚者綠豆泡湯化行軍散一分或紫雪三分灌之一切痧藥內有燥藥如
朮朴等忌用

救縊死●凡男女縊死身雖僵冷尙可救活不可割斷繩索抱起解下安放平
坦處仰面朝上頭要扶正先將手足慢慢曲彎然後將大小便用絲軟之物
裏塞不令洩氣一人坐於頭前兩足踏其肩揪住頭髮將縊人之手拉直令
喉項通順再用二人將筆管入耳內不住口吹氣不住手撫摸其胸前用活
雞冠血滴入喉鼻之中男左女右男用雄雞女用雌雞如氣絕時久照此救法務要多吹多

摸勿謂已冷忽略不救又灸法將其兩手大拇指並排平正以小帶縛定於

兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴以艾火灸三壯無故中邪而縊者以多灸為妙

救溺死●急打乾壁泥一堵置之地上卻以溺者卧其上更以壁土覆之止露

口眼自然水氣翁入泥中即醒如係冬月急將溼衣解去速令生人脫貼身

熱衣為之更換抱攬身上將溺人微倒側之令其水出一面用粗紙燒燃取

煙薰其鼻竅稍燃片時即用皂角末吹入鼻竅得嚏即生或用蘇合丸生薑

湯化灌湯勿過熱恐其損齒又不可驟令見火一見則大笑不止而死倘微笑急掩其口鼻

救斃死●原有燈即存燈無燈忌火照並忌急喚但痛咬其足跟及足大拇指頻輕呼其

名及唾其面甚者以蘇合丸酒化灌之

中風不省●慎不可以滴水入喉即成廢人治法分閉脫兩症如緊閉牙齒手

拳面赤脈息洪大即閉症白礬鹽花擦牙細辛皂角末吹鼻用竹瀝五錢入

薑汁少許化牛黃清心丸灌之若口開手撒眼合遺尿汗出如珠面白肢冷

爲脫症宜灸臍下丹田穴濃煎參湯調三生飲三錢灌之

撲打猝死●心頭溫熱者經日亦可救先將死者盤屈在地上如僧打坐狀令一人將其髮控住放低用生半夏末竹管吹兩鼻中久之卽活甚者以蘇合丸酒化灌之

跌壓傷死●口耳出血不省人事但看面有生氣可救亦如前法坐定隨以人尿或馬溺灌之更以足緊抵糞門不令洩氣急購回生丹一九或藜洞丸一九童便化灌

又方●購七釐散一二分灌之外用醋調敷傷處醒後熱酒調雪白糖時服再入

跌仆不省●親見江湖走索之人墮地不省次日仍然走索以爲駭異知有此方重價得傳生地歸身丹皮五加皮乳香沒藥海金砂自然銅各一錢酒水各

半煎服無不應效

煙薰至死●白蘿蔔搗汁灌之立醒無則用乾葉水泡搗汁

衛生易簡方

急救門

火燒悶死●肢體未甚傷者人尿頻灌之良

煤毒昏暈●惡心跌倒急移風涼處用海帶泡水待冷灌之

解鹽鹵毒●急將豆腐漿灌下不致凝血將死者卽生

又方●白洋糖四兩白湯調灌亦活

救吞生煙●藜蘆五錢生甘草五錢生大黃一兩長流水三碗煎汁去渣再入

白蜜五錢膽礬末二錢待涼灌之不論用茶酒食生煙者皆能全活

又方●粳米粉生水調一碗灌之自然嘔吐再灌再嘔以吐水雪白爲止沈華亭傳

又方●柿漆一鍾灌入此物入煙煙卽化水傘店漆店均有

解砒毒●急取熱鴨血灌之羊血亦佳

又方●急研防風末一兩冷水調灌

救吞金銀●羊脛骨燒灰三錢米湯調下立從大便出

又方●荔枝肉二兩砂仁一兩威靈仙三錢煎水飲之亦下砂仁太多不妥以前方爲妙

誤吞銅錢●多食葶薺胡桃銅自化

誤吞鐵針●葦菜蠶豆同煮食之

解河豚毒●大紅降香爲末以綠豆一升煎湯調服錢許吐出毒物卽愈

解巴豆毒●先用糯米湯頻頻灌之口渴面赤五心煩躁泄痢不止者甘草濃

煎服入腹卽定

又方●黑豆一升煮汁飲之

閉口椒毒●吐白沫身冷欲死飲人乳可解

中飲食毒●未審何物只以甘草薺芫煎湯入口便活

解礪砂鳩酒毒●已死心頭溫者綠豆粉調水灌之愈多愈好

飲燒酒毒●鍋蓋上氣水半盞灌下卽醒又用生蚌水灌之

誤吞螞蝗●多以蜂蜜調水飲蝗卽化水卽從小便出後服淡鹽湯解之

耳內蟲痛●蟲在內竅奔走或血水流痛不可忍以蛇蛻烘研吹入立愈或

滴貓尿及鹽滷立效

壁虎入耳●用雞冠血滴耳內卽出或用雄貓尿滴入耳中靈效

蛇蟲傷●五靈脂一兩雄黃五錢爲末酒調灌服二錢並敷傷處

又方●毒蛇嚙死用香白芷四兩爲末麥冬湯灌之傷處出惡水卽活

又蛇牙入肉●傷痛者蜈蚣研末敷

又方●野苧麻根打汁服渣敷傷處

蜈蚣毒蛇咬●竹煙管內脂膏塗在咬傷處痛卽止

又方●蜈蚣入腹刺羊血或豬血灌之卽吐出

瘋狗咬●狗嗅蛇涎中毒頸大頭低耳落尾掉見人則咬或啣衣亦能中毒急

則七日緩則百日必發腹中絞痛痛極心中無賴自抓胸襟並舌指膚肉衣

服再咬瓦石過二三時卽死慘狀難言起初欲辨此證須以葵扇向病人重

扇卽身縮戰慄是也卽服此方一二劑至二七日吃生黃豆試之如有腥氣

欲嘔毒已盡除否則再進一劑至三七日再取黃豆試之方列於下真紋黨
三錢 前胡 三錢 桔梗 二錢 撫芎 二錢 羌活 三錢 紅柴胡 三錢 茯苓 三錢 生地
榆 一兩 獨活 三錢 枳殼 二錢 甘草 三錢 紫竹根 一大握 郎黑竹 生薑 三片 濃煎服或
用紫銅錢如雍正最妙煎湯洗患處

又方 ● 金銀花 六錢 清風藤根 五錢 黃芩 一錢 五分 連翹 二錢 甘草 五分 山梔仁 一

錢 水煎如鄉僻無藥取萬年青打汁三杯陳酒送下約二三時寒熱交作次
日下瀉血錠毒下即愈

痴犬咬拔毒法 ● 木髓子 一筒 明雄精 一錢 杏仁 一錢 蓖麻子 廿粒 人中黃 三

錢 膽礬 三錢 研勻蚯蚓泥搗塗一週時出犬毛為驗

蛛蝎咬 ● 雞子 一筒 敲小孔含之立瘥

又方 ● 洋火一枚只用頭蘸口津輕磨傷處甚者三枚即愈

蜂螫傷 ● 醋調黃丹塗之或用漆碗合螫處神驗

百蟲咬 ● 先以頭垢封之再購青黛雄黃研塗

虎咬 ● 血大出傷口立時爛痛急用豬肉貼之隨研地榆一筋三七末三兩苦

參四兩 研末摻之血止痛定

人咬 ● 熱尿洗去牙黃瘀血漱口嚼青州柿餅蒸爛敷生白果栗子均可嚼敷

解悶香 ● 旅客卧時口含黑大棗肉香不能迷或枕間置水一盂則迷藥渙散

傷科門

刀傷靈藥 ● 柱圓核研末摻之愈後無癢傷在鬢髮兼能生髮

止血藥桐方家傳 大暑時拔野苧麻草打汁熟棉花浸至黃色曬收見血不止

貼之神效

刀傷內服方 ● 未透膜者用乳香沒藥各一錢 好酒草便各半盞 煎服另以磁瓦刮

真降香龍骨烏劍骨末摻之亦效

金瘡犯內出血 ● 不止者取本人婦袴帶一條燒灰水服血即止又箭及傷急

用婦人經布燒灰用陳酒沖服

咽喉截傷飲食不下 ● 雞蛋一箇 開一孔去黃留白入生半夏一箇 微火煨熟

止食蛋白即愈

煙筒傷喉出血不止 ● 桂圓核焙研筆管吹之血止痛定

跌打青腫 ● 猪肉或肝微炙貼之

又方 ● 梔子黃五文 白麪一調羹 麩皮少許 薑葱同搗燒酒和微炒塗之閃斝亦治

面目傷腫 ● 凡眼目打傷青腫以生半夏為末水調塗之即愈凡指爪抓傷面

目以橄欖核磨水搽之過宿則無痕

又方 ● 坐臀猪肉一片 以當歸赤石脂研末摻肉上貼之拔出瘀血眼即無恙

受傷瘀血注痛 ● 生大黃末薑汁調塗一夜黑者變紫二夜變白

跌打損傷 ● 玫瑰花四十朵 黃菊花四十朵 紅月季花七朵 土鼈蟲七枚 研細末童

便酒各半 沖服如嘔瘀血加白荷花七朵 研末瘀停青痛用木耳四兩 焙末

每服一兩麻油三匙串好酒送日二服

金瘡傷悶絕不省●急研琥珀末一錢童便調灌從高墮下者亦治

杖傷●急飲童便一碗外用熱豆腐鋪在傷處其氣如蒸豆腐漸成紫色再換

熱豆腐鋪之須得紫色散盡得淡紅色為度內服白芨末二錢米湯送下

接骨神方●治跌傷斷骨從高墮下跌折筋骨碎痛不可忍此能接骨續筋止

痛活血礪砂當歸續斷各三錢骨碎補四錢為末每服二錢蘇木湯下筋斷加

楓香脂末敷傷處即連

又方●活蟹一隻生搗爛滾酒沖服

接骨外敷●綠豆炒黃研粉井水攪之愈黏愈妙攤布上圍裹傷處務先將斷

骨正理包紫勿動兩日夜方可解看

跌仆傷筋●葦菜搗爛敷之一宿即愈

一切擦傷●釘鞋傷腫病久褥瘡皆治廣東皮金紙即剪取將金面貼傷處過

宿卽愈

箭鏃銅鐵炮子入肉 ● 乾莧菜打爛紅沙糖少許 同敷自出竹木入肉亦可治

竹木刺入肉 ● 沙糖厚敷之刺自出又治葦刺生嚼栗子敷之

骨刺入肉不拘鐵物 雜物均治 ● 象牙刮末以白梅煮水調塗刺輒卽可出加蓖麻子同

研亦妙

湯火傷 ● 最忌水淋又忌燒酒敷增火致腐急買蒲黃末 黃丹末 赤石脂末 梔

子黃末 生大黃末 數味藥店有現成研好卽加香灰少許 麻油醋各半調塗

既便捷又止痛退火護肌

預備湯火傷兩方 ● 廣東桂圓外殼勿塗黃者煨末貯存麻油調愈後無痕

又方 ● 秋葵化將謝入麻油中浸密收用時以油塗之

熱油燒痛 ● 石膏末四文 蜜調塗猪膽汁掃之亦妙或加青黛最妙

渾身火瘡 ● 麥麩盛入夾被中縫合藉以半墊半覆性涼而輒兼可愈瘡外用

雞蛋煮熟去白用黃入猪油去膜比蛋黃稍多同搗敷之神效薄荷煎汁待涼頻塗亦妙

火藥傷人●生南瓜搗敷槍子入肉敷之亦出收南瓜入鹽滷中備用亦良

眼目門

赤眼腫痛●黃丹白蜜塗太陽穴或用土硃石膏入冰片塗兩太陽穴

又方●葶薺汁塗目即退

去赤翳●田螺一枚去殼以川連細末摻入露一夜早晨取化出之水點之即退或用指甲象牙磨人乳點亦妙

目上有星●石蟹磨汁點目皆合眼少頃即去或白蒺藜

三錢水煎洗之三日

即退親驗

又方●葶薺汁灑紙上乾後點之

洗眼方●昔彰德府太守親驗杏葉十片無根水一確煎入分澄清洗之此方

洗之一年日如童子照下列日期洗正月初八二月初初五三月初初五四月初初五五月初

六月初初七七月初初七八月初初九九月初初七十月初初十十一月初初九十二月初初九如遇閏月同前

治偷針眼 ● 白芨磨水塗又用生地南星搗貼

眼皮生瘤 ● 櫻桃核磨水塗之自消

爛沿風眼 ● 覆盆子取葉按碎以汁滴眼中即有蟲出盡盡自愈

雞盲眼 ● 雞肝一箇不落水羊肝一副指去血汚用車前子一錢石決明五錢砂罐內淘米

水煮服

眼瞳成漏 ● 凡眼下空處生瘡出膿流水不乾日久成漏諸藥不應者以柿餅

去皮取肉搗爛塗之十日全愈

塵絲入目 ● 磨爪甲及金墨點之其絲自出

泥沙入目 ● 嚼牛膝搓丸塞之泥裹沙出

石灰入目 ● 三日外不可治用山梔子煎濃汁俟澄定頻洗

又方●用潔白糖化水澄清將眼皮展開以糖水滴之

火藥傷眼●急令患人倒地用熱小便澆之再用自己小便洗自明

煙矢入口●亂髮揉之即出

頭風日盲薰方●徐靈胎云嘗見一人頭風痛甚兩目皆盲徧求良醫不效有鄉人教用十字路口及人家屋腳邊野萹菜煎湯注壺內塞住壺嘴以雙目就壺薰之日漸見光竟得復明王孟英飲食譜載此方注云本草萹通九竅其實主青盲明目而萹字從見益嘆古聖取義之精

喉舌門

喉蛾●看頭上有紅疙瘩即用針挑破或生紅髮即扯去毒自鬆以雞內金末吹之即穿

免喉內生蛾●喉中略痛即用燈草一把煎傷白洋糖少許沖飲一日即止痛

立愈

纏喉風救生丸●先兩日頭目昏暈胸悶氣促咽喉腫痛手足冷爲纏喉有兩塊結喉旁甚則大如雞卵爲鎖喉更劇天名精根卽杜牛膝取根乾爲末鮮菖蒲打汁爲丸曬乾收貯每噉一二丸痰吐卽鬆好善者宜備之方便

鎮按人需天氣氣閉式時卽死故喉風爲急症

又方●廣東萬年青搗爛取汁灌之吐痰卽生

纏喉風秘方●常熟趙氏祖傳纏喉方秘惜不傳一日趙氏子與章某飲詢其方不答酒次趙喉間痛不可忍乃大聲曰爲求猪牙皂角細末來以醋調入喉痰大吐痛立止餘藥塗外頸項乾卽易遂愈

喉風十八症秘方●馬蘭連根打汁一盞明礬壹大一塊重湯燉溫細呷之

又外治法親●喉脹牙緊不及醫治者老大蒜一瓣搗如泥男左女右罨寸脈後將

手側放大指盡處以胡桃殼半枚掩之用綫緊紮數時起泡挑破去毒水卽鬆

純陽青娥丹●專治雙單蛾喉風喉閉等症立卽開關白試百驗青魚膽不拘多少

以生石膏和勻須乾溼得宜陰乾爲末每一兩加上梅片一錢共研磁瓶密收吹之

喉風奪命丹 ● 專治急喉風痰湧氣逆吹之立效真西黃珍珠當門子各一錢

砂四錢 牙硝一兩 五錢 月石五錢 殭蠶一錢 雄精二錢 人中黃一錢 九味各研細

末磁瓶收儲勿泄氣急喉風乃喉症之最險者小兒每患之按其症必痰潮上湧氣短欲絕有初起寒熱延至三四日後發者有一二日發者有朝發夕死夕發朝死者總以痰湧氣促爲的候如見此症急吹此丹二三管痰即隨藥而下頃刻卽愈真奪命神丹也寶之

外治與功丹切弗沾唇 ● 此乾隆丁未札方班毛去翹足四錢糯 血竭另研 沒藥乳香

全蝎元參各六分 麝香冰片各三分 共研細末磁瓶貯用時以尋常膏藥一張取

藥末如黃豆大貼喉外緊對痛處一二時揭去卽起泡用銀針挑破水如黑

色再用膏藥及藥末貼於泡之左右仍照前挑看以出痰黃水爲度不論候

蛾喉風喉閉一切均可用惟孕婦忌之藥瓶及藥包上宜寫明水貝請入山不可入口以防誤毒

又方●茱萸末醋調塗足心能令火氣下行

白喉清熱肅肺飲●此症頭痛背脹惡寒發熱身痛喉微痛或痛甚漸見白點

成塊切忌表燥誤則音啞氣喘鼻衄頤腫白塊自落喉間全爛要知此症多

患於肺陰虛七情氣鬱嗜飲吸辣之人五志之火早已蒸騰內燄鎔金灼液

況少陽相火少陰君火二脈並絡喉二火相煽金傷已極就令再感外邪六

氣多從火化煤油火尚要遠避況燥藥乎即多臥亦氣火上蒸宜掙扎行動

倦者坐站可也初用粉葛根五分薄荷一錢桑葉一錢連翹三錢

金銀花三錢黑梔二錢元參二錢丹皮二錢燈心三尺掛金燈八分此藥不

必多煎一日夜須二劑搜少加車前子二錢大便秘加肥知母二錢痰多加

竹瀝八錢有積加萊菔纒五錢山查炭三錢嗜飲熱壅加綠豆衣六錢多鬱

氣悶者加鬱金末三分綠萼梅二錢惡寒已退見氣喘鼻衄者去葛根薄荷

加冬瓜子五錢 枇杷葉拭去毛 青蘆管二尺 白茅根一握 喉腫口臭神糊加

馬兜鈴一錢五分 赤芍一錢五分 木通一錢 竹葉心十片 喉見白爛加金果欖三錢 鮮

石斛五錢 大天冬三錢 頻吹錫類散自愈

錫類散●專治一切時疫白喉爛喉雙單蛾等症象牙屑二分 珍珠二分 梅片

三厘 飛青黛六分 西牛黃五厘 壁錢廿箇俗名蟾子窠 人指甲男女各三 共

研細末吹入患處流出毒涎慎勿嚙下爛處自能生肌

舌上出血●槐花研末敷即止

魚骨哽喉●硼砂一錢 含化脫然而失

又方●橄欖核磨水呷之

又方●哽某魚之骨即取其魚眼珠腐皮包吞自化

諸獸骨哽●象牙磨水吞之 又人指甲研末水化呷之

諸骨噴祝由方●用清水一杯 中大雨指並之水中空書八字入水見龍入山

見虎連書連誦其七遍將水吞下即化

婦科門

月經久閉●逆從口鼻出血先以好京墨濃磨一盞服之其血立止次用當歸

尾三錢紅花一錢五分煎服經即通

乾血勞奇方●白鴿子一隻去海腸雜入血竭一兩以綫縫合無灰酒煮熟食完瘀血

即行如心中慌亂急食白煮猪肉一塊自止病二年血竭用二兩三年三兩

血如山崩●或五色漏帶香附炒研末米飲調服二錢昏迷甚者亦愈

又方●桑耳或槐耳焙研酒調二錢肉色黃瘦暫止復發者均止

妊娠便血●血餘灰二錢空心米飲調服即止

頻慣墮胎●覺有孕用杜仲八兩糯米湯炒川斷肉四兩酒焙為末淮山藥粉

二兩糊丸梧子大空心鹽湯下三錢

又方●用絲絲一兩入瓦罐內封固煨灰存性空心熱酒沖服須於小產月內

服之

胎前患瘡●每致小產夜明砂為末空心酒下三錢即止

妊婦久痢●不止則墮胎荷葉蒂七箇燒灰存性研末酒沖服之奇效

又方●服過諸藥不效者用雞蛋一箇開一孔以銀針腳挑勻加黃丹三錢紙

封飯鍋蒸熟空心食之愈

閃跌漏胎●已見紅者生地炭一兩川斷杜仲阿膠各五錢砂仁七分沖服

胞破瀝漿難產●猪肉一二斤洗切煎湯吹去浮油恣飲之即生

橫生難產●黨參一兩煎湯舊頭繩一條燒灰沖服不論橫生逆產神效

蔡松汀保產神方●治久產不下連服四五劑只服頭煎不服二煎恐力薄也

己產勿服熟地一兩蜜炙蘇芪一兩當歸身四錢白茯神三錢醋炙龜版四

錢 路黨參四錢川芎一錢白芍酒炒一錢杞子四錢產以氣血為主氣足則

易於送胎出門血足則易於滑胎落地若忍痛過久則傷氣下水過多則傷

血氣血傷而不足產何能下此方大補氣血於臨產危急之時無論產婦平時氣體虛實胞衣已破未破急服此方痛可立減胎自順下或疑產婦先受外感不宜大補殊不知痛甚且久則腠理齊開邪從表解矣胞水迸下則邪從下解矣切勿疑慮自誤有孕之家至足月時宜將此方預購一二劑聽用深恐夜深店遠一時不及也

臨產六字真言●達生編云一日睡二日忍痛三日慢臨盆蓋小痛徐徐下水乃是試痛有至數日產者若暴下水緊痛方是欲產亦宜安耐或仰睡或坐站勿早臨盆切不可縱令收生婦動手探摸及摘破胞衣誤事不小倘目花胸陷腰腹齊痛方可用力只一盞茶時耳若早用力逆則有橫生倒產之患難產奇方●黃紙一方硃筆書紫英夫人在此放於產婦髮中其胎立下卽刻將黃紙取出焚化稍遲則并腸俱下矣

又方●露天陳麥草一兩洗去塵剪寸段煎湯服下窮鄉僻壤亦可方便

將產備物●凡房中冬月宜放火盆以禦寒氣夏月宜貯井水以收熱氣片斷

臍帶當長六寸長傷肌短傷藏勿早洗兒恐水溼傷臍以致臍風冬天尤宜

慎之最宜滿月洗兒亦必密室避風也產後預備陳醋一斤以燒紅炭淬之

以免血暈三日止產後上牀卽高枕靠墊勿令睡下膝宜豎起勿伸直三朝

始可稍去其墊尙宜高枕七日後無他病方可安枕多有半月未能貼席者

免嬰兒生螳螂法●產婦臨盆時朝南則生下兒可免妬乳屢驗

胞衣不下親驗●蓖麻子七粒去殼研塗足心下卽洗去否則連腸攝下如腸下

及盤腸生者蓖麻子仁研塗頂心卽收上

又方●黑豆三四合陳醋三大碗煎數沸布蘸熨臍腹胞自下已驗

死胎不下●蒼朮米泔浸炒厚朴製陳皮去白各三錢甘草一錢炒朴硝三錢一服令化下

臨產忽暈●乃氣悶不清所致紅花同醋煎薰鼻卽醒

產後血暈●眩冒不省者五靈脂半生研末白易湯服一錢丁禁者灌之又接

卽活外用鐵秤錘燒紅淬醋中使嗅自醒

預防血暈●苧麻破血可作枕令產婦枕之能止血暈

產後中風●不省人事口吐涎沫手足癱瘓當歸荆芥各二錢水一盞酒少許童

便少許煎七分灌之下咽卽生

產後發喘●面黑乃血衝心胸入肺竅命在須臾血竭沒藥各一錢研末童便和

酒調服

又方●蘇木二兩水煎參鬚末五錢沖服之血下卽可回生

產後下痢●七日止殺人炒枯赤沙糖四錢查肉炭五錢伏龍肝一兩水煎

空腹服

產後陰腫●紅赤腫痛形似生毒皆因下體受風瘀血停滯穿山甲炙研末每

服二錢酒下卽消外用乳香五錢研細葱白打如泥同研敷患處

產後溺秘不通●橘紅一錢為末空心溫酒下

幼科門

初生解胎毒 ● 橄欖核 三枚 憶存性明雄黃研水飛 三分 甘草 一分 研末用白

蜜 數匙 連皮胡桃 一枚 研勻去渣溫熱時哺之大忌服三黃湯最傷元氣

又方 ● 橄欖核 一枚 甘草湯磨濃如糊溫熱與吞亦解胎毒

小兒不吮乳 ● 黑豆 十九粒 白茅根 一錢 加金銀器 一件 懸煎人乳 一杯 煎至五分哺

之服完即能食乳

臍風神方 親 ● 初生七日內不時噴嚏吸乳口鬆音啞手拳面眼角黃甚或人

中承漿亦黃若口唇鎖緊舌頭強直不治一見眼黃用墨筆點額門眉心人

中承漿兩大指甲外側少商穴隨取燈心蘸麻油點火吹熄乘熱照墨筆點

一焯末落臍帶於帶口一焯既落於落處一焯臍四圍六焯共十三焯若少

腹有青筋一條如了父到心即不治亦於青筋頭焯三次風止面黃亦退

又方 ● 兒生次日看牙齦有白泡此病發之候即以指爪擦搯令遍微出血不

妨隨以冰硼散搽之如齒際不開用天南星薑汁磨一分擦牙關卽開再用

時直疆蠶八分蟬衣錢薄荷一錢煎濃沖勻癩半調灌入口中以口開為度

預防臍風方●枯礬二錢硼砂五分硃砂五分冰飛冰片五厘明雄黃五分共為細

末凡小兒生下卽用此末摻臍眼上每日換尿布摻之完一料永無臍風之

患臍風為初生險症然風之由來皆因天寒洗兒或束臍不妥及兒尿溼臍

所致慎之

兒多啼臍中出血●白石脂研末敷之如不愈再以末微炒摻之

臍內破爛出水●煨龍骨當歸黃連桑螵蛸各一錢枯礬五分輕粉少許研細敷

初生不通大便●眞麻油一兩皮硝少許同煎滾少冷微灌之嚙下卽通

赤遊丹毒●綠豆五錢大黃一分為末生薄荷泡湯與蜜調塗

又方●芭蕉根打汁搽塗馬蘭頭打汁不時塗之亦效

過歲小兒尿血●大甘草一兩清水六碗煎二碗分數次溫服

小兒顛陷 ● 生半夏末水調塗兩足心陷即起

小兒發熱不退生驚 ● 凡小兒壯熱不退忽然生驚勢甚危急用之多效青蒿

蟲立秋前取青蒿梗剖開中有蟲取出麻油浸儲每一兩用辰砂五錢輕粉

大黃各一錢 麝香二分 共研為丸如綠豆大週歲一粒二三歲二粒四五歲三

粒用人乳和服有心濟人者宜預製方便凡慢驚有吐瀉肢冷昏睡露睛顛

陷鼻塌等證宜溫補不宜用此

急驚外治 ● 驚時勿捉摸手足防致疾一切石藥多服則成呆此方外治甚穩

直僵蠶三條 藤黃七分 青黛七分 川連一錢 全蠍三隻 研末天泉水煮糊用

大膏藥一張 放藥於上留一小孔冰片一分 麝香少許 作藥心趁熱貼兒臍

上用綢紮住不半時兒腹嚮隨下大便驚即止膏藥須十二時方可揭去

種牛痘須知 ● 英醫占那氏種牛痘一法創於乾隆時種之兩臂較鼻妥當能

弭天花誠萬國赤子之福也顧種後須辨真偽蓋真痘種後有紅暈一據也

十日內外清漿變稠邊高中窩色清亮二據也入九日身微熱不安三據也
痂落有白痕終身不退四據也倘無憑據乃假痘雖種未種隔半年宜復種
西人於小兒三月內卽種有種至三四回者華人一種卽爲了事近年喉痧
盛行每多傳染不治論者每咎近種牛痘痘毒不清不知時行病起人人可
以種痘防患而襁褓體質壯胎火旺者尤宜常種近年善堂多半無臨時防
疫種痘卽有之不肯人人皆種爲可憾耳

痘後發餘毒 ● 赤小豆 五錢 苧蔴根 二錢 爲末雞子白調塗卽消如穿不可用

內服方金銀花 三錢 生玉竹 一錢 五分 地骨皮 二錢 綠豆 二錢 野黑豆 三錢 生甘

草 三分 青果 三枚 燈心 三尺 水煎服

痘出眼中方 ● 此爲天花者設東丹輕粉猪牙皂 各一分 大梅片 五厘 爲末左眼

吹左耳右眼吹右耳久則難移

治小兒一切胎毒 ● 金銀花 鮮者曬乾不炒研末 四兩 白洋糖 三兩 拌勻磁瓶

收貯隨時服之或作糕餅食或以物蘸食之

痧發不透

即瘡症俗
子痧子

●氣喘欲絕芝麻

五合

滾水泡之乘熱薰頭面即發誠起

死回生之法

小兒驚口●口瘡色白醋磨南星白芨塗兩足心勿洗去男女左右另用馬蘭打汁

搽之口唇

走馬牙疳●凡大人熱病之後火毒留胃或小兒痧痘之後變為牙疳白腐口

臭潰爛不堪或發癢齒脫腮硬多致不救用綠礬一錢石膏三錢粉口兒茶

一錢蓬砂一錢人中白一錢人中黃一錢冰片一錢煨共研細末以甘草浸絹

帕拭去腐血將舊軟筆頭蘸藥搽之此幼科高三如驗方

耳疳臭膿●久則臭膿成塊塞竅而成耳聾終身不便上梅片一分煨蘆甘石

五分五倍子三分枯礬一分煨龍骨五分海螵蛸五分橘皮炭一錢赤石脂五分

五分粉口兒茶一分黃魚齒二枚蠶繭殼二枚胭脂邊二錢共研細末捲淨

濃吹耳中一日二三次

小兒痞疳食積●小兒失乳之後服食米麪定有積塊或食積或蟲積乳積痞

疳患此症或泄瀉而傷眼或口渴而思飲或貪食而不飽或黃瘦而愛睡用

苦杏仁

七粒

生黃梔子

七箇

皮硝

三錢

紅棗

七箇

去核葱白

七寸

小麥麪

羅細三錢

其打爛分爲兩一敷肚臍一貼背腰以布巾縛好貼三日肉見

靛色卽好如未見青再換一次

一切兒疳●螻螂又名竈馬竈上甚多焙乾入食物內與吃患者但聞其香不

覺其腥猶生疔之食豆也食一二次愈後體更肥胖

幼孩瀉久不止●防成慢驚黃丹

一兩

葱

一根

薑

二片

切打爲膏貼臍上以布

紮緊待瀉止解去

又方●川椒

一分

去目碾末米飲調塗腦門日三次

小兒痢疾●山查肉炒研每服三錢紅痢白糖湯調白痢紅糖湯調

衛生易簡方

幼科門

瘡毒門

男女童勞●不如大人咳血洩精只是身羸膚熱皮焦宜早治野茄稞內蟲數

條此蟲生梗中有蛀眼內綠色黑嘴和食物內與吃數次愈

小兒熱病狂語●諸藥不效者竹瀝一合温服

瘡毒門

芙蓉散專敷瘡毒●芙蓉花或葉或根皮搗爛或乾研末蜜調塗四圍中間留

頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿出已潰者則易斂或

加赤小豆末亦妙凡無名腫毒急切無方購金黃散敷或一筆消磨塗均效

發背腦疽●初覺時採獨科蒼耳一根連葉帶子細切不犯鐵器砂鍋熬清水

二大碗煎一半瘡在上飯後徐徐服之倘吐候吐定再服瘡在下空心服瘡自

破出膿不計數服以愈為度

背瘡初起●醋磨金墨塗四圍中以豬膽汁塗之乾又上一夜即消

治搭手●芋苳生薑同搗敷之立消

指痛欲生疔●人指甲炙末一分放患處胡桃肉搗爛裝入胡桃半殼內合住

不可露氣一時痛止卽消

又方●雞蛋一箇開一小口入紅靈丹一分攪勻套指上久之痛止卽消如不

愈再套一箇

疔腫惡瘡●荔枝肉白梅肉各三箇搗餅貼上根卽出

治疔神藥●蒼耳梗中蟲狀如小蠶梗有蛀蟲眼以刀截兩頭綫縛挂簷前有

蟲在內經年猶活用時取兩枚同白梅肉打貼神效一法將蟲浸麻油內用

時將蟲嘴對疔頭膏藥貼之

疔瘡神方●治十三種疔憎寒煩熱惡心肢麻心煩作躁甚者昏憤頻服此方

忌食葷酒始終以素菜爲穩野菊五錢蒼耳頭稀莧草半枝蓮地丁草各三錢

草河車二錢金銀花五錢煎服梅花點舌丹一九先吞

紅絲疔●此症危急生於足者紅絲漸長至臍生於手者漸長至心生於唇面

者紅絲漸至喉至則不可治矣急用針或磁鋒刺破其紅絲盡處用白菊花

葉一兩冬月用根加雄黃少許蛇蚰螺一條搗爛從頭敷至絲盡處內服地丁湯地

丁草三錢野菊五錢連翹三錢山梔二錢淡黃芩一錢黃連五分銀花七錢

竹葉心五片水煎忌用酒瘡以疔為最險宜忌口只食醃白菜蘿蔔絲瓜冬

瓜綠豆所做諸蔬均可食忌食一切葷腥煙酒房事惱怒每見患者不知禁

忌釀成走黃攻心不救殊堪憫也白淋肉疔

菊花汁治疔毒重症●又治走黃家園菊花多取搗汁一大碗隔湯溫飲即愈無花用

葉無葉用根疔肉白淋肉

疔瘡走黃●凡患疔毒誤食猪肉走黃法在不治急搗芭蕉根汁服之立效屢驗

翻唇疔●有少年唇口患疔接連七箇頭腫如斗心悶人昏一女丐曰此名七

星趕月急用蛔蟲搗爛塗之頃刻瘡內流出黃水腫消神清次日愈如無蛔

蟲以五穀蟲一錢燒末白礬三分蟾酥三分醋化搗勻塗疔上少刻流出毒水亦

效凡疔毒生唇上卽看大腿彎有紫筋起者急用銀針或磁鋒刺出血卽鬆

痰核●五倍子砂鍋炒黃爲末以好醋調膏攤貼患處三五次愈

瘰癧方●用黑鉛炒成灰四兩醋調敷不痛不破一月卽內消而愈

又方●青蠶豆葉浸米醋貼之乾後換愈內服方茜草根末五分雞子一枚破

頂入藥紙糊好煮透去草食之輕者三箇卽消

瘰子頸秘方●炙龜版二錢穿山甲二錢焰硝一錢製白蠟二錢白毛夏枯草

二錢研極細末陳酒沖服

瘰串芋芳丸並治喉癰●治瘰癧結核皮赤潰爛久不收口年近者一料收功年遠

者兩料全愈真香梗芋芳十斤取去皮者烘乾切片曬燥磨末以開水泛丸早晚每服三錢

甜酒送下如不吃酒米湯送下此方耗液損陰有服之皆剝帶多者瘦人忌之

瘰癧收口神方●龜版一枚煨過埋地青果五十枚陰同研細摻之收口如神

乳頭結核●久之防成乳巖初起並不疼痛最惡之症每日用山茨菇一錢胡

桃肉 三枚 搗爛酒送以散為度否則變幻莫測

乳巖初起 ● 阿魏 各五分 大茴香 各五分 麝香 少許 為末購寶珍膏 一張 焗烱放末貼患

處即消另用大茴杞子 各一錢 研細烏金紙包患左塞右鼻患右塞左鼻

乳巖奇方 ● 此病乳中有塊七八年方破一破不治龜版 數枚 炙黃研細以黑棗肉

打和成丸每服三錢金橘葉湯送下

又方 ● 枸橘李切片炙研每日酒調二錢服半月愈

女人乳癰 ● 蒲公英 五錢 煎服其渣敷患處

又方 ● 香葶灰末陳酒沖服三錢痛定即消

又治乳吹 ● 香白芷 二錢 川貝母 二錢 共為細末滾黃酒調服出汗已成未成

皆治

無名腫毒圍藥 ● 治初起熱毒紅腫等症大黃 四兩 薑黃 二兩 黃柏 二兩 白芷

三兩 靑黛 一兩 白芨 一兩 花粉 一兩 陳皮 一兩 甘草 五錢 研極細末密貯每

用冷茶調敷可以方便

拔毒去膿藥 ● 熟石膏 五錢 黃升 五分 青黛 一錢 研細末 搽膏藥掩之

長肉收功藥 ● 熟石膏 五錢 黃丹 一錢 研極細粗則作痛先宜與拔毒藥勻 搽

毒清方可全用

瘡有腐肉不收口 ● 腐肉如手指頭上者最不易斂小農手瘍二月自檢此方

愈之突出如肉不宜再用降藥用此收斂即平烏梅肉 一錢 膽礬 五分 研末

搽之加熟地炭 一錢 亦可

瘡生多骨不收口 ● 蜣螂蟲又名推車蟲 一錢 研末搽骨上骨自出或加乾薑

末 五分 亦可

諸毒瘡不收口 ● 鼈甲陰陽瓦焙存性研細末過篩搽之用龜甲煨研亦妙

膝上生癰 ● 名牛頭癰連鬚葱頭切碎糯米飯乘熱拌敷重者五六次即消

惡瘡作痛叫號不睡 ● 人難別者獨頭蒜 數顆 搗爛麻油拌和厚敷瘡上乾又

換毒消痛止

散毒仙丹 ● 治紅腫毒癢金銀花生甘草當歸蒲公英各一錢水五碗

煎一碗乳香末一錢沖服

頑瘡腫毒多年不愈 ● 馬齒莧生搗敷之三次即愈

腫毒皮厚不出頭 ● 麻雀屎研末米醋和成豆大一粒乘溼放瘡頂即穿破

瘡癢難忍 ● 食鹽乾摩其四圍即止蟬蛻煎水搽亦止

遍身風瘡作癢 ● 浮萍煎汁浸洗半日效加茵陳亦妙

癬瘡 ● 黃柏土權皮毛薑樟腦廿文洋河膏梁浸一日擦之

雲頭風塊 ● 頭上忽生腫塊不省人事以地膚子同生薑搗爛沖服汗出立效

老幼火丹 ● 大黃磨水調梔子黃末塗

流火兩腿紅腫放 ● 馬前子即番木鱧子磨水塗一日一次其痛立止

天泡瘡 ● 錦紋生大黃磨水時搽之或用蓮花貼之

疥瘡●薄荷一把百部五錢煎湯浴之外用鹿藜根生礬花椒猪油布包蒸透

擦之立愈 鹿梨即野梨

漆瘡●切忌熱湯以蟹殼煎洗

又方●樟腦香油調塗

汗癩●刺白莢藜研末米醋調搽五六次除根另外用生黃瓜蘸硼砂末搽隨

搽隨愈

騎馬癩●凡覺陰囊後穀道前腫痛即多用生甘草濃煎多服外用紫蘇葉焙

乾研末麻油調敷

魚口便毒●左膀魚口右膀便毒初起大如核桃用飛羅麩黃豆麩雞蛋白調

敷桑皮紙蓋貼日換二次敷日而消

毒瘡●雄黃一錢杏仁三十粒輕粉一錢為末猪膽汁調日易三次

脫肛奇方●蟬衣研末香油調搽肛門立收加甲魚頭一箇煨紅研末入冰片

少許 用唾津調和敷

馬汗入瘡 ● 不治殺人以白礬雄黃各一錢 烏梅 三箇 巴豆 一箇 同研香油調敷

手足凍瘡 ● 初起未破者以附子末同麩葱汁調封

腳底紅腫熱痛 ● 大蒜頭和鹽同搗敷過夜即退

鄉人足潰 ● 名惹肥田家糞澆地上為烈日曬蒸人跣足行則受熱毒足趾腫痛似潰非潰用鴨毛煎湯入皂礬洗之即痊

隔蒜灸法 ● 治陰疽不起發不作膿或大痛或不痛宜灸之大蒜頭去皮切三文錢厚安瘡上用艾絨於蒜上灸三壯換蒜再灸如瘡大將蒜搗爛鋪瘡上灸之未成即消已成即滅

葱熨法 ● 治虛怯人肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲經絡肢體疼痛或婦人乳吹乳癰男子流注及便毒初起葱白搗爛炒熱布包熨患處冷則易之數次腫痛即止

奇瘍惡毒●用生肥皂去子弦及筋搗爛入醋和敷立愈不愈再敷奇驗如貧

人僻地倉卒無藥者用之甚便

衛生易簡法

少飲

抱朴子曰宜生之具莫先乎食食之過多實結癥瘕況酒醴之毒物乎故仲尼則畏性之變不敢及亂周公則終日百拜肴乾酒澄上聖戰戰猶且若斯況乎庸人能毋悔乎

鍾按大寒凝海惟酒不冰明其性熱也久飲則傷神軟筋釀痰溼耗肺陰其性上升勞嗽吐血人忌之王孟英云酒之爲物志氣兩昏世間敗德損行之事無不由於酒者子弟幼時不令飲酒大來不戒而自不飲矣燒酒一名火酒性烈火熱得火則燃過飲黑腸腐胃陰虛火體切弗沾唇有以燻物代炭者每發癰疽惟臟寒之體稍可飲之近世陰虛火旺者多不嗜爲妙

遠煙室

鴉片西人目爲醉藥乃毒物也性能助火凝血耗氣猶賈參以雜料廣人又參以雜藥其毒不下於砒特其性柔奸未成癮者初不覺其苦王孟英云衰病誤入之初間有一吸暫效者人不知爲劫劑遂以爲神丹迨癮入膏盲刻不能離舊病復作較前更劇煙亦不能奏效偶輒則困憊噬臍莫及燕昌王氏云因倦吸煙成癮者吸遲則思臥因色吸煙成癮者吸遲則精滑壯人吸煙卽成弱人氣傷陽陷故也肥人吸煙卽成瘦人脾胃乾涸不生肌肉也癮深則肢體萎縮面黑肩聳兩眼淚流腸腕不收其毒可知秉國鈞者禁之不絕則重稅之而毒流四海煙館林立貧而味者或竟以土皮煙灰過癮近有煉取鴉片之精名嗎啡戒煙者服之則爛肺性更毒烈夫立志戒煙當思因何成癮調治宿病卽有小變宜以毒去身安爲念否則未有不飲恨終身者未失足者宜如何遠避如疾讎哉

煙草出建廣諸處用火酒及素馨葉薑黃其製久吸則肺焦水煙出蘭州以砒及香油炒成其性尤燥凡吸煙後勿飲火酒能引火氣薰灼臟腑煙性辛散上升素患咳嗽喉症氣虛易汗均忌之陰虛火體不吸爲妙

節慾

燕海文氏益壽俚言略云小兒一歲至三歲長元氣三年一增至十六歲元氣長足往往人在十六歲前父母失於管束被誘破身大傷元氣則一生多病卒不能壽蓋人無精神猶燈之無油豈可悠久更無論百憂感其心萬事勞其形也本身元氣既虧筋力疲憊完姻後又加斲喪育子亦必虛弱難養故近世人精神氣血代不如前予甫髫時輒被人引誘致傷元陽疾病纏身迨年三十恍然有悟夫深秋草木盡落古稱虛月冬爲一歲之餘萬物交冬蟄藏至春乃發卽蛟龍蟲蟻亦然儻非秋收冬藏萬物之滅久矣書云冬不藏精春必病溫又云夜爲一日之餘如夜不能寐壯者次日卽倦弱者一日

不爽其理相同是以予每年九月起保養百日有養至二百日者其得六子
二女年逾花甲齒固耳聰精力猶可耐勞此保養之明證也凡父母真心愛
子者幼年時如養處女時刻提防務使元陽無損婚配務過二十歲成婚後
宜教以節慾守身之道省嗇保養不惟卻病延年子孫蕃盛而人之精神乃
事業之根本格言云身之靈也以心身之強也以精失其心者悖理耗其精
者戕生眞醒世之要言也

保命延生戒期

節錄王松堂先生秘力輯要

娶婦必期偕老生子必望長成乃人有伉儷極篤而中道死亡產育艱難而
半途夭折者祇因肆情縱慾暗犯禁忌而不自知也道經云男女房幃最有
避忌若犯所忌天奪其算神降其殃生子醜貌怪相性行不良殘疾夭折實
有明驗故君子不獨外色鋤之務盡卽琴瑟之歡俱有克治之道焉茲將正
色戒期錄出以爲卻病保生之一助

不載神佛位號以免褻瀆

正月初一短壽每初三減初五虛初六六初七上初九減十四惡十五短十六降

廿五主病每廿七奪廿八人神在陰犯者三十主減壽月

二月初一同前初三奪初九奪十五奪十八奪廿五廿七廿八三十俱同

二月初一同前初三奪初九奪十五奪十八奪廿五廿七廿八三十俱同

十俱同

四月初一同前初二同前初四失音初八犯血症死十五廿五廿七廿八三十俱同

五月初一減初三同前初五初六初七十五十六十七廿五廿六廿七以上九日

犯者得病損壽若十五日于時犯者主三年內夫妻皆死經十三奪廿八三

十俱同

六月初一同前十五同前十九同前廿三同前廿四凶廿五同前廿七同前廿八同前三十同前

七月初一同前初三同前初七同前初十同前十五同前十六同前廿五同前廿七同前廿八同前三十同前

八月初一同前初三同前初七同前初十同前十五同前廿五同前廿七同前廿八同前三十同前

衛生易簡方 延年

九月初一奪初九大凶在亥時犯者主男女雙亡十五前同十七十九同廿五廿七廿八三十同

十月初一初三同初五大初六犯者初十犯者十五廿五廿七廿八三十俱同

十一月初一初三同初六大十三大十五前同十七佛十九同廿五廿七廿八三十俱同

十俱同

十二月初一初三同初七惡初八佛十五前同十六大二十促廿三廿四同廿五同

廿七廿八三十俱同

遇閏照前月同

每月無定戒期 四立二分二至日四絕日四立前一四離日二分二至前一社日三

伏日庚申甲子日祭神前齋戒日父母誕日諱日夫婦生日本命日疾風暴雨

雷電晦暝日月薄蝕犯者大寒大熱日月星斗之下神祇寺廟井竈柩厠之傍

均宜勿犯燈前行房最擾神怒竹蓆易感寒氣入房汗出勿卽揮扇及飲冷水房後

感風乘涼身熱面赤足冷陽縮名夾陰時疫熱病百不一生傷寒後氣血尙虛諸勞皆復

御女者死其症頭眩目花手足攣腰痛少腹結痛逆冷陽縮入腹舌吐死過醉夜

深空腹遠行犯者得病損身素有吐血勞嗽短氣虛汗咽痛諸症貪慾則成瘡久未愈

犯之或瘡勞霍亂病後早犯成怯素有鼻血腰痛不節慾發弱症發脚氣時亦忌遺精盛時多慾

勞目恙時作貪慾則首耳鳴時作貪慾婦人胎前犯之傷胎產後百日内犯之一切腦疽

背瘡犯則神疔瘡走黃瘰癧犯之不懸癰潰深後陰之間破後金刃傷瘡犯之

不止染毒瘡後入房則染婦人倘以上一切俱宜嚴戒若能依期避忌必臻上壽

惜身人壽
幾何

木有根則榮根絕則枯魚有水則活水涸則死燈有膏則明膏盡則滅人有

真精保之則壽戕之則夭故古人多盡天年今人恆多不壽以下錄遠色編

保養內身易損

人得先天為本後天為標飲食五味養髓骨生精血精為主氣為使神為倚

精氣神統於一身夜半子時生機所發切宜固齋保養苟能隨時調攝則寒暑不侵

身無疾病若不知禁忌肆情縱慾真元虧損遂成勞瘵

遠色畏淫如虎

色乃人間最樂春片刻汝淫人婦婦淫人果報不爽

勸君莫造生前孽神百如電後代兒孫氣象新科名必顯

寡慾延齡卻病

枯骨安能補形容憔悴傷精藥不醫病真藥假

堅心能忍戒立志自持永保福壽齊富貴長春



[Faint, mostly illegible vertical text columns on the left side of the page, likely bleed-through or secondary text.]

周氏集驗良方序

嗟乎醫之學問殆隨年月與俱進乎當予初學時則必購有方之書閱有方之論一若執方例病徑無再捷者矣及閱喻氏三書並唐大烈之吳醫彙講其所稱述大略爲吾醫學問全在乎無方處求方無治處求治當以無方之書爲根本也今錫邑周莘農先生徵求海內外名醫著述刊集驗良方一書不日可以行世一似周君之用意與喻氏之論殆有所背而非治病求本之旨歟是豈知周君之用心蓋非淺識者所能窺也彼喻氏唐氏誠有見於近日醫家師心自用漫無定識業醫益衆而爲學益荒偶有幸中之方卽以爲萬古可遵之法著書幾同制藝不失之於泥古卽失之於崇新以一人有限之見治變化無窮之病其方雖驗於此而或誤於彼烏得謂之良方乎今周君不敢自私徵集海內外之智識以求百試百驗之良方集腋成裘琳瑯滿紙如仲景之一百十三方可謂萬世遵守者同而寒素之家鄙陋之醫得此一卷勝讀十年書矣蓋檢病

查方取效良多也由是觀之周君之用心可謂純且粹矣而周君之積德抑又未可限量也即起唐氏喻氏而質之亦必歎服者歟諤南沙愚魯寡學陋聞偶有所感遂泚筆書之郵寄以示周君非敢爲序云時

丙辰年三月下浣南沙張謇識

周君不煩自其始業務內
以勤懇五端美溢於繁而無舉益敬聞存幸中文以爲萬古同文之悲
同善之用心蓋非爲端善也端善也則命刃書刃始首良致或曰德運輪亦自
百世一則周君之用心與命刃之端善有相背而非命取來本之自源豈豈朕
心必合哉周君善書夫三書亦善內小善善善也其說更式一書不日而以
書數大綱爲吾醫學師全五平無式獨末式無治謝來命當以無式之書爲用
一書特式兩兩外無再對善矣又閱命刃三書並與大感之吳醫彙精其而
平醫之學問故謝平日與則善平當于時學和順必翻育式之書閱育式之
刃書則其式也

單方之盛肇於外臺徐氏靈胎每則之爲葉天士先生所歎賞肘後千金彌極神效倉卒所需每獲其益側聞張聿青先生課餘嘗令門弟子瀏覽驗方誠有見也周君小農別署伯華畢業於張門潛心聖道博覽典籍與余相交十餘年矣己酉上海警署開辦衛生延君醫治懋著勤勞 尊甫莘農先生胞與爲懷遇有貧病往往自出輿金十餘年來毫無稍怠閒嘗選輯毛世洪經驗集衛生易簡方臨產須知等書餉遺世界贈炙人口者已非一日近以數年間親朋投贈有秘本簡方中西雜陳治法頗備復積頁成卷因屬伯兄分門別類刊印行世足見痼癘在抱期世人壽域同登遠紹東坡良方之刻近規泰西實驗之求洵心誠造福者矣因樂得而爲之序

宣統二年庚戌清和月長洲馬錢昌範九甫撰

... 二卒與青味日長... 論論昌輝大甫...

... 心適哉... 突因樂將而...

... 其風... 蘇蘇... 蘇蘇... 蘇蘇...

... 願... 願... 願... 願...

... 願... 願... 願... 願...



... 其一日... 以... 以... 以...

... 願... 願... 願... 願... 願...

... 願... 願... 願... 願... 願...

... 願... 願... 願... 願... 願...

... 願... 願... 願... 願... 願...

... 願... 願... 願... 願... 願...

周氏集驗方例言

一是編喉科門所選囊秘喉書係小兒同門常熟蕭冬友明經所贈三孫痘後舌菌小試其方大獲效果攷其中秘方世不多見因近年喉症甚烈故採錄要方冠於卷首

一是編所選串雅方乃泉唐趙恕軒先生利濟十二種之一前由遠省購得并與拔萃方等選錄要方編入

一是編眼科亦採輯眼科易秘係四明崙門閱歷之言閒埵一二以正俗誤

一是編廣徵秘方同邑張笠臣廣文屢驗之方及伯崑世交中惠鈔選存者得之四五餘從歷年日記中錄出一再甄選方敢列入

一是編因初印衛生易簡排字時校對三次尙有錯誤故本集改用刻印如有同志附印行世務望校正爲要

錫山 周 憬莘農敬識

周氏集驗方

喉舌門 牙疔附

乳蛾方

楊龍九囊
必喉書

○有單有雙

雙者重連
珠更重

發寒熱者凶

傷寒後發蛾
喉閉者不治

一日疼二

日紅腫三日有形

如有細白星而發寒熱者此
飛蛾之凶症惡者朝發夕死

如係血蛾用銀針挑破血泡

即愈

乳蛾初起即吹連砂散如
成膿黃熟者用代針散

連砂散

此丹專治風熱
喉症之聖藥

○薄荷牙硝

各二錢

硼砂 一錢

蒲黃 五分

川連 四分

硃砂

二分

冰片 三分

七味研細瓶貯

代針散

此治乳蛾成
膿不穿者

○指甲二三寸

雙紅紙

捲好燈上
燒灰存性

研末辰砂

少許

膽星 三分

冰片

五厘

研和吹入喉中少頃即出膿血自愈

搥舌喉癰

搥音三
囊秘方

○舌下生如小舌樣為搥舌如連喉腫痛為喉癰此乃心脾

火上攻使然搥舌兼喉癰其勢最重速治可愈傷甘遂散時吹舌根及舌傍

寒後發者難治如氣閉不通無形無聲多是危症不可間斷方可速

愈如癰勢重兼吞上清丸

甘遂散

專治九種喉痺一切喉症急

○甘遂

六分麩裏煨

牙硝

一錢提

食鹽二

錢炒薄荷二錢

蒲黃一錢

硼砂八分

冰片三分

七味研末

貯如痰甚加

蛇蚶

梅痰涎壅塞欲斃者先吹開關散加牛黃桂皮

少許

開關散見下

上清丸

專治實火喉嚨腫痛之神藥

○元明粉二錢

川連一錢

月石一錢

五分枯芩二錢

苦桔梗

一錢

薄荷二錢

冰片四分

山豆根一錢

五分生甘草

八分大黃

三錢

右十味研末

密丸芡實大每吞一丸重者連吞一丸

將藥含口中化下其腫漸消而愈

鎖喉風

囊秘

○喉及牙關閉塞不通喉內多痰外無形迹

難以吹丹症又緊急

人仰面滴入鼻中男左女右到喉即開牙關速吹

甘遂散同開關散或用熏鼻方

驗方用針兩手少

商穴

手大指內側近

中衝穴

中指內

少衝穴

小指內

商陽穴

食指內

關沖穴

無名指

兩手同穴

開關散○專治牙喉關閉痰涎壅塞欲斃者牙皂

一錢

疆蠶

八分

研末密貯加

黑魚膽尤妙

黑魚膽臘月陰乾研用

熏鼻方○巴豆肉二粒 蓖麻子仁二粒 麝香少許 研勻火紙捲燒熏鼻竅牙關

立通開後用日遂散加杜牛膝根末十分之二吹之

咽喉緊閉吹鼻散黃少章錄驗 ○牙關緊閉不能吹藥用此吹入鼻內即開飛雄精

二錢淨朴硝五錢 淨硼砂二錢 共研極細貯用

急救破棺丹囊秘喉症牙關緊閉 ○老猪婆糞冬天收取置屋上日晒夜露約一月取下放炭火上煨至煙將

絕咽候四五月閒探杜牛膝根打汁拌入煨過猪糞內晒乾再拌再晒如是

磁瓶收貯凡遇喉蛾喉痺諸急症痰涎壅塞聲不能出氣息欲絕者用此化開下咽即活

鎖喉風閉急救方良方續錄 ○先於頭頸處搽香油用錢一文蘸香油刮之如刮痧

刺四腕委中等穴以洩毒氣 牆壁上蟻窠數箇瓦上 加冰片少許吹咽內血散痰消立愈

能吹藥蟻窠有子者十餘箇裝旱煙管內 好人燃呼口內吹病人鼻中吐痰涎為妙

又方重慶堂隨筆 ○鎖喉有脫閉兩症脫症則大汗氣喘為肺氣閉症氣道閉塞關

竅而死其證由素性抑鬱或受寒冷或食凝滯忽然喉關鎖定 不能出聲不知痛癢面色青白手足

周氏集驗方 喉舌門

冰冷脈見沈伏不開口無痰聲宜用紫金錠薑湯磨灌關竅必開

纏喉風囊秘

方 ○心中燥急而發先二日胸膈氣緊呼吸氣促忽然咽痛喉腫牙

關緊閉手足厥冷頸紋如縛又如蛇纏熱結於內腫遠於外且麻且癢喉中紅絲纏緊指甲

或白或青手心壯熱痰聲如鋸其症最急初起急治可救若過一日夜目直

鳴者不治探以燈火近患人口邊即吹滅者不治暑喘急額視而睛定聲如雷

汗危在旦夕治法初起用加味硝磺散加甘遂散時吹吹藥

牛黃少許或用杜牛膝根汁咽之并吞上清丸遲則難救

加味硝磺散此治一切喉症 ○牙硝 二錢 蒲黃 五分 冰片 一分 白芷 一分

製牙皂 二厘 研細密貯如痰盛加蜣蚰梅纏喉風等痰出太多精神已竭病

愈殊不知少頃即發脈細即死故提痰當適中即止也

防毒攻心方囊秘 ○喉症頸項赤腫深受時毒一頸俱紅腫赤腫不可至胸至胸即死

謂之毒歸於心其人必歡必用護心散兼與煎

附識前醫會李某喉疫浦南某醫用桂枝升防狝於惡寒連投二劑一頸紅腫味者戒嘗涼劑竟危

火脈斜熱重晨熾平關

丙託護心散 防毒攻心之劑 ○真萊豆粉 一兩 孔香 去油 燈心炭 少許 用生甘草 湯調

製蛇蚶梅 治痰涎壅塞喉風等症 ○青脆大梅子 四月閒買去核打碎 舖碗底再將蛇蚶 數條舖梅肉上又將

白礬末 舖蛇蚶上 逐層舖完待其 箸蚶化盡晒梅極乾瓦上炙研末 加入吹藥或用蜜湯同藥調灌均效

喉症神效方 良方續錄 ○無論喉蛾喉風均治製青魚膽 一錢臘月取大青魚膽每箇盛糯米數粒勿將苦汁

傾去掛陰處 黃瓜霜 五分揀老黃瓜竹刀去蒂挖子囊用銀梅花冰片 五厘風乾聽用

研極細瓷瓶收貯勿令洩氣 吹時以吐痰涎為要

吹急喉痺神藥 餘墨偶譚加味 ○皂角子 七分 沙鹽 四分 血餘灰 五分 指甲末 五分 燈

心炭 三分 雞內金 一錢 研極細末磁瓶密貯

爛喉赤腫 囊秘方 ○用連砂散加山慈菇粉配合去腐方消退其腫 用後二方以治碎腐

去腐方 高治喉症黑臭腐爛 ○銅綠 一錢 燈心灰 六分 川連 三分 冰片 二分 四味研貯

製豬膽 爛喉痧之神藥 ○川連 僵蠶 月石 青黛 雄黃 牙硝 白礬 薄荷 各五錢 入味研末用

雄豬膽數箇 將膽汁和藥拌勻仍納膽殼中立冬日掘地作坑放入春分取起陰乾 研細瓶貯

周氏集驗方 喉舌門 三

爛喉神藥囊 ○珍珠二分 西黃一分 甘中黃一錢 烏牛糞尖一錢 瓦上煨 青黛一錢

冰片二分 人指甲一分 男女用男七味研末瓶貯爛喉吹入即效 腐碎白蜜調噉如爛碎先用此

長肉藥蓋其破處再用前消腫藥吹喉症三日前症雖重尚未成膿藥能消散五日外多成膿縱使穿破必有爛窠難愈加用口疳藥龍骨兒茶末疊吹吹藥非獨腫破處要吹并周圍好肉上亦須吹之方免延開且易愈也如溼爛虛腐不收用製爐甘石同人參末入長肉藥吹之即愈 ○附注 喉症食難下噉用真藕粉調食甚佳

喉症結毒囊 ○或口或舌或喉不拘定處隨經絡而發爛久不愈者是也琥珀散頻吹

散頻吹

琥珀散 此治喉舌結毒之要藥 ○琥珀三分 兒茶八分 甘草一分 冰片一分 五厘 滴乳石三分

珍珠二分 六味研末密貯 先用絲棉捲筒上抹患處後吹此藥

散堅方囊 ○專治喉症腫硬堅塊不消茜草根末配入連砂散內吹之自軟

喉痧項結腫毒 唐和庭方 ○蒲公英五錢 菊花露浸軟敷之即消 鎮幼患喉痧項間結毒硬痛利庭先

生指用此方獲效按遺毒發於項腮而喉腫身熱不止疫毒重難治

喉症宜大便秘囊秘 ○喉症必大便利後方可望痊大便閉結勿輕許痊可初起自宜通下火降則勢減
五六日久不食便悶此由病久胃氣已虛元氣已弱禁用硝黃霸劑以致虛脫欲通其便則宜養陰降火潤藥下之
或用蜜導此秘法之當遵也

婦人喉症宜通經見囊秘 ○新陽王士翹云喉症腫痛經水道止火不下達宜通

其經而喉自愈某居停婦產後三日患喉痧身熱嘔吐惡露即停喉症極重某知其故屢以通瘀之說進其家不應專科亦不以爲意竟致不起

喉症用藥宜慎囊秘 ○凡喉症不可純用寒涼取效目前蓋上熱未除中寒即起

毒氣乘虛入腹胸膈高起上喘下泄手足指甲青黑七日以外全不飲食口

若魚口者危治喉症最忌發汗誤人不淺如針出血即并之義口渴氣急痰多而稠如桃膠者危喉症初發一日即寒戰戰後身涼口不

渴又無重症或二便俱利不可認作熱症喉症多上盛下虛其痰不可提盡此痰即津液所化只宜消降亦不宜太降

與熱症乳蛾搗舌痰毒腫盛以消盡毒痰而愈者不同須以吹藥或用燈草取嚏使喉一通即服煎劑無痰者不治

酒毒喉痺囊秘方 ○外見紅腫內形如雞子其色鮮紅光亮如鏡發熱惡寒目睛

周氏集驗方 喉舌門

上視此心脾積熱形象雖凶開關散少許食鹽牙硝硼砂共研細吹之

懸癰囊秘○生於上腭形如紫李墜下抵舌口不能言舌不能伸頭不能低仰面而立鼻中時出紅涕若不速治其毒入腦而死

末成膿吹甘遂散已成膿代針散

重舌囊秘○舌下生小舌樣或紅或紫又名雀舌小兒胎毒亦有此症如生舌根連喉腫者名捲舌此

毒氣出於舌下薄荷冰片末摻之內服燈心五尺川連五分山梔仁三錢竈心土五錢

煎服

又方翦兩樓○五靈脂一兩陳醋一碗於銅杓內煎三沸為度沸即離火候冷

將醋藥頻含待涎沫滿口即吐勿咽下

木舌囊秘○舌腫大如煎熟猪肝不能轉動此憂鬱所致初起不疼不寒熱漸漸腫大可治連砂散甘

遂散同吹陰陽散治陰火舌川連乾薑生蒲黃各一分研末擦凡治木舌先將生

薑蘸硼砂擦之後敷此方

連珠口疳風囊秘○舌上起一小泡發一箇又一箇甚至七八箇連珠而生舌上腫痛色黃名舌黃獨生舌中名舌楊梅

若色赤腫而地閣紅
腫名舌癰俱屬心火
內服清心犀角地黃湯
加減舌腫脹滿口吐
舌在外難以納藥者
開關散入
鼻中牙關自開痰涎自出後用篲
捲棉蘸甘草湯潤其唇再用吹藥

舌出三寸不收
囊秘方
先用熏鼻方
將煙熏後即收
兼吹連砂散
舌縮無言者內服清

之劑外用芥菜子
研末醋拌敷頸上

牙槽風
囊秘方
初起先齒痛後漸牙肉腫紫黑色或出血
久則腐爛而臭
連砂散配去

腐方頻吹
後用口疳藥倍
用珠黃長肉

又方
泰州韓少懷家傳
○金釵石斛二兩晒脆研末
蘇薄荷二兩晒乾
研用碗盛貯上蓋一碗泥封

種火上煨煉
俟碗上飛霜刮下約一二錢
去火性涼水調塗患處

又良方
○棟樹果
去核打爛敷患處雖延久已成多骨亦能退去化膿止痛

牙漏
囊秘方
○與前症相同久則不愈
牙症破後患久齒縫
甚則牙落
如落上左邊門牙則

一概俱落以上二症俱屬胃腎虛熱也須戒
酒色一切辛燥毒物煎劑用滋降陰火之品
琥珀散
如腐亦同
牙槽藥治之

吞髮繞喉
效
○白亂髮燒灰研細白湯調服一錢

雞骨哽喉近效 ○五倍子末摻入喉間自化附 竹刺哽喉老絲瓜燒灰 酒服三錢立消

急救門

預籌救荒潛齋叢書 ○糯米燒飯曬乾透永遠不壞飢者嚼一撮得米氣便可不死 每年各家留飯

一斗晒飯入甕存 甚不費力若得家家如此遠勝積穀備荒多矣 或以糯米一甕淘淨百蒸百晒搗細入甕

存乾燥處亦不壞日服三勺渴則飲之

祖師救飢方救荒良方 ○核桃仁去皮 茯苓去薄 荷各四兩 杏仁去雙仁皮尖一兩 煮甘草去皮嫩

桔梗一兩 小荷炒 貫眾各四兩 其研細末或晒或烘乾候冷瓶收 草木枝葉細嚼

至飽為度依舊氣力不減 食樹皮必與稻草節同食否則脹死不可不知 久飢後大忌驛細薄驟飽則寸斷矣宜先少食稀粥并忌過熱漸食稠粥逐漸調理

熱痧普濟良方 ○其證頭暈目赤煩悶嘔惡渴能盡飲唇紅 食鹽一撮揉擦兩手腕

兩脇兩足心並心窩背心八處擦出許多紫黑班即鬆快而愈垂死亦治

冷痧西法 ○其證神清唇白舌潤渴不多飲腹不甚痛即痛 白芥子五錢 研末滾水調

成餅貼臍上油紙雙層蓋布紫身體冰冷用麩粉包入布囊蒸熱熨其四肢又近驗方胡椒

末納臍中膏藥封貼用菜黃食鹽各五錢炒熨臍下

冷痧藥水名嚼囉嚨西藥房○夏月貪涼飲冷瓜菓有微生蟲忽然上吐下瀉頓瘦身

涼寒暑表不脈遲每分鐘及九十度舌冷口渴以嚼囉嚨藥水輕則十滴重者三四十滴開水沖服

每一點鐘服一次此藥性溫止吐止瀉止痛令人身暖脈數身熱轉宜潤藥熱痧不宜也

絞腸痧州柳柳○鹽一匙熬令黃加童便一盃和入溫服少頃吐下而愈按絞腸痧腹如版硬痛如錐刺單以

鹽湯探吐亦可

弔腳痧熱痧有兼者略輕冷痧則劇○熱痧轉筋柏葉打爛裹腳上內服方逢扁豆葉一握

生搗汁入醋三滴燉溫服立止冷痧轉筋徐子薑汁燒酒溫熱措其腿足攝生方大蒜頭

打攔擦足令熱即止冷痧忌服痧藥開竅及針刺挑痧

羊毛痧良方○天氣鬱勃潮溼酷熱夜不能眠將曙體乘涼風中有絲乘虛易入無論頭面手足胸背猝入滿身刺

痛一刻緊一刻痛一半夜面色漸黃而危按脩園先生急救門中羊毛痧有手足直硬麻木指甲青黑色甚

周氏集驗方 急救門

或身有寒熱或吐瀉喉腫心疼治法不用針刺現貯燒酒甕頭泥塊敲碎水調捻成泥團向

團見有絲如羊毛亮則邪氣拔出自然平愈此仙法也

雷擊散治各種奇痧○牙皂三錢五分硃砂二錢五分明雄黃二錢五分細辛三錢五分廣木香

二錢廣皮二錢藿香三錢苦桔梗二錢薄荷二錢貫眾二錢防風二錢枯礬

一錢宋半夏二錢白芷一錢生甘草二錢共研細末每服一錢兼以吹鼻甚效

諸疫預辟法西○鹽與樟腦用冷水浸之置於卧房灑汚地可殺微生毒蟲疇嘯水冰

凍易釀痧氣瓜果有微生蟲隔宿食亦不可食

跌壓悶死沈華庭傳○慌見四體挺直不省人事者急以有力二人扶其起立輕輕

縱跳並按摩胸脘候其氣回呻吟方可釋手如任其僵卧氣滯血冷內閉不救今庚其鄰某微人甥三房獨

子由晒臺跌下即親手救醒後送仁濟醫院善後而瘳

腰子脫窠傷科陳九皋法○大人毆打或恨責小孩閃脫腰子最險如一時大笑或哭

數聲頃刻而死急救法兩人挾其兩腋往上縱跳腰部還原頓時復活

附識 又據云凡兩太陽及氣海血海及小肚女人兩乳傷重皆致不救

拳打心口氣悶忽死

陳九皋法

○急救法一人扶住死者一人對合兩手如合掌狀

用力平擊肺腧穴

背脊上第三椎各開一寸五分

即活遲則不救

拳打血湧頃刻數碗

陳九皋方

○山七血見愁

即地錦

馬蘭

陰乾

全當歸

各等分

研細瓶貯

每服錢半開水加陳酒

少許

調服略遲即脫

男婦涎潮暈倒

良方續錄

○扶入暖室

扶策正坐

當面用火炭浸醋中

燒炭宜遠開

令醋氣對

口鼻沖入良久自醒切不可灌以湯水

恐涎水壅絡而成廢人

黑料豆橘紅湯飲之如

倉卒未甦急於人中穴及兩足大拇指

離甲一菲葉各灸三壯效

救火傷

西法

○火傷外皮輕傷肉筋則重

傷要害自頂至踵者險火災處煙霧迷目不辨門戶宜偃背而行方能出險衣

裳燒爇宜避風徐徐脫下動手者指蘸麻油不致受傷倉卒不能解者宜取

醴醅隨身包按自能悶熄如無醴宜卧地滾轉以熄其火倘衣裳粘著忌強

揭宜留傷處剪留以護皮外一分時神油雞毛蘸塗係痛傷神藥爛者亦能

皮傷風吹必痛宜避風為要

化為白淨紅暈退而漸愈

附火藥傷爛方徐氏 ○用鹽籬中盛鹽蚌殼煨研麻油調塗 爆竹打傷用鮮

柏葉春爛香油調塗

居家預備滅火藥水西法 ○鹽七磅 硝強亞麼尼亞十磅西藥房有現成 和水置罇內勿洩氣 遇失

火以此水灑之火即熄滅或豆腐店鹽滷亦能滅火 凡燒炙之物過甚者

撒鹽即止煙息燄此其明驗

戒煙方沈莘庭試驗 ○生地 三錢 蒲公英 三錢 鶴虱 三錢 木棉花 三錢此與下味 羊

桃花 三錢 煙灰 三錢此味照癮之大 而定下次照減

解吞煙後餘毒王孟英醫案 ○柿餅煎湯服之愈久愈妙

蛇傷手腫西醫方 ○雞子五六枚煮熟至硬為度 將黃取出切薄片中穿一孔 敷

黃不失本色為止皮色復原即可無虞

瘋狗咬黃少章方 ○前代紫銅錢數枚現時銅幣勿用 煎濃洗淨患處驗有毒否黃豆 鍾洵陽

用白鱈魚愈大愈佳 去頭與肉取淨骨曬黃新瓦焙研細末貯藏用時將 蛋白及

藥末 少許揼其傷口其毒水拔出作黑色抹淨再揼以蛋黃本色爲度

蜘蛛傷 毛對山醫話 ○蜘蛛之毒甚於蛇蝎一人左臂爲蜘蛛螫手腫如甕痛極悶絕

或令以羊血沖酒飲之昏睡一日夜其腫始消外治方大藍汁 如無用藍澱代 八雄

黃二錢 麝香 少許 塗患處

蜂咬腫毒 毛對山醫話 ○芋苳搗敷即散

傷科門

刀傷簡便止法 西法 ○身體刀傷如斷大血管血即立時噴湧 頃刻而危 故宜知止血

法 於近傷處用力壓住血管 或用手巾紮緊 以桿絞急 或所傷者爲手爲腿可令病人平身而

卧 令傷處伸直亦爲止血妙法將猪皮貼患處亦能止血忌食熱粥

刀斧斬神效藥 良方 ○黃丹 飛五六兩 樟腦末 二兩 其研極細貯瓷罐用時蜜調二

茶匙敷患處 即時痛定 過夜結痂

止血去傷 拾遺 ○野苳蔴草 洗淨打爛取汁敷之昔有牧童臂上被牛角挑一洞將此汁用雞毛不止塗之乾即塗至愈爲度內服方

周氏集驗方 傷科門

野苧麻

一兩打爛好酒煎服盡量飲醉

止血補傷方

歸田瑣記

○跌傷馬踢無不立驗生白附子

十二兩

白芷天麻防風羌活

生南星

各一兩研極細末就傷處敷上傷重者用黃酒浸服五分青腫者水調敷上傷爛者乾敷一切破爛皆可敷之即愈

兩舟子持篙相鬥刺額角而穿又與夫為輪所壓兩腎子俱出均照方配藥敷之而愈不必避風也

跌打損傷方

沈華亭傳方

○生地 三錢

全當歸 三錢

乳香 三錢

桂枝 八分

紅花 一錢

劉寄奴

二錢

防風 一錢

鈎藤 二錢

淮牛膝 四錢

川萆薢 二錢

炒川斷 三錢

厚

杜仲

三錢

炒小茴 一錢

公丁香 四枚

酒水各半煎重者二服輕者一服

折損腰乳香散

串雅

○虎骨酒浸敗龜版黃耆川牛膝萆薢川斷乳香

各三錢

煎服

跌仆攣筋三四年不愈者

拔萃

○楊梅樹皮曬燥研末以滴花燒酒

隔湯燉熱調塗患處以絹

紮緊每日一換不過三五次即愈

此方係無錫富室得之遊方道士費百金始傳

傷筋痠痛

新驗

○扞扞活

即接骨木一歲一節

桑枝 五錢

紅花 三錢

生薑 二片

黃酒 四兩

加

水同煎熨洗並治風痺骨痛

重物壓打拔○凡手足肩背重物打傷青腫紫赤以蘇木煎汁磨眞降香塗之

不可落水連搽數日其腫消散百試百驗

舌頭咬復生方無錫坊前○此方能長新如舊言語照常刀割落者亦治生蒲黃五分東丹

一錢眞降香五分五倍子三分冰片少許共研摻之即長

陰囊被人扯破坊前倪○卵子未碎者尙可救雞子黃熬油調金毛狗脊毛攤

塗次敷封口藥珠粉琥珀象皮三七等分研細

火燎油澆傷瘡吳庚生○火燙切忌浸冷水熱毒內攻陳年小粉炒黑收貯臨

患處如皮已破串雅注即乾摻之未破必爛至骨

用陳菜油調塗立刻止痛屢驗又簡便方孫子○雞蛋黃二枚麻油一錢白蜜一錢攪勻翎毛調擦患處熱油

澆傷亦治

預備燙火傷拾○山茶花研末麻油調塗如用鮮者與木芙蓉葉共浸入麻油中備用

眼目門

暴發赤眼 呂樵翁眼科易秘 ○川連 三分 槐花 一錢五分 煎汁調塗足心

又方 ○鮮芙蓉葉搗塗太陽穴 甘蔗西瓜雪梨食之退赤

眼目昏糊有黑翳 程後榮先生方 ○野料豆 研先同炒 首烏 蒸製更佳 入炒米粉洋白糖 少許調服

樂壽齋鈔方 ○花頭海螵 一筋 馬料豆 一升 沙鍋內煮至海螵炸化將豆曬

乾 隨意作點心小菜食一料卽驗

雞盲方 瘦吟醫贅 ○鮮合歡皮 兩許 煎服頗效

爛弦初起 秘易 ○薄荷 一錢 青鹽 五分 沸湯泡後澄清洗之

眼中齋肉 拔萃 ○蛇蛻 一條 以麻油炒黃色 勿使焦黑 加菜豆 三合 水一碗沙糖一鐘

煎七分食後服立退 良方治 齋肉攀睛 浮萍 一錢 入冰片 少許 點之神效

梅瘡誤服升藥損目 秘易 ○槐米 一味 久久煎服自能明亮 按毒火上炎眼白焦黃如熏糊塗少光

產後失明 秘易 ○決明子 五錢 包同青羊肝煮服能治肝風虛熱

小兒五疳目疾 秘易 ○蘆薈胡連史君子芙蓉葉煨肉果枳殼 等分 雞肺 背上脊骨開紅

白相間形如積血者便是瓦上焙燥研細加糖霜少許調服極效用雞肺者因小兒目疾有蟲積起見耳

痘瘡入目易秘○嫩浮萍五分同羊肝煮服能退

天絲入目易秘○鶴吐絲飄揚入目勢甚危險鷹絲在爪高下隨風蛛絲低懸多在屋角用

陳金墨磨點未久可去

眼疾忌服諸藥易秘○川連瀉肝膽火不可久服穿山甲同雞卵燉食兩目上星單方

木鼈子同雞卵燉食艾葉附桂肝火旺相之婦多服助火米粉酒糊小兒代

虛寒之人多致傷命藥陰肝木憔悴多致成障乳能升

肝陽兩目上星變珠虎鹿等膠及附桂動風助火肝膽小孩幼時多食水菓魚腥多致疳積

瀉痢兩目上珠不治

丙症門
感冒初起親驗○真范志糲半塊煎湯飲能祛風寒暑溼較午時茶和平舟車預備甚妙兼治傷

食腹痛嘔瀉瘡痢諸疾

發汗散串雅吳庚生注○行旅備帶施濟極善此路途救急神方端治感冒風寒杏仁

周氏集驗方
眼目門

三十粒白胡椒三十粒其搗為末生薑汁和丸握手中心一時自然汗出傷寒用

此於虛損人尤宜

大頭瘡良方○卽時行火毒其症頭面腮際腫脹極大寒熱交作甚者破裂出膿不可敷藥恐毒氣入內不

救馬藍打汁日敷五六次熱氣頓出神效

傷寒挾積腹痛王旭高醫案○鹽一杯葱一把丁香一錢飛羅麩三錢打爛敷痛處

免傳染時疾西法○以鈣綠即枯瀝溝中及一切通氣之溝極少每七日灑一次

截瘡外治菱湖諸吟梅方○薏仁生半夏細辛等分研細末入膏藥中貼風門穴

治三日瘡良方○大葶薺一劬洗去泥用好燒酒一劬洗淨之地粟不去皮浸酒中用泥

封固七日後每日中午服酒一按西醫云瘡病人血中有微蟲出自穢水

又蚊蟲易傳瘡亦出汚水溼地有腐爛物發臭身弱者易生熱瘡云

虛瘡日久不愈沈華亭傳○東洋參一錢五分桂圓肉三錢上午煎服此治虛體並無

伏邪痰淫蘊結之方

深秋寒熱不止

無錫曹清華方

○淹成勞症者經霜桑枝熬膏日服三次每次一調羹

消血塊方

程篔簹傳錫醫黃春山秘方

○血塊推之不易其處丹參一味醋糊為丸每服一

錢丹參症緣血因氣積醋飲其氣以漸祛血積其塊自化

治氣鼓脹方

良方○薑汁炒遠志五錢

水煎服氣通自愈

水鼓病秘方

張舜欽傳

○清明日楊柳葉

探二兩

納入小茶壺泡湯飲之水頓下而愈

不傷臟腑真神方也

清明多採曬乾送人

又方

郁間堯○烏柏樹根皮取鮮者和開水打絞汁半飯碗和酒一碗空心服之

水腫小便不通

醫贅

○鳳尾草根

背有金星名金星草

洗去泥打爛同雞子白研和入麝香

少許

敷臍上一日一換小便即長退腫甚速

大隰風方

治虛

○海桐皮防己片姜黃原蠶沙

各三錢

茅朮

二錢

煎湯薰洗日三四次屢效

腳氣腫痛難走

拾遺

○松香末入熱豆腐漿搗勻敷過夜即好行走永無後患

冷腳氣方

新驗

○川椒一把

小麥麩皮

四升

葱

五莖

鹽

一把

醋和同炒令極熱攤

周氏集驗方

內症門

於蓐下以足薰之

腳氣灸法

洪氏集驗方

○艾灸風市兩穴以多為佳

蔡元長為開封少尹一日據案似覺有蟲自足心行至腰間落

筆暈倒久之方甦後得俞

山人灸風市至百數遂愈

免腳氣

新驗

○晚蠶沙製蒼朮

各三錢

陳艾

二錢

葱鬚

三根

生薑

一塊

卧前煎水薰

洗兩足厚覆取汗大能驅寒溼溫血脈凡雨天襪溼並少覆感寒足痠用此

足以弭患

汗管有吸收作用新創之屋污溼之鞋易成腳氣

遠路足上起泡

西法

○預於末行時浸腳於生礬水中自必無泡

足痠外洗

席春漁太守方

○木瓜

五錢

蒼朮

五錢

姜

二兩

葱

廿根

加杪樹皮

一兩

杉樹

鏤花

一兩煎湯薰洗

治黃疸神應妙方

朱淵亭

○鮮鯽魚

一尾

白洋糖

一撮

陽春砂仁

一兩

三味同搗

爛如泥去骨入蚌殼內合於臍眼上用布一幅捆好一週時濟中有黃涎流出

出自覺鬆快即愈病深者照法再敷

又方甬上黃。刺虎甬名老不大。用根去紅皮水酒各半煎服三服見效黃疸

蒸熱鬱目珠黃
漸及皮膚皆黃

黃疸病秘方張舜。金錢草陰溼近溝處甚多葉圓如錢對生四圍打汁一茶

孟病若失垂死者能活約四兩陳酒冲服下咽

多食即脹腹滿發黃繆宜。此脾胃虧損之症陳香櫟挖去蓋砂仁二錢用蓋

東壁土糊好糠火煨透去泥研細末
用時將東壁土一撮煎湯送下一錢

肺火盛咳喘親。生西瓜子半筋淘淨煎濃服或取西瓜子仁杵如糊煮服極

能清肺化痰下氣名瓜子酪

清化燥痰竹鹽方張聿青先。淡青竹一段納食鹽令滿另以竹管套之置炭

生口授。一夜去浮灰取淨鹽研每晨取少許泡湯
飲之最能潤燥凡患津耗舌乾熱痰壅盛者最宜

附痰火咳嗽方凌退庵。功勞葉煮飲甚驗

肺虛久嗽方吳門崇。猪肺一具勿破用水拍淨取紅蓮肉七粒去心勿紫緊

周氏集驗方內症門

肺管內置砂鍋中煮之隨時撇去白沫以淨爲度水沸時加入生薑一片葱

加鹽少許不用更妙日盡一具或兩日一具不得凡服製肺多次後雖感風

寒亦不復發頗驗

治冷哮膏明中堂秘方○天雄三兩 草烏三兩 川烏三兩 乾薑三兩 川附子三兩

頭尖三兩 天麻三兩 黃丹一筋 用真麻油三筋煎成膏貼肺腧穴背脊下第三節極爲效驗

吐血方良方續錄○蠶豆花莖上第一朵尤佳無花用葉抽去筋陰乾研末煎湯服不拘何經之血久服

均可除根

吐血由於酒勞者近驗○用雞距子一兩 水二鍾 煎一鍾服益智奇書燒酒同薑芽食壞肺辣茄等物

得酒尤熾性溫動血味者不知也有嗜之而失血成瘵者

酷暑吐血見日報無分男女急以蔓菁子數兩卽榨油加水少許打汁溫服病

者不知人事急宜灌救其汁入腹血卽頓止

勞役吐血良方補遺○并治一切傷力疲乏蘿摩俗名婆婆針綫包取近根壯者二兩紅棗

十枚 煎湯服之

引血歸源方良方續錄○血衝多至數升切弗驟用補藥及寒凝之劑先服童便二

三碗血止神安用廣西真山羊血臨卧温水服三分不過三服引血歸源自然全愈

吐血衄血不止重慶堂隨筆○鹽滷浸足即止 張聿青先生嘗云血症多火升面

赤足冷不暖用好陳酒數筋温熱放脚盆中病人兩足浸之即止

鼻衄不止近效○鮮生地八兩打爛急火煎停温服即止外用血餘烏梅炭研末摻鼻中

酒毒下血普濟○鮮枸杞根煎濃汁每服一盞少加酒食前温服曹紹亭方治便血猪大腸近肛門入

寸漂入白蓮去心填滿紫緊煮爛空心食之

血淋方近效○黃魚頭石十四枚當歸三錢研細牛膝湯空心服錢半

良方治小便出血痛不可忍豆豉一撮煎湯服之立效

肺癰初起醫學報○咳痰腥臭魚腥草鮮者搗汁少加酒飲之滬上藥店張聿青有乾者即青蘆管現

先生嘗云肺癰由溼熱壅肺葦莖湯甚效並謂葦字說文幹也即青蘆管現於水面者其性上行入肺管領溼

周氏集驗方 丙症門

濁痰熱下行而出膀胱歷來均用
蘆根無人辨正此後應知審用爾

千金葶藶湯治欬有微熱煩滿葶藶二升 杏仁半升 桃仁五十枚 冬瓜仁半升

一斗煮葶藶得五升去滓納諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿徐氏
靈胎云此方最穩 又接尤在溼云此方重不傷峻緩不傷懈可補桔梗湯

散之偏

又方徐子昭錄驗 ○白花百合洗淨搗汁每日溫服一碗七日愈

膈食初起指南 ○蠶豆炒 磨粉紅糖開水調食數次愈

胃陰枯食入梗痛張聿青 ○青皮甘蔗 切片 另備小鍋煮飯待飯汁將吸乾以

蔗片鋪飯面待煨香去蔗食飯久服能和胃

膈膈神效奇方詩禮堂孔原刊 ○舊篩羅一箇即羅麵鮮藕四兩無則猪肺管四兩上

三味用新沙鍋內炙研極細再用生薑一兩搗上白糖一兩沖服初服吐者

再三服之即效世上治噎膈獨有此

羊癩風沈莘農西藥試驗方 ○錐磺養即精以一厘沖開水飲之每日三次不可間斷按

癩風乃腦病此藥能平腦
化痰服三月可以全愈

猪羊癩癩拔萃 ○苦參 廿兩 川鬱金 八兩 木香 四兩 陳茶葉 廿兩 生白礬 八兩

薄荷四兩 其研細末煉蜜為丸硃砂為衣少用 每服五錢清茶送下服完一

料其病全愈

保心石丹李平書先生鈔傳 ○治一切痴癩時邪昏迷產後發狂小兒驚風精光眞珠

二兩 眞毛鹿角尖 二兩 眞龍涎香 二錢 上血珀 一兩 眞石蟹眼 二兩 生蟹爪

二兩 禹山珊瑚 一兩 撫川芎 二錢 研細密貯本草補保心石生鹿腹中鹿食

而為石此一種也一是泰西至小西洋采珍藥製成服之令毒氣不
攻於心故名保心石近來徐家滙天主堂配製每分一圓原方甚秘

頭痛如刀劈秘方張舜欽傳 ○麝香 七厘 班貓 去頭足 白胡椒 七粒 糯米 七粒 研極

細末瓶貯勿洩氣用時兩太陽男女左先用薄荷油搽之然後用末藥放小膏

藥中貼之隔一夜起一泡用針挑穿搯去毒水永不再發

牙痛方拔萃 ○鹹鯽魚頭一箇瓦上炙炭 冰片 五厘 其研搽齒上數次即愈

周氏集驗方 內症門

重慶堂隨筆云真薄
荷油搽患處甚良

牙痛秘方

張舜欽傳

○老桑樹上結成木耳採下咬於牙上立能止痛永不復發

畦蓀氏驗方沒石子一粒打碎
含痛處牙中垢自出痛即止

痰飲脘痛

張津青先生口授

○瓦楞子一味研極細重羅篩過開水服三錢

治胃脘痛

泰州松蔭堂韓氏傳

○海參腸漂淨曬乾焙勿令枯研極細末陳酒燉温每次

調服五分

老幼氣阻脘痛

竹香草廬

○陳香櫟

一隻

切開頭入砂仁

一錢五分

蓋好紮緊水煎湯半

碗服之即愈

治疝氣

近驗

○每發時用萬年青根浸燒酒或米酒服之永不復發

腎囊大熏方

無錫坊前倪氏方

○踏麩筋水放罈內一二日入鍋燒滾用棉花子

炒焦

傾入腳盆內將滾熱麩筋水澆下患者坐盆上熏之俟徧身汗流腎囊冷水

直出一次略鬆三次即效

溺結淋痛諸吟 ○舊涼帽麥柴 一圈煎湯服之 近驗方三月三薺菜花煎湯

服之每服鮮者以八錢為 率滬上藥店有乾者

溼熱阻止洩閉不行張笠臣廣 ○螻蛄數只 去頭足翅和陳酒煎服立通

良方○用萊菔子炒香白酒送下三錢

又方○陳海螵四兩 葶薺四枚 煎湯服 外治方○葛苳一味 研泥塗臍上即通

大便熱結沈莘農西 ○洋瀉葉產印度宛如綠 五分泡湯服之服後大便通者

十之九小便微赤其性清涼若 溫熱症須通下者宜用

又外治法顧渭 ○諸藥不效者用白菜三四 顆 清水煎爛傾腳桶中坐上熏之立

刻鬆解屢驗

感邪下痢張笠臣廣 ○外感風寒內停寒積溼邪下痢最捷之法蒼朮三錢 薄

荷二錢 桑葉五錢 葱五根 薑七片 煎滾水對臍眼熏之四面圍布背部見汗

痛苦若失按此法於晚間眠時用之為宜 薰後臍貼膏藥以避風為要

周氏集驗方 丙症方

痢疾神效方

拔萃

○生五靈脂 三錢

巴豆霜 一錢

五分胡椒 三十粒

明乳香 三錢

麝香 三

分沒藥 三錢

右藥六味共為細末和勻糝子搗糊丸梧子大硃砂為衣乾透收貯

用時將一丸納入臍內另以膏藥貼之到一周時即效

暑溼泄瀉

近

○芟白子 三錢

鮮竹葉 十片

白茯苓 三錢

白燈芯 一束

井水煎服

陰虛遺精

張蘭蓀兄試驗

○大淡菜酒洗

空心代點食或蒸入雞蛋作飯菜食甚效

尹則卿先生外治法

勝帶緊大脚上早晨解去虛人遇交節及勞乏時用之為宜

勞心遺精

集要

○蓮子青心 二錢

硃砂 一分

研勻臨卧開水調服

病久髮結難理

重慶堂隨筆

○竹瀝一味少加麻油和勻潤之即可梳通

婦科門

室女經行復閉方

秦州韓少懷家藏方

○并治新婚後不知禁忌經行未盡行身復痛起

塊諸疾陳楊柳枝

一握焙末

鮮夏枯草

一握打汁

二味待用

血繭一兩即未曾咬穿殘繭

赤糖 一

兩煎湯和汁調灰空心服三日分早中晚其九次無閒斷自能通暢亦有加

一兩 此方極靈極驗不可輕視

婦人乾血勞郁開堯明府 ○白馬蘭二三 煎湯港內生者打汁和酒服

血崩方近 ○雞冠花二朵 猪奶樸肉一塊 煎湯撇浮沫空心服

血崩不止舍親馮樂齋親驗方 ○金馬蘭一味煎湯空心服能得鮮者打汁溫熱服尤驗

按金馬蘭開花細碎色黃成簇葉長圓微尖莖赤長約二尺五寸略與拾遺野馬蘭相仿惟此氣不臭莖不甚粗且乾後莖葉均赭紅色

漏下赤帶倪銘三 ○墓頭回一味研末猪脊筋搗丸每服錢半空心鹽湯下

顧渭川驗方 ○用黃柏三兩研猪脊筋搗丸服四錢一料驗

赤白帶徐子昭 ○炒扁豆磨粉每日清晨米湯服五錢不一月即痊

滑胎易墮張笠臣廣文屢驗方 ○苧蔴根三錢 糯米二錢 蓮心三錢 去心三錢 每早煎服久之

自安即驗方 安胎飲

胎上衝心方重慶堂 ○乾葡萄一兩 煎服立愈

胞衣不下潛齋叢書 ○芡實葉一兩 煎湯服之立效芡實葉裂者

周氏集驗方 婦科門

胞衣亦分裂而下頗驗

產後惡露奔放不止良方○帶舊黑羶帽墊在產門卽止西人云產後有血崩者極險不可不知

產後空肚痛近方○醋一觔 秤錘燒紅入醋中使產婦鼻嗅其氣卽愈

產婦中風危急妻驗方○黑豆一茶鍾焙至有煙時卽入連鬚葱五枚 黃酒一鍾 水一鍾 共煎

至一鍾温服出汗卽愈

又陰生菌坊前倪琴三方○龜版一錢煨 生黃柏八分 兒茶五分 杏仁一錢炙乾 冰片八厘 醋爲末

共麻油調塗

產後陰挺方四明義士沈洪賚方○貢淡菜煨灰麻油調塗 又方○清明楊柳枝煎湯服

婦人身弱截孕徐子昭○柿子蒂七箇 煎湯空心服

兒科門

初生大便不解奉賢袁依琴試驗○啼不出聲危極 用紙捲成細條蘸透麻油入於

肛門立解

初生小兒無皮韓少懷家傳方○千腳泥土茶館等行人多之地研細麻油調搽

預解胎毒張舜欽○婦人有孕八月用葎草名葛勒蔓錫名葛人藤洗淨打汁一小盃約重一兩

稍溫服養兒永無瘡疥如父母染毒瘡更宜多服

小兒臍風撮口貴州王氏方張舜欽屢驗○老雄鼠腎子一對預備掛風簷下陰乾硃砂研拌

末小瓶收藏每服一分薑湯沖服重者酌加

芽兒臍風丸翁仲仁金鏡錄○製南星天麻白附子泡各膩粉五分巴霜二米許蕪荑炒

全蠍炒滑石各二分糊丸麻子大薄荷湯化開送下患得一日一丸七日七丸

此方亦宜預備臍風為襁褓惡症寒風由臍帶而入勢最急險

馬牙方囊秘喉書○並治雪口牙根白色如脆骨噴嚏含乳不吮若不急治其邪入腹而死此胎內受

熱見風而發銀針挑破青布蘸清水洗淨以地骨皮散先磨金墨擦之鮮地骨皮五分洗去人中白五分

一錢蠶砂三分冰片二分五厘杜鹽橄欖瓦錢半鳳凰衣一錢黃狗屎中糯米一錢

一錢研細封貯

雪口囊秘○滿舌白屑為心脾積熱後變黃色如轉黑色不治口若魚口或作鴟聲難治絲棉捲紙蘸水拭去

白衣用地骨皮散搽之又方○馬蘭頭打汁搽之或用硼砂銀綠焰硝冰片等分研參

赤遊風驗方吳門崇素室主○寒水石三錢研細末麻油調敷立愈小女生纔七日兩股紅熱諸藥不效

愈化愈大後用右方調敷甫一日全愈附識以備續驗

馬蘭膏良方續錄○初生月內外兩足紅赤遊風流火如足至少腹手至胸膈多致不救或大人兩腿赤腫流火

或溼熱伏於經絡皮面上不紅不腫其疼異常病者只叫腿熱他人按之極冷此伏氣之病均宜用馬蘭頭冬季無葉取根亦可水洗去

泥搗絞汁以雞毛蘸擦燥則再換如潰爛以汁調飛淨六一散搽之即愈

襁褓猓癩疔無錫坊前倪氏方○其症尿梗有紅暈一團大便口有紅暈如胭脂碎痛

者是為重候不可少緩黃連五分黃柏青黛寒水石細茶各一錢甘草七分為

末豬膽汁調塗此症宜急治紅暈入腹難療內服方川連二錢犀角屑一錢

生甘草一錢防風羌活各五分連翹七錢銀花八錢胡桃肉七枚井水二鍾置

大慢煎將乾淋汁添水再煎去渣少頃再服以紅渣一同熬濃名黃連膏用時入西牛黃五厘每服二三匙少頃再服以紅

月內胎驚上杭羅氏○由肝風內熱覓活蝦蟇一只生波澤皮有黑斑跳動極急冬

尋之將蝦蟇身後塞入洗淨拭乾用潔淨玻璃瓶瓶內俟其遺尿以尿灌服即安

免驚風目疾秘○用蠶砂同鷺毛作枕甚妙

急驚方重慶堂隨筆○其症目直氣喘昏閉不醒由於感邪挾痰失於清解壅閉肺

為搖擲擊顫反張竄視而入候生焉當其拘攣弓仰之時不可通關散鼻得

用力緊抱但以手扶聽其自抽自止庶不傷筋絡而成廢人醒次以竹瀝一鍾生梨汁半鍾萊菔汁半鍾和入鮮石菖蒲汁二調羹

灌之火降痰平則病自已慢脾虛驚忌服

慢脾風外治良方○其症肢體逆冷痰滯咽喉如牽鋸狀唇黑面青口鼻氣微昏

睡露睛者是胡椒七粒丁香七粒生梔子七箇葱頭七箇飛羅麪一撮研末

雞子白少許調貼臍上青布紮過一夜除去有青黑色者即愈如未青再貼愈後

服補脾藥推拿廣意大忌推揉艾薑灸崑崙穴足外踝骨陷中面無寶光則危

幼孩類瘧痰喘王旭高醫案○白蘿蔔汁一盃鮮薄荷汁半盃二味略煎去渣加冰

糖少許 薑汁三滴 沖服

小孩鹹哮 張聿青先生口授 ○豆腐一大塊點冰糖少許 飯上蒸熟但喫其汁自愈

小孩天哮 菱湖諸吟梅試驗 ○陳年芥菜滷每服一鍾早晚二次久之自止

風寒發汗 鐵鏡 ○驗病以三指按兒額 受風則熱傷食則冷或惡食吐食腹滿按之如鼓聲宜運化 先以葱薑打汁蘸

汁揉太陽穴 男女左右 先從眉心 同額上推 次從眉心 分推 太陽穴 數 再自天庭 眉心上承

漿下之 各搯一下 以代針數

小兒稀痘 蘇州沈香谷家傳張舜欽屢驗 ○鮮橄欖 兩枚 生甘草 一寸 稍入開水燉飯上蒸湯

服至五次後大便有黑物解下其毒已去 再服一二次重者可輕稀矣 一方橄欖核 搗碎

雜入米粉中隨意量與小兒 食之服至四兩以上為佳 有外感嗆風鼻塞緩服

痘後餘毒 方長 ○焮腫異常勢最迅速 腐爛至骨逢 山藥陳小粉 同打爛 乾即換

毒即 退 如已爛用杜仲牡蠣煨石膏 等分 研細白蜜調搽結成連珠者馬齒莧

打汁 豬油白蜜 各一碗 熬膏塗之 近驗用獨角毛大粟子 去皮搗爛

又方用野苧藤去皮搗敷

痘瘡潰爛

尹則卿先生方

○松黃散松花二錢黃丹一錢

研細乾摻滬上北石路老萬年合送

西藥房復司令藥油擦之亦佳

小兒洩閉不通

醫費

○脹急欲死囟圖蓮房

一隻

煎服即通

鮮者尤佳

小兒河白

菱湖諸吟梅試驗

○小兒忽起浮腫先以粗夏布揩胸腹令毛竅開再用軟

網蘸鹽擦之如有白沫出者即是河白

河白草

三錢即雷公藤

煎湯飲之外用白

葱一粒同鯽魚搗爛敷臍上

小兒疳瘡

徐子昭方

○面上或身生瘡爛如孔曰

似大人楊梅瘡狀

用蒸糯米時釜邊氣水

以盤承取埽瘡上不數日即效

走馬牙疳螻蛄散

囊秘

○治穿腮落牙仙方

螻蛄

瓦上煨存性研末絲棉輕拭摻之

又方○崑治疳蝕鼻梁乾蟾蜍川連

各二錢

青黛

八分

麝香少許絲棉

內服犀角

解毒丸

此症因胎毒或痘毒攻牙腐成疳如醬色者一日爛一分二日爛一寸齒落左邊上門戶則餘牙盡落死症也鼻梁發紅點危

周氏集驗方

兒科門

九

痧後疳囊秘○單用梧桐葉煎湯洗脚卽刻痊愈應驗如神

痧後舌菌方囊秘○名除瘡落菌膏專治舌生瘡菌神糊發煩真血珀生犀角辰砂扶

神冰片各一錢珠兒參二錢棗仁二錢蜜丸彈子大每服一丸麥冬湯化下

附識伯華之三兒天痘後舌生菌異常煩躁外科意欲用降藥亟屏之得此方加味疊進而愈

小兒疳積肚大骨瘦沈琴波常配此藥送人名香櫛散○因飲食過傷而成掛乾香櫛每只去內衣加

真人中白一錢用泥罈頭糊碗大文武火煨透煙盡為度研細放土上存性每服五

分輕者一服重者再服

疳積腹大如鼓徐子昭錄驗○紅糶磨粉沙糖打丸如圓眼大每日空心沙糖湯送服一丸

小兒虛黃瘦弱沈華亭試驗○小鰻鱺煎食自肥澤改觀再以蓮心黑棗桂圓胡桃

肉荔枝等煎湯日飲

蛔蟲溧陽沈莘農、蛔蟲之卵由食未熟猪肉而來小兒患者最多有山道年一厘西藥

有再服西人葶蘇油瀉藥中無流弊則蟲盡瀉下市上所售疳積糖內卽此藥糖受潮卽

變黃是其驗也

蛔結痛

李文瀾試驗

○曲腰撲身口流清涎痛久不歇少頃又痛面黃唇白者是使

君子

每歲一粒

入紅棗中

去核飯上蒸熟

空心食之蟲由便解如蟲多則多服數次

幼兒納少便溏

張念特兄試驗

○白朮

一味三錢

黑棗

十四枚同煮飲湯甚效

小兒行遲

海得蘭

軟弱者可服驢牛乳及魚肝油

消食衛生

西法

○西人小孩六月後

食粥及內湯

一歲後斷乳

代以牛馬驢諸乳

食母過冷

化過熱傷粘膜

食後即眠

極難消化

西瓜內有微生蟲

西人不敢食 豬油不易消化

油與麩合成點心

極難消化

小兒遺尿

幼幼新編

○雞內金

一具

桑螵蛸

三枚

黃芪

五錢

炙甘

三分

煨牡蠣

五錢

卧前煎服

又方○赤豆葉

搗汁温服

小豆利小便而葉止小便猶之橘肉聚痰橘皮化痰也

小兒冷痢

西蜀席春漁太守方

○吳萸

三錢

為末和飯作餅貼臍眼以布包紮

鐵鏡法

周氏集驗方

兒科門

以薑片放尾間穴灸之亦治脫肛

霍亂灸法鏡○崑崙穴足踝骨之下灸七壯起死神效 止吐法湧泉穴左轉

揉之女則右揉

小兒頭上血箭不止近驗○黃牛糞塗之即截止

瘡毒門

金銀花統治良方續錄○一名忍冬藤 一治一切惡毒異瘡搗汁沖黃酒熱服

一預解諸毒或口乾作渴或食已即飢將來必發癰疽或熬膏或研末早晚

酒下 一治熱毒血痢將藤濃煎服 一治婦女血淋研為末以白酒沖服

數次即愈

蒲公英統治良方續錄○一名黃花地丁 一治乳癰水煎沖酒服以渣敷患處即

消 一治痔瘡煮熟壓乾切碎香油拌食二筋即愈 一治發背雖青黑色

者搗爛貼之三日內肉色如初惟破者不可貼 一治婦女熱淋搗汁調下黃酒

馬齒莧統治良方續錄

○馬齒莧柔莖布地細細對生六七月開細花結小尖實中有細子如葶藶子其葉比並如馬齒而性滑利耐久難燥故名長命菜

一治楊梅瘡偏身如癩喉硬如管取碗粗一握溫水煎服出汗

愈 一治發背諸毒用一握水煎熱服出汗再服去熱退腐三服全愈 一治癬瘡極

癢無藥可愈搗敷立愈 一治婦女臍下生瘡痛癢連及二陰加青黛等分

研勻敷之

無名腫毒立效方張舜欽傳

○芒硝大黃先購芒硝七文開水化烱入大黃末調如糊 四圍敷之留頭勿

敷如不消散必有膿出

又方○明礬雄黃對半 研置膏藥上貼之即愈

又方○芙蓉花葉浸鹽滷內日久爛化如遇腫毒將滷汁擦上立消

對口靈方近驗 ○番瓜蒂醋磨敷之極效番瓜形似南瓜江北一帶極多

呂祖治發背靈效膏良方統治 ○瓜萁五枚去殼取子 乳香五塊如棗大者 右藥共研細末以白蜜

一 同熬成膏每服三錢溫熱黃酒化下

周氏集驗方 瘡毒門

發背神效方 上杭羅氏 ○米泔水將瘡內膿血洗極淨以紙搥乾後用中國自製淨

白沙糖填滿瘡內上覆薄紙如糖化流盡再洗再填三四次即愈其效如神

疔瘡方 親驗 ○中國鹼油調塗內服六神丸 大人十九小兒減半一日二服丸內

凡疔瘡生在脈息處多致命 又有疔生手十指極及足指極者多由誤食

毒蟹而生 暑令水鉗須蓋恐蛇入水洗浴及壁虎入水多生毒疔 凡疔

瘡四圍有脈處宜厚敷

指生疔瘡 良方續錄 ○雄黃七分 白芷末三分 入猪膽內套指上漸散 紅絲疔

將疔頭挑碎去惡血 疔頭即紅絲盡處 購浮萍草菊花露搗碎

挑洩五藏毒疔 近驗 ○疔毒之發於五藏 五藏之脈皆繫於背故凡生疔背上必

疔或心窩刺痛或耳底作痛或生於隱處即看背上 其發於心肺者發於唇

如有坵點即是生疔速為挑刺出血此洩毒之要治 其發於心脾者多發手足腰脇筋骨

指節間屬心發於鼻之上 現於背之上或發於肝脾者屬肝發於口角腮觀

上下屬脾 現於背之中或發於腎者多見耳竅胸腹腰 現於腰部輕者紅重

者色急用針於班上挑刺約入二三分 擠出惡血日挑兩次者轉輕輕者勢

即解 昔見鈴鑿治疔視背有紅點悉數挑之名曰挑疔馬培之先生亦云簡便而驗故細誌之

治療癰方樂善書屋○頭項無論前後左右癰癩多少柿油一味用筆蘸圈留中間

一點透露熱毒之氣隨圈隨縮漸次消散

又方坊前倪氏○生山藥去皮加食鹽少許搗如泥敷患處即消

一方○生茨菇同老薑打敷甚效

靈應必消散拔萃○端治一切痰核無名腫毒未成者摻於膏上貼之立即內消

草烏 五錢 白芷 五錢 山柰 二錢 貝母 三錢 蟾酥 一錢 曬研川烏 五錢 花椒 一

錢 麝香 四分 大黃 三錢 研細密貯此方加伏薑乾末四錢治小兒頸上寒痰核

脇下生漏陳偉生鈔傳○狀如牛眼膿水不止蛇蛻三錢五倍子 五錢 龍骨 五錢 川

斷 五錢 麝香 五分 爲末唾津調敷立效

鼠癩新方山陰瀉渚張若震○淡硫酸即淡硫酸強水合法淡硫酸一份淨水二份擦之即愈方由試驗溼重失手將淡硫酸

傾覆適頭上鼠癩癢痛以指硫酸巾擦之漸愈傳人均效

周氏集驗方 瘡毒門

臘梨頭瘡岑曉方。油炸膾所熬臙之油脚加白礬末調敷。倪琴。○生芋頭打和

飴糖勻敷。瘡內之蟲蝕糖出窠為

又方。○新棉花核連殼焙研乾麪真麻油和調塗布紫如頭癢勿解。用于敲頭百部一兩煎洗再

換藥敷自愈

胎瘡一應溼瘡拔萃方。○恬素氏合送四十餘年百試百效老松香二兩黃丹一兩鉛粉五錢青

黛一兩白礬二兩人髮少許同殺以枯為度同研麻油調搽。並治臘

內消乳島良方。○瓜萁一箇當歸五錢蒲公英三錢乳香去油沒藥各一錢生甘

草二錢鮮橘葉每歲酒煎服自消

又方。○活鯽魚一箇打爛去骨鱗和老酒糟厚敷患處一宿初起即消

耳中膿血應驗方。○紅綾三寸爐甘石一錢胭脂銀硃冰片各五棉杖捲淨吹入

徐氏鈔驗。○蓮蓬殼一箇冰片五厘同研吹入

鴛掌瘋唐子培。○手爪甲裂白皮時蛻者白毛籜煎湯洗日數次自愈

小兒蛇疔張舜欽先生方 ○ 緞店柿漆搯之隨手結痂

又方 ○ 寒水石二錢研 山梔仁 二錢 白芷 一錢 飛麩 一錢五分 共為末雞子白調塗

遍身癩瘡坊前倪氏 ○ 銀花防風荆芥連翹苦參皮硝川椒各四錢 煎洗浴避風

瘡疥方竹香草廬 ○ 大楓子肉四十粒 檀腦 一錢 皂礬 一錢 冰片甘文研 細備用猪油三兩 黃一錢

同煮入藥末攪勻拭瘡上日三四次

附識西人謂一切瘡疥皆有微生蟲在血內能令人之血質變壞在頭則令髮禿中西醫理確亦相符

解蘊熱瘡毒親驗 ○ 專治心脾積熱壯人血熱大人瘡毒 嫩蠶豆葉立者前 採半觔打汁

隔湯燉熱飲一茶盃日二次

風疹日久不愈浙甯陳立齋方 ○ 用皮硝一二兩 煎湯洗澡奇效

凍瘡吳門崇素室主方 ○ 大黃黃柏各研細末 立時止痛數日痊愈據云乙已患凍瘡足背腐爛不能履

地夜不安眠得此方用之而愈

男婦痔漏方坊前倪氏 ○ 兼治腸風下血刺帽皮 入錢 猪懸蹄 十枚 牛角鯁 八錢 槐

周氏集驗方 瘡毒門