



王孟英潛齋醫書五種

卷十

隨息居重訂霍亂論三

藥方篇

藥性 方劑

岳晉昌霍亂括要附

霍亂百病之一也。而其致病之由則不一。醫者審證投劑寒熱攻補各有所宜。誠未容偏執一是。顧軒歧以來。治霍亂無專書。臨證者卒鮮依據。自孟英以流離兵燹之餘。覩疹厲天札之慘。因時論證。因證立法。而有霍亂論之作。於是治霍亂者始有成法可遵。獨惜其書流傳未廣。吾鄉仁術之士。以未獲一讀是書爲憾者。竟不之人。光緒丁亥夏秋之交。霍亂遍吳越。治之苦無善法。余友金君笠山袖。是書與同里馬君果盦。勸其重刊壽世。馬君讀而善之。囑賢與汪君金三司校勘事訖。歲餘始畢。工沈丈杏田見之語賢曰。王氏之論誠善矣。岳景昌霍亂歌括其言。雖不文。治法固可傳也。盍附諸。賢以告果盦。果盦以爲然。乃麗

之篇未焉嗚呼兩美既合相得益彰後之讀是書者幸參觀而互證之也可會稽德生高汝賢謹識

謂余文金氏金山南其告與同文也重正壽世
應者東平人武都王友夏侯玄之子也
因曰數識吾其實於轉未遺吾恩也故士多服之
因則德高因獨立志在聖門故其子也
謂燭者李衡之號也以善燭京洛之領燭物而天子之物
又謂名首冠五胡未終亂時」張顧車之以來百蠻之無事舊
墨傳曰定之「主其達家」由是不一燭而照燭支流民燭

隨息居重訂霍亂論總目

病情第一

總義

熱證

寒證

治法第二

伐毛

取嚏

刮法

焫法

刺法

搗洗 治熱證

熨灸 治寒證

偵探

策應

紀律

守險

醫案第三

南誠

夢影

藥方第四

藥性

方劑

隨息居重訂霍亂論第四

藥方篇

海昌王士雄夢隱纂

藥性

原蠶砂 諸霍亂之主藥也。

黃芩 溫病轉霍亂之主藥。凡吐下而熱邪痞結上焦。胸次不
舒者。並可與黃連半夏同用。

石膏 暑熱霍亂之主藥。凡吐利而苔黃大渴者。並宜用之外。
挾風寒者。佐以柴蘇桂枝香薷生薑之類。內挾痰滯者。佐以厚
樸半夏菖蒲橘紅之類。下兼寒溼者。佐以防己細辛海桐皮威
靈仙之類。

滑石 溼熱霍亂之主藥。熟甚者佐石膏。溼甚者佐茵陳。

薏苡仁 霍亂轉筋溺祕者之主藥也。

木瓜 霍亂轉筋溺不祕者之主藥也。

香薷 夏令浴水迎風而霍亂之主藥也。

扁豆 中虛而暑溼霍亂之主藥也。

西洋人參 虛人霍亂之主藥也。

枳桔蘆菔子 停食霍亂之主藥也。

梔豉石菖蒲 穢濁霍亂之主藥也。

棟實黃檗桑葉絲瓜 霍亂而肝火盛者之主藥也。

茅根地丁益母蒲公英 霍亂而血分熱熾之主藥也。

竹筍石斛蘆根梔子枇杷葉 霍亂嘔噦之主藥也。

厚樸蘆菔大腹皮 霍亂脹滿之主藥也。

茵陳連翹綠豆皮絲瓜絡 霍亂身黃之主藥也。

通草車前海金沙 霍亂無溺之主藥也。

綠豆銀花竹葉黃連 霍亂誤服熱藥之主藥也。

旋覆紫苑麥蘖蘆菔子 霍亂誤補之主藥也。

人參龍骨牡蠣甘草石脂餘糧 霍亂大虛欲脫之主藥也。

桂枝 傷寒轉霍亂之主藥也。

紫蘇藿香生薑厚樸白豆蔻 霍亂因外寒之主藥也。

吳茱萸烏藥砂仁高良薑 霍亂因內寒之主藥也。

人參白朮炙甘草蓮子 中虛而寒溼霍亂之主藥也。
丁香木香川椒神翹 瓜果魚鱗生冷傷中霍亂之主藥也。
乾薑附子肉桂硫黃 陽虛中寒而霍亂及寒霍亂誤服寒藥
之主藥也。

方劑附目次

臥龍丹二方 以下治熱證須預備者

立效丹

開關散

速效丹

甘露消毒丹

玉樞丹

紫金丹

行軍散

干金丹

卽平安散

紫雪

碧雪

絳雪卽紅靈丹

飛龍奪命丹

煉雄丹

三聖丹

以下治寒證須預備者

蟾酥丸

四方

露慮散

回陽膏

黃芩湯以下各方治熱證

黃芩加半夏生薑湯

梔子豉湯

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

桂苓甘露飲

六一散

葱豉湯

四苓散

平胃散

正氣散

半夏厚樸湯

六和湯

香薷飲

黃連香薷飲

左金丸

黃芩定亂湯

燃照湯

連樸飲

蠶矢湯

解毒活血湯

駕輕湯

昌陽瀉心湯

麥門冬湯

致和湯

五苓散以下各方治寒證

理中丸

厚樸生薑半夏甘草人參湯

四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

附子杭米湯

吳茱萸湯

漿水散

冷香飲子

大順散

神香散

來復丹

桂枝湯

異功散

梅花丸此下杜絕霍亂方

資生丸二方

回龍丹治諸痧中惡霍亂五絕諸般卒倒急暴之證

西牛黃

飛金箔各四分

四

梅花冰片

荆芥

羊躡躅各二錢

錢

麝

香當門子五分

硃砂六分

六

猪牙皂角一錢

一錢

燈心炭二錢

二錢

九味共研

細瓷瓶密收毋使泄氣

以少許搐鼻取嚏垂危重證亦可以

涼開水調灌分許併治癰疽發背蛇蝎蜈蚣敵傷用酒塗患

處。

案羊躡躅俗名鬧羊花。辛溫大毒。不入湯劑。只可以用以取嚏。近目卽昏翳。今肆中卧龍丹。以此爲君藥。又去牛黃而加蟾酥。減輕燈心炭而冰麝不過略用些須耳。故藥力大遜。甚不可恃。好善者必自配製也。

案冰片近日有一種洋冰以樟腦升提者性熱萬不可用

又

西黃

六分

梅片

當門子

各一錢

北細辛

一錢

牙皂

羊躡躅

各二錢

燈心炭

一兩

七味

製如上法

主治亦同

立效丹

治同上

硃砂

三兩

明雄黃

蓬砂

各一錢

梅冰

當門子

各九錢

火硝

六錢

華芨

牛黃

三錢

八味

共研細

蜜餅緊收勿令泄氣每用分

許蘆管吹入鼻內若卒倒氣閉重證則七竅及臍中均可放
置立蘇。凡暑月入城市抹少許於鼻孔可杜穢惡諸氣。

開關散 治畜痧臭毒痛如絞氣閉神昏欲絕之證。

燈心炭雨羊躡躅三北細辛

杜蟾酥

牙皂各二錢

牛黃

梅片

當門子各一錢

八味共研細瓷瓶緊裝毋令泄氣每少

許吹鼻得嚏卽生

速效丹 治諸痧手足麻木牙關緊急目閉不語胸背有紅點。
或咽腫心痛及風餐露宿寒暑雜感危急之證。

北細辛

牙皂

各三錢

硃砂二錢

廣木香

陳皮

桔梗

貫眾

薄荷葉

防風

製半夏

甘草各二錢

枯礬一錢

白

芷錢十三味共研細末。瓷瓶緊裝。每用三分吹入鼻孔。寒溼內盛而病重者。開水調服一錢。方內入蘇合香二錢尤妙。按痧藥方。藥品珍貴者多。惟此價廉。用以搐鼻。頗亦有效。故人徐君亞枝嘗合大料。交余在淳溪施送。累年鄉人無不感頌。甘露消毒丹。天士治暑溼霍亂時感痧邪。及觸冒穢惡不正之氣。身熱倦怠。脹悶肢痠。頭暉咽痛。身黃口渴。瘡痢淋濁。泄瀉。瘡瘍。水土不服諸病。但看病人舌苔淡白。或厚膩或乾黃者。疫邪尚在氣分。悉以此丹主之。凡醫臨證亦當準此化裁。自可十全爲上。

飛滑石十五兩 簾茵陳十一兩 淡黃芩十兩 石菖蒲六兩 川貝母木

通谷五霍香

連翹

射干 薄荷葉

白豆蔻各四兩

十一

味不可加減。生曬研細末。蜜密收。每服三錢。開水溫溫服。
日二。或以神麴糊丸彈子大。調化服亦可。此丹治溼溫時疫。
著效亦神。累年同人合送。價廉功效無出此方之右者。一名
曹濟解疫丹。

太乙玉樞丹

一名解毒丹
萬病丹

治諸痧霍亂。疫癘瘴氣。喉風五絕。尸疰

鬼胎。驚忤顛狂。百般惡證。及諸中毒。諸癰疽。水土不服。黃疸
鼓脹。蛇犬蟲傷。內服外敷。功難殞述。洵神方也。

山慈姑

去皮洗淨煆

川文蛤

即五倍子搗破洗刮內淨

千金子

即續隨子去油取淨霜各二兩

紅芽大戟

洗焙一兩

當門子

三錢

五味先將慈姑。蛤戟三味研極細末。

再入霜香研勻。糯米湯調和乾溼得宜於辰日淨室中。水曰
內杵千餘下。每料分四十錠。故亦名紫金錠。再入飛淨硃砂。
飛淨明雄黃各五錢尤良。或以加味者杵成薄片切而用之。
名紫金片。每服一錢涼開水調下。孕婦忌之。又不可與甘草
藥同進也。

太乙紫金丹 治霍亂痧脹嵐瘴。中惡水土不服。喉風。中。毒蛇
犬蟲傷。五絕暴厥。顛狂癲疽。鬼胎魘魅。及暑溼溫疫之邪。彌
漫熏蒸。神明昏亂。危急諸證。

山慈姑 川文蛤各二兩 紅芽大戟 白檀香 安息香 蘇

合油各一兩 于金霜一錢 明雄黃飛琥珀各五錢 梅冰 寶門子

鰐魅以左道致人於死也
圖畫形象或刻作人身刺心眼繫手縛足妄行左道之神
或假託鬼神之神

錢各三

十一味各研極細再合研勻濃糯米飲杵丸綠豆大外

以飛金爲衣每錢許涼開水下按一瓢云此方比蘇合丸而

無熱較至寶丹而不涼兼玉樞丹之解毒備二方之開閉洵

爲濟生之仙品立八百功之上藥也又按昔人所云太乙丹

能治多病者卽上二方也今俗傳太乙丹不知創自何人藥

品龐雜羣集燥熱惟風餐露宿藜藿人寒溼爲病者服之頗

宜若一概施之誤人匪淺

行軍散治霍亂痧脹山嵐瘴癘及暑熱穢惡諸邪直干包絡

頭目昏暈不省人事危急等證竝治口瘡喉痛點目去風熱

障翳搐鼻辟時疫之氣

西牛黃 當門子 真珠 梅冰

蓬砂

各五錢

明雄黃

飛淨八錢

火硝三錢。金頁十八味各研極細如粉。再合研勻。瓷瓶密收。以蠟封之。每三分涼開水調下。

千金丹

一名人馬平安散

治同上

明雄黃

蓬砂

硝石

各一兩

硃砂

五錢梅冰

當門子

各二錢

金頁一百七味各爲細末。合研勻。瓷瓶緊裝。每三分涼開水

下。或嗅少許於鼻內。或加牛黃。噙溪云此祕方也。

紫雪

治癰瘍。脹穢。毒心。腹痛。霍亂。火熾。躁瞀。煩狂。及暑火溫

熱。癥瘕。疫毒厲諸邪。直犯膻中。猝死。溫瘧發斑。狂易叫走。五尸。鬼魅驚癲。急黃。蠱毒。麻痘火閉。口舌生瘡。一切毒火邪

火穿經入臟蘊伏深沉無醫可治之證

黃金

百兩石
頑云須賈金鋪中煉過葉子煮之方有性味而止用十兩薛公望云不用亦可

洞溪云如用飛金萬頁研入

尤妙寒水石
石頑云如無真者以元精石代之

慈石

醋煅石膏

白滑石

各三斤石

各五兩

四石共搗碎用水一斛

石頑一斗

連金煮至四斗

石頑五升去

滓入下藥

滓入下藥

犀角屑羚羊角屑青木香切沉香

研各五斤石頑止用五錢案斤字恐是兩字之譌

丁香

一兩石頑止用一錢洞溪云可用二兩

元參切升麻

各一斤石頑用一兩六錢甘草八兩

石頑用生者八錢洞溪用炙

八味入前藥汁中煮取一斗五升

石頑一升五合去

滓入下藥

樸硝

十斤石頑用芒硝一兩

焰硝

四斤石頑用三兩洞溪云余製此二硝止用十之一

二味入前

藥汁中微火上煎。柳木鎗攬不住手。候有七升石頑七合半投在木盆中半日。欲凝入下藥。

硃砂

研細水飛淨三兩石頑五錢

當門子

研一兩二錢五分石頑一錢二分

二味入前藥

中攬勻。勿見火。寒之二日。候凝結成霜紫色鉛罐密收。每服三四分至一錢。量用新水調灌。案雞峰方無慈石滑石硝石二角。祇用各十兩。丁沉木香各五兩。升麻六兩。樸硝二斤。麝香卻用三兩。餘六味分兩同醫通云。此方卽千金元霜加甘草丁香硃砂三味。遂易紫雪之名。余以其香味易散。故減小其制。竊謂宜從張氏配合爲是。

碧雪 治熱極火閉。痧脹昏狂。及霍亂誤服熱藥。煩躁瞀亂。及

時疫憒亂便祕發斑。一切積熱咽喉腫痛。口糜齦爛。舌瘡喉閉。水漿不下等證。

寒水石 石膏 硝石 樸硝 芒硝 牙硝 青黛 甘草 八味等分。先將甘草煎湯去滓。納諸藥再煎。以柳木籠不住手攬。令消鎔得所。卻入青黛和勻。傾入砂盆內。候凝結成霜。研細密收。每錢許涼開水下。上焦病以少許含化嚥津。不能嚥物者。蘆筍吹入喉中。齒舌病抹患處。

絳雪

一名八寶
紅靈丹

寶

治霍亂

痧脹

肢厥

脈伏轉筋

昏暈

瘴癘

時疫

暑

毒下痢等證。竝治喉痺牙舌諸病。湯火金刃諸傷。均擦患處。

硃砂

牙硝

各一

明雄黃

飛蓬

砂

各六

礞石

服四

梅片

當

門子各三

飛真金五

十

味擇吉日淨室中各研極細再研

勻。瓷餅緊收。鎔蠟封口。毋使泄氣。每一分涼開水送下。小兒

減半。以藥佩帶身上。可辟疫氣。牛馬羊瘧。以此點其眼。卽愈。

飛龍奪命丹。治痧脹疔瘍。霍亂轉筋。厥冷脈伏。神昏危急之

證。及受溫暑瘴疫。穢惡陰晦諸邪。而眩暈痞脹。瞀亂昏狂。或

卒倒身強。遺溺不語。身熱癰癤。宛如中風。或時證逆傳。神迷

狂譖。小兒驚癇。角弓反張。牙關緊閉諸證。

硃砂

飛二

明雄黃

飛燈心炭

各一

人中白

漂黑

明礬

青黛

飛各

梅冰

去節各

兩

真珠

牙皂

當門子

蓬砂

各三

西牛黃

二

杜蟾酥

火硝

各一錢

飛真金

三百

十六味各

五分

西牛黃

二

杜蟾酥

火硝

各一錢

飛真金

五百

十六味各

三分

研極細合研勻。瓷餅緊收毋令泄氣。以少許吹鼻取嚏。重者再用涼開水調服一分。小兒減半。案此丹芳香辟穢。化毒祛邪。宣氣通營。全體大用。真有斬關奪隘之功。而具起死回生之力也。

煉雄丹 治暑穢痧邪直犯包絡。神明閉塞。昏憒如尸。及霍亂初定。餘熱失清。驟爾神昏。如醉如寐。身不厥冷。脈至模糊者。皆燥熱無形之氣。蒙蔽膻中。如人在煙塵障霧中行。治失其宜。漸漸燥悶而死。此非牛黃清心犀角地黃等方可療。此丹主之。

極明雄黃一研極細 提淨牙硝六分研細同入銅勻內。微火

丹竈鍊丹之竈
也江淹賦
守丹竈而不顧

鎔化撥勻。俟如水時急瀘清者於碗內。粗渣不用。俟其凝定收藏。此丹竈家祕製也。案此法見游宦紀聞。陳平伯載此方。黃多而硝少。素園糾其誤。謂黃多硝少。何能鎔化。今依楊定雄一硝六爲率。

木通錢通草三錢陳雨水用冬雪水似更良一碗煎出味去滓。再以陳雨水九碗與藥汁和勻。每次用藥水一碗磨入犀角三分。挑入煉雄三釐調勻。徐徐冷灌。能於三日內服盡十碗藥水。必有清痰吐出數碗而愈。蓋齋嘗親驗矣。

三聖丹 治寒溼爲病。諸痧腹痛。霍亂吐瀉。

木香一兩見火不
明雄黃二兩明礬三兩共研細末以鮮荷葉橘葉藿

香葉各二兩搗汁丸綠豆大每服九分重者再服

蟾酥丸 治暑月貪涼飲冷食物不慎兼吸礦惡成痧脹腹痛或霍亂吐瀉

杜蟾酥

燒酒化

硃砂

飛各五錢

明雄黃

飛茅山

蒼朮土

炒焦各一錢

丁香

各一錢

木香

各二錢

沉香

各二錢

茅山

牙皂

各三錢

當門子

一錢

七味各研極細

蟾酥打

九鳳仙子

大辰

砂爲衣放舌底化下重者二三丸。洄溪云此祕方也。

又 治同上

杜蟾酥

燒酒化開明雄黃水

飛各三錢

丁香

各一錢

木香

各二錢

沉香

各二錢

茅山

蒼朮土

炒焦四錢

硃砂

飛一錢五分

當門子

一錢

西牛黃

分三九味各研極細

擇上吉日淨室中合研勻同蟾酥加糯米糉尖五箇搗千

餘下丸如椒子大。曬乾盛于瓷碗內。再用硃砂一錢五分燒酒調塗碗內蓋好。用力搖一二千下。則光亮矣。密收瓷瓶內。每三粒輕者一粒。重者五粒。泉水下。

姚氏蟾酥丸 治同上

杜蟾酥天燒酒浸烊如無杜酥可以東酥加倍明雄黃研硃砂飛各木香曬丁香曬茅丸炒滑石飛各當門子兩八味各研極細和入蟾酥杵勻丸黍米大。每藥丸就四兩。以火酒噴溼。蓋在碗內。加入飛淨硃砂六錢。竭力搖播。以光亮爲度。

又萬應丹 治同上而力較峻。

杜蟾酥九錢燒酒化 錦紋大黃曬乾六兩硃砂飛明雄黃飛明天麻焙乾

麻黃

去節焙各三兩六錢

丁香

六錢

當門子

三錢

茅丸

米泔水浸

切焙三兩

十味各爲細末。以糯米粥漿和杵丸蘆菔子大硃砂爲

衣。每七丸納舌下。少頃陰陽水下。若研細吹鼻亦可取嚏。

麝憲散

治陽虛中寒。腹痛吐瀉。轉筋肢冷。汗淋苔白。不渴脈

微欲絕者。

附子

濃甘草湯煎去毒

吳茱萸

泡去第一次汁。鹽水微炒名三兩

絲瓜絡

燒酒洗五兩

陳

伏龍肝

二兩燒酒一小杯收乾

木瓜

絡石藤七錢煎汁炒乾一兩五錢

丁香

蒸曬一兩

六味

共爲極細末。分作十九服。外以醋

半酒標

鹽

一分一錢

藕肉

一兩五錢煎

滾瓦上炙存性研。每服加三釐。

每病止須用半服。參湯下。案

確係寒證。此散固佳。若未辨陰陽。而用熱藥。以爲外治。尙無

大害。內服之藥極宜審慎。勿輕試也。

回陽膏 治同上

生香附

或用吳茱萸亦可一兩八錢

母丁香一兩上桂心

八錢倭硫黃五錢當四錢

當

門子錢五味其研極細。瓷餅密收。每二三分安臍中。以膏藥封之。一時卽愈。孕婦忌貼。案霍亂轉筋。旣有寒暑之分。亦有寒暑雜感而成者。更有暑伏於內。而寒束於外者。故服藥最宜審慎。况利多亡陰。津液大奪。雖可投熱藥者。亦恐剛烈劫陰。終於不救。此方藥雖猛峻。而僅取其氣由臍入腹。自能溫通臟腑。以逐寒邪。不致傷陰。誠爲善策。惟口渴苔黃。下利極熱者。顯爲陽證。雖見肢冷脈伏。亦勿妄貼此膏。更張其焰也。

前茅一猶斥候
旗前有敵則舉旗報於後軍左傳前茅慮無二今謂考試得前列者為前茅

以上諸方雖分別熱證寒證之治而和平猛厲用得其宜並皆佳妙然非倉卒可辦者故列諸前茅冀仁人君子量力製備刊明藥味證治廣爲傳播俾醫家病家一覽瞭然不但將死者可以得生而不死者亦不致誤藥以喪其生利濟之功不其偉哉方下兼及別證治例者既不敢沒良方之大用且以推廣施藥之仁懷也

黃芩湯傷寒論治溫病變霍亂之主方用者因證加減

黃芩三兩炙草一兩芍藥各二兩大棗十二枚

水一斗煮取三升去渣溫服一升日再夜一服

黃芩加半夏生薑湯傷寒論

原方加半夏半升。生薑三兩。案冬傷於寒。至春發爲溫病。有或瀉或嘔之兼證。皆少陽犯陽明也。故仲聖以黃芩清解溫邪。協芍藥泄迫血之熱。而以甘棗夏薑。奠安中土。法至當矣。其溫病轉爲霍亂。果由中虛飲聚而伏邪乘之者。仍宜以此法治之。如火勢披猖。上衝下迫。或脈數口渴。或熱深厥深。則無藉乎。奠中滌飲。當從事於瀉火清中。舉一反三。在人善悟也。

梔子豉湯。傷寒論。治溫熱暑疫。轉爲霍亂之主劑。

梔子

十四枚
四合
絲裹

水四升。先煮梔子得二升半。內豉煮取升半去滓。分二服。

案此傷寒吐劑也然古方梔子生用故能涌吐今皆炒黑用之雖不作吐。洄溪謂其滌熱除煩之性故在也。而余之治熱霍亂獨推以爲主劑蓋梔子苦寒善泄鬱熱故時後方以之治乾霍亂矣。豉經蒸腐性極和中凡霍亂多由溼鬱化熱挾穢濁惡氣而擾攘於中宮惟此二物最爲對證良藥奈昔人皆不知察也。且二物之奇匪可言磬如偶以銀花竹葉清暑風配以白蔻菖蒲宣穢惡溼甚者臣以滑樸熟勝者佐以芩連同木瓜扁豆則和中合甘草鼠黏而化毒其有誤投熱藥而致煩亂躁悶者亦可藉以爲解救厥功懋矣而古今之治霍亂者從不引用豈非一大闕典耶

杭俗作梗

白虎湯傷寒論治暑熱熾盛而爲霍亂者。

石膏一斤知母六兩甘草炙二兩杭米六合

水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服案治霍亂杭

米須用陳倉者或用生苡仁亦妙

白虎加人參湯傷寒論治證如前而元氣已虛者。

原方加人參三兩

案白虎湯神於解熱妙用無窮加人參則補氣以生津加桂枝則和營而化瘧加蒼朮則清溼以治痿變而爲竹葉石膏湯則爲熱病後之補劑余因推廣其義凡暑熱霍亂之兼表邪者加香薷蘇葉之類轉筋之熱極似寒非反佐莫能深入

者少加細辛威靈仙之類。痰溼阻滯者加厚樸半夏之類。血虛內熱者加生地地丁之類。中虛氣弱者加白朮苡仁之類。病衰而氣短精乏者加大棗枸杞之類無不奏效如神也。

竹葉石膏湯

傷寒論

治中虛暑熱霍亂及霍亂已定而餘熱未

清虛羸少氣者

竹葉一握石膏一斤半夏

半升洗

人參三兩

麥門冬一升

粳米半升

甘草

炙二兩

水一斗先煮六味取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三案集驗云此方加生薑治嘔最良余謂治白霍亂宜用地漿煎更妙

桂苓甘露飲 河間治暑熱挾溼之霍亂

桂皮白朮

猪苓

各五錢

茯苓

去皮澤瀉各一兩

滑石

四兩

寒水石

石膏

甘草

炙各二兩

一方

滑石

四兩

九味爲末

每三錢

溫水

或新汲

水

或生薑湯量證調下

小兒每服一錢

案此方一名桂苓白

朮散

一方不用猪苓

或云去猪苓加人參

名桂苓白朮散

六一散

卽益元散

一名

天水散

河間

桂府膩白滑石

六兩

甘草

炙兩

一二味爲末

每三錢

溫水

或新汲

水調下

日三挾表邪者

以蔥白五寸

豆豉五十粒

煎湯調下

本方加黃丹

名紅玉散

加青黛

名碧玉散

加薄荷

名雞蘇散

加硃砂

名辰砂

益元散

葱豉湯 胎後 治霍亂發斑。

葱白 握一 香豉 三

水煎入童子小便一合日三服。

案石頑云。本方藥味雖輕。功效最著。凡虛人風熱。伏氣發溫。及產後感冒。靡不隨手獲效。余謂胎前外感。何嘗不是妙劑。蘆根竹葉蘇葉薄芩。可以隨證佐入。

四苓散 溫疫論 治溼盛霍亂。胸悶溺澀而渴者。

茯苓 猪苓 潤瀉 橘皮

水煎服。

案吳氏五苓去桂。而治胃中溼熱。最爲有見。且以橘皮易丸。

則無實中之弊。而有利氣之功。當變而變。斯爲善用古法。欲平霍亂者。宜知所趨嚮矣。吳又可溫疫論解理透闢。用藥靈活。爲窮家不可不閱之書。益園局方治溼盛於中霍亂吐瀉。

茅朮去粗皮水浸四兩紫厚樸去皮薑汁炒

陳皮去白各三兩二錢

甘草炙二兩

大腹皮炙一兩

十一味爲

味爲末。每服二錢。水一盞。薑一片。煎七分服。轉筋者加木瓜。本方加藿香半夏。名金不換正氣散。

藿香正氣散。治溼蘊於中寒。襲其外而爲霍亂吐瀉者。

厚樸 陳皮 桔梗 白朮

牛夏

各二兩

大腹皮

一本作蒼朮或用檳榔亦可

十一味爲

白芷 茵苓 蘇葉 蕃香

各三兩

甘草

炙一兩

十一味爲

粗末。每三錢。薑三片。棗一枚。煎服。

蘭臺軌範此方無

白朮似更妥

謝城

附馬月真言醫言
案右二方皆治風寒外感食滯內停或兼溼邪或吸穢氣或傷生冷或不服水土等證的是良方若溫暑熱證不兼寒溼者在所切禁今人謂其統治四時感證不審病情一概濫用誤人不少用治霍亂薑棗宜裁

半夏厚樸湯一名四七湯治情志不舒痰溼阻氣而成霍亂者。

半夏一升厚樸三錢金匱治情志不舒痰溼阻氣而成霍亂者。
升藥兩
半夏一升厚樸三錢金匱治情志不舒痰溼阻氣而成霍亂者。
升藥兩
乾蘇葉四錢金匱治情志不舒痰溼阻氣而成霍亂者。
乾蘇葉兩
生薑二錢金匱治情志不舒痰溼阻氣而成霍亂者。
生薑兩

水七升煮取四升分溫四服

案此方既主七情不適之鬱痰證亦治寒溼不化風感外侵食滯不消誤投滋補因而病劇者無不所嚮輒捷。

六和湯 治夏月虛人外感風寒內傷生冷之霍亂吐瀉而身

發熱者

香薷

二錢

人參

茯苓

甘草

炙

扁豆

厚樸

製木瓜

杏仁

去皮

半夏

各一錢

藿香

砂仁

炒研各六分

生薑

三片

大棗

一枚

水煎服。

香薷飲局方治暑月乘涼飲冷。陽氣爲陰邪所遏。頭痛發熱。惡寒煩躁。口渴腹滿之霍亂。

香薷

一斤厚樸

薑汁炒

白扁豆

各半斤

三味爲粗末。

每五錢至一兩。

水煎冷服。

黃連香薷飲

活人治同上。

原方加薑汁炒黃連四兩。

左金丸 治霍亂轉筋。肝火內熾。或吐青綠苦水者。

川連六兩

吳茱萸取陳而開口者一兩

二味同煮乾爲細末。米飲糊丸綠

豆大每三錢。陳木瓜五錢煎湯下。吐酸味者。竹筍生苡仁各

三錢煎湯下。案張雨農司馬見余采此方。極爲首肯。云嘗在

都城見杜石樵少宰亦用此藥治愈多人也。

黃芩定亂湯

夢隱

治溫病轉爲霍亂。腹不痛而肢冷脈伏。或肢

不冷而口渴苔黃。小水不行。神情煩躁。

黃芩

酒蕉梔子炒各一錢

香豉

炒各一錢

原蠶砂

三錢

製半夏

三錢

橘紅

鹽水

炒各一錢

蒲公英

四錢

鮮竹筍

二錢

川連

六分

薑汁

炒陳

吳萸

泡淡一分

陰陽水二錢煎一錢。候溫徐服。轉筋者加生苡仁八錢絲。

瓜絡三錢。溺行者用本瓜三錢。溼盛者加連翹茵陳各三
錢。

燃照湯 霍亂論 治暑穢挾溼。霍亂吐下。脫痞煩渴。苔色白膩。外顯惡寒、肢冷者。

飛滑石 四錢香豉炒三錢 焦梔二錢 黃芩 酒炒一錢 酒省頭草 各一分 製厚樸
製半夏 各一錢

水煎去滓。研入白蔻仁八分。溫服。苔膩而厚濁者去白蔻。
加草果仁一錢。

連樸飲 霍亂論 治溼熱蘊伏而成霍亂。兼能行食滌痰。

製厚樸 二錢 川連 薑汁炒 石菖蒲 製半夏 各一錢 香豉炒 焦梔各三

錢蘆根二兩

水煎溫服。

蠶矢湯霍亂論治霍亂轉筋。肢冷腹痛。口渴煩躁。目陷脈伏。時

行急證。

晚蠶砂五錢

生苡仁 大豆黃谷各四錢

陳木瓜三川連

薑汁炒二錢

製半夏

黃芩酒炒

通草各一錢

焦梔一錢

陳吳萸泡淡五分

地漿。或陰陽水煎。稍涼徐服。

解毒活血湯夢隱

治溫暑痧邪。深人營分。轉筋吐下。肢厥汗多。

脈伏溺無。口渴腹痛。面黑目陷。勢極可危之證。

連翹

絲瓜絡

淡紫菜各三錢

石菖蒲一錢

川連吳茱水炒二錢

原蠶

砂 地丁 益母草

各五錢

生苡仁

八錢

銀花

四錢

地漿或陰陽水。煮生綠豆四兩。取清湯煎藥。和入生藕汁。
或白茅根汁。或童便一杯。稍涼徐徐服。

駕輕湯

霍亂論

治霍亂後。餘邪未清。身熱口渴。及餘熱內蘊。身

冷脈沉。湯藥不下。而發呃者。

鮮竹葉 生扁豆

各四錢

香豉

炒

石斛

各三錢

枇杷葉

刷二錢

橘紅

鹽水炒

陳木瓜

各一錢

焦梔

五分

水煎溫服。

昌陽瀉心湯。夢隱治霍亂後。胸前痞塞。湯水礙下。或渴或呃。

石菖蒲

黃芩

酒炒

製半夏

各一錢

川連

薑汁炒

蘇葉

三四分

製厚

附錄方言醫食言
樸分鮮竹茹

枇杷葉

刷各二錢蘆根一

天雨水急火煎徐溫服小洩祕澀者加紫苑此方甚巧
案此瀉心湯證也何必另立方治以暑熱穢濁之邪與傷寒
不同故五瀉心皆有圓柄方鑿之格漫爲引用豈徒無益已
哉茲以菖蒲爲君辛香不燥一名昌陽者謂能埽滌濁邪而
昌發清陽之氣也合諸藥以爲劑其奏蠲瘧泄熱展氣通津
之績已歷試不爽矣

麥門冬湯金匱治霍亂後餘熱未清神倦不饑無苦而渴或火
升氣逆乾咳無痰

麥冬一兩製半夏

一分人參一錢甘草分

六錢米六合大棗

四枚

水煎溫分四服

案海藏以竹葉易半夏。治溫熱後房勞復之氣欲絕者大效。余謂卽不因房勞復而氣液兩虧不能受重劑峻補皆可以此湯接續其一綫之生機。余屢用輒效。

致和湯霍亂論治霍亂後津液不復喉乾舌燥溺短便溏。

北沙參 生扁豆 石斛 陳倉米各四錢 枇杷葉刷鮮竹葉
麥冬各三錢 陳木瓜六分 生甘草一錢

水煎服

五苓散傷寒論治傷寒轉霍亂身熱頭痛渴欲飲水。

施石禎云宜茯苓 猪苓各十八錢案二十四錢爲一兩每用生白朮 茯苓 重四分二釐弱六錢爲鎰卽二

錢五分十八銖。澤瀉一兩桂五
卽七錢五分。澤瀉六銖桂錢五味爲末以白飲和服方寸
七日三多飲緩水汗出愈。

案仲聖於霍亂。分列熱多寒多之治。皆爲傷寒轉爲霍亂而
設。故二多字最宜玩味。所云熱多者。謂表熱多於裏寒也。寒
多者裏寒多於表熱也。豈可以熱多二字。遂謂此方可治熱
霍亂哉。沈果之云。其用桂者。宣陽氣。通津液于周身。非用之
以通水道下出也。用瀉尤二苓以通三焦之閉塞。非開膀胱
之溺竅也。如果熱人而渴。復用桂尤以溫液耗津。又加苓澤
以滲之。是熱之又熱。耗之又耗。速之斃矣。余謂觀此。則多飲
緩水汗出愈之義益明。故霍亂無陽氣鬱遏身熱之表證。無

三焦閉塞氣化不宣之裏證而欲飲水者切勿誤解熱多爲
熱證而妄援聖訓。浪投此藥也。石頑又可皆語焉未詳。河間
則加三石以駕馭之。茲復詳述方義。庶用者知所取舍焉。而
今人治溼熱病。不察其有無外挾風寒。內傷生冷之兼證。輒
以胃苓湯爲通用之方。因而償事者亦多。且古方用散。不過
三錢。權量又小。今世改爲湯劑。動輒一二兩。權量又大。宜乎
中病者恆少。而誤人者恆多也。豈獨霍亂然哉。可慨也夫。

又案此方與苓桂朮甘湯同爲溫中滌飲之劑。而力較峻。凡
霍亂之寒溼內盛。水飲阻閉三焦者。雖外無風寒之表邪。未
嘗不可用也。故亦治水蓄之疝。溼聚之腫。氣滯者加厚樸氣

虛者加人參名春澤湯用藥如用兵。苟能量敵而選將斯戰無不克矣。

理中丸

傷寒論

治寒霍亂口不渴者。

人參 甘草 白朮 乾薑各三

兩

四味搗篩爲末。蜜和丸。雞

黃大以沸湯數合。和一丸。碎研溫服之。日三夜二。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。湯法以味依兩數切。用水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三。

加減法。若膀上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。尤氏云。膀上築者。膀上築築然跳動。腎氣上而之脾也。脾方受氣。朮之甘能壅脾氣。故去之。桂之辛能下腎氣。故加之。案此陽虛之腎。

氣動欲作奔豚也。故去朮加桂以杜其上凌之萌。若陰虛而
脣上築築者。大忌剛燥之劑。非峻滋肝腎之陰不可。蓋一爲
水動。一爲火動也。

吐多者去朮加生薑三兩。尤氏云。吐多者氣方上壅。甘能壅
氣。故去朮。辛能散氣。故加生薑。案鄒潤安云。旣吐且利。有屬
太陰者。有屬少陰者。在少陰。則無用朮之理。在太陰。亦在可
用。可不用之列。以朮能治脾胃虛。不能治脾胃實。故吐多者
去之下。多者還用之。蓋朮能舉脾之陷。不能定胃之逆也。又
洞溪云。寒霍亂可用理中者。百不得一。余謂是寒霍亂矣。可
用理中矣。尙有如此細密加減之法。何今人旣不識病。又不

附錄卷之三
議藥輕於一試。何異以不教之民而使之戰耶。吁可哀已。
下多者還用尤。悸者加茯苓二兩。尤氏云。下多者脾氣不
守。故須尤以固之。悸者腎水上逆。故加茯苓以導之。案今人
治霍亂。既不辨其證之虛實寒熱。亦不察其吐多下多。溫補
率投。漫無忌憚者。吾不知其何心也。

渴欲得水者加尤。足前成四兩半。尤氏云。渴欲得水者。津
液不足。白尤之甘。足以生之。案此渴因脾虛不能爲胃行其
津液。故加尤以補脾。而致其津液也。所謂白尤能生津液者。
其義如此。豈熱爍津液而渴者所堪一試哉。

腹中痛者加人參。足前成四兩半。尤氏云。腹中痛者。裏虛

不足人參之甘足以補之。案裏虛腹痛必喜溫按。

寒者加乾薑足前成四兩半。尤氏云。寒者。腹中氣寒也。乾薑之辛足以溫之。案五苓主熱多。謂表有熱也。理中主寒多。謂裏有寒也。故方下既有腹中未熱益至三四九之法。此復云寒者加乾薑。是腹中尙未熱。故獨于此味又加重也。蓋腹中寒爲寒之眞論。故仲聖不嫌煩複。而瑣瑣教人以此爲辨證之法。顧昧者一見吐下肢寒。略不察其腹中光景。何如擅以薑附丁桂。欲其轉熱。遂至從此而一身皆冷。嗚呼。豈未聞熱深厥深之聖訓乎。

腹滿者去。尤加附子一枚。服湯後如食頃。飲熱粥一升許。微

食頃一飯之頃
言其時短

也

自溫勿發揭衣被

尤氏云。腹滿者氣滯不行也。氣得甘則

壅。得辛則行。故去丸加附子。

案飲熱粥一升許

固是助藥力

亦是辨證法。設時行熱霍亂。不但熱粥在所大忌。即使不忌。

亦萬不能強飲升許。果能飲熱粥升許者

豈非虛寒爲病乎

故可以理中治之。若倣于古而不知今。是房琯之以車戰也。

案原方加附子。名附子理中湯。加青皮陳皮。名治中湯。加枳

實茯苓。名枳實理中湯。加黃連。名連理湯。合五苓。名理苓湯。

厚樸生薑半夏甘草人參湯傷寒論治虛人寒溼霍亂

厚樸炙

去皮

生薑切各半斤

半夏洗半升

甘草炙二兩

人參一兩

水一斗煮取三升去滓溫服一升日三

四逆湯傷寒論治陰寒霍亂汗出而四肢拘急小便復利脈微欲絕而無頭痛口渴者

生附子一枚

乾薑半兩

甘草二兩

水三升煮取一升二合去滓分溫再服。強人可用大附子一枚乾薑三兩。

案附子乾薑非攻蕩之品。何以強人乃可加倍用。蓋無論補瀉寒熱諸藥皆賴身中元氣載之以行。故氣強者堪任重劑。若氣弱者投劑稍重則氣行愈緩焉能駕馭藥力以爲補瀉寒熱之用耶。凡事皆然。用藥特其一端耳。顧知之者鮮。所以覆敗多而成功少也。

通脈四逆加猪膽汁湯傷寒論治陰寒霍亂愈後四肢拘急脈微欲絕者。

前方加入猪膽汁半合和服。如無猪膽以羊膽代之。

附子杭米湯金匱治中寒霍亂肢冷腹痛吐少嘔多者。

附子薑汁炮切半夏薑汁炒甘草炙各三錢大棗十枚擘杭米半升

水五升煮米熟湯成去滓溫服一升。

吳茱萸湯傷寒論治少陰吐利厥逆煩躁及厥陰寒犯陽明食穀欲嘔。

吳茱萸一斤洗人參三兩生薑六兩切大棗十二枚擘水七升煮取二升去滓分三服。

漿水散潔古治陰寒霍亂。暴瀉如水。汗多身冷。氣少腹痛。脈沉或脫者。

甘草 乾薑 附子 桂各五錢 良薑 半夏俱醋炒各二錢

漿水煎去滓冷服。

案石頑云。漿水乃秫米和麴釀成。如醋而淡。今人點牛乳作餅用之。或用澄綠豆粉之漿水尤佳。余謂地漿亦可用。冷香飲子。治陰寒霍亂。腹痛。脈沉細。或絃緊。無汗惡寒。面如塵土。四肢厥逆。陽氣大虛之證。

甘草 附子 草果仁 橘紅各一錢 生薑五片

水煎冷服。

大順散局方治襲涼飲冷陰寒抑遏陽氣而成霍亂水穀不分
脈沉而緊者。

甘草四兩乾薑八錢

杏仁去皮尖

桂心各六錢

先將甘草同白砂

炒至八分黃熟王晉三云白砂卽河砂

次入乾薑同炒令薑裂

次入杏

仁同炒候不作聲爲度篩去砂

與桂心同搗爲散每二錢水

煎服或沸湯調服如煩躁并華水調下

案洞溪云此治暑月內傷飲冷證非治暑也又甘草多於諸藥八倍亦非法此等病百不得一而世人竟以之治燥火之暑病役人無算可勝悼哉余謂以上三方皆治夏令因畏熱而浴冷卧風冰瓜過啖反爲陰溼所傷致病實夏月之傷寒

也。故用藥如是。如名醫類案所載。羅謙甫治商參政與完顏
畢小將軍二案。俱用熱藥。俱不名曰暑病。又吳球治暑月遠行
人案。直曰中寒。蓋深恐後世誤以熱藥治暑。故特舉病因以
稱之。可謂名正言順矣。乃昧者猶誤謂此等方爲治暑之藥。
誠有一盲引眾盲。相將入火坑之歎。夫盛夏之有寒病。猶隆
冬之有熱病。雖不多見。而臨證者不可不諦辨而施治也。
神香散景岳治霍亂。因於寒溼凝滯氣道者。

丁香 白豆蔻各七粒 二味研末。清湯下。小腹痛者加砂仁。七粒
案晉三云。此方治寒溼癰脹有神功。與益元散治溼熱癰脹。
可謂鍼鋒相對。

來復丹局方 治上盛下虛。裏寒外熱。伏暑夾陰霍亂危證。

太陰元精石 船上硫黃 硝石

各一兩用硫黃爲末。橘紅微火炒結成砂子。大橘紅

青皮

去白五靈脂澄去砂炒令烟盡各二錢。

六味爲末。醋糊丸。豌豆大。每

服三十九。白湯下。

桂枝湯 傷寒論 治寒霍亂後。身痛不休。

桂枝皮

芍藥 生薑

切各三兩。甘草炙二兩。

大棗

十二枚擘。

水七升。微火煮取三升去滓。適寒溫服一升。須臾啜稀熱

粥一升餘。以助藥力。

異功散 治霍亂後中虛主劑。

人參

一錢至三錢

白朮

炒黃一錢至二錢半

茯苓

一錢至一錢半

甘草

炙六分至一錢

橘紅

一錢

水煎服。肝風動而身痛肢浮者。加水瓜薑棗。
梅花丸 治體虛多鬱血熱氣愆。木土相乘。嘔瀉腹痛。易感痧
癧霍亂者。久服可杜外患。兼除宿恙。亦主肝胃久痛。消癥調
經帶。催生種子。孕婦忌之。

綠萼白梅蕊

三飛滑石

七兩以粉丹皮八兩前
雨汁製透去丹皮曬乾

四製香附

二

甘松

蓬莪蒼

各五錢

山藥

茯苓

各三錢

人參

潞參洋參高麗參皆可因
人酌用

嫩黃蓍

益智仁

砂仁

勿見火

各三錢

遠志肉

甘草水製二錢五分

香

桔梗

一錢

甘草

分十五味各研細末合研勻

煉白蜜搗丸。每丸重一錢。白蠟衣之。每一丸去衣。開水調服。

蜜搗丸。每丸重一錢。白蠟衣之。每一丸去衣。開水調服。

案此方調和氣血。舒鬱培元。男女皆堪久服。以杜諸疴。不僅可已肝胃之痛。而禦腸胃之亂也。孕婦體堅。或胎氣多滯者。正宜用以宣展充暢。惟虛而不固者忌之。

資生丸 調和脾胃。運化飲食。滋養營衛。消除百疾。可杜霍亂等患。

人參酌用白朮各三兩 橘紅 桑肉 神麴各二
同上 茯苓一兩 甘草炙五錢 川連炒 薑汁 白蔻仁各三錢 九味研細末。煉白蜜。搗丸五錢甘草。彈子大。每食後細嚼一丸。開水下。嚴寒時或用淡薑湯下。

案石頑云。此古方也。與後人加味者。雖繁簡不同。而功效不異。

繆氏資生丸 治同上

人參

人乳浸飯上蒸烘乾各二兩

白朮

米泔水浸山黃土拌蒸九次曬乾各三兩

查內

蒸

橘紅

略蒸各二兩

白茯苓

細末水澄蒸曬乾各五錢

懷山藥

切片

白扁豆

炒湘蓮肉

炒各一兩

芡實粉

炒黃各一兩

麥芽

炒研磨取米泔浸去蘆根各五錢

霍香

葉火

不見甘草炙

桔梗

米泔浸去蘆根各五錢

澤瀉

炒切片

白蔻仁

勿見火各三分

川連

如法炒七五分

十七味

如法修製細末煉白蜜搗丸每

丸重二錢

飯後白湯或橘皮湯砂仁湯嚼化下

案治法彙醫通蘭臺執範載此方皆有神麴二兩其餘分兩亦稍有參差名醫方論有神麴無澤瀉廣筆記云妊娠三月陽明脈養胎陽明脈衰胎無所養故易墮也宜服此丸潤溪

云此方治懷孕氣阻用兼消補之法。以止嘔吐而固胎氣。意頗可取。余謂保胎止吐皆健運脾胃之功。故曰資生。夫脾胃位鎮中樞。而司出納。爲人生後天之本。一失健運。百病叢生。凡衰老稚弱。及饑飽不時。勞逸過度。思慮久傷之輩。脾胃尤易受病。若能常服此丸。俾升降不愆。周流無滯。揮霍撩亂。於是弭焉。

俱收茲蓄。待用無遺。爲將爲醫。理無二致。對證發藥。諺語
堪師。十劑七方。陣圖有法。故必藥性明而兵法諳。始可制
方臨敵也。先藥性。後方劑。特其大略耳。神明變化。存乎其
人。方先外治。而後內服。昭慎重也。始卧龍而中結。以致和。
未殿以資生。其有如卧龍之才者。出而撥亂。反正。以致中
和。則天地位。萬物育化。日舒長。更何疫癘之有哉。謹拭目
待之。以慰余重訂此書之意焉。故列藥方第四。

霍亂括要

附錄

道光紀元。水運風木司天。相火在泉。夏秋霍亂大發。經云。
必先歲氣。毋伐天和。爰引古方。擬撰七言。附以管見。爲司
命者之一助。

蘭陵岳晉昌撰

暑溼風寒飲食傷。三焦失道夏秋行。厥陰風木司天盛。濁氣清
陽亂胃腸。

夫六氣之邪。燥氣發霍亂。少風邪發霍亂。輕若暑火挾溼
邪。爲熱霍亂。寒挾溼邪。爲寒霍亂。霍亂多兼飲食過飽。乃
一發亦有觸穢惡發者。靈樞經曰。更實更虛。其氣乃居。食入
則胃實而腸虛。食下則腸實而胃虛。若飲食多飽脹。則腸

附息居重言
胃俱實氣閉不得升降作吐瀉矣。

吐瀉轉筋手足寒心煩熱渴左金安二芩滑澤分清濁溫膽養
香嘔痞寬。

猝然痞痛。吐瀉轉筋而發霍亂者。多因清氣濁氣亂於腸
胃也。若腕痛者。病在上中焦。先嘔後瀉。若腹痛者。病在中
下焦。先瀉後嘔。先轉筋後吐瀉者輕。先嘔瀉後轉筋者重。
蓋霍亂症。手少陽三焦俱病。上焦不入。則吐。飲食不納。中
焦不運化。則痞痛。下焦不分。則大便瀉。小便不通。若吐瀉
而手足溫。不渴。兼太陰者順。吐瀉而參蠅消渴。手足厥冷。
兼厥陰者。險。吐瀉而煩渴。腰痛。失音。氣急。兼少陰者。危。至

於手掌紫冷。厥冷至肘膝。冷汗出。直視發呃。吐瀉。小便不通。煩躁氣急。脈微欲絕。或浮虛欲散。此三焦厥陰少陰俱病。逆症危急。凡治吐瀉轉筋。痞痛腸鳴。煩渴參蠅。眶陷失音。手足厥冷。爪紫脈伏或微者。卽用左金湯和陰陽。治嘔瀉。因川連入心胃。清暑除煩渴。治熱嘔瀉也。吳茱萸入肝腎。去寒降濁氣。除手足厥冷轉筋。右關尺濤伏。治寒嘔瀉也。其黃連吳茱萸分兩。隨寒熱輕重配合爲要。合溫膽湯加藿香。通痞治嘔。再合猪苓湯去阿膠。加木通利小便止瀉也。井水河水各一杯。煎至一杯。分兩次服。服後毋多飲。多飲則連藥吐出。不得藥力矣。此夏秋霍亂症治法。若冬

令及春初霍亂症當宗傷寒論霍亂門。張長沙諸方治法也。

先針手紫木通經。暢痞分疎。小便行。嘔瀉漸安。無喘躁。肢溫脈復轉回春。

經經絡也。凡吐瀉轉筋手爪紫甚者。手掌皆紫。內加木通。外當針刺通經血以洩邪。凡治吐瀉法。當化滯通痞。以止嘔。分消利小便。以止瀉。先服藥不嘔。後小便通利。則吐瀉止。手足厥冷漸溫。六脈漸復。正回卽生矣。雖吐瀉已止。而煩躁氣喘爲暑邪未解。陰陽未和。有邪正兩脫之危。但盛夏霍亂煩熱性躁者。日夜赤身不衣。當風而卧。則暑邪鬱。

悶無汗喘躁而危。又有恣飲冷水吐瀉不止肢冷發呃。冷汗脈脫則斃。至長夏吐瀉汗多。正氣易脫。深秋吐瀉汗少。伏邪難達。治當活變。

嘔瀉頻頻語失音。肢寒煩渴汗淋淋。沈微欲絕浮虛散。救脫連芩四逆參。

霍亂吐瀉。連次多不止。手足寒至肘膝。冷汗淋淋。指爪青白。目眶低陷。失音呃短。脈沈微欲絕。或浮虛欲散者。此三焦厥陰俱病。少陰逆症。更兼口渴煩躁。用茯苓四逆人參湯加川連。既濟法。冀幸服後。身溫躁止。脈微續轉細緩者。陽回卽生。若更兼微煩微渴者。用茯苓四逆加麥冬冀幸。

痞通嘔止瀉多空用枳苓連入理中瀉止痞堅頻嘔噦熱煩半夏瀉心功。

吐瀉轉筋諸症用左金合溫膽猪苓湯去阿膠加藿香水通服後痞通嘔止而瀉多不止轉用理中加枳殼黃連茯苓六一散治之若吐瀉轉筋諸症服左金溫膽複方後小便長瀉止而痞悶煩熱嘔噦渴不止者轉用半夏瀉心湯去棗加枳殼厚樸橘皮藿香竹茹治之。

調和霍亂陰陽水汗少香薷呃柿丁止渴蛔梅清暑土承先哲治在靈通。

吐瀉汗少加香薷吐瀉用鮮黃土清暑安蛔舌紅用鬱金

涼心營昏煩乃暑邪閉氣加鮮石菖蒲開心陽若呃加丁
香柿蒂脘腹痛甚加延胡水香若消渴參峒加烏梅若轉
筋甚加木瓜但木瓜烏梅氣味酸收宜少用多則恐小便
不利至於黃連湯加吳茱萸蘆根隨症參用瀉止嘔數日
不止旋覆代赭湯或合左金或合溫膽每年氣運不同西
北東南高卑不一必須靈通活變不可拘泥執一

左金湯方

川連或生或炒隨酌吳茱萸湯泡製半夏 茯苓 陳皮 甘草 枳殼

竹茹 加藿香

猪苓湯方

猪苓 茯苓 滑石 澤瀉 去阿膠 加車前子 木通
半夏瀉心湯

枳殼 厚樸 陳皮 薑香 竹茹 去大棗

理中湯方 應投理中四逆之症務宜加意審察

黨參三錢 白朮一錢 炙甘草三分 乾薑五分 茯苓二錢 枳殼一錢

川連三分

茯苓四逆湯方

附片八分 乾薑三分 東洋參一錢 炙甘草三分 煩渴加川連三分
口渴加麥冬二錢

藿香左金丸方

藿香五錢吳茱萸四錢川連三錢靜金一錢枳殼二錢厚樸二錢
製半夏二錢砂仁二錢茯苓一錢猪苓一錢車前子二錢六一
散三錢其研細末。香薷生薑木通各一兩。煎湯滴丸。每服一二
錢。開水送下。輕二服重加之。