

醫學心悟卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

醫學心悟 卷三

中風
虛勞
咳嗽
喘
類中風
傷暑
霍亂
瀉陽渺疫癘
虛勞
咳嗽
喘
頭痛
心痛
胸痛
腹痛
身痛
肩背臂膀痛腰痛
脇痛
瘡風
噎膈
痢疾
泄濁
腹脹
積聚
疝氣
瘦飲
嘔吐穢
呃逆
三消
熱淋
小便不通
關格
孕婦轉脬
大便不通
天陽爻
遺尿
脫肛
小便不禁
便血
尿血

醫學心悟第三卷

天都曾明子程國彭鍾齡著

中風門

中風者。與中風也。有中腑。中臟。中血脉之殊。中腑者。中在表也。外有六經之形症。與傷寒、六經傳變之症無異也。中太陽。用桂枝湯。中陽明。葛根湯加桂枝。中少陽。小柴胡湯加桂枝。其法悉具。傷寒門茲不贅。中臟者。中在裏也。其人眩仆昏冒。不醒人事。或痰聲如曳鋸。宜分臟腑寒熱而治之。假如其人素挾虛寒。或



南京中医药大学图书馆版权所有

暴中新寒。則風水相遭。寒冰徹骨。而風爲寒風矣。假如其人素有積熱。或鬱火暴發。則風乘火勢。火借風威。而風爲熱風矣。爲熱風多見閉症。其症牙關緊急。兩手握固。法當疏風開竅。先用搐鼻散吹之。次用牛黃丸灌之。若大便閉結。腹滿脹悶。火勢極盛者。以三化湯攻之。爲寒風多見脫症。其症手撒脾絕。眼合肝絕。口張心絕。聲如廝肺絕。遺尿腎絕。更有兩目直視。搖頭上竄。髮直如粧。汗出如珠。皆脫絕之症。法當溫補元氣。急用大劑附子理中湯灌之。若痰涎壅盛。以三生飲加人參灌之。間亦有寒

痰壅塞介乎閉脫之間。不使驟補者。用半夏橘紅各一兩濃煎。
至一杯以生薑自然汁對冲。頻頻灌之。其人卽甦。然後按其虛
而調之。然予自揣生平用附子理中治愈者甚多。其用牛黃光
治愈者亦恒有之。惟三化湯一方。並未舉用。此必天時地土人
事之不同。然寒熱之刺。屹然並立。古方具在。法不可泯。故兩存
之。以備參酌。中血脉者。中在經絡之中也。其症口眼歪斜。半身
不遂是也。大秦艽湯主之。偏在左。倍用四物湯。偏在右。佐以四
君子湯。左右俱病。佐以八珍湯。並虎骨膠丸。此治真中之大法。



也。

口噤角弓反張。痙病也。但口噤而兼反張者。是已成痙也。不續命湯。口噤而不反張者。是未成痙也。大秦艽湯。其痙病俱見前。

傷寒兼症中。宜細加查核。

不語有心脾腎三經之異。又有風寒客于會厭。卒然無音者。大法若因痰迷心竅。當清心火。牛黃丸。神仙解語丹。若因風痰聚于脾經。當導痰涎。二陳湯加竹瀝薑汁。並用解語丹。若因腎經虛火上炎。當壯水之主。六味湯加遠志。菖蒲。若因腎經虛寒。

厥逆當益火之源。劉河潤地黃飲子或用虎骨膠丸加鹿茸。若風寒客于會厭。聲音不揚者。用甘桔湯加陳散藥。

遺尿謂之腎絕。多難救。然反目遺尿者爲腎絕。若不反目。但遺尿者多屬氣虛。重用參蓍等藥補之則愈。

桂枝湯 葛根湯 小柴胡湯俱見傷寒

搐鼻散 治一切中症。不醒人事。用此吹鼻中。有嚏者生無嚏者難治。

細辛去葉
各一兩
生用
皂角去皮弦
半夏王錢

爲極細末，磁瓶收注勿泄氣，臨用吹一二分入鼻孔中，取嚏。

牛黃丸

治中風痰火閉結，或癥瘕癰瘍，語言蹇澁，恍惚眩暎。

精神昏憒，不省人事，或喘嗽痰壅，煩心等症。

牛黃

六錢

麝香

龍腦以上三味另研

羚羊角

當歸

酒洗

防風

黃芩

柴胡

白术

麥冬去心

白芍各七錢

桔梗

白茯苓

杏仁尖去皮

川芎

大豆黃卷

阿膠

各八錢

蒲黃

人參

去蘆

神曲

各一兩二錢五分

雄黃

另研
四錢

甘草

二兩
五錢

白斂

肉桂

去皮

乾薑

各三錢
七分

犀角

一錢
兩

乾山藥

三兩
五錢

大棗

五十枚
大

爛去皮核

金箔

六伯
五十片

內
片爲衣

爲細末，煉蜜同乘膏丸，每兩作十九用。金箔爲衣，每服一丸。
溫水化下。

三化湯 治中風入臟，熱勢極盛，閉結不通，便溺阻隔不行。乃風火相搏而爲熱風者，本方主之。設內有寒氣，大便反鞭，名曰陰結。陰結者得和氣緩回，寒冰自化，不可誤用攻藥，誤卽

不能復救。慎之慎之。

厚朴
姜汁
炒
大黃
酒蒸

枳實
麪炒
羌活
各一錢
五分

水煎服

附子理中湯
見中寒

治寒風中暍。陰冷極盛。脫症隨見。此風。

水相遭而爲寒風者急服此藥猶可得生。夫病屬脫症。設誤用疏通開竅之藥。如人旣入井而又加之以石也。必須參附大劑飲之。方爲合法。

三生飲 治寒風中暍。六脈沉細。瘞壅喉嚨。不省人事。乃寒癥。

厥逆之候

生南星

生烏頭

去皮尖

生附子

各一錢五分

生薑

五斤

生木香

五分

水煎服。薛立齋云三生飲乃行經絡治寒痰之涼藥，斬關奪旗之神劑。每服必用人參兩許駕馭而行，庶可驅外邪而補真氣。否則不惟無益，適以取敗。觀先哲用芪附木附參附等湯，其義可見。

大秦艽湯 治風中經絡口眼歪斜半身不遂或語言蹇澁乃

血弱不能養於筋宜用養血疏風之劑經云治風先治血血行風自滅是也

秦艽

一錢
五分

甘草

炙

川芎

當歸

芍藥

生地

熟地

自製

茯苓

羌活

獨活

白术

防風

白芷

黃芩

酒炒各
八分

細辛

春夏加母八分

水煎服如或煩躁口渴加石膏一錢五分陰雨加生薑三片



南京中医药大学图书馆版权

竊謂本方初時宜用。若日久則以四物四君爲主而以風藥

佐之庶收全功

四物湯 四君子湯

八珍湯

俱見虛症

虎骨膠丸

見脾

小續命湯

見傷寒發痙

六味湯

見後類中門

甘桔梗湯

見傷寒咽痛

神仙解語丹

白附子

炮

石菖蒲

去

心甘草

遠志

水

泡炒

天麻



全蝎

去尾甘草水洗

羌法

南星

牛膽製多次更佳各一兩

木香

錢

右爲末麵糊丸龍眼大每服一丸薄荷湯下

二陳湯

陳皮

茯苓

半夏

薑汁炒

炙草

各一錢五分

加入大棗二枚水煎服

地黃飲子

熟地

九蒸晒二錢

巴戟

去心

萸肉

去核

肉蔻

培酒浸

石斛

附子

五味

杵炒

白茯苓

各一錢



南京中医药大学图书馆版权所有

石菖蒲

去毛

桂心

麥冬

去心

遠志

酒炒各五分

心甘草水

入薄荷少許薑一片棗二枚水煎服。氣虛加人參二錢。

甘桔湯

見傷寒。咽痛。

類中風

類中風者。謂火中虛中。濕中寒中。暑中氣中。食中惡中也。共同有八種。與真中相類而實不同也。然類中有與真中相兼者。須細察其形症而辨之。凡真中之症必連經絡。多現歪斜偏廢之候。與類中之專氣致病者。自是不同。然而風乘火勢。邪乘虛以寒。

風相搏。暑風相炫。飲食招風。種種變症。所在多有。務在詳辨精
細。果其爲眞中也。則用前驅風法。果其爲類中也。則照本而施
治。果其爲眞中類中相兼也。則以兩門醫法合治之。斯無弊耳。
茲舉類中諸症。詳列於左。俾學者觸目洞然也。

一曰火中火。火之自外來者。名曰賊寃火也。火之自內出者。名曰
子虛火也。中火之症。良由將息失宜。心火聚盛。腎水虛衰。不
能制之。故卒然昏倒。不可作寃火論。假如怒動肝火。逍遙散
心火鬱結。牛黃清心丸。肺火壅遏。貝母瓜蒌散。思慮傷脾。加

大

味歸脾湯。腎水枯涸。虛火上炎者。六味地黃湯。若腎經陽虛。
火不歸原者。八味地黃湯。劉河濶地黃飲子並主之。此治火
中之法也。或問火中而用桂附者何也。答曰。腎陽飛越。則丹
田虛冷。其痰涎上壅者。水不歸原也。面赤煩躁者。火不歸原
也。惟桂附八味能引火歸原。火歸水中。則水能生木。木不生
風。而風自息矣。

二曰虛中。凡人體質虛弱。過于作勞。傷損元氣。以致痰壅氣浮。
卒然昏倒。宜用大君子湯主之中氣下陷者。補中益氣湯主

之。

三日濕中。濕中者。卽痰中也。凡人嗜食肥甘。或醇酒乳酪。則濕從內受。或山嵐瘴氣。久雨陰晦。或遠行涉水。坐臥濕地。則濕從外受。濕生痰。痰生熱。熱生風。故卒然昏倒。無知也。蒼白二陳湯主之。

四日寒中。凡火暴中于寒。卒然口鼻氣冷。手足厥冷。或腹痛下利。清穀。或身體強硬。口噤不語。四肢戰搖。此寒邪直中于裏。也。宜用姜附湯。或附子理中湯加桂主之。

五曰暑中。凡人務農于赤日。行旅于長途。暑氣逼迫。卒然昏倒。自汗面垢。昏不知人。急用千金消暑丸灌之。其人立甦。此藥有回生之功。一切暑藥皆不及此。村落中各宜預備。灌醒後。以益元散清之。或以四味香薷飲去厚朴。加丹參。茯苓。黃連治之。虛者。加人參。餘詳論傷暑門。

六曰氣中。七情氣結。或怒動肝氣。以致氣逆痰壅。牙關緊急。極與中風相似。但中風身熱。中氣身涼。中風脈浮。中氣脈沉。且病有根由。必須細究。宜用木香調氣散主之。

七曰食中醉飽過度。或着腦怒。以致飲食填塞胸中。胃氣不和。
卒然昏倒。宜用橘紅二兩。生薑一兩。炒鹽一撮。煎湯灌而吐。
之。次用神术散和之。其最甚者。胸高滿悶。閉而不通。或牙關
緊急。厥暈不醒。但心頭溫者。卽以獨行丸攻之。藥旣下咽。其
人或吐或瀉。自應漸甦。若瀉不止者。以冷粥湯飲之。卽止。

八曰惡中。登塚入廟。冷屋樓遲。以致邪氣相侵。卒然錯語妄言。
或頭面青黯。昏不知人。惡用慈薑湯灌之。次以神术散調之。

蘿合丸亦佳。

加味逍遙散 治肝經鬱火 胸肋脹痛或作寒熱甚至肝木生
風眩暈振搖或咬牙發瘙 二目斜視一手一足搐搦此皆肝
氣不和之症 經云木鬱達之是已

柴胡

甘草

茯苓

白朮

當歸

白芍

丹皮

黑山枝

各一錢

薄荷

五分

水煎服

牛黃清心丸

見真中門

貝母瓜萎散



貝母二錢

瓜蔞仁一錢

五分

胆南星五分

黃芩

橘紅

黃連一錢

炒各

甘草

黑山梔各

五分

水煎服

加味歸脾湯

黃蓍一錢

八參

白朮

茯神

當歸

棗仁

炒各一錢

遠志

去心泡

甘草

炙各七分

丹皮

黑山梔

各八分

元眼肉五枚水煎服

六味地黃湯 滋水制火則無上盛下虛之症

卽六味地黃丸方○水煎服本方加肉桂熟附子各五分

八味地黃湯

六君子湯 理脾祛痰

人參

茯苓

白术

陳土炒

陳皮

去白

炙甘草

半夏

湯炮七次各一錢

生薑五分大棗二枚水煎服

補中益氣湯 中氣下陷宜服此以升舉之



黃芪

一錢
五分

白朮

陳土
炒

人參

當歸

甘草

炙各
一錢

柴胡

升麻

陳皮

五分

生薑一片大棗二枚水煎服

蒼白二陳湯

見中
風

卽二陳湯加蒼朮白朮各一錢

薑附湯

見諸方
補遺

四味香薷飲

見傷
暑

木香調氣散

平肝氣和胃氣

白蔻仁

去殼
研

檀香

木香

名上
兩

丁香

錢三
三

香附

五
兩

藿香

四
兩

炙甘草

砂仁

陳皮

各二
兩

右爲細末每服二錢入鹽少許點服

神木散 此藥能治時行不正之氣發熱頭痛傷食停飲胸滿

腹痛嘔吐瀉利並能解穢驅邪除山嵐瘴氣鬼瘧尸疰中食

中惡諸症其效至速予嘗令此普送藥到病除罔不應驗

蒼术

陳土
炒

陳皮

厚朴

姜汁炒
各一兩

甘草

炙十
二兩

藿香

八兩
炒

砂仁

四兩
炒

共爲末每服二三錢開水調下

獨行丸 治中食至甚胸高滿悶吐法不效須用此藥攻之若

昏暈不醒四肢僵硬但心頭溫者快齒灌之

大黃 酒炒 芭豆去殼 乾姜 各一
錢

研細姜汁爲丸如黃豆大每服五七丸用姜湯化下若服後瀉不止者用冷粥湯飲之卽止

蘿合丸 治勞瘵骨蒸疰心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘡疫

癟癰血月閉痃癖丁腫驚癇中風中氣痰厥昏迷等證

白朮 青木香 犀角 麝香附子 炒去毛

朱砂 水飛 訶梨勤 煙取皮 檀香 安息香 酒熬膏

沉香

麝香

丁香

草撥
各二兩

龍腦

薰陸香

別研

蘿合香

各二
兩

右爲細末研藥勻用安息香膏并蘿合香油煉蜜和劑丸如
蟬子大以蠟匱固緋絹當心帶之一切邪祟不敢近

傷暑

霍亂

攬腸沙

古稱靜而得之爲中暑動而得之爲中熱暑陰而熱陽也不思
暑字以日爲首正言熱氣之襲人耳夏日烈烈爲太陽之亢氣
人觸之則生暑病至于靜而得之者乃納涼于深堂水閣大扇



風車嗜食瓜菓致生寒疾或頭痛身痛發熱惡寒者外感于寒也或嘔吐腹痛四肢厥冷者直中于寒也與暑症有何干涉大抵暑症辨法以自汗口渴煩心渴赤身熱脈虛爲的然有傷暑

中暑閉暑之不同傷暑者感之輕者也其症煩熱口渴益元散主之中暑者感之重者也其症汗大泄昏悶不醒或煩心喘喝

妄言也昏悶之際以消暑丸灌之立醒既醒則驗其暑氣之輕重而清之輕者益元散重者白虎湯閉暑者內伏暑氣而外爲

風寒閉之也其頭痛身痛發熱惡寒者風寒也口渴煩心者暑

也。四味香薷飲加荆芥、秦艽主之。又有暑天受濕，嘔吐瀉利，發爲霍亂。此停食伏飲所致。宜分寒熱治之。熱者口必渴，黃連香薷飲主之。寒者口不渴，藿香正氣散主之。更有乾霍亂症，欲吐不得吐，欲瀉不得瀉，攬腸大痛，變在須臾。古方以燒鹽和陰陽水引而吐之。或以陳皮同煎吐之。或用多年陳香圓煎湯更佳。俗名攬腸沙、烏沙、脹，皆此之類。此係穢氣閉塞經隧，氣滯血凝，脾土壅滿，不能轉輸，失天地運行之常則，脹閉而危矣。是以治法宜速切戒飲粥湯食諸物，入口即敗，慎之慎之。

消暑丸 益元散

見類中

白虎湯

見陽明腑病

四味香薷飲 治風寒閉暑之症。頭痛發熱。頰赤口渴。或嘔吐泄瀉。發爲霍亂。或兩足轉筋。凡閉暑而不能發越者。非薷不可。香薷乃消暑之要藥。而方書稱爲散劑。俗稱爲夏月之禁劑。夏既禁用。則當戒于何時乎。此不經之說。致令良藥受屈。殊可扼腕。故辯之。

香薷

扁豆

厚朴

姜汁炒各一錢五分

甘草

炙五分

水煎服。若兼風寒。本方加荆芥。秦艽。蔓荆子。若兼霍亂。



中医药大学图书馆版权所有

吐瀉煩心口渴。本方加黃連。若兩足轉筋。本方加木瓜。芩
芩木瓜治轉筋之神劑。○若風暑相搏而發搐搦者。本方加
羌活鈎藤。凡暑症不宜發汗。今用風藥者。因其暑中挾風也。
○若暑濕相搏。名曰濕溫。說汗則名重暘。多難治。宜用蒼朮。
白虎湯時醫不論暑濕。概行發散。傷生匪淺。

藿香正氣散 治暑月貪涼飲冷。發爲霍亂。腹痛吐瀉。憎寒壯
熱。

藿香

砂仁

厚朴

茯苓



清华大学图书馆藏印

紫蘿

陳皮各一
錢

白朮土炒
半夏

桔梗

白芷各七
分

甘草炙五
分

生姜三片水煎服

清暑益氣湯 預服此藥，以防暑風

黃芪一錢
五分

人參

當歸

陳皮

麥冬去心

炙甘草各五
分

扁豆二錢

茯苓

七分

升麻

柴胡

北五味各三
分

神麃

四分

黃柏

澤瀉各二
分



水煎服

疫癘

疫論已見首卷。分來路兩條。去路三條。治法五條。詳且盡矣。大法天行之氣。從經絡入。其症頭痛發熱。宜微散。香薷散。散之病氣傳染。從口鼻入。其症嘔吐。噁心滿。宜解穢。神木散。和之。若兩路之邪歸併于裡。腹脹滿悶。譫語發狂。唇焦口渴者。治疫清涼散。清之便閉不通者。加大黃下之。其清涼散內人中黃一味。乃退熱之要藥。解穢之靈丹。醫家缺而不備。安能取效。復有虛人憊。



疫。或病久變虛。或妄治變虛者。須用人參白朮當歸等藥。加入清涼藥內。以扶助正氣。如或病氣漸退。正氣大虛。更宜補益。正氣爲主。夫發散解鬱。清中攻下。四法外。而以補法駕馭其間。此收效萬全之策也。予嘗用麥冬生地各一兩。加人參二三錢。以救津液。又嘗用人參湯送下。加味枳术丸。以治虛人鬱熱便閉之症。病氣退而元氣安。遂特爲囊中活法。謹告同志。各自存神。

又有頭面腫大。名曰大頭瘟者。頸項粗腫。名曰蝦蟆瘟者。古方。曾濟消毒飲。並主之。但頭腫之極。須用針砭。若醫者不究其理。

患者畏而不行。多致潰裂腐爛而難救。若頸腫之極。須用橘紅

淡鹽湯吐去其痰。再用前方倍其桔紅之量。須宜早治。不可忽也。

香薷散

見太陽症

神术散

見類中

治疫清涼散

秦艽

赤芍

知母

貝母

連翹

各一錢

荷葉七分

丹參五錢

柴胡一錢

人中黃二錢

水煎服。如傷食胸滿加麥芽山楂蘿蔔子陳皮。脇下痞

加鱉甲枳殼。昏憤譖語加黃連。熱甚大渴能消水者加

石膏夫花粉人參。便閉不通腹中脹痛者。加大黃下之。
虛人自汗多倍加人參。津液枯少。更加麥冬生地。若時
行寒疫。不可輕用涼藥。宜斟酌投劑。

普濟消毒飲

針砭法

並見頭痛

加味枳术丸

見腹痛

製人中黃法

用竹筒兩頭留節。剗去青皮。開一孔。將甘草裝

滿。仍用木屑塞口。鎔松香封固。用繩扎定于臘月初一日。投
廁缸中。一月足。取起用水瀝洗。然後劈開竹筒。將甘草晒乾。

收貯聽用。

或問香薷散神术散芳香藥也人中黃有穢氣者也而皆以之解疫毒消穢氣何也。不知邪客上焦乃清虛之所故用芳香以解之。邪客中下二焦乃濁陰之所疫毒至此結而爲穢則用芳香所能解必須以穢攻穢而穢氣始除此人中黃之用所以切當也。夫病有先後有部位有更變而用藥隨之方爲活法。醫家常須識此不只治疫一端而已。

虛勞

帝曰陰虛生內熱柰何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛

上焦不行。下脘不通。胃氣熱。熱氣薰胸中。故內熱。此言氣虛之候也。東垣宗其說。發補中益氣之論。卓立千古。朱丹溪從而廣之。以爲陽常有餘。陰常不足。人之勞心好色。內損腎元者多屬真陰虧損。宜用六味湯加知母黃柏。補其陰而火自降。此又以血虛爲言也。後人論補氣者。則宗東垣。論補血者。則宗丹溪。且曰水爲天一之元。土爲萬物之母。其說至爲有理。然而陽虛易補。陰虛難治。治虛損者當就其陰血未枯之時。而早補之。患虛損者。當就其真陰未槁之時。而重養之。亦庶乎其可矣。凡虛勞。

之症多見吐血、痰湧、發熱夢遺、經閉，以及肺痿、肺痟、咽痛、音癡、側臥傳刀鬼注諸疾。今照葛仙翁十藥神書例，增損方法，臚列於左，以便觀覽。

◎甲字號方

止咳嗽爲主。予見虛損之症，多由于吐血。吐血之因，多由于咳嗽。咳嗽之原，多起于風寒。仲景云：咳而喘息有音，甚則吐血者，用麻黃湯東垣師其意，改用麻黃人參芍藥湯，可見咳嗽吐紅之症，多有因于外感者，不可不察也。予治外感咳嗽。



用止嗽散加荆防。蘿梗以散之。散後肺虛。即用五味異功散補脾土。以生肺金。虛中挾邪。則用團魚丸解之。虛損漸成。嗽不止。乃用紫苑散。月華丸。清而補之。此治虛咳之要訣也。

餘詳本門

止嗽散見後咳嗽門

五味異功散卽四君子加陳皮
方見後

團魚丸 治久咳不止。恐成勞瘵

貝母 去心

知母

前胡

柴胡

中國藥科大學圖書館版權

杏仁去皮尖及雙仁者各四錢

大團魚一箇重十二兩以上者去腸

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥渣焙乾爲末用角筍

煮汁一盞和藥爲丸如桐子大每服二十九麥冬湯下

服

海藏紫苑散

潤肺止嗽並治肺癆

人參五分

紫苑

知母蒸

貝母去心

桔梗

茯苓

眞阿膠

蛤粉炒成珠各一錢

五味子

甘草

炙各三分

水煎服

月華丸 滋陰降火、消痰祛瘀、止咳定喘、保肺平肝、消風熱。此陰虛發咳之聖藥也。

天冬

去心
蒸

麥冬

去心
蒸

生地

酒洗
熟地

九蒸
熟地

山藥

乳蒸

百部

蒸

沙參

蒸

川貝母

去心
蒸

真阿膠

各一兩
乳蒸

茯苓

乳蒸

獺肝

廣三七
各五錢

用白菊花二兩

去蒂
桑葉二兩

經霜

熟葉者

熬膏

將阿膠化入膏內和

藥稍加煉蜜爲丸如彈子大每服一丸噙化日三服

○乙字號方

止吐血爲主。凡血症有陽乘陰者。有陰乘陽者。假如脈數熱。口舌乾燥。或平素血虛火旺。加以醇酒炙燭之物。此乃熱氣騰沸。迫血妄行。名曰陽乘陰法。當清降四生丸等主之。吐止後。則用六味地黃丸補之。又如脉息沉遲。口舌清潤。平素體質虛寒。或兼受風冷之氣。此謂天寒地凍。水凝成冰。名曰陰乘陽法。當溫散理中湯主之。凡治血症。不論陰陽。俱以照顧脾胃爲收功良策。誠以脾胃者。吉凶之關也。書云。自上捐。

下者一損損于肺。二損損于肝。三損損于脾。過於脾則不可治。自下損上者一損損于腎。二損損于心。三損損于胃。過于胃則不可治。所謂過于脾胃者吐瀉是也。古人有言不問陰陽與冷熱先將脾胃與安和。丹溪云凡血症須用四君子之類以收功。其言深有至理。然而補脾養胃不專在藥而在飲食之得宜。難經曰損其脾者調其飲食適其寒溫誠以飲食之補遠勝于藥耳。世之治損者亦可恍然悟矣。

四生丸 治陽盛陰虛熱迫血而妄行以致吐血咯血衄血法

當清降

生地黃

生荷葉

生側柏葉

生艾葉

各等分

細切同搗極爛爲丸如雞子大每服一丸水煎去渣服吐其者用此丸前湯調下花蕊散二二錢尤佳

花蕊石散 能化瘀血爲水而不動臟腑真神藥也

花蕊石

一觔

明硫黃

四兩

入瓦罐內封口鐵線緊扎鹽泥包裹晒乾硬炭圍定煉二炷香細研篩過每服二三錢童便熟酒調服

生地黃湯

生地三錢

牛膝

丹皮

黑山梔

各一錢

丹參

元參

麥冬

白芍

各一錢

鬱金

廣三七

荷葉各七分

水煎加陳墨汁清童便各半杯和服

六味地黃丸 滋益先天生腎水制虛火乃醫門要藥尤紅症

之靈丹也

見類中

理中湯 見中寒門治陰盛陽虛不能統血以致陰血走散法當溫補

四君子湯

人參

白术

茯苓

炙甘草各一錢

一大棗二枚生薑一片水煎服

◎丙字號方

治大吐血成升斗者先用花蕊散止之隨用獨參湯補之所謂血脫益氣陽生陰長之理貧者以歸脾湯代之。

人參一兩去蘆

水煎服聽其熟睡切勿驚醒則陰血復生矣。

歸脾湯

白朮

人參

當歸

棗仁炒

白芍各

錢

黃蓍一錢遠志去心泡
五分七分

甘草炙五分元眼肉五枚

水煎服

②丁字號方

治咳嗽吐紅漸成骨蒸勞熱之症。如人胃強氣盛。大便結脹。有力。此陽盛生熱法。當清涼。清骨散主之。若胃虛脾弱。大便溏。脈虛細。此陰虛發熱法。當養陰。逍遙散。四物湯主之。若氣



南京中医药大学图书馆藏

血兩虛而發熱者八珍湯補之。若元氣大虛變症百出，艱以名狀，不問其脈，不論其病，但用人參養榮湯，諸症自退。其溫能除大熱，如或誤用寒涼，反伐生氣，多至不救。

清骨散

柴胡

白芍各一錢

秦艽七分

甘草五分

丹皮

地骨皮

青蒿

鰲甲各一錢三分

知母

黃芩

胡黃連各四分

水煎服，加童便尤妙。凡逍遙、四物、八珍方內，皆可加入。



逍遙散

方 觀類中

治肝經血虛、煩燥口渴、胸脇刺痛、頭眩心悸。

頰赤口苦發熱、盜汗食少嗜臥、又治女人經水不調、腰腹脹痛、寒熱如瘧、並治室女經閉、痰嗽、潮熱、肌瘦、勞熱等症。

四物湯

大熟地

自製

當歸

白芍

各一錢

川芎

五分

水煎服。加丹皮、麥冬、玉竹、山藥、茯苓退虛熱至效。

八珍湯 治氣血虛、發熱潮熱。

人參

白朮

茯苓

甘草

炙

熟地

當歸

白芍 各一錢 川芎 五分

棗二枚水煎服。本方加黃蓍肉桂名十全大補湯。

皮黑山梔柴胡各八分

加朱砂湯

小參養榮湯

白芍
錢二

人參

黃蓍
蜜炙

當歸

白朮

熟地

各一錢

甘草
炙

茯苓

五分

遠志

去心泡
各七分

北五味

桂心

陳皮

各四分

薑一片棗二枚水煎服



南京中医药大学图书馆版权所有

◎戊字號方

治肺痿肺瘡久咳不正時吐白沫如米粥者名曰肺痿此火
盛金傷肺熱而金化也保和湯主之咳嗽吐膿血咳引胸中
痛此肺內生毒也名曰肺瘡加味桔梗湯主之

保和湯

治肺痿

知母蒸五分 貝母三錢 天冬去心一錢 枣仁去心一錢 桔梗五錢

北五味十粒 甘草

桔梗

馬兜鈴

百合

阿膠蛤粉炒成 珠各八分

薄荷一分

水煎入飴糖一匙溫服虛者加人參

加味桔梗湯 治肺癰

桔梗

去蘆

白芨

橘紅

甜葶苈

微炒八分

甘草節

貝母各一錢

五分

苡仁

金銀花各五錢

◎已字號方

治咽痛音嘶喉瘡勞病至此乃真陰枯涸虛陽上泛之危症多屬難起宜用六味丸滋腎水而以治標之法佐之可也



南京中医药大学图书馆版权所有

百藥煎散 治咽痛

白藥煎 五錢

硼砂 五分

甘草 二錢

爲末每服一錢米飲調食後細細嚥之

通音煎

治音癡

白蜜 一劙

川貝母 一兩去心爲末

款冬花 二兩去梗爲末

胡桃肉 十二兩去衣研爛

右四味和均飯上蒸熟不拘時開水點服

柳華散 治喉瘡並口舌生瘡咽喉腫痛諸症

真青黛

蒲黃

黃柏炒

人中白

各一
兩

冰片三分

硼砂五錢

共爲細末吹喉極效

○庚字號方

治男子夢遺精滑其夢而遺者相火之强也不夢而遺者心腎之衰也宜分別之

秘精丸 有相火必生濕熱則水不溝不清則不固故本方以
理脾導濕爲先濕祛水清而精自止矣治濁之法亦然



南京中医药大学图书馆版权所有

白术

山藥

茯苓

茯神

蓮子肉

去心者

各二兩

芡實

四兩

蓮花鬚

牡蠣

各一兩

五錢

黃柏

五錢

車前子

三兩

共爲末。金櫻膏爲丸。如桐子大。每服七八十九。開水下。氣虛者。加入參一兩。

十補丸。氣旺則能攝精。時下體虛者。眾服此。累效。

黃耆

白术

各二

茯苓

山藥

各一兩

人參

一兩

大熟地

三兩

當歸

白芍

各一

兩

山萸肉

杜仲

續斷

各二兩

棗仁二兩

遠志一兩

北五味

龍骨

牡蠣各七錢
五分

金櫻膏爲丸每服四錢開水下

◎辛字號方

治女人經水不調並治室女經閉成損按女人經水不調乃氣血不和其病尤淺室女經閉則水源斷絕其病至深夫所謂天癸者癸生于子天一所生之本也所謂月經者經常也反常則災病至矣室女乃血氣完足之人尤不宜閉閉則



髮焦咳嗽發熱諸病蜂起勢難爲也

澤蘭湯 調經通血脈治經閉

澤蘭二錢

柏子仁

當歸

白芍

熟地

牛膝

茺蔚子

各一錢五分

水煎服

益母勝金丹

熟地

當歸各四兩

白芍

酒炒三兩

川芎

一兩五錢

牛膝

二兩

白术

香附

酒醋姜湯鹽水各炒一次



南京中医药大学图书馆版权所有

丹參

茺蔚子酒

各四

益母草一觔酒水各半熬膏和煉蜜爲丸每早開水下三錢
晚用清酒下二錢。經水後期而來小腹冷痛爲寒加肉桂

五錢。經水先期妄行自覺血熱加丹皮三兩酒炒条芩五
錢凡遇經水作痛乃血凝氣滯加延胡索一兩

◎王字號方

治傳尸勞瘵驅邪殺蟲勞症之有蟲如樹之有蠹去其蠹而
後培其根則樹木生長勞症不去蟲而徒恃補養未見其受



中医药大学图书馆版权

益者古法具在不可廢也。

驅蟲丸

明雄黃

兩

蕪荑

雷丸

鬼箭羽

各五
錢

獺肝

一具

丹參

一兩
五錢

麝

二分
五厘

煉蜜丸如桐子大每食後開水下計丸日三服紫金丸亦效
或用真蘿合香丸治之尤佳

⑨癸字號方

補五臟虛損凡病邪之所乘其氣必虛况由虛致病者乎則



南京中医药大学图书馆版印所

補法爲最要。難經云：損其肺者益其氣，損其心者和其榮衛。
損其脾者調其飲食，適其寒溫。損其肝者緩其沖，損其腎者
益其精。按法主之。

補天大造丸 補立臟虛損

人參二兩

黃耆蜜炙

白朮

陳土蒸各三兩

當歸

酒蒸

棗仁

去壳克炒

遠志

去心甘草冰泡炒

白芍

酒炒

山藥

乳蒸

茯苓

乳蒸各一兩五錢

枸杞子

酒蒸

大熟地

九蒸晒各四兩

阿膠

水洗一具耳



鹿角一觔

龜版八兩

與鹿角全發膏

以龜鹿膠和藥加煉蜜爲丸。每早開水下四錢。陰虛火動者。加丹皮二兩。陽虛內寒者。加肉桂五錢。

咳嗽

咳嗽症虛勞門已言之。而未詳及外感諸病因故。再言之。肺體屬金。譬若鐘。然鐘非叩不鳴。風寒暑濕燥火六淫之邪。自外繫之。則鳴。勞慾情志飲食炙燙之火。自內攻之。則亦鳴。醫者不去其鳴鐘之具。而日磨鎚其鐘。將鐘損聲嘶而鳴之者。如故也。鐘

其能保乎。吾願治咳者作如是觀。大法風寒初起頭痛鼻塞發
熱惡寒而咳嗽者用止嗽散加荆芥防風蘿葉生姜以散邪既
散而咳不止專用本方調和肺氣或兼用入參胡桃湯以潤之。
若汗多食少此脾虛也用五味異功散加桔梗補脾土以生肺
金。若中寒入裏而咳者但溫其中而咳自止。若暑氣傷肺口渴
煩心溺赤者其症最重用止嗽散加黃連黃芩花粉以直折其
火。若濕氣生痰痰涎稠粘者用止嗽散加半夏茯苓桑白皮生
薑大棗以祛其濕。若燥氣焚金乾咳無痰者用止嗽散加瓜蔞

更母知母拍子仁以潤燥此外感之治法也然外感之邪初病在肺肺咳不已則移于五臟臟咳不已則移于六腑須按內經十二經見症而加減如法則治無不痊經云咳而喘息有音甚則十二經見症而加減如法則治無不痊經云咳而喘息有音甚

則唾血者屬肺臟此卽風寒咳血也止嗽散加荆芥紫蘿赤芍丹參咳而兩脇痛不能轉側屬肝臟前方加柴胡枳殼赤芍咳而喉中如梗狀甚則咽腫喉痺屬心臟前方倍桔梗加杏子咳而右脇痛陰引肩背甚則不可以動動則咳嗽屬脾臟前方加葛根秦艽鬱金咳而腰背痛甚則咳嗽者屬腎臟前方加附子

咳而嘔苦水者屬膽腑前方加黃芩半夏生姜咳而失氣者屬小腸腑前方加芍藥咳而嘔嘔甚則長蟲出屬胃腑前方加烏梅川椒乾姜有熱佐之以黃連咳而遺屎屬大腸腑前方加白朮赤石脂咳而遺溺屬膀胱腑前方加茯苓半夏久咳不止三焦受之其症腹滿不食令人多涕唾面目浮腫氣逆以止嗽散合五味异功散並用投之對症其效如神又以內傷論前症若七情氣結鬱火上衝者用止嗽散加香附貝母柴胡黑山梔若腎經陰虛水衰不能制火內熱脉細數者宜潮用地黃

丸滋腎水。干用止嗽散去荆芥加知母貝母以開火鬱。仍佐以
萎蕤胡桃湯。若客邪混合肺經變生虛熱者。更佐以圓魚丸。若
病勢深沉變爲虛損。或刀蟲入肺。喉癢而咳者。更佐以月華散。
若內傷飲食口乾痞悶。五更咳甚者。乃食積之火。至此時流入
肺經用止嗽散加連翹山楂麥芽苟子。若脾氣虛弱飲食不思
此氣弱也。用五味異功散加桔梗。此內傷之治法也。凡治咳嗽
貴在初起得法爲善。經云微寒微咳咳嗽之因屬風寒者十居
其九。故初治必須發散。而又不可以過散。不散則邪不去。過散

則肺氣必虛。皆令纏綿難愈。薛立齋云。肺有火則風邪易入。宜解表兼清肺火。肺氣虛則腠理不固。治宜解表兼補肺氣。又云。肺屬辛金。生于己土。久咳不已。必須補脾土以生肺金。此誠格致之言也。然清火之藥不宜久服。無論肺之洪大滑數。數劑後。卽宜捨去。但用六味丸。頻頻服之。而兼以白蜜。胡桃潤之。其咳。自住。若脾肺氣虛。則用五味异功散。六君子等藥。補土生肺。反掌收功。爲至捷也。治咳者。宜細加詳審。患咳者。宜戒口。慎風。毋令久咳。不除變爲肺痿肺疽。虛損勞瘵之候。慎之戒之。

止嗽散 治諸般咳嗽

炒

蒸

蒸

桔梗

炒

荆芥

紫苑

蒸

百部

蒸

白前

蒸各
二觔

甘草

炒十
二兩

陳皮

水洗去
白一觔

共爲末。每服三錢，開水調下。食後臨臥服。初感風寒，生薑湯調下。予製此藥，普送只前七味服者，多效。或問藥極輕微，而取效甚廣，何也？子曰：藥不貴峻峻，惟期中病而已。此方係乎苦心揣摩而得也。蓋肺體屬金畏火者也。過熱則咳，金性剛燥惡冷者也。過寒亦咳。且肺爲嬌臟，攻擊之劑既不任受。



而外主皮毛最易受邪不行表散則邪氣留連而不解經曰
微寒微咳寒之感也若小寇然啟門逐之卽去矣醫者不審
妄用清涼酸澀之劑未免閉門留寇寇欲出而無門必至穿
瘡而走則咳而見紅肺有一竅一在鼻一在喉鼻竅貴開而
不閉喉竅宜閉而不開今鼻竅不通則喉竅將啟能無慮乎
本方溫潤和平不寒不熱旣無攻擊過當之虞大有啟門驅
賊之勢是以客邪易散肺氣安寧宜其投之有效歟附論于
此以詒明哲

人參胡桃湯 止嗽定喘

人參五分 胡桃肉三錢連
衣研

生薑三片

水煎服。本方以萎蕤易生姜，名萎蕤胡桃湯治陰虛症。
又方用白蜜二觔胡桃肉二觔隔湯頓熟，開水點服，不拘時。

五味異功散 六味丸

圓魚丸

月華丸 俱見虛勞

六君子湯

見類中

喘

經云諸病喘滿皆屬於熱。蓋寒則息微而氣緩。熱則息粗而氣急也。由是觀之。喘之屬火無疑矣。然而外感寒邪以及脾胃虛寒。皆能令喘。未便概以火斷也。假如風寒外客而喘者。散之。直中于寒而喘者。溫之。熱邪傳裏。便閉而喘者。攻之。暑熱傷氣而喘者。清而補之。濕痰壅遏而喘者。消之。燥火入肺而喘者。潤之。此外感之治法也。各詳本門。若夫七情氣結。鬱火上衝者。疏而達之。加味逍遙散。腎水虛而火上炎者。壯水制之。知柏八味丸。腎經真陽不足而火上泛者。引火歸根桂附八味丸。若因脾虛



不能生肺而喘者五味异功散加桔梗補土生金此內傷之治法也夫外感之喘多出于肺內傷之喘未有不由乎腎者經云諸痰喘嘔皆属于下定喘之法當于腎經責其真水真火之不足而主之如或脾氣大虛則以人參白朮爲主參朮補脾土以生肺金金旺則能生水乃隔二隔三之治也更有哮症與喘相似呀呷不已喘息有音此表寒束其內熱致成斯疾加味甘桔湯主之止嗽散亦佳古今治喘哮症方論甚繁大意總不出此

加味道遙散見類中

知柏八味丸 卽六味丸加知母黃柏

桂附八味丸 俱見類中

五味异功散 見虛症

加味甘桔湯 治喘定哮

甘草 五分 桔梗

川貝母

百部

旋覆花 各一錢

五分

白前

橘紅

茯苓

水煎服

止嗽散 見傷寒咳嗽

吐血

暴吐血以祛瘀爲主而兼之降火久吐血以養陰爲主而兼之理脾古方四生丸十灰散花蕊石散祛瘀降火之法也古方味湯四物湯四君子湯養陰補脾之法也然血症有外感內傷之不同假如咳而喘息有音甚則吐血者此風寒也加味香薷散散之務農赤日行旅長途口渴自汗而吐血者此傷暑也益元散清之夏令火炎更乘秋燥發爲乾咳脈數大而吐血者此燥火焚金也三黃解毒湯降之此外感之治法也又如陰虛吐



血者初用四生丸十灰散以化之兼用生地黃湯以清之吐血則用地黃丸補之陽虛大吐血成升斗者初用花蕊石散以化之隨用獨參湯以補之繼則用四君八珍等以調之臟寒吐血如天寒地凍水凝成冰也用理中湯以溫之其或七情氣結怒動肝火者則用加味逍遙散以疏達之傷力吐血者則用澤蘭湯行之此內傷之治法也夫血以下行爲順上行爲逆暴吐之時氣血未衰飲食如常大便結實法當導之下行病勢旣久氣血衰微飲食漸減大便不實法當養陰血兼補脾氣大凡吐血



咯血須用四君子之類以收功。蓋陰血生于陽氣，脾土旺則能生血。耳治者念之。

四生丸

見虛症

十灰散。祛瘀生新止血之利劑。

大薊

小薊

茅根

茜根

老絲瓜

山梔

蒲黃

荷葉

大黃

亂髮

燒灰存性，每服二三錢，藕湯調下。

花蕊石散



南京中医药大学图书馆版权所有

六味湯 四物湯 四君子湯

並見虛症

加味香薷散

卽香薷散加山梔丹皮

益元散

見瀕中

三黃解毒湯

見傷寒

生地黃湯

見虛症

獨參湯

八珍湯

見虛症 理中湯 見中寒

加味逍遙散

見類中

澤蘭湯

見後腰痛

頭痛

頭爲諸陽之會。清陽不升，則邪氣乘之，致令頭痛。然有內傷外



感之。外感風寒者宜散之。熱邪傳入胃腑。熱氣上攻者宜清之。直中症寒氣上逼者宜溫之。治法詳見傷寒門。茲不贅。然除正風寒外。復有偏頭風。雷頭風。客寒犯腦。胃火上衝。痰厥頭痛。

大頭天行。破腦傷風。眉稜骨痛。眼眶痛等症。更有真頭痛。朝不保暮。勢更危急。皆宜細辨。偏頭風者。半邊頭痛。有風熱。有血虛。風熱者。筋脈抽搐。或鼻塞常流濁涕。清空膏王之血虛者。晝輕夜重。痛連眼角。逍遙散主之雷頭風者。頭痛而起核塊。或頭中雷鳴。多屬痰火。清震湯主之。客寒犯腦者。腦痛連齒。手足厥冷。

口鼻氣冷。差活附子湯主之。胃火上衝者。脈洪大。口渴飲冷。頭
筋扛起者。加味升麻湯主之。癲厥頭痛者。胸膈多痰動則眩。量
半夏白术天麻湯主之。腎厥頭痛者。頭重足浮。腰膝痠軟。經所
謂下虛上實是也。腎氣衰則下虛。浮火上泛故上實也。然腎經
有真水虛者。脈必數而無力。有真火虛者。脈必大而無力。水虛
六味丸。火虛八味丸。大頭天行者。頭腫大甚如斗。時疫之症也。
輕者名發頤。腫在耳前後皆火鬱也。普濟消毒飲主之。更加針
砭以佐之。破腦傷風者。風從破處而入。其症多發搐搦。防風散

主之眉稜骨痛或眼眶痛俱屬肝經見光則痛者屬血虛逍遙散痛不可開者屬風熱清空膏真頭痛者多屬陽衰頭鏡諸陽而腦爲髓海不任受邪若陽氣大虛腦受邪侵則發爲真頭痛手足青至節勢難爲矣速用補中益氣湯加蔓荆子川芎附子並進八味丸間有得生者不可忽也

清空膏

羌活

防風各六分

柴胡五分

東芩半生半炒

一錢二分

川芎

四分

甘草

錢一錢

薄荷

三分

黃連

酒炒六分

水煎服

逍遙散 治虛勞

加味清震湯

升麻一錢

蒼朮一錢

青荷葉一箇
全用甘草炙

陳皮各八分

蔓荆子

荆芥各一錢五分

薄荷五分

水煎服

羌活附子散

羌活一錢

附子

乾姜各五分

炙甘草八分



水煎服

加味升麻湯

升麻

葛根

赤芍

甘草各一錢

石膏二錢

薄荷三分

燈心二十節水煎服

半夏白术天麻湯

半夏一錢
五分白术

天麻

陳皮

茯苓各一錢

甘草一分
炙五分生薑二片大棗三個蔓荆子一錢

虛者加人參

水煎服

六味丸 八味丸

見類中

普濟消毒飲 治大頭症腫甚者宜砭之

甘草

桔梗

黃芩

酒炒

黃連

酒炒各一錢

馬勃

元參

橘紅

柴胡

各五分

薄荷 六分 升麻 二分 連翹

牛蒡子 炒八分

水煎服。虛加人參五分便閉。加大黃酒煨一錢。愚按



此症須用貝母、人中黃、荷葉爲妙。發願症倍柴胡、加丹皮、喉嚨腫痛倍桔梗甘草。

砭法以上細磁鋒用竹片夾定緊繫放鋒出半分對患處另以箸敲之偏刺腫處俾紫血多出爲善刺畢以精肉貼片時再用雞子清調乳香末潤之此地不宜成膿頭內中空耳前後更多曲折提膿拔毒恒多不便故針砭斷不可少。

針法以小布針兩枚手法扣定露鋒纖少偏刺腫處血出立鬆更敷前藥自然消散用針砭時須正心誠意咬定牙齒下手



北京中医药大学图书馆版权所有

刺之

防風散 治破腦傷風

防風

生南星

炮等分

右爲末每服二錢童便沖酒調服

補中益氣湯

見類方

心痛

當胸之下岐骨陷去屬心之部位其發痛者則曰心痛然心不受邪受邪則爲真心痛日暮不保矣凡有痛者胞絡受病也胞



南京中医药大学图书馆版权所有
NanJing University of Chinese Medicine Library

絡者心主之宮城也。寇凌宮禁，勢已可危，而况犯主乎？故治之宜亟亟也。心痛有九種：一曰氣，二曰血，三曰熱，四曰寒，五曰飲。六曰食，七曰虛，八曰蟲，九曰癥。宜分而治之。

氣痛者，氣壅攻刺而痛游走不定也。沉香降氣散主氣血痛者，痛有定處而不移轉側，若刀錐之刺子，拈散主之。熱痛者，舌燥唇焦，渴亦便閉，喜冷畏熱，其痛或作或止。脈洪大有力，清中湯主之。寒痛者，其痛暴發，手足厥冷，口鼻氣冷，喜熱畏寒，其痛綿綿不休，脈沉細無力，姜附湯加肉桂主之。飲痛者，亦飲停積也。



乾嘔吐涎或咳或噎甚則搘之作水聲脈弦滑小半夏加茯苓
湯主之食痛者傷于飲食心胸脹悶手不可按或吞酸嘔腐脈
緊滑保和湯主之虛痛者心悸怔忡以手按之則痛止歸脾湯
主之蟲痛者面白唇紅或唇之上下有白斑點或口吐白沫飢
時更甚化蟲丸主之疰痛者觸冒邪祟卒爾心痛面目青黯或
昏憊譫語脈來乍大乍小或兩手如出兩人神米散葱曰酒生
薑湯並主之此治心痛之大法也

或問久痛無寒暴痛無火然乎否乎答曰此說亦宜斟酌如人



素有積熱或受暑濕之熱或熱食所傷而發則暴痛亦屬火矣。
豈宜熱藥療之如人本體虛寒經年累月憑發無休是久痛亦
屬寒矣豈宜寒藥療之且凡病始受熱中未傳寒中者比比皆
是必須臨症審確逐一明辨斯無誤也又或謂諸痛爲實痛無
補法亦非也如人果屬實痛則不可補若屬虛痛必須補之虛
而且寒則宜溫補並行若寒而不虛則專以溫劑主之丹溪云
溫卽是補若虛而兼火則補劑中須加涼藥此治痛之良法治
者宜詳審焉

沉香降氣散 治氣滯心痛

沉香 三錢

砂仁 七錢

甘草 炙五錢

香附 茵水炒五兩

元胡索

一兩

酒炒川棟子

煨去肉淨一兩

共爲末每服二錢淡薑湯吞
手拈散 治血積心痛

元胡索

醋炒

香附 酒炒

五靈脂 去土

醋炒沒藥

箬上炙等分

共爲細末每服三錢熟酒調下血老者用紅花五分桃仁十

粒煎酒調下

清中湯 治熱厥心痛、

香附

陳皮

各一錢
五分

黑山梔

金錢子

即川
棟子

元胡索

各八分

甘草

炙五分

川黃連

姜汁炒
一錢

水煎服

薑附湯

見諸方補遺

治寒厥心痛。

又真心痛

手足青至節

宜

用本方大劑飲之或救十中之一二若痛時著手緊按更加

人參

小半夏加茯苓湯

見傷寒咳嗽

保和湯 治傷食心痛

麥芽

山楂

葛子

厚朴

香附
錢一
分各一

甘草

連翹
分各五

陳皮
錢一
分五

水煎服

歸脾湯 治氣血虛弱以致心痛

黃蓍
錢一
分五

白朮

人參

茯神

棗仁

當歸
錢各一

遠志
七分

木香

甘草
炙各
五分

圓眼肉
五枚



南京中医药大学图书馆版权所有

水煎服。若挾肝火加柴胡山梔丹皮各一錢

化蟲丸 治蟲嗜心痛

蕪荑 去梗

白雷丸 各五錢

枳榔 二錢 五分

雄黃 一錢 五分

木香

白术

陳皮 各三錢

神曲 四錢 炒

以百部二兩、熬膏糊丸如桐子大、每服一錢五分米飲下、如
取下蟲積、加大黃五錢 酒炒

神木散 見中食

胸痛

胸者肺之分野。然少陽膽經受病亦令胸痛。此邪氣初傳入裡而未深入于裡故胸痛也。古方用柴胡湯加枳殼治之。如本方對小陷湯一服其效如神。又風寒在肺胸滿痛氣喘宜用其桔湯加理氣散風之劑。又飲食填塞者宜用吐法。其肺癰肺痰二症詳見虛勞茲不贅。

柴胡湯

見傷寒少陽症

其桔湯

見傷寒咽痛

脇痛

傷寒脇痛屬少陽經受邪用小柴胡湯雜症脇痛左爲肝氣不

和用柴胡疏肝散。七情鬱結。用逍遙散。若兼肝火痰飲。食積瘀血。隨症加藥。右爲肝移邪于肺。用推氣散。凡治實症。肠痛。左用枳殼。右用鬱金。皆爲的劑。然亦有虛寒作痛。得溫則散。按之則止者。又宜溫補。不可拘執也。

小柴胡湯見傷寒

柴胡疎肝散 治左脇痛

柴胡

陳皮

各一錢

川芎

赤芍

枳殼
麸炒

香附

二分
醋炒各一錢

甘草
分

次五

水煎服。唇焦口渴乍痛乍止者火也。加山梔黃芩。肝經一條扛起者食積也。加青皮參芽山楂。痛有定處而不移。日輕夜重者瘀血也。加歸尾紅花桃仁牡丹皮。乾嘔咳引脇下痛者停飲也。加半夏茯苓。喜熱畏寒欲得熱手按者寒氣也。加肉桂吳茱萸。

逍遙散見虛勞

推氣散 治右脇痛

枳殼一錢
鬱金一錢

桂心

甘草炙各五分

桔梗

陳皮

各八分

薑

二片

棗

二枚

水煎服

瓜蔞散 治肝氣燥急而脇痛或發水泡

大瓜蔞一枚連
皮搗爛

粉甘草二錢

紅花七分

水煎服。按鬱火日久。肝氣燥急。不得發越。故皮膚起泡轉
爲脹痛。經云。損其肝者緩之。其中瓜蔞爲物甘緩而潤。于鬱不
逆。又如油之洗物。滑而不滯。此其所以奏功也。

胃脘痛



南京中医药大学图书馆版权所有

胃脘痛。治法與心痛相倣。但停食一症。其脹痛連胸者。吐之。張痛連腹者。下之。其食積之輕者。則用神术散消之。又有胃脘症。嘔而吐膿血者。不得妄治。書云。嘔家有膿不須治。膿盡自愈。

神术散 方見食中

腹痛

腹中痛。其寒熱食積氣血。更蟲辨法亦與心痛相符。惟有肝木乘脾。攬腸沙腹內癰。茲三症有不同耳。經云。諸痛皆屬於肝。肝

木乘脾。則腹痛。仲景以芍藥甘草湯主之。甘草味甘。甘者。已也。
芍藥味酸。酸者。甲也。甲已化土。則肝木平。而腹痛止矣。傷寒症。

中有由少陽傳入太陰而腹痛者。柴胡湯加芍藥。有因悞下轉
入太陰而腹痛者。桂枝湯加芍藥。卽同此意。尋常腹痛。全在寒、
熱食積。分別詳明爲主。凡腹痛乍作乍止。脈洪有力。熱也。以芍

藥甘草湯加黃連清之。若噯腐吞酸飽悶。腹中有一條杠
起者。是食積也。保和丸消之。而痛不止。便閉不行。腹痛拒

按者。三黃枳木丸下之。設或下後仍痛。以手按其腹。若更痛者。

積未盡也。仍用平藥再消之。若按之痛止者。積已去而中氣虛也。五味異功散補之。若消導攻下之後。漸變寒中。遂至惡寒喜熱。須易溫中之劑。此火痛兼食之治法也。若腹痛綿綿。不發脈遲。無力者。寒也。香砂理中湯溫之。若兼飢悶脹痛。是有食積。不便。驟補香砂二陳湯。加薑桂。查芽厚朴。溫而消之。消之而痛不止。大便反閉。名曰陰結。以木香丸。熟藥下之。後仍以溫劑和之。此寒痛兼食之治法也。若因濁氣壅塞。走注疼痛。木香調氣散。散之。若因瘀血積聚。呆痛不移。澤蘭湯行之。蟲瞞而痛。唇有



班點飢時更甚化蟲丸消之傷暑霍亂四味香薷飲解之更有乾霍亂症欲吐不得吐欲瀉不得瀉變在須臾俗名攬腸沙是也更有偏體紫黑者名曰烏沙脹急用燒鹽和陰陽水吐之或用四陳湯服之外用武侯平安散點左右大眼角其人卽甦其腹內癟一症當臍腫痛轉側作水聲小便如淋千金壯丹皮散化之古方治腹痛症多以寒者爲虛熱者爲實未盡然也蓋寒症亦有實痛者熱症亦有虛痛者如寒痛兼食則爲實矣挾熱久痢則爲虛矣凡看症之法寒熱虛實互相辨明斯無悞也。

芍藥甘草湯 止腹痛如神

白芍藥酒炒
三錢
甘草
炙一錢
五分

水煎服。脈遲爲寒加乾薑。脈洪爲熱加黃連。脈緩爲濕加蒼朮。生薑。脈濇傷血加當歸。脈弦傷氣加芍藥。

保和丸 見心痛 消食積、清濕熱。腹中有一條杠起者是食積也。

舌乾口燥是濕熱也。本方主之。有熱加黃連。

三黃枳木丸 消熱食除積滯。腹痛拒按便閉瀉。亦名曰陽結。

宜用本方。若冷食所傷。宜用木香丸。若冷熱互傷。須酌其所。

食冷熱之多寡而並用之此東垣法也

黃芩一兩 黃連五錢 大黃七錢五分

神曲

白术 枳實 陳皮各五錢

荷葉一枚煎水盞爲丸量虛實用

五味異功散見虛寒

香砂理中湯見中寒 治客寒犯胃其症手足厥冷回鼻氣冷其

痛綿綿不止喜熱畏寒脈沉細不比熱痛乍止乍作喜冷畏

熱唇焦舌燥口渴脈洪也寒熱之別相隔千里

香砂二陳湯

見類中卽二陳
湯加木香砂仁

木香丸

治寒積冷食腹痛拒按或大便閉結謂之冷閼名曰

陰結本方攻之

木香

丁香

各一錢
五分

乾姜

三錢

麥芽

炒五
錢

陳皮

三錢

巴豆

三十粒去
壳炒黑

神曲煮糊爲丸每服十丸或二十丸開水下痛甚者倍之所食之物應隨利出如利不止以冷粥飲之即止

木香調氣散

見類中

澤蘭湯

見吐血



化蟲丸 見心痛

四味香薷飲 見傷暑

諸葛武侯平安散

硃砂 二錢

射香

冰片 各五
厘

明雄黃

硼砂 各五
分 白硝 二分

共研極細、未用小磁罐收貯、每用清水、以骨簪點三三厘在
大眼角內、如點眼藥法、點後忌熟茶飲食半日即愈。

四陳湯

陳皮 去白

陳皮圓 去穰

陳枳殼 去穰

陳茶葉 麵炒



南京中医药大学图书馆版权所有

等分爲末。每服三錢，開水點服。

千金牡丹皮散 治腹內癰

牡丹皮 三錢 荸薺仁 五錢 桃仁 十粒

瓜蔞仁 去壳去油淨二錢

水煎服

小腹痛

書云：大腹屬太陰。當臍屬少陰。小腹屬厥陰。傷寒傳至厥陰。少腹痛甚。此熱邪也。宜下之。若熱結在裏。蓄血下焦。亦宜下之。若



南京中医药大学图书馆所有
1661
中医药大学图书馆版本所有

直中厥陰。小腹冷痛。則爲寒邪。宜溫之。治法已詳本門尋常。少
腹痛多屬疝瘕奔豚之類。書云男子外結七疝。女子帶下。瘕聚。

古人更有痃癖癰瘕之名。皆一類也。痃如弓弦。筋扛起也。癖者。
隱辟沉附着骨也。瘕則有塊可徵。猶積也。多屬於血瘕者假也。
忽聚而忽散氣爲之也。奔豚者。如江豚之上竄。冷氣上衝也。其

癰瘕之氣。聚于小腸。則曰小腸氣。聚于膀胱。則曰膀胱氣也。小
腸氣失氣則快。膀胱氣少。腹熱若沃以湯。溼于小便也。凡治少
腹痛。當用墜降之藥。其行氣皆當用核。乃能宣達病所以取效。

也橘核丸奔豚丸並主之

橘核丸 通治癥瘕痃癖。小腸膀胱等氣。

橘核
鹽酒炒

川棟子
肉煨去

山楂子
炒

香附
姜汁浸炒各

荔枝核
煨研

小茴香
微炒各

一兩五錢

一兩

神曲四兩。煮糊爲丸。如桐子大。每服三錢。淡鹽水下。寒甚。
加附子五錢。肉桂三錢。當歸一兩。有熱加黑山梔七錢。又

補氣症表寒。東其內熱。丹溪以黑山梔吳茱萸並用。按此二
味若寒熱不調者。加入丸中更佳。若胞廩小便不利。去小茴

加茯苓草前子丹參黑山梔

奔豚丸

見積聚

身痛

身體痛。內傷外感。均有之。如身痛而拘急者。外感風寒也。身痛

如受杖者。中寒也。身痛而重墜者。濕也。若勞力辛苦之人。一身

酸軟無力而痛者。虛也。治法風則散之。香薷散寒則溫之。理中

湯濕則燥之。第白二陳湯虛則補之。補中益氣湯大抵身痛多

屬於寒。蓋熱主流通寒主閉塞也。無論風濕與虛挾寒者。多挾

熟者少治者審之。

香薷散

見太陽病

理中湯

見中寒

荅木二陳湯

卽二陳湯加荅木。白朮見類中。

補中益氣湯

見類中

肩背臂膊痛

肩背痛古方主以茯苓丸。謂痰飲爲患也。而亦有不盡然者。庄子曰：背痛多屬於風。胸痛多屬於氣。氣滯見痰癰。臟腑之病也。苦爲諸輸之所伏。凡風邪襲人必從肺。八經絡之病也。間有胸痛連

背者氣閉其經也亦有背痛連胸者風鼓其氣也治胸痛者理痰氣治背痛者祛風邪此一定之理理痰氣宜用木香調氣散並前丸祛風邪宜用秦艽天麻湯挾寒者加附桂挾虛者以補中益氣加秦艽天麻主之如或風邪痰氣互相鼓煽痰飲隨風走入經絡而眉脣腫痛則前丸二方須酌量合用治無不效矣

茯苓丸

茯苓

半夏

各二兩
薑汁糊

風化硝

枳殼

炒各五錢
薑汁糊

薑汁糊丸如桐子大每服二十九粒淡薑湯下

木香調氣散

見類中

秦艽天麻湯

秦艽一錢
五分天麻

羌活

陳皮

當歸
川芎各一錢
炙甘草五分
生薑三片

桑枝三錢
酒炒

水煎服。挾寒加附子桂枝

補中益氣湯

見類中

腰痛

腰痛有風。有寒。有濕。有熱。有瘀血。有氣滯。有痰飲。皆標也。醫虛基本也。腰痛拘急牽引。腿足脈浮弦者。風也。腰冷如冰。喜得熱。手熱脈沉遲或緊者。寒也。並用獨活湯主之。腰痛如坐水中射。

體沉重。腰間如帶重物。脈濡細者。濕也。蒼白二陳湯加獨活主之。若腰重疼痛。腰間發熱。瘦軟無力。脈弦數者。濕熱也。恐成癆症。前方加黃藥主之。若因閃挫跌躄。瘀積於內。轉側若刀錐之刺。大便黑色。脈濇或芤者。瘀血也。澤蘭湯主之。走注刺痛忽聚忽散。脈弦急者。氣滯也。橘核丸主之。腰間腫按之濡軟不痛。脈

滑者痰也。二陳湯加白朮、蘿蔔、白芥子、竹瀝、薑汁主之。腰痛似脫重按稍止。脈細弱無力者虛也。大君子湯加杜仲、續斷、桑枝若兼陰冷更佐以八味丸。大抵腰痛悉屬腎虛既挾邪氣必須祛邪如無外邪則惟補腎而已。然腎虛之中又須分辨寒熱二症。如脈虛軟無力。溺清便溏。腰間冷痛。此爲陽虛須補命門之火。則用八味丸。若脈細數無力。便結溺赤。虛火時炎。此腎氣熱。髓減骨枯。恐成骨痿。斯爲陰虛須補先天之水。則用六味丸。合補陰丸之類不可誤用熱藥以灼其陰。治者審之。

獨活湯 治腎虛兼受風寒濕氣

獨活

桑寄生

防風

秦艽

威靈仙

牛膝

茯苓各一錢

桂心五分

細辛

甘草炙各三分

金毛狗脊各二錢

當歸

生薑二片水煎服。丹溪云久腰痛必用官桂開之方止。寒甚者更加附子但有濕熱則二者皆不宜用。

蒼白二陳湯 見類中

澤蘭湯 治閃挫跌撲瘀血內蓄轉側若刀錐之刺。

澤蘭三錢

丹皮

牛膝各二錢

桃仁

十粒去皮尖角

紅花五分

當歸尾五錢

廣三七一錢

赤芍藥五分

一錢

水煎熱酒衝服。如二便不通加酒蒸大黃三錢。凡跌撲

傷重便溺不通者非大黃不救若大便已通則用廣三七煎

酒或山羊血衝酒青木香煎酒隨用一味皆可立止疼痛

橘核丸見小腹痛

茯苓丸見臂肩痛

六君子湯

見類中

六味丸

八味丸

見虛

補陰丸治腎氣熱腰軟無力恐成骨癆

熟地 三兩

舟皮

天冬

當歸

枸杞子

牛膝

山藥

女貞子

茯苓

龜版

杜仲

續斷 各一兩
二錢

人參

黃柏 各五
錢

石斛四兩熬膏和煉蜜爲丸每早淡鹽水下三錢

庫

鶴膝風

痺者痛也、風寒濕三氣雜至合而爲痺也、其風氣勝者爲行痺、遊走不定也、寒氣勝者爲痛痺、筋骨攣痛也、濕氣勝者爲着痺、

浮腫重墜也。然既曰勝，則受病有偏重矣。治行痺者，散風爲主。而以除寒祛濕佐之。大抵參以補血之劑。所謂治風先治血。行風自滅也。治痛痺者，散寒爲主。而以疏風燥濕佐之。大抵參以補火之劑。所謂熱則流通，寒則凝塞。通則不痛，痛則不通也。治着痺者，燥濕爲主。而以祛風散寒佐之。大抵參以補脾之劑。蓋土旺，則能勝濕，而氣足，自無頑麻也。通用蠲痺湯加減主之。痛甚者，佐以松枝酒。復有患痺日久，腿足枯細，膝頭壅大，名曰鶴膝風。此三陰本虧，寒邪蘊于經絡，遂成斯症。宜服虎骨膠丸。

外貼普敷萬全膏則漸次可愈矣。此不治則成痼疾而爲癰瘍矣。

蠲痹湯 通治風寒濕三氣合而成痺

羌活 行上力大

獨活 行下力專各一錢

紫苑 一錢

當歸

三錢

川芎

七分治風先治血

甘草炙五分

海風藤 一二錢

桑枝

三錢

乳香

透明者

木香

各入分止痛瀉理氣

水煎服。風氣勝者更加秦艽防風。寒氣勝者加附子。
濕氣勝者加防己草薢苡仁。痛在上者去獨活加荆芥。

痛在下者加牛膝。間有濕熱者。某人舌乾喜冷。口渴溺赤。

腫處熱辣。此寒久變熱也。去肉桂。加黃柏三分。

松枝酒 治白虎歷節風。走注疼痛。或如蟲行。諸般風氣。

松節

桑枝

藜寄生

勾筋

續斷

天麻

金毛狗脊

虎骨

秦艽

青木香

海風藤

菊花

五加皮

各一兩
當歸三兩

每藥一兩。用生酒二觔煮。退火七日飲。痛在下。加牛膝。



虎骨膏丸

治鶴膝風並治癱瘓諸症

虎骨

二筋剉碎洗淨用嫩桑枝金毛狗脊去毛白菊花去
蒂各十兩秦艽二兩煎水熬虎骨成膠收起如膏樣

和藥爲丸如不足量加煉蜜

足量加煉蜜

大熟地

四兩

當歸三兩

牛膝

山藥

茯苓

杜仲

枸杞

續斷

桑寄生各二兩熟附子七錢

厚肉桂火五錢

去皮不見

丹皮

澤瀉八錢

人參二兩

貧者以黃

芪四兩代之

右爲末以虎骨膠爲丸每早開水下三錢

普救萬全膏 治一切風氣走注疼痛以及白虎歷節風鴉脛
風寒濕流注瘡疽發背疔瘡癰癧跌打損傷腹中食積痞塊
多年瘧母頑痰瘀血停蓄腹痛泄利小兒疳積女人癥瘕諸
症並貼患處咳嗽瘧疾貼背脊心第七椎子製此膏普送取
效神速倘貼後起泡出水此病氣本深盡爲藥力拔出吉兆
也不必疑懼記之記之

藿香

白芷

當歸尾

貝母

大楓子

木香

白芍

烏藥

生地

蘿蔔子

丁香

白芨

姜蚕

細辛

草麻子

檀香

秦艽

蜂房

防風

五加皮

苦參

肉桂

蟬退

丁皮

白鮮皮

羌活

桂枝

全蝎

赤芍

高良薑

元參

南星

鱉甲

荆芥

兩頭尖

獨活

蘿木

枳殼

連翹

威靈仙

桃仁

牛膝

紅花

續斷

花百頭

杏仁

蒼术

艾絨

藁本

骨碎補



川芎

黃芩

麻黃

北草

黑山梔

川烏

附子

牙皂

半夏

草烏

紫荆皮

青風藤

以上各一兩五錢

大黃

三兩 蟠蚣三十

蛇脫五條

槐枝

桃枝

柳枝

桑枝

練枝

榆枝

楮枝

以上各三十五寸

男人血餘

三兩以上俱浸油內

貞麻油

十五觔用二十一兩秤稱


松香

一百觔櫻皮濾淨

百草霜

研細十觔過

冬浸九宿春秋七宿夏五宿分數次入鍋文武火熬以藥枯



油黑滴水成珠爲度。瀘去渣重稱。每藥油十二兩下瀘淨片子松香。圓勑同熬至滴水不散。每鍋下百草霜細末六兩。勿住手攬。俟火候成。則傾入水缸中。以捧攬和成塊。用兩人扯拔數次。磁鉢收貯。治一切風寒濕氣痞疽等症。其效如神。又法治瘡疽。用血丹收。更妙。每油一勑用丹六兩。

瘧

瘧大症也。諸瘧生於肺熱。經云五臟因肺熱葉焦發爲瘧。覽肺氣熱。則皮毛先瘧而爲肺鳴。心氣熱。則脈瘧脛縱不任地。肝氣

熱則筋痠。口苦而經攀脾氣熱則肉痠。肌膚不仁。腎氣熱則渴。腰脊不舉。丹溪治法。瀉南方補北方。瀉南方則肺金不要刑。補北方則心火自下降。俾西方清肅之令下行。庶肺氣轉清筋脈骨肉之間。濕熱漸消而痠可愈也。然經云。治痠獨取陽明。何也。蓋陽明爲臟腑之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。陽明虛則宗筋縱帶脈不引。故足痠不用也。由前論之。則曰五臟有熱。由後論之。則曰陽明之虛。二說似異而實同。蓋陽明胃屬溫土。土虛而感濕熱之化。則母病傳子。肺金受傷而痠症作矣。



是以治痿獨取陽明也。取陽明者所以祛其濕濁。南補北者所以清其熱。治痿之法不外補中祛濕養陰清熱而已矣。

五痿湯

治五臟痿

人參

白术

茯苓各一錢

甘草炙四分

當歸

一錢
五分

苡仁

三錢

麥冬

二錢

黃柏

炒炭

知母

各五分

水煎服。心氣熱加黃連三分。丹參生地各一錢。肝氣熱加黃芩。丹皮牛膝各一錢。脾氣熱加連翹一錢。生地一錢。
加黃芩。丹皮牛膝各一錢。脾氣熱加連翹一錢。生地一錢。



五分。腎氣熱加生地牛膝石斛各一錢五分。肺氣熱加天冬百合各二錢。挾痰如川貝竹瀝。濕炎加半夏曲。瘀血加桃仁紅花。如氣血兩虛另用十全大補湯。腎肝虛熱髓減骨枯兼用虎潛丸之。

十全大補湯

見虛勞

虎潛丸

龜版

四兩

杜仲

熟地

各三兩

黃柏

炒褐色

知母

各五錢

牛膝

白芍藥

虎骨

酒炙

錢

當歸各二
兩
陳皮四錢

乾薑二錢

爲末酒糊丸每服二錢淡鹽水下加人參一兩尤妙

脚氣

脚氣者脚下腫痛卽癰症之類也因其痛專在脚故以脚氣名之其腫者名濕脚氣不腫者名乾脚氣濕脚氣水氣勝也檳榔散主之乾脚氣風氣勝也四物湯加牛膝木瓜主之

檳榔散脚氣謂之壅疾不宜驟補

止檳榔

牛膝

防回

燭活



南京中医药大学图书馆版权所有

秦艽各一

錢

青木香

天麻

赤芍

各八分

桑枝

二錢

當歸

五分

水煎服

四物湯見虛症

癩風

癩風癩也俗稱大麻風。濕熱在內而爲風鼓之。則肌肉生蟲。白屑重疊。搔癢頑麻。甚則眉毛脫落。鼻柱崩壞。事不可爲矣。治法。清濕熱。祛風邪。以苦參湯。地黃酒。並主之外。以當歸膏塗之。徃。



往取效。未可據視爲廢疾而忽之也。

苦參湯

苦參一錢 生地二錢 黃柏五分

當歸

秦艽

牛蒡子

赤芍

白蒺藜

丹參

丹皮

銀花

貝母

各一錢

加甘菊三錢水煎服

地黃酒

生地二兩

黃柏

苦參

丹參

草薢

菊花

銀花

丹皮

赤芍

當歸

枸杞子

蔓荆子

赤茯苓

各一兩

秦艽

獨活

威靈仙

各五錢

桑枝

一兩
五錢

烏梢蛇

去頭尾
一具

右煮好頭生酒五十觔退火七日用

加味當歸膏 治一切瘡疹並瘧癆口皆效

當歸

生地

各一
兩

紫草

木鼈子肉

去壳研
末

麻黃

大楓子肉

去壳研

防風



中国医药大学图书馆版

黃柏

各五
元參
錢

八兩
麻油

二兩
黃蠟

先將前九味入油熬枯，瀘去渣，再將油復入鍋內，熬至滴水成珠，再下黃蠟，試水中不散爲度，傾入盞碗內，半水中出水。

三日聽擦

噎隔

古方治噎隔多以止吐之劑通用。不思吐，濕症也。宜燥。噎隔，症也。宜潤。經云三陽結謂之隔，結熱也。熱甚則物乾。凡噎隔症不出胃脘，乾稿四字稿在上脘者，水飲可行。食物難入，槁在

下脫者食雖可入久而復出夫胃既稿矣而復以燥藥投之不
愈益其燥乎是以大小半夏二湯在噎膈門爲禁劑予嘗用散
膈散開闢更佐以四君子湯調理脾胃挾鬱者則用逍遙散主
之雖然藥逍遙而人不逍遙亦無益也張雞峯云此症乃神思
間病法當內觀靜養斯言深中病情然其間有挾蟲挾血挾痰
與食而爲患者皆當按法兼治不可忽也

啟膈散通噎膈開闢之劑屢效苦寒破氣取散氣之功

沙參三錢

丹參三錢

茯苓一錢

川貝母

去心一錢五分

鑾金五分

砂仁壳四分

荷葉蒂二個

杵頭糠五分

水煎服。虛者加人參。前症若兼蟲積加胡連蕪黃甚則

用河濶雄黃散吐之。若兼血積加桃仁紅花或另以生韭

汁飲之。若兼痰積加廣橘紅。若兼食積加葛子麥芽山

查。此症有生蛇虱者華陀以醋蒜食之令飽則吐物而出

真神法也。

四君子湯

見虛症

調中散

開關和胃

胃寒

寒氣

氣逆

氣逆

氣逆

氣逆

氣逆

氣逆

氣逆

北沙參 三兩

荷葉 去角淨 一兩

廣陳皮 濃去泊

一兩

茯苓 一兩

川貝母 去心粘米 拌炒 一兩

丹參 二兩

陳倉米 炒熟 三兩

五穀飴 酒炒焦

黃 一兩

共爲細末，每用米飲調下三錢，日二服。

逍遙散 見類中

河間雄黃散

雄黃

瓜蒂

赤小豆

各一錢

共爲細末，每服五分，溫水調滴入狗油數匙，服下以吐爲度。



吐去隔間小蠶隨用五味異功散安之續用逍遙散調之

痢疾

古人治痢多用墜下之品如檳榔枳實厚朴大黃之屬所謂通用法非不善矣然而效者半不效者半其不效者每至纏綿難愈或嘔逆不食而成敗症者比比皆是予爲此症仔細揣摩不捨置忽見燭光遂恍然有得因思火性炎上者也何以降下于腸間而爲痢良由積熱在中或爲外感風寒所閉或爲飲食生冷所遏以致火氣不得舒伸逼迫于下裏憲而後重也醫



者不察。更用梔榔等藥下墜之。則降者愈降。而痢愈甚矣。予因
製治痢散以治痢症初起之時。方用葛根爲君。鼓舞胃氣上行。
也。陳茶苦參爲臣。清濕熱也。麥芽山楂爲佐。消宿食也。赤芍藥
廣陳皮爲使。所謂行血則便。溫自愈。調氣則後重自除也。製藥
普送效者極多。惟於腹中脹痛。不可手按者。此有宿食。更佐以
樸黃丸下之。若日久脾虛。食少痢多者。五味異功散加白芍黃
連木香清而補之。氣虛下陷者。補中益氣湯升提之。若邪熱穢
氣塞于胃腑。嘔逆不食者。開噤散散之。若久痢變爲虛寒。四肢



厥冷脈微細飲食不消者附子理中湯加桂溫之矣久痢必傷腎不爲溫煖元陽誤事者衆矣可不謹歟

治痢散 峩治痢疾初起之時不論赤白皆效

葛根

苦參

陳皮

陳松蘿茶

各一
觔

赤芍

酒炒

麥芽

炒

山楂

炒各十

二兩

右爲細末每服四錢水煎連末藥服下小兒減半忌葷腥麪

食前炒開氣發氣諸物本方加川連四兩尤效

樸黃丸 治痢疾初起腹中實痛不得手按此有宿食也宜下

之

陳皮 厚朴 姜汁炒条 大黃一觔四

十二兩 十二兩 沒酒蒸

廣木香 四兩

荷葉水盞爲丸如葵豆大每服三錢開水下小兒二錢

五味異功散

卽六君子湯除半夏見類中門

補中益氣

見類中

開噤散 治嘔逆食不入書云食不得入是有火也故用黃連

痢而不食則氣益虛故加人參虛人久痢並用此法

人參

川黃連

姜水炒

各五分

石菖蒲

七分不
見鐵



丹參 三錢 石蓮子 去壳卽建蓮
中有黑壳者

冬瓜仁 去壳一錢五分

茯苓

陳皮

陳米一撮

冬瓜仁

去壳一錢五分

荷葉蒂二箇

水煎服

附子理中湯 見中寒門

泄瀉

書云濕多成五瀉瀉之屬濕也明矣然有濕熱有濕寒有食積
有脾虛有腎虛皆能致瀉宜分而治之假如口渴溺赤下瀉腸



垢濕熱也。溺清口和下瀉。清穀濕寒也。胸溝痞悶。愛腐吞酸瀉。

下穀食積也。食少便頻。面色㿠白。脾虛也。五更天明依常作。

瀉腎虛也。治瀉神水散主之。寒熱食積隨症加藥。脾虛者。香附

六君子湯。腎虛者。加減七神丸。凡治瀉須利小便。然有食積未
消者。正不宜利小便。必俟食積既消。然後利之。斯爲合法。

神水散

見類中

燥濕理脾。消積滯。爲止瀉之良藥。濕熱加連翹。

濕寒

加炮薑木香。食積。加山楂麥芽神曲。

香砂六君子湯

見類中

治脾虛作瀉。挾寒者。加薑桂。甚加附子。

加味七神丸 止腎瀉如神

肉豆蔻 韶囊 煥 味
吳茱萸 去梗湯 泡七次

廣木香 各一
兩

補骨脂 咸酒炒
二兩

白朮 陳土炒
四兩

茯苓 蒸二
兩

車前子 去壳蒸
二兩

熱湯盞爲丸每服三錢開水下

瘧疾

瘧者。暴瘧之狀。因形而得名也。經曰。陰陽相搏。而瘧作矣。陰搏陽。而爲寒。陽搏陰。而爲熱。如二人交爭。此勝則彼負。彼勝則此



南京中医药大学图书馆版行所

負陰陽互相勝負故寒熱並作也善治瘧者調其陰陽平其爭
勝察其相兼之症而用藥得宜應手可愈大法瘧症初起香薷
散散之隨用加減小柴胡湯和之二三發後止瘧丹截之久瘧
脾虛六君子湯加柴胡補之中氣下陷補中益氣湯舉之元氣
既回瘧症自止書云一日一發者其病淺兩日一發者其病深
三日一發者其病尤深然而寒熱往來總在少陽久而不愈總
不離乎脾胃蓋胃虛亦惡寒脾虛亦發熱也疎理少陽狀助脾
周治瘧無餘蘊矣

香薷散見傷寒大陽症

加減小柴胡湯 治瘧症之通劑須按加減法主之

柴胡

秦艽

赤芍各一錢

甘草

五分

陳皮

一錢
五分

生薑一片桑枝二錢水煎服。熱多者加黃芩一錢。寒多者加黑薑五分。口渴甚者加知母一錢貝母一錢五分。

嘔惡加半夏茯苓各一錢砂仁七分生薑二片。汗少者加荆芥一錢川芎五分。汗多者祛秦艽咸柴胡一半加人參



一錢白朮一錢五分。少食停滯胸膈飽悶加麥芽神曲四
查厚朴各一錢。如欲止之加白蔻仁八分鱉甲醋炙二錢
更另用止瘧丹一二丸截之神效。若體虛氣弱加人參五
錢白朮各二錢當歸茯苓各一錢。久病成瘧母加白朮一

錢木香枳實各五分鱉甲二錢。

止瘧丹 治瘧症二三發後以此止之應手取效

常山火酒炒 草菓仁去壳姜汁炒 半夏曲姜汁炒

香附米酒炒 青皮去穰醋炒 各四兩

真六神麩十二兩爲末、用米飲煮糊爲丸如彈子大、殊妙爲
衣輕者一丸重者二丸、紅棗五六枚煎湯化下、清晨面東空
腹服。

六君子湯 補中益氣湯 俱見類中

瘧久變虛宜用前二方主之、但真虛者多扶寒須加肉桂附
子炮姜砂仁之類溫補元氣而克收功。

論水腫鼓脹

問曰水腫鼓脹何以別之答曰目窠與足先腫後腹大者水也

先腹大後四肢腫者脹也然水腫亦有兼脹者脹亦有兼水者
須按其先後多寡而治之今分爲兩門治者宜合參焉

水腫

水腫症有表裏寒熱腎胃之分大抵四肢腫腹不腫者表也四
肢腫腹亦腫者裏也煩渴口燥溺赤便閉飲食喜涼此屬陽水
熱也不煩渴大便自調飲食喜熱此屬陰水寒也先喘而後腫
者腎經聚水也先腫而後喘或但腫而不喘者胃經蓄水也經
云腎者胃之關也關閉則水積然胃病而關亦自閉矣治胃者



五皮飲加減主之。治腎者。腎氣左加減主之。或問。書云先喘後腫。其病在肺何也。答曰。喘雖肺病。其本在腎經云。諸痿喘喝皆屬於下是也。若外感致喘。或專屬肺經受邪。內傷致喘。未有不由于腎者。治者詳之。

累驗。

五皮飲 治胃經聚水。乃通用之劑。華陀中藏經之方也。累用

大腹皮 黑豆
桑白皮 各一錢
汁洗

茯苓皮 八分
生姜皮 八分

陳皮

水煎服。仲景云腰以上腫宜發汗加紫蘚秦艽荆芥防風
腰以下腫宜利小便加赤小豆赤茯苓澤瀉車前子草薢附
子若大便不通宜下之加大黃葶苈腹中脹滿加葛子厚朴
陳皮麥芽山楂。體虛者加白朮人參茯苓。審是陰水加
附子乾姜肉桂。審是陽水加連翹黃柏黃芩。挾痰者加
半夏生姜既消之後宜用理中湯健脾實胃或以金匱丸溫
煖命門或以六味加牛膝車前滋腎水清餘熱庶收全功

附子理中湯

見中寒

金匱腎氣丸

治腎經聚水。小便不利。腹脹肢腫。或痰喘氣急。

漸成水蠱。其效如神。然腎經聚水亦有陰陽之分。不可不辨。

也。經云。陰無陽無以生。陽無陰無以化。經又云。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。假如腎經陽虛。陰無以生。真火不能制水者。宜用此丸。假如腎經陰虛。陽無以化。真陰不能化氣者。宜用本方去附桂。主之。東垣云。土在兩中化爲泥。陰水之象也。河潤云。夏熱之甚。庶土蒸溽。陽水之象也。知斯意者。可以治水矣。

大熟地 八兩 山藥 四兩

山萸肉

丹皮

澤瀉

車前子

牛膝 各二兩

茯苓 六兩

肉桂 一兩

附子

一兩虛寒甚者倍之

用五加皮八兩煮水一大碗濾去渣和藥加煉蜜爲丸如桐子大每早開水下四錢。前症若屬陰虛本方祛桂附加文蛤牡蠣各二兩濕熱甚者加黃柏五錢不用五加皮以蓮子八兩熬汁代之。

論血水分

婦人經水先斷後發腫者名曰血分通經丸主之。先發水腫然後經斷者名曰水分五皮飲送下通經丸主之。

通經丸

當歸尾 赤芍藥 生地黃 川芎

牛膝 五靈脂 各一 紅花 桃仁 各五
兩 錢

香附 二兩 琥珀 七錢五分

蘿水屑二兩煎酒和砂糖熬化爲丸如桐子大每服三錢酒下。體虛者用理中湯送下。若血寒加肉桂五錢。

鼓脹

或問方書有鼓脹蠱脹之別何也答曰鼓者中空無物有似於鼓蠭者中實有物非蠭卽血也中空無物填實則消經所謂塞因塞用是已中實有物消之則平經所謂堅者削之是已然脹滿有寒熱虛實淺深部位之不同若不細辨何由取效假如溺赤便閉脈數有力色紫黑氣粗厲口渴飲冷唇焦舌燥多屬於熱假如溺清便溏脈細無力色㿠白氣短促喜飲熱湯舌潤口和多屬於寒又如腹脹按之不痛或時脹時減者爲虛按之愈

痛。腹。脹。不。減。者。爲。實。凡。脹。滿。飲。食。如。常。者。其。病。淺。飲。食。減。少。者。
其。病。深。且。脹。有。部。分。縱。是。通。腹。脹。滿。亦。必。有。脹。甚。之。部。與。病。先。
起。處。即。可。知。屬。何。藏。腑。而。用。藥。必。以。之。爲。主。東。垣。治。脹。滿。不。
枳。木。補。中。二。方。出。入。加。減。寒。熱。攻。補。隨。症。施。治。予。因。製。和。中。丸。
普。送。效。者。甚。多。有。力。者。當。修。合。以。濟。貧。乏。又。氣。虛。中。滿。宜。用。白。
术。丸。而。以。六。君。子。湯。佐。之。中。空。無。物。不。用。枳。實。恐。傷。氣。也。

枳。实。丸。除。脹。消。食。

枳。實。一。兩。
麪。炒。

白。术。二。兩。
土。炒。

共爲末荷葉包爛飲煨透杵和爲丸每服一錢開水下

補中益氣湯

見類中

和中丸

白术
陳土炒四兩

茯苓
一兩五錢

枳實
炒二兩

陳皮
三兩

麥芽
炒

山楂
炒

香附
姜汁炒二兩

半夏
姜汁炒一兩

丹參
酒蒸二兩

五穀蟲
炒焦黃色三兩酒拌

荷葉一枚煎水盞爲丸每日上午下午開水下二錢此方不



寒不熱和平之治法也。若寒氣盛加乾姜吳萸肉桂。

濕熱盛加黃連連翹。若大便閉結先用三黃枳术丸下之。

隨用本方漸磨之。若兼瘀血加厚朴赤芍。若脾虛氣弱。
用六君子湯不服此丸或以補中益氣湯送下此醫門之秘
法不可不講。

白术丸 治氣虛中滿

南星 白术

茯苓

陳皮 各二兩

砂仁

共神末各一兩
五錢

四兩

水煎服

用荷葉老米煎水盞爲丸每服三錢開水下

三黃枳术丸 治熱食所傷肚腹脹痛並濕熱脹滿大便閉結

者

黃芩

一兩
酒炒

黃連

四錢
酒炒

大黃

七錢五分
酒蒸神曲炒

枳實

炒
薑炒

白米

陳土
炒

陳皮

各五
錢

荷葉煎水盞爲丸如菉豆大每服一錢五分或二三錢量人

虛實用

六君子湯 見類中



中国中医药大学图书馆版权所有

積聚

積者推之不移成於五臟多屬血病聚者推之則移成於六腑多屬氣病治積聚者當按初中末之三法焉邪氣初客積聚堅宜直消之而後和之若積聚日久邪盛正虛法從中治須以補瀉相兼爲用苦塊消及半便從末治卽佳攻擊之藥但和中養胃導達經脈俾榮衛流通而塊自消矣更有虛人患積者必先補其虛理其脾增其飲食然後用藥攻其積斯爲善治此先補後攻之法也初治太無神功散主之肺治之中丸主之末治

理中湯主之予嘗以此三法互相爲用往往有功

太無神功散 治痞積不拘氣血飲食蟲積痰水皆效

地扁蓄 瞽麥穗 大麥芽 各五錢
二錢 神曲 五分

沉香 木香 各一錢
五分 甘草 炙五錢
大黃 酒蒸 二兩

右爲細末每服二三錢燈心竹葉煎湯及無灰酒調服女以
燈心紅花當歸煎湯及無灰酒送下忌油膩動氣之物及房
室一月藥須黃昏服勿食晚飯大小便見惡物爲度

和中丸 見鼓脹書云肝之積在左脇下名曰肥氣加柴胡鼈甲



南京中医药大学图书馆版权所有

青皮、莪术肺之積。在右脇下。名曰息竇。加白蔻仁、桑白皮、蠶殼。金心之積。起脣上。上至心下。大如臂。名曰伏梁。加石菖蒲、厚朴、紅花、莪术脾之積。在胃脘。腹大如盤。名曰痞氣。加厚朴、鬚之積。在脣下。發於小腹。上衝心而痛。名曰奔豚。另用奔豚丸。主之。熱積。加黃連、黃芩。寒積。加肉桂、乾姜。附子酒積。加葛根、痰積。加半夏水積。加桑白皮。赤小豆血積。加桃仁、紅花、乾漆。肉積。加阿魏。山楂。

奔豚丸

川棟子 煨去肉

茯苓

橘子

鹽酒炒各一兩

肉桂 三錢

附子 炮

吳茱萸

湯泡各五錢七次

荔枝子 煨八錢

小茴香

木香 各七錢

熬砂糖爲丸每服二錢淡鹽湯下若有熱者去附桂
理中湯見中寒

疝氣

疝者少腹痛引睾丸也經云任脈爲病男子外結七疝女子帶
下瘕聚七疝者一曰衝疝氣上衝心二便不通也二曰狐疝臥



則入腹立則出腹也。三曰癰。疽陰囊腫大如升如斗也。四曰癰。疽肝氣上逆也。五曰痕。疽腹有癥痞痛而熱時下白濁也。六曰癢。疽內裏膿血也。七曰癰瘡。疽內裹膿血小便不通也。愚按：疽卽衝疽，癰瘡卽癰疽。其名有七，其實五者而已。疽之根起于各臟，而歸併總在厥陰。以肝主筋，又主痛也。治疽之法，非一而分別不外氣血氣。則遊走不定，血則凝聚不散也。橘核丸加減主之。

橘核

二兩 塩酒炒

小茴香

川棟子

煨去
肉 桃仁 去皮尖及
雙仁者炒

香附

醋炒

山楂子

炒各一兩

廣木香

紅花 各五錢

以神曲三兩打糊爲丸。每服三錢。衝疝用白茯苓一錢松子仁三錢煎湯送下。狐疝用當歸二錢牛膝一錢五分煎酒送下。癩疝用白茯苓陳皮赤茯苓各一錢煎湯送下。厥疝治同衝疝。瘕疝用丹參白茯苓各一錢五分煎湯送下。癰疝本方內加五靈脂一兩醋炒赤芍一兩五錢酒炒服時用牛膝一錢五分當歸尾三錢煎酒送下。癰瘍疝治

法同上。此症若寒氣深重、本方內加吳茱萸肉桂心各五錢、甚則加附子一枚。若表寒束其內、熱腹痛熱辣、或流白濁者、本方內加黑山梔五錢、川萆薢一兩、吳茱萸三錢、湯泡七次、吳萸散表寒、山梔清內熱、二者并行、丹溪心法也。

小腸氣者、臍下轉痛、失氣則快。

膀胱氣者、臍熱痛濇于小便卽胞溼也。

癥者、狀如弓弦筋病也。

癰者、隱伏于內、疼痛着骨也。



癥者有塊可癥血病也

瘕者假也忽聚忽散氣病也

以上諸症雖作痛不引睾丸故不以疝名之。然而治法可以彷彿前丸加減或輕或重因時制宜也。

痰飲

凡病未有不發熱不生痰者。是痰與熱乃雜病兼見之症似無容專立法門矣。然亦有雜病輕而痰飲重則帶以痰飲爲主治。書有五痰之名。以五臟分主之也。五飲之名隨症見也。其實猶

未確當。大抵痰以燥濕爲分飲。以表裏爲別。濕痰滑而易出。多生於脾。脾實則消之。二陳湯甚。則滾痰丸。脾虛則補之。六君子湯。兼寒兼熱隨症加藥。燥痰滯而難出。多生於肺。肺燥則潤之。貝母瓜蔞散。肺受火刑不能下降。以致真水上泛。則滋其陰。六殊丸。飲有在表者。乾呕發熱而咳。面目四肢浮腫。杏蘿五皮散。飲有在裏者。或停心下。或伏兩腋。咳則相引而痛。或走腸間。轆轤有聲。用小半夏加茯苓湯。隨其部位而分治之。此治痰飲之大法也。書云。膏痰須理脾。以痰屬濕。脾土旺。則能生耳。治痰

如此飲亦宜。然脾經痰飲，當健脾以祛其濕。若腎虛水泛爲痰，爲飲者，必滋其腎。腎水不足，則用六味。若命門真火衰微寒痰上泛者，則用八味。腎氣九補火生土，開胃家之關導泉水下流而然飲自消矣。

二陳湯

半夏

茯苓

陳皮

去白各一錢

甘草

炙五分

生薑二片、大棗二枚煎服。加入參白朮各一錢，名六君子湯。

湯

滾痰丸 治實熱老痰變生怪症

大黃

蒸片刻

黃芩

炒各四錢

青礞石

硝煅金色

沉香

細剉各三錢

辰砂

細研水飛二錢

冰查爲丸辰砂爲衣每服一二錢開水下此藥但取痰積並
不刮腸大瀉爲老痰要藥

貝母瓜蔞散

貝母

一錢五分

瓜蔞

一錢

花粉

茯苓

橘紅

各八分

桔梗

各八分



南京中医药大学图书馆版权所有

水煎服

香薷散 見太陽症 五皮飲 見水滯

小半夏加茯苓湯 見傷寒、咳嗽

六味丸 十味腎氣丸 即八味丸加車前牛膝並見類中門

嘔吐噦 呃逆

嘔者聲與物俱出。吐者有物無聲。噦者有聲無物。世俗謂之乾嘔。東垣以此三者皆因脾胃虛弱或寒氣所客或飲食所傷以致氣逆而食不得下也。香砂二陳湯主之。然嘔吐多有屬火者。



南京中医药大学图书馆版权所有

經云食不得入。是有火也。食入反出。是有寒也。若拒格飲食。漸澗不入者。必用薑水炒黃連以開之。累用累效。至于食入反出。固爲有寒。若大便閉結。須加血藥以潤之。潤之不去。宜蜜煎導而通之。蓋下竅開。上竅卽入也。其有因脾胃虛弱而吐者。補中爲主。理中湯。其有因痞積滯礙而吐者。消積爲主。和中丸。若命門火衰。不能生土者。補火爲主。八味丸。復有呃逆之症。氣自臍下直衝上。多因痰飲所致。或氣鬱所發。扁鵲丁香散主之。若火氣上衝。橘皮竹茹湯主之。至於大病中見呃逆者。是謂土敗木

賊爲胃絕多難治也。

二陳湯

見痰飲

通治嘔吐噦隨症加減。

前症若脾胃虛弱加人參白朮若寒氣所侵加薑桂甚加附子若飲食所傷加山楂麥芽神曲香附砂仁藿香若飲食冲口而出不得入者是爲有火加黃連山梔若大便結燥加當歸黃芩知母若有積滯宜兼服和中丸。

理中湯

見中寒

和中丸

見蠭脹

八味丸

見類中

扁鵲丁香散

見傷寒呃逆

擒皮竹茹湯

陳皮

去白
二錢

竹茹

一錢

半夏

八參

甘草

各一
錢

水煎服

三消

經云渴而多飲爲上消。消穀善肌爲中消。口渴小水如膏者爲下消。三消之症皆燥熱結聚也。大法治上消者宜潤其肺兼清其胃。二冬湯主之。治中消者宜清其胃兼滋其腎。生地八物湯主之。治下消者宜滋其腎兼補其肺。地黃湯。生脈散並主之。夫



上消清胃者使胃火不得傷肺也。中消滋腎者使相火不得攻
胃也。下消清肺者滋上源以生水也。三消之治不必專執本經。
而滋其化源則病易痊矣。書又云飲一溲一或飲一溲二。病勢
危急。仲景用八味丸主之所以安固腎氣也。而河潤則用黃蓍
湯和平之劑大抵肺腎虛而不寒者宜用此法。又按仲景少陰
篇云腎經虛必頻飲熱湯以自救乃同氣相求之理。今腎經虛
寒則引水自灌虛寒不能約制故小便頻數似此不必與消症
同論。宜用理中湯加益智仁主之。然予嘗見傷暑發喘之症。小



便極多。不啻飲一而溲一者。用六味加知柏而效。可見此症。又由腎經陰虛而得治。宜通變正當臨症制宜。未可一途而取也。

二冬湯 治上消

天冬二錢

麥冬三錢

花粉一錢

黃芩一錢

去心

去心

知母一錢

甘草五分

人參五分

荷葉一錢水煎服

生地八物湯 治中消

生地三錢

山藥一錢

知母一錢

五分

麥冬二錢

黃芩

錢

黃連

一錢

黃柏

一錢

丹皮

一錢

荷葉二錢水煎服

六味地黃湯

見類中

生脈散

麥冬二錢 人參一錢

北五味十五粒

水煎服

八味丸 即六味加桂附

黃耆湯 治肺腎兩虛飲少溲多



南京中医药大学图书馆版权所有

黃蓍三錢

五味子一錢

人參一錢

麥冬

枸杞子

大熟地各一錢

五分

水煎服

理中湯見中寒

熱淋

淋者小便頻數不得流通溺已而痛是也大抵由膀胱經濕熱

所致然淋有六種一曰石淋下如砂石有似湯瓶久在火中底

結白碱也益元散加琥珀末主之二曰膏淋滴下濁液如脂膏



南京中医药大学图书馆版权所有

也草薢飲主之三日氣淋。氣滯不通。水道阻塞。膀胱下妨悶脹痛。是也恨蘿散主之四日血淋。瘀血停蓄。膀胱中割痛難忍。是也。生地四物湯加紅花。桃仁。花蕊石主之。或兼服代抵當丸。五日勞淋。勞力辛苦而發。此爲氣虛。以至氣化不及。州都補中益氣湯主之。六日冷淋。寒氣堅閉。水道不行。其症四肢厥冷。口鼻氣冷。喜飲熱湯。是也。金匱腎氣湯主之。更有過服金石熱藥。敗精流注。轉而爲淋者。又老人陰已衰而思色以降其精。則精不出而內則以致大小便痛如淋。愈痛則愈。便愈則愈。痛宜用前

草薢飲去黃柏加菟絲遠志導去其精然後用六味地黃湯補之方爲有益淋症多端未可執一而論也。

益元散

見類中

草薢食

治膏淋並治諸淋

草薢

三錢

文蛤粉

研細

石華

茯苓

一錢

燈心

二十
節

蓮子心

石菖蒲

軍前子

石菖蒲

黃柏

名八
分

穀穉散

涼氣淋



荆芥

陳皮

香附

麥芽炒

瞿麥

木通

赤茯苓

各等分爲末每服三錢開水下

生地四物湯節四物湯以生地易熟地方見虛勞

代抵當丸

生地

當歸

赤芍

各一兩

川芎

五靈脂

各七錢

大黃

一兩五錢酒蒸

砂糖爲丸每服三錢開水下

稍稍中益氣湯 見類中

金匱腎氣湯 見水滸

小便不通 關格 孕婦轉脬

小便不通

關格

孕婦轉脬

小便不通謂之癃閉。癃閉與淋症不同。淋則便數而革痛。癃閉則小便點滴而難通。東垣云渴而小便不利者。熱在上焦氣分也。宜用四苓散加山梔黃芩等藥以分利之。若大便亦閉。加大黃元明粉之類。不渴而小便不利者。熱在下焦血分也。宜用滋陰化氣之法。若滋腎丸之類是已。大法無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。下元真陰不足。則陽氣不化。必滋其陰。若下元真



中國醫藥大學圖書館藏
1951

陽不足。則陰氣不生。必補其陽。譬如水腫鼓脹。小便不通者。服金匱。腎氣丸。而小便自行。陰得陽以生也。復有除桂附服之。而亦效者。陽得陰而化也。此陰陽氣化之精義也。更有小便不通。因而吐食者。名曰關格。經云。關則不得小便。格則吐逆。關格者。不得盡其命矣。宜用假蘿散治之。又丹溪治孕婦轉脬。小便不通者。用補中益氣湯。隨服而探吐之。往往有效。譬如滴水之器。上竅閉。則下竅不通。必上竅開。然後下竅之水出焉。丹溪初試此法。以爲偶中。後來屢用。屢驗。遂特爲救急良法。每見今人治。



轉脬症投補中益氣而不爲探吐且曰古法不效有是理乎予嘗用茯苓升麻湯治此有驗。蓋用升麻以舉其胎氣用茯苓以利小便用歸芍以活其胎用苧根理胞絲之繩亂此以升麻爲通之法也。附錄於此以俟明哲。

四苓散卽五苓散去桂枝
方見太陽府病

滋腎丸

黃柏炒褐色 知母蒸熟去皮 二兩 淬桂去皮一錢

蜜丸如梧桐子大每服七八十九粒開水下

伏苓升麻湯

伏苓 赤白各一錢
五錢 升麻 一分
五分

川芎 一錢
芍根 三錢

滌水流水煎服。或調琥珀末一錢服更佳。

大便不通 大小腸交 遺尿 脫肛

經曰：北方黑色。入通于腎。開竅於二陰。是知腎主二便。腎經溢

液乾枯。則大便閉結矣。然有實閉虛閉熱閉冷閉之不同。如陽明胃實。燥渴譖語。不大便者。實閉也。小承氣湯下之。若老弱人精血不足。新產婦人氣血乾枯。以致腸胃不潤。此虛閉也。四肢湯加松子仁。柏子仁。肉蔻。蕤柏子仁。乳之類。以潤之。或以蜜煎導而通之。若氣血兩虛。則用八珍湯。熟閉者。口燥唇焦。舌胎黃。小便赤。喜冷惡熱。此名陽結。宜用清藥及攻下之法。三黃枳术丸主之。冷閉者。唇淡口和。舌胎白。小便清。喜熱惡寒。此名陰結。宜用溫藥而兼潤燥之法。理中湯加歸芍主之。凡虛人。不大便。

未可勉强逆之。大便雖閉腹無所苦。但與潤劑積久自行不比。
傷寒邪熱消爍津液。有不容刻緩之勢也。予嘗治老人虛閉數
至圊而不能便者。用四物湯及滋潤藥加升麻。瘦試屢驗。此亦
救急之良法也。

大小腸交陰陽拂逆也。大便前出小便後出名曰交腸五苓散
主之。復有老人陰血乾枯。大腸結燥。便溺俱自前出。此非交腸。
乃血液枯涸之徵氣血衰敗之候也。多服大劑八珍湯或可稍
延歲月耳。



遺尿有二症。一因脾胃虛弱。倉廩不固。腸滑而遺者。一因火性急速逼迫而遺者。宜分別治之。脾虛理中湯。火盛芍藥甘草湯。

加黃連。

脫肛亦有二症。一因氣虛下陷而脫者。補中益氣湯。一因腸胃有火腫脹下脫者。四物加升麻黃芩荷葉之屬。

小承氣湯

見傷寒少陰經症

四物湯

見虛勞

蜜煎導法

見傷寒

八珍湯

見虛勞

三黃枳术丸

見腹痛

理中湯

見傷寒中寒門

五苓散

見太陽腑病

芍藥甘草湯

見腹痛

補中益氣湯

見類中

小便不禁

經云膀胱不利爲癃。不約爲遺漏。所以不約者其因有三。一曰肝熱。肝氣熱則陰挺失職。書云肝主疏泄。是已。加味道遙散王之二曰氣虛。中氣虛則不能統攝。以致遺漏。十補湯主之。大抵老幼多見此症。悉屬脬氣不固。老人挾寒者多嬰兒。挾熱者衆。挾寒者用本方。挾熱者六味地黃丸。三曰腎敗。狂言反目。溲便。



南京中医药大学图书馆版权

自遺者此腎絕也傷寒日久見之多難救中症見之隨用大劑附子理中湯頻灌間有得生者蓋暴脫者可以暴復若病勢日深則不可爲也然中症亦有陰虛而遺溺者不宜偏用熱藥治者詳之

加味逍遙散

見類中

牛全大補湯

見虛勞

六味地黃丸

見虛勞

附子理中湯

見中寒

便血

便血症有腸風有臟毒有熱有寒病人臟腑有熱風邪乘之則

下鮮血此名腸風清魂散主之。若腸胃不清。下如魚腸或如豆
汁。此名臘毒。芍藥湯主之。凡下血症脈數有力。唇焦口燥。是
異熱。是爲有火。宜用前方加黃芩。丹皮。生地之屬。若脈細無力。
唇淡口和。喜熱畏寒。或四肢厥冷。是爲有寒。宜用溫藥止之。理
中加歸芍主之。若便久不止。氣血大虛。宜用歸脾十全輩。統血
歸經。血本屬陰。生於陽氣。治者宜滋其化源。

清魂散

荆芥 三錢

當歸 五錢



中医大学图书馆藏

水煎服

守藥湯 見腹痛

理中湯 見中寒

歸脾湯

十全大補湯 俱見虛勞

尿血



心主血。心氣熱。則遺熱於膀胱。陰血妄行而溺出焉。又肝主疏泄。肝火盛。亦令尿血。清心阿膠散主之。平肝加味逍遙散主之。若久病氣血俱虛而見此症。八珍湯主之。凡治尿血不可輕用正清藥。恐積瘀於陰莖。痛楚難當也。

阿膠散

阿膠水化開冲
服一錢 丹參

生地各二錢

黑山梔

丹皮

血餘即亂髮燒
灰存性

麥冬

當歸各八分

水煎服

加味道遙散見類中

八珍湯見虛勞

實學心悟第三卷終



南京中医药大学图书馆版权所