

醫宗說約小兒科卷之五

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏述

天池自得子毛漢迎方來氏叅

長洲學人馬化龍凌凡氏

姚江後學毛惠公威氏

訂

小兒色診說

夫女子稟少陰之氣而生合少陽之數而化丈夫逢少陰之數而化稟少陽之氣而生少陽之數次于七故女子二七癸至可爲人母少陰之數次于八故男子二八精通可爲人父若是則

醫宗說約小兒科卷之五

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏述

天池自得子毛漢迎方來氏叅

長洲學人馬化龍凌凡氏

姚江後學毛惠公威氏

訂

小兒色診說

夫女子稟少陰之氣而生合少陽之數而化丈夫逢少陰之數而化稟少陽之氣而生少陽之數次于七故女子二七癸至可為人母少陰之數次于八故男子二八精通可為人父若是則

爲成人診以大方脈法如未至二七十四歲二八十六歲之歲惟以

小兒論不可與大人同日語矣錢仲陽云若憑寸口之浮沉必

乃橫亡于孩子故小兒半歲之際心鑑有按眉端之法甚善兼

辨脈紋以斷病自此以後未及三週者錢氏看三關察五色辨

脈紋是法尤不可廢三歲以下始以脈診焉然亦不過以一指

按高骨分其三部定其息數而已若再加一二歲方以一指袞

轉尋其三部以關爲準七八歲移指少許自九歲而後診以

指次第依三關部位尋取其浮沉遲數陰陽冷熱自無遜情矣

從此而至二七二八之歲方以三指照內經脈法診之古人云

寧醫十老人莫醫一小兒老人雖榮衛俱衰而口尤可宜小兒
既血氣未足又兼口不能言苟其疾病惟賴三關面色而洞其
臟腑之微不亦難乎

心鑑按眉端法

小兒半歲者以名中食三指按干髮際額前眉端之間兒頭在
左舉右手頭在右舉左手食指爲上中指爲中名指爲下三
指俱熱主傷風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽 三指俱冷主外感風
寒內傷飲食發熱吐瀉一食中二指熱主上熱下冷一名中二
指熱主夾驚之候 食指熱指胸中氣滿乳食不消

癖成泄瀉嘔吐白色進異色主臟初患驚瀉印堂青青黑腹病

夜啼頻淡白泄瀉食不化紅主啼哭被火驚黑色見時為客忤

二次受驚三根青或驚後發燥三根黑黃死來侵年壽乎陷亦主天

青色發熱更生驚黑主瀉痢紅主燥俱微黃隱隱始為乎黃甚

亂傷乳胃逆人中黃青主下痢乳食妨噯氣酸腐食不進黑色

蟲痛定須防 食時被驚承漿青黃主吐逆血痢因黑色驚風

須急救額長腎足壽元形吐血便血唇色白或吐嘔涎沫乾燥而

皺脾熱極消渴煩熱并不寐大便不通下之則 兩眼黑睛黃

主執白睛黃時食積訣主疳病黃疸白睛青時主驚風黑睛紅黃傷

寒劫 兩眉青色是為平紅主煩燥夜啼勤黃主霍亂并吐瀉

久痢紅者定傷人 兩顴赤色肺有熱 太陽青時二次驚青

自太陽入耳死紅色見時主血淋 客忤之病兩臉青食痰喘

急黃色親赤主風執須發散 兩頰赤時傷寒導 額間赤色

心經執煩燥驚悸不必說青黑腹痛又驚風癎瘓叫啼何時歇

微黃驚疳自古傳純黑之時命已絕 左臉青赤肝風熱項張

煩悶病之訣驚搐腹痛定黑青細心推看心能決 風邪發熱

右臉赤咳嗽便閉并氣急青白惡心或咳嗽青黑驚風腹痛極

或盤腸 脾胃執極鼻色赤小便不通深黃色鼻中乾燥及氣粗

衄血之症因而得脾虛泄瀉若何形乳食不化鼻淡白脾上受
 寒色白青木尅黑為死候君須識 小便不通額間赤膀胱與

腎氣蒙熱結則 耳後微赤尿少鳴本經風熱宜知悉睡中驚悸

若咬牙微黃之色法無矢 耳輪乾燥是骨蒸口渴盜汗肝執

極 兩頰青時主吐蟲古人望色從來的

虎口

三關

脉紋



第一節寅位風關

第二節卯位氣關

第三節辰位命關

虎口又手處是也

及百病說

卷之五虎口三關

四

示吉按水鏡曰寅關脉初見易治卯關脉見病深辰關脉見者死若三關通度是為極驚虎口脉絞亂者主胃氣不和若青驚積發病

三關脉色如何斷紅黃隱隱是為常非病脉也青色為驚人與獸紅

色傷寒咳嗽搶又主水驚脾虛色黃乳不化又主雷驚紫色瀉痢執多張

白色為疴黑中惡黑王人驚紅黑相兼痢不良青多自病紅多赤痢紋如線直

青紅色乳食傷脾驚熱償左右一樣驚積發三條四散肺風痰

小兒脉法

小兒三歲方切水一指三關定數急一息七至號乎和加則為

數熱是責減則爲遲冷病侵浮則爲風沉爲積左手人迎主外
感右手氣口主內疾外候風寒暑濕傷內候痰積停乳食浮緊
無汗是傷寒浮緩有汗傷風則浮大多因風熱盛沉緩元來乳
食塞沉緊腹中痛不休弦緊喉間作氣急促急驚風搐搦主弦
滑風癇人強直大小不常鬼祟侵二便秘時脈牢實軟細之脈
有疳蟲上下失血脈芤悉虛濡主氣兼慢驚沉緩爲冷泄瀉得
沉數骨蒸時內執客忤邪氣脈弦急遲瀆胃腕自不和弦長肝
膈有風人已上脈訣出名家冉叅紋色方無失

薛立齋曰小兒血氣未實驚則氣散氣散則脈亂必當叅三

部五脈三部者面上氣色虎口脈紋寸口一指之脈五脈者

上按額前下診太衝并前三部也

心誠賦

欲保赤子金仗心誠口不能言其疾若脈難以決其浮沉外感

六邪風寒火邪易襲內因諸症心肝脾臟為多小兒多啼則傷肝多驚則傷心

多食則傷脾故三臟病多欲觀氣色失分部位左頰尿木為肝右頰尿金為

肺天庭高為心火之位承漿低為腎水之區脾土中央鼻為通

氣肝青腎黑木水之色主驚寒肺白心紅金火之色為虛熱土

色黃現疳食症多欲窮其變再察五宮鼻雖中央肺竅通聲重

鼻塞風寒可見唇雖赤色脾氣應燥腫生瘡脾熱自詳舌乃心

苗紅滑順而乾黑者熱舌乾主心熱乾黑則熱極難治目為肝竅赤腫熱而有

神者生胃流注于雙頤風熱內攻則紅腫腎開竅于兩耳腎元

僅損則黑枯槁耳經絡足少陽暴聾紅腫其過在膽牙床經絡

二陽明上床足陽明下床手陽明齒遲枯燥病歸乎腎再觀其外以知其內

已下活紅氣現而熱蒸青色露而驚悸如煤之黑兮中惡之因

似橘之黃兮脾虛之謂白乃疢勞紫為熱極青遮口角扁鵲難

醫黑掩太陽盧醫莫治年壽赤光兮多生膿血山根青色兮頻

見灾危瀉痢而帶陽者須防咳嗽而掩藍者可畏疼痛方殷面

醫宗金匱 卷之五 活幼指南 六

青唇撮眉自蹙驚風欲發面赤目直睡多驚火光燄燄外感風
寒白氣浮浮中藏癖積乍黃乍白兮疳熱連綿又赤又青兮風
邪緊急察之若精治之得理鴉聲魚口枉費精神肉拆皮乾空
勞氣力氣色頓移形容變異氣乏則脾冷腎虛則滯頤面目虛
浮定腹脹而氣喘眉毛頻蹙則肚痛以多啼虵出兮脾胃將敗
匿蟲兮肚臍先虧苟瞑眩而弗瘳總盧扁而何益手如數物兮
肝風將發面若塗硃兮心火已熾坐臥愛冷兮煩熱之攻伸縮
就煖兮風寒之畏肚大脚細兮脾欲困而成疳瞠目張口兮熱
已危而必斃弄舌脾熱解顙腎僊重舌木舌兮虛熱積于心脾

噎氣喘氣兮實火浮于肝肺齟宜息露必是牙疳哺露丁笑多
綠食積唇乾自作渴腸鳴必自利夜啼分爲四症寢蒸週于一
歲心熱欲言而不能脾虛無時而好睡病後失音者腎怯咳嗽
失音者肺痿壯痛而清水流出者蟲腹疼而大便酸臭者積口
頻撮而虛寒舌長伸而火熾龜胸兮肝火乘于肺膈鼈皆兮腎
風入于骨髓鼻乾黑燥兮火甚金衰肚大青筋兮土強土潰丹
瘤瘡疥皆胎毒之連纏吐瀉瘡痢乃食積之滯滯不能吮乳者
執在心脾常欲俯臥者火蒸脾胃喜視燈火者煩執在心愛吃
泥土者庶執在脾腹痛寒侵口瘡熱積臍風忌于一臘火丹畏

于一週驚自熱生癰因痰致吐瀉而精神好者則危瘧痢而飲
食減者則瘁驚本心生風由肝致搐合左右兮症有順逆藥分
補瀉兮病有虛實急驚也由于積熱之深涼瀉偏宜慢驚也得
于大病之後溫補爲貴頭搖目攛而氣喘兮上工莫醫口禁鼻
張而氣冷兮神丹何濟閉目兮無魂狂叫兮多祟不知吞吐者
死反加悶亂者危且如病則熱超熱則驚生或制熱以熱或攻
熱以寒襁褓未寧兮但調其母匍匐不快兮當固其元柰何瀉
久成痢積久成瘧瘧久生癰驚久成癰未致留連兮攻之宜速
已見沉痾兮治之宜緩腸胃秘結兮急瀉而已氣血虛乏兮急補

而安此皆指南之活幼何疑治病之萬全

示吉日小兒之病口不能言故曰啞科惟賴望色驗症察紋切脈以知其臟腑之微實難事也故庸工治病遂拘小兒病食上起之說概施消導攻伐之品實者偶爾中病虛者遂至重虛良可憫也卽有智者不遵古人之遺意常恃一己之聰明或致弄巧而成拙以致智愚相去其間不能以寸此故維何皆因不辨明其寒熱虛實外感內傷之故也子不揣愚陋將六症分朋于後一見了然使無疑似之嫌如兼他症隨症加減又存司命者之方寸耳

凡見小兒頭疼發熱鼻塞聲重咳嗽手皆熱惡風寒皆屬外感無汗脉浮緊傷寒自汗脉浮緩傷風暑月吐瀉作渴齒燥脉虛傷暑浮腫洩瀉身重小便不利脉濡細傷溼舌乾口燥唇焦面赤或啞脉數傷熱

凡見小兒噯氣飽悶作酸腹膨不思食及惡聞食氣下洩臭屁惡心乍吐乍瀉或寒熱或腹中硬塊作痛手心熱脉弦滑俱屬內傷飲食 已上二症最多

凡見小兒發熱無汗表實大便閉裏實心胸飽悶腹中膨脹惡心愛氣吐出酸水手足有力腹痛手不可按 脉洪實有

力俱尿實症

凡見小兒面恍白無神懶言氣短不思食腹膨不痛工便如常喜臥服喜閉手足無力慢驚久吐胃虛久瀉脫肛脾虛自汗表虛自痢裏虛脉來微細無力及行遲髮遲齒遲解顛鶴節俱尿腎氣未成元積不足 已上俱尿虛症

凡見小兒發熱手足心熱面紅唇乾舌乾口渴口上生瘡口中熱臭大便秘小便赤黃或痢下黃赤肛門焦痛喜飲冷水喜就涼處腹中熱痛 脉來洪數 俱屬熱症

凡見小兒面白唇青手足冷口中冷氣或泄痢清自無熱不

渴腹痛悠悠無增減或惡心嘔吐喜就煖處 脈來沉遲無

力 但屬寒症

已上諸症每症不必悉具凡見一二便作主張治之若二症
三症兼見者須照本條斟酌盡善自能中病也

小兒百病歌

初生小兒宜珍攝温涼得體自和悅 初生小兒宜用老人舊衣
故作衣衫 宜氣相滋令兒

有壽夏月宜夾衣獨卧冬月宜窠薄綿襖置大人懷中以就暖
氣因平兒陽氣尚微即養重喪其陽氣不能自較多致凍壞也

冬月初生黃連
忌用木寒故也 三朝內服此毒丹名爲開乳解胎熱臍帶落後

須炙乾硃砂相和爲細屑最能稀痘更還元胎毒胎熱從此絕

脘帶落後置新瓦上用炭火因圍燒至烟將盡放地上用瓦蓋
蓋之存性每未預用透明硃砂未水飛過如脘帶灰四分硃砂
未二分和勻煎生地當歸濃汁少許調和前二味抹見土膠間
及乳母乳頭上一日之內服盡次日大便遺下穢物終身無疾

矣滿月之後有變蒸微寒微熱吐現生唇有白泡三日愈若來

風寒逐樣等變者異常蒸者發熱小見自此氣血發榮性情有
異一二口其熱自退若爽他症而不愈有食則消

食是風則行厥有驚則安神可也若
變蒸面妄投藥餌則壞人最大慎之

眼閉面赤名胎熱焦啼煩燥熱不歇口中
氣熱甘草一錢黑豆及燈心

七莖豆
二錢竹葉七葉煎湯頻頻呷乳母
亦服面色青白四肢寒口冷腹痛

胎寒說當歸黃芩及桂心細辛龍骨白芍訣等分為未服一匙

乳汁調下寒能絕此症見大便青黑身起
寒燥因母孕時受寒入

卷之五小兒百病

臍帶斷後風濕傷臍腫硬直臍風殃臍有青筋冲心者燈火急

救始無妨臍有青筋行肚却分兩岔行至心者必死急用灯草蘸油然火自青筋頭并行盡處燎之外再灸中脘三

壯內服小紅丸以泄胎毒五通膏貼功誠妙生地生姜葱自當小子田螺各

等分五件共擣搭臍傍敷臍四傍一指厚拘住一時有屁下泄即愈一用田螺人麝擣爛敷腫上亦消

風邪入臍心脾熱唇青舌強撮口訣齒根上下粟未瘡青布蘸

水擦破截小兒口撮緊閉不吮乳皆因齒根生小泡子痛極也青布蘸雪水擦破即開口便安甚者用牛黃一分為

未竹歷調滴人口中即愈一用龍骨為極細末敷之

急驚

小兒急症急驚風緊閉牙開氣不通壯熱涎潮目窳反張搐

榻頰唇紅二便閉結法當下驅痰清火有神功輕用小牛黃丸重用小紅丸若

不後不止夢中驚悸宜玉樞丹驚定即當調胃氣莫仍尅伐典推攻

慢驚

慢驚之症實非驚吐瀉亡陽病後成脾胃損傷肢體冷虛痰泛上目無神口鼻氣微時驚悸手足癱瘓命將頽加減醒脾湯可治人參白朮白茯苓木香天麻并半夏膽星甘草橘皮靈倉米棗麥煎服效姜蚕全蝎遂痰增不愈六君加附子煖回痰降白全生

示吉日急驚者內傷乳食外感風寒內熱痰壅腹脹便秘脉

數有力故宜瀉宜攻慢驚者人吐之後名胃虛驚人瀉之後
名慢脾驚或服尅伐過多或投寒冷太甚以致元氣衰憊虛
痰泛上不投溫補何以挽回元氣無何有之鄉耶古人云以
風而無風可驅似痰而無痰可逐信然也

疳疾

小兒疳疾從何起乳母寒熱失調理肥甘過度喜怒偏主冷油
膩不得體或因吐瀉及痢瘧或熱或嗽病不已以致脾胃中氣
傷溺如米泔又不長皮黃肌瘦髮更直肚大青筋腹痛殃好食
泥屎并茶米諸蟲作痛藥須嘗先服珍珠丹一服

或用小
牛黃丸追蟲

取積最為良，連齋肥兒後調理，蒸餅替丸，細酌量，并治了笑疳症。

發熱

小兒發熱病不一，傷寒無汗惡寒極，手足稍冷，面色青，寒不舒暢左

額青紋可認識，傷風惡風且自汗，手足稍溫，面光赤，二症宜通神散傷

食胸膈又飽悶吐瀉，腹疼面黃色，在額青紋，目胞腫，夜熱晝涼

無定跡，便秘小牛黃丸，驚風發熱三根青，手心有汗，時驚惕，小

丸抱龍丸紫疳積發熱，是骨蒸，昔熱不止，盜汗生，有積丸服小

金錠選用疳積發熱，是骨蒸，昔熱不止，盜汗生，牛黃丸後服

乾蟾肥兒丸唇有白泡，裏蒸熱耳冷，微汗又虛，驚復痛啼，或吐，喎

週歲之後無此形，不須諸熱表熱，手指熱遍通神散，內熱化毒

醫宗說內
卷之五百病

自能平內熱手心熱口乾唇紅便秘結

痧疹班

小兒痧疹屬風熱煩悶焦躁啼不歇汗下之後熱轉增痧疹將

發醫之訣頭粒細小痧疹來細點無頭斑症列欲出未出須升

散牛旁升麻乾葛慣防風薄荷及甘草陳水姜煎服古方撰已出

之後去葛麻加入玄參黃苓定不差知母花山黃粉支連能消熱咽喉疼痛黛

枯拿大便秘結大黃用自汗口渴石羔查

一方治痧子不發用櫻桃核打碎泡湯與之

風寒

風寒之症若何成 頭疼宛執茲嗽生傷寒無汗風白汗鼻塞若
里梅急形解表先 服通神散若來驚痰細酌斟

傷食

孔食不化自飽悶 噯氣作酸或吐甚下洩臭屁不思食沉香末
子藥可進大便結 者小牛黃食隨利去法有信

嘔吐

孔食傷胃則嘔吐 食消吐定法所在沉香末子是總司

用濃姜湯調下

不愈定吐飲功大 半夏陳皮及藿香麴芽厚朴木香助水煎臨
服加姜汁口渴身 熱黃連入身冷不渴炮乾姜脉遲厥冷參水

人自

益夏月香需滑石添大便秘時檳榔吃秘甚者用小牛黃丸姜湯化下

泄瀉

孔食傷脾泄瀉症健脾消食利水應沉香末子亦可施寔脾利

水煎方定蒼木白朮白茯苓山藥扁豆甘草順澤瀉木通及木

香砂仁煨姜陳皮進有熱須增姜炒連無熱肉菓炮姜性少許
山子只厚

食積腹痛麩麥芽查下實利兵榔令

暑

夏月吐瀉多因暑加減香需飲可止香需霍香及木香厚朴陳

皮麩麥神芽始半夏茯苓并木通扁豆倉木滑石同熱加黃連去茶

水瀉多炒芍亦良工有食山查枳實炒臨服姜汁助成功

按燒針丸治小兒吐瀉甚效用東丹硃砂枯白礬等分爲細末棗肉爲丸丸如黃豆大每服三四丸戳針尖上燈火上燒過研細涼水調服外用菜豆粉以雞子清調成膏如吐塗兩腳心瀉塗顛門上止則去之

痢疾皆因傷濕熱白傷氣今赤傷血新積多血久積膿初起腹

痛下之訣

通因通用之法用小牛黃丸珍珠丹後服肥兒丸調理

表熱太甚姜茶煎內熱

口渴香連截嘔逆禁口用石蓮爲末調下病能絕

姜茶煎 用生姜切片細茶各三錢并水煎服痢而兼外感者用之血痢加連根非菜汁酒調服

香連丸 治內熱口渴肛門焦痛 用川黃連十兩切片姜

汁拌炒廣木香 二兩為細末神麴糊丸如菘豆大每服三五

七分量大小酌用白湯下

石蓮散 石蓮肉炒去心為末每服一二錢陳蒼米飲調下

如嘔加姜汁一匙同服

久痢塞劑 用粟壳木香榴皮細茶烏梅肉各三錢白蜜砂

糖各五錢紅痢多糖白痢多蜜水二鍾煎八分去渣服 大人亦田

瘧疾

小兒瘧疾名童瘧初起消食痰涎却便秘腹痛小牛黃屬乳食痰積

發熱無汗通神畧

屬風寒外感

六七發後截法精天靈散用真靈藥

天靈散 用天靈蓋燒存性為細末黃酒調下五痺瘧立止

一用班毛一個放小膏藥上侵晨貼眉間即堂中瘧止揭去

咳嗽

有聲有痰名咳嗽風寒邪氣肺經受若兼發熱及頭疼通神解

表功方就火鬱肺經聲不轉瀉白噲化丸能奏痰塞喉中喘急

者巴豆塞鼻如神宥

小兒痰喘用巴豆一枚去壳搗爛作一九綿花包裹男左女
右塞鼻中痰即降下而愈

一方治咳嗽喘急 甜梨一個刀切勿斷入蜜于內麵裹灰
火煨熟去麵吃梨

一方用白蘿蔔汁半鍾蜜半鍾飴糖半盞姜汁十匙蒸熟不
拘時吃并治老年痰火

肺脹喘急

小兒肺脹喘嗽多人看作風喉大黃檳榔三牽牛人參分兩等
勾五味研成細末蜜水調量稀稠每將一字下咽喉不用神針

法灸

雲林云肺脹喘滿胸高氣急兩脇搖動陷下作坑脹悶亂噉
聲嘎不鳴痰涎壅塞俗云馬脾風不急治則死本方主之

按幼科陳見田秘本肺葉脹以致喘急眼胞上下卧蚕紋起

用防芫散見雜症木腫條

浮腫

徧身浮腫是屬濕燥脾利水并消食腹脹便秘珍珠丹內消食

積沉香未子益不效平胃皮子飲厚朴陳皮炒蒼朮腹皮姜皮茯

苓皮車前小子栴榔則神麩澤瀉及麥牙木香木通桑皮力砂

仁炒末水煎服小便利時腫自息

一方用黑丑半生半炒取頭細末每服二三匙煎桑白皮湯磨木香汁調服一方小便不利者磨玉樞丹燈心湯送下一用草菓仁每歲用一粒炒爲末白酒調下外用河白草煎湯洗浴若浮腫先眼_下卧蠶紋起喘急病在肺宜防芪散黃疽

小兒黃疽是溫熱清熱利水方直訣指甲面目遍身黃溺如黃汁或寒熱嘔吐口渴不思食夜無安卧不寧賅大便秘結珍珠丹蒸併快活調理截不愈茵陳湯茵陳赤茯苓連枝_{川山}防口

二木及陳皮猪苓澤瀉栝榔悅食積神麩炒小子理氣木香香
附絕小便不利加木通小便清白病自歇

汗症

小兒汗症原須治氣虛自汗日間至血虛盜汗睡中來總屬虛

弱分明誌黑豆

三錢

浮麥

一錢

及烏梅

一錢

煎湯服時汗亦住

一方用蜜炙黃芪生地各一錢五分牡蠣煨為末二錢水煎

服 一用五倍子為末津調塗臍內俱治汗出不止

諸失血

小兒失血非一病鼻中出血衄血認吐咯嗽血從口來總是去

焦火熱症

宜化毒丹便結者用小牛黃丸

小便尿血為溺血大便出血下血甚

初生小兒是胎熱

用化毒丹一用生地汁入蜜少許和勻溫服或用甘露飲

能食小兒食多

積病

用沉香末子或用蒸餅快活洗大便秘腹痛用小牛黃丸

隨症調治是良工再參方去

醫方應

治吐血衄血

一用白芍為末磨犀角汁調服

一用側柏

葉藕節晒乾等分為末每服五分藕汁和蜜調日湯送下

一用黃芩為末蜜丸丸如龍眼大每服一丸鹽湯化下

用吳茱萸為末津調塗脚心湧泉穴 一用山枝炒黑為末

吹鼻中或用藕汁調服五分灯心湯送下

治小兒初生下血溺血及牙宣口臭口舌生瘡咽喉腫痛名
甘露飲 用熟地生地天冬麥冬去心枳殼茵陳酒炒黃芩石
斛甘草枇杷葉蜜炙各等分水煎飲溺血加石蓮肉灯心竹葉
一用蒲黃頭髮灰等分爲末生地汁或藕汁乳汁調下一錢

脫肛

小兒脫肛有二症瀉痢之後氣虛應補中益氣去當歸外用薰
洗能接命若還便秘努力來清火潤燥方相稱

凡小兒脫肛大腸頭自糞門而出久不收進則硬燥難入法
用蓮鬚葱葉斤許煎湯數碗乘熱放桶內令小兒坐上薰之

後慢慢洗軟用冰片三四分爲末敷上肛自收矣 一用五

倍子煎湯薰洗 一用陳壁土煎湯薰洗 一用鱉頭骨燒

灰存性香油調敷 一用五倍末敷上托入 一用草麻子

擣爛貼頭項上腸入去之

小兒大便秘結努力脫肛肛門焦痛或時下血用玄明粉二

錢當歸一錢杏仁桔梗各八分甘草升麻各二分水煎服

諸遲解 顛鶴節

氣血不克行走遲腎氣不足齒生遲語遲背因心不足血分不

足髮生遲顛顛開解 是頭縫不合 并鶴節腎氣不成總宜知

行遲語遲髮遲齒遲明肉消瘦顛顛開解神色昏慢總宜調

元散 乾山藥五錢 白芍炒 茯苓神 各二錢 白朮人參生地

熟地當歸川芎黃芪蜜炙各二錢半 甘草半 石菖蒲一 生薑三片 棗一

水煎見母不拘時同服

加減地黃丸 治頭暈不合各解顛腿瘦骨節呈露如鶴之

勝名鶴節腎主骨髓腎氣不成所致也

懷熟地八 嫩鹿茸山藥白茯苓山茱萸肉五 澤瀉丹皮當

歸各二錢 為細末煉蜜綏丸如龍眼大 解顛去澤瀉加入參

五錢食遠服 鶴節加牛膝肉五錢土心服白湯化下外用

大南星為末米醋調難維帛上烘熱貼膝上

通神散 外感風寒內傷飲食頭疼發熱咳嗽痰喘鼻塞聲重

驚悸口乾煩渴胸滿不食凡有表症者並治并治瘧痢初起

薄荷葉 一兩 羌活 一兩 葛根 一兩 川黃連 姜汁炒 一兩

膽南星 一兩 枳實 七錢 煨榔 一兩 陳皮 炒 一兩

厚朴 姜汁炒 七錢 神麩 炒 七錢 麥牙 炒 七錢 川芎 三錢

甘草三錢共為極細末黑糖杵濃煎生姜湯送下每服週歲

丙者五分外者七分二週者一錢量見大小酌用 痢瀉細茶 各一錢煎

湯送下

瀉白丸 止嗽疎邪消痰定喘清熱順丁丸嗽而声不轉者

石膏 煨熟 二兩

花粉

川見母 去心

噉香圓 去穢

膽南星

欬冬花

薄荷葉 各一兩

甘草

細芽茶 各七

已上九味共為極細末聽川

麻黃 一兩 五錢

防風

桑皮 蜜火炒

杏仁 去皮尖炒

前胡

柴苑

蘇子 炒為末 各一兩

陳瓜萼 一人個

楠餅 三兩

出枝 一兩

葶塵子 炒五錢

已上十一味用水煎

去渣瀘清再入蘿蔔汁冰梨汁餒糖各四兩姜汁五錢煎成

膏滴水成珠為一水而未藥和勻為去每九重一錢每服一

丸燈心湯化下大人附化風邪痰火咳嗽如神

蔣氏北毒丹 治一切胎熱胎毒遊風丹毒熱癩口疳疔火燥

渴煩燥大便結小便濇赤等症

真犀角

川黃連

枯梗

玄參

薄荷葉

粉耳草

各一兩

青黛

五錢

大黃

酒蒸九次五分

硃砂

三分另硃極細末

有為極細末煉白蜜為丸丸重一錢三分每服一丸燈心湯

化下

小牛黃左

消痰逐積追蟲消食清熱定驚除膨消脹凡大便

不通或按腹中便痛者以此下之急驚痢疾初起神效

黑白丑頭未各七錢半 大黃一兩五錢 膽星 半夏各五錢姜汁製

枳實炒五錢 牙皂三錢 為極細末煉白蜜為丸九重一

錢二分週歲者一九三週者二九生姜湯化下追蟲糖湯下

沉香末子 治乳食傷脾胃以致嘔吐泄瀉痢疾瘧疾心腹疼

痛大便下血寒熱不止凡兼胸腹脹滿噎氣作酸惡心惡聞

食氣及不思食下洩臭屁上症不必悉具凡見一二定為傷

食此方主之

香附鹽水拌炒 兵郎 紫厚朴姜汁拌炒 廣陳皮炒各四重

枳壳炒 枳實炒 青皮子炒 山查肉

麥芽炒

神麩炒

蘿蔔子炒

白酒藥炒各二兩

柴胡

桔梗

真川芎各一兩
二錢

芸白朮土炒

炮乾姜

沉香

碾木香不見火
各一兩

共為極細末每服週歲七分二三週者一錢糖拌空心生姜

湯送下便血米湯送下小兒下血多因飲食傷脾脾不攝

血若用止血之劑及溫補升提之法無益也予製此方以消

食為主食消則脾氣自復血不治而自愈

陳氏小紅丸

治一切咳嗽驚癇發搐發熱齁喘痰涎上壅痰

厥卒倒等症

全蝎 去刺洗淨 炒一兩

南星 一兩

硃砂

四錢五分

米子 一錢

巴豆霜

去油淨 二錢半

為極細末糯米糊為丸如菜子大週歲者每

服五十九二週者一百丸看小兒大小壯實用燈心湯送下

此吳中陳氏治急驚風秘方也昔年見田先生專司幼科名

布江南其子珍如先生以此方授予試之奇驗

肥兒丸 治五疳五痢瀉蛔蟲臟腑虛弱身體羸瘦髮墮篋黃

小便燭色消積化食健脾和胃長肌肉肚腹膨脹俱宜服

廣陳皮 一斤

甘草 炙四兩

蓬朮 炒六兩

厚朴 米泔浸炒 八兩

枳實 炒八兩

連翹 六兩

香附 米泔浸炒 一斤

山查肉 六兩

神麩 炒六兩
十子 炒八兩
龍膽草 六兩
青皮子 炒八兩

川黃連 炒
白朮 土炒
兵部 各八兩

其為極細末煉白蜜為丸丸如龍眼大空心清米湯化下

若疳積加蘆薈胡黃連銀柴胡名蘆薈丸又名五疳保童丸

此須夜間發熱骨瘦如柴者可用 一方加蝦蟇食蛆或用

蝦蟇食蛆俱燒存性入前藥內各乾蟾丸虛者加米仁山藥

虛甚加人參有蟲加川練子史君子肉鶴風

將氏肥兒丸 治小兒瘦弱食不生肌肚腹疼痛內熱蟲積

芸白朮 上炒
陳皮 炒
香附 監水
厚朴 姜汁炒

枳實炒

兵郎

神麩炒

爽芽炒

澤瀉

卜子炒

山香肉炒

白茯苓蒸

白芍藥

炒各四兩

木香

不見火

甘草

炙各二兩

內熱口渴脉洪數小便黃加連翹川黃連

各三兩

骨蒸熱背熱手心脚底熱口渴身瘦溺赤脉細數加蘆薈

一兩

胡連銀柴胡

名三兩

鼈甲

醋炙四兩

攄後寒熱不止脇下有塊加銀柴胡胡黃連當歸青皮

各三兩

醋炙鼈甲

四兩

桂枝

七兩

腹中膨脹或有塊痛手不可按如山稜蓬木

醋炒各三兩

食蛆

二兩

乾蟾二隻

泄瀉少食或腹痛手按則減面色恍白無神六脉無力倍白

木白芍加人參山藥米仁各四兩瀉不止加肉果麵裹煨

六脉遲手足冷口不渴溺清白肌肉日削或悠悠腹痛無減

增或喜就煖處或食生冷即瀉或臍下作痛是屬虛寒加炮

姜肉桂各二兩倍白朮白芍泄加肉果麵煨虛甚加人參山藥

各二兩

面上白斑腹中作痛口出清水或口中吐蟲屬蟲積加史君

于肉貫仲各二兩雷丸鶴風各一兩

示吉日小兒如春令草木得雨露滋養則日生夜長所患者
惟蟲物以害之則枯萎爾小兒稟純陽之體乳食滋補則先
天之氣生生不窮所患者飲食過度脾胃損傷成疳成積肌
肉瘦削也食積之害小兒亦猶蟲物之害草木蟲物去則草
木日長食積去則元氣自生固不易之理故古人製肥兒之
方多用消食去積之品蓋欲先除其害也予得古人之旨隨
症加減以盡寒熱虛實蟲積之變敢云一片婆心聊爲古人
之小補耳

經燕丹 專治小兒疳積了奚骨瘦如柴目閉溺赤或腹中疼

痛或瀉如米泔

大石燕

一雌一雄每個重上下用炭火煨紅淬入好醋中如此九次

兩者佳入傾銀罐中

朋硃砂

三名另硃水飛紅麩

洗淨一兩

味為極細末和勻週歲者每服

三分糖拌不拘時服

按此方乃消疳化積之神藥也且無

藥氣利于小兒之畏藥者予表侄二三歲間患疳積症頭大

身瘦發熱瀉如米泔諸藥不效後聞藥氣即吐束手無策偶

遇異人傳此方和于糖菓粥飯中與之數服全愈後以此濟

人無不效矣

犯龍丸

治小兒急驚癇痰涎壅盛胎驚內弔咳嗽喘急瀉

搐驚悸等症

天竺黃

五斤辰砂三斤

九套膽南星

一兩明雄黃

一斤

麝香

一分五庫

為極細末另用麻黃欵冬花甘草各五錢煎湯

去查慢火熬成膏和末藥為丸丸知芡實大每服一丸薄苛

湯化下

示吉日鎮驚消痰安神開竅製抱龍之旨也然恐病輕藥重

殊雄則過干墜鎮而麝香更有引驚入竅之弊故古人有不

可輕用之說今此方之妙作之以膏麝香得麻黃之辛散竅

內之驚盡出雄硃得甘草之和緩墜鎮之性和平膽星天竺

而佐欵冬消痰潤肺肺潤則氣降氣降則痰下痰下則驚平
咳嗽痰喘不治而悉愈其方若與古人同則其効勝于古人
遠矣非得岐黃之秘者斷不知此此方爲計元讓家秘活人
無算予求之數年始得同志者勿易視之

玉樞丹

一名太乙神丹
一名紫金錠

一名追毒丹

解百毒逐水氣下痰開

結鎮驚去積通竅除驚悸定搐搦理內外無名之症療大小

疑難之疾

明雄黃

一兩五倍子

槌破洗淨
焙二兩

山茨菇

去皮洗淨
二兩

紅芽大戟

去蘆洗淨
焙乾兩半

于金子

去壳碾去油
取霜一兩

明硃砂

五斤

麝香 三錢

右除雄硃麝于金另碾外其三味各爲極細末
和勻却入前四味再碾勻以糯米糊和忤干餘下爲錠子陰
乾端午日午時修合者佳 癰疽腫毒初起腫疼或蟲獸咬
傷疼痛外用井花水磨敷內用井水磨服大人每服二錢小
兒週歲者五分大者酌用 小兒夢中驚悸及痰痰壅甚大
便如常者并花水磨服薄荷湯送下半歲者二三分週歲外
者三五分

珍珠丹 追蟲去積消食逐滯消膨脹通便結化痰垢踈滯氣

推陳致新下法中之神藥也

早莢

去筋子 八兩

小兵郎

乾切六兩

黑白丑

海淨浮水者 不用各四兩

巳豆肉

六斤槌碎 句夏布中

四味和一處用陰陽水十四碗與藥共

煮水盡取起去巳豆晒乾磨為極細末磁瓶收貯每服男用

三五七分女用四六八十分黑糖拌上部病白蘿蔔湯下

下部病冷茶送下生姜湯催之 貝如治水蠱用川貝母秦艸

花粉各一錢真蘇子九分煎湯送下珍珠丹三分隔一日服

藥一次水去依本條中調理 川貝四味為末蜜湯調下治

咳嗽如神

鷄肝藥 治小兒疳積肝經積熱以致眼閉眼紅失明腹脹為

症

白肉雷丸

一兩赤色者不用用蒼木一兩
同煮一二十滾去蒼木切片

史君子肉

一兩黑油
者不用

二味焙乾等分鉄碾內碾為細末用

不落水雞軟肝一具男用雌女用雄將水藥一錢溲上飯上

蒸熟小兒食之即愈輕者二三服重者不過七服神效忌猪

肝及猪牛犬肉不忌損目 此方係王仙師所傳吳中專司

疳積者惟賴此方其效若神子竭力覓之以公海內庶得好

生之意云

蒸餅快活丸

治小兒丁奚疳症皮膚瘦削骨露如柴肚大青

筋小便濁睡臥燥亂神氣昏沉常服健脾化積進食肥肌神效
用小麥麵一斤作餅十六箇每餅重一兩內裹青礬一錢外以溼紙包黃泥封固炭火內煨透取出候冷爲細末用紅棗米泔水煮熟去皮核擣爛如糊同餅末杵勻丸黍米大每服三五丸清水湯送下礮化下亦可

示吉常讀內經曰以酒爲漿以妄爲常醉以入房以欲竭其精以耗散其真不知特滿不時御神務快其心逆于生樂起居無節此岐伯言今人致病之由也若夫小兒則榮辱不開其心色慾不傷其腎惟天之六邪外入風寒火症爲多暑溼

燥次之內因諸症易驚則傷神而心病善啼則怒而肝病多
食則傷脾而脾病至于傷脾傷腎之事無有也故予集幼科
諸方通神瀉白風寒火之通治也沉香末肥兒丸快活丸脾
胃病之通治也紅燕丹雞肝藥肝臟之通治也小紅丸抱龍
丸心臟之通治也小牛黃珍珠丹追蟲取積化毒專司清熱
玉樞丹消痰逐水定驚解毒兼理怪病俱去害之良藥因小
兒純陽之體害去其生生之氣自長溫補之法不講也惟慢
驚及久吐瀉諸遲法宜補益已見于木條下專司幼科者諸
方預宜修合三歲之內非此不愈四五歲後當察火人雜症

條治之

治夜啼方 治邪熱相乘雋炒夜啼用燈花三顆爲末以乳汁

調抹兒口內或沫母乳頭上令兒吮之 一用燈心燒灰敷

乳頭上令兒吮之 一用玉樞丹二分井花水磨抹兒口中

一用硃砂二分半碾細末蜜調兒睡時抹兒口中 一方用

火柴頭一箇長四五寸削平面用硃砂寫云撥火杖撥火杖

將來作神將捉着夜啼鬼打殺不要放急急如律令

治愛吃泥土方 煎黃土湯送下小牛黃丸 一用乾黃土爲

末濃煎黃連汁和爲餅食之愈 一用臍粉一錢砂糖和爲

丸如麻干大米飲送下蕩出去土立愈小兒愛吃泥去乃
脾虛胃熱所致用清胃養脾湯用黃芩石羔陳皮白木茯苓
甘草水煎服

治蟲痛方

凡腹痛口中出清水者尿蟲積用小牛黃丸糖湯

化下一方用史君子肉二錢殼五分楮郎一錢水煎服

一用史君子肉一錢楮郎一錢雄黃五分共爲細末每服一

錢糖拌苦練根煎湯送下小兒蟲咬心痛欲絕用五靈脂

一錢枯礬五分爲細末水煎一錢不拘時服蟲卽吐出示

予少時八山路逢一小兒心腹痛啼哭口吐清水予曰蟲也

少頃吐出蟲長一二寸者一二十其痛愈急倉卒無藥予記
 老葱根能化蟲為水取葱搗汁香油調服下咽痛定其病永
 不發矣此方大人心中腹蟲痛俱治

予一日靜坐一人索化蟲藥甚急日三日前鄰家小兒心腹

痛欲死服相公丸藥後即下血籠七八枚蛔蟲二三十如蟻

蛄者一二十痛立愈矣今小兒心痛亦然必求前藥乃妙予

亦不記其何藥以諸丸令渠驗之乃揀遇仙丹而去

方見雜症蟲條

治遺尿方 小兒膀胱冷弱則遺尿一用破故紙一兩鹽酒炒

為末每服一錢熱湯調下 一用益智炒為末白湯調下一

錢 一用雞脰脰十且雞腸一且燒存性猪泡炙集爲細末
每服一錢黃酒調下男用雌女用雄 一用官桂爲末雄雞
肝一具等分搗丸如小豆大溫水送下日三服

治尿濁方 小兒胃中溼熱下流則小便濁如米泔或多食糯
米食之故沉香末子主之一用澄清飲白朮茯苓白芍黃連
澤瀉山查青皮甘草水煎空心服

治小便不通方 膀胱有火則小便閉結而不通 用燈心湯

送下益元散一錢 一用見茶二錢爲末藟藟煎湯送下

一用五苓散加車前燈心煎服 初生小兒二三日不大

便用葱汁入乳各半調勻抹兒口中即通

治語遲方 治小兒心氣不足邪熱乘之則語遲用石菖蒲九

菖蒲人參麥門冬法川芎遠志甘草木當歸各乳香五錢石

砂仁為細末煉蜜丸黍米大每服十丸食後梗米湯下

治齒遲方 小兒腎不足則齒生遲用川芎山藥當歸自芎炒

甘草炙等為細末白湯調下二錢食後服將藥末擦牙齦即

生

龜胸方 小兒心胸高如覆掌是肺熱脹滿之故用天冬去

百合杏仁去皮尖木通和壳桑皮蜜葶藶隔紙石羔煨各

去皮尖

炒

炙

炒

錢

用大黃酒蒸

六分

共為細末煉蜜為丸如菜豆大每服五丸白湯

化下食後臨臥服

外灸兩乳前各一寸半土兩行三骨間

六處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起

龜背方

風入督脉背春受傷故背高如龜

用枳壳防風獨

活大黃煨

前胡當歸麻黃去節

等分為末麵糊丸如黍米大每

服十五丸看兒大小以米湯送下食後服外宜灸肺膈穴

在三椎下兩傍各一寸半心膈穴在五椎下兩傍各一寸半

膈膈穴在七椎下兩傍各一寸半六處穴各灸三壯以小兒

中指節為一十艾炷如小麥大

陰腫疝氣方

治寒鬱下焦偏墜氣痛

用故子

炒

橘核

炒

乾

姜肉桂砂仁等分爲末酒拌空心生姜湯送下一錢一方

用五倍子燒灰存性爲末好酒調下三分出汗立愈一方

用牡蠣不均多少爲末雞子調塗治外腎腫大卽消陰囊

忽腫或久坐溼地或蟲蟻吹毒用蟬退五錢煎湯薰洗腫痛

目消內服五苓散加燈心煎服若因蚯蚓吹毒陰頭腫痛用

鴨涎敷之一方用葱園內蚯蚓糞以甘草汁調塗腫處或

薄倚汁調亦可

斷乳法以山枝三

粒

炒

黑

硃砂

輕

粉各少許

碾爲細末

取生

芝麻油調和待小兒睡着以藥濃敷兩眉間睡起即不食乳

不可說破如不效再加黃丹一錢須揀伏斷及卯日

牙疳口瘡方 小兒心熱則舌瘡胃熱則牙疳脾熱則唇瘡凡

治牙疳口瘡先用青絹蘸雪水或井花水拭淨白皮即血出

亦不妨拭淨後用元木丹見雜症吹入口舌病口舌瘡用黃連為

細末蜜水調服 牙疳用竹葉石羔湯水煎服少許噙嗽

丸痘後痧後生疳是邪熱未散積毒成疳不急治則牙落非

元水丹可治宜秘方二仙丹用活雄童子鯽魚炙乾女葫蘆

浸糞坑內七日取起洗淨炙乾各為極細末等分和勻先拭

淨牙根敷上即愈

牛黃散 治小兒口中百病鵝口口瘡重膠不能吮乳及咽喉

腫塞一切熱毒用黃連末黃栢末各八分雄黃青黛火硝各二分半

牛黃冰片硼砂硃砂各一共碾極細每用小許敷入口內

重舌木舌弄舌方 心脾積熱舌下有形如舌而小者各重舌

舌腫硬不和為木舌舌伸出縮進不安各弄舌 重木舌用

歸尾連翹白芷絡三大黃煨甘草炙絡一木煎食後頻頻服

外用青黛黃栢末和勻敷之 一方蒲黃敷 一方用膽礬

碾細點少許 一方用百草霜札硝滑石共為末酒調塗之

木舌用玄明粉五錢川連末一錢食鹽少許竹瀝調敷

弄舌宜服化毒丹

頭而疳火方 治小兒頭面諸瘡丹毒腮腫眼痛用牛黃黃連

散用牛旁子一兩炒用大黃一兩生川黃連三錢共爲末每

服一錢蜜湯調下 外用松香三錢葱汁特東丹鉛粉各二

錢爲細末香油調搽名三物丹

丹毒方 遍身遊走赤腫名曰丹毒內服通神散散之或玉樞

丹解毒 外用朴硝大黃等分爲末新汲水調雞翎蘸藥塗

之一用伏龍肝不拘多少雞子清調敷患處

痛紅腫方 小兒眼痛紅腫是風火土攻宜通神散熱甚化

毒丹 外用熟地黄一兩新汲水浸透擣爛貼脚心布裹住

有效 一用火硝一錢雄黃六分為極細末吹入鼻中目中

流淚即效

耳痛方 賢熱上冲耳中或痛或出水或流膿 耳中腫痛用

葱汁滴入 出膿流水先用綿紙撚撚盡膿水後以自龍丹

見雜症 吹入 一用五倍子燒存性為末吹入耳效 一用

黃蠟如豆大搓成條外用真鞞艾槌熱裹蠟條用火燒着烟

燻患處

鼻瘡方

鼻下兩傍瘡溼痒

膿流處卽又成瘡最爲可厭宜

用澤瀉鬱金山枝仁炙甘草等分共爲細末食後白湯調下
一錢外用甘草湯洗淨敷疔火三物丹

頭瘡方

小兒頭上生瘡最難除根

法先用葱頭花椒米泔

水煎湯洗淨瘡蓋後用臘豬油半斤熬滾入麻黃半斤同煎
煎至麻黃色黑枯撈去查以油擦瘡一加輕粉三錢尤妙

一方用菜油一盃放杓內煮滾入活蜈蚣一二條煎蜈蚣黑
枯爲度去查將油擦

臍瘡方一小兒剪臍外傷風溼以致臍瘡不乾用枯白礬龍骨

煨各五分共爲細末每用少許摻臍土 一用草紙灰敷

一用紅絨灰敷 一用蠶繭燒灰存性敷

小兒初患舌碎繼之遍身發熱一醫以傷風停食而用發散
清導之劑予曰無益也服後果熱愈甚滴水難食復來求救
予以黃連五錢煎湯徐徐與之終劑而愈其父問其故予曰
若先身熱而後舌碎則因風食發熱以致舌碎固常事也今
先舌碎知其心火亢甚加之身熱是內熱極而火外行耳
小兒二三歲身熱驚悸易醫六七俱無寸效一日忽作鴉聲
少頃其音已啞魚口開張予視之欲哭狀惟着頭稍縴終無

音出心甚憐之細思其策因以指探其口中唇乾舌燥予曰
心熱欲言而不能果有之乎卽以黃連黃芩石羔麥冬五味
山枝玄麥花粉知母甘草薄荷燈心竹葉剉一大劑煎成薄
膏顛顛典之一晝夜而鴉声復出又一日而音始全而愈自
此之後此法活人無數大便三四日不行者加玄明粉二三
錢尤驗驚悸者加金子同煎嗟乎人遇啞驚風俱棄之而不
治孰知唇乾舌燥終屬陽症此法甚善故記之

嘉善魏交讓子予之表舅也年十歲患小腹痛三四年矣醫藥
不效予診之脉來沉遲二便如常按之無塊此必腎家虛寒

也六味地黄丸如炮姜肉桂青皮香附車前半膝而愈

淮安大商陳受伯弟年十一歲傷寒病起幾至二百日粒米不食食即脹滿諸藥不愈惟日以人參三錢煎湯飲而已載至吳中求治予視之骨瘦如柴六脉沉細投之參朮正相官也何無效驗因搗心胸小腹按之硬塊已滿手按則痛予曰愚脉則難用下藥不下亦無生理遂用當歸玄明粉各三錢酒蒸大黃二錢杏仁麻仁蘇子桃仁俱炒為末各一錢白芍川芎桔梗各七分水煎服服後即去黑塊三三中脘硬處下行寸許然人已虛極明日去大黃玄明粉加入參二錢服二

劑後口復用大黃玄明粉而去人參又去黑塊一二十如此
人參大黃間服半月黑塊始盡而愈

周忠介公孫女年七八歲大便下血不止遍問幼科有用黃連
犀角者有用人參阿膠者俱無寸效予診得氣口沉緊予曰
十服未子卽霍然矣佩老母舅笑曰何言之易耶姑試之三
服而血止索其故予曰人但知脾虛不能揖血不知飲食傷
脾亦不揖血今用消導之劑食去則脾氣復而血自揖焉得
不愈其未子卽沉香末也

小兒在水閣風雨卒至又驚又寒後至四肢厥冷漸至遍身

惟心口稍煖此冷風入骨症也冷至心窩則死用理中湯加附子一錢數服而寒始退

[Large dark ink blot or smudge obscuring text]

人參大黃間服半日黑便... 腹新口實服大黃之則健而活人參又去黑便一二七散也

女科

調經

女科雖則有專工餘病皆于男子同惟有調經并崩漏胎前產後不相通小產乳疾及種子催生臨蓐各成功 調經大法在

補血血旺氣衰名曰從古人四物為生劑隨症加減酌其中

四物湯當川生白歸芎地芍本方烏藥香附青皮着澤蘭丹皮及砂仁茯

苓白朮俱良藥甘草陳皮引姜棗先期而至再斟酌 一月一

至方為正先期而來虛熱症或半月而求或二十日外而至加八條芩炒山枝

阿膠知栢亦能應母黃後期而至屬虛寒三十日外或四十五日一至炮姜蘄

卷之五 調經

艾古人定寒甚須加桂附子附子童便甘草木煮三日用脉虛氣弱參芪任

將來作痛用延胡血瘀塊痛桃紅順塊痛不止木小山蓬通稜桂枝

辛散疼方定經閉塊痛亦宜添再着大黃酒蒸九次牛膝進小腹有塊疼痛

屬瘀血故用行經破瘀之品若还勞察經閉者另有良方非一論牛膝鼈甲

王方兼臨服童尿一盃滲經來不止是虛熱涼血補血是真

訣條芩酒妙荆芥炒黑及阿膠日外升柴不可缺若醫崩漏用稷灰

續斷蒲榆黃切二味炒黑血自歇經後作痛血氣虛加入參芪調補悅

脉來遲細屬虛寒炮姜人參自古設適來適斷發寒熱熱人

血室謔語說本方合用小柴胡病兼外感湯澆雪白帶皆因

濕熱流半夏白薇功甚截亦加連枝黃山血分來日久升補真奇絕

用補中益氣湯或十全大補加升柴肥人胸滿去地黃加入星半南夏正相當脉遲腹

痛去白芍泄瀉當歸也要藏經行不止澤蘭去氣虛青烏除出

方

示吉日乾道成男坤道成女女以坤道用事上應大陰月天

之陰也三十日則周于天故女子之血亦三旬而一見血之

下也同于月故名之曰月事月事時下有子道也若月事不

調艱于得子皆固陰衰之故故古人用四物厚味之品味厚

為陰中之陰理能益血隨症斟酌者可盡其寒熱虛實之變

也如是而調之月事調勻陰陽和而萬物生種子之道得其

旨矣

胎前諸症

女子懷胎須調攝飲食起居俱要節辛熱推蕩毒莫投利水破

血藥宜歇古人安胎有妙方白朮土炒條芩酒川黃炒歸訣生地紫蘇

及枳壳白芍甘陳香附屑附鹽酒拌炒為末砂仁炒末水姜煎隨症加

減為君別惡心惡食名惡阻二三月妊有是苦加入茯苓并

山枝竹筍半夏姜汁安不嘔去半夏胸滿去生地脉遲胃寒姜朮香總去甘

草病自可胎氣不和腹滿悶痛湊心腹子懸症加入腹皮共

人參生薑四片葱七寸減去地黃白水荅手帶弩弦瘰自定

子淋之症又如何小便赤色去不多加入栢知通竹葉日久升

麻不可無一用地膚草四兩水四升煎至一半去渣子癰卒倒

痰壅甚言語蹇澁人不省茯苓半夏及川連臨服竹筴姜汁進

小便不通轉胞症胞為胎壓水不滲入麻胡升柴及葱頭吐法

托法功誠勝

示吉曰胞為胎壓轉在一邊水不得通最為急症治法有二

一看其母氣怯弱不能舉胎面逼胞者八味地黃左丹奚吐

法一看其母氣壯實善飯胎必肥重胎重而壓胞者瘦胎飲

穩婆托法若困過忍小便以致不通者滑石爲末葱湯送下一錢亦效若用八味丸須加車前如不能速合竟配煎藥典之并治漏胎尿出不知者

丹溪吐法 用二陳四君四物三湯煎大碗頓服以指探吐

吐出少頓氣定又典亦然予會用之甚效

托胎法 用一老成穩婆察其病處若胎氣上者以香油抹

手入產戶托起其胎溺出如法開後卽以參芪升麻大劑服

之或少有急滿再托如前一法將孕婦倒豎起胎自墜轉其

溺濺出似勝于手托矣此症治緩則殺人故子備述

四肢浮腫如水氣面目俱浮子腫例姜皮腹皮與茯苓皮四物甘

芩暫時去 足指發腫漸腿膝亦如水氣難飲食二三月見名

子氣天仙藤散另有方天仙烏附及甘陳等生姜木瓜蘇葉八

各三片每服三錢日三服六君兼用脾虛益中氣下陷用胸腹脹

滿遍身浮名曰胎水不須憂加入蒼腹并小子四物黃芩去不

留不愈鯉魚湯一服白木茯苓歸芎等分剉鯉魚一箇破腹鱗煎汁

調未四錢足生姜七片及陳皮煎至七分空心服 妊娠下血

名胎漏加入膠莖阿黃勸艾炒就淋瀝不止續斷君烏梅一個功能奏

胎動痛時治如何阿膠參米加相奏 風寒頭痛去芍歸羌

胎前 卷之五 胎前

活葱姜為主救無汗加醋乘熱服破益汗出人無咎 若兼暑

氣入香茹黃連木通篇豆知母泄瀉去歸加蒼朮小便不利澤

前車施 小厚皮子

食痢蒼朴腹下好 嗽入前貝杏桑枝 瘧疾柴胡并

知母 痢疾通朴腹皮持 大便秘加蘇杏桔臨服之時蜜十

延去白木 耳聾目暗因火甚小柴胡湯合用除

達生

八九月間達生散服過數貼無產難腹皮洗淨 二人皮 參陳蘇 各五分

芍藥白朮當歸各一 炙甘草二錢葱五葉能食胎肥黃楊譚春

川風 人芎防夏入芩冬加砂壳秋澤真多怒芩柴食炒 神 麥胎動貯根

黃 人芎防夏入芩冬加砂壳秋澤真多怒芩柴食炒 神 麥胎動貯根

反金銀渴加芩麥痰加半氣上加蘇生地尋

臨蓐

臨蓐之時有主方催生甚穩佛手湯當歸六錢川芎四五錢益
母水煎膏 冬天衣服宜厚煖若傷冷氣各凍產紫蘇吳萸煎
熱湯薰洗下體無憂患 夏月產室宜貯水溫涼得所人無累
黃蜀葵子用煎湯調入五苓功為最 子死腹中症如何面赤
舌青脹悶多三錢熟黃二分麝木方加便妙無過唇舌俱青母
亦死面青舌赤子活痾母主死 交骨不開加龜板醋炙錢為末 血餘一
錢和勻服

示吉曰懷胎十月覺腰痛連腹腹中轉動卽產候也進佛手湯一劑侯漿水破下產婦一身仰臥兒自轉順頭對產門努力送出名 正產若臨月忽然腹痛或作或止或三四日或數日胎動而痛陣不息者各曰弄胎或一月前忽然腹痛水下似欲便產却又無事名曰試水供非當產也不問胎水來否宜寬心候時服本湯調理若坐草太早或努力過度或先期動手風入產門使生路腫脹狹小以致累日不下及橫逆偏礙之患治之宜多服本湯生血氣益胞水庶爲可生如產經日久氣乏名曰宿疾宜用赤小豆二錢阿膠炒三錢水鍾

半煎八分服一法用皂夾未吹鼻中令嚏卽生

胞衣不下

產後何症最爲急胞衣不下腹悶極皆因惡露脹胞中漸冲清道痛不息若喘滿時定主凶脫衣散用從來得牛膝水通各三錢歸尾枳壳二錢人滑石四錢冬葵子二錢五分水煎熱服應有益產母自嚼頭髮尾得嘔噦時胞自出

按胞衣不下急以臍帶斷之以物墜住使其子血脉不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下總淹延時日亦無害矣只要產母心懷安泰不可焦燥驚憂古法取夫單衣葢井上立出一

用鉄稱椎燒紅酒浸少頃服 一用咽脂一張溫水洗服 一用
黑薑一合炒熟入醋一盞煎五沸去渣分五服外用鞋底炙
熱熨小腹上下三五次立效

產門不閉

產門不閉是爲虛胎前調攝不相宜補中益氣湯誠妙加入炮

姜香附醋炒醫

子宮不收

玉門不閉或腫脹愀熱疼痛苦無量加味道遙散所司當歸芍
藥白茯苓白朮甘草炙及柴胡各一六加入丹皮枝二樣若腫

消後用升提補中益氣如夏相

按子宮不收外治法用荆芥霍香椿根皮三味煎湯薰洗總之二症俱屬虛乏升補爲急切忌寒涼

產後

產後總宜大補益寒涼尅伐害非一雖有雜症未治之丹溪一言論論息主方加減產寶湯熟地當歸香附方用皮白朮白茯苓陳皮山查木通入姜灰少許及川芎益母甘草棗姜及煎成童便添一盃加減再分虛與實一何者爲實腹疼痛兼有硬塊手難動皆因惡露去不多敬血停留爲病重桃仁紅花牛蒡枝桂枝增

蒲黃靈脂亦有用 何者為虛惡露多昏暈不省腹空痛手按

痛止日懶言人參黃芪加亦中 去血不止血虛熱生地山枝

荆芥二味炒黑截阿膠黃芪及烏梅益母丹皮除去絕 血暈之症

頭眼暈神昏口噤心下悶韭醋薰法自古傳補新去瘀暈自定

有痛須憑失笑功失笑散用蒲黃五無痛參芪亦神應脉滑有

痰合二陳半夏白茯苓再加竹瀝姜汁進

示吉曰產後眩暈譫語發熱諸症須問其去血多少及胸脇

小腹有無痛處有痛處手不可近者及去血少者瘀未盡也

行血為先無痛處者或有痛處手按痛減者及去血過多者

血虛極也補血爲要倘倉卒未及詳審先用薰法 產後血
暈用荳葉細切入有嘴甌中用滾醋沃之急封其口以嘴塞
產婦鼻中令醋氣透入卽醒然後辨症用藥葑菜最能清
胸中滯血加以醋氣運達用無不效

產後歲惡名冲胃顛狂錯亂冲心類是皆敗血住上冲五靈爲

未半生半炒三錢兌送下童便酒來調本方調理精神遂

產後寒熱多屬虛本湯調理又何疑不愈柴胡并鼈甲醋炙腹

中塊痛敗血欺增入澤蘭桃仁花紅劑失笑散用亦相宜若兼嚙酸

并飽悶惡食惡心傷食醫加大山查及厚朴麥芽神麩效亦奇

勞勞之症乍寒熱喘乏自汗久不歇莫作瘧疾并外感逍遙散

用真奇絕 逍遙當歸甘草炙白芍酒炒柴胡入茯苓白朮加

皮山 丹枝水煎服後病如失

半身肉戰半身汗惡露不淨真希罕二陳四物加桃查煎成瀝

姜 汁功不亂

率倒仆地似中風肢體抽搐症同產寶須加半瀝汁發痊仍

添桂枝攻 聖惠愈風亦主前荆芥當歸尾等分通為未

三錢童便下豆淋酒下有奇功 則黑投酒中去豆用酒

大腸血少大便結生地壳紅不必說桃杏麻仁炒為末減去木

杏灰母

挾姜益歇

泄瀉脾虛兼發腫蒼木砂仁厚朴統猪苓澤瀉及麩芽神麥除去當

歸病不恐

瀉甚加肉果山藥蕭豆

食傷脾胃自飽悶作酸惡心泄瀉甚加入蒼朴香砂仁除去歸木厚木當

生用母

地芎益應

去血過多生惡心嘔噦不止虛寒形加參半夏并姜汁一加益

母當歸熟地停

去三味

因怒傷用胸脇痛飽脹胸滿食不用木香延胡皮厚增不止柴

胡芍藥動

審宗說約

卷之二十五產後

五

血虛煩燥易虛驚錯語失神卧不寧加入人仁竹味冬皮灰麥棗茹砂麥丹姜益

母去不存

痰迷心竅不能言瓜川只人浦梗萸實參菖桔漆竹瀝姜汁臨服入去丹姜皮灰

附益母傳精神短少添遠志麥神生地服如仙香

脾虛飽悶不進食砂仁白寇香朴入芎丹烏益四味除倍加白木厚川皮菜母

木功奇特

升舉作痛腹有塊若無寒熱兒枕塊痛兒枕類自自止痛不移處作寒

熱花桂牛膝苑血遂或合失蒸乳寒熱乳必膨皮只青壳木通功為

最

骨節疼痛難轉側內無血養柴筋骨去血過多之故生地白花紅人參增

牛膝乳桂三味少許亦有益

小產

妊娠小產是何緣七情交攻厚味煎起居不時調理失或因跌撲損傷兼大產如瓜熟自脫小產猶如生採然枝枯藤蔓菓自

落病比大產十倍添因循不治滑胎症終身無子良可憐吾人

保胎預防法養血清火固胎元固胎湯用芍歸芎生地條芩酒炒

白朮同參茯甘陳同膠艾砂仁香附氣多壅有痰再添姜半夏

脈數山枝亦可通三五七月服數劑蝨斯之慶自無窮

示吉日凡人經淨種子之後最宜將息勿怒勿勞勿舉重勿
遠行勿洗浴勿復淫火以擾其子宮而多服養肝平氣清熱
養血補脾之品胎自固矣蓋墮胎之症在三五七月者多在
四六八月者少臟陰而腑陽三月戾心五月戾脾七月戾肺
皆在五臟之脉陰常易虧故多墮耳惟一月之內墮胎人但
知不受妊不知其受而墮也一月戾肝大怒則墮多洗下体
竅開亦墮一次既墮肝脉受傷後期必應乘其虛耳故人無
子者宜預服調經種子之藥以保一月之胎予家四金匱丸
出自秘府實有挽回造化之功屢用屢驗調經種子如神

敢自秘謹附十後以廣生生之德云

四金匱丸

香附六兩

用黃相山枝各二兩同浸炒

川芎續斷白朮白茯苓

當歸山藥白芍

俱酒洗炒各四兩

青皮砂仁

但炒

白茯苓

酒洗各二兩

條芩

酒炒

生地

酒洗各四兩

芎朮山藥淡醋湯糊丸醋湯下蓋條芩白朮安

胎聖藥養胎全在脾胃譬之金懸于梁梁軟則鐘下墜折而

隨矣故用白朮若條芩力能清下焦實火火去則陰自足一

增其利一去其害又何小產之足慮哉

赤白帶

奇經八脈帶居一橫于腰間如帶束病生于此故取名方書分

為五種錄色如青泥屬肝紅津屬心形如白涕經行產後風入

胞傳于臟腑生病出婦人良方東垣之論主亡陽東垣云血崩久則白陽故白滑

之物下流未必丹溪淫熱痰積屬丹溪云帶下是淫熱為病治

全拘于帶脉丹溪云帶下是淫熱為病治丹溪淫熱痰積屬丹溪云帶下是淫熱為病治

宜升白尿氣分赤屬血徐用誠言真可讀清源收帶有妙方芪

鮮當人麻胡，芍夏草皮川

木歸參升柴局茯苓甘陳芎香附水煎姜棗空心服生地黃栢

瘦人添延胡小茴腹痛兼去冬加姜灰法玄妙防風山枝色青

先紅白黃連枝子用黑合六味地黃煎

示吉白帶症病原不同治法各異如病婦肥白無病容或昔

肥今瘦脉來沉滑濕痰也如飲食減少四肢無力帶下多自

胃中痰積下滲也加婦人久病寒熱不齊夜輕日重或自汗
脉大無力氣虛下陷也加兼潮熱夜重日輕肌黑形瘦盜汗
骨蒸脉細數血虛火熱也如因不得十大七情抑鬱鬱而

爲火以致帶下鬱也濕痰宜滲濕消痰海不半夏南星黃栢
倉朮川芎香附檮根

皮痰積宜消痰升提二陳加二木升麻柴
胡或前湯加左菴子下陷宜升提補氣

宜六君子湯加綠升麻柴胡火熱宜滋陰養血四物湯加黃栢檮根
皮滑石青黛海石鬱

氣宜開鬱行氣起鞠凡加
檮根黃栢分條而治自得病情東垣用葵

花治帶白者治白赤者治赤須炒黑用神驗肥人用瓦龍

子以燥其淫

乳疾

陽明胃經主乳房厥陰肝經乳頭生醇酒厚味兼憤怒胃肝火
 動癰疽妨堅硬如石各石乳娑娑多口乳發方吹乳發于乳嘴
 上乳漏之癰生塊囊不痛不痒如桃核乳岩潰後病難當有子
 吃乳外吹癰兒口熱毒吹乳病急須消散易為功因循潰後醫
 難應軟溫飲子是煎方總治乳疾能接命柴胡赤芍并木通黃
 芩瓜蒌青皮順甘草桔梗共當丹乳香沒藥山甲進廣膠三錢
 酒水煎痛甚角刺橘葉滲托裏黃芪及防風解毒銀花翅具順
 示吉曰乳症消散為易潰後收斂為難蓋其形內懸垂而血

連丹

易滿也然乳癰為輕石乳乳發為重乳癰費日尤可望愈乳
 巖一潰不可救矣胎前乳癰為內吹產後乳癰為外吹外吹
 若潰乳至即膿最難收口初起乳汁不通結核腫痛速宜操
 散或忍痛吮出惡汁或用木梳頻刮乳房乳汁一通核自消
 散倘不愈急用葱搗成餅攤乳上一指厚用灰火一罐覆之
 須臾汗出腫消內服瓜蒌散亦妙 黃瓜蒌子多者一當歸
 甘草 各五錢 乳香沒藥 另研各一錢 水酒煎服若結核乳巖兼用八
 珍湯加青皮柴胡麝香少許尤妙 秘方治吹乳乳汁不行
 猪牙皂 炒 蛤粉等分為末每服一錢陳酒送下 一方諸般

乳病內消用大黃白芷鼠糞當歸等分爲末每服三錢陳酒
下毛公威驗過

女子月事胎產脉法

玄黃之精妙合而凝乾道成男坤道成女女子以坤道用事故
陰盛陽衰爲順左爲陽右爲陰寸爲陽尺爲陰是以女子寸脉
常弱尺脉常盛右脉常盛左脉常弱此與丈夫之脉不相同之
大綱也更有不相同者惟月事胎產之脉經云女子二七而天
癸至任脉通太衝脉盛月事以時下故有子王大僕曰陰靜海
滿而去血陽動陰合而泄精二者相資故能有子卽易所謂男

女構精萬物化生也其有子之脉若何經曰足少陰脉動甚者
妊又云陰搏陽別謂之有子十月既滿子欲受生則有離經之
脉可考焉離經者離其常經謂脉來數急或沉細而滑也迨及
產後脉來沉小緩弱爲吉何也脉爲血之克產後則心生血肝
藏血其生藏者有限血送胎下無窮不足症也若脉來弦實洪
人是爲脉症相反其能久乎總之產後之脉現微細不責其不
足胎前之脉現洪滑不責其有餘臨蓐之際沉滑而數不責其
熱調經之時遲數不等方辨其病此爲女子脉法之要從此而
益求其精有何病之不愈哉

調經脈法

診脈沉遲主踰期不至小腹冷痛 脈弦數主先期而來或有
黑紫血塊 弦滑而沉主月色淺淡或雜色如魚腦或帶下多
白 脈微濇主月來血少或過期不至 沉實主經行著氣腰
腹疼痛 六脈俱微主榮衛皆虛月事前後不均或來欠少或
淡白色 陰脈虛陽脈搏手主血崩 二尺芤主血海敗 微
細而數主骨蒸血少經閉不行 脈來狀如琴絃若小腹痛主
月水不利孔竅生瘡 少陰脈滑而數者陰中生瘡 少陰脈
位者白腸心挺出 胃脈濇少陰脈微遲微則無精遲則陰中

寒瀆則血不來此為居經三月一至 瀝血下赤白脉遲者及
芤小虛滑者急疾者及大緊實數者死

妊娠脉法 王冰曰陰搏陽別謂之有子者陰中有陽故尺脉

搏擊于指與寸口殊別也 王叔和曰診其少陰脉動甚者妊

子也少陰心腎也心主血脉腎名胞門子戶二脉動甚妊娠何

疑 王肯堂曰懷胎二三月之脉兩寸浮大兩關滑而天微帶

數者此真胎脉 妊娠四月可分男女左疾為男右疾為女俱

疾主生二子 又法尺脉左偏大為男右偏大為女左右俱大

主產二子 妊娠五月脉來數疾不散 六七月脉來實長若

沉遲而濇宜防胎墮 八月脉喜弦實息沉細若少陰微緊主
兩胎一傷 臨蓐脉法 離經之脉一息六至或六脉沉細而
滑若兼中指木節跳動臨蓐之徵也如忽然浮大必主難產看
唇舌若青黑沫又出者爲母子俱死若面赤舌青母活子死面
青舌紅母死子活

產後脉法 產後之脉診得緩滑及沉細附骨者生若見實大
弦急及寸口疾濇不調者死 肝脉虛散而數者主血暈 左
手三部堅牢主血氣冲心冲胃 胎前尺脉沉滑產後不減者
主兒枕痛 兩尺脉花主去血過度 右手三部虛散者主惡

露不止蓋氣不足以固血也 微細而數主血虛發熱日輕夜

重 六脉微細無神主羸勞自汗 石關沉而有力主傷食發

熱噫酸惡食 產後傷寒熱病脉宜微細不作陽病見陰脉論

也 丹溪曰胎前脉細小產後脉洪大者死

一婦年四十歲有十餘年不受胎矣月事前後不淮而又無子

脉來微細兼數子製女寶丹服至百日而孕後產一男

一女子二十餘歲有孕至五月間必墮已三四次矣于亦以女

寶丹加減付之即產一子

女寶丹 調經種子如神能安胎保孕

當歸

六兩 酒洗

生地

六兩 酒淨

白芍藥

酒炒 三兩

川芎

酒洗 三兩

芸白朮

六兩 上炒

條芩

酒炒 四兩

陳皮

炒 兩

香附

童便鹽酒醋 四製 四兩

阿膠

酒浸溶蜜 兩三兩

砂仁

炒 兩

已上

加法製度為末另將益母草

一斤半煎膏和煉蜜及阿膠為丸如桐子大每服五錢空

心白湯送下 月事後期來者去條芩加乾姜灰一兩岐艾

二兩 肥者 製半夏三兩白茯苓四兩有白帶者再加白

薇四兩 氣虛甚者加人參三兩茯苓四兩山藥四兩如

安胎用白蜜丸不用益母膏如腰痛加山藥杜仲各二兩

孕婦瘧疾大作脉得弦數子用知母四錢柴胡三錢陳皮

錢甘草一錢并河水各一碗煎至一碗露一夜明早隔湯頓
溫服而愈 不愈加生何首烏五錢 自盜汗甚加黑豆三
錢 食多加枳壳二錢 此方熱多者宜之

孕婦瘧疾右脉微滑左脉微弦予曰脾虛生痰也以白朮五
錢生姜三錢并河水煎露一夜溫服而愈 此方寒多者宜
之

一孕婦痢下赤白裏急後重逐滯利水俱不可予曰惟清血調
氣法也用姜汁炒黃芩黃連各一錢蘇梗當歸各錢半炒白
芍篇豆山藥欒芩澤瀉車前枳壳各一錢木香五分甘草二

分煎服數劑而愈

新產發熱服藥不上予以益母草煎湯加童便與之熱遂退

益膠其脉平和惟稍數故也

新產發熱投之四物及童便姜灰之類不應予診其脉右弦

謂左微細予曰是也燕酸飽悶停食故也以神麩山查厚朴

神麩山查厚朴 燕酸飽悶停食故也 以神麩山查厚朴