

無醫
自治

百病治療丹方

海左書局印行



無醫百病治療丹方卷三

○第五編 皮膚科

▲治手足生磁

藥料

用半夏二錢 生南星二錢 川椒二錢 夷茶一錢五分 川烏二錢

錢 生軍二錢五分 姜黃二錢 石羔二錢 蒲黃二錢 蘇黃二錢

草節一錢 雄黃一錢五分 銀花三錢

治法

將各藥共為細末 用猪胆調塗

▲治手足腫炎

治法

初起之時 宜急平置此指於桌上 取剪刀或洋刀徐刮指甲 先

宜縱刮 然後橫刮 刮至指甲糙白為度

附註

此法看似平常 然極有效 刮後閱一日 其腫即能自消 且刮

時亦不覺痛苦也

▲治噦噎

治法

煎良姜服之 或可嚙而吞之 輕者藥下咽即止 或用大指強押

亞門穴 (在頸後) 復以一手押兩眉間 強押片時 即能止



▲治聲啞

治法 用蟬蛻（藥店中有購）十數枚 煎湯服之 隔一日可愈

▲治吞針入喉

治法 用舊葫蘆燒灰存性 以茶送下 自能出

▲治骨鯁

治法 宜端午午時韭菜地上 面東不語 取蚯蚓泥藏之（即蚯蚓糞）

遇魚骨鯁喉 用此泥少許 擦於咽喉 即能愈

(二)

治法 食橄欖數枚 其骨即下

(三)

治法 用生扁魚胎搗爛 同酸梅敷於喉上 魚骨即可散開

四

治法 用礪砂煨末吹喉 或鵝鴨涎滴喉 均有效 或用乾柿 儘一口

之量吞之 連核一氣嚥下

▲治鷄鴨等骨鯁



治法 用威靈仙和紅糖少許 煎濃服之 骨即軟化而下

(二)

治法 用茶半杯 向東方用中指書禾川米貴四字於茶上 不須挑動

將茶一氣飲之 立即可下

▲治龜裂

治法 用五倍子 同牛骨髓 填納縫中 即愈

▲治鷄眼

治法 用萬年青葉 搗爛敷於患處 可以斷根

▲治足下生繭

治法 用葶藶半個 (切忌用刀) 貼在患處過一夜 次日晚上再貼 六

七次後 其繭即能連脫去

▲治氣逆

治法 將自己指甲用刀剪下少許 塞在烟捲紙內 燒而吸其烟 (須

將其烟氣咽下) 不吸紙烟者 可用水旱烟以同法吸之

▲治噎隔不止



治法 用物刺鼻中 使嚏涕 即能愈

▲治噎食

治法 用佛手香椽一個 先割去蒂處一塊 將香椽囊心 盡行挖去 取新鮮人糞 放入香椽內 仍取先割去之蒂一塊 照前合之 濕草紙包裹香椽 外面更用泥包之 以新瓦存性 去其泥 椽連內所放之大糞 共為細末 以白粥送下

(二)

治法 用生鹽川椒各等分為末 塞以臍孔 另再用生姜一片掩蓋 以乾艾絨灸之 俟姜焦 再換再灸 其氣自通

▲治噎食噎喉

治法 用巴豆北辛研為末 用紙將藥捲在其中 兩頭紮緊 從中間剪開塞入鼻孔 一時後 頭頂上水涼 其喉即開

▲治龜疝

治法 用調味瓶內之糖少許 濯手不獨易去龜疝內之污穢 且能治愈

凍瘡

▲治皴裂

治法 用醋化亞鉛 和凡士林 羊毛指 三種混合為膏 擦凍處即愈
或用樟腦油與安母利母亞水擦之

▲治手掌磁

藥料 用草烏一錢 川烏頭一錢 川大黃一錢 荆芥一錢五分 當歸

尾一錢五分 甘草一錢 蛇床子一錢五分 防風一錢五分 麻黃

一錢 五倍子一錢五分 牛皮膠一錢五分 加葱白六條 老姜

錢 煎水洗之

▲治油灰指甲

治法 用白鳳仙花 連根葉搗爛敷之 換二三次即愈

▲治竹木刺

治法 用螻蛄膏塗之 秋間取螻蛄陰乾藏之 用時將螻蛄為末 以飯

粒捏和塗於患處 則刺自出

(二)

治法 用釘頭折斷 釘頭自出 鉗不能拔 塗螻蛄膏於釘頭 越一日

第五編 皮膚科



夜 釘頭自出

▲治瘦手轉肥

治法 乾癯之手 浸於沸水中 以可可乳油 或他種乳油 摩擦之 分鐘後 置冷手內 亟伸出 以毛布拭乾 熱水忽為冷水所激 乳酪之屬 悉閉毛孔內 能使新肌肥發

▲治手指肉刺

治法 指上肉刺 往往拔去復生 觸著甚痛 殊覺不便 可於如廁之時 順手在糞桶邊上磨之 越一宿 即萎自落 因鹼性之作用 故極神效

▲治鶴膝風

症象 患此者 初起之時 膝下酸痛 漸至膝蓋膨脹 股筋焦瘦 以腎虛虧之故

治法 用火嘴燻鰻魚數尾 以白糖搗爛 敷三四次 即能愈

(二)

藥料 用大熟地五錢 白當歸五錢 薏米五錢 川貝(製)五錢 半夏



版權所有

（製）五錢 杜仲二錢 枸杞三錢 以大白鶴一隻 乾去其毛 再以火燒去絲毛 不可沾水 開肚 不可腰臟 用雙蒸酒四斤 鶴肉切碎 和藥同酒煎熟 早晚吃二三次自愈

治爛脚

藥料 用黑鉛眉一錢 銀粉一錢 雲連一錢 枯礬一錢 麝香一分 牛艮（去毛存性）一錢 樟腦一錢五分 血竭八分 兒茶五分 冰片一分

治法 將各藥共為細末 如脚爛日久 有腐骨腐肉者 先用葯葉搗爛

貼在患處數次 腐骨腐肉 必然高起 然後再用旗匣魚存性 清油調塗 立即可愈

（二）

藥料 用生大黃二錢 川山甲（炒）二錢 乳香（煨）二錢 沒藥（煨）一錢五分 香白芷二錢 生甘草三錢 石脂（煨）三錢 硃砂一錢五分 正龍骨二錢 正川椒二錢

治法 將各藥共研末 用芝麻油調塗 另用水片麝香各一分 敷在患

處 頗見神效

附註

爛脚為患 竄逐蔓延 往往經年累月 難於治愈 惟用自

龜板一個 煨灰存性 研末搽上 (或用麻油調塗亦可) 頗著奇效

特其物難得耳

▲治爛脚方

藥料

用生葱(連根)一握 老姜五大片 甘草節二錢 金銀花二錢

洗法

將各藥煎濃去渣 溫洗

▲治遠年爛脚

治法

用隔年白茄葉搗爛 以未蒸的酒糟勻和 放瓦鉢內 以滾水燙

煖 敷於患處 俟藥冷 再換熱藥敷上 如是數次 即愈

▲治遠年蠃脚

治法

用桐油反研薄藥心 用冰片并入 加麝香少許 敷於患處 隨

其流盡毒水自愈

▲治爛脚指鱗

治法

用五倍子(煨)三枚 冰片五釐 共為末 茶油調塗



▲治爛頭爛脚諸毒

治法 用九里明葉 猪胆汁 茶油 各等分 共煎好澄清 放於地

一二日 然後取塗患處

▲治爛脰(又名爛尺高)

藥料 用胆礬三分 蛇床子二錢 柏子油四茶匙 猪胆一枚 用九里

明汁和勻 以瓦鉢煎成膏塗之 即小兒爛頭爛身亦可用

▲治濕氣脚腫

症象 濕氣脚腫 下腿麻木 行走不便 若不速治 腫至腿彎以上

即難治愈 特述內外兩種治法 奏效神速

治法 (外治法) 用陳米赤豆 (形如豆畧細而長愈陳愈佳即使蟲蛀者

亦所不妨) 與退秧竹 (筍將成竹未成而自死者陰曆四五月間竹

林中甚多) 入水煎至沸透 盛桶中先燻後洗 日一二次 即愈

(內治法) 用甲魚一隻 約重半斤許 殺之去腸雜洗淨置砂鍋內

加入大蒜頭(分開去衣)二三枚 生姜二片 灌入陳酒八分 以滿

為度 (用水無效) 緩火煎之 (灶內燉更佳) 至爛熟脫骨 然後令



患者連湯淡食之（切不可用鹽）亦可愈

附註 其味頗難上口 以食盡為度 其不善食者 其肉即可啣食

湯務要吃完 如是食鱉一二隻 必愈

▲治脚底濕毒

治法 用蛇皮一條（藥店中有購價甚便宜）撒以冰片少許

不久毒液流盡 即愈

▲治脚腫

治法 用紅棗一斤（去核）熟花生一斤（去壳）共搗爛 用吊鍋蒸露

每日飲之

▲治脚癬

治法 用瘡粉（夏令小兒生瘡子所撲之粉）裝入白鶴花（即白玉簪花）蕊

中 吹乾後 裏諸盒中 患脚癬者 取其粉撲患處 即效

▲治脚氣

治法 用杉木節三寸（無木節以木花代之其功稍低）與橘葉三錢 煎

服之 七服後能愈 患脚氣者 切忌洗足



二

治法 用猪蹄胖之太骨一根 切陳香椽數片 加水煎至骨髓出

爛 將水傾入盆中 浸脚入 上面覆以布 連日照法行

(三)

治法 搗蘿蔔成汁 向膝下及足掌 輕輕塗之 約五六次可愈

(四)

治法 用大蒜燉甲魚 淡食之 或用金腎氣丸 亦可治

(五)

治法 用地梨煎湯 乘熱洗於患處 或於冬時食布穀鳥亦可治

▲治足癰法

病原 足上老癰 在天氣陰霾 將雨未雨之際 抽痛甚烈 一步難移

雖時時洗足挖剔 然終不能斷根 且遇刀等鐵器挖之 愈增其

堅厚

治法 用糯稻根泡在沸水中 將在癰浸入其中 連洗數月 漸漸軟薄

自能脫盡



▲治鷄眼要法

治法 用軟竹布塗松節油 Turpentine 貼於患處 每日換兩

早晚行之 其效神速 悶數日 自能消去

(二)

治法 宜搗葶藶一枚 和蕎麥麩少許 貼在患處 越一晝夜 便能自

落

▲治肉刺鷄眼疼痛

治法 用黃丹枯礬稍 各等分 共為細末 炒葱白塗之 即能愈

▲治足底膿泡

治法 用鯨鬚為粉 和飯粒塗之 貼於底上

▲治遠行疲倦

治法 將足洗淨 以口嚼鹽塗於足底 以火灸之 復用細索 繫索束

兩股 遠行自忘疲倦 或塗奇楠香於足心 而穿草鞋 不致起泡

▲治足跟痛

治法 用黃牛糞和鹽灸之 灸熱和鹽塗於患處

▲治脚底起泡

治法 用水調生麩塗之 一夜即平 或用菜菔子炒研末 和白礬末鋪於鞋底上 雖行遠路 永不作痛

▲治脚起水泡

治法 臨睡時 用燭油滴於手 頻頻擦之 如行路遠 可預搽肥皂於襪底 以免生泡 或旱烟管吸烟之時 將烟管頭着泡上亦可 用旱烟灰和飯粒融之 使粘塗紙上 貼水泡

▲治足麻木

治法 兀坐與如廁 如時間過久 兩足即麻木不仁 須於初覺時探手膝灣 頻頻抓之 即能愈

▲治手足入水怕冷

治法 將手足塗陳黄酒 口服胡椒渡河 則手足入水不畏寒矣

▲治手足畏寒

治法 用胡椒剖為二 炒焦乘熱包之 束於臍上 可治

▲治汗斑



治法 用吳茱萸為末 苦瓜蒂蘸擦之 使起泡為度 再以疏布碎捲成

團 蘸油燒灰 仍用苦瓜蒂 點擦患處

(二)

藥料 用蜜陀僧一兩 硫黃五錢 紅礬八錢 雄黃二錢 孩兒茶二錢

五分

治法 將各藥為末 以醋調敷患處即愈

(三)

治法 用苦瓜搗爛取汁 赤礬三分 硫黃五分 (研末)入苦瓜汁中同

煎 約數滾後 以布蘸藥塗之 極效

(四)

治法 用蜜陀僧白芷明礬硫黃各等分 研為細末 以新布點擦即愈

(五)

治法 每月十四夜 月色光明 下階將兩手捧月 洗於患處 勿令人

見之 奇驗無比

▲治夏日汗斑如疹



治法 用蜜陀僧八錢 雄黃四錢 共為末 先將生姜片擦患處 再用

姜片蘸藥擦之 即能消

(二)

治法 用老黃瓜 (以色純黃者為佳) 於汗斑處頻頻擦之 即能自消

▲治雀斑

治法 用茄子切成小片 擦於面部 其效如神

▲治粉刺

治法 用雲母粉 杏仁粉 牛乳 調和畧蒸 敷之

▲治面上黑氣

治法 用門冬 和蜜搗爛 日日洗面 即能白

▲治頭皮屑

治法 用牛蒡叶 搗汁熬膏 塗之 明兒茨水洗之

▲治牛皮癬

治法 用石榴皮蘸明礬末 抹之自愈

▲治荷葉癬



治法 用荷葉蒂 晒乾研末 香油調敷 數日脫去厚皮一層 將來永
不發

▲治癩風

治法 用松脂煉之 入冷水中再煉之 至二十度 研末以蜜丸
椒之大 每服二十九 空心用開水送下 切忌鹽味之食物 如胡

▲治暈船

治法 用生姜甘姜研成細末 服之 或初上船時 用硫黃嗅之 可免
此患 或製梅數顆 含於口中 或閉一眼 或戴紅色眼鏡 均可
免

▲治湯火傷

治法 用石膏滑石研末 加鷄蛋白和之 塗於傷處 或塗燈油於傷處
再塗鹽於其上

▲治碎片刺足

治法 貝類之碎片 刺入足內 用捕生青蛙 割開貼於傷處

▲治釘類入皮膚



治法 用酸棗煨灰 以熱酒送下 如傷處在上 可服於食後 傷處在下 則服於食前 俟額上作癢 即能從原處拔出

▲治跌打損傷簡法

治法 用生姜汁 加阿膠煎之 塗於患傷 或搗大蒜成泥 和石灰 使其堅固 七月十三日埋在土中 至次年此日 搗碎藏瓶 可用以敷傷

▲治折傷手足

治法 用水仙連根及葉 煨灰存性 與梅乾和飯粒塗之

▲治刀傷藥

治法 用黃臘橄欖油各一兩 煎熱 調和俟冷 再加松香油一兩 凡刀傷及湯傷 青腫起泡 貼之皆效 當五月五日午時 將野外之車前草 採取洗淨 曬乾研末貯藏 如遇大小傷口 將此藥敷於患處 則血立止 並可防菌類之寄生

▲治折骨

治法 用楊梅樹皮 並洗傷處 再將其渣塗之



▲接骨法

治法 用未退胎毛小鷄一隻 生搗其鷄成泥 再加五茄皮末少許 勻後 敷於傷處 接骨如神

▲治瘤

治法 用丹礬研末 搓入紙捲之內 切緊瘤之根部 其瘤可脫

▲治鼠咬傷

治法 用生姜一片 塗於貓口 貓涎流出 將涎滴在咬傷之處 即能

全愈

(二)

治法 用焰硝傳於傷處 點着使之發火毒 可隨火而散 再傳以麝香

將白躑躅花 或用千屈煎菜服之 或將其血擠出 或將傷處用

熱湯洗之 或揉牽牛葉敷在傷處 再服千屈菜白躑躅花

▲治毒蟲螫

治法 用胡椒粉糊飯粒塗之 或用芋芳搗爛塗之

▲治螞蝗入肉



治法 赤足耕田螞蝗鑽入足內 可用菜油 或凡士林厚塗足上 可免

此患

▲治嘴歪

治法 用全斑蝥一隻 (脚要完全) 青娘子一對 紅娘子一對 藥店

均有出售 將各藥搗入 再用葱頭搗爛 用黃蜆壳盛好 如歪左

則合右手太陽處 歪右 則合左手太陽處 用打頭帕 即綳紗

包好 合一週時 待嘴不歪 將藥即行取去 但切忌針灸

◎第六編 喉科

▲治喉痧

藥料 用紫蘇葉一錢 炒香豆豉三錢 薄荷一錢 牛蒡子三錢 整杏


仁二錢 大貝母二錢 炒枳實一錢五分 生甘草梢一錢 生姜皮

一錢 連鬚葱二根 童便一茶杯 兌橘絡一錢 鮮枇杷葉一斤

(去毛包) 茨茹苗七個

治法 如痧仍不大暢 則可單煨香薷湯食之 切不可吃春筍尖芫荽等

味 或用芫荽觀音柳 (二味同煎) 務要濃湯 時時於頭面身間薰



洗 亦足疏啟皮毛 使痧透出

治一切喉症

治法 用蝸牛（俗名圓螺虫）雄黃 二味共搗爛 以滾水冲之

中含之 即可治愈

治鵝喉

藥料 用黃柏一錢五分 防風二錢 川連五分 黃芩六分 青黛五分

白芷一錢 花粉五分 甘草一錢 硼砂一錢 梔子一錢 麝香

一錢 冰片一錢 人中白二錢 山豆根二錢

治法 將各藥共研為末 吹入喉內 即可消

治雙單鵝喉

藥料 用山豆根一錢 牛黃五分 青黛四分 冰片三釐 人中白五分

硃砂三釐 硼砂三釐 川連七分 麝香二釐

治法 將各藥共為末 用小紙捲成筒 將藥放入紙筒中 輕輕吹入喉

中 隨即吐痰 又復吹入 經一夜後 必可全愈

附註 須預煖茶一盃 恐藥末粘喉 必須茶方能吞下 再用鳳仙花子



數粒 焙乾研末糝之

(二)

藥料 用桔梗二錢五分 甘草二錢 桑白二錢五分 花粉二錢

一錢五分 銀花二錢 川芎一錢五分 白芷一錢 連翹一錢五分

牛子二錢 歸尾一錢 赤芍二錢 黃芩二錢 荆芥一錢五分

生軍二錢 防風一錢

服法 用淨水兩大碗 煎至一碗 分兩次服之 甚效

▲治鵝喉要藥

藥料 用製半夏 荆芥 防風 羌活 獨活 柴胡 赤芍 甘草 桂

枝 陳皮 薄荷 青皮 熟南星 銀花 厚朴(姜汁炒)各一錢

服法 以淨水煎好 溫服 如生在左 再加用厚朴一錢 生在右 加

用赤芍一錢 痰多 則加南星一錢 半夏一錢 舌黑 加荆芥一

錢 舌白 加防風一錢 舌黃 加柴胡一錢 在正喉者 加人中

白一錢 秋石一錢 牙肉黑者 加升麻一錢 石羔一錢 如婦人

有孕者 去南星半夏桂枝赤芍 再加用當歸一錢 川芎一錢



附註 凡此症者 咬牙抽筋者不治 心經有痰者不治 搦滿牙肉者不

治 額頭有藍者不治 入頸蛇頭者不治 有氣不喘者不治

(二)

治法 平時取水爪蜂 以酸梅汁浸之 遇患此症 則撬開患者之牙關

取蜂放入口中含之 使口中之水 漸漸咽下 便能自愈

(三)

治法 用蜘蛛二個 以酸梅包裹 用新瓦在性為末 吹入喉內 或用

壁錢帶白胎盒存性 研為末 吹入喉內 亦效

(四)

藥料 用牛蒡子一錢 僵蚕一錢 山豆根一錢 花粉一錢 浙貝母一

錢 明礬三分 川黃連五分 連喬一錢 正硃砂五分

治法 將各藥共研為末 吹入喉內 便可愈

(五)

治法 用蝸牛搗青梅 滴入即穿 或用青梅搗鼠婦 能兼治爛喉

(六)



藥料 用硼砂六分 冰片一分 秋石二錢 生石羔一錢 川連一錢

▲青黛六分 甘草二錢 夷茶六分 木樨子(存性)四粒

治法 將各藥研為細末 吹入喉內

▲治重舌鵝喉

藥料 用冰片四分 牙硝四分 川連四分 雄黃四分

治法 將各藥共為細末 吹入喉內 即愈

▲治雙鵝喉

治法 用水瓜根 煎湯極濃 飲之立愈

▲治經驗喉

藥料 用荊芥五分 枯硼三分 梅片一分 木樨子(存性)一枚 川貝

六分 半夏四分 秋石一錢 青黛二分 川連三分 胆礬一分五

釐 豆根三分 兒茶五分

治法 將各藥研末 吹入喉中 如喉風症 再加雨傘紙少許 烏梅一

枚 (同存性)入前藥中 吹之 神效無比

▲治蟻喉



〔症象〕

凡此症者 喉嚨腫痛 即是 如無痰者 就為鵝喉 不可不辨

〔治法〕

用白蟻頭 焙乾存性 吹入喉中 立即能愈

▲治咽喉腫閉

〔治法〕

用鵝血煎湯飲之 如果腫痛 用巴豆一粒 包塞鼻中 男左女右

右

〔二〕

〔治法〕

用橄欖核燒末吹之 喉有響聲 以破裂血出者 有效

〔三〕

〔治法〕

用食鹽炒研末 吹入鼻中 或加用胆礬硼砂人中白少許

〔四〕

〔治法〕

用巴豆(去皮絲) 穿之 納入喉中 須臾牽出 即省

〔五〕

〔治法〕

用癩蝦蟆一隻 白礬三錢 同搗爛 敷之 俟乾再換

▲治喉痺

〔治法〕

用秋石二分 枯礬二分 生鹽二分 畧炒 共研細末 吹入喉



南京中醫藥大學圖書館藏

內 即愈

▲治爛喉痧

病因

近時多煤火煤油麩食 則偽鹼起酵 凡人鼻受之氣

口食之味

熱毒久積腸胃三焦

且天氣寒熱太暴

稍資大意

便要觸動

如地雷炸藥

直冲咽喉

串入血絡皮膚

兼發痧疹

可知此症

全是熱毒迷漫而發者

每每先從小兒起

傳染於大人

蓋因小孩

臟腑柔嫩也

凡病至傳染

則為瘟疫

故此症

當從瘟疫熱毒例

治之 不得概照喉症治之

避忌

(一) 忌風燥溫升藥

如荆芥防風葛根羌活獨活柴胡桂枝芫荽觀

音柳笋尖等

(二) 忌苦寒水伏藥

如黃連黃芩黃柏石羔知母犀牛角羚羊角雪水

金汁梨汁等

(三) 忌陰柔滋膩藥

如党參熟地黃芪麥冬玉竹白朮阿膠等

(四) 忌酸澁收斂藥

如山萸肉五味子烏梅肉酸棗仁櫻桃核蒲桃乾

青菓等



專一蕩滌肺胃 疎通三焦 祛其邪從大小二便出 則妙 至於寒痰喉痺 則大不同 不必混入

藥料

用枳實三錢 豆豉四錢 通草一錢 連翹二錢 山柃三錢 杏仁二錢 金銀花三錢 牛子三錢 人中黃三錢 薄荷一錢五分 滑石三錢 生草梢二錢 鮮枇杷葉(去毛用布包)一片 童便一茶杯

服法

用清水煎服 如天寒 可酌加蘇葉少許 生姜一片 小孩則煎此分量減半

治喉吹散藥

藥料

用生甘草五錢 薄荷四錢 海蛤壳五錢 秋石四錢 人中黃五錢 金銀花五錢 生山柃三錢 海浮石五錢 寒水石四錢 玄明粉五錢 桔梗二錢 天竺黃三錢 硼砂五錢 射干二錢 青黛三錢 正號真梅片二錢

治法

外研揀入右藥 生晒 忌用火焙 研極細末 吹入喉中

治爛喉痧喉



治法

將患者頭頂上察視 先將患者頭髮拔去數莖 視其有無紅筋紅

點 先用生姜一大片 蘸青桐油擦之 以皮白為度 紅筋等自然

顯露 再用銀針挑破 擠去惡血 喉間結毒自消 然後進藥 奇

保萬全

▲治燕窩喉

治法

用燕子窩坭二個 將清水十斤溶之 (用捧搗碎) 待其澄清即

用此坭水嗽口 接連嗽至二十餘口後 腫者自破而血出 再嗽十

餘口 血盡而根除矣

▲治破喉及喉痛

治法

用山豆根炒水 以紅火炭加入炒之 飲下即愈

▲治喉症靈方

治法

宜於清晨井中 汲第二桶之清水 滴於壇底 以金葉蘭(各處

藥舖中有之)磨之 磨下之粘汁 以開水冲服 但其味甚苦 其

性極涼 故能治喉症

(二)

治法 用土牛膝四兩 (即天名精根) 此草方梗對葉 紅芽白根 產於

郊野地) 搗爛絞汁 用大半茶杯 一口飲下 逾半小時

得吐痰

涎半盂 即覺輕鬆 再以土牛膝二兩 搗爛煎湯 俟涼時時飲

壅腫自消 應若桴鼓 且亦簡便 但孕婦忌服

▲治一切喉症靈驗方

治法 用美國燕醫生化痰藥水 每次服一小調羹(即茶匙) 三分之一

以微溫開水沖服 另再用蘿菔汁一大酒杯 隔水燉 畧溫飲服

隔二三十分鐘 再服化痰藥水一次 蘿菔汁一次 如係初次

服三五次後 痛勢即能減輕大半 再服二三次 即全愈矣 若係

極重喉症 即酌加藥水分量 並加蘿菔汁分量服之 十次八次

病勢必能減輕 再服數次 必可全愈

附註 如轉輾稽延 多生他變 誤人性命 如服此方 輕者二三點鐘

重者四五點鐘 極重者一日之內 必能全愈 萬試萬驗 且燕

醫生化痰藥水 性極和平 勿以西藥猛烈 因而遲迴却願 而不

敢於嘗試 此方屢試屢驗 百無一失 無論何種喉症 初起時可



北京中醫藥大學圖書館藏

用大棗一枚（去核）內包蜒蝥一條（俗名鼻涕蟲）裹緊含於口內
其毒自解 再用桑葉蠶蚕 以水嗽口去痰

（二）

治法 用人指甲白蟻窠 各等分 以藥每錢加麝香一分吹之 此法能

兼治雙單鵝喉

（三）

治法 如在船中 或在陸路之際 遇此症者 可將病人頭髮解開視之
如有血泡 即是此症 速用細料磁器打碎 將尖頭擦破 擠之
血淨 喉內即愈 有銀針銅刀更妙 切忌鉄器

（四）

治法 用活蜒蝥一條 以開水洗淨 再鹽梅乾一個（去核）將蜒蝥嵌
入鹽梅乾內 含在口中 則火痰立刻吐出 病勢驟減

治喉風急痺

治法 用蠶殼置屋瓦上 日晒夜露 取下 選其色白如雪者 搗細

以水漂淨未晒乾 同冰片吹喉 能專治一切咽喉急症



治喉風

治法

當臘月時 霜雪交降 用蘿蔔一大枚 中放皮硝水片

際通風處 俟其霜吊出 取為吹藥 屢試屢驗

治白喉

治法

用老大蒜一瓣 (獨子者佳) 搗泥如豌豆大 敷於經渠穴

指伸直近手腕寸脉有窩處即是 (男左女右) 用瓦楞子 或相類

物 蓋上紮住 閱五六時 起一水泡 將銀針挑破 搯去毒水即

愈

(二)

治法

用蒼耳草煎水服之 神效無比

治咽喉腫塞

治法

用蒿苳之根 煨灰研末 吹入咽喉即愈 或鼻中生癰 不通氣

時 此藥亦能奏效

治咽喉不乾及防寒氣

治法

可嚙大蒜塗鼻孔 喉既不乾 兼防寒氣



治烟喉糰餅梗塞

治法 煎濃醋飲之 自能下 或飲麻油 擊背三四下

(二)

治法 可削細竹約三寸長 以綿球縛其一頭 緩緩入喉 至糰餅梗塞

處 用力一觸自下

◎第七編 眼鼻科

▲治水眼熱眼

藥料 用大紅棗一枚 上梅片一分 黃藤(去皮心切片) 以金黃色者

為上 染靛店中有購)六分

治法 將三藥和勻 加淨水三分 放在酒盃 取白紙封固貯鉢內 放

飯面蒸熟 取其藥汁搽眼 立見奇效 如用七月七日水蒸 其力

更速 切忌塗入眼內

▲治熱眼

藥料 用杏仁(去皮生用)八分 生粉草六分 胆礬一分 正川連三錢

銅青三分 黑棗(去核)一枚



治法 將各藥秤准 不得加減分毫 用水一碗 煎至一盃 將棉乾蘸藥水洗眼 至喉中見苦為度 洗一二次立愈

▲治清涼眼

藥料 用硼砂一分 琥珀一分 硃砂一分 珊瑚一分 蘇合三釐 硝三釐 麝香三釐 丹頭一錢 元胡五釐 冰片一分

▲治風眼

藥料 用黃連三分 杏仁十粒 胆礬四釐

治法 將各藥煎水塗之 甚效

▲治眼膜

治法 用蛤胆調乳汁點之 立刻可愈

▲治風眩爛眼

藥料 用銅綠五釐 胆礬三釐 麝香二釐

治法 將各藥為末 入大口螺內 隔一宿 次早取螺水塗之



藥料 用黃藤(燒灰)一錢 白面豆仁(去皮)五分 銅青一分 冰片二分

治法 將各藥共為末 點眼上

(三)

治法 用開元錢三文 (要有指甲痕者為佳) 醋浸磨塗

▲治目不能遠視

治法 用羊肝一副 去衣膜切碎 加以葱子一勺 共炒為末 水煮熟

去渣 入米煮粥食之

▲預防眼病

病因 白濁入目 數日之內 流膿不息 雙目全瞽 名曰膿漏眼 白

濁之毒為淋菌 含於白濁之膿中 入目之後 暴發赤眼 胞腫如

桃不能開 眼角流脂如黃膿 烏睛多 化膿而潰爛 卒起蟹珠旋

螺而失明 世間瞽目 烏睛如覆白殼 如附旋螺者 均為膿漏眼

之結果

防法 (一) 男流白濁者 女患白帶者 須速治愈



(二) 凡患白濁者 手指與手中 防染淋毒 用消毒藥洗之 勿覆臥中及晨起時 尤不可以手指拭目

(三) 醫師治白濁後 拭過之棉布 宜悉數燒毀 用過之器具 宜十分消毒 手指尤當淨洗 以防自染 或染於人

(四) 入浴時 頭面與下身 宜分別時時洗之 切不可用洗下身之水 與浴巾洗面部

(五) 公廁之門鈕 旅館之枕被 戲園浴室 茶樓酒肆 之臉布 皆難免含着淋毒 宜注意之

(六) 無論何時 切不可用不潔之布片 或他人之手巾拭目 在兒童時 即當養成自帶手巾之習慣

(七) 青樓為淋毒之發源地 手巾為傳染之媒介 宜注意避之

(八) 小便治眼病之習俗 宜早禁絕

(九) 產母白帶有淋毒 產兒每染膿漏眼 故未產之先 宜用鹽水洗淨陰部

(十) 初生小兒 湯沐之時 頭面與身體 宜分別洗之 如洗面部



用清淨面盆 盛清水 用清潔手中拭之

(十一) 初生小兒 經過不潔之產道而出 難保無淋毒入目之患

宜翻轉眼皮 用新製二十倍硼酸水點眼

(十二) 接生宜用新法之產婆 使其能完全解毒 蓋因穩婆不知清

潔法 膿眼臍風 多由穩婆不良而造成之

(十三) 初生之小兒 七日之內 發赤眼胞腫不開者 必係膿眼

速延醫之

▲治目疾失明

治法 用厚朴五分 清水一碗 煎至五分 洗之即愈 但未洗之前

須齋戒沐浴 將洗之時 須迎日光焚香 一日三次 洗目之日期

列後 正月初三 二月初六 三月初三 四月初五 五月初五

六月初四 七月初二 八月初九 九月初十 十月初三 十一月

初四 十二月初四 或用皮硝(揀淨)六錢 桑白皮(生者洗淨尤

佳)二兩

治法 將二味入新沙罐內 用河水煎透傾出 澄清溫涼洗之 少傾再



洗 洗日須自早至晚 每日洗十數次 洗期亦同前

▲治目疾

治法 用黃連五十文 艾葉十文 以飯碗一隻 將艾葉置於碗

火焚之 用白紙一張 以針多刺小孔 將黃連鋪置紙上 蓋於碗

口 俟烟燻至黃連現焦色者 當即取下 用人乳和置杯中 浸一

晝夜 待寢時塗於眼角 二三日後即愈 無論初起或已成之眼疾

均有奇效 惟切忌入口

附註 此眼病治愈後 須忌房事 以百日後 方可無虞 蓋目疾大抵

以腎虧所致也

▲治目靈方

洗法 用芒硝六錢 溶解於清水中 照下列之日期洗之

正月初三 二月初八 三月初四 四月初四 五月初五 六月初

四 七月初三 八月初一 九月十三 十月十三 十一月十六

十二月初五

▲治石灰入目



治法 用極細之白糖 化為清水 取其膿而清者 將眼皮展開 用糖水
水滴入目中

(二)

治法 用生菜油洗滌之 更再滴入糖水數滴 不久自愈

▲明目奇方

治法 新生之小兒 以礪砂少許 熔化於熱水中 時時洗之

▲治目中起星

治法 用葶藶搗汁 洒在紙上 俟燥刮之 點在眼角 靈效無匹

▲移目中之星

治法 用黃柏縛置足心 即去

▲治目紅

治法 用人乳浸黃連 臨卧之時 點於眼角 過夜即愈

▲治微物入目

治法 用柚子核燒灰 置於舌上

▲治蛛絲入目



治法 用明礬末 和入滾水 貯於盆內 將首俯在盆上 頭上罩布一

塊 將水內之氣燻之 其絲即落於水內 或用上等之中國墨

水研之 注入眼角 少頃飛絲即和淚而出

▲治飛塵入目

治法 急將頭俯下 視一唾即愈 或將兩目閉緊 鼻孔用力呼吸

將下眼皮翻開 用絹拭之 如眼紅 可點以草麻油 須忌光亮

▲治忽然目腫

治法 畧用生姜汁滴於目中 奏效神速

▲治青盲眼

治法 用烏鴉胆一個 以綫穿之陰乾 點之即愈

附註 烏鴉胆汁 晝則散之身目 故精聚而能見 烟霄雲外 夜則汁

歸於胆 故取之之法 須待烏鴉夜睡 乘其不覺 以利刀斷其頭

急剖腹取之 胆汁全飽 庶無漏溢 然後以眼及翳障皆可治

點青盲極靈

▲治病後青盲



治法 用仙靈脂一兩 淡豆豉一兩 水一盞半 煎至一盞 服之即愈

▲治紅眼

治法 用明礬一小塊 入水洗之 使光滑無稜 涇口涎少許 或煎茶汁亦可 每日於眼角上 輕輕捺磨數次 七八日可愈

▲治縮眼

治法 用老姜煨熟 槌爛敷眉心 即愈

▲治見一物如有兩物

治法 此因好食鮮魚所致 可食姜醋 加紫蘇水 數日必愈

▲治見一物如有數物

病因 如見一物如兩物 或如三四物 見棹椅等物 平正者視之如歪

斜 不正者 反視為平正 此胸膈有伏痰也

治法 用常山(酒煮)五錢 党參蘆三錢 甘草一錢 生姜五片 清水

兩盞 煎至八分 食遠服之 吐痰而愈

▲治偷針眼



病象 生在眼皮近處 上下各有白色小孔一 孔塞 則眼皮必致紅腫

即俗名偷針眼也

治法 用馬琮或猪鬃之柔軟者一根 通之覺有微痒 眼淚即簌簌落

二日後必愈 或用木蟲血點之 亦可治

▲治縮鼻

治法 用蒼朮煎水 調雄黃硃砂末各三錢 服之 後將煎水之蒼朮

爛 敷貼鼻上 即愈 惟須先用手捉住其鼻 毋令縮入為安

▲治鼻淵(即腦漏)

治法 用老刀豆焙為末 酒服三錢 或用玉蜀黍鬚風乾 作烟吸之

或用葫蘆焙乾 研末嗅之 用斑蝥一枚 以薄棉裹之塞鼻

(二)

藥料 用白芷辛夷蒼耳仁薄荷 輕重酌用

治法 將各藥共為末 煎服 或用經霜絲瓜根 須在泥時經霜 並服

之 必效

▲治鼻痔



症象 鼻中垂物 不痛不痒 即是鼻痔

藥料 用山楂 神麩 麥冬 白芷 甘草 南星 半夏 川連 黃芩

蒼朮 輕重參用

治法 將各藥煎服 次用白礬樟腦杏仁麝香猪油黑物汁各等分 同研

用綿捲之 塞在鼻中 或用藕節 有毛處 一段 煨灰 研之 吹

入鼻中

▲治鼻鼓赤炮

治法 用密陀僧二兩 研為細末 入乳汁調之 夜塗早洗 或用白鹽

常擦之 可愈

▲治鼻衄

治法 用馬蘭頭搗爛 漚汁飲之 惟其性太涼 婦女切不可用 或用

井水撲額 或用棉絨濡藥墨塞之 或用白茅根煎湯服之 或速用

細繩或線 緊紮左手小指 第二節上 手指麻木 血即立止 即

將所紮之繩線去之 或用白滿堂紅花搗爛 敷在手心 立刻可止

男左女右 或用黑枝 甘草 為末 吹入鼻孔 即止 或用生



藕磨爛 和京墨沙糖煮食 或用白榴花燒灰為末 吹入鼻中 立刻可止 或用竹青三錢 細茶三錢 共煎服之 或用梨熬猪肉食之 兩三次後 必可全愈 如無鮮者用乾梨亦可

▲治流鼻血不止

治法 無論地方鋪填石頭 或磚瓦 或門脚 隨便抽起

滴 即將其石頭或磚瓦門脚照舊放還原處 其血立止

▲治鼻中流涕不止

治法 如鼻中垂涕如濃 常常不斷者 用蒼耳子為末 開水服之 每

服二錢 以生花生四五斤 入於鍋內 令本人親手拌沙炒之 數

次即愈

▲治鼻不能嗅

治法 用石菖蒲皂莢葉 分量相等塞鼻中

●第八編 耳髮科

▲治耳痛

病因 耳病由於少陽風熱 少陰虛火居多 因腎脉開竅於耳胆與三焦



一入耳內 一繞耳外故也

外治 用蛇退煨炭乳細吹之 取其祛風也 或用龍骨燒灰 研末吹之

耳內 取其收水也

內治 (係風熱上壅) 用丹梔逍遙散 去白朮 加羚羊角枯苓 審修

虛火上炎 宜服六味地黃丸 如不應 再加桂附 (大藥店中有購)

丹梔逍遙散 去白朮 加羚羊角枯苓藥味如下

藥料 用北柴胡二錢 酒白芍二錢 羚羊角五分 酒當歸二錢 白野

芩二錢 生粉草五分 枯條苓五分 黑山梔一錢 蘇薄荷五分

粉丹皮一錢 煨姜一片

▲治生耳掙

治法 用蝸牛 (又名圓螺蟲) 水養半日 鑿穿其尾壳 用火炭炙其口

水自尾出 滴入耳內 即愈 加水片少許更佳

(二)

治法 用紙引入熟烟筒內 捲出烟膏 插入患處 俟熱時取出 凡兩

三次即愈



▲治耳孔腫痛

治法 宜向東生的顛茄子一個去蒂 挖去其囊 用茶油放入茄內

滾放冷 滴入耳內 自愈

▲治耳癰

治法 用蟬退一錢 蛇退一錢 血餘(煨)二錢 胭脂(煨)

七分 冰片五分共為細末 吹入耳內 即愈

(二)

治法 三賴削尖 塞入耳孔 其痛即止

(三)

治法 用黑棗二枚 (去核)入青鹽煨末 以清油調塗

▲治耳瘡

治法 用馬錢一枚 以七月七水磨塗 或用清茶磨 滴入耳中 均能

治 如外治 可服清肝火藥

▲治耳聾

治法 用假糖草(其子如糖牙)取葉二兩 粘米粉黃糖各二兩 共搗爛



煎熟 臨睡時連服三次

(二)

治法 用生花仁(去紅衣) 和黃糖煮之 每日服三四次

(三)

治法 用生葱插耳內 以艾葉連灸七灸 其葱尾即能自通

▲治耳乾痛

治法 用蛇壳燒灰 吹入耳內 即愈

▲治耳爛

治法 用丹頭一錢 冰片一分 黃連一錢五分 共為末 吹入耳內

數次自愈

(二)

治法 用舊簪棚蓋箬葉 燒灰存性 研末吹之

(三)

治法 用蜘蛛三隻 燒灰 加白礬三分 共研為末 吹入耳內 三四

次即愈



(四)

治法 用陳皮一錢 燈草灰五分 冰片一分 研末 吹入耳中

(五)

治法 用五倍子燒灰為末 吹入耳內 極效

(六)

治法 用寺院大香爐內煙膏一錢 冰片五釐 研末吹入耳內

▲治縮耳

治法 用番石榴(俗名鷄糞果)搗爛 敷貼兩邊牙關 即愈

▲治百蟲入耳

治法 用雄黃以草紙捲燒熏之

附註

切不可驚動 如在左耳 以手緊閉 右耳并兩鼻孔 努氣至左

右耳 其蟲必出 如在右耳亦然 或以好醋麻油韭汁葱汁姜汁等

此數種因便而用 一二灌入耳內 其蟲立刻可出

▲治蟲類入耳不出

治法 用猫尿滴入耳內 其蟲必出 即所入是豆類 亦裂而出 (以

生姜塗在貓鼻貓尿即出

▲治猝然耳聾

治法 用炒香附子研細末 煎蘿蔔子湯服之

▲治蟻入耳中

治法 用油浸燈芯插入耳中 或可稍加杏仁於耳內

▲治耳痛靈方

治法 用北細辛研末 以醋為丸塞耳 有奇效

▲治耳內生疔

治法 用鮮紅菱柄煨末 加礪砂冰片少許 研末吹之 即能愈

▲治耳鳴

治法 用生地黄煨熟為灰 以棉裹之塞耳 每日易數次 以瘥為度

使髮重生

治法 用黑脂麻梗 柳樹枝各等分熬水 洗頭髮 其髮易生而潤 如

以此味 泡油搽頭更妙 小兒髮稀 洗之亦佳

(二)



治法 用旱蓮草（又名墨頭墨斗墨東）搗爛 髮易生而多

（三）

治法 用嫩棗樹皮一大把 斫作尺餘長 滿插淨磁瓶內 勿令到底 上面以火燃之 下面使流汁水 先用溫水洗頭 然後再將棗汁擦之 則髮生矣

▲治髮落不止

治法 用石灰三升 水拌炒焦 以酒三升浸之

服法 每次服三合 常使酒氣相接 則新髮能生

▲治髮禿

治法 用水調麩粉 取蛇壳 塗於其上 貼在禿髮處

▲治髮白

治法 用黑芝麻九蒸九晒 研末 以棗肉為丸 久服 能轉白為黑

使白髮轉黑

治法 少年髮白 拔去其白髮 塗生姜汁於髮根上 則白髮永不生矣

或以蜂蜜塗在髮根上數次 但年老者 因血氣虛弱 此法恐不

生效力

▲預防脫髮

治法 每晨以百倍之食鹽水 與加里石鹼精洗頭髮 畧乾後 以金精

當 (NAPHAIPNE) 酒精 及蕃椒丁幾 (均日本藥名) 塗之 可免

脫髮

▲烏髮油

油料 用核桃十個 榧子三十個 側柏葉半斤 搗爛 微煎至涼 裝

盒

搽法 每晨梳髮 以此油搽之 光能鑒人

▲治捲髮

治法 用麻葉桑葉煎湯常洗之 捲髮能直 或用甘草根 熟蒸之 取

汁洗髮 約一二日 亦能直

▲治髮赤

治法 用桐油煎洗 能使赤髮變黑

▲治頭禿



藥料 用真菰二錢（煨灰）蛙皮一錢 蝸牛一錢 皂角子二錢 狗屎

草二錢

治法 將各藥為末 先以芥草汁三杯 生姜汁二杯 椰子油五杯

布濾之 然後將真菰等五味加入拌勻 再加白臘 使成膏用之

(二)

治法 用胎髮輕粉松脂鼠糞臍帶 共研為末 以麻油調之 塗於頭上

能令禿頭生髮

▲烏髮神方

藥料 用生礬一錢 紅銅末（必須用重羅篩過極細之末可用）五分 五

梧子（炒至成炭烟盡為度炒時用濃茶酒入切勿使底糊為妨）六錢

灰麩二錢五分

治法 將上藥共研細末 以磁罐收貯 遇陰雨後 日出之時 傾出晒

之 雖久貯可用 再加生鹽二三釐 燒酒少許 調稀粥糊（比飯

湯畧厚者）敷於鬚上 過夜即黑 並不染肉 神效無比

(二)

藥料

用五梧子（炒黑用青布包脚踏研細末）一兩 銅花（研細末）伍錢

沒石子（要公母成對打碎炒黑研末）二錢 枯礬（研末）一錢

麩（研末）一錢 食鹽一錢 煉鉛二錢（須每白鉛五錢銅錫內溶

化水銀一兩再取錦文大黃一兩剉片搗碎入熔化鉛水一處炒黑研

末）

治法

將各藥和勻 以磁罐盛好封固 臨用之時 可取少許 以茶酒

調勻如飴糖 湯燉一餐飯之久 乘熱塗於鬚上 用菜炙乾 貼在

鬚上 神效

（三）

藥料

用麝香三分 頂好京墨（為末）三錢 生漆（去渣）一升 雌雄蟹

（以霜降後者佳對臍紫好重約八兩）一對

治法

將墨先射入磁瓶內 然後將蟹投入 再將生漆傾入瓶中 封固

於人行中地處深埋尺多深 俟四十九日後 方可取起 麻布去

渣 收貯磁瓶中 凡用筆塗上 將指頭套魚泡捏勻 以防藥染手

指上



藥料 用針砂八兩 (用米醋浸五日 炒畧起紅色 研末) 五倍子百藥

煎沒石子各二兩 訶黎勒皮三兩 (研末) 皂莢水 蕎麥等

治法 先將皂莢水洗鬚髭 再用米醋打蕎麥麩糊 和針砂末敷上 以

荷葉包過一夜 次日取去 再以蕎麥麩糊四味敷之 一日洗去

鬚髭即變為黑

▲烏鬚簡便方

治法 用松子肉燈火燒灰研末 用指頭搽上即黑

▲治髮根油疔

治法 用南瓜蒂煨灰 俟火氣淨後 以麻油調敷疔脚 歸縮消散 膿

亦自出

▲治頭髮粘膩

治法 用威靈仙十莖 側柏葉二枝 牙卑三莖 黑牽牛念粒 黃柏皮

一片 切細入袋 浸麻油中 揩拭頭髮 能去粘膩

