

醫方擇要上



南京中醫藥大學圖書館版權所有

道光己丑夏五月刊

醫方擇要

板藏織署



醫方擇要弁言

先君子平生好善喜讀方書嘗修合瘡膏施濟遠邇
爭購者四十餘年其藥物皆命余手爲炮製故外科
急救諸症頗有得自青囊秘傳者至內科百病雖素
不知醫而凡丹方之確有徵驗者亦莫不蒐採手錄
積而成帙攜以自隨今來吳中偶爲友人所見力勸
付梓以廣流通余惟軒岐道興自靈素以來代有著
述不啻汗牛充棟我

朝彙輯金鑑錄頒行海寓集前賢之大成開後人之

心法福民壽世美矣備矣區區鄉曲丹方不猶燭火
之於日月乎雖然長桑禁方龍宮秘法一草一木苟
能應手除疴皆足以廣上天好生之意且在窮鄉僻
邑或行旅無醫之處病起倉猝誠得是編按症治之
於以救急於以衛生亦未始非我

國家福民壽世之餘波暨我先人好善施濟之遺意
也夫爰卽舊錄重加增刪略分四門剞劂印佈以公
同好是爲序

道光九年三月蘇州尙衣使者綺園文祥

醫方擇要目錄

元和李棟銜覺齋

元和汪廷楷節安全輯

甘泉周棣苞甫

卷上

方脈雜症

婦科雜症



北京中醫藥大學圖書館版權所印
1964

醫方摘要
目錄
兒科雜症

卷下

外科雜症



醫方擇要

方脈雜症

鳳髓湯 治咳嗽潤肺氣

松子仁

一兩湯
浸去皮

胡桃肉

一兩湯
浸去皮

白

蜜

五錢

右藥研爛次入蜜和勻滾水沖服

草還丹

大壯脾胃進飲食益精髓固元陽輕腰膝

安五臟通九竅昔有七十老翁服此鬚髮

變黑耳目聰明壽至期頤雖則平補而大

有神效足以奪丹砂燒煉之功勿輕視之



蒼朮

四兩

茴香

揀新者
一兩

補骨脂

一兩酒
浸一宿

川練子

一兩

木香

一兩

牛膝

一兩

葫蘆巴

一兩

地龍

一兩

山藥

一兩

茯苓

一兩

穿山甲

一兩

右藥先將蒼朮四兩分作四分用醋酒米泔水

鹽水各浸一兩透後取出同各藥曬乾研末好

酒和丸每服三十五丸溫酒送下鹽湯亦可空

心服後須以乾物壓之力行百步每日須進二

服久久自有神效



南京中医药大学图书馆版权所有

草靈丹

此藥延年益壽添精補髓烏鬚黑髮固齒
強筋可以返老還童衰年服之十日便有
小效服過一月健若少年惟忌食黑羊肉
鷓鴣及桃李等果恐減藥力

川烏

一兩去皮臍

白茯苓

二兩去皮炒

真川椒

四兩去目炒出汗

茴香

二兩鹽炒

蒼朮

四兩酒浸焙乾

粉甘草

二兩去皮炙

大熟地

三兩酒浸

山藥

三兩

右藥共為細末蜜煉為丸如桐子大每服三十
丸至四五十九空心溫酒下以乾物壓之



青金錠

治男婦卒然中風痰厥牙關緊閉難進飲

食并雙蛾腫閉不能開口以及小兒驚風

痰迷不省人事急用井水磨藥一錠以棉

紙蘸藥汁滴入鼻孔進喉內其風痰即隨

紙引出片刻得生百發百中其效如神惟

久病則不能去根

延胡索 三錢

麝香 一分

青黛 六厘

牙皂 十四枝

右爲細末清水調做每錠重五分陰乾備用

神秘浸酒方

治左癱右瘓半身不遂口眼歪斜

切諸風疼痛不可忍者治之如神

何首烏 一兩

石菖蒲 一兩

大生地 七錢

明天麻 七錢

白附子 五錢

白茯苓 五錢

蒼耳子 一兩 研極細

五靈脂 五錢 炒

天南星 七錢 姜汁炒

先草烏米 五錢

紅花 五錢

陳皮 五錢

防風 五錢

漢防己 五錢

赤芍藥 五錢

甘草 三錢

黃柏 五錢

木瓜 七錢

右藥為片以布袋盛懸罈內無灰好酒一斗瓶



口封固隔水煮五炷香不拘時服隨量以醉時

爲度

止嗽瓊琳膏

栗

殼

三兩去膜筋穢

桑

皮

七錢

貝

母

八錢

五味子

五錢

元

參

七錢

薄

荷

陳

皮

六錢

甘

草

四錢

右藥共爲細末蜜煉爲丸如彈子大每服一丸

臨睡白湯送下

治赤白痢仙方



五月五日取黃鱧數斤將燒酒洗濕穿尾吊起曬乾候取黃麻頭蓮房壳二物曬乾爲末聽用鱧末一錢蓮房末五分對配大人一錢小者七八分酒下○收縮之法用之宜慎

治禁口痢三方

山藥

薏苡仁

石蓮子

右藥三味爲末白湯調三五服卽思食愈

又方

加蓮肉

又方 人虛用此

加人參 三錢 黃連 三錢 蓮肉 三錢

神通散 治傷寒危急發狂并大小便不通有食腹

痛

硃砂 一錢 雄黃 五分 沉香 一錢

木香 一錢 巴豆 一錢 鬱金 一錢
去油

右藥共爲末每服六厘或半分看人大小以七厘作一服爲止更不可多茶送下

大解不通方



松仁

八達杏仁

榧子

米泔水
浸一日

核桃

柏子仁

右藥各等分白糖霜和爲餅食下卽通

小解不通方

舊麥草帽同木通煎湯一碗服之卽便

又方

用松蘿茶簍內箬葉煎湯一碗服下卽便

遺精白濁奇方

白濁一月是精後皆痰汁也故當

以此治之



用山梔子三錢炒黑色用水二鍾煎至一大鍾
取起先將蚯蚓新瓦上炒燥爲末每秤二錢調
梔子水沖服久病不過三服卽愈

遺精夢遺驗過方

用透明雄黃四兩研極細末攤紙作薄包墊枕
頭睡卽止

治弱症并啞聲癆驗方

土茯苓

四兩
生用

淮山藥

八兩

紅棗

二斤煮熟
去皮核

黃牛脊髓

全付

通靈萬應丹

川大黃 六兩

麻黃 三兩

茅山蒼朮 三兩六錢

明天麻 三兩六錢

明雄黃 三兩六錢

砂 三兩六錢

炒甘草 二兩四錢

真蟾酥 九錢

香 六錢

真麝香 三錢

銀硝 三錢一本無銀硝有冰片三錢

右藥各研細末以糯米粥漿和之丸如蘿蔔子

大硃砂為衣候乾磁瓶收貯封固備用

一絞腸腹痛頭眩眼黑一時閉悶不省人事斑

痧等症先將二丸研末吹入鼻內或放舌上口



津嚥下不能嚥者以陰陽水灌下少頃再灌三
丸重者六丸

一驟然腹痛陰陽反錯手足厥冷轉筋吐瀉或
吐瀉不出及惡心頭痛肚腹飽脹痰喘氣逆空
心觸穢山嵐瘴氣一切雜症每服二三丸頭目
不清爽者研末嗅鼻亦妙

一凡自縊死打死驚死溺死魘魅死跌死氣閉
死只要胃口尚溫略有微氣皆可用此藥研末
吹鼻灌口以冀復活既活之後酌服湯劑調理

一癰疽疔毒及蛇蝎毒蟲所傷研末用酒調敷
并可消散此係急救仙方居家出行俱宜佩服
在身隨時救濟孕婦忌服

清神散

川大黃

二兩

雄黃

一兩

蒼朮

一兩

香白芷

五錢

細辛

五錢

鬼箭羽

五錢帶
鱗甲者

川芎

五錢

牙皂

三錢去子

右藥共爲粗末分裝小袋遇歲氣時令不正及
入病人之家用以齟鼻可免傳染之患

反胃方

用韭菜汁二杯入薑汁牛乳各一盃細細溫服
蓋韭菜汁消血薑汁下氣消痰和胃牛乳解熱
潤燥補虛也

升麻散 凡人肝經有病目卽赤眼中生翳肉暈膜

視物不明宜服之

升麻 八分
黃芩 八分
山梔 七分

黃連 七分
決明子 一錢
車前子 一錢

乾姜 七分
龍胆草 五分
充蔚子 五分



治耳聾方

用黃魚腦火內燒灰存性研為細末菜油調清

入

治眼熱方

當歸 二錢

生地 一錢

黃芩 一錢

薄荷 五分

蟬退 七分

白朮 一錢五分

檳榔 七分

木賊 七分

白芍 一錢五分

荆芥 八分

防風 八分

川芎 八錢

柴胡 八分

梔子 八分

菊花 一錢



引用燈心三十寸水三盃煎一盃飯後溫服

治斑痧腹痛不止方

用千年石灰研雄黃少許滾水調下愈

治啞喉奇方

礪砂一兩

元明粉一錢

胆星一錢

訶子肉二錢

冰片三分

右藥爲末外加烏梅肉一兩搗如泥丸如龍

眼核大每用一丸噙化

下頰落方



用烏梅一個口含卽上

立救痰厥方

用膽南星一錢薑湯調灌卽甦

神仙長生藥酒方

紅花

一兩。辛溫最消瘀血多則通經少則養

鬱金

五錢。味苦破血生肌血淋瀝血鬱結能

茯苓

五錢。味淡滲濕白化痰涎赤通水道

陳皮

五錢。甘溫順氣寬隔留血用和脾去白

青皮

五錢。苦寒能攻氣滯平肝安脾下食



枳

殼

五錢。微温快氣寬腸胃中氣結脹滿堪

杜

仲

五錢。辛温強筋壯骨足痛腰疼小便淋瀝

山

查

五錢。味甘消磨肉食療疝催瘡消膨健

黑

糖

一斤。甘寒無毒治心腹熱口乾渴潤肝

臘

醋

一斤。消腫毒積瘕可去療金瘡血暈皆

燒

酒

十斤。通血脈消愁遣興少飲壯神過則

以上藥八味重四兩五錢用甜水二斤煨藥煎

落一寸爲度再入黑糖一斤滾水一斤燒酒十

斤同裝罈內泡七日一日攪二次至第八日將

清酒取出所剩藥渣擗汁淨共裝饅內到九日

用

治斑痧神效方

發熱身上有紅點驗前心應後心

十分疼痛叫喊不止者以此治之

梲香

赭石

秦芫

姜

蠶

各一錢

全

蝎

二個

紅

花

五分

生地

當

歸

各二錢

皂

刺

陳皮

大力子

各一錢

一二貼水煎服愈



止鼻血方

將青苔放顙門上頂之立止永不再發

舌腫塞

朴硝

白礬

右藥爲末搽之立愈

治風熱火眼方

生地 一錢

茯苓 二錢

防風 一錢

桔梗 八分

生白芍 一錢

炒梔 一錢

歸尾 八分

車前 一錢

黃芩 八分



白芷 八分 陳皮 六分 甘草 三分

右用水煎好先燻眼後服之

瘡疾二仙丹

川貝母

六兩
去心

生半夏

四兩

右各爲細末端陽午時合和銅鍋微火炒至嫩黃色冷定收貯遇患瘡者先依症服表藥一二劑至將發先一時用藥末二分生薑汁調服一二次必效不可多服忌發物又瘡發三次於未來先一時取川貝母三錢黃酒沖服盡量而止



外用老薑一塊搗爛敷海眼穴

在後頸齊領圓骨

以筋

骨疼膏貼住蒙被熟睡取汗卽愈愈後須多貼
幾日方不再發

痢疾方

初冬時取白蘿蔔整個攤在瓦屋上任他日曬
風吹經歷霜雪不要遮蓋直至立春前一日收
下用繩捆好挂在無日處陰乾遇患痢者以水
煮加砂糖食卽愈將此蘿蔔切碎鹽拌放碗內
蒸熟常作小菜并可免喉疾又暑中痢用乾葛



烏梅甘草三味濃煎一碗服之卽止

暴瀉方

以車前子炒爲末米湯調服二錢治夏秋間暴
注下迫清濁不分者頗效虛瀉溏瀉俱非宜

治中暑卒倒

急取道上熱土放臍間作窩令人尿其中隨灌
以童便卽甦又用熱土大蒜搗爛和新汲水灌
之切不可飲冷水臥冷地

穢跡佛治胃氣疼方



香

附四兩醋製
七次研末

高良薑

四兩酒製
七次研末

因寒起者用良薑二錢香附一錢因氣起者用

香附二錢良薑一錢寒氣相兼者各一錢五分

薑鹽湯調服立愈

三釐藥 治胃脘疼極效

紅花一兩

枳殼一兩

五靈脂一兩

廣木香三錢

丁香三錢

胡椒三錢

明雄黃三錢

巴豆霜三錢即巴豆
去淨油如霜

共為細末磁瓶收貯封固勿令泄氣遇患者用



三釐本人自以口津嚥下頃刻見功忌茶水半

日初合此藥須遲數日方用恐藥性太猛也

通關神應散 專治一切咽喉腫痛雙單乳鵝喉痺

纏喉等症

山茨菇

礪砂

煨海巴

川黃連

入薑內煨熟

煨珍珠

煨明礬

梅冰片

紅鐵皮

即鐵繡以有繡之鐵火煨醋淬刮下用

辰硃砂

飛淨

金鑰匙

治急喉閉并風熱牙痛

醫方摘要

焰硝 七錢五分
礪砂 二錢五分
殭蠶 一錢

冰片 二分五釐

共研細末磁瓶收貯每用少許吹患處神效

偏正頭風

用舊小襯帽極油者燒灰入薑汁一兩水煎洗

又白蘿蔔汁一匙冰片少許研拌灌鼻孔如左

痛灌右鼻右痛灌左鼻蒙頭微汗俱效

鼻衄方

以驚頭一個外包濕泥火煨存性埋土內七日



取出去泥研末貯磁瓶內每用少許吹鼻神效

又以紙捲蘸香墨塞鼻或髮灰吹鼻內服茶泡

葶藶或白茅草湯或線紮手中指中節或蒜搗

塗足心皆經試驗不能一方全效故詳載備用

絡石籐酒 治中風未深手足肢體麻木不仁等症

脾胃有滯者宜酌用之

絡石籐

二兩卽爬山虎在石上纏繞之籐

仙茅

五錢酒浸竹刀切去赤

骨碎補

二兩

狗脊

一兩去皮

大生地

一兩

歸身

一兩

薏仁

一兩

白朮

五錢

黃耆 五錢

玉竹 五錢

枸杞 五錢

黃肉 五錢

白芍 五錢

木瓜 五錢

紅花 五錢

牛膝 五錢

川續斷 五錢

杜仲 五錢

川草薺 五錢

右藥咀片用潮綿一張裝入浸黃酒十觔蒸一

炷香每日量飲渣可再浸酒一次！

宋真宗瓊液膏

治遠年近日一切眼疾其效如神

熊膽 一錢

牛黃 一錢

麝仁 一錢

川黃連 一兩

蜂蜜 一錢

硼砂 一錢研末



冰

片

五分研末

右熊膽牛黃麩仁黃連四味用長流水二大碗
於磁器內熬至半碗用重綿濾過去滓入蜜再
用文武火熬至紫色蘸起牽絲爲度不可太過
不及取出入礪砂冰片二味攪勻磁罐收固封
埋入地七日出火毒每用銅簪蘸少許點於患
目內卽瞑目仰臥片時候藥性過日點三次立
愈忌動風熱物

太陽疼方

用煨熟生薑三片兩片貼太陽一片貼印堂以

帶縛之立愈

治腹內蟲方

烏梅一個
老薑三片
榧子七個

花椒十四粒

加黑糖少許煎服蟲盡出矣

治耳聾丸方

白茯苓四兩
丹皮三兩
製半夏四兩

懷牛膝一兩
山萸肉四兩
甘枸杞四兩



澤瀉

三兩 炒

新會皮

三兩 炒

北五味

一兩 飯土蒸焙炒

巴戟肉

二兩 炒

淡從容

三兩 炒

白朮

六兩 土炒

真沉香

一兩 銼末

大熟地

八兩 每兩用砂仁一錢拌蒸

紫河車

二具

以上共為細末外用

懷山藥

四兩 研末

兔絲餅

四兩 研末

杜仲

四兩

龜腹板

四兩

真牡蠣

四兩

真磁石

四兩

後四味用銅器煎汁糊山藥兔絲粉再用霞天

膠四兩酒頓化共為丸如桐子大每早晚服三



錢白湯送下霞天膠用黃牛肉三四斤熬成現
用則用不用酒化矣

治病齒方

玉壺清話云猪牙皂角卽生薑西國升麻蜀地

黃木律旱蓮槐角子

木一作草

細辛荷葉要相當

荷剪

葉心

青鹽等分同燒燉研殺將來使最良揩齒

牢牙髭鬚黑誰知世上有仙方此得之西嶽蓮
花峰斷碑療病齒者用之皆效

擦牙散

生大黃 五錢去粗皮

生白芷 五錢

生石膏 五錢研末

甘松 五錢

香附 五錢去毛

胡椒 四十九粒

細辛 五錢

菘豆 四十九粒

食盐 八兩炒黃

共為末用絹羅過二道合鹽擦之

擦牙兼明目方

熟石膏 四兩

青鹽 四兩

生大黃 十兩

杜仲 四兩炒斷絲

右藥共為細末每早擦牙即將漱口水洗目甚

驗



治牙疼方

青礬 一錢
升麻 一錢
青皮 一錢

丹皮 一錢
當歸 一錢
細辛 八分

用水二鍾煎八分食遠服

上門牙 加黃連 麥冬

下門牙 加黃栢 知母

上左牙 加羌活 龍胆草

下左牙 加柴胡 炒山梔

上右牙 加大黃 枳殼



下右牙

加黃芩

枳殼

上兩邊牙

加川芎

白芷

下兩邊牙

加白芍

焦朮

照部位用藥每樣加一錢喫二劑此藥單以前
七味爲主或左右上下只加二味共合九味喫
二劑卽好飯後服下全安其左右上下應加那
兩味另開於方後以免錯用

治脫肛

五倍子

八個

川椒

二十粒

葱

二根



用米泔水煎洗

解中百毒方

砂仁末

生韭菜

搗汁

靛

青

三味調服

石菖蒲末

白礬末

二味等分新汲水調服

淡豆豉

葱

麥門冬

三味搗服

雄黃

明者一錢酒調

生麻油吃一二盞吐出惡水效

解中山蠻瘴氣毒方

犀角

一錢

羚羊角

一錢

雄黃

一錢



南京中医药大学图书馆版权所有

麝香 三分

右藥四味水調服

解中禽鳥斃等毒方

五倍子

白

礬

各等分爲末水調服

馬鞭草

搗汁

大

黃

一錢煎湯服

生笋根

搗汁服

朴

硝

一錢水調服

橘

皮

煎湯服

以上俱可解

解中螃蟻毒方

生

藕

搗汁服

乾

薑

蒜

蒲

搗汁服



紫蘇煎湯服



救五絕良方 補遺

自縊

牆壁壓

溺水

魘魅

凍死

凡五絕皆以半夏爲末冷水爲丸如豆大納鼻中卽愈心溫者一日可治

專救自縊方

凡自縊高懸者徐徐抱住其繩不得絕斷解下放倒微微撚正喉嚨以手掩其口鼻勿令透氣一人以脚踏其兩肩以手挽其頂髮常令弦急



勿使緩縱一人以手摩捋其胸臆屈伸其手足
若已僵直漸漸強屈之一人以脚裹衣抵其腰
門勿令洩氣又以竹管吹其兩耳候氣從口出
呼吸閉眼仍引按勿住須臾以小姜湯或清粥
灌令喉潤漸能舉動乃止此法自日至暮雖已
冷可活自暮至旦者難救倘心下微溫雖一日
以上亦可活○或用艾丸于湧泉穴男左女右
灸三次卽活

專救水瀉方

凡溺死者先以刀斡開溺者口橫放一箸于牙關使可出水令一健夫屈溺者兩足著肩土以背相貼倒駝之而行令出其水並取燥土或壁土置地上將溺者仰臥其上更以土覆之止露口眼自然水氣吸入土中其人自甦仍急用竹管各于口耳鼻臍糞門內迭吹之令上下氣通并用半夏末搐其鼻皂角綿裹塞糞門須臾卽活○或用艾灸臍中亦驗

又方

醫方摘要 卷一
以溺死之人將梯放倒置其上用鹽塞鼻填滿
並堆臍上鹽化卽醒

專治凍死方

凡凍死及冬月落水微有氣者脫去濕衣隨解
活人熱衣包暖用米炒熱囊盛熨心上冷卽換
之或炒熱竈灰亦可候身溫暖目開氣回後以
溫姜湯粥飲灌之若先將火灸必死

專治壓死方

凡壓死及墜跌死心頭溫者急扶坐起將手提



其髮用半夏末吹入鼻內少甦以生姜汁同麻
油打勻灌之次取散血藥服如無藥以小便灌
之或取東向桃柳枝各七寸煎湯灌下

專治中惡魘死方

凡中惡魘死者不得近前呼叫但唾其面不醒
卽咬脚根及拇指畧移動臥處徐徐咬之原無
燈不可用燈照待少甦以皂角末吹鼻取嚏○

或急用韭菜搗汁灌鼻中并將皂角末麝香同

灌更快捷

治狐媚方

凡狐迷男女白日用口吸精夜間交媾如人用
桐油搽陰處自去或用珠蘭根搽之則獸自死
卽將獸肉晒乾爲末服之更好





南京中医药大学图书馆版权所有



醫方擇要

婦科雜症

回生至寶丹

當歸 一兩

川芎 一兩

熟地黃 一兩

烏藥 一兩

延胡索 一兩

桃仁 一兩去皮尖研

香附米 一兩

蒲黃 一兩

蒼朮 一兩米汁浸去皮炒

白茯苓 一兩

牛膝 一兩

白朮 五錢米汁浸切片炒

人參 五錢

甘草 五錢去皮

山茱萸 五錢酒洗蒸去核

白芍 五錢酒炒

木香 五錢

五靈脂 五錢淘去沙土



北京中醫藥大學圖書館版權所

青皮 五錢 陳皮 五錢 三稜 五錢醋

羌活 五錢 木瓜 五錢 地榆 五錢

良薑 四錢 沒藥 一錢 乳香 一錢

右為細末用後大黃膏為丸

川大黃 一觔 研細末 蘇木 三兩 敲碎用河水五碗煎

頭紅花 三兩 炒黃色入好酒一大壺隔湯煮三炷

黑豆 三升 淘淨用水六碗煮取汁三碗去豆仁不用豆皮為細末入藥

先將大黃末以好米醋三四碗攪勻以文武火

熬成膏如此二遍次下紅花酒黑豆汁蘇木汁



又攪勻緩熬成膏取出如有粘鍋底者刮起焙乾爲末和入前羣藥末內再以膏和爲丸如彈子大每服二丸黃酒頓化服

一催生用一丸研茶盃內加葱白三莖好酒二盃重湯頓熱去葱攪勻熱服

一橫逆難生并胎衣不下淡炒鹽湯服

一妊娠染病子死腹中車前子煎酒化服三丸

一產後血暈眼花芍藥甘菊各三分煎湯化服

一產後兒枕痛惡露不盡砂糖滾水化服

一產後胸膈氣滿嘔逆不安烏藥煎湯化服

一產後頭疼身熱有汗者桂皮三分葱酒化服

無汗者用麻黃末三分葱酒化服

一產後寒熱似瘧非瘧酒化服

一產後惡露不止形如肝色渾身潮熱背膊拘

急并面黃舌乾鼻中流血遍身斑點俱酒化服

一產後敗血熱極衝心如見鬼神言語顛倒燈

草一團黃連三分煎湯化服

一產後四肢浮腫先用此丹敗血再徐利水氣



一產後失音甘草三分桔梗二分煎湯化服

一產後未滿月食酸冷硬物不能尅化與血相搏流入大腸泄痢膿血山查湯化服

一產後尿血似雞肝并兩便不通木通湯化服

一婦人經水不調室女經閉葱酒化服

以上各條不過略舉數端產後一切異症書所未載醫所未經但服此藥無不立效一丸未應再進一二必有奇功惟虛弱極者宜斟酌用之凡催生須當正產之候如臨月忽然腹痛或作



或止或一日二日三五日胎水已來腹痛不止者名之弄胎非當產也有一月前忽然腹痛如欲產又不產者此名試月亦非當產也不問胎水來與不來俱不妨事但當寬心待時時至如瓜熟蒂落卽臨盆之際腹中急痛轉胎胎氣壯者轉身易胎氣虛者轉身難延緩時刻腹痛不已俱非正產之候切不可預先驚動混服催生藥餌直至腰腹陣痛痛極難忍穀道挺進如欲大便眼中流火漿破血來方是正產之候如不

易生方可服此往往有未至產候誤用催藥轉動非時以至橫逆無所不至不可不知也

治妊娠小便不禁方

用桑螵蛸十二個爲末分作二服米飲下立止

加味芎歸湯

當歸一兩

川芎五錢

龜板

手大一片
醋炙研末

婦人頭髮

如雞蛋大一團麩洗淨油瓦上焙存性

水煎溫服凡臨產預將此藥備下一二劑遇交

骨不開難產者服之其效如神

治難產方

用杏仁一個一邊書日字一邊書月字外用蜜熬為丸或滾水或酒吞下有驗

生化湯 治婦人產後淤滯未淨等症

當歸 五錢 川芎 一錢五分 炙甘草 五分

炮薑 三錢 桃仁 七粒去皮尖研

右加棗二枚水煎溫服

一凡內熱有火去炮薑加益母草二三錢

一血暈或口噤如中風反張瘈瘲俱加炒荆芥



穗七八分

一多汗不眠加茯神棗仁各一二錢

一血燥便結火麻仁肉蓯蓉各一二錢凡產後
病症此方最妥惟血分虧極口乾脈大無力汗
出者不可服當用羊肉煮濃汁去油淡飲之

胎衣不下

將產婦頭髮吊起以髮梢探入口中一嘔卽下

治產後腸脫不收方

用香油五斤煉熱一盆候稍冷令產婦坐油盆

醫方摘要 卷一
中半餉吹皂角末婦人鼻中令作噎腸立收

產後血暈

木炭火燒紅入醋內近鼻薰之卽愈不可睡臥

治轉胞小便不通腹脹如鼓數日垂死方

用猪脬吹脹以鵝毛管安上插陰孔捻脬氣吹

入卽大尿

治產後小便不禁方

用鴨屎燒灰爲末酒調一錢服之立愈

下乳方



燉猪蹄連湯食或加木通更妙

回乳方

麥芽 一兩

茯苓 五錢

當歸 五錢

牛膝 三錢

水煎服奇效

乳頭腫硬

用鹿角尖燒灰存性研末酒調服外用葱白搗

爛敷之立愈

治乳腫神方



用楊柳根皮四兩以水熬爛溫熨腫處一宿卽愈又馬溺塗之亦妙

乳孔塞痛

用核桃肉數顆搗碎沖滾酒服之卽下

乳癰

以做豆腐淋下水一桶傾入鍋熬乾成膏濃搽乾卽再搽乳上結塊自消五七次必愈

四紅丸 治血崩并失血衄血便血

阿膠

當歸

蒲黃

澤瀉

右等分蜜煉爲丸每服三丸如血崩不止用棕
灰蓮蓬殼灰水煎服或棉花子灰黃酒沖服有
黑塊者以舊馬尾羅底三個燒灰苡麵二合黃
酒和服

治血崩驗方

用白扁豆花不拘多少爲末炒米煮飲調末二
錢入炒鹽少許空心數服卽效紫花勿用

治血山崩漏方



用火漆不拘多少入無油鍋鎔化炒黃黑色黑
 烟淨白烟起退火取起研為細末每服三錢空
 心好酒調服即安至重不消三服

治脚受濕氣癢痛并下疳方

升麻 一錢
 葛根 一錢
 獨活 一錢

雄黃 一錢
 樟腦 一錢
 硼砂 二錢

冰片 五錢

共為細末磁瓶收貯量搽如破爛有膿水者用
 海螵蛸人中白等分為末量加冰片搽之即愈



治赤白帶下方

用三七葉不拘多少搗汁半碗和生白酒

服下

乳升丹 治女人虛癆

香附

一斤童便侵炒

當歸

歸

一兩五錢酒炒

紅

花

一兩

川芎

一兩五錢酒浸

三

稜

一兩五錢炒

生

地

二兩

白芍藥

一兩五錢

丹

皮

二兩

斬

艾

四兩

枳殼

二兩

草豆仁

一兩麩皮炒

延胡索

一兩五錢

山查肉

四兩炒

青皮

一兩麩皮炒

烏

藥

二兩炒



治赤白帶下方

用三七葉不拘多少搗汁半碗和生白酒

服下

乳升丹 治女人虛癆

香附

一斤童便侵炒

當歸

歸

一兩五錢酒炒

紅

花

一兩

川芎

一兩五錢酒浸

三

稜

一兩五錢炒

生

地

二兩

白芍藥

一兩五錢

丹

皮

二兩

斬

艾

四兩

枳殼

二兩

草豆仁

一兩麩皮炒

延胡索

一兩五錢

山查肉

四兩炒

青皮

一兩麩皮炒

烏

藥

二兩炒



蘇子

一兩五錢

蘿蔔子

二兩炒

蓬朮

一兩錯炒

熟地

二兩酒熬膏

砂仁

一兩五錢炒

右爲末和醋爲丸每服二錢艾醋湯不拘時服

治女人下部溼癬方

用芙蓉葉不拘多少搗汁半碗和生白酒空心

服

去雀斑法

白梅肉

牙皂

櫻桃枝

紫背浮萍

各五錢研末



右爲蜜丸洗面

去粉痣法

肥皂 一兩

益母草 燒灰 一兩

右共搗爲丸日洗三次後自愈忌姜酒

去臉上黑斑法

白附子

白芨

白歛

白茯苓

蜜陀僧

右藥各等分爲末臥時將臉洗淨用漿水和藥塗之次早洗去如此數次斑除爲止



醫方擇要

兒科雜症

稀痘方

凡嬰兒不論男女用肥大川練子於石臼中搗爛新砂鍋內煎濃傾入盆內在避風處將新稀白布一方蘸水替兒自頭至足擦洗不留餘空仍以布拭乾避風一刻其法一歲至三歲者川練子七個水三碗四五歲者九個水五碗六七歲者十五個水七碗八歲至十歲二十個水九



碗十一歲至十五歲三十個水十五碗照此擦
洗可不出痘且能免瘡癩○擦洗日期于五六
七三個月一連擇七個除日用之

又方

用神黃豆不拘多寡治痘將發未發時連壳焙
燥去壳用豆研細末用水調服斷無不效○按
此豆出雲南迤西

又方

用橄欖核水磨服或搗碎研末雜入粉麵中作



糕餅每日量與小兒食之凡橄欖核服過四兩
以上者出痘稀少至筋許者可不出痘

治痘症黑陷不起方

用狗蠅七個搗碎和白酒釀調服卽愈

治痘瘡攻目方

蛇蛻一條洗淨焙乾燥加天花粉等分爲末入羊
肝內以麻布包縛煮食妙

牛黃八寶丹 不拘已痘未痘諸般惡瘡惡毒皆可

消除而痘中服之尤佳



元參

五錢

硃砂

砂

五錢
飛淨

明雄黃

五錢

犀角

三錢
磨細

羚羊角

三錢
磨細

川黃連

三錢
土炒

青黛

三錢
水澄

川貝母

三錢
炒淨

羌活

三錢
炒

乳香

三錢
去油

沒藥

三錢
去油

琥珀

二錢
研細

珍珠

四分
研細

牛黃

二分

冰片

一分

以上十五味如法製為細末包好外將

金銀花

二兩
揀淨

地丁

二兩
揀淨

胡桃肉

二兩
搗爛

甘菊花

一兩

生甘草

五錢

以上五味先入長流水五碗用砂鍋慢火熬至



賽金化毒散

一 半將渣絞汁濾清入煉蜜盞許桑柴熬至黏
筋再入前十五味藥和為丸重三分一歲
者服一丸三歲上下者服二丸蜜水送下

大黃

生二錢
酒炒二錢

川黃連

二錢
五分

天花粉

二錢

赤芍

一錢
五分

川貝母

一錢
去心

乳香

一錢
去油

沒藥

一錢
去油

珍珠

一錢
研細

牛黃

八分
研細

明雄黃

五分

冰片

一分
五釐

生甘草

七分

共為細末貯磁瓶內勿令洩氣凡痘有伏毒經



日不起并發癰發疔者以此散用蜜水調服痘
若搔傷或攢簇堆聚或報點梟惡乾焦紫黑板
硬等象悉以散調紫草膏用細綿紙做如膏樣
貼之如痘癩膏上點之貼患處尤妙

拔疔丹 治痘後起疔

馬齒莧搗爛敷之不數日拔出黑疔如大螺殼屢
試屢驗切勿令庸醫挖割悞事

痘癩膏 治痘後毒癩疔癰

練枝

柳枝

槐枝



桃枝

紅椿枝

以上五枝不拘多少去皮入真麻油一斤桐油
六兩熬焦去渣再入猪毛一斤洗淨熬化之後
再稱油若干每油一兩入黃丹五錢用槐枝攪
勻再入製好乳香沒藥細末各三錢同熬成膏
傾入水內擰百遍收貯量瘡大小攤膏貼之

消疔解毒散

人中白 三錢

雨前茶 二錢

天花粉 一錢

青黛

一錢
水澄

白硼砂 一錢

兒茶 一錢

川黃連

五分

薄荷

五分

生甘草

五分

珍珠

二分
細研

牛黃

一分

冰片

一分

共為細末以無聲為度先以濃茶或米泔水拭

淨吹之

洗肝煎 治痘後熱毒在肝兩目通紅甚至起障生

翳者其妙異常

生地

川黃連

赤芍

木通

甘菊花

金銀花

羚羊角

大黃

荆芥穗



羌活

穀精草

木賊

望月砂

生甘草

一分至三分

加燈心白芙蓉葉煎服

退翳救睛湯

治痘後一切雲翳冒珠及風熱火眼

暴赤脹痛等症其應如神

柴胡

羌活

川芎

白芷

龍胆草

白菊花

羚羊角

蜜蒙花

青箱子

梔子

蟬退

木賊



檳榔

決明

先將兔糞半鍾用滾水潑成汁俟藥煎成食入
同服早服頭煎晚服二煎

痧症方 此初見用

防

風

五分

牛蒡子

二錢

荆

芥

五分

甘
草

三分

服此如不透再加麥芽二錢蟬退二分杏仁五
分桔梗五分服此如再不透再服二劑或三劑

痧症已透用



桔梗 八分

大貝母 八分

丹皮 八分

甘草 三分

瓜蒌仁 八分

連翹 五分

赤芍 八分

杏仁 五分

牛蒡子 一錢

右藥服二劑

痧症已退用

生地 一錢

赤芍 五分

大貝母 八分

瓜蒌仁 一錢

丹皮 八分

地骨皮 八分

甘草 三分

元參 五分

右藥服二劑



表散疹子方

紅穀子

即小米帶紅殼者

熬水不拘時服看似平淡功效

異常屢經屢驗

預防臍風馬牙

枯

礬

二錢五分

礪

砂

五分

硃

砂

二分

冰

片

五厘

麝

香

五厘

共為細末凡嬰兒下地洗過即用此末代礬糝
臍眼上每日換尿布時仍糝此末完一料永無
臍風等症



驚風方

明雄黃 五錢

砂仁 六分

梔子 五枚

冰片 五厘

共研細末以雞蛋清調敷肚之四圍如碗口大
空臍眼入麝香五釐上用綿紙蓋好再以輭絹
紮之一晝夜後溫水洗去神效

急慢驚風方

用活蚯蚓一條剝斷能跳者治急驚不能跳者
治慢驚每味加硃砂一顆共搗爲泥另用烏梅

一個煎湯送下神效或先合成分別收貯

治走馬疔方

用瓦楞子連肉煨存性置地蓋覆候冷碾末搽

治疔疾方

眞於朮

三兩
土炒

茯苓

一兩

懷山藥

八錢

蓮肉

八錢
炒

芡實

八錢
炒

白扁豆

八錢
炒

炙黃耆

八錢

陳皮

八錢

製半夏

八錢

南枳殼

八錢
炒

樞子

八錢
炒

史君肉

生熟各
一兩

檳榔

六錢

老厚朴

五錢
製

川棟根

四錢
炒黃



麥

冬

入錢
去心

丹

皮

六錢

共研細末荷葉煮老米湯和丸每個重一錢白

湯下

蟲疾方

史君子炭火煨熟去皮每日食一個病愈卽止不可多食又榧子二三斤陸續吃完自愈治寸白蟲尤效凡治蟲藥皆宜上半月服之

治感受時氣胸膈脹滿喘嗽不安法

以官粉香油入鐵勺內熬數滾離火少停約熱

不傷肌用頭髮團蘸粉糊搽胸膈數次愈又收
麵雞蛋清和成黏團搽之亦效

治瀉痢不服藥方

土木鼈

半個

母丁香

四粒

麝

香

一分半

共爲細末吐津調爲丸如黃豆大納一丸臍內
外用不拘小膏藥貼之立止

赤遊丹毒

鐵鏽陳醋磨搽或以哺退雞蛋內臭水拂上俱效

治頭上薄皮瘡方

馬齒莧熬水每日洗一二次漸愈

治黃水瘡方 凡皮溼破爛者皆治

官粉 銅綠 枯礬

製松香

右藥各等分爲細末麻油調搽勿用水洗奇效

治肥瘡方

大黑棗七枚去核放在新瓦上焙灰研爲細末生

青油或麻油調搽數次卽愈

夜啼方



蟬退後半截七個研末調搽乳頭小兒食下卽不

哭

治頭上軟癩

用大芋頭搗爛敷之卽愈



北京中医药大学图书馆版权所有

異傳不出天花方 補遺

天麻子

三十粒去殼衣
揀肥大者用

硃

砂一錢揀明
透者用

麝

香

五厘揀真
淨者用

右藥三味先將硃砂麝香研極細末後入天麻子共研成膏于五月五日午時擦小兒頭頂心

前心 背心 兩手心 兩脚心 兩臂灣

兩脚灣 兩脇

共十三處俱要擦到不可短少擦如錢大勿使藥有餘刺擦完不可洗動聽其自落本年擦過



一次出痘數粒次年端午再擦一次出痘三粒
再次年端午又擦一次永不出痘如未過週歲
小兒于七月七日九月九日依法擦之更妙男
女治法皆同

