

尚論後篇





尙論後篇卷之三諸方目錄

太陽傷風諸方

計十五方除重

太陽傷寒方

計三十九方除重附

太陽兩傷方

計十方除重

尙論張仲景傷寒論太陽本經諸方脈症卷之三

西昌喻昌嘉士著

黎川陳守誠伯常重梓

尙論諸方大意

仲景一百一十三方用本草九十一種耳。仲景上遡神農本經藥三百六十五種。効法周天三百六十五度之數。應三才而合四時。妙義開天也。仲景取述神農本經藥品。纔九十一種。入傷寒論中。輔相裁成。有合六經之大綱者。有合六經之一目者。蓋神農百病兼收。而仲景則由六

經以例百病。所以於上古本經取裁九十一種。用之不盡。萬世而後星日炳然聖之又聖者矣。梁陶隱君別錄倍之爲七百三十種。迨唐本圖經證類宋嘉佑政和旁搜編錄於是旁門遠經各自成名者多矣。而仲景宮牆生色間出英賢數十輩。尤爲不孤識大識小總計一千七百四十六種。病雖百疚藥無纖漏天下後世永賴焉。然一千七百四十六種顯現億兆。如問一日昭式。乃至漸推漸廣觀察盡矣。何獨仲景九十一種。賢哲挺生莫識厥旨。昌也晚進無識手集神。

農本經，竊以傷寒論中藥品爲主。其晉唐以後，  
太醫諸賢，發揮傷寒論全方有得者，亦一一錄出。而  
昌亦少步尙論諸方之後，總欲門下好學隨證  
問藥，一目瞭然無檢書之苦，難是慰耳。

太陽經風傷衛方

辨中風證用桂枝湯解肌大綱總法

桂枝湯方

桂枝

三兩去皮  
炙味

芍藥

三兩味苦  
微寒

甘草

二兩

甘平

生薑

三兩切  
味辛溫

大棗

十二枚  
味甘溫

右五味咬咀，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒

溫服一升服已須臾。歡熱稀粥一升餘。以助藥力。  
溫覆令一時許。遍身蟄蟄微似有汗者益佳。不可  
令如水流漓。病必不除。若一服汗出病差。停後服  
不必盡劑。若不汗更服。依前法。又不汗後服小促。  
役其間半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。  
周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不  
出者。乃服至二三劑。禁生冷粘滑肉麵。五辛酒酪  
臭惡等物。

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。有自  
出。嗁告惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。宜桂枝湯。仲景原文

風之傷人也。頭先受之。故令頭痛。風在表。則表實。故令發熱。風爲陽氣。亦爲陽。同類相從。則傷衛外之氣。衛傷。則無以固衛津液。故令汗出。其惡風者。衛氣不能衛也。其脉緩者。衛氣不能鼓也。上件皆太陽症。故曰太陽中風。桂枝辛甘。辛則能解肌。甘則能實表。內經曰。辛甘發散爲陽。故用之以治風。然恐其走泄陰氣。故用芍藥之酸。以收之。佐以生薑。甘草。大棗。此發散而兼和裏之意。是方也。惟表邪。乃可用之。若陽邪去表。入裏。裏作燥渴。二便秘結。此宜承氣之時也。而悞用之。則反矣。昌按承氣

之誤庸者固然。而工者悞在微細。仲景諄切不似此項逐條本文詳玩始獲。

凡桂枝湯病症者。常自汗出。小便不數。手足溫和。或手足指稍露之。則微冷。覆之。則溫渾身熱。微煩。而又憎寒。始可行之。若病者無汗。小便不數。手足溫和。或手足逆身冷。不惡寒。反惡熱。或飲酒後。慎不可行桂枝湯也。脈緊必無汗。有汗不可悞作桂枝症。此脈與症。仲景說得甚明。後人看不透。所以不敢用此方。假令寸口脉微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則酒淅惡寒也。尺脉弱。名曰陰不足。陽氣

下陷入陰中則發熱也。此謂元氣受病而然也。及日陽微則惡寒。陰微則發熱。醫既汗之使陽氣微又大下之令陰氣弱。此謂醫所使也。大抵陰不足陽往從之。故陽內陷而發熱。陽不足陰往乘之。故陰上入陽中則惡寒。舉此二端明白易曉。何憚而不用桂枝湯哉。

仲景治表虛。製此湯。桂枝味辛熱。發散助陽。體輕本乎天者親上。故桂枝爲君。芍藥甘草佐之。如陽脈濶。陰脈弦。腹中急痛。乃製小建中湯。以芍藥爲君。桂枝甘草佐之一。則治其表虛。一則治其裏虛。

故各有主用也。

以桂枝易肉桂。治傷寒腹痛。神品藥也。如夏中熱。腹疼少加黃芩去桂。痛立止。桂於春夏二時爲禁藥。

按經云。桂枝入咽。陽盛則斃。春夏發者爲禁藥也。桂能動血。血熱者爲禁藥也。木得桂而死。肝不足者爲禁藥也。

桂枝湯有禁用三法

仲景本文并昌論

汗後水氣上逆。有禁更汗增滿一法

本文并昌論

中風病。主用桂枝湯解肌和營衛七法

本文并昌論

或問桂枝湯發字之義曰一桂枝耳或云發汗或  
云當得汗解或云當發汗更發汗宜桂枝湯者數  
方是用桂枝發汗也復云無汗不得用桂枝又曰  
汗家不得重發汗又曰發汗過多者都用桂枝甘  
草湯是閉汗也一藥二用如何說得仲景發汗與  
本草出汗之義相通爲一答曰本草云桂味辛甘  
熱無毒能爲百藥之長通血脉止煩出汗者是調  
血而汗自出也仲景云藏無他病發熱自汗者此  
衛氣不和也又曰自汗者爲營氣和營氣和則外  
不諧以衛氣不與營氣和諧也營氣和則愈故皆

用桂枝湯調和營衛。營衛既和，則汗自出矣。風邪由此而解。非桂枝能於腠理發出汗也。以其固閉營血，衛氣自和，邪無容地而出矣。其實則閉汗孔也。昧者不解閉汗之意。凡是病者俱用桂枝湯發汗。若與中風自汗者合效如桴鼓。因見其取効而病愈，則曰此桂枝發出汗也。遂不問傷寒無汗者亦與桂枝湯悞之甚矣。故仲景言無汗不得服桂枝，是閉汗孔也。又曰發汗多入手太陽心經，欲得按者用桂枝甘草湯，是亦閉汗孔也。又曰汗家不得重發汗，若桂枝湯發汗，是重發汗也。凡桂枝條

下言發字當認作出字是汗自然出也非若麻黃能開腠理而發出汗也本草出汗二字上文有通血脉一句是非三焦衛氣皮毛中藥是爲營血中藥也如是則出汗二字當認作營衛和自然汗出非桂開腠理而發出汗也故後人用桂治虛汗讀者當逆察其意則可矣噫神農作於前仲景述於後前聖後聖其揆一矣

不解肌或悞汗病邪入裏用五苓兩解表裏二法一法水逆用之多服緩水汗出愈一法脉浮小便不利微熱消渴者用之

五苓散方

猪苓

十八銖去皮

茯苓

十八銖

澤瀉

一兩六銖

白朮

十八銖

桂

半兩

右五味爲散以白飲和服方寸七日三多服煖水汗出愈

不解肌而悞發大汗其變逆有救亡陽漏風二法

一法真武

一法桂枝加附子湯

真武湯方

此本少陰經之神方。并加減法。而太陽上篇。

先錄之至太陽下篇尤宜緊要先同錄此

茯苓

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩切

白朮

二兩

附子

一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

### 桂枝加附子湯

於桂枝湯內加附子一枚餘依桂枝湯法、不解肌而用燒鍼取汗寒入核起炙核止變一法  
桂枝加桂湯更加桂

中風於桂枝湯方內更加桂枝二兩

、中風肌未解不可下宜用桂枝湯解外一法。

桂枝湯

方見前

、不解肌反悞下邪不服者於前下藥內更加桂枝湯一法。

卽桂枝大黃湯之互訶因上衝陽位故兩解之也不上衝者不用此方。

、不解肌反悞下心痞用溫補藥兩解表裏一法。

桂枝人參湯

卽理中加桂枝而易其名也。

桂枝

四兩  
去皮

甘草

四兩  
炙

白朮

三兩

人參

三兩

乾薑

三兩

右五味以水九升先煎四味取五升內桂枝更煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

或問大柴胡瀉也桂枝人參湯補也何爲皆治下利心下痞鞭曰此非裏熱乃下之早因作痞裏虛協熱而利表又不解故與桂枝人參湯和裏解表若夫傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者表和而裏病也以心下痞鞭故爲實當以大柴胡下之二者心下痞鞭雖同而虛實之症有別故

用藥有攻補之異

不解肌反悞下邪入陽明變用太陽兩解一法

葛根黃蓮黃芩湯方

葛根半斤

黃蓮二兩

黃芩三兩

甘草二兩

炙

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

二解肌反悞下宜辨陽實陽虛加減桂枝湯一法

桂枝去芍藥湯

下之後脉促體滿於桂枝湯內去芍藥一味

餘依桂枝湯法

去芍藥方巾加附子湯

風下之微惡寒，於桂枝湯內去芍藥，加附子一  
枚。

不解肌，反悞下，陽邪作喘，有用桂枝加行氣藥一  
法。

桂枝加厚朴杏仁湯

於桂枝湯方內加厚朴二兩，杏仁五十個，餘

依桂枝湯法

中風病不解，熱結膀胱，下血，有宜先表後裏一法。

卷之三  
六百上  
桃核承氣湯

外不解者，尙未可攻。宜桂枝湯外解已。少腹急結可用攻此。

桃仁

五十個去皮尖

桂枝

二兩

大黃

四兩

芒硝

二兩

甘草

二兩炙

右五味以水五升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火方食溫服五合日三服當微利中風病不解熱瘀蓄血明辨脉症用抵當湯二法一法發狂蓄血重證

一法再辨脉證法中之法

抵當湯方

水蛭三十個 蒼朮三十個

大黃三兩 趙足熬

桃仁三十個去皮尖

右四味爲散。以水五升煮取三升去滓溫服一升。  
不下再服。

中風病下後復汗。因虛致冒先汗解後議下一法。  
遵內經虛者責之之義汗法下法金不出方。若論  
用藥表無過桂枝裏無過大柴五苓矣。

中風經表裏已虛餘邪未解辨脉用治迥異初病  
一法。

桂枝湯

陽脉微者用此

方見前

調胃承氣湯

陰脉微者宜此

方見後

中風病嘔利痞滿表解可攻與攻冒實迥異一法

十棗湯方

芫花

熬

甘遂

大戟

大棗

十枚劈

右上三味等分各別搗爲散以水一升半先煮大

棗肥者十枚取入合去滓內藥末強人服一錢七  
羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明  
日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽中風不利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗  
出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣  
汗出不惡寒此表解裏未和也十棗湯主之棗音蟄

按大棗純得土之中氣兼感天之微陽以生故味  
其氣平又溫氣味俱厚陽也入足太陰陽明經經  
曰裏不足者以甘補之又曰形不足者溫之以氣  
其能補中溫能益氣甘溫能補脾胃故主治安中

白話行醫 卷之三  
補脾補中益氣此方三藥皆峻利故用肥棗十枚  
蓋戎衣一着大發鉅橋之意所以題之曰十棗湯  
表其用之重也

按神農本經云蕘花味苦寒主傷寒溫瘧下十二  
經水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸中留癖飲食寒熱  
邪氣利水道仲景本方取用正取此義後人乃遂  
改芫花何也卽曰芫花別錄亦云能消胸中痰水  
五藏五水然本經云味辛溫全與芫花不同且亦  
并不云主傷寒溫瘧等症也權移通用殊非仲景  
立方本旨不可不辨

仲景傷寒論以蕘花治利者取其行水也水去則利止用當斟酌不可過使須有是症乃用

或問乾嘔脇痛小柴胡十棗湯皆有之和解一攻伐何也蓋小柴胡症邪在半表半裏間外有寒熱在來內有乾嘔諸病所以不可攻下宜和解以散表裏之邪十棗湯證外無寒熱其人熱汗出此表已解也但頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣者邪熱內蓄而有伏飲是裏未和也與十棗湯以下熱逐飲有表症而乾嘔脇痛者乃柴胡湯症無表症而乾嘔脇痛者卽十棗湯症也上文所

言頭痛者乃飲家有此症不可以常法拘仲景所以述此者恐後學見其頭痛以爲表不解不敢用也

或問同是心下有水氣乾嘔欬喘一用小青龍湯主之一用十棗湯主之何也蓋小青龍治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐裏邪使水氣自大小便而泄乃內經所謂潔淨府去陳莝法也夫飲有五皆內啜水末外受濕氣鬱蓄而爲留飲流於膈則爲支飲令人欬喘寒吐沫背寒流於肺則爲懸飲令人咳唾

痛引缺盆流於心下則爲伏飲令人胸滿嘔吐寒  
濕眩暈流於腸胃則爲痰飲令人腹鳴吐水胸脇  
支滿或作泄瀉或肥或瘦流於經絡則爲溢飲令  
人沉重注痛或作水氣跗腫芫花大戟甘遂之姓  
遂水洩濕能直達水飲窠囊隱僻之處但可徐徐  
用之取效甚捷不可過劑洩人真元也陳言三因  
方以十枣湯藥爲末用棗肉和丸以治水氣喘急  
浮腫之症蓋善變通者也昔杜任問孫兆曰十枣  
湯究竟治甚病孫曰治太陽中風表解裏未和也  
杜曰何以知裏未和孫曰頭痛心下痞滿脇下痛

乾嘔汗出此知裏未和也。杜曰公但言病證而所以裏未和之故要緊處總未言也。孫曰某嘗於此未決願聽開諭。杜曰裏未和者蓋痰與燥氣壅於中焦故頭痛乾嘔短氣汗出是痰膈也。非十乘不治。但此湯不宜輕用恐損人於倏忽用者慎之。大抵痰亦水濕之病耳。蓋痰涎之爲物隨氣升降無處不到入於心則迷竅而成癲癇妄言妄見入於肺則塞竅而成咳唾稠粘喘急背冷入於肝則留伏蓄聚而成脹痛乾嘔寒熱往來入於經絡麻皮頭痛入於筋骨則頭項胸背脇腰手足牽引瞖

痛然治痰須治其本。痰之本水也。濕也。得氣與火則凝滯而爲痰。爲飲。爲涎。爲涕。爲癥。故十乘湯逐水去濕。正所以治痰膈耳。

中風病悞下熱邪內陷。而成結胸諸法。

大陷胸湯方

大黃

六兩去皮

芒硝一升

甘遂一錢爲

末

右三味以水六升先煎大黃取二升去滓內芒硝一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服結胸兼涉陽明仍用本湯

大陷胸丸

結胸似涉柔症

丸成煮湯連滓服

大陷胸丸方

大黃半斤去皮

葶苈半斤熬

芒硝半斤

杏仁半斤去皮

尖熬黑

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取  
知彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合水二  
升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取  
下爲効禁如藥法

結胸項強者胸滿鞭痛能仰而不能俛也有汗項  
強爲柔痙此雖有汗其項強乃胸中滿實而不能

按瘡音痴惡也當作瘡音徑風強病也

故知詩歌傳自古。今樂傳於唐宋。  
歌者多中古十全之領。歌用古以及今。  
舞者三無者實。追用影之謂也。此其所以  
歌於唐宋。而舞於五代。則其事也。蓋其時  
歌者。多有風流。不苟同。而舞者。多有風流。不苟同。

太陽經傷營方

辨傷寒證用麻黃發汗大綱總法

麻黃湯方

麻黃

三兩去節

桂枝

三兩去皮

甘草

炙一兩

杏仁

七十個浸去皮尖湯

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息。

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘。麻黃湯主之。

按太陰少陰有身熱而無頭痛蓋二經皆不上頭故也厥陰有頭痛而無身熱若身熱而又頭痛屬太陽經也

傷寒頭痛屬三陽乃邪氣上攻也太陽專主頭痛陽明少陽亦有之三陰無頭痛蓋太陰少陰二經至胸而還惟厥陰循喉嚨上入頸額出額會於巔故亦有頭痛傷寒頭痛太陽經居多頭角痛屬少陽經頭額痛及鼻屬陽明經頭頂痛屬厥陰經足太陽經起目內皆循頭背腰膕故所過疼痛不利寒邪外束人身之陽不得宣越故令發熱寒邪

在表不能任寒故令惡寒。寒主閉藏故令無汗。人身之陽既不得宣越於外則必壅塞於內故令乍喘寒氣剛勁故令脉緊。

仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代名醫未有究其精微嘗繹思之似有一得云津液爲汗汗卽血也。在營則爲血。在衛則爲汗。夫寒傷營營血內滯不能外通於衛。衛氣閉固津液不行故無汗發熱而憎寒。夫風傷衛衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風。然風寒之邪由於皮毛而入皮毛者肺之合也。肺主衛

氣包羅一身。天之象也。是證雖屬乎太陽。而肺實受邪氣。其證時兼面赤。怫鬱欬嗽。以及痰喘。而胸滿者。非肺病乎。蓋皮毛外閉。則邪熱內攻。而肺氣贖鬱。故用麻黃甘草同桂枝。引出營氣之邪。達之肌表。佐以杏仁。泄肺而利氣。是則麻黃湯。雖太陽發汗重劑。實爲發散肺經火鬱之藥也。

辨脉浮宜用麻黃湯發汗一法。

辨脉浮數宜用麻黃湯發汗一法。

卽脉不緊。但浮及浮數。俱必用此。

辨傷寒欲傳不傳。心悸而煩。宜用建中一法。

太陽中篇連大綱止此三法

變法用桂枝湯加減七法

小建中湯

桂枝

三兩去皮

芍藥

六兩

甘草

二兩炙

生薑

三兩切

膠餡

一升

大棗

十二枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓內膠餡更上微火消解溫服一升日三服嘔者不可用建中湯以

辭故也

按山僻絕無醫藥之區每遇頭痛發熱用蠻法山椒炒雞炊飯一飽津津發汗豈非得建中意乎

服麻黃湯得汗後察脈辨證有次第不同三法。一法傷寒發汗解半日許復煩脈浮者可更發汗。

直桂枝湯

方見上篇

再按發汗已解因表疎外邪內襲可更發法。宜桂枝湯仲景意中蚤已慮其正虛桂枝解肌誠正法也。昌欲表虛之體少和人參助正驅邪免致再襲三襲留連而至殆耳略加人參托出其邪豈不善乎。粗醫不行微汗輒至表疎邪入汗而又汗展轉增變卒至莫救可爲寒心。

一法發汗已。脉浮數煩渴者宜表裏兩解五苓湯。  
方見上篇。

一法汗出而渴。五苓散不渴者。茯苓甘草湯。

茯苓甘草湯方

茯苓

三兩

桂枝

二兩  
去皮

生薑

三兩  
切

右四味以水四升煮取二升分溫三服。

辨脈浮緊浮數尺脉反遲反微不可發汗二法再按二條但論其法然無藥也宜用建中湯生其津液津液克則穀氣傳腎而生精血所以自致表

裏俱實便自出汗而愈可見津液精血人身之至寶也。

服麻黃湯汗後病不解有惡寒惡熱不同治一法

芍藥甘草附子湯方

惡寒者虛也

芍藥

三兩

甘草

二兩

附子

一枚泡去

皮切八片

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

調胃承氣湯方

不惡寒但熱者實也當和胃氣與此方

大黃

四兩去皮清酒浸

芒硝

半斤

甘草

二兩

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上微火煮令沸少少溫服

服麻黃湯後身痛脉沉遲者宜行補散一法

桂枝加芍藥生薑人參新加湯方

桂枝

三兩去皮

芍藥

四兩

甘草

二兩炙

人參

三兩

生薑

四兩切

大棗

十二枚擘

右六味以水一斗一升微火煮取三升去滓分溫服如桂枝法

或問經言表邪盛脈浮而緊法當身疼痛宜以汗解之况身疼皆係表邪未盡此又加人參芍藥生

薑以益血何也曰表邪盛則身疼血虛則身亦疼其脉浮緊者邪盛也其脉沉微者血虛也盛者損之則安虛者益之則愈仲景凡言發汗後以外無表證內無熱證止餘身疼而已若脉稍浮盛則爲表邪未盡解今言脉沉遲此血虛而致然也故加人參生薑芍藥以養血

服麻黃湯後不可悞用桂枝及飲水灌水過多一法

麻杏甘石湯方

治喘飲水灌水

麻黃四兩

杏仁五十個去皮尖

甘草二兩炙

石膏半斤綿裹碎

右四味以水七升先煮麻黃減一升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

本麻黃湯證悞下表邪未盡氣逆變喘一法

麻黃杏仁甘草石膏湯

悞下變喘方同前

服麻黃湯後有陽氣暴虛久手自冒心悸及耳聾無聞二法

桂枝甘草湯方

桂枝四兩去皮

甘草二兩炙

右二味以水三升者取一升去滓頓服。按心下悸及耳聾無聞皆陽氣暴虛。仲景止用桂枝甘草二味補虛之義顯明易見。如二證大虛又必多用人參矣。

服麻黃湯後有陽氣暴虛陰邪上逆。膺下悸。腹脹滿二法。

茯苓桂枝甘草大棗湯方

欲作奔豚預伐其邪

茯苓半斤

桂枝四兩去皮

甘草二兩炙

大棗一枚劈

十二

右四味以甘瀉一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服作甘瀉法取水三斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

汗後腹脹滿

厚朴

半斤去皮炙

生薑

半斤切

半夏

半升洗

人參

一兩

甘草

四兩炙

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三

服

服麻黃湯後、不繇悞下津乾飲結、胃困變痞一法、

生薑瀉心湯方

生薑

四兩  
切

甘草

三兩  
炙

人參

三兩

乾薑

一兩

黃芩

三兩

半夏

半斤  
洗

黃連

一兩

大棗

十二枚  
擘

右八味以水一斗、煮取六升去滓再煎取三升、溫服一升日三服

悞下成痞用瀉心湯方、次第不同四法、

一法悞下後、再悞下、客熱虛痞用甘草瀉心湯、

一法悞下後復發汗惡寒先解表用大黃黃連瀉心湯

一法上用陰氣協熱邪作痞用大黃黃連瀉心湯  
矣而陰氣乘陽虛作痞用附子瀉心湯  
一法心下滿而不痛者用半夏瀉心湯

甘草瀉心湯方

甘草

四兩

黃芩

三兩

半夏

半斤洗

大棗

十二枚劈

乾薑

一兩

黃連

一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫  
服一升日三服

病在表而反下之則逆矣。下而虛其中氣則表邪乘之而入虛不任邪。今人謂之挾熱利也。火性急速。穀難入而未及化。故穀不化虛陽上迫。故令腹中雷鳴。中虛不能化氣。故令痞鞕而滿。胃虛客氣上逆。故令乾嘔心煩不得安。人參甘草大棗。胃虛之聖藥也。半夏乾薑。嘔逆之聖藥也。黃連黃芩。痞熱之聖藥也。

相傳伊尹湯液原有甘草瀉心湯治證同上。仲景本此方而但去人參可見先哲皆有祖述不似後人一味臆騁。音益稱去声此云去人參未是。

海云伊尹湯液此湯七味今監本無人參脫之也。  
此爲定衡

大黃黃連瀉心湯方

大黃二兩

黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再  
服

按結胸之脉沉實其病謂之實邪故下之也。急痞  
氣之脉關脉必浮其病謂之虛邪故下之也緩彼  
用大黃則煎之乃取其氣味厚此用大黃則漬之。  
取其氣味薄也。

大黃乃足太陰、手足陽明、手足厥陰、五經血分之藥。凡病在五經之血分者，宜用之。若在氣分用之，是謂誅伐無過矣。故仲景言治心下痞滿，按之軟者，用大黃黃連瀉心湯主之。此正瀉脾胃之濕熱，非瀉心也。病發於陰而反下之，則作痞滿。乃寒傷營血邪氣乘虛結於上焦胃之上脘，在於心，故曰瀉心實瀉脾也。素問云：太陰所至爲痞滿。又云：濁氣在上，則生膜脹是矣。病發於陽而反下之，則成結胸，乃熱邪陷入血分，亦在上脘分野。大陷胸湯丸，皆用大黃，亦瀉脾胃血分之邪，而降其濁氣也。

若結胸在氣分。則只用小陷胸湯。痞滿在氣分。則用瀉心湯矣。膾音噴。肉脹起也。

麻沸湯卽熱湯。一名百沸湯。一名太和湯。味甘平。無毒。主治助陽氣。通經絡。

附子瀉心湯方

大黃二兩

黃連一兩

黃芩一兩

附子一枚炮去皮  
別煮取汁

右四味。初三味以麻沸湯二升漬之。絞去滓。內附子汁。分溫再服。

按心下滿。鞭而痛者爲實。爲結胸。鞭滿不痛者爲

虛爲痞氣。不滿不痛。但煩悶者。爲支結保命。  
集云。脾不能行氣於四藏。結而不散。則爲痞。大抵  
諸痞。皆熱也。故攻痞之藥。皆寒劑。其一加附子。是  
以辛熱佐其寒涼。欲令開發痞之拂鬱。結滯。非攻  
寒也。先發汗。或下後。陽氣虛。故惡寒。汗出。太陽證  
二。發汗後。惡寒者虛也。此加附子。恐大黃、黃連。損  
其陽也。非補虛也。

半夏瀉心湯方

半夏半升

黃芩三兩

乾薑三兩

甘草三兩

人參三兩

黃連一兩

大棗

枚劈

十二

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温  
服一升日三服

按至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下後陽  
邪傳裏者則結於胸中爲結胸以胸中爲陽受氣  
之分與大陷湯以下其結陰邪傳裏者則留於心  
下爲痞以心下爲陰受氣之分與半夏瀉心湯以  
通其痞

服瀉心湯痞不解煩渴小便不利用五苓兩解表  
裏一法

前第九條五苓湯方兩解表裏於此更治痞滿服瀉心湯復悞下利不止宜治下焦一法

赤石脂禹餘糧方

赤石脂碎一斤

禹餘糧碎一斤

已上二味以水六升煮取二升去滓分三服下之利不止者下之虛其裏邪熱乘其虛故利虛而不能禁固故不止更無中焦之症故曰病在下焦瀉可以固脫故用赤石脂重可以鎮固故用禹餘糧然惟病在下焦者可以用若病在中焦而悞以爲虛者則二物之氣益壞於申氣實者固而濇

之則邪無自而泄。必增腹脹且痛矣。慎之慎之。  
再按難經曰。中焦者。在胃中。膀主腐熟水穀。下焦  
者。當膀胱上口。主分別清濁。主出而不內。以傳道  
也。靈樞曰。水穀者常居於胃中。成糟粕而俱下於  
小腸而成下焦。滲而居下。濟泌別汁。循下焦而滲  
入膀胱焉。然則利在下焦者。膀胱不滲。而大腸滑  
脫也。禹餘糧。甘平消痞鞭。而鎮定其臟腑。赤石脂。  
甘溫固腸虛。而收其滑脫也。膀胱不滲。水穀不  
分。更當導利小便。令分清之。使府司各行其事。始  
無餘治而愈也。

、汗吐下解後、餘邪挾飲作痞。用旋復代赭石湯一法。

旋復代赭石湯方、赭音者赤色

旋復花

三兩

人参

二兩

生薑

五兩  
切

代赭石

一兩

半夏

半斤  
洗

甘草

三兩  
炙

大棗

十二枚  
擘劈

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

汗吐下而解則中氣必虛虛則濁氣不降而上逆故作痞鞶逆氣上干於心心不受邪故噫氣不除

內經宣明五氣篇曰五氣所病心爲噫是也旋復之鹹能軟痞鞭而下氣代赭之重能鎮心君而止噫薑夏之辛所以散逆參甘大棗之甘所以補虛或曰汗吐中虛肺金失令肝氣乘脾而作上逆逆氣干心心病爲噫此方用代赭石所以鎮心亦所以平肝也亦是究理之論噫音隘

昌用此方治反胃多痰氣逆并噦者愈千人矣傷寒下早亦成結胸之證四法

一法辨大結胸用大陷胸湯

熱實脉沉緊心下痛按之不鞭水飲結在胸膈主大

陷胸湯原文

一法辨小結胸用小陷胸湯

正在心下按之則痛脉浮微滑發熱微惡寒煩疼微  
嘔心下支結用柴胡桂枝湯原文

一法熱結在裏與結胸異治

一法辨邪熱在表心下支結但治其表

小陷胸湯方

黃連一兩

半夏半升

括囊實一枚

大者

右三味以水六升先煮括囊去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

大陷胸湯方

水飲結在胸膈、仍用此方

方見前

柴胡桂枝湯方

不宜大小陷胸之法、此方

柴胡 四兩

黃芩 一兩

人參 一兩

桂枝 半兩

甘草 一兩

半夏 二合

生薑 半兩

芍藥 半兩

大棗 六枚

右九味以水七升、煮取三升去滓、分溫服  
辨傷寒太陽兼少陽、連上共五法。

小柴胡湯方

柴胡半斤

黃芩三兩

半夏半升

人參三兩

甘草三兩

生薑三兩

大棗十二枚

切

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒四五日身熱惡風頭項強。腸下滿手足溫而渴者。小柴胡湯主之。原文

傷寒五六日中風往來。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴或腹中痛。或脇下痞。

輒或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳者。小柴胡湯主之。原文後加減法

若胸中煩滿而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚。  
若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根四兩。

若腹中痛去黃芩加茯苓四兩。

若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫覆取微汗愈。

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩。

經曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具邪在表則寒邪在裏則熱今邪在半表半裏之間未有定處是以寒熱往來也邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿今止言胸脇苦滿知邪氣在表裏也經曰陽入之陰則靜默默者邪方自表之裏在表裏之間也能食不能食煩不煩嘔不嘔皆然邪初入裏未有定處則所處不一故有或爲之證柴胡證但見一證便是不必悉具正指此或爲之證也

傷寒陽脉澁陰脉弦法當腹中惡痛者先與小建中

湯不瘥者與小柴胡湯主之

原文

小建中湯方

方見前

服小建中湯不瘥者。蓋少陽屬木。其脉弦。木盛則土受寇。故瀉而急痛也。故伐木以救土也。

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑三兩

黃芩三兩 括蔞根四兩 牡蠣熬三兩

甘草二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升。日三服。初服微煩。後服汗出便愈。  
按已發汗而復下之。雖不失先發後攻之序。及當  
汗而反下之。宜然。既汗之邪當自散。若不待其全  
解。後內實而復下之。是猶傷於早也。烏得不結。然  
已發汗則邪勢已衰。雖或失之下早。故結亦當微  
也。

傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿微結。小便不  
利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱心煩者。此爲未解  
也。柴胡桂枝乾薑湯主之。原文

太陽病十日以去。脉浮細而嗜卧者。外解已也。設胸

滿腸痛者與小柴胡湯。脈浮者用麻黃湯。原文

脉微細而嗜卧者大邪已退血氣乍虛而支體倦怠也。胸滿腸痛則少陽未除故與小柴胡以和之。脉但浮則邪還表故與麻黃以發之。

柴胡加龍骨牡蠣湯方

柴胡四兩

半夏二合洗

龍骨一兩

人參一兩半

茯苓一兩半

鉛丹一兩半

桂枝一兩桂枝去皮半

生薑一兩半

大黃二兩

牡蠣半兩

大棗六枚

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如碩子

更煮一二沸去滓溫服一升

辨下後胸滿煩驚身重困篤用此湯

原文自明

病久脉代結心動悸宜補胃生津兼散邪用炙甘

草湯一法

炙甘草湯方

甘草

四兩炙

生薑

三兩切

桂枝

三兩去皮

細川麥門冬

半斤

麻子仁

半斤

大棗

十二枚擘

遠志人參

二兩

生地

一片

阿膠

二兩

者九味以清酒七升水八升先煮前藥八味取三升去滓內膠烊消盡溫服一升日三服一名復脈

湯。

悞下、下利不止、身疼痛、宜先救裏、後救表、一法  
先救裏用四逆湯、

一四逆湯方

甘草

二兩  
炙

乾薑

一兩  
半

附子

一枚

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫

再服強人可大附子一枚乾薑三兩

服後身疼痛便清自調者急救表用桂枝湯

一方見上篇

辨悞下引邪內入用梔子湯取吐三法

病人舊微溏者不可服

一法下後煩滿不安用梔子厚朴湯

梔子厚朴湯方

再用梔子十四枚劈

厚朴四兩  
薑炙

枳實四兩  
湯浸去核炒

已上三味以水三升半煮取一升半去滓分三服  
溫進一服得吐止後服

一法悞用丸藥大下身熱微煩用梔子乾薑湯

梔子乾薑湯方

梔子十四枚劈

乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫

進一服得吐止後服

一法大下後身熱心中結痛用梔子豉湯

梔子豉湯方

梔子

十四枚劈

香豉

四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進二服得吐止後服

又本方二法

發汗若下煩熱胸中窒者用此方

原文

發汗吐下後虛煩不眠反覆顛倒懊憹者用此方

原文

又加味二法

若少氣者梔子甘草豉湯

於前方內加倍甘草

若嘔者梔子生薑豉湯

於前方內加倍生薑甘草

辨下後復發汗之脉證。晝夜靜躁一法。

乾薑附子湯方

晝日煩躁夜而安靜。脈沉微身無大熱者。

乾薑

一兩

附子

一枚生用

破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服。

按用薑附二味偏於辛熱者。恢復重虛之陽而求

以協和於偏勝之陰也。

辨吐下後復汗身爲振搖動惕久成痿廢二法

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓

四兩

桂枝

三兩

白朮

二兩

甘草

二兩

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

辨傷寒熱瘀小便反利爲蓄血用抵當丸一法

抵當丸方

上篇用抵當湯

水蛭

二十  
個熬

蟲蟲

二十五  
個熬去翅

桃仁

二十  
個去皮尖

大黃

二兩

右四味杵分爲四丸以水一升煮一丸取七合服  
醉時當自下血若不下更服

辨傷寒風濕相搏身體煩疼脈證二法

桂枝附子湯方

桂枝四兩

去皮

附子三枚炮去

皮破八片

生薑三兩切

甘草三兩

炙

大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取三升去滓分溫三服

去桂枝加白朮湯方

大便鞶小便利者用此

於桂枝附子湯方內去桂枝加朮三兩餘依

前法

甘草附子湯

甘草二兩  
炙

附子九枚炮  
去皮臍

白朮二兩

桂枝四兩  
去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出服煩者服五合恐一升多者宜服六七合爲妙

按上條項傷寒此條項中風無疑本文痛不可近汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫語皆是中風可見風寒與溫相搏冬月若此而風與

溫濕熱濕相搏夏月又若彼王叔和云傷寒所致太陽痙濕暋三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之果何說耶太陽經證痙濕暋居先傷寒證居後駭眩無定乃後代咸爲取宗焉傷寒書誠疑而難讀之矣

辨傷寒發黃有寒濕相傳三法

麻黃連翹赤小豆方

麻黃

二兩

赤小豆

一升

杏仁

四十枚去皮尖

連翹

二兩連翹根也

大棗

十二枚劈

生薑

二兩切

甘草

一兩炙

生梓白皮

已上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內  
諸藥煮取三升分溫三服半日則盡  
瘀血在裏身必發黃用前方原文

茵陳蒿湯方

茵陳蒿六兩

梔子十四枚

大黃三兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取  
三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀  
色正赤一宿腹減黃從小便去也

身黃如橘子色小便不利腹微滿者用前方原文

梔子葉皮湯方

梔子

十五枚  
擘

甘草

一兩  
炙

黃葉

一兩

右三味以水四升煮取一升半分溫再服。  
身黃發熱者用前方。

按熱已發出於外。則與瘡熱不同。正當隨熱勢而  
亟散其黃。俾不留於肌表也。前條熱瘡。故用麻黃。  
此條發熱。反不用麻黃。正所謂寒濕中求之。不盡  
泥傷寒之定法矣。此隸太陽中篇。惟仲景乃識其  
旨。所謂者何。蓋四條已發於瘡濕。渴三種。瘡熱。蒸  
黃之先。凡近豈能窺乎。至於總入陽明發黃。尤爲  
膚淺矣。

附越脾湯方

麻黃六兩

石膏八兩

生薑二兩

甘草二兩

大棗十二枚

太陽傷寒方終

其律二西

大東十二

頌樂六首

召南八首

小雅三首

太陽經風傷衛寒傷營方

大青龍湯風寒兩傷大綱總法

大青龍湯方

麻黃

六兩去節

桂枝

二兩去皮

甘草

二兩炙

杏仁

四十枚去皮尖

生薑

三兩切

石膏

如鷄子大  
綿裹碎

大棗

十二枚擘

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

服青龍湯，厥逆筋惕肉瞤。此爲逆也。用真武湯救之。  
仲景原文

真武湯方

茯苓三兩

芍藥三兩

生薑二兩  
切

白朮二兩

附子一枚炮去  
皮破入片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服。  
此乃少陰經之方先錄於此。

按成註謂不久厥吐利無少陰裏證，大謬無少陰證者，但欲寐尚不止少陰疑似，况敢言不久厥吐利等耶。

麻黃味甘溫。桂枝味辛熱。寒則傷營。必以甘緩之。  
風則傷衛。必以辛散之。此風寒兩傷。營衛俱病。故  
以甘辛相合。而爲發散之劑。甘草味甘平。杏仁味  
甘苦。苦甘爲助。佐麻黃以發表。大棗味甘溫。生薑  
味辛溫。辛甘相合。佐桂枝以解肌。石膏味甘微寒。  
而使石膏爲重劑。而又專達肌表者也。

大青龍湯。發汗之重劑。非桂枝所同用。之稍逆。則  
又有亡陽之失。若脉微弱。汗出惡風者。不可服。服  
之。則厥逆筋惕肉瞤。此爲逆也。

傷寒發熱。惡寒煩躁。身心無奈者。發汗則愈。譬若

亢熱已極。一雨而涼。其理可見也。若見其躁熱。投以寒涼。其害豈勝言哉。

中風脈浮緊。傷寒脉浮緩。仲景以青龍對之。證候與脈相對。無不應手而愈。

風傷衛。衛氣也。寒傷營。營血也。營行脈中。衛行脈外。寒邪居脈中。非特營受病邪。自內作。則併與衛氣犯之。久則浸滯入骨。亦自有淺深也。

太陽中風脉浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出。而煩躁者。大青龍湯主之。原文

傷寒脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。前

湯發之。原文

大青龍湯。仲景治傷寒發熱。惡寒、煩躁者。則用之。  
夫傷寒。邪氣在表。不得汗出。其人煩躁不安。身心  
無如之奈何。如脈浮緊。或浮數者。急用此湯發汗。  
則愈。若不浮緊而數。無惡寒、身疼者。亦不可用。所  
以脉證不明者。多不敢用也。

仲景治傷寒。一則桂枝。二則麻黃。三則青龍。桂枝。  
治中風。麻黃治傷寒。青龍治中風。見寒脉傷寒。見  
風脉。三者如鼎立。人皆能言之。而不曉前人處方。  
用藥之意。故醫遂多不用。昌謂脉緩而浮者。中風。

也。故嗇嗇惡風，浙浙惡寒。翕翕發熱。仲景以桂枝對之。脉浮緊而嗇者，傷寒也。故頭痛發熱，身疼，腰痛骨節疼痛。惡寒無汗而喘。仲景以麻黃對之。至於牛風脈浮緊，傷寒脉浮緩。仲景皆以青龍對之。昌爲究之。風傷衛則風邪干陽，陽氣不固，發越而爲汗。是以自汗是表虛，故仲景用桂枝以發其邪。芍藥以和其血。蓋中風則病在脉之外，其病稍輕。雖同曰發汗，實解肌之藥耳。所以仲景於桂枝症云，令半身熱，似有汗不可如水淋漓，病必不除。可知中風不可大發汗，汗過則反動營血邪氣。

乘虛襲之。故病不除也。寒傷營則寒邪入陰血而  
營行脈中者也。寒邪居脈中。非特營受病邪。自內  
作。則併與衛氣犯之。久則浸淫入骨。是以汗不出  
而熱齒乾而煩寬。仲景以麻黃發其汗。又以桂枝  
助其發散。欲滌除內外之邪。營衛之病耳。大抵二  
藥皆發汗以桂枝發其衛之邪。麻黃開營衛之病。  
治自有淺深也。何以驗之。觀仲景第十九症云。病  
當自汗出者。此爲營氣和者。外不諧。以衛  
氣不其營氣和諧故也。以營行脈中。衛行脈外。復  
發其汗。營衛和則愈。宜桂枝湯。及四十七症云。發

熱汗出此爲營弱衛強故僕汗出欲救邪風者宜桂枝湯是知中風汗出者營和而衛不和又第一卷云脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷營俱病者卽煩渴當發其汗是知僕寒浮緊者營衛俱病也此麻黃湯中并用桂枝此仲景之言也至於青龍雖治傷風見寒脉傷寒見風脉之病然仲景又云陽微惡風者不可服服之厥逆便有筋惕肉瞶之症故青龍一症尤難用藥須是形症諦當然後可行

熱盛而煩手足自溫脉浮而緊此傷風見寒脉也

不煩少熱。四肢微厥。脉浮而緩。此傷寒見風脈也。  
二者爲營衛俱病法。宜大青龍湯。

小青龍湯方。

麻黃去節

桂枝

芍藥酒炒

細辛

甘草炙

乾薑各三兩

半夏

五味

半升

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔。發熱而咳。或渴或利。  
或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。原文  
傷寒心下有水氣。咳而微喘。發熱不渴。服已渴者。此  
寒去欲解也。小青龍湯主之。噎音謂食質氣不通也  
原文

或問小青龍與小柴胡證皆嘔而發汗表裏之證大槩彷彿何故二方用藥之不同曰夫傷寒表不解裏熱未甚而渴欲飲水不能多不當與之以腹中熱尙少而不能消水飲停蓄故作消症然水寒作病非溫熱之劑不能解故用小青龍發汗散水原其理初無裏症因水寒以致然也若小柴胡症則係傷寒發熱之邪傳裏在於半表半裏之間熱氣內攻故生諸症是二症雖曰表裏俱病至其中之寒熱則全不同故用藥有薑桂柴芩之異耳

乾薑附子湯方。

乾薑 附子

卜之後復發汗煩躁不得眠者。乾薑附子湯主之。原文此當與梔子豉湯症參看。蓋下後煩不得眠一也。而用藥有寒熱不同乃爾。

服薑附湯有二法。一法當熱服。手少陰心也。水包火。熱服以接心火。身表寒盛。外火少也。寒從外生。熱從內消。譬如凍死寒在外也。一法當寒服。足少陰腎也。寒邪入水。令冷服以類腎水。身發微熱。內水多也。熱從外生。寒從內消。譬如飲冷寒在內也。

麻黃杏仁甘草石膏湯方

方見前。

發汗後。汗出而喘。無大熱者。麻黃杏仁甘草石膏湯。主之。原文

予觀仲景常言發汗後。乃表邪悉解。止餘一症而已。故言不可更行桂枝湯。今汗出而喘無大熱。乃上焦餘邪未解。當用此方以散之。夫桂枝加厚朴杏仁湯。乃桂枝症悉具。而加喘者用之。註言汗出而喘。以爲邪氣壅甚。非桂枝所能發散。此誤也。況身無大熱。更無證。何故復言表邪必盛。其後章下後。不可更行桂枝湯條下註曰。汗下雖殊。其不當

損正氣則一。其言有至理存焉。可見汗後所註之誤矣。大抵當時因事發機。前後失於照應。故有此等之弊也。

### 桂枝甘草湯方

桂枝

甘草

大棗

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之。原文

悸心動也。怔怔忪忪。不能自安也。有氣虛而悸。陽氣內弱。心下空虛。也有停水飲而悸。心爲火而惡水。水既內停。心不自安也。有汗下後而悸。汗爲心

液汗去心虛。如魚離水也。故悸與驚不同。

茯苓。甘草。大棗湯方。

茯苓。桂枝。甘草。

大棗

發汗後。其人臍下悸者。欲作奔豚。茯苓。甘草。大棗湯。

主之。

原文自明

厚朴。生薑。半夏。甘草。人參湯方。

厚朴

生薑

半夏

甘草

人參

汗後腹脹滿者。前湯主之。

原文自明

或問太陽篇中發汗後諸症不言太陽病固所當然亦合列於傷寒之右何故止言發汗後腹脹者厚朴半夏甘草人參湯主之曰凡言發汗後者以外無表症裏無別邪止有腹痛一事而已除此之外卽獲全安夫傷寒二字豈可易言哉其傳變吉凶猶反掌耳可與所餘一症而並例哉其諸汗後不殊此意

芍藥甘草附子湯方

芍藥

甘草

附子

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主

之原文自明

四逆湯方

方見前

發汗若下之病仍不解煩躁者。茯苓四逆湯主之。原文

五苓散方

方見前

太陽病發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。欲得飲水者。稍稍與飲之。令胃氣和則愈。若脈浮。小便不利。微熱消渴者。與五苓散主之。原文下同

水道爲熱所蔽。故令小便不利。小便不利。則不能

運化津液故令渴水無當於五味故用淡以治水  
茯苓猪苓澤瀉白朮雖有或潤或躁之殊然其爲  
淡則一也故均足以利水桂性辛熱辛熱則能化  
氣內經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能  
出矣此用桂之意也濁陰旣出下竅則清陽自出  
上竅又熱隨溺而泄則渴不治可以自除雖然小  
便不利亦有因汗下之後內亡津液而致者不可  
強以五苓散利之強利之則重亡津液益虧其陰  
故曰大下之後復發汗小便不利者亡津液故也  
勿治之得小便利必自愈師又曰太陽隨經之邪

直達膀胱小便不利其人如狂者此太陽之邪不傳他經自入其府也五苓散主之是使陽邪由溺而泄耳

發汗見脈浮數煩渴者五苓散主之

按太陽標病傳入標之本發渴溺不利以此散導之邪自膀胱而出也若未渴妄用五苓散反引邪氣入裏而不能解也故易老云卽太陽經之下藥也若傷寒太陽脉緊而渴者不宜用此

中風發熱六七日不解而煩有表裏症欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

本以下之故。心下痞。與瀉心湯。痞不解。其人渴而口躁煩。小便不利者。五苓散主之。

太陽病寸緩。關浮。尺弱。其人發熱汗出。復惡寒不嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如其不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必鞕。不更衣十日無所苦也。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。宜五苓散。

或問上條云。小便數者。大便必鞕。不更衣十日無所苦也。嘗有四五日。六七日。不大便者。卽爲攻之。今言十日不更衣。而不用攻伐。何也。曰。此非結熱。

乃津液不足。雖十日不更衣。亦無所苦也。經曰。陽明病本自汗出。醫更重發汗。病已瘥。尙微煩不了了者。此大便必鞭故也。以亡津液。胃中乾躁故令大便鞭。當問其小便日幾行。本小便日三四行。今日再行。卽知大便不久。出爲小便數少。以津液足。寒。胃中。故知不久大便也。夫不便者。若有潮熱讞語。可下之症者。然後可以攻之。其不大便而無諸下症者。此津液不足。當須自審。慎勿以日數久而輒爲攻下也。

五苓散爲太陽裏之下藥也。太陽高則汗發之下。

則引而竭之。渴者邪入太陽裏也。當下之使從膀胱出也。

腎燥膀胱熱小便不利此藥主之小便利者不宜用然太陽病熱而渴小便雖利亦宜五苓散下之當服不服則生何症答曰當服不服則穀消水去必致陽明燥火鬱胃發黃故有調胃湯症此太陽入本失下也由不曾服五苓散故也

不當服服之則生何症答曰不當服而服之是爲犯本小便強利津液重亡侵陽之極則侵陰而成血症也輕則桃仁承氣湯重則抵當湯故五苓散

調和陰陽者也。乃太陽陽明之間。故爲調和之劑。  
酒毒小便赤澁。宜五苓散。但熱在中焦。未入太陽  
之本。小便自利而清。乃津液已行者。若與五苓散  
利之。則重涸腎水。不惟重涸腎水。而酒毒之熱亦  
不能去。以故上下不通。而溺濇。則爲發黃症也。若  
入血室。則爲蓄血。用五苓散以瀉濕熱。

太陽症傷寒。自外入。其標本有二說。以主言之。膀  
胱爲本。經絡爲標。以邪言之。先得者爲本。後得者  
爲標。此乃客邪之標本也。治當從客之標本。  
又小腸火爲本。膀光水爲本。乃寒毒之氣。從標入

本邪與手經相合而下至膀胱。五苓主之。以方內  
桂枝陽中之陽。茯苓陽中之陰。相引而下於本道。  
出邪氣。

手經 自上之下 足經

丙火

壬水

小腸

丁之土目

膀胱

火邪之氣從下之上。以內爲本。水中有火。火爲客  
氣。當再責其本。兩腎相通。又在下部。責在下。焦下  
焦如瀆。相火明也。生地黃。黃蘗主之。邪從本受。下  
焦火邪。遺於小腸。是熱在下。焦填塞不便。自內而

之外也。蓋生地黃柏黃連乃陰中之陽爲裏之表藥若五苓之桂木澤鴻猪苓茯苓乃陽中之陰爲表之裏藥也。

治酒病宜發汗若止以五苓利小便炎焰不肯下行故曰火鬱則發之辛溫則散之是從其火體也乃知利小便濕去熱不去動大便尤爲疎遠大便者有形質之物酒者無形水也從發而汗之最爲之近以使濕熱俱去蓋治以辛溫發其火也佐以苦寒除其濕也。

茯苓甘草湯方

茯苓

桂枝二兩

甘草一兩

生薑

一兩

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯  
主之原文下同

傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却  
治其厥不爾水漬入胃必作利也

金匱要畧曰水停心下甚者則悸厥雖寒勝然以  
心下悸爲水飲內甚先與此湯治其水而後治其  
厥若先治厥則先飲浸漬入胃必作下利

凡治悸其法或鎮固之或化散之惟飲之爲悸甚

於他邪。雖有餘邪。必先治悸。何者。以水停下。無所不入。侵於肺。爲喘嗽。傳於胃。爲嘔噎。溢於皮膚。爲腫瀆。於腸間。爲利。其厥之病甚重。猶先治水。況病之淺者乎。

白虎湯方

石膏一斤 知母六兩

甘草二兩

粳米六合

傷寒。脉浮滑。此表有實。裏有寒。白虎湯主之。

原文

按前篇云。熱諸在裏。表裏俱熱者。白虎湯主之。又曰。其表不解。不可與白虎湯。此云脉浮滑。表有實。

裏有寒者必表裏字訛耳又陽明一症云脈浮遲  
表虛裏寒四逆湯主之又少陰一症云裏寒外熱  
通脉四逆湯主之以此相參其訛益明矣又陽明  
篇曰脈浮而疾者小承氣湯既用承氣湯是裏熱  
也又厥陰篇曰脈滑而厥者裏有熱白虎湯主之  
是謂滑爲裏熱也明矣况知母石膏豈應以水濟  
水成氏隨文釋之謬也

海云此表有熱裏有寒非寒冷之寒寒邪之寒亦  
自有理可思。

傷寒脈浮而厥者裏有熱也白虎湯主之。厥陰原文

粳米本草諸家共言益脾胃。如何白虎湯用之入肺。以其陽明爲胃之經。色爲西方之白。故入肺也。然治陽明之經。卽在胃也。色白味甘寒。入手太陽。又少陰症。桃花湯用此。甘以補正氣。竹葉石膏用此。甘以補不足。垣云。身以前胃之經也。胸胃肺之室也。邪在陽明。肺受火制。故用辛寒以清肺。所以號爲白虎湯也。

活人云。謂白虎湯治中暍汗後一解表藥耳。非正傷寒藥也。而夏日陰氣在內。白虎尤宜戒之。夫白虎湯具載仲景之書。症治昭然明白。何爲非正傷

寒之藥也。况傷寒論言無表症者可與白虎湯。今云汗後一解藥耳。於法既無表症何解之有。又曰夏月陰氣在內。白虎尤宜戒之。而明理論又云立秋後不可服。秋則陰氣半矣。白虎大寒。若不能禁服之。而爲嘔逆不能食。或虛羸者有矣。夫傷寒之法。有是症。則投是藥。安可拘於時而爲治哉。假如秋冬之間。患傷寒。身無表症。而大煩渴。於法合用白虎湯。苟拘其時。何以措手。若以白虎爲大寒。其承氣又何有於冬月耶。旣以夏宜戒。秋不可行。然則宜乎何時也。雖然。經云必先歲氣。無伐天和。比

言常也。假如賊邪變出。陰陽寒暑亦當捨時而從。  
症。豈可以時令拘哉。

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁而面詬。讞語遺尿。發汗則讞語下之。則額上生汗。手足逆冷。自汗出者。白虎湯主之。

原文

垣云。入足陽明。手太陽。味苦寒潤治。有汗骨蒸。腎經氣勞瀉心。仲景用此治不得眠者。煩躁也。煩者肺也。躁者腎也。以石膏爲君主。佐以知母之苦寒。以清腎之源。緩以甘草粳米之甘。而使不速下也。經云。胸中有寒者。瓜蒂散吐之。又云。表熱裏寒者。

白虎湯主之。瓜蒂知母味皆苦寒而治胸中寒。及  
裏寒。何也。答曰。成無已註云。卽傷寒寒邪之毒爲  
熱病也。讀者要逆識之。如論語言亂臣十人書曰。  
惟以亂臣其能亂而四方亂皆治也。乃治寒者也。  
故云亂民亂四方也。仲景所言寒之一字舉其初  
而言之。熱病在其中矣。若以寒爲寒。冷之寒無復  
苦寒之劑。兼言白虎症脉尺寸俱長則熱可知矣。  
白虎加人參湯五法。

藥卽湯見

許云。有人初病嘔吐。俄爲醫者下之。已七八日而

內外發熱。予診之曰。當用白虎加人參湯。或曰。既吐復下。且重虛矣。白虎何用乎。予曰。仲景云。若吐下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱者。白虎加人參湯。正相當也。蓋嘔吐者。熱留胃脘而致令虛火上逆。三投湯而愈。仲景旣云傷寒。若吐若下後。七八日不解。表裏俱熱者。白虎加人參湯主之。又云。傷寒脉浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎。又云。脈浮滑。此以表有熱。裏有寒。白虎加人參湯主之。國朝林億校正謂仲景於此。表裏自差矣。余謂不然。大抵白虎能除傷寒。中渴表裏發熱。故前後。

二症或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服之一種脈浮無汗其表不解全是麻黃與葛根症安可行白虎也林億見所稱表裏不同侵謂之差是亦不思之過也

張云用藥有遲速之弊故設法以關防法有關防不盡者則著方以拯治也便如上二條前條乃仲景設法以關防也後條及傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴口舌乾燥而煩飲水數升者以白虎加人參湯主之此二條乃著方以拯治也夫白虎湯專治大煩大

渴古人設法之意。惟恐表症未罷而輒用之。治有太速之弊。若背微惡寒。及時時惡風二症。其中煩渴已甚。非白虎不能遏也。必候表邪俱盡。未免有太遲之愆也。此乃法之闕防。不盡者。故著方以拯治也。苟不著方。必然違法。此方法之妙。所以不可偏廢也。或問白虎湯。仲景以表不解者不可與。又時時惡風。皆上惡寒者。此有表也。以白虎主之。何也。蓋石膏辛涼。解足陽明本經熱。蒸蒸發熱。潮熱表裏皆熱。舌燥煩渴之聖藥也。且時時者。時或惡風而不常也。皆上惡者。但覺微惡而不甚也。所以

於盛熱燥渴而用。則無疑矣。若夫表症惡寒。常在  
背上惡寒。而加燥渴者。切不可用也。又太陽經發  
熱。而渴無汗者。不可與之。但汗後脈洪大。而渴者。  
則可與之。如陰傷寒。面赤煩躁。身熱。與夫胃虛惡  
心。太便不實。脉弱食少。無大熱者。切不可用也。如  
慎用之。則傾危可立而待矣。

尙論後篇卷之三 緒

曉日以里風，  
立雨各矣。

急教算子賣，  
穀碌算小通。  
大謫詩人出，  
假言更汝改。  
紅葉寒回赤，  
碧雲秋盡碧。  
失田耕未復，  
荒田耕始終。  
年來不重興，  
故土始終同。  
大而無外，  
無外而無中。  
萬象歸一體，  
一體散萬物。