

II. *A Catalogue of the 50 Plants, from Chelsea Garden, presented to the Royal Society, for the Year 1724. by the Company of Apothecaries, pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane Bart. Pr. Coll. Med. S. P. V. Pr. By Mr. Isaac Rand, Apothecary, F. R. S.*

101. **G**eranium lucidum, saxatile. C. B. 318.
 102. **G**eranium folio Malvæ rotundo. C. B. Ib.
 Majus, foliis in breviores & latas lacinias divisis.
 103. — Columbinum, vulgare, petalis florum bifidis, purpureis.
 — Secundum *Camer. Epit.* 600.
 104. — — Petalis florum bifidis albis.
An Ger. Malacoides, flore albo. H. Reg. Blasf.
 105. — — Humile, flore cæruleo, minimo. *Raii Syn. Ed. 3. p. 359.*
 — — Tenuius laciniatum. C. B. 318. *Prod.* 138.
 106. — — Majus, flore minore, cæruleo. *Raii H. 1058.*
 107. — — Maximum, dissectis foliis. *Plot. Hist. Ox.*
 108. — Orientale, columbinum, flore maximo, Asphodeli radice. *T. Cor.* 20.
 109. — Sanguineum, maximo flore. C. B. 318.
 110. — — Cauliculis erectis, flore minore. *H. L. Bat.* 286.
 111. — Hæmatodes, foliis majoribus, pallidioribus & altius incis, *D. Dale. Raii Syn* 219.

112. *Geranium hæmatodes* Lancastrense, flore eleganter
friato. *Raii Hist.* 1061.
113. — *Batrachoides*. Gratia Dei, Germanorum. C. B.
318.
114. — — *Montanum nostras*. *Raii Hist.* 1062.
115. — — *Odoratum*. C. B. 318.
116. — *Annuum minus Batrachoides*, Bohemicum,
purpureo-violaceum. *H. Ox.* p. 2. 511.
117. — *Phæum*, flore reflexo I. B. T. 3. 477.
118. — *Magnum*, folio trifido I. B. T. 3. 478.
119. — *Romanum versicolor*, sive striatum. *Park.*
Parad. 229.
120. — *Robertianum primum*. C. B. 319.
121. — — *Rubens*, flore albo.
122. — *Lucidum saxatile*, foliis *Geranii Robertiani*. *D.*
Sherard. Raii Syn. 218.
123. — *Folio Althææ*. C. B. 318.
124. — — — *Floribus saturatiùs rubentibus*. *H. L.*
Bat. 290.
125. — *Chium Vernum*, *Caryophyllatæ* folio. *T.*
Cor. 20.
126. — *Folio Alcææ*, tenuiter laciniato; flore pen-
tapetalo; purpurascete, semine tenui. *Boerb.*
Ind. alt. 266.
127. — *Cicutæ* folio, moschatum. C. B. 319.
128. — — —, *Minus & supinum* C. B. 319.
129. — *Arvense*, album. *Tabern. Ic.* 57.
130. — *Myrrhinum*, tenuifolium, amplo flore purpu-
reo. *Barrel. ob.* 55.
131. — *Latifolium*, longissimâ acu. C. B. 319.
132. — *Cicutæ* folio, acu longissimâ. C. B. ib.
133. — *Acu longissimâ*, *Cicutæ* folio tenuiùs laci-
niato.
— *Cicutæ* folio, viscosum, acu longissima. *D. Jus.*
sieu.

134. — Triste *Corunti*. 109.
135. — *Æthiopicum*, noctu olens, radice tuberosa, foliis Myrrhidis, angustioribus. *Breyn. Cent.*
136. — Africanum, Coriandri folio, floribus incarnatis, minus. *H. L. Bat.* 279.
137. — Africanum frutescens, Chelidonii folio, petalis florum angustis, albidis; carnosio caudice.
138. — — Noctu olens, tuberosum & nodosum, Aquilegii foliis. *H. L. Bat.* 284.
139. — — *Betonicæ* folio, procumbens, floribus parvis, eleganter variegatis. *Pluk. Alm.* 169.
140. — — Foliis inferioribus Afari, superioribus Staphydis agricæ, maculatis, splendentibus, & Acetosæ sapore. *Com. Præl.* 52.
141. — Africanum frutescens, folio crasso & glauco, Acetosæ sapore. *Com. Præl.* 54.
142. — — Alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis. *H. L. Bat.* 282.
143. — — Folio Malvæ crasso, molli, odoratissimo, flosculo pentapetalo, albo. *Boerb. Ind. alt.* 263.
144. — — Frutescens, Malvæ folio laciniato, odorato. *H. L. Bat.* 277.
145. — — — — — Inftar Melissæ, flore purpurascente. *Boerb. Ind.* 110.
146. — — Arborefcens, Malvæ folio mucronato, petalis florum inferioribus vix conspicuis.
147. — — — Alchimillæ hirsuto folio, floribus rubicundis. *Com. præl.* 51.
148. — — — Folio Malvæ plano, lucido, glabro; flore Kermefino, Di van Leur. *Boerb. Ind.* 109.
149. — — — Ibisci folio rotundo; Carlinæ odore. *H. L. Bat.* 274.
150. — — — — — Anguloso; floribus amplis purpureis.
 — — — Frutescens, Alchimillæ folio, hirsuto, cum fimbriis purpureis. *Boerb. Ind.* 110.