

醫方類聚卷之百六十一

中惡門二

聖惠方二

治風尸諸方

夫風尸者在人四肢循環經絡其狀

來沉沉默默不知痛處若衝風則發故名風

尸也

治風尸及中惡賊風寒氣入腹疴痛飛尸遁

尸發作無時搶心脇如刀刺口噤宜服甘草



散方

甘草一兩炙 牛乾地黄一兩 乾薑壹兩炮

歸一兩到 赤茯苓一兩 細辛一兩 桂心一兩 赤芍

藥壹兩 防風壹兩去 梔子一拾 吳茱萸壹兩

十通焙 乾微炒

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中

煮前至六分去滓不計時候溫服

治風尸及卒賊風遁尸邪鬼五疰心腹刺痛

宜服川大黃散方

川大黃壹兩半 甘草壹兩炙 當歸壹兩

微炒 赤芍藥壹兩 川烏頭壹兩炮 桂心壹兩

右件藥持篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分蜜半合煎至六分去滓不計

時候溫服

治風尸疰忤鬼氣心腹刺痛金牙散方

金牙壹分 犀角屑壹分 黃芩壹分 麝香

細研壹分 牛黃壹分 川椒壹兩去目及閉 天雄

半兩炮裂 真珠半兩 桂心半兩 細辛三分 雄黃

去皮臍

半兩乾薑半兩裂黃連三分蜈蚣去鬚炙去足

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服

以煖酒調下一錢不計時候服

治風尸及飛屍鬼疰風痺身上痛如針刀所

刺嘔逆痰癖除五勞七傷萬病散方

附子炮裂去皮臍川烏頭炮裂去皮臍朱砂細研芫青

糯米拌令黃川椒目及閉口者微炒去汗雄黃細研乾

薑炮裂人參去蘆細辛微莽草微鬼白去鬚

已上各壹枚蜈蚣炙去足蜥蜴壹枚

右件藥搗細羅為散不計時候以温酒調

下半錢

治尸疰諸方

夫尸疰者則是五尸內之尸疰而挾外鬼邪

毒之氣流注身體令人寒熱淋瀝沉沉嘿嘿

不的知所苦或腹痛脹滿不得氣息吐衝心

骨傍攻兩脇或礫塊踊起或攣引腰脊或舉

身沉重精神錯雜恒覺昏謬每節改變輒致

大惡積月累年漸就頓滯以至於死死後復

易傍人仍至滅門以其尸病注易傍人故云尸疰也

治尸疰及惡氣中人令人心胃滿悶神思昏迷宜服此取吐杜衡散方

杜衡壹兩或兩壹人參半兩去蘆頭松蘿壹分瓠子人
二七枚赤小豆二七炒熟

右件藥搗細羅為散平旦時以溫酒調下壹錢得吐多為妙

治尸疰鬼邪毒氣流注身體令人寒熱淋瀝

腹痛脹滿精神錯亂朱砂丸方

朱砂壹兩細研雄黃壹兩細研鬼臼半兩
水飛過水飛過

莽草半兩巴豆十四枚去皮心蜈蚣壹枚
微炙研紙裏壓去油

去足右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

丸如小豆大每服不計時候以煖酒下三

丸

治尸疰發作無時心胃痛喘息急赤茯苓散

方

赤茯苓三分當歸半兩到赤芍藥半兩鬼箭羽

三分桂心二分生乾地黄兩半川升麻三分木香兩半

芍藥兩半桃人三分湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水壹中

蓋煎至五分去滓溫服

治尸疰邪氣流注悶絕時復發作寒熱淋瀝

或腹痛脹滿鶴骨丸方

鶴骨壹兩塗酥微黃桂心三分雄黃一兩細研麝

香半兩朱砂壹分細研川大黃三分到蜈蚣條

微炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服不計時候煎桃枝湯下

二十九

治尸疰寒熱不思食味心腹剝痛宜服虎掌

丸方

虎掌半兩湯洗七遍到赤茯苓壹兩龍齒壹兩

細朱砂半兩當歸三分到阿魏兩蓬莪茂

研三分

右件藥搗羅為末用酒煎阿魏成膏和搗
 百餘杵丸如梧桐子大每服不計時候煎
 生薑烏梅湯下二十九丸
 治尸疰惡氣寒熱悶絕宜服此方

鸛鵲皮

方三寸炙

桂心

三寸蟲令微黃

班猫

拾四枚糯米拌炒

巴豆

三十枚去皮心研紙裏壓

去油

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
 如小豆大每日空心以粥飲下三九

又方亂髮灰

半兩

杏仁 皮尖雙八

右件藥研如脂鍊少蜜和丸如梧桐子大
 每服不計候時以温酒下五九日三四服

又方桃人

五拾枚湯浸去皮尖雙八研

右以水一大盞半煮取壹盞分温三服服
 後當吐為効不吐即非疰也

治人有親近死屍惡氣入腹終身不愈遂醫
 所不療宜服此方

阿魏

三分細研

右件藥每取壹分作餽餽餽十餘枚熟煮食之日二服服滿七日永差

治諸疰諸方

凡疰者言住也謂邪氣住人身內故名爲疰此由陰陽失守經絡空虛風寒暑濕飲食勞倦之所致也其傷寒不時發汗或發汗不得真汗三陽傳於諸陰入於五藏不時除差留滯宿食或冷熱不調邪氣流注或感生死之氣卒犯鬼物之精皆成此病其變狀多端乃

至三十六種九十九種其方不皆顯其名也

治諸疰及冷痰痰飲宿酒癖疰悉主之宜服

藜蘆丸方

藜蘆 壹兩去蘆 皂莢 三分去黑皮塗 桔梗 三分去頭微炙 附子 三分炮裂 巴豆 一分去皮心 蘆頭 去皮膚 油 研紙裏壓去

右件藥搗羅爲末鍊蜜和膏三二百杵丸如小豆大每服空心以溫酒下三九利下

惡物卽住服

治諸疰病及中惡鬼邪客忤及一切不測之病並宜服此雄黃丸方

雄黃壹兩細研人參半兩去甘草半兩炙

桔梗半兩去藁本半兩附子半兩炮裂麥門

冬壹兩去川椒半兩去目及閉巴豆半兩

心別研紙裏壓去油入

右件藥擣羅為末入研了藥令勻鍊蜜和擣三二百杵丸如小豆大每服不計時候以溫酒下二丸

治諸疰邪鬼客忤萬病竜牙散方

竜牙兩半赤茯苓兩雄黃壹分細研赤芍藥壹分生

乾地黄壹分羌活壹分胡鷲糞半兩川烏頭壹分

炮裂去真珠細研銅鏡鼻細研鬼箭羽一

曾青壹分露蜂房壹分蜈蚣壹枚微防風

一分去桂心壹分杏仁壹分及雙人麩炒微桃

蘆頭壹分鬼臼壹分鶴骨壹分塗酥人參壹分

頭川大黃壹分碎微炒廿草壹分炙芎藭壹分陳

橘皮壹分湯浸遠志壹分去鼈甲壹分塗

黃去鬼督郵壹分白朮半兩狸目壹分炙紫蘇

子壹分炒石斛壹分根剉去

右件藥搗細羅為散食前以煖酒調下半錢當有蟲從大便中出為効

治諸疰入腹胃膈急痛鬼擊客忤停尸垂死者藥入喉即愈雄黃丸方

雄黃壹兩細研水飛過朱砂壹兩細研水飛過甘遂半兩

黃附子壹兩炮裂去皮臍豉六拾粒巴豆壹分去皮壓去

油入裏

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵凡如小豆大每服不計時候

以粥飲下三丸

治諸疰鬼擊客忤心痛上氣魘夢蠱毒朱砂

丸方

朱砂半兩細研白礬半兩燒藜蘆半兩附子

半兩炮裂雄黃半兩蜈蚣壹枚微炙去足巴豆壹

去皮臍去皮心研紙裏壓去油入

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如小豆大每服不計時候以煖酒下二丸

治諸疰在人身體寒熱短氣兩脇下痛引背腰少力不能行飲食全少面目萎黃小便澁項強不得俛仰腹中堅癖臍下痛宜服牛黃丸方

牛黃壹分細研麝香壹分細研川椒壹分去目及閉口者微炒去汗
雄黃壹分細研川大黃壹分剉碎微炒常歸壹分剉微炒天雄三分炮裂川烏頭三分炮裂去皮臍消石壹分

參壹分去蘆頭川芒消壹分桂心壹分朱砂壹分細研辛壹分乾葛壹分炮裂剉蜥蜴壹枚微炙巴豆五拾枚去皮心
研紙裏壓去油
右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如小豆大每服不計時候以煖酒下三丸
治風疰諸方

夫疰者言住也其言連滯停住之狀皮膚遊易往來痛無常處是也由體虛受風邪氣客

於榮衛隨氣行遊故謂風疰也

治風疰及五尸惡氣遊走胃心流出四肢來

往不住短氣欲死宜服烏頭散方

川烏頭

壹兩炮裂去皮臍

赤芍藥

壹兩

當歸 壹兩炮

乾薑

半兩炮

桂心

兩

細辛

兩

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

甘草

一兩炙

右件藥搗齏羅為散每服三錢以水壹中

煮煎至六分去滓不計時候溫服

治風疰走入皮膚中如蟲行腰脊強直五緩

六急手足拘攣癱瘓搔之作瘡風尸身痒卒

風面目腫起手不出頭口噤不能語細辛散

方

細辛

壹兩

人參

壹兩去蘆頭

乾薑

一兩炮

桂心

壹兩

麻黃

一兩半

當歸

一兩半

一兩石南

兩甘草

壹兩炙

生乾地黃

三分

茱萸

三分

右件藥搗齏羅為散每服三錢以水壹中

蓋煎至六分去滓不計時候溫服

治風疰毒氣猫鬼所著真珠散方

真珠

半兩細研

雄黃

半兩細研

朱砂

半兩細研

細辛

半兩

薑

半兩炮裂

川椒

半兩去目及骨

口者微炒去汗

桂心

壹兩

天

雄

半兩炮裂

蜈蚣

壹枚微炙

莽草

半兩

微炙

右件藥搗細羅為散不計時候以温酒調

下膏錢

治風疰淫躍皮膚攻注遊走疼痛不可忍天

雄散方

天雄

一兩炮裂

去皮臍

桂心

三分

石南

三分

莽草

三分微炙

茵芋

三分

狼毒

半兩剉碎

醋拌炒熟

木香

三分

雄黃

半兩細研

麝香

膏分細研

右件藥搗細羅為散入雄黃麝香同研令
勻不計時候以温酒調下膏錢

治鬼疰諸方

夫人先無他痛忽被鬼邪所擊當時心腹刺
痛或悶絕倒地如中惡之類其得差之後餘
氣不歇停住積久有時發動連滯停住及至
於死死後注易傍人故謂之鬼疰也

治鬼疰心膈痛悶亂欲絕宜服木香散方

木香半兩丁香兩壹鬼箭羽半兩桔梗半兩去陳

橘皮半兩湯浸去白穢焙當歸半兩劉微炒桃梟五枚紫蘇

荳蔻兩壹檳榔兩壹

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

久生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治鬼疰中惡犀角散方

犀角屑一分川升麻三分木香半兩檳榔三分桃人

三七枚湯浸去皮川大黃碎微炒桑根白

皮壹兩麝香一錢

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蒸煎至六分去滓不計時候溫服

治鬼疰宜服恒山散吐之方

恒山一兩甘草半兩麝香一錢

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓食前溫服得大吐即效

治鬼疰蠱毒氣變化無常鮫魚皮散方

鮫魚皮半兩炙 犀角屑半兩 麝香細研 朱砂分
牛兩 雄黃細研 蜈蚣一枚 丁香一分 鹿角
細研 蕤荷根一分 龍骨一分 川椒閉口者 微炒
去乾薑 壹分 炮 貝齒拾枚 燒
汗乾薑 壹分 炮 貝齒拾枚 燒
 右件藥擣細羅為散入研了藥令勻不計
 時候以煖酒調下一錢

治諸病破積聚心下支滿寒熱鬼疰長病嗽
 逆唾噫辟除眾惡殺鬼逐邪氣鬼擊客忤中
 惡胃中結氣咽中閉塞有痛惻惻隨上下手

心中愠愠如有血狀毒疰相染宜服太一神

明陷冰片方

雄黃一分 元青五拾枚 糯米拌炒 真珠三
細研 麝香半兩 附子三分 炮裂人參 犀頭半兩 去
 角屑半兩 鬼臼半兩 蜈蚣壹枚 微川烏頭 兩
 炮裂去 杏仁壹分 湯浸去皮尖 朱砂壹兩 細研
 皮臍去 雙人 麩炒微黃 朱砂壹兩 細研
 水飛 蜥蜴壹枚 斑貓三七枚 糯米拌炒 藜
 過 蘆頭微炙 礬石壹兩 黃泥裏 擣雞三分
 蘆頭微炙 礬石壹兩 黃泥裏 擣雞三分
 用 牛黃細研 川大黃壹兩 微炒 地膽三七枚 糯米拌

炒令黃壹兩判當歸壹兩判桂心兩壹巴豆壹分去
去翅足紙裏壓當歸微炒桂心兩壹巴豆皮心研
去油

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和
搗三五百杵丸如小豆大每服食前以温
酒下三丸

治鬼疰氣痛方

芫青二十枚糯米炒雄黃半兩阿魏半兩
煨令麵當歸半兩判附子半兩炮裂桂心
熟為度微炒附子半兩炮裂桂心
兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每
服不計時候以温酒下五丸至七丸立愈

治三十六種鬼疰不問男子女人皆主之方

白芥子壹斤陳米醋二升三韭子壹升燒令

右以瓷瓶盛醋內芥子於中以物蓋鉗頭
封之勿令洩氣其合藥日時分明記之七

日為滿還以合藥時開內淨白中搗如泥
用生布絞取汁內韭子末和丸如菉豆大
服藥之時不食夜飯明旦以粥飲下三十

九温酒亦得至辰巳時當有大利如不利
更喫熱粥飲一盞投之當利下惡物及有
蟲如蒜瓣大出卽以粥飯壓之

治鬼疰相染方

猪肝一具薄切炙乾

右擣細羅爲散每服不計時候以新汲水

調下二錢

又方桃人四兩湯浸去皮尖雙人

右研爲膏每服不計時候以酒調下半匙

服之

治轉疰諸方

夫轉疰者言死又易傍人轉注之狀與諸疰
略同以其在於身內移轉無常故以爲轉疰
也

治鬼物前亡轉相染易夢寐氛氲肌體羸瘦
往來寒熱嘿嘿煩悶欲寤不能手足熱不能
食或欲向壁悲啼或喜笑無常宜服牛黃散
方

牛黃半兩 鬼箭羽半兩 王不留行半兩 徐長卿

半兩 遠志去心 乾薑半兩 附子半兩 炮裂

五味子半兩 石韋半兩 黃芩半兩 赤茯苓半兩 桂

心壹分 代赭半兩 苜蓿壹兩 麥門冬壹兩 焙

右件藥搗細羅為散每服用酒壹小盞入

生薑汁少許地黃汁一合煖令溫調下壹

錢不計時候服

治轉症絕門族族盡轉逐中外復易親友雄

黃丸方

雄黃半兩 麥門冬壹兩 天門冬壹兩

皂莢半兩 黑皮塗酥 芥草半兩 鬼臼半兩

去去 巴豆半兩 去皮心研

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸

如小豆大每服空心以煖酒下二丸

治人久疰相傳乃至滅族宜服此方

雄黃壹兩 鬼臼壹兩 朱砂壹兩

芥草壹兩 巴豆四拾枚

裏壓皂莢半兩 真珠半兩

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和
搗三二百杵丸如小豆大每服空心以温
酒下二九當吐利下惡物即住服

治萬病轉疰相染或霍亂中惡客忤病者宜
服此獼肝丸方

獼肝半兩 雄黃半兩 莽草半兩 朱砂半兩
鬼白半兩 犀角半兩 麝香半兩 川大黃半兩
剉碎牛黃 細研蜈蚣 炒巴豆 皮心 研
微炒紙裏壓 去油

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和
搗三五百杵丸如麻子大每服空心以温
酒下三九若中病不計時候服

治惡疰諸方

夫惡疰者是惡毒之氣也人體虛者受之毒
氣入於經絡遂流移心腹其狀往來擊痛痛
不一處故名惡疰也
治惡疰邪氣往來心痛徹背或入皮膚移
動不定四肢煩疼羸乏短氣宜服牛黃散方

類聚真土

十一

牛黃壹分 蜈蚣壹枚 朱砂壹兩 細辛兩

川大黃一兩 鬼臼半兩 黃芩壹兩 當歸兩

枳心兩 人參半兩 麝香壹分 附子兩

乾薑半兩 炮頭兩 麝香壹分 附子兩

右件藥搗麤羅為散入研了藥令勻每服

三錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

治惡症撮肋連心痛宜服此方

常歸二兩 木香壹兩 檳榔二兩 麝香壹錢

右件藥搗細羅為散不計時候煎童子小

便調下三錢

治惡症心痛悶絕欲死宜服此方

鬼督郵壹兩 安息香壹兩 酒浸細升去

右件藥以安息香煎和丸如梧桐子大不

計時候以醋湯下十九

治卒得惡症腹脹方

釜底墨壹兩 鹽兩

右件藥以水壹大盞煎至七分去滓分溫

藥事真

廿九

二服

又方獨顆蒜

四顆伏竜肝壹兩細研

右件藥搗入少水和丸如梧桐子大每服

以温酒下二十九式

治惡疰腹痛不可忍宜服此方

吳茱萸

壹兩湯浸七遍焙乾微炒桂心兩

右件藥搗細羅爲散不計時候以熱酒調

下二錢

治惡疰入心欲死宜服此方安息香半兩搗

末分爲二服以熱酒和服之

又方阿魏末壹分分爲二服以熱酒調服之

又立差

又方獨顆蒜一頭香墨如棗大並搗以醬汁

壹合和頓服立差

未治走疰諸方

夫疰者由體虛之人受於邪氣隨血而行

或滯奕皮膚去來擊痛遊走無有常所故名

爲疰也

治惡走疰疼痛宜服此方

川烏頭壹兩 去皮 臍 桂心壹兩 川椒一兩 去目

微炒 天雄壹兩 去皮 臍 莽草壹兩 微炙 雄黃壹兩 細研

朱砂壹兩 細研 木香半兩 虎頭骨壹兩 塗酥

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下疳錢

又方雄黃三兩 細研 清漆三匙 米醋九升

右件藥五月五日以糠火煎一復時候可

丸即丸如小豆大每服不計時候以溫酒

下壹丸兼治蛇蠍螫塗之立驗

治走疰上下隨痛貼之神效膏方

芫花壹兩 蔓莖子半兩 安息香半兩 附子半兩 去皮臍

桂心半兩 川椒半兩 已上並生用

右件藥搗細羅為散入牛皮膠中和成膏

塗紙上隨痛處貼之立定

治走疰風毒疼痛藥方

狼毒壹兩 去皮臍 附子壹兩 去皮臍 川椒壹兩 吳茱萸三升 乾

地黃壹兩 桂心壹兩 蔓莖子壹兩 芎藭壹兩 當歸壹兩

川大黃

已上各半兩

右件藥並生用壽羅為末以酒糟三片同炒令熟用絹包裹更互熨痛處以効為度

又方小芥子末壹合

右以蜜和丸如梧桐子大每服以温酒下十九三兩服差後不得食五辛

又方漢椒擣碎以布裹之繫布於疔上以熨

對熨汗出即効

又方桂心壹兩

右以酒壹大盞煎至七分分為二服

又方蠶薑子以慢火炒熟擣為末以油麵入

濃醋調煎為糊看冷熱塗在痛處三五上

効中惡容神氣入即康強又中惡毒利

又方小芥子末和雞子白調傅之即差

效中惡諸疾末送外神變消毒冷扑限

夫中惡者是人精神衰弱為鬼邪之氣卒中

之也夫人陰陽順理榮衛調平神守則強邪

不干正若將攝失宜精神衰弱便中鬼毒之

氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死又凡卒中
惡腹大而滿者診其脉緊大而浮者死緊細
而微者生又中惡吐血數升脉數細者死浮
焱如疾者生中惡者差後餘勢尚滯發作則
變成疰也

治卒中惡客忤飛尸入腹鬼擊及中蠱毒吐
血下血心腹卒痛滿及熱毒痛六七日並宜
服此雄黃散方

雄黃一兩朱砂半兩附子半兩炮裂桂心
細研

藜蘆一分野葛半兩醋拌川椒半兩
及閉口者

巴豆二拾枚芫花一分
微炒去汗研紙裏壓去油醋拌

乾

右件藥擣細羅為散每服以溫水調下半

錢服後或吐或汗出即住服

治中惡喘急心腹胃脇疝痛宜服此方

東引桃枝皮壹握白楊皮壹握真珠壹兩梔子

仁十四枚當歸一兩吳茱萸壹兩湯浸七

桂心壹兩附子壹兩炮裂三錢

右件藥擣篩為散每服三錢以水盪中盪入生薑半分豉五十粒煎至六分去滓不計時候温服

治中惡心腹痛胃脇短氣當歸散方

當歸二兩劉碎微炒 梔子人壹兩 桃白皮二兩 附子壹兩

皮臍去 赤芍藥壹兩 蓬莪茂兩 桂心兩 芡茶

莢壹兩湯浸七遍焙乾微炒

右件藥擣篩羅為散每服三錢以水盪中盪入豉五十粒煎至六分去滓不計時候

温服

治中惡客忤垂死宜服朱砂丸方

朱砂一兩細研水飛過 雄黃一兩細研水飛過

香壹分 附子壹兩炮裂去 巴豆二拾枚

研紙裏壓去油

右件藥都細研令勻鍊蜜和擣三五百杵

丸如麻子大每服不計時候以粥飲下三

黃丸不利更服三丸漸加至五丸七丸以利

又為度

又方空青壹兩細研麝香壹分細研朱砂壹兩細研雄

黃半兩細研

右件藥相和研令勻每服以醋壹合湯壹合相和調散半錢不計時候服之須臾卽吐爲効

治卒中惡心腹疔刺痛氣急脹滿方

雄黃兩赤小豆半兩炒熟瓜蒂兩

右件藥搗細羅爲散每服不計時候以溫漿水調服壹錢半當小吐立止不吐加至

二錢

治卒中惡心腹刺痛煩亂方

麝香壹分細研犀角屑兩木香壹兩

右件藥搗羅爲散每服不計時候以溫漿水調服壹錢半加至二錢類三五服卽差

治中惡心神煩悶腹脇刺痛宜服此方

菝根壹把烏梅七顆吳茱萸壹分湯浸七遍焙乾微炒

右件藥以水壹大盞煎至七分去滓不計時候分溫二服

類聚

治中惡悶亂腹痛心膈不利宜服此吐方

桂心半兩生薑壹兩梔子拾四枚鼓二人

參蘆頭壹分

右件藥都以酒二大盞煮取一盞去滓不

計時候分温二服取吐為度

治中惡遁尸心腹及身體痛甚者短氣不語

不知痛處手摸按之即知痛處偏宜用此

方右以艾葉按令碎著痛上令厚二寸以

熨斗內著灰火熨艾上令熱透如冷即再

熨之

治中惡心痛欲絕方

釜底墨半兩塩壹錢

右件藥和研以熱水壹盞調頓服之

治卒中惡方牛糞新者絞取汁三合為壹服

若口不開拗開口內藥也若無新者乾即

加水煮之

治卒中惡氣絕方右以上好朱砂細研於舌

上書鬼字額上亦書之此法極効

類聚

三六

治尸厥諸方

夫尸厥者是陰陽氣逆也此由陽脉卒下墜
 陰脉卒上昇陰陽離居榮衛不通真氣厥亂
 客邪乘之其狀如死猶微有息而不恒脉尚
 動而形無知也聽其耳內脩脩有如嘯聲而
 股間暖者是也耳內雖無嘯聲而脉動者故
 當以尸厥治之診其寸口脉沉大而滑沉即
 為實滑即為氣實氣相搏身溫而汗此為入
 腑雖卒厥不知人氣復則自愈若唇面青身

冷此為入藏亦卒厥不知人即死候其左手
 關上脉陰陽俱虛者是厥陰手少陰巢氏病源是少
 陽俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄有所見
 也

治尸厥脉動而無氣氣閉不通故靜如死聽
 其耳中脩脩有如嘯聲而股內暖者是也不
 治三日當死宜服朱砂丸方

朱砂三分雄黃一分附子三分桂心
 壹兩細研巴豆二拾枚去皮去心研細裹壁去油

右件藥擣羅為末入研了藥令勻鍊蜜和
丸如麻子大每服不計時候以粥飲下五
丸不知更下二丸若利多即止之

治尸厥不語返魂丹方

生玳瑁壹分朱砂壹分雄黃壹分白芥子壹分麝香壹分

右件藥同研如粉於瓷器中鎔安息香和

丸如菉豆大或衝惡不語不計時候以小

便下五丸孩子熱風只壹丸

治中惡暴死方

菖蒲二兩

右擣細羅為散取半錢著舌底又吹入兩

鼻孔中及下部中更吹入兩耳內即活矣

又方捧兩手莫放須臾即活

又方握兩大姆指令固即活

又方肘後方救卒死或先病痛或常居右以

竹管吹下部數人更互吹之氣滿即活肘後

又方氣通則活

又方以竹管令人更互吹兩耳中經驗良不
過良久即活

又方酒磨桂心灌之即活

又方研麝香壹錢醋衛生易簡方二合和灌之即活

又方取床下土小便研灌之瀝入口鼻即活

治卒死諸方

夫卒死者由三虛而遇賊風也所為三虛者
謂乘年之衰一也逢月之空二也失時之和
三也人有此三虛而為賊風所傷使陰氣偏

竭於內陽氣阻隔於外二氣壅閉故暴絕如
死也若腑藏氣未竭者良久乃蘇然亦有挾
鬼神之氣而卒者皆有鬼邪退乃活也凡中
惡及卒忤卒然氣絕其後得蘇若其邪氣不
盡者即停滯心腹令心腹痛或身體沉重不
能飲食而成宿疾而變成疰也
治卒死俱有微氣心上稍暖者服此五神返
魂丹方

朱砂半兩牛黃兩半安息香兩半砒霜兩半大蜘蛛

五枚重午日採袋
內盛通風勿令死

右先細研四味方人蜘蛛又研令勻用不
蛙皂莢三寸去黑皮以水三合按汁便入
少粟米飯煮令水盡和丸如梧桐子如中
惡卒死及急風者但有微氣以新汲水研
下壹丸如昏迷加壹丸立活無疾常服壹
丸至老無病

治卒死及感忤口噤不開者宜服此方

巴豆 拾枚去皮心研 乾薑 半兩炮 川大黃 細裏壓去油

半兩到
碎微炒

右件藥搗羅為末以棗瓠和丸如棗豆大

又每服不計時候以溫水下五丸如人行才

更再服

治卒死中惡及尸厥方右以葱刺其耳中鼻

中血出者是活候也其欲蘇時當捉兩手

莫放之須臾死人自當舉手撈人言痛乃

止男左女右鼻內令葱入五寸 肘後方為

則立効 肘後方青域神

又方右以縣漬好酒備預百要方二蓋手按汁令入

鼻中并持其手足莫令驚動肘後方同

又方半夏搗為末如大豆許吹其鼻中肘後方同

又方擣韭取汁以灌口中

又方截狗尾取而灌之并縛狗以枕之死人

須臾活矣肘後方同

又方視其上唇烟霞聖効方上下唇裏絃絃者白如黍

米大以針決去之得效方經驗秘方壽域神方同

又方右以女青擣細羅為散用一錢發開口

內喉中以水及醋下之立活肘後方同

治忤打死心由暖宜用此法取葱白內於下

部中及鼻中須臾即活

治卒忤諸方

夫卒忤者亦名客忤謂邪客之氣卒忤犯人

精神也此是鬼厲之毒氣中惡之類也人有

魂魄衰弱者則為鬼氣所犯忤喜於道問門

外得之其狀心腹疔痛腹滿氣衝心胃或即

悶絕不識人肉色變異腑藏虛竭者不即治

乃至於死然其毒氣有輕重輕者微治而差重者侵剋腑藏雖當時救療餘氣停滯久後猶乃變成痲也

治卒中忤礬石丸方

礬石半兩黃泥裏燒細研附子半兩炮裂去皮臍雄黃半兩細研

真珠半兩細研巴豆半兩去皮心研藜蘆半兩去蘆

頭蜈蚣一枚微去足麝香壹分細研犀角屑半兩細辛

三斑猫七枚糯米拌炒

右件藥搗羅爲末入研了者藥令勻鍊蜜

和搗三五百杵丸如小豆大每服不計時候以溫酒下壹丸日二服蛇蜂蠍所中藥摩之効

治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺知或已死口噤卽發口下湯湯入口不下者捉病人髮左右搖動引之藥下復增取盡膏升須臾立蘇還魂散方

麻黃二兩去根節杏仁一兩湯浸去皮尖桂心

壹甘草半兩炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治客忤有似卒死方

右擣生苜蒲根絞取汁二三合經驗秘方一盞備預

百要方三四灌下立愈也簡方同

治卒客忤不能言方

桔梗末壹分麝香末壹分

右二味更研令勻每服以溫水調下二錢

服之

治鬼擊諸方

夫鬼擊者謂鬼厲之氣擊著於人也得之無漸卒著如人以刀矛刺狀胃脇腹內疔急切痛不可抑按或吐血或鼻中出血或下血一名為鬼排言鬼排觸於人也人有氣而虛弱精魂衰微忽與鬼神通相觸突致為其所排擊輕者因而獲病重者即多死矣
治鬼打鬼排鬼刺心腹痛下血欲死不知人及臥多魘諸惡毒氣宜用此方

礬石

壹分黃泥裏燒赤研

皂莢

壹分去皮子

雄黃

壹分細研

蘆

壹分去蘆頭

右件藥擣細羅為散每用大豆許內竹管中吹鼻得嚏則氣通便活未嚏更吹以嚏為度

治鬼擊之病得之無漸卒如刀刺狀胃脇腹

內疔急切痛不可抑按或即吐血下血或鼻

中出血一名鬼排宜服升麻散方

川升麻

壹兩獨活

壹兩犀角屑

兩半

右件藥擣細羅為散不計時候以溫酒調

下二錢立愈

又方桂心

半兩

川大黃

半兩剉碎微炒

川升麻

半兩

右件藥擣細羅為散以溫酒調下二錢立

差

治卒鬼排鬼刺下血方

麝香

壹分

雄黃

細研

藜蘆

頭瓜蒂

已上各壹分

右件藥擣細羅為散用大豆大以竹管吹

入鼻中得嚏則氣通便活若未嚏復吹之得嚏為度

治鬼神所鑿諸術不治吹鼻散方

特生礬石

壹分以水和赤土裹之炭火燒三斤燒兩炊久取出赤土

黃半分

壹分皂莢末

壹分朱砂

半分

壹分藜蘆頭

右件藥都研勻細每服少許以細竹管吹入鼻內得嚏即愈及重病者亦可以吹矣

又方取白犬血一合熱飲之

又方割雞冠血

備預百要方丹雄雞冠血

以瀝口中令入

咽內

百要方以管吹入

仍破此雞以搗心下冷乃

棄之於道邊得烏雞佳矣

肘後方同

又方右服猪脂如雞子大即差未差再服之

治卒魘諸方

夫卒魘者屈也謂夢裏為鬼邪之所魘屈人臥不悟皆是魂魄外遊為他邪所執錄還未得致成魘也忌燈火照照則神魂遂不復入乃至於死人有於燈光前魘者本在明處是

以不忌火也

治虛羸心氣乏弱多屬宜服扶神散方

扶神 壹兩 黃耆 壹兩 甘草 壹兩 白芍藥 壹兩

乾薑 壹兩 遠志 壹兩 人參 壹兩 桂心 壹兩

兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚屬腎氣不足人參散方

人參 去蘆 扶神 去心 遠志 去心 赤石脂 去土 龍骨

乾薑 炮裂 當歸 剉微炒 甘草 炙微 白朮 白

芍藥 熟乾 地黃 桂心 防風 去蘆 紫

苑 去苗土已 上各壹兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

日三服

治卒屬昏昧不覺方右以皂莢末用細竹管

吹兩鼻中 得効乃經 即起三兩日 肘後方 壽域神

方三 四日猶可吹之

又方右以筆毛壽域神方刺兩鼻中男左女

右展轉即起也用後方展轉進之

又方右以蘆管得効方吹兩耳取其人髮二

七輩作繩紐入鼻中經驗秘又割雄雞冠

血以管吹內鼻中肘後方吹入咽喉中大効

治卒魘方雄黃細研以蘆管吹入兩鼻中壽

刺方衛生桂心末亦得肘後方同

又方右以菖蒲末吹兩鼻中以桂末內於舌

下亦得

又方右以麝香一臍置枕頭邊佳肘後方同

又方右枕犀角枕佳肘後方同

又方右以木香內枕中并帶之佳肘後方同

又方右取韭搗以汁得効方經驗秘滴鼻中

壽域神方滴鼻孔內及兩耳中冬月可取根汁灌於口中

肘後方急救仙方衛生易簡方同

治鬼魅諸方

夫鬼魅者是鬼物所魅則好悲或心亂如醉

如狂言驚怖向壁悲啼夢寐喜魘或與鬼神
交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能食此
魅之所致也

治五藏六腑氣少亡魂失魄五藏不安忽喜
忽悲恐怖如有鬼物皆發於大驚及當風從
高壁下落水所致悉治之雄黃散方

雄黃壹兩黃芩半兩黃連壹分黃蘗壹分川

大黃半兩黃耆半兩桂心半兩細辛半兩黃

環半兩澤瀉半兩山茱萸半兩蒲黃壹分麻黃半兩

節人參半兩去蘆頭

右件藥擣細羅為散每服不計時候以溫
酒調下壹錢日三服不知稍增至二錢服
絕一切鬼魅魘大殺鬼丸法

虎頭骨三兩雄黃一兩鬼臼一兩天雄壹兩

臍皂莢壹兩去皮及子蕪荑壹兩藜蘆六兩去

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如杏核大主
伏屍惡疰為患者燒壹丸安室四角熱疾
時氣燒壹丸安牀頭邊牛馬疫疾燒壹丸

安鼻中

治狂邪鬼魅妄語狂走恍惚不識人殺鬼丸

方

朱砂一兩雄黃壹兩白龍骨壹兩犀角屑兩半

鬼臼壹兩赤小豆壹兩鬼箭羽壹兩芫青二拾枚

桃人三拾枚

右件藥擣羅爲末更研令勻以蠟和丸彈

丸大絳囊盛之繫臂上男左女右小兒繫

項頸下合藥之時勿令婦人雞犬見

又方虎爪細研朱砂細研雄黃細研龍爪已上各壹兩

右件藥搗細羅爲散以松脂消和丸如蓮

子人每夜堂中燒壹丸

治鬼魅方

由跋根壹分金牙壹分防葵壹分莨菪子壹分淘去浮

者水煮令牙出曝乾炒令黃黑色

右件藥搗細羅爲散每服空心以溫酒調

下壹錢欲令病者見其鬼增防葵壹分服

之

治患鬼氣出鬼毛方

獨顆蒜

壹枚雄黃

壹分

湯浸去皮尖雙人

衣別

右件藥都研為丸如麻子大每日空心以粥飲下三丸靜坐少時鬼毛自爪甲中出矣

大全本草

藥性論云塩能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛

中惡或連腰臍者塩治雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物

孫真人食忌主卒中尸遁其狀腹脹氣急衝

心或塊起或牽腰脊者是服塩湯取吐

鬼疰氣痛取粉鼠壤堆上土以秫米甘汁搜

作餅燒令熟以物裹熨痛處凡蚡鼠是野

田中尖嘴鼠也

鑄墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研

温服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面切勿

塗之黑入肉如印此鑄下墨是也

藥性論云平天河單用此竹籬頭水及高樹

穴中盛天雨能殺鬼精恍惚妄論勿冷知
之與飲差
熱湯主忤死先衣三種籍忤死人腹上乃
取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者
大冷者換湯即愈

糧鬻中水主鬼氣中惡症忤心腹痛惡夢鬼
神進膏合多飲令人心悶又云洗眼見鬼
末試害蚘蟲其澄清久遠者佳古塚云文
選留餘節瓜毒潰屍言此二物不爛餘皆

成水北人呼糧鬻為食鬻也

斗門方辟魔以雄黃一塊帶頭上妙

外臺秘要治卒客忤停口不能言細辛桂心

等分內口中

孟誥云白蒿子主鬼氣末和酒服之良又燒

淋灰煎治淋瀝疾

葛洪治卒中五尸擣疾藜子蜜丸服如胡豆

二枚比三愈

食療云治白惡氣取艾子和乾薑搗作末蜜

丸如梧子大空心三十丸服以飯三五匙
壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷
血

陳藏器鸞尾主飛尸遊蠱著喉中氣欲絕者
以根削去皮內喉中摩病處令血出佳

食療云治鬼氣取青蒿子為末酒服之方寸

匕差

敗天公主鬼疰精魅

陶隱居云此人所戴竹
笠之敗者也取上竹燒

酒服

楊氏產乳療中惡心痛吳茱萸五合以酒三

未升煮三沸分三服

陳藏器云樟林主惡氣中惡心腹痛鬼注霍

亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之

無藥處用之江東舸船多是樟木斫取札

用之彌辛烈者佳

嘗有媼人患滯冷積年不差徐嗣伯為診曰

此尸疰也當以死人枕煮服之乃愈於是往

古塚中取枕枕已一邊腐缺媼服之卽差張

景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石虵耳極難療當取死人枕煮服之得大虵蟲頭堅如石者五六升病卽差沉僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病三同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石虵者醫療旣癖虵

蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因而去之故令埋於塚間也食療尸疰腹痛痔瘻狸骨炙之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒爲灰酒服二錢亦主食野鳥肉物毒腫也再服之卽差五月收者糞極神妙正

月勿食傷神

續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡
 未移時者濕水微研灌入喉即活常須預
 備救人移時即無及矣運化玄雄狐屎燒
 之辟惡在木石上者是也

孟詵云以鱧魚大者洗去泥開肚以胡椒末
 半兩切大蒜三兩顆內魚腹中縫合并和
 小豆壹升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指
 大切葱壹握煮熟空腹食之方石等強飽
 盡食之至夜即洩氣無限三五日更一頓

下一切惡氣又十二月作醬良
 外臺秘要治卒狂言鬼語燒蜈蚣末酒服
 方寸匕日三

崔氏主鬼疰小腹痛不可忍取東引桃枝削
 去蒼皮取白皮壹握水二升煮取半升服
 令盡差如未定再服
 三因方

卒厥尸厥脉證治
 追魂湯治卒厥暴死及主客忤鬼擊飛尸奄

忽氣絕不覺口禁

麻黃

去節

杏仁

去皮尖

三百八十箇

得效方二百五拾箇

甘草

炙一兩

草

炙一兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓灌之通治諸感忤或口噤拗口不開去齒下湯湯入口活不下分病人髮左右捉搦肩引之藥下漸令服尽取効千金有桂心二兩金匱云寸脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟則死入腑

則愈若卒厥唇口青身冷為入臟即死身和汗出則愈

疰忤中惡證治

病者卒心腹脹滿吐利不行如乾霍亂狀世所謂律惡是也由人精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或復附著沉沉默默寢言謔語誹謗罵詈訐露人事不避讖嫌口中好言未然禍福及至其時毫髮無失人有起心已知其墜登高涉險如履平地或悲泣呻吟不欲

見人其狀萬端如醉如狂不可槩舉此皆鬼神及諸精魅附著惑人或復觸犯忌諱土地神靈為其所作非有真實但隨方俗攷驗治之方列于后
還魂湯治卒中惡感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺知或已死絕口噤不開去齒下湯或湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取尽一升須臾立蘇

麻黃去節湯三兩○得桂去皮二兩○得
効方洗乙兩半

兩甘草壹兩杏仁去皮尖二百壹十粒
右剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓不以時服

桃奴圓治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤厭夢不祥小兒驚癇並宜服之

桃奴七枚別研為末辰砂十兩別研桃仁十四枚去皮

未生玳瑁鎊過為末牛黃壹分別研碎龜腦壹分別研

雄黃用桃葉煮水研飛取黑犀石上以小

取細末麝香別研安息香一兩以無灰酒

去砂土銀器中入琥珀別研三分

右為細末和入前膏丸如雞頭大陰乾密

器封閉淨室安置煎人參湯研下壹丸食

後臨臥服

蘇合香圓治卒中惡忤症得効方同方

搗碎錄治心腹急痛不常言請龍圖

治壓死不得著燈火照亦不得近前急喚多

殺人但痛咬其足跟及足拇指甲邊并多

唾其面即活經驗秘方良方同時後方備生身簡方得効方此下云如

不醒者移動處此子徐喚之若元有燈即存如無燈切不可用燈照

禳遠行所在邪魅九龍符符樣至宿泊所

在望空劃之則厭諸邪魅精怪不敢動

直指方

辟妖魅瘟瘵朱砂雄黃等分為末法醋調入

口鼻

得效方

硫黃散治尸厥奄然死去四肢逆冷不省人

事腹中氣走如雷鳴

焰消半兩硫黃兩壹

右二件細研如粉分作三服每服用好酒一大觥煎覺焰起傾於盞內蓋著溫灌與服如人行五里又進壹服不過三服即甦又方附子七錢炮熟去皮臍為散分作二服每服用酒三盞煎至壹盞溫服

又方生姜自然汁半觥酒一觥煎令百沸灌

貳服却用灸見針灸門

破棺散治魘寐卒死及為墻壁竹木所壓水

溺余瘡卒致悶絕產婦惡血衝心諸暴絕訂

半頁湯洗七次去骨不拘多少

右為末每壹大豆許吹入鼻中即活但心

頭溫者一日可活皂角末亦効

又方用葱黃心或韭黃男左女右鼻中刺入

深四五寸令目小出血即活

單方治胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不

可按摩或吐血口中衄血肘後方此用搗

壹盃水二盃肘後方壽域神方和服以冷

水喫之吐即瘥

經驗秘方
良方同

又用蓬莪朮酒研服壹盞

經驗秘方
良方同

備急散治卒中惡風氣忤迷絕不知人用乾

薑大黃各壹兩巴豆仁十五粒各研細以

水三合灌服

經驗良方同

雄朱散或到客舍官驛及久無人居冷房睡

中為鬼物所魘但聞其人吃吃作聲使令人

叫喚如不醒不急救則死

牛黃

雄黃

各壹錢
大朱砂半錢

右為末壹挑每錢床下燒壹錢用酒調灌之

又方桃柳枝取東邊者各三七寸煎湯二盞

候溫并灌服

又方竈心土搥碎為末每服二錢新汲井花

水調灌更挑半指甲許吹入鼻中

經驗秘方
急救

仙方
同

朱犀散治中惡中忤鬼氣其訂暮夜或登廁或出郊野或遊空冷屋室或人所不至之地

忽然眼見鬼物鼻口吸著惡氣驀然倒地四肢厥冷兩手握拳鼻口出清血性命逡巡須臾不救此訂與尸厥同但腹不鳴心脇俱暖此此切勿移動卽令親眷衆人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香蘇木樟木經驗良方之類直候記醒方可移歸

犀角

半兩鎊屑研末

生麝香

大朱砂

各壹分

右爲末每服二錢新汲井水調灌之

又方雄黃爲末每服壹錢桃枝葉煎湯調灌

下

又方故汗衣須用內衣久遭汗者佳

經驗良方或觸

衣觸衣者久著內衣親衣也

男用女衣女用男衣燒灰

爲末每服二錢百沸湯調下

又方治客忤中惡多於道路在外得之令人

心腹絞痛漲滿氣衝心胃不急治卽殺人

好京墨爲末調二錢服

肘後方水和服一錢匕或瓦

器盛湯用衣襯貼熱湯於肚上轉移溫湯

冷別換

經驗秘方良方

澹軒方

崇物憑人

崇物憑人有術收束之角帶鬼哀求不然口嚼黃樺子和水噴人人亦瘳

肘後方

救卒中惡死方

救卒死或先病痛或常居寢臥奄忽而絕皆是中惡救之方令二人以衣塞口吹其兩耳極則易又可以筒吹之並捧其肩上側

身遠之莫臨死人上

壽域神方同

又方割雄雞頸取血以塗其面乾復塗并以

灰營死人一周

又方破白犬以搗心上無白犬白雞亦佳

又方取雄鴨就死人口上斷其頭以熱而瀝

口中并以竹筒吹其下部極則易人氣通

下即活

又有備急三物丸散及裴公膏並在後備急藥條中救卒死尤良亦可臨時合用之凡卒

死中惡及尸蹩皆天地及人身自然陰陽之氣忽有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可治而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可以符術而獲濟者

扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者爲治皆參用此方擣菖蒲生根絞汁灌之立

又差尸厥之病卒死脉猶動聽其耳中如微語聲股間暖是也亦此方治之

孫真入治卒死方以皂角末吹鼻中

救卒死尸蹩方

尸蹩之病卒死而脉猶動聽其耳中循循如嘯聲而股間暖是也耳中雖然嘯聲而脉動者故當以尸蹩救之方以管吹其左耳中極三度復吹右耳三度活

又方擣乾菖蒲以一棗核大著其舌下

此亦全是魏大夫傳中扁鵲法卽趙太子之患又張仲景云尸一蹩脉動而無氣氣閉不

通故靜然而死也

又方熨其兩脇下取竈中墨如彈丸漿水和
 飲之須臾三四以管吹耳中令三四人更
 采吹之又小管吹鼻孔梁上塵如豆著中
 吹之令入差

又方白馬尾二七莖白馬前脚目二枚合燒
 之以苦酒丸如小豆開口吞二丸須臾服
 壹丸

救卒客忤死方

客忤者中惡之類也多於道門門外得之令

人心腹絞痛脹滿氣衝心胃不即治亦殺

又人救之方灸鼻人中二十壯令切鼻柱下

卒也以水漬粳米取汁壹二升飲之已即噤

者以物強發之

又方以三重衣著腹上銅器著衣上稍稍少

許茅於器中燒之茅盡益之勿頓多也取

氣愈乃止

又方真丹方寸匕蜜三合和服口噤者折齒

下之

扁鵲治忤有救卒符并服熅湯法恐非庸世

所能故不載而此病即今人所謂中惡者

又與卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用之

已死者擣生菖蒲根絞取汁含之立差

卒忤停尸不能言者桔槎燒二枚末之服

又方末細辛桂分等內口中

又方雞冠血和真朱丸如小豆內口中與三

谷四枚差

若卒口噤不開者末生附子置管中吹內舌

下即差矣

又方人血和真朱如梧桐子大二丸折齒內

喉中令下

卒中惡短氣欲死桂一兩生薑三兩梔子十

四枚豉五合擣以酒三升攪微煮之味出

去滓頓服取差

又有諸凡散並在備急藥中客者客也忤者

犯也謂客氣犯人也此蓋惡氣治之多愈雖

是氣來鬼鬼毒厲之氣忽逢觸之其衰歇故不能如自然惡氣治之入身而侵尅藏腑經絡差後猶宜更爲治以消其餘勢不尔而終爲患今有時輒發

外臺秘要治卒客忤停尸不能言細辛桂心等分備預百要方半錢內口中

又方燒桔梗二兩末米飲服備預百要方或酒服仍吞麝香如大豆許佳

廣利方治卒中客忤垂死麝香一錢重研和

醋二合服之即差

治卒得鬼擊方

鬼擊之病得之無漸卒者如人刀刺狀胃脇或腹內絞急切痛不可抑按或即吐面或鼻中出血或下血一名鬼排治之方升麻獨活牡桂分等末酒服方寸匕立愈

又方以粉一撮著水中攪飲之

又方斷白犬一頭取熱犬血一升飲之

又方刀鞘三寸燒末水飲之

又方燒鼠屎末服如黍米不能飲之以少水
 又和內喉中一服即效大血一服即愈
 又有諸丸散並在備急藥條中令巫實見人
 忽有被鬼神所擺拂者或犯其行伍或遇相
 觸突或身神散弱或愆負所貽輕者因而獲
 免重者多見死亡猶如燕簡輩事非為虛也
 必應死亦不可要自不得不救爾
 古今錄驗瘡妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿
 角屑擣散以水服方寸匕即言實也

治卒魘寐不寤方

卧忽不寐末竈下黄土管吹入鼻中末雄黃

又并桂吹鼻中並佳

又方取井底泥塗日畢令人

壽域神方塗眼鼻令寐人垂

又頭於井中呼其姓名即便起也

又方以盞湯飲之

經驗秘方灌之

多少約在意

又方以其人置地利力畫地從肩起男左女

右令周面以刀鋒刺病人鼻令人一分急

特勿動其人當鬼神語求哀乃問阿誰何

故來當自乞去乃以指滅向所畫地當肩頭數寸令得去不可不具詰問之也

又方以瓦甌壽域神方覆病人面上使人疾打

又破甌則寤方

又方以牛蹄或馬蹄臨壓人上亦可治卒死

又青牛尤佳壽域神方

又方菖蒲末吹兩鼻中又末內舌下壽域神方

又方以甌帶左索縛其肘後男左女右用餘

稍急絞之又以麻縛脚乃詰問其故約勅

解之令一人坐頭守一人於戶內呼病人

姓名坐人應曰諾在便蘇

人喜魘及惡夢者取火死灰著履中合枕壽域神方

又方帶雄黃男左女右

又方以虎頭枕尤佳

辟魘寐方真赤刻方一赤以枕之

又方魘鬼治卒魘寐久書此符於紙燒令黑

以少水和之內死人口中懸鑑死者耳前

訂之喚死者名不過半日即活

歷臥寐不寤者皆魂魄外遊為邪所執錄欲

還未得所忌火照火照遂不復入而有燈光

中魘者是木山則出但不反身中故耳

千金方治鬼魘不悟皂莢末刀圭起死人

治卒中五尸方

五尸者

飛尸遁尸風尸沉尸

其狀腹痛脹

急不得氣息上衝心胷旁攻兩脇或礪塊

涌起或攣引腰脊兼治之方破雞子白頓

吞之口閉者內喉中插頓令下立差

又方破鷄子白頓吞七枚不可再服

又方理當陸根熬以囊貯更番熨之冷復易

雖有五尸之名其例皆相似而有小異者飛

尸者遊走皮膚洞穿臟腑每發刺痛變作

無常也遁尸者附骨入肉攻擊血脉每發

不可得近見屍喪間哀哭便作也風尸者

淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風

雪便作也沉尸者纏結臟腑衝心脇每發

絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏癡每節氣改變輒致大惡此一條別有治後髮也凡五尸卽身中屍鬼接引也共爲病害經術甚有消滅之方而非世徒能用今復撰其經要以救其敝方雄黃一兩大蒜一兩合相和似彈丸許內二合熱酒中服之須臾差未差更作已又有疥者常畜此藥也又方乾薑桂分等末之鹽三指最蒸令青末

合水服之卽差

又方擣蒺藜子蜜丸服如胡豆二九日三

又方粳米二升水六升煮一沸服之

又方猪肪八合銅器煎小沸投苦酒八合相

和頓服卽差

又方掘地作小坎水滿中熟攪取汁服之

又方取屋上四角茅內銅器中以三赤布覆

腹著器布上燒茅令熱隨痛追逐躡下痒

卽差若瓦屋削取四角柱燒之亦得極大

神良者也

又方桂赤薑壹兩巴豆三枚合搗末苦酒

和如泥以傅尸處燥即差

又方烏白根剉一升煮令濃去滓煎汁凡五

升則入水一兩服五合至壹升良

又方忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服

如鷄子二枚日二三服佳也

又方燒亂髮熬杏仁等分搗膏和丸之酒服

桐子大三升日五六服

又方龍骨三分藜蘆二分巴豆壹分搗和并

花水服如麻子大如法用酒服之

又方漆葉暴乾搗末酒服之

又方鼈肝壹具孰煮切食之令盡亦用蒜薑

又方斷鼈頭燒末水服可分為三度當如肉

又者不盡後發更作

又方雄黃壹分梔子十五枚芍藥壹兩水三

升煮取壹升半分再服

又方梔子二十七枚燒末服

又方乾薑附子各壹兩桂二分巴豆三十枚
 去心並生用搗篩蜜和搗萬杵服二丸如
 又小豆大此藥無所不治
 又飛尸入腹刺痛死方凡犀角射罔五注凡
 並是好藥別在大方中治卒存物在皮內
 又如蝦蟇宿昔下入腹中如杯不動搖掣痛
 又不可堪過數日即煞人方巴豆十四枚龍
 膽壹兩半夏土苽子各壹兩桂壹斤半合
 又搗碎以兩布囊貯蒸熱更番以熨之亦可

又煮飲少少服之

此本在雜治中病名曰陰尸得者多死

尸注鬼注病者葛云即是五屍之中尸注又
 挾諸鬼邪為害也其病變動乃有出平天
 種至九十九種大略使人寒熱淋瀝恍惚
 默默不的知其所苦而無處不惡累年積
 月漸就頓滯以至於死死後復傳之旁人
 乃至滅門覺如此候者便宜急治之方取

桑樹白皮曝乾燒爲灰得二斗許著甌中
蒸令氣淡使下以釜中湯三四斗淋之又
淋凡三度極濃止澄清取二斗以漬赤小
豆二斗一宿出曝乾乾復漬灰汁盡止乃
濕蒸令熟以羊肉若鹿肉作羹進此豆飯
只初食一升至二升取飽滿微者中四斗愈
極者七八斗病去時體中自覺疼痒淫淫
或若根本不拔重爲之神驗也
又方桃人五十枚破研以水煮取四升一服

盡當吐吐病不盡三兩日更作若不吐非
注

又方杜蘅一兩莖一兩人參半兩許瓠子二
七枚松蘿六銖赤小豆二七枚擣末散平
旦溫服方寸匕晚當吐百種物若不盡後
更服之也

又方獺肝壹具陰乾擣末水服方寸匕日三
壹具未差更作姚云神良
又方朱砂雄黃各壹兩鬼臼茵草各半兩巴

豆四十枚去心皮蜈蚣兩枚搗蜜和丸服
如小豆不得下服二丸亦長將行之

姚氏燒髮灰熬杏仁紫色分等搗如脂猪脂
和酒服梧桐子大日三服差

又有葉他狸骨散竜牙散羊脂丸諸大藥等
並在大方中及成帝所受淮南丸並療疰
易滅門女子小兒多注車注舡心悶亂頭
痛吐有此疰者宜辟方車前子車下李根
皮石長生徐長卿各數兩分等麤搗作方

囊貯半合繫衣帶及頭若注舡下暴慘以
和此共帶之又臨入舡刻取此舡自燒作
屑以水服之

子母祕錄治尸注燒亂髮如雞子大爲末水
服之差

衛生寶鑑

八毒赤丸治鬼疰病入國信副使許可道到
雄州請予看脉予診之脉中乍大乍小乍短
乍長此乃氣血不勻邪氣傷正本官說在路

到鄆甘驛中夜夢一婦人著青衣不見面目
用手去脇下打了壹拳遂一點痛往來不止
兼之寒熱而不能食乃鬼擊也予曰可服八
毒赤丸本官言嘗讀名醫錄中見李子豫八
毒赤丸爲殺鬼杖子遂與藥叁粒臨卧服明
旦下清水二斗立效又進白海青陳慶玉第
三子因盡卧於水仙廟中夢得壹餅食之心
懷憂思心腹痞滿飲食減少約一載有餘漸
漸瘦弱腹脹如蠱屢易醫藥及師巫禱之皆

不效又不得安卧召予治之予診之問其病
始末因思之此疾既非外感風寒又非內傷
生冷將何據而醫予思李子豫八毒赤丸頗
有相當遂合與五七丸服之下清黃涎斗餘
漸漸氣調而以別藥理之數月良愈不二年
身體壯實如故故因錄之此藥可謂如神合
時宜齋戒沐浴淨室志心修合方

雄黃

礞石

拔粹方礞石

朱砂

附子

炮

藜蘆

牡丹皮

巴豆

各壹兩

蜈蚣

壹條

右八味為末煉蜜丸如小豆大每服五七

丸拔粹方冷水送下無時

經驗秘方

治深井塚毒五月七日深井塚有毒氣殺人

若已入過毒者以水噴其面并含水以雄

黃犀角麝香調服之

凡卒死或先病及寢卧間忽然而絕皆是中

惡救之有方絲浸好酒半盞手按令汁入

鼻中并捉手烟霞聖効方令勿驚又皂角

或生半夏末如大豆許吹兩鼻中聖効方

即更活矣

客忤中惡之類多於道路在外得之令人心

腹絞痛脹滿氣衝心胷不即治則殺人搯

二錢水三盞煎壹盞分二服得吐即愈

中惡客忤卒死鬼擊亦相類為治可通用之

燒羊屎令煙熏鼻亦妙

鬼擊之狀卒著如刀刺胃脇腹內絞急切痛

不可按摩或吐血下血衄血好酒壹盞灌

鼻中

又車脂壹錢酒調温服

又竈下黃土水調服妙

凡屬死皂角末如大豆許吹兩鼻中得嚏則

氣通三四日者猶可救

卒上氣鳴息便欲絕方擣韭絞汁飲壹盞立

愈

又露蜂房水煮服壹盞

又吳茱萸生姜各半兩切姜作片水五盞煮

三盞分作二服

又蓬莪茂酒研服之

尸厥奄然死去不省人事腹中氣走如雷鳴

生姜自然汁半盞和酒壹盞煎令百沸并

灌壹服急救仙方此下云仍灸丹田百會氣海穴

中鬼氣忽倒地四肢冷手握拳鼻口血出雄

黃爲末二錢急救仙方衛生易簡方一錢許煎桃葉湯

調下二本一作一又故汗衫衣觸衣久染汗者男

用女衣仙方此下云女用男衣燒灰沸湯調每服二

錢

仙方此下云觸衣即內觀衣也

治睡卧中不省者取韭汁滴鼻中冬月則取

韭根汁灌之

急救仙方同

治魘通附人凡山魘五通諸神鬼附著女人

者使斷不食牛肉鬼神即去已試三二人

皆驗

經驗良方

尸厥其證奄然死去四肢逆冷不省人事腹

中氣走如雷鳴用

焰硝

半兩 硫黃 壹兩

已上細研如粉分作三服每服用好舊酒

壹大盞煎覺焰起傾於盞內蓋著温灌與

服如人行五里人進壹服不過三服即醒

兼灸頭上百會穴四十九壯兼臍下氣海

丹田穴三百壯覺身體温暖即止如無前

藥用附子重七錢許炮熟去皮臍為末分

作二服每服用酒三盞煎至壹盞溫服

又無附子用生姜自然汁半盞酒壹盞煎

令百沸併灌二服仍依前法灸
鬼魘鬼打其證初到客舍或官驛及久無人
居冷房睡中覺鬼物魘打但聞其人吃吃作
聲使令人叫喚如叫不醒此乃鬼魘也須臾
不救則死

牛黃人雄黃各壹錢朱砂半錢

已上各研為細末和勻每挑壹錢許床下
燒次挑壹錢用酒調灌之如無前藥用
桃柳枝取東邊者各三七寸煎湯三盞候

又温併灌服又無桃柳枝川 竈心土槌

又碎為細末每服二錢新汲井花水調灌更

挑半指甲許吹入鼻中更用艾灸人中穴

人中穴在鼻下并灸兩脚大拇指內離甲

一蕪葉許各灸一七壯即活

醫林方

五絕魘死不得著燈照又不得近前急喚用

口咬手足人母指覺痛即活

悶絕不省人事救之活又死者往往後又死

令白沸併灌二服仍依前法灸
鬼魘鬼打其證初到客舍或官驛及久無人
居冷房睡中覺鬼物魘打但聞其人吃吃作
聲便令人叫喚如叫不醒此乃鬼魘也須臾
不救則死

牛黃人雄黃

各壹錢

朱砂

半錢

不飯三服即愈

已上各研為細末和勻每挑壹錢許床下
燒次挑壹錢用酒調灌之如無前藥用
桃柳枝取東邊者各三七寸煎湯三盞候

又溫併灌服

又無桃柳枝川

竈心土槌

又碎為細末每服二錢新汲井花水調灌更

挑半指甲許吹入鼻中更用艾灸人中穴

人中穴在鼻下并灸兩脚大拇指內離甲

一蕪葉許各灸一七壯即活

醫林方

五絕魘死不得著燈照又不得近前急喚用

口咬手足大母指覺痛即活

悶絕不省人事救之活又死者往往後又死

者可服蘇合香丸出本

煙霞聖効方

救卒死方

菽蔥根

二苳帶壹丁香拾四

右為末吹壹字鼻中男左女右須臾便活

吳氏集驗方

救魔睡強眠失氣以屋梁上塵吹入鼻中

又以雄黃抹鼻

又以定志圓加辰砂與服

救因悞擊著心頭悶絕者石蓮肉去桔梗

兩乳香壹錢

右為末以童子小便調下三錢刮開口用

之

山居四要

諸急證

比斃死者不得近前急喚但咬痛其脚跟及

睡其而不醒者移動些小臥處徐喚之元

有燈則存無燈切不可點燈及用皂角末

搐兩鼻

魘死兼治中惡自縊墻壁壓溺水產氣絕用

皂角末或半夏末如豆大衛生易簡方納

鼻中嚏則氣通可活備預百要方同易簡

吹鼻中但凡卒死

驚怖死者以溫酒灌之壽域神方同

中惡客忤卒死者灸臍中百壯以皂角末吹

鼻或研韭汁灌耳中

急救仙方

鬼魘鬼擊房中被鬼打作聲叫喚不省用桃

柳東生枝各三七寸煎湯三盞衛生易簡方二盞

候溫灌服

玉機微義 厥

內經論厥證所因

陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱

厥人質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不能

復精氣溢下邪氣因從之而上也氣因於中

由陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣

獨在故手足為之寒厥也陰氣衰於下則為
熱厥由醉飽入房內亡精氣中虛熱入腎氣
日衰陽盛陰虛故手足為之熱也陰氣盛於
上則下虛下虛則腹脹滿腹滿則下氣重而
邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則令人暴不知
人或至半日遠一日乃知人也名曰尸厥

按本論敘六經厥狀與六經厥逆甚詳宜
玩本文大抵六經之厥陽證至為拘仆為
癱疾為妄見陰證至為臍脹大小便不利

或嘔或心痛之類皆素多痰氣因虛所乘
之為病也惟有輕重之殊爾如成無己註
傷寒論云厥者手足冷也四逆者四肢不
溫也邪在三陽則手足必熱傳到三陰則
手足厥冷厥者逆也而有陰陽之殊熱極
而成厥逆者陽極陰也寒極而成厥逆者
獨陰無陽也
論卒厥脉法
脉經曰脉至如喘名曰氣厥氣厥者不知與

入言曰氣至而脈不至曰厥。氣不至而脈至曰盛。氣至而脈至曰平。氣不至而脈不至曰死。金匱方論曰寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入藏唇口青身冷即死如身和汗自出為入腑即愈此為卒厥並按腑者為傳道出內之所其氣通故入腑即愈也

論諸厥證寒熱不同。陳無擇曰經論粗分六經殊不出寒熱二證所因欲求備治當歷明之寒厥則因多慾而

奪其精故致陽衰陰盛熱厥則因醉飽入房精虛則熱入故致陰虛陽盛致其厥因多以不勝乘其所勝氣不得行遂致厥逆如腎移寒於脾則水乘於土水既不行乃成寒厥如心移熱於腎則火乘于水水既不行乃成熱厥六經皆然可次第論也尺厥亦然正由臟氣相刑或與外邪相忤則氣遏不行閉於經絡諸脈匿伏昏不知人唯當隨其藏氣而通之寒則熱熱則寒閉則通經中以數醉為熱

厥之因學者不可拘此蓋傷寒溫病皆有熱厥仲景所謂熱深厥深經意以酒能發百脈熱故舉此以爲例耳寒厥有初得之四肢冷脈沉微而不數多惡寒引衣自覆下利清穀外證多惺惺熱厥者初得之必發熱頭疼脈雖沉伏按之必數其人或畏熱喜冷揚手掉足煩躁不眠大小便秘赤外証多昏冒傷寒亦然厥者手足逆冷也謹按寒熱發厥固宜隨其陰陽勝負爲治

如其厥逆者不外乎傷寒寒熱二證求陰陽厥逆之淺深餘寒熱厥證是沉寒積熱發厥至若陰陽竭閉尸厥卒厥又非已上寒熱厥證之比也陳論雖稱關其曠何治例殊未少具爾和少年會錄而本節上論寒熱厥證宜吐下和少年會錄太平丸和少年會錄子和曰云云厥人至謹按厥證寒熱亦有陰陽虛實不同如形氣稍實者宜從子和之法吐下之虛甚者

惟宜隨其所因而調理之可也陳氏論臟
氣相刑或與外邪相忤氣遏不行閉經絡
下脈伏昏不知人至爲尸厥今世俗多作風
論治鮮不致斃如傳引華陀治虢太子尸厥
爲陽脈下墜陰脈上爭會氣閉而不通上
有絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之
色已發脈亂故形靜如死狀此與經言陰
陽之氣盛衰爲厥之旨甚微後人安能得
證治之彷彿乎而以陰陽證治之可驗者

只較之若傷寒手足厥逆昏不知人邪正已
三極溫下之間稍或遲緩禍不旋踵或津液
解暴衄不知人而厥或雜病得吐衄血而
厥不知人者十二日或五日必問期則爲
愈矣蓋陰氣尚實必身不熱熱則不厥厥
宜則爲血溫身熱主死矣暴氣厥而形實者
藉七情所致痰飲內鬱而厥必半日或一二
時必間形虛而氣逆甚者多致不救此又
可見氣血爲厥陰陽暴逆之甚也故不可

斷作風治
通關竅之劑

蘇合香丸治卒暴厥不知人未辨風痰氣厥宜與此膏化濃湯灌之惺後却議脉證用藥

吐劑

瓜蒂散方見咳嗽門日噤者或先用搐鼻藥

升發之劑

三因追魂湯治卒厥暴死及主客忤鬼擊飛尸氣絕不覺口噤

麻黃湯

方見傷寒門

右咬咀水煎嚙之不下者分病人髮左右

捉搦按肩引之令服取効千金方加桂

按此治感中邪氣之劑也

治寒之劑

四逆湯治寒厥表熱裏寒下利清穀食入則

吐脉沉伏手足冷方見傷寒門

按此治寒熱之劑並出寒暑例然內因氣血之劑詳見各門宜對證選用茲不詳錄

血治熱之劑各門官機筋脈川效不精難
白燒湯治熱厥腹滿身重難以轉側面垢譫
語遺溺手足厥冷自汗脈沉滑暑門
壽域神方

屍變部

治尸厥驀然死去四肢逆冷不省人事腹中
氣走如雷鳴命在頃刻急用附子壹枚重
七錢炮熟去皮臍為末分作二服每服用
酒三盞煎至壹盞溫服如無附子只用生

薑自然汁半盞和酒壹盞煎令百沸連灌
二服亦効

一方剪左額上髮方二寸燒末以酒調灌入
喉即愈

一方熨其兩脇下取鍋底墨如彈子大以漿
水調服須臾令三四人以管吹耳更開牙
吹之取梁上塵如豆許著小管吹入鼻孔
中即瘥

一方用生薑汁半盞和酒煎沸灌之仍灸丹

田百會氣海穴各二七壯衛生易簡方同

厲魅部

睡為鬼厲欲死者原無火勿以火照原有火不可去火又不可下牀呼其姓名若如此即死但痛咬其踵及足拇趾甲際以唾噴

其面即活備預百要方同

治卒厲寐書後符服之

鬼鬼鬼

蓋味此符蓋原令百將戲

此符用黃紙朱書燒灰滴水濃和內死人

口中掛鏡子於死者耳前打之喚死人名

不過半口即活

鬼厲不省者取竈心土少許為末吹入鼻中

以塩湯灌入口中即活

衛生易簡方

治卒中惡短氣不省人事欲死及療諸昏憾

用麻黃四錢甘草一錢桂心二錢杏仁八

十枚水七升煮取三升分三服不拘時立

效

治卒中惡心痛用桂心八分剉細水四升煮壹升分二服

治卒死心頭熱者用百草花曝乾水漬却埋百日砂鍋內連水熬稠凡如皂角子大放壹丸入患人口內須臾即活大妙

治一切瘧氣或近屍惡氣入腹久不愈用阿魏打如麻子大以麴裹作餛飩煮熟食之日三至五七日永除忌五辛濕麵生冷油

賦硬物

治被鬼擊用竈心土為末每服二錢新汲水調下及以少許吹鼻中

治恍惚見鬼發狂用平胃散加辰砂末棗湯調服

治屍癘如死脉動如故用竈突中黑煤土如彈子大一塊採水和飲之

又方用豆豉水煮汁服之
又方用官桂為末水調灌之

備預百要方

卒中惡心痛方桑上鵲巢土為末酒服已死

者內鼻孔

鬼擊及刀傷血滴滿腸中煩悶欲死方猪脂

如雞子大服効

中惡食治

大全本草

藥性論云除鬼氣炒艾作餛飩吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢

肘後方

食醫心鏡主傳尸鬼氣咳嗽痰癖注氣血氣

不通利漸羸瘦方桃人壹兩去皮尖杵碎

以水壹升半煮汁著米煮粥空心食之

中惡禁忌

巢氏病源食米甘穢變源或或又兩蠶也

諸注候

養生方云諸濕食不見影食之成卒注

養生道注候

養生方云背汗倚壁成遁注又雞肉合獺肉
養食之令人病成遁注

走注候

養生方云食米甘甜粥變成走注又兩脇也

中惡鍼灸

付鬼擊

尸厥

卒死

千金方

卒死

治卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也治之
方針間使各百餘息又灸鼻下人中一名
鬼客廳肘後方云又治尸厥

治中惡方灸胃管五十壯愈

治卒忤方此病即今人所謂中惡者與卒死

鬼擊亦相類為治皆參取而用之灸手十

指爪下各三壯餘治同上方備急方云治

卒死而張目反折者

又灸人中三壯又灸肩井百壯又灸間使七

壯又灸巨闕百壯

治鬼擊病方鬼擊之病得之無漸卒著人如

刀刺狀胃脇腹內絞急切痛不可抑按或

卽吐血或鼻口血出或下血一名鬼排灸
人中一壯立愈不瘥更灸漸漸平脊人取
又灸臍上壹寸七壯及兩踵白肉際取瘥又
灸臍下壹寸三壯
得效方

卒厥尸厥

治尸厥奄然死去四肢逆冷不省人事腹中
氣走如雷鳴生薑自然汁半盞酒壹觥煎
令百沸灌二服却用灸 灸法頭上百會

穴四十九壯兼臍下氣海丹田穴三百壯
覺身體溫煖卽止

肘後方

救卒中惡死方

救卒死或先病痛或常居寢卧奄忽而絕皆
是中惡救之方視其上唇裏絃絃者有白
如黍米大以針決去之
又方灸承漿穴十壯大效矣
又方以繩圍其死人肘腕男左女右舉伸繩

從背上大槌度以下又從此灸橫行各半
繩此法三灸各三即起

又方令爪其病人人中取醒不者捲其手灸
下文頭隨年

又方灸兩足大指爪甲聚毛中七壯此華他
法一云三七壯

又方灸臍中百壯也
救卒死尸蹙方

尸蹙之病卒死而脉猶動聽其耳中循循如

嘯聲而股間暖是也耳中雖然嘯聲而脉

容動者故當以尸蹙救之方灸鼻人中七壯

又灸陰囊下去下部壹寸百壯若婦人

又兩乳中間又云爪刺人中良久又針人中

至齒立起

此亦全是魏大夫傳中扁鵲法即趙太子之

患又張仲景云尸蹙脉動而無氣氣閉不

通故靜然而死也以繩圍其臂腕男女女

右繩從大椎上度下行脊上灸繩頭五十

壯活此是扁鵲秘法
 又方針百會當鼻中入髮際五寸針入三分
 補之針足大指甲下肉側去甲三分又針
 其足中指甲上各三分大指之內去端韭葉
 又針手少陰銳骨之端各壹分

又方灸臆中穴三寸八壯
 又救卒客忤死方
 客忤者中惡之類也多於道門門外得之
 人心腹絞痛脹滿氣衝心胃不即治亦殺

人救之方灸鼻人中三十壯令切鼻柱下
 也以水漬粳米取汁壹二升飲之口已噤
 者以物強發之

又方以繩橫度其人口以度其臍去四面各
 壹處灸各三壯令四火俱起差
 又方橫度口中折之令上頭著心下灸下頭
 五壯

華他卒中惡短氣欲死灸足兩母指上甲後
 聚毛中各十四壯即愈未差又灸十四壯

前救卒死方三七壯已有其法

中惡導引

巢氏病源

鬼邪候

養生方云上清真人訣日夜行常琢齒殺鬼邪又云仙經治百病之道叩齒三七過輒咽氣二七過如三百通乃止為之二十日邪氣悉去六十日小病愈百日大病除三蠱伏尸皆去面體光澤又無生經日治百

病邪鬼蠱毒當正偃卧閉目閉氣內視丹田以鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐之勿令有聲令人多出少以微為之故存視五臟各如其形色又存胃中令鮮明潔白如素為之倦極汗出乃止以粉粉身摩捋形體汗不出而倦者亦可止明日復為之

又當存作大雷電隆隆鬼鬼走入腹中為之不止病自除矣

又云封君達常乘青牛魯女生常乘駁牛孟
 子綽常乘駁馬尹公度常乘青驪時人莫
 知其名字為誰故曰欲得不死當問青牛
 道士欲得此色駁牛為上青牛次之駁馬
 又次之二已者順生之氣也故云青牛者
 乃栢木之精駁牛者古之神示之先駁馬
 者乃神龍之祖也云道士乘此以行于路
 百物之惡精疫氣之癘鬼長攝之焉
 卒魔候

養生方導引法云拘魂門制魄戶名曰握固
 法屈大母指著四小指內抱之積習不止
 眠時亦不復開令人不魘魅
 又云大魘勿然明喚之魘死不疑闇喚之唯
 好得遠喚亦不得近而急喚亦喜失魂魄
 養也

伏尸候

養生方導引法云叩齒二七過輒咽氣二七
 過如此三百通乃止為之二十日日邪氣

悉去六干日小病愈百日大病除伏尸皆
養去面體光澤云甲齒二少齒神即聚二寸

風注候

養生方導引法云兩手交拓兩膊頭面兩肘
頭仰上極勢身平頭仰同時取勢肘頭上
又下三七搖之去膊肘風注咽項急血脉不

通

冷注候

養生方導引法云一手長舒合掌一手捉頰

挽之向外一時極勢二七左右亦然手不
動兩向側勢急挽之二七去頸骨急強頭
風腦旋喉痺膈內冷注偏風

鷄腸草散 解毒藥散 葱白豉湯 甘
 草湯 桂心湯 杜仲湯 大麥奴湯
 人參湯 生麥□□ 大黃湯 栝萸根
 湯 苦消湯 人參湯 生麥門冬湯
 人參湯 大麥麩 葱白豉湯 生麥門
 冬湯 大黃黃湯 栝萸根湯 梔子
 豉湯 葱白豉湯 理中湯 人參湯
 檳榔湯 鴨通湯 解散 下散法
 千金翼方

三解散發動
 鴨通湯 治氣湯 解散 斬邵大黃圓
 消石大圓 千金丸 細辛圓 大青圓
 下藥法 洗瘡湯 解散
 千金月令
 解諸毒法
 海上仙方
 菓病
 聖惠方

研鍊錘乳及單服錘乳法

研鍊錘乳法 單服錘乳法 乳煎錘乳

法

錘乳酒方

錘乳酒 錘乳浸酒 錘乳酒

五石寒食散更生散及錘乳丸散諸

方

五石更生散 五石護命散 更生散

三石散 錘乳丸 錘乳丸 錘乳散

錘乳散 錘乳散

飛鍊石英及單服石英法

飛鍊研煮石英法 石英粉法 燒石英

法 銀罐煮白石英服水法

白石英和草藥服餌方

白石英丸 法者白石英水

牛乳中煮鍊石英及以石英飼牛取

乳服餌方

牛乳煮白石英 乳酒煮白石英 白石

英飼特牛下英

白石英和草藥浸酒方

白石英酒中

白下服乳石有五乖七急八不可三無疑

法

五乖

七急

八不可

三無疑

尖蘆乳石陰陽體性并草藥觸動形候論

并諸方

葱豉湯 甘草湯 大黃湯

治餌寒食五石諸雜石等發動解散

兼下石諸方

生麥門冬湯 薺萆湯 大鴨通湯 大黃

散 葱豉湯 人參湯 烏梅湯 露蜂

房散 酒豉 下石散

治乳石發動上衝頭面及身體壯熱

諸方

薺芫散 五加皮散 犀角散 射干散

餘甘子散 麥門冬散

治乳石發動頭痛寒熱諸方

葛根湯 葶藶散 知母散 麻黃湯

石膏散 麥門冬丸 前胡散

治乳石發動煩悶諸方

竹茹湯 麥門冬散 犀角散 蘆根湯

吳藍散 金石凌法

治乳石發動煩渴諸方

麥門冬散 柴胡散 黃連散 人參散

黃芪散 葛根煎 竹葉湯 滑石湯

治乳石發動口舌生瘡諸方

黃連散 升麻散 大青散 黃蘗散

漱口湯 浮萍草丸

治乳石發動吐血衄血諸方

地黃湯 刺薊湯

治乳石發動虛熱痰飲嘔逆諸方

前胡散 人參散 鴈肪湯 黃芩湯

白茅根湯 黃耆散

治乳石發動心膈痞滿腹痛諸方

枳實散 大黃湯 檳榔散 大腹皮散

訶梨勒散

治乳石發動心腹痛噤諸方

木香散 白朮散 茅香花散 前胡散

麥門治乳石發動身體浮腫諸方

漢防已散 吳藍散 枳殼散 紫雪散

赤茯苓散

治乳石發動生癰腫諸方

犀角散 升麻散 玄參散 黃耆散

連翹散 獨活散 大青散

治乳石發動身體生瘡諸方

飛麻散 犀角散 黃芩散 飛雪湯

麥門冬湯 牛蒡子丸

治乳石發動變下痢諸方

地榆散 犀角散 白朮散 黃耆散

類聚

九

木香散

治乳石發動小便淋瀝諸方

犀角散

澤瀉散 麥門冬散 地黄散

滑石散

升麻散

治乳石發動大小腸壅滯不通諸方

大腹皮散

枳實散 羚羊角散 犀角

散

檳榔散 葵子散 三黃丸

服乳石後飲食所宜法

生薑汁酒

鮮膾法

紫餠託法

麵餅

法

解俚人藥毒諸方

解毒門三

聖惠方二

解諸藥毒諸方

解毒丸

解金石毒諸方

治服藥過度諸方

治諸飲食中毒諸方

治食六畜肉中毒諸方

治食牛肉中毒諸方

治食馬肉中毒諸方

治食猪肉中毒方

治食狗肉中毒方

治食鴨肉成病方

治食六畜百獸肝中毒諸方

治食漏脯中毒諸方

治食射罔肉中毒方

治食鸞肉中毒諸方

治食諸肉中毒諸方

治食諸魚中毒諸方

治食魚鱠中毒諸方

治食蟹中毒諸方

治食諸菜筍菌中毒諸方

大和本草

是齋醫方

解毒萬應膏

神仙解毒萬病圓解毒散

瑣碎錄內中諸毒方

大治藥毒內中諸毒方

治毒食葉草菌中諸毒方

直指方內中諸毒方

獨勝散食魚鱸中諸毒方

朱氏集驗方中諸毒方

中毒評內中諸毒方

禁灰散雄黃散 凍青飲

管見大全良方

解諸毒方

得效方

中毒

解毒圓 保靈丹 萬病解毒圓 青黛

雄黃散 藍飲子

肘後方

治卒服藥過劑煩悶方

治卒中諸藥毒救解

如聖散

治食中諸毒方

澹軒方

食蟹柿反惡

諸藥毒

服丹藥毒

砒毒

食鳩子毒

仙茅毒

巴豆毒

烏附毒

草烏毒

河豚毒

簞毒

聖濟總錄

乳石將適失度

乳石發動寒熱

麥門冬丸

犀角丸

前胡湯

華佗芍

藥湯

乳石發渴

生地黄湯 黃耆湯 葛根煎 葱白飲

竹葉湯 人參湯 茯苓湯 枳實湯

桃人粥丸 黃連丸

乳石發動上衝頭面及身體壯熱

黃耆湯 黃芩湯 升麻湯 麥奴湯

茵陳蒿湯 除熱蜂房湯 朴消丸 冷

石湯 麻黃湯 防風湯

乳石發動吐血衄血

麥門冬湯 連翹飲 小薊湯 吹鼻散

麥門冬飲 生地黄湯 生地黄飲

乳石發目昏赤痛

大黃湯 瀉肝前胡湯 黃芩湯 黃連

飲 小便洗方 棗肉黃連點 丁香黃

連點 青鹽點 雄黃散 豬肉貼

乳石發癰疽發背瘡腫

五香連翹湯 麥門冬湯 犀角湯 黃

耆湯 人參湯 五味子湯 增損當歸

湯 漏蘆湯 大黃湯 犀角丸 黃耆

丸 麻人丸 生地黃煎 無名異膏

甜菜膏 必效膏 神效膏 蛇皮塗貼

龍葵散

乳石發身體生瘡

黃連湯 大黃湯 升麻湯 麥門冬湯

知母芒消湯 麥門冬湯 香豉飲 甘

草湯 葱白湯

解毒門 四

聖濟總錄 二

人參乳石發日舌瘡爛 葱白煎

梔子仁湯 香豉湯 前胡湯 漱黃芩

湯 鈇霜散 黃藥湯 龍腦散 升麻

湯 升麻散 浮萍丸

乳石發身體腫

升麻湯 茯苓湯 生麥門冬湯 芍藥

湯 木通湯 紫蘇子丸 赤茯苓散

消石湯 並石鷺子淋洗方

天門冬煎 乳石發七氣喘嗽 麥門冬湯

紫苑湯 麥門冬湯 貝母湯 葶藶丸

天門冬煎 乳石發

乳石發嘔逆 藥散 諸細症 水煎

茯苓湯 鴈肪湯 三黃湯 栝樓根湯

人參湯 半夏湯 人參湯 薤白飲

枳殼湯

治石發霍亂轉筋

香薷湯 木瓜湯 糯米飲 高良薑湯

棠梨木瓜湯 桑葉飲 高良薑飲 木

瓜飲

乳石發痞結羸瘦

黃耆湯 當歸湯 半夏湯 枳實湯

大腹湯 桔梗湯 桑木湯 黃連湯

治乳石發心腹脹滿 人參湯 香薷丸

導氣丸 石膏湯 黃芩湯 大黃湯

萎蕤湯 香鼓湯 甘草湯 桔梗湯

葱豉酒

乳石發下利

地榆湯 黃連湯 梔子人湯 香豉飲

黃連湯 黃蘗湯 梁米湯 黃連湯

梔子湯

乳石發淋瀝

滑石散 桑白皮飲 滑石木通湯 大

黃湯 螺蛳湯 車前湯 雞蘇湯 茅

根湯 葵子湯

乳石發大小便不通

升麻湯 前胡湯 茯苓飲 芒消湯

赤茯苓散 大麻人飲 枳實湯

服乳石備飲食常法

紫麵食 水模餅 食麵餅

乳石發諸藥不治者

萎蕤酒 豆豉酒 胡豆汁 大麥麩

胡荽飲 麥門冬丸

醫方大成

雜類

經驗良方

神仙解毒圍門方

煙霞聖效方

吳氏集驗方

解毒小對症

黃白散 百足散 生薑散 桔梗湯

犀角飲 水銀散 伐陰湯

山居四要

解飲食毒

急救仙方

神仙解毒丸

壽域神方

藥毒部

中食毒部

金石毒部

衛生易簡方

中諸毒物

備預百要方

食毒方

百藥毒方

餘藥無名者散見本方

金口毒

中風毒

藥毒

毒

毒

毒

解毒門

巢氏病源 解散病諸候

寒食散發候

夫散脉或洪實或斷絕不足欲似死脉或細數或弦駛坐所犯非一故也脉無常投醫不能識熱多則弦駛有癖則洪實急痛則斷絕凡寒食藥率如是無苦非死候也動從節度不從節度則死矣欲服散宜診脉候審正其候爾乃畢愈脉沉數者難發難發當數下之

脈浮大者易發也人有服散兩三劑不發者此人脈沉難發發不令人覺藥勢行已藥但於內發不出形於外欲候知其得力人進食多是一候氣下顏色和悅是二候頭面身癢瘡是三候策策惡風是四候厭厭欲寐是五候也諸有此證候者皆藥內發五藏不形出於外但如方法服散勿疑但數下之則內虛自當發也諸方互有不同皇甫唯欲將冷廩丘公欲得暖將之意其多有情致也世人未

能知其深趣故鮮能用之然其方法猶多不盡但論服藥之始將息之度不言發動之後治解之宜多有闕略江左有道弘道人深識法體凡所救療妙驗若神製解散對治方云鍾乳對朮又對栝萋其治主肺上通頭胃木動鍾乳胃塞短氣鍾乳動木頭痛目疼又鍾乳雖不對海蛤海蛤動則目痛短氣有時木動鍾乳直頭痛胃寒然鍾乳與朮所可為患不過此也雖所患不同其治亦一矣發動之

始要其有始由覺體中有異與上患相應便
速服葱白豉湯又云硫黃對防風又對細辛
其治主脾腎通腰脚防風動硫黃煩疼腰痛
或瞋忿無常或下利不禁防風細辛能動硫
黃硫黃不能動彼始覺發便服杜仲湯白石
英對附子其治主胃通至脾腎附子動白石
英煩滿腹脹白石英動附子則嘔逆不得食
或口禁不開或言語難手脚疼痛覺發服生
麥門冬湯紫石英對人參其治主心肝通至

腎脚人參動紫石英心急而痛或驚悸不得
眠卧或恍惚忘誤失性狂發或黯黯欲眠或
憤憤喜瞋或痿或劇乍寒乍熱或耳聾目暗
又防風雖不對紫石而能動紫石紫石由防
風而動人參人參動亦心痛煩熱頭項強始
覺便宜服麻黃湯赤石脂對桔梗其治主心
通至胃背桔梗動赤石心痛口噤手足逆冷
心中煩悶赤石不動桔梗頭痛目赤身體壯熱
始覺發卽溫酒飲之隨能數杯酒勢行則解

亦可服大麥麩良復若不解復服米對鍾乳
木發則頭痛目赤或舉身壯熱解與鍾乳同
附子對白石英亦對赤石脂附子發則嘔逆
手脚疼體強骨節痛或項強面目滿腫飲酒
食麩自愈若不愈與白石英同解人參對紫
石英人參發則煩熱頭項強解與紫石英同
桔梗對赤石脂又對茯苓又對牡蠣桔梗發
則頭痛目赤身體壯熱解與赤石脂同乾姜無
所偏對

有說者云藥性草木則速發而易歇土石則
遲發而難歇也夫服藥草石俱下於喉其勢
厲盛衰皆有先後其始得效皆是草木先感
耳土石方引日月也草木少時便歇石勢猶
自未成其疾者不解消息便謂頓休續後更
服或謂病痼藥微倍更增石或更雜服衆石
非一也石之爲性其精華之氣則合五行乃
益五藏其滓穢便同灰土也夫病家氣血虛
少不能宣通雜石之性卒相和合更相塵瘀

備成牢積其病身不知是石不和精華不發不能致熱消疾便謂是冷盛牢劇服之無已不知石之爲體體冷性熱其精華氣性不發其冷如冰而疾者其石入腹卽熱既不卽熱服之彌多是以患冷癖之人不敢寒食而大服石石數彌多其冷癖尤劇皆石性不發而積也亦有雜餌諸石凡酒單服異石初不息唯以大散爲數而已有此諸害其證甚多小品方云道弘道人製解散對治方說草石相

對之和有的能發動爲證世人逐易不逆思尋古今方說至於動散臨急便就服之既不救疾便成委禍大散由來是難將之藥夫以大散難將而未經服者乃前有慎耳旣心期得益苟就服之已服之人便應研習救解之宜異口動之使得自救也夫身有石之藥而門內無解救之人輕信對治新方逐易服之從非棄是不當枉命誤藥邪檢神農本草經說草石性味無對治之和無指的發動之

說按其對治之和亦依本草之說耳且大散方說其患注藥物不說其所主治亦不說對和指的發動之性也覽皇甫士安撰解散說及將服消息節度亦無對和的發之說也復有虞丘家將溫法以收變敗之色亦無對和的動之說若以藥性相對為神者枯蕒煎乾真此是對之大害者道弘說對治而不辨此道弘之方焉可從乎今不從也當從皇甫節度自更改枯蕒便為良矣患熱則不服其滋

惟患冷者服之耳自可以除枯蕒若虛勞脚弱者以石斛十分代枯蕒二法極良若雜患常當以紫苑十分代枯蕒二法極良若雜患常疾者止除枯蕒而已慎勿加餘物皇甫云然寒食藥者世莫知焉或言華佗或曰仲景考之於實佗之精微方類單省而仲景經有侯氏黑散紫石英方皆數種相出入節度略同然則寒食草石二方出自仲景非佗也且佗之為治或剝斷腸胃滌洗五臟不純任方也

仲景雖精不及於能悉於審方物之候論草石之宜亦妙絕衆醫及寒食之瘵者御之至難將之甚苦近世尙書何晏耽聲好色始服此藥心加開朗體力轉強京師翕然傳以相授歷歲之困皆不終朝而愈衆人喜於近利未初後患晏死之後服者彌繁于時不輟余亦豫焉或暴發不常夭害年命是以族弟長互舌縮入喉東海王良夫癰瘡陷背隴西辛長緒脊肉爛漬蜀郡趙公烈中表六喪悉寒

食散之所爲也遠者數十歲近者五六歲余雖視息猶溺人之笑耳而世人之患病者出不能以斯爲戒失節之人多來問余乃喟然嘆曰今之醫官精方不及華佗審治莫如仲景而競服至難之藥以招甚苦之患其天死者焉可勝計哉咸寧四年平陽太守劉泰亦沉斯病使使問余救解之宜先時有姜子者以藥困絕余實生之是以聞焉然身自荷毒雖才士不能書辨者不能說也苟思所不逮

暴至不旋踵散以教人乎辭不獲已乃退而
惟之求諸本草考以素問尋故事之所更參
氣物之相使并列四方之本注釋其下集而
與之匪曰我能也蓋三折臂者爲醫非生而
知之試驗亦其次也服寒食散二兩爲劑分
作三貼清旦溫醇酒服壹貼移日壹丈復服
壹貼移日二丈復服壹貼如此三貼盡須更
以寒水洗手足藥氣兩行者當小痺便因脫
衣以冷水極浴藥勢益行周體涼了心意開

朗所患卽瘥雖羸困著床皆不終日而愈人
有強弱有耐藥若人羸弱者可先小食乃服
若人強者不須食也有至三劑藥不行者病
人有宿癖者不可便服也當先服消石大丸
下去乃可服之服藥之後宜煩勞若羸著床
不能行者扶起行之常當寒衣寒飲寒食寒
卧極寒益善若藥未散者不可浴浴之則矜
寒使藥噤不發令人戰掉當更溫酒飲食起
跳踴春磨出力令溫乃浴解則止勿過多也

又當數冷食無晝夜也一日可六七食若失食初亦令人寒但食則溫矣若老小不耐藥者可減二兩強者過二兩少小氣盛及產婦臥不起頭不去巾帽厚衣對火者服散之後便去衣巾將冷如法勿疑也虛人亦治又與此藥相宜實人勿服也藥雖良令人氣力兼倍然甚難將息適大要在能善消息節度專心候察不可失意常絕人事唯病著牀虛所不能言厭病者精意能盡藥意者乃可服耳

小病不能自勞者必廢失節度慎勿服也若大傷寒者下後乃服之便極飲冷水若產婦中風寒身體強痛不得動搖者便溫服一劑因以寒水浴卽瘥以浴後身有痺處者便以寒水洗使周遍初得小冷當數食飲酒於意後憤憤不了快者當復冷水浴甚者水略不去體也若藥偏在壹處偏痛偏冷偏熱痺及眩煩腹滿者便以水逐洗於水下卽了矣如此晝夜洗藥力盡乃止凡服此藥不令人

吐下也病皆愈若鬲上大滿欲吐者便舖食
卽安矣服藥之後大便當變於常故小青黑
色是藥染耳勿恠之也若亦溫溫欲吐當遂
吐之不令極也明且當更服若浴晚者藥勢
必不行則不堪冷浴不可強也當如法更服
之凡洗太早則藥禁寒太晚則吐亂不可失
過也寒則出力洗吐則速冷食若不飢爲寒
者食自溫常當將冷不可熱灸之也若溫衣
溫食溫臥則吐逆顛覆矣但冷飲食冷浴則

瘥矣凡服藥者服食皆冷唯酒冷熱自從或
壹日而解或二十餘日解常飲酒令體中醺
醺不絕當飲醇酒勿飲薄白酒也體內重令
人變亂若不發者要當先下乃服之也寒食
藥得節度者一月轉解或二十日解堪溫不
堪寒卽以解之候也其失節度者頭痛欲裂
坐服藥食溫作癖急宜下之或兩目欲脫坐
犯熱在肝速下之將冷自止或腰痛欲弊坐
衣厚體溫以冷洗浴冷石熨也或眩冒欲蹶

坐衣裳犯澗宜斷頭冷洗之或腰疼欲折坐
久坐下溫宜常令牀上冷水洗也或腹脹欲
決甚者斷衣帶坐寢處久下熱又得溫失食
失洗不起行但冷食冷洗當風立或心痛如
刺坐當食而不食當洗而不洗寒熱相結氣
不通結在中心口不得息當校口但與熱酒
任本性多少其令酒氣兩得行氣自通得噫
因以冷水澆淹手巾著所苦處溫復易之自
解解便速冷食能多益善於諸痛之內心痛

最急救之若赴湯火乃可濟耳或有氣斷絕
不知人時蹶口不得開病者不自知當須傍
人救之要以熱酒爲性命之本不得下者當
斷齒以酒灌咽中咽中穴逆酒入腹還出者
但與勿止也出復內之如此或半日酒下氣
蘇酒不下者便殺人也或下利如寒中坐行
止食飲飲犯熱所致人多疑冷病人又滯癱
皆犯熱所爲慎勿疑也速脫衣冷食飲冷洗
也或百節痠疼坐卧太厚又入溫被中衣溫

不脫衣故也臥下當極薄單布不著繻也當薄且垢故勿著新衣多著故也雖冬寒常常被頭受風以冷石熨衣帶不得繫也若犯此疲悶者但入冷水浴勿忍病而畏浴也或於戰患寒如傷寒或發熱如瘧坐食忍飢洗冷不行便坐食臭故也急冷洗起行或惡食如臭物坐溫衣作癖也常急下之若不下萬救終不瘳也或咽中痛鼻塞清涕出坐溫衣近火故也但脫衣冷水洗當風以冷石熨咽類

五六偏自瘥或胃脅氣逆乾嘔坐飢而不食藥氣熏隔故也但冷食冷飲冷洗卽瘥或食下便出不得安坐有癖但下之或淋不得小便久坐溫及騎馬鞍熱入膀胱也冷食以冷水洗小腹以冷石熨一日卽止或大行難腹中牢固如蛇盤坐犯溫久積腹中乾糞不去故也消酥若膏便寒服壹二升浸潤則下不下更服卽瘥或寒慄頭掉不自支任坐食少藥氣行於肌膚五藏失守百脉搖動與氣爭

類身頁上
百三
競故也努力強飲熱酒以和其脉強冷令冷
飲以定其藏強起行以調其關節酒行食充
關機以調則洗了矣云了者是瑟然病除神
明了然之狀也或關節強直不可屈伸坐久
停息不息煩勞藥氣停止絡結不敢越沉滯
於血中故也佳力自溫便冷洗卽瘥云在力
自溫者令行動出力從勞則發溫也非厚衣
近火之溫也或小便稠數坐熱食及噉諸含
熱物餅黍之屬故也以冷水洗少腹服梔子

湯卽瘥或失氣不可禁坐犯溫不時洗故也
冷洗自寒卽止或遺糞不自覺坐久坐下溫
熱氣上入胃少腹不禁故也冷洗卽瘥或目
痛如刺坐熱熱氣衝肝上奔兩眼故也勤冷
食清且溫小便洗不過三卽瘥或耳鳴如風
聲汗出坐自勞出力過矣房室不節氣逆奔
耳故也勤好飲食稍稍行步數食節情卽止
或口傷舌強爛燥不得食少穀氣不足藥在
胃腕中故也急作梔子豉湯或手足偏痛諸

節解身體發癩瘡鞞結坐寢處久不自移從
暴熱偏併聚在背處或鞞結核疔此者發如
癩覺便以冷水洗冷石熨微背食頃散也劇
者數日水不絕乃差洗之無限要瘥爲期若
大不瘥卽取磨刀石火燒令熱赤以石投苦
酒中石入苦酒皆破裂因搗以汁和塗癩上
三卽瘥取糞中大蟻蟪搗令熟以塗癩上亦
不渴三再卽瘥尤良或飲酒不解食不復下
乍寒乍熱不洗便熱洗復寒甚者數十日輕

者數日晝夜不得寐愁憂恚怒自驚跳悸恐
恍惚忘誤者坐犯溫積久寢處失節食熱作
癩內實使熱與藥并行寒熱交爭雖以法救
之終不可解也吾嘗如此對食垂涕援刀欲
自刺未及得施賴家親見迫奪故事不行退
而自佳乃強食冷飲水遂止禍不成若絲髮
矣凡有寒食散藥者雖素聰明發背頑鬪告
捨難愈也以此死者不可勝計急飲三黃湯
下之當吾之困也舉家知親皆以見分刺賴

亡兄士元披方得三黃湯方合使吾服火下
卽瘥自此常以救急也或脫衣使寒著衣便
熱坐脫著之間無適故小寒自可著小溫使
脫卽洗之卽慧矣慎勿忍使病發也洗可得
了然瘥忍之則病成矣或齒腫唇爛齒牙搖
痛頰車噤坐犯熱不時救故也當風張口使
冷氣入咽漱寒水卽瘥或周體患腫不能自
轉徙坐久停息久不飲酒藥氣沉在皮膚之
內血脈不通故也飲酒冷洗自勞行卽瘥極

不能行使入扶或車行之事寧違意勿聽從
之使支節柔調乃止勿令過差過則使極更
爲失度執者復洗也或患冷食不可下坐久
冷食食口中不知味故也可作白酒麋盃著
酥熱食一兩頓悶者冷飲還冷食或陰囊臭
爛坐席厚下熱故也坐冷水中卽瘥或腳趾
間生瘡坐著履溫故也脫履著履以冷水洗
足卽愈或兩腋下爛作瘡坐臂脇相親也以
物懸手離脇冷熨之卽瘥或嗜寐不能自覺

久坐熱悶故也急起洗浴飲冷自精了或有
癖也當候所宜下之或夜不得眠坐食少熱
在內故也常服梔子湯數進冷食或咳逆咽
中傷清而出坐卧溫故也或食溫故也飲冷
水冷熨咽外也或得傷寒或得溫瘧坐犯熱
所爲也凡常服寒食散雖以久解而更病者
要先以寒食救之終不中冷也若得傷寒及
溫瘧者卒可以常藥治之無咎也但不當飲
熱藥耳傷寒藥皆除熱瘧藥皆除癖不與寒

食相妨故可服也或藥發輒并臥不以語人
坐熱氣盛食少穀不充邪干正性故也飲熱
酒冷食自勞便律或寒熱累月張口大呼眼
視高精候不與人相當日用水百餘石澆不
解者坐不能自勞又飲冷酒復食溫食譬如
喝人心下更寒以冷救之愈劇者氣結成冰
得熱熨飲則冰銷氣通喝人乃解令藥熱聚
心乃更寒戰亦如喝人之類也速與熱酒寒
解氣通酒兩行於四肢周體悉溫然後以冷

水三斗洗之慄然了了矣河東裴季彥服藥失度而處三公之尊人不敢強所欲已錯之後其不能自知左右人不解救之救之法但飲冷水以水洗之用水數百石寒遂甚命絕於水中良可痛也夫以十石焦炭二百石水沃之則炭滅矣藥熱雖甚未如十石之火也沃之不已寒足殺人何怨於藥乎不可不曉此意世人失救者例多如此欲服此藥者不唯已自知也家人皆宜習之使熟解其法乃

可用相救也吾每壹發氣絕不知人雖復自知有方力不復施也如此之弊歲有八九幸家人大小以法救之猶時有小違錯兒都不知者哉或大便稠數坐久失節度將死候也如此難治矣爲可與湯下之儻十得一生耳不與湯必死莫畏不與也下已致死令不恨也或人困已而脉不絕坐藥氣盛行於百脉人之真氣已盡唯有藥氣尙自獨行故不絕非生氣也或死之後體故溫如入肌腹中雷

鳴顏色不變壹兩日乃似死人耳或灸之尋死或不死坐藥氣有輕重故有死生雖灸得生非已疾之法終當作禍宜慎之大有此故也或服藥心中亂坐服溫藥與疾爭結故也法當大吐下若不吐下當死若不吐死者冷飲自了然瘥或偏臂脚急痛生久籍持則溫不自轉移熱氣入肌附骨故也勤以布冷水淹搗之溫復易之或肌皮鞭如木石枯不可得屈伸坐食熱卧溫作癖久不下五藏隔

閉血脉不周通故也但下之冷食飲酒自勞行卽瘥或四支面目皆浮腫坐食飲溫又不自勞藥與正氣停并故也飲熱酒冷食自勞冷洗之則瘥或瞑無所見坐飲食居處溫故也脫衣自洗但冷飲食須更自明了或鼻中作膿雞子臭坐著衣溫故也脫衣冷洗卽瘥或身皮楚痛轉移不在處處如風坐犯熱所爲非得風也冷洗熨之卽瘥或脚疼欲折出久坐下溫宜坐單牀上以冷水洗卽愈或苦

頭眩目疼不用食山食及犯熱心隔有滯故
也可下之或臂脚偏急苦痛者由久坐臥廣
溫下熱不自移轉氣入肺胃脾骨故也勤以
手巾淹冷水迫之溫則易之如此不過兩日
卽瘥凡治寒食藥者雖治得瘥師終不可以
治爲恩非得治人後忘得效也皆如文摯治
齊王病先使王怒而後病已文摯以是雖愈
王病而終爲王所殺今救寒食者要當逆常
理反正性成犯怒之自非達者得瘥之後心

念犯怒之怨不必得治之恩猶齊王殺文摯
也后與太子不能救况於凡人哉然死生大
事也如知可生而不救之非仁者也唯仁者
心不已必冒犯怒而治之爲親戚之故不但
其人而已凡此諸救皆吾所親也試之不
借問於他人也要當違人理反常性重衣更
寒一反也飢則生臭二反也極則自勞三反
也溫則滯利四反也飲食欲寒五反也癰瘡
水洗六反也當洗勿失時一急也當食勿忍

飢二急也酒必淳清令温三急也衣温便脫
 四急也食必極冷五急也卧必衣薄六急也
 食不厭多七急也冬寒欲火一不可也飲食
 欲熱二不可也常疹自疑三不可也畏避風
 涼四不可也極不能行五不可也飲食畏多
 六不可也居貧厚席七不可也所欲從意八
 不可也務違常理九無疑也委心棄本一無
 疑也寢處必寒三無疑也

念此解散痰癖候

服散而飲過度將適失宜衣厚食温則飲結
 成痰癖其狀痰多則胃隔舌滿頭眩痛癖結
 則心脇結急是也

解散除熱候

夫服散之人覺熱則洗覺飢則食若洗食不
 時失其節度令石勢壅結否塞不解而生熱
 故須以藥除之

解散浮腫候

服散而浮腫者由食飲温而久不白勞藥勢

與血氣相并使氣壅在肌膚不得宣散故令
浮腫或外有風濕內有停水皆與散勢相搏
致令煩熱而氣壅滯亦令浮腫若食飲溫不
自勞而腫者但煩熱虛腫而已其風濕停水
而已者則心腫而煩熱或小便澀而腫

解散濕候

夫服石之人石勢歸於腎而勢衝府藏府藏
既熱津液渴燥腎惡燥故渴而引飲也

解散上氣候

服散將適失所取溫太過熱搏榮衛而氣逆
上其狀胃滿短氣是也

解散心腹痛心澀候

鬲間有寒胃腕有熱寒熱相搏氣逆攻腹乘
心故心腹痛其寒氣盛勝於熱氣榮衛秘澀
不通寒氣內結於心故心腹痛而心澀寒也
其狀心腹痛而戰澀不能言語是也

解散大便秘難候

將適失宜犯溫過度散勢不宜熱氣積在腸

胃故大便秘難也
解散虛冷小便多候

將適失度熱在上焦下焦虛冷冷氣乘於胞
故胞冷不能制於小便則小便多

解散大便血脈

將適失度或取熱或傷冷觸動於石冷熱交
擊俱乘於血致動血氣血滲入於大腸腸虛
則泄故大便血

解散卒下利候

行非違節飲食失度犯觸解散而腸胃虛弱
故卒然下利也

下寒解散下利後諸病候

服散而飲食失度居處違節或霍亂或傷寒

或服藥而下利利雖斷而血氣不調石勢因

動致生諸病其狀或手足煩熱或口噤或嘔

逆之類是也隨其病證而解之

解散大小便難候

積服散散勢盛在內熱氣乘於大小腸大小

腸否澀故大小便難也乘氣大小便大小

解散小便不通候

夫服散石者石勢歸於腎而內生熱熱結小

腸胞內否澀故小便不通以熱熾口熱大便

澀則解散熱淋候澀澀而血虛不歸不澀因

夫服散石石勢歸於腎若腎氣宿虛者今因

石熱而又將適失度虛熱相搏熱乘於腎腎

主水水行小腸入胞為小便腎虛則小便數

熱結則小便澀澀則羣內痛故淋瀝不快也

解散發黃候

飲酒內熱因服石石勢又熱熱搏脾胃脾胃

主土其色黃而候於肌肉積熱蘊結蒸於於

肌膚故成黃也

解散脚熱腰痛候

腎主腰脚服石熱歸於腎若將適失度發動

石熱氣乘腰脚石與血氣相擊故脚熱腰痛

也其狀脚煩熱而腰攣痛

解散鼻塞候

石發則將冷其熱盡之候冷氣不退者冷乘於肺肺主氣開竅於鼻其冷滯結不宣通故鼻塞
將適失宜外有風邪內有積熱熱乘於血而氣壅滯故使生瘡

解散癰腫候

六府不和而成癰夫解散之人若將適失宜散動熱氣內乘六府六府血氣行於經脉經

脉為熱所搏而外有風邪乘之則石熱癰結血氣否澀而成癰腫

解散煩悶候

將適失宜冷熱相搏石勢不宜化熱氣乘於藏故令煩悶也

解散嘔逆候

將適失宜脾胃虛弱者石勢結滯乘於脾胃致令脾胃氣不和不勝於穀故氣逆而嘔調之即愈

之散目無所見目疼候

將適失宜飲食乖度蓄內生痰其痰熱之氣熏肝肝候目故目無所見而疼痛

解散心腹脹滿候

居處犯溫致令石勢不宜內壅府藏與氣相搏故心腹脹滿

解散挾風勞候

本患風勞而服散石風勞未盡石勢固發解石之後體尚虛羸故猶挾風勞也

解散飲酒發熱候

服散而積飲酒石因酒勢而盛敷散經絡故煩而發熱也

食鱖魚中毒候

此魚肝及腹內子有大毒不可食食之往往致死

食諸蟲中毒候

野菜芹苳之類多有毒蟲水蛭附之人誤食之俾中其毒亦能悶亂煩躁不安

食鱸魚肝中毒候

此魚肝有毒人食之中其毒者即面皮剝落

雖爾不至於死

疔

此魚肝大熱內子食人積不可食食之并

介鱸魚中毒類

醫方類聚卷之一百六十一

如...