

註解傷寒論卷第四

漢張仲景著

宋成無已註

晉王叔和撰次

明汪通值校正

辨太陽脉證并治下第七

問曰病有結胃有藏結其狀何如荅曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胃也何謂藏結荅曰如結胃狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治

結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相



結者爲結胃以陽受氣於胃中故爾與陰  
相結者爲藏結以陰受之則入五藏故爾氣宜  
通而塞故痛邪結陽分則陰氣不得上通邪結  
陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞭痛寸  
脉浮關脉沉知邪結在陽也寸脉浮關脉小細  
沉緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結  
痛飲食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時時自  
下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治舌上  
白胎滑者邪氣結胃中亦寒故云難治  
藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者

不可攻也

藏結於法當下無陽證爲表無熱不往來寒熱  
爲半表半裏無熱其人反靜爲裏無熱經曰舌  
上如胎者以丹田有熱胃中有寒以表裏皆寒  
故不可攻

病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而  
反下之因作痞所以成結胃者以下之太早故也  
發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽邪  
入裏結於胃中爲結胃無熱惡寒者發於陰也  
而反下之表中陰邪入裏結於心下爲痞

結胃者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胃丸方

結胃病項強者為邪結胃中胃膈結滿心下緊實但能仰而不能俛是項強亦如柔痙之狀也與大陷胃丸下結泄滿

大陷胃丸方

大黃半斤

葶藶半斤

芒硝半斤

杏仁半升

大黃芒硝之苦鹹所以下熱葶藶杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以

下泄滿實物也

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末壹錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法

結胃證其脉浮大者不可下下之則死

結胃為邪結胃中屬上焦之分得寸脉浮關脉沉者為在裏則可下若脉浮大心下雖結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難可制故云下之則死

六傷寒論卷之四  
結胃證悉具煩燥者亦死

結胃證悉具邪結已深也煩燥者正氣散亂也  
邪氣勝正病者必死

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲  
痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表  
未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛  
客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因  
鞭則爲結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出  
餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃也

動數皆陽脉也當責邪在表唾而汗出者謂之

盜汗爲邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發  
熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫  
反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見  
陽脉邪在裏則見陰脉邪氣內陷動數之脉所  
以變遲而浮脉獨不變者以邪結胃中上焦陽  
結脉不得而沉也客氣者外邪乘胃中空虛入  
裏結於胃膈膈中拒痛者客氣動膈也金匱要  
畧曰短氣不足以息者實也短氣燥煩心中懊  
懣皆邪熱爲實陽氣內陷氣不得通於膈壅於  
心下爲鞭滿而痛成結胃也與大陷胃湯以下

傷寒論卷之四  
四  
結熱若胃中空虛陽氣內陷不結於胃膈下入於胃中者遍身汗出則為熱越不能發黃若但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胃湯方

大黃

六兩去皮苦寒

芒硝

一升鹹寒

甘遂

一錢苦寒

大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名硝石以其鹹能熨鞭夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣可以直達透結陷胃三物為允

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消

煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服傷寒六七日結胃熱實脈沉而緊心下痛按之石鞭者大陷胃湯主之

病在表而下之熱入因作結胃此不云下後而云傷寒六七日則是傳裏之實熱也沉為在裏緊為裏實以心下痛按之實鞭是以為結胃與大陷胃湯以下結熱

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胃無大熱者此為水結在胃脇也但頭微汗出者大陷胃湯主之

傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱爲正邪分爭未全歛結與大柴胡湯下之但結胃無大熱者非熱結也是水飲結於胃脇謂之水結胃周身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停畜而不行也與大陷胃湯以逐其水  
太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胃湯王之  
重發汗而復下之則內外重亡津液而邪熱內

結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱甚也與大陷胃湯以下其邪

小結胃病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胃湯王之

心下鞭痛手不可近者結胃也正在心下按之則痛是熱氣猶淺謂之小結胃結胃脉沉緊或寸浮關沉今脉浮滑知熱未深結與小陷胃湯以除胃膈上結熱也

小陷胃湯方

黃連一兩 苦寒 半夏半升 洗 辛溫 括蕒實大者一箇 味苦寒

苦以泄之辛以散之黃連括蕒實苦寒以泄熱  
半夏之辛以散結

右三味以水六升先煮括蕒取三升去滓內諸藥  
煮取二升去滓分溫三服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱  
者此本有寒分也反下之若利止必作結胃未止  
者四日復下之此作協熱利也

太陽病二三日邪在表也不能卧但欲起心下

必結者以心下結滿卧則氣壅而愈甚故不能  
卧而但欲起也心下結滿有水分有寒分有氣  
分今脉微弱知本有寒分醫見心下結而反下  
之則太陽表邪乘虛入裏利止則邪氣留結為  
結胃利不止至次日復如前下利不止者是邪  
熱下攻腸胃為挾熱利也

太陽病下之其脉促不結胃者此為欲解也脉浮  
者必結胃也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急  
脉細數者頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者  
協熱利脉浮滑者必下血

此太陽病下之後邪氣傳變其脉促者為陽盛  
下後脉促為陽勝陰也故不作結胃為欲解下  
後脉浮為上焦陽邪結而為結胃也經曰結胃  
者寸脉浮關脉沉下後脉緊則太陽之邪傳於  
少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於少陰  
之絡令人咽痛不可內食所以脉緊者必咽痛  
脉弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者  
少陽受病也其脉循脇絡於耳所以脉弦者必  
兩脇拘急下後邪氣傳裏則頭痛當止脉細數  
為邪未傳裏而傷氣也細為氣少數為在表故

頭痛未止脉沉緊則太陽之邪傳於陽明為裏  
實也沉為在裏緊為裏實陽明裏實故必欲嘔  
脉滑則太陽之邪傳於腸胃以滑為陰氣有餘  
知邪氣入裏干於下焦也沉為血勝氣虛是為  
協熱利浮為氣勝血虛是知必下血經曰不宜  
下而便攻之諸變不可勝數此之謂也

病在陽應以汗解之反以冷水瀦之若灌之其熱  
被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不  
渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無  
熱證者與三物小陷胃湯白散亦可服



病在陽為邪在表也法當汗出而解反以冷水  
澀之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏彌  
更益煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意  
欲飲水者裏有熱也反不渴者寒在表也與文  
蛤散以散表中水寒之氣若不差是水熱相搏  
欲傳於裏與五苓散發汗以和之始熱在表因  
水寒制之不得外泄內攻於裏結於胃膈心下  
鞭痛本是水寒伏熱為實故謂之寒實結胃無  
熱證者外無熱而熱悉収斂於裏也與小陷胃  
湯以下逐之白散下熱故亦可攻

### 文蛤散方

文蛤五兩味鹹寒

鹹走腎則可以勝水氣

右一味為散以沸湯和一錢匕服湯用五合

白散方

桔梗三分味辛苦微溫

芑豆一分去皮心熬黑研如脂平溫

貝母三分味辛苦平

辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣芑豆  
之辛用以散實

右件三味為末內芑豆更於臼中杵之以白飲和

服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆者若水以濕之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胃心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則讖語脉弦五六日讖語不止當刺期門

太陽之脉絡頭下項頭項強痛者太陽表病也少陽之脉循胃絡脇如結胃心下痞鞭者少陽

裏病也太陽少陽相併爲病不純在表故頭項

不但強痛而或眩冒亦未全入裏故時如結胃

心下痞鞭此邪在半表半裏之間也刺大椎第

一間肺俞以瀉太陽之邪刺肝俞以瀉少陽之

邪邪在表則可發汗邪在半表半裏則不可發

汗發汗則亡津液損動胃氣少陽之邪因干於

胃土爲木刑必發讖語脉弦至五六日傳經盡

邪熱去而讖語當止若復不止爲少陽邪熱甚

也刺期門以瀉肝膽之氣

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除

而脉遲身涼胃脇下滿如結胃狀讖語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

中風發熱惡寒表病也若經水不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來血室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入於血室熱除脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃脇下滿如結胃狀讖語者熱入血室而裏實期門者肝之募肝主血刺期門者瀉血室之熱審看何經氣實更隨其實而瀉之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

中風七八日邪氣傳裏之時本無寒熱而續得寒熱經水適斷者此爲表邪乘血室虛入於血室與血相搏而血結不行經水所以斷也血氣與邪分爭致寒熱如瘧而發作有時與小柴胡湯以解傳經之邪

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讖語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室虛空邪熱乘虛入於血室若晝日譫語爲邪客於府而陽爭也此晝日明了暮則譫語如見鬼狀是邪不入府入於血室而陰爭也陽盛譫語則宜下此熱入血室不可與下藥犯其胃氣熱入血室血結實熱者與小柴胡湯散邪發汗此雖熱入血室而不留結不可與發汗藥犯其上焦熱入血室胃脇滿如結胸狀者可刺期門此雖熱入血室而無滿結不可刺期門犯其中焦必自愈者以經行則熱隨血去血下也已則邪熱

悉除而愈矣所爲發汗爲犯上焦者發汗則動衛氣衛氣出上焦故也刺期門爲犯中焦者刺期門則動榮氣榮氣出中焦故也脉經曰無犯胃氣及上二焦必自愈豈謂藥不謂針耶

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之

傷寒六七日邪當傳裏之時支散也嘔而心下結者裏證也法當攻裏發熱微惡寒支節煩疼爲外證未去不可攻裏與柴胡桂枝湯以和解之

傷寒五六日已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

傷寒五六日已經汗下之後則邪當解今胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣猶在半表半裏之間為未解也胃脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭

汗出而餘處無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏之邪復津液而助陽也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡

半斤 苦平

桂枝

三兩 去皮 味辛熱

乾薑

三兩 辛熱

枳實根

四兩 苦寒

黃芩

三兩 苦寒

牡蠣

三兩 熬 鹹寒

甘草

二兩 炙 味甘平

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳表之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散在表之邪鹹以熯之牡蠣之鹹以消胃脇

之滿辛以潤之乾薑之辛以固陽虛之汗津液  
不足而爲渴苦以堅之括萋之苦以生津液  
右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三  
升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈  
傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不  
欲食大便鞭脈細者此爲陽微結必有表復有裏  
也脈沉亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得  
復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脈雖  
沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭  
汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者

得屎而解

傷寒五六日邪當傳裏之時頭汗出微惡寒者  
表仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞭  
脈細者邪結於裏也大便秘爲陽結此邪熱雖  
傳於裏然以外帶表邪則熱結猶淺故曰陽微  
結脈沉雖爲在裏若純陰結則更無頭汗惡寒  
之表證諸陰脈皆至頸胷中而還不上循頭今  
頭汗出知非少陰也與小柴胡湯以除半表半  
裏之邪服湯已外證罷而不了了者爲裏熱未  
除與湯取其微利則愈故云得屎而解

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胃也大陷胃湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

傷寒五六日邪在半表半裏之時嘔而發熱邪在半表半裏之證是為柴胡證具以他藥下之柴胡證不罷者不為逆却與柴胡湯則愈若下後邪氣傳裏者邪在半表半裏則陰陽俱有邪至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下後陽

邪傳裏者則結於胃中為結胃以胃中為陽受氣之分與大陷胃湯以下其結陰邪傳裏者則留於心下為痞以心下為陰受氣之分與半夏瀉心湯以通其痞經曰病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之因作痞此之謂也

### 半夏瀉心湯方

半夏

半升洗

黃芩

苦寒

乾薑

辛熱

人參

已上各三兩

黃連

苦寒

大棗

十二枚

甘草

三兩炙

辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣苦入心而  
泄熱黃芩黃連之苦以瀉痞熱脾欲緩急食甘  
以緩之人參甘草大棗之甘以緩之

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫  
服一升日三服

太陽少陽併病而反下之成結胃心下鞭下利不  
止水漿不下其人心煩

太陽少陽併病爲邪氣在半表半裏也而反下  
之二經之邪乘虛而入太陽表邪入裏結於胃  
中爲結胃心下鞭少陽裏邪乘虛下干腸胃遂

利不止若邪結陰分則飲食如故而爲藏結此  
爲陽邪內結故水漿不下而心煩

脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡  
但氣痞耳

浮而緊浮爲傷陽緊爲傷陰當發其汗而反下  
之若浮入裏爲陽邪入裏則作結胃浮不入裏  
而緊入裏者陰邪入裏則作痞

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱  
汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔  
短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主



之

下利嘔逆裏受邪也邪在裏者可下亦須待表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時不惡寒者表已解也頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣者邪熱內畜而有伏飲是裏未和也與十棗湯下熱逐飲

十棗湯方

芫花熬味辛苦

甘遂苦寒

大戟苦寒

大棗十枚擘

辛以散之芫花之辛以散飲苦以泄之甘遂大

戟之苦以泄水水者腎所主也甘者脾之味也大棗之甘者益土而勝水

右三味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚瞶者難治今色微黃手足溫者易愈

太陽病因發汗遂發熱惡寒者外虛陽氣邪復不除也因復下之又虛其裏表中虛邪內陷傳於心下爲痞發汗表虛爲竭陽下之裏虛爲竭陰表證罷爲無陽裏有痞爲陰獨又加燒針虛不勝火火氣內攻致胃煩也傷寒之病以陽爲主其人面色青膚肉瞶動者陽氣大虛故云難治若面色微黃手足溫者即陽氣得復故云易愈

心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之

心下鞭按之痛關脈沉者實熱也心下痞按之濡其脈關上浮者虛熱也大黃黃連湯以導其虛熱

大黃黃連瀉心湯方

大黃 二兩 味苦寒

黃連 一兩 味苦寒

內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

心下痞者虛熱內伏也惡寒汗出者陽氣外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

本因下後成痞當與瀉心湯除之若服之痞不解其人渴而口燥煩小便不利者為水飲內畜

津液不行非熱痞也與五苓散發汗散水則愈一方忍之一日乃愈者不飲水者外水不入所停之水得行而痞亦愈也

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭

脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

胃為津液之主陽氣之根大汗出後外亡津液胃中空虛客氣上逆心下痞鞭金匱要畧曰中

焦氣未和不能消穀故令噫乾噫食臭者胃虛而不殺穀也脇下有水氣腹中雷鳴土弱不能

勝水也與瀉心湯以攻痞加生薑以益胃

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見

心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但

以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之  
傷寒中風是傷寒或中風也邪氣在表醫反下  
之虛其腸胃而氣內陷也下利日數十行穀不  
化腹中雷鳴者下後重虛胃弱也心下痞鞭乾  
嘔心煩不得安者胃中空虛客氣上逆也與瀉  
心湯以攻表加甘草以補虛前以汗後胃虛是  
外傷陽氣故加生薑此以下後胃虛是內損陰  
氣故加甘草

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復  
以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中

者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復  
利不止者當利其小便

傷寒服湯藥下後利不止而心下痞鞭者氣虛  
而客氣上逆也與瀉心湯攻之則痞已醫復以  
他藥下之又虛其裏致利不止也理中丸脾胃  
虛寒下利者服之愈此以下焦虛故與之其利  
益甚聖濟經曰滑則氣脫欲其收也如開腸洞  
泄便溺遺失澁劑所以收之此利由下焦不約  
與赤石脂禹餘糧湯以澁洞泄下焦主分清濁  
下利者水穀不分也若服澁劑而利不止當利

小便以分其氣

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂一斤碎 味甘溫

禹餘糧一斤碎 味甘平

本草云澁可去脫石脂之澁以收斂之重可去怯餘糧之重以鎮固

已上二味以水六升煮取二升去滓三服

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿傷寒吐下後發汗則表裏之氣俱虛虛煩脉甚微為正氣內虛邪氣獨在至七八日正氣當復

邪氣當罷而心下痞脇下痛氣上衝咽喉眩冒者正氣內虛而不復邪氣留結而不去經脉動惕者經絡之氣虛極久則熱氣還經必成痿弱傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋復代赭石湯主之

大邪雖解以魯發汗吐下胃氣弱而未和虛氣上逆故心下痞鞭噫氣不除與旋復代赭石湯降虛氣而和胃

旋復代赭石湯方

旋復花三兩 味鹹溫 人參二兩 味甘溫 生薑五兩 味辛溫

半夏

半升洗  
味辛温

代赭石

一兩味  
苦寒

大棗

十二枚  
擘其温

甘草

三兩炙  
味平

鞭則氣堅鹹味可以熉之旋復之鹹以熉痞鞭  
虛則氣浮重劑可以鎮之代赭石之重以鎮虛  
逆辛者散也生薑半夏之辛以散虛痞甘者緩  
也人參甘草大棗之甘以補胃弱

右件七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升  
温服一升日三服

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可  
與麻黃杏子甘草石膏湯

前第三卷十六證云發汗後不可更行桂枝湯

汗出而喘無大熱者為與此證治法同汗下雖

殊既不當損正氣則一邪氣所傳既同遂用一

法治之經所謂若發汗若下若吐後是矣

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不

止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

外證未除而數下之為重虛其裏邪熱乘虛而

入裏虛協熱遂利不止而心下痞若表解而下

利心下痞者可與瀉心湯若不下利表不解而

心下痞者可先解表而後攻痞以表裏不解故

與桂枝人參湯和裏解表

桂枝人參湯方

桂枝四兩去皮 甘草四兩炙 白朮三兩味

人參三兩味 乾薑三兩味

表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏氣大虛表裏不解故加桂枝甘草於理中湯也

右伍味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升日再夜一服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不

可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

大下後復發汗則表裏之邪當悉已此心下為痞惡寒者表裏之邪俱不解也因表不解而下之為心下痞先與桂枝湯解表表解乃與大黃黃連瀉心湯攻痞內經曰從外之內而盛於內者先治其外而後調其內

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之

傷寒發熱寒已成熱也汗出不解表和而裏病

也吐利心腹濡更爲裏虛嘔吐而下利心腹痞  
鞭者是裏實也與大柴胡湯以下裏熱

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胃中痞鞭  
氣上衝咽喉不得息者此爲胃有寒也當吐之宜

瓜蒂散

病如桂枝證爲發熱汗出惡風言邪在表也頭  
痛項強爲桂枝湯證具若頭不痛項不強則邪  
不在表而傳裏也浮爲在表沉爲在裏今寸脉  
微浮則邪不在表亦不在裏而在胃中也胃中  
與表相應故知邪在胃中者猶如桂枝證而寸

脉微浮也以胃中痞鞭上衝咽喉不得息知寒  
邪客於胃中而不在表也千金曰氣浮上部填塞  
心胃胃中滿者吐之則愈與瓜蒂散以吐胃中  
之邪

瓜蒂散方

瓜蒂一分熬黃 赤小豆一分味

其高者越之越以瓜蒂豆豉之苦在上者湧之湧  
以赤小豆之酸內經曰酸苦湧泄爲陰

右二味各別搗篩爲散已合治之取一錢匕以香  
豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫



頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死

素有宿昔之積結於脇下爲痞今因傷寒邪氣入裏與宿積相助使藏之真氣結而不通致連在臍傍痛引少腹入陰筋而死

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

若吐若下後七八日則當解復不解而熱結在裏表熱者身熱也裏熱者內熱也本因吐下後邪氣乘虛內陷爲結熱若無表熱而純爲裏熱則邪熱結而爲實此以表熱未罷時時惡風若邪氣純在表則惡風無時若邪氣純在裏則更不惡風以時時惡風知表裏俱有熱也邪熱結而爲實者則無大渴邪熱散漫則渴今雖熱結在裏表裏俱熱未爲結實邪氣散漫熏烝焦膈故大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升與白虎加人參湯散熱生津

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

無大熱者爲身無大熱也口燥渴心煩者當作陽明病然以背微惡寒爲表未全罷所以屬大陽也背爲陽背惡寒口中和者少陰病也當與附子湯今口燥而渴背雖惡寒此裏熱也則惡寒亦不至甚故云微惡寒與白虎湯和表散熱加人參止渴生津

傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不渴者宜麻黃湯渴者宜五苓散非白虎所宜大渴欲水無表證者乃可與白虎加人參湯以散裏熱臨病之工大宜精別

太陽少陽併病心下鞅頸項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之

心下痞鞅而眩者少陽也頸項強者太陽也刺大椎肺俞以瀉太陽之邪以太陽脉下項俠脊故余肝俞以瀉少陽之邪以膽爲肝之府故余太陽爲在表少陽爲在裏即是半表半裏證前

第五證云不可發汗發汗則譫語是發汗攻太陽之邪少陽之邪益甚于胃必發譫語此云慎勿下之攻少陽之邪太陽之邪乘虛入裏必作結胃經曰太陽少陽併病而反下之成結胃太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

太陽陽明合病自下利為在表當與葛根湯發汗陽明少陽合病自下利為在裏可與承氣湯下之此太陽少陽合病自下利為在半表半裏非汗下所宜故與黃芩湯以和解半表半裏之

邪嘔者胃氣逆也故加半夏生薑以散逆氣

### 黃芩湯方

黃芩

三兩味苦寒

甘草

二兩炙味甘平

芍藥

二兩味酸平

大棗

十二枚擘味甘溫

虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服若嘔者加半夏半升生薑三兩傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃



能自轉側者風濕相搏也煩者風也身疼不能  
自轉側者濕也經曰風則浮虛脉經曰脉來濇  
者為病寒濕也不嘔不渴裏無邪也脉得浮虛  
而濇身有疼煩知風濕但在經也與桂枝附子  
湯以散表中風濕

若其人大便鞭小便自利者去桂枝加白朮湯主  
之

桂發汗走津液此小便利大便鞭為津液不足

去桂加朮

桂枝附子湯方

桂枝

四兩去皮  
味辛熱

附子

三枚炮去皮  
破八片辛熱

生薑

三兩切  
辛溫

甘草

二兩炙  
味甘溫

大棗

十二枚擘  
味甘溫

風在表者散以桂枝甘草之辛甘濕在經者逐  
以附子之辛熱薑棗辛甘行榮衛通津液以和  
表也

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇  
汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者  
甘草附子湯主之

風則傷衛濕流關節風濕相搏兩邪亂經故骨

節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇也風勝則衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣為風在表濕勝則水氣不行小便不利或身微腫為濕外薄也與甘草附子湯散濕固衛氣

甘草附子湯方

甘草 二兩炙 味甘平

附子 二枚炮去皮 破味辛熱

白朮 二兩味甘溫

桂枝 四兩去皮 味辛熱

桂枝甘草之辛甘發散風邪而固衛附子白朮之辛甘解濕氣而溫經

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三

服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合為妙

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

浮為在表滑為在裏表有熱外有熱也裏有寒有邪氣傳裏也以邪未入府故止言寒如瓜蒂散證云曾上有寒者是矣與白虎湯以解內外之邪

白虎湯方

知母 六兩味甘寒

石膏 一斤碎 味甘寒

甘草 二兩味甘平

粳米 六合味甘平

內經曰熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳米之甘以益氣

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之

結代之脈動而中止能自還者名曰結不能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也心中悸動知真氣內虛也與炙甘草湯益虛補血氣而復脈

炙甘草湯方

甘草四兩炙生薑三兩切桂枝三兩去皮

人參二兩生地黄一斤阿膠二兩

麥門冬半升去心麻子仁半升

大棗十二枚擘

補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰津耗散為枯五藏痿弱榮衛涸流溫劑所以潤之麻人阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脈通心也右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去

澤內膠烱消盡温服一升日三服一名復脉湯  
脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動  
而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉  
來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得  
此脉者必難治

結代之脉一為邪氣留結一為真氣虛衰脉來  
動而中止若能自還更來小數止是邪氣留結  
名曰結陰若動而中止不能自還因其呼吸陰  
陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰為難治  
之脉經曰脉結者生代者死此之謂也

釋音

俛

音免  
俯也

瞶

水倫切  
目動也

匱

求位切  
匱也

痿

於危切  
痺病也

更

音軟  
柔也

椎

音樞  
樞也

掣

昌列切

涸

乎各切  
竭也

烱

音羊

註解傷寒論卷第四



傷寒論卷五

辨陽明

註解傷寒論卷五

漢張仲景著

晉王叔和撰次

宋成無已註

明汪通值校正

辨陽明脉證并治第八

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也

陽明胃也邪自太陽經傳之入府者謂之太陽陽明經曰太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯即是太陽陽明脾約病也

傷寒論卷五

七

五

正陽陽明者胃家實是也

邪自陽明經傳入府者謂之正陽陽明經曰陽明病脉遲雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者外欲解可攻裏也手足濇濇然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之即是正陽陽明胃家實也

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

邪自少陽經傳之入府者謂之少陽陽明經曰傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發

汗發汗則譏語此屬胃即是少陽陽明病也

陽明之為病胃家實也

邪傳入胃熱毒留結則胃家為實華陀曰熱毒入胃要須下去之不可留於胃中是知邪在陽明為胃家實也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內

實大便難者

本太陽病

太陽之邪

更衣者通為不大便不更衣則胃中物不得泄  
故為內實胃無津液加之畜熱大便則難為陽  
明裏實也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒  
反惡熱也

陽明病為邪入府也邪在表則身熱汗出而惡  
寒邪既入府則表證已罷故不惡寒但身熱汗  
出而惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰  
雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

邪客在陽明當發熱而不惡寒今得之一日猶  
不發熱而惡寒者即邪未全入府尚帶表邪若  
表邪全入則更無惡寒必自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所  
歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也  
胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳入  
於胃入胃則更不復傳如太陽傳之入胃則更  
不傳陽明陽明病傳之入胃則更不傳少陽少  
陽病傳之入胃則更不傳三陰

本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽

明也

傷寒傳經者則一日太陽二日陽明此太陽傳經故曰轉屬陽明

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出澀澀然者是轉屬陽明也

傷寒發熱無汗嘔不能食者太陽受病也若反汗出澀澀然者太陽之邪轉屬陽明也經曰陽明病法多汗

傷寒三日陽明脉大

傷寒三日邪傳陽明之時經曰尺寸俱長者陽

明受病當二三日發陽明氣血俱多又邪併於經是以脉大

傷寒脉浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也

浮為陽邪緩為脾脉傷寒脉浮緩太陰客熱邪在三陽則手足熱邪在三陰則手足寒今手足自溫是知繫在太陰也太陰土也為邪丞之則色見於外當發身黃小便自利者熱不內畜不能發黃至七八日大便鞭者即太陰之邪入府

轉屬陽明也

傷寒轉繫陽明者其人澀然微汗出也

傷寒則無汗陽明法多汗此以傷寒邪轉繫陽明故澀然微汗出

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也

脈浮在表緊爲裏實陽明中風口苦咽乾腹滿微喘者熱傳於裏也發熱惡寒者表仍未解也若下之裏邪雖去表邪復入於裏又亡津液故使腹滿而小便難

陽明病若能食名中風不能食名中寒

陽明病以飲食別受風寒者以胃爲水穀之海風爲陽邪陽殺穀故中風者能食寒爲陰邪陰邪不殺穀故傷寒者不能食

陽明病若中寒不能食小便不利手足澀然汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

陽明中寒不能食者寒不殺穀也小便不利者津液不化也陽明病法多汗則周身汗出此手足澀然而汗出而身無汗者陽明中寒也固瘕

者寒氣結積也胃中寒甚欲留結而爲固痠則  
津液不得通行而大便必鞭者若汗出小便不  
利者爲實也此以小便不利水穀不別雖大便  
初鞭後必溏也  
陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼  
翁翁如有熱狀奄然發狂澀然汗出而解者此水  
不勝穀氣與汗共併脈緊則愈

陽病客熱初傳入胃胃熱則消穀而欲食陽明  
病熱爲實者則小便當數大便當鞭今小便反  
不利大便自調者熱氣散漫不爲實也欲食則

胃中穀多內經曰食入於陰長氣於陽穀多則  
陽氣勝熱消津液則水少經曰水入於經其血  
乃成水少則陰血弱金匱要畧曰陰氣不通即  
骨疼其人骨節疼者陰氣不足也熱甚於表者  
翁翁發熱熱甚於裏者烝烝發熱此熱氣散漫  
不專著於表裏故翁翁如有熱狀奄忽也忽然  
發狂者陰不勝陽也內經曰陰不勝其陽者則  
脈流薄疾并乃狂陽明蘊熱爲實者須下之愈  
熱氣散漫不爲實者必待汗出而愈故云澀然  
而汗出解也水穀之等者陰陽氣平也水不勝

穀氣是陰不勝陽也汗出則陽氣衰脉緊則陰  
氣生陰陽氣平兩無偏勝則愈故云與汗共併  
脉緊則愈

陽明病欲解時從申至戌上

胃為陽土旺於申酉戌向王時是為欲解

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷  
故也以其人本虛故攻其熱必噦

不能食胃中本寒攻其熱復虛其胃虛寒相搏  
故令噦也經曰關脉弱胃氣虛有熱不可大攻  
之熱去則寒起此之謂也

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難  
此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故  
也

陽明病脉遲則邪方入裏熱未為實也食入於  
陰長氣於陽胃中有熱食難用飽飽則微煩而  
頭眩者穀氣與熱氣相搏也兩熱相合消搏津  
液必小便難利者不能發黃言熱得泄也小便  
不利則熱不得泄身必發黃疸黃也以其發於  
穀氣之熱故名穀疸熱實者下之則愈脉遲為  
熱氣未實雖下之腹滿亦不減也經曰脉遲尚

未可攻。陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也。不嘔者手足不厥者頭不痛者必苦頭痛若不效不嘔手足不厥者頭不痛者陽明病法多汗反無汗而小便利者陽明傷寒也。而寒氣內攻也。至二三日嘔效而支厥者寒邪發於外也。必苦頭痛若不效不嘔手足不厥者

是寒邪但攻裏而不外發其頭亦不痛也。陽明病但頭眩不惡寒故能食而效其人必咽痛若不效者咽不痛

陽明病身不重痛但頭眩而不惡寒者陽明中風而風氣內攻也。經曰陽明病若能食名中風風邪攻胃胃氣上逆則效咽門者胃之系效甚則咽傷故必咽痛若胃氣不逆則不效其咽亦不痛也。

陽明病無汗小便不利心中懊懣者身必發黃。陽明病無汗而小便不利者熱蘊於內而不得



越心中懊懣者熱氣鬱蒸欲發於外而爲黃也  
陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃  
陽明病則爲內熱被火則火熱相合而甚若遍  
身汗出而小便利者熱得泄越不能發黃今額  
上微汗出而小便不利則熱不得越鬱蒸於胃  
必發黃也  
陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必  
盜汗出  
浮爲在經緊者裏實脈浮而緊者表熱裏實也  
必潮熱發作有時若脈但浮而不緊者止是表

熱也必盜汗出盜汗者睡而汗出也陽明病裏  
熱者自汗表熱者盜汗  
陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄  
陽明之脈起於鼻絡於口陽明裏熱則渴欲飲  
水此口燥但欲漱水不欲嚥者是熱在經而裏  
無熱也陽明氣血俱多經中熱甚迫血妄行必  
作衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不  
了者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故  
令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四

行今日再行故知大便不久出今為小便數少以  
津液當還入胃中故知不久必大便也  
先亡津液使大便鞭小便數少津液分別大便  
必自下也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之  
嘔者熱在上焦未全入府故不可下  
陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者  
死利止者愈

陽明病腹滿者為邪氣入府可下之心下鞭滿  
則邪氣尚淺未全入府不可便下之得利止者

為邪氣去正氣安正氣安則愈若因下利不止  
者為正氣脫而死  
陽明病面合赤色不可攻之攻之必發熱色黃小便不  
利也

合通也陽明病面色通赤者熱在經也不可下  
之下之虛其胃氣耗其津液經中之熱乘虛入  
胃必發熱色黃小便不利也  
陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯  
吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽  
明病不吐不下心煩則是胃有鬱熱也與調胃

承氣湯以下鬱熱其四其胃中積熱也與承氣湯  
陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹  
滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足澀然  
而汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多  
微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣  
湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿  
令大泄下

陽明病脈遲若汗出多微發熱惡寒者表未解  
也若脈遲雖汗出而不惡寒者表證罷也身重  
短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽

之本津液足為熱烝之則周身汗出津液不足  
為熱烝之其手足澀然而汗出知大便已鞭也  
與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱  
不潮是熱未成實故不可便與大承氣湯雖有  
腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承  
氣湯微和胃氣

大承氣湯方

大黃

四兩苦寒酒洗

厚朴

半斤苦溫炙去皮

枳實

五枚苦寒炙

芒硝

三合鹹寒

內經曰燥淫所勝以苦下之大黃枳實之苦以

潤燥除熱又曰燥淫於內治以苦溫厚朴之苦  
下結燥又曰熱淫所勝治以鹹寒芒硝之鹹以  
攻蘊熱

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃  
煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再  
服得下餘勿服

小承氣湯方

大黃 四兩

厚朴 二兩

枳實 三枚

者灸大

大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承  
氣湯以熱不大甚故於大承氣湯去芒硝又以

結不至堅故不減厚朴枳實也

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二  
服初服湯當更衣不更衣者盡飲之若更衣者勿服  
之

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者  
不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少  
與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可  
攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻  
之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其  
後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之

不轉失氣者慎不可攻也

潮熱者實得大便微鞭者便可攻之若便不鞭者則熱未成實雖有潮熱亦未可攻若不大大便六七日恐有燥屎當先與小承氣湯贖之如有燥屎小承氣湯藥勢緩不能宣泄必轉氣下失若不轉失氣是胃中無燥屎但腸間少鞭爾止初頭鞭後必澹攻之則虛其胃氣致腹脹滿不能食也胃中乾燥則欲飲水水入胃中虛寒相搏氣逆則噦其後却發熱者則熱氣乘虛還復聚於胃中胃燥得熱必大便復鞭而少與小承

氣湯微利與和之故以重云不轉失氣不可攻內慎之至也

夫實則讖語虛則鄭聲鄭聲重語也  
內經曰邪氣盛則實精氣奪則虛讖語由邪氣盛而神識昏也鄭聲由精氣奪而聲不全也讖語者言語不次也鄭聲者鄭音不正也論語云惡鄭聲之亂雅樂又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆言鄭聲不正也今新差氣虛人聲轉者是所謂重語者也若聲重亦聲轉之直視讖語喘滿者死下利者亦死

直視譫語邪勝也喘滿為氣上脫下利為氣下

脫是皆主死也

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脉短者死脉自

和者不死

亡陽胃燥譫語者脉短津液已絕不可復治脉

自和為正氣未衰而猶可生也

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘

日自晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者

發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦

者生瀼者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之

若一服利止後服

若吐若下皆傷胃氣不大便五六日上至十餘

日者亡津液胃氣虛邪熱內結也陽明主於申

酉戌日晡所發潮熱者陽明熱甚也不惡寒

者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也以

為熱氣有餘若劇者是熱氣甚大也熱大甚於

內昏冒正氣使不識人至於循衣摸牀惕而不

安微喘直視傷寒陽勝而陰絕者死陰勝而陽

絕者死熱劇者為陽勝脉弦為陰有餘瀼為陰

不足陽熱雖劇脉弦知陰未絕而猶可生脉瀼

則絕陰故不可治其邪熱微而未至於劇者但發熱譫語可與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下藥中病即止不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則止後服人至外師本對林樹而不陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譫語小承氣湯主之若一服譫語止更莫復服西大日師視公賦然未則即味其少不更矣亡津液胃燥大便鞭而譫語雖無大熱內結亦須與小承氣湯和其胃氣得一服譫語止則胃燥以潤更莫復與承氣湯以本無實熱故也

陽明病譫語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之明日不大便脉反微澁者裏虛也爲難治不可更與承氣湯也

陽明病譫語發潮熱若脉沉實者內實者也則可下若脉滑疾爲裏熱未實則未可下先與小承氣湯和之湯入腹中轉失氣者中有燥屎可更與小承氣湯一升以除之若不轉失氣者是無燥屎不可更與小承氣湯至明日邪氣傳時脉得沉實緊牢之類是裏實也反得微澁者裏

氣大虛也若大便利後脉微澁者止爲裏虛而猶可此不會大便脉反微澁是正氣內衰爲邪氣所勝故云難治

陽明病讞語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞞尔宜大承氣湯下之  
讞語潮熱爲胃熱當消穀引食反不能食者胃中有燥屎而胃中實也若能食者胃中虛熱雖鞞不得爲有燥屎雜病虛爲不欲食實爲欲食傷寒則胃實熱甚者不能食胃中虛熱甚者能食與雜病爲異也大承氣湯以下燥屎逐結熱

陽明病下血讞語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之澼然汗出則愈  
陽明病熱入血室迫血下行使下血讞語陽明病法多汗以奪血者無汗故但頭汗出也刺期門以散血室之熱隨其實而瀉之以除陽明之邪熱散邪除熱榮衛得通津液得復澼然汗出而解

汗出讞語者以有燥屎在胃中此爲風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈宜大承氣湯



胃中有燥屎則讖語以汗出爲表未罷故云風也燥屎在胃則當下以表未和則未可下須過下太陽經無表證乃可下之若下之是燥屎雖除則表邪乘虛復陷於裏爲表虛裏實胃虛熱甚語言必亂與大承氣湯却下胃中邪熱則止傷寒四五日脈沈而喘滿沈爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實又則讖語邪氣入內之時得脈沈而喘滿裏證具也則當下之反發其汗令津液越出胃中乾燥大便必難又則屎燥胃實必發讖語

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讖語遺尿發汗則讖語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

腹滿身重難以反側口不仁讖語者陽明也鍼經曰少陽病甚則面微塵此面垢者少陽也遺尿者太陽也三者以陽明證多故出陽明篇中三陽合病爲表裏有邪若發汗攻表則燥熱益甚必愈讖語若下之攻裏表熱乘虛內陷必額上汗出手足逆冷其自汗出者三陽經熱甚也內經曰熱則腠理開榮衛通汗大泄與白虎湯

以解內外之熱

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱汗出大便難而讖語者下之則愈宜大承氣湯

本太陽病併於陽明名曰併病太陽證罷是無

表證但發潮熱是熱併陽明一身汗出為熱越

今手足熱汗出是熱聚於胃也必大便難而

讖語經曰手足熱然而汗出者必大便已鞅也

與大承氣湯以下胃中實熱

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出

不惡寒反惡熱身重若發汗則燥心憤憤反讖語

若加燒鍼必怵惕煩燥不得眠若下之則胃中空

虛客氣動隔心中懊懷舌上胎者梔子豉湯主之

脈浮發熱為邪在表咽燥口苦為熱在經脈緊

腹滿而喘汗出不惡寒反惡熱身重為邪在裏

此表裏俱有邪猶當雙解之若發汗攻表表熱

雖除而內熱益甚故燥而憤憤反讖語憤憤者

心亂經曰榮氣微者加燒鍼則血不行更發熱

而躁煩此表裏有熱若加燒鍼則損動陰氣故

怵惕煩燥不得眠也若下之裏熱雖去則胃中

空虛表中客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於膈

使心中懊懣而不了了也舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣客於胃中與梔子豉湯以吐胃中之邪  
若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之  
若下後邪熱客於上焦者為虛煩此下後邪熱不客於上焦而客於中焦者是為乾燥煩渴與白虎加人參湯散熱潤燥  
若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之此下後客熱客於下焦者也邪氣自表入裏客於下焦三焦俱帶熱也脈浮發熱者上焦熱也

渴欲飲水者中焦熱也小便不利者邪客下焦津液不得下通也與猪苓湯利小便以瀉下焦之熱也

猪苓湯方

猪苓

去皮 甘平

茯苓

甘平

阿膠

甘平

滑石

碎 甘寒

澤瀉

甘寒 一兩

其甚而反淡淡味滲泄為陽猪苓茯苓之甘以行小便鹹味湧泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水滑利竅阿膠滑石之滑以利水道  
右伍味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿

本膠烱消溫服七合日三服  
陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也  
鍼經曰水穀入於口輸於腸胃其液別為五天寒衣薄則為溺天熱衣厚則為汗是汗溺一液也汗多為津液外泄胃中乾燥故不可與猪苓湯利小便也

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之  
浮為表熱遲為裏寒下利清穀者裏寒甚也與四逆湯溫裏散寒

若胃中虛冷不能食者飲水則噦  
噦者欬逆是也千金曰咳逆者噦逆之名胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦  
脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經也能食者裏和也熱甚於經迫血為衄胃中虛冷陰勝也水入於經其血乃成飲水者助陰氣逆為噦發熱口乾陽勝也食入於陰長氣於陽能食者助陽血妄為衄二者偏陰偏陽之疾也  
陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣

飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之  
表未罷而下者應邪熱內陷也熱內陷者則外  
熱無而手足寒今外有熱而手足溫者熱雖內  
陷然而不深故不作結胃也心中懊懣飢不能  
食者熱客胃中為虛煩也熱自胃中薰蒸於上  
故但頭汗出而身無汗與梔子豉湯以吐胃中  
和之虛煩口渾身熱消食者俱宜

陽明病發潮熱大便溏小便自可胃脘滿不去者  
小柴胡湯主之  
陽明病潮熱為胃實大便鞭而小便數今大便

溏小便自可則胃熱未實而米穀不別也大便  
溏者應氣降而胃脘滿去余反不去者邪氣猶  
在半表半裏之間與小柴胡湯以去表裏之邪  
陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與  
小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然  
而汗出解也

陽明病腹滿不大便舌上胎黃者為邪熱入府  
可下若脇下鞭滿雖不大便而嘔舌上白胎者  
為邪未入府在表裏之間與小柴胡湯以和解  
之上焦得通則嘔止津液得下則胃氣因和汗

出而解者脈弦浮大而不短氣腹都滿脇下及心痛  
 陽明中風脈弦浮大而不短氣腹都滿脇下及心痛  
 久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧身及面目悉  
 黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外  
 不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮  
 無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治  
 浮大為陽風在表也弦則為陰風在裏也短氣  
 腹滿脇下及心痛風熱壅於腹中而不通也若  
 寒客於內而痛者按之則寒氣散而痛止此以  
 風熱內壅故雖久按而氣亦不通陽明病鼻乾

不得卧自汗出者邪在表也此鼻乾不得汗而  
 嗜卧者風熱內攻不干表也一身面目悉黃小  
 便難有潮熱時時噦者風熱攻於胃也陽明之  
 脈出大迎循頰車上耳前過客主人熱勝則腫  
 此風熱在經故耳前後腫刺之經氣通腫則小  
 差如此者外證罷則可攻若外證不解雖過十  
 日脈續浮者邪氣猶在半表半裏與小柴胡湯  
 以和解之若其脈但浮而不弦大無諸裏證者  
 是邪但在表也可與麻黃湯以發其汗若不尿  
 腹滿加噦者關格之疾也故云不治難經曰關

格者不得盡其命而死  
陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及與大豬膽汁皆可為導  
津液內竭腸胃乾燥大便因硬此非結熱故不可攻宜以藥外治而導引之

### 蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長三寸許當熱時急作冷則硬以內穀道

中以手急抱欲大便時乃去之

### 豬膽汁方

大豬膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病脉遲汗出多當責邪在裏以微惡寒知表未解與桂枝湯和表

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯  
陽明傷寒表實脉浮無汗而喘也與麻黃湯以

發汗

陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為發熱在裏身必發黃茵陳湯主之其以渴惡寒者但頭汗出身無汗劑頸而還者熱不得越也小便不利渴引水漿者熱甚於胃津液內竭也胃為土而色黃胃為熱蒸則色奪於外必發黃也與茵陳湯逐熱退黃

茵陳蒿湯方

茵陳蒿

六兩苦微寒

梔子

十四枚苦寒

大黃

二兩去皮苦寒

小熱之氣涼以和之伏熱之氣寒以取之茵陳

梔子之苦寒以逐胃燥宜下必以苦宜補必以

酸大黃之苦寒以下瘀熱

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之

內經曰血并於下亂而喜忘此下本有久瘀血



所以喜忘也津液少大便鞭以畜血在內屎雖  
鞭大便反易其色黑也與抵當湯以下瘀血

陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻  
腹微滿初頭鞭後必溏不可攻之若有燥屎者宜

大承氣湯

三下後心中懊懣而煩者虛煩也當與梔子豉湯  
若胃中有燥屎者非虛煩也可與大承氣湯下  
之其腹微滿初鞭後溏是無燥屎此熱不在胃  
而在上也故不可攻  
病人不大便五六日繞臍痛煩燥發作有時者此

有燥屎故使不大便也

不大便五六日者則大便必結為燥屎也胃中

燥實氣不得下通故繞臍痛煩燥發作有時也

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬

陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與

大承氣湯發汗宜桂枝湯

雖得陽明證未可便為裏實審看脈候以別內  
外其脈實者熱已入府為實可與大承氣湯下  
之其脈浮虛者是熱未入府猶在表也可與桂  
枝湯發汗則愈

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

大下之後則胃弱不能消穀至六七日不大便則宿食已結不消故使煩熱不解而腹滿痛是知有燥屎也與大承氣湯以下除之

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯

小便利則大便鞭此以有燥屎故小便不利而大便乍難乍易胃熱者發熱喘冒無時及嗜卧也此燥屎在胃故時有微熱喘冒不得卧也與

大承氣湯以下燥屎

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

上焦主內胃為之主食穀欲嘔者胃不受也與

吳茱萸湯以溫胃氣得湯反劇者上焦不內也以治上焦法治之

吳茱萸湯方

吳茱萸辛熱升洗人參三兩薑六兩切

大棗十二枚

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸

生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以緩脾

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三

服

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散

太陽病脈陽浮陰弱為邪在表今寸緩關浮尺弱邪氣漸傳裏則發熱汗出復惡寒者表未解

也傳經之邪入裏裏不和者必嘔此不嘔但心

下痞者醫下之早邪氣留於心下也如其不下

者必漸不惡寒而渴太陽之邪轉屬陽明也若

吐若下若發汗後小便數大便鞭者當與小承

氣湯和之此不因吐下發汗後小便數大便鞭

若是無滿實雖不更衣十日無所苦也候津液

還入胃中小便數少大便必自出也渴欲飲水

者少少與之以潤胃氣但審邪氣所在以法救

之如渴不止與五苓散是也

脈陽微而汗出少者為自和也汗出多者為太過

脈陽微者邪氣少汗出少者為適當故自和汗出多者反損正氣是汗出太過也

陽脈實因發其汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津液大便因鞭也

陽脈實者表熱甚也因發汗熱乘虛蒸津液外泄致汗出太過汗出多者亡其陽陽絕於裏腸胃乾燥大便因鞭也

脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕

浮芤相搏陰陽不諧胃氣獨治鬱而生熱消燦

津液其陽為絕

跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之

跌陽者脾胃之脈診浮為陽知胃氣強濇為陰知脾為約約者儉約之約又約束之約內經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸於膀胱水精四布五經並行是脾主為胃行其津液者也今胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱致小便數大便難與脾約丸通腸潤燥

麻仁丸方

麻子仁二升

芍藥半斤

枳實半斤

厚朴一斤

杏仁一斤

大黃一斤

枳實半斤

厚朴一斤

杏仁一斤

內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘

緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以

斂津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之

苦下燥結而泄胃強也

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十丸日三服

漸加以和為度

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃

承氣湯主之

蒸蒸者如熱薰蒸言甚熱也太陽病三日發汗

不解則表邪已罷蒸蒸發熱胃熱為甚與調胃

承氣湯下胃熱

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

內經曰諸脹腹大皆屬於熱熱在上焦則吐吐

後不解復腹脹滿者邪熱入胃也與調胃承氣

湯下其胃熱

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭

者與小承氣湯和之愈  
吐下發汗皆損津液表邪乘虛傳裏大煩者邪  
在表也微煩者邪入裏也小便數大便因鞭者  
其脾爲約也小承氣湯和之愈  
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩燥心下鞭至  
四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小  
安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便  
少者雖不能食但初頭鞭後必溏未定成鞭攻之  
必溏瀕小便利尿定鞭乃可攻之宜大承氣湯  
大針經曰脉軟者病將下弱爲陰脉當責邪在裏

得病二三日脉弱是日數雖淺而邪氣已入裏  
也無太陽證爲表證已罷無柴胡證爲無半表  
半裏之證煩燥心下鞭者邪氣內甚也胃實熱  
甚則不能食胃虛熱甚至四五日雖能食亦當  
與小承氣湯微和之至六日則熱甚與大承氣  
湯一升若不大便六七日小便多者爲津液內  
竭大便必鞭則可下之小便少者則胃中水穀  
不別必初鞭後溏雖不能食爲胃實以小便少  
則未定成鞭亦不可攻瀕小便利尿定鞭乃可  
攻之

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便  
難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯  
內經曰諸脉者皆屬於目傷寒六七日邪氣入  
裏之時目中不了了睛不和者邪熱肉甚上熏  
於目也無表裏證大便難者裏實也身大熱者  
表熱也身微熱者裏熱也針經曰熱病目不明  
熱不已者死此目中不了了睛不和則證近危  
惡也須急與大承氣湯下之

陽明發熱汗多者急下之宜大承氣湯  
邪熱入府外發熱汗多者熱迫津液將竭急與

大承氣湯以下其府熱

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

發汗不解邪熱傳入府而成腹滿痛者傳之迅

也是須急下之

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

腹滿不減邪氣實也經曰大滿大實自可除下

之大承氣湯下其滿實若腹滿時減非內實也

則不可下金匱要畧曰腹滿時減復如故此爲

寒當與溫藥是減不足言也

陽明少陽合病必下利其脉不負者順也負者失

也互相剋賊名爲負也脉滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

陽明主少陽木二經合病氣不相和則必下利少陽脉不勝陽明不負是不相剋爲順也若少陽脉勝陽明脉負者是鬼賊相剋爲正氣失也

脉經曰脉滑者爲病食也又曰滑數則胃氣實下利者脉當微厥今脉滑數知胃有宿食與大承氣湯以下除之

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯

七八日邪入府之時病人無表裏證但發熱雖脉浮數亦可與大承氣湯下之浮爲熱客於氣數爲熱客於血下之邪熱去而浮數之脉俱當解若下後數脉去而脉但浮則是榮血間熱併於衛氣間也當爲邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴之證此下之後浮脉去而數不解則是衛氣間熱合於榮血間也熱氣合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若大便利者下血乃愈若六七日不大便則血不得行畜積



於下爲瘀血與抵當湯以下去之不可下者  
若脉數不解而下不止必協熱而便膿血也  
下後脉數不解而不大便者是熱不得泄畜血  
於下爲瘀血也若下後脉數不解而下利不止  
者爲熱得下泄迫血下行必便膿血  
傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不  
解故也以爲不可下也於寒濕中求之  
金匱要畧曰黃家所起從濕得之汗出熱去則  
不能發黃發汗已身目爲黃者風氣去濕氣在  
也脾惡濕濕氣內著脾色外奪者身目爲黃若

瘀血在裏發黃者則可下此以寒濕在裏故不  
可下當從寒濕法治之

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者  
茵陳蒿湯主之

當熱甚之時身黃如橘子色是熱毒發泄於外  
內經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出小便不  
利小腹滿者熱氣甚於外而津液不得下行也  
與茵陳湯利小便退黃逐熱

傷寒身黃發熱者梔子蘘皮湯主之

傷寒身黃胃有瘀熱當瀆下去之此以發熱爲

熱未實與梔子藥皮湯解散之

梔子藥皮湯方

梔子

一十五箇苦寒

甘草

一兩其平

黃蘗

二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軹赤小豆湯主

之

濕熱相交民多病痺痺黃也傷寒為寒濕在表

其發黃為瘀熱在裏與麻黃連軹赤小豆湯除熱

散濕

麻黃連軹赤小豆湯方

麻黃

二兩其溫去節

赤小豆

一升其平

連軹

二兩連軹根也苦寒

杏仁

四十箇其溫去皮尖

大棗

十二枚其溫

生梓白皮

一升其苦寒

生薑

二兩其溫切

甘草

二兩其平炙

內經曰濕上甚而熱治以其溫佐以其平以汗

為故正此之謂也又煎用潦水者亦取其水味

薄則不助濕氣

已上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內

諸藥煮取三升分溫三服半日服盡

辨少陽病脈證并治第九

少陽之病口苦咽乾目眩也

足少陽膽經也內經曰有病口苦者名曰膽痺  
甲乙經曰膽者中精之府五藏取決於膽咽爲  
筋之使少陽之脉起於目銳眦少陽受邪故口苦  
咽乾目眩  
少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可  
吐下吐下則悸而驚  
少陽之脉起於目眥走於耳中其支者下胷中  
貫膈風傷氣風則爲熱少陽中風氣壅而熱故  
耳聾目赤胷滿而煩邪在少陽爲半表半裏以  
吐除煩吐則傷氣氣虛者悸以下除滿下則亡

血血虛者驚

傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗  
發汗則讞語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸  
經曰三部俱弦者少陽受病脉細者邪漸傳裏  
雖頭痛發熱爲表未解以邪客少陽爲半在表  
半在裏則不可發汗發汗亡津液胃中乾燥少  
陽之邪因傳入胃必發讞語當與調胃承氣湯  
下之胃和則愈不下則胃爲少陽木邪干之故  
煩而悸  
本太陽病不解轉入少陽者脇下鞅滿乾嘔不能

食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯  
太陽轉入少陽是表邪入於裏脇下鞭滿不能  
食往來寒熱者邪在半表半裏之間若已經吐  
下脉沉緊者邪氣入府爲裏實尚未經吐下而  
脉沉緊爲傳裏雖深未全入府外猶未解也與  
小柴胡湯以和解之  
若已吐下發汗溫鍼譏語柴胡湯證罷此爲壞病  
知犯何逆以法治之  
少陽之邪在表裏之間若妄吐下發汗溫鍼損  
耗津液胃中乾燥木邪干胃必發譏語若柴胡

證不罷者則不爲逆柴胡證罷者壞病也詳其  
因何治之逆以法救之

三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗  
關脉以候少陽之氣太陽之脉浮陽明之脉大  
脉浮大上關上知三陽合病膽熱則睡少陰病但  
欲眠睡目合則無汗以陰不得有汗但欲眠睡  
目合則汗知三陽合病膽有熱也  
傷寒六七日無大熱其人燥煩者此爲陽去入陰  
故也

表爲陽裏爲陰邪在表則外有熱六七日邪氣

入裏之時外無大熱內有燥煩者表邪傳裏也  
故曰陽去入陰

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而  
不嘔此為三陰不受邪也

傷寒四日表邪傳裏裏不和則不能食而嘔今  
反能食而不嘔是邪不傳陰但在陽也

傷寒三日少陽脉小者欲已也

內經曰大則邪至小則平傷寒三日邪傳少陽  
脉當弦緊今脉小者邪氣微而欲已也

少陽病欲解時從寅至辰上

內經曰陽中之少陽通於春氣寅卯辰少陽木  
王之時

釋音

廁初吏切

瘕音假腹

疸音丑黃病

憤古對切

怵勑律切

惕音陽敬也

痺丁賀切



註解傷寒論卷第五

論卷之五

五