



太醫院  
祁廣生輯著

外科大成

光霽堂梓行





源家世山陰習師學自家忠敏  
公殉前明難後業醫先王父廣  
生公幼敏悟通儒書諸子旁流  
靡不詳究其義更以外科醫世  
鮮精者尤加考求冥搜幽索遂  
盡其奧突膺



世祖章皇帝召以

御醫曹侍值

內進先王父性謹慎自重

聖祖仁皇帝尤嘉信之賜與優渥累擢

太醫院判官遇休沐兀坐一室

先大人昭遠公與諸伯叔侍環

列惟醫家書發疑問難校雙言折



裛隆寒盛暑常兩夜乃命就寢  
在直廬或中夜有得必索火記  
之會丁曾王母憂家居更簡練  
揣摩訂為書顏之曰外科大成  
凡四卷部類三十有二鋟而藏  
其板於家是時先大人亦以

御醫侍值

內庭性實介慎歷事

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝

兩朝恩眷特殊贈太醫院判官憶源  
方垂髻先大人即以大成課源  
兄弟而冢兄弘濤早世季弟國  
興成成進士乃心



跋

醫自軒岐而始原無內外科之

分蓋緣本於運氣之有司天則

有主客加臨之遷迭臟腑之有

虛實則有淫勝鬱復之垂變用

藥之有氣味則有逆從反正之

權衡是醫者一也至於唐宋之間分立一十三科意在學難盡述使人各治一科如水陸之殊途矣第瘡瘍雖曰外科而其本必根於內且多針灸去腐完肌之技似治外較難於治內耶近



之世重內而輕外者由近之醫  
棄內而治外是捨本而從末也  
予暇中殫精採掇叅素問靈樞  
之奧旨蒐古今名賢之確論彙  
爲一書名曰外科大成直陳本  
末一目了然猶星辰之有躔度

河漢之有源流庶不致輕人命  
於草菅焉今大成梓宗尚有內  
科症治粗評相繼鐫發因書予  
平昔之所見者著之二云爾

愧菴生陽子祁坤跋



王事又不果卒業先大人嘗訓源曰  
嗣我家學者其惟女乎源不肖  
惟恐不克仰承用是黽勉不敢  
自逸於今五十餘年乾隆己未  
冬今

上諭太醫院判官吳謙等纂醫宗金  
鑑一書以源世外科醫

欽命纂脩源識謏學陋何可與能惟  
竊取先王父大成之意旨而敷  
揚之耳而謬叨優錄感愧交并  
嗟夫醫者意也意之所之死生  
繫焉矧外科之六脰三因陰陽  
善惡端雜緒棼黍粟不辨有失  
之尺丈而不知者是編也義晰

辭明字釋句解部今類別領挈  
經提瘡瘍之微者無不載方法  
之善者無不備集曰大成洵可  
謂集外科之大成也與源年屆  
七旬兩兒邦相邦柱俱駑鈍深  
懼先業失傳緣命坊人印行海  
內非特業是科者有所式循庶



幾先王父之精神學問亦不至  
湮沒云爾時

乾隆歲次癸亥  
1747  
8  
穉七月既望孫男  
宏源敬識

外科大成目錄

卷之一

總論部

癰疽原委症治脉法經絡總不外乎此

癰疽之脉

癰疽之原

癰疽之別

癰疽陽症歌

癰疽陰症歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善歌

癰疽七惡歌

癰疽生殞法

察形色順逆法

內消內托法

虛實症治法

延壽殿

經絡大畧

補瀉藥品

鍼法

砭法

灸法

取穴灸法

烙法

黃蠟灸法

桑柴烘法

神燈照法

牛膠蒸法

藥筒拔法

症治總訣

始未辨症用藥之次第也如

症治次第

虛實治法

順逆看法

標本治法

標使治宜

論汗

論下

論嘔

論寒熱



論痛

論飲食

論藥禁忌

辯瘡暈

辯舌

辯內陷

潰瘍治法

論膿

論血

論瘡口

論生肌

驗膜

陰症變陽

陽症變陰

腫瘍主治方

潰瘍主治方

腫瘍附餘類方

腫瘍敷治類方

腫瘍洗滌類方

腫潰膏藥類方

麻藥類方

去腐類方

生肌類方

潰瘍外治附餘

家傳西聖膏方

調理須知

雜忌須知

試百病生办法

卷之二

分治部

癰疽之原委症治首卷已詳今之分部位者蓋  
爲別經絡認穴次定名色耳其症治不外乎首  
卷之提綱然間有稍異於總治者有專治本症  
之方而卽以此方各附於本症條下則開卷了  
然庶無遺漏紊亂矣

頭部

經絡

百會疽

玉頂發

透腦疽

侵腦疽

額音硬

額

疽

一名赤疽

太陽疽

一名勇疽

鬚

疽

天疽

銳

毒

耳後疽

耳根毒

耳發

玉枕疽

腦後發

腦鑠

面部

其頭面小疵及眼耳鼻口齒舌咽喉等症另有分門

顴瘍

顴

疽



顴 疔

面發毒

面遊風

疥者茶

疥 腮

頰 瘍

一名金腮

癩 毒

骨槽風

一名牙又發

發 頤

時 毒

鳳眉疽

一名眉發

龍泉疽

虎髭毒

一名承漿疽一名頰癰

頸項部

經絡

腦 疽

一名項中疽俗名對口

臥蚕疽

天柱疽

偏腦疽

魚尾疽

頰音劫

頰音劫

百脉疽

鎖喉毒

結喉癰

一名猛疽

氣癰

夾喉癰

疽案

八條

瘰癧

計二十名

石疽

失榮症

背部

經絡

上發背

一名脾肚癰

中發背

一名對心發

蓮子發

蜂窩發

附半身發竟體發

上搭手

一名左右串

中搭手

串疽

陰陽二炁疽

酒毒發

連珠發

丹毒發

禽疽

痰注發

黃瓜癰

一名肉龜

夏月暑瘍

瘡疽

產後癰疽

背部總論

經絡之所統

始末不應生灰訣

腫潰症治法

外治次第法

背疽醫案

腰部



下發背 一名對臍發

腎俞發

下搭手 一名連腎發

濕流注

石疽 附瘀血為患

纏腰火丹 一名火丹瘡俗名蛇串瘡

胸部

經絡

缺盆疽 一名鎖骨疽一名蠱疽

甘疽

膾音誼

膾中疽

井疽

蜂窠疽

胃疽

脾發

乳吹

乳毒

乳癰

乳疽

乳發

乳漏

乳結核

乳勞

乳岩

下乳回乳法

腹部

幽癰

嚇癰 一名胃疽

衝疽

臍癰

小腹疽

腹皮癰

發肚 及于肚足

緩疽

胸腹總論

附小兒臍症

腋部

左右肘腋之間曰腋

腋部

音蠶 厥

經絡

米疽

附夾癰 瘰癧 瘰癧

腋癰

一名夾癰

黥疔

腋氣

肋部

經絡

肋疽

一名夾癰

脇疽

一名敗疔

淵疽

內發丹毒

下部後

鸛口疽

一名銳疽

坐馬癰

臀癰

上馬癰

音貫 音豚

小斗大戈

目錄

六

古雪堂藏板



痔者池

瘡音賢

蕈音尋

下馬癰

附風疔 俗名坐板瘡

懸癰

湧泉疽

穿襠發

跨馬癰

臟毒

痔瘡

附趙直字  
崑科的本

漏瘡

附痔漏  
附餘

截腸症

下部前

便癰

卽便毒一名血  
疔破為魚口

橫痃

疔瘡

一名妬精瘡  
一名耻瘡

陰濕瘡

婦人陰瘡

陰挺

陰蕈

陰腫

一名  
特疽

同癩顏

陰蝕

陰脫

陰癩

俗名癩  
葫蘆

囊癰

附卵疔  
溫暗疔

腎囊風

腎臟風瘡

肩部

經絡

肩疽

肩癰

過肩疽

一名乾疽  
一名丁疽

太陰疽

一名肩  
後疽

蜂窠疽



臍部

自肩至肘曰臍  
自肘至腕曰臍

經絡

臍癰

一名藕  
包毒

膠疽

樂疽

下斗大茂

目錄

七

古雪堂藏板

各料

各如

肩風毒

臂癰

魚肚發

石榴疽

肘癰

臂部

腕癰

兌疽

穿骨疽

骨螻疽

螻蛄串

臂癰

手部

經絡

手發背

手心毒

一名穿掌毒

鵝

癰

一名穿哽毒

姑音姑

毒



者即蛭者註

鯁音秋

病 蝦

手又發

蛇頭疔

一名天蛇毒

蛇背疔

蛇節疔

一名蛭節疔

代指

腐瘡

鷺掌風

股部

經絡

合谷疔

一名虎口疽了又毒又名拍蟹毒

調疽

一名燂疽一名敦疽

蛇眼疔

蛇腹疔

一名魚肚疽

泥鯁疽

僵螂蛭

狐狸刺



股陰疽

陰疽

玄疽

伏兔

肚門癰

箕門癰

股陽疽

環跳疽

附骨疽

咬骨疽

腿遊風

醫案

膝部

經絡

疔疽

膝癰

膝眼風

遊膝風

石疽

緩疽

委中毒

上水魚

脛部

三里發

腓喘發

黃鰓癰

一名脛陰疽

青蛇毒

接骨發

附陰疽

靈樞為兎齧

內踝疽

一名鞋帶癰靈樞為走緩

外踝疽

穿踝疽

濕毒流注

瓜藤纏

腎氣遊風

血風瘡

一名爪風瘡

臙瘡

女為裙風禱口



鱧漏

四騰風

足部

經絡

足跗發

一名足發背

足心癰

一名湧泉疽

脫疽

敦疽

一名足指發

甲疽

足跟疽

一名兔齧

厲癰

四淫

臭田螺

牛程蹇

土栗

冷疔

腳氣瘡

田螺泡

肉刺 俗名雞眼



補遺

卷之三

分治部

此係頭面小疵及眼耳口鼻喉舌等部位因其  
症治多岐不可紊亂於大毒之內故另立之以  
便檢閱

頭部

頭痛頭風

油風

白屑風

禿瘡

蝮蝨癬

一名鱗拱頭

髮際瘡

癩瘡

面部

黃水瘡

眉瘡

肺風酒刺

黧黑斑

雀班

黑子 痣也

鼻慝瘡

羊鬍子瘡

眼部

風火雲翳等眼自有專科姑不錄

眼胞菌毒

眼丹

鍼眼

眼胞痰核

眼胞內椒瘡粟瘡

脾番症



漏睛

大小眼皆出膿出血

耳部

經絡

耳底痛

黑疔

耳疔

耳翳

耳痔

附耳挺耳聾

耳鏡瘡

一名月蝕瘡  
又名鴉喙瘡

耳痒

耳聾

蟲入耳

凍耳成瘡

鼻部

經絡

鼻淵

一名腦崩腦漏  
又名控腦砂

古雪堂藏板

鼻 鼽

鼻 齶

鼻 衄

鼻 痔

鼻 疔

鼻 瘡

酒 鼓 鼻

唇部

經 絡

反唇疔鎖口疔

唇 疽

繭 唇

唇 風

口部

經 絡

口 瘡

舌部

紫舌脹

痰包

舌衄

重舌

附痰氣  
舌疔

重腭

弄舌舒舌

牙齒部

經絡

牙痛

附風齩

牙衄

攢齒疔

牙疔

牙癰

附多骨

走馬牙疳

咽喉部



經絡

緊喉

慢喉

喉痺

附喉風喉癰乳蛾喉癰

啞瘡喉風

弄舌喉風

喉節

喉瘤

不分部位大毒

不分部位者蓋為隨處可生不按穴次也故另

分之

內癰總論

附肚癰

陽疽毒

心漏

肺癰

小腸癰

附醫案

大腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

疔瘡症治總決

共計四十七名

多骨疽

一名剩骨疽  
又名朽骨疽

流注

附馬瘻

癭

瘤

各有五附  
黑砂等瘤

結核

楊梅瘡

倒發梅毒

石癰石疽

疔

發

癰疽

附

疔

音尔

音類

有故

音標

卷之四

不分部位小疵

此皆小症不可紊亂於大毒之內故另分之

無名腫毒

丹毒

赤白遊風

癰疹

諸痒

諸痛

大麻風

癩風

癰瘍風

白駿風

紫白癜風

諸瘡總論

翻花瘡

諸疥

諸癬

附逸風瘡

瘞

癰同瘡



癩瘡

瘡癩

浸淫瘡

天炮瘡 一名肺疽

火赤瘡

寒瘡

魚脊瘡

骨痠瘡

紅絲瘡

天蛇瘡

風疔血疔

白疔 破

漆瘡

血箭

血痣

跌撲損傷

金瘡

杖傷

夾傷

破傷風

類破傷風

發瘰

湯火傷

凍瘡

骨哽喉

及誤吞針鉄

竹木刺入肉

人咬傷

風犬傷

虫獸傷

小兒部

赤遊丹毒

胎毒瘡瘍

熱毒瘡瘍

垂

癰

附重舌重腭重齒

胎風

胎赤

胎瘤

臍瘡臍突

陰腫脫囊

脫肛香

肛門作痒

遺毒

葡萄疫

痘裏瘡瘍

夾瘦痘爛

發丹痘蛆

夾瘡痘痂

損傷痘癍

痘疔

痘後癰

痘風瘡

痘後便膿

煉取諸藥法

昇打靈藥固罐法

封罐口法

煉玄明粉法

取紅鉛法

煉金頂砒法

煉硝石法



外科大成  
卷之六

取蟾酥法

取金汁法 執

製大附子法

製寒食麩法

製炒諸藥法

針灸入神歌訣

五戒

後 跋

小兒急痧

急風痧

急寒痧

急熱

急風

急痧

急痧

急痧

蕭蕪痧

眼門痧

黃 痧

眼 痧

眼 痧

外科大成卷之一

太醫院御醫燕越祁坤廣生甫 輯著

男 嘉錫 嘉釗

嘉鈺 嘉鉉

嘉銘 正字

總論部

脉源

粵稽炎農御世而醫之名始立夫醫者濟世之統名也名雖一而實有內外科之異也科之分有內外蓋因人之疾有內外故也因其疾以命醫神而明之則

因內可以推外由外可以測內精微之理豈易言哉  
胡爲乎今之重於內者精其內而瘡科或有所遺專  
於外者精其外而方脉或有未諳斯二者誠未合乎  
中庸之道不幾失先正之薪傳乎故惟仁者之心深  
長周密思欲兼之而無遺內遺外之憾者必先以脉  
爲首務也靈樞經云見其色知其病命曰明按其脉  
知其病命曰神嗟嗟神其難言也夫誠以病在臟腑  
不能以告人而脉告之脉不能以接人而指接之則  
是脉也者乃天真委和之氣非圖可狀非言可傳維  
在人之會心而已獨不見王叔和之脉經乎王忠父



之脉旨乎李蘋湖之脉學戴同父之刊誤等書乎寓  
之於目悟之於心措之於指運之於意於是乎病之  
淺深不彰明較著也哉是以胗脉之道不易精也因  
其不易精而竟忽之其誤天下也多矣爰採脉學歌  
訣辯脉之形象并遴外科腫潰脉法辯症之順逆類  
之卷首聊補學者上達之功云爾

脉歌

浮如木在水中浮浮大中空乃是芤拍拍而浮  
是洪脉來時雖盛去悠悠浮脉輕平似捻葱虛  
來遲大豁然空浮而柔細爲濡脉散似楊花無定

縱 腫瘍爲虛爲風潰瘍爲虛宜補

沉 沉幫筋骨自調勻伏則推筋着骨尋沉細如綿

真弱脉弦長實大是牢形 腫瘍爲邪氣深潰瘍

爲遺毒在內

遲 遲來一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮沉

分表裏消陰須益火之源 脉來三至號爲遲小

駛於遲作緩持遲細而難知是濇浮而遲大以虛

推 腫瘍爲寒爲虛潰瘍亦爲寒爲虛

數 數脉息間常六至陰微陽盛必狂煩浮沉表裏

分虛實惟有兒童作吉看 數比平人多一至緊

來如數似彈繩數而時止名爲促數見關中動脈  
形數脈爲陽熱可知只將君相火來醫實宜涼  
瀉虛宜補肺病秋深却畏之 腫瘍爲熱數而洪  
者欲膿潰瘍爲病進數甚者難醫

滑 滑脈如珠替替然往來流利却還前莫將滑數  
爲同類數脈惟看至數間 腫瘍爲熱爲痰潰瘍  
爲熱爲虛爲邪氣未退

瀉 細遲短瀉往來難散止依稀應指間如雨沾沙  
容易散病蚕食葉慢而艱 參伍不調名曰瀉輕  
刀刮竹短而難微似杪芒微粟甚浮沉不別有無



間 腫瘍為氣實氣滯潰瘍為血虛為脈病相應

虛 舉之遲大按之鬆脈狀無涯類谷空莫把芤虛

為一例芤來浮大似慈慈 腫瘍宜內托潰瘍宜

大補

實 浮沉皆得大而長應指無虛幅幅強熱蘊三焦

成壯火通腸發汗始安康 實脈浮沉有力強緊

來彈索轉無常須知牢脈幫筋骨實大微弦更帶

長 腫瘍為邪氣太盛潰瘍為邪氣不退

長 過於本位脈名長弦則非然但滿張弦脈與長

爭較遠良工尺度自能量 腫瘍為有餘宜內消

潰瘍爲氣治則易愈

短 兩頭縮縮名爲短瀼短遲遲細且難短瀼而浮  
秋喜見三春爲賊有邪干 腫瘍爲元氣不足潰  
瘍爲大虛宜大補

洪 脉來洪盛去還衰滿指滔滔應夏時若在春秋

冬月分升陽散火莫狐疑 洪脉來時拍拍然去

衰來盛似波瀾欲知實脉參差處舉按弦長扁幅

堅 腫瘍爲熱盛宜宣熱拔毒壯實者下之潰瘍  
爲邪氣盛藥之不退者難愈

微 微脉輕微瞥瞥乎按之欲絕有如無微爲陽弱

〔細〕陰弱細比於微畧較麤 腫瘍爲虛服藥漸充者佳潰瘍亦爲虛若微而勻者爲脉病相應

緊 舉如轉索切如繩脉象因之得緊名總是寒邪來作寇內爲腹痛外爲疼 腫瘍脉浮緊發熱惡

寒或有痛處是爲癰疽潰瘍主氣沉滯爲有外寒 緩 緩脉阿阿四至通柳稍裊裊颯輕風欲從脉裏求神氣只在從容和緩中 腫瘍爲虛潰瘍爲有胃氣爲脉病相應

芤 中空傍實乃爲芤浮大而遲〔虛〕脉呼芤更帶弦名曰革血亾芤革血虛虛 腫瘍爲血虛潰瘍爲



脉病相應

弦 弦來端直似絲弦緊則如繩左右彈緊言其力

弦言象**牢**脉弦長沉伏間 腫瘍主血氣不和爲

痛潰瘍爲血虛雙弦爲賊邪侵脾加數則危矣

革 革脉形如按鼓皮芤弦相合脉寒虛女人半產

并崩漏男子營虛或夢遺

牢 弦長實大脉牢堅牢位常居沉伏間**革**脉芤弦

自浮起革虛牢實要詳看 腫瘍爲邪盛潰瘍爲

邪氣不退

濡 浮而柔細知爲濡沉細而柔作**弱**持微則浮微

如欲絕細來沉細近於微

弱 弱來無力按之柔柔細而沉不見浮陽陷入陰  
精血弱白頭由可少年愁 腫瘍宜托裏潰瘍爲  
脉病相應宜補

散 散似楊花散漫飛去來無定至難齊產爲生兆  
胎爲墮久病逢之不必醫 散脉無拘散漫然濡

來浮細水中綿浮而遲大爲虛脉乳脉中空有兩  
邊 腫瘍爲氣虛不收潰瘍獨見者死

細 細來纍纍細如絲應指沉沉無絕期春夏少年  
俱不利秋冬老弱却相宜 細爲氣聚血少有此

症者逆

伏 伏脉推筋着骨尋指間纔動隱然深傷寒欲汗  
陽將解厥逆臍疼症屬陰 腫瘍爲陰中伏陽邪  
潰瘍爲陽伏陰中爲內蝕爲流注浸淫難治宜温  
補

動 動脉搖搖數在關無頭無尾豈形團其原本是  
陰陽搏虛者搖兮勝者安 動主痛陽動汗之陰  
動温之

促 促脉數而時一止此爲陽極欲亾陰三焦鬱火  
炎炎盛進必無生退可生 腫瘍爲熱爲病進潰



瘍為熱不退漸進者死

結 結脉緩而時一止獨陰偏勝欲亾陽浮為氣滯

沉為積汗下分明在王張 腫瘍為氣結潰瘍為

氣不調則危

代 動而中止不能還復動因而作代看病者得之

猶可療平人却與壽相關 數而時止名為促緩

止須將結脉呼止不能回方是代結生代死自殊

途 兩動一止三四日三四動止應六七五六一

止七八朝次第推之自無失 腫潰俱不利

脉數不時見當生惡瘡 脉數身無熱內有癰膿

脉數應當發熱而反惡寒若有痛處當發癰 脉浮  
而數焮腫在外宜先托裏恐邪入內脉沉而實宜先  
疎通以絕其源脉不浮不沉無內外症知其經宜  
和榮衛 脉數發熱而痛者發於陽脉不數不發熱  
而痛者發於陰 癰脉宜洪大而數若沉緊者成疽  
脉宜沉而實若浮洪而散者成 癰疽無脉者氣閉  
也宜行氣其脉自見

### 癰疽之源

人身之氣血與天地同流人身之經絡與晝夜同度  
苟或六淫之感七情之傷飲食不時房勞不節致使

陰陽乖錯榮衛蘊結而成癰者總不出於三因故以  
三因首例

外因運氣癰疽有四

一火熱助心爲瘡瘍經曰少陰所至爲瘍疹又云少  
陰司天熱氣下臨肺氣上從甚則瘡瘍又云少陰司  
天之政初之氣寒乃始陽氣鬱炎暑將起中外瘡瘍  
又云少陽所至爲瘡瘍又云少陽司天之政風熱參  
布太陰橫流寒乃時至民病寒中外發瘡瘍初之氣  
候乃太溫其病膚腠中瘡二之氣火反鬱其病熱鬱  
於上瘡發於中三之氣炎暑至民病膿瘡又云大陽



司天之政初之氣氣乃太溫肌腠瘡瘍此皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所勝甚則瘡瘍又云少陰司天客勝甚則瘡瘍又云少陰之復病痲疹癰疽瘰疔又云火太過曰赫羲其病瘡疽血流又云火鬱之發民病瘡瘍癰腫此是邪變病之甚也

二曰寒邪傷心爲瘡瘍經曰太陽司天寒淫所勝血變於中發爲癰瘍病本於心又云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰疽注下又云陽明司天之政四之氣寒雨降民病癰腫瘡瘍是也

三曰燥邪傷肝爲瘡瘍經曰木不及曰委和上商與

正商同其病支發癰腫瘡瘍邪傷肝也又云陽明司  
天燥淫所勝民病瘡瘍瘰癧病本於肝是也

四曰濕邪瘡瘍經曰太陰司天濕氣變物甚則身後  
癰又云大陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於外是  
也

右四條天行時氣也此由外感故曰外因然外來之  
因則肌肉血脉筋骨受之其見症多寒熱交作筋骨  
疼痛及濕痰流注風濕風溫時毒等類治宜發之如  
蒼朮復煎散紺珠丹之類經云汗之則瘡已使榮衛  
通行邪氣不得干於內也 又云陽氣者開闔不得

寒氣從之乃生大僕又云此寒氣之種八風之變四時之病以其勝者治之此亦外因也

內因

經云氣宿於經絡與血俱澁而不行壅結爲癰疽不言熱之所作而後成癰者爲由七情內鬱而成或兼竭力房勞陰虛所致又云形樂志苦病生於內此由內傷故曰內因然內傷之因則五臟受之其見症瘡多堅硬根蒂深固二便不調飲食少進外軟內堅平陷無膿表實裏虛毒多難出治宜托裏以培其本禁用驅熱拔毒汗下之劑書云纔得腫痛叅之脉症



但有虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉 經云肺  
乘肝則爲癰又云腎移寒於肝癰腫少氣脾移寒於  
肝癰腫筋攣此臟腑之變亦屬內因也臟腑之變及  
入風之變皆寒癰例也其形堅硬如石或皮不變色  
或捻之不痛治宜溫補以回其陽如參附蒼朮之類  
是也

不內外因

經云膏粱之變足生大疔又曰榮氣不從逆於肉理  
乃生癰腫榮氣胃氣也蓋飲食入胃先輸於脾而朝  
於肺腑百脉次及於皮毛先行陽道下歸臟腑而氣

口成寸矣夫膏梁之變者則榮氣太過不能走空竅而行皮毛反行陰道逆於腠裡而生癰腫此肌肉實滯而然也

飲食之虧者則榮氣不及不能走空竅而充皮毛短而不盈凝於腠裡而生癰腫此肌肉虛澁而然也

或兼房勞不節者則腎水虧損腎水虧損則反從濕化而上行其瘡多生於胸背書言大疔者癰之最重者也此不屬內外兩因故曰不內外因然不內外因則脾腎二經受之外無六經之形症內無便溺之阻隔治宜審症脉之虛實辨形色之順逆知所從來用

癰六腑不和之

所生疽五藏不

和之致陽滯於

陰則生癰陰滯

於陽則生疽

疽音直  
子余切

以補瀉如 榮氣太過者治宜大瀉以奪氣壅如貴

金丸排膿散之類

榮氣不及者治宜大補以滋氣少如異功散十全大

補湯之類 真陰虧損者治宜托裏補虛如神効托

裏散內固黃耆湯之類禁用五香等藥復損其陰

其有癰癧痰注氣痞癭瘤之屬生於肉裏膜外者亦

屬不內外因也治以養氣血調經脉行痰開鬱健胃

和中之法為善

癰疽之別

癰發於六腑為表為陽為熱為實其發迅暴如燎原



之火故熱痛高腫侵長廣大皮薄光軟以澤多有椒  
眼或作便閉發渴發逆以拒之由正氣內固不能下  
陷是以五臟終不傷也

疽之發於五臟爲裏爲陰爲冷爲虛其發停蓄如陶  
室之火內消骨髓故無熱無腫無痛形如瘡癰色淡  
而堅甚則如牛領之皮見七惡逆症者死

七惡逆症  
歌見後

陽中之陰者似熱非熱雖腫而虛赤而不燥痛而不  
膿浮而復消外盛而內腐其人多肥肉緊而內虛也  
陰中之陽者似冷非冷不腫而實赤微而燥痛而有  
膿外不盛而內煩悶其人多瘦肉緩而內實也

陽症變而爲陰者草醫涼劑之過也陰症變而爲陽者大方熱藥之驟也然陽變爲陰爲猶可返於陽也其症多生陰變爲陽爲不久復歸於陰矣其症多死陽症有熱則氣血行而生肌陰症無熱則氣血滯而不斂故云有熱無熱爲生死之訣觀此則知癰疽有陰陽表裏虛實之分而無大小之別也第恐猶有未悉者再續陰陽善惡生死順逆等謔內消內托虛實等治使一見了然庶無舛誤

### 癰疽陽症歌

癰疽不論上中下惟在陰陽二症推發背雖有正與

偏要取高低兩樣看純陽初起必燼腫更兼身熱有  
微寒頂如尖字高突起腫似灣弓根有盤七日之間  
多燼痛二七之期膿漸漫動息自寧食知味二便調  
勻無瀉乾腫消膿潰精神爽脫腐生新氣血完五善  
自然臻並至七惡全無半點干痛便隨膿減腫退自  
肌寬新肉已生紅艷艷腐皮自斂白漫漫一身多爽  
快五臟盡和歡此屬純陽俱易治百人百可保全安

癰疽陰症歌

純陰初起不知瘡粟米之形疙瘡僵不紅不腫不知  
痛少熱少燼少隄防七朝之後身體倦瘡根平大喜



澆湯頂不高兮根不活色不光兮腐不穰陷軟無膿  
空結聚脉浮散大細飛颺飲食不餐身戰戰嘗湯止  
許意怵怵瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳膿多  
臭穢身難便舉動愴惶韻不長瘡形成紫黑面色變  
青黃精神昏憤多鼾睡言語無人自發揚口乾多舌  
強痰喘定身亾此屬純陰俱不治百人百可到泉鄉

癰疽半陰半陽症歌

陰陽之症兩相交生死同兼事可招微熱微寒微赤  
腫半昏半爽半平高脉來雖數多無力飲食雖餐便  
不消腫而不潰因脾弱潰而不斂爲膿饒大便多澹

小便數上身有汗下身焦五善雖兼有七惡未全逃  
口渴喜茶腸腹痛面浮屢飲足心高心煩不穩睡神  
亂怕音焦投方應病方爲妙陰轉爲陽漸可調心真  
造化爾命堅牢逢之任是神仙手半歿餘生定莫逃  
癰疽五善歌

心善精神爽言清舌潤鮮瘡疼兼不渴睡醒得安然  
肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康  
脾善脣滋潤衾幃蘭麝香凡餐俱有味膿厚更肥黃  
肺善聲音響無痰韻更長肌膚多滑潤大便自尋常  
腎善誠爲要水深火自降口和兼不渴小水得稀長

爲

癰疽七惡歌

憤者膾心亂

心動

一惡神昏憤心煩舌上乾瘡形多紫黑言語自呢喃  
二惡腰身強目睛邪視人瘡頭流血水驚悸是肝純  
三惡形消瘦膿清臭穢生瘡形多軟陷脾敗不知疼  
四惡皮膚槁聲嘶韻不長痰多兼喘急鼻動肺將亾  
五惡成消渴隨飲卽隨乾形容多慘黑囊縮腎家端  
六惡身浮重腸鳴嘔餽頻大腸多滑泄臟腑並將傾  
七惡瘡倒陷形如剥鱗同四肢多冷逆污水自流通  
善屬腑症病微邪淺更能慎起居節飲食則勿藥  
亦愈惡屬臟症多因元氣虛弱或汗下失宜胃氣



音擊  
音景

受傷或寒涼剋伐以致邪氣愈實也法當純補胃  
氣多有可生者宜於潰瘍主治諸方內對症施治  
此外更有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐  
不寧牙關緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙  
手撒身熱脉洪大按之如無或身熱惡衣欲投水  
中其脉浮大按之微細衣厚仍寒此氣虛極傳變  
之惡症也 手足逆冷肚腹疼痛泄瀉腸鳴飲食  
不入吃逆嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡症也  
有汗而不惡寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反  
張頸項勁強此氣血虛極變痙之惡症也俱急用

參耆歸朮附子以救之間有得生者不可因其症惡遂棄而不治

### 癰疽生成法

初生如粟裏可容谷外面如麻裏大如瓜外面如錢裏可容拳起勢大終無害未老先白頭無膿軟陷休瘡從疔瘡起有膿生方許腫潰氣昂昂不治自安康根高頂又高八十壽還饒焮腫易腐爛任大終無恙瘡高熱焮疼雖苦必然生瘡軟無神氣應補方爲益肉腫瘡不腫必竟生疑恐膿穢不進食泄瀉黃泉客瘡色猪肝紫無膿必定死綿潰不腐爛內怕蒲萄嵌

仰臥不知疼陰症命難生腐盡有敗氣笑裏終生祟  
根散瘡平塌神仙無治法久病日露神必竟命難存  
面忽似塗脂十日後分離敗中有紅肉雖重生門路  
新肉如板片不食終須變手足皮枯槁血敗生難保  
脣白眼無神腹脹瀉將傾隴氣不滲氣雖重多生意  
眼眶黑氣濃癰疽怕此逢房中香馥馥是病終爲福  
瘡熱身微熱輕病何須說生灰此中求片言一可決  
察行色順逆

凡閱人之病必先視其形色而後與脉病相叅誠識  
於始以決其終百無一失矣曷言之陰病見陽色腮



顴紅獻陽病見陰色指甲呈青此二者俱死又身熱  
脉細脣吻反青目珠直視者死面如塗脂色若土黃  
油膩黑氣塗抹者死脣舌乾焦鼻生煙煤眼神透露  
者死形容憔悴精神昏短身形縮小者死喘粗氣短  
鼻焮睛露語言謔妄者死循衣摸床遺尿失禁撮空  
者死頭低項軟眼視無神吸吸短氣者死皮破無血  
肉綻爛麻木不知痛痒者死齒黃色如煮豆脣白  
反理無紋耳黑枯焦不聽人中縮而坦平口張氣出  
無回閉鼻煽相隨呼吸行汗出如珠不散痰若膠而  
堅凝白血紅如肺色指甲灣而帶青神昏神浮神亂

神離縑衣生滿面黑氣憊天庭逢之都沒命法在此  
中評

內消內托

內消 消者滅也於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之劑必分之以虛實如脉症俱實者汗利之脉症俱虛者滋補之次分部位佐以引經消毒之藥使氣血各得其常則可內消也再如熱渴便閉邪在裏也則疎導之寒熱焮痛邪在表也則發散之無表裏症邪在經也則和解之

內托 托者起也已成之時不能突起亦難潰膿或

堅腫不赤或不痛大痛或得膿根散或膿少膿清或  
瘡口不合者皆氣血虛也主以大補佐以活血祛毒  
之品或加以芳香行其鬱滯或加以溫熱禦其風寒  
如托裏消毒散隨時加減之候膿出腫消腐淨用參  
耆歸朮大補之甚加附子使氣血滋茂則新肉易生  
是為內托也 又云治癰以寒是為內消治疽以熱  
是為內托內消內托治之義也

虛實

腫潰諸症須辨虛實隨行補瀉若或稍差關係甚大  
假如腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀



者瘡疽之虛也

瀉利腸鳴食少嘔吐手足並冷脉

弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出

精神不爽者悉臟腑之虛也大便秘小便濇飲食如

故腸滿脹悶肢節疼痛口苦咽乾煩渴身熱脉大神

昏者悉臟腑之實也

膿亦清稀瘡口不合聚腫不

赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫高色赤寒

熱疼痛膿稠壯熱頭目昏重者氣血之實也

頭痛

鼻塞目赤心驚喉舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上

實也精滑便利腰脚沉重睡臥不寧者下虛也

肩

項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音

嘶聲敗四肢浮腫者真氣虛也。焮腫痛甚日久不潰寒熱往來二便淋秘心神煩悶者邪氣虛也。又曰

真氣奪則虛邪氣盛則實諸痒爲虛諸痛爲實脉微細軟者爲虛洪大而數者爲實也。脉症俱虛虛則

補之和其氣托裏也。脉症俱實實則瀉之導其氣疎利也。脉症俱緩緩則治本用平和之藥徐治之也。主治之法如腫高焮痛者神授衛生散解之次用托

裏消毒散漫腫微痛者用托裏散如不應加薑桂

膿出反痛氣血虛也宜八珍湯。不作膿不腐潰陽

氣虛也宜四君子湯加歸耆肉桂。不生肌不收斂

脾氣虛也宜四君子湯加芍藥木香 惡寒增寒陽

氣虛也宜十全大補湯加薑附 補熱內熱陰血虛

也宜四物湯加參朮 欲嘔作嘔胃氣虛也宜六君

子湯加炮薑 自汗盜汗五臟虛也宜六味丸加五

味子 食少體倦脾氣虛也宜補中益氣湯加茯苓

半夏 喘促咳嗽脾肺虛也宜補中益氣湯加五味

麥冬 欲嘔食少脾胃虛也宜人參理中湯腹瀉泄

瀉脾胃虛寒也宜附子理中湯 小腹痞足脛腫脾

腎虛也宜十全大補湯加山藥山茱 泄瀉足冷脾

腎虛寒也宜十全大補湯加附子 熱渴淋秘腎虛



陰火也宜加減八味丸 喘嗽淋秘肺腎虛火也宜  
補中益氣湯加減八味丸 大凡怯弱之人不必分  
其腫潰惟宜先補胃氣或疑參耆滿中或泥於氣質  
素實或爲有痰勿服補劑或間有用者又加發散敗  
毒等藥致使所補不償所損多致有悞殊不究瘡瘍  
之作緣陰陽已虧膿血既瀉元氣已憊斯時也不行  
溫補將何以恃書云纔得腫痛叅之脉症見有虛弱  
便與滋補氣血無虧可保終吉此古今不易之確論  
也

人生之有經絡猶地理之有界分治病不知經絡猶捕盜不知界分其能無誅伐無過之咎乎岐黃問答以經絡爲主惟經絡一明然後知症見何經用何經之藥以治之了然無謬如古之善射御者自有得心應手之妙焉假如腹之中行係任脉一經開兩傍係足少陰腎經又開兩傍係足陽明胃經又開兩傍係足太陰脾經此皆在腹中者其乳之在上在傍係手太陰肺經手少陰心經手厥陰心包絡經也又開兩傍則在兩肋係足厥陰肝經又肋之後背之傍係足少陽胆經其脊之兩傍各兩行係足太陽膀胱經若

脊之中行係督脉一經手之外廉係手三陽經手之  
內廉係手三陰經足之外廉係足三陽經足之內廉  
係足三陰經頭乃手足六陽經所會如耳前後係手  
足少陽經額之上下係手足陽明經兩眦傍係手足  
太陽經其鼻之上行仍係督脉一經又凡各經支別  
交會與夫足三陰皆循喉嚨挾舌本又足厥陰隨督  
脉會於巔雖未得備陳分寸起止實乃十四經之大  
畧也內經所謂分肉者正指此耳至於奇經入脉亦  
皆有起止病患也假如肋痛便知其爲肝經不分內  
外男婦大小皆可識症用藥稍近後便知其爲胆經



則又當隨症加減矣由此言之則凡十四經所在皆可類推也

陀云癰疽之作其行也有處其主也有歸如心之發於喉舌肺之發於皮膚脾之發於肌肉肝之發於筋肋腎之發於骨髓是也 陰毒發於下陽毒

發於上腑之發於外臟之發於內發於下者得之緩發於上者得之速感於腑者易治感於臟者難療故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆 近骨者多冷久而不愈化血生虫虫則多痒少疼或先痒後疼近膚者多熱久而不愈傳氣成漏漏則多疼少

身和九厥  
卷之一  
三  
痒或不疼不痒 發於虛處者多險 發於節而

相應者不治 應爲內外通潰也

手足十二經有氣血多少之分 謂曰多氣多血君須  
記手經大腸足經胃多氣少血有六經三焦胆腎心  
脾肺多血少氣心胞絡膀胱小腸肝所異 治以氣

多者行其氣血多者破其血氣少者難於起發補托  
之血少者難於收斂滋養之雖然厥陰經有相火難  
治少陽經有相火而更難治故足少陰當作氣血兩  
虛治也用藥之道如東垣之處方矧有兼風兼痰兼  
濕兼氣兼血兼陰虛等症病本不同治當求備較之

世俗圖人形瘡樣而不分經絡者大相徑庭矣

十二經補瀉藥品

手少陰心經

補 當歸 生地黃 茯神 遠志

酸棗仁 麥門冬 栝子仁 山藥

蓮肉 圓眼肉 人參 紅藍花

瀉 黃連 枳實 木香 貝母

天竺黃 鬱金 赤茯苓 玄胡索

溫 石菖蒲 藿香 沉香 木香

桂枝 麻黃

竺之六切



涼 連翹 丹參 石蓮子 枝子

犀角 牛黃 硃砂 石膏

引經獨活 細辛 燈心 圓眼

手厥陰心包絡經

補 人參 黃耆 肉桂 沉香

兔絲子 破故紙

瀉 大黃 朴硝 枝子 烏藥

溫 大附子 肉桂 乾薑 沉香

川芎 白芷 栝子仁 烏藥

涼 黃連 枝子 丹皮 柴胡

薄荷

滑石

引經柴胡

桂佐之

川芎

青皮

手太陽小腸經

補石斛

牡蠣

甘草稍

瀉木通

赤茯苓

車前子

紫蘇

羌活

藁本

檳榔

大黃

饗麥

温巴戟天

茴香

烏藥

砂仁

益智仁

凉滑石

木通

枝子

茅根

車前子

猪苓

澤瀉

苳磳

引經羌活

藁本

黃栢

足厥陰肝經

補

當歸

熟地黃

酸棗仁

阿膠

木瓜

沙參

薏苡仁

枸杞子 鈎杞起

兔絲子

山茱萸

白朮

蓮肉

甘草

蒺藜

瀉

白芍藥

赤芍藥

柴胡

青皮

枳實

青黛

羌活

木賊

甘菊

蒲黃

桃仁

蔓荊子

茱萸

芍若



常山 五靈脂 益母草 前胡

温 木香 肉桂 香附子

凉 黄連 黄栢 胡黄連 龍胆草

草决明 牛黄 羚羊角 令車前子

甘菊花 地榆

引經川芎 行上 青皮 行下 柴胡 烏梅

足少陽膽經

補 當歸 酸棗仁 山茱萸 五味子

瀉 柴胡 青皮 黄連 白芍藥

川芎 貝母 瓜隻 鈎藤

天然一黃

溫 乾薑

肉桂

陳皮

半夏

涼 黃連

黃芩 琴

柴胡

竹茹

甘草

引經川芎

行上

青皮

行下

柴胡

足太陰脾經

補 人參

白朮 促

茯苓

甘草

白芍藥

山藥

蓮肉

白遍莖

木瓜

茯苓

當歸

黃蓍

薏苡仁

芡實

陳皮

大棗

圓眼肉

瀉

枳實

大腹皮

山查

麥芽

神麩

半夏

南星

檳榔

三稜

萊菔子

升麻

防風

石膏

猪苓

玄胡索

桑寄生

溫

砂仁

白荳蔻

藿香

破故紙

黑乾薑

官桂

大附子

蘇葉

肉果

木瓜

蒼朮

吳茱萸

丁香

涼

黃連

玄明粉

竹瀝力

連翹



大黃

引經白芍

麻黃

大棗

蓮肉

足陽明胃經

補人參

白朮

黃耆

石斛

山藥

蓮子

芡實

薏苡仁

糯米

白糖

瀉

枳實

厚朴

大腹皮

前胡

三稜

莪朮

檳榔

大黃

石膏

礞石

溫

肉桂

肉果

大附子

砂仁

藿香

半夏

蒼朮

白芷

川芎

香附

乾薑

涼

葛根

知母

石蓮子

枝子

滑石

竹茹

胡黃連

引經葛根

升麻

白芷

手太陰肺經

補

人參

沙參

黃耆

麥冬

阿膠

五味子

紫苑

百部

知母

欵冬花

木瓜

山藥

茯苓

茯苓

瀉 防風

蘇梗

羌活

前胡

生薑

桑白皮

蘇子

橘紅

石膏

杏仁

貝母

瓜婁

南星

枳殼

薄荷

白芥子

白芍

玄胡索

葶藶

鼠粘子 嚴

芎

萊菔子

香薷 殊

荆芥

溫

乾薑

生薑

半夏

白荳蔻

縮砂

木香

藿香

桂枝

香附

麻黃

涼

枯苓

竹葉

竹瀝

童便



羚羊角

馬兜鈴

山梔

天門冬

玄參

桔梗

藕節

枇杷葉

玄明粉

地骨皮

引經白芷

升麻

葱白

生薑

手陽明大腸經

補蓮肉

糯米

白砂糖

薏苡仁

粟殼

木香

肉荳蔻

龍骨

牡礪

瀉

大黃

苳硝

枳實

桃仁

檳榔

葱白

麻仁

温 人參

乾薑

半夏

肉桂

吳茱萸

凉 黃芩

槐花

大黃

地榆

胡黃連

連翹

石膏

秦艽 文蛤

引經葛根

升麻

白芷

足少陰腎經

補 杜仲

兔絲子

蒺藜

破故紙

山茱萸

山藥

石斛

巴戟天

人參

白朮

當歸

熟地

枸杞

五味

牛膝

龜板

淫羊藿

何首烏

鱉甲

鹿茸

鹿角

龍骨

牡蠣

續斷

肉蓯蓉

韭子

覆盆子

瀉

澤瀉

猪苓

知母

玄胡索

甘草

茯苓

木通

溫

大附子

桂心

破故紙

黑乾薑

磁砂

仙茅

沉香

涼

黃栢

知母

丹皮

天門冬

地骨皮

山梔

玄參

竹瀝

引經獨活

肉桂

牛膝

鹽酒



足太陽膀胱經

補 龍骨

續斷

益智仁

橘核

瀉 猪苓

澤瀉

滑石

車前子

木通

瞿麥

茯苓

溫 茴香

烏藥

沉香

山茱萸

桂枝

麻黃

硝砂

涼 胆草

石連子

防風

羌活

蔓荊子

茵陳

葶藶

大黃

黃栢

石膏

引經藁本

羌活

黃栢

手少陽三焦經

補 人參

黃耆

白朮

藿香

瀉 柴胡

枳殼

枳實

青皮

山茨菰

溫 大附子

厚朴

乾薑

沉香

涼 連翹

滑石

胆草

地骨皮

引經柴胡

川芎

青皮

散品

凡藥之性輕虛者諸臟腑皆能發散是以不屬經

絡也

羌活

獨活

升麻

防風

荊芥

細辛

藁本

麻黃

秦艽

防己

牛旁子

香薷

夏枯草

山苳根

五靈脂

射干

青蒿

葱白頭

漏蘆

蟬腿

走品

凡藥之體重濁者諸臟腑皆能走瀉是以不屬經

絡也

川烏

草烏

三稜

莪朮

歲靈仙

川山甲

葶藶

海藻



昆布

五加皮

撫芎

常山

青黛

巴豆

益母草

桑寄生

針灸烙烘炤蒸拔等法

疽之發也所患者惟內攻與外潰耳蓋毒不能外發勢必內攻急宜護膜以托裏不能中出勢必旁潰必外兼針灸等法以提其毒此外科之首務也

針法

夫用針者譬之救火火在屋下必穴其頂不爾則延焚盡焚之矣故曰毒氣中隔內外不通不行針灸藥無全功又曰血實者決之先診其脈緊而數者其膿

外科大成卷之十一  
三十一  
未成緊去但數者其膿已成若膿未成而用針氣血  
已瀉膿反難成膿已成而不針潰壞愈深瘡口難斂  
次輕按熱痛者膿淺而稠重按微痛者膿深而稀  
按之不痛俱硬者瘀血也俱軟者濕水也 再按之  
陷而不起者膿未成按之軟隨手而起者膿已成按  
之四畔俱軟者膿大成矣

手法針鋒宜隨經絡之橫豎不則難於收口部位宜  
下取便於出膿腫高而軟者在肌肉針四五分腫下  
而堅者在筋脉針六七分腫平肉色不變者附於骨  
也針寸許毒生背腹肋脇等處宜匾針斜人以防透

膜之害入針在好肉之處則磁實而難進針至膿潰之處則虛軟而無阻針既透膿卽視針口必有膿意如珠斯時也欲大開口則將針斜出欲小其口則將針直出所謂迎而奪之順而取之也隨以綿紙撚蘸玄珠膏度之使膿會齊三二時取出撚則膿水速乾矣瘡口貼呼膿膏四圍敷潰膿散 元氣虛者必先補而後針膿一出則諸症悉退若膿出返痛腫仍不消或煩燥嘔逆者胃氣虛也治宜大補之

神妙拔根法

凡背疽腦疽陰症者初起不腫高不

焮熱灸之不疼者必致壞人於十日已前用披針當



頭插入至知痛方止出其惡血通其瘡竅隨用蟬酥  
條插入直至孔底服蟬酥丸紺珠丹發其大汗如元  
氣虛者隨以內托之藥大補之每日插二條以膏蓋  
之三日後加添插藥其根高腫作痛外用神燈照法  
桑根灸法助陰爲陽插換七日其瘡裂縫流膿至十  
三日其根自脫如日多根深蒂固不能脫者披針取  
之玉紅膏搽之不脫者自脫不斂者自斂 如半月  
後不作膿腐者用披針品字樣三孔開之不問深淺  
以知痛爲任隨用藥筒拔法拔之視其膿血鮮明謂  
氣血交粘用藥可痊若紫黑氣穢謂氣敗血衰神仙

嘆哉若拔後大膿當出而返少必內有頑膜宜取去  
寸餘雖微痛血出無妨隨用兩手輕重得宜從瘡根  
焮處漸漸捺至中間剪去膿管聚膿自然湧出以黃  
厚爲吉其膿日漸多者爲輕反此則爲慮矣

又有不宜針者如疽生於筋脉及骨節臍門并癭瘤  
再結核推之不動者俱不宜針 冬月閉藏水冰地  
折只宜用藥托裏而少針石者蓋謂善行水者不能  
注冰善穿地者不能鑿凍善用針者亦不能取四厥  
也所爲寒微腠理以苦發之以辛散之如托裏溫中  
湯之類也

蜚針一法爲開門放毒之捷徑然恐竭於外不能及於內卽皮膚之疾恐血去而氣不能獨居也禁之針委中穴法 治癰疽發背紅腫疼痛及脚膝風濕疼痛卽柱杖跛足者針之有功又中風痰厥牙關緊急不知人事者針之立効

其法令患者雙手倚壁上雙脚挺直用三角披針將紙札只露半米粒許尖頭針時以中指抵住針頭看委中穴有細青紫脉皆是濕毒惡血看準於紫脉上刺之凡青脉俱刺任出黑血無妨看血出淡黃色方以紙輕手按片時以小膏藥貼之三四日不可洗浴放血後令人將員棍于手足腰背腿上加轆利麵卽棄杖而行百發百中針家不宜出血惟腫偏宜出血也

針少商穴法

治喉風喉痺顛額

顛音容大頭也

懸癰虬蛾



等症危急者刺之立驗

穴在大指端內側去爪甲角一莖葉許白肉際間  
用三稜針刺出紫血立瘥此穴能泄諸臟之熱但  
不宜  
灸

內托黃耆丸

治悞傷經絡白膿赤汁逗流不止者

黃耆

生八兩

當歸

三兩

肉桂

木香

沉香

乳香

各一兩

為末用菘荳粉四兩生薑自然汁煮糊丸桐子大  
每服四五十九白湯下

砭法

扁鵲云病在血脉治宜砭石此舉素問血實者決之

也非止丹毒及紅絲疔走散但見紅腫色赤遊走不定者或時毒瘀血壅盛等症并宜砭之忌其太深內經所謂刺皮無傷肉也法用細磁器擊碎取有鋒苳者一塊用筋一根劈開頭夾之縛之用二指輕捺筋稍以磁鋒對患處懸寸許再用重筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出如丹毒敷貼見小兒赤遊丹毒門參考至次日腫未全消再量行砭之以腫消紅散為率

灸法

灸乃開結破硬之法蓋火性暢達引拔內毒有路而發外也凡瘡之初起七日已前隨毒勢之大小灸艾

壯之多寡如赤腫紫黑者取蒜片三錢厚置瘡頂上  
著艾灸之三壯一換蒜片初灸覺痛以不痛似痒爲  
止初灸不痛以知痛痒爲止初灸全然不覺痛痒宜  
去蒜明灸之方能速潰艾數宜多有漫腫無頭者以  
濕紙覆其上視其先乾處置蒜灸之兩三處先乾兩  
三處齊灸之有一點白粒如粟四圍紅腫如錢者卽  
於白粒上灸之有陰瘡日數多者艾炷不及其事以  
蒜搗爛鋪於瘡上艾鋪蒜上灸之蒜敗再易以知痛  
甚爲効 癰疽流注鶴膝風等每日灸二三十壯頑  
疽陰瘡癩發等艾數必多宜先服護心散以防火氣



入內灸小兒先將蒜置大人臂上燃艾候蒜溫卽移  
於小兒毒上易艾照前凡腫瘍初起用此灸之一不  
開大二不內壞三易收口誠瘍科之首法也如七日  
已後毒已成形宜隨經絡取穴次灸之或騎竹馬法  
灸之或用錠子藥餅蠟餅等類灸之至真要論云陽  
氣湊襲寒化爲熱熱盛則肉腐爲膿是毒乃寒邪所  
傷艾火攻之求其本也

經曰陷者灸之陽症似不必灸也頭爲諸陽之首凡  
生瘡腫由亢陽所致灸之必加大腫痰動必灸腎俞  
穴發瘡由腎水枯竭而成灸之則火爍其源惡障則

死有元氣素虛瘡不高腫體倦神昏脉空虛浮散數而不鼓此內無真氣抵當火力灸之必昏潰而死世云艾火不傷人非通論也

分經絡取穴次灸法

手太陰肺經

少商穴 此穴宜刺不宜灸入前針法

手陽明大腸經

曲池穴 治胃疽及上部疔腫發背渾身瘡毒風

刺癰疹頑疥小兒丹毒并癰疽四肢拘攣歷節風

穴在肘外輔屈肘兩骨中以手拱胸紋盡頭陷者是穴

三門穴

治蜂窩疽

穴在手次指本節後肉側陷中又名少骨穴

肩髃穴

治乳癰乳毒乳岩

穴在肩端兩骨罅間陷者宛宛舉臂取之

有空是穴

一名肩井

穴足少陽陽矯之會

三里穴

治乳症膝症

穴在膝眼下三寸髌骨外廉內兩筋間舉足取之

偏歷穴

治顛疔

穴在手腕中後三寸陷中

足太陰脾經

神門穴

治脇癰

穴去大橫五寸在府舍下橫骨端約中動脈

商丘穴

治陰疽

穴在足內踝下微前陷中

箕門穴

治腹癰

穴在魚腹上越筋間陰股內動脈應手是穴

足大指端

治魚

即大敦穴在指甲裹中毛中



三陰交穴

治鶴膝襠疽

穴內踝上三寸骨下陷中

膝頂穴

治鶴膝風脚氣

此秘法也諸書不載

足陽明胃經

神授穴

治牙癰

二穴隨火太指上直去骨罅處起用患人手一跨此秘法也

缺盆穴

治鬢疽瘰癧

穴在肩下橫骨陷中

伏兔穴

治鬢疽

穴在膝上六寸起肉正跪坐而取之一云膝蓋上七寸以左右

谷三指按捺上有肉起如兔之狀故名之脉絡會也

犢鼻穴

治唇疽膝痛

穴在膝膕下筋陷中是穴形如牛鼻

梁丘穴

治流注

穴在膝上二寸兩筋間

踝骨尖

治疽着五指及霍亂轉筋

此秘法也

古雪堂藏板

手厥陰心胞絡經 胞絡乃包裹心之內也

郄門穴 治胸疽 穴在掌後去腕五寸

間使穴 治肘癰腋腫癭瘤疥癬 穴在手掌後三寸兩筋間陷中

內關穴 治銳疽癰癰合谷疔蛇頭疔 穴在掌後去腕二寸

兩筋間

合谷穴 治魚肚疔注節疔 穴在大指次指合紋盡處陷中

手少陽三焦經

四竇穴 治魚腮 穴在肘前五寸外廉陷中

天井穴 治癰癰柘榴疽癰毒魚腮五癰癰疹 穴在肘外大骨後肘上一寸輔骨上

兩筋又骨陷中屈肘拱胸得之

會宗穴

治肩疽

翳疽穴在臂腕後三寸空中一寸

腋門穴

治樂疽

穴在手小指次指間陷中握拳取

手少陰心經

少冲穴

治喉癰舌疔舌腫

穴在手小指內廉端去爪甲角如韭葉又

名經始穴

靈道穴

治氣癰

穴在掌後一寸五分

少海穴

治臄疽并癩癧不問腫潰及臂痛不能

伸齒齦痛爛齒寒頭痛胸風腋疽一名曲節

穴在肘內

廉後大骨外去肘五分陷中屈手向上取之

神門穴

治兌疽穿骨疽

穴在掌下銳骨端陷中



少商穴

治喉症宜針忌灸見針門

心俞穴

治喉毒懸癰穴在背第五推兩傍各開一寸五分

手太陽小腸經

支正穴

治侵腦疽穴在腕後五寸

陽谷穴

治鳳脣疽穴在手外側腕中兌骨下陷中

後谿穴

治黑疔穴在手小指外側本節後陷中坦拳取之

腕骨穴

治鼻疔穴在手外側腕前起骨下陷中

天宗穴

治頂疽穴在秉風後大骨下陷中

肩貞穴

治肩風穴曲胛下兩骨解間肩顯後陷中

掌後五寸五分

治馬口瘡秘法

足厥陰肝經

陰包穴

治咬骨疽

穴在膝上四寸股內廉兩筋間拳足取之看膝內側必有

槽中

膝關穴

治透腦疽

穴在犢鼻下二寸傍陷中

中都穴

治陰疽陽癰頑疔

穴在內踝上七寸筋骨中

蠡溝穴

治玄疽

穴在足內踝上五寸

章門穴

治氣癰

穴在直季脇肋端臍上二寸兩傍九寸側臥屈上足伸下足舉

臂取之一云肘尖盡處是

膝下外膝橫骨

治鶴口疽坐馬等癰

秘法

足少陽胆經

小十二

卷之二

三

古雪堂藏板

劍巨穴

治馬刀

穴在掌後三寸二分秘法

肘尖穴

治癩癧三次除根

取穴令患者端坐又手平胸肘後突出尖

骨是灼艾人須立於患人後因穴在後面內側小尖骨尖以指按之患處酸麻方是真穴此乃大肘尖之傍小肘尖仰手與小指對直者是也按此骨尖小指即麻為驗此穴與肩尖穴多取不真惟此取法最確故重表而出之宜珍之勿忽

金門穴

治癩癧

穴在掌三寸五分泌法

陽陵泉穴

治淵疽

此穴筋之會也專治筋病穴在膝下一寸箭外膝陷蹲坐

取

懸鐘穴

治附骨疽

穴在足外踝上三寸動脈中

膝眼穴

治鶴膝風

穴在膝頭骨下兩傍陷中



環跳穴 治腿股風居膠二穴認真攻委中毒血

更出盡愈見醫科神聖功穴在腓樞中則臥伸下足屈上足以手摸穴在

搖撼取之足少陽太陽之會也居膠穴在章門

下八寸三分監骨上陷中居膠在跳上一寸灸則

縮筋

### 足少陰腎經

陰谷穴

治心口疽

穴在膝下內輔骨後大筋下小筋上屈膝取之按之應手

築賓穴

治幽癰赫癰

穴在內踝上端分中

### 足太陽膀胱經

風門穴

治玉枕疽又能宣通背上諸陽熱氣一

名熱府穴

穴在背骨第二椎下陷中間兩傍相去春同身寸各開一寸五分正坐取之各

壯 炎七

心俞穴

治發背

穴在五椎下兩傍各開一寸五分

委陽穴

治五發

穴在足小脛中外膝兩筋間屈伸取之一云在承扶下一寸六

分屈伸取之

承扶在尻臀下

會陽穴

治腎疽血崩

穴在膝約文中央下三寸

崑崙穴

治附陰疽風疹風熱冷脾

穴在足外踝後跟骨上陷

中細脉 動應手

任脉經

此經會陰而行腹

百會穴

治龍泉疽虎鬚此毒

穴在巔頂中直平耳尖

督脉經

此經會陽而行背