

大德重校聖濟總錄卷第一百

療癰門

諸癰

諸癰



諸瘰癧諸病皆由風熱毒氣蘊積藏府搏於肝經所

論曰瘰癧諸病皆由風熱毒氣蘊積藏府搏於肝經所

致蓋肝主筋毒氣攻於筋脉故隨肌肉虛處停結而為

瘰癧多生頸腋間其狀結核累累相連或如梅李故謂

之瘰癧

治瘰癧諸病烏蛇丸方

烏蛇酒浸去皮骨炙白僵蠶微炒 大黃濕紙裹煨

昆布細剉斑貓糯米同炒令米黃去米不用

連翹各半乾蝦壹枚 芫青參對與斑

雄鴿屎緊淨者皂莢子壹佰枚揀圓熟肥好者

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七
丸加至十九茶清下空腹晚後各一服成瘡者不過
四十日內消乾其效皆勝於轉瀉及小便內取者

治諸癰瘰皂莢丸方

豬牙皂莢

染批參挺炮訖挺多或挺生並去皮部
壹處推破用溫水壹碗浸染晝夜每日

搽一編日滿去滓絹濾熬
至上半盞如糊入藥用

母丁香肆拾
玖枚

龍腦研

麝香研各
半錢

漏蘆去蘆
頭

紅娘子

去頭
翅足

蘇枋木節削

木通剉

滑石各壹
分

粳米少

右一十味除皂莢外搗研爲末都入皂莢汁中更和

寒食麩少許爲丸如菘豆大每服十九丸香水下空
心食前日三四服服時不得見日此藥內消不吐不

利也

治癰癩神妙追毒煎方

丁香柒
枚

麝香研壹
錢

葇若子伍拾
粒

雄鼠屎

柒粒兩頭尖者以麩兩
匙同炒令黃去麩用
檲皮叁斤去蘆皮
金屑細剉以

水貳斗煎取肆升濾過
重煎候成膏入諸藥

斑貓參枚去脚足
以糯米半合

同妙去

右六味除檲皮外搗研爲末煖檲皮煎令溫和諸藥
攪勻貯瓷器內每服三匙許空心以溫酒一盞調下

臨時更看人虛實及肥瘦加減斟酌用之服了仰臥
須臾即吐出若病根年深者如蝦蟇衣魚腸相似近
者若覘肉吐了以溫水漱口喫粟米淡粥補粳米亦
可

治漂癰鶴骨丸方

鶴骨炙酥

狸骨炙酥

獺肝炙

連翹

射干

玄參

丹參

木香

沉香剉

犀角鎊

羚羊角鎊各

升麻兩

甘草炙

丹砂研細

人參各

沙參壹分
右一十六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服
二十九空心米飲下加至三十九

治療癰六神散方

斑貓肆拾枚去頭翅足用

巴豆伍枚去皮

檳榔壹枚

蓬砂研壹分

麝香研半錢

膩粉研壹分

右六味搗研為散再同研勻用雞子清兩枚調和藥
末勻却傾藥入殼中濕紙糊合勿令透氣入飯甑內
蒸候飯熟取出藥暴乾細研如粉虛人每服半錢七

實人一錢匕並用炒生薑酒調下五更初服至平明
取下惡物如覺小腹內疼即時用商實燻灰入沒藥
等分爲散茶調下一錢引前藥入大腸其取下惡物
如爛肉是藥效驗

治療癰皂莢丸方

皂莢伍挺去皮用酥

乾薄荷葉

大黃剉

防葵各貳兩

膩粉少許

雞子貳枚煮

右六味搗研爲末別將皂莢五挺生椎碎以水一斗
採取汁羯羊肉半斤去筋膜以皂莢水熬成膏和藥

末凡如梧桐子大每服十九食前米飲下日二
治療癰諸方不差連翹湯方

連翹三犀角

黃耆剉

蔓荆實

青箱子生等

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓
溫服空心食前十日見效

治療癰烏犀散方

犀角鎊壹分

白花蛇酒浸去皮

青橘皮湯浸去白

牽牛子熟炒壹兩

右四味搗羅爲散每服二錢匕入膩粉一錢匕五更

初以粳米粥飲調下至辰巳間胸膈內作聲勿怪相
次如筋線連內結子下是病根也更候二十日再一
服永差

治瘰癧內消散方

芎藭兩

白殭蠶

直者炒

甘草

炙到各半兩

右三味搗羅為散每服一錢匕蜜水調下食後服日

三

治瘰癧神聖得效三神丸方

斑猫壹分

石決明壹枚

麝香研壹分

右三味先將前二味為末和粥麩少許搗成劑入麝

香再搗研丸如菉豆大每服五丸臨臥煎生薑湯下

治瘰癧蓖麻子丸方

蓖麻子

壹斤顆半生用半瓦內炒令烟起

礬石

壹兩瓦上鑿參伍沸放冷

研

黑豆

陸顆參粒生用參粒瓦上炒熟

右三味並不得犯鐵器一處細杵勻爛丸如皂子大
每服一丸鹽湯下婦人醋湯下不計時候

治瘰癧皂莢針散方

皂莢針

壹對不惡實半生子者

右二味取皂莢針於盆中燒候火盛時撒惡實於火
中燒候煙欲盡急以盆合之冷定取出搗羅為散每

服三錢七空心井華水調下數日復利下惡物如膠
錫永除根本利了三五日只可喫軟粥飯

治瘰癧內消牡蠣丸方

牡蠣

煨過為末參兩

皂莢子

貳升取白水浸壹宿

右二味先將皂莢子以水三升煮令爛取出入瓷盆
內研為膏入牡蠣末為丸如梧桐子大每服十五丸
空心溫酒下日晚再服

治瘰癧牡蠣散方

牡蠣

黃泥固濟煨取白為度參兩

甘草

炙剉壹兩

右二味搗羅為散每服二錢七空心點臘茶清調下

日三服仍用好皂莢一挺去皮分作兩截一截使米

醋半盞刷炙以醋乾為度一截焙乾烏頭二枚內一

枚炮一枚生炒糯米三十粒同為末再用醋半盞煖

動和勻成膏貼之

治項下生瘰癧不問新久有熱人可服清涼散方

龍膽

揀淨

右一味搗羅為散每服一錢七酒或米飲調下食後

夜臥服天陰日佳服

治瘰癧三物散方

紅娘子

陸拾枚不蚶者去翅足

大黃

兩

陳粟米壹合無即以
陳粳米代

右三味同炒令米黃爲度共搗羅爲細散初服一字
匕每日空心溫酒調下第四日後服半錢匕及五七
日覺臍下疼小便澀勿怪是藥驗也更服後藥女對

青橘皮湯浸去
白焙 虎杖等
分

右二味搗羅爲末以醋煮麩糊爲丸如菘豆大每服
五丸至七丸用青橘皮湯下與前散藥相間食後臨
臥服日二次用貼藥二十日
用名末再用醋半盞

貼瘰癧方

砒黃信州
者

我少英一匙去過心半兩磨一搗與米

右一味細研滴濃墨汁爲丸如梧桐子大於銚子內
炒令乾後用竹筒子盛每用時於所患處灸破或針
挑破將藥半丸敲碎貼之以自然蝕落爲度覺藥力
盡時更貼少許點眼
不出用黃豉草豉吞一錢

治療癰宗先服輕粉丸方末
用一匙
水一小盞

烏雞子

壹枚去黃取白盛於盞內用膩粉壹錢半
巴豆壹柴粒新者去皮心與粉同入雞白

內蒸熟取於乳鉢內研令勻細細用膩粉參錢匕
於手掌中以病人津唾調和合前藥爲丸如茅豆

煎水氣燥不將出風一
日深息發此藥

右每服五丸荆芥薄荷茶下黃昏時服至更如未
轉更以薄荷茶投之若腹痛先取下宿食六次第二

次以水盛取見病根惡物出也或患年深只可三度
轉出盡惡物其項漸小或大者先使線記轉了其項
旋小為驗不得出風一月日將息後用補藥

人參 玄參 白藥

苦參 各半兩

右四味剉細焙乾搗為麤末每服一錢匕水一小盞
煎三五沸去滓溫服如瀉不止用黃連乾薑各一錢
為麤末煎服不過三五服便止永差如瘡口未合用

後膏藥 對風竹筒一盞用紙包外濕熱灸過

坐拏草 半兩 商陸 十錢 或酥酥干大枝 燻干肉

右一味搗羅為細末用粟米少許將酒煮成稀粥瀝
取濃汁入前藥調勻為膏塗於帛子上貼之不得動
換瘡口永差

治瘰癧藥一宗先服托中散方用 玉眼藥 瘰癧瘻口生

黃耆 兩 剉 壹 甘草 微炙 半兩

右三味搗羅為散每日食後湯點服一錢匕日二服

次用取藥 此藥精製合口

外取瘰癧方

麝香 研壹錢 蟾酥 拾枚如松子大者 砒霜 研半錢

斑貓 拾枚去翅足炒末 龍腦 研壹錢

右五味搗研爲末用細白麩一錢以水和勻青黛爲衣每用相度瘡大小仍須灸三壯候瘡發用藥切宜少使

候取下病便用此藥淋洗瘡口方

五倍子兩

礬石兩半

右二味爲末每用二錢匕沸湯一碗調勻淋洗湯溫卽止每淋洗了用軟帛裹乾用生肌藥摻於瘡口上

治諸瘰癧方

右用極薄紙剪成四寸許片子以水銀膩粉各一錢用雞子一枚破之取自和膩粉等攤在四方紙上看

藥多少攤得若干片數仍於瓷牒中攤之藥勻爲度於日內曬不得見火候八九分乾和紙揭起細剪九成梧桐子大每片約作五十九丸用皂子人煎湯放溫下三九日服三服空心日午臨臥服之至第三日取下如鼈卵或如爛杏小鼠之形者乃是病源卽不動

氣

治瘰癧此胡湯方

芫胡去

荆芥穗

秦艽去

知母焙

當歸

桂皮去

藿香去

甘松去

敗龜炙

烏頭炮裂去皮臍

地骨皮

楓香脂

白芍藥各半兩

芎藭壹兩

苧根濕碎切

右一十五味並淨洗暴乾搗為麤末每服三錢匕以水一盞入生薑三片大棗一枚擘同煎七分去滓溫服早晨午食後夜臥各一服

治瘰癧散毒湯方

連翹

射干

玄參

芍藥

木香

升麻

梔子人

前胡去蘆頭

當歸切焙

甘草剉微炙

大黃剉微炒

芒消研各等分

右一十二味除芒消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半入芒消半錢匕同煎至八分去滓溫服早晚食後

各一

治瘰癧遠項如連珠連翹丸方

連翹

防已

羌活去蘆頭

木香

梔子人

芍藥各參兩

玄參兩

大黃壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫水下食後

治熱結瘰癧遠項滋蔓連翹丸方

連翹

羌活

去蘆頭 各壹兩

芍藥

木香

防已

大黃生

梔子人生

犀角

屑各壹兩

玄參

壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸食後米飲下

治熱毒風毒結成癩癧勝金散方

斑貓

半兩去頭翅翅炒

豆黃末

炒壹合

糯米末

炒壹合

甘草

壹中指節許半生半炙

膩粉

研壹分

右五味搗研為散拌勻空心以米飲調下五錢匕當

吐瀉下惡物煮糯米粥補之

治風毒癩癧祛風丸方

皂莢

參拾挺拾挺火燒欲過拾挺塗酥去皮子拾挺水浸盡去滓取汁隔下瀉用

何首烏

蒸半

乾薄荷葉

玄參

各肆兩為末

治風精羊肉半斤丸

右五味以皂莢水煮肉使爛細研和藥為丸如梧桐

子大每服二十九空心溫酒下薄荷湯亦得

治癩癧內消散方

人參

兩半

滑石

各半兩

丹砂

研壹分

斑貓

肆拾枚去頭足糯米炒

麝香

研半錢

右五味搗研為散每服二錢匕溫酒調下

治瘰癧禹餘糧飲方

禹餘糧粉研壹兩分
作兩貼

甘草壹兩半生
半炙椎碎

膩粉研半分
作兩貼

右三味先將甘草半兩以水一升煎取半升調禹餘糧末并膩粉各一貼空心頓服當瀉下惡物未愈再

服瀉後以薤粥補之

治風毒熱毒結成瘰癧內消羌活散方

羌活去蘆頭
壹兩半

白僵蠶壹兩

右三味搗羅為散每服四錢匕空心蜜酒調下臨臥

再服

治風熱毒氣結成瘰癧內消浸酒方

仙人放杖草根并苗壹斤羌活去蘆頭日乾

白杏仁去皮尖炒研為末

右三味將前二味細剉入研杏仁以醇酒一斗於瓶

內密封七日後取開每日空心煖服一盞臨睡再服

治熱結瘰癧大薊根散方

大薊根壹斤

右一味搗羅為散每服三錢匕食後溫酒調下日再

治瘰癧鯽魚丸方

右取鯽魚長三寸者去腸以和皮巴豆填滿腹中麻

皮纏以一束稗草燒煙盡研細粳米粥和丸如菘豆
大每服一丸粟米飯飲下未利加一丸以利爲度每
日以此爲准盡劑乃安病甚破者見效尤速
治風熱毒氣結成癩癰內消方

小麥淘淨

右一味煮三五升頻喫卽愈

諸癩

論曰癩有九種曰狼癩者由大怒傷陰氣上而不下所
致也曰鼠癩者由飲食之間有蠱鼠餘毒所致也曰蠛
蛄癩者因食果蔬并蠱噉之所致也曰蜂癩者因倦飲

水卽得蜂毒所致也曰蚘蟬癩者因中寒毒腹中臃脹
所致也曰蟻螬癩者恐懼憂思哭泣不止所致也曰浮
疽癩者悲結馳思往返變化所致也曰轉脉癩者大醉
驚嘔轉側失枕所致也癩癰癩則癩癰諸證論之爲詳
其名其證雖則不同然皆由飲食居處不慎憂思恚怒
或衝冒寒暑或勞傷血氣邪毒蘊結留滯血脉久而不
去故爲癩也巢氏又載三十六種之多而自謂其方不
可次第至其論病源則與九癩亦大同小異故不復類
今有可以一方兼治諸證者集之於前餘各隨其病名
附之于後

治諸瘦蝟皮散方

蝟皮炙焦半枚

蜀椒去目并閉口炒出汗當歸焙

露蜂房炙焦

地榆醋炙各分

斑貓去足翅糯米炒

蛇蛻炒到

烏賊魚骨去甲

葛上亭長去足翅糯米炒

各半兩

鮫鯉甲炙焦肆兩

蘭茹兩

細辛去苗葉半兩

樗雞肆枚炒

蜈蚣去頭足炙壹枚

蜥蜴去頭足炙壹枚

薏苡人

乾漆炒煙出

蒺藜子炒去角

桂皮去麤

漏蘆去蘆頭

木通剉

附子炮裂去皮臍

牡丹皮

龍膽

土瓜根各分

鶴骨酒炙

治諸瘦骨酒

雄黃研

蛇牀子炒

大黃剉 苦參各兩 正火

右三十味搗羅為散每服二錢匕空心用溫酒調

下日晚再服漸加至三錢匕

治九種瘰癧青丸方太中白煎

芫青炙 地膽

斑貓參味並去頭足翅糯米炒

諸毒各拾 蜈蚣去頭足炙壹枚

生犀角屑

黑牛黃研各出盡 鼓心肆拾玖粒

黑豆黃拾粒

右八味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大欲服藥隔宿

少食物明旦空心酒服三丸須臾煮醋飯及漿水薄

粥稍稍飲之其瘦蟲各有形狀從小便中出至日西時再煮粥食之若人強盛隔日一服怯弱隔三日一服以瘡差蟲出盡為度

治諸瘻葛上亭長丸方

葛上亭長 地膽

斑貓參味並去頭足翅糯米炒

治諸瘻斑貓散方

斑貓去足翅糯米炒 真珠研 檳榔到貳枚

右八味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每日空心溫酒下三九日晚再服漸加至五九

酒下三九日晚再服漸加至五九

治諸瘻斑貓散方

斑黃

斑貓

斑貓去足翅糯米炒 真珠研 桂皮去麤皮 兼新熟土

水銀與衆藥研令星盡各半兩 葛上亭長去足翅糯米炒

柴本白史

右五味搗研為散每服半錢匕米飲調下空心午後

服小便有所出即差

治諸瘻腫芫青散方

芫青 斑貓 葛上亭長參味並去足翅

糯米炒各拾枚 桂去麤皮壹兩

右四味搗羅為散每服半錢匕空心溫酒調下日晚再服更宜灸陽明絡脉在肩前甲頭二寸陷中有青

脉是正上向臥交兩臂勿令開乃夾取之灸隨年壯即差

治諸瘻久不差烏藥膏方

烏藥未貳兩

豬膽參

右二味以膽汁和烏藥末令勻以薄綿裹內瘡口日

三五度

治諸瘻槲皮膏方

槲木白皮細切伍斤

右一味以水二斗煎至三升絞去滓重煎令成膏每日空心服半棗大漸加至一棗許日二服兼傅瘡上

日三兩度

治久冷瘻瘡癩瘰癧痔毒疼痛生肌丁香膏方中藥蘆壺

丁香參

沒藥

安息香

麝香研

當歸末

乳香末

附子去皮

桂去皮

雄雀尿肆

蕪荑入兩

鉛丹參

油捌

右一十二味除麝香外並剉碎先熬油令沸下諸藥

煎候附子黃赤色以綿濾去滓下鉛丹柳篋攪候色

黑滴水內成珠子得所入麝香攪勻以瓷合盛用故

紙帛上攤貼日再換取差

治諸瘰癧癰陰偏腫堅或發潰膿血不絕蝟肝膏方

蝟肝炙令熟 貳兩

芍藥

芎藭

細辛去苗葉 各半兩

羊膈脂伍兩

當歸切 黃芩

蠟去黃連去須

黃芩去黑心

松脂各壹兩

右一十味除羊脂蠟松脂外搗羅為末先熬脂令沸

下蠟松脂銷鎔即下諸藥末攪令勻以瓷合盛塗瘡

上日三度換

治諸瘰浮核不盡及諸惡瘡癰疽息肉在肌中藜蘆塗

傅方二兩

藜蘆以雞子參枚取 白塗炙令乾

蘭茹各壹兩

雄黃研貳兩

右三味搗研為末塗傅息肉上日三五度即差

治瘰瘡腫地鼈散方

乾地鼈末

麝香各研少許

右二味研勻乾搽或貼隨乾濕治之

治一切冷瘰虬蟲散傅方

人吐出虬蟲

右一味燒灰細研為末先以甘草湯洗瘰後取末傅

瘡上日三五度即差

治鼠瘦黃者散方

黃者劉

白礬燒

附子炮裂去皮

明各半兩

當歸焙切

防風去

栝樓根

芎藭

黃芩去黑心

狸骨酒炙

甘草炙各兩

大黃炒劉

乾薑炮

細辛去苗葉

露蜂房炙各兩

斑貓

芫青貳味並去翅足糯米炒各伍枚

右一十六味搗羅為散每服一錢七空心溫酒調下

日再服

治鼠瘦瘰癧寒熱狸骨散方

狸骨酒炙壹分

躑躅炒

龍骨炙

王不留行

當歸焙切

土瓜根焙切

鼠姑各半兩

右七味搗羅為散每服二錢七食後溫酒調下日晚

再服

治鼠瘦發起無頭尾如鼯鼠使人寒熱脫皮此得之大鼠毒不去其根在胃鯪鯉甲散方

鯪鯉甲炙焦

龜甲醋炙

甘草炙

桂皮去麩

雄黃研

乾薑炮

狸骨酒炙各半兩

右七味搗研爲散每服二錢匕溫酒調下日晚再服
又法以蜜爲丸內瘡中日一度易之

治鼠瘻犀角散方

犀角銜壹兩半

斑貓去足翅糲米炒拾肆枚

雄黃別

桂去蠟皮各壹兩

右四味搗研爲散每服半錢匕溫酒調下空心日服

治鼠瘻外正膏方

死貓兒骨

酒和醋炙壹片參寸長

皂莢

去皮子醋炙壹挺

木鼈子

去殼生用貳柒枚

重粉

半錢匕研

右四味搗研爲末每用三錢匕用米醋熬成膏傅之
如一兩日未效即用溫酒調下二錢匕服畢衣被蓋

出汗卽差

治鼠瘻仙人杖散方

筍黑死者

取壹兩燒灰存性

甘草

炙爲末參分

麝香

別研半分

右三味一處研細分作六服每服臨臥時溫酒調下

治鼠瘻方

蜚螂

燒存性細研

右一味用醋調如糊先以鹽湯洗瘡塗傅日再易

治諸瘻消消出膿血疼痛日夜不止漸加羸瘦宜服此方

赤小豆

白欬

牡蠣燒赤
細研

黃耆各等分

右四味搗篩為散每服三錢匕酒一盞半煎至一盞去滓不計時候

治諸瘻膿血不止方

新生兒尿不以多少

右一味取置密器中五六日取塗瘡孔中不四五上差

治諸瘻下血不止肌體黃瘦四肢無力宜用雞子方

雞子參

右一味以米下蒸半日取出用黃炒令黑色先拭瘡汁令乾以藥內瘡孔中即差

治蟻瘻鯁鱗塗傅方

鯁鱗燒
灰

右一味研細以醋調如糊塗傅瘡上日三五度即差又方

蟻蛄

右一味以酒研細塗傅瘡上日三五度即差

治此蜂癩始發在項如患傷寒此因喫食中有此蜂其根在腎礬石散方

白礬燒令汁枯半兩

李白皮

桃白皮

獨活去蘆頭

知母焙

生乾地黄

雌黃研各壹分

蝟皮炙焦

白朮各參分

蜀椒去目并合口炒出汗壹佰粒

青黛研

斑猫去足翅糯米炒

白芷

柏枝

芍藥

海苔

當歸焙各壹分

右一十七味搗研爲散每服一錢匕空心溫水調下

口三

治五癩下血疼痛裏急不可忍蝟皮丸方

蝟皮貳兩炙令焦黃

槐子人貳兩微炒

龍骨貳兩

柵葉壹兩微炙

乾薑半兩炮裂剉

熟乾地黄壹兩

當歸壹兩剉微炒

茜根參分剉

附子壹兩炮裂去皮臍

芎藭半兩

檳榔壹兩

黃耆壹兩剉

吳茱萸半兩湯浸染福焙乾微炒

石一十三味搗羅爲末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧

桐子大食前以粥飲下三十九至四十九日三

治五癩出血疼痛久不差硫黃散方

硫黃兩

蛇黃壹兩金星者火燒令赤碎

白礬壹兩

鰻鱺魚頭壹枚

鯽魚大者壹枚 肚取却

賜却入肆味藥安腹內以散麻皮纏縛泔泥裏之候乾入炭火上燒令煙盡取出去泥

右五味細研如粉每服三錢匕食前以粥飲調下日

三

空青散方

空青研

當歸切焙各半兩

細辛去苗葉

乾蝟肉壹方用皮炙令焦

枸杞根去黑皮

斑貓去足翅糯米炒

白朮

地膽去足翅糯米炒

白礬燒令汁盡各壹分 乾烏腦脂參大豆許

右一十味擣研為散每服一錢匕空心用漿水調下

日晚再服病在項則舒臥令頭處低足後高使藥易

行速差

治蚯蚓瘦鴨脂膏方

鴨脂參兩

胡粉貳兩

巴豆去殼細研去油盡半兩

右三味先鎔脂入二味末調如膏每日三五度塗瘡

上卽差

又方

胡粉不限多少

右一味用豬脂和調塗摩瘡上日再塗卽差

治蛇瘦蛇蛻膏方

蛇蛻壹條 燒灰

右一味細研用豬脂調塗日三上即差

治浮疽癰始發於頸如兩指使人寒熱欲臥得病之由因思慮憂怒其根在膽石中黃子散方

石中黃子

乾薑炮

續斷

決明子

甘草炙

地膽

去頭足起炒壹分

龍膽

菴藷根各半 兩

大黃

半

細辛去苗葉 半兩

右一十味擣羅為散傅瘡上日四五度即差

治瘦瘡十餘年不差神助散傅方

檳榔

黃連

去須

右二味擣羅為末先用活鱧魚一條擲於地候鱧困

盤屈以竹鍼五七枚貫之覆瘡良久取視當有白蟲

數十如鍼著鱧上取去復覆之如此五六度即已用

藥量多少覆之

大德重校聖濟總錄卷第一百二十七

此症之起或因
久患風寒白濕
或因勞傷
或因飲食不節
或因房事過度
或因憂思過度
或因勞心過度
或因勞力過度
或因勞神過度
或因勞氣過度
或因勞血過度
或因勞精過度
或因勞神過度
或因勞氣過度
或因勞血過度
或因勞精過度

大德重校聖濟總錄卷第一百二十八

癰疽門

石癰

附骨癰

癰內虛

久癰

乳癰

癰疽統論

論曰周官瘍醫與疾醫分職而異治凡有瘍者受其藥焉蓋非專門之學不足以深究博識故也人之氣血與天地同流經絡常數與晝夜同度一或壅而不通沮而不行則血老不作汗肉陳不脫垢蒸氣不達癰疽內熱甚於焚溺之患治之不可緩是以喜怒憂樂之不時飲食居處之不節芳草石藥之發動內使陰陽不平而蘊結外使榮衛凝滯而腐化輕者起於六府浮達而爲癰外潰膚肉經所謂榮衛稽留於經脉之中血滯不行衛氣壅遏不通熱盛則肉腐爲膿然不陷肌膚於骨髓骨

髓不爲燥枯五藏不爲傷損其皮薄以澤是也重者發於五藏蘊蓄而爲疽內消骨髓經所謂熱毒熾盛下陷肌膚骨髓燥枯五藏涸竭當其病下良肉無餘其皮夭以堅如牛領然是也夫瘡腫之患莫大於癰疽明乎二者則凡腫毒丹疹可以類推矣故證有淺深治有輕重若瘡發之初湯液疏其內鍼石疏其外內外之治不同也五藏內虛則平補內實則駛利補寫之法不同也瘡發於虛處則難差發於實處則易愈則其生有虛實之辨富貴體逸危殆者多貧賤形苦困篤者少則其形有苦樂之辨淺瘡欲在厚處攻之易平深瘡欲在薄處達

之易及則肌肉皮膚有厚薄之辨脈見洪滑癰散其病難治脈見微澀遲緩其病易治則脈之與病有應否之辨凡癰之類其氣浮達宜灸熨而不宜鍼烙凡疽之類其氣深沉宜鍼烙而不宜灸熨此灸熨鍼烙之異也淋射熯貼以消腫毒膏潤溫養以生肌肉此先後終始之序也昔人論癰疽病者惑於人神所在不可妄行鍼刺見血不知神之與形同爲休戚體既不平神烏能定內經謂癰疽不得頃時回恐內爛筋骨穿通藏府豈有人神之忌耶

療疾所向吉凶方

三月七月十一月不得向西方治病

四月八月十二月不向南方治病

正月五月九月不向東方治病

二月六月十月不向北方治病

凡治病將患人行年本命筭與生氣天德福德合者往之必差仍須與生氣人看侍患者吉占病色候上面法凡患人目中赤脉從上下貫瞳子者一脉一年死二脉二年死若脉下者瘵之必差又曰患人面忽有赤色之多貫上下如脂有赤色從額上下至鼻又黑色出額上大如指及連鼻上至肩又有赤色垂者並為死候不可

瘵

論癰疽所生忌穴

背面九處不可患瘡

第一入髮際為玉枕亦為舌本

第二項頸節

第三為崇骨

第四大椎為五藏

第五脊骨兩邊肺俞穴

第六夾脊骨兩邊肝俞穴

第七脊骨兩邊腎俞二穴

第八後心鳩穴

第九鳩尾骨穴

正面五處不可患瘡

第一喉骨爲垂膚

第二當胸前爲神舍

第三爲心鳩尾

第四當兩乳穴

第五臍下二寸爲腸屈之間

側面二處不可患瘡

耳下近耳後牙車尖中央陷中爲喉脉一穴當膊下一

穴爲肩骨

承山上三寸一穴爲臑腸

辨癰疽證候美惡法

夫癰疽外發其理易明至於內癰內疽隱而不見目既
不接治之至難然五藏六府有俞募雖結固於中而自

形於外外察其部內審其源定藥投方若按芒刺然則

癰疽之發有五善七惡之證不可不察也煩躁時嗽腹

痛渴甚或泄痢無度或小便如淋一惡也膿血大洩腫

嫩尤盛膿色敗臭痛不可近二惡也喘羸短氣恍惚嗜

睡三惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者

四惡也肩項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色脫唇鼻青赤面目四肢浮腫七惡也動息自寧食飲知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清亮四善也體氣和平五善也然病有證合七惡皮急緊如善者病有證合五善皮緩虛如惡者非淺識之所知若五善併至則善無以加也若七惡併至則惡爲劇矣今載證候并諸俞募以申明之凡五藏六府募中府隱隱而痛者肺疽也上肉微起者肺癰也中府在雲門下壹寸陸分乳肋間動脈應手階巨關隱隱而痛者心疽也心上肉微起者心癰也

巨關壹穴在鳩尾下壹寸是期門隱隱而痛者肝疽也上肉微起者

肝癰也期門壹穴在第九肋傍章門隱隱而痛者脾疽

也上肉微起者脾癰也章門壹穴在季肋端京門隱隱

而痛者腎疽也上肉微起者腎癰也京門壹穴在期中

管隱隱而痛者胃疽也上肉微起者胃癰也中管壹穴

在上管下壹寸天樞隱隱而痛者大腸疽也上肉微起者大

腸癰也天樞壹穴在臍兩傍丹田隱隱而痛者三焦疽

也上肉微起者三焦癰也丹田壹穴在臍下貳寸

關元隱隱而痛者小腸疽也上肉微起者小腸癰也關元

壹名液門在臍下叁寸右驗其所募依據此審定癰疽淺深病

從何藏腑發先會食何乳石又驗其氣虛實叅詳而療之

癰疽叙療諸法

凡癰疽癰初生皆只如粟黍粒許大微似有痛痒或觸破之卽焮展初覺有之卽須速服犀角湯丸及諸冷等藥取通利踈暢腑藏兼以湯水淋射滌其壅滯瘡頭塗石藥四畔貼熲藥折其毒勢如此將理覺不退是熱毒稍堅卽停用湯水淋射精意辨之定是癰疽便當上灸之若是疽則審按候其淺深燒針烙之於紐上塗止痛引膿膏紐之兼以膏塗帛貼之常令開潤勿令燥也四

畔貼熲藥夫血脉喜溫而惡寒若着冷氣過理迫之卽血滯難差若已成大膿者兼瘡中有惡肉卽須用豬蹄湯洗之傅藺茹散等蝕其惡肉候爛肉欲盡卽貼生肌膏藥及飲食慎忌寢臥居處觸事抑情克意將理至辨癰疽宜灸不宜灸法

凡癰疽發背初生如黍粟粒許或痒或痛覺似有卽用湯水淋射兼貼藥熲之經一兩日不退須當上灸之二百壯如菘豆許大凡灸後却似焮痛經一宿乃定卽火氣下徹腫內熱氣被火導之隨火而出也若能於瘡頭四邊相去各一寸已來更花灸尤妙其瘡若只痒卽

宜隔鼓餅灸之其鼓餅須以椒薑鹽葱相和爛搗捏作餅厚薄如三錢已來當番頭鼓餅上灸之若覺大熱卽微取起少頃再安只灸七壯而已鼓餅若乾更換新者尤佳若痛卽須苦灸仍壯數唯多爲妙若是痘卽不宜灸夫痘初生形如瘡癰頭白焦枯氣本深沉治者既不精辨亦便灸之或癰疔成膿之後亦令灸之皆能害人初灸三壯不覺痛者爲上肉已天其下膿深及至數壯之後焮痛必倍爲熱氣益盛膿伏內攻之火灼其外轉增毒甚不可不知也灸所忌穴具載於後

頭維

在額角髮際神傷壹寸

承光

在頭上伍處是

神庭

在髮際直鼻上

承泣

在眼下梁分直瞳子陷中是

絲竹空

在眉後陷中

膺窻

在胸下壹寸

腦戶

在枕骨間後壹寸

脊中

在項後髮際

宛宛

在項後髮際

脊中

在項後髮際

三陽絡

在臂上壹寸

下關

在耳前動脈是也

耳中

禁不灸

迎香

在頰大脈應手伏合者三兩

石門

在臍下貳寸

伏兔

在臍下肆寸

太地五會

在足小指次指本節後

伏兔

在臍下肆寸

右件穴據鍼經並禁不可灸或於上出瘡癰亦不得便灸且以諸方法及湯水注射并用諸藥燻之若已

成膿卽須鍼烙出之爲其內已有膿縱鍼烙出之卽
並無妨其經入瘦卽用硫黃灸之

灸法

右用硫黃一塊隨瘡口大小安之別取少許硫黃於

火上燒之以銀釵脚挑之取焰點硫黃上令著三兩

徧取膿水以瘡乾差爲度

辨癰疽宜鍼烙不宜鍼烙法

夫癰疽者頭少腫處多出膿不快者宜鍼烙膿未盛已
前不可不以諸藥貼熈救療以安病者之心膿成卽當
棄藥從鍼烙也旣至膿成卽當決意不可疑懼痛頃刻

之間以至內潰古今同斃斯疾十有八九深識之士當
斷法就夫患癰疽已成結腫須有出處療之無不鍼鍼
無不差未有不鍼不刺而差者未有鍼刺及時而不差
者夫痛之極也衆熱聚攻膏膜爲之腐爛肌肉爲之敗
潰內通貫藏府若不鍼烙決潰熱毒無從而解膿瘀無
從而洩或過時不鍼卽反攻於內內旣消敗欲望其生
豈可得乎則鍼烙取差實爲良法疑而不決爲必死之
患或隱諱此疾或懼痛不鍼此神奪其識死期將至癰
則皮薄宜鍼疽則皮厚宜烙古法無烙唯鍼刺烙卽
火也亦謂之烙鍼却刺以其有却病之功也今用烙法

多差殊穩妙於鍍鐵法本用鍍鐵烙法當用火鉞如似
火筋磨頭令尖如棗核團滑用燈焰燒須更火作炬數
蘸油燒令赤皆須近下面烙之一烙不透卽再烙之令
透若其攻稍廣卽須散烙數處並令透則氣疎達膿水
易出不假按抑實者撚髮爲絛虛者以紙爲絛塗引膿
膏藥絛之兼以膏藥貼之常令開潤勿令急燥若其人
羸瘠勿頓出膿徐徐令出癰疽廣大膿潰肌者懼一時
之痛不肯四畔多下鍼烙唯開三兩處而已欲望早愈
不亦難乎常見有開腫者不審淺深所烙或當時無膿
經宿方潰或下鍼不出別處生頭或抑擦焮動益加損

疼真氣轉傷經云病淺鍼深則氣血伏沉若病深鍼淺
則毒氣不洩反爲大癰也如務求速差腫內餘膿及膿
根未盡便令瘡合後必再發諸發腫都輒而不痛者卽
並宜鍼烙若發於背者卽須用水角乃得痊愈
辨癰疽宜水角不宜水角法辨癰疽宜水角不宜水角法
凡癰癰疽發背腫高堅鞭膿稠焮盛色赤者宜水角凡癰癰疽發背腫高堅鞭膿稠焮盛色赤者宜水角
下肉色不變輒慢稀者不用水角角法於寬靜室中不
當風處平實地掘一小坑口稍闊於瘡重深一尺已下
去此坑三尺外又爲一坑子口闊三四寸傍穿兩坑會
相通灌水並令去坑面二寸於地上腰背下先鋪油單

三兩重辟地氣卽以席薦東西鋪坑口兩畔令患者以
瘡合坑上無令偏側腰間布氈褥務令安穩則得久角
角口兩畔以繪帛遮擁兼蓋覆水坑口勿令通泄熱被
水引下滲地中臥一炊久爲度瘀滯膿血並洩角中熱
盛者日夜三四徧腫氣不侵每日或兩度亦得候其毒
解熱退水角方止中間以藥燴之熱毒及癰託命在醫
宜用意惻怛心機百變如愛己身始可濟人凡看疾之
人尤須安靜或有言中旁觸遂使患者驚疑至於庸醫
昧於深理就施鍼艾尤不能精用水角則太早以火攻
則稍遲何者疽之萌生而用水角則內熱毒畏冷逼之

却人腠理皮肉堅厚毒氣內堅肉變爲膿以致內潰深
可哀也疽之已成而乃火攻則火毒相擊令人煩悶加
其虛憊可不慎乎或富貴之人遭遇此疾多貯水銀以
爲水角尤妙用水銀角法右揀穩實地穿一坑口稍闊
於瘡腫處深可四五寸先於坑中布紙五六重糊水銀
諸餘鋪設一依前方其水銀多至一升已來如無只三
五合亦得

石癰

論曰人之氣血得熱則淖澤得寒則凝結石癰者寒氣
凝結致熱氣不得散故其腫毒覈實如石之狀而謂之

石癰治宜溫調榮衛散其寒邪使氣得陽而外發則膿血出而腫鞭自消

治石癰久不差黃耆當歸散方

黃耆剉拾兩

當歸切焙別兩

右二味爲散每服三錢匕溫酒調下不計時候

治石癰結聚腫硬熱痛藏府祕泄木香丸方宜附木地

木香兩

檳榔剉分 芎藭一其口餘

羌活

去薑頭各半兩

大黃剉炒 附子炮裂去

人參

各半兩

枳殼去瓤 牽牛子炒令香

陳橘皮湯浸去白

肉桂剉 肉蓯蓉剉

右一十味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大貯以瓷

合每服三十九空心粥飲下通利爲度如未利加至

四十九

黃耆

去

黃耆

治石癰皮色紫赤惡寒壯熱一二日未成膿者下之升

淋湯方

升麻

連翹

大青各壹兩

生地黃

焙貳兩

大黃剉炒

敗醬

絡石

白飲各半兩

玄參壹兩

右九味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分更

入芒消末半分去滓空心溫服微利爲度

治石癰已服前升麻湯後用木香散塗貼方

木香 各一分 大黃 剉 一分 升麻 煎至八分

白欬 芒消 一分 赤小豆 各半

右六味搗羅為散以榆白皮汁入水少許調和如糊

塗故帛上貼日二 大青 一分

治石癰結實已壞未壞占斯散方

占斯 一分 厚朴 去皮 薑汁炙 一分

生乾地黄 焙 栝樓 乾者 去皮 敗醬

防風 去 桔梗 剉 炒 人參 未味 炙

細辛 去苗葉 各一分 桂 去皮 一分

右一十味搗羅為散每服食前以溫酒調下二錢匕

治石癰腫毒結鞭疼痛口乾煩熱四肢拘急不得臥沉

香湯方

沉香 分 地骨皮 麥門冬 去心 焙

當歸 切焙 各一分 大黃 剉炒 一分 升麻 壹分

木香 分 玄參 枳殼 去穢 炒

羚羊角 銹 獨活 去蘆 頭 甘草 剉

赤芍藥 各壹分 防風 去分

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓不計時候溫服

治石癰熱毒氣盛腫靨疼痛口乾煩悶犀角湯方

犀角鎊參

連翹

射干

梔子人

升麻

當歸切焙各壹兩

大黃剉炒

木香分

枳殼去炒

赤芍藥

甘草生

玄參各壹兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓不計時候溫服

治石癰地黃煎方

生地黃淨洗

右一味剉碎搗研絞取汁入銅器內盛安湯上煮柳

篋攪勻如糖以瓷合盛每日空心取如一彈子犬溫

又酒調服日午晚間再服

治癰疽堅如石核鹿角散塗方以日三五次

鹿角燒

白欬各壹兩

麤理黃石伍兩燒令赤色投酒中再燒投醋凡柒編

右三味搗羅極細以醞醋調如糊塗傅腫上乾卽易

治癰疽結靨未成膿凝水石散貼方

凝水石

黃藥

黃耆剉

黃連去須

大黃

石膏

梔子人各半

白欬壹兩

右入味搗羅極細以漿水調如糊攤故帛上貼患處

乾即易

大凡

不膏

又塗鹿角泥方

黃藥

鹿角

鹿角

未化者入酒中煮之

右於石上用水磨令如泥塗患處日三五次薄即愈

又塗半夏方

中研細末以酒調服

半夏

壹兩

白煆

右為末以新水調如糊塗患處日三五次

又塗葇荳子方

與四再煎

葇荳子貳以酒合溫每日空心煎破一戰于大盛

其右為末以醋調如糊塗患處乾即易

又塗葵莖灰方葵莖灰以毒藥入留於內者必宜快煎

葵莖灰

梁上塵各壹兩

右二味為末以醋調如糊塗腫上日三兩次

又塗蛇蛻方

蛇蛻三五次

右燒灰細研以醋調塗腫上乾即易亦可只以蛇皮

貼之經宿即差

桑葉白芷

又塗商陸根方

生商陸根半

上細文其味長者為商陸根

右爛膏攤故帛上貼之乾即易并治諸瘻瘡癰

又塗蜀漆方

蜀漆

乾者半兩

桑根白皮

兩

右二味爲末每用量多少以銕牛皮膠并酒調和傅

腫處日三五次

附骨癰

論曰凡身體盛熱不可膏風蓋風冷之氣入於肌肉則熱氣搏伏不得出故附着於骨而成癰也其狀無頭但腫而闊皮膚薄澤者以毒氣伏留於內故也法宜外散其寒內達蘊熱乃得本標之治

治附骨癰結核脹水腫痛心腹氣滿五香連翹湯方

木香

獨活

去虛

射干

連翹

各參

甘草

炙

桑寄生

炒

三升麻

沉香

雞舌香

乳香

研各兩

大黃

剉微炒

麝香

研

右一十二味除研者外麝搗篩再入麝香乳香同研拌勻每服五錢匕水一盞半煎至八分下竹瀝半合

濾去滓空心溫服快利爲度未利再服

治附骨癰生股上伏肉間淋煤貫衆湯方

貫衆

地骨皮

穀精草

枇杷葉拭去毛炙 荆芥去梗 蜀椒去目并合口者各壹兩

右六味麤搗篩以水三升煮取二升和滓淋煤蘸布

帛揚之速効

治附骨癰腫根在臧府蛇皮散方

蛇皮二升 露蜂房各壹兩 亂髮各半

右三味並燒灰存性研細每服一錢匕温酒調下日

三服

治附骨癰金石凌法

梔子人半 犀角屑 麝香研各半兩

桔梗剉炒貳兩半 石膏推碎 寒水石推碎各肆兩

木通剉 甘草炙 鬱金剉各貳兩

青木香剉壹分 朴消研肆斤 金貳拾兩

右十二味除朴消麝香外先將寒水石石膏金以水

二斗於銀器內慢火煎至一斗次下前犀角等草藥

七味再煎至五升以生絹濾去滓下朴消以柳木篋

攪勿住手候稍凝即住火入麝香拌令勻盛密器中

每服一錢匕新水調下老小加減服

治附骨癰蜜陀僧散方

蜜陀僧 自然銅各半 杏人去皮尖雙

右三味用苦竹筒一枚入藥在內紙封筒口慢火煨

候竹筒黃色取出研極細看瘡腫大小用藥以新汲水調勻用雞翎掃藥塗癰上甚者不過三七日効

治附骨癰牛膠散方

牛膠

黃明者慢炙令燥

甘草

用水煮盡藥炙水盡到各

兩半

右二味搗羅為散每服二錢匕濃煎木賊湯調下空心服復取藥末以井水調膏看瘡大小攤紙貼之藥

治附骨癰槲皮散方

槲皮

參兩燒令煙盡

林檎

金

右一味細研為散每服二錢匕空心米飲調下日晚

宋再服入火公斷藥燒過藥料不取也

治附骨癰方

新鼠皮

張美謝謝鼠血蘇蘇不長復正謝之尿

右一味看瘡大小裁貼日二次若出膿已潰者用豬

脊脂貼吮膿出盡即差

治附骨癰甘草湯方

甘草

炙貳兩

露蜂房

兩

右二味並剉以水五升煎至三升去滓以故帛二片

浸湯中更互洗瘡上日三兩度即差

治附骨癰方

蓖麻子 去殼不
拘多少

右一味研令細取塗癰上日三兩度即差

治附骨癰方 以水正代以生三升去滓以葱白二升

生地黄 取汁
壹盞

右一味銀石器中煎如膏候冷塗傅腫上日三五度

即差 胡... 出... 唱... 差

癰內虛 會大小癰濕日二六法出艱已膏者狀

論曰癰內虛者榮衛腐為膿血經絡不足則五藏之氣
虛乏也其證多生虛熱而心神為之驚悸以癰熱不散
乘虛而入又心獨惡熱故驚悸不定也

治癰潰膿太多裏虛熱茯苓湯方

麥門冬 壹兩
土心 散

白茯苓 去黑皮
參分 黃耆 剉壹
兩半 芎藭 壹
兩

桂 去蠹皮
參分 麥門冬 去心
焙 五味子 各壹
兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分
拍碎乾棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服晚

再服 再服

治癰潰漏血脉空竭內塞黃耆散方 不... 人... 不... 美

黃耆 剉
參分 芍藥 細辛
去苗 細辛 去苗
壹分

瞿麥穗 白芷 薏苡仁 不... 煎

人參 附子 地裂去
皮 熟乾地黄 焙各
壹兩

赤小豆醋浸炒

乾參兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下晚再服痛甚加芍藥口乾渴加薏苡人膿多加黃耆治癰內虛不足膿水不絕四肢乏弱不能飲食久不差必為內漏黃耆散方

黃耆剉壹兩

山茱萸至八分

五味子各半

白茯苓去黑皮

當歸切焙

附子炮裂去皮

石斛去根

遠志去心

巴戟天去心

肉蓯蓉酒浸切焙

各壹兩

人參參

菟絲子酒浸參日焙

乾搗末半兩

麥門冬去心焙

石韋去毛

白芍藥參

芎藭兩

熟乾地黄焙壹兩

甘草炙到

右一十八味搗羅為散每服二錢匕荆芥湯調下日三四服

治癰膿血至甚不生肌肉內補五香丸方

沉香

乳香

木香

藿香葉

丁香

續斷各壹兩

熟乾地黄焙貳兩

白芍藥

側子炮裂去皮

石長生各壹兩

厚朴去蠹皮薑汁

敗醬

人參

白茯苓去黑皮

鹿角屑 虎脛骨酥炙令黃 各貳兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜和搗三百杵九梧桐子

大每服三十九食前以黃耆湯下

治癰經年不差膿血過多補虛肉苳蓉散方

肉苳蓉酒浸切 貳兩 乾薑炮半 兩 菟絲子酒浸別 搗參分

巴戟天去心 貳兩 遠志去心 貳兩 人參各壹 兩

甘草炙 貳兩 麥門冬去心 焙 貳兩 石華去毛 貳兩

白芍藥 桂去 皮 壹 兩 芎藭各壹 兩

熟乾地黄焙 兩半 山茱萸 五味子

當歸切 焙 各 貳兩 附子炮裂去皮 貳兩 白茯苓去黑皮 壹兩半

右一十八味搗羅為散每服二錢匕荆芥湯調下空

心食前服

治癰內虛蜀椒散方

蜀椒去目并閉口 出汗半兩 熟乾地黄焙

白欬去心 貳兩 防風去 心 貳兩 黃芩去 心 壹兩

人參 桂去 皮 壹 兩 芍藥各壹兩

附子炮裂去皮 各壹兩 赤小豆壹合 炒 令熟 甘草炙 兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下早晚

食前服以差為度

治癰疽內虛黃耆湯方

黃耆剉

人參

甘草剉

芍藥

當歸切焙各壹兩

熟乾地黄焙

白茯苓

去黑皮

桂去蟲皮各參分

白朮

靈志

去心各半兩

甘草

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎乾棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治癰內虛熱生地黃湯方

生乾地黄切焙 人參

甘草剉

芍藥

去黑皮

白茯苓

去黑皮

桂去蟲皮 芎藭 蒼朮剉 干薑

黃耆剉

黃芩去黑心

木通剉

當歸切焙各參分

各壹兩

木通剉

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉七片乾棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服日晚再服

久癰

論曰人之肌肉皮膚待氣血以溫養癰久不差熱毒未盡風冷乘之客於瘡孔肌不得溫故腫結不消乍差乍發名曰久癰不治則變成瘻

治一切癰疽及乳癰風毒留積疼痛不止或膿出不快

久不生肌木香湯方

木香

乳香

雞舌香

各半兩

沉香

射干

連翹

升麻

黃耆剉炒

木通剉

獨活去蘆頭

桑寄生剉

甘草剉

大黃剉炒各分

右一十三味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至

一盞下芒消半錢匕麝香半字匕更煎一二沸濾去

滓空心溫服不利再服

治癰疽日月久遠膿水不盡心中煩悶白鮮皮湯方

白鮮皮

桑根白皮剉

玄參

漏蘆去蘆頭

升麻各壹兩

犀角屑半兩

敗醬參分

右七味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞

入芒消半錢匕濾去滓空心溫服晚再服稍覺瘡痛

止卽去芒消

治癰疽惡瘡久遠膿水不盡變爲癰黃耆湯方

黃耆剉炒壹兩

升麻

犀角鑿各半兩

紫葛

木通剉各分

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞

下朴消半錢匕瀝去滓空心溫服取利三兩行為度
未利再服

治發背癰疽經年不差熱氣結聚山茱萸散方

山茱萸

五味子

白茯苓去黑皮各參分

當歸切焙

附子炮裂去皮臍

芎藭

芍藥

石韋去毛炙

桂去麩皮

人參

地脉草

石斛去根酒浸

菟絲子酒浸炙

甘草炙各半兩

巴戟天去心

遠志去心

麥門冬去心

肉蓯蓉酒浸去麩皮炙

生乾地黃炒各兩 乾薑炮壹分

右二十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下加至三

錢匕醋漿水調下亦得長服永不發瘡癰

治一切癰疽諸癭拔毒風生肌肉止膿血蝟皮散方

蝟皮半枚炙

杜仲剉炒

厚朴去麩皮薑汁炙透各壹兩

續斷

附子炮裂去皮臍

地榆

藁本去土

當歸切焙

桂去麩皮各半兩

小露蜂房半枚炙

右一十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下晚再服

治癰疽潰後膿水不絕麥門冬湯方

麥門冬去心

黃耆剉

五味子炒

白茯苓去黑皮 芎藭

桂去蘘皮 各半兩

當歸焙切

人參

甘草炙各

遠志去心焙 壹兩

右十味麝搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎大棗二枚擘破同煎至一盞濾去滓空心溫服晚再服生肌骨取差爲度

治一切癰疽久不差黃連散方

黃連去須

滑石碎各壹兩

右二味搗羅爲散先濃煎甘草湯溫洗瘡了拭乾爛嚼胡麻子傅之後乾貼此散子日二度易良

治一切瘡腫癰疽瘰癧等疾經月不差將作冷癭蟾蜍膏方

蟾蜍壹枚去頭用

石硫黃研別

乳香研別

木香

桂去蘘皮各半兩

露蜂房壹枚燒灰用

右六味搗羅爲末用清油一兩調藥末入瓷碗盛於銚子內重湯熬不住手攪合成膏絹上攤貼之候清水出更換新藥瘡患甚者厚攤藥貼之

治瘡久不差時常痛痒皮縮肉消黃汁膿血不斷如神

散方

天南星炮壹枚

草烏頭炒壹兩

礬石煨半兩

續錄一百二十八

右三味搗研為散先用熱湯洗次將散子生油調塗
紙上貼之

治久癰塗傅方

白楊葉乾者
壹握

右一味搗羅為末傅瘡上日二度

又方

巴豆伍枚燒
灰細研 斑猫伍枚燒
灰細研

右二味研和為散傅瘡上以綿貼之日一次

又方

巴豆伍枚去心
皮研令細 魚脂參兩

右一味先熬脂令沸入巴豆煎攪令勻以瓷合盛塗

傅瘡上日三度

治久癰疽秦艽塗傅方

秦艽半兩

右一味搗羅為末塗傅瘡上以帛裹縛之日二次

又方

飴糖壹分

右一味取火鎔灌瘡中日三度即差

又方

鶴骨剉半兩

續錄一百二十八

二十一

右一味搗羅為末以豬脂調如糊塗傳瘡上以故帛裹之須臾痒發當有蟲出即差

治諸癰腫熱毒蘊積或久出膿水煩熱疼痛瘡口不合排敗膿去死肌五香連翹丸方

木香壹兩

沉香剉

人參

雞舌香

乳香

芍藥二日二六

玄參

海藻

洗去鹹汁

桂去蟲皮

大黃剉

芒消

研各壹兩

惡實貳兩

桃人去皮尖雙人炒黃

當歸切焙

連翹各壹兩半

麝香研半

右一十六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九至三十九空心酒下更量虛實加減

治癰瘍潰後膿不斷及諸物刺傷瘡不差方

硫黃粉貳兩

牛筋一片推碎

右二味以筋內硫黃中以刺瘡孔內取差為度

治久癰不差方

右以馬齒菜搗傳之差

治癰後瘡不合方

右燒鼠一枚作灰傳瘡孔中

又嚼大豆傳之

又以牛屎傅之乾即易

乳癰

論曰足陽明之脉自缺盆下於乳又衝脉者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至胸中而散蓋婦人以衝任爲本若失於將理衝任不和陽明經熱或爲風邪所客則氣壅不散結聚乳間或鞭或腫疼痛有核皮膚焮赤寒熱往來謂之乳癰然風多則腫鞭色白熱多則腫焮色赤若不卽治血不流通氣爲留滯與乳內津液相搏腐化爲膿然此病產後多有者以衝任之經上爲乳汁下爲月水新產之人乳脉正行若不自乳兒乳汁蓄結

氣血蘊積卽爲乳癰又有因乳子汗出露風邪氣外客入於乳內氣留不行傳而爲熱則乳脉壅滯氣不疎通蓄結成膿疼痛不可忍世謂之吹爛速宜下其乳汁導其壅塞散其風熱則病可愈

治乳癰初有異於常則先用此藥散化毒氣麥門冬湯方

麥門冬

去心炒

黃芩

去黑心

桑上寄生

剉

兩半

甘草

炙

木通

剉

防風

去

芍藥

炒

赤茯苓

去黑

黃耆

剉

兩

人參

半

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞入乳糖一分
棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服日三早晨午時
至晚各一

治乳癰初覺赤腫有異於常服此黃芩飲方

黃芩去黑心 甘草炙令赤 桑上寄生炙

防風去 麥門冬去心 赤芍藥炒

黃耆剉炒各 木通剉半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入棗三枚擘破
同煎至七分去滓入乳糖一分再煎令消溫服日三
早晨午時至夜各一

治乳癰焮腫疼痛排膿鐵粉散方

鐵粉 肉苳蓉酒浸去桂皮

細辛去苗葉 芎藭 人參

防風去 乾薑炮 黃芩去黑心

芍藥炒 當歸焙令香 甘草炙

右一十二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三
早晨午時至夜各一服藥十日後有血出多勿怪是
惡物除也

治乳癰堅韌如石當歸散方

當歸焙令香 芍藥炒 黃耆炒

人參

茯苓子

去角

枳殼

去穢

附子

炮裂去

雞骨

各兩

桂

去穢皮

薏苡人

微炒

右一十味搗羅為散每服二錢匕以溫酒調下日三

早晨午時至晚各一

治乳癰大堅鞭赤紫色衣不得近痛不可忍大黃散方

大黃

剉

芍藥

剉

棟實

馬蹄

各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕以溫酒調下衣蓋出

汗若睡若覺後腫散不痛經宿乃消百無一失次日

早晨再服無不差者

治乳癰堅鞭枳殼散方

枳殼

去穢

芍藥

剉

人參

各壹兩半

黃耆

剉

雞骨

炙

木通

剉

當歸

焙令

桂

去穢皮

茯苓子

微炒

右九味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三

治乳癰疼痛蔓荊實散方

蔓荊實

微炒

甘草

壹寸半

生

右二味搗羅為散每服二錢匕以溫酒調下日再服

治乳中結塞腫痛髮灰散方

亂髮灰

蛇蛻皮

灰各半兩

蔓荊實

微炒壹兩

右三味搗羅爲散每服二錢七溫酒調下日三
治乳癰先用諸湯藥塗傅搗後服此麥門冬丸方

麥門冬

去心焙

木通

剉

人參

五味子

黃耆

剉

羌活

去蘆頭

防風

去

生乾地黄

焙

黃芩

去黑心

桑上寄生

茯神

去木

天雄

炮裂去

升麻

澤蘭

各半

枳殼

去瓢炒令黃

大黃

剉微炒

當歸

切焙

右一十七味搗羅爲末鍊蜜爲丸梧桐子大每服空

心溫酒下二十九漸加至二十九以差爲度

治乳癰排膿肉從蓉散方

肉從蓉

微炙

鐵精

桂皮

細辛

去苗葉

黃芩

去黑心

芍藥

芎藭

人參

防風

乾薑

炮裂

甘草

炙令赤

當歸

切焙

右一十二味搗羅爲散每服二錢七空心溫酒調服

日晚再服

治乳癰防風散方

防風

去

牽牛子

炒令香

防風

去

右二味搗羅爲散每服二錢匕空心用沸湯調下取
微利爲度未利再服漸減服之卽差

治乳癰疼痛結鞭不可忍鱧鯉甲散方

鱧鯉甲

燒灰
壹兩

栝樓

壹枚
燒灰

右二味研和爲散每服二錢匕空心用葱酒調下至

晚再服

治乳癰及一切腫毒重螫散方

車螯殼

燒灰
拾兩

黃連

去須
壹兩

蜣殼

多年白爛者
以黃泥裏燒

右三味搗羅爲散每服二錢匕空心用甘草酒調下

日晚再服

治乳癰初發腫痛結鞭欲成膿令一服差牡蠣散方

牡蠣

取臍頭厚
處生用

右一味細研爲散每服二錢匕研澱花冷酒調下如

癰盛已潰者以藥末傅之仍更服藥一日三服

治乳癰初發腫痛結鞭欲成膿令一服差樺皮散方

右以北來真樺皮燒灰酒服方寸匕就病乳處臥及

覺已差

治乳腫痛慮作癰毒但乳癰痛甚者甘草飲方

甘草

牛炙令赤黃
半生半兩

栝樓

壹枚去
皮取

右二味先以酒二盞煎甘草至一盞入栝樓瓢同絞
和勻濾去滓放溫頓服未差更作服之

治乳癰疼痛丹參膏方

丹參

去蘆

白芷

芍藥

炒各
貳兩

右三味以苦酒浸經一宿又取豬脂半斤微火上同
煎之令白芷黃其膏乃成去滓以膏塗癰腫處差

治乳癰黃明膠傳散方

黃明膠

炙令
燥

大黃

剉

莽草

細辛

去苗葉
各半兩

右四味搗羅爲散以雞子白調勻塗紙上貼腫處頻

易卽差仍割穿紙如小錢大歇腫頭更頻差

治乳癰宜用黃連散傳方

黃連

須上

大黃

剉

鼠糞

各壹
分

右三味搗羅爲散以黍米粥清調和看癰大小傅乳

四邊其痛卽止

治乳癰初得令消傳方

莽草

一升
赤小豆各壹
升

右三味搗羅爲散以苦酒和傅於乳上

治乳癰黃耆白芷膏塗方

黃耆

白芷

大黃

當歸

續斷各壹兩

薤白貳兩

松脂貳兩

乳香半兩

蠟壹兩

豬脂貳兩

生地黄汁貳分

右一十一味取前五味剉碎以地黄汁拌勻先蒸脂

令沸下諸藥煎候白花赤黑色漉出下薤白松脂香

蠟俟候鎔盡以綿布絞去滓瓷合內盛取塗傅乳上

日三四度卽差

治乳癰生地黄塗傅方

生地黄伍兩 鼓半升

芒消壹兩

右三味細研令勻塗傅腫上日三五度卽差

治乳癰乳香塗傅方

乳香壹兩 丹砂半兩

葱白參兩

右三味先研葱令細入二味末再研令勻塗傅乳上

乾卽易之

治乳癰腫未穴痛不可忍薰陸香塗傅方

薰陸香壹分 百合分 雄雀屎貳柒

鹽兩

右四味細研令勻以醋調如糊塗傅患上乾卽再傅

以差爲度

治乳癰地黃湯搗方

生地黄汁壹射干

升麻

黃連須去芒消

白欬

梔子人大黃各半

甘草一兩

當歸各壹分

右一十味內九味碎剉以水五升煎至三升去滓下地黃汁更煎三五沸以故帛三片浸藥汁中更互搗腫上日一二十度再煖用即差

治乳癰結鞭疼疼痛方

和泥芥菜斤半

煎白細而

右一味剉碎以水四升煮取三升傾於瓷瓶內熏乳

腫處日三五度即差

蘇州刺史甘芳

治乳癰結鞭疼疼痛方

香合和泥葱斤

煎

右一味細剉以水四升煮十數沸於瓷瓶子內盛熏

乳腫處冷即再煖以差為度

治乳癰結鞭疼疼痛露蜂房熏方

甘草半兩

露蜂房伍兩

煎

右一味剉碎以醋五升煎至三升傾於瓷瓶子內乘熱熏乳上冷即再煖以差為度

治乳癰腫疼宜熲貼方

鹽草根生莠頭各半

右二味搗如泥貼之立効

治乳癰瘡散方

黃連去須 白欬 鼠糞

積雪草 大黃炒 甘草炙剉各半兩

右六味搗羅為散用漿水調為膏貼之乾即易

治癰疽發背婦人發乳諸癰癤已潰者令愈未潰不潰者令潰木占斯散方

木占斯取末 敗醬 細辛去苗

乾薑炮 厚朴去麤皮生薑汁炙 甘草炙

桔梗剉炒各壹兩 栝樓皮去 防風去

人參各壹兩半

右一十味搗羅為散酒調方寸匕日七八服夜二三服如長服去敗醬

治乳結顯塊膿水宿滯血脉壅閉惡血疼痛久不差者無名異散方

無名異 牡丹皮 虎杖根

當歸焙切 白芷 白茯苓去黑皮各參分

沒藥研 騏驎竭研 木香

黃芩去黑心 黃耆剉 人參

桂去麩皮

熟乾地黄焙各半兩

右一十四味搗羅為散每服三錢匕空腹煎棗湯調下日二服

治吹乳乳癰連翹湯方

連翹

瞿麥穗各壹兩

升麻

玄參

生乾地黄焙

芍藥各參分

甘草炙壹分

射干半兩

右八味細剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後

治乳癰疼痛方

大車前子壹兩

右一味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

治乳癰腫疼痛方

右打雞子一枚熱酒調為一服

大德重校聖濟總錄卷第一百二十八

大德重校聖濟總錄卷第一百二十九
癰疽門

腸癰 胃脘癰

緩疽 石疽

附骨疽 風疽

甲疽 癩疽

甲

諸

辨

鐵

鐵

大益里對聖新藥從錄卷一百二十五

腸癰

論曰腸癰由恚怒不節憂思過甚腸胃虛弱寒溫不調
 邪熱交攻故榮衛相干血為敗濁流滲入腸不能傳導
 蓄結成癰津液腐化變為膿汁其候少腹鞭滿按之內
 痛小便淋數汗出惡寒身皮甲錯腹滿如腫動搖轉側
 聲如裏水或達臍生瘡膿從瘡出或膿出臍中或大便
 下膿血宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救
 矣診其脉洪數者膿已成設脉遲緊雖膿未就已有瘀
 血也

治腸癰少腹堅腫大如掌而熱按之則痛其上色或赤

或白小便稠數汗出憎寒其脉遲緊者未成膿如脉數則膿已成大黃湯方

大黃剉炒

牡丹皮

消石研

桃人湯浸去皮尖炒芥子各半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓空心溫服以利下膿血爲度未利再服

治腸瘡木占斯散方

木占斯

厚朴去麤皮生薑汁炙甘草炙

細辛去苗葉

栝樓皮去

防風去

乾薑炮

人參

桔梗剉炒

敗醬各壹兩

右一十味搗羅爲散每服二錢匕空心日晚溫酒調

下

治腸癰牡丹湯方

牡丹皮兩壹

芍藥

丹參

生乾地黄切焙各兩貳

薏苡人

桔梗剉炒

麥門冬去心焙各壹兩半

甘草炙剉

赤茯苓去黑皮

敗醬各壹兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生薑五片煎至一盞去滓空心日晚溫服

治腸癰犀角丸方

犀角屑壹兩半

巴豆冷粒去心皮炒研去油

大黃參分蒸

蜀椒去目并閉口者炒出汗

黃芩去黑心

防風又去黑心

人參

當歸切

黃耆細切

藜蘆去蘆頭

山梔子去皮

黃連去須

甘草炙

升麻各半兩

右一十四味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

丸空心米飲下加至四五丸利下黃水爲度

治腸癰裏急隱痛大便秘澀梅人湯方

梅核人肆拾玖箇去皮尖

大黃兩參

牡丹皮壹兩參分

冬瓜人肆兩

犀角鎊壹兩半

芒消貳兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服以下膿血三兩行爲度

治腸癰附子湯方

附子炮裂去皮臍

敗醬各參分

薏苡人壹兩半

右三味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓空心日晚溫服下膿血卽差

治腸癰雞毛散方

雄雞項上毛

燒雄雞屎壹兩

右二味細研為散空心溫酒二合調下一錢匕日晚

再服

又方

右截檐頭尖少許燒作灰水調服即穴出膿

治腸癰壯熱惡寒微汗氣急少腹痛小便澀或大便如

刀錐刺痛或有膿腹中已成膿瓜子人汁方

瓜子人

參合與水陸合同研絞取汁

當歸切焙壹兩

蛇蛻

壹條燒灰研

右三味將二味末和勻分作二服用瓜子汁調下空

心日午服下膿血即差

治腸癰大黃牡丹湯方

大黃

炒

牡丹皮

各二兩

桃人

湯浸去皮尖雙入炒半兩

芒消

研壹兩

冬瓜人

參

右五味廔搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心溫服以利下膿血為度

治腸癰薏苡人湯方

薏苡人

壹兩

牡丹皮

桃人

湯浸去皮尖雙入炒各壹兩

半兩

瓜子人

半兩

右四味廔搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

淳空心日晚溫服

胃脘癰

論曰內經謂人病胃脘癰者當候胃脈其脈沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘爲癰也夫陰陽升降則榮衛流通氣逆而隔則留結爲癰胃脘癰者由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脈沉細以陽氣不得下通故頸人迎甚盛令人寒熱如瘧身皮甲錯或欬或嘔或唾膿血觀伏梁之病亦有俠胃脘內癰者以其裹大膿血居腸胃之外故也

治熱聚胃脘留結爲癰連翹升麻湯方

連翹

升麻

射干

獨活

去蘆頭

桑寄生

木通

剉各畝兩半

大黃

剉碎炒貳兩以
上搗爲鹽末

木香

沉香

薰陸香

丁香

麝香

各等分以上
搗研爲細末

右一十二味每抄前藥五錢匕水二盞煎至一盞半

去滓入後五香末二錢匕再前至一盞溫服日三服

以快利爲度

治胃府實熱留結爲癰陽氣不得下胃脈沉細者犀角

湯方

犀角 鎊

梔子人

赤芍藥

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑心

射干

去毛

大黃

剉炒各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓入蜜一匙攪勻再煎一兩沸食後溫服

治榮衛不流熱聚胃口血肉腐壞胃脘成癰射干湯方

射干

去毛

梔子人

赤茯苓

去黑皮

升麻

各壹兩

赤芍藥

白朮

各壹兩半

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓入生地黃汁一合蜜半合再煎三沸溫服

不拘時候日二服

治熱氣留聚胃脘內結成癰麥門冬湯方

麥門冬

去心

犀角

鎊

萎蕤

各壹兩半

薈

各壹兩

赤芍藥

各壹兩

石膏

各壹兩半

甘草

炙

紅雪

各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓入竹瀝一合再煎三兩沸溫服

治胃脘蓄熱結聚成癰芍藥湯方

赤芍藥

犀角 鎊

木通

剉

續金一百二十九

石膏碎

升麻各貳兩

甘草生

朴消

玄參

麥門冬

去心焙
各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候

緩疽

論曰緩疽者以寒氣客於經絡榮衛凝澁其寒氣盛則腫痛深伏其狀無頭尾大如拳小如桃李與皮肉相附著其腫與肉色相似亦不甚赤積日不潰久乃變紫黯色皮肉俱爛如牛領瘡以其初勢緩慢故名緩疽以其腫色與肉色相似故亦名肉色疽

治緩疽木占斯散方

木占斯

乾薑

桂

去苗葉

敗醬

防風

桔梗

去皮各半兩

甘草

人參

去麤皮薑汁炙到參分

右十一味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下

日晚再服

治緩疽芍藥湯方

芍藥

當歸

黃耆

生乾地黄

赤茯苓

續金一百二十九

八

人參 甘草參各

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分
拍碎棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服晚再
服

治緩疽及諸癰腫膿血結聚皮肉堅厚日久不潰疼痛
黃耆湯方

黃耆 沉香 薰陸香

連翹 各參 羚羊角屑 兩 雞舌香

漏蘆 去蘆頭 黃芩 去黑心 梔子人

甘草 生 防風 去 栝樓根 各半

右六十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八
分去滓不計時候溫服

治緩疽日久穿潰出膿水不盡非膿散方

貝齒 兩 黃耆 剉 當歸 剉

赤芍藥 生乾地黄 焙 黃連 須

升麻 桂 去 白欬

犀角屑 各 甘草 生 麝香 細研

右十二味搗研為散拌勻再羅每服溫酒調下一

錢匕不計時候

治緩疽初結微腫疼痛塗貼葦草散方

白及
鹿角屑
白欬

半夏
天南星

附子
生去皮臍
各壹兩
蛇蛻皮
壹條
炙
皂莢
兩挺
去黑皮及子

右九味搗羅爲散用醋麩薄糊調爲膏塗貼腫處乾
卽再上以腫散爲度

治緩疽蛇牀散方

蛇牀子
末
杏仁
湯浸去皮尖
雙入研細入

黃連
去須
搗末
乳香
細研各
半兩
鹽
壹分
研

蔓菁根
參兩切
爛研

右六味以蔓菁根和藥末細研令勻塗傳腫上乾卽

易之

治緩疽惡瘡蝕惡肉飛黃散方

丹砂
雌黃
磁石

曾青
白石英
礬石

石膏
石鍾乳
雄黃
各貳兩

雲母粉
參兩

右一十味各細研爲散用瓦盆一口丹砂安南雌黃
安中磁石向北曾青在東白石英在西礬石當上石
膏次更下鍾乳雄黃雲母覆蓋更用一盆覆蓋定以
泥封厚一寸於竈底以陳葦燒一日取出看取飛上

者研細傅瘡上日二度即差

治緩疽以飛黃散蝕惡肉盡用雄黃散惠方

雄黃

乾雞屎白

藜蘆頭去薑

丹砂研細

乾鰻鱺魚炙焦各青兩

右五味搗羅為散以青布裹之安小土甕內燒熏患

處如是熏三日即止後用黃耆散常法傅之

治緩疽黃耆散方

黃耆兩貳

右一味細剉搗羅為散傅瘡上日一度

又方

漆頭葡萄兩貳

右一味搗羅為散傅瘡上日二度

石疽

論曰石疽與石癰之證同比石癰為深以寒客經絡氣血結聚而不得散隱於皮膚之內重按如石故謂之石疽癰疽皆熱氣所作今寒氣為梗故凝結不化其毒內著結韌如石治宜溫其經絡使熱氣得通其毒外泄故能腐熟而發散化膿血而出也

治石疽堅韌皮色紫赤惡寒壯熱一二日未膿者下之

升麻湯方

升麻

連翹

玄參

大青

大黃剉微炒

敗醬

絡石

白欬各半

生地黄兩

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七

分入芒消一錢去滓空心溫服微利三兩行未利再

服

治石疽結堅若壞若未壞或已成疽者占斯散方

木占斯

厚朴去麤皮

生乾地黄焙

栝樓乾者

敗醬

防風去

桔梗炒

人參

細辛去苗葉

桂去麤皮

右一十味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下食前

治石疽腫毒結靱口乾煩熱四肢拘急不得臥沉香湯

方

沉香

防風去

木香各分

地骨皮

麥門冬焙

當歸切

升麻

玄參

枳殼去

羚羊角屑

獨活去蘆

甘草生

赤芍藥各壹兩

大黃剉炒

右一十四味搗篩每服四錢匕水一盞半煎取七

分去滓不計時候溫服

治石疽堅韌不消地黃煎方

生地黃

淨洗參斤

右一味剉碎細研以布絞取汁入銅器內盛重湯上

煮柳篋攪勻如糖以瓷合盛每日空心取一九如彈

子大溫酒調下日午晚間再服即差

治疽發堅如石核復大色不變鹿角散方

鹿角

燒過

貳兩

白欬

壹兩

麝理黃石

伍兩燒令赤色

古入醋中再燒

右三味搗羅爲散以醞醋調如糊塗傅腫上乾即再

傳以差爲度

治石疽堅如石不作膿商陸根貼方

生商陸根

斤半

右一味爛搗如泥於故帛上塗貼乾即易之

治石疽狀如瘰癧而皮厚者楮實塗方

楮實

不以多少

右一味搗羅爲末以醋調如糊塗患上乾即易之

治石疽堅韌皮色紫赤惡寒壯熱一二日未成膿者下
之後宜用木香散貼方

木香

大黃

升麻

白歛

芒消

赤小豆各半兩

右六味搗羅爲散以榆白皮汁入水少許調和如糊以故帛上塗貼日二上卽差

又方

鹿角

右一味於石上水磨如泥塗患上日三五度卽差

又方

半夏兩

右一味搗羅爲末以水調如糊塗患上日三五度卽差
治石疽塗傳方

蜀漆乾者半兩

桑根白皮兩

右二味搗羅爲末鎔牛膠更以酒調和塗傳腫上日三五度卽差

又方

芫若子兩

右一味搗羅爲散以醋調和如糊塗傳腫上乾卽再塗取差

又方

梁上塵

葵莖灰各壹兩

右二味搗羅爲散以醋調如糊塗傳腫上日三兩度

卽差

又方

蛇蛻皮

右一味燒灰細研以醋調如糊塗腫上乾卽易之

附骨疽

論曰骨疽者由風入骨解與熱相搏復爲冷濕所折風熱伏結不得發散蘊積成毒故附骨而爲疽喜發於大節解間按之應骨皮肉微急洪洪如肌而不外見是也治之宜急稍緩則膿不得潰而肢體變青黯者不可治治附骨疽漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

升麻

連翹

麻黃去根節

大黃剉炒

防已

木香

白斂

沉香各分

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入竹葉一七片煎至八分再入芒消一錢攪勻去滓空心溫服取利三兩行未利再服

治附骨疽連翹湯方

連翹

射干

升麻

防已

黃芩去心

大黃剉

甘草炙

芍藥

杏仁湯浸去皮尖雙入各壹兩

此胡去苗

貳兩

右一十味蠱擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分入芒消一錢匕去滓空心溫服

治附骨疽敗醬湯方

敗醬貳兩

大黃剉炒

桃人貳兩

右三味蠱擣篩每服五錢匕先取皂莢刺一兩剉碎以水二盞煎至一盞半漉出下藥及朴消一錢同煎至八分去滓空心溫服

治附骨疽亂髮湯洗方

亂髮灰半兩

杏人推碎貳拾壹粒

甘草剉伍寸

鹽花半兩

右四味以漿水五升煎至三升濾去滓通手洗疽上若有膿血洗取淨後以絹帛縛定每日三兩遍洗

治附骨疽瘡及陰瘡久不差天靈蓋散塗傅方

天靈蓋每炙壹兩

狗骨燒灰壹兩半

白礬燒灰壹兩半

麝香研壹錢

右四味擣研爲散乾傅瘡口日三五上以差爲度

治附骨疽天南星散塗傅方

天南星炮

附子炮裂去皮臍

黃蘗去蘆皮各半兩

鉛丹研壹分

麝香研半

右五味除麝香鉛丹外搗羅爲散入二味和勻乾傅
瘡上日三五度

治附骨疽久不差麝香散塗傅方

麝香

研壹分

騏驎竭

蜜陀僧

煨各壹兩

右三味細研爲散先用鹽湯洗瘡拭乾取活鱗魚一
條剉細研搗瘡上一宿明旦揭看有蟲卽去再拭乾
塗傅散子日三五度卽差

治附骨疽內消小豆散方

赤小豆

壹合

糯米

炒黑伍合

右二味搗羅爲散水調如糊攤故帛上塗貼乾卽易

治附骨疽騏驎竭散塗傅方

騏驎竭

檳榔

剉

黃連

須

馬腸根

各壹兩

右四味搗羅爲散先以油炒葱豉入膩粉半錢和搗
捻作餅子一片用鹽漿水洗瘡後用餅搗瘡上以生
帛縛定三日後再用鹽湯洗卽塗傅散子日三五次
治附骨疽久不差骨從瘡口出烏雞散塗傅方

烏雞雞骨

煨

牛楮木

刮燒灰參家者煨單者各壹兩

右三味合和研細塗傅瘡上日三五度碎骨出卽差
治附骨疽久不差或差年歲再發秦苳散塗傅方

秦朮去苗土

右一味搗羅爲散塗傳瘡上以帛縛定口二三
治附骨疽積年發膿骨出不差牛膠散塗傳方

水牛皮膠炙焦

右一味細研爲散塗傳瘡上用生鯉魚破開外面貼
定時看有小蟲出更以鹽湯洗傳上藥再以魚貼蟲
出盡更傳藥

治附骨疽椒葉塗傳方

椒葉陰乾 豬膽半兩

右二味相和搗爛塗於瘡上封之卽差

又方

黃丹細研 膩粉各錢研 雞子伍枚煮熟去白用黃

右三味先將雞子黃於銚子內以慢火炒令黑候自
然爲膏溼於盞內入黃丹膩粉和勻用時先以米泔
煎湯洗患處拭乾用藥傳之妙

又方

新枸杞子自然汁 白礬結別研

右三味先將枸杞汁慢火熬成煎後入白礬團令堅
實陰乾搗羅爲末每用時以甘草水洗之拭乾先唾
塗瘡上次用藥末周匝傳之

治附骨疽久不愈及碎骨皆從瘡孔中出者雞骨散方

一歲烏雌雞骨壹兩燒灰

三家桐材屑壹兩燒灰

三家炊單壹兩燒灰

右三味都研令細每用少許內於瘡中碎骨當出即愈

愈

治附骨疽及魚眼瘡方

杏人伍拾枚燒為灰

亂髮灰壹兩

膩粉壹分

決明子壹分

右三味同研令細入油三合蠟半兩煎攪令勻入瓷

合盛淨洗貼之

治附骨疽腫痛有膿久不差天靈蓋散方

天靈蓋壹兩燒灰

狗頭骨半兩燒灰

白礬半兩燒令汁盡

麝香壹錢細研

黃連壹分去須

黃蘗壹分

右六味搗羅為細散入麝香令勻每用先煎甘草湯

洗拭乾用生油調塗之

風疽

論曰風疽者本由風濕之氣入於腠理流注血脉凝滯不利攣曲腫起發作瘡疽所以疼痛經久不差者是也

蓋風勝則動故其疽留止無常待之醉臥汗出當風風

入膚腠客於經絡與榮衛相搏而成

治風毒結腫聚為惡膿瘀血毒壅不散發作成疽五香

連翹湯方

連翹

射干

獨活去盡頭

桑寄生

木通

升麻各貳兩

大黃參兩

丁香壹兩

木香

沉香

薰陸香

麝香各貳兩

右一十二味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎

至一盞入竹瀝半合再煎取沸去滓溫服未差再服

治風毒中人留血脈不散與榮衛相搏結成風疽身體

煩熱昏冒腫痛防風湯方

防風去

茈胡去苗

白芷

桔梗炒

木通剉

當歸切焙各壹兩半

羌活去蘆頭

麻黃去根節煎附子地裂去

甘草炙剉各壹兩

右一十味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服食後臨臥各一如欲出汗空心併兩

服後以熱薑稀粥投蓋覆取汗慎外風

治熱毒風結成疽腫痛行履不得海桐皮浸酒方

海桐皮剉

五加皮剉

獨活去蘆頭

防風去

乾蠍炒

杜仲去麩皮切

牛膝去苗燂

薏苡人炒各壹兩

生乾地黄焙參兩

右九味麤搗篩生絹囊貯以好酒一斗五升浸於瓷
瓶中密封秋夏二日春冬七日開取食前溫酒三合
加至四五合不拘時甚者常令酒氣相續

治熱毒風腫成疽日夜熱痛大豆酒方

大豆緊小者

麻子人研碎

烏蛇壹條去頭尾皮骨重肆兩

碎推

右三味相和令勻就甑內蒸臨熟去甑底湯將好酒
一斗五升就甑中淋候酒熱又淋凡七八徧入瓷瓶
內密封候冷量性飲之常帶酒氣佳

治醉酒汗出風入經絡成風疽麻黃湯方

麻黃去根節

五加皮壹兩

防風去

獨活去蘆

桂去蟲

當歸切

芍藥

乾薑炮各

附子生去皮

牛膝貳兩

杏仁去皮尖雙

右十一味各細剉以水九升先煎麻黃掠去沫內

諸藥煎取三升絞去滓每用一盞溫服併三服溫覆

微汗慎外風

治風毒氣客經絡成風疽秦朮丸方

秦朮土去

苦參

升麻

黃芩去土

枳殼去穢炒

防風去

惡實炒各

烏蛇酒浸去皮骨炙

蒺藜子炒各

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大早晚食後

以蒺藜子煎湯下二十九

治酒醉汗出風入經絡久成風疽黃耆丸方

黃耆剉

犀角鎊各

黃連去

茯神去

當歸切

防風去

芍藥

升麻

黃芩去黑心

木通剉

甘草生剉

麝香別研

右一十二味搗研為末拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九空腹生薑湯下食後再服即煎麥門冬湯

下...合...
治風疽搔之黃水出大豆汁塗方

大豆升

馬屎升

白蜜斤半

右三味拌令勻用青竹筒盛實築架在炭火上當中

慢燒將蓋椀兩頭盛取汁先用泔清入鹽少許和溫

洗瘡上拭乾後以藥汁塗日三五度

又方

胡麻子

右細嚼塗傳疽上以綿裹縛之日三兩上以差為度

甲疽

論曰足三陰經皆起於足氣血沮而不行潰於指甲之間能成甲疽凡以經絡之所流注非特肌肉之病也故或得於指甲傷肌或得於中長侵肉或得於屢舄之不適使血氣沮遏不通故腐潰爲疽久則浸淫爛指上引於腕膝之間而瘡疤者是已然病在四末不必治其內惟塗傅滌濯去惡而除穢及適其行履則愈

治甲疽日夜倍增赤肉生甲邊裏甲者

蘭茹

黃耆各貳兩

豬脂斤

右三味先咬咀如豆以苦酒浸一宿與豬脂一處微火上煎取三合絞去滓以塗瘡上日三四度其赤肉

卽消散

治甲疽腫爛生脚指甲邊赤肉努出時差時發方

雄黃半兩

蛇蛻皮燒灰分

右二味同研如粉每用先以溫泔洗瘡令軟以尖刀子割去甲角拭乾以藥傅之上用軟帛裹之半日許藥濕卽易之一日卽除其痛便止

入山此藥與共

治甲疽及諸癰疽惡瘡有肉息豬蹄湯方

豬蹄壹隻生者

白欬

白芷

狼牙

芍藥各參兩

黃連日二錢

黃芩

大黃

獨活各貳兩

右八味以咀如豆先以水三斗煮豬蹄水至一斗二升去蹄後入藥更煮至五升候溫洗瘡日三度

治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不差乳香散傳方

乳香

研 膽礬

燒灰

右二味等分再同研極細時時傳之大凡此疾須是

剔去甲不燥亦愈或已成瘡久不差即用此方日

治甲疽綠礬散傳方

綠礬

研

右一味熨斗內以炭火燒令通赤去火研令極細先

以鹽湯洗瘡拭乾旋傳瘡上將輒帛裹縛如瘡急痛

卽以酥塗瘡上令潤日三五度用

治甲疽努肉疼痛膿血不止石膽散傳方

石膽

研

右一味煨過細研傳瘡上日三兩度

治甲疽白礬散傳方

白礬

燒灰

麝香

日三 盧會

蝮蛇膽

各分

右四味合研極細先以漿水洗瘡拭乾傳之日三兩

上以差爲度

治甲疽多年不差努肉膿血疼痛烏梅散傳方

烏梅拾枚
燒灰

右一味研為散傳瘡上日三易

治甲疽黃者散傳方

黃者剉

蛇蛻皮炙令焦
各壹兩

右二味搗羅為散傳瘡上日三五度

治甲疽馬齒散傳方

墻上馬齒菜陰乾
壹兩

木香

丹砂細研

鹽研細分
壹分

右四味除丹砂鹽外剉碎拌令勻於熨斗內以炭火燒過取出細研即入丹砂鹽末再研勻旋取傳瘡上

日三兩度

瘰疽

論曰字書凡字從票皆有疾轉之義瘰疽為病毒發疾轉不旋踵而害人故其字從票音同於飄風之飄治之不可稍緩也古人謂人受惡風入於肌脉變成斯病蓋厲氣蘊伏初未知覺毒鬱既發則若火之熾烈不可嚮邇是以其狀隱小而深實黧黑而不明其痛復應於心毒氣已深故其證如此惟痛取利可以僅存欲頓飲藍青升麻葵根竹瀝之類以沃其熱毒甚則斷指割肉灼肌以除之凡以毒氣疾轉稍緩則入藏故也

治瘰疬枳實湯方

枳實炒

射干

升麻

生乾地黄焙

黃芩去黑心

前胡去頭

犀角屑

大黃炒

甘草炙到各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓入麝香半字攪勻空心溫服日三

治瘰疬初覺宜速取利犀角丸方

犀角屑青兩半

大黃炒

黃芩去黑心各參分

防風去

人參

當歸切

黃耆剉

梔子人

黃連去須

乾藍

甘草炙到各半兩

巴豆拾貳粒去皮心研

右一十二味除巴豆外搗羅爲末研入巴豆令勻錄蜜丸如梧桐子大每日空心米飲下三丸如未利加五七丸以利爲度

治瘰疬漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

白欬

黃芩去黑心

麻黃去根節

白薇

枳實炒

升麻

芍藥

甘草炙

大黃剉炒各壹兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去

洋空心溫服日三

治癰疽諸疽十指頭焮赤痛而痒豬蹄湯方

白芷

大黃炒

芎藭

黃芩

去黑心

黃連

去須

甘草炙

細辛

去苗葉

葉本

去苗土

當歸切黑

藜蘆

莽草

各壹兩

右一十一味咬咀如麻豆每用水二斗煮豬蹄一具取一斗入藥三兩再煮取五升浸淋瘡處未陳疔

治癰疽手足累累如米起色白刮之汗出愈後復發款

冬花散方

冬花散方

冬花散方

款冬花半兩

黃耆剉壹兩半

升麻壹兩

赤小豆

附子炮裂去皮臍

苦參各壹兩

右六味搗羅為散每服一錢匕空心溫酒調服日再加至二錢匕

治癰疽浸淫多日漸長大黃連散方

黃連

去須壹兩

胡粉

甘草炙

蘭茹

各半兩

右四味除胡粉外搗羅為散入胡粉令勻塗傅瘡上

日三五度

治癰疽丹砂膏方

丹砂研細

犀角屑

烏干

大黃炒剉

芎藭

黃芩去黑心

升麻

前胡去蘆

沉香

木香各壹兩

豬脂貳斤

生地黄貳兩

麝香半分

右一十三味除丹砂麝香豬脂外剉碎以醋半升和勻浸一宿先熬脂令沸次下諸藥煎候地黃赤黑色以綿絞去滓入丹砂麝香末以柳篋攪勻瓷合盛傳患處日三五上又取棗大以溫酒調下空心日午服治癰疽熾甚消毒散方

藜蘆

大黃剉炒

黃蘗去蘆皮

菴連

當歸

甘草各壹兩

右六味咬咀如麻豆以水一斗煮至五升去滓浸淋瘡處卽差

治癰疽方

竈室塵

竈突中墨

竈釜下土各壹升

又方
右三味以水九升煮三沸取汁以洗瘡口三四度

胡粉貳兩

青木香

滑石

龍骨各貳兩半

米粉壹兩

右五味搗羅為細末稍以粉瘡上日三

治療疽著手足肩背忽發累累如赤豆剥之汁出者方

麻子不以多少

右一味細研用水煎取沫摩於瘡上即差

治療疽潰後皂莢散方

皂莢實槌去皮子燒為灰

右一味細研為散用鹽湯洗瘡令淨乾搽傅日三

治療疽似癰小異去膿明日還滿血如小豆汁者芸薹

熨方

芸薹葉不拘多少

右一味爛搗炒熱以布袋二枚盛更互熱熨之冷即

換冬用乾者又將甘草湯洗瘡令淨乾以黃蘗末塗

傅熨了即用以差為度