

產

鑑

卷中



產鑑卷之中

睢陽馬志光重梓

臨產須知

一 臨月不可洗頭以免橫生逆產

一 諸般不得喧鬧房中常要緊閉

一 閑雜婦人喪婦穢濁等人預宜杜絕勿令觸犯

胎氣致產不利

一 宜擇年高歷練穩婆及純謹親密之人在傍扶

持 乃謂產婦有主持之心無有畏忌



一預備催生符藥譬之停水滅火積時無用偶爾
不虞可救一時之急凡胎前產後數般危証有
妊之家須當預備幸而無事不用何妨

一月數滿忌才覺腹疼驚動太早以為欲產及其
不產聽信師巫誕妄之人稱說鬼神多方恐怖
恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹氣乃不行產
必不利犯此者宜紫蘇飲 方見後

一臨月腹疼或作或止一日二日三日胎水已來
而痛不甚者名曰弄疼非當產也又有一月前

忽然腹疼欲產却又無事者名曰試月非也
 也不問胎水來不妨只當寬心候時若是產時
 腰腹疼極不已穀道挺逆眼中火生便產豈有
 欲產有或痛或不痛之候耶人多于此胡見亂
 做枉了性命

一初覺腹疼且令扶行熟忍如行不得或憑物坐
 或安臥或服安胎藥一二服得安且止慎勿妄
 服催生藥餌一切張皇致令產母憂恐而挫其
 志務要產母寬心存養令坐婆先說解諭之如



覺心中煩悶可取白蜜一匙新汲水調下

妄亂用力先困其母

一用力太早兒身方轉被用力所逼以致錯路多致橫逆須待臨逼產門用力一遍兒卽下生

一產時未急不可強服催生藥宜待衣漿既破腹重痛極眼中火生此時胎已離經兒逼產門進催生藥服藥後更宜勉強扶行痛陣轉甚了進催生符

一產母如覺饑餓可進軟粥勿令饑餓以致產時



乏力若渴欲飲水宜與米飲或炒米湯

一產母忍痛不肯舒伸行動曲腰眠睡胎元轉

尋到生門被遮閉又轉又尋以至再三胎已

力決主難產

一產兒如登廁自有其時不可聽信輕躁坐婆不

候時至便言試水併胞漿先破風入產門以致

腫脹乾澀難產

上十三論活婦之要道為人不可不知

束胎

束胎散

胎前宜多服安胎易產



C000067

白朮 白芍藥 當歸身尾 各一錢

人參 陳皮 紫蘇葉 各七分

大腹皮 三分 甘草 炙三分

右剉作一服水一鍾姜三片煎服八九個月內服

十數服甚得力夏月加條芩一錢瘦人加川芎

一錢

東胎丸 八個月宜

條黃芩 酒炒夏用一兩春秋 陳皮 一兩

白朮 一兩 白茯苓 七錢半



右為末粥為丸梧子大每服六七十九丸食前服
枳壳散 八九月後胎氣壅隘常服枳壳散滑胎

血安和子臟易產

商州枳壳

五兩麩皮炒赤

粉草

一兩半炙

香附子

一兩童便炒

右為末每服二錢空心白湯點服食前臨臥日三

服令兒易產初生胎氣微黑百日後變白此為

右方之冠若妊婦稍弱者加當歸身一兩

忌宜

勿亂服湯藥勿過飲酒臨產尤忌勿妄亂針灸



000069

勿向非常地勿舉重登高涉險心有大驚
顛疾勿多睡臥須時時行步體虛腎氣不足
必解頤宜預溫補脾胃不和榮衛虛怯子必羸
瘦宜預調理產室貴乎無風又不可太暖太暖
則汗出腠理開張易致中風

產婦着衣臥首起日

甲乙日產宜着黑衣忌白衣臥忌西首起日忌

庚辛

丙丁日產宜着青衣忌黑衣臥忌北首起日忌



000070

壬癸

戊巳日產宜着赤衣忌青衣臥忌東首起日

甲乙

庚辛日產宜着黃衣忌赤衣臥忌南首起日

丙丁

壬癸日產宜着白衣忌黃衣臥忌無起日忌

巳

生子所向方

子午卯酉日

宜西
南向

寅申巳亥日

宜西



辰戌丑未日 宜東
南向

體玄子借地法 寫貼產婦床後吉

東借十步西借十步南借十步北借十步上借

十步下借十步壁方之中四十餘步安產借地

恐有穢污或有四海神正月遊將軍白虎夫人

遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸入地

十丈令此空閑產婦某氏安居無所妨碍無所

畏忌諸神擁護百邪速退急急如律令勅

催生



催生滑胎等藥勢不得已則服之大法滑以流
澁滯苦以驅逐閉塞氣滯者行氣胞漿先破者

固血

丹溪云催生只用佛手散最穩當又效捷

佛手散

治難產及妊娠子死或未死胎動不安連

進數服若胎已死服之便下若未死其胎即安

此經累效萬不失一凡產前產後腹疼頭疼體

熱眩暈及總產未進別物即先服此藥逐敗血

生新血能除諸疾



川芎

當歸各

兩

右咬咀水煎服一方為籠末每服四錢水七

三分同煎至七分熱服未產前先安拂此藥煎

熟產畢即服之三日内二服三日外一服凡胎

氣不安及產後諸疾俱加酒煎

一產後血衝心及腹脹氣絕者神驗

一難生倒橫子死腹中先用黑大豆一合炒熟水

一盞人童子便一盞煎藥四錢同煎至一盞分

為二服未效再作



一產後腹疼不可忍加桂心二錢入童子便合

服之立效

一凡傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血

牙去血一切去血過多不止眩暈悶絕舉頭

倒悉能治之

催生如聖散

黃蜀葵子

三錢研爛以酒濾去渣溫服神妙或漏血胎乾難產痛極者兼進三服長

久腹中氣寬胎滑即產須候欲產時方可服歌曰

黃葵子炒七十粒細

研酒調濟若急若過臨危產難時免得全家俱



哭泣

又方以香油白蜜童便和勻各半盞調益母草末

錢

催生丹 治生理不順產育艱難或橫或逆大有神

效

十二月兔腦髓

去皮膜研如泥

母丁香

取末一錢

乳香

另研一錢

通明者

麝香

另研五分

右三味研勻以兔腦和丸鷄頭實大陰乾油紙包



每服一丸温湯下即產兒握藥

柞木飲子 治產難或橫或倒及死胎爛脹腹

方屢用神效

大柞木嫩枝頭

如指大者長一尺到碎洗淨生用

甘草

大者五寸到碎

右用新汲水三碗同入新磁瓶內以紙三重封

文武火煎至一碗半令香候產婦腰重痛欲坐

草時温飲一小盞腰未重痛勿服服後仍覺心

下閉豁如渴再飲一小盞覺下重即生更無諸



C000077

苦橫生倒逆不過三日自止子死腹中不

服即下最為神驗有一婦橫產手出臍

欲截其手以此藥濃煎一碗與服小頃

少弱再與一碗因單少時忽云我骨節俱折開

了快扶我起血水俱下拔出死胎全不

謂更生以此救人百發百中真神劑也

易辦母忽母忽

乳珠丹 治難產及胞衣不下

用通明乳香研細以豬心血為丸梧子



為衣晒乾每服一粒催生冷酒化下良久

再服 一方用蓮葉心蒂七個水二盞煎至

盞溫化下其驗如神合藥須五月五日午時立

七月七日三月三日亦可

又方通明乳香 如皂角子大 為末腰痛時用新汲水

一小盞入醋少許同煎令產母兩手提兩乳

坐婆調藥飲水須臾坐草便生無痛楚神良

勝金散 治難產逐敗血即自生若橫逆即轉正子

死腹中則胎軟膨寬即產



王不留行

酸漿草

生肌倍

艾蒿子

白蒺藜

去刺

五靈脂

生用各等分

右為散每服三錢取長流水一盞半入白花露奇

奴子一撮同煎温服

催生萬金膏 治難產并治胞衣不下兼治死胎

草麻子七粒去壳研細成膏塗脚心即產速洗

去少遲即腸出却用此膏塗頂上腸自縮入

一方草麻子百粒雄黃一錢細研用如上法

萬金不傳遇仙丹



草麻子 十四粒去壳

硃砂 研

雄黃 研各一錢半

蛇蛻 一尺燒存性

右為末飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯洗

下拭乾安藥一丸于臍中用紙數重覆上以帛

束之頭生出即取去藥一丸可用三次

又方 三麻四豆脫衣裳研碎將來入麝香若有蟻

人適產難貼在臍中兩分張 草麻子三粒已

研細貼臍中

如神散 治一切難產及橫逆



百草霜

香白芷

為末不見火

右等分為末每三錢臨產用童子小便并好

打為膏沸湯調下無醋用酒同童便各半盞

煎纔沸即調停溫服不過再服此藥固血滑胎

免無漿乾生神效

千里馬散 催生累效靈妙之理人所難通用之良

效

臨產時于路上尋破草鞋一隻取耳燒灰溫酒

調下三錢得左足者男右足者女覆者死何如



驚極是神奇

油蜜飲 治去血胎乾因而難產他藥無益

血卽效

清油 好蜜各半碗 加當歸 川芎

錢一 妙一

右同煎數沸溫服胎滑卽生是理

濟陰丹 專治產難橫逆并安胎順氣及產後諸

益母草 一名野天麻卽克蔚子也

五月五日采其葉莖陰乾不見日不犯鐵器拍
細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九臨產時以



童便温酒各十盞化下急用時取生者

汁入蜜少許煎服將產時雖無事用一

安魂定魄破血止疼產後十九證皆宜服之

名返魂丹

加味芎歸湯 治產五七日不下垂死及交骨不開

者

川芎

當歸名一兩


自死乾龜壳

酥炙

生男女婦人髮一握

碗內燒存性為末

每三錢水一盞半煎服大約人行五里不閉止



000084

死胎立下

右催生之藥梓枝兔腦如神佛手等藥常用

無不獲驗今具多方者恐倉皇之際無此用

第求其效耳

凡產婦八九月前腰腹疼痛有似欲產却又不產

者宜與安胎藥用芎歸參朮少加紫蘇調之口

足自產

凍產

冬月天冷血得冷則凝以致兒子不能生下此



善身深若冬月產者下部不可脫去綿衣并
可坐臥寒處當滿房著火常有暖氣令產母背
身向火使腰膂腿膝間常暖血得熱則流兒自
易產

洗法 有醫宿客店值店婦數日不產下體已冷
無藥可治甚窘遂以椒橙吳茱萸等葉濃煎湯
可下手則和臍腹人門等處皆淋洗之氣溫血
行遂產

又法 劉復真遇湯府判女產不利已歛劉以紅



花二升濃煎湯扶女子凳上以綿帛蘸湯濕之
 連以湯澆帛上以器盛水又暖又淋久而得醒
 遂生男子蓋嚴冬血冷凝滯不行溫則產此神
 見也

又紫蘇葉濃煎薰洗亦可

薛立齋夫入冬月產難產子已死用油紙撚燒斷
 臍帶借其氣以暖之俄頃忽作聲此兒後無傷
 食作泄之證凡冬月產子雖已死用此法使暖
 氣入腹多有得生者切勿用刀斷之

熱症

盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼

胎氣亦不可令人多熱氣逼襲產母使產母血

沸而有發熱頭疼面赤昏昏如醉乃至不知人

事者有熱氣乘虛入血室致令惡露不行敗血

攻心狂言叫呼奔走捉拿不住用荷葉湯

荷葉湯

荷葉

生地黃

牡丹皮

各等分

右濃煎調下生蒲黃二錢一服即定惡露即下



8800000

逆產

逆產者由產母胎氣不足關鍵不牢用力太
令兒子不能廻轉便直下先露其足當令產母
仰臥令看生之人推其足入去不可令產母用
分毫力

刺法 用小絹針于小兒脚心刺三五刺用鹽
許塗刺處輕輕送入卽時順生母子俱活
又兒脚下用鹽塗又可急搔之並以鹽摩母腹上
又以手中指取錫底墨交盡兒足下卽順生



北京中醫藥大學圖書館版權所有

多法 手產婦右脚小指尖上去甲一分許艾

如麥粒大三壯立產此法治難產良

橫產

橫產者兒先露手或先露背此由產母未當用力
而用之過也須令產母安然仰臥後令看生之
人先推其手令入直上漸漸逼身以中指摩其
肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產
母仰臥然後推兒直上徐徐正之俟其身正煎
一服生藥一服方可用力兒即下生



蛇蛻散

蛇蛻 一條全者 蠶故紙 一張

右二味皆入新瓦瓶中 搥泥固濟 燒存性為末

榆白皮湯調下 一錢 不過兩服 卽出

又方 阿膠 炒五錢 滑石 一兩 黃葵子 一合 酥 一兩

右分作二服 每服水二盞 煎至一盞 作二三次服

又方 車前子為末 二錢 酒調服

伏龍肝 治橫逆不順 子死腹中

卽炒中心 十冬年紅者佳 研為細末 溫酒調下



灸法 于產婦右腳小指尖上去甲一分許艾

如麥粒大三壯立產此法治難產良

橫產

橫產者兒先露手或先露背此由產母未當用力
而用之過也須令產母安然仰臥後令看生之
人先推其手令入直上漸漸逼身以中指摩其
肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產
母仰臥然後推兒直上徐徐正之俟其身正煎
催生藥一服方可用功兒即下生



蛇蛻散

蛇蛻

一條全者 蠶故紙 一張

右二味皆入新瓦瓶中 塩泥固濟 燒存性為末 煎

榆白皮湯調下一錢 不過兩服即出

又方

阿膠

炒五錢

滑石

一兩

黃葵子

一合

酥

一兩

右分作二服 每服水二盞 煎至一盞 作二三次服

又方 車前子為末 二錢酒調服

伏龍肝 治橫逆不順 子死腹中

即灶中心土 多年紅者 在研為細末 温酒調下



一蓋兒頭戴藥出

又方 治橫逆難產子死腹中用黑大豆一大合炒

熟水與童便合煎服神效

又方 當歸為末二錢煎紫蘇湯調服

偏產

偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏挂

左腿或偏挂右腿故頭雖露偏挂一畔不能生

下蓋所露者左右額角也非正頂也治法令產

母仰臥看生人輕輕推兒近上以手正其頭令



頭頂端正用力一逼卽下若是頭之後骨
穀道只露其額當令看生人以綿衣炙溫舉手
急于穀道外傍輕輕推兒頭令正然後用力
送兒卽下生

礙產

兒身已順已露正頂不能生下盖因兒身廻轉肚
帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰
臥令看生之人輕推兒近上徐徐引手以中指
按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順用力一



送兒卽下生

又法令穩婆款款分開臍帶與產母打噴嚏自
又法以單被蓋產母自頭至腰少時猛揭得氣頓
通立產

右倒產橫產偏產礙產四法若看生之人非精良
妙手不可輕用此法恐恣其愚以傷人命也按
倒產者俗名踏蓮花生世人徃徃隨其倒足生
下子母俱全並無他患蓋雙足齊下多易得生
不必依推上之法亦可若一足單下者不可不



用法推入又礙產者往往肚帶有纏在兒頭
而兒頭自出在產門外看生之人以手撥其
帶而下之者又有肚帶纏在項上一匝而兒
胞衣同下者皆無妨在看生之人視其緩急消
息用意斟酌不可胡亂動手悞人性命

坐產

兒將欲生其母疲倦不能行立欲坐急于高處牢
擊手巾一條令產母以手攀之輕輕屈足坐身
令兒生下此名坐產若坐在物上反抵其生路

C000097

疾

盤腸產

盤腸產者臨產母腸先出然後兒生產後其腸不收治法以盆着溫水盛其腸令產母仰臥不妨以安其心却用好米醋半盞新汲水七分調勻喫產母面每喫一縮三喫收盡此良法也

一方用半夏爲末搗些小入鼻中

一方用草麻子二十四粒去壳研如膏貼頭頂上卽收急洗去



丹溪方治產後腸不收用香油五斤煎熱成

候温坐油盆中約一食時以皂角末吹入

覺作立收

又方以大紙撚蘸香油點燈吹滅以烟薰產母鼻

中腸卽上矣

又方盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之卽收

交骨不開

薛立齋曰交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎

前失于調攝以致血氣不能運達而然也交骨



不開陰氣虛也用加味芎歸湯 方見前

閉氣血虛也用十全大補湯地官李孟卿取

十五歲女為繼室慮其難產索加味芎歸湯四

貼備用至期果產門不開止服一貼頓然分娩

凡用此方者無不獲驗

內龜壳白死者良若無覓處即灼過龜板亦可

開骨膏 五月五日午時製

乳香研細滴水充如茨實大每服一粒無灰酒

吞下

雲母散 治交骨不開經日不產



雲母石研細澄過乾取三錢以無灰酒調

口卽產屢驗

紫蘇飲 治臨產驚恐氣結連日不下亦治懷胎近

上脹滿疼痛謂之子懸

紫蘇莖葉 一兩 大腹皮 人參 川芎 陳皮

白芍藥 各半 當歸 七錢 甘草 二錢半

右剉作三服每服用水一盞半生薑四片葱白七

寸煎至八分空心服

死胎



臨產子死婦中者多因驚動太早或觸犯禁

令產難胞漿已破無血養胎枯涸而死須驗

母舌若青黑知其已死當速下之疑貳之際先

進佛手散 方見前 用酒水合煎二三服探之若

未死子母俱安若胎已死立便逐下 母面赤

舌青者母活子死 母面青舌赤口沫出子活

母死 母唇口皆青兩邊沫出身重寒熱舌下

青黑及舌上冷遇此證者子母俱死不可救

有大貴人產難胎死腹中遍身如藍舌稍紅以



大劑芎歸湯加官桂牛膝葵子

半兩製三服

服水二盞煎一盞一服胸膈寬再服覺胸膈

如石墜下遂思食至半夜併查凡四服四

胎下已臭穢矣次早產母顏色紅白如常則亦

未可以面青身藍而不用藥也

烏金散 治難產胎死腹中或因顛撲或從高墜下

或房室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌或產

時未到經血先下致胎乾子死身冷不能自出

但視產婦面赤舌青是其候也又有雙胎一死



一活其候難知臨時觀變可也

熟地黄 焙乾 直蒲黃 大當歸尾

交趾桂 楊芍藥 均薑 去皮

豆粉 各一兩 小黑豆 四兩 百草霜 五錢

右為末每服三錢米合許沸湯六七分浸溫服

香桂散

桂枝 二錢 麝香當門子 一個

右研細煖酒調送須臾如手推下 一方單用官

桂末一錢痛時童便調下名救苦散



朴硝平胃散 治死胎不下指甲青古青脹門口出

作屎臭服此化為血水而下

蒼朮 陳皮 厚朴 各二錢 甘草 一錢

右用酒水各一盞煎至一盞投朴硝半兩再煎

二沸溫服極効

邕知縣治死胎不出用朴硝半兩研細以溫童便

調服屢驗

榆皮飲子 治子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥 六兩 通草 三兩 桂心 三兩



牛膝 西南

白榆皮

右水九升煎三升去渣分三服

又方 治子死腹中或半生不下血氣上盪母心面

無顏色神氣欲絕

豬脂 一個 白蜜 一升 淳酒 二升

右三味合煎取二升分温二服不能服者隨其所

欲服之

蛇退散 治死胎不出胞衣不下臨產危急甚妙

蛇退 全者香油燈上燒研



麝少許

右為末童便酒各半盞調一服即下

一字神散 治死胎不下胞破不生此方屢効救人

無量

鬼曰用羅黃毛者不以多少去毛研為末細如粉不

右每服二錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服

立効如神

千金神造湯 治妊有兩子一死一活服此死者出

生者安



蟹瓜

一升

甘草

二兩

阿膠

三兩

右用東流水一斗先煮蟹瓜甘草得三升去滓次

用阿膠納之令烊頓服之不能盡者分二三服

若妊母因弱仰口納藥入即活藥用東向靈以

蒿薪煮之佳

又方 治妊娠遇熱病胎死腹中鹿角屑一兩水

盞慈五莖豆豉半合同煎至六分去滓分二服

又方 取死胎

烏鷄一隻



右去尾細切以水三升煮二升去鷄通手用衣自

蘸摩臍下胎自出

一方用牛屎炒大熱入醋半盞以青布包于臍上

下炭之立下

臨產氣痿口噤

妊有坐草驀然氣痿目翻口噤此因喜怒大過精

竭營枯胎難轉動又坐草時用力過多腹疼久

不能熟忍目翻口噤面黑唇青口中沫出子母

俱損右兩臉微紅子死母活用此藥急救之



霹靂奪命丹 須至誠修合勿令婦人鷄犬見

蛇退 一條瓦罐內燒

千里馬 路上拾左脚舊草鞋洗淨燒取一錢

金銀箔 各七片

髮灰 二錢

馬鳴退 卽蚕紙燒灰一錢 乳香 半錢另研

黑鉛 三錢半鎔開入水銀七分半共攪研用

右用獐豬心血丸如桐子大倒流水灌下二丸如不能下化開灌之

產後調理



按經云婦人非止臨產須憂產後倍宜將息勿以
產時無他疾乃縱心恣意無所不犯犯時微
秋毫感病重于山岳

一產畢未可上床且兩人扶住却令人從心下輕
輕按至臍腹處五七次惡露皆下此後雖睡時
時按之使惡露不滯三日乃止

一產母分娩預燒秤錘或硬炭石燒令通赤置器
中方產卽于床前以醋沃之可除血暈七日內
時作爲妙無醋燒舊漆器亦可

一夏月宜房外燒磚以醋沃之却置房中不宜
房內燒火煮粥煎藥

一產畢卽令飲童子小便一盞不問有病無病以
童便和酒共一盃火中溫過服之以後進五七
服爲佳

一產畢不宜便臥且閉目少坐背後倚物須臾方
扶上床仰臥立膝未可伸足勿令側臥

一宜密遮四圍使無隙風不宜熟臥頻頻喚醒母
過飲酒母食太飽

七日內切不可洗七日外方可溫水就床坐洗
 須着襯手一月之外方可洗面梳頭兩月之外
 方可洗澡一百二十日內不可勞力過度
 胞衣不下

書云婦人百病莫甚于生產臨產莫重于催生既
 產莫重于胞衣不下所以不下者母生訖血流
 入衣中爲血所脹治之稍緩脹滿衝心疼痛喘
 急必致危殆但逐去衣中之血脹消自下切忌
 藉信坐婆輕用取法慎之慎之花蓋石散最妙

可預贖一匙備用凡胎衣不下切母先斷臍帶

若停待稍久恐損兒宜以物繫墜切宜用心先

繫牢不可脫然後如法截斷不爾則胞上掩心

而死既繫墜內服逐血之藥則胞衣自當痿縮

而下縱淹延數日亦無妨只要產母安心無慮

花蓋石散 治產後敗血不盡惡血奔心胞衣不下

一切血暈並皆治之或至死而心頭尚熱急以

童便調服三錢取下惡物如鷄肝片終身不患

血暈血風等證若膈上有血化為黃水即時吐

出或從小便而下神驗

硫黃

上色明淨者四兩搗為粗末

花蓋石

半斤搗為粗末

右二味拌勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一個
候泥乾入藥于內再用泥封口候乾安在四方
磚上書八卦五行字用炭一秤籠疊周圍自己
午時從下著火令漸漸上徹直至經宿火冷炭
消又放經宿罐冷取出細研以絹羅羅細磁盒
內收貯用童子小便調下一錢治胞衣不下如



神效藥即瘵金麻花菴石散宜時時蓄以防急
人事云死矣以此藥灌下一錢即甦其胎衣樂
惡水旋下而愈

必效牛膝湯 治胎衣不出腹脹急痛即殺人服此

藥胞即爛下

牛膝 瞿麥 各四兩 當歸 三兩

通草 六兩 滑石 八兩 葵子 五兩

右細切以水九升煮三升分三服

又方 治胞衣不下或經一二宿者

皂角刺燒為末每服一錢溫酒調下



又方

黑豆一合炒熟入醋一盞水一盞煎三五沸作
二三次服酒煎亦可

壓法

欲產時先脫下所着衣以籠竈上脫易產又脫
衣白下

又方

取夫单衣蓋井上立也

又方



又方

取產母鞋底火炙熱熨小腹上下二七次

令產母自啣髮尾在口嘔噦卽下

千金備急方

用三指撮竈突中土溫水服之

又方

灶內紅土一塊研細用醋調納臍中服甘草湯
一盞卽下

又秤錘燒紅酒浸服少許卽下

又方

鹿角鎊為細末二錢煎葱白湯調下

凡胞衣未下須忍痛正着身體切不可十分欠也

若困極以水煮蠮螋一枚二十沸灌之汁下即

出

血暈

金匱問曰新產婦人有三病一病瘧二鬱冒三六

便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令

病瘧亡血復汗寒多故令鬱冒亡津血胃燥故大



從其極產始覺昏即今世所謂血暈也眼黑花
 旋暈不能起坐甚者昏不知人氣閉欲絕是也
 其由有三宜仔細辨認方可用藥有下血少而暈
 者乃惡露上搶于心心下滿急神昏口噤不知人
 事宜用破血行血之藥黑神散最妙有下血多而
 暈者但神昏煩亂而已宜用補血清心之藥有用
 心使力過多而暈者宜補氣之藥俗醫不識呼爲
 疇風往往致劇凡欲分娩者先取穢醋以塗鼻
 仍置醋于傍使聞其氣或不時細細飲之此爲上

法如覺暈卽以醋熨面麤卽以醋飲之一法燒乾

漆令煙濃薰產母卽醒睡中頻頻喚醒母令睡熟

黑神散 治產後血暈寒多者用之產後十八證皆

可用驗過

熟地黄

當歸

蒲黃炒

乾姜炒黑

桂心

白芍藥各一兩

甘草炙二錢

黑豆炒去皮二合

右爲細末每服二錢酒半盞童便同煎調服

清魂散 治產後氣血極虛不省人事甚者口噤氣



金匱要略

澤蘭葉

人參

各二錢半

川芎

五錢

荆芥 一兩

甘草

二錢

右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽

眼開神定

失咲散 治產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭

暈或心下滿悶神昏口噤痰涎壅盛及一切心腹

痛欲死百藥不效服此即愈

五靈脂

蒲黃

各等分



右為細末先用醴醋調二錢熬成稠膏人水一盞

煎至七分食前熱服良驗

廣濟方

治血暈心悶不識人妄言鬼神氣急欲絕

芍藥

甘草

各一兩丹參

七錢半

生地黄汁

一盞

生姜汁

白蜜

各半盞

右水二碗煎前三味取一碗下二汁及蜜和勻分

二服

獨行散

治產後血暈昏迷不醒

五靈脂

二兩半生半炒



石為末每服一匙溫酒調下口燥者物開灌

入喉即愈一方加荊芥末童便調服如血崩

止加當歸童便酒煎服

又方 松煙墨二錢燒通紅窰滅為末溫酒或醋湯

調服半七

丹溪方 治產後血暈

鹿角燒灰出火毒研細用好酒童便調灌下

一呷即醒此物行血極效

登金散 治產後血上衝心已死用此灌之即活



鬱金 燒存性

右為末 釀醋調服

等命散 治血入心經 語言顛倒 健忘失志 及產後

百病

沒藥

血竭 各等分

右為細末 纔產下 卽用童便 細酒各半 盞煎一兩

沸調下 二錢 良久再服 其惡血自下 更不衝上

兔生百疾

收骨木破之 如箕子 一握 以水一升 煎取半升 分二



服治產後惡露不行心煩手脚發熱氣力欲
血暈連心頭硬及寒熱不禁服之即瘥

芎歸湯 治產後去血過多而暈

川芎

當歸 各一兩

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服腹中刺痛加

白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加白

芍藥水停心下加茯苓生姜虛煩不眠加人參

竹葉若目眼喎斜等證皆當大補氣血為主

以治痰藥 有臨產用力太過而暈者用補



益氣湯加香附有痰加茯苓半夏發熱作渴自汗盜汗氣血俱虛也用十全大補湯加炮薑

治血暈簡易方

韭菜細切盛于有嘴瓶內以滾醋沃之急封瓶口以瓶嘴塞對產母鼻中蓋韭能行血又以醋氣運之無有不効

血不下

夫惡露不下由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞絡按于宿冷或產營風取涼風冷乘虛而擣于血則

惡露不行積蓄在內故令惡露不下也宜用失散方見前

荷葉散

治產後三四日惡露不下

芍藥 一錢

知母 八分

生姜 一錢

當歸尾 七分

蒲黃 一錢

紅花 五分

荷葉中心蒂 七枚

生地黄汁 二合

右用水二鍾煎服

荷葉湯

治產後惡露不下腹疼煩悶

乾荷葉 二兩

鬼箭羽

桃仁



劉寄奴

蒲黃 各一兩

右為粗末每服三錢以童便一盞薑二片生地黃

一分搥碎同煎至六分去滓無時熱服

地黃湯 治產惡露不行餘血奔心煩悶不知人事

生地黃

川芎

枳殼

芍藥

右等分為末酒調服二錢并以童便飲之以手攪

心下

一方生藕汁飲二盞立效

本事方 治血不下



鮮益母草搗絞汁每服一小盅入酒三分攪勻

溫服

廣濟方 治惡露不下

川牛膝

大黃 各一兩 牡丹皮

當歸 各七錢

芍藥

蒲黃

桂心 各五錢

右為末以生地黄汁調服日二服血即下虛弱不

能食者宜酌用

血不止

血不止者惡露淋漓不絕也薛立齋云若肝氣弱



不能主血用六味地黄丸有熱用加味逍遙散
脾氣虛不能攝血用六君子湯脾氣下陷不能
血用補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源用
味歸脾湯若肝經怒火而血妄行用加味四物湯
若氣血俱虛用十全大補湯若肝經風邪而血沸
騰用一味防風丸大法補虛為主

芍歸加芍藥湯治產後血去不止

川芎

當歸

芍藥

各等分

右剉碎每服四錢水鍾半煎至七八服



知味四物湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

阿膠 炒成珠

蒲黃 各一錢

蘇根

艾葉

白芷 各八分

右用水二鍾煎至一鍾入生地黃汁一鍾再煎服

牡蠣散 治產後惡露淋漓不絕心悶短氣四肢乏

弱五心煩熱不思飲食面黃體瘦

牡蠣 煨

川芎

熟地黃

白茯苓

龍骨 各一兩

續斷

當歸

艾葉 酒炒



人參

五味子

地榆 各半兩
甘草 三

右為末每服三錢水一鍾生薑三片棗一枚煎

六分濾去渣空心服

生地黄湯 治產後七八日惡露不止

敗醬草

當歸 各八分
芍藥

續斷

川芎 各一錢

竹茹 五分

生地 一錢半

水二鍾煎八分空心頓服

獨聖湯 治產後亡血過多久而不止心腹刺疼亦

治赤白帶下年深諸藥不愈者良驗

生

卷

七



貫衆 狀如刺蝟者一個全用只揀去皮不到斷

右用好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為細末用酒

飲調下二錢空心服

秘對方 治胎落下血不止

桑木中蠹蟲燒存性為末酒服方寸七日二服

又方 治血不止虛羸欲死

蒲黃二兩水三升煎八合頓服

心疼

產後心疼為陰血虧損隨火上衝心絡名曰心胞



絡疼宜大岩蜜湯治之其真心疼者朝發夕死夕發朝死無藥可救 薛立齋曰若陽氣虛寒用岩蜜湯溫之瘀血上衝用失咲散散之血既散而痛仍作用八珍湯補之大凡心腹作痛以手按之却不痛血虛也須用補養之劑按之而疼益甚者瘀血也宜用行血利氣之藥

一產婦患前證昏憤口噤冷汗不止手足厥逆用六君子加附子一錢以廻其陽二劑頓甦又以十全大補湯養其血氣而愈

一產婦心腹疼手不敢近用失咲散一服下瘀血而愈次日腹疼亦用十全大補湯而安

一產婦患前證用大黃等藥其血雖下復患頭疼發熱惡寒次日昏憤自以兩手堅護其腹面色青白此脾氣虛寒而疼也用六君子湯加姜桂而疼止又用八珍湯加姜桂調理而安

大岩蜜湯

生乾地黄 當歸 獨活 吳茱萸

芍藥 乾姜 甘草 桂心



3000136
小草 各五錢 細辛 二錢

右爲末每服半兩水二盞煎至一盞去渣稍熱服
失啖散 治心腹疼欲死百藥不効服此頓愈

五靈脂 蒲黃 各等分

右爲末先用礮醋調二錢熬膏入水一盞煎至七

分稍熱服神驗

七氣手拈散 治產後心氣攻痛

玄胡索

小茴香

白芍藥

乾漆

炒

枳壳 各二錢 黃連

石菖蒲

香附子



苦蘇葉 各一錢半
沒藥 各一錢
乳香 各一錢
甘草 六分

右分作二服每服水一盞半薑三片煎至七分空

心服忌半日不飲食

腹疼

薛立齋云產後小腹作疼俗名兒枕塊用失笑散

行之見前若惡露既去而仍痛用四神散調補之

若不應用八珍湯若痛而惡心或欲作嘔用六君

子湯若痛而泄瀉六君子湯送四神丸若泄瀉痛

或後重用補中益氣湯送四神丸若胸膈飽脹或



惡食吞酸或手不可按此飲食所傷當用二陳加
 山查白朮以消導若食既消而仍痛或按之不痛
 或更加頭痛煩熱作渴惡寒欲嘔等證此是中氣
 被傷宜補脾胃為主若發熱腹痛按之疼甚不惡
 食不吞酸此是瘀血停滯用失笑散以消之若止
 是發熱頭痛或腹痛按之却不痛此是血虛用四
 物加炮姜參朮以補之丹溪先生云產後當大補
 氣血為先雖有雜證從末治之一切病多是血虛
 皆不可發表病機要云產後有三禁不可汗不可



下不可利小便

一產婦小腹作疼服行氣破血之藥不効其脉洪數此瘀血內潰爲膿也以瓜子仁湯二劑疼止更以大乙膏下膿而愈產後多有此病縱非癰用之更効

一產婦小腹疼小便利用薏苡仁湯二劑疼止更以四物加紅花桃仁下瘀血而愈大抵此證皆因榮衛不調或瘀血所致若脉洪數已有膿脉但數緩有膿脉遲緊有瘀血下之卽愈若腹脹



作水聲或膿從臍出或從大便出宜用虻螬
太乙膏及托裡藥凡瘀血停滯宜急治之緩則
化爲膿最難治療若流注關節則患骨疽失治
爲敗證

延胡索散 治產婦血塊凝滯在于小腹不能通流
致令結聚疼痛名曰兒枕疼因敗血挾寒而成此

證

延胡索

當歸

各一錢

真琥珀

蒲黃

炒各三錢

赤芍藥

桂心

各五錢

紅藍花

二錢



此合酒溫調三錢食前服

治先患冷氣因產後發腹疼

川芎

桂心

當歸

吳茱萸

茯苓

芍藥

甘草

各一錢

桃仁

一錢半

右水煎空心服

牡丹皮散

治產後三日血塊疼發熱

牡丹皮

五靈脂

炒

沒藥

滑石

飛過

各五錢

右研細分五貼豆淋酒調下食前服

定痛散

治產後腹中掬疼兒枕未定



當歸 三錢

芍藥 三錢

肉桂 二錢

右用薑二片水與酒各半盅煎六分溫服身熱以

芎代桂

黑神散 方見前

桃仁散 治產後下血不盡腹疼不可忍

桃仁 六十個 厚桂 一兩 當歸 一兩 芍藥 一兩

右分作二服用水二碗煎八分溫服未應加錦紋

大黃各三錢

治產後敗血作痛



玄胡索 各一錢

芍藥 生地黄

沒藥 七分 白芷 八分

水煎食遠溫服

立効散 治產後兒枕痛不可忍

五靈脂 慢火炒乾

右為末溫酒下二錢立瘥

當歸血竭丸 治產後惡露不下結聚成塊心胸痞

悶及臍堅疼

當歸 血竭 芍藥



蓬木 各二兩 五靈脂 四兩

右爲細末醋糊和丸如梧桐子大每服五十九合
前溫酒送下

丹溪方 治惡露未盡小腹作疼

五靈脂 末 香附 末 各等分

右合和醋糊爲丸甚者加桃仁不去尖

救急方 治惡露不盡腹脹疼

亂髮如鷄子大灰水洗淨燒存性末爲酒調服

二錢

生之



治餘血作疼成塊者

桂心

薑黃

各等分

右為細末酒調服方寸七血下即愈

枳實芍藥散

治腹痛煩滿不得臥

枳實

燒令黑勿太過

芍藥

各等分

右二味杵為末服方寸七日三服

當歸生薑羊肉湯

治產後寒疝虛勞不足腹中疴

疼

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 一斤



右三味以水八升煮取三升作三服熱服痛而
者加橘皮寒多者加生薑水亦量加

一婦人寒月產寒氣乘虛而入臍下脹滿手不可近
此寒疝也服羊肉湯稍減二服愈或以為瘀血欲
服抵當湯幾悞

一產婦小腹疼甚牙關緊急此瘀血內停灌以失咲
散下血而痊又用四物加白朮陳皮炮薑而愈

一產婦患前證或作嘔或昏憤此脾氣虛寒用人參
三升湯煎愈又以補中益氣湯加茯苓半夏全愈



產後兩脇脹滿氣痛由膀胱宿有停水因產後惡露

下不盡水滯痞與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹

滿氣與水相激故令痞也

薛立齋云前證若肝

經血瘀則玄胡索散若肝經氣滯用四君子青皮

柴胡若肝經血虛用四物參朮柴胡氣血俱虛用

八珍柴胡若腎本不足不能生肝用六味丸

一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹

痛此氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血順



止又用十全大補湯而寒熱漸退此證若非用薑
桂辛溫助脾肺以行藥熱不惟無以成功而反助
其張耳

青木香散 治產後脇肋脹痛

當歸 一錢
芍藥 二分
苦梗
枳櫛

枳殼 各八分
桂心
青木香
柴胡 各七分

石 瓦片水二鍾煎八分去滓空心溫服

一 治產後煩悶兩腋脹滿時痛

黃芩 各六分
芍藥 炒一錢



右水二鍾煎八分入薄荷空心服

廣濟方

療產後腹脇痛脹不能下食兼微痢

茯苓

人參

當歸

甘草

各六分

乾生薑

陳皮各四分

厚朴

七分

右豉阻水二盞煎八分溫服

扶聖湯

治產後腹脇滿悶或嘔吐者

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

陳皮

人參

甘草

各一錢



改阻水一盞薑三片煎溫服

腰疼

產後腰痛者爲女人腎位繫于胞產則勞傷腎氣損
動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰
痛也若寒冷邪氣連滯背脊則疼久未已後忽有
娠必致損動蓋胞絡屬腎腎主腰故也 薛立齋

日前證真氣虛邪乘之者用當歸黃芪湯或十全
大補湯爲主佐以寄生湯如不應用十全大補加
附子一產婦腰痛腹脹善噦諸藥皆嘔余以爲氣



匙許四劑後漸安百餘劑而愈

黃芪當歸湯 治產後腰痛不可轉側自汗腹熱氣短

黃芪

芍藥 各二兩

當歸 三兩

右剉碎每服一兩薑四片水煎溫服

活生薑湯

治產後風冷腰痛不可轉側四肢沉

重行步艱難

獨活

川芎

芍藥 黃

桂心



續斷

生薑

桑寄生

各六分

當歸

防風

各八分

右用水二盞煎至八分空心服

敗醬散

治產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬

當歸 各八分

川芎

桂心

芍藥

各六分

水二盞煎八分溫服忌葱

千金大豆酒

治產後中風腰背強痛煩熱苦渴頭

身苦重此因風冷及傷寒所致



黑大豆一升炒令煙出以酒一升投之密蓋候
溫去豆服酒日夜數服臥取微汗避風亦有如
羌活服者亦佳

如神湯 治產後血滯腰痛及腹中疝痛神效

玄胡索 微炒 當歸 桂心 各等分

右為細末每服二三錢不拘時溫酒調服一方加

杜仲或桃仁牛膝續斷亦可

又方

四物湯細末三兩加酒煮玄胡索末二兩每服



C000154

三錢酒下

三錢酒下

