



~~17.12.26~~  
~~1673~~

Q H 186

N 2

F

v. 2

No. \_\_\_\_\_

**ACADEMY OF NATURAL SCIENCES**

OF

**PHILADELPHIA.**

*Deposited by D. Wilson*

1847










VERHANDELINGEN  
over  
DE NATUURLIJKE GESCHIEDENIS  
DER  
Nederlandsche overzeesche bezittingen,  
door  
de Leden der Natuurkundige commissie in Indië  
en andere Schrijvers.

UITGEGEVEN  
OP LASTE VAN DEN KONING  
door  
C. J. TEMMINK.



**BOTANIE.**

Geredigeerd door J. A. Sussanna, Gedrukt door J. G. la Lau.  
Leiden

IN COMMISSIE BIJ S. EN J. LUCHTMANS EN C. C. VAN DER HOEK.

1839 - 1842.

QH 186

N 2

F

V. 2



113834

# **K R U I D K U N D E,**

DOOR

**P. W. KORTHALS.**



## REGISTER.

	Pag.
<b>Nepenthes</b> . . . . .	1.
N. bongso . . . . .	19.
N. gracilis . . . . .	22.
N. Boschiana . . . . .	25.
N. phyllamphora . . . . .	28.
N. gymnamphora . . . . .	32.
N. Rafflesiana . . . . .	35.
N. ampullaria . . . . .	39.
N. madagascariensis . . . . .	41.
N. destillatoria . . . . .	42.
Verklaring der platen . . . . .	43.
<b>Dipterocarpeae</b> . . . . .	45.
Retinodendron . . . . .	55.
R. rassak . . . . .	56.
R. pauciflorum . . . . .	58.
Dipterocarpus . . . . .	59.
D. Baudii . . . . .	ib.
D. trinervis . . . . .	61.
D. littoralis . . . . .	62.
D. elongatus . . . . .	ib.
D. tampurau . . . . .	63.
D. marginatus . . . . .	64.
D. Hasseltii . . . . .	65.
Anisoptera . . . . .	ib.
A. marginata . . . . .	66.
A. costata . . . . .	67.
Dryobalanops . . . . .	ib.
D. camphorae . . . . .	68.
D. sericea . . . . .	72.
Vatica . . . . .	ib.
V. lepidota . . . . .	73.
V. ovalis . . . . .	ib.
Hopea . . . . .	74.
H. balangeran . . . . .	ib.
H. sangal . . . . .	75.
<b>Bauhinia</b> . . . . .	77.
Lasiobema . . . . .	84.
B. anguina . . . . .	ib.
Pauletia . . . . .	ib.
B. acuminata . . . . .	ib.
B. tomentosa . . . . .	85.

	Pag.
B. hirsuta . . . . .	85.
B. acida . . . . .	86.
Phanera . . . . .	87.
Symphopoda . . . . .	ib.
B. Kockiana . . . . .	ib.
B. pyrraneura . . . . .	88.
B. elongata . . . . .	89.
B. ferruginea . . . . .	90.
B. semibifida . . . . .	91.
B. fulva . . . . .	ib.
B. stipularis . . . . .	92.
B. corymbosa . . . . .	ib.
<b>Ternstroemiaceae</b> . . . . .	93.
Reinwardtia . . . . .	101.
R. patens . . . . .	102.
R. elongata . . . . .	103.
Sarosantha . . . . .	ib.
S. excelsa . . . . .	104.
Adinandra . . . . .	105.
A. Jackiana . . . . .	106.
A. trichocoryna . . . . .	107.
A. dasyantha . . . . .	108.
A. excelsa . . . . .	109.
A. acuminata . . . . .	ib.
Eurya . . . . .	110.
E. euprista . . . . .	113.
E. glabra . . . . .	114.
E. nitida . . . . .	115.
E. coneocarpa . . . . .	117.
E. obovata . . . . .	118.
E. reticulata . . . . .	ib.
E. Blumeana . . . . .	119.
Saurauja . . . . .	120.
S. subcordata . . . . .	124.
S. leucophloia . . . . .	125.
S. media . . . . .	ib.
S. nudiflora . . . . .	126.
S. cauliflora . . . . .	ib.
S. Jackiana . . . . .	127.
S. spadicea . . . . .	ib.
S. pendula . . . . .	ib.
S. nigrescens . . . . .	128.

	Pag.
S. vulcani . . . . .	128.
S. excavata . . . . .	130.
S. leprosa . . . . .	ib.
S. distasosa . . . . .	131.
S. ferox . . . . .	132.
S. setigera . . . . .	133.
S. tewensis . . . . .	ib.
S. Reinwardtiana . . . . .	134.
S. sakoembangensis . . . . .	ib.
S. singalangensis . . . . .	ib.
Ploiarium . . . . .	135.
P. elegans . . . . .	ib.
Laplacea . . . . .	136.
L. vulcanica . . . . .	ib.
Antheischima . . . . .	137.
A. excelsa . . . . .	138.
Closaschima . . . . .	139.
C. ovalis . . . . .	140.
C. marginata . . . . .	141.
Schima . . . . .	142.
S. crenata . . . . .	143.
S. Noronhae . . . . .	144.
S. antherisosa . . . . .	145.
Pyrenaria . . . . .	ib.
P. serrata . . . . .	146.
P. oidocarpa . . . . .	147.
P. masocarpa . . . . .	ib.
P. lasiocarpa . . . . .	ib.
Calpandria . . . . .	148.
C. lanceolata . . . . .	ib.
C. quiscosaura . . . . .	149.
<b>Nauclea en eenige verwante</b>	
<b>geslachten</b> . . . . .	150.
Platanocarpum . . . . .	152.
P. subditum . . . . .	153.
Anthocephalus . . . . .	ib.
A. morindaefolius . . . . .	154.
Nauclea . . . . .	156.
N. strigosa . . . . .	157.
N. purpurascens . . . . .	ib.
N. synkorynes . . . . .	158.
N. obtusa . . . . .	ib.



	Pag.
<i>N. lanceolata</i> . . . . .	159.
<i>Stephegyne</i> . . . . .	160.
<i>S. spcciosa</i> . . . . .	ib.
<i>S. parvifolia</i> . . . . .	161.
<i>Uncaria</i> . . . . .	162.
<i>U. ferruginea</i> . . . . .	164.
<i>U. Hallii</i> . . . . .	165.
<i>U. nemorosa</i> . . . . .	166.
<i>U. pedicellata</i> . . . . .	ib.
<i>U. gambir</i> . . . . .	167.
<i>U. dasyoneura</i> . . . . .	169.
<i>U. attenuata</i> . . . . .	170.
<i>U. callophylla</i> . . . . .	ib.
<i>U. acida</i> . . . . .	171.
<i>U. canescens</i> . . . . .	172.
<i>U. Roxburghiana</i> . . . . .	ib.
<i>U. glabrata</i> . . . . .	173.
<i>U. ferrea</i> . . . . .	ib.
<b>Cratoxylon en Tridesmis</b> . . . . .	175.
<i>Cratoxylon</i> . . . . .	ib.
<i>C. polyanthum</i> . . . . .	ib.
<i>C. glaucum</i> . . . . .	176.
<i>C. Hornschuchii</i> . . . . .	178.
<i>Tridesmis</i> . . . . .	179.
<i>T. formosa</i> . . . . .	ib.
<b>Salacia en Hippocratea</b> . . . . .	181.
<i>Salacia</i> . . . . .	ib.
<i>S. polyantha</i> . . . . .	182.
<i>S. ovalis</i> . . . . .	ib.
<i>S. kalahiensis</i> . . . . .	183.
<i>S. exsculpta</i> . . . . .	ib.
<i>S. prinoïdes</i> . . . . .	184.
<i>S. macrocarpa</i> . . . . .	ib.
<i>Hippocratea</i> . . . . .	185.
<i>H. indica</i> . . . . .	ib.
<i>H. glaga</i> . . . . .	186.
<i>H. macrantha</i> . . . . .	187.
<i>H. salacioïdes</i> . . . . .	188.
<b>Praravinia en Omphacarpus</b> . . . . .	189.
<i>Praravinia</i> . . . . .	ib.
<i>P. densiflora</i> . . . . .	190.
<i>Omphacarpus</i> . . . . .	192.
<i>O. opacus</i> . . . . .	193.
<i>O. hirsutus</i> . . . . .	ib.

	Pag.
<b>Eiken van den Indischen Archipel</b> . . . . .	195.
<i>Quercus hystrix</i> . . . . .	201.
<i>Q. mappacea</i> . . . . .	202.
<i>Q. oligoneura</i> . . . . .	203.
<i>Q. anceps</i> . . . . .	204.
<i>Q. racemosa</i> . . . . .	205.
<i>Q. microcalyx</i> . . . . .	206.
<i>Q. leptogyne</i> . . . . .	ib.
<i>Q. gracilis</i> . . . . .	207.
<i>Q. Blumeana</i> . . . . .	208.
<i>Q. encleisacarpa</i> . . . . .	209.
<i>Q. Reinwardtii</i> . . . . .	211.
<i>Q. costata</i> . . . . .	212.
<i>Q. Ewyckii</i> . . . . .	ib.
<i>Q. annulata</i> . . . . .	213.
<i>Q. omalokos</i> . . . . .	214.
<i>Q. argentata</i> . . . . .	215.
<i>Q. oïdocarpa</i> . . . . .	216.
<b>Indische Melastomaceae</b> . . . . .	218.
<i>Osbeckia</i> . . . . .	223.
<i>O. linearis</i> . . . . .	224.
<i>Melastoma</i> . . . . .	ib.
<i>M. polyanthum</i> . . . . .	225.
<i>M. erectum</i> . . . . .	226.
<i>M. lanuginosum</i> . . . . .	227.
<i>M. Jackianum</i> . . . . .	ib.
<i>M. punctatum</i> . . . . .	229.
<i>M. asperum</i> . . . . .	230.
<i>M. setigerum</i> . . . . .	ib.
<i>M. pulcherrimum</i> . . . . .	231.
<i>M. Boryanum</i> . . . . .	232.
<i>M. nitidum</i> . . . . .	234.
<i>Othanothera</i> . . . . .	235.
<i>O. bracteata</i> . . . . .	ib.
<i>Dissochaeta</i> . . . . .	236.
<i>D. fallax</i> . . . . .	ib.
<i>D. intermedia</i> . . . . .	ib.
<i>D. gracilis</i> . . . . .	237.
<i>D. bracteata</i> . . . . .	ib.
<i>D. cyanocarpa</i> . . . . .	238.
<i>D. bipulvinata</i> . . . . .	239.
<i>D. rostrata</i> . . . . .	ib.
<i>D. nodosa</i> . . . . .	ib.

	Pag.
<i>D. biligulata</i> . . . . .	240.
<i>Marumia</i> . . . . .	ib.
<i>M. affinis</i> . . . . .	241.
<i>M. leprosa</i> . . . . .	ib.
<i>M. pachygyna</i> . . . . .	242.
<i>M. vulcanica</i> . . . . .	243.
<i>M. Jackii</i> . . . . .	ib.
<i>M. stellulata</i> . . . . .	ib.
<i>Dalenia</i> . . . . .	ib.
<i>D. speciosa</i> . . . . .	244.
<i>Medinilla</i> . . . . .	245.
<i>M. polyantha</i> . . . . .	ib.
<i>Pachycentria</i> . . . . .	246.
<i>P. tuberculata</i> . . . . .	ib.
<i>Pogonanthera</i> . . . . .	247.
<i>P. pulverulenta</i> . . . . .	ib.
<i>Ochthocharis</i> . . . . .	ib.
<i>O. paniculata</i> . . . . .	ib.
<i>Sonerila</i> . . . . .	248.
<i>S. begoniaefolia</i> . . . . .	ib.
<i>S. picta</i> . . . . .	249.
<i>S. obliqua</i> . . . . .	250.
<i>Anerincleistus</i> . . . . .	ib.
<i>A. hirsutus</i> . . . . .	ib.
<i>Driessenia</i> . . . . .	251.
<i>D. axantha</i> . . . . .	ib.
<i>Phyllagathis</i> . . . . .	252.
<i>P. rotundifolia</i> . . . . .	ib.
<i>P. gymnantha</i> . . . . .	ib.
<i>Kibessia</i> . . . . .	253.
<i>K. cordata</i> . . . . .	ib.
<i>K. simplex</i> . . . . .	ib.
<i>Ewyckia</i> . . . . .	254.
<i>E. galeata</i> . . . . .	ib.
<i>E. tuberculata</i> . . . . .	255.
<i>E. cordata</i> . . . . .	ib.
<b>Cleisocratera, Boschia en Maranthes</b> . . . . .	256.
<i>Cleisocratera</i> . . . . .	ib.
<i>C. elegans</i> . . . . .	257.
<i>Boschia</i> . . . . .	ib.
<i>B. excelsa</i> . . . . .	258.
<i>Maranthes</i> . . . . .	ib.
<i>M. multiflora</i> . . . . .	259.



OVER HET GESLACHT  
**N E P E N T H E S,**

DOOR

**P. W. KORTHALS,**

PHIL. DOCT., RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW,  
LID VAN DE NATUURKUNDIGE COMMISSIE IN OOST-INDIË.



Onder de ons door Benzon (\*) bekend gemaakte gewassen, vinden wij er een vermeld, dat, volgens dezen schrijver, door de afdruipling van vocht uit de bladen, den regen schijnt na te bootsen en dat door Sprengel voor *Nepenthes* gehouden wordt (†). Met dit gevoelen kan ik mij niet vereenigen: veeleer zoude ik, na de meer uitvoerige beschrijving, welke Linschoten eenige jaren later leverde (§), van gevoelen zijn, dat Benzon en Linschoten eenen op de *Caesalpinia pluviosa* gelijkenden boom, of misschien wel dezen zelve, bedoeld hebben.

De bekendwording der *Nepenthes* behoort dus tot een nieuwer tijdvak, en de eerste bepaalde opgave derzelve moet den Gouverneur van Madagascar, Flacourt, worden toegeschreven. Hij vond haar in de omstreken van de door de Franschen op dit eiland genomene bezitting, leerde haar van de inlanders onder den naam van Poenga kennen, en deelde ecne beschrijving en afbeelding van haar mede, onder de benaming van *Amramatico* (x).

---

(\*) Benzonius, *Nova novi orbis historia*.

(†) Sprengel, *Historia rei herbariae*, I. p. 373.

(§) Linschoten, *Indiae Orientalis*, Pars 3. Cap. 5.

(x) Flacourt, *Histoire de la grande Isle de Madagascar*, p. 130. N<sup>o</sup>. 43.

Het aanwezen van een gelijkvormig gewas op Ceylon, werd eenige jaren later door Paulus Hermann, die langen tijd (van 1669) op dit eiland Geneesheer was, bekend gemaakt, toen deze, door het vreemde van den vorm getroffen, eenige der verzamelde voorwerpen aan Commelyn, te Amsterdam, toezond. Door dezen beoefenaar der kruidkunde werd de van Ceylon ontvangen sebat aan den beroemden J. Breyne, bij gelegenheid, dat deze Holland bezocht, getoond en medegedeeld, om de eigendom der wetenschap te worden. Het vond dan ook in den door Breyne uitgegeven Prodrumus eene plaats, en werd vermeld onder bijvoeging, dat het zeer gelijk was aan de Madagasearse Amramatieo (\*).

De bladen werden vervolgens door Amman onder den naam van Bandoera afgebeeld (†), en de geheele plant, in 1682, door H. N. Grimm, volgens door hem, niet ver van Colombo op Ceylon gevondene voorwerpen, onder den naam van Planta mirabilis destillatoria beschreven (§).

Het aanwezen van eenen gelijksoortigen vorm in den Archipel, werd ons door Rumphius bekend, en zijne afbeelding en beschrijving komen, onder den naam van Cantharifera, in het door hem reeds in 1702 voltooide werk voor (\*).

Deze drie vermelde, door hunne uitwendige gedaante zoo zeer overeenstemmende gewassen, waren dus ontdekt, toen Linnaeus als herschepper der wetenschappelijke nomenclatuur optrad. Evenwel schijnt hem de Ceylonsehe plant alleen door voorwerpen en de andere slechts door beschrijvingen en afbeeldingen bekend te zijn geweest, en hare in het oog vallende overeenkomst met de afbeeldingen der Madagasearse en Moluksehe planten aanleiding te hebben gegeven, om allen onder den soortnaam destillatoria met den geslachtsnaam Nepenthes te vereenigen. De eerste naam was zeer goed gekozen om de eigenschap der plant uit te drukken; de tweede was meer diehterlijk, en herinnerde aan een gewas, dat in de oudheid den roem had van uitstekende smartverdrijvende eigenschappen te bezitten (‡).

Deze bekerdragende gewassen komen nu onder den geslachtsnaam Nepenthes bij de volgende schrijvers voor. Door Poiret (\*\*\*) werd het eerst het soortelijk verschil der onder den Linneaansehen naam vereenigde gewassen aan het licht gebracht, en eene wetenschappelijke beschrijving van de door Commerson aan de Fransehe verzamelingen bezorgde Madagasearsehe plant, onder den naam van Nepenthes Madagaseariensis geleverd, en tevens eene naamsverandering van de planten der oostelijker streken voorgesteld. Deze laatste werden nu als Nepenthes Indica vermeld en bleven vereenigd, tot dat Willdenow aan de Ceylonsehe plant als de oorspronkelijke, door Linnaeus bedoelde soort, den naam van Nepenthes destillatoria gaf, en aan die van den Archipel en de door Loureiro van Coehinehina beschrevene plant, dien van Nepenthes phyllamphora toekende (††).

(\*) J. Breyne, Prodrumus, I. p. 18.

(†) Ephemeridium Academiae Naturae curiosorum, Ann. 1. Observ. 23.

(§) Hetzelfde werk, Observatio 146.

(\*) Rumphius, Herbarium Amboinense, T. 5. Tab. 59.

(‡) Homerus, Odyssea IV. 221. Plinius, Historia naturalis, Lib. XXI. 21. Lib. XXV. 2.

(\*\*\*) Encyclopedie Botanique, Nepenthes.

(††) Willdenow, Species Plantarum, T. 4. p. 874.

Later werden er aan dit drietal soorten door het onderzoek van den Hoogleraar Reinwardt (van 1816—1822) nog twee toegevoegd, van welke de eene op het eiland Java en de andere soort op Celebes wordt aangetroffen. Beiden zijn het eerst door den Heer Nees von Esenbeck onder de haar door den Heer Reinwardt gegevene namen beschreven (\*). Bijna gelijktijdig had de ontdekking der fraaije *Nepenthes ampullaria* en *N. Rafflesiana* (vermoedelijk de *N. maxima* Rwdt.), op de eilanden Singapoera, Bintang enzv., door W. Jaek, plaats (†). De Heer Brongniart, eene uitvoerige beschrijving van de in de Parijsche verzamelingen voorhandene *Nepenthes destillatoria* en *N. Madagascariensis* leverende, maakte bij die gelegenheid melding eener soort onder den naam van *N. cristata*, die, hoewel door Nees von Esenbeck met de Javaansehe *N. gymnamphora* als identiesch beschouwd, vermoedelijk op wortelbladen van onderscheidene soorten berust. Deze reeds bekende zes soorten werden door onze latere reizen op Sumatra en Borneo, met nog een drietal onvermelde soorten vermeerderd.

Blijkens deze korte geschiedenis behooren de soorten van *Nepenthes* in de, door den grooten oceaan bespoelde, tusschen de keerkringen gelegene oorden te huis. Zij vertegenwoordigen hier, door hare vormen, de Noord-Amerikaansehe *Sarraceniae* en den aan Nieuw-Holland eigenen *Cephalotus*. De westelijkst gevondene soort is de *Nepenthes Madagascariensis*, welke op het eiland Madagascar, in de oorspronkelijke bosschen der lagere streken voorkomt, alwaar, volgens Bojer en Hilzenberg, de *Tanghina veneniflua*, de beruchte giftboom van dit eiland niet zeldzaam is. Op Ceylon groeit de *Nepenthes destillatoria* vooral in de vochtige opene plaatsen, waar enkele struikbossen in de grasvlakten verspreid zijn, tussehen deze struiken als een verscheidene voeten lang klimgewas, of zij treedt minder welig van tussehen het gras te voorschijn. Oostelijker op de eilanden van den Archipel tot aan Nieuw-Guinea's zuid-westkust, in de Philippijnen en op het vasteland in Cochinehina merkt men meerdere soorten op. De *Nepenthes ampullaria*, *N. Rafflesiana*, *N. phyllamphora* wassen in de moerassige bosschen van Sumatra's westkust, en de *N. Bongso*, eene nieuwe soort, op de met uitgebrande steenblokken bedekte bergruggen van den aldaar gelegen Merapi. De beide eerste soorten zijn daarenboven op de kleine eilanden, tegen over Malakka's zuidpunt te huis, en de *N. phyllamphora* heeft Sumatra's oostkust (§), Banea, Cochinehina, de Molukken, Tidore en Nieuw-Guinea tot groeiplaatsen. Het laatstgenoemd gewas werd door ons waargenomen in de moerassige bosschen van het bezocht gedeelte van Borneo's zuid-oostkust. De *Nepenthes gracilis* versierde in deze landstreek daarentegen de drooge zanden steengronden, en een heerlijk ontwikkelde vorm van *N. Boschiana*, de bosschen van het hoogere gebergte. De *Nepenthes gymnamphora* is tot dusverre alleen bekend als bewoner der oorspronkelijke bosschen van Java's gebergte.

Hoewel de versehillende standplaatsen, waar deze planten groeijen, op de ontwikkeling derzelve eenen aanmerkelijken invloed uitoefenen, bieden echter de bekende soorten eene zeer overeenstemmende groeiwijze aan.

(\*) Nees von Esenbeck in *Annales des Sciences naturelles*, Tom. 3.

(†) De eerste vermelding dezer soorten vindt men in eenen brief van W. Jack aan zijnen Vader, dato 20 Junij 1819.

(§) Deze opgave berust op het door Rumphius medegedeelde, en op de mij door bewoners van Corinthie, die de rivier naar Palembang waren afgezakt, gegevene inlichtingen.

De worteltjes der pas ontkiemde planten zijn spilvormig en worden bij meerdere uitgroeiing door eene menigte vezeltjes takrijk. Vervolgens vormt de wortel eenen wortelstok, die zich bijna horizontaal onder den grond ontwikkelt, of in den vorm van eene rank over denzelfven heenkruipt. In het eerste geval is hij zwart en zeer houtig; in het laatste neemt hij het voorkomen van de steng aan. Deze wortelstok bezit dikwerf aan het begin, zoo als Rumphius dit reeds zeer juist afbeeldt, eene knolvormige verdikking, welke vooral op droogere plaatsen eene aanzienlijke ontwikkeling erlangt, en sehijnt mij toe, na de afsterfing der bladdeelen voort te duren. Uit den wortelstok ontwikkelen zich op onbepaalde afstanden nieuwe spruiten, die grootendeels eene geringe uitgroeiing verkrijgen, omdat meestal de eene derzelve zich ten koste der andere vergroot. Deze hoofdsteng neemt nu bij hare vergrooing bijzonder in lengte toe, terwijl zij slechts eene geringe vermeerdering van dikte ondervindt.

De stengen zijn bij eene aanzienlijke verlenging in het benedenste gedeelte bladerloos, en bezitten daar enkele verspreidene bladgroepen. Hare oudere deelen hebben eenen rolronden vorm en den houtachtigen aard van den wortelstok; hare jongere bezitten, naarmate de bladen meer of minder gesteed zijn, eenen driehoekigen vorm en eene meer kruidachtige geaardheid. Bij de *Nepenthes gracilis* is de jonge steng driezijdig en de afloopende bladstelen vormen langs de, aan de bladen tegenovergestelde zijden, bladaardige randen; bij de *N. Borehiana* zijn deze randen op de ronde steng tegen over elkander geplaatst. De jongere stengen van al de mij bekende soorten hebben eene meer of minder ontwikkelde haarbedekking, welke aan de *Nepenthes Rafflesiana* enzv. een grijs, en aan de *N. ampullaria* enzv. een bruin aanzien geeft. Dit harig bekleedsel blijft bij de laatstgenoemde soort voorhanden, maar ontvalt aan de andere met de uitgroeiing der plant; hetgeen deze bijna geheel glad doet worden. Omtrent dit bedeksel heb ik opgemerkt, dat het uit langere eenvoudige en uit kleinere meer stervormige haartjes bestaat, en dat de eerste veelal het spoedigst verdwijnen.

Zoo als reeds door vroegere sehrijvers, de Heeren Valentini en Lindley (\*) is aangetoond, versehilt de steng van *Nepenthes* van de gewone zamenstelling, doordien de grenzen tussehen vaten en merg minder bepaald zijn, dan gewoonlijk. Zeer jonge toppen der steng bestaan uit een zeer fijn mergaardig eelweefsel, hetwelk rijk aan korrels en omgeven is door een uit eene eellenlaag bestaand vlies. Lager heeft dit eelweefsel eenige spiraalvaten, die gemeenlijk met eenen afgeronden top tussehen vier eellen besloten zijn; hetzelfde is door eene vezellaag omringd. Wanneer men de ontwikkelde stengen in het gebladerd gedeelte onderzoekt, dan leveren zij de volgende zamenstellende deelen. — De opperhuid bestaat uit ééne of twee, zelden uit meerdere lagen van dikwandige, eene groene of bruine kleurstof bevattende, eellen. Onder haar liggen de dikwandige, van zeer aanzienlijke openingen voorziene bastvezels, met eene menigte tussehen dezelve verspreide spiraalvaten. De bastlagen omringen een zeer los eelweefsel, waarin eenige, vooral uit spiraalvaten bestaande, vaatbundels verstrooid liggen. Nu volgt een ring, die in het bovengedeelte uit ééne of twee en in het lager gedeelte van de steng uit meerdere rijen van kleine eellen bestaat. Deze omgeeft eene, zich aan het bloote oog als een witte, vezelige eirkel voordoende laag, die met gewapende oogen waargenomen, spiraalvaten van ongeveer  $\frac{1}{20}$  streep middellijns doet zien.

(\*) Lindley, Introduction to Botany, p. 69.



Deze spiraalbundelring wordt door eene cellenlaag, waarin enkele bastvezelbundels verspreid zijn, van de houtlaag geseheden. De houtlaag met het ongewapend oog gezien, doet zich voor, als uit twee versehillende lagen bestaande, van welke de buitenste rijk is aan kleine gaatjes en de binnenste, het merg omringende, eene zeer digte samenstelling aanbiedt. Bij eenige vergrooing nemen wij in deze houtlaag spiraal- en rozenkransvaten, gestipte langwerpige eellen en vezels, en ook mergeellen waar. De buitenste laag bevat alleen regelmatige mergstralen, die uit dikwandige tafelvormige eellen bestaan, en in de gemelde eellenlaag onder de spiraalvaten verloopend; vervolgens rozenkransvaten met tamelijk lange, door bijna horizontale dwarsbanden aangetoonde leden, en zeer kleine, digt gedrongene vezels. De binnenste laag, die als het mergkanaal kan aangemerkt worden, bestaat uit grootere, dikwandige vezels, langwerpige vezeleellen, met bruine kleurstof gevulde eellen, benevens eenige spiraalvaten, die door de dikkere wanden en den grooteren omvang gemakkelijk erkend kunnen worden. Tussehen deze laag is het merg besloten, hetwelk uit twee soorten van eellen en uit spiraalvaten bestaat. De eene en talrijkste soort van eellen is tevens de grootste en vormt een los weefsel; tussehen deze zijn de andere, meer dan de helft kleinere, zoodanig in rijen boven elkander geplaatst, dat zij bij een oppervlakkig onderzoek vezels sehijnen te zijn. De eerste hebben tussehen dikke wanden kleine holten, en in de laatste omgeven dunne wanden eene bruine kleurstof. Niet zelden zijn deze kleine eellen bij de spiraalvaten geplaatst, zoodat ik in het begin, bij geringe vergrooing, een' vaatbundel meende te zien (\*). De spiraalvaten hebben somwijlen eene aanzienlijke grootte, ongeveer  $\frac{1}{3}$  streep middellijns, en zeer dikke draden, die mij voorkwamen bijna vierkantig te zijn.

De oudere stengen versehillen door het gemis van de buitenste epidermis, de bastvezellaag en het daaronder gelegen eelweefsel met deszelfs vaatbundels, die mij voorkomen, deelen te zijn van de afloopende bladstelen der jongeren. Haar buitenvlies bestaat uit eene menigte kleine eellen, met bruin gekleurde wanden; het bedekt de reeds vermelde laag van spiraalvaten; hieronder ligt het eelweefsel en verder naar binnen de reeds bij de jongere steng waargenomene deelen. Bij deze gelijke samenstelling leveren echter de bestanddeelen eenig versehil. De spiraalvaten zijn over het algemeen veel kleiner; hunne draden bezitten naauwelijks de helft der grootte van de in jongere stengen voorkomende. De buitenste ring van de houtlaag, aan zijne gaatjes te erkennen, is veel meer ontwikkeld, echter zijn zijne vaten van gelijke geaardheid. De binnenste is meer te zamengedrongen en omgeeft een digt, dikwandig eelweefsel met verspreide spiraalvaten. Dit eelweefsel bestaat uit twee soorten van eellen, en niet zelden bevatten ook hier de grootere eellen kleine bruine bolletjes. Deze samenstelling der steng met het tot dusver bekende van andere gewassen vergelijkende, is het voorkomen van de spiraalvaten in het merg eene eenigzins met de Monocotyledonen in verband staande en met verseheidene Dicotyledonen overeenkomende verschijning (†), van welke de Heer Treviranus vele voorbeelden, en de Heer Schultz ons eenige afbeeldingen gegeven hebben. Daarentegen staat het voorkomen van den spiraalring tussehen bast en hout nog geheel op zich zelf.

(\*) Het is belangrijk, deze samenstelling te vergelijken met hetgeen de Heer Meyen, in Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte, 1838, p. 297, over de vezelen van het vlas vermeldt, waardoor het niet onwaarschijnlijk wordt, dat deze langwerpige cellen, als nog niet tot een geheel zaamgegroeide vezels te beschouwen zijn.

(†) Treviranus, Physiologie, I. p. 209.

Na deze uitweiding omtrent de zamenstellende deelen der steng, zetten wij de beschouwing van het uiterlijke der plant verder voort. De knoppen zijn zelden geheel rolrond, maar veelal eenigzins zamengedrukt en omvatten de jongere deelen. Hunne meerdere of mindere lengte hangt af van de ontwikkeling van den steel, aan welks einde de beker in eenen zeer jongen staat slechts eene kleine teruggebogene verdikking vormt. Deze, even als het verlengde gedeelte van de middelnerf, en de middelnerf benevens de randen der knoppen, zijn veelal digt behaard.

De knoppen ontrollen zich bij de meerdere vergrooting, en gaan door de uitgroeiing, in geheel van het gewone afwijkende bladvormen over, welke uit een' steel, eene meer of minder groote bladschijf, met eene sterk ontwikkelde middelnerf, die zich boven de bladschijf verlengt, en uit een' knods of bekervormig ligchaam bestaan. De bladen hebben, naar gelang van hunnen stand, eene veranderde evenredigheid in derzelve zamenstellende deelen.

De wortel en benedenste stengbladen bezitten dikwerf alleen aan den voet, waar zich het blad met de steng vereenigt, eene geringe scheëvormige uitbreiding, wier middelnerf in eenen ongelijken driehoekigen steel uitloopt, welks bovenste gedeelte altijd vlak is. In den jeugdigen staat eindigt deze steel in een klein onregelmatig rolrond of vierkantig ligchaam. Deze verdikking neemt vervolgens eenen meer regelmatigen vorm aan, en wordt bijna kogelvormig bij *Nepenthes ampullaria*, meer eivormig bij *N. gymnamphora* of langwerpig bij *N. gracilis*. Al deze hoofdvormen zijn echter min of meer driekantig, waarbij het van de spil afgewende of buitenste gedeelte rond, en het naar haar toegekeerde, vlak is. De gemelde vlakke wordt aan de beide zijden door twee bladaardige uitgesnedene kammen begrensd, welke somwijlen eene aanzienlijke uitgroeiing verkrijgen.

Bij eene meerdere vergróoting van deze veelvormige holle aanhangsels, openen zij zich aan de geknotte uiteinden door een deksel, dat aan de uitstekende hoogste punt vastgehecht, zich naar de spil der plant ontsluit en, zich vervolgens van deze verwijderende, terugbuigt. Dit deksel is vliezig, cirkelrond of meer ovaal, en verandert bij den voortgaanden groei van den beker weinig in grootte of vorm.

De stengbladen hebben eene andere evenredigheid. De vlakke bladschijf wordt door eenen, dikwerf aanzienlijk langen steel, welke aan de beide zijden een smal bladaardig, bij de steng eindigend randje heeft, gedragen: zij is meest langwerpig ovaal, aan beide einden spits, zelden stomp uitlopende, en heeft in hare nervuur veel overeenkomst met die, welke bij eenige monocotyledonische gewassen wordt waargenomen. De hoofdnerven ontspringen aan den voet, zelden uit de middelnerf, loopen vervolgens bijna evenwijdig met den rand van de bladschijf, en vereenigen zich aan den top met de middelnerf: zij zijn door eene menigte kleine aderen verbonden, waardoor een uit vierkante mazen bestaand net wordt gevormd.

De steel, welke, zoo als ik boven reeds aanstipte, eene voortzetting der middelnerf van de gemelde bladschijf is, vertoont zich onder twee gedaanten: in de digt bij de bloemen geplaatste bladen eindigt hij dikwerf in eene eenigzins verdikte punt, en heeft dan schijnbaar alleen het doel, om als klawier de te

zwakke steng te ondersteunen, waartoe zich het uiteinde in eenige krullen terugbuigt en de naastbij gelegene takken omwindt: bij anderen ontwikkelen zich aan het einde van den steel de reeds gemelde bekers. In dit geval gaat hij eerst regtstandig op, kronkelt zich vervolgens in twee of drie krullen om, en buigt zich dan loodregt naar beneden, om in den omgebogenen voet van den beker over te gaan: zoodat hier de steel door de krullen als klawier dient en tevens den opgerigten stand van den beker bevordert. Bij eenige planten zijn deze bekers regelmatig buisvormig, bij andere buisvormig met eene verwijding boven den voet en bij sommige meer regelmatig trechtervormig. Op dezelve verdwijnen de bij de bekers der jongere planten dikwerf zeer ontwikkelde ingesnedene bladvormige kammen, naarmate zij hooger geplaatst zijn, en laten op die van zeer ontwikkelde planten dikwerf alleen in kleine randen hunne overblijfsels terug. De mond of opening der bekers van de steng en wortelbladen is door eene vlakke geribde bladuitbreiding gekroond. In zeer jonge bekers is deze boord vlak, en bij meer ontwikkelde is, zoo wel het binnenwaartsche, als het naar buiten gelegen gedeelte van deze bladuitbreiding omgerold; het binnenwaartsche heeft den omtrek seherp getand. Over het algemeen zijn de deksels van de bekers der stengen meer uitgegroeid, dan die van de bekers der wortelbladen, en van eene minder langwerpige gedaante.

De stengbekers hebben, even als de wortelbekers, drie hoofdnerven, welke met de kanten van den steel in verband staan; twee derzelve zijn tegen over de spil gelegen, en eene is van de spil verwijderd. Tusschen de beide eersten, op welke zich de gemelde kammen ontwikkelen, verdwijnen ééne of somwijlen meerdere nerven van den voet naar den rand. De andere nerven, welke grootendeels uit den steel of in kleiner aantal uit de gemelde twee kamnerven haren oorsprong nemen, loopen bijna allen uit, op het tegen over de spil gelegen punt der aanhechting van het deksel. Zij vereenigen zich hier gedeeltelijk in een klein, somwijlen getand aanhangsel, en breiden zich anderdeels in het deksel weder uit. Tusschen deze hoofdnerven zijn eene menigte kleinere aderen, welke echter door de meerdere buigingen, een minder regelmatig net vormen, dan op den vlakken bladboord. De nervuur der deksels is, door hare rigting en door hare meer boogvormige takverdeeling, van de bovengemelde onderscheiden en komt meer met die der gewone bladen overeen.

De gemelde bekers zijn vóór het opengaan tot op de helft, zelden daar boven, met vocht gevuld, hetgeen een genoegzaam bewijs oplevert, dat dit vocht in den beker zelven afgescheiden wordt en niet ontstaat door den invallenden regen of dauw. Nadat de bekers zich geopend hebben, blijft deze afseheiding van vocht, vooral op vochtige plaatsen, voortduren, en in geledigde toegedekte bekers heb ik telkens weér nieuw vocht zien afscheiden. Rumphius, welke de Amboinsche *Nepenthes* gedurende eenigen tijd schijnt waargenomen te hebben, deelt ons mede, dat deze afseheiding voornamelijk des naechts zoude plaats vinden. De in de nabijheid van Padang door mij gedane waarnemingen, stemmen met dit door Rumphius medegedeelde gevoelen niet geheel overeen, maar pleiten er voor, dat de des naechts in de tropische gewesten zoo rijkelijk vallende dauw een groot aandeel heeft aan dit door Rumphius bekend verschijnsel; terwijl de gedurende den dag plaats hebbende en niet in aanmerking genomene verdamping van het vocht, zeker het hare zal hebben bijgebracht om Rumphius tot de meerdere afseheiding gedurende den nacht te doen besluiten. In den omtrek van Padang had ik in een' zeer vochtigen bodem eenige gewassen waargenomen, waarvan sommigen in de schaduw en anderen

op eene meer aan de zon blootgestelde plaats groeiden. De jongere, nog ongeopende bekers dezer, op onderscheidene plaatsen tierende gewassen, verschilden eenigzins ten opzichte van de in dezelve aanwezige hoeveelheid vocht. De in de schaduw gegroeiden bevatteden geene zoo aanzienlijke hoeveelheid, als de anderen. Dit bracht mij op het denkbeeld, dat de zonnestralen welligt deze afscheiding bevorderden. Ten einde hieromtrent eenige zekerheid te hebben, traachtte ik deze gewassen, zoo veel hunne standplaats zulks toeliet, vergelijkend na te gaan. Ik ledigde nu des avonds de reeds geopende bekers en sloot eenige met daartoe vervaardigde kleine papieren hoedjes. Mijne proefgewassen den volgenden morgen bezoekende, vond ik in de bekers van allen eenig vocht, maar het minste in de met gemelde hoedjes geslotene, hetgeen mij dus de meerdere hoeveelheid der anderen aan de vochtigheid van den dampkring deed toeschrijven. Mijne bekers op nieuw geledigd en eenige weder gesloten hebbende, vond ik des avonds in de in de schaduw geplaatste gewassen zeker geene meerdere hoeveelheid vocht, dan des morgens; terwijl de geopende, aan de zon (\*) blootgestelde, even zoo gevuld waren, en de met hoedjes geslotene niet minder inhielden, dan des morgens. De planten nu eenige dagen aan zichzelf overgelaten zijnde, bleek het mij, dat de in de zon geplaatste, door het licht tot eene meerdere afscheiding geprikkeld werden, daar de hoeveelheid vocht van de beschaduwde voorwerpen, die der onbeschaduwde weinig overtrof, terwijl toch de uitdamping ten nadeele van de laatste in aanmerking behoort genomen te worden. Ik heb getracht, aan deze proef eenige meerdere zekerheid te geven door eenige bekers met fijn goudvlies, dat door zijden draden om de randen derzelve bevestigd was, af te sluiten: dan ook deze proef kon mij geene quantitative beslissing opleveren; echter bewees zij genoegzaam, dat de hoeveelheid van het des daags afgescheiden vocht, dat van den nacht overtrof. Ik heb wijders gepoogd, deze proeven met afgesneden en in het water geplaatste bladen te herhalen; maar de ondervinding heeft mij ras bewezen, dat deze gewassen dan spoedig alle levenswerking verliezen, om slechts korten tijd een kwijnend aanzijn te behouden.

Nog niet te vreden met deze reeds zoo merkwaardige afscheiding, heeft men aan het deksel der bekers een afwisselend sluiten en openen toegekend (†), hetwelk, volgens De Candolle, door eenigen aan den staat van den dampkring, door anderen aan de in den beker bevatte hoeveelheid vocht toegeschreven wordt. Dit verschijnsel, reeds door den Heer Treviranus omtrent de *N. destillatoria* ontkend, is door mij bij geene der geziene soorten waargenomen, en men behoeft slechts de verandering, welke de mond van den beker na de opening ondergaat, op te merken, om hieruit af te leiden, dat eene nieuwe sluiting van denzelfden onmogelijk is. Het in de bekers afgescheiden vocht heeft een eenigzins troebel voorkomen, eenen flauwen, zoetaetigen smaak, en gaat, aan zich zelf overgelaten, spoedig tot bederf over. Eenige met hetzelfde genomen qualitative proeven, hebben mij bij de verdamping eenen eigenaardigen reuk doen opmerken en als vaste overblijfsels een zuringzuur zout, benevens plantaardige slijmstof doen vinden (§).

(\*) In de zon teekende de Thermometer daar ter plaatse, des middags ten 2 ure, 94° en somwijlen tot 104° F.

(†) De Candolle, *Physiologie végétale*, p. 870.

(§) Ik durf niet bepalen of dit vocht een voortbrengsel is, dat door uitwaseming in den beker wordt verzameld, dan wel of het door eene afscheiding wordt voortgebracht; voor het laatste schijnt de overeenkomst van hetzelfde met het vocht uit de stammen van slingerewassen te pleiten.

Deze zonderlinge vochtafseiding heeft de Heer Treviranus het eerst getracht uit een meer physiologisch oogpunt te doen kennen. Hij nam ten dien cinde de *Nepenthes destillatoria* waar en deelde dienaangaande mede, dat de bovenste helft van de binnenvlakte gekleurd en met eenen bruinen dauw, zoo als men gewoonlijk op de vlakte van vruchten en bladen, ter beseherming tegen vocht opmerkt, bedekt en dat de benedenste daarentegen blinkend is, vol kleine, klierachtige en gedeeltelijk van epidermis ontbloote heuveltjes. De Heer Treviranus houdt het voor waarschijnlijk, dat deze kliermassen het vocht afseiden, en dat hetzelfde zich in den beker niet boven de blinkende klierrijke oppervlakte verheft (\*).

De Heer Brongniart heeft ons in zijne beschrijving der *Nepenthes* mede reeds op deze klieren opmerkzaam gemaakt, zonder zich echter bijzonder met derzelve samenstel bezig te houden (†).

In eene bekroonde prijsverhandeling van den Heer Meyen over de afscheidingsorganen der planten (§), heeft gemelde schrijver aan de binnenste oppervlakte van de *Nepenthes*-bekers zijne bijzondere opmerkzaamheid toegewijd, zijne waarnemingen omtrent de klieren der *N. destillatoria* medegedeeld en door afbeeldingen opgehelderd. In dit stuk treedt de Heer Meyen met het gevoelen op, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat gemelde klieren de blinkende stof afzonderen, welke de binnenvlakte der bekers gedeeltelijk bedekt, en dat het vocht uit de gekwetste plaats tusschen de opperhuid en de klier te voorschijn komt, even als zulks bij de bleeding der epidermis van andere planten geschiedt. Ter staving van dit gevoelen voert hij aan, dat deze kleine klieren in de nog ongeopende bekers, van eene groene kleur en zeer saprijk zijnde, geen vocht afzonderen, en dat zulks eerst later, na de scheuring van de opperhuid, waarmede deze klieren geheel bedekt zijn, plaats vindt.

Deze waarnemingen van de Heeren Treviranus en Meyen medegedeeld hebbende, wil ik mijne waarnemingen, die van 1832 dagteekenen, hieromtrent opgeven. De wortelbladen hebben de binnenste oppervlakte der bekers somwijlen geheel met deze klieren bedekt; bij de stengbladen van *Nepenthes Bongso* en *N. Rafflesiana* en, volgens de opgave van den Heer Brongniart, ook bij de *N. Madagascariensis* (\*), wordt dit mede waargenomen; bij de andere onderzochte soorten beslaat deze blinkende oppervlakte de helft en soms zelfs een geringer gedeelte van de lengte der buis; terwijl het hoogere deel eenen blaauwen of purper-rooden dauw bezit: deze dauw is mij voorgekomen meer vlies- dan wasaardig te zijn, en dus door de afsehilfering van de epidermis gevormd te worden. De vorm der klieren van de onderzochte soorten stemt met de door den Heer Meyen van de *N. destillatoria* opgegevene structuur overeen.

Hare ontwikkeling, door den Heer Meyen op de *Nepenthes destillatoria* waargenomen, is door mij ook bij andere soorten nagegaan. De binnenvlakte van zeer jonge, pas te voorschijn komende bekertjes, is op het uiterlijk aanzien nog geheel gelijk; fijne plaatjes van dezelve, bij sterke vergrooting nader

(\*) Treviranus, Zeitschr. für Physiolog. III. p. 75.

(†) Annales des Sciences naturelles, I. p. 38.

(§) Meyen, Ueber die Sekretions-Organen der Pflanzen, p. 11 u. s. w.

(\*) Brongniart, gen. werk, p. 38.

onderzoekt, bieden een tamelijk gelijk eelweefsel en, tussehen de doorsehijnde cellen, andere met donkere stippen aan. Dergelijke fijne plaatjes van grootere bekers waargenomen, bewijzen, dat deze gestipte cellen de aanstaande klieren zijn. Zij onderscheiden zich in deze bekers duidelijk als eirkelronde, uit eene menigte kleine eelletjes bestaande groepen van het uit grootere eellen bestaand weefsel, en zijn in het begin nog geheel door de opperhuid bedekt. Vervolgens neemt, bij meerdere ontwikkeling, deze bedekkende huid in dikte af en vertoont zich als een vliezig deksel. Dit deksel is naar beneden open en bezit daar eene bijna regt afgesnedene zijde, die dicht op de ondergelegene vlakke sluit. Bij meerdere uitgroeiing wordt de onderzijde van dit deksel meer boogvormig. Het bedekt in de geopende bekers veelal de helft der klier en bestaat, even als de overige opperhuid, uit langwerpige, dicht aan elkander sluitende cellen: alleen bij *Nepenthes ampullaria* bedekt gemeld deksel een kleiner gedeelte der klieren en heeft het meer vierkante cellen. De klieren bestaan uit eene menigte van kleine, dicht aan elkander sluitende cellen. In de jonge bekers hebben zij mij de waarneming van den Heer Meyen bevestigd, en hier waren deze kleine eellen zeer saprijk en met groene, benevens enkele bruine korreltjes (bij *N. ampullaria*), opgevuld.

Eenen eenigzins anderen vorm en eene verschillende samenstelling vertoonen de klieren, welke op de binnenvlakte van de deksels der bekers verspreid zijn. Met het bloot oog of bij geringe vergrooting gezien, zijn zij kleine, eirkelronde en op de nerven meer ovale, door eenigzins verhevene ringen omgevene holten. Bij eene verticale snede nader onderzocht, worden deze holten of op de oppervlakte zichtbare diepten ons als de ingangen tot grootere hopen bekend, die, in het midden, eene verhevenheid tegenover de opening hebben. De doorsnede dezer organen, met eenige vergrooting onderzocht zijnde, toonde mij de volgende samenstelling: de uit eene laag van vierkante cellen bestaande opperhuid buigt zich bij de holten binnewaarts en bekleedt nu den rand en het bovenste gedeelte derzelve, terwijl de verhevenheid in het midden der holten, door eene gelijke samenstelling, eene vroegere gemeenschap met de opperhuid verraadt; het overige gedeelte der holten bestaat daarentegen uit zeer kleine cellen, welke eenige overeenkomst met die der bekerklieren bezitten.

Na deze beschrijving van de samenstelling tot den aard dezer organen overgaande, herinneren wij ons het gevoelen van den Heer Meyen, dat de binnenklieren eene bruine blinkende stof zouden afzonderen: dit denkbeeld komt mij minder waarschijnlijk voor, omdat ik nimmer bij de onderzochte soorten eene dergelijke afscheiding heb kunnen waarnemen. Na een vergelijkend onderzoek van de glanzige en doffe binnenvlakte der bekers is het mij waarschijnlijker, dat deze glans aan de meerder ontwikkelde dikte van de epidermislaag is toe te schrijven.

Moeijlijker is het om te beslissen tussehen de opgegevene denkbeelden van de Heeren Treviranus en Meyen, nopens de afscheidingsplaats van het vocht, welke de eerstgemelde in de klieren zoekt, en de laatstgenoemde in een beleedigd eelweefsel om de klieren vooronderstelt plaats te vinden. Het laatste gevoelen, hoewel veel voor zich hebbende, zoo men de verwonding van de opperhuid nagaat, heeft echter dat tegen, dat de afscheiding dan na de uitgroeiing zoude verminderen of geheel eindigen, omdat de natuur eene dergelijke verwonding spoedig zoude hebben hersteld: zoo als ons de opperhuid van de bladranden der Aroideën en anderen bewijst. Het eerste denkbeeld van den Heer Treviranus, dat het afgescheiden vocht

uit de kleine klieren deszelfs oorsprong neemt, is mij dus meer waarschijnlijk en kan door andere daadzaken vergelijkend worden ondersteund. Bij de *Sarraenia* heeft de afseiding van het vocht door de haren plaats; bij de *Urticeën* wordt zij even zoo van deze waargenomen, en bij vele anderen zijn zij als afseidingsorganen bekend. Daar nu deze haren meestal als verlengde eellen voorkomen, zoo geloof ik, dat wij hunne werking ter vergelijking en tot ondersteuning gevoegelijk kunnen aannemen.

Bij de grootere bekers heb ik deze klieroppervlakte dikwerf met kleine kraaltjes vocht bedekt gezien, en deze bevochtiging bij de onderzochte soorten, vooral in het benedenste van den beker, waar, tusschen het binnenste en buitenste bekleedsel, een aanzienlijk, zeer voehtrijk eelweefsel de vaatbundels omgeeft, waargenomen. Dit eelweefsel in de samenstelling van het meer vliezige deksel geheel gemist wordende, zoo kan men hieraan welligt toeschrijven, dat deze vochtafseiding op dit deel geen plaats vindt.

Na de vermelding van de samenstellende deelen der bladen, moeten wij de denkbeelden omtrent den aard derzelve kortelijk doorloopen. De Heer Willdenow (\*) beschouwde de bekers als eigenaardige bladvormige uitgroeiingen. De Heer De Candolle laat zich omtrent deze bladen op eene wijze uit, welke doet gelooven, dat hij de vlakke sehijf als een' bezoomden steel en den beker als de ware bladsehijf aanneemt (†), en op eene andere plaats doet hij ons gelooven, dat hij alleen het deksel der bekers als de bladsehijf, en het overige als een gedeelte van den bladsteel beschouwt (§). In de bekervormige uitbreiding ziet de Heer Bischoff veranderde vormen van geheele of gedeelten van bladorganen, en door de vergelijking van de *Sarraenia* met de *Nepenthes* sehijnt hij tot het gevoelen van den Heer De Candolle over te hellen, dat het deksel het blad is (¶). De Heer van Hall het eerste gevoelen van den Geneefsehen Hoogleeraar aannemende, beschouwt de bekers als de bladsehijven en noemt hen bladbuizen (‡). Omtrent dezen bladvorm heeft de Heer Link het gevoelen uitgedrukt, dat de vlakke bladuitbreiding de wezentlijke bladsehijven, en dat de bekers bloemaardige aanhangsels zouden zijn (\*\*). De Heer Turpin houdt de vlakke uitbreiding voor eenen bezoomden steel en den beker voor een omgeslagen, met de randen zamengegroeid blad, en noemt de opening van den beker *Maeropile*.

Wij zien uit deze opgave, dat de meeste sehrijvers de geheele bladvormige uitbreiding voor een, in deszelfs deelen veranderd blad houden. Ik zal hier eenige opmerkingen bijvoegen. Van de steng af beginnende, trekt de gesteelde of ongesteelde vlakke uitbreiding het eerst de aandaelt. Bij de kiemende of pas uit zaad opgekome ne plantjes, is deze uitbreiding weinig ontwikkeld, en bij de eenigzins meer uitgegroeide, die van 4 of 5 bladen voorzien zijn, vertoont zij zich sheedevormig: in beiden was de beker

(\*) Grundriss der Kräuterkunde, 5 Ausg. p. 93.

(†) Physiologie végétale, p. 279.

(§) » » p. 320.

(¶) Handbuch der botanischen Terminologie, p. 243.

(‡) Tijdschrift voor Nat. Gesch. en Physiologie van J. v. d. Hoeven en W. H. de Vriese, III. bl. 9; en Van Hall, Eerste beginselen der Plantkunde, bl. 48.

(\*\*) Philosophia Botanica, I. p. 475.

reeds geheel aanwezig. De vlakke bladuitbreidingen hebben takverdelingen van nerven, welke weinig van die der bekeraf wijken: in beiden is de hoofdrigting naar één bepaald punt, en bij beiden zijn de grootere nerven door kleinere dwarsaderen verbonden. Wanneer deze vatenloop met dien van andere gewassen vergeleken wordt, dan vindt men eene gelijke bewerktuiging in de bladseheden van de Umbelliferae, in de holle bladstelen van *Trapa* enzv., en hierdoor word ik in het denkbeeld versterkt, om met den Heer De Candolle en de vlakke uitbreiding en den beker als tot den bladsteel behoorende organen te beschouwen; terwijl ik het deksel, waarin wij eene meer netvormig vertakte nervuur waarnemen, als den eigenlijken vertegenwoordiger der bladschijf aanmerk.

De steel, waaraan de beker bevestigd is, heeft de nerven van de vlakke bladuitbreiding, even boven het einde derzelve, in eenen gesloten vatenring vereenigd en, in het midden van dezen, een mergachtig celweefsel. Meer van de gemelde bladuitbreiding verwijderd, is de steel driekant, en heeft zich de gemelde vaatring in drie door celweefsel geseheidene vaatbundels verdeeld. Deze zijn aan den voet van de bekeraf duidelijk zichtbaar, en een derzelve is aan de beneden- en twee aan de bovenzijde van den steel gelegen. De beide laatsten vormen de grondnerven der kammen, en uit dezelve ontstaan zij-nerven, die naar het eindpunt van de ondernerf verloop. Hier vereenigen zich de drie hoofdnerven en vormen zij eenen platgedrukten vaatbundel met zeer weinig parenchymatisch weefsel. Vervolgens verdeelen zij zich weder in het deksel, en geven zij aan hetzelfde, door hare takverdelingen, eene nervuur, welke met die der bladen van andere Dicotyledonen veel overeenkomst heeft.

De onderzochte soorten bezitten allen, zoowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke bloemen, eene in of door uitgroeiing boven den oksel geplaatste pluimvormige bloeiwijze, met een- of tweebloemige steeltjes, bij *N. gracilis*, *phyllamphora*, of met tot bijschermen vereenigde steeltjes bij *N. Madagascariensis*, *N. ampullaria* enzv. Deze bloeiwijze, waarin de bloemen zich van den voet naar den top openen, is vooral in hare eerste ontwikkeling bij *N. ampullaria* met eene bruine donzige, bij *N. gracilis* met eene bruine zijde aardige, bij *N. Rafflesiana* met eene digte grijze en bij *N. phyllamphora* met eene lossere beharing bekleed, en verliest dit bekleedsel bij eene verdere ontwikkeling dikwerf grootendeels. De algemeene bloemsteel is min of meer vijfhoekig en heeft de bloemstelen met verbrede voeten op zijne kanten geplaatst. De benedenste bloemsteeltjes dragen veelal min of meer ontwikkelde sehutblaadjes; de hoogere bezitten slechts geringe sporen, en de naar den top der bloem pluim geplaatste, geene overblijfsels derzelve. Bij de overeenstemmende bloeiwijze der mannelijke en vrouwelijke planten, doet de vorm der knoppen dezelve spoedig onderscheiden: de mannelijke bloemen zijn bij deze kogelrond, en de vrouwelijke meer eivormig. De vier deelen of aan den voet zaamgegroeide bladen van het bloembekleedsel zijn vóór de opening der bloem in diervoegge gelegen, dat de twee buitenste groote, de beide binnenste, tegen over de spil geplaatste kleinere deelen bedekken; zij zijn in de mannelijke bloemen bijna cirkelrond en in de vrouwelijke ovaal, tamelijk dik, van buiten, vooral om den rand behaard, van binnen met kleine groefjes en, na de opening der bloem, terug geslagen.

De mannelijke bloemen rieken onaangenaam. In haar midden staat de cilindervormige, min of meer vierkantige meeldraden-kolom, met eenigzins verdikte uiteinden. Zij is bij de opening der bloem



zeer kort, neemt vervolgens in lengte toe, en draagt op den top eene kogelvormige verdikking, aan welke 8, 12 tot 16 meelknopjes gehecht zijn. In den jeugdigen staat zijn deze meelknopjes in dezelfde rigting met de spil, en eerst later worden, door de ontwikkeling, de ongelijke grootte, benevens de onregelmatige buigingen te weeg gebracht. Zij zijn langwerpig, vóór hunne opening in het midden gevoerd, en hebben, aan weërszijden van den niet zeer ontwikkelden helmknoop, één hokje. Deze hokjes bestaan slechts uit een klepje, dat zich inbuigt en op den helmknoop sluit, zoodat de stuifknopjes van *Nepenthes* eigenlijk slechts de helft of een hokje van een gewoon helmknopje aanbieden. In de samenstelling onderscheidt men onder een vrij dik buitenvlies, een uit twee rijen spiraaleellen bestaand endotheeium. Het uitgeworpen stuifmeel is kogelrond, of bestaat somwijlen uit drie of vier verbondene kogeltjes, die aan den stuifmeelvorm van de *Godeniaceae*, *Eriaceae* enzv. herinneren (\*).

De vrouwelijke bloemen hebben in het midden, in plaats van de stuifdradenkolom, het vruchtbeginsel. Dit is bij eenigen gesteeld: *N. Rafflesiana*, enzv., bij anderen vastzittend of op den torus gehecht: *N. gracilis*. Het heeft eenen langwerpigen, vijfzijdigen, naar het aanhechtingspunt eenigzins verdikten en afgeronden vorm. De eene dezer zijden of de geknotte top wordt door den somwijlen vierlobbigen, platgedrukten, door vier voren ingesnedenen stempel gekroond: de anderen vormen den omvang. Zij zijn door stompe, tegen over de bloemdeelen gelegene kanten verbonden, in het midden eenigzins gevoerd en met dezelfde beharing als de jongere bloemstelen bedekt. Inwendig is het vruchtbeginsel verdeeld in vier volkomene hokjes met gladde wanden. Met deze zijn de naar den voet der hokjes verbrede en naar boven smaller wordende moederkoeken verbonden, die aan iedere zijde van den wand uit eenen hoofdvaatbundel bestaan, welke zich even boven den voet van het hokje, over of door de oppervlakte van den wand verdeelt (†).

De eitjes vertoonen zich, in zeer jonge vruchtbeginsels, als kleine, boven den moederkoek uitstekende, ronde, of aan den top eenigzins geknotte, uit eellen bestaande knopjes. Zij worden bij eene meerdere ontwikkeling langwerpiger en eindigen dan in eene versmalde buis: in het benedenste of buikvormig gedeelte van deze eitjes zijn de twee eellenlagen, door de mindere ontwikkeling van de binnenbuis, duidelijk erkenbaar; en somwijlen is het mij gelukt, deze beiden te scheiden: alsdan vertoont zich het binnenvlies zeer fijn en het buitenste van eene meerdere dikte. De meer uitgegroeide eitjes zijn reeds langwerpiger, en door derzelve doorsehijndheid laten zij duidelijk zien, dat het punt van aanhechting van het binnen- of kernvlies, boven den voet is verheven. De kernzak is in dien staat reeds boven zijn aanhechtingspunt een weinig buikvormig en naar boven versmald. In de meer ontwikkelde eitjes zag ik het aanhechtingspunt meer van den voet verwijderd en het bovineinde meer doorsehijnd. In dien staat had er reeds eene veranderde rigting van den kernzak plaats, waardoor het draadje, waarin deze eindigt, naar beneden gebogen werd. De ontwikkeling thans verder in hare verschillende tijdperken vol-

(\*) Vroeger in Indië gedane onderzoekingen doen mij vermoeden, dat hier de moedereellen van het stuifmeel drie deelen bevatten: daar dit echter met het gewoonlijk voorkomende viertal in strijd is, zoo laat ik deze waarneming aan latere onderzoekingen ter bevestiging over.

(†) Somwijlen gebeurt het, dat de eitjes aborteren, en zich in ieder hokje een min of meer vleezig, langwerpig ligehaam bevindt, hetwelk van boven en beneden in den hoek van het hokje is vastgehecht; vermoedelijk is dit eene vrije placenta.

gende, dan zien wij het aanhechtingspunt van den kernzak meer en meer van den voet van het zaad verwijderen, en de omdraaiing van den kernzak, en dus de benedenwaartsehe rigting van den wortel, als een gevolg van deze uitgroeiing, te voorschijn treden. De binnenzaadmond wordt hierdoor naar beneden gekeerd en vertoont zich in het zaad, aan het einde van een meer of minder ontwikkeld, uit eelweefsel bestaand buisje, met eene kleine verdikking. Voor zoover ik dit nagegaan heb, heeft dit buisje geenen zamenhang met de buitenzaadhuid (\*).

De rijpe vruchten zijn drooge, somwijlen op een klein steeltje gezetene langwerpige, stomp vierkantige, in het midden of meer naar den voet verdikte, bruine, gladde of behaarde kapsels. Zij springen in vier met de bloembekleedselen afwisselende, door een deel van den stempel gekroonde kleppen, open. Ieder dezer heeft op de binnenvlakte het tegen dezelve overstaande gedeelte van de middelsehotten. De scheiding van deze middelsehotten is van dien aard, dat er geen spil terug blijft, en dat alleen een verdikte zoom langs den vrijen binnenrand der tusseheshotten het vroegere vereenigingspunt aanduidt.

De zaadjes dezer gewassen hebben het voorkomen van kleine vliezige, in het midden eenigzins verdikte of verbrede, aan de beide einden spits uitlopende draadjes of plaatjes. Zij zijn, bij eenige vergrooting waargenomen, somwijlen geheel glad, somwijlen, vooral in het midden, met eene geribde of bultige oppervlakte. Het buitenste zaadomhulsel is door eene vliezige, uit lange, zelden korte, bijna vierkantige eellen bestaande huid gevormd. Onder dit bekleedsel ligt een los merenhymatiseh eelweefsel (†), hetwelk, vooral boven en onder de kern, eene meer aanzienlijke ontwikkeling erlangt, en tussehen de buitenhuid en kern somtijds bijna geheel verdwijnt. Tussehen dit eelweefsel en bij anderen meer tegen de buitenzaadhuid bevestigd, loopt de raphé. Dit voedingsvat buigt zich vervolgens op meerdere of mindere hoogte boven de kern om, en daalt dan benedenwaarts, om zich met de binnenzaadhuid te verbinden. Het bestaat uit langgestrekte eellen en gestipte vaten. De kern, van de buitenzaadhuid en het eelweefsel geseheden, vertoont zich als een rolronde zak, welke in een fijn draadje of buisje, tegen over de raphé geplaatst, eindigt. Dit draadje kan als een verlengde binnenzaadmond beshouwd worden, en bestaat uit een gestrekt eelweefsel. De binnenste zaadvlies is zeer fijn en wordt gevormd door langwerpige eellen, welke door hare breedte, van die der buitenhuid vershillen. Behalve naar de beide einden is deze binnenste zaadhuid geheel door de kern gevuld. Deze is rolrond, aan den wortel en het bladgedeelte stomp, somwijlen in een klein puntje eindigende, wit van kleur, en heeft de kiem geheel door kiemwit omgeven.

Dit kiemwit is van eenen olieachtigen aard, en zet zich bij zijne vorming het eerst langs de wanden van de omringende bekleedselen, terwijl het binnenste, de kiem omgevende gedeelte, dan nog eene olieachtige vloeibare stof vormt. De kiem heeft, in de nog onrijpe zaden, den vorm van een hart, van hetwelk de wortel het spitse en de zaadlobben het verdikte einde uitmaken. Bij meerdere ontwikkeling

---

(\*) De Heer Brongniart, aan wien wij de ontdekking van dit buisje verschuldigd zijn, schijnt tot het gevoelen over te hellen, dat hetzelfde een vaatbundel is, die tot de bevruchtende vaten behoort.

(†) Gaertner (de Fruct. II. p. 18. Tab. 83.) geeft eene vrij goede beschrijving van de zaadbekleedsels.

wordt de wortel dikker en de beide zaadlobben zijn nog aanzienlijk van elkander verwijderd (\*). Door verdere uitgroeiing veranderende, verkrijgt de rijpe kiem eenen rolronden, aan beide zijden in stompe punten eindigenden vorm. De wortel derzelve is naar het aanhechtingspunt van het zaad gekeerd en vormt ongeveer de helft der kiem. De zaadlobben sluiten nu met de vlakke zijden tegen elkander, en tusschen dezelve vertoont zich de plumula als een klein puntje.

Omtrent den aard der zaadbekleedsels zijn de gevoelens verdeeld. De Heer Nees wilde het buitenste zaadbekleedsel als een' zaadrok (*Arillus*) beschouwd hebben. De Heer Brongniart en anderen hebben het daarentegen voor een wezentlijk gedeelte van het zaad, voor de buitenste zaadhuid (*Testa*) aangenomen. Met dit gevoelen van den Heer Brongniart vereenig ik mij, omdat het gemelde buitenbekleedsel reeds in de eitjes ontwikkeld is, en wel somwijlen met de raphé samenhangt, maar ook niet zelden zieh geheel vrij van deze vertoont.

Hetgeen ons D<sup>r</sup>. Graham (†) omtrent de ontkieming der *N. destillatoria* (§) vermeldt, heb ik ook bij *N. phyllamphora* waargenomen. Bij de zaden, op eenen moerassigen bodem gelegen, begon zich het midden of kerngedeelte uit te zetten, en vervolgens te splijten. Uit deze spleet traden nu de tegen elkander gelegene zaadlobben met eene licht groene kleur te voorschijn, en kort na hare ontwikkeling zich scheidende, deden zij het groene ronde pluimpje zichtbaar worden. In dit tijdvak of wel iets vroeger, groeit uit dit verdikte gedeelte het worteltje, hetwelk eerst enkelvoudig spilvormig, vervolgens, door de vorming van een aantal vezels, zeer getakt voorkomt. Inmiddels neemt het pluimpje aan grootte toe en bestaat uit twee omgebogene, zeer ongelijke ligchaampjes. Deze buigen zich bij meerdere ontwikkeling terug, en vertoonen dan ongesteelde, kleine, buikvormig verwijde, met ingesnedene kammen voorziene bekertjes. Bij het nu volgende bladpaar zijn deze bekertjes reeds aan het einde van kleine, vlakke bladuitbreidingen geplaatst, welke bij de verder ontwikkelende, achtervolgens aanmerkelijk toenemen. De inwendige structuur dezer jonge bekertjes is gelijk aan die der wortelbladen, en de uitwendige vorm biedt bijna geene afwijking aan.

Na de geschiedenis van de plant en de beschrijving harer deelen te hebben opgegeven, blijft ons de beschouwing van hare plaats in het wetenschappelijke stelsel over. Nadat men de *Nepenthes* in hare groeiplaatsen waargenomen had, boden zij weinig moeilijkheid voor de Linneaansehe rangsehikking aan, omdat zij hier, wegens het voorkomen der mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten, in de klasse der tweehuizigen konden opgenomen worden. Minder gemakkelijk was het, haar eene plaats in een natuurlijk stelsel aan te wijzen. Vershillende schrijvers hebben ten dien opzichte andere gedachten gehad, die gedeeltelijk door gebrek aan voorwerpen, ten deele door hunne wijze van beschouwing moesten ontstaan. Wanneer wij het daaromtrent bekende nasporen, dan blijkt het, dat de verdienstelijke en ijverige Adanson de eerste proef nam, om onze *Nepenthes* in een natuurlijk stelsel te

---

(\*) De Heer Richard heeft het eerst het denkbeeld van Gaertner wederlegd, dat de *Nepenthes*-kiem slechts ééne zaadlob had.

(†) *Edinburgh Journ.* 1830. p. 380.

(§) Dit is vermoedelijk de *Nepenthes phyllamphora*.

brengen en haar, naar de door hem geziene afbeeldingen oordeelende, met den naam *Bandura*, bij zijne *Aristolochiae* plaatste, onder bijvoeging, dat het hem voorkwam, dat een nader en naauwkeuriger onderzoek der planten zelve, haar in eene andere familie, nabij de *Sarracenia* zoude overbrengen. In de door *Linnaeus* ontworpen rangschikking, welke *Giseke* heeft medegedeeld, is haar geene plaats aangewezen, en in de *Genera* van *Jussieu* staat *Nepenthes* onder de geslachten, wier verwantsehap onzeker was. Bij gelegenheid, dat de Heer *R. Brown* de verdeeling der door *Jussieu* hervormde vereeniging van de *Aristolochiae* in twee familiën voorstelde, liet hij den wenk van *Adanson* niet verloren gaan, maar maakte toen tevens op de verwantschap van *Nepenthes* tot de *Aristolochiae* opmerkzaam. Meer bepaaldelijk hield zich de Heer *Brongniart* met dit onderwerp bezig, toen hij dit geslacht uitvoerig behandelde; en zijn onderzoek deed hem het gevoelen omhelzen, dat *Nepenthes* met *Cytinus* vereenigd, eene eigene familie konde vormen. In dit gevoelen deelde ook zijn ambtgenoot, de Heer *A. Richard*. Bij anderen echter vond het minder bijval, omdat bij den afwijkenden habitus dezer beide geslachten, en bij de onvolledige kennis der zaden van *Cytinus*, alléén de mannelijke bloemen tot deze vereeniging aanleiding konden geven.

Reeds in 1827 maakte de Hoogleraar *Blume* zijn gevoelen bekend, dat de *Nepenthes* een aan de *Aristolochiae* verwant geslacht was, en dat zij als de grondvorm van eene kleine, aan de genoemde en aan de *Dioscoreae* verwante familie kon beschouwd worden (\*). Het denkbeeld van afscheiding vinden wij ook door den Heer *Bartling* aangenomen. De Heer *Link* vermeldde, in 1829, de *Nepenthes* als eene afdeeling der *Aristolochiae*, onder den naam *Nepenthinae*.

Het voorstel ter vorming eener nieuwe familie, werd in 1830 (†) door den Heer *Lindley* verwezenlijkt, en de *Nepenthes*, onder den naam *Nepentheae*, tusschen de *Droseraceae* en *Lineae* geplaatst. Deze plaatsing beschouwde de schrijver slechts als voorloopig en zij geschiedde met de verklaring, dat er eene menigte verbindende vormen noodig waren, om deze familie in hare nieuwe standplaats te vestigen. Getrouw aan zijne vroegere voorstelling, bevestigde de Heer *Blume*, in 1834, zijn reeds voor zeven jaren geuit beginsel, door de *Nepenthes* als eene familie aan te nemen. De Heer *R. Brown* in hetzelfde jaar, zijn gevoelen omtrent deze planten duidelijker opgevende en uitbreidende, volhardde bij zijn vroeger denkbeeld omtrent hare verwantschap, en bewees tevens het doeltreffende van de vorming eener nieuwe familie. In de tweede uitgave van het *Natural System*, p. 204, van 1836, neemt de Heer *Lindley* het gevoelen van zijnen beroemden landgenoot aan, en vormt hij van *Nepentheae* en *Aristolochiae* eene groep, onder den naam *Columnosae*. De Heer *Endlicher*, het gevoelen zijner voorgangers deelende, nam de *Nepenthes* als eene bijzondere familie en de vereeniging derzelve met de *Aristolochiae*, onder den naam *Serpentariae* aan (§). Het algemeen aangenomen gevoelen, dat *Nepenthes* eene afzonderlijke familie kan vormen, deelende, wil ik de verwantschap derzelve nog kortelijk toelichten. De meeste schrijvers hebben het voetspoor van *Adanson* gevolgd, door de *Nepenthes* in de nabijheid der *Aristolochiae*

(\*) *Enumeratio plantarum Javae etc.* p. 84. (Anno 1827).

(†) *Lindley, Natural System*, p. 154.

(§) *Genera plantarum*, p. 345.

te plaatsen, en de Heeren Lindley en Endlicher hebben haar beiden in ééne groep vereenigd. Het hoofdkenmerk, dat de een voor zijne Columnosae, en de ander voor zijne Serpentariae opgeeft, is het gebrek aan houtringen (\*). Het onderzoek der *Aristolochia grandis* Khs. (†) deed mij reeds het gemis dezer eoneentrische ringen betwijfelen, en dat der A. Siphon bewees mij, dat het hout der *Aristolochia* deze ringen niet geheel mist: want bij eene doorsnede van de steng ziet men duidelijk ringvormige, uit grootere en kleinere vaten en vezels bestaande lagen, en in ieder dezer zijn twee ringen, van welke de binnenste grootendeels uit wijder gestipte vaten bestaat, en de buitenste eenen meerderen rijkdom van vezels bezit. Zoo als uit de vroeger gegevene beschrijving blijkt, heeft *Nepenthes* in hare houtdeelen eene geheel andere zamenstelling, en ontbreken aan deze de regelmatige eoneentrische lagen, terwijl de grootere, met diepten voorziene vaten, onregelmatig tussehen de vezels verspreid liggen. De groeiwijze der beide familiën vergelijkend gade slaande, vinden wij het volgende, niet minder opmerkelijk onderscheid: bij de *Aristolochia* is zij overeenstemmend met die van andere tweezaadlobbige gewassen; bij de *Nepenthes* daarentegen, herinnert zij aan de bij de eenzaadlobbige gewassen plaats hebbende ontwikkeling. Zoowel de omhullende als de wezentlijke of geslachtsdeelen van de bloem, zijn bij beiden zeer verschillend. De eersten zijn bij de *Nepenthes* onder het vruchtbeginsel geplaatst, en bij de *Aristolochia* boven hetzelfde gezeten, of indien men wil, gedeeltelijk er mede zamengegroeid. De omhullende bloemdeelen liggen vóór de opening van de bloem, bij de *Aristolochia* klepvormig (bij *Heterotropa* van Morren en Decaisne, met de randen naar binnen gebogen) en bij de *Nepenthes* paarsgewijze, als dakpannen over elkander. Om eenige overeenkomst in de geslachtsdeelen te vinden, moeten wij aannemen, dat de vrouwelijke in de mannelijke bloemen der *Nepenthes* aborteren, en dat de knop, waar de helmknopjes tegen bevestigd zijn, met de epigynische schijf van de *Aristolochia* kan vergeleken worden. De opening van de vruchten der *Aristolochia* wijkt zeer af van die der *Nepenthes*. Bij de eersten heeft eene *dehiscencia septicida*, bij de anderen daarentegen eene *dehiscencia loeuicida* plaats (§). Bij de *Aristolochia* en *Nepenthes* hebben de zaden eene niet zeer dicht om de kern sluitende buitenhuid, het voedingsvat tussehen deze doorlopende en aan de tegenovergestelde zijde van het aanhechtingspunt des zaads met de kernhuid verbonden. Bij de eersten is deze raphé verdikt en bij de laatsten draadvormig. De kiem van de *Nepenthes* overtreft door hare ontwikkeling het kiemwit, en die der *Aristolochia* wordt daarentegen door dit, aanzienlijk overtroffen. De *Dioseoreae*, in andere punten zeer verschillend, bieden in het losse buitenzaadvlies en de hieronder doorlopende raphé eenige overeenkomst aan. Even zoo heeft onze familie, in de verbinding der helmdraden, eenige overeenkomst met de *Menispermaceae* (*Anamyrta*, enzv.), *Schizandrae* (*Kadsura*), *Sterculiaceae* en *Euphorbiaceae*. Vervolgens komt voor de *Nepenthes* de verwantschap met de *Drose-*

(\*) De Heer Lindley zegt, bl. 214 van de tweede uitgave van zijn *Natural System*, dat de *Menispermaceae* ook geene houtringen bezitten: hiertoe heeft gewis het onderzoek van zeer poreuse stengen den geëerden schrijver aanleiding gegeven, daar de meer vaste niet alleen deze concentrische lagen duidelijk doen zien, maar deze ringen zich in drooge stengen somwijlen van elkander scheiden. Bij de stengen van slingerende *Uncariae*, *Dissochaetae*, *Marumiae*, *Uvariae*, *Bauhiniae* enzv., welke eene losse houtzelfstandigheid bezitten, verdwijnen deze houtringen dikwerf geheel.

(†) Deze soort komt op Sumatra, in het gebergte Singalang, voor.

(§) Vermoedelijk door eene drukfout wordt in het familiekenmerk der *Aristolochia* van de Genera van Endlicher, bl. 344, aan deze eene *dehiscencia loeuicida* toegeschreven.

raceae, in wier nabijheid de Heer Lindley dezelve reeds vroeger had geplaatst, in aanmerking. De bloembekleedselen zijn ook bij deze onder de vruchtdeelen geplaatst en hebben, vóór de opening der bloem, dezelfde ligging. In de samenstelling der kapsels is dezelfde grondvorm aanwezig. Bij de Droseraceae, welke veelhokkig zijn, groeijen uit het middelgedeelte der kleppen de middelschotten uit, en vereenigen zich deze in het midden van het vruchtbeginsel: daarentegen scheiden zij zich weder in de vrucht, en laten dan geen spoor van eene middelkolom achter. Deze middelschotten zijn dikwerf bij de Droseraceae, even als bij de Nepentheae, naar den voet met de grootste hoeveelheid zaden bedekt. De samenstelling der zaden levert verscheidene punten van overeenkomst op. Ook bij Droseraceae hebben zij dikwerf een los omhullend buitenvlies, langs hetwelk de raphé loopt, tot hij zich tegen over het punt van aanhechting van het zaad met het kern- of binnenvlies vereenigt. In het algemeen zijn de Nepentheae, door de samenstelling der vrucht, zeer verwant aan de door Lindley als Cistales voorgestelde groep, en bieden zij punten aan van vergelijking in de aanhechting der eitjes, de wijze van openspringen der kapsels en in de samenstelling der zaden.

De aan dezen, door hunnen vorm verwante gewassen vergelijkende, komen *Dionaea*, *Sarracenia* en *Cephalotus* in aanmerking. De *Dionaea* heeft cenige overeenkomst door de wijze van ontwikkeling en door den vorm der bladen, welke, zoo als bekend is, bestaan uit eenen bladvormig uitgebreiden steel, die de steng omvat, en uit eene tweelobbige bladschijf; de eerste is zeer goed te vergelijken met den bladvormigen steel en de laatste met het bekergedeelte van *Nepenthes*. Vóór de ontwikkeling is de prikkelbare bladschijf zamengevouwen en op den bladsteel teruggebogen: de geheele vorm verschilt dan zeer weinig van eene jonge *Nepenthes*-plant. In beiden bestaat dus eene knopvorming der bladen, die eenige gelijkheid met en eenen overgang tot de Droseraceae aantoont (\*). De verwantschap met *Sarracenia* berust op cenige gelijkheid van den bladvorm en misschien van de vruchtdeelen, terwijl die met *Cephalotus* (†) alleen in den vorm der bladen kan gezocht worden. De beide laatstgenoemden staan, als gelijkvormige gewassen, in eenige verbinding met de Nepentheae; de Droseraceae en Aristolochiae komen als verwantschapsvormen in aanmerking, en de eerstgenoemden moeten, naar het mij voorkomt, de Nepentheae in hare nabijheid hebben.

---

(\*) Door de waarneming van de *Dionaea muscipula*, is het ook mij gebleken, dat de bladschijven, vooral in het middelste gedeelte, langs de nerf aangeraakt, de prikkelbaarheid doen blijken, en dat deze eigenschap misschien in verband staat met eene eigenaardige soort van haren en met de door uitvalling dezer, ontstaande diepten, die vooral in het middelgedeelte zijn geplaatst. In den tuin van Berlijn schijnt deze plant hare prikkelbaarheid gedeeltelijk te verliezen (Meyen, *Physiologie*, 3. p. 545); hier te Leiden, heb ik zeer dikwerf vliegen, tusschen de beide lobben gevat, waargenomen, en de opene lobben, bij eene prikkeling en tusschenlegging van haar, zich tot elkander zien voegen.

(†) Lang nadat ik dit geschreven had, ontving ik door de goedheid van den Heer Donkeler, een blad van *Cephalotus* ter bezigtiging. Hierdoor heb ik de gelijkheid van de nervuur der bovenlip met die der deksels van *Nepenthes* kunnen waarnemen. Voor het overige verschilt de grondvorm des blads van *Cephalotus* en hetzelfde schijnt mij toe, als een blad beschouwd te moeten worden, waarin het parenchym ontbreekt. Voor dit gevoelen pleit eene vergelijking van den loop der nerven in de bladen van *Cephalotus*, met dien der nerven van de vleezige bladen van eenige soorten van *Mesembryanthemum*, enzv. (Treviranus, *Physiologie*, I. bl. 439.)

## I. NEPENTHES BONGSO. KHS.

*N. phyllodiis sessilibus basi biauriculatis, ascidiis infundibuliformibus, inflorescentiâ racemosâ subpubescente, pedicellis uni- vel bifloris, ovariis substipitatis.*

De oudere stengen, naauwelijks de dikte eener ganzensehacht overtreffende, zijn van eene min of meer rolronde gedaante, bijna bladerloos, van eene donker grijze kleur en geheel glad. De jongere stengen zijn stomp vierkant, aan de uiteinden meer scherpkantig met gevoorde zijden, bijna geheel glad en van eene grijze of grijs-groene kleur. De phyllodia, ongeveer 3 of 4 Ned. duimen van elkander verwijderd, zijn overhoeks geplaatst, zoodat het derde bijna boven het eerste staat. In den knop zijn zij omgerold en omvatten zij het volgende blad; vervolgens zich ontwikkelende, buigen zij terug en nemen op het laatst eenen horizontalen, en niet zelden eenen teruggebogenen stand aan. De jonge steng-phyllodia zijn licht-groen, van buiten glad, maar van binnen, naar den top en even beneden denzelfden, min of meer behaard. Hunne gedaante is langwerpig, van boven eenigzins breeder, ingedeukt, stomp, zelden spits; even boven den voet nemen zij weder in breedte toe, omvatten hier de steng en bezitten aan de zijden twee ronde oortjes. De oudere phyllodia hebben den rand eenigzins kroes, zijn van boven glad, van onderen met eene bruine stoffachtige beharing bedekt, lederachtig, 9 Ned. duim lang, 2,5 duim breed; door dezelve loopen, behalve eene zeer ontwikkelde middelnerf, vier tot zes kleine, op verschillende hoogten uit de middelnerf ontstaande zij-nerven, in eene met den rand overeenstemmende rigting, die zich weder naar den top vereenigen. Tusschen deze overlansche nerven zijn een aantal kleine, die op de ondervlakte netvormig uitsteken. De middelnerf steekt alleen aan de onderzijde van het vlak aanzienlijk uit, en heeft daar drie zijden: zij zet zich boven de beschreven bladvlakte in eenen steel voort, welke in den jeugdigen staat geheel door eene grijze beharing is bedekt, en in een langwerpig, driehoekig, puntig, even zoo digt behaard knodsje eindigt. De oudere, veeltijds door het afvallen der beharing geheel gladde stelen, komen onder twee vormen voor: bij den een' ontwikkelt het beschreven knodsje tot een bekervormig aanhangsel; bij den anderen blijft dit onontwikkeld. In het laatste geval zijn de stelen, bij het verlaten der bladuitbreiding, vier- of soms driekantig, en worden, naar het einde, meer rolrond. Hier vinden wij altijd eene min of meer aanzienlijke, grijs behaarde, rolronde en puntig uitlopende verdikking, welke, naarmate van de meerdere ontwikkeling, eene meer aanzienlijke holte aanbiedt. In het eerste geval bereiken de stelen niet zelden eene lengte van 2 palmen, en hebben in den geheelen loop eene driekante gedaante. De jongere bekervormige, waarin zij eindigen, zijn door eene digte, grijze beharing bedekt, knodsvormig, aan den top scheef afgesneden; de naar de spil gekeerde zijde is het kortste, en de andere met eene bogt oplopende en in een lijnvormig aanhangsel eindigende. In dezen onontwikkelden staat is de stelling der bekervormige bekervormige, doeh eene meerdere ontwikkeling maakt de rigting meer bepaald. Door de buiging en soms door de kronkeling der stelen, nemen de bekervormige bekervormige eenen vertikalen stand aan, die de opening naar boven rigt. De ontwikkelde stengbekervormige zijn trechtervormig, met den voet in eene kleine bogt omgebogen, en hier met het regtstandig nederdalende einde van den steel verbonden. Het tegen over de spil staande gedeelte van den beker is vlak; het afgewende deel is rond, verwijdt zich naar boven en vernauwt vervolgens weder even beneden de opening. Deze van de spil verwijderde zijde is het langste, en op het einde derzelve heeft de inhechting van het deksel plaats. De opening van den beker is scheef, bijna rond, en van eenen geribden

rand omgeven. De reeds gemelde, tegen over de spil geplaatste, vlakke zijde, wordt door twee uitstekende randen bepaald: tussehen deze loopen drie nerven, welke vele zij-aren afgeven, naar den rand der opening. Een grooter aantal nerven, welke mede in den steel haren oorsprong nemen, geeft aan den voet een geribd voorkomen. Deze loopen door de geheele lengte van den beker, en vereenigen zich vervolgens beneden of in het aanhechtingspunt van het deksel. Behalve deze hoofdnerven, welke het grootste getal uitmaken, vereenigen zich hier nog eenige, uit de reeds vermelde uitstekende randen voortkomende nerven. Tussehen deze hoofdnerven vertoonen zich eene menigte aderen, welke, de nerven bijna regthoekig snijdende, hierdoor een uit vierkante mazen gevormd weefsel doen ontstaan. Op de licht-groene grondkleur der bekens zijn onregelmatig purperkleurige vlakken verspreid, en eene fijne bruine beharing geeft aan de geheele oppervlakte een gestipt voorkomen. De opening staat tot de lengte als 1 tot 3, en de geheele lengte der bekens is zoo afwisselend, dat zij tussehen de 6 en 14 Ned. duimen versehilt. Hunne binnenvlakte is naar de opening dof purperkleurig, het lagere gedeelte meer glanzig en nog meer naar den voet blinkend geel. In het benedenste gedeelte zijn de ovale kliertjes het grootste, maar ook het minst talrijk; en naar boven nemen zij in grootte af en in getal toe. Het menigvuldigst zijn zij in het hoogste gedeelte der bekens; dáár eehter verandert hun vorm en nemen zij eene meer ronde gedaante aan. Even beneden den voet van het deksel is een klein, platgedrukt, min of meer behaard draadje, waarin een gedeelte der nerven eindigt; het ander vereenigt zich daarentegen in den voet van het deksel, en breidt zich daarin als aderen uit. Dit deksel is ten naastenbij eirkelrond, aan den top ingedeukt of afgesneden, aan den voet hartvormig ingesneden, van buiten met eene fijne beharing en van binnen, vooral naar het midden, van eene menigte kleine, ronde of langwerpige, door walletjes omringde kliertjes voorzien, vliezig, 2 Ned. duimen lang, 3 duimen breed, aan de binnenzijde niet zelden purperkleurig en zeer rijk aan aderen. Deze aderen zijn bij haar ontstaan aan den voet van het deksel, meest oneven van getal en splijten zich hooger weder in kleinere; vervolgens vereenigen zich deze talrijke verdeelingen weder en vormen hierdoor, in de vliezige uitbreiding, eene sehoone, samenhangende årenvlecht. De in de oksels geplaatste bloemtrossen hebben den algemeenen steel van den voet tot op ongeveer de helft of twee derden naakt; dit gedeelte is zamengedrukt, met ronde kanten, glad of met kleine verspreide grijze haren; het bloemdragend gedeelte is vier- of vijfzijdig, seherpkantig, grijs behaard, en heeft de bloemen spiraalsgewijze geplaatst. De bloemsteeltjes hebben eenen verbreedten, zaamgedrukten voet, en worden naar het einde meer rolrond; de benedenste dragen even boven den voet, min of meer uitgegroeide, laneet-lijn-vormige, toegespitste, grijs behaarde sehutblaadjes, welke 1 Ned. duim tot 2 strepen lang zijn; de hooger geplaatste missen deze geheel of hebben dezelve op enkele der bloemsteeltjes als draadvormige aanhangsels. Ieder bloemsteeltje draagt één, zelden twee bloempjes en is ongeveer 4 à 6 strepen lang. De vier deelen van het bloembekleedsel zijn ovaal, van boven stomp, van buiten behaard, van binnen glad met eene menigte langwerpige groefjes, dik, 2 strepen lang en 1 streep breed, voortdurend en, kort na de opening der bloem, benedenwaarts omgeslagen. Het in het midden der bloem op een klein steeltje geplaatste vruchtbeginsel is stomp-vierkantig, de kanten tegen over de bloemdeelen, met gevoorde zijden, naar den voet eenigzins afgerond, naar den top afgeknot, door den vastzittenden stempel gekroond en grijs behaard. De stempel is vierlobbig, van boven vlak, met twee elkander kruisende voren, die over de kanten uitkomen. De rijpe kapsels hebben, even als het vruchtbeginsel,



eenen langwerpigen vorm, doch eene meer verspreide beharing, zelden meer dan één' duim lengte, en springen in het midden der vermelde kanten in vier, met het bovenste gedeelte eenigzins omgebogene, kleppen open. Deze langwerpig ovale kleppen zijn van binnen glad, door een vierde gedeelte van den stempel gekroond, en dragen op het midden de dunne, naar boven en beneden eenigzins verdikte, plaatvormige wanden, welke de vrucht vierhoekig maken. Langs deze wanden zijn de kleine zaadjes, van den voet der kapsels tot op ongeveer het midden, geplaatst. De onrijpe, die door mij gezien zijn, waren in het midden rolrond, somtijds eenigzins zamengedrukt en eindigden aan weërszijde draadvormig.

Deze soort werd door ons op den berg Merapi, op Sumatra, waargenomen. Bij de bestijging van dezen, in het midden van het rijk van Menang-Karbau gelegen, 2912 N. Ellen hoogen berg (\*), troffen wij haar aan, nadat wij het digte bosc verlaten hadden en ons op de minder digt begroeide, ja soms bijna kale bergruggen bevonden. Eene bijgeloovige gewoonte onzer begeleiders gaf tot het vinden der eerste plant aanleiding. Op eene kleine, in het midden kale, maar door helder groen bebladerde *Euryae reticulatae* en witte, welriekende bloemen dragende *Laplaeae vuleanae* Khs. (†), omzoomde vlakte gekomen zijnde, verrigteden onze begeleiders hunne gebeden en bragten eene soort van offer aan de bewaakster van den berg, *Poeti-Bongso*, terwijl ik intussehen, de om ons heen verspreide struiken doorzoekende, eene bijna geheel verdorde plant vond. Den weg hooger op, langs den zich versmalenden bergrug voortzettende, zagen wij deze *Nepenthes*-soort, op ongeveer 2500 N. Ellen, minder zeldzaam. Hier slingerde zij zich, met ongeveer 2 N. Ellen lange stengen, tussehen de kleine groepen van *Thibaudia elliptica* Bl., *Gaultheria punctata* Bl., *Eurya reticulata* Khs., *Ardisia laevigata* Bl. en *Photinia serrata* Khs.; dan weder verried zij haar aanwezen door haar lichtgroen loof, tussehen de grijskleurige *Gleichenia vuleana* Bl., en deed zij, door eene mindere ontwikkeling en de broosheid harer deelen, het ongunstige harer groeiplaats kennen.

De *Nepenthes Bongso* is, door den weinig ontwikkelden, bladvormigen steel, verwant aan *N. Gymnamphora* en *N. gracilis*, maar wijkt van beiden, door den trechtvorm der bekens af. Zij heeft dezen vorm der bekens gemeen met de *N. Madagascariensis*, van welke zij overigens door de beharing en de bloeiwijze verschilt.

(\*) Behalve de hoogte van dezen berg, zijn nog de hoogten der boven de bergketen uitstekende, vulkanische toppen van den Ophir of Passaman en van den Singalang, door de waarnemingen van den Heer Horner, bekend geworden. De eerste is 2924 N. Ellen (niet 4219 ellen, zoo als Nairne heeft opgegeven) en de tweede, de Singalang, 2936 ellen hoog. De bergtoppen van den Talang of Soloashie, en van den Merapi of Piek van Corinthie, welke zuidelijker boven de bergketen van Sumatra's westkust uitsteken, zijn nog niet bestegen. Deze echter, naar van zee genomene hoeken, met de bovengenoemden vergelijkende, kunnen niet aanmerkelijk van elkander verschillen.

(†) Beiden zullen, in de tweede of derde aflevering van dit werk, beschreven worden.

## II. NEPENTHES GRACILIS. Kns.

*N. phyllodiis decurrentibus, ascidiis radicalibus ventricoso-tubulosis, caulinis cylindrico-tubulosis, inflorescentiâ racemosâ fusco-sericeâ, pedunculis unifloris, ovariis sessilibus.*

De wortel dezer soort zwelt somwijlen tot eenen onregelmatig ronden of meer langwerpigen, houtigen knol aan, uit welken een aantal kleine worteltjes ontstaan, benevens één, zelden meer, rolronde, soms gevoorde, knobbelige, houtige, bruin gekleurde, horizontaal onder of over den bodem kruipende wortelstok. Uit dezen wortelstok ontwikkelen zich eene menigte zwarte, rijk met vezeltjes bedekte worteltjes, ter plaatse, waar jonge blad- of stengseheuten te voorschijn komen. Van deze groeit meestal slechts één, zelden meerdere, tot hoofdsteng uit, terwijl de anderen veeltijds in groei achterlijk blijven. Van deze seheuten zijn de phyllodia langwerpig, naar de punt toegespitst, met den voet de steng op ongeveer drie vierde van den omtrek omgevende, van boven glad en van onderen met eene zeer fijne beharing. De steel van de middelnerf is bruin behaard, stomp-driekantig, met eene vlakke zijde naar boven, en eindigt in een even zoo behaard, eivormig ligehaampje, hetwelk in dien onontwikkelden staat blijft of tot een' beker uitgroeit. Deze bekere zijn buisvormig, aan den voet kogelvormig verwijd en hebben hunne cirkelronde opening, wier middellijn tot de lengte van den beker als 1 tot 2 staat, door eenen geribden, naar buiten en binnen omgebogenen rand omzoomd. Zij worden op de naar de spil gekeerde zijde door twee diep getande, bladaardige kammen versierd, en bezitten ook op dezen de bundelsgewijs vereenigde, fijne haartjes, welke insgelijks op het overige gedeelte van den beker aanwezig zijn. De nervenloop dezer groene, purper gevlekte bekere, wijkt weinig van dien der andere soorten af, uitgenomen, dat hier de, van den voet regt naar het deksel uitlopende nerf duidelijker is ontwikkeld, en met haar verseheidene zij-nerven te zamenloopen, alvorens den top te bereiken. Hier vereenigen zich deze nerven gedeeltelijk in een klein ingesneden of ongedeeld, bruin behaard aanhangsel, gedeeltelijk in den voet van het deksel. Deze laatste breiden zich vervolgens weder uit in het bijna cirkelronde deksel, hetwelk aan den voet hartvormig ingesneden, gaaf van rand of met eenige priemvormige tanden omzet, van buiten behaard en van binnen glad, van eenige weinige klieren voorzien, vliezig en door een fraai aderen-net versierd is. De binnenvlakte van den beker is bijna gelijkelijk in eene eenigzins purperkleurige, doffe en in eene blinkend gele, met kleine zwarte kliertjes voorziene helft verdeeld, en onder de zeer regelmatige scheidingslijn zijn twee, met dezelve evenwijdig loopende rijen van klieren; onder dezen zijn de volgende klieren minder regelmatig geplaatst, en het is opmerkelijk, dat zij in deze soort, op eene bepaalde ruimte, naar den voet in getal toenemen, en er hier driemaal meer dan aan den top, bij gelijke uitbreiding zouden aanwezig zijn. Het naakte gedeelte van de steng der oudere planten is rolrond, knobbelig, blinkend, zwart-bruin, en het gebladerde gedeelte seherp driekant met vlakke zijden, groen of somwijlen paarskleurig, bijna geheel glad. De phyllodia zijn overhoeks, even als de aan dezelfde zijde staande en bijna boven elkander geplaatste, langwerpig, naar den top zeer toegespitst, met den voet twee derde gedeelten der steng omvattende en het overige vlakke gedeelte met eenen bladaardigen, stomp eindigenden rand omzoomende, van boven glad, van onderen met eene verspreide beharing, 2 duim breed en 10 duim lang, geel-groen gekleurd, met eene van onderen uitstekende middelnerf, en aan weërszijden twee of drie uit of even boven het aanhechtingspunt ontspringende, met den omtrek evenwijdig loopende en zich in den top vereenigende zij-nerven, die door eene menigte, dwars over de

bladuitbreiding loopende aderen zijn verbonden. Een of meerdere, digter bij de bloeiwijze geplaatste phyllodia, zijn soms van eene meer ovale gedaante, waarin de lengte tot de breedte als 5 tot 2 staat. De steel, in welken de middelnerf verloopt, heeft dikwerf de dubbele lengte van de bladuitbreiding, is half rolrond, eerst roest-bruin behaard, vervolgens glad, naar het uiteinde of meer in het midden met twee tot vijf kleine krullen, en eindigt in een langwerpige, onregelmatig, spits knodsje of in eenen beker. Deze bekens zijn buisvormig, aan den voet met eene korte bogt, even boven denzelfden verwijd en vervolgens naar de opening in omvang afnemende. Bij eenen beker van 11 duim lengte bedroeg de grootste omtrek 6 en de kleinste 4 Ned. duim. Hunne beharing, het verloop der nerven en de omzoomende rand der opening behoeven, wegens de gelijkvormigheid met het dien-aangaande vermelde, geene nadere opgave. De beide, op de jongere of lager geplaatste bekens aanwezige kammen, zijn bij deze soort soms meer, dan bij andere soorten, van elkander verwijderd en dikwerf alleen als eenvoudige uitstekende randen aanwezig. De binnenvlakte der bekens is, van den voet tot op ongeveer een derde van de lengte, blinkend en klierdragende. Het aanhangsel en het deksel wijken weinig van de reeds beschrevenen af; alleen heeft het laatste de insnede aan den voet een weinig dieper en de binnenvlakte met eenige weinige, vrij groote, ronde, somwijlen met eene kleine uitholling, in het midden voorziene kliertjes of klierhoopjes. Het grootste door mij geziene deksel was 30 strepen breed en 32 strepen lang, en bedekte de opening van eenen beker van 12 duimen lengte. De bloeiwijze der mannelijke en vrouwelijke planten is sehijnbaar aan het einde der stengen geplaatst, trosvormig, bruin behaard, dikwerf twee palmen lang, met éénbloemige bloemsteeltjes. De algemeene bloemsteel is aan den voet zaamgedrukt, een weinig gevoord; het bloemdragende gedeelte daarentegen vier- of vijfkantig en naar den top eenigzins platgedrukt. De bloemsteeltjes zijn bij den oorsprong een weinig verbreed, naar boven meer rolrond, blinkend bruin behaard. De mannelijke bloemknoppen zijn bijna kogelrond, en in deze liggen de beide buitenste grootste kelkdeelen over de binnenste heengeslagen. De buitenste deelen zijn bijna eirkelrond, van buiten bruin behaard, van binnen glad, met kleine groefjes, lederachtig, ongeveer 2,2 streep lang en 2 streep breed; de binnenste zijn ovaal en beiden na de opening teruggeslagen. De meeldraden-kolom is stomp-vierkantig, aan den voet een weinig verbreed, glad en eindigt in eenen bijna kogelronden knop, welke vervolgens meer sehijfvormig wordt. Om dezen knop zitten twaalf langwerpige helmknopjes, welke een drielobbig, zelden kogelrond stuifmeel uitstorten. De vrouwelijke bloemen zijn gekenmerkt door meer eironde knoppen. Zij hebben de vier bekleedselen langwerpig ovaal, stomp, aan de buitenzijde bruin behaard, aan de binnenzijde glad, met kleine groefjes, 1 streep breed, 2,5 streep lang. Het vruehtbeginsel is stomp-vierkantig, met de kanten tegen over de bloembekleedsel-deelen, naar den voet afgerond, naar den top eenigzins verdund, door een vierlobbig, platgedrukten stempel gekroond, bruin behaard, vierhokkig, met eene menigte eitjes. De kapsels zijn houtig, langwerpig, in het midden buikvormig, naar de einden in omvang afnemende, stomp-vierkantig, met eenigzins gevoorde zijden, blinkend licht bruin, met kleine haartjes en groefjes, ongeveer 16 streep lang en 3 streep breed, in vier kleppen openspringende. Deze kleppen dragen in het midden de vliezige middelsehotten, welke de vrueht verdeelen, zijn blinkend bruin en eindigen in een tweelobbig gedeelte van den stempel. De talrijke zaadjes zijn tegen de wanden, met het vrije einde naar boven geplaatst, spilvormig, aan beide einden toegespitst, eenigzins zaamgedrukt, ruw, ongeveer 1 duim lang en een derde tot eene halve streep breed. Hun buitenste vlies is eenigzins dikker,

dan bij de volgende soort. De raphé loopt eerst vrij door het celweefsel, verbindt zich vervolgens beneden de kern met het gemelde vlies, loopt daarna langs deze tot boven de kern, waar zij zich ombuigt en met het binnenste zaadbekleedsel verbindt. De kern is rolrond, aan den top en aan den voet stomp. Zij bestaat uit een wit kiemwit, hetwelk de regstandige kiem omgeeft. Deze is rolrond, in het midden eenigzins ingesnoerd, met stompe zaadlobben en een, somwijlen in een klein puntje eindigend worteltje.

---

Deze soort, door mij het eerst op Sumatra's westkust gevonden, waarvan ik aan den Hoogleraar van Hall schriftelijk kennis gaf, berustte in dien tijd alleen op de mij toen bekende onderseheidende blad-vormen, terwijl hare bloem- en vruchtdeelen mij geheel onbekend waren. Ik verheugde mij dus, door voorwerpen, welke mijn reisgenoot Dr. Müller aan de rivier Palantau verzamelde, van haar aanwezig op Borneo's zuid-oostkust onderrigt te worden, en mogt daardoor de hoop voeden, deze plant, hier of daar, bloem- en vruchtdragende te zullen ontmoeten. Deze hoop werd dan ook later, bij onzen togt naar den berg Pamatton, verwezentlijkt. Aan den voet van dezen berg groeide, op den uit verweerd Dioriet-aardig gesteente gevormden, rood-bruinen grond, deze soort met eene tot dien bodem in verhouding staande ontwikkeling. Eenige der hier verzamelde voorwerpen hadden nauwelijks meer dan eenige duimen hoogte; anderen eenen aanzienlijker wasdom. Omtrent het voorkomen en de standplaats dezer soort, vind ik het volgende in mijn dagboek opgeteekend:

»Aan den voet, even als op de hellingen, van den ongeveer 325 meters hoogen berg Pamatton, steken overal steenblokken uit, die in hunne gebarstene oppervlakte de kenmerken dragen van vroeger gesmolten te zijn geweest. Zij zijn van buiten bruin of geel gekleurd en van binnen zwart met glanzende glimmerblaadjes, enkele witte kiezelkorreltjes en hoopjes ijzeroxyde, en behooren tot eene soort van Gabbro, die somwijlen in digtere, minder sehulpvormig brekende Serpentijn overgaat. Het moeilijke verwerken dezer steensoort, benevens de onvruchtbaarheid van de hierdoor gevormde aarde, wordt door het aanzien der voorhandene planten bewezen. — De onder haar niet zeldzame *Nepenthes gracilis* ontwikkelt, naar gelang zij een gunstiger of ongunstiger plekje gronds bedekt, de bladaardige uitbreiding met eene meerder of minder levendig groene kleur. Bij deze fraaije plant wast eene heerlijke soort van *Melastoma* (*M. porphyratum* Bl.), welke hier slechts een' halven voet hoogte bereikt en elders, met geene grootere bloemen, tot vier voet hooge struiken uitgroeit; verder eene *Hedyotis*, welke ons aan *H. rugosa* (*Metabolos rugosa* Bl.) van de omstreken der hooge kraters herinnerde, en, als hoofdplant, eene nu geheel verdorde grassoort (*Anthisteria*). Boven deze lage gewassen, waren *Apoterium sulatri*, *Petunga*, *Spathodea*, *Melanthesa* en *Psychotria* groepsgewijze te zamen verspreid, welke, daar hunne schaduw de uitdrooging van den grond verminderde, aan de daardoor vochtiger geplaatste *Nepenthes* eene meerdere ontwikkeling deden te beurt vallen.»

De op Sumatra verzamelde planten onderseiden zich van die van Borneo door eene meer aanzienlijke bladontwikkeling, waarschijnlijk door de voor haren groei meer geschikte, vochtiger standplaats te weeg gebracht. Behalve deze beide, door ons onderzochte oorden, bewoont deze soort ver-

moedelijk ook Malacca en Singapoera; ten minste, naar de beschrijving, welke door W. Jaek, van de door hem in die streken gevondene *Nepenthes destillatoria* gegeven wordt (\*), meen ik te mogen vooronderstellen, dat hij niet de ware *N. destillatoria* L., maar eene met de *N. graeilis* overeenkomende plant heeft voor zich gehad, èn omdat het gegeven kenmerk op de laatstgenoemde soort juist toepasselijk is, èn omdat hare wijze van verspreiding geene bedenking tegen deze gelijkheid oplevert.

### III. NEPENTHES BOSCHIANA. KHS.

*N. phyllodiis decurrentibus, ascidiis radicalibus ventricoso-tubulosis, caulinis tubuloso-infundibuliformibus, inflorescentiâ cinereo-pubescente, pedunculis uni- vel bifloris, ovariis sessilibus.*

Op deze soort is het bij de vorige, omtrent den wortelstok en de bekleeding der stengen van jongere planten opgemerkte toepasselijk. Zij heeft aan de wortelbladen, even boven de seheedevormige stengomvattende uitbreiding, een klein steeltje, en hooger een ovaal naar den top toegespitst, van boven glad, van onderen spaarzaam stipvormig behaard, ongeveer 3 duim breed en 7 duim lang, lichtgroen phyllodium, met eene van onderen zeer ontwikkelde middelnerf, en ééne of twee met den rand evenwijdig loopende en niet ver van denzelven verwijderde, zieh even beneden den top met de middelnerf vereenigende zij-nerven, welke door eene menigte aderen met elkander en met de middelnerf zijn verbonden. De steel, welke deze middelnerf vervolgt, is stomp-driekantig, met gevoorde zijden; jong zijnde behaard, ouder wordende glad. De eenigzins zaamgedrukte knoppen en de zeer jonge bladen zijn aan de beide randen en op de middelnerf, en de jonge bekens geheel door eene grijze beharing bedekt. In het begin hunner ontwikkeling zijn de bekens bijna rolrond en van boven seheef afgeknot. Meer uitgegroeid, worden zij kruikvormig, even boven den voet kogel- of eivormig verwijd, en vervolgens na de opening weder meer regelmatig buisvormig. Op dezelve zijn de beide kammen, even als bij de vorige soorten, ontwikkeld. Hunne nervuur wijkt zeer weinig van die der *N. graeilis* af, en de rand, welke de opening omzoomt, is even als die der vorige soorten, geribd. Het aanhangsel, beneden het deksel, is meestal een gaaf, somwijlen aan het einde gespleten plaatje. Het deksel is bijna eirkelrond, aan den voet hartvormig ingesneden, op de binnenzijde met eene menigte eirkelronde of meer ovale, door kleine wallen omgevene kliertjes, en aan de buitenzijde met eenige kleine, bruine haartjes voorzien. De binnenvlakte der bekens wordt door het kleurverschil in bijna twee gelijke deelen verdeeld en heeft het bovenste gedeelte dof, met eenen purper-blaauwen dauw bedekt; het benedenste is zeer glanzig, bruin-geel, met een groot getal kleine poren, die van den voet naar boven op eene bepaalde ruimte toenemen. Aan meer uitgegroeide planten zijn de oudere stengen rolrond, glad, met eene menigte kleine groeven; de jongere, min of meer stomp-driekantig, glad, met kleine zwarte stipjes en in de oksels der bladstelen dicht grijs behaard. De phyllodia vershillen vooral door eene meerdere ontwikkeling van die der jongere seheuten. Het aflopend gedeelte is stomp-driekantig, met eenen bladerigen rand bezoomd, en omgeeft ongeveer twee derde gedeelten van den omvang der steng. Het breede is langwerpig-ovaal en heeft eene met de reeds beshrevene, overeenkomende nervenverdee-

(\*) *Hooker Companion*, I. p. 271. *Foliis sessilibus amplexicaulibus, ascidiis infundibuliformibus ore striato.*

ling. De van onderen half rolronde middelnerf zet zich voort in eenen dikwerf aanzienlijk ontwikkelden, in het midden gekrulden steel, welke naar het einde in dikte toeneemt en veelal in eenen, aan den voet gebogenen beker overgaat. Deze beker heeft eenen verlengden trechtervorm, is in het benedenste gedeelte eenigzins wijder en heeft, bij eene lengte van ongeveer drie palmen, eene middellijn van, aan den voet 4, in het midden 3 en aan de opening ongeveer 5 duimen. Zijne opening is met eenen breeden geribden rand omzoomd, en de binnenvlakte in het bovenste twee derde gedeelte, min of meer dof purperkleurig, en in het overige glanzend bruin met eene menigte half eirkelronde poren. Zijn deksel is in vorm weinig van dat der jongere bladen onderscheiden, maar bezit somwijlen even boven den voet, een zaamgedrukt, min of meer rond uitsteeksel. Aan een groot stengblad heb ik de volgende evenredigheid waargenomen: het aflopend gedeelte van het phylodium 13 duim lang; het verbrede gedeelte 32 duim lang en 8 duim breed; de bekersteel 30 duim en de beker 27 duim lang; de rand 1,5 duim breed; het deksel 6 duim lang en 7 duim breed. De bloeiwijze der mannelijke en ook der vrouwelijke planten is trosvormig, dikwerf 9 palmen lang, behaard, heeft de benedenste helft van den algemeen bloemsteel bloemloos, rolronde, en de bovenste bloemdragend, zaamgedrukt, kantig. Hare bloemsteeltjes zijn meest twee-, en naar den top éénbloemig, behaard, min of meer te zamengedrukt; de benedenste hebben even boven den voet een toegespitst schutblaadje. De mannelijke bloem bezit de vier bloemdeelen ovaal, van buiten geheel en van binnen even boven den voet grijs behaard, hooger op glad, met kleine groefjes, 3 streep breed en 4 streep lang, en na de opening teruggeslagen. Zij heeft het zuiltje en den knop van de vereenigde helmraden gelijk aan die der *N. gracilis*, uitgezonderd dat de laatste somwijlen slechts 8 helmknopjes draagt. De vrouwelijke bloemen onderscheiden zich van de mannelijke door langere knoppen en door de meer langwerpige deelen van het bloembekleedsel. Haar vruehtbeginsel is door vorm en samenstelling weinig onderscheiden van dat der bovenvermelde soort. De kapsels zijn langwerpig, in het midden een weinig dikker, stomp-vierkantig, grijs behaard, houtig, door den stempel gekroond, in vier, ieder een gedeelte van den stempel dragende, kleppen openspringende. Deze kleppen hebben, even als de vorige soorten, het tegen over hen liggende gedeelte van het middelsehot op hun midden. De talrijke, daaraan vastgehechte zaadjes, zijn in het midden bijna rolronde verdikt, naar de einden elsvormig uitlopende, en ongeveer 12 strepen lang. De kern beslaat daarvan 1,2 streep, heeft eenen langwerpigen eivorm en een aanzienlijk ontwikkeld kiemwit, hetwelk de kiem, met uitzondering van een klein, tegen over den wortel gelegen puntje, geheel omgeeft. In haren vorm wijkt de kiem somwijlen door eene meerdere verdikking van het wortelgedeelte van de andere soorten af; dit is echter als eene uitzondering aan te merken, daar zij meestal cilindervormig, in het midden een weinig ingesnoerd en aan de uiteinden afgerond voorkomt.

---

De boven beschrevene, tot heden onbekende plant verdiende, wegens haren uitnemend schoonen vorm en hare aanzienlijke grootte, ook met eenen uitstekenden naam in het stelsel der wetenschap te worden opgenomen. Derhalve, gebruik makende van de in de kruidkunde aangenomene loffelijke gewoonte, om den naam van hen, welke der maatschappij of der wetenschappen belangrijke diensten bewezen, op onbeschrevene gewassen toe te passen, heb ik de vrijheid genomen om deze soort van

Nepenthes te vereeren met den naam van den algemeen geachten Staatsman, aan wien de maatschappij zulk een doeltreffend middel ter verzorging der armen, het vaderland, in deszelfs Oost-Indische bezittingen, de invoering van een, door rijke vruchten bekroond stelsel van cultuur, en de natuurkundige wetenschappen zulke belangrijke ondersteuning verschuldigd zijn, ten einde op die wijze eene dankbare hulde te brengen aan Zijne Excellentie, den Luitenant-Generaal, Minister van Staat, Graaf van den Bosch, laatst Minister van Koloniën, vroeger Commissaris-Generaal der Nederlandsche Oost- en West-Indische bezittingen.

De *Nepenthes Boschiana* werd door ons op den top van den berg Sakoembang (\*), op Borneo's zuid-oostkust gevonden, en droeg niet weinig bij tot de opluistering der vegetatie aldaar. Tussehen eene groep van rijkbloeiende, maar bijna bladerlooze *Melastomata porphyrata*, herstelden hare aanzienlijke bladerige uitbreidingen het voor het oog verbroken evenwigt, en verborgen zij de ruwe en hoekige takken der planten, tegen welke zij steunden. Op eene andere plaats tooiden hare afhangende stengcn, met de groene bladschijfvormige stelen en uitnemend groote, door purpervlekken bont gesehakeerde bekers, de door verschillende soorten van *Balsamina*, *Begonia*, *Hymenophyllum* en *Hypnum* schraal begroeide, steile Syënetwanden. Elders slingerden zich meer ontwikkelde stengcn tusschen de in hare nabijheid staande boomen, en verborgen zij zich tusschen de digte kroonen der *Myrtus acuminata*, *Eurya nitida*, *Coptosapelta montana* Khs. (†) en *Macklottia Amboinensis* Khs. (§). Door de meerdere grootte der bladvlakte, en vooral door de lange trechtervormige bekers, die niet zelden langs den omtrek der kroonen afhingen, werden zij echter niet aan het oog onttrokken en verschaften zij de gelegenheid, om de schoonste gewassen voor onze verzameling uit te kiezen en dus een sieraad van deze te worden. Terwijl ik mij met zoodanige bloemlezing onledig hield, waren mijne begeleiders bezig met de grootste bladen van eene, door hen gevondene groep dezer planten, ter verkrijging der bekers, te vernielen. Eenigen kozen zich daarbij de nog ongeopende bekers uit en verzekerden mij, dat het in dezelve bevatte water een zeer heilzaam middel tegen oogontstekingen was; anderen zochten de grootste, reeds geopende bekers op, hetzij om hunne rijst daarin te koken, of wel om ze als speelgoed, zakjes of pijlkokertjes voor hunne kinderen mede te nemen. Van dit laatste gebruik is vermoedelijk de inlandsche naam *Daoen-sompitan*, hetwelk blaaspip-bladen beteekent, afkomstig. Voor het overige maken de inlanders, naar ik vernomen heb, geen ander gebruik van cenig gedeelte dezer plant, en evenmin schijnen zij aan het bijgeloof te hechten, hetwelk bij de bewoners van de Molukken en van Madagascar algemeen heerschende is, dat na de uitstorting van het vocht der bekers, regen zou moeten volgen, daar zij het water van die bekers, in welke hetzelve, zoo als dikwerf geschiedt, door verdronkene mieren bezoedeld is, terstond uitstorteden.

Bij eene vergelijking der *Nepenthes Boschiana* met de andere soorten, onderscheidt zij zich van de *Nepenthes graeilis* door den meer ovalen vorm van de phyllodia, en door de meer trechtervormige gedaante

---

(\*) De Sakoembang is eene der hoogste kruinen van het op Borneo's zuid-oostkust gelegen Ratoesgebergte en heeft, volgens Barometer-waarnemingen, eene hoogte van 967,8 Ned. ellen. Hij bestaat voornamelijk uit Dioriet en Syënet, en schijnt tusschen eene micaschiste-formatie opgeheven te zijn.

(†) Een nieuw geslacht van de *Cinehoneae*.

(§) *Leptospermum Amboinense* Bl.

der bekers. Door deze laatste bijzonderheid heeft de *Nepenthes Bosehiana* eenige gelijkenis met de *N. destillatoria*, *N. Madagascariensis* en *N. Rafflesiana*: zij verschilt echter van de beide eersten door hare minder zaamgestelde bloeiwijze, en van de laatstgenoemde, door de minder buikige bekers der jongere stengbladen en door de rijkere nervuur van den bladschijfvormigen steel.

#### IV. NEPENTHES PHYLLAMPHORA. Willd.

*N. phyllodiis* basi angustatis, inferioribus dentatis superioribus integerrimis, ascidiis radicalibus tubulosis basi ventricosis, caulinis subinfundibuliformibus, inflorescentiâ pilosâ, pedunculis uni- vel bifloris, ovariis stipitatis. Khs.

Willdenow, *Species plantarum*, IV. p. 874; Sprengel, *Systema vegetabilium*, III. p. 84; Brongniart, *Annales des Sciences naturelles*, I. p. 40; W. Jack in *Hooker Companion to the Botanical magazine*, I. p. 271; *Phyllamphora mirabilis* Loureiro, *Flora Cochinchinensis* (1790. 4°.), p. 606; *Cantharifera* Rumphius, *Herbarium Amboinense*, V. p. 121. Tab. 59. f. 2.

Somwijlen bezit deze soort eenen bijna ronden, knolvormigen, somwijlen eenen meer rolronden, bruin gekleurden wortel, waaruit kleinere, met eene menigte haarvormige vezels bezette worteltjes voortspruiten. Hare jongere stengen zijn geheel door de bladseheden der afgestorvene of der nog levende bladen bedekt, en volgen met hare bladen dezelfde wijze van ontwikkeling, die wij reeds bij de andere soorten opmerkten. Aan de benedenste of eerste bladen der spruiten, heeft de beker het grootste aandeel; op die der later ontsprotenen is het phyllodium grooter. Dit is langwerpig, naar den voet versmald, de steng omvattend, naar den top toegespitst, aan den rand seherp getand, van boven geheel en van onderen bijna glad, de breedte tot de lengte als 1 tot 3, vliezig, 3 of 4 kleinere, met den rand parallel loopende nerven aan weërszijden van de middelnerf: door dien nervenloop verschilt deze soort van de *N. Bosehiana*, die in een breeder phyllodium minder hoofdnerven en eene grootere ruimte tussehen de middelnerf en de zijnerven bezit. De bekersteel is eerst behaard, vervolgens glad en heeft eene geringe lengte. De bekers zijn buisvormig, met eene verwijding boven den voet; bij hunne eerste ontwikkeling dicht, bij meerdere ontwikkeling verspreid behaard, en bezitten de reeds bij andere vermelde, getande kammen. Hunne opening is eirkelrond en door eenen rolronden, geribden rand omgeven. Het deksel is insgelijks eirkelrond, somwijlen door eenen breeden voet met het bekergedeelte verbonden, langs den rand, zoowel als op dit verbreedde deel van aanhechting, met eenige draadvormige aanhangsels voorzien; bij een deksel van 5,5 duim breedte en 5 duim lengte, bedroeg het aanhechtingspunt 2,5 streep, en gingen de nerven onverbonden uit den beker in het deksel over. De bovenhelft van de binnenzijde dezer bekers is dof, somwijlen geel-groen, met een' purperen zoom, soms geheel purperkleurig; de benedenhelft blinkend bruin, rijk aan half eirkelvormige klieren of groefjes, waaraan de bovenranden zeer duidelijk zichtbaar zijn. Het deksel heeft slechts weinige klieren. De zaamgedrukte knoppen volgen de reeds opgegevene ontwikkelingswijze en zijn aan de randen en uiteinden grijs-bruin behaard. Het bladerlooze gedeelte van de stengen der oudere gewassen is bijna rolrond, het gebladerde gedeelte stomp-vierhoekig, naar het einde soms zamengedrukt. Het versmalde gedeelte van het phyllodium omvat de halve steng, is halfrolrond, van boven eenigzins gevoerd, met een smal bladerig randje; het breede deel van hetzelfde is langwerpig-ovaal,



naar de beide einden versmallend en somwijlen aan weërszijden van den steel ongelijk afloopende; zelden stomp; met eenen seherp getanden rand; van boven licht groen, van onderen iets donkerder gekleurd en op de beide vlakten bijna geheel onbehaard. De bekersteel verkrijgt somtijds eene aanzienlijke lengte. Indien hij zonder beker is, verlengt hij zich in de rigting van het blad, en heeft aan het eenigzins verdikte einde twee of meerdere krullen. Draagt hij eenen beker, alsdan volgt hij de rigting van het blad tot op ongeveer het midden zijner lengte, waar hij eenige kronkelingen heeft, vervolgens loodregt afdaalt en aan het einde met eene korte bogt in den beker overgaat. De bekeraars dezer soort hebben eenige gelijkheid met die der *N. gymnamphora*: zij nemen van den voet af naar boven, tot op ongeveer het midden der lengte toe, en verminderen naar de opening in omtrek: het eerste gedeelte heeft eenen omtrek van 8, en het tweede van 7 duimen. Hunne opening is van eenen vlakken, breedten, geribden rand omgeven. De ontwikkelde kammen der bekeraars van de jongere planten, worden hier slechts door uitstekende randen, en somtijds alleen door uitstekende ribben vervangen. Het verloop der nerven verschilt weinig van hetgene dienaangaande reeds bij andere soorten is opgegeven. Van buiten zijn de bekeraars licht groen, somwijlen met purperen vlekken: de bovenste helft van de binnenvlakte is purperkleurig en bedauwd; de onderste glanzend bruin en met klieren bedekt. Het aanhangsel beneden het deksel is van eene geringe grootte, in slippen verdeeld, of tot een behaard, lijnvormig plaatje ontwikkeld. Het deksel is ovaal, aan den top stomp, naar den voet versmald, van buiten bijna glad of met eene zeer fijne beharing, van binnen met eene menigte ronde en op de aderen met ovale groefjes bedekt. Bij een middelmatig blad nam ik de volgende grootte der deelen waar: de steel van het phyllodium 7 duim; het phyllodium 22 d. lang en 6,5 d. breed; de beker 20 d. lang en 9 d. omvang; het deksel 4,5 d. lang en 3 d. breed. De in de nabijheid der bloemen geplaatste bladen bestaan alleen uit het phyllodium, hetwelk door den vorm weinig van dat der stengbladen afwijkt. Over het algemeen is het echter gaaf van rand; bij enkelen verdwijnt de middelnerf beneden den top, en er ontstaat dan een, aan dit einde geheel stomp phyllodium. De bloemtrossen zijn in den jeugdigen staat tussehen de scheedevormig zaamgebogene phyllodia besloten, komen of uit, of door de verlenging der steng, boven de oksels der bladen te voorschijn, en worden somwijlen 5 palmen lang. Ongeveer de benedenste helft van den steel is zonder bloemen. Hij is in dit naakte gedeelte aan den voet stomp-vierkant, hooger rolrond, bijna glad, en wordt in het bloemdragende deel seherp-kantig en grijs behaard. De talrijke bloemsteeltjes zijn aan den voet een weinig zaamgedrukt, en boven dezen rolrond, twee- of éénbloemig. De mannelijke bloemknoppen zijn bijna kogelrond, grijs behaard, en hebben de bloembekleedseldeelen in dezelfde ligging, als reeds bij andere soorten is opgegeven. Deze vier deelen zijn van eene ongelijke grootte, bijna cirkelrond, aan den top eenigzins puntig, van binnen glad, voorzien van eene menigte kleine, langwerpige groefjes, van buiten met eene verspreide en aan den rand met eene digte, grijze beharing, ongeveer 5 strepen lang en 4,5 breed. De helmdradenkolom is stomp-vierkant, glad en eindigt in eenen bijna kogelronden knop, om welchen zestien, door vergroeiing dikwerf zeer gebogene langwerpige meelknopjes zijn vastgehecht. De vrouwelijke bloeiwijze is, in het algemeen, vrij gelijk aan die der mannelijke; alleen heeft zij de bloemsteeltjes korter. De bloemknopjes zijn grijs behaard en eivormig. De vier bloemdeelen zijn ovaal, stomp of puntig, van buiten en van binnen, even als de mannelijke bloemen, na de opening teruggeslagen, 5 strepen lang en 3 tot 4 strepen breed. Het vruehtbeginsel zit op een klein rolrond steeltje, is stomp-

vierkant, naar den voet en den top eenigzins afgerond, door den vierlobbigen, naar boven eenigzins puntig toeloopenden stempel gekroond, digt licht bruin behaard en vierhokkig. De talrijke eitjes beslaan tegen de wanden dezer hokjes eene langwerpige, driekantige, naar boven in eenen spitsen hoek uitlopende, tot over het midden gaande oppervlakte; zij zijn bij hunne eerste verschijning rond, en nemen bij de ontwikkeling eenen meer langwerpigen vorm aan. De kapsels zijn kort gesteeld, langwerpig, in het midden verdikt, naar het einde in omvang afnemende, stomp-vierkantig, blinkend bruin met kleine groefjes, houtig, ongeveer 30 streep lang en 5 streep breed, in vier kleppen openspringende. De kleppen dragen aan den top een driehoekig gedeelte van den stempel, en in het midden het tegen over haar gelegen deel van den seheidswand der hokjes; van binnen zijn zij blinkend bruin. De zaden zijn zeer talrijk, in het midden rolrond en naar de beide einden elsvormig uitlopende, aan de punt van aanhechting eenigzins stomp en ongeveer 15 strepen lang. Het buitenzaadvlies omgeeft in het middelgedeelte een los eelweefsel. De raphé loopt van den voet van het zaad tegen dit buitenvlies, en seheidt zich even boven de kern van hetzelfde af, om in het binnenste zaadvlies over te gaan. De kern is rolrond, aan de beide einden stomp, en bevat de, van de vorige soorten door vorm en evenredigheid der deelen weinig vershillende kiem in een wit, niet zeer ontwikkeld kiemwit.

---

De *Nepenthes Phyllamphora* onderscheidt zich van de overige, mij bekende soorten, door den getanden rand van de phyllodia der jongere stengen, en wijkt van de haar verwante *N. Gymnamphora* af, door den meer verlengden vorm van de bekens der jongere bladen, door het hier langwerpig, bij de verwante soort meer eirkelrond deksel, en door de grijze, bij *N. Gymnamphora* bruine beharing.

Zij werd het eerst door Rumphius (\*), onder den naam *Cantharifera*, naar door hem in de Moluksche eilanden gevondene voorwerpen, uitvoerig beschreven, kennelijk afgebeeld, en tevens als op Sumatra's oostkust en op Malaea groeiende, vermeld. Later is door Loureiro (†), onder den naam *Phyllamphora mirabilis*, een in Coehinchina voorkomend gewas beschreven, hetwelk, volgens hem, op geringe afwijkingen (§) na, met de door Rumphius vermelde en afgebeelde plant, overeenstemde. Vervolgens is deze soort in vershillende streken van den Arehipel opgemerkt en verzameld: zoo komt zij, blijkens de door mij in het Herbarium van den Hoogleraar Reinwardt geziene jonge bladen, op Tidore voor, en groeit zij, naar de door Zippelius gevondene jonge spruiten te oordeelen, op Nieuw-Guinea's zuidwestkust, en is zij op Amboina geen zeldzaam gewas. Zij werd mij door den Heer Diard, als op het eiland Banea voorkomende, opgegeven, en door eene vergelijking van de aldaar verzamelde en in het Rijks-Herbarium aanwezige voorwerpen, nader bekend. W. Jaek (‡) gaf ons kennis van haar aanwezigheid in de nabijheid van Benkoelen, en dat zij ook in de omstreken van Padang, op Sumatra's westkust, als ook op Borneo's zuid-oostkust voorkomt, is door onze latere togten in deze oorden bewezen.

(\*) Herbarium Amboinense, V. p. 123.

(†) Loureiro, *Flora Cochinchinensis*, ed. orig. 4<sup>o</sup>. p. 606.

(§) Deze afwijkingen schijnen mij toe, een gevolg van de minder gunstige standplaats dezer planten te kunnen zijn.

(‡) Hooker, *Companion to the Botanical magazine*, I. p. 271, etc.

Hoewel nu de, op deze verschillende plaatsen verzamelde voorwerpen eene opmerkelijke gelijkheid bezitten, kan men toch eenig verschil tusschen dezelve aantoonen. De op Amboina en Banca bijeengebrachte voorwerpen hebben eene tamelijk gelijke ontwikkeling, en wijken alleen in de beharing af; bij de op Sumatra verzamelde, wordt eene grootere uitbreiding en eene soms zeer digte beharing der jongere deelen waargenomen; de talrijke, op verschillende plaatsen van Borneo vereenigde voorwerpen zijn door eene minder uitgegrocide bloeiwijze en zeer geringe beharing, van die der genoemde eilanden onderscheiden. Deze geringe afwijkingen zijn eenigermate uit de verschillende standplaatsen te verklaren. Zoo groeijen deze planten op Banca en Amboina, even als, volgens de opgave van Loureiro, in Cochinchina, in eenen kiezelaardigen bodem, die voor hare ontwikkeling niet gunstig is; daarentegen wassen zij op Sumatra in de omstreken van Benkoelen en Padang, in eenen vochtigen, meer leemaardigen grond, en in de nabijheid van Doekoe, waar zij zeer welig groeijen, in een moerassig, alluviaal terrein. Op Borneo was deze plant hier en daar langs de oevers van de Doeson-rivier verspreid, en in de omstreken van Poeloe-Lampeï niet zeldzaam. Op de eerste groeiplaats strekte zij ten sieraad aan de, uit eene jongere tertiaire-formatie bestaande hooge oevers, terwijl, op de tweede, kleine heuvels en meer vlakke moerassige plaatsen met haar prijkten. In deze oorden, waar kleine heuvels de bewijzen van vulkanische ophelling, en de vlakke die van eene neptunische werking opleveren; waar zich de vermeerdering des bodems, door de afspoelende werking des waters en de dagelijks voortgaande humusvorming in de moerassen voortzet, groeide de *Nepenthes Phyllamphora*, in gezelschap van *Polygonum amoenum* en *P. pulchrum*, *Hydrocera angustifolia*, *Enhydra longifolia* (*Tetraotis paludosa*, Rwdt.) en andere, moerassige oorden minnende gewassen, met eene geringe stengontwikkeling; terwijl zij tusschen de grijze *Melaleuca leucadendron*, den fraai groen bebladerden en rozenkleurige bloemen dragenden *Ploiarium elegans* geplaatst, eene zoo aanzienlijke verlenging der steng erlangde, dat hare uiteinden zich in de kroonen dezer boomen verborgen.

De *Nepenthes Phyllamphora* en de andere soorten van dit geslacht heeten bij de strand-Maleijers *Daoen Gindi*, hetwelk, de overeenkomst dezer bladen met hunne waterkruiken uitdrukkende, door kruik- of kannetjesbladen vertaald zou kunnen worden. Bij andere Maleijers, vermoedelijk van Bintang en Singapoera, worden zij, volgens W. Jack, *Priokra* en *Kachong-broe* genoemd: het eerste is waarschijnlijk eene eenigzins veranderde uitspraak van *Prioekh-kar*, welk *Prioekh* een' pot om rijst te koken aanduidt, terwijl het woord *Kar*, in de Maleische schriften voorkomende, aap beteekent, en bij gevolg *Priokra* door apenrijstpot vertaald zou kunnen worden. De Maleijers van het Menangkabausche gedeelte van Sumatra noemen haar *Taboeng-broe*, hetgeen, daar zij het woord *Taboeng* voor een vat en vooral voor de holle leden van het bamboes, welk ter bewaring van vocht geschikt is, gebruiken, en met dat van *Broe* of *Baroe*, den in de benedenlanden niet zeldzamen *Innuus nemestrinus* bestempelen, apen-beker beteekent.

Omtrent den oorsprong van deze verschillende, op eene zelfde zaak doelende benamingen, navorschende, is mij nu hetzelfde medegedeeld als aan Rumphius anderhalve eeuw vroeger, dat namelijk de apen eene bijzondere neiging zouden hebben om het vocht te drinken, hetwelk in deze bekers vervat is. Hoewel ik nu zulks nimmer van, in het wild loopende apen heb waargenomen, kan ik echter

de waarheid dezer mededeeling, ten opzichte van de meer tamme, in gevangenschap levende apen, bevestigen. Volgens Rumphius heet de Nepenthes aan Sumatra's oostkust *Gada-gada* (\*), hetwelk als Maleiseh woord, windwijzer, en als Hindoeseh, knods beteekent. Dezelfde sehrijver verhaalt ons, dat zij op Leytimor *Nitu-aläa*, duivels-potjes, waarvan *Gindi-Setang* eene Maleisehe vertaling is, genoemd wordt, en dat haar Ambonsehe naam *Lobe-leyposso* of *Aytiba*, shepperskruid wil zeggen. Op Sumatra en Borneo was deze soort bij de inlanders alleen door den zonderlingen vorm der bladen bekend. In de Molukken boezemde zij den inboorlingen niet alleen hierdoor, maar ook door hare geneeskraehten, belang in. Zij sehreven aan dezelve ook het vermogen om regen voort te brengen en andere gewigtige eigenschappen toe (†).

#### V. NEPENTHES GYMNAMPHORA. RWDT.

*N. phyllodiis subsessilibus, ascidiis radicalibus ovoideis, caulinis tubulosis basi ventricosis, inflorescentiä fusco-sericeä, pedunculis uni- vel bifloris.*

*Nepenthes melamphora*, Rwdt., Catalog. Hort. Bogorensis; *N. Gymnamphora*, Rwdt. et Necs, *Annales des Sciences naturelles*, III. p. 365.

De wortels dezer soort nemen zelden hunnen oorsprong uit eenen houtigen knol, maar hebben veeltijds van het begin af aan eene gelijke dikte, zijn onregelmatig rolrond, met eene menigte knoestjes, waaruit, met kleine zwarte vezeltjes voorziene worteltjes ontspruiten, zwart gekleurd, zeer houtig, in den wortelstok overgaande. Uit dezen wortelstok ontwikkelen zich veelal verseheidene stengen, van welke gewoonlijk slechts ééne tot vruehtdragende plant uitgroeit. Bij de gemelde minder ontwikkelde planten, is de steng geheel door de dicht bij elkander geplaatste bladseheeden omgeven. Deze omvatten, bij haar ontstaan, ongeveer twee derden van de steng, blijven, na de verdrooging en afvalling van het overige meer vrije gedeelte, op de steng terug, en vormen dan rondom dezelve eene losse, eenigzins kurkaardige bekleeding, welke later van beneden af aan loslaat. De knoppen eindigen in een licht bruin behaard, aan het einde eenigzins verdikt, of in een omgebogen steeltje, dat een driekant, puntig knodsje draagt, en zijn meestal rolrond of eenigzins zaamgedrukt, met bruin behaarde kanten. Bij verdere ontwikkeling vertoonen zich de jonge phyllodia met eene bijna gladde bovenzijde en eene fijn behaarde ondervlakte, met door lange bruine haren bekleede middelnerfen en omzoomde randen. De geheel ontwikkelde phyllodia zijn langwerpig-ovaal, aan de punt dikwerf ongelijk toegespitst, of aan weërszijden van den steel met kleine ronde oortjes voorzien; zij omvatten met den voet ongeveer twee derden van de steng en hebben eene uitstekende middelnerf; aan zeer jonge planten zijn zij vliezig en aan oudere meer lederachtig. De bekersteel, het vervolg van de middelnerf, is driekant met eene vlakke bovenzijde en de beide onderste gevoerd, bruin behaard; soms meer dan eene palm lang, zonder kronkels; dikwerf aan het begin bij de bladuitbreiding vertikaal naar beneden gerigt en aan het uiteinde verdikt. In deze verdikking begint de holte van den beker. De beker is, in den jeugdigen staat,

(\*) Welligt *Gindi-gindi*, het meervoud van waterkruid.

(†) Zie Rumphius op genoemde plaats.

digte bruin behaard, onregelmatig omgekeerd kegelvormig, met eene seheve bovenzijde, waarvan de langste zijde in een puntje eindigt. Ouder, is hij rolrond, naar boven een weinig breeder, en aan den top scheef afgeknot met de kortste zijde naar de spil gerigt. De ontwikkelde bekens zijn onregelmatig eirond, met de opening, even beneden den top, naar de binnenzijde in eene uitgeronde bogt, ongeveer 7 duimen lang en van 3,5 duim middellijns, bruin behaard, met twee bladaardige, dikwerf zeer ontwikkelde kammen met in lange priemvormige tanden uitgesnedene randen. De ongeveer een' boog van 80° beslaande, ovale opening der bekens, is door een' eenigzins brozen, geribden rand omgeven, van welken de buitenste omgeslagen zijde gaafrandig, en de binnenste scherp getand is. De nerven verschillen in haren loop niet van die der *N. ampullaria*; zij gaan naar het hoogste gedeelte van den beker, en ontstaan of uit den voet of uit de kamnerven. De nervuur tussehen de beide kammen is soms netvormig, en kan als de vertakking van eene, verschillend gebogene middelnerf beschouwd worden. De binnenvlakte van den beker is in hare lengte door twee kleuren verdeeld, die door eene tamelijk regelmatig loopende lijn gescheiden worden. In het langste gedeelte van den beker is deze scheidingslijn 3 duim, en in het kortste ongeveer één' duim van den rand verwijderd. Het boven deze lijn gelegen gedeelte is dof, als met eenen purperen dauw bedekt, en het naar den voet gelegene, blinkend licht bruin, met eene menigte langwerpige, uitstekende, zwart-bruine kliertjes. Deze zijn voor een derde door eenen uitstekenden rand bedekt, en nemen naar den voet in getal af, maar in grootte toe. De steng der meer ontwikkelde planten is rolrond, glad, bij eene aanzienlijke verlenging gedeeltelijk bladerloos, met eenige verspreide, in groepen vereenigde en door korte stelen gedragene bladen versierd. De phyllodia dezer bladen zijn langwerpig, naar den voet versmald en aldaar de halve steng omvattende en met een smal, langs de zijden uitstekend randje, naar den top toegespitst, van boven glad, van onderen met eene verspreide, bruine, stervormige en aan de randen met eene digte beharing. Zij hebben de uit den voet en de middelnerf ontstaande nerven, die zich naar den top weder vereenigen, door eene menigte kleine aderen verbonden, en verkrijgen hierdoor in de vliezige bladvlakte een onregelmatig mazit net. De stengbekens zijn meer verlengd dan de beschrevene wortelbekens, en in dezelve staat de lengte tot de breedte als 7 tot 2,5; op dezelve is een klein elsvormig aanhangsel beneden het deksel. Dit deksel is ovaal, van boven stomp, aan den voet een weinig uitgesneden, van buiten zeer fijn behaard, van binnen glad, en even boven den voet met eenige weinige, langwerpige kliertjes, vliezig, 2,5 duim breed, 1,5 duim lang, met eene menigte omgebogene, zelden tot den omtrek doorloopende aderen. Bij de bloeiende gewassen is de steng aan haar uiteinde somwijlen stomp-vierkant, glad, en in hare pas ontwikkelde deelen bruin behaard; hunne knoppen zijn alleen door eene meerdere verlenging van die der jongere gewassen onderscheiden; hunne phyllodia wijken, door eene meer lederachtige zelfstandigheid, van de op de steng in groepen vereenigde af, en eindigen in naar de punt behaarde, vervolgens glad wordende, bekerdragende of klaviervormende stelen; de laatste loopen naar het einde verdikt uit en krullen zich daar binnenwaarts; de bekerdragende hebben deze krullen meest in het midden van de, somwijlen tot 2,5 palmen uitgroeide lengte, en buigen zich dan naar beneden om in de bekens over te gaan. Deze zijn van eenen langwerpigen trechtervorm, 8,5 duimen lang, ongeveer 6 duim in omvang, met eene seherpe bogt, aan den voet minder behaard dan de bekens der jongere stengen. Zij bezitten eene met deze overeenkomende nervuur, en eenen even zoo gevormden rand om de ovale opening, maar de kammen zijn slechts als een kleine rand aan dezelve aanwezig.

Het aanhangsel beneden het deksel is soms in tweeën gespleten en bijna een duim lang. Het deksel is ovaal, met eenen afgeronden top, eenen hartvormig ingesneden voet, van buiten zeer fijn behaard, van binnen met talrijke, vooral in het midden zeer dicht bij elkander geplaatste klieren, welke somwijlen 0,3 streep middellijn hebben, bedekt. De binnenvlakte van eenen 15 duim langen beker, had de scheidingslijn ongeveer 8 duim van den voet verwijderd, en de blinkende kliervlakte aldaar, door eenen met kleine stipjes voorzienen rand, van het dof purperkleurig gedeelte gescheiden. De bloeiwijze der mannelijke en vrouwelijke gewassen is vrij overeenstemmende, en bestaat uit in de oksels geplaatste, lang gesteelde bloemtrossen. Haar algemeene bloemsteel is in het naakte gedeelte zaamgedrukt, met ronde kanten, en in het bloemdragend, dat soms twee tot twee en eene halve palm lengte heeft, seherp vierkant en eenigzins behaard. De uit denzelfden ontstaande bloemsteeltjes hebben eenen verbreedten, zaamgedrukten voet, zijn hooger meer rolrond, behaard en in tweeën verdeeld. De benedenste dragen somwijlen langwerpige, toegespitste sehutblaadjes; op de hoogere vertoonen deze zich alleen als kleine puntjes, en op de meer naar den top der bloeiwijze geplaatste, zijn ook deze sporen niet meer voorhanden. Op de bloeiwijze der vrouwelijke bloemen zijn echter alleen aan den voet twee- en hooger éénbloemige steeltjes. De laatsten zijn tevens van het kleine, elsvormig eindigende sehutblaadje voorzien, hetwelk aan de tweebloemige veelal ontbreekt. De mannelijke bloemen hebben bijna kogelronde knoppen, waarin de vier paarsgewijze, tegen over elkander geplaatste deelen over elkander liggen, die welligt, ten gevolge van de ontwikkeling der stuifdraden-kolom, worden geopend. Deze bloembekleedsel-deelen zijn ovaal, stomp, langs den rand dicht, bruin, van buiten verspreid behaard, van binnen met zeer kleine, alleen bij vergrooting zichtbare groefjes, vleezig, ongelijk in grootte, de buitenste iets breeder dan de binnenste, welke 4 strepen lengte en 3 strepen breedte hebben. De helmraden-kolom is vierkantig, met de eenigzins gevoorde vlakke zijden tegen over de bloemdeelen, aan den voet een weinig dikker en eenigzins behaard. De hierop geplaatste ronde, sehijfvormige knop wordt geheel van zestien langwerpige, door vergroeiing ongelijke en vershillend gebogene meelknopjes bedekt. De vrouwelijke bloemen hebben de knopjes eivormig en de bloemdeelen ovaal, min of meer puntig, aan den rand dicht bruin en van buiten zwakker behaard, van binnen glad, 4 strepen lang en 2 strepen breed, en na de opening teruggeslagen. Het vruchtbeginsel is stomp-vierkantig, met de kanten over de bloemdeelen geplaatst, aan den voet rond, naar den top een weinig verdund, door den platgedrukten en met vier insnijdingen voorzienen stempel gekroond, en glanzend kastanje-bruin behaard. Het is in vier hokken afgedeeld, en heeft eene menigte eitjes, van den voet tot op ongeveer het midden tegen de tussebenwanden geplaatst. De kapsels zijn langwerpig, van den voet naar het midden in dikte toenemende en vervolgens weder naar den top in omvang verminderende, stomp-vierkantig, met gevoorde zijden, houtig, blinkend bruin, zwak behaard, ongeveer 12 strepen lang en 4 breed: zij springen in vier, van binnen dof bruin gekleurde kleppen open. Ieder dezer kleppen draagt een gedeelte van den stempel, en langs het midden, in een vliezig plaatje, het over dezelve geplaatste gedeelte van het tussehenschot; op dit gedeelte zijn de talrijke, met het vrije einde naar boven gerigte, eenigzins zaamgedrukte, in het midden verdikte, naar de uiteinden elsvormig toeloopende, ongeveer 5 strepen lange zaadjes gehecht. Deze zaadjes verschillen, door hun buitenvlies, merenchymatisch celweefsel, binnenvlies en kiem, bijna niet van die der *N. ampullaria*.

Deze soort werd in 1817, door den Hoogleraar Reinwardt, op Java gevonden, en in den, door den Hoogleraar Blume uitgegeven Catalogus van den Kruidtuin van Buitenzorg, als *N. melamphora* bekend gemaakt. Deze naam, die met het donker purperkleurige van de bekeraars in verband stond, is later, bij de uitvoerige beschrijving, welke Nees van Esenbeck van deze plant gaf, in dien van *N. gymnamphora* veranderd. Hierdoor ontstond een naam, die bij alle soorten op de bekeraars der steng, maar vermoedelijk bij geene op die der wortelbladen toepasselijk is. Hij zoude dus door den eersten vervangen moeten worden, zoo wij de namen chronologisch beschouwen en de beteekenis raadplegen wilden. Daar beiden echter aan den Hoogleraar Reinwardt toegeschreven worden en de laatste naam, op de afbeelding en in de beschrijving van Nees, is aangenomen, doen wij geen afbreuk aan de eer der vinding, en vermijden wij alle verwarring, wanneer wij den door Nees algemeen bekend geworden naam behouden. Het gevoelen van Nees, dat deze soort de *Nepenthes cristata* van den Heer Brongniart zou wezen, komt mij onwaarschijnlijk voor, omdat de *N. gymnamphora* tot dusverre alleen op Java gevonden is, terwijl de *N. cristata* op Madagaskar en de Philippijnen zoude voorkomen. Deze standplaatsen doen mij vermoeden, dat *N. cristata* op wortelbladen van de in deze oorden voorkomende soorten berusten kan.

Door de Heeren Reinwardt, Blume, Kuhl, van Hasselt en ook door ons, is deze soort in de bosschen der meeste gebergten van het westelijk deel van Java verzameld, en volgens eene mededeeling van den Heer Spanoghe, zoude zij ook in het gebergte van het oostelijker gelegen Pakalongan voorkomen. In de onderscheidene, door ons bezochte streken, begon deze plant op eene hoogte van 1000 tot 1200 ellen, en breidde zij zich tot op eene hoogte van 2000 ellen uit. Op deze plaatsen groeide zij met eene, door den aard der gronden gewijzigde ontwikkeling. Tegen beschaduwde rotsige wanden geplaatst, bleef zij klein, doch in eenen vruchtbaren bodem geworteld, groeide zij tot eene lengte van 3 tot 4 ellen uit. De, in gunstige streken waargenomene gewassen, hadden aan den voet der steng, op den bodem, talrijke donker purperkleurige bekervereenigingen, en langs dezelve hingen lichter gekleurde, trechtersvormige bekeraars.

Bij de Maleijers wordt deze plant *Daoen-gindi*, blad-kannetje genaamd, terwijl haar door de Sundaanen de naam van *Pakoe-Sorok-Radja*, hetgeen koninklijke bekervaren beteekent, gegeven wordt.

## VI. NEPENTHES RAFFLESIANA. JACK.

*N. phyllodiis* longe petiolatis, ascidiis inferioribus globoso-ventricosis, caulinis infundibuliformibus, inflorescentiâ cinereo-fusco-tomentosâ, pedunculis uni- vel bifloris.

W. Jack in Hooker, Companion to the Botanical magazine, I. p. 271.

De steng en groeivijze dezer soort zijn gelijk aan die der *N. phyllamphora*. De knoppen, de randen der pas ontwikkelde bladen, de jonge stelen en bekeraars zijn alle grijs behaard. De phyllodia der jonge stengen hebben eene aanzienlijke lengte. Hun steel omvat den halven omtrek van de steng en is met

eenen smallen bladrand bezoomd. Hunne vlakke uitbreiding is langwerpig, naar de beide einden zeer toegespitst, gaafrandig, aan weërszijden bijna glad, en heeft, behalve de zeer ontwikkelde middelnerf, drie of vier met den rand evenwijdig loopende, van den voet naar den top gaande zijnerven. De bekersteel is van onderen half rolrond, van boven gevoerd, glad, somwijlen vijf palmen lang, buigt zich even boven den oorsprong naar beneden, en daalt dan loodregt tot aan zijne vereeniging of uitlooping in den beker. Deze heeft eenen onregelmatig ronden vorm, van welken de binnenzijde vlak en de buitenzijde buikig is. De eerstgemelde vlakke wordt door twee zeer ontwikkelde bladvormige, diep getande of ingesnedene kammen van het ronde gedeelte gescheiden. De opening van deze bekere is ovaal, eenigzins gebogen en door eenen zeer breeden rand bepaald. Van buiten zijn deze bekere licht groen, naar den voet somwijlen met purperen vlekken; van binnen hebben zij twee derden van het benedenste gedeelte blinkend bruin, met talrijke kliergroefjes, en het bovenste gedeelte dof purperkleurig. Het aanhangsel beneden het deksel is ongedeeld, somwijlen aan het einde gespleten, lijnvormig en glad. Het deksel is ovaal, aan den top stomp, aan den voet een weinig hartvormig ingesnedene, met eenen min of meer behaarden rand, van buiten fijn behaard, van binnen glad met cirkelronde of langwerpige kliertjes, dikwerf rijkelijk met purperen vlekjes voorzien. Een tamelijk ontwikkeld blad had de deelen van de volgende grootte: steel van het phyllodium 7"; phyllodium 30" lang en 5" breed; bekersteel 50"; beker 10" lang, aan den voet met 15" en bij den mond met 10" omtrek; het deksel 6" lang en 4" breed. De vorm van de phyllodia der oudere en reeds bloemdragende stengen verschilt alleen door eene meerdere breedte van dien der jongere stengen: maar die der bekere wijkt geheel van dien der jongere bladen af. Deze hebben eenen langwerpigen trechtervorm, bij eene lengte van 22" eenen omtrek van 12", en op de plaats van de vermelde bladaardige kammen, uitstekende randen, en de geheele binnenvlakte glanzend en met kleine groefjes bedekt. Hun deksel verschilt alleen door de meer cirkelronde gedaante; voor het overige heeft het, even als de omzoomende, geribde breede rand van de opening, al de kenmerken van die der jongeren: terwijl bij den bekersteel alleen eene nog meerdere verlenging en eenige kronkelingen bij de nederbuiging worden waargenomen. De uit de oksels, of door abortie eindelijk voortkomende bloeiwijze, is trosvormig, min of meer grijs of grijs-bruin behaard, en heeft den algemeen bloemsteel aan het benedenste gedeelte zaamgedrukt, stomp-kantig, is aan het bloemdragende somwijlen vier palmen lang, gedeeltelijk zaamgedrukt, scherp-kantig, met eene menigte één-, zelden tweebloemige steeltjes. De vorm dezer is gelijk aan dien der *N. phyllamphora* en anderen. De mannelijke bloemen hebben de deelen ovaal-rond, stomp, van buiten dicht grijs behaard en van binnen glad met kleine groefjes, 7" lang en 5" breed: de stuifdraden-kolom is glad, stomp-vierkantig en in eenen bijna kogelronden knop, om welken veertien tot zestien onregelmatig gebogene helmknopjes gehecht zijn, eindigende. De bloeiwijze der vrouwelijke planten is gelijk aan die der mannelijke. De bloemdeelen verschillen alleen door eene meerdere lengte, en hebben, bij eene meer ovale gedaante, 6" lengte en 4,5" breedte. Het vruchtbeginsel wordt door een kort, rolrond steeltje gedragen, en is langwerpig, naar den voet en top in omvang afnemende, stomp-vierkantig, licht bruin behaard, en door eenen vierhoekigen, platgedrukten, van vier voren voorzien stempel gekroond. Het is in vier hokjes afgedeeld. De wanden zijn tot op ongeveer de helft hunner lengte met citjes bedekt. Rijpe vruchten heb ik niet verzameld.



Van de beschrevene soorten wijkt de *N. Rafflesiana*, door de aanzienlijke verlenging van de bladdeelen, vooral van den steel der phyllodia, af, en van verscheidene anderen verschilt zij nog daarenboven door den ronden vorm der bekera van de jonge planten, of door den trechtvorm van de stengbekers. Door den eersten heeft zij eenige overeenkomst met de *N. gymnamphora*, en door den laatsten zoude zij met *N. Boschiana* kunnen vergeleken worden. Daarenboven heeft deze plant eene zoo groote verwantsehap met een door den Hoogleraar Reinwardt, in 1821 op den berg Rumegan, ter noord-oostkuste van Celebes ontdekt en door hem *Nepenthes maxima* genaamd (\*) gewas, dat ik er toe overhel, om dezen op Celebes gevondennen vorm als eene verscheidenheid van de *N. Rafflesiana* te beschouwen. Evenwel waag ik het niet, omtrent deze gelijkheid eene zekere uitspraak te doen, omdat mij de bladen van de jongere stengen der *N. maxima* en de rijpe vruchten van de *N. Rafflesiana* ontbreken. De oudere en bloeiende takken hebben overeenkomst in de stengen, knoppen, phyllodia, in den vorm en in de inwendige oppervlakte van de bekera, in de bloeiwijze en in de bloemen, maar daarentegen eenig verschil in de gedaante van de deksels: deze zijn bij *N. maxima* ten naastebij eirond, naar den top smaller, en aan den voet hartvormig uitgesneden, doch bij *N. Rafflesiana* meer eirkelrond, naar den top zeer weinig in breedte afnemende en aan den voet met eene hartvormige insnede.

De *N. Rafflesiana* werd, blijkens eenen brief van W. Jack, gedagteekend Singapoera 20 junij 1820 (+), op dit eiland ontdekt, later door dezen ijverigen natuuronderzoeker ook op Bintang (§) gevonden, en is door ons op Sumatra's westkust verzameld. Zij groeide daar, even als op Singapoera, in gezelschap van *N. ampullaria*, en versierde de moerassige bosschen der omstreken van Indrapoera.

Omtrent de plaats, waar en hoe zij voorkomt, heb ik, gedurende ons verblijf aldaar in 1835, het volgende opgeteekend: »De rivieren Indrapoera en Salaut, op welke wij dezer dagen talrijke togtjes maakten, begrenzen ten noorden en ten zuid-westen de streek, waar de, in Sumatra's geschiedenis vroeger zoo beroemde en nu zoo onbeduidende, hoofdplaats van het rijk van Indrapoera gelegen is. Beiden hebben zij haren oorsprong in de groote bergketen, die Sumatra in eene westelijke en oostelijke helft verdeelt. Van daar stroomt de Indrapoera met eenen bijna regten loop, de Salaut in eene meer kronkelende rigting naar het vereenigingspunt. De eerste schijnt nog haren vroegeren loop behouden te hebben; de Salaut daarentegen heeft, door de verstopping van de meer zuidelijk gelegene monding, eene nieuwe rigting genomen, en stroomt, door de haar gelegde hinderpalen wederhouden, aan het einde van haren dalweg meer noordelijk, tussehen de nieuw gevormde en altijd vermeerderende alluviaal-formatie door. Terwijl de Indrapoera haren dalweg, door den snellen stroom, dagelijks verbreedt, versmalt de Salaut den haren, en vermeedert zij hare oevers met kleine verhoogingen, ten koste van de hooger gelegene oorden. Door deze kleine wallen wordt een lager terrein afgesloten, in hetwelk de beide *Nepenthes*-soorten, in gezelschap van *Sapindaceae*, *Malvaceae*, *Myrtaecae*, *Slingergewassen*, *Rottang* en andere palmen en varen groeiden.

(\*) Nees, *Annales des Sciences naturelles*, III.

(+) Hooker, *Companion to the Botanical magazine*, I. p. 131.

(§) Hetzelfde werk, bl. 271.

»De Sapindaceae worden hier vertegenwoordigd door de breed gekroonde, met nederhangend loof voorziene *Irina*, wier jonge bladen door eene purper-roode kleur van het donkere groen der ouderen onderscheiden zijn; de Malvavorm, door de kortstammige, rondkruinige *Paritia similia*, op welke de groote, aan de onderzijde donzige bladen, met de heerlijke goud-gele bloemen afwisselen, en ook door de onregelmatig, piramidaal groeiende *Pterosperma Blumeana*, wier omtrek door fraaije, sneeuw-witte, lelievormige bloemen, of hoekige, nederhangende vruchten versierd zijn. Voor den Mirtenvorm treden op, de *Myrtus obtusissima* en *M. densiflora*, met door een digt, glanzend groen loof gevormde kroonen; de door het gebladerte aan hem verwante, maar door eigenaardige eigenschappen afwijkende *Gluta Runghas*, wier ontwikkelde en ver uitschietende takken een gedeelte der rivier overschaduwden, en de door bladvorm aan deze, en door de aanzienlijke gele bloemen aan den Malvavorm herinnerende, fraaije Capelliaboomen.

»Voor de palmen treffen wij hier heerlijke vormen aan in den Pinang renda (*Cyrtostachys* Bl.), welke aan zijne, in groepen vereenigde, regt opgaande, van boven roodkleurige stammen, op gelijke wijze ontwikkelde en gekleurde bladstelen en een gevederd loof kenbaar is; in den Nibong (*Oncosperma* Bl. of *Areca tegularia* W. J.), welke zich onderscheidt door de gedoornde stengen en een meer hangend en donker groen gekleurd loof. Van de tot deze familie behoorende, maar door de slingerende groeiwijze zoo onderscheidene groep des Rottangs, vonden wij den, door zijne onbedekte bloemen gekenmerkten *Calamus*, ook den *Daemonorops*, die dezelve in scheeden besloten heeft, en enkele, door meer ontwikkeld loof en door onder schubjes geplaatste bloemen gekenschetste *Plectocomia*. Bij deze overschoone gewassen bleven de varen niet achterlijk. Door verscheidenheid van grootte en de verdeeling van het loof, werd het gemis der bloemen bij dezen vergoed. Het waren kortstammige *Gymnosphaera*, met naar boven gerigt loof, of groepsgewijze vereenigde *Diplazia*, met zeer verdeelde bladvormen, of op den grond en tegen de boomstammen groeiende *Aspidia* en *Polypodia*, met in kleine lobjes gesnedene bladen, of tusschen de boomen slingerende *Lygodia*, welke, door een licht groen, eenvoudig gevederd loof, met andere slingerplanten de ruimte tusschen de boomen, door schoone groene wanden opvulden. De slingergewassen hadden zeer in het oogvallende afwisselingen. De *Dissochaeta* en *Marrumia* waren uitstekend door hare talrijke, meestal rozenkleurige, dikwerf rozenvormige bloemen; de *Gynoccephalum* door de grootte en den glans der bladen; de *Cissus* door de trosvormig vereenigde, naar druiven gelijkende, zacht roode vruchten, en de *Nepenthes* door den vorm en de kleur der groepsgewijze op de naakte stengen vereenigde bekens. Deze laatsten ontwikkelden zich hier met eene nimmer door mij geziene pracht. Hare met purper gevlekte, groene, bijna ronde bekens, bedekten de wortelstoelen der palmen; hare stengen, met deze bekens, als zoo vele bonte bloemen versierd, woelden hare ranken door de bekerstelen, welke zich om de takken der hen omringende gewassen slingerden, en in de hoogte ondersteund werden, terwijl hare uiteinden zich in de soms 20 el hooge, talrijke kroonen der Capellia, of in de lagere, onverdeelde kroonen der Renda- en Nibong-palmen verborgen.”

## VII. NEPENTHES AMPULLARIA. W. JACK.

*N. phyllodiis petiolatis integerrimis, ascidiis radicalibus et caulinis ampullaceis, inflorescentiâ paniculatâ fusco-tomentosâ, pedunculis corymbiferis.*

W. Jack in Hooker, Companion to the Botanical magazine, I. p. 271.

De wortel dezer soort is rolrond, houtig, donker bruin, van eene menigte vezelige worteltjes voorzien. Uit denzelfden ontspruiten één, somwijlen verscheidene wortelstokken, welke mede talrijke fijne worteltjes bezitten. Uit deze ontwikkelen zich veelal eene hoofdsteng en enkele kleine stengen. De jonge stengen zijn door de dicht bij elkander geplaatste bladseheeden geheel bedekt; de oudere grootendeels naakt, alleen naar het einde bebladerd. Deze laatste zijn meestal enkelvoudig, zeer zelden met zij-takken voorzien, rolrond, bijna glad of met enkele kleine, verspreide, stervormige haartjes, houtig, donker bruin en zelden dikker dan eene ganzensehaecht. De jongere stengen, en in het algemeen de pas ontwikkelde deelen, hebben, behalve deze stervormige, nog eene spoedig afvallende, priemvormige haarbedekking. De bladen der jonge stengen hebben den beker aanzienlijk, maar het phyllodium weinig ontwikkeld. Dit laatste omvat met den voet bijna den geheelen omvang der steng, is langwerpig, naar den top toegespitst, van boven glad, van onderen dicht met bruine haren bedekt. De bekersteel is stomp-driekantig, met eene vlakke zijde naar boven, bruin behaard. De bekeraars zijn onregelmatig eivormig, met eene kleine vlakke zijde naar de spil gerigt, en met het ronde van dezelve afgekeerd: de eerste is begrensd en van het ronde geseheden door twee bladaardige, onregelmatig ingesnedene en priemvormig getande kammen. Zij hebben op eene licht of donkerder groene hoofdkleur eene menigte purperen vlekken, en bij hunne eerste versehijning eene zeer digte en, bij meerdere uitgroeiing, eene zeer verspreide, bruine beharing. De nerven hebben eene rigting, welke met die der vorige soorten overeenstemt, en de rand der ovale opening is sterk geribd en zoowel naar de buiten- als naar de binnenzijde omgebogen. Hare binnenzijde is glanzend en met kleine cirkelronde kliertjes bedekt. Het deksel der bekeraars is langwerpig-ovaal, aan de beide einden stomp, gaafrandig, van buiten met kleine, stervormige haartjes, van binnen met kleine, ronde of ovale kliertjes, met purperen vlekjes op eene groene hoofdkleur, zeer schoon gaderd; 2" lang en 5" breed. De bladen der op de steng verspreide bladgroepen hebben veel overeenkomst met de reeds beschrevene; echter zijn de phyllodia reeds meer uitgegroeid, en hebben deze eene langwerpige, naar de beide einden versmallende gedaante. De bekersteel en beker verschillen alleen door eene aanzienlijker grootte van de reeds vermelden. Het deksel wijkt in gedaante af, en is omgekeerd eivormig of langwerpig-ovaal. De bladen, aan welke het phyllodium zich, ten koste van de bekeraars, heeft uitgebreid, zijn langwerpig-ovaal, naar den voet versmallend, naar den top toegespitst of versmallend en den bekersteel met een smal bladrandje bezoomende, van boven glad, van onderen, vooral aan den rand en bij de middelnerf, behaard; zij hebben de lengte tot de breedte als 4 tot 1. Behalve de sterk ontwikkelde middelnerf bezitten zij, aan weërszijde van dezelve, twee of drie hoofdnerven, die van den voet naar den top loopen, de rigting van den rand volgen, en door talrijke dwarse aderen, die uit de middelnerf ontstaan, verbonden of gekruist worden. De bij andere bladen bekerdragende steel eindigt hier in een rolrond, toegespitst knodsje. In de knoppen omvatten deze bladen elkander, even als bij de andere soorten, maar zij hebben het eigenaardige, dat zij bij hunne ontrolling en ontwikkeling eene grijze, stervormige beharing op de binnenvlakte vertoonen, die kort na

de uitbreiding afvalt. De naar de einden der steng geplaatste bladen hebben de phyllodia een weinig breeder, naar den top iets stomper, en den bekersteel, benevens den beker, gelijkvormig of alleen door eene meerdere verlenging afwijkende. De in de nabijheid der bloemen geplaatste bladen hebben zelden bekers. Hunne phyllodia wijken niet van de beschrevene af, en de bekerstelen vergroeijen hier in naar het einde verdikte en omgekrulde klawieren. De mannelijke en vrouwelijke bloeitrossen zijn in of boven de oksels der bladen geplaatst en bestaan uit, ééne of twee palmen lange, door bruine haren bekleede, trosvormige pluimen. Derzelve algemeene bloemsteel is aan den voet platgedrukt, en hooger aan het bloemdragend gedeelte kantig en gevoord. De uit denzelven ontspruitende steeltjes zijn aan den voet een weinig zaamgedrukt, en boven dezen bijna rolrond. Zij dragen 3 tot 7 bloemen als een bijsehem geplaatst, en even boven den voet en beneden de verdeling een lijnvormig-langwerpig, stomp of zeer toegespitst, teruggebogen schutblaadje. Op de benedenste is dit blaadje het meeste ontwikkeld; van daar neemt het op de hooger geplaatste bloemsteeltjes in grootte af; op de bovenste is het in het geheel niet aanwezig. De knoppen der mannelijke bloemen hebben den vorm en in hunne deelen de ligging van de vorige soorten. De bloemdeelen zijn, na de opening der bloem, min of meer teruggebogen, van buiten bruin behaard, van binnen glad, met eene menigte kleine groefjes, tamelijk dik; de grootste derzelve zijn bijna eirkelrond, 4''' breed en 5''' lang, en de kleinste ovaal, 3''' breed en 5''' lang. De helmdraden-kolom is aan den voet vierkantig, hooger rolrond en eindigt in een sehijfvormig knopje. Rondom dit zijn 12 tot 16 lijnvormige, soms zeer gebogene helmknopjes geplaatst. De vrouwelijke bloemen hebben eivormige knoppen en meer langwerpige bloemdeelen. Het vruchtbeginsel is langwerpig, naar den voet in een kort rolrond steeltje uitlopende, en naar den top dunner wordende, stomp-vierkantig, met gevoorde zijden, bruin behaard, en door den vierhoekigen of soms vierlobbigen stempel gekroond. Vier tussehenschotten verdeelen het in even zoo vele hokjes, en dragen, vooral in het benedenste gedeelte, eene talrijke menigte eitjes. De kapsels zijn langwerpig, in het midden buikvormig, naar de beide einden verdund, stomp-vierkantig, aan de zijden gevoord, houtig, bruin behaard, na de afvalling der haren blinkend bruin, 3" lang en 5''' breed. Zij springen op dezelfde wijze als de vorige soorten open. Hunne tussehenschotten zijn tot even beneden het midden met naar boven gerigte zaden bedekt. De zaadjes zijn regtopstaand, lijnvormig, naar de beide einden elsvormig uitlopende, 22''' lang, waarvan het kerngedeelte 2''' beslaat, een weinig ruw. Het buitenzaadvlies bestaat bij deze soort, vermoedelijk ook wel bij de anderen, volgens mijne latere waarnemingen, uit een fijn doorschijnend vliesje, en onder hetzelfde uit langwerpige eellen. Het bedekt een zeer los, vooral om de kern ontwikkeld, fijn eelweefsel. Door dit en langs het buitenzaadvlies stijgt de raphé naar boven, welke boven de kern ombuigt en zich vervolgens in de binnenste zaadhuid verliest. Bij deze vereeniging is het binnenvlies een weinig dikker. Het bestaat uit een zeer fijn, door eellen gevormd vlies, en bedekt een ander, bij sterke vergrooting zichtbaar, geheel effen, doorschijnend vliesje, dat de kern omgeeft. De kern is wit, rolrond, aan de beide einden stomp, en bestaat uit een gering eiwit en uit de kiem. De laatste heeft den vorm van de kern, en wordt door bijna even groote zaadlobben en wortel zamengesteld.

Deze, door W. Jaek in de wouden van Singapoera en Bintang ontdekte soort, werd door ons, in 1835, in de moerassige bosschen van Sumatra's westkust gevonden. Hier bereikte zij eene aanzienlijke grootte, en verspreidde zij hare, door de kronkelende klawieren der bladen ondersteunde stengen, tot in de kruinen der groote, gele bloemen dragende Capelliaboomen, of in de kroonen der Nibong- (*Areaa tegularia* W. J., *Oneosperma* Bl.) en Renda- (*Cyrtostachys*) palmen. Zoowel aan den voet als langs de bladerlooze steng, waren of hingen eene menigte groepen van met purperen vlekken voorziene, eivormige bekens. Zij versierden de steng en droegen tevens het hunne bij, om de voeding der snelgroeijende planten te vermeerderen. Deze laatste vooronderstelling berust op de proef, dat planten, wier stengen door mij waren afgesneden, maar wier bekens ik met water had gevuld, gedurende eenige dagen niet verwelkten, en dat ik het koper eener in een paar bekens geworpen oplossing, later in den steel terugvond. Hierdoor is de opnemende werking van de binnenvlakte der bekens genoegzaam bewezen. Wordt hierbij nu in aanmerking genomen, dat door de verrotting der in het vocht der bekens verdronkene insecten, eene voor den plantengroei zeer voedzame vloeistof wordt gevormd, dan kan deze stelling welligt tot waarheid worden.

*N. ampullaria* wijkt door hare bloeiwijze van de vroeger beschrevene soorten af, maar is door deze aan *N. destillatoria* en *N. Madagascariensis* verwant, zijnde zij echter gemakkelijk, door den vorm der bekens, van deze beiden te onderscheiden.

#### VIII. NEPENTHES MADAGASCARIENSIS. POIRET.

*N. phyllodiis* petiolatis, ascidiis caulinis infundibuliformibus, inflorescentiâ fusco-tomentosâ paniculatâ, pedunculis corymbiferis multifloris.

*Nepenthes Madagascariensis* Poir., *Encyclopedie Botanique*, IV. p. 459; Willdenow, *Species plantarum*, IV. p. 873; Brongniart, *Annales des Sciences naturelles*, I. p. 45; Amramatico Flacourt, *Histoire de Madagascar*, p. 150, Tab. 43.

Deze soort, welke zeer naauwkeurig door den Heer Brongniart beschreven is, kennen wij tot dus verre alleen van het eiland Madagaskar. Zij wordt aldaar door de inboorlingen *Poenga* genoemd. Dit woord herinnert aan het Maleische woord *Boenga*, hetwelk bloem beteekent, en doet de waarschijnlijkheid ontstaan, dat de Madagaskaren, even als de Maleijers, deze bekens voor bloemen houden.

## IX. NEPENTHES DESTILLATORIA. LINN.

*N. phyllodiis petiolatis, ascidiis radicalibus ventricoso-tubulosis, caulinis infundibuliformibus, inflorescentiâ cinereo-sericeâ, pedunculis corymbiferis paucifloris.*

Linn., Hortus Cliffortianus, p. 431; Linn., Species plantarum, N. 1354; Linn., Flora Zeylanica, p. 321; Willdenow, Species plantarum, IV. p. 873; Nepenthes Indica Lamarck et Poirer, Encyclopedie Botanique, IV. p. 458; Brongniart, Annales des Sciences naturelles. I. p. 43; Bandoera Burman, Thesaurus Zeylanicus, p. 42, Tab. 17; Hermann, Museum Zeylanicum, p. 16.

Deze soort sehijnt zich alleen tot het eiland Ceylon te bepalen. Zij is door de bloeiwijze met de beide voorgaande verwant, maar van beide, door de haar eigene grijze beharing, en daarenboven van de *N. ampullaria* door den vorm der bekers, en van *N. Madagascariensis* door de minder rijke bloem-schermen onderscheiden.

Het als landnaam voor deze plant opgegeven woord *Bandoera*, is niet bij uitsluiting op haar toepasselijk, wordende hetzelfde voor alle slingerplanten gebezigd. Het Sanskrietsche *Bandhoera* beteekent, als bijvoegelijk woord gebruikt: gebogen, gewonden; terwijl het, als eigennaam gebezigd, de *Pentapetes phoenicea* aanduidt.

## VERKLARING DER PLATEN.

### NEPENTHES GRACILIS. Tab. 1 et 4.

Fig. 1. Mannelijke bloemknop. 2. Doorsnede van denzelfden. 3. Geopende mannelijke bloem. 4. Helmdraden-kolom van boven. 5. Van de zijden. 6. Doorgesneden. 7, 8, 9. Stuiſmeel. 10. Dwarse doorsnede van de helmknopjes. 11. Dezelfde van één helmknopje. 12. Vrouwelijke bloemknop. 13. Geopende vrouwelijke bloem. 14. Regte doorsnede. 15. Dwarse doorsnede van het vruchtbeginsel. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eitjes van verschillenden ouderdom. 22, 23, 24. Kapsels. 25. Driekleppig kapsel. 26. Vergroot zaad. 27, 28. Zaad, dat van het buitenbekleedsel ontdaan is. 29. Dwarse doorsnede van het zaad. 30. Zaad, waar het losse eelweefsel uit weggenomen is, ten einde het voedingsvat (Raphé) en de kern te doen zien. 31. Kernhuid of Tegmen, waaruit de kern geligt is. 32. Buitenste zaadhuid (Testa). 33. Binnenste zaadhuid (Tegmen). 34, 35. Geheele kiem. 36. Kiem, van welke eene zaadlob is weggenomen. 37. Dwarse doorsnede van eene vrouwelijke bloem. 38. Dwarse doorsnede eener bloem van *Nepenthes ampullaria*, Jack.

### NEPENTHES BOSCHIANA. Tab. 2 et 4.

39. Mannelijke bloem. 40. Doorsnede van een vruchtbeginsel, in welke verscheidene vleezige ligehamen tussehen de eitjes liggen. 41, 42. Kapsel. 43. Kapsel, van hetwelk eene klep is weggenomen. 44. Eene klep van ter zijde gezien, voor de aanhechtingspunten. 45, 46. Het zaad. 47. Een eitje, waarin de kernzak nog regtstandig is. 48, 49. Zaden met onvolkomen ontwikkelde kiemen. 50. Het zaad, van de buitenhuid beroofd, en dus de kern, de raphé en het losse eelweefsel zichtbaar. 51. Doorsnede van het zaad, waarbij de eene zaadlob geheel verloren is gegaan. 52. Geheele kiem. 53. Met eene zaadlob voorziene kiem. 54. Zeer vergrootte, dwarse snede uit eene klep, op welke nog sporen van zaden aanwezig zijn.

### NEPENTHES GYMNAMPHORA. Tab. 3 et 4.

55. Mannelijke bloemknop enzv. 56, 57. Geopende mannelijke bloemen. 58. Helmknopjes-kolom. 59. Vrouwelijke bloemknop. 60. Geopende vrouwelijke bloemen. 61. Doorsnede van een vruchtbeginsel. 62, 63. Kapsels. 64. Doorgesneden kapsel. 65. Zaad, van hetwelk een gedeelte der buitenhuid en van het eelweefsel is weggenomen. 66. Gedeelte van de buitenhuid met de raphé en de kern. 67. Buitenheid, zeer vergroot. 68. De kern ontbloot. 69. De kiem met ééne zaadlob. 70. Met twee zaadlobben.

### NEPENTHES AMPULLARIA. Tab. 13.

### NEPENTHES BONGSO. Tab. 14.

### NEPENTHES PHYLLAMPHORA. Tab. 15 et 4.

#### ONTKIEMING VOLGENS D<sup>r</sup>. GRAHAM.

71. Kiemend zaad. 72. Ontkiemd zaad met de beide zaadlobben. 73. Jong plantje met den eersten spilvormigen wortel en het eerste bekertje. 74. Verder ontwikkeld plantje met drie bekertjes. 75. Jong plantje, aan hetwelk vijf blaadjes zijn, en het vierde en vijfde reeds de vlakke bladuitbreiding of phyllodia onder de bekertjes hebben.

### ZAMENSTELLING VAN DE TOT DEN GROEI BEHOORENDE DEELEN.

Tab. 20, 21 en 22.

In de volgende figuren beteekenen: Cu. huidje (*cuticula*), E. opperhuid (*epidermis*), C. schors (*cortex*), L. bast (*liber*), Lg. hout (*lignum*), F.V. vaatbundel (*fasciculus vasorum*), M. merg (*medulla*), R. M. p. groote mergstralen (*radii medullares primarii*), R. M. s. kleine mergstralen (*radii medullares secundarii*), v. s. spiraalvaten (*vasa spiralia*), f. s. spiraaldraad (*fibra spiralis*), v. p. gestipte vaten (*vasa punctata*), f. vezels (*fibrae*), st. stoma, c. cellen (*cellulae*), v. s. p. eigene sappenvoerende vaatjes (*vasa succi proprii*).

### NEPENTHES AMPULLARIA.

Fig. 1. In de lengte doorgesneden knop.  
2. Dwarse snede uit de steng bij den knop.  
3. In de lengte doorgesneden stukje van het voorgaande, zeer vergroot.  
4, 5. Uit den houtbundel bij het merg genomen stukje, waaraan de gestipte vaten nog als eenvoudige, langwerpige cellen met eenige indrukken voorkomen.  
6. Dwarse snede uit het bovenste bladdragend gedeelte der steng, een weinig vergroot.  
7. Dwarse snede uit hetzelfde gedeelte, zeer vergroot.  
8. Stukje uit den bast van het voorgaande.  
9. Overlangsehe snede uit hetzelfde gedeelte der steng.  
10—13. Zeer vergrootte gedeelten van het voorgaande.  
14. Afgezonderd lid van een gestipt vat.  
15. Gedeelte van eene gesneden vezel, zeer vergroot.  
16. Spiraalvat uit het merg, waarin aan het einde eene onregelmatige zamenlegging van draden zichtbaar is.  
17. Spiraalvat uit het merg, waarvan de doorsnede het omgevende vlies, benevens de holte, en aan het einde een dik knodsje, alleen uit stof bestaande, zichtbaar maakt.  
18. Spiraalvat, dat in een knodsje eindigt.  
19. Dwarse snede van het bladerloos of ouder gedeelte der steng.  
20. Gedeelte van het voorgaande, zeer vergroot.  
21. Overlangsehe snede van hetzelfde gedeelte.  
22. Vergrootte cellen uit de sehorslaag.

23. Vaten uit het cambium, waarin de vorming van den spiraaldraad eerst begint.
24. Vaten uit een meer ontwikkeld cambiumgedeelte met de vaatjes, die de eigenaardige sappen voeren door en over de spiraalvaten.
25. Lid van een gestipt vat, over hetwelk bovengenoemde vaatjes loopen.
26. Een lid van een gestipt vat, hetwelk gedeeltelijk gescheurd is, en de sappenvoerende vaatjes van binnen heeft.
27. Horizontale snede van een gestipt vat met vezels, en eene eel, uit de nabijheid van het merg, dat door de eellen van de kleine mergstralen, en door eenige platte draden, vermoedelijk afgewondene spiraaldraden, omgeven wordt.
28. Dwarse snede van den wortel, een weinig vergroot.
29. Eene diergelijke snede, zeer vergroot.
30. Lengte-snede uit den wortel, zeer vergroot.
31. Een stukje uit het begin van eene wortelverdeeling om den overgang der vaten te doen zien, zeer vergroot.
32. Een stukje uit den wortel, zeer vergroot.
33. Sehors van den wortel, zeer vergroot.
34. Lengte-snede uit een klein worteltje, zeer vergroot.
35. Vezels uit den wortel, zeer vergroot.
36. Epidermis van een wortelvezeltje met een haar: beiden zijn bruin gekleurd.
37. Dwarse snede uit den wortel, om de dikte der vezels te toonen: *a.* binnenste; *b.* buitenste.
38. Dwarse snede uit de steng bij de uitgroeiing van eene zij-spruit, vergroot.
39. Overlangsehe snede op dezelfde plaats.
40. Cellen van het merg uit de bogt, zeer vergroot.
41. Dwarse snede uit een deel der steng, waar een wortel uitgroeit.
42. Lengte-snede uit hetzelfde deel.
43. Dwarse snede, in welke *a* tot de steng en *b* tot den wortel behoort.
44. Stukje uit een' wortel, om de verandering van de gestipte vaten bij de buiging te doen zien, zeer vergroot.
45. Dwarse snede uit den steel van het phyllodium.
46. Een gedeelte van het voorgaande, zeer vergroot.
47. Overlangsehe snede uit hetzelfde, zeer vergroot.
48. Dwarse en
49. Overlangsehe snede uit den steel, dicht bij den beker, om de vermindering van de buitenste eellenlaag te doen zien.
50. Vaatbundel uit de buitenste laag van het voorgaande, zeer vergroot.
- 51, 52, 53. Gestipte vaten uit het cambium.
- 54 en 55. Gedeelte van een klein blaadje uit den knop (zeer vergroot), met eellen en met spiraalvaten, in welke hier en daar de spiraaldraden begonnen zichtbaar te worden en nog onafrolbaar waren.
56. Epidermis van hetzelfde, waar de kringen de zetels der haren aantonen.
- 57 en 58. Haren in hunne moedercel.
59. Haren buiten dezelve.
60. Overlangsehe snede eener groeve, in welke de haren zijn gezeten.
61. Stoma, in de lengte doorgesneden, zeer vergroot.
62. Epidermis met een stoma, benevens eene groeve voor de haren.
63. Zeer jong bekertje met de eigene sappenvoerende vaatjes.
64. Stukje uit het voorgaande, zeer vergroot, ten einde de samenstelling dezer vaatjes duidelijk te doen zien.
- 65 en 66. Klieren uit eenen jongen beker.
67. Klieren uit een' volwassen beker, vergroot.
68. Dezelfde van de binnenzijde, na de wegneming van het eelweefsel, en den overgang van de eigene sappenvoerende vaatjes in de klier aantonende.
69. Dezelfde, nog meer vergroot.
- NEPENTHES BONGSO.
70. Overlangsehe snede uit den beker, zeer vergroot.
71. Dwarse snede uit denzelfden, zeer vergroot.
- 72, 73 en 74. Uiteinden van spiraalvaten uit den beker.
75. Klieren uit den beker van buiten.
76. Eene klier van de binnenzijde, benevens eenig parenhym, de epidermis en de onbewerkte eutieula, zeer vergroot.
77. Doorgesneden klier, waarvan de eutieula door weeking afgecheiden is.
78. Stukje uit het deksel, om den loop en vorm der vaten duidelijk te maken.
79. Stukje uit hetzelfde, om de klier enzv. te doen zien, zeer vergroot.
- NEPENTHES GRACILIS.
80. Klier van buiten.
81. Klier van binnen.
82. Epidermis van de buitenzijde der bekens.
83. Stoma van buiten.
84. Stoma van binnen.
- NEPENTHES BOSCHIANA.
85. Klieren uit den beker, van buiten.
86. Dezelfde van binnen.
87. Klier van het deksel.
88. Cellen uit de epidermis met verbindende groeven, en de onder dezelve liggende laag eellen.
89. Dwarse snede uit den beker.
- NEPENTHES GYMNAMPHORA.
90. De klieren van den beker.
- NEPENTHES PHYLLAMPHORA.
91. Klieren van den beker, van buiten.
92. Dezelfde van binnen.
93. Klier van de, in den Kruidtuin te Leiden gekweekte soort, vermoedelijk *N. phyllamphora*.
94. Snede van het deksel boven, en van de laag onder de klier.
- NEPENTHES RAFFLESIANA.
95. Klieren van buiten gezien.
- NEPENTHES DESTILLATORIA.
96. Klieren van buiten.
97. Dezelfde, zeer vergroot.
- NEPENTHES MADAGASCARIENSIS.
98. Klieren van buiten.
99. Klieren zeer vergroot.



OVER EENIGE SOORTEN VAN DE FAMILIE

DER

**D I P T E R O C A R P E A E ,**

DOOR

**P. W. KORTHALS.**



Reeds bij den aanvang van het verkeer der Europeanen met de inboorlingen van Indië, werden er weldra eenige voortbrengselen van de gewassen der Dipterocarpeae bekend, en eenigen tijd na de opening van dezen invloedrijken wereldhandel, werd door Grimm de kamfergevende *Dryobalanops*, welke door hem te Baros, op Sumatra, was waargenomen, beschreven. Bijna eene eeuw later verkregen wij door Linnaeus kennis van de *Vateria Indica* van Ceylon, en van de *Vatica Chinensis* van China (\*). Dit drietal vermeerderde vervolgens door het onderzoek des plantenrijks van het vasteland van Indië, inzonderheid van Bengalen, met verscheidene andere soorten dezer familie, die in de werken van Roxburgh, den ontdekker der meesten, en van Gaertner, onder de geslachtsnamen *Dipterocarpus*, *Hopea* en *Shorea*, voorkomen, en in de laatste tijden, door het onderzoek van de Heeren Blume, Kuhl, van Hasselt en Spanoghe, nog met een zestal nieuwe soorten van *Dipterocarpus*, welke door den Hoogleraar Blume zijn beschreven. Dit geslacht en de andere reeds genoemde, zijn bijna gelijktijdig, door de onvermoeide pogingen der Engelsche Kruidkundigen, met een aantal soorten hunner bezittingen op het vasteland en op de eilanden, vermeerderd, van welke eenige beschreven en andere slechts bij name zijn bekend geworden. De reeds beschrevene maken gezamentlijk een getal uit van drie-en-twintig soorten. Bij dezen komen nu nog de elf door ons ontdekte soorten, welke onder de reeds bekende geslachten *Dipterocarpus* G., *Hopea* Roxb., *Vatica* L. (*Shorea* Roxb.) en de nieuwe geslachten *Retinodendron* Khs. en *Anisoptera* Khs. gerangschikt moeten worden.

---

(\*) De Heeren Wight en Arnott zijn van gevoelen, dat de door Linnaeus beschrevene plant, niet van hunne *Vatica laccifera* verschilt, en niet uit China, maar van Dekan en Bengalen afkomstig is.

Al de soorten van de Dipteroearpeae zijn tussehen 31° N. Br. en 10° Z. Br., en 75° en 115° Oosterlengte verspreid. Verseheidene derzelve hebben op het vasteland van Indië het stroomgebied van den Ganges tot standplaats. De *Vatica robusta*, volgens den Heer Wallich de noordelijkst voorkomende soort dier familie, wordt nog tot op 31° N. Br., aan den oorsprong van dien stroom gevonden; de anderen behooren daarentegen in de lagere breedte van Bengalen en op het schiereiland Dekan te huis. De *Vateria Indiaea* is van Ceylon bekend. Van Poeloe-Pinang zijn *Vatica* (*Shorea*) *longisperma* en *Hopea faginea*, en van Singapoera *Hopea gratissima* genoemd geworden. Door de vereenigde pogingen van de Nederlandsche Natuurkundigen, kunnen de soorten der Dipteroearpeae nu als Java, Borneo, Sumatra en Nieuw-Guinea bewonende, worden opgegeven. Zij zijn in deze oorden ongelijk verdeeld. Op Java werden tot dusverre alleen soorten van *Dipterocarpus* verzameld; op Sumatra zijn, behalve eene enkele soort van dit geslacht, andere van *Vatica*, *Retinodendron* en *Dryobalanops* gevonden; van Nieuw-Guinea is de eenige Anisoptera *Zippeliana* bekend, en op Borneo werden aan de geslachten *Dipterocarpus*, *Dryobalanops*, *Hopea*, *Anisoptera* en *Retinodendron*, nieuwe soorten toegevoegd. Daarenboven komt het geslacht *Dipterocarpus*, blijkens eene door mij in het Rijks Herbarium geziene soort, *Dipterocarpus fulvus* Bl., ook op Manilla voor.

Hetgeen door den Hoogleeraar Blume en de Engelsche Kruidkundigen omtrent de standplaatsen en het uiterlijk aanzien dezer gewassen is medegedeeld, hebben ook wij, bij de door ons waargenomene soorten, opgemerkt. Zij waren meest allen in gezelschap vereenigde bewoners der tussehen het strand en 1500 meters hoog gelegene bosschen, en trokken vooral langs de boorden der rivieren, waar zij geheel overzien konden worden, door hunne grootte, bladen en de tussehen dezen uitstekende bloemen en vruchten, de aandacht. Eenige soorten (*Dipterocarpus trinervis*, *D. Baudii*, enzv.) hebben dikwerf ruim 35 meters hooge en 3 tot 5 meters dikke stammen, welke als zuilen verheven en door een, in de tropische streken zeldzaam gemis aan woekergewassen, gekenmerkt zijn. Bijna allen bezitten uitgebreide kroonen, en eenen, alleen tegen den bloeitijd eenigzins minder digten bladtooi, die van het begin tot zijne volkomene ontwikkeling de verschillende tinten van groen doorgaat. Bij de eerste ontwikkeling zijn deze bladen licht-, somwijlen geel-groen, dof, en vervolgens krijgen zij langzamerhand eene donkerder kleur en eene glanzige oppervlakte. Tussehen dezelve prijken welriekende bloemen. Bij *Dipterocarpus* versieren deze den omtrek der bladkroon door hare aanzienlijke grootte, bij anderen door hare talrijke vereeniging: in beide gevallen geven zij aan de, op eenigen afstand geziene kroonen, een gevlekt voorkomen; in een later tijdperk onderseiden zich de gevleugelde kelken door hunne kleinere bladuitbreiding en door de lichter groene of meer roodachtige kleur van de hen omgevende bladen.

De door ons gevondene soorten hebben meestal tamelijk regelmatig rolronde, regte stammen, die door eene geel-grijze of licht bruine, dikwerf vrij gladde schors zijn bekleed. Het hout der takken en der jonge boomstammen is niet zeer digt, licht geel; dat der oudere stammen heeft bij de meesten, verseh zijnde, eene licht gele of bruin-gele kleur, die vervolgens donker of rood-bruin wordt; een' fijnen draad, een zacht en gemakkelijk te bewerken weefsel, en over het algemeen eene tamelijke duurzaamheid. Zij bezitten wijd uitgespreide, van onderen vlakke, van boven stompe, zelden kegelvormige, digtbebladerde kroonen, met horizontaal uitgespreide hoofdtakken, die op eenigen afstand van den stam in kleinere takken verdeeld zijn.

De eerstgenoemde takken zijn over het algemeen rolrond, glad; de laatsten een weinig zaamgedrukt, zelden volkomen rolrond, op verschillende wijzen behaard, en vooral bij *Dipterocarpus* met kleine ringen, de overblijfselen van het aanhechtingspunt der nevenblaadjes, voorzien. De knoppen zijn bij de soorten van *Dipterocarpus* zeer lang, en de beide hen bedekkende nevenblaadjes, welke na de ontwikkeling der bladen afvallen, geheel of gedeeltelijk als eene scheede of kapje zaamgegroeid. Zij hebben bij de soorten der andere geslachten eenen minder verlengden vorm, en de nevenblaadjes, welke na de ontwikkeling der bladen nog eenigen tijd blijven zitten, zijn niet zaamgegroeid. In de knoppen zijn de bladschijven met de binnenzijde naar elkander gevouwen, op de nerven zeer dicht behaard, zelden geheel glad, scheedevormig de later ontwikkelde deelen omvattende; de bladstelen hebben eene geringe ontwikkeling. Bij volkomen uitgegroeide bladen zijn de bladstelen dikwerf vrij lang, dicht bij den voet van het blad met eene geleding, die zich in vele soorten door eene verdikking of door eene knievormige bogt vertoont, stomp-driekantig of bijna rolrond. De bladschijven zijn langwerpig, aan de einden puntig, stomp of ingesneden, veelal gaafrandig, glad, met eene bekleeding, die uit enkelvoudige of tevens bundelsgewijze vereenigde haren bestaat, lederachtig, met dikwerf zeer uitstekende middel- en hoofd-zijnerven. De laatste loop van de middelnerf tot dicht aan den rand, en buigen zich naar boven. Zij worden door eene menigte, dikwerf evenwijdig loopende kleine nerven en netvormig verdeelde aren verbonden.

De knoppen, welke de bloemen insluiten, hebben eenen meer rolronden, toegespitsten vorm dan de bladknoppen, en staan in de oksels der bladen of over dezelve. De bloeiwijze bestaat uit eenvoudige trossen of zeer verdeelde pluimen, en is meestal met eene meer of minder digte beharing bedekt. Haar bloemsteel is, onverdeeld zijnde, met bogten, en heeft de bloemen op uitstekende kussentjes geplaatst; doch verdeeld zijnde, bezitten de deelen van den algemeenen steel veelal dezen zelfden vorm. De bloemen zijn niet zelden langs twee tegen elkander overstaande zijden van den steel geplaatst, en hebben bij *Hopea* en *Retinodendron* ieder een klein schutblaadje, dat haar, vóór de ontwikkeling, insluit en na deze spoedig afvalt. Al de bekende soorten hebben de bloembekleedselen dubbel, uit eenen kelk en uit eene bloemkroon bestaande. De kelk bestaat uit vijf deelen. Bij eenigen zijn deze deelen aan den voet tot eene buis zaamgegroeid; hooger, als vijf ongelijke lobben, in den knop klepvormig, en in het midden naar binnen gebogen en tegen elkander gevouwen: *Dipterocarpus*; bij anderen zijn de deelen even zoo zaamgegroeid, maar voor de opening als kleppen of over elkander gelegen: *Anisoptera*, *Retinodendron*, en bij de soorten van *Vatica* en *Hopea* zijn vijf geheel vrije kelkbladen, van welke twee binnenwaarts en drie naar buiten zijn geplaatst. Bij eene ongelijke ontwikkeling van de kelkdeelen, zijn twee kleine van de spil afgewend, één naar dezelve toegekeerd en staan de beide uitgegroeiden dwars van de spil of den algemeenen bloemsteel. De kelk is bij velen, gedurende zijn geheel bestaan, met eene meer of minder aanzienlijke beharing bekleed; bij enkelen alleen in den jeugdigen staat behaard, doch bij verdere ontwikkeling volkomen glad. Het benedenste gedeelte van denzelfden is bij eenigen, vooral bij de aan den voet zaamgegroeide, dik; het bovenste bladaardig. In dit laatste, vooral in de zeer uitgegroeide deelen, zijn drie tot vijf, zelden elf uit den voet ontspringende hoofdnerven, en eene menigte getakte en weder netsgewijze vereenigde kleinere nerven en aderen. De bloemkroon is bij de meesten onder het vruchtbeginsel aangehecht, bij *Anisoptera* daarentegen, rondom hetzelfde geplaatst. Zij bestaat uit vijf, bij *Hopea* aan den voet te zaamgegroeide, en bij anderen geheel

onverbondene bloembladen, welke voor de opening der bloem gedraaid zijn of elkander alleen met de randen bedekken. Bij de draaijing van de bloemknoppen dezer gewassen, even als bij die van een aantal Malvaceae, heb ik den eenvoudigen regel waargenomen, dat de overdekkende randen altijd naar de spil zijn gekeerd, en dus dat de zoogenoemde regtsehe of linksehe wending der bloembladen van den stand der bloem afhankelijk is. Zelden ontsluiten zich de bloemdeelen geheel, maar veelal blijven zij aan den voet in eene buis vereenigd, en heeft de bloemkroon eenen radervormigen boord of zoom, in welken men den spiralen stand der bladen meer zaamgedrongen herhaald ziet. De bloembladen zijn bij enkelen van eene ronde, maar bij de meesten van eene langwerpige gedaante, met stompe of spitse punten, somwijlen aan den voet in een klein nageltje uitlopende, gaafrandig, glad of met eene stervormige (\*) beharing, alleen bij de soorten van *Dipterocarpus* aanzienlijk ontwikkeld, wit, geelachtig of geel met eenen zacht rozen-rooden tint.

De meeldraden groeijen met elkander, en in sommige soorten ook met de bloembladen te zamen: *Hopea*, *Retinodendron*. Zij zijn bij de genoemde en bij anderen in een bepaald, bij *Vateria* en *Dipteroearpus* in een meer onbepaald, maar veelal vijfvoudig getal aanwezig. Bij de eersten zijn zij regelmatig in twee rijen geplaatst; de buitenste rij staat meestal over de kelkdeelen, en heeft de helft van het getal meeldraden der binnenste rij. De helmraden hebben bij *Retinodendron* enzv. eene geringe, bij *Dipteroearpus* eene aanzienlijke grootte, zijn lijnvormig of langwerpig, en somwijlen door te zamengroeijing van de buitenste met de tegenoverstaande van de binnenste rij, paarsgewijze verbonden. Bij *Dipteroearpus* bezitten zij in het midden, en bij andere geslachten iets hooger, eene geleding, welke het verbindingspunt van den helmknoop met het helmdraadje is (+). De helmknoop is over het algemeen, in verhouding tot de stuifmeelhokjes, zeer ontwikkeld, verlengt zich naar den top elsvormig bij *Dipteroearpus*; in een zeer toegespitst, ongedeeld vliesje bij *Anisoptera*; in een aan het einde verdeeld draadje bij *Vatica*; in een ongedeeld draadje bij *Hopea*; in een gespleten vliesje bij *Vateria*; in een klein knopje bij *Retinodendron*, en heeft naar of aan den voet eene hartvormige insnede met twee kleine oortjes. Op deze staat aan weërszijden van den helmknoop een stuifmeelhokje, hetwelk in twee kleinere is verdeeld. Deze kleinere zijn bij *Dipteroearpus* en *Hopea* ongeveer even lang, maar bij de andere geslachten zijn zij ongelijk en staan de kortste dezer deelen naar de binnenzijde naast elkander. De helmknopjes zijn meestal van eene vliezige zelfstandigheid, en bestaan uit een vlies, dat aan de binnenzijde langwerpige of naar het ronde overgaande, door hooge wanden gevormde vakjes heeft: eene zamenstelling, die aan de *Eriaceae* en *Solana* herinnert. In deze vakjes of kleine hollen ligt het stuifmeel bij de zeer jonge helmknopjes besloten, en later komt het door deszelfs vergrooiting buiten dezelve. Het stuifmeel is bijna kogelrond, op de oppervlakte effen of door uitstekende randjes of andere verhevenheden ruw, en springt op drie plaatsen open.

De stempel is bij de meeste ongedeeld, knopvormig, of getand; bij *Anisoptera* in drie deelen gespleten. Hij wordt door eenen bijna rolronden stijl gedragen. Deze bezit in het midden eene door

(\*) Deze beharing bestaat uit kleine stervormige haarbundels, in welke de haren om een klein half kogelrond knopje, waaruit zij ontstaan, geplaatst zijn.

(+) De vaatbundel, welke de helmraden doorloopt, is bij dit verbindingspunt geleed.

vaten en vezels omringde holte, welke, door de weeking van de omgevende deelen geseheden zijnde, gemakkelijk tot aan den moederkoek kan vervolgd worden. Het vruchtbeginsel is bij Anisoptera gedeeltelijk met den kelk zaamgegroeid, bij de anderen bijna geheel vrij, half eivormig, effen of gevoord, naar boven toegespitst, en gewoonlijk kort behaard. In den jeugdigen staat is het bij allen driehokkig, en bevat het in ieder hokje twee, naast elkander, op ongelijke hoogte in den binnensten hoek van de hokjes bevestigde eitjes. De eitjes zijn eerst kleine, ronde, op den moederkoek gezetene en later gesteelde blaasjes. Vervolgens buigt zich het dikke gedeelte van de eitjes naar den steel, waardoor het voedingsvat of de raphé loopt, en groeit het hiermede zamen (\*). Zij zijn nu langwerpig eirond, aan de zijden platgedrukt, op den rug rolrond, en op den buik door de uitstekende raphé gekield, aan het bovenste einde kegelvormig en aan het benedenste stomp. Het vruchtbeginsel ondergaat door den wasdom aanzienlijke veranderingen. Somwijlen wordt het, door de geringe uitgroeiing van de zelfstandigheid der tussehenschotten, eenhokkig, en heeft het de eitjes in het bovengedeelte der holte, rondom eenen uit den bodem voortkomenden draad, welke de voedingsvaten van den moederkoek bevat, geplaatst; dan krijgt het, door de ongelijke uitgroeiing, hokjes van eene zoo versehillende grootte, dat één of twee derzelve alleen met moeite kunnen erkend worden. In deze kleine hokjes blijven de eitjes kleine sehubjes, en in het groote groeit slechts een der twee tot zaad uit.

De vrucht is bij *Vateria* en *Retinodendron* bijna geheel boven den kelk geplaatst, en bij de andere geslachten voor een groot gedeelte door den uitgegroeiden kelk omsloten. Zij is bij eenigen niet openspringend, lederachtig of vleezig; bij anderen kapselaardig, eivormig of meer kogelvormig, aan den voet rond, aan den top puntig of stomp, glad of behaard. Zij heeft een dikker of dunner lederachtig epicarpium, een vezelig, bij *Hopea* zeer gering, maar bij *Dipteroearpus* zeer aanzienlijk sareoearpium, en een glad, bij enkelen glanzig, lederachtig, of broos kraakbeenachtig endoearpium. Een eenig zaad vult de geheele holte der vrucht, en heeft eenen meer of minder regelmatigigen kogel- of eivorm. Het heeft het uitwendig zaadvlies meest vliezig; het inwendige dikker, vleezig en somwijlen tussehen de zaadlobben ingegroeid. De kern bezit geen eiwit. De kiem heeft kort na hare vorming de beide zaadlobben vlak, van eene ongelijke grootte, de kleinste lob binnenwaarts naar den moederkoek geplaatst. Later groeijen de zaadlobben bij *Dipteroearpus*, *Dryobalanops*, enzv. zoozeer in de lengte en breedte uit, dat zij in de enge, tot hare ontwikkeling bestemde ruimte zoodanig moeten zaamgerold en geplooid worden, dat zij moeilijk te ontwarren zijn; bij *Hopea*, *Vatiea*, enzv. nemen zij daarentegen meer in dikte toe, en vergrooten zij zonder buiging. Zij zijn aan den voet uitgesneden, en hebben in deze insnede het rolronde, aan het einde spitse of stompe worteltje. Het knopje is niet zeer ontwikkeld.

Na de beschrijving van den vorm der deelen, zal ik eenige regelen over de zamenstelling van de takken enzv. laten volgen. Deze zijn, zeer jong, door een bijna ongekleurd of somwijlen, bij *Dipteroearpus*

(\*) In dezen draad of buis heb ik, bij eene sterke vergrooting, binnen de buitenste omhullende cellenlaag, eene rij cellen, en eene, uit eenen eenvoudigen draad bestaanden spiraal gevonden, die naarmate van de verlenging der buis of van de raphé, meer of minder op- of afgerold was. Bij meer ontwikkelde eitjes vond ik daarentegen, in plaats dezer middelste eellenreeks, leden van gestipte vaten, en geen spoor van de spiraalsgewijze wending: vermoedelijk was de spiraaldraad geheel ontrold geworden en nu tegen de gestipte vaten geplaatst.

Baudii, door een bruin gekleurd huidje (cuticula) bedekt. Onder dit huidje ligt de, meestal uit langwerpige-vierkante eellen gevormde opperhuid, waarin eenige stomata en enkele lenticellen, door gaatjes of verhevenheden de effenheid verminderen. Zij is bij de oudere takken dikwerf geheel anders gevormd, en schijnt dan uit de buitenste laag van de cellen der schors, met welke zij groote overeenkomst bezit, te bestaan. De schors of buitenste bastlaag bestaat uit twee lagen, die meer of minder scherp bepaald zijn. De eerste of buitenste wordt door een los weefsel van dunwandige eellen gevormd; de tweede of binnenste heeft daarentegen eenigzins meer zamenhangende en vele zeer dikwandige eellen. In beide zijn de, door dunne wanden gevormde eellen tamelijk op elkander gelijkend, van twaalf- tot zeshoekig; de twaalfhoekige zijn echter meer aan de buitenste, en de zeshoekige aan de binnenste laag eigen. De dikwandige cellen zijn tamelijk regelmatige of langwerpige vierkanten met gestipte wanden, en zeer naauw met elkander verbonden. Zij bevatten in de onderzochten soorten nu en dan een weinig hars, en zelden de groene korrels, die in de dunwandige eellen zoo rijkelijk zijn besloten. Hierdoor is bij mij het denkbeeld ontstaan, of deze eellen ook missehien van eenen anderen aard konden zijn, en, door eene verhoogde levenskracht, meer bewerktuigde stoffen afseheidden? Voor het oogenblik durf ik deze vraag niet beslissen; maar het zal niet overtollig zijn, hier, ter zijdelingsehe versterking van dit denkbeeld, aan te voeren, dat deze dikwandige eellen ook bij de Guttiferae de gele harsige stof, en bij andere gewassen eene zeer gommige vloeistof met weinig ehromule bevatten. — Op deze tweede schorslaag volgt de bastlaag, welke in jonge takken, uit eene menigte dunwandige eellen en uit niet zeer ontwikkelde bastbundels bestaat. In de eerste eindigen de groote mergstralen. De bastbundel is, door eene laag van langwerpige, dicht aan elkander geslotene cellen des eelweefsels, van den bast gescheiden, en heeft bij de meesten den vorm eener halve maan, en bij *Vatlea* van eenen scherpen driehoek. Dezelve bestaat uit fijne, vooral bij *Hopea* uit zeer kleine, dikwandige vezels, van welke kleine harsstreepjes de digte verbinding afbreken. Naarmate deze bastvezels meer naar binnen zijn geplaatst, vertoonen zij dunner wanden en eene minder vaste stof; waardoor het in jonge takken moeilijk is, om de grenzen van den bast- en den houtbundel aan te wijzen. De laatste begint met gestipte vaten. — Hij bestaat uit vezels, gestipte vaten, spiraalvaten, spiraaldraden, kleine mergstralen en sapvoerende vaatjes. Bij *Hopea* en *Dryobalanops* maken de vezels het grootste gedeelte van den bundel uit; bij *Vatlea* zijn de gestipte vaten het talrijkst. De vezels zijn bij allen zeer dikwandig, eindigen in spitse punten, en hebben van binnen kleine groeven. Zij zijn in het eambium korter, een weinig dikker en niet gestipt. De gestipte vaten verschillen in den omvang, de lengte der leden en den vorm der stippen. Bij *Dryobalanops* en *Hopea* zijn zij het kleinste van omvang, maar hebben derzelve leden eene lengte van een derde tot eene streep, bij eene breedte van een tiende streep. De dwarse strepen, welke de verbinding der leden bij *Dryobalanops* aantoonen, zijn meestal in een' hoek van  $10^\circ$  geplaatst. De stippen zijn op de vaten ongelijk verdeeld: nu eens staan zij vrij dicht bij elkander en zijn zij over de geheele vaten verspreid; somwijlen worden zij als kleine groepen in het midden van eene effene vlakte waargenomen, of wel zijn zij allen aan eene zijde geplaatst (\*). Haar vorm is langwerpig-ovaal of gelijk aan kleine dwarsstrepen; hare grootte is zeer ongelijk: meestal echter zijn er 4 tot 6 in eenen kring. De scheidingsstrepen (zoo als wij gevoegelijk de strepen, die de leden aantoonen, meenen te kunnen noemen) hebben

(\*) De Heer Mohl heeft deze ongelijke verdeling der stippen bij de *Tilia*, enzv. waargenomen.

bij *Hopea Balingeran* dezelfde rigting. De stippen volgen in hare verdeeling eene even zoo onregelmatige verspreiding, maar zijn daarentegen dikwerf zoo dicht bij elkander geplaatst, dat het vlies der vaten, door eene geringe vergrooing, als alleen uit stippen bestaande, voorkomt en, bij eene sterkere vergrooing, 14 tot 16 stippen in den omvang laat waarnemen. Haar vorm is bijna rond. De gestipte vaten van *Dipteroearpus Baudii* hebben de leden van een vierde tot ongeveer eene streep lang, en den omtrek tot de lengte als 1 tot 6 of 8. De scheidingstrepen zijn minder regelmatig en vertoonen zich als regte, gebogene, of wel als schuinsehe lijnen. De stippen hebben veel gelijkheid met die der *Dryobalanops*, zoowel wat den vorm, de grootte, als de verdeeling betreft. De *Anisoptera marginata* heeft de gestipte vaten zeer gelijkvormig met die van den *Dipteroearpus*, maar vershillend door eene mindere grootte, en dikwerf door een geringer aantal van langwerpige stippen. Bij *Vatiea* vormen de gestipte vaten een zoo groot gedeelte van den houtbundel, dat men bij eene overlangsehe snede slechts eenige vezels tussehen een groot aantal derzelve waarneemt. Zij bestaan uit leden van  $\frac{1}{4}$  tot  $\frac{1}{3}$  streep lengte, die de lengte tot de middellijn als 3 tot 1 hebben. Hunne scheidingstrepen zijn regt of schuins; somwijlen aan het eene einde van het lid regt en aan het andere schuins. De stippen zijn, even als bij de vorige soorten, zeer ongelijk verdeeld, en staan door haren vorm en getal, in het midden tussehen *Hopea* en de andere opgenoemde geslachten. — Hetgeen ik van de spiraalvaten waargenomen heb, kan zeer geschikt op de volgende wijze worden zaamgetrokken. Zij vertoonen zich onder twee vormen, als zeer kleine in eenen draad of als grootere, in meerdere draden afrolbare vaten. De laatste zijn in den omtrek van het merg geplaatst en vormen het binnenste van het mergkanaal; de eerste heb ik dikwerf in het buitenste gedeelte van hetzelfde en in het eambium tussehen den bast- en houtbundel waargenomen. De in den omtrek van het merg geplaatste spiraalvaten vormen drie tot vijf ringen, en bestaan uit eene halve tot anderhalve streep lange leden, waarin de middellijn tot den omtrek als 1 tot 20 of 30 staat. Deze leden zijn aan de uiteinden seheef en eindigen derwijze, dat de beide punten tegen elkander overstaan, en dus altijd aan de kortste zijde van de volgende, boven dezelve geplaatste sluiten. De wendingen der draden sehijnen mij toe, want als eene zekerheid durf ik zulks niet bepalen, in verband te staan met den vorm der leden, en in de beide puntige einden te beginnen en te eindigen. De andere, uit éne draad bestaande, spiraalvaten, heb ik het duidelijkste in het eambium gezien. Zij waren meestal, eerst bij eene zeer sterke vergrooing zichtbaar, en naarmate van den graad der ontwikkeling van het eambium meer of minder ontrold. Ik zal later op deze vaten terugkomen, en hier de beschrijving van de andere zamenstellende deelen van den houtbundel vervolgen. — De kleine mergstralen zijn bij allen, op eene min of meer duidelijke wijze zichtbaar, en vormen, van het merg tot in en door den bastbundel voortlopende, stralen, of hebben eene netvormige verbinding in den vaatbundel. Zij bestaan uit kleine, zeer platte of zoogenaamde tafelvormige eellen, die zeer dicht aan elkander sluiten, ongelijk van grootte zijn en eenen vierkantigen vorm hebben, in welken het vlak een volkomen of een langwerpig vierkant voorstelt. De eellen hebben zeer dikke wanden met diepten, die in tegen elkander liggende eellen, tegen over elkander zijn geplaatst. Dikwerf omgeven deze kleine mergstralen een gedeelte van de gestipte vaten, en somwijlen omsluiten hunne eellen de gestipte vaten zoo juist, dat men hen, zonder een naauwkeurig onderzoek, voor deelen van de wanden der gestipte vaten zoude houden (\*).

---

(\*) Op vele ontleedkundige platen van planten komen zij als zoodanig voor.

Behalve deze, bij allen aanwezige, samenstellende deelen, vertoonen zich langs de gestipte vaten, strepen, welke wij op de meeste ontleedkundige platen, als tot den wand van deze vaten behoorende, afgebeeld vinden. Een nauwkeurig onderzoek heeft deze strepen als zaamgedrukte of bijna rolronde draden doen kennen, en aangetoond, dat zij over de gemelde mergeellen of tussehen deze en de wanden der gestipte vaten waren gelegen. Later zal ik haren oorsprong aantonen, en nu tot de beschrijving van het merg en de groote mergstralen overgaan. — Het merg heeft bij de meesten eenen eirkelvormigen, en bij enkelen, naar de uiteinden der takken, eenen meer ovalen omtrek, waarin bij den oorsprong der mergstralen kleine uitstekende hoeken zijn. Deszelfs omvang is bij *Dipteroearpus* en *Anisoptera* het aanmerkelijkste; vervolgens komt die van *Vatiea*, en daarna die der anderen, in hunne verhouding tot den vatenring, in aanmerking. In de onderzochte bloeiende takken bestond het merg bij *Anisoptera* uit bijna gelijkzijdige, en bij de andere uit langwerpig vierkante cellen, waarin de lengte tot de breedte bij *Dryobalanops* als 1 tot 4 staat. Deze eellen hebben meestal dikke gestipte wanden, in welke de stippen of verdiepingen, vooral bij *Hopea* en *Dryobalanops*, zeer opmerkelijk zijn. De groote mergstralen bestaan uit twee of drie rijen eellen, en splejten aan het einde van hunnen loop, om de bastvezellaag, welke aan weërszijde ligt, met eene rij dezer eellen te begrenzen. Hunne eellen zijn bij *Hopea* en *Dryobalanops* vierkantig, bij *Retinodendron* *Rassak* en de andere langwerpig en, even als die van het merg, dikwandig en gestipt. — Bij de onderzochte soorten vertoonden zich reeds aan het ongewapend oog, in den omtrek van het merg, eenige ronde gaatjes, die met eene harsachtige stof waren opgevuld. Bij vergrooting zijn zij even zoo vele ruimten, die door scheuring van de omringende deelen ontstaan. Het was eene bekende, ook door mij waargenomene daadzaak, dat dikwerf in het midden, bij het merg der boomen harsophoopingën plaats hebben: de oorsprong van dezelve was echter onbekend. Ik beproefde de oplossing van dit vraagpunt. Behalve de beschrevene samenstellende deelen van de takken, heb ik nog de sapvoerende vaatjes opgenoemd. Zij vertoonen zich bij de onderzochte jonge takken in de bast- en houtbundels, en in het merg, als zeer fijne vaatjes. Naar de uiteinden der takken laten zij derzelver geleden samenstelling zeer duidelijk waarnemen. In de oudere deelen der takken vertoonen zij meer te samenhangende buisjes. Op beide plaatsen bevatten zij reeds hars. Zij loopen in de rigting der vaten en zijn door mij langs de gestipte en spiraalvaten, en ook in deze vaten waargenomen. Vooral waren zij zeer talrijk in den omtrek van het merg en bij de reeds gemelde harsophoopingën. In deze waren zij afgebroken. Deze harsophoopingën hadden plaatsen ingenomen van eenige mergeellen, van de spiraalvaten uit het mergkanaal, van enkele gestipte vaten en vezels van den houtbundel, en lieten bij een nauwkeurig onderzoek nog de overblijfsels der vliezen en draden tussehen de harskorrels erkennen. Door het onderzoek van een stukje van het uiterste einde eens taks van *Dipteroearpus* *Baudii*, werd het ontstaan van deze uitstortingën nog duidelijker, omdat hier de gemelde sapvoerende vaatjes, in de spiraalvaten en gestipte vaten rozenkransvormig opgezwollen en aan het uiteinde gebroken zijnde, het begin van de uitstorting in deze vaten zoo duidelijk maakten.

Na de gronddeelen in hunnen volkomen staat beschreven te hebben, zullen hier nog eenige woorden over hunnen toestand in het eambium worden bijgevoegd. Hier vertoonde zich in den jongen staat eene gomachtige stof, in welke bij sterke vergrootingen een begin van bewerktuiging zichtbaar werd. Later vertoonde deze stof ongelijke cellen, en waren er tussehen dezelve zeer kleine spiraalvaten zichtbaar.



In het meer gevorderde cambium was de bewerktuiging reeds duidelijker, en vertoonden zich de vezels als lange eellen, en de gestipte vaten als groote, korte eellen, die juist boven elkander stonden. De laatsten bezaten in dien staat effene wanden en hadden een of meerdere, meer of minder ontrolde spiraalvaten nevens zich. Deze spiralen sehijnen zich bij de oudere lagen meer en meer te ontrollen en vormen de draden, die wij boven reeds, als in de nabijheid van de gestipte vaten geplaatst, hebben beshreven.

Bij de kieming der zaden van *Dipterocarpus* komt de wortel uit het bovenste gedeelte der vrucht te voorschijn, en de zaadlobben blijven in de vrucht besloten. Uit deze groeijen zeer lange stelen, tussehen welke het bladpluimpje later ontspruit. Bij de ontkieming der zaden van *Vatica* komen, volgens de opgave van Roxburgh, de zaadlobben voor den dag, en ontwikkelen zich deze tot kleine bladen. Bij de ontwikkeling der kiem van *Dryobalanops*, blijven de zaadlobben in de half openspringende vrucht besloten of ontspruiten zij uit deze, om zich bladvormig uit te breiden. De wortel is spilvormig en verdeelt zich naar het einde in vele kleinere, met grijze haren bezette worteltjes.

Waarnemingen omtrent eenige soorten van *Hopea*, *Retinodendron* en *Dipteroearpus*, doen mij vooronderstellen, dat er tegen den bloeitijd een stilstand in de ontwikkeling van het gebladerte plaats heeft, daar deszelfs digtheid alsdan door het afvallen van de oude bladen aanzienlijk vermindert. Zoo als ik boven reeds aanstipte, zijn de bladen bij hunne eerste ontwikkeling dof licht groen, en worden zij later glanzend en donkerder groen. In eenen ouderen staat neemt deze groene kleur eenen meer of minder bruinen tint aan. In het tijdperk, hetwelk de afvalling der bladen voorafgaat, verkrijgen zij eene rood- of geel-bruine, en vervolgens, bij hunne afvalling, eene donkere of licht bruine kleur.

De bloeitijd is bij de versehillende soorten zeer ongelijk: eenigen zijn tegen of in het begin van het drooge jaargetijde met schoone, talrijke bloemen versierd; anderen daarentegen, wanneer de regentijd nadert. Alleen, volgens de opgave der inlanders en bij gissing, kan ik mededeelen, dat de bloeitijd tussehen eene en twee maanden duren zoude. De bevruechting heeft kort vóór of na de opening van de bloemkroon plaats, en wordt spoedig door de ongelijke ontwikkeling der eitjes kenbaar. Op haar volgt de afvalling van de omringende meeldraden en bloembladen, en eene vergrooting van den kelk, benevens eene digtere omsluiting van het vruchtbeginsel door denzelven. De uitgroeiing van twee of meerdere deelen van den kelk duurt bij verseheidene tot aan de rijpwording der vrucht, welke ongeveer vijf tot zes maanden na de bloeiing plaats heeft. Bij *Dipteroearpus* beginnen de rijpe zaden niet zelden reeds aan den boom te kiemen. Hierdoor is, omtrent het einddoel van de vleugels des kelks, bij mij het denkbeeld ontstaan, of zij niet tevens bestemd zouden wezen om, daar zij het bovengedeelte van de vrucht lichter maken, bij het nedervallen derzelve van hare hooge groeiplaats, de teedere deelen van de ontwikkelde kiem voor kwetsing te bewaren?

Van de versehillende deelen dezer gewassen wordt alleen het hout ten gebruike aangewend. Dit behoort, wanneer het niet te veel van hars is voorzien, tot de beste bouwstoffen, en levert aan de,

langs de Iraway wonende Birmanen, het noodige voor hunne aanzienlijke kano's, aan de bewoners van Chittagong, voor hunne doodkisten, en aan die van Borneo's zuid-oostkust eene voortreffelijke bouwstof voor hunne woningen. Daarentegen zijn de zamentrekkende, olierijke zaden een zoo geliefkoosd voedsel voor den, onder den naam van *Cereopithecus cynomolgus* bekenden aap, en voor den *Sciurus ephippium* (eene soort van eekhoren), dat wij al de op den grond gevallene vruchten min of meer door deze dieren aangebeten of doorknaagd vonden. Zeer belangrijk daarenboven zijn de voortbrengselen dezer gewassen, bestaande in balsem, hars, olie en kamfer. De eerste wordt als olie ter verlichting of ook wel als teer gebezigd; de hars, welke tot de zoogenaamde onderharsen behoort, wordt in flambouwen gebrand, als pek aangewend om de vaartuigen te kalefateren en door de Hindoesche priesters als wierook gebruikt. Men heeft beproefd om ze tevens als vernis aan te wenden, dan deze proef is, wegens de, bij eene geringe warmte plaats hebbende smelting, mislukt. Vervolgens verdient de kamferolie, ofsehoon van minder belang, en de voor den Indisch-Chineeschen handel zoo gewigtige kamfer, bijzondere vermelding.

De verwantshap dezer familie kunnen wij, hetzij naar haar uiterlijk aanzien, hetzij naar de kenteekenen, welke eene nadere beschouwing opleveren, beoordeelen. Door het eerste sluiten zieh de *Dipterocarpeae* aan den door den Heer von Humboldt genoemden Malvavorm met *Dipterocarpus* enzv., of aan den Lauriervorm door den *Retinodendron*. Door de laatsten nadert deze familie, zoo als de Heer Blume in de *Flora Javae* heeft aangetoond, tot de *Malvaceae*, in den ruimsten zin en in het bijzonder bij de *Sterculiaceae*. Latere sehrijvers hebben dit gevoelen, wat de hoofdzaak betreft, aangenomen; maar de Heer Lindley plaatst de *Dipterocarpeae* tussehen de *Elaeocarpeae* en *Tiliaceae*, terwijl de Heer Blume dezelve tussehen de laatste familie en de *Buttneriaceae* rangschikt. Met het eerste gevoelen kan men zich zeer goed vereenigen, zoo men den vorm van de helmknopjes en van den helmknoop, en de plaatsing van het ei in aanmerking neemt; met het laatste, wanneer het zaad in deszelfs samenstelling wordt ten grondslag genomen (\*). Het komt mij voor, dat de *Dipterocarpeae* tussehen de *Malvaceae* en de *Elaeocarpeae* kunnen worden geplaatst: omdat zij met de laatste familie het gering, maar toch voor dezelve belangrijk uitgroeijsel van den helmknoop, benevens eenige overeenkomst in de samenstelling der vrucht bezitten, en met de eerste, door den vorm van de kiem, alsmede door de ligging van de bloemkroondeelen voor de opening der bloem, overeenstemmen. Daarenboven bezitten de *Dipterocarpeae*, volgens den Heer Blume, eenige overeenkomst met de *Guttiferae*. Deze verwantshap is vooral door het geslacht *Lophira* Afz., dat tot de *Dipterocarpeae* is gebragt, versterkt. De eenige soort van dit geslacht, welke het Rijks Herbarium uit de door den Heer Leprieur op Senegal gemaakte verzameling bezit, werd door dezen Kruidkundige op het eerste gezigt voor eene plant van de *Guttiferae* gehouden, en zal vermoedelijk bij de meesten wel den indruk van eene soort van *Callophyllum* maken, waarmede zij, door het aanzien der bladen en de bloeiwijze, overeenstemt. Daarentegen wijkt zij, door den stand derzelve, van *Callophyllum* af. Van *Dipterocarpus* vershillen de bladen door het gebrek der neven-

(\*) De Heer Lindley brengt deze familie tot de *Synearposae*, welke volgens hem de kelkbladen in een' volkomen krans bezitten. Deze schikking is geldig voor de met verbondene kelkbladen voorziene geslachten; doch kan op die, welke vrije kelkbladen bezitten, niet worden toegepast, omdat hier de bladen duidelijk in twee kransen staande, meer verwantshap met de *Calyceae* hebben.

blaadjes. De bloemdeelen zijn door vorm, getal, ligging, en vooral door de verlenging der kelkdeelen, zeer gelijk aan die der Dipterocarpeae; daarentegen hebben de geslachtsdeelen meer overeenkomst met die der Guttiferae (\*), door den vorm van de helmknopjes, bij welke de helmknoop niet is uitgegroeid, door de plaatsing van het vruchtbeginsel op eene kleine verhevenheid, en door het inwendige samenstel. Het vruchtbeginsel is, even als bij eenige Guttiferae, eenhokkig, en heeft de talrijke eitjes op eene in deszelfs midden geplaatste korte zuil vastgehecht. Behalve deze overeenkomst vinden wij nog eene tamelijke gelijkvormigheid in de samenstelling van het zaad, vooral wat de kiem betreft. Uit deze vergelijking blijkt genoegzaam, dat de *Lophira* niet bij de Dipterocarpeae behoort, en tussehen deze en de Guttiferae staat. Het komt mij dus raadzaam voor, om dit geslacht als eene eigene familie af te scheiden onder den naam van Lophiraceae.

De *Lophira* dus uitgesloten hebbende, behouden wij in de familie der Dipterocarpeae drie natuurlijke groepen: de eerste, welke wij de *Vateriae* zouden kunnen noemen, is gekenmerkt door de gelijkmatige, niet zeer uitgroeiende kelkdeelen, bevat de *Vateria* L. en *Retinodendron* Khs., en is de overgangsvorm tot de *Elaeocarpeae*; de tweede, die der eigenlijke Dipterocarpeae, bezit de kelkdeelen aan den voet min of meer buisvormig verbonden, en twee of meer derzelve bladvormig uitgegroeid: hieronder kunnen gerangschikt worden: *Dipterocarpus* G., *Anisoptera* Khs. en *Dryobalanops* G.; en de derde, die der *Hopeae*, heeft de kelkbladen geheel vrij, gedeeltelijk of allen bladvormig ontwikkeld, en bevat *Hopea* Roxb. en *Vatica* L.

#### RETINODENDRON. KHS.

*Vateriae* species, Roxb. Flora Indica II. pag. 602.

CALYX profunde quinque-partitus, excrescens. COROLLA pentapetala, aestivatione convolutâ. STAMINA quindecim, biserialia: serie interiore staminibus 10 et serie exteriore staminibus 5 calycis laciniis, et 5 seriei interioris oppositis et connatis; ANTHERAE basi affixae, locellis inaequalibus; CONNEXIVUM glandulâ terminatum. OVARIUM trilobulare, loculis bi-ovulatis; OVULA subeollateralialia, descendentialia. STYLUS subteres; STIGMA capitatatum, integrum vel dentatum. CAPSULA (auctor. Roxburghi in *Vateria* lanceaefoliâ) solida, trivalvis. SEMINA solitaria vel geminata; INTEGUMENTUM (simplex? Roxb.) in semine immaturo duplex. EMBRYO erectus (inversus); COTYLEDONES subaequales, crasse-carnosi, bilobi; RADICULA lanceolata (Roxb.).

ARBORES. FOLIA alterna, oblonga, coriacea. STIPULAE oblongae, laterales. Flores axillares vel terminales, paniculati.

(\*) In de beschrijving van de zaden dezer familie, kent men aan dezelve eenen zaadrok en dunne zaadhuid toe. Het onderzoek van de ontwikkeling der zaden van *Garcinia Mangostana* heeft mij overtuigd, dat hetgeen men voor den zaadrok houdt, eene zeer uitgegroeide, saprijke buitenzaadhuid is, en dat het voor de geheele zaadhuid genomen gedeelte, het binnenste deel van dezelve vormt.

De Heeren Wight en Arnott maakten, bij de vermelding van de *Vateria lanceaefolia* Roxb., de opmerking, dat deze soort misschien een afzonderlijk geslacht moest vormen (*Prodromus Florae Peninsulae* I. p. 84). Ik heb dit denkbeeld mijner voorgangers, na het onderzoek van de beide door ons verzamelde soorten, bevestigd gevonden en aangenomen, en aan het thans voorgestelde geslacht den naam *Retinodendron* gegeven, om daardoor de aanzienlijke hoeveelheid hars aan te duiden, die deze boomen afzonderen. Het is van *Vateria* genoegzaam onderscheiden door een kleiner getal meeldraden, door den in eene klier uitloopenden helmknoop, en door den vorm van de zaadlobben, welke, volgens Roxburgh, meer overeenkomst met die van *Vatica* L. (*Shorea* Roxb.) dan van *Vateria* bezitten. Tot dusverre zijn drie soorten van dit geslacht bekend: de eene, *R. lanceaefolium*, behoort tot de gewassen van Silhet en Chittagong; de andere, *R. pauciflorum*, werd aan de rivier van Indrapoera verzameld, en de derde, *R. Rassak*, groeit vrij menigvuldig langs de rivieren van Borneo's zuid-oostkust.

### I. RETINODENDRON RASSAK. KHS.

*R. foliis ovali-oblongis obtuse acuminatis basi obtusis, stipulis oblongis, paniculis divaricatis, stigmatibus truncato-denticulato.*

ARBOR speciosus, saepe 20 ad 25 metrarum altitudine; TRUNCUS rectus, subcylindricus, cortice sat crasso, griseo-fusco, ligno laete fusco; CORONA conoidea vel ovoidea, aperta; RAMI patentes, subteretes, fusci, glabri solutione epidermidis; RAMULI compressiusculi, griseo-fusci, lepidoti; novelli compressi, dense fusco-lepidoti. FOLIA ovali-oblonga, acuta, breviter obtuse acuminata vel acuminatissima, basi obtusa vel acutiuscula, integerrima, supra glabra, subtus tenuissime lepidota, pilis stellatis, coriacea, 6 cm. lata, 32 cm. longa, nervis primariis patentibus, prominentibus, nervis secundariis subparallelis, venis reticulatis; PETIOLI 3 cm. longi, subteretes, lepidoti vel glabriusculi. STIPULAE sessiles, oblongae, obtusae, intus glabrae, carinatae, extus lepidotae, coriaceae, deciduae, 20'' longae, 5'' latae. GEMMAE compressae, ovatae, acutae, stipulis tectae. INFLORESCENTIA dense lepidota, axillaris vel terminalis, paniculata; PEDUNCULUS communis basi compressus, versus apicem subtetragonus; PEDUNCULI alternantes, compressi, ad apices subtetragoni; PEDICELLI tetragoni imò basi articulati. BRACTEAE ovatae, acutiusculae, intus glabrae, extus lepidotae, minutae, admodum deciduae. FLORES odorati, flavescens. CALYX aestivatione valvatà, tubo subpentagono, basi attenuato, limbo quinque-partito, partibus rectis, triangularibus, acutiusculis, intus glabris, extus lepidotis, carnosus, persistentibus, excrescentibus. COROLLA pentapetala, aestivatione convoluta; PETALA oblonga, saepe subfalcata, obtusa, intus glabra, basi bituberculata, extus sublepidota, carnosae, 14'' longa, 6'' lata. STAMINA quindecim, basi subcoalita, in duabus seriebus disposita; decem seriei interioris inaequalia, minora petalis opposita, majora calycis laciniis opposita et staminibus quinque seriei exterioris connata; FILAMENTA laminaeformia, basi dilatata, apice linearia, glabra; ANTHERAE oblongae, basi affixae, locellis inaequalibus, exterioribus majoribus; CONNEXIVO glandulà truncatà vel acutiusculà terminato, basi subdilatato. POLLEN sphaericum. OVARIUM semi-ovoideum, subtrigonum, versus apicem attenuatum, dense lepidotum, triloculare; loculis oblongis apice angustioribus, bi-ovulatis; OVULA subcollateralia, ab apice anguli interni loculi pendula, infra verticem affixa. STYLUS trigonus, glaber; STIGMA truncatum, denticulatum. FRUCTUS immaturus,

ealyce coriaseo stellato insidens, subovoïdeus, apiee attenuatus, fere glaber, carnosus, epiearpio submembranaeeo, sareocarpio earnoso, endoearpio subeoriaeeo, abortu unilocularis, monospermus.

*Crescit ad flumina Baritto, Kapoeas, etc.: BORNEO.*

Tab. 8. Explicatio. 1. Gemma floris. 2. Flos. 3. Petalum introrsum visum. 4. Flos calyce et corolla ablatis. 5. Staminum pars introrsum visa. 6. Stamen majus antice. 8. Idem postice. 7. Stamen minus antice. 9. Idem postice visum. 10. Ovarium. 11. Ovarium verticaliter sectum. 12. Ovulum. 13. Fructus immaturus. 14. Idem verticaliter sectus. 15. Symmetria floris.

Langs de Baritto-, Kleine Dajak-, Kapoeas-rivieren enzv. en derzelver zijtakken, is deze boom bij de inlanders bekend onder den naam Rassak, en groeit hij zoowel langs de oevers, als op eenigen afstand van dezelve. In de eerste standplaats wordt de groei niet zelden, uithoofde der beperking, welke de ontwikkeling der wortels door het nabij zijnde water ondervindt, verhinderd, en gaat de hoogte zijner stammen soms geene 3 N. ellen te boven. In de laatste, meer gunstige standplaatsen, bereikt hij daarentegen eene hoogte van 30 ellen. De regtopgaande, door eene bruin-grijze schors bekleede stammen hebben eene hoogte van 20 à 22 ellen, en de piramidale of ovale kroonen verkrijgen eene lengte van 8 à 10 ellen, bij eenen soms dubbelen omvang.

In voor den groei minder gunstige omstandigheden is de stam nu en dan met onregelmatige bogten, maar behouden de kroonen den gewonen vorm. Wij hadden den Rassak, gedurende onzen togt op de Baritto en hare zijtakken, de Tewe, Karrau enzv., in de maanden september met enkele onrijpe vruchten gezien. In de maand oktober vonden wij denzelven bloemdragend langs de oevers van de Kapoeas. Hier vertoonden de, van de oevers verwijderde boomen, tusschen hun groen loof, groote witte vlekken; gunstiger daarentegen waren de door de natuur minder bedeelde, aan de oevers groeiende gewassen voor de beschouwing. De Rassak stond hier in gezelschap van eenige vijgenboomen. De laatste waren met een blinkend, helder groen loof en kleine roode vruchten voorzien; de eerste bezat een minder glanzig, donkerder groen, grootere bladen, en naar de uitcinden der takken en takjes aanzienlijke bloempluimen, met talrijke witte bloempjes. Deze laatste versierden de kroonen, waarin zij in kleine leegten tusschen het loof geplaatst waren, of buiten hetzelfde als pluimen wapperden, en veraangenaamden des avonds den omtrek door eenen liefelijken vanieljegeur, welken zij alsdan van zich verspreidden.

De Rassak behoort, even als de vermaagsehapte soort op het vasteland van Indië, tot de zeer harsrijke boomen. Deze hars is door den geheelen boom, zoowel in het schors- en bastgedeelte, als in het hout verspreid, als eene doorschijnende, licht gele of licht bruine, lijvige vloeistof. Als zoodanig vult zij een eigen vaatstelsel, dat, gebroken zijnde, zich in, door scheuring van vaten en eellen ontstane ruimten, of in gestipte vaten ontlast. De beweging dezer vloeibare stof is zoowel dalend als stijgend. Bij onze reis naar het bovengedeelte der rivier, had ik in eenen aanzienlijken Rassakstam eene inkapping laten maken, ten einde de rigting en de hoeveelheid der vloeistof te kunnen bepalen. Op onze terugreis bezocht ik den boom weder, en nu bleek het, dat de harsige vloeistof vooral uit het bovenste gedeelte der insnede gevloeid was, en dat zij uit het benedenste gedeelte slechts in geringe hoeveelheid was

opgeweld. Minder gelukkig slaagde deze proef omtrent de hoeveelheid, waarom ik deswege alleen het gevoelen der inlanders kan mededeelen. Volgens hetzelfde is de hoeveelheid zeer verscheidend: bij vochtig weder is zij het aanzienlijkst, bij eene zeer drooge lucht het geringst. De vloeistof verhardt, bij hare aanraking met de lucht, tot eene half doorschijnende, gele of bruine hars, door de Maleijers *Dammar* en door de inboorlingen *Njating* of *Njato* genoemd. Deze hars is zeer broos, wordt beneden de warmte van kokend water week, en komt somwijlen als klompen van 9 N. ponden en, volgens de opgave der inlanders, ook wel van 15 N. ponden voor. Groote klompen heb ik aan den voet, of even boven den grond, uit groote spleten van den stam gevloeid, en kleinere stukken hooger aan den stam, uit kleine scheuren van denzelven, gevonden. Door de inlanders wordt de hars verzameld voor hun eigen gebruik of tot handelsartikel. Zij bezigen dezelve fijngestampt en in palm- of banaanbladen gewikkeld, als fakkels om hunne woningen te verlichten, of fijngestampt en met olie vermengd, om hunne vaartuigen te kalefateren. Als handelsartikel brengen zij dezelve naar de kustplaatsen, vooral naar Banjermassing. Als zoodanig bekleedt deze hars, benevens andere harsige stoffen, naast den rotting, eene aanzienlijke plaats in den handel met Soerabaja. Haar prijs is zeer wisselvallig, en hangt op de plaats zelve veel van dien des rottings af: is deze gezocht, dan stijgt de prijs van den dammar, omdat het opzoeken van denzelven aldan alleen aan kinderen wordt overgelaten, en de volwassenen zich met het rotting zoeken en snijden bezig houden. In de Indische streken vervangt deze dammar de gewone terpentijn-hars en het pek, en is hij, als een vervanger dezer stoffen, zeer belangrijk. Voor de Europese markten, en dus als algemeen handelsartikel, zal hij gewis moeilijk in aanmerking kunnen komen, omdat hij, door de, bij eene geringe warmte plaats hebbende weekwording, zich niet tot het maken van vernissen aanbeveelt, en het gebruik van denzelven, in plaats van gewone hars, door de meerdere kostbaarheid, welke het vervoer zoude veroorzaken, belet zal worden.

## II. RETINODENDRON PAUCIFLORUM. KHS.

R. foliis oblongo-ovalibus obtuso-acuminatis basi acutis, inflorescentiâ racemoso-paniculatâ, stigmatibus capitato.

ARBOR speciosus; CORONA aperta; RAMI subteretes, griseo-fusei, glabri, foliorum ciliatis tuberculati; RAMULI subcompressi, fusei, sparsim lepidoti. FOLIA oblonga vel oblongo-ovalia, breviter obtuse-acuminata, basi acuta, raro obtusiuscula, supra nitida, subtus sparsim lepidota, coriacea, 5" lata, 13" longa; nervis primariis in angulo 45°, distantibus, 12 ad 16, secundariis et venis uti in praecedente specie; PETIOLI subteretes, supra canaliculati, sparsim lepidoti, 1,5" longi. GEMMAE compressae, obtusae, dense griseo-fusco-lepidotae. INFLORESCENTIA axillaris, pauciflora; sparsim lepidota; PEDUNCULUS COMMUNIS compressus, saepe aneeps; PEDUNCULI eadem formâ, alterna; PEDICELLI breves, 2" longi, compressi vel tetragoni. BRACTEAE minutae, 1" longae, ovatae, obtusiusculae, intus glabrae, extus lepidotae. CALYX tubo basi rotundato, limbo quinquepartito, aestivatione subvalvata; partibus ovatis, breviter obtuse-acuminatis, intus glabris, extus dense lepidotis. COROLLA pentapetala, aestivatione convoluta, petalis lineari-oblongis, subfalcatis, obtusis, extus sublepidotis, intus glabris, carnosissimis, 7" longis, 2,5" latis. STAMINA eodem numero et dispositione praecedentis speciei; ANTHERAE ovatae, locellis exterioribus majore-

ribus, connexivè glandulâ acutiuseulâ terminato. OVARIIUM formâ et structurâ haud a praecedente diversum. STYLUS trisulcatus, glaber. STIGMA capitatum, apice truncatum vel subrotundum.

*Crescit juxta Indrapoera: SUMATRA.*

Deze soort verschilt van de vorige door den minder langwerpigen vorm, de niet zoo talrijke en ook schuiner loopende nerven en de mindere beharing der bladen, door de kleinere bloemen, en den gaven, knopvormigen stempel, en wijkt door dit laatste kenmerk ook van *R. lanceaefolium* (Vateria Roxb.) af, bij hetwelk de stempel verdeeld of diep getand is. Zij levert vermoedelijk een gedeelte van den dammar of hars, die in de omstreken van Indrapoera verzameld wordt.

## DIPTEROCARPUS. GAERTNER, ROXBURGH, BLUME, ENZV.

De kenmerken, door den Hoogleraar Blume in de Flora Javae opgegeven, bepalen zeer juist de gewassen, welke in het geslacht *Dipterocarpus* moeten geplaatst worden. Zij sluiten het geslacht *Dryobalanops* uit, hetwelk de Heer Lindley met *Dipterocarpus* vereenigt (\*). Bij *Dryobalanops* zijn de deelen van den kelk alle tot gelijkvormige, langwerpige slippen uitgegroeid, en ontstaat, door de afwijkende nervuur der bladen en ook door de gedaante der nevenblaadjes, welke veel overeenkomst met die van *Retinodendron* bezitten, een geheel ander aanzien. Even zoo verwijderen zij het geslacht *Caryolobus* Gaertner (†), hetwelk tot dusverre alleen door de vrucht bekend is en waarschijnlijk nabij of tot *Hopea* of *Vatica* behoort (§).

### I. DIPTEROCARPUS BAUDII. KHS.

D. foliis obovatis acuminatis basi subeordatis supra in nervo mediano subtus in nervis stellatim pilosis, gemmis lineari-oblongis obtusis compressis pilosis, calycis fructiferi partibus majoribus oblongo-linearibus obtusis sparsim pilosis.

ARBOR excelsa, saepe alta 36 metrarum; TRUNCUS rectus, fere cylindricus, cortice albeseente, lacvi raro rimoso, ligno flaveseente demum fusco, valde resinoso; CORONA hemisphaerica, basi truncate; RAMI patentes, teretes, glabriusculi, fusei, saepe fureati; RAMULI subteretes, annulati, fusei, flavo-hirsuti, setis fasciculatis; RAMULI NOVELLI compressi, densissime flaveseente-hirsuti. FOLIA obovalia, obovata, vel ovalia, breviter acuminata, basi obtusa vel subeordata, undulata; juniora supra in nervo mediano dense et in superfieie sparsim pilis longis, simplicibus tecta, subtus in nervis mediano et primariis dense pilosa, et in nervis secundariis pilis stellatis tecta; adultiora supra in nervo mediano dense pilosa, subtus in nervo mediano et in nervis primariis fascieulatim-pilosa, et in nervis secundariis et venis stellatim-

(\*) Natural System, 2 ed. p. 98.

(†) Gaertner, de fructibus et seminibus plantarum, p. 215, tab. 45.

(§) In de dertiende aflevering der Genera van den Heer Endlicher, welke ik bij het ter perse leggen van dit blad ontving, heeft deze Schrijver, op bl. 1014, de *Lophira* onder den naam *Lophiraceae*, aan het einde van de familie der *Dipterocarpeae* geplaatst.

pilosa; coriacea, 21" longa et 12" lata, nervis mediano et primariis prominentibus, posteris eum primo saepe in angulo 45° ad 55°, paulo a margine incurvis, nervis secundaris subparallelis approximatis, venis reticulatis; PETIOLI semi-teretes, supra plani, dense pilosi 3" longi. GEMMAE lineari-oblongae, obtusae, subcompressae, pilis longis fasciculatis, et granulis munitae, intus glabrae: GEMMAE FLORUM subteretes, acutiusculae. INFLORESCENTIA axillaris, centri-peta; PEDUNCULUS COMMUNIS 5 ad 8 florus, flexuosus, basi subteres, pilis flavis longis fasciculatis, parte floriferâ compressus, pilis eanis brevioribus adpressis; PEDUNCULI subdistichi, breves, pilosi; CALYX tubo campanulato, intus infra faucem glabro, extus dense pilis stellatis tecto; limbo dense piloso, inaequale quinque-partito, partibus tribus minoribus obtusis, et duabus majoribus linearibus, obtusis vel acutiusculis, saepe in medio subcarinatis, aestivatione plieato-valvata. COROLLA pentapetala, aestivatione convoluta; petala basi in tubum convoluta, apice rotatim patentia, oblonga, obtusa, basi angustata; intus glabra, extus pilis stellatis, carnea, rosea. STAMINA indefinita saepe 30, biserialia, basi coalita, ante anthesin versus apices contorta; FILAMENTA linearia, carinata, glabra; ANTHERAE lineares, locellis subaequalibus, ab apice ad basin dehiscens, connexivo apice in subulam sat longam, et basi in appendicem linearem bi-auriculatum producto, in filamentum articulato. OVARIUM hemisphaericum, versus apicem attenuatum, dense pilosum, trilobulare; OVULA geminata, subcollateralia, descendens, paulum infra verticem affixa, oblonga, dorso rotundata, lateribus planiuscula, ventre carinata, basi rotundata; STYLUS subteres, pilosus; STIGMA simplex. FRUCTUS induviatus calyce cum tubo subgloboso, basi rotundato, piloso et cum limbo inaequaliter partito, partibus tribus minoribus subrotundis, obtusissimis, duabus majoribus oblongo-linearibus, obtusis, asperis, sparsim pilosis, coriaceis, saepe 20" longis, 2,5" latis, trinerviis et reticulato-venosis; ovoideus, versus apicem attenuatus, basi subrotundus, parte inferiore pilis longis et superiore pilis brevioribus munitus; epicarpio coriaceo, sarcocarpio fibroso, endocarpio subcartilagineo, fragili; abortu unilocularis; PARS PLACENTARIS vel pars remanens axis ovarii pariete fructus arete adpressa linearis. SEMEN cavitatem fructus complens, fere ovoideum, inversum, glabrum; TESTA subcoriacea, fusa; mesospermium tenue cum quibusdam vasis resinâ impletis; TEGMEN membranaecum; HILUM micropylae approximatum, chalazae fere oppositum; RAPHE in uno latere seminis partita et anastomosata. ALBUMEN nullum. EMBRYO erectus; RADICULA subteres, partim inter cotyledones recondita; COTYLEDONES implicato-convoluti, arete cohaerentes.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Tab. 5. 1. Gemma floris. 2. Flos ante anthesin calyce ablato. 3. Petalum. 4. Stamina calyce et corollâ ablatis. 5. Tria stamina introrsum visa, medium ad seriem anteriorem pertinet. 6. Sectio transversalis antherae. 7. Pars endothecii valde aucta. 8. Ovarium. 9. Sectio longitudinalis ovarii. 10. Sectio transversalis ejusdem. 11. Ovulum verticaliter sectum. 12. Ovulum adultius verticaliter sectum cum Embryone juvenili. 13. Fructus cum calyce excreto. 14. Fructus, partim denudatus. 15. Semen fructus parte cinctum. 16. Sectio longitudinalis seminis. 17. Fasciculus pilorum. 18. Pars folii aucta. 19. Pars petali aucta.

Onder de talrijke door ons, op de westelijke helling van het beoosten Padang gelegen gebergte, verzamelde gewassen, is de hierboven beschreven boom een der schoonste en aanzienlijkste. Hij bezit niet zelden stammen van dertig ellen, bereikt met zijne groote, uitgebreide kroonen zes-en-dertig ellen hoogte, en is door de groote, glanzige bladen en lielevormige bloemen van de hem omringende eiken onderscheiden.



Met dezen maakte hij, op enkele minder hellende plaatsen, den hoofdboom van het bosch uit, of groeide in gezelschap langs de kleine bergbeken, tot op eene hoogte van ongeveer 800 ellen.

Daar hij tot dusverre in het wetenschappelijk stelsel onbekend was, heb ik, bij zijne benoeming, de gewenschte gelegenheid te baat genomen om eenen naam te huldigen, die ieder, wien de bevordering en uitbreiding der kennis van de gesteldheid en voortbrengselen der Nederlandsch-Indische gewesten ter harte gaan, belangstelling inboezemt, en om tevens opentlijk eenen verschuldigten dank te brengen aan Zijne Excellentie, den Heer J. C. Baud, thans Minister van Marine en Koloniën, vroeger Gouverneur-Generaal der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, als goedgunstig beschermer van de natuurkundige Commissie in die gewesten.

## II. DIPTEROCARPUS TRINERVIS. BL.

*D. foliis ovalibus aetiusculis basi subrotundatis gemmisque linearibus attenuatis glabris, calycis fructiferi laciniis majoribus oblongo-lanceolatis obtusis, minoribus ovatis obtusis.*

Blume, Catalogus Horti Bogoriensis, p. 78; Verhandelingen van het Bat. Genootschap, IX. p. 178; Bijdr. tot de Flora van Neêrlandseh-Indië, p. 223; Flora Javae, fasc. VII.

*Crescit in silvis montanis: JAVA.*

Deze soort, welke in de Flora Javae afgebeeld en beschreven is, werd tot heden alleen op Java gevonden, en groeit daar, met de aan haar verwante *Dipterocarpus retusus*, Bl., in de bosschen van den Salak, Probakti, Gédé enzv., tusschen eene hoogte van 600 en 1200 ellen. In deze groeiplaatsen bereikt zij, even als de verwante soort, niet zelden bij eenen omvang van vijf tot zes, eene hoogte van 40 Nederlandsche ellen, en verbergt zij hierdoor hare wijd uitgespreide, naar den omtrek digt met bladeren voorziene kroonen, boven en tusschen het loof van de andere boomen.

Al de soorten van *Dipterocarpus* zijn bij de Sundanezen onder den naam *Palaglar* bekend (\*). Behalve dezen geslachtsnaam heeft iedere soort, voor zoo ver zij dezelve onderscheiden, nog eenen tweeden naam. De *D. trinervis* wordt door hen *Palaglar Mienjak* genoemd — *Mienjak* beteekent olie of vet — wegens de aanzienlijke hoeveelheid balsem, die bij eene inkapping uit het hout vloeit. Deze vloeistof

(\*) Het woord *Palaglar* kan met vleugelvrucht vertaald worden. Het bestaat uit de woorden *Pala* en *Glar*: het eerste is mij als Sanskrit bekend, en beteekent vrucht; het andere, vermoedelijk uit dezelfde taal afkomstig, vertaal ik door vliegen: om de daarin voorkomende bewegende, verwijderende *g*, de zwevende *l*, en de eindsyllabe *ar*, welke, volgens Hamaker, uit *r'i*, bewegen, ontstaan is. Voor de beteekenis van het tweede woord, zoude ik nog het latijnse *volare*, dat zeker met *glar* verwant is — de *g* gaat toch dikwerf in *v* over: men denke aan het hollandsche *ga* en het fransche *va* — kunnen bijbrengen. — Wat het woord *Pala* betreft, dit is bij de Maleijers, voor vrucht minder in gebruik. Zij zeggen hiervoor meestal *Boea*, hetwelk van het Sanskrit *Boe*, zijn of worden, afkomstig is. Aan hetzelfde is *Pala*, naar den dichterlijken geest der Oostersche talen, verwant. Dit toch bestaat uit de woorden: *Pa*, hetwelk door verkorting uit *Boea* ontstaan is, en uit de zwevende *l*, en kan dus beschouwd worden, als een *zwevend zijn of worden* te kennen gevende. Kan men de vrucht, welke de kiem insluit, dichterlijker aanduiden?

verhardt door de aanraking met de lueht tot eene licht gele, bij eene geringe warmte week wordende hars. Als zoodanig wordt deze zelfstandigheid door de inlanders verzameld en tusschen palmbladen gewikkeld, om als flambouwen te kunnen dienen. Deze flambouwen geven bij het branden eenen aangename geur, en worden, volgens het zeggen der inlanders, om die reden met voorkeur gebezigd, bij het wegnemen van de eetbare nesten der zwaluwen uit de hollen van het kalkgebergte.

Behalve in de bosschen, heb ik deze soort ook in den tuin van Buitenzorg, waar zij in 1823 door den Hoogleeraar Blume was overgebracht, waargenomen. Zij groeide hier zeer welig en had, in 1836, eene hoogte van twaalf ellen. Omstreeks juni van dat jaar vielen hare bladen, meer dan in vroegere maanden af en ontwikkelden zich de eerste bloemen. Zij waren niet zeer talrijk. Haar licht rozenroode tint en tamelijk groote lelicaechtige vorm behaagden niet minder aan het gezigt, dan de heerlijke vanieljegeur, welken zij des avonds en des morgens uitwasemden, aan den reuk. Zeer kortstondig versehaften zij dit genot: want twee of hoogstens vier dagen na de opening, vielen de meeste bloemen geheel en van enkelen alleen de bloemkroonen af. Hierdoor bleven er aan iederen tros een of twee vruchtbeginsels ter rijping over.

### III. DIPTEROCARPUS LITTORALIS. BL.

D. foliis ovalibus acutis basi subcordatis ad costam utraque pubescentibus, gemmis elongato-conicis sericco-villosis, calycis fructiferi laciniis majoribus clongato-lanceolatis obtusis vel acutis. (Ramuli glabri).

Blume, Bijdr. p. 224. Flor. Javae l. c. p. 17. Tab. IV.

*Crescit ad flumen Tjiboebaloekan: JAVA.*

Door den Heer Blume, en ook later door mij, werd deze soort aan het zuiderstrand van Java, in eene standplaats gevonden, die zeker hare oorspronkelijke niet is. Zij behoort veeleer aan de zuidelijke afhellingen van den 2300 ellen hoogen Papandayang of aan den 3000 ellen hoogen Tjikoerai, waar het stroomgebied van den Tjiboebaloekan, of wel aan den zuidelijk afdalenden voet van den Tjerimai, waar de Tjitandui als bergstroom zijnen oorsprong heeft, en is vermoedelijk alleen aan de monden dezer rivieren, door de naar dezelve afgespoelde vruchten, voortgekomen.

### IV. DIPTEROCARPUS ELONGATUS. KHS.

D. foliis ovalibus acutis basi obtusis, gemmis lineari-oblongis hirsutis vel pilosis. (Ramuli dense hirsuti.)

ARBOR adulta speciosa, eoronâ expansâ, junior eoronâ oblongâ. RAMI arboris junioris teretes, glabri, fusei; RAMULI novelli dense fuseo-pilosi; adultiores faseieulatim pilosi. FOLIA arboris junioris ovalia, vel ovali-oblonga, breviter aeuminata, basi rotundata vel subeordata, undulata, supra glabra, subtus praesertim in nervo mediano et primariis prominentibus dense pilosa, pilis adpressis, eoriaeea, 60" longa, 18" lata; PETIOLI semi-teretes, supra plani, dense pilosi, 2" ad 6" longi: FOLIA arboris adultioris latiora,

rigidiora. GEMMAE lineari-oblongae, subcompressae, fusco-pilosae. STIPULAE lineari-oblongae, obtusiusculae, intus glabrae, saepe 30" longae, admodum deciduae.

*Crescit ad flumen Baritto, et in monte Sakoembang: BORNEO.*

Deze soort, welke zeer na aan *D. littoralis*, Bl. verwant is, kan van dezen, door de digte beharing der jonge takken en door de meer uitstekende nerven der bladen, gemakkelijk worden onderscheiden. De door ons gevondene planten waren aan de Poenin-rivier, een' zijtak van de Baritto, vermoedelijk uit afgespoelde zaden opgekomen, en bevonden zich aan den berg Sakoembang in hare natuurlijke standplaats.

## V. DIPTEROCARPUS TAMPURAU. KHS.

*D. foliis oblongo-ovalibus breviter acuminatis subcordatis supra subtusque praesertim margine pilosis, gemmis dense pilosis, laciniis majoribus calycis fructiferi oblongo-linearibus et minoribus subrotundis obtusis.*

ARBOR excelsa, saepe 30 ad 35 metrarum alta; TRUNCUS rectus, cylindricus; cortice sat crasso, fusco-griseo, laevi, raro rimato tectus; CORONA ampla, hemisphaerica, basi truncata; RAMI patentes. FOLIA oblonga vel oblongo-ovalia, breve acuminata, basi obtusa vel subcordata, margine integerrima vel subcrenulata, supra nitida, sparsim pilosa, in nervo mediano et subtus in eodem et in nervis primariis stellatim pilosa, 20" longa, 9" lata, eoriacea; nervis primariis in angulo 70° ad 80°, secundariis subparallelis. STIPULAE oblongo-lineares, obtusiusculae, intus glabrae, extus dense fusco-pilosae, subeoriaceae, 11" longae, 1,5" latae, 8 ad 10 nerviae. CALYX exsertus, tubo fructum circumdante subgloboso, basi rotundato, vel depresso, glabro; limbo inaequaliter quinquepartito, partibus duabus majoribus oblongo-linearibus, obtusis vel retusis, glabris, eoriaceis, trinerviis, 13" longis, 3" latis; partibus tribus minoribus subrotundis, obtusissimis, glabris, eoriaceis, 2" longis, 1,5" latis. FRUCTUS ovoïdeus basi rotundatus, in vertice attenuatus, parte inferiore glaber, parte superiore dense adpresso-pilosus, abortu monospermus, caetera et SEMINIS forma et structura haud a DIPTEROCARPO BAUDII diversae sunt.

*Crescit ad flumen Baritto: BORNEO.*

De boven beschrevene soort vershilt van *D. trinervis* door de behaarde knoppen; van *D. Baudii* door de meer verlengde gedaante der bladen en het stomper einde der groote kelk-slippen, en van *D. retusus* door de spitsere toeloopende noot.

Zij is, bij de bevolking van Banjermassing en van de binnenlanden, onder den naam *Tampoerau* bekend. Het is mij echter gebleken, dat deze naam wel in het bijzonder, maar niet uitsluitend op haar wordt toegepast, dewijl ook andere boomen met sterk geribde bladen, Dilleniaceae, mij onder de benaming *Tampoerau* zijn aangeduid. *D. Tampurau* groeit vermoedelijk in het gebergte, dat het groote stroomgebied van de Baritto begrenst, en is, even als *D. elongatus* en *D. littoralis*, alleen uit afgespoelde zaden langs den Baritto-stroom opgekomen. Hij is hier niet zeer menigvuldig, en werd door ons voornamelijk in de nabijheid van den mond der, uit het oosten komende en in de Baritto vallende Karrau-rivier waargenomen. Op deze groeiplaats stond hij in gezelschap van Myrtaceae, Anonaceae enzv.

Door eene aanzienlijke hoogte, soms van 30 en meerdere N. ellen, verhief hij zich boven deze hem omringende gewassen, en reeds in de verte waren zijne regtstandige stammen en de, bij onzen riviertoegt in september, bijna bladerlooze kroonen duidelijk te onderscheiden.

Door dit gemis van bladeren werden wij te spoediger op de oorzaak der algemeene bekendheid dezer boomen opmerkzaam. Hunne kroonen droegen eene menigte verspreide klompen, welke, volgens de mededeeling der inboorlingen, door eene kleine soort van bijen vervaardigd worden. Het schijnt, dat die diertjes bij voorkeur deze, doch bij gemis derzelve, ook andere hooge boomen, zoo als *Parkia*, *Elaeocarpus* enzv., tot hunne verzamelplaats kiezen; misschien om hunne woning des te gemakkelijker terug te kunnen vinden, of wel om zich tegen de roofzucht van hunnen vijand, den maleischen beer, te beschermen. Aan de *Karrau* had iedere *Tampoerau* zijnen eigenaar, en werden deze boomen als eene zeer voordeelige bezitting en aanzienlijke erfenis beschouwd. Ieder derzelve leverde jaarlijks, volgens de opgave der inlanders, voor 5 tot 10 en soms meerdere gulden aan honig en was op. Ter verkrijging van deze hoog geplaatste voordeelen, bedienden zich de eigenaars van ladders, die tot in de kroonen reikten; eenige dezer ladders hadden sporten, van welke het eene einde in den boom geslagen en het andere aan een' uit de kroon nederhangenden rotting verbonden was; anderen waren alleen van rotting vervaardigd en hingen geheel vrij uit de kroonen af. In weêrwil dezer hulpmiddelen ter bestijging, kon ik geene takken verkrijgen, omdat aan den een' mijner begeleiders de beklimming, als eene schennis van het regt van eigendom, verboden, en aan den ander' de verontrusting der bijen, welke aan zekere personen gewend zijn, een te gevaarlijk en zeker niet ongewroken waagstuk toescheen. Ten einde dus de denkbeelden der inlanders, wier goede gezindheid bij de voortzetting van onzen togt zoo noodig was, niet te kwetsen, vergenoegde ik mij, met de onder de boomen gelegene vruchten en bladen te verzamelen.

## VI. DIPTEROCARPUS MARGINATUS. KHS.

*D. foliis oblongo-ovalibus acuminatis basi obtusiusculis margine pilosis, gemmis teretibus obtusis dense pilosis.*

ARBOR, *fide indigenarum*, speciosa, ampla, trunco recto, griseo, coronâ expansâ. — ARBUSCULA 10 pedalis; TRUNCUS rectus, cylindricus, laete fuscus; CORONA semi-ovoïdea, dense foliata; RAMI teretes, annulati, glabri, griseo-fusci; RAMULI teretes, annulati, dense fusco-pilosi, pilis caducis, fasciculatis, longis. FOLIA oblongo-ovalia, acuminata, basi obtusiuscula vel cordatim emarginata, coriacea, 30" longa, 8" lata, nervo mediano et nervis primariis prominentibus; juniora margine, supra in nervo mediano, subtus praesertim in nervis dense pilosa; adultiora fere glabra; PETIOLI subteretes, prope foliorum basim incrassati et articulati, dense pilosi, 3" longi. GEMMAE teretes, obtusae, fusco-pilosae. STIPULAE lineares, obtusiusculae, intus glabrae, extus pilis fasciculatis vestitae, 8" longae, 7" latae, 3-4 nerves, deciduae.

*Crescit in monticula Bahai: BORNEO.*

Alleen op den, uit eene jonge tertiaire formatie bestaanden heuvel Bahai, werd deze soort door mij als kleine boompjes gezien. Zij is, volgens het zeggen der inlanders, zeer menigvuldig op de meer van de

rivier verwijderd gelegene bergreeks, van welke de Bahai een voorgebergte vormt, en was op de Bahai verdwenen, ten gevolge van het menigvuldig gebruik der houtskolen van deze boomen, voor de nabijgelegene ijzersmelterijen. Voor het branden van dezelve kiezen de inlanders bij voorkeur het hout dezer boomen: waarom? dit durf ik niet beslissen; alleen is het mij niet onwaarschijnlijk voorgekomen, dat de eigenschap, welke dit hout bezit, van eenige dagen na de omkapping reeds tot kolen gebrand te kunnen worden, tot deze voorkeur veel kan bijdragen.

## VII. DIPTEROCARPUS HASSELTII. Bl.

D. foliis ovalibus ovatisve acutiusculis basi obtusis utrinque, gemmis cylindricis attenuatis glabris, calycis fructiferi laciniis majoribus oblongis obtusis, minoribus obtusis.

Bl. Flora Javae l. c. p. 22. Tab. VI.

CALYX tubo campanulato, basi quinque sulcato, intus et extus glabro; limbo dense pubescente inaequaliter quinque-, raro sexpartito, partibus minoribus tribus vel quatuor triangularibus, acutiusculis; majoribus lincari-oblongis, obtusis, dense pubescentibus, excrescentibus. COROLLA pentapetala, basi petalorum approximatione tubulosa, limbo rotato, petalis obovale-oblongis, obtusis, saepe falcatis, intus glabris, extus lepidotis, subcoriaceis, 4" longis, 1" latis, laete roseis. STAMINA indefinita, bi- vel triseriaria; FILAMENTA linearia vel oblongo-linearia, glabra; ANTHERAE lanceolatae, locellis inaequalibus, interioribus paulo brevioribus; connexivo apice in subulam pubescentem et basi in appendicem linearem, biauriculatam producto. POLLEN sphaericum. OVARIUM sessile, subtrigonum, attenuatum, pubescens, triloculare, loculis biovulatis; OVULA subcollateralialia; STYLUS subteres, pubescens; STIGMA truncate. CAETERA in Flora Javae descripta.

*Crescit in provincia Bantam: JAVA, et ad montes Pamatton et Balaran: BORNEO.*

Deze soort is het eerst door van Hasselt, in de residentie Bantam op Java, gevonden en nu ook door ons op Borneo, aan den berg Pamatton, op 50 ellen, en aan den berg Balaran, tusschen 100 en 600 ellen, aangetroffen. Het is tot dusverre de eenige soort van deze familie, welke op de beide eilanden werd waargenomen.

## ANISOPTERA. Khs.

CALYX semi-superus, quinque partitus; partes omnes admodum exerescentes, duae in alas foliaceas expansae. COROLLA pentapetala, aestivatione convoluta. STAMINA 25, biserialia; FILAMENTA basi coalita; ANTHERAE oblongae, locellis inaequalibus, exteriores longiores, connexivo in laminam acuminatissimam producto. OVARIUM calyce coalitum, triloculare; OVULA geminata, subcollateralialia, descendentialia; STYLUS subteres, crassus; STIGMATA tria. FRUCTUS calyce excreto cinctus, abortu unilocularis. SEMEN unicum fructus cavitatem explens; TESTA subcoriacea; TEGMEN membranaceum. EMBRYO erectus, radiculâ terete, cotyledonibus inaequalibus, involutis.

ARBORES. FOLIA oblonga, coriacea, nervosa. STIPULAE liberae, minutae. FLORES axillares, paniculati, albidi.

Het geslacht *Anisoptera* bevat drie zeer verwante soorten. Eene derzelve behoort tot de door Zippelius op de zuid-westkust van Nieuw-Guinea verzamelde gewassen, en is door dien ijverigen Kruidkundige als *Dipterocarpus parviflorus* beschreven (\*). De beide anderen zijn door ons in de gebergten van het zuid-oostelijk gedeelte van Borneo gevonden. Zij groeiden daar, van eene slechts weinig boven zee verhevene hoogte, tot op ongeveer 300 ellen, en behoorden tot de in gezelschap wassende boomsoorten. Door hare groeiwijze zijn zij aan *Dipterocarpus* en *Dryobalanops* verwant; door hare kenmerken echter van deze beiden genoegzaam onderscheiden. Van de soorten des eerstgenoemden geslachts verschillen die van *Anisoptera* door den vorm en de groeiwijze der nevenblaadjes, des kelks, der bloemkroon, der stuifdraden, en door de zaamgroeiing van een gedeelte der vrucht met den uitgegroeiden kelk. Van *Dryobalanops* wijkt *Anisoptera* af door de vruchten, vooral door den vorm van den uitgegroeiden kelk.

#### I. ANISOPTERA MARGINATA. KHS.

A. foliis oblongo-ovalibus acutiusculis basi obtusis glabris, nervis distantibus.

ARBOR speciosa; RAMI teretes, fusci, glabri; RAMULI compressiusculi, fusco-leprosi. FOLIA ovalia vel oblongo-ovalia, acutiuscula, basi obtusa, truncata vel subcordata, utraque glabra — juniora subtus pubescentia — coriacea, 4,5" lata, 8,5" longa, nervis primariis prominentibus, distantibus, nervis secundariis reticulatis; petioli 1,5" longi, subtetragoni, glabriusculi. GEMMAE ovatae, acutae, pubescentes. INFLORESCENTIA axillaris, paniculata; PEDUNCULUS COMMUNIS compressus, fusco-pubescentis; PEDUNCULI PARTIALES et PEDICELLI subdistichi, alterni, obscure trigoni vel tetragoni, dense pilosi. CALYX profunde quinque-partitus; partes triangulares, acutae, extus dense pilosae, intus glabrae, 3,5" longae. COROLLA pentapetala, aestivatione convoluta; petala obovata, obtusiuscula, integerrima, intus glabra, extus partim pubescentia, membranacea, nervis palmatis. STAMINA 25, biserialia, saepe in serie exteriori 10; in serie interiori 15; FILAMENTA oblongo-linearum, basi coalita, glabra, brevissima; ANTHERAE oblongo-ovatae, pubescentes, locellis inaequalibus, exterioribus longioribus; connexivo in lamina acuminatissimo, producto; POLLEN sphaericum. OVARIUM semi-inferum, hemisphaericum, quinque sulcatum, pubescens, triloculare; OVULA geminata, descendencia, subcollateralis, infra verticem affixa. STYLUS crassus, teres, pubescens; STIGMATA tria, filiformia, patentia.

*Crescit in montem Pamatton: BORNEO.*

Tab. 6. 1<sup>a</sup>. Gemma floris. 2<sup>a</sup>. Flos apertus. 3<sup>a</sup>. Flos vi expansus. 4<sup>a</sup>. Petalum. 5<sup>a</sup>. Flos, calyce et corollâ ablatis. 6<sup>a</sup>. Stamen postice visum. 7<sup>a</sup> et 8<sup>a</sup>. Stamina antice visa. 9<sup>a</sup>. Pollen. 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>. Endothecium. 13<sup>a</sup>. Symetria floris.

(\*) De Hoogl. Blume heeft, gelijk ik in het Herbarium van Zippelius heb gezien, bij *Dipterocarpus parviflorus* Zipp. de aanmerking gevoegd, dat dezelve een nieuw geslacht kon vormen.

## II. ANISOPTERA COSTATA. KHS.

A. foliis ovalibus breve acuminatis basi obtusis subtus pubescentibus, nervis approximatis.

ARBOR speciosa; CORONA conica, aperta; TRUNCUS rectus, cylindricus, cortice griseo tectus; RAMI patentes, subteretes, glabri; RAMULI compressi, angulati, pubescentes. FOLIA ovalia, vel obovalia, breviter acuminata, basi obtusa vel subcordata, supra nitida, subtus pubescentia, coriacea, 7" lata, 13" longa nervis primariis patentibus, parallelis, prominentibus; PETIOLI subteretes, pubescentes, 2,5" longi. INFLORESCENTIA axillaris, paniculata; PEDUNCULUS COMMUNIS et PEDUNCULI PARTIALES compressi, dense pilosi; PEDICELLI teretes, pilosi, breves. CALYX profunde quinque-partitus, partibus ovatis, acutiusculis, extus dense pubescentibus, intus glabris. COROLLA mihi deest. STAMINA 25; biserialia; FILAMENTA linearia, basi latiora, connata, glabra; ANTHERAE ovato-oblongae, pubescentes, locellis inaequalibus, exterioribus longioribus, connexivo acuminatissimo. OVARIVM ad dimidiam partem calyce concretum, hemisphaericum, pubescens, triloculare; OVULA geminata, subcollateralia, descendencia; STYLUS subteres, glaber; STIGMATA tria, filiformia, patentia. CALYCIS excreti tubus hemisphaericus et limbus inaequaliter partitus; partes duae majores lineari-oblongae, obtusae, et tres minores oblongae, acutiusculae; omnes trinerves, pubescentes. FRUCTUS calyceis tubo concretus, stylo coronatus, hemisphaericus, pubescens, abortu unilocularis, monospermus. SEMEN immaturum cavitatem fructus explens, subglobosum; TESTA subcoriaceo; TEGMEN membranaceum. EMBRYO erectus; RADICULA teres, acuminata; COTYLEDONES inaequales reniformes.

*Crescit in montem Sakoembang: BORNEO.*

Tab. 6. Figura speciei. 1. Ovarium, integumentis floralibus ablatis. 2. Ovarium verticaliter sectum. 3. Ovulum. 4. Ovulum juvenile cum raphe libera. 5. Ovarium adultius verticaliter sectum. 6 et 7. Fructus verticaliter sectus. 8. Semen. 9. Embryo.

---

 DRYOBALANOPS. GAERTNER, COLEBROOKE, W. JACK.

CALYX monophyllus, quinque-partitus, laciniis lineari-lanceolatis, patentibus. COROLLA pentapetala, petalis basi junctis, ovato-lanceolatis, calyce longioribus. STAMINA hypogyna plurima, monadelphica, longitudine fere calycis; FILAMENTA in anulum brevem coalita; ANTHERAE conniventes, supra tubum filamentorum subsessiles, lineares, acutae, mucrone membranaceo, biloculares. OVARIVM superum, ovatum, in stylum attenuatum, triloculare; loculis biovulatis; STYLUS filiformis; STIGMA capitatum (W. JACK). CALYX FRUCTIFER liber, tubo cupulari, limbo in alas quinque foliaceas, aequales, multinerves. CAPSULA cupulae calycinae semi-immersa, unilocularis, trivalvis, monosperma. SEMEN inversum, fructum explens. EMBRYO exalbuminosus, erectus; cotyledonibus inaequalibus, contortuplicatis, partem remanentem axis fructus amplectentibus, subcarnosis; plumulâ conicâ; radiculâ teretiusculâ.

ARBORES. FOLIA alterna vel opposita, coriacea. STIPULAE caducae. FLORES paniculati, terminales vel axillares.

Het geslacht *Dryobalanops* werd door Gaertner (de *Fructibus* III. pag. 49. T. 186. f. 2) gevormd naar eenige vruchten, die in de verzameling van den Engelschen Maecenas der Kruidkunde, J. Banks, voorhanden en als van Ceylon afkomstig opgegeven waren. Colebrooke nam hetzelfde bij zijne beschrijving van den Kamferboom (*Asiat. Research.* XII. p. 536) aan. Door anderen, welke niets meerder van de plant kenden, werd het niet aangenomen; door Roxburgh tot *Shorea* (*Vatica* L.), en door Lindley tot *Dipterocarpus* gebracht. W. Jack, gelegenheid gehad hebbende om niet alleen de vrucht, maar ook de bloemen te onderzoeken, vereenigde zich met het gevoelen van Gaertner, en leverde eene beschrijving van de vroeger onbekende bloemdeelen, welke ik onder het bovenstaande kenmerk heb medegedeeld (W. Jack in Hooker, *Companion to the Botanical Magazine* I. pag. 364). Dat kenmerk toont aan, dat *Dryobalanops* genoegzaam van *Dipterocarpus* en ook van *Anisoptera* onderscheiden is en tot deze geslachten staat, als *Vatica* tot *Hopea*. In hetzelfde heb ik, voor hetgeen Gaertner *Columna centralis*, en de Heer Endlicher (*Genera* n. 5393) *Raphe crassiuscula* noemt, de uitdrukking *pars remanens axis fructus* gebezigd; omdat deze den aard van dit deel, de onuitgegroeide middelzuil, waaraan de wanden in het vruchtbeginsel verbonden zijn, en waardoor de voedingsvaten naar de eitjes gaan, volkomen uitdrukt (\*).

#### I. DRYOBALANOPS CAMPHORAE. COLEBROOKE.

D. foliis ovatis obtuse acuminatis basi obtusis subtus glabriusculis, stipulis ovatis acutis.

*Crescit prope Ayer Bangis, etc.: SUMATRA.*

Deze plant is het eerst door H. N. Grimm, gedurende zijn verblijf ter westkust van Sumatra, uit een wetenschappelijk oogpunt nagegaan, en in 1683 door eene beschrijving en ruwe, maar toch kenschetsende afbeelding, bekend gemaakt (*Ephem. Acad. Natur. Curios.* Dec. II. pag. 371). Van dezelfde streken werd zij door Macdonald als eene soort van *Laurus* beschreven (*Asiat. Research.* IV). Vervolgens maakte zij het onderwerp uit eener verhandeling van Colebrooke, waarbij eene beschrijving van den boom en van de vrucht werd medegedeeld, en deze laatste, benevens een tak, vrij juist afgebeeld. — De gedaante der nevenblaadjes, aldaar als lijnvormig toegespitst aangeduid, zijn op de door mij geziene voorwerpen eivormig puntig. — Bij dat bekende, voegde W. Jack (*Malayan Miscellanies*, overgenomen in Hooker *Comp. to the Botan. Magaz.* I. p. 264 enzv.) de beschrijving van de nog onbekende bloemdeelen, onder bijvoeging, dat deze plant in dezelfde familie met *Dipterocarpus*, *Shorea*, behoorde.

Volgens de reeds bekende en de mij door den Heer Osthoff medegedeelde berigten, groeit deze boom benoorden Ayer Bangis, tegen den voet der bergketen, als gezellig gewas, hetwelk eene aanzienlijke hoogte en eenen geëvenredigden omvang bereikt. Hij schijnt mij toe, naar de mededeelingen van dezen Heer, met dezelfde soorten van gewassen vereenigd te zijn, als de *Dipterocarpus Baudii*, bij Padang, en dus dezen in de noordelijker streken te vervangen.

(\*) Bij *Anisoptera costata*, Pl. 6, fig. 5, is deze kolom zeer duidelijk afgebeeld.



De jongere boomen heb ik, door de goedheid van de Heeren Franeis en van der Linden, van Ayer Bangis bekomen, en naar den tuin van Buitenzorg kunnen overbrengen. Zij groeiden daar zoo welig, dat zij in een jaar ruim anderhalve palm in lengte toenamen. Behalve dezen, zag ik in den tuin van den Heer van der Linden, welke bij Padang, zeer weinig boven zee verheven is, ongeveer 7 ellen hooge boompjes, met eene aanzienlijke groeikraecht. Deze boompjes hadden regt opgaande stammen, door eene min of meer donker bruine sehors bedekt, piramidenvormige kroonen, met naar den top allengskens korter wordende takken, en van onderen grijs-groen gekleurde, eivormige, toegespitste bladen. — Volgens de mij dienaangaande gegevene berigten, wordt de opsporing dezer boomen, ter verkrijging van den kamfer, door gebeden en offeranden aan den grooten geest, voorafgegaan. Bij dezelve vervult de *Toengoe-nyr-ka-poer*, welke meestal ook de offeraar is, eene aanzienlijke rol. Deze wordt, volgens het bijgeloof der Batta's, door droomen ingelicht aangaande den gepasten tijd van het vertrek der opspoorders, den door hen te nemen weg, en de kenmerken der gewensehte boomen. Zij verlaten zich geheel op de kunde van dezen leidsman, wiens verdiensten hoofdzakelijk bestaan in zijne dikwerf herhaalde boshwandelingen en in de meerdere of mindere gelukkige uitkomsten, die dezelve opleveren. Die wandelingen stellen hem gewis in staat om zich, door het kloppen der boomen, onder aanleuning van het oor, omtrent hunnen inwendigen toestand eenige zekerheid te verschaffen. Van dezen *Toengoe-nyr-ka-poer* vergezeld, begeeft zich een gezelschap boshwaarts. Ieder van hetzelfde heeft een gelijk belang bij het welgelukken van den togt, en allen zijn dus aandachtig met de opsporing van den boom bezig. Heeft men nu zulk een' boom gevonden, dan wordt hij door den gemelden *Toengo* onderzocht, en ontvangt hij van dezen de eerste inkapping, als bewijs zijner goedkeuring tot eene verdere behandeling. Vervolgens wordt, op ongeveer twee vademmen boven den grond, nog eene inkapping gedaan, welke tot het hart van den boom doordringt. Alsdan hebben zij den zetel der gewensehte kostbaarheden bereikt, van den kamfer namelijk en zijne olie. De olie wordt uit deze insnede door eene bamboezen buis, als door een gootje naar buiten geleid, en aldaar in eenen bamboezen koker of andere soort van vat opgevangen. Volgens de verzekering van sommige inlanders, zouden door de jonge boomen alleen *Mienjak kapoer* (kamferolie) of *Kapoer moeda* (jonge kamfer; aldus genaamd, omdat zij gelooven, dat deze olie naderhand in kamfer verandert) worden geleverd, en in de oudere boomen olie en kamfer aanwezig zijn. Zij besluiten uit eene aanzienlijke hoeveelheid der olie tot het aanwezen van den kamfer. Vinden zij derhalve eenen boom, die hun eene aanzienlijke hoeveelheid olie oplevert, dan maken zij de inkapping tot op het merg, waar gewoonlijk de kamfer ligt. Dusdoende sehenden zij talrijke, volgens sommigen dikwijls wel drie honderd boomen, eer zij er éenen vinden, die kamfer bevat.

Eens zulk eenen boom gevonden hebbende, wordt die, nadat de olie er uitgelopen is, waartoe soms wel drie dagen zouden vereischt worden, geveld. Vervolgens kappen zij den stam in blokken van ongeveer eene halve of geheele el lengte. Deze blokken worden daarna in kleine stukken gespleten, ten einde het opsporen en uitnemen van den kamfer gemakkelijker te maken. De groote stukken kamfer, welke voor de beste gehouden worden en onder den naam van *Tentorie* bekend zijn, worden in het midden van den stam, nabij het merg, in onregelmatige hollen gevonden. Zij zijn zelden zwaarder, dan 0,12 N. p., en gewoonlijk niet beneden het anderhalve lood. Kleine stukjes zijn tusschen het hout verspreid en komen daar als korrels of schilfertjes voor. Deze worden niet zelden van het hout afge-

schraapt, zijn minder zuiver en, ten gevolge der wijze van verzamelen, met houtvezels vermengd. Van deze beide soorten onderscheiden de inlanders, onder den naam *Oegar*, den kamfer uit boomen gewonnen, die vroeger olie hebben geleverd, en vervolgens gedurende eenige (6 à 8) jaren onaangeroerd zijn gebleven. — De opgaven omtrent de gewonnen wordende hoeveelheid uit eenen boom, zijn zeer uiteenloopende: volgens dezelve zouden sommige boomen slechts één Nederlandsch pond, anderen wel tienmaal zooveel opleveren. Maedonald zegt, uit één' boom 1,5 Ned. pond kamfer en 10 Ned. ponden olie gewonnen te hebben. De beste kamfer komt als eene half doorschijnende, korrelachtige, kristallijne stof voor, vervliegt bij eene warmte van 30 C. Gr. geheel of met achterlating van eene geringe hoeveelheid witte, harsachtige stof en is door een' terpentijnachtigen bijreuk, nog doordringender van geur, dan de Japansehe kamfer. Bij dezen echten, voor den uitvoer bestemden kamfer, komt op Sumatra nog eene andere soort, onder den naam *Kapoer-mati* (doode kamfer), voor. Deze scheidt zich uit de olie af, wanneer zij aan de luecht wordt blootgesteld, en is zeer weinig geacht. Zij schijnt mij toe, een mengsel van hars met eene geringe hoeveelheid kamfer te zijn. De kamferolie, zoo als zij uitgevoerd wordt, is licht geel gekleurd, bezit eenen reuk, welke naar dien eener oplossing van kamfer in terpentijn zweemt, en vervliegt met achterlating van eene harsachtige stof.

De naam *Kapoer* (\*) doet mij vooronderstellen, dat dit artikel bij de Batta's, eerst na hunne kennis-making met de Hindoes, is bekend geworden. Of zij, dan wel Hindoesche of Arabische kooplieden hetzelve in den handel met de Chinezen bragten, durf ik niet bepalen. Alleen is het genoegzaam zeker,

---

(\*) Dit voortbrengsel, hetwelk de Chinezen vroeger alleen van Borneo schijnen verkregen te hebben, draagt bij hen verscheidene namen. De een, *Lung-naou-hëang*: *Lung* (draak), *naou* (hersens), *hëang* (welriekende stof), dus *welriekende stof uit de hersens van den draak*, duidt de waarde van dit voortbrengsel aan: want het woord *lung* wordt altijd gebezigd voor hetgeen den Keizer betreft, en hoe konden zij een uitmuntend geneesmiddel beter aanduiden, dan door hetzelve als het uitvloeisel van het edelste gedeelte van hem, die volgens de denkbeelden der Chinezen, de verwezentlijkte almacht is, te beschouwen? Een ander, *Ping-pëen*: *Ping* (ijs) en *pëen* (splinters), dus *ijssplinters*, toont zeer juist het uitwendig aanzien der stof aan. En de derde, *Polo-hëang*: *Po-lo* (Borneo) en *hëang* (welriekende stof), dus *welriekende stof van Polo*, de plaats, van welke hetzelve afkomstig is: want dat *Polo* hetzelfde is als Borneo, is eene aan zekerheid grenzende onderstelling, omdat de Chinezen voor de *b* altijd de *p* bezigen, en de *r* altijd door de *l* uitspreken.

De Chinesche Kamfer daarentegen, is het voortbrengsel van eenen boom (*Laurus Camphorae*), die menigvuldig en zeer welig in de nabijheid van Sin-kin, in het landsehap Keang-se, groeit. De Chinezen noemen dezen boom *Cham moe*. — Het woord *moe* is door *hout* of *boom* te vertalen; deszelfs voortbrengsel, den Kamfer, noemen zij *Cham naou*. *Naou* beteekent *hersens*. — Uit de vergelijking dezer vershillende benamingen blijkt het reeds, welke hooge denkbeelden zij van den uit Borneo ingevoerden Kamfer hadden, en waarom deze hooger in prijs was, dan hun *Cham naou*. De kunst van raffineren was den Chinezen onbekend en vershafte langen tijd aan eenige Amsterdamsehe fabrieken aanmerkelijke voordeelen, die door de Chinezen voor het gezuiverd voortbrengsel werden betaald. Naar ik vermeen, wordt de geraffineerde Kamfer bij de Chinezen *Ping-pëen* genoemd.

Den gegeven' naam *Cham* vinden wij min of meer gewijzigd, in de namen, welke dit voortbrengsel in andere talen draagt, terug. In het sanskrit heet het *Kapura* of *Kampura*, en ons *Kamfer*, het fransehe *Camphre*, het engelsehe *Camphire*, zijn even als *Camphora*, aan dat woord verwant. Al deze woorden duiden dus op één hoofdwoord *Kam*, *Kar* of *Ka*, hetwelk in het sanskritsehe ons denkbeeld van *schudden*, *beven* enzv. uitdrukt. De andere beide syllaben, welke in *phora* en *fer* het best bewaard zijn, wijzen ons op het grieksehe  $\varphi\rho\rho\omega$  en  $\varphi\rho\rho\epsilon\omega$  en het latijnsehe *fero*, *ik draag*. Het woord Kamfer zoude alzoo het denkbeeld uitdrukken van een *dragen* of *voortbrengen van beving* of *schudding*; en heeft de Kamfer niet deze uitwerking op het ligehaamsgestel?

dat het in lateren tijd, blijkens de opgaven van Mareo Paolo, een belangrijk handelsartikel van Lambri en Fanfar (\*) was, dat van daar naar China werd overgevoerd. De kamfer was dus in dat tijdperk een handelsartikel van de oostkust van Sumatra, werwaarts hij, staande de grootheid van het rijk der Batta's, misschien wel over land vervoerd werd. Tijdens de eerste bezoeken der Europeanen op Sumatra, bevond zich de kamferhandel in handen der Atsjinezen, en de hoofdplaats voor den uitvoer was Baros; hiervan de naam *Kapoer-Baros*. Naarmate de magt der Atsjinezen verminderde, geraakte hij allengskens onder den invloed der Engelsche en Hollandsche kooplieden, en leverde hij hun aanzienlijke voordeelen op. De hoofdplaatsen, van waar hij gedreven werd, waren, na de Europese vestiging, Sinkel, Baros, Tapoes en Tapanoeli. Van deze plaatsen werd altijd een gedeelte naar Atsje en een ander gedeelte naar Padang gebracht. Van Padang zijn, in de jaren 1750 tot 1758, ongeveer 5780 halve Ned. ponden, en in latere tijden, na 1826, jaarlijks ongeveer 1250 halve Ned. ponden uitgevoerd. Indien de opgaven niet vergroot zijn, hetgeen ik echter vooronderstel, dan zoude er jaarlijks meer dan twee- en een halfmaal zooveel naar Atsje gevoerd worden. Van deze plaats wordt de kamfer naar Singapoera, en van Padang voornamelijk naar Batavia gezonden, om daar een artikel van handel met China te worden. De prijs van den kamfer bedroeg in 1750, te Padang, ruim 22 gulden per half Nederl. pond, en wisselde aldaar in de laatste jaren tusschen 25 en 30 gulden. Beaulieu kocht hem op Sumatra's westkust, in 1622, voor 28 gulden. Blijkens de opgaven van Macculloch (Schmidt, *Comptoir-Handbuch*, S. 252) was te Kanton, in 1836, de Baros-kamfer 57 gulden het halve Ned. pond, en ongeveer honderdmaal duurder dan de gewone kamfer. — In hoeverre deze hoogere waarde alleen aan eene eigenzinnige voorkeur der Chinezen, dan wel aan eene krachtiger werking als geneesmiddel zij toe te schrijven, is voor alsnog onbekend. De beslissing dezer laatste vraag werd, blijkens eene mededeeling van W. Jack, aan den Heer Hume voorgesteld. Is de uitslag van dat onderzoek ontkennend geweest, dan moeten wij den buitengewonen prijs aan eene vooringenomenheid der Chinezen toeschrijven en wordt dit artikel, alsook de vogelnestjes, door hen even duur aan ons betaald, als de thee aan hen door ons.

De kamferolie wordt bijna niet gebruikt. De Heer Macculloch stelt voor, om haar in plaats van terpentijn te bezigen. Ik geloof echter, dat de prijsverhoging, die door de minste aanvraag zoude veroorzaakt worden, dit gebruik zeer zoude in den weg staan.

Uit deze mededeeling blijkt het, dat de geheele behandeling enzv. van den kamfer, onder Indischen invloed staat. In hoeverre het wenschelijk zoude zijn, het verzamelen door middel van het omkappen der boomen, onder zekere beperkingen te brengen, en door destillatie en andere kunstbewerkingen het produkt te vermeederen enzv., durf ik, wegens gebrek aan plaatselijke kennis, niet beslissen.

---

(\*) Lambri (Marco Paolo, Boek III, Hoofdst. 15) wordt door Marsden voorondersteld het tegenwoordige Jambi te zijn, en Fanfar (Boek III, Hoofdst. 16) wordt door hem, vermoedelijk met regt, voor het nu als Kampar bekende gehouden.

## II. DRYOBALANOPS? SERICEA. KHS.

*D. foliis ovatis obtuse acuminatis basi obtusiusculis subtus in nervorum axillis pubescentibus.*

RAMI ARBUSCULAE teretes, pubescentes, fuscii. FOLIA ovata, obtuse acuminata, basi cuneata vel obtusiuscula, utraque glabra, subtus in nervorum axillis et in nervo mediano dense pubescentia, nervis prominentibus, 9" longa, 4,5" lata; PETIOLI 10" longi, teretes, pubescentes. GEMMAE oblongae, obtusae, pubescentes, minutae.

*Crescit ad montem Balaran: BORNEO.*

De groote overeenkomst van de beschrevene bladen met die van *D. camphorae*, heeft mij doen besluiten om de weinige verzamelde takjes met den bovengenoemden soortnaam te bestempelen. Of zij werkelijk van den boom zijn, welke den kamfer op Borneo levert, kan ik niet verzekeren (\*). Het blijft altijd nog eene vraag, of de vruchten, welke Gaertner en Houttuin hebben afgebeeld, tot dezelfde soort behooren als de door Colebrooke in plaat voorgestelde. De door Houttuin afgebeelde vrucht, welke met die van Gaertner groote overeenkomst bezit, schijnt van Borneo afkomstig te zijn en verschilt, door den vorm van den uitgegroeiden kelk, met de soort van Sumatra. Deze twijfel, omtrent de gelijkheid der soorten, heeft mij doen besluiten, om den naam van Colebrooke, bij de beschrijving der soort van Sumatra, boven dien van Gaertner te verkiezen.

## VATICA. LINN., WIGHT EN ARNOTT, ENDLICHER.

SHOREA. Roxburgh, Gaertner.

Bij de door bovengenoemde sehrijvers gegevene geslachtskenmerken behoef ik slechts te voegen, dat de hokjes der helmknopjes ongelijk, de beide buitensten de langste zijn, en dat de helmknoop in een verdeeld aanhangsel eindigt. Deze kenteekenen zijn belangrijk, omdat *Hopea* den helmknoop onverdeeld en de hokjes der helmknopjes even groot bezit.

Dit geslacht bevat de *Vatica* (*Shorea* Wall.) *robusta*, *V.* (*Shorea* Wall.) *obtusa*, *V. laccifera*, Wight en Arn. (*V. Indica*? Linn., *Sh. Talura*, Roxb.), *V.* (*Shorea* Roxb.) *Tumbugaia*, W. en A., en *V.* (*Shorea* Roxb.) *longisperma*, *V. lepidota* en *V. ovalis*. *V. Tumbugaia* (†), aan welke een honderdtal stuifdraden toegeschreven wordt, zal vermoedelijk bij een nader onderzoek blijken, een nicuw geslacht te kunnen vormen, en kan dan gevoegelijk den naam *Shorea* in het wetenschappelijk stelsel bijbehouden.

Deze soorten bewonen het schiereiland Dekan tot op 31° N. Br., Poeloe-pinang, Sumatra en Borneo, en leveren, behalve een deugdzaam timmerhout, eene aanzienlijke hoeveelheid dammar op. De beste van dezen dammar wordt, in plaats van wierook of benzoë, in de Hindoesche tempels gebezigd.

(\*) Over den kamferboom en den kamfer van Borneo geeft Boerhaave (*Historia Plantarum, quae in Hortu Aead. Lugd. Bat. crescunt*, pag. 456), uit welke bronnen is mij onbekend, eenige inlichtingen.

(†) Colebrooke bedoelt vermoedelijk deze soort met zijne *Shorea Zambuga* (*Asiat. Researches*, XII. p. 540).

## I. VATICA LEPIDOTA. KHS.

V. foliis ovatis acutis leprosis, stipulis falcato-ovatis, floribus paniculatis, calycibus subtomentosis.

ARBOR excelsa, trunco recto, cortice fusco vel nigrescente, coronâ late expansâ, basi truncatâ; RAMI patentés, teretes, nigrescentes; RAMULI compressi, fusci, dense leprosi. FOLIA alterna, ovata, acuta, basi obtusa vel subtruncata, supra glabra, subtus leprosa, coriacea, 5,5" lata, 10" longa, nervis primariis prominentibus, nervis secundariis parallelis, approximatis; PETIOLI 2" longi, subteretes, supra planiusculi, leprosi. GEMMAE compressae, falcato-ovatae. STIPULAE falcato-ovatae, acutiusculae, extus leprosa, intus glabriusculae, subcoriaceae, 5 ad 7 nerves, admodum deciduae. INFLORESCENTIA axillaris, paniculata, leprosa; PEDUNCULUS communis et pedunculi partiales compressi. BRACTEAE minutae, subrotundae, obtusae, membranaceae. FLORES subsessiles. CALYX pentasepalus, aestivatione imbricata; SEPALA ovata, acutiuscula, extus tomentosa, intus pubescentia, inaequalia, in alas excrescentia. OVARIUM hemisphaericum, pubescens, triloculare: loculis bi-ovulatis (vel 4-ovulatis). OVULA collateralia (dum 4, per paria superposita), apici loculi affixa; STYLUS brevissimus, subteres; STIGMA tridentatum, dentibus obtusis.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Deze soort behoort tot de fraaiste boomen, welke wij op de groote bergketen vonden, en is groepsgewijze langs de westelijke helling verspreid. Volgens de getuigenis der inlanders wordt zij aan de oostelijke of binnenzijde zeldzamer gevonden. Zij bezit een licht bruin, naar het roode hellend hout, hetwelk zich, volgens de inlanders, door buitengewone duurzaamheid aanbeveelt en, volgens onze ondervinding, ligte en zeer brandbare houtskolen oplevert.

## II. VATICA OVALIS. KHS.

V. foliis ovalibus acuminatis in nervis pilosis, stipulis ovatis obtusis.

FOLIA oblongo-ovalia vel ovalia, acuminata, basi obtusa, emarginata vel cuneata, obtusiuscula, glabra, supra subtusque in nervis pilosa, nervis primariis et secundariis prominentibus, subparallelis, 31" longa, 12" lata; PETIOLI 2" longi, subteretes, sulcati, superne incrassati, dense fasciculato-pilosi. GEMMAE compressae, ovatae, obtusae. STIPULAE ovatae, obtusae, basi truncatae, extus fasciculato-pilosae, intus glabrae, 7 nerves, 10" latae, 15 ad 20" longae.

*Crescit in monte Prarawin: BORNEO.*

## HOPEA. ROXBURGH, WIGHT EN ARNOTT, ENZV.

De kenmerken door deze Schrijvers en den Heer Endlicher opgegeven, behoeven slechts de bijvoeging van eene beschrijving der kiem, om voor volledig gehouden te kunnen worden. Bij de *Hopea odorata* heb ik de kiem kunnen onderzoeken. Zij vult het geheele zaad. Haar wortel is in eene groeve van de kleinste zaadlob gelegerd, bijna rolronde en aan het einde eenigzins puntig. Hare zaadlobben zijn omgebogen, vleezig, ongelijk van grootte, de binnenste de kleinste. De beschrevene en de alleen met naam vermelde soorten bewonen het vaste land van Indië, vooral het lager gedeelte des stroomgebieds van den Ganges, het schiereiland Dekan, de eilanden langs de kust van Malakka, of het stroomgebied van de Baritto op Borneo.

## I. HOPEA BALANGERAN. KHS.

H. foliis ovato-oblongis breviter acuminatis subtus dense pubescentibus in axillis nervorum glandulosis, floribus paniculatis.

ARBOR excelsa; TRUNCUS rectus, teres; CORTEX rimosus, griseus vel griseo-fuscus; RAMI patentcs, teretes, glabriusculi; RAMULI teretes, griseo-fusci, pubescentes; novelli compressiusculi, saepe sulcati, pubescentes. FOLIA alterna, ovato-oblonga, breviter obtuse acuminata, basi obtusa, supra nitida, subtus laete viridia, dense pubescentia, coriacea, 7" lata, 16" longa, nervis primariis prominentibus, in axillis glandulosis, nervis secundariis parallelis, approximatis; PETIOLI subteretes, pubescentes, supra subsulcati, 2,5" longi. STIPULAE oblongae, acutiusculae, intus glabrae, extus dense pubescentes. GEMMAE compressae, ovatae, acutiusculae, dense pubescentes. INFLORESCENTIA axillaris, paniculata, pilosa; PEDUNCULUS communis et PEDUNCULI partiales compressiusculi. BRACTEAE subrotundae, acutae, intus glabrae, extus pubescentes, membranaceae, flavescentes, 4" longae, 3" latae, admodum deciduae. FLORES subsecundi, sessiles vel brevissime pedicellati. CALYX pentasepalus; SEPALA inaequalia, biserialia — tria exteriora majora, dua interiora minora — ovata, acuta, extus dense tomentosa, intus glabra, coriacea 3" longa, 1,5" lata, excrescentia, aestivatione imbricata. COROLLA hypogyna, pentapetala, aestivatione convoluta; PETALA basi cum annulo filamentorum in tubo urceolato coalita, oblonga, subfalcata, acutiuscula, intus glabra, extus pubescentia, membranacea, alba, 8" longa, 2" lata. STAMINA 15, biserialia; series interior cum 10, minora petalis opposita; series exterior cum 5, majoribus seriei interioris opposita et adnata; FILAMENTA basi dilatata, apici attenuata, connata; ANTHERAE ovatae, sessiles, connectivo in subula setacea producto, loculis rimis dehiscentibus, locellis aequalibus. POLLEN subglobosum. OVARIIUM hemisphaericum, attenuatum, pubescens, triloculare, loculis bi-ovulatis. OVULA oblongo-ovoidca, vertici angustiora, collateralia, paululum infra apicem loculi in angulo interno affixa. STYLUS subteres, glaber; STIGMA truncatum, denticulatum.

*Crescit ad ripas fluminis Pattai etc.: BORNEO.*

Tab. 7. Figura Hopeae Balangeran. 1. Gemma floris. 2. Flos apertus. 3. Flos calyce ablato. 4. Pars corollae expansae intus visa. 5. Stamina in dorso visa. 6. Stamina in facie visa. 7. Ovarium partibus floris pro parte ablati. 8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Ovarium horizontaliter sectum. 10. Ovulum verticaliter sectum. 11. Symmetria floris. 12 et 13. Bracteae. 14. Pars aucta folii. — Hopea odorata. 15 et 16. Fructus, calyce excreto cinctus. 17. Fructus nudus. 18 et 19. Fructus cum semine verticaliter sectus. 20 et 21. Embryones.

Hopea Balangeran is in gezelligheid groeiende, door ons, langs de Pattai, een' der zijtakken van de Baritto, in gezelschap van soorten van Myrtus, van Garcinia, Carallia, Roxb. (Symmetria, Bl.) enz. waargenomen. Zij vertoonde zich daar, als een aanzienlijk groote boom, met bijna loodregten stam, uitgebreide kroon, openstaande takken, nederhangende jonge takken, een helder groen, van boven blinkend loof en veelbloemige bloempluimen. Deze laatsten bezaten in september eene talrijke menigte, zacht rozen-roode bloempjes, die eenen aangename vanieljegeur verspreidden. Het hout dezer boomen, in de binnenlanden en te Banjermassing, onder den naam *Kajoe-* (hout) *Balangeran* bekend, is naast het zoogenoemde *Kajoe-bessi* (ijzerhout), het beste timmerhout dezer oorden. Het heeft eene rood-bruine kleur, een' fijnen draad en niet zeer hard weefsel. De laatste hoedanigheden maken de bewerking van hetzelfde gemakkelijk, en eene geringe hoeveelheid hars geeft het eene meerdere duurzaamheid, door den wederstand, welken het alsdan tegen den invloed van lueht en vocht bieden kan, terwijl tevens alle schadelijke insekten daardoor van hetzelfde worden afgeweerd.

Van deze boomen wordt de bruine hars, *Njating-Mahambong*, verzameld.

## II. HOPEA SANGAL. KHS.

H. foliis oblongo-ovatis obtuse acuminatis inaequilateralibus glabris, in nervorum axillis glandulosis, stipulis ovatis.

ARBOR speciosa, trunco ereeto, cortice laete fuseo, rimoso, coronâ patente subconicâ; RAMI patentes; RAMULI subteretes, glabri, fusei, novelli compressiusculi vel subtrigoni. FOLIA alterna, oblongo-ovata, inaequilateralia, obtuse acuminata, basi latere unieo rotundata, altero angustata, utraque glabriuscula vel subtus subpubescentia, 5" lata, 11" longa, nervo medio et nervis lateralibus prominentibus, in angulo 45°, in axillis inferioribus glandulosis; PETIOLI subteretes, glabri, 15" longi. STIPULAE minutae, ovatae, admodum caducae.

*Crescit prope laco Kambat etc. ad ripas Baritto: BORNEO.*

In de lagere streken van de Baritto-rivier, gewoonlijk door de inlanders de Koempai en Doesson genoemd, wordt deze soort, hier en daar groepsgewijze vereenigd, aangetroffen, en behoort zij, door hare grootte en door haar helder groen loof, tot de schoonste boomen dezer moerassige oorden. Zij is

bij de Biadjoe (\*) onder den naam *Sangal* bekend, en levert eene zeer schoone witte hars, welke *Njating mata-poesa* of *Njating pleppek* genoemd wordt. Beiden vloeijen uit de spleten der schors en hebben, versch zijnde, een bijna wit, halfdoorschijnend en op de breuk glasachtig aanzien. De *Njating pleppek*, welke het voortbrengsel van jonge boomen schijnt te zijn, is lossier en ligter, dan de *Njating mata-poesa*, die in grootere, zwaardere, digtere brokken voorkomt. De eerste soort heeft bij de inboorlingen minder waarde, omdat zij moeilijk brandt en bij het branden knapt, hetgeen aan het, in dezelve voorhanden zijnde vocht en aan de luchtblaasjes kan toegeschreven worden.

*Hopea Sangal* verschilt van *H. speciosa* en *H. gratissima* door hare scheeve ongelijkzijdige bladen; van de *H. odorata* door meerdere grootte, door de langere punt harer bladen, en door de klieren, welke bij haar in de oksels der nerven aanwezig zijn.

---

(\*) De bewoners der binnenlanden noemen zich gewoonlijk Orang-kahajan, Orang-doesson enzv., dus menschen met den naam van de rivier, die zij bewonen. Anderen, welke zich reeds jaren op Banjermassing bevonden of daar dikwerf kwamen, zeiden, dat zij Biadjoe-kahajan enzv. genoemd werden, en beshouwden den naam *Dajak*, als eenen seheldnaam, die hun door de, in latere tijden aangekomene, thans het strand bewonende vreemdelingen, werd toegevoegd. Het eerste woord *Biadjoe* staat, volgens de opmerking van den Heer van den Boseh (Nederl. Bezittingen, II. bl. 162) en anderen, in verband met de sanskritsche woorden *Biodjoe* en *Viadja*, welke met het woord *Wilden* zijn vertolkt. Het wijst, even als andere nog gebruijkelijke woorden, op eene vroegere gemeenschap met de Hindoes. Nader onderzocht, toont het woord *Biadjoe*, hoe juist dit volk in het toepassen zijner namen was, daar deze het denkbeeld uitdrukt van een, alléén door kraecht, niet door het denkvermogen beteugeld handelen. De mensch in zijnen natuurstaat kon zeker niet geschikter geschilderd worden, door een reeds beschaafd volk, dat den invloed van den geest kende. Met de sanskritsche woorden zal ik mij hier niet bezig houden, doe alleen tot de grieksehe  $\beta\iota\alpha$  en  $\delta\iota\omega$  en  $\delta\nu\omega$ , welke vrij juist met dezelve overeenstemmen en gemakkelijker kunnen worden nagegaan, verwijzen, en aan het latijnsehe *vis* en *induo*, enzv. herinneren. Het woord *Dajak* is zoo zeer verwant aan het maleisehe *Daja*, *list*, *slimheid*: eigenschappen, die de bewoners der binnenlanden in eene hooge mate bezitten, dat het mij waarschijnlijk voorkomt, dat de Maleijers, bij hunne vestiging of, vroeger reeds, bij hun handelsverkeer met de inboorlingen, aan dezen, als een gevolg van derzelve kunstgrepen en lagen, den scheldnaam van *Orang-daja* of *Dajak*, *sluipers*, gegeven hebben.



OVER EENIGE SOORTEN VAN HET GESLACHT

**B A U H I N I A,**

DOOR

**P. W. KORTHALS.**



De soorten van het geslacht *Bauhinia* zijn bijna allen tusschen de keerkringen gevonden en aldaar zeer ongelijk verdeeld. Afrika bezit slechts de *Bauhinia Senegalensis* op de westkust, de *Bauhinia farek* op de oostkust, en de *B. Madagascariensis* op het eiland Madagaskar. Amerika, vanwaar de eerste soort, onder den naam van *Bauhinia*, door Plumier werd beschreven, heeft eene menigte soorten, welke tot de afdeelingen *Caulotretus*, *Casparea* en *Pauletia* behooren. Deze zijn daar van de zeestranden tot op eene hoogte van ruim 1200 N. ellen gevonden en trokken, door de grootte harer bloemen en door de zonderlinge bandvormige gedaante der stammen, de aandacht der reizigers. In Azië groeijen de bekende soorten in Bengalen, op het schiereiland Decan, op Ceilon en de zuid-oostelijke eilanden. Op het vasteland van Indië komt ééne soort voor, namelijk de *Bauhinia corymbosa*, tot op 28°—30° N. Br., in den omtrek van Saharumpore, in de dalen van het Himalaija-gcbergte; de anderen zijn daar beneden de 1000 ellen, zoowel in de bosschen als in de meer opene plaatsen gevonden. Van Ceilon zijn de *Bauhinia tomentosa* en *B. acuminata* bekend. Op de Philippijnen zijn eenige soorten, waaronder de *B. latisiliqua*, verzameld. De Indische Archipel leverde, van Sumatra, Java, Borneo, Nieuw-Guinea, Timor, enzv. een aantal soorten; daarentegen kennen wij er nog niet eene van Celebes. Eene derzelve is op het vasteland van Indië, Ceilon en de drie groote Sunda-eilanden gevonden: *B. acuminata*; eene andere, *B. tomentosa*, is van het vasteland, van Ceilon en van Java bekend; en eene derde behoort

op het vasteland en Sumatra te huis. De andren zijn meer tot den Indischen Archipel beperkt en meestal slechts op één van deszelfs eilanden aangetroffen. De door mij waargenomene soorten, welke ik hier beschrijven zal, verzamelde ik steeds beneden eene hoogte van 1000 ellen; de boomachtige soorten, *B. tomentosa*, *acuminata* enzv., groeijen in de lage alluviale oorden, tusschen klein bosch of op opene plaatsen; zelden verspreiden zij zich tot in de dalen der voorgebergten, zoo als: *B. aeida*, *B. hirsuta*; de slingerende soorten wassen in de bosschen langs de zeestranden en verspreiden zich vervolgens tot op gemelde hoogte. In deze streken erlangen zij niet zelden eene aanmerkelijke ontwikkeling. Hare stengen verheffen zich in ranken, door klawieren ondersteund, of slingeren, de boomen digt omwindende, tot in de kroonen derzelve. Hier vermengen zij haar loof met dat der reuzen uit het plantenrijk, terwijl de rijke, met gele of roode bloemen versierde takken van tusschen hetzelfde nederhangen.

---

De vrijgroeijende soorten komen als kleine boomen, somwijlen als heesters voor. Hare stammen zijn meestal regt, rolrond, door eene bruine of grijze, gave of gespletene schors bedekt, en hebben een geel of licht bruin, week, ligt en tegen den invloed van luecht en vochtigheid niet zeer bestand hout. Derzelve kroonen zijn half rond of eivormig, over het algemeen met eenen zeer digten bladtooi bekleed. De slingerende soorten hebben den stam platgedrukt, onregelmatig rolrond of hoekig; nimmer heb ik denzelven zoo bandvormig als bij de Amerikaansche soorten gezien. De stam bezit onder eene gespletene, kurkachtige, bruine schors, een zeer poreus hout. De takken staan afwisselend, bij de slingerende soorten dikwerf in twee rijen, bij de boomen meer spiraalsgewijze. Zij zijn min of meer hoekig; bij hunne eerste verschijning zelfs te zamengedrukt, en niet zelden meer of min digt behaard. In de samenstelling van de takken en takjes der beide vormen bestaat geen verschil: zij hebben eene tamelijk ontwikkelde schors, eene niet zeer aanzienlijke bastlaag; de houtbundel bestaat uit vezels en vaten; zij hebben een vrij groot, somtijds vijfhoekig merg, de groote mergstralen, in bijna regte lijnen van het merg naar de schors loopende, en de kleine mergstralen zeer klein. Deze samenstelling ondergaat bij de boomachtige stammen weinig verandering. Bij de slingerende soorten verandert de steng eenigzins; ik zal de beschrijving derzelve hier laten volgen. — De schors en bastlagen verschillen alleen door de meerdere dikte en losheid bij de boom- en bij de slingerende soorten. Bij beiden bestaat de eerste uit zes- tot twaalfhoekige cellen met dikke, van binnen gestipte wanden, en de, bij de boomsoorten aanzienlijker bastbundel wordt door zeer dikwandige vezels gevormd, wier holte vijf- of zeshoekig is. Het hout van de slingerengewassen heeft het merg zeer klein; de hoofdmergstralen en de kleinere mergstralen in slingerende bogten, en den houtbundel zeer rijk aan groote vaten. Het merg bestaat uit een los weefsel van naar het ronde overgaande, dikwandige, gestipte cellen. De groote mergstralen loopen slingerend van het merg naar den omtrek, en de kleinen vormen een bogtig gewonden net tusschen den houtbundel. De eersten bestaan uit twee tot vier, en de anderen uit eene of twee rijen cellen. Deze cellen hebben den vorm van teerlingen of van regthoekige zuilen: de teerlingvormige zijn, vooral in de groote mergstralen, tusschen de langwerpige cellen, als ook aan de einden der stralen voorhanden; de anderen zijn het talrijkst. Zij sluiten zeer juist op elkander en vormen een zamenhangend,

uit regelmatige mazen bestaand net. Beide soorten hebben zeer dikke wanden met talrijke ronde stippen, die in de naast elkander liggende cellen, schijnbaar met elkander in verbinding staan. De langwerpige cellen hebben de lengte meest in de rigting van de spil der plant, maar, wanneer zij de gestipte vaten omgeven, zijn zij meer breed dan lang. Hare lengte staat tot de breedte als 3 of 2 tot 1 ( $\frac{3}{1}$  streep). — In den houtbundel heb ik spiraalvaten, gestipte vaten, eigen sapvoerende vaatjes en vezels waargenomen. De spiraalvaten zijn alleen in het mergkanaal in gering getal aanwezig; zij zijn zeer klein en hebben slechts 0,01 streep middellijns. De gestipte vaten maken het hoofdgedeelte van den houtbundel uit. De groote gestipte vaten, welke door ééne laag van dwarse, en soms nog door eene andere van lange cellen omsloten zijn, hebben 0'',35 tot 0'',5 middellijns, en bestaan uit leden van 0'',25 tot 0'',15 lengte. Derzelve wanden zijn van eene talrijke menigte stippen, in de gedaante van dwarse streepjes voorzien. In de nabijheid van deze groote vaten bevinden zich eene menigte kleine gestipte vaten, om welke ik geene insluitende cellenlaag heb waargenomen. Deze vaten hebben eene middellijn van 0'',04 tot 0'',08, en de lengte van derzelve leden is 0'',25 tot 0'',125. Zij hebben de einden der leden dikwerf scheef; somwijlen met eene meer of min belangrijke vernauwing. Derzelve wanden zijn even dik, als die der groote vaten, met eene menigte eirkelronde stippen voorzien. Behalve deze beide vormen van gestipte vaten, zijn er nog zeer dunwandige vaten aanwezig; deze sehijnen mij toe, voor gestipte, pas gevormde vaten gehouden te moeten worden. — De kleine eigene sappenvoerende vaatjes zijn, vooral langs de gestipte vaten, aanwezig: zij bestaan uit leedjes van 0'',006 tot 0'',008 lengte en ongeveer de helft breedte, en verbinden zich dikwerf tot een net. — De vezels hebben ongeveer 0'',5 tot 0'',8 lengte, bij 0'',01 middellijn, en dikke, meestal gave wanden. Somwijlen zijn zij opgezwollen en kunnen dan alleen door de aan de einden aanwezige vernauwing en door de ligging der stippen op de binnenzijde der wanden, van de gestipte vaten onderscheiden worden. De groote gestipte vaten, welke ik in de jongere takken en in de stammen van *Bauhinia pyrraneura* heb vergeleken, ondergaan, bij de ontwikkeling der plant, eene aanmerkelijke verwijding, maar verkrijgen, in derzelve leden, bijna geene meerdere lengte.

De knoppen zijn zamengedrukt ovaal; zij bestaan uit de beide nevenblaadjes, die met de randen tegen elkander liggen, en uit de blaadjes, van welke de bladsehijf zamengevouwen en op den steel terug gebogen is. Na de scheiding van de nevenblaadjes buigt de bladsehijf, door de uitgroeiing, terug, en blijft zij nog, gedurende eenigen tijd, met de bovenzijde tegen elkander gevouwen. — De bladen van zeer jonge planten bestaan meestal uit twee geheel geseheidene of alleen aan den voet zaamgegroeide blaadjes; die van oudere planten hebben de blaadjes hooger zaamgegroeid; bij enkele soorten zelfs zijn zij bijna tot eene onverdeelde bladsehijf vereenigd. Indien de blaadjes geheel geseheidene zijn, is er tussehen dezelve eene kleine elsvormige verlenging van den bladsteel; bij eene te zamengroeiing van dezelve groeit deze verlenging tot eene middelnerf der vereenigde blaadjes, die boven de zaamgegroeide bladsehijf uitsteekt. Langs deze middelnerf, vooral aan het benedenste derzelve, is de zelfstandigheid van het blad minder digt. De blaadjes zijn ongelijkzijdig; de buitenzijde is het grootst, langwerpig, aan de punt spits of rond, aan den voet rond of bijna afgeknot; waardoor de voet van de zaamgegroeide bladsehijf min of meer hartvormig is. Zij zijn op den bladsteel geled, of vertoonen, bij hunne vasthechting, een aanmerkelijk verdund parenchym. De reeds beschreven middelnerf is eene voortzetting

van den bladsteel. Deze samenstelling doet mij de bladen van *Bauhinia* voor gevinde, éénjukkige bladvormen houden. De oppervlakte der bladsehijven is aan de bovenzijde meestal glad; aan de onderzijde glad of met eenvoudige haren bedekt, die somwijlen bruin gekleurd en door tussehenschotten en kleine cellen verdeeld zijn, en later gedeeltelijk wegvallen. Derzelver zelfstandigheid is lederachtig. Hare hoofdnerven komen allen uit den voet van het blad, even als zulks bij de palminerven gewoonlijk gevonden wordt, en loopen naar de buitenzijde van de blaadjes, tot aan of tot op eenigen afstand van den rand door. Hier loopen zij langs den rand, eenen kleinen zoom vormende, of buigen zij terug en vereenigen zich met de meer binnenwaarts gelegene, door ronde of hoekige bogten. De, uit deze hoofdnerven voortkomende secundaire nerven vormen met elkander, hoeken van  $45^\circ$  tot  $90^\circ$ : de eersten loopen gewoonlijk tot den rand door; de regthoekigen, welke bij vele soorten voorkomen, verbinden de hoofdnerven met elkander en zijn tusschen dezelve evenwijdig, dikwerf vrij dicht bij elkander geplaatst. De, uit deze nerven voortkomende aderen zijn, naarmate van de mindere of meerdere ontwikkeling van het parenchym, duidelijker of minder zichtbaar. — De bladstelen zijn op de steng geled, bijna rolrond of kantig, aan de beide einden dikker, glad of behaard, eenige soorten met eene aanzienlijke lengte. — De nevenblaadjes komen onder twee vormen voor en zijn aan den voet van den bladsteel, of even boven den voet, op de steng gehecht. De eersten, welke de onontwikkelde bladen beschutten, zijn de grootste, langwerpige of rond, glad of behaard; de anderen, welke spoediger dan de genoemde afvallen, zijn klein, bij de meesten gelijk aan kleine draadjes, of langwerpige toegespitst, en kunnen als de nevenblaadjes der beide blaadjes aangemerkt worden. — In de plaats van de bladen of van de groote nevenblaadjes, of van de bloemen, groeijen niet zelden, bij de slingerende soorten, klawieren, welke onverdeeld blijven of het einde in twee deelen gespleten of gegaffeld hebben.

De bloemen der Indische soorten zijn in trossen, bij sehermen of in pluimen vereenigd, welke aan het einde der takken, of in de oksels der bladen, of ook, doch zeldzaam, tegen over dezelve zijn geplaatst. De algemeene steel is bij de meeste soorten hoekig, eenigermate zamengedrukt. De bloemstelen zijn, op kleine kussentjes geled, langs denzelfden spiraalsgewijze geplaatst, bijna rolrond of kantig. Aan den voet derzelve is een, en op dezelve zijn twee schutblaadjes, van eene langwerpige, dikwerf zeer toegespitste gedaante. De bloemknoppen zijn rolrond of kantig, bij enkele soorten zeer toegespitst, glad, bruin of grijs behaard. De kelk komt onder twee vormen voor: bij de meeste soorten bestaat hij uit eene buis en eenen verdeelden boord; bij sommigen (*B. anguina*, *B. emarginata*, Jack of *B. retusa*, Roxb.) is de buis bijna of in het geheel niet ontwikkeld. De buis is bij verscheidene Amerikaansche soorten (*B. outimouta*, enzv.) kogelrond, bij de Indische rolrond, of kantig met uitstekende ribben en min of meer aanzienlijke holten. De vijf deelen van den kelkboord zijn vóór de opening van de bloem, als kleppen tegen elkander geplaatst. Na de opening buigen zij terug en blijven met elkander vereenigd tot eene scheede (*B. acuminata*, enzv.), of zijn twee of drie derzelve zaamgegroeid (*B. pyrraneura*, enzv.), of al de deelen scheiden zich van elkander (*B. ferruginea*, enzv.). Deze deelen komen voor, onder eene meer of min verlengde gedaante, met eene vliezige of lederachtige zelfstandigheid, hebben veelal eene middelnerf en zijn, na de opening der bloem, teruggebogen. — De bloemkroon, uit vijf bladen te zamengesteld, is openstaande of eenigzins klokvormig, wit, geel of hoog oranje. Hare bladen zijn, vóór de opening der bloem, door de grootte, somwijlen zeer geplooid; gewoonlijk echter toonen zij duidelijk de

ligging van vlinderbloemen. Deze bladen zijn ongelijk; datgene, hetwelk de vaan voorstelt, is dikwerf het kleinste; de beide andere paren zijn bijna van dezelfde grootte. Zij bestaan uit een nageltje en eene schijf. Het eerste is bij eenigen zeer klein (*B. tomentosa*, enzv.) en bij anderen tamelijk groot (*B. ferruginea*, enzv.); daarentegen hebben de eersten de bladsehijf grooter, dan de laatsten. De bladsehijf is langwerpig, ovaal of rond, aan den top stomp of puntig, aan den voet puntig, rond of van één of twee oortjes voorzien, op de binnenvlakte glad, en op de buitenvlakte, vooral langs de nerven, behaard of geheel glad, en heeft eene gevederde nervuur.

De helmdraden zijn aan den rand van de binnenzijde der kelkbuis geplaatst, en bij eene normale ontwikkeling tien in getal. In dit geval zijn zij ongelijk van grootte en staan de vijf kleinere tegen over de bloembladen. Bij de meeste soorten zijn echter sommige van deze helmdraden geheel geaborteerd of gebrekkig ontwikkeld. Eenigen hebben de vijf, over de bloembladen geplaatste helmdraden zonder stuifmeelknopjes, of zeer klein (*B. variegata*); anderen hebben drie vruchtbare en van twee tot zeven onvruchtbare helmdraden: de eersten staan dan tegen over de drie van de spil verwijderde kelkbladen (*B. ferruginea*); weêr anderen hebben negen onvruchtbare en een' vruchtbaren helmdraad, die tegen over het, van de spil het verst verwijderde kelkblad staat. De helmdraden zijn vóór de opening der bloem gekronkeld, en worden later regt. Zij zijn draad- of lijn- of elsvormig, veelal onbehaard. De helmknopjes staan vóór de opening der bloem, met het voorste gedeelte naar binnen, en krijgen eerst na de opening eene tegenovergestelde, of eene horizontale rigting. Zij zijn ovaal of lijnvormig ovaal, bestaan uit den helmknoop en vier, zelden uit twee stuifmeelhokjes. De helmknoop, in welks midden het helmdraadje is vastgehecht, is dikwijls zoo ontwikkeld, dat hij het grootste deel van de helmknopjes uitmaakt. Aan weêrszijden van denzelfden is een paar stuifmeelhokjes, die zich van boven af aan openen. Het exothecium dezer hokjes is vliezig bij *B. acuminata*, en dik bij *B. ferruginea*. Het endothecium bestaat uit eene laag spiraal-cellen, uit welke men door weeking den draad gemakkelijk afscheidbaar kan maken. — Het stuifmeel, dat bijna kogelrond is, springt op verschillende wijzen open.

Het vruchtbeginsel komt òf bijna geheel zonder steel voor (*B. outimouta*), òf heeft den steel vrij in de kelkbuis geplaatst (*B. acuminata*), òf met deze zaamgegroeid (*B. ferruginea*). Bij alle soorten is het zaamgedrukt, langwerpig, met de eene zijde gebogen en de andere bijna regt, min of meer behaard. Het is eenhokkig en bevat een onbepaald getal, zelden meer dan zestien eitjes. Deze eitjes beginnen reeds zeer vroeg de ongelijke ontwikkeling, waardoor de eimond naar boven gerigt wordt. — De stijl is zeer ongelijk van grootte en neemt naar den stempel in omvang toe. De stempel is, bij de onderzochte soorten, knoop- of kopvormig, somwijlen eenigzins lobbig. Het ter opneming van de bevruchtende stof bestemde gedeelte, bestaat uit naakte eellen, die rondom een klein gaatje geplaatst zijn, hetwelk met een kanaal, in het hokje uitkomende, in verband staat. De door mij waargenomene vruchten hebben drie geheel verschillende vormen. De vrucht was bijna lijnvormig, aan de beide einden toegespitst, van eene aanzienlijke lengte, bij *B. acida*; meer zeisvormig, met eene bijna regte en eene andere boogvormige zijde, bij *B. ferruginea*; zij had den vorm en de zelfstandigheid van onze gewone peulen, bij *B. acuminata*. De inwendige samenstelling, door Adanson als meerhokkig opgegeven, heeft twee verschillende vormen. Bij de eenen is de peul door dwarse tussehenschotten en vele hokjes verdeeld,

en ligt ieder zaad in een afzonderlijk hokje (*B. hirsuta*, enz.); bij de anderen liggen de zaadjes in kleine holten, welke door het zaamgegroeide endocarpium geheel omsloten worden (*B. ferruginea*, enz.). Het epicarpium is lederachtig, somwijlen zeer dik; bruin of geel. Het sarcocarpium, hetwelk een groot aandeel aan de vorming der tusschenschotten heeft, is zeer vaatrijk; bij *B. ferruginea* en de verwante soorten dik, en bij *B. tomentosa* dunner. Het endocarpium is glanzig, licht of donker bruin gekleurd. De zaadstreng is bij cenigen bijna rolrond (*B. acuminata*, enz.) en bestaat bij anderen (*B. ferruginea*, enz.) uit een ongelijkzijdig, driehoekig plaatje. Aan het einde der zaadstreng is bij de half rijpe en volkomen rijpe zaden een tweelobbig uitgroeisel: de bovenste, naar den zaadmond of de micropyle gerigte lob, is de kortste, aan het einde met eene kleine insnede voorzien: de benedenste is even boven het punt van verdeeling, in twee min of meer verlengde, om den rand van den rug des zaads loopende beenen gespleten. De zaden zijn schijfvormig (*B. ferruginea*) of zaamgedrukt eivormig (*B. acuminata*); glad, van geel tot donker bruin gekleurd; volkomen rijp zijnde, zeer hard. Zij hebben het vrije einde naar boven gerigt. Hunne opperhuid bestaat uit kleurlooze, bijna teerlingvormige of meer langwerpige cellen. Onder dezelve ligt de testa, even als bij *Vicia faba*, uit twee lagen van langwerpige, digt aan elkander sluitende cellen gevormd. Het mesospermium bestaat uit een lossere weefsel van kleine, soms teerlingvormige eellen en de raphé. Het hieronder gelegen tegmen of endopleura is uit zeer dikwandige cellen gevormd en bedekt een zeer fijn vliesje, dat als de kernhuid moet aangemerkt worden. De navel heeft de gedaante van het segment eener schijf, met twee lange beenen, die bij eenige soorten een achtste, en bij andere ruim drie vierde van den omtrek des zaads omvatten. Hij wordt naar voren door een klein, aan den voet verbreed haakje begrensd. Dit haakje, hetwelk bij al de door mij onderzochte zaden van Leguminosae, meer of min duidelijk zichtbaar is, het zoogenoemde spermotylium van den Heer Bischoff, is bij de *Bauhinia* juist tusschen de navelopening (omphalodium) en het likteeken van den eimond (micropyle) geplaatst. Het hecht de rijpe zaden aan de zaadstreng en bestaat uit een digt celweefsel. De navelopening, bij de onderzochte soorten een klein cirkelvormig stipje, ligt juist achter het spermotylium. De micropyle bevindt zich voor het haakje, of op eenen geringen afstand van hetzelfde. Zij is nu eens onder den vorm van eene kleine ronde verhevenheid, dan weder als eene kleine dwarse of lange groeve aanwezig. — De binnenvlavel of chalaza wordt op de oppervlakte van het zaad, door eene insnede en verhevenheid, met een donker vlekje aangetoond, en veelal in eene regte lijn over de micropyle, of meer op den buik van het zaad gevonden. Naar denzelfden loopt de raphé, die, door eene donker gekleurde streep op de testa zichtbaar, gemakkelijk kan gevolgd worden. Zij bestaat uit lagen van langwerpige eellen en uit een' bundel zeer fijne spiraalvaten, wier draad eerst in latere tijdperken kan worden afgewonden. De kiem, welke door een fijn, bijna geheel onbewerktuigd vliesje, hetwelk ik boven reeds aanduidde, omgeven wordt, vult het geheele zaad. Haar worteltje, even bezijden den zaadmond gelegen, is rolrond, naar het einde een weinig toegespitst, en somwijlen met een draadje voorzien. Derzelver zaadlobben zijn van langwerpig tot bijna rond, stomp, aan den voet hartvormig, vlak, en sluiten zeer digt tegen elkander. Het, tusschen dezelve in eene groeve gelegen, niet zeer ontwikkeld knopje, heeft de gedaante van een zamengedrukt ligehaam. — De kiem bestaat uit cellen. Het in de zaadlobben aanwezige net, dat den nervenloop aantoonst, bestaat uit kleine cellen, die zich alleen door de lengte van de haar omringende onderscheiden. Bij de ontkieming, of bij het begin van de eerste werking der zaden, veranderen de cellen, welke de nerven aanduiden, in vaten en vezels.

Zij verlengen zich meer dan de omringende cellen en vertoonen al zeer spoedig de vorming der spiraalvaten, die uit een' gemakkelijk af te winden draad bestaan. Bij dezelve komen de zaadlobben boven den grond uit en nemen zij eene groene kleur aan, zijn de eerste blaadjes bijna onverdeeld, en hebben de volgende de gedaante, welke aan de bladen van oudere planten eigen is.

De waargenomene soorten van *Bauhinia* zijn het geheele jaar door, met bladen voorzien. Zij bloeijen bij voortduring, zoo als *B. acuminata*, enzv.; of, in den droogen tijd, bij het naderen van de regenmoe-son, zoo als *B. ferruginea*, enzv. De laatsten hebben ongeveer vijf of zes maanden later, rijpe vruchten.

---

Linnaeus nam voor het geslacht *Bauhinia* de kenmerken van eene Amerikaanse soort (*Gen. Plantarum*, ed. secunda, pag. 178), met één vruchtbaar helmdraadjje (*B. divaricata*). Hierdoor gaf hij aanleiding, dat Loureiro voor eene, door hem gevondene plant met drie helmdraden, welke aan *Bauhinia* verwant was, het nieuwe geslacht *Phanera* vormde. Vervolgens veroorzaakte dit eenzijdig kenmerk, bij de ontdekking van meerdere, door uiterlijken vorm overeenkomende gewassen, de invoering van nog andere geslachten. Cavanilles vormde voor de, met tien vruchtbare helmdraden voorziene soorten, het geslacht *Pauletia*, en behield voor de soorten met één' of drie vruchtbare helmdraden, den naam *Bauhinia*. De Heer Kunth, het gevoelen voor de verdeeling van deze gelijkvormige gewassen aannemende, verschilde echter van Cavanilles in de beschouwing van de, ter verdeeling vereischt wordende kenmerken. Hij nam daartoe niet alleen het getal der helmdraden, maar ook de meerdere of mindere scheiding van de kelkslippen, en het gesteeld en niet gesteeld zijn van het vruchtbeginsel, in aanmerking. Deze veelvoudige verdeelingsgrond deed hem *Pauletia* (*B. acuminata*, enzv.) aannemen, en *Bauhinia*, voor zoo ver dit de Amerikaansche soorten van Cavanilles betrof, in *Casparea*, met één vruchtbaar helmdraadjje en een gesteeld vruchtbeginsel, en in *Bauhinia*, met tien vruchtbare helmdraden en een ongesteeld vruchtbeginsel, verdeelen. De Heer De Candolle, door zijne talrijke hulpmiddelen in staat gesteld om het werk van zijne voorgangers vergelijkend te onderzoeken, oordeelde niet gunstig over de door hen opgegevene kenmerken; besehouwde dezelve als van geringe waarde, en als eene aanleiding ter vorming van een te groot getal geslachten. Hij behield derhalve het geslacht *Bauhinia* in deszelfs geheel, met een, alle soorten omvattend kenmerk, en stelde voor, om hetzelfde in ondergeslachten te splitsen, welke op het getal der vruchtbare stuifdraden, het gesteeld of niet gesteeld zijn van het vruchtbeginsel, en op de plaatsing van den steel met betrekking tot den kelk, zouden gegrond zijn. Tusschen deze versehillende wijzen van besehouwing durf ik, wegens gebrek aan genoegzame, vooral vruchtdragende voorwerpen, geene uitspraak doen. Indien ik echter naar de boven besehrevene soorten, welke vooral tot *Pauletia*, Cav. (*B. acuminata*, enzv.) en tot *Phanera*, Lour. (*Symphyopoda*, D. C.) (*B. ferruginea*, enzv.) behooren, oordeel, dan zoude ik, wegens het verschil, dat zij in de bloem- en vruchtdeelen hebben, gaarne het gevoelen van Cavanilles en Kunth, om het geslacht *Bauhinia* te verdeelen, aannemen. Naar de hulpmiddelen oordeelende, welke mij het Rijks-Herbarium, door de welwillende medewerking van den Hoogleeraar Blume, verschaftte, wil ik thans alleen de onderverdeeling nagaan, en uiteenzetten, hoe zij gewijzigd zoude kunnen worden.

- De peul gevleugeld. . . . . MESOPTERA (*B. latisiliqua*, Cav.).
- De peul ongefleugeld.
- De kelk vlak. . . . . LASIOBEMA (*B. anguina*, Roxb., *B. retusa*, Roxb.,  
emarginata, W. Jaek).
- De kelk buisvormig.
- Het vruchtbeginsel ongesteeld.
- De buis rolronde. . . . . GRIPONEURA (*B. reticulata*, D. C.).
- De buis buikvormig. . . . . CAULOTRETUS, Rich. (*B. outimouta*, Aub. enzv.).
- Het vruchtbeginsel gesteeld.
- De steel vrij.
- Een vruchtbaar helmdraadje. . . . CASPAREA, Kunth (*B. divaricata*, L. enzv.).
- Vijf of tien vruchtbare helmdraden. PAULETIA, Cav. (*B. acuminata*, L. enzv.).
- De steel met den kelk zamengegroeid. . PHANERA, Lour. (Symphyopoda, D. C. — *B. ferruginea*, enzv.).

---

LASIOBEMA. Khs.

I. BAUHINIA ANGUINA. ROXB.

Deze soort, welke door Rheede (*Hort. Mal. VIII. tab. 30 en 31*) en door Roxburgh (*Flor. Coromand. III. tab. 235*) zeer goed afgebeeld, en door den laatsten en andere schrijvers uitvoerig beschreven is, werd door ons op Sumatra, in de bosschen van het gebergte Singalang, op eene hoogte van 400 ellen, gevonden. Zij bezit twee soorten van klawieren, geheel onverdeeld en aan het einde gespleten of gegaffeld; de eersten zijn vergroeide nevenblaadjes, en de anderen vergroeide bladen. Bij deze aanmerking kan nog gevoegd worden, dat de door Roxburgh (*Flora Indica II. bl. 322*) beschrevene puntige klieren in de bloem, onvolkomene helmdraden zijn.

---

PAULETIA. CAVANILLES, KUNTH, DE CANDOLLE, ENZV.

II. BAUHINIA ACUMINATA. L.

Reeds vroeger hebben de Heeren Wight en Arnott (*Prod. Flor. Penins. p. 295*) opgemerkt, dat deze soort tot Pauletia behoort. Zij was bekend als voorkomende op het vasteland van Indië en op Ceylon, en groeit ook, volgens onze onderzoekingen, in de lagere streken van Java, Sumatra en Borneo. In deze oorden wast zij bijzonder welig op opene, aan de zon blootgelegene velden, en bereikt zij, naarmate van het meer of min gunstige der standplaats, eene vershillende grootte; onder voordeelige omstandigheden vormt zij tamelijk aanzienlijke boomen met regte, rolronde stammen en half ronde kroonen. Op minder gunstige groeiplaatsen, vooral in eenen kiezelaardigen bodem, ontwikkelt zij slechts tot struiken. Bij dit vershil van ontwikkeling heb ik geene verscheidenheid van vorm tussehen de bladen en bloemen kunnen waarnemen: bij de struiken en boomen waren de bladen nu eens rond, dan weder aan het einde meer toegespitst.

---



## III. BAUHINIA TOMENTOSA. L.

In de lagere, vooral in de alluviale streken van Java, is deze soort niet zeldzaam. Zij bloeit het geheele jaar door, en verspreidt eenen aangenamen geur.

## IV. BAUHINIA HIRSUTA. KHS.

B. foliis basi cordatis emarginatisve, foliolis oblongis obtusis 3-4 nerviis ultra medium conerctis subtus, petiolis, ramulis, stipulis, pedunculis, bracteis calycibusque hirsutis, petalis oblongis.

ARBUSCULA; CORONA hemisphaerica, basi truncata; truncus rectus, cortice fusco tectus. RAMI divaricati, teretes, cinereo-fusci, glabri; RAMULI angulati, fulcati, fusci, hirsuti. FOLIA basi emarginata vel cordata, apici sinu 90°, juniora supra glabriuscula, subtus dense hirsuta; adultiora supra glabra, subtus praesertim in nervis et margine hirsuta; foliola oblonga, obtusa, ad tres quartas vel ultra connata, 0,085 longa, 0,045 lata, 3 vel 4 nervia; nervis secundariis subparallelis, distantibus; PETIOLI trigoni, supra sulcati, superne et inferne incrassati, hirsuti, 0,03 longi. STIPULAE lanceolatae, subulatae, hirsutae; stipellae oblongae, acutiusculae, petiolo appressae, minutae. INFLORESCENTIA racemosa, oppositifolia: PEDUNCULUS COMMUNIS pauciflorus, 3 ad 5, subteres, hirsutus; PEDICELLI subteretes, subsulcati, hirsuti. BRACTEAE minutae, lanceolatae, subulatae, hirsutae. ALABASTRUM cylindricum, attenuatum in setas quinque, hirsutum. CALYCIS tubus brevis, obconicus, subsulcatus, intus glaber; linibus quinque partitus: partes saepe connatae, lanceolatae, acuminatissimae, intus glabrae, reflexae, 0,025 longae, 0,0025 latae. PETALA oblonga vel ovalia, obtusiuscula, breviter unguiculata, subaequalia, 0,03 longa, 0,01 lata, membranacea, alba, nervis pinnatis. STAMINA 10, omnia fertilia, alterna longiora; FILAMENTA subteretia, basi latiora, breviter coalita, apici subulata; ANTHERAE oblongae, acutiusculae, eordatae, infra medium affixae, vacillantes; POLLEN sphaericum, verrucosum. GYNOPHORUM librum in tubo calycis, teres, glabrum. OVARIUM rectum, lineari-oblongum, glabrum, uniloculare; OVULA 8 ad 12; STYLUS compressus, glaber; STIGMA capitatum, subbilobum. LEGUMEN stipitatum, recto-lineare, basi cuneatum, apici subfalcatum, rostratum, latere seminifero costatum, latere opposito obtusatum, torulosum, eoriaceum; endocarpio nitido, laete fusco. FUNICULUS UMBILICALIS arcuatus, subteres, semine delapso, apici bilobus: lobus inferior brevior linearis, emarginatus; lobus superior bipartitus, partibus linearibus. SEMEN compresso-ovoideum, basi cum appendiculo recurvato, fuscum, in dorso duabus lineis notatum; TESTA crustacea; TEGMEN corneo-carnosum, sat crassum. COTYLEDONES oblongo-rotundatae, obtusae, basi subcordatae, subcarnosae; RADICULA teres; GEMMULA compresso-ovoidea.

*Crescit juxta Limbang, Waniasa, Trogon: JAVA.*

Tab. 9. 1—2. Figura Bauhiniae hirsutae. 1. Gemma floris. 2. Flos, petalis nondum explicatis, sepalis reflexis. 3. Petala. 4. Flos, calyce et corollâ ablatis. 5. Cellulae endotheii antice, et 6. a latere visae. 7. Pollen. 8. Calyx et ovarium longitudinaliter secti. 9. Legumen, una parte ablata. 10. Pars leguminis aucta. 11. Semen in dorso visum. 12. Semen eodem modo visum parte funiculi reflexâ. 13. Semen in basi visum. 14. Semen cum funiculo umbilicali in basi visum. 15. Seminis pars eum parte funiculi a latere visa. 16. Semen. 17. Semen verticaliter, et 18. transversaliter sectum. 19. Pars spermodermis eum spermotylio aucta. 20. Pars seminis et funiculi umbilicalis verticaliter secta, aucta. 21. Sectio transversalis partis seminis aucta.

In de hoogere streken van Java kan deze soort beschouwd worden, als de *B. tomentosa* vervangende. Door den vorm der bladen en de kleinere bloemkroonen met geheel witte bloembladen, is zij gemakkelijk van deze te onderscheiden.

#### V. BAUHINIA ACIDA. RWDT.

*B. foliis basi cordatis, foliolis ovalibus obtusissimis 4-5 nervis ultra medium concretis, stipulis oblongis, bracteis acutis cucullatis, inflorescentiâ racemoso-paniculatâ et calycibus fusco-tomentosis. (Legumen recto-lineare).*

*Bauhinia purpurea. D. C. Prod. 2. p. 515, nec Linn.*

ARBOR 10 ad 15 metrarum alta; TRUNCUS rectus, cylindricus, cortice nigrescente tectus; CORONA hemisphaerica, basi truncata, dense foliata. RAMI divaricati, subteretes, cinereo-fusci, glabri; RAMULI angulati, sulcati, laete fusco-tomentosi. FOLIA basi profunde cordata, apici cum sinu 90°; adultiora utraque glabra; juniora subtus laete fusco-tomentosa; foliola ovalia, obtusissima, ad tres quartas et ultra connata, 0,06 longa, 0,04 lata, 4-5 nervia, nervis secundariis subparallelis; PETIOLI subtetragoni, supra sulcati, inferne et superne incrassati, pubescentes, 0,025 longi. STIPULAE lanceolatae, acuminatae, tomentosae, minutae, admodum deciduae. INFLORESCENTIA racemoso-paniculata, terminalis vel axillaris; PEDUNCULUS COMMUNIS angulatus, tomentosus; PEDUNCULI PARTIALES eadem formâ et eodem vestimento; PEDICELLI teretes, tomentosi, saepe longi, bibracteolati. BRACTEAE ovatae, acutae, cucullatae, tomentosae; BRACTEOLAE minutae, ovatae, acutae, appressae. FLORES polygami. ALABASTRUM clavatum, obtusum, fusco-tomentosum. CALYCIS tubus campanulatus, basi conicus, intus glaber; limbus quinque partitus, partibus saepe connatis, ovatis, acutis vel acutiusculis, intus glabris, rectis, 0,01 longis, 0,003 latis. PETALA 5, obovata, obtusa, basi angustata, undulata, intus glabra, extus pubescentia, subaequalia, 0,011 longa, 0,003 lata. STAMINA 10, omnia fertilia, subaequalia; FILAMENTA linearia, basi latiora, apici angustata; ANTHERAE ovatae, vacillantes. — STAMINUM rudimenta in flore femineo filiformia, basi in verticillo connata. — GYNOPHORUM in tubo calycis librum, teres. OVARIVM lineare, utriusque angustatum, tomentosum, uniloculare; OVULA 10-16, compresso-ovoidea; STYLUS teres; STIGMA depressum, subbilobum. LEGUMEN rectum, lineare, basi cuneatum, apici acutum, margini carinato dense et in superficie sparsim pubescens, coriaceum, saepe 0,35 longum, 0,02 latum, reticulatim nervosum; epicarpio subcoriaceo; mesocarpio strato exteriori fibroso, strato interiore farinoso; endocarpio subcoriaceo, glabro. SEMINA 10-12, formâ et structurâ praecedentis speciei.

*Crescit in sylvis juxta Tjikao, etc.: JAVA, et in insula TIMOR  
(fide Herb. Clar. Prof. Reinwardt, Zippelius et Spanoghe).*

Deze soort werd door den Hoogleraar Reinwardt, en later ook door Zippelius en Spanoghe, op het eiland Timor gevonden. Op Java verzamelde de Hoogleraar Blume haar in de omstreken van Tjikao, en ik zag haar in het bewesten van de rivier Tjitarum gelegen voorgebergte Passir Heas. Zij is op laatstgenoemd eiland onder den naam *Kandajakkan* bekend, en wordt aldaar somwijlen door de inlanders bij de bereiding hunner spijzen, even als de vruchten der tamarinde, gebruikt.

Deze soort is, gelijk de Heeren Wight en Arnott opgemerkt hebben (Prod. Flor. Pen. I. p. 296), door den Heer De Candolle ten onrechte voor de *B. purpurea*, Linn. gehouden. Zij zoude, indien wij den habitus raadplegen, eene eigene groep kunnen vormen.

PHANERA. LOUREIRO NEC DE CANDOLLE.

SYMPHYPODA. DE CANDOLLE.

### VI. BAUHINIA KOCKIANA. KHS.

*B. foliis ovatis basi obtusis apici emarginatis tri-nerviis glabris, inflorescentiâ corymboso-racemosâ, petalis unguiculatis subrotundis.*

CAULIS scandens, compressus, cortice suberoso tectus; RAMI subteretes, fusei, glabri; RAMULI obscure tetragoni, quadri-sulcati, glabri; novelli sparsim pubescentes. FOLIA ovata, acuminata, acumine emarginato, basi cuneata vel obtusa, supra nitida, subtus glabra, in nervorum axillis fusco-pilosa, 0,1 longa, 0,045 lata, trinervia, nervis secundariis subparallelis; PETIOLI tetragoni, pubescentes, 0,01 longi. CIRRHII pedunculanei, compressi, sulcati, glabri, superne fusco-sericei. INFLORESCENTIA corymboso-racemosa, terminalis vel axillaris; PEDUNCULUS communis angulatus, sulcatus, fusco-pubescentis; PEDICELLI triangulares, sparsim pubescentes. BRACTEAE lanceolatae, acuminatae, dense pubescentes, minutae; BRACTEOLAE filiformes. ALABASTRI pars inferior cylindrica; pars superior globosa. CALYCIS tubus cylindricus, sulcatus, ferrugineo-sericeo-pubescentis, 0,015 longus, intus glaber; limbus quinque partitus: partes ovatae, acutae, extus ferrugineo-sericeae, intus glabrae, partim saepe conglutinatae, reflexae, 0,01 longae, 0,003 latae. PETALA quinque, inaequalia, — unum vexillum mentiens aequilaterale, altera inaequaliteralia, — subrotundata, obtusa, basi angustata, unguiculata, intus glabra, extus in nervis pilosa, 0,02 longa, 0,015 lata. STAMINA 8; tria fertilia, quinque sterilia: fertilia approximata; FILAMENTA teretia, attenuata, curvata, glabra; ANTHERAE subdidymae, in connexivo carnoso affixae, vacillantes: sterilia minora, inaequalia; FILAMENTA teretia, attenuata, glabra; antherarum rudimenta subrotunda. GYNOPHORUM cum calycis tubo concretum. OVARIIUM compressum, oblongum, utriusque angustatum, sigmoideum, margini dense fusco-sericeo-pilosum, uniloculare; OVULA 3 ad 6; STYLUS subcompressus; STIGMA capitatum, depressum. LEGUMEN stipitatum, uno latere recto, altero arcuato. SEMINA funiculo umbilicali lamelliformi affixa, disciformia.

*Crescit in sylvis montes Melintang: SUMATRA.*

Tab. 10. Figura Bauhiniae Kockianae. 1. Petalum postice visum. 2. Flos, genitalibus ablatis. 3. Flos, petalis ablatis. 4. Sectio transversalis antherae. 5. Calycis tubus verticaliter sectus et ovarium. 6. Ovarium verticaliter sectum. 7. Legumen immaturum verticaliter sectum. 8. Semen cum funiculo umbilicali. 9. Sectio verticalis seminis et funiculi. 10. Embryo juvenis cum integumento.

Deze soort heb ik in de bosschen gevonden, welke den voet van het beoosten Padang gelegen gebergte bedekten. Zij behoort tot de grootste slingerplanten, heeft eene zaamgedrukte steng, blinkende

bladen en schitterend gele, later rood wordende bloemen. Door den vorm harer bladen wijkt zij van de tot dusver bekende soorten af; doch door hare bloemdeelen behoort zij bij *Bauhinia*. Zij groeide in gezelschap van *Dissochaeta* en *Marumia*, waarmede hare bladen cenige gelijkheid hebben, en verspreidde, even als deze, haar loof en bloemen tusschen dat van de kroonen der hoogste boomen.

Deze fraaije soort, toegewijd aan Zijne Excellentie den Heer Baron de Kock, vroeger Luitenant-Gouverneur-Generaal van Neêrlandsch-Indië, thans Minister van Binnenlandsche Zaken, strekke in het wetenschappelijk stelsel om aan dezen edelen Staatsman, als bevorderaar der wetenschappen te herinneren, en tevens als een opentlijk bewijs der dankbaarheid van eenen harer beoefenaars.

### VII. BAUHINIA PYRRANEURA. KHS.

B. foliis suborbiculatis basi cordatis apici emarginato-acuminatis subtus in nervis, et bracteis cucullatis et inflorescentiâ corymboso-racemosâ ferrugineo-sericeis, petalis unguiculatis subrotundis.

CAULIS scandens, compressus, cortice suberoso, rimato, fusco tectus. RAMI subtetragoni, quadri-sulcati, nigri, glabri; RAMULI obscure tetragoni, quadri-sulcati, glabriusculi; novelli tetragoni, profunde sulcati, dense ferrugineo-pubescentes. FOLIA integra, suborbiculata, basi cordata, apici cum acumine brevi emarginato; adultiora subtus in nervis pubescentia; juniora supra glabra, subtus praesertim in venis et nervis ferrugineo-pubescentia, 0,16 lata, 0,17 longa, 9 nervia, nervis secundariis subparallelis; PETIOLI subteres, pubescentiâ ferrugineâ deciduâ tecti, 0,045 longi. STIPULAE admodum deciduae. CIRRI foliacei, compressi, versus apicem incrassati, pubescentes. INFLORESCENTIA corymboso-racemosa, oppositifolia vel terminalis: PEDUNCULUS communis angulatus, sulcatus, pubescens; PEDICELLI triangulati, sulcati, dense pubescentes, bibracteolati. BRACTEAE cucullatae, ovatae, obtusae, intus glabrae; BRACTEOLAE minutae, lanccolatae, admodum deciduae. ALABASTRUM clavatum, acutum, decem sulcatum, dense ferrugineo-pubescentia. CALYCIS tubus cylindricus, decem costatus, costis obtusis, intus glaber; limbus quinque partitus: partes ovatae, acutae, intus glabrae, saepe conglutinatae, reflexae, 0,008 longae, 0,004 latae. PETALA quinque, subaequalia, — unum vexillum mentiens aequilaterale, altera inaequaliteralia, — subrotunda, obtusa vel obtusiuscula, basi angustata in unguiculam, margini undulata, intus glabra, extus in nervis et unguiculis pilosis, 0,034 longa, 0,025 lata, flava. STAMINA 10, basi monadelphica, tria fertilia, septem sterilia; FILAMENTA primorum subtetragona, attenuata, glabra; ANTHERAE subdidymae, oblongae, infra medium affixae, vacillantes; rudimenta staminum subtetragona, corpusculis oblongo-ovoideis terminata. GYNOPHORUM tubo calycis adnatum, parte liberâ hirsutum. OVARIVM sigmoideum, eompressum, margini dense pubescens; OVULA 3 ad 10, compresso-ovoidea. STYLUS recurvatus, subcompressus, glaber; STIGMA capitatum, depressum.

*Crescit in sylvis montes Melintang: SUMATRA.*

Tab. 11. Figura *Bauhiniae pyrraneurae*. 1. Gemma floris. 2. Gemma floris aperiens. 3. Petala. 4. Flos, calyce et corollâ ablatis. 5. Flos, corollâ et staminibus ablatis. 6. Calycis tubus longitudinaliter sectus. 7. Ovarium longitudinaliter sectum. 8. Symmetria floris.

Op ongeveer 200 ellen boven zee groeit deze soort in het gebergte Melintang. Zij is door de ontwikkeling der bladen en somwijlen ook der bloemen opmerkenswaardig. De eersten hebben twee palmen lengte en even zooveel breedte, en de bloemen, welke bij derzelve ontwikkeling goudgeel gekleurd zijn, hebben soms zes duim middellijn. De *B. pyrraneura* heeft cenige verwantschap met *B. integrifolia*, Roxb. (*Flora Indica* II. p. 331); doch verschilt van deze door de meerdere grootte en door den vorm der bladen. Deze zijn bij de laatstgenoemde soort aan den top afgerond en hebben de middelnerf als eenen draad boven de bladschijf uitgegroeid.

### VIII. BAUHINIA ELONGATA. KHS.

*B. foliis basi cordatis, foliolis ovatis obtusis 5 nerviis ultra medium connatis subtus, et stipulis lanceolatis, et bracteis ovatis, et inflorescentiâ racemosâ ferrugineo-tomentosis, petalis ovali-oblongis unguiculatis.*

**ARBUSCULA** 8 metrarum alta; **TRUNCUS** brevis; **CORONA** oblonga, dense foliata; **RAMI** flexuosi, subteretes, fusi, glabriusculi; **RAMULI** obscure tetragoni, sparsim pubescentes; novelli tetragoni, dense ferrugineo-pubescentes. **FOLIA** basi cordata, apici sinu 45°; juniora utraque dense, adultiora subtus dense ferrugineo-pubescentia; foliola oblongo-ovata, obtusa, ultra medium coalita, 5 nervia, nervis secundariis parallelis, approximatis, 0,11 longa, 0,065 lata; **PETIOLI** tetragoni, superne et inferne incrassati, dense pubescentes, 0,04 longi. **STIPULAE** lanceolatae, pubescentes; **STIPELLAE** petiolo adpressae, filiformes, admodum caducae. **INFLORESCENTIA** oppositifolia, racemosa; **PEDUNCULUS** communis subteres, superne compressus, dense tomentosus; **PEDICELLI** trigoni, sulcati, bibracteolati. **BRACTEAE** ovatae, acutae, cucullatae, intus glabrae, extus tomentosae; **BRACTEOLAE** oblongae. **ALABASTRUM** clavatum, apici acutum, dense ferrugineo-tomentosum. **CALYCIS** tubus cylindricus, subsulcatus, intus glaber; limbus quinque partitus: partes lanceolatae, acutae, intus glabrae, saepe conglutinatae. **PETALA** quinque, subaequalia, ovali-oblonga, acuta, basi angustata in unguem, margini undulata, intus glabra, extus in nervis pilosa, 0,04 longa, 0,008 lata. **STAMINA** tria fertilia; **FILAMENTA** subteretia, versus apicem compressa, glabra; **ANTHERAE** oblongae, ad extremitates emarginatae, vacillantes. **GYNOPHORUM** tubo calycis adnatum, parte liberâ dense hirsutum. **OVARIVM** compressum, oblongum, utriusque attenuatum, dense cinereo-hirsutum, uniloculare; **OVULA** 6-8. **STYLUS** teres, hirsutus; **STIGMA** hemisphaericum, sulcatum. **LEGUMEN** lineare vel oblongo-lineare, basi angustatum, cuneatum, apici curvatum, dense fusco-tomentosum. **SEMINA** formâ et structurâ eorum *Bauhiniae ferrugineae*.

*Collegi ad flumen Baritto: BORNEO.*

Tab. 24. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Alabastrum, calyce ablato. 3. Flos apertus. 4. Ovarium, tubo calycis longitudinaliter secto. 5. Ovarium longitudinaliter sectum. 6. Leguminis valva.

## IX. BAUHINIA FERRUGINEA. ROXBURGH.

B. foliis basi cordatis, foliolis ultra medium conerctis obtusis quinque nerviis, stipulis et braetis obtusis, et inflorescentiâ racemosâ ferrugineo-pubescentibus, petalis longe unguiculatis obovatis.

Roxb., Flora Indica, II. p. 331. B. exeelsa, Khs. MS.

CAULIS scandens; RAMI bifarii, obscure tetragoni, glabri, laete fusci; RAMULI novelli tetragoni, quadrisulcati, dense ferrugineo tomentosi. FOLIA basi cordata, apici sinu 30° ad 45°, adultiora utraque glabra; juniora subtus, praesertim in nervis pubescentia; FOLIOLA oblongo-ovalia, obtusa, ultra medium connata, quinque nervia, nervis secundariis distantibus, 0,06 longa, 0,035 lata; PETIOLI subcylindrici, superne et inferne incrassati, pilosi, pilis deciduis, 0,02 longi. STIPULAE ovatae, obtusae, supra glabrae, subtus dense pilosae. CIRRHII stipulanei et folianei indivisi, saepe compressi, glabri vel pilosi. INFLORESCENTIA terminalis vel axillaris, racemosa; PEDUNCULUS COMMUNIS angulatus, sulcatus, dense ferrugineo-pubescentis; PEDICELLI trigoni, sulcati, bibracteolati. BRACTEAE ovatae, obtusae, intus glabrae, extus pubescentes; BRACTEOLAE oblongae, obtusae. ALABASTRUM dense ferrugineo-pubescentis, pentagonum, sulcatum, acutum. CALYCIS tubus subcylindricus, decem costatus, costis obtusatis, basi gibbus, intus glaber; limbus quinque partitus, reflexus: partes oblongo-lanceolatae, acutae, intus dense pubescentes, 0,035 longae, 0,006 latae. PETALA quinque, subaequalia, obovata, obtusa, basi cuneata, in unguem angustata, intus glabriuscula, extus dense sericeo-pilosa, 0,04 longa, 0,012 lata. STAMINA quinque; tria fertilia, duo sterilia; FILAMENTA tetragona, attenuata, glabra; ANTHERAE oblongo-lineares, utriusque emarginatae, in medio connectivi ampli affixae, 0,02 longae, 0,005 latae; rudimenta staminum filamentis tetragonis, attenuatis et corpusculis bilobis. GYNOPHORUM pro parte tubo calycis adnatum. PISTILLUM sigmoideum; OVARIIUM oblongum utrinque angustatum, dense sericeo-pubescentis; OVULA 4 ad 10; STYLUS compressus, apice dilatatus; STIGMA capitato-angulatum, depressum. LEGUMEN stipitatum, lineare, basi cuneatum, apici arcuatum, margini dense ferrugineo-pubescentis; endocarpium coriaceum glabrum; sarcocarpium strato celluloso et altero strato vasculoso formatum; epicarpium coriaceum, crassum, fuscum. SEMINA in locellis posita, discoidea, marginata, fusca, nitida, funiculo umbilicali lamelliformi, triangulari affixa. EMBRYO rectus; RADICULA teres, acuminata; COTYLEDONES subrotundae, obtusae, basi cordatae.

*Crescit ad montes Pamatton et Sakoembang: BORNEO.*

Tab. 23. Figura et analysis Bauhiniae ferrugineae. 1. Flos nondum apertus. 2. Flos, calyce ablato. 3. Flos, calyce et corollâ ablati. 4. Ovarium eum tubo calycis. 5. Idem longitudinaliter sectum. 6. Ovarii pars. 7. Semen cum funiculo umbilicali. 8. Semen verticaliter sectum. 9. Embryo.

De, door ons op Borneo verzamelde voorwerpen verschillen, door de veel grootere bloemen, van die, welke het Rijks Herbarium uit de verzameling van Roxburgh bezit. Tusschen de jonge en oude planten dezer soort bestaat er, behalve in de zamengroeiing der blaadjes, nog een groot verschil in de haren; deze zijn aan de jonge planten dikwerf vrij lang en van de bedekte deelen verwijderd; bij de oude, daarentegen, kort en tegen deze deelen aangedrukt. Deze soort hebben wij tusschen 50 en 200 ellen op den Pamatton en Sakoembang bloeiend, en als eene jonge plant op den berg Prarawin verzameld. Deze groeiplaatsen pleiten voor hare verspreiding op Borneo's zuid-oostkust.

## X. BAUHINIA SEMIBIFIDA. ROXBURGH.

B. foliis basi cordatis, foliolis ultra medium connatis oblongis obtusis 5 nerviis, stipulis falcatis, et bracteis lanceolatis, et inflorescentiâ racemosâ dense fusco-pubescentibus, petalis oblongis basi subcordatis unguiculatis.

Roxburgh, Flor. Indica, II. p. 330; Wallich, Plantae rar. Tab. 253.

*Crescit juxta Doekoe et Pao: SUMATRA.*

In de beide genoemde werken is deze plant uitvoerig beschreven of afgebeeld. Bij deze opgaven kan ik nog voegen, dat de bladen der jonge planten met langere haren bedekt zijn en de ondervlakte purperkleurig hebben. De *Bauhinia semibifida* is door ons gevonden in de bosschen, welke den alluvialen bodem van Sumatra's westkust bedekken.

## XI. BAUHINIA FULVA. BLUME.

B. foliis basi cordatis, foliolis obovalibus obtusis 5 nerviis ultra medium concretis, stipulis falcatis obtusis, bracteis ovatis et inflorescentiâ paniculato-racemosâ dense pubescentibus, petalis obovalibus obtusis extus villosis.

CAULIS scandens; RAMI subteretes vel obscure tetragoni sulcati, glabri; RAMULI bifarii, compressi, sulcati, subpilosi. FOLIA exciso-cordata, apici sinu 30° ad 40°; juniora supra glabra, subtus in nervis dense ferrugineo-pubescentia; adultiora utraque glabra, basi dense pubescentia; foliola obovalia, apici obtusa, raro acutiuscula, basi obtusa, margini subintegerrima, saepe pubescentia, 0,085 longa, 0,045 lata, ultra medium concreta, quinque nervia, nervis secundariis distantibus; PETIOLI juniores ferrugineo-pubescentes, adultiores glabri, subteretes, ad extremitates incrassati 0,03 ad 0,010 longi. STIPULAE ovato-falcatae, obtusae, intus glabriusculae, extus dense pubescentes; STIPELLAE obtusae, minutae. CIRRI pedunculanei, compressi, superne incrassati, glabri vel pubescentes. INFLORESCENTIA paniculato-racemosa, terminalis; PEDUNCULUS communis angulatus, sulcatus; PEDICELLI trigoni, sulcati, saepe 0,003 longi, dense cinereo-pubescentes. BRACTEAE oblongo-ovatae, acutae, intus glabrae, intus pubescentes; BRACTEOLAE flore approximatae, vix conspicuae. ALABASTRUM clavatum superne ovoïdeum, cinereo-pubescentis. CALYCIS tubus brevis, subpentagonus, intus glaber; limbus quinque partitus: partes ovali-oblongae, acutiusculae, intus glabrae, 0,006 longae, 0,002 latae, saepe conglomeratae. PETALA quinque, unguiculata, obovalia, obtusa, basi cuneata, intus glabriuscula extus dense villosa, 0,015 longa, 0,006 lata, alba. STAMINA 5, tria fertilia, duosterilia; FILAMENTA tetragona, attenuata, glabra; ANTHERAE ovatae, obtusae, basi cordatae, vacillantes; RUDIMENTA teretia, attenuata. GYNOPHORI pars cum tubo calycis coalita glabra, libera dense hirsuta. OVARIUM lineari-oblongum, compressum, utriusque angustatum, dense hirsutum; OVULA 6 ad 8; STYLUS compressus, superne glaber; STIGMA capitatum, subsulcatum.

*Crescit in sylvis montium Papandajang, Goentoer, etc.: JAVA.*

In de bosschen der gemelde bergen, tusschen de 600 en 1000 ellen boven zee, heb ik deze soort, als eene aanzienlijke slingerplant, aangetroffen. Zij is zeer rijk aan bloemen, welker kroonen bij de opening wit zijn en later geel worden.

## XII. BAUHINIA STIPULARIS. KHS.

B. foliis basi exciso-cordatis, foliolis oblongis acutiusculis ultra medium connatis 4-5 nerviis, stipulis suborbiculatis vel reniformibus, bracteis lanceolatis, inflorescentiâ corymboso-racemosâ, petalis oblongis acuminatis basi subcordatis.

CAULIS scandens; RAMI teretes, rugosi, griseo-fusci; RAMULI obscure tetragoni, sulcati, fusco-pubescentes. FOLIA basi cordata, apici sinu 30° ad 40°, supra glabra, adultiora subtus sparsim et juniora dense pubescentia; foliola oblonga, acutiuscula, 4-5 nervia, nervis secundariis distantibus, ultra medium connata, 0,075 longa, 0,035 lata; PETIOLI subteretes, inferne et superne compresso-incrassati, 0,04 longi. STIPULAE suborbiculatae vel reniformes, intus glabriusculae, extus pubescentes; STIPELLAE minutae, ovaes, obtusae. CIRRI simplices, subteretes. INFLORESCENTIA axillaris, oppositifolia vel terminalis, corymboso-racemosa; PEDUNCULUS COMMUNIS angulatus; PEDICELLI triangulati, trisulcati, longi, bibracteolati, dense pubescentes. BRACTEAE et BRACTEOLAE lanceolatae, acuminatae, pubescentes. ALABASTRUM subpentagonum, acutum, dense pubescens. CALYCIS tubus subpentagonus, inferne gibbus, decem sulcatus, intus glaber; limbus quinque partitus: partes lineari-oblongae, acuminatae, mucronulatae, intus glabrae, 0,025 longae, 0,003 latae. PETALA quinque, alba, unguiculata, subaequalia: unum vexillum mentiens oblongum, acuminatum, basi profunde cordatum; altera oblonga, acuminata, basi cordata, 0,01 lata, 0,025 longa, intus glabra, extus in nervo mediano sparsim pilosa. STAMINA 5: tria fertilia, duo sterilia; FILAMENTA tetragona, attenuata, glabra; ANTHERAE ovatae, superne acutiusculae, inferne subcordatae, vacillantes: sterilium filamenta eadem formâ, rudimenta antherarum gerentia. GYNOPHORI pars cum tubo calycis coalita glabra; pars libera dense pubescens. OVARIUM oblongum utriusque angustatum, dense pubescens, uniloculare; OVULA 3. STYLUS compressus, superne latior, glaber; STIGMA capitatum, truncatum. LEGUMEN lineare, basi cuneatum, apici rotundatum, acutum, lignosum, fuscum. SEMINA haud ab iis Bauhiniae ferrugineae diversa.

*Crescit in monte Singalang: SUMATRA.*

Ongeveer 600 ellen boven zec werd deze soort in de bosschen van den Singalang verzameld. Zij is bijzonder opmerkenwaardig door de aanzienlijke grootte en den vorm der nevenblaadjes. Hare klawieren, ten koste van de nevenblaadjes, van de bladen en somwijlen van de bloemen gevormd, zijn meestal ongedeeld en, even als die der andere soorten, bij welke zij enkelvoudig zijn, naar buiten omgerold.

## XIII. BAUHINIA CORYMBOSA. ROXBURGH.

B. foliis basi cordatis vel truncatis, foliolis rotundato — ovatis obtusis infra medium connatis, stipulis et bracteis lanceolatis, inflorescentiâ corymboso-racemosâ rufo-sericâ, petalis oblongis obtusis unguiculatis.

De Candolle, Prod. 2. p. 515; De C. Mem. s. l. Leg. p. 487, Tab. 70; Roxburgh, Flor. Ind. II. p. 329.

*Crescit in monte Singalang: SUMATRA, etc.*



BIJDRAGE TOT DE KENNIS

DER

**T E R N S T R O E M I A C E A E ,**

DOOR

**P. W. KORTHALS.**



Vele der geslachten van de familie der Ternstroemiaceae waren vroeger onder de Aurantiaceae gerangschikt. Uit dezen werden zij door den Heer Mirbel, wegens verscheidene kenmerken, die aan de echte Aurantiaceae vreemd waren, gescheiden, om onder twee afzonderlijke familiën, naar de voornaamste geslachten, Ternstroemieae en Theaceae genoemd, verdeeld te worden. Deze beide familiën behield de Heer De Candolle, wien de voorrang ten opzichte der afscheiding van de laatste familie, onder den naam Camellieae, toekomt, in zijnen Prodrômus, daarbij opmerkende, dat de Ternstroemiaceae en Camellieae later, door de ontdekking van tusschenvormen, welligt vereenigd zouden kunnen worden. De Ternstroemiaceae werden in gemeld werk in vijf afdeelingen gesplitst: Ternstroemieae, Frezieraee, Sauraujeae, Laplaceae en Gordonieae. Den beiden eerstgenoemden worden, als gemeenschappelijke kenmerken, schutblaadjes onder den kelk en vastgegroeide helmknopjes toegekend; zij worden onderscheiden door den stempel, die bij de Ternstroemieae zaamgegroeid, bij de Frezieraee als in twee tot vijf deelen gespleten, voorkomt, en door den vorm der kiem, welke de laatste afdeeling een weinig gebogen, en de eerste geheel boogvormig bezit. De Sauraujeae en de Laplaceae hadden het gemis der schutblaadjes met elkander gemeen; doch de Sauraujeae waren gekenmerkt door de zamengroeiing der bloembladen, door de vasthechting van de helmknopjes op den rug, en door het gescheiden zijn van de stijlen; de Laplaceae, door de vrije bloembladen, die de drie tot vier kelkbladen dikwerf in getal overtroffen, door de vasthechting der helmknopjes aan den voet, en door de zamengroeiing der stijlen; daarenboven wordt aan deze afdeling een vleezig-hoornaardig eiwit toegeschreven.

De Gordonieae, door den Heer De Candolle uit de Malvaceae en de Tiliaceae afgescheiden, worden door hem beschouwd, als eene aan de Ternstroemiaceae en de Camellieae verwante groep, die door het gemis van kiemwit van beiden afwijkt. — De Heer Cambessèdes, bij de bewerking van de Ternstroemiaceae voor de Flora Brasiliensis, al de hem ten dienste staande voorwerpen dezer familie, welke voornamelijk uit Amerikaansche soorten bestonden, onderzoekende, heeft zich voor de vereeniging der beide familiën, en tegen eene splitsing derzelve in groepen verklaard, omdat hij geene vaste kenmerken, die als grondslagen eener verdeeling konden dienen, tusschen de beide familiën en de geslachten vond. Dit gevoelen wordt door den Heer Lindley, die met de Ternstroemiaceae, zijne *alliance theales* vormt, aangenomen. De beide familiën zijn door den Heer Endlicher, onder den naam Ternstroemiaceae vereenigd gelaten, doch in zes afdeelingen: Cochlospermeae, Ternstroemieae, Sauraujeae, Laplaceae, Gordonieae en Camellieae, gescheiden, wier kenmerken van de bloem en de vruchtdeelen zijn genomen. Deze namen herinneren, met uitzondering van den eersten, de door den Heer De Candolle aangenomene benoemingen der afdeelingen, doch het wezen der door dezelve aangetoonde afdeelingen is veranderd. De Ternstroemieae bevatten nu de Ternstroemieae en de Freziereae De C.; de Laplaceae, met andere geslachten, het geslacht Laplacea; terwijl Cochlospermum de afdeeling van dien naam vormt.

Het onderzoek der in den Archipel verzamelde soorten heeft mij de gelegenheid verschaft, aan de Indische gewassen dezer familie de verdeeling te toetsen, welke voornamelijk op Amerikaansche vormen was gevestigd, en welligt ook, om eene juistere omschrijving der afdeelingen te geven. Daarenboven heeft mij dit de Calpandria, Pyrenaria en Adinandra, als echte leden der familie doen kennen, en in de Laplacea vulcanica en in Ploiarium, welke zeer verwant is aan Bonnetia, nieuwe vertegenwoordigers van Amerikaansche vormen doen vinden. De waarnemingen, door dit onderzoek gedaan, leveren de volgende uitkomsten. De Indische soorten zijn boomen, welke soms 30 N. ellen, doch meestal tusschen de 3 en 20 N. ellen hoogte hebben; of struiken, waaronder eenigen ééne el niet te boven gaan. Derzelve takken buigen zelden naar beneden, en de takjes, die rond of, en dit is niet zelden, zaamgedrukt zijn, worden bij sommigen door de zwaarte der vruchten nederwaarts gerigt. De stand der bladen tot elkander moet als afwisselend opgegeven en in verband beschouwd worden, als aan twee wijzigingen onderworpen: bij de eene in eene spiraal met het zesde blad boven het eerste: Ploiarium; bij de andere is de spiraal afgebroken: Eurya. Hun vorm ligt tusschen het ronde en dien van het lancet. Zij hebben de beide einden puntig en den rand gaaf, getand of gezaagd. De beide vlakken zijn bij de jonge bladen meestal door eenvoudige haren, of, zoo als bij Saurauja, door haren en saplooze schubjes bedekt; bij de oude bladen worden zij dikwerf glad. De knoppen zijn door schubjes bedekt of bloot: de eerste samenstelling, welke ook aan de Thea en Camellia eigen is, bezit de Calpandria; de tweede is die der andere geslachten. De laatsten hebben, in plaats van eene bladaardige bedekking, eene digte harige of schubachtige bekleeding. In de knoppen liggen de bladen eerst omvattend, vervolgens rijdend: Sarosanthera, Adinandra, Saurauja; of rijdend met de randen naar binnen op het bovenvlak gevouwen: Gordonia, Schima, enzv., waarbij op te merken is, dat dan de zaamgevouwen deelen meestal glad zijn. Nevenblaadjes heb ik bij geene der soorten waargenomen. — De bloemen staan meestal in de oksels der bladen, doch komen bij enkele soorten in groepen uit den stam of oudere takken te voorschijn: eene bloeiwijze, uit de eerste ontstaan, door het eigenaardige om op dezelfde plaats

bij herhaling de bloemen te ontwikkelen; of zij zijn, door het niet uitgroeijen der bladen, in trossen aan het einde der takjes aanwezig, of, in bijsehermen uit de oksels der bladen groeiende, vereenigd: in beide gevallen verraden zij, door hare plaatsing, de oorspronkelijke bloeiwijze. De bloemstelen zijn bij eenigen kort en bij anderen, zoo als *Ploiarium*, *Adinandra* enzv., tamelijk lang. Op dezelve vertoonen zich, bij de meeste soorten, twee schutblaadjes, door derzelve stand en vorm vershillende. Zij staan dikwerf zoo dicht bij den kelk, dat zij tot dezen sehijnen te behooren, en hebben dan de gedaante van kleine kelkbladen: *Eurya*, *Adinandra* enzv.; of zij zijn van dezen verwijderd, waardoor hun afwisselende stand duidelijker is, en komen dan als sehubjes (*Saurauja*), of als kleine blaadjes (*Ploiarium*) voor. Behalve deze beiden is er bij de trossen, aan den voet van ieder bloempje, een tegenover de spil staand schutblaadje, hetwelk dikwerf zeer vroeg afvalt. — De kelk van al de door mij onderzochte soorten is geheel vrij, bedekt de bloemkroon in den jeugdigen staat en vervolgens het jonge vruehtbeginsel, en blijft, veclal ook bij de vergrooting van dit, terug, dikwerf aanzienlijk uitgroeijende, om of onder de vrueht. Bij *Schima* bedekt de kelk, alleen bij hare eerste ontwikkeling, de bloemkroon. Bij de vruchten, welke openspringen (*Antheësehima*), duurt de kelk, aan dezelfde takken, onder de vrueht voort, of valt hij geheel of gedeeltelijk af; bij de vleezige vruechten blijft hij. De vijf kelkbladen, uit welke hij bestaat, bedekken elkander meer of minder door de grootte der sehijf, bij wijze van dakpannen, en staan in eenen onregelmatigen krans. In dezen stand zijn twee wijzigingen: de eene heeft het vijfde kelkblad tegenover de spil der plant: *Ploiarium*; de andere van de spil verwijderd. Zij zijn meestal vrij, somwijlen eenigzins zaamgegroeid, ongelijk in grootte, gewoonlijk de twee kleinste, en de drie grootste gelijkvormig, op de aan de lueht blootgestelde gedeelten door haren of schubben bekleed. De bloemkroon staat onder het vruehtbeginsel en valt kort na de bevruechting af. Zij bestaat uit vijf bloembladen; somwijlen, bij *Laplaea*, *Gordonia*, en ook bij *Thea*, zoo als mij het onderzoek van de Theeboomen op Java bewezen heeft, schijnbaar uit een grooter getal: want dan hebben de bedekte kelkbladen het aanzien der bloembladen aangenomen, of eenige helmdraden zijn tot bloembladen uitgegroeid. Vóór de opening liggen de bloembladen als dakpannen over elkander: *Gordonia*, *Eurya*, *Laplaea*; of als een peperhuis zamengerold: *Saurauja*, *Ploiarium*; na dezelve groeijen zij tot rozenvormige bloemkroonen, met kortere of langere buizen. Zij zijn geheel vrij, of aan den voet, zelden meer dan tot op een vierde van derzelve lengte, zamengegroeid. Hunne gedaante is langwerpig of rond, dikwerf onregelmatig door de grootere ontwikkeling van eene der zijden, bij de met eene gerolde bloemplooiing voorziene *Sauraujae* en *Ploiarium*. — De helmdraden zijn vijfvoudig in getal, dat met de beide bloemkransen gelijk staat: *Eurya*; of hetzelfde eenmaal, meermalen en zelfs tot twintigmaal overtreft: *Gordonia*, *Thea*. Onder het vruehtbeginsel geplaatst, omgeven zij dit als een gave ring of buis, of wel als een, die in verseheidene stukken gebroken is, naarmate van de zamengroeijing der draden. Bij *Calpandria* zijn de buitenste helmdraden in eene buis zaamgegroeid, en de binnenste geheel vrij; zij vormen met het benedenste gedeelte eene dikke buis, die niet gebroken is: *Sarosanthera*; of eene, in vijf stukken gespletene: *Adinandra*. In vijf bundels, tegen over de bloembladen staande, zijn zij bij *Ploiarium* vereenigd; terwijl de tusschenruimte over de kelkbladen door kleine uitgroeisels wordt aangevuld. Zij zijn alleen aan, of even boven hunnen voet met elkander en met de bloembladen zaamgewassen bij *Gordonia*, *Saurauja*, *Sehima* enzv.; geheel vrij bij *Eurya*, eenige *Sauraujae*, enzv. De zaamgegroeiden vallen gewoonlijk met de bloemkroon af en laten dan, zoo als bij *Saurauja*, eenen rand terug, die veel van

eenen *Diseus* heeft. De helmdraden zijn tamelijk lang en verschillen in hun vrij gedeelte, naar de meerdere of mindere zamengroeiing. De helmknopjes zijn met de helmdraden geheel: *Sarosantha*, of op het midden van den rug zaamgegroeid: *Saurauja*; of wel zij zijn op dezen geleed en bewegelijk, en dan op den rug, even boven het benedenste of op het midden, verbonden. Lijnvormig, langwerpig, aan de beide einden ongedeeld, of het eene einde in twee lobben geseheden, zijn zij bij *Saurauja*; eivormig, aan het benedenste einde, dat soms door ombuiging het bovenste sehijnt, hartvormig ingesneden bij vele anderen; en tweelobbig of uit twee, van elkander verwijderde halve eirkels bestaande, bij *Antheëishima*, *Sehima* enzv. Aan deze vershillende vormen heeft de helmknoop een wezentlijk aandeel: niet zoo zeer in lengte uitgegroeid zijnde, als de hokjes van den helmknoop, doet hij de helmknopjes tweelobbig worden; naar boven in een smal streepje uitlopende, geeft hij aan dezelve den vorm van een omgekeerd hart, dat naarmate hij min of meer boven de hokjes uitsteekt, spits is; breeder zijnde, zoodat hij eirond of bijna rond is, en alleen aan de zijden, maar niet aan de einden door de hokjes omgeven wordende, bepaalt hij den tweelobbigen vorm. De beide hokjes zijn aan weërszijden, of langs de zijden en op het binnenvlak van den helmknoop geplaatst. Zij zijn in den jeugdigen staat ieder in tweeën verdeeld, doch worden later, door de verwijdering van den tussehenwand des helmknops, bijna altijd tweehokkig, en toonen dan nog, alleen door eene in de lengte loopende groeve, de vroegere verdeling. Langs deze groeve heeft hunne opening plaats, die zeer dikwijls aan den top der hokjes begint. Bij sommige soorten: enkele *Sauraujae*, bepaalt zij zieh tot dit punt, waardoor deze dan sehijnbaar door poren het stuifmeel uitwerpen; bij de meesten echter verwijdert zij de beide helften langs de groeve in de geheele lengte. In hoever de opening door poren aan den voet: bij *Bonnetia*, hiermede overeenstemt, moet het onderzoek der voorwerpen leeren. — De gemelde hokjes bestaan uit een fijn buitenvlies (*Exotheeium*) en een dikker binnenvlies (*Endotheeium*). Het eerste is, bij tamelijk sterke vergrootingen waargenomen, effen, zonder eellen, en bedekt den geheelen helmknop. Het andere daarentegen bestaat uit eigenaardige eellen, die het binnenste gedeelte van de hokjes van den helmknop geheel bekleeden. Deze eellen, zoo geheel afwijkende van de gewone in de ontwikkelde en geopende hokjes, zijn, in een zeer vroeg tijdperk onderzocht, niet zoo vershillend. Zij zijn dan doorsehijnd, gevuld, effen, bijna kogelrond. Vervolgens komen zij meer verlengd, minder doorsehijnd, en aan de binnenzijde gestreept voor. Bij meer ontwikkelde helmknopjes nemen zij toe in lengte, en worden de strepen duidelijker en cirkel- of meer netvormig. Later, bij eene volkomene ontwikkeling, zijn de eellen langwerpig en aan de binnenzijde met netsgewijze verbundene, onregelmatig loopende strepen voorzien. Deze strepen, van het buitenvlies geseheden zijnde, hebben eenige overeenkomst met de spiraaldraden. — Het stuifmeel is gewoonlijk rond, effen of met kleine puntjes, en springt op drie vershillende punten, die gelijkmatig van elkander verwijderd zijn, open. — Het vruehtbeginsel is meest half kogelrond of eivormig, en heeft van één tot vijf hokken. In de eenhokkige vruehtbeginsels groeijen de moederkoeken of zaaddragers, uit den omtrek naar het middelpunt, en zijn zij aan het einde in twee deelen gespleten, die omgebogen zijnde, de gedaante eener halve maan hebben, en met de einden elkander naderen: *Sarosantha*. In de meerhokkige, hebben de zaaddragers in den binnensten hoek der hokken hunnen oorsprong. Zij zijn in deze onmiddellijk, of door middel van een dun plaatje, of door een klein steeltje bevestigd, en hebben de lengte van het hokje: *Ploiarium* enzv.; of komen voor in het bovenste gedeelte van hetzelfde: *Ternstroemia* enzv.; in het midden: *Saurauja*, *Gordonia*, *Calpandria*; of, zoo als bij *Stewartia*, even boven

het benedenste van hetzelfde. Hun vorm is die van een' cilinder: Ploiarium, van eenen halven bol: Sauraujae, onregelmatig, in verseheidene takjes verdeeld: Eurya, of gelijk aan lijnvormig uitstekende randen: Gordonia. De door dezelve gedragen wordende eitjes bieden geene mindere versehedenheid aan in getal, plaatsing, ontwikkeling enzv. Aan de lijnvormige zaaddragers zijn zij in een bepaald getal, drie tot acht, in twee naast elkander gelegene rijen en afwisselend aanwezig; aan de, naar het uiteinde verdeelden, is aan ieder takje een eitje tot een onbepaald getal, van twee tot tien en meer; zij zijn dikwerf zeer talrijk op de half bolvormige en eilindervormige zaaddragers en langs de randen van de verdeelde zaaddragers der cenhokkige vruchtbeginsels. Alleen bij Ploiarium zijn zij door mij, met het benedenste einde vastgehecht, bij de anderen hangende gezien. Door hunne ontwikkeling behooren zij tot de Campylotropa en Anatropa. De eersten, welke wij zeer wel gekromde eitjes konden noemen, bij Reinwardtia, Eurya, Sarosantha en z. v. aanwezig, hebben de raphe zeer kort. De anderen, of de gebogene eitjes, hebben in hunne buiging eenige belangrijke wijzigingen, welke wel waargenomen, doch in de beschrijvende kruidkunde niet genoegzaam zijn opgegeven. Aan de gebogene eitjes, waarin de raphe en het ligchaam van dezelve ongeveer parallel komen, werd door den Heer Mirbel de naam Ovula Anatropa gegeven. Bij allen heeft de buiging niet in dezelfde rigting, noch in dezelfde mate plaats; want bij eenigen: Saurauja, buigt het ligchaam van het ei van de spil af en is de raphe naar dezelve gekeerd, zoodat de eimond over den navel ligt: deze wijze van ontwikkeling zoude het woord extropa vrij juist uitdrukken; bij anderen buigt het ligchaam van het ei naar de spil, en de raphe van dezelve af, waardoor de eimond beneden het aanhechtingspunt van hetzelfde ligt. Deze binnenwaartse buiging heeft bij de door mij onderzochte soorten twee graden: de binnennavel ligt aan het benedenste einde van het ei: Gordonia en z. v.: eene uitgroeiing, die deze eitjes zeer wel ovula entropa, binnenwaarts gebogene eitjes, kon doen noemen; òf de binnennavel is aan het bovenste einde van het ei, waarmede eene kleine buiging des ligchaams van het ei, in de nabijheid van den zaadmond vergezeld is: Sehima; deze ontwikkeling, eene wijziging van de vorige zijnde, zoude deze half binnenwaarts gebogene eitjes den naam kunnen doen dragen van ovula hementropa. — De stijlen zijn somwijlen zeer kort. Hun getal is gelijk aan dat der hokken van het vruchtbeginsel; doch door zamengroeiing zijn zij dikwerf tot één ligchaam vereenigd. — De stempels bevinden zich aan het einde der stijlen of even beneden derzelve top, aan de binnenzijde; in het laatste geval is het stempelkanaal, de buis, waardoor de bevruchtende stof in het vruchtbeginsel dringt, van den top af aan tot op de helft der lengte, soms nog verder, open en het inwendige met kleine kliertjes bezet. — De vruchten zijn rond of eivormig, in den omvang hoekig of van diepe voren voorzien. In hare zelfstandigheid bezitten zij overgangen van het sappige tot het drooge houtige. Hare bekleedsels, ten minste de beide binnensten, hebben op deze versehedenheid beurtelings invloed. Het buitenvruchtbekleedsel (epiearpium) is, zoo lang de staat der vrucht het onderseiden laat, lederachtig, somwijlen vliezig. Het middelvruchtbekleedsel (sareoarpium) bestaat uit een vezelrijk sappig of droog vleesch, of uit eene vezelige, drooge stof, en het binnenvruchtbekleedsel (endoearpium) is vliezig, lederachtig of broos; in het laatste geval is het dikwerf vrij dik en glanzig, en heeft het daarenboven eenigen invloed op den aard der vrucht. Door hetzelfde worden de wanden der vruchthokken gevormd. Deze zijn door vergroeiing of door miswas, in grooter of kleiner getal, dan in het vruchtbeginsel, aanwezig: in grooter getal, bij Sarosantha, door de zamengroeiing van de bogen der zaaddragers, die de vrucht van drie- tot vijfhoekig maakt, en ieder

hok door de zaamgegroeide verbinding van twee naast elkander geplaatste bogen beperkt; in kleiner getal, door eene aanzienlijke vergrooing van het zaad. De drooge vruchten springen in even zoo vele kleppen open als er hokken zijn. Bij de meesten scheiden zich deze kleppen van boven af aan; tot op het midden der vrucht, zelden tot beneden, omgeven zij met het verbonden gedeelte een standertje, en dragen zij in het midden den tussehenwand van de beide hokken, die hunne helften bedekten. Bij *Ploiarium* beginnen de kleppen in het benedenste gedeelte der vrucht te openen, blijven zij met het bovenste om het standertje verbonden, en vormt ieder, omdat bij de opening de tussehenwanden gespleten zijn, een kaantje, dat het spitse eind naar boven gerigt heeft: eene wijze van openen, die de *Geraniaceae* herinnert, en ten naastenbij op hetzelfde beginsel rust. — Het gemelde standertje, dat reeds meer of min duidelijk in het vruchtbeginsel aangewezen kan worden, is eene voortzetting van de spil, die zich zoover uitstrekt als er zaden zijn vastgehecht, vermoedelijk om deze te voeden. In deszelfs lengte verschilt het derhalve naar de aanhechting der zaden: bij *Malaehodendron* is het waarschijnlijk zeer kort; deszelfs vorm verandert, naarmate een meer of min aanzienlijk gedeelte van de vruchtvormende bladen met deze verlenging der spil is zaamgegroeid. Aan hetzelfde bevinden zich de zaadragers als eilinders of als lijnvormige randjes. De vleezige vruchten blijven gesloten. Hare zaadragers ondergaan over het algemeen weinig verandering; doch somwijlen groeit derzelve eellig gedeelte vleezig tussehen de zaden uit. — De zaden zijn in een bepaald of onbepaald getal voorhanden. In een bepaald getal, van twee tot zes, voorkomende, zijn zij in ieder hok in twee rijen afwisselend vastgehecht; missehien wel, want dit is mij nog niet zeker genoeg gebleken, min of meer spiraalsgewijze rondom het standertje; of zij liggen, wanneer zij den rondscheitvorm nabij komen, boven elkander, of, zoo zij min of meer zaamgedrukt zijn, zoodanig, dat het hooger vastgehechte, altijd een gedeelte van het lager geplaatste bedekt. Wanneer hunne rigting niet door eene te groote ontwikkeling in omvang bepaald wordt, hetwelk aan het eene zaad eene andere rigting doet nemen, dan aan het andere, zijn zij nederdalend of hangende. Hun getal onbepaald zijnde, is hunne rigting door het punt van aanhechting bepaald: alleen bij *Ploiarium* is het vrije einde, even als bij de eitjes, naar boven gerigt. In hunnen vorm hebben zij de drie uitmetingen tamelijk gelijkmatig, of twee derzelve, de dikte en de breedte kleiner dan de lengte. De laatste of zaamgedrukte zaden zijn, behalve in het onderseheid, dat de verschillende verhouding van lengte en breedte veroorzaakt, vooral in derzelve dikte afwijkend: want bij eenigen is deze vrij gelijkmatig: *Eurya*, *Pyrenaria*; bij anderen is een gedeelte dikker, hetzij aan een der einden: *Gordonia*, hetzij in het midden, zoo als bij *Sehima*, welke het dikke gedeelte door eene vleezige uitbreiding omgeven heeft, of bij *Ploiarium*, dat alleen de beide einden zoodanig verlengd heeft. Hunne oppervlakte is glad, soms blinkend, of door kleine groefjes en puntjes, of door vleezige lobjes, ruw. Zij zijn bruin of, wanneer de opperhuid vleezig is, soms rood gekleurd. Behalve de gewone bekleedsels hebben de zaden de opperhuid soms tamelijk ontwikkeld. Bij *Reinwardtia* komt zij voor als kleine, over elkander liggende, eellige lobjes; bij andere geslachten is zij een effen vliesje of een vlies, dat uit zeer fijne, met een waterig vocht gevulde cellen bestaat. De buitenhuid is dik, broos of taai, of vleezig, soms een weinig lederachtig. Zij komt glad, doch ook niet zelden met kleine gaatjes voor, die dikwerf eenen vrij regelmatigen vorm hebben, en verharde helften van eellen sehijnen te zijn, van welke de andere helft vleezig is gebleven, en bij een naauwkeurig onderzoek, duidelijk zichtbaar wordt. De vleezige buitenhuid, die uit min of meer verlengde eellen bestaat, vormt het dunne

gedeelte der zaden, hetwelk hun het aanzien geeft van gevleugeld te zijn. Op deze buitenhuid staan de navel en het kiemgaatje (micropyle) in dezelfde verhouding als de navel en de eimond op het ei. De eerste heeft de gedaante van een' cirkel, van een cirkelsegment of van eene min of meer regelmatige ruit. De navelopening (omphalodium) vertoont zich als eene, door eenen cirkel omsehrevene holte en is bij de meesten klein, doch bij *Calpandria* enzv. tamelijk groot. Het kiemgaatje wordt dikwerf door eenen kleinen rand omgeven. Onder de buitenhuid is de middelzaadhuid soms nauwelijks meer te erkennen, en met de beide, haar insluitende zaadbekleedsels zamengegroeid of vereenigd, of als eene laag van cellen, met fijnere of dikkere wanden en eenvoudige of takkige vaatbundels, die de raphe vormen, aanwezig. — De raphe, vroeger door mij voedingsvat, doch beter navelvaatbundel genoemd, loopt in de zaden, met eene dikke buitenzaadhuid, door een kanaaltje, dat de gemelde harde huid omgeeft, tot dat zij de kern- of binnenzaadhuid breekt; in de anderen mist zij schijnbaar alle beperking. In de gekromde zaden is zij zeer kort; in de buitenwaarts gebogene heeft zij de lengte der zaden, en in de binnenwaarts gebogene wordt zij langs den geheelen rug, of met eene esvormige bogt, tot op het bovenste gedeelte van de kernhuid, waargenomen. Tot in de nabijheid van den binnennavel loopt zij bij allen onverdeeld voort. Hier echter, ten minste bij de groote zaden van *Calpandria* en *Pyrenaria*, verdeelt zij zich in versecheidene takken, die tussehen de buitenzaadhuid en de kernhuid verder uitgroeijen; bij de kleine en bij de gevleugelde zaden is deze verdeling nog niet door mij gevonden: ik beschouw den navelvaatbundel dus op dit oogenblik nog als onverdeeld. — De binnennavel (ehalaza) vertoont, wanneer de kleinheid der zaden de waarneming niet ondoenlijk maakt, zich als een kleine cirkel. Bij eene aanzienlijke vergrooting vertoont deze cirkel geheel anders gevormde cellen als de omgevende kernhuid, en bij de onrijpe zaden van *Gordonia* heb ik ze tot binnen deze huid gevonden, in de gedaante van een rondscheitig ligehaam (Tab. 27. fig. 16, 17, 18), dat naar boven in een' kleinen cilinder was uitgroeid. Onder dezelfde gedaante of eenigzins naar dezen vorm gewijzigd, is de chalaza door mij ook bij onvruchtbare zaden van *Shima* gevonden. In vruchtbare, half rijpe zaden is daarentegen, in plaats van den gemelden cilinder, de jonge kiem waargenomen. Deze waarnemingen in verband gebragt hebbende met anderen van dien aard, en bij eenige zaden, waarbij de ehazala duidelijk en de navelvaatbundel grooter is, later uitgebreid, doen mij nu eene stelling wagen, die mij, daar zij de analogie voor zich heeft, van eenig belang sehijnt te zijn: dat namelijk de binnennavel vergeleken kan worden met een' knop, in het eerste tijdperk zijner ontwikkeling, en dat de navelvaatbundel de drager van dezen knop is. In de zaadstrengen, die niets anders zijn dan vrije, niet met het ligehaam van het zaad zamengegroeide navelvaatbundels, kan de samenstelling dezer bundels het best nagegaan worden, en in deze vaatbundels dezelfde deelen, als in die van jonge, kiemende plantjes of ontwikkelende takjes, worden aangetoond; namelijk, bekleedsel, vaatbundel: uit spiraalvaten en lange cellen bestaande, en in het midden van dezen bundel, eellen. Wordt nu deze vergelijking verder voortgezet, dan is het buitenbekleedsel met de sehors van den tak, de vaatbundel met het houtligehaam of de gewone vaatbundels, en het binnenste met het merg te vergelijken, en in het zaad, de buitenzaadhuid met de sehors, de middelzaadhuid, in welke korte eellen de vezels of verlengde eellen vervangen, met het houtligehaam of de vaatbundels; terwijl de binnenzaadhuid als eene laag van cellen, die van de middelzaadhuid geseheden is — men denke sleehts aan de ontwikkeling en samenstelling der bladen — kan worden aangenomen. Later, bij eene andere gelegenheid, zal ik hierop terugkomen en de waarnemingen uitvoeriger mededeelen, welke voor deze

stelling pleiten. — De binnenzaadhuid is vliezig of eenigzins lederachtig. — De kern is gekromd of regt. Zij bestaat uit kiemwit en kiem, of wordt door de kiem alleen gevormd. Het kiemwit omgeeft de kiem geheel, als eene dikkere of dunnere laag van witte, vleezige stof; of het komt tusschen de plooiën der zaadlobben en in eene zeer dunne laag tegen de binnenzaadhuid voor. De kiem heeft bij allen het worteleinde naar het kiemgaatje, en de zaadlobben naar den binnennavel gerigt. Bij Saurauja, misschien ook wel bij de anderen, is zij door een fijn vliezig buisje omgeven, dat haar van het eiwit scheidt en, in een buisje versmald, met het kiemgaatje verbindt (Pl. 19. fig. 20). Door een aanzienlijk kiemwit omgeven zijnde, heeft zij eenen rolronden vorm en laat zij de zaadlobben, alleen door de insuede, die de scheiding aanwijst, van het worteltje onderscheiden. Met weinig kiemwit omgeven of geheel naakt zijnde, bezit de kiem het worteltje zeer klein in verhouding tot het geheel; meestal in eene loodregte lijn met de zaadlobben, doch bij Schima gebogen, met den benedenrand derzelve parallel loopende. Ook bij alle dezen is het min of meer rolrond. De zaadlobben der naakte kiemen zijn plat, vlak en, ongevouwen of ongeplooid, in zeer zamengedrukte zaden; doch gevouwen en soms met talrijke plooiën, in dikkere zaden; bij Thea zeer dik. In de door mij onderzochte Indische soorten is het pluimpje weinig of bijna in het geheel niet zichtbaar.

---

Door deze beschouwing van de verschillende organen hebben wij verscheidene afwijkingen tusschen dezelve leeren kennen, die bij eene verdeeling in aanmerking konden komen. De belangrijkste derzelve schijnen mij in de zamenstelling van den knop, de ligging der bloembladen vóór de opening van de bloemkroon, in die van het openspringen der vruchten, en in de ontwikkeling der eitjes te bestaan. De knoppen leveren het eerste onderscheidend kenmerk ter afzondering van de Camellieae, die dezelve door schubben bedekt en de bladen en bloemen vereenigd hebben; terwijl zij bij de overigen naakt en de beide deelen gescheiden zijn. De ligging van de bloembladen is dakpansgewijze bij de Gordonieae en Ternstroemieae, en zaamgerold bij de Sauraujeae en Ploiarieae. Tusschen de beide laatsten kan het openspringen der kapsels, die door splinging der wanden (septicida) plaats heeft bij Ploiarieae, of in het midden der hokjes (loculicida) bij Sauraujeae, een middel ter onderscheiding opleveren. En om de Gordonieae en Ternstroemieae te scheiden, zou de uiterlijke vorm van het zaad, doch vooral de grondvorm, die reeds in het eitje aangewezen wordt, in aanmerking kunnen komen; de eerste hebben binnenwaarts gebogene, en de tweede gekromde eitjes.

De Ternstroemieae uit den Archipel zijn: Reinwardtia, Sarosantha, Adinandra en Eurya; de Sauraujeae: Saurauja; de Ploiarieae uit die streek, Ploiarium, en uit Zuid-Amerika, Bonnetia, Archytaea enzv.; de Gordonieae, Laplacea, Antheëschima, Closaschima, Schima, Pyrenaria; en de Camellieae: Calpandria.

---



## REINWARDTIA. KHS.

CALYX pentasepalus, persistens, sepalis inaequalibus, imbricatis. COROLLA pentapetala, petalis basi connatis, eum sepalis alternantibus, aestivatione imbricatâ. STAMINA multa; FILAMENTA corollae basi adhaerentia, linearia, basi connata; ANTHERAE basi affixae, biloculares; CONNECTIVUM mutieum. OVARIIUM liberum bi-triloculare, loculis 1—4 ovulatis; OVULA a placenta prominente pendula, campylotropa. STYLUS teres; STIGMA partitum vel radiatum. BACCA sicca. SEMEN solitare, pendulum, hippocrepiformi-complicatum. EPIDERMIS SEMINALIS carnosotuberculatum; TESTA crustacea; TEGMEN membranaceum. EMBRYO cylindricus, bicurvis, in axi albuminis carnosus; COTYLEDONES et RADICULA superae.

ARBUSCULAE. FOLIA alterna, versus apicem ramorum fasciculatim approximata, integerrima, coriacea. STIPULAE nullae. PEDUNCULI uniflori.

Het geslacht *Reinwardtia* is zeer na verwant aan de, van het vasteland van Indië, door den Heer Wallich beschrevene *Anneslea*, en de van Zuid-Amerika bekende *Ternstroemia*. Van beiden verschilt het door de veelbladerige bloemkroon en den stompen helmknoop; van *Anneslea* daarenboven door den vorm van den stempel en doordien de vrucht niet met den kelk is zaamgegroeid; van *Ternstroemia* door den verdeelden stempel en de niet openspringende vrucht. Daarentegen bestaat er tusschen de zaadbekleedsels van *Anneslea* en *Reinwardtia* eene opmerkelijke gelijkvormigheid en, zoo ik, naar het onderzoek der *Ternstroemia Brasiliensis* mogt besluiten, ook met het geslacht *Ternstroemia*. Bij de gemelde soort van dit geslacht, even als bij die der eerstgenoemden, heeft het zaadbekleedsel drie deelen: eene vleezige, dikwerf roodgekleurde epidermis; eene kraakbeenige, bij allen tamelijk dikke testa, en een vliezig tegmen.

De beide soorten van *Reinwardtia* zijn door ons, in de bosseken van het weinig boven zee verheven Doekoe, op Sumatra, verzameld. Als kleine struikjes groeiden zij op oude boomstammen, in gezelschap van *Asplenium*, *Polypodium*, *Lycopodium*, *Vanda* en *Dendrobium*. Hare wortels waren grootendeels tusschen de talrijke wortelvezels der varen verborgen; hare takken groeiden bijna regt en droegen naar de uiteinden de dikwerf in kransen vereenigde bladen, benevens de bloemen, welke in de oksels der bladen gezeten waren of door de geringe ontwikkeling der bladen in trossen of aren stonden. De bloemen hadden eene geel-witte kleur; en vermengden met den aromatischen vanieljegeur der geopende *Vanda*-bloemen, eenen zwakken eitroenreuk.

Bij de opgave van de geslachtskenmerken heb ik het buitenste zaadbekleedsel, dat de Heeren Wallich en Endlicher eenen zaadrok noemen, als epidermis seminalis beschreven: eene verandering, die gegrond is op de waarneming van de uitgroeiing der bekleedselen van het zaad. In den jeugdigen staat hebben de eitjes de gewone vleezige bekleedsels, uit enkele lagen van meer of min dicht celweefsel bestaande. Vervolgens, na de ombuiging der eitjes, zijn deze vliezen dikker, en bestaan zij uit meerdere lagen van eellen. In een later tijdperk vertoonden mij de onrijpe zaden een zeer fijn tegmen van langwerpige eellen, eene nog weeke testa, die uit lagen van dikwandige eellen bestond, en rondom deze,

een saprijk bekleedsel, waarin alleen eene sterke vergrooing de cellige structuur deed waarnemen. Met het rijper worden der zaden nemen de gemelde zaadbekleedsels in dikte, en de beide binnensten tevens in vastheid en in hardheid toe. Het buitenste, de epidermis seminalis, verandert bij deze uitgroeiing geheel van gedaante. Zij bestaat dan uit een aantal roode lobjes, die door kleine, dikwandige celletjes gevormd zijn.

De vroeger voorgestelde geslachtsnaam *Reinwardtia* in het wetenschappelijk stelsel niet aangenomen zijnde, heb ik het als eenen aangenamen pligt beschouwd, om dezen naam op nieuw aan tot dusverre onbekende gewassen te geven. Ik wensch op die wijze eene gepaste hulde te brengen aan eenen beoefenaar der Kruidkunde, die haar gebied, zoowel door het vermeerderen van het aantal bekende voorwerpen, als door wetenschappelijke bijdragen heeft uitgebreid. Zij biedt mij tevens eene gunstige gelegenheid aan, om opentlijk en dankbaar te erkennen, dat ik steeds in den Hoogleraar Reinwardt een' welwillend' leidsman en belangstellend' raadgever heb mogen vinden.

#### I. REINWARDTIA PATENS. KHS.

*R. foliis obovatis, stigmatibus radiatis.*

ARBUSCULA pseudo-parasitica, tri-pedalis, diffusa; RAMI subteretes, verrucosi vel laeves, grisei; RAMULI ultimi subtetragoni, glabri, fusci. FOLIA subopposita, saepe subverticillata, versus apices ramorum conferta, obovata, acutiuscula, integerrima, utrinque glabra, coriacea, longa 7 c. m., lata 4 c. m.; PETIOLI in ramis articulati, semi-teretes, supra sulcati, longi 7 m. m. FLORES alarcs, axillares vel foliorum abortu racemosi; PEDUNCULI bibracteolati, subteretes, glabri; BRACTEOLAE alternae, oblongae, obtusae, admodum caducae. ALABASTRUM subglobosum. CALYX pentasepalus, aestivatione imbricatâ; SEPALA subrotunda, obtusa, ciliata, coriacea, persistentia. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA basi cohaerentia, subrotunda, breviter unguiculata, obtusissima, crenulata, carnosae, decidua. STAMINA numerosa, biserialia; FILAMENTA basi connata inter se et cum corolla, brevia, linearia; ANTHERAE basi affixae, lineares, ab apice dehiscentes. OVARIUM ovoideum, pubescens, (abortu?) biloculare; OVULA solitaria ternave, pendula ab placenta partita vel indivisa. STYLUS brevissimus; STIGMA disciforme, decem-sulcatum. BACCA oblonga, glabriuscula, abortu monosperma. SEMEN pendulum, oblongum, compressum, basi obtusissimum, vertice emarginatum; hippocrepiformi-complicatum, cruribus fere aequalibus; SPERMODERMIS SEMINALIS tuberculata, succosa, aurantiaca; TESTA crustacea, flavescens; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS hippocrepiformis, cruribus subaequalibus, teres. EMBRYO in medio albuminis carnosus, teres, bicurvis; RADICULA obtusa; COTYLEDONES arcte connatae, lineares, obtusae; PLUMULA haud conspicua.

*Crescit juxta Doekoe: SUMATRA.*

Tab. 12. Figura speciei. 1. Flos. 2. Symmetria floris. 3. Petala tria expansa, intus visa. 4. Antherae. 5. Ovarium. 6. Ovarium longitudinaliter sectum. 7. Ovarium adultius verticaliter sectum. 8 et 9. Ovula. 10. Fructus sectus. 11. Semen, epidermidis parte ablatâ. 12. Epidermis seminalis aucta. 13. Lobulus epidermidis seminalis admodum auctus. 14. Semen verticaliter sectum. 15. Testa, nucleo exciso, verticaliter et 16. horizontaliter secta. 17. Nucleus verticaliter sectus. 18 et 19. Embryones.

## II. REINWARDTIA ELONGATA. KHS.

R. foliis oblongis, stigmatè trilobo.

ARBUSCULA pseudo-parasitica, diffusa; RAMI recti, teretes, glabri, fusci; RAMULI subcompressi vel subtetragoni, cinereo-fusei. FOLIA subopposita, versus ramorum apices fasciculatim approximata, oblonga, utrinque acuta, integerrima, glabra, coriacea, subavenia, 9 c. m. longa, 4 c. m. lata; PETIOLI semiteretes, supra sulcati, 2 c. m. longi, glabri. FLORES axillares vel racemosi; PEDUNCULI alterni, compressi, saepe ancipites, glabri. ALABASTRUM sphaericum. CALYX pentasepalus, aestivatione imbricatâ; SEPALA inaequalia, subrotunda, obtusissima, coriacea. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA subrotunda, obtusa, suberenulata. STAMINA numerosa; FILAMENTA basi connata, corollae adhaerentia, linearia; ANTHERAE basi affixae, oblongae, muticae. OVARIVM hemisphaericum, glabrum, tri- vel biloculare, loculis 3—5 ovulatis; OVULA pendula a placentis partitis. STYLUS subcylindricus, glaber; STIGMA trilobum.

*Crescit juxta Doekoe, etc.: SUMATRA.*

Tab. 12. 2. Figura speciei. 1<sup>a</sup>. Alabastrum. 2<sup>a</sup>. Calyx explicatus. 3<sup>a</sup>. Corolla explicata. 4<sup>a</sup>. Antherae auctae. 5<sup>a</sup>. Ovarium. 6<sup>a</sup>. Ovarium verticaliter sectum. 7<sup>a</sup>. Ovarium adultius verticaliter sectum.

## SAROSANTHERA. KHS.

CALYX bibracteolatus, pentaphyllus, persistens, foliolis subaequalibus, aestivatione imbricatâ. COROLLA pentapetala, petalis basi connatis, aestivatione imbricatâ. STAMINA plurima; FILAMENTA monadelphia, petalorum basibus adhaerentia; ANTHERAE introfsae, biloculares, muticae, basi affixae, rimis longitudinalibus dehiscentes. OVARIVM liberum, triloculare, loculis 6—10 ovulatis; OVULA a placenta, ex apice anguli centralis producta, pendula, campylotropa. STYLUS teres; STIGMA tripartitum. BACCA sicca, bi-trilocularis. SEMINA 4—10 in singulo loculo, saepe deformia, hippocrepice-complicata. EPIDERMIS SEMINALIS succosa; TESTA crustacea; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in axi albuminis carnosì, bicurvis, cylindricus; RADICULA et COTYLEDONES superac.

ARBORES. FOLIA alterna, coriacea. FLORES axillares, solitaires.

De Sarosanthera verschilt van Cleyera door de, bijna in hare geheele lengte zaamgegroeide stuifdraden, en de hierdoor op eenen vleezigen ring, in twee tot vier rijen geplaatste helmknopjes; door den stompen helmknoop, en door het grooter getal eitjes, welke aan eenen verdeelden, nederhangenden moederkoek bevestigd zijn. Van Adinandra is Sarosanthera te onderscheiden door de wijze van zamengroeiing der helmraden, en vooral door het zamenstel der vruchten.

De naam voor dit geslacht heb ik ontleend van de stijve haren, welke aan den bundel der stuifdraden eenige overeenkomst met eenen bezem geven. De eene soort hebben wij op de westkust van Sumatra,

tusschen 200 en 500 N. ellen hoogte, de andere op de zuid-oostkust van Borneo, langs de Doesonrivier en in de bergachtige oorden verzameld. Zij groeijen tot aanzienlijke boomen, met stammen van vijftien N. ellen lengte, en langwerpige, digt met bladen bedekte kroonen. In den droogen tijd bloeijen zij zeer welig, terwijl in den regentijd de groei der bladen toeneemt.

### I. SAROSANTHERA EXCELSA. KHS.

S. foliis ellipticis, petalis obovatis hirsutis.

ARBOR excelsa, saepe 20 metrorum; TRUNCUS rectus, cylindricus, cortice cinerascete tectus, ligno rubicundo, valido, fibris tenuibus; CORONA oblonga, dense foliata; RAMI alterni, subpatentes, teretes, laeves, cinerei; RAMULI compressiusculi, glabri. FOLIA alterna, elliptica vel oblongo-ovalia, basi angustata, apice acuta vel obtuse acuminata, integerrima vel obsolete crenulato-dentata, utrinque glabra, coriacea, 0,15 longa, 0,05 lata; PETIOLI 0,01—0,005 longi, semiteretes, supra plani, glabri. GEMMAE conicae, acutae, pubescentes. FLORES axillares, solitares vel geminati, speciosi, albidi; PEDUNCULI teretes, apice et basi incrassati, glabri, subcarnosi, albi. BRACTEAE duae, inaequales, subrotundae, obtusae, glabrae, minutae. CALYX pentasepalus, aestivatione imbricatâ; SEPALA inaequalia: tria exteriora minora, orbiculata, crenulata; duo interiora late-rotundata, integerrima, emarginata, carnosae. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA basi connata, obovata, obtusa, saepe undulata, extus versus apicem hirsuta, carnosae, alba. STAMINA numerosa; FILAMENTA monadelphae, corolla adhaerentia, glabra; ANTHERAE basi affixae, lineari-oblongae, acutiusculae, dense hirsutae, loculis rimis longitudinalibus dehiscentibus. OVARIVM liberum, hemisphaericum, in stylum attenuatum, glabrum, triloculare; OVULA 6—10 in singulo loculo; primo recta, demum hippocrepica, affixa in placenta, ex apice anguli loculi producta. STYLUS teres, glaber; STIGMA tripartitum, partibus filiformibus, obtusis. BACCA sicca, subglobosa, stylo persistente mucronata, glabra: — pericarpio coriaceo, sarcocarpio subcarnoso, fibroso, endocarpio crustaceo, — abortu uni- vel bilocularis; DISSEPIENTUM membranaceum. SEMINA 4—10, saepe deformia, hippocrepiformi-complicata, compressa; HILUM et EXOSTOMIUM approximata. EPIDERMIS SEMINALIS succosa; TESTA crustacea, extus rugosa, intus laevis; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS bicurvis, albus. EMBRYO in axi albuminis carnosus, cylindricus; RADICULA obtusa; COTYLEDONES lineares, obtusae; PLUMULA haud conspicua.

*Crescit ad ripas fluminis Doesson et ad montem Pamatton: BORNEO.*

Tab. 16. Figura hujus plantae. 1. Flos. 2. Flos, calyce ablato. 3. Flos, calyce, corollâ et dimidia parte staminum ablatis. 4. Staminum fasciculus extus visus. 5. Anthera aucta. 6. Antherae transversa sectio. 7. Ovarium. 8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Placenta aucta, cum ovulis superne visa. 10. Eadem a latere visa. 11. Ovulum. 12. Fructus cum calycis parte. 13. Fructus verticaliter sectus cum seminibus. 14. Fructus verticaliter sectus, seminibus ablatis. 15, 16, 17, 18, 19. Semina. 20. Semen, parte epidermidis ablata. 21. Semen verticaliter sectum. 22. Embryo.

De voorwerpen van de opgenoemde groeiplaatsen verschillen, op het gezigt, een weinig door den rand der bladen en de rigting der bloemstelen, en bij het onderzoek, door de schutblaadjes. Aan de voorwerpen van Tanjong Petong zijn de stompe zaagtanden der bladen tamelijk duidelijk, en staan de bloemstelen bijna regt of slechts weinig naar buiten gebogen. Hunne schutblaadjes hebben eene zeer ongelijke grootte: het eene groeit weinig uit in vergelijking van het andere, dat tot een ovaal blaadje vergroot wordt. De, bij Karrau geplukte voorwerpen bezitten grootere bladen en omgebogene, kortere bloemstelen, zijnde de schutblaadjes bijna gelijk door vorm en grootte.

Van de beschrevene voorwerpen verschillen de op Sumatra, in het gebergte Singalang, gevondene, door den korteren bladsteel, den langwerpig ovalen vorm der bladen, en doordien de bloembladen van buiten geheel glad zijn. Als soort aangenomen zijnde, zoude men haar *S. leiopetala* tot naam kunnen geven.

#### ADINANDRA. W. JACK.

W. Jack, in Hooker Companion to the Bot. Magaz. I. pag. 153.

**CALYX** bibracteolatus, pentasepalus, aestivatione imbricatâ. **COROLLA** pentapetala, aestivatione convolutâ, petalis basi cohaerentibus. **STAMINA** 20—25; **FILAMENTA** subpolyadelphe; **ANTHERAE** basi affixae, oblongae, loculis longitudinaliter dehiscentibus. **OVARIUM** liberum, uniloculare; **OVULA** numerosa, in placentis tribus vel quinque, apice bifidis et reflexis affixa, campylotropa. **STYLUS** teres, glaber; **STIGMA** sulcatum vel partitum. **BACCA** sicca, confluentibus placentis, tri- ad quinque-ocularis. **SEMINA** numerosa, hippocrepiformi-complicata, compressa, hilo et exostomio approximatis; **TESTA** crustacea, fragilis; **TEGMEN** membranaceum. **EMBRYO** in medio albuminis subcarnosi, bicurvis, teres; **RADICULA** acutiuscula; **COTYLEDONES** lineares, acutiusculae; **PLUMULA** minuta.

**ARBUSCULAE.** **FOLIA** alterna, coriacea. **FLORES** axillares, saepe solitaires.

Door de wijze van zamengroeiing der helmdraden, door het eenhokkig vruchtbeginsel en de van drietot vijfhoekige vrucht, door de aanzienlijke menigte zaadjes, welke de, uit het midden der vrucht voortkomende moederkoeken bedekken, verschilt Adinandra genoegzaam van Sarosanthera en ook van Cleyera, met welke laatste de Heer Arnott haar heeft willen vereenigen.

De vijf bekende soorten zijn op Sumatra en Borneo verzameld. In het westelijk gedeelte van eerstgenoemd eiland en op het zuid-oostelijke van het laatstgemelde zijn zij, van eene weinig boven het zeevlak verheven hoogte, tot op ongeveer 600 ellen boven hetzelfde verspreid. Zij groeijen zoowel in de schaduwrijke bosschen, als in de meer opene streken, doch bloeiden het weligste op belommerde plaatsen. Over het algemeen zijn het kleine boompjes met korte stammen en bijna piramidale kroonen, die door een effen glanzig, donker groen loof, en in den bloeitijd daarenboven door talrijke witte, dikwerf nedergebogene bloemen zijn versierd. De bloeitijd duurt, blijkens waarnemingen op Adinandra Jaekiana

gedaan, zeer kort; de bevruchting begint reeds vóór de opening van de bloem. Het vruchtbeginsel vertoont zich, zeer jong zijnde, eenhokkig, met drie of vijf moederkoeken, die uit den omvang der holte voortkomen. Ieder dezer moederkoeken groeit tot in het midden van de holte, en verdeelt zich daar in twee omgebogene beenen. In een' meer uitgegroeiden staat van het vruchtbeginsel zijn de omgebogene deelen van deze plaecntae elkander genaderd, waardoor in de holte drie tot vijf hokjes, soms zelfs, ten gevolge van de vergrooting der verdeeling van de plaecntae, een nog grooter getal, gevormd worden. Door de genoemde zaadragers loopt van den bodem van het vruchtbeginsel af aan, langs het begin van de splitsing, een bundel vaten. Deze verdeelt zich in zijnen loop en geeft naar de eitjes takken af, welke niet zelden uit ééne spiraal, die uit een' draad bestaat, worden gevormd. — De eitjes volgen de gewone ontwikkeling der campylotropen. De kiem begint in dezelve, even boven de bogt, naar den eimond; hare ontwikkeling heeft kort na hare verschijning eenen ronden, vervolgens eenen ovalen vorm en, na meerdere uitgroeiing, dien van een' cilinder.

### I. ADINANDRA JACKIANA. KHS.

A. foliis oblongo-ellipticis obtuse acuminatis, gemmis glabris, pedunculis in pulvinis articulatis, petalis glabris.

ARBUSCULA 5—7 metrorum; TRUNCUS rectus, cylindricus, laevis, fuscus; CORONA pyramidalis, patens; RAMI patentes, teretes, glabri, fusei; RAMULI subteretes vel subtetragoni, glabri. FOLIA alterna, subdisticha, patentia, oblongo-elliptica, breviter obtuse acuminata, saepe cum mucronulo pubescente, obsolete crenulata, utrinque glabra, coriacea, 0,04 lata, 0,08 longa, nervis vix conspicuis; PETIOLI semi-teretes, supra sulcati, glabri. GEMMAE subteretes, elongatae, glabrae. FLORES axillares, solitares vel geminati, nutantes; PEDUNCULI teretes, sursum incrassati, glabri. CALYX bibracteolatus, pentasepalus, aestivatione imbricatâ; BRACTEOLAE suboppositae, calyci approximatae, subrotundae, ciliolatae, glabrae, coriaceae, persistentes; SEPALA erecta, subrotunda, obtusissima, ciliolata, glabra, carnosocoriacea, 0,008 longa, 0,006 lata. COROLLA pentapetala, subcampanulata, aestivatione convolutâ; PETALA oblongo-ovalia, obtusa, glabra, carnososa, alba, 0,015 longa, 0,01 lata. STAMINA 25, biserialia; FILAMENTA monadelphica, ad medium usque connata, subtetragona, pilosa; ANTHERAЕ basi affixae, oblongae, glabrae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. POLLEN sphaericum. OVARIVM liberum, hemisphaericum, apice attenuatum, glabrum, uniloculare; OVULA numerosa, affixa in placentis quinque ex ambitu cavitatis productis, versus apicem bipartitis, partibus reflexis, campylotropa. STYLUS teres, glaber; STIGMA sulcatum vel quinquefidum. BACCA sieca, ovoïdeo-globosa, in stylum attenuata, glabra; — epicarpio subcoriaceo, sarcoearpio fibroso, endoearpio subcoriaceo, — quinquelocularis placentarum conerescentiâ. SEMINA numerosa; hippoerepiformi-complicata, saepe reniformia, fusea, nitida, hilo et exostomio approximatis; TESTA crustacea, fragilis; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in axi albuminis, bicurvis, cylindricus; RADICULA et COTYLEDONES longitudine aequales.

*Crescit in monte Galangan-Kwo: SUMATRA.*

Eenmaal slechts heb ik deze gewassen gevonden, en wel bij eenen togt over het gebergte Galangan-Kwo (\*). Zij stonden in eene groep bij elkander, rondom een graf, op den top van dit gebergte, en waren dus vermoedelijk daar aangeplant. Dit laatste doet de dichterlijke denkwijze dezer bewoners eer aan, daar zij in het gebladerte, dat eenen zeer donkeren tint bezit, het beeld van den dood of de verduistering van het ligchaam hebben meenen te zien, en bij de witte, telkens vernieuwende bloemen, aan het onstoffelijke van den begravenen hebben gedacht. Onder welken naam deze plant bij de Maleijers van Padang enzv. bekend is, weet ik niet, doch op Benkoelen draagt zij dien van *Dawn Sariboe*, hetwelk, naar de gewone wijze van vertolking overgebracht, duizend-bladen zoude beteekenen. Dit zoude echter geheel tegenstrijdig zijn, daar de boom niet naar de menigte van bladen, maar veeleer naar die der bloemen kan genoemd worden. Het komt mij dus waarschijnlijker voor, dat de kletterende beweging der harde bladen aanleiding tot dien naam kan gegeven hebben, in welk geval de overbrenging van denzelven, naar ons taaleigen, zoude moeten wezen: bladen, die kletterend bewegen.

## II. ADINANDRA TRICHOCORYNA. Khs.

A. foliis ovalibus utrinque acutiuseulis, gemmis hirsutiusculis, pedunculis in pulvinis articulatis, petalis glabris.

ARBUSCULA; RAMI erecti, versus apicem incurvati, subflexuosi, teretes, glabri, fusci; RAMULI subcompressi, glabri, novelli hirsutiusculi. GEMMAE oblongae, compressae, saepe falcatae, acutae, ubique vel in margine hirsutiusculae. FOLIA alterna, erecto-patentia, ovalia, basi angustata, apice submarginata acutiuscula, obsolete rotundato-crenulata, utrinque glabra — novella subtus, praesertim in nervo medio hirsutiuscula —, coriacea, 0,07 longa, 0,035 lata, supra laete olivacea, subtus flavo-virentia, nervis patentibus; PETIOLI subteretes, supra sulcati, glabri, 0,005 longi. FLORES axillares, solitarii; PEDUNCULI in pulvinis inserti, reflexi vel cernui, subteretes, sursum incrassati, glabri; BRACTEOLAE suboppositae, subaequales, rotundatae, ciliolatae, extus saepe carinatae, pubescentes, intus glabrae. CALYX pentasepalus aestivatione imbricatâ; SEPALA basi connata, corollâ apertâ erecta, corollâ delapsâ conniventia, demum patentia, inaequalia, obovato-rotundata vel subrotundata, obtusa, glabra, ciliolata, medio carnosâ, margine membranacea. COROLLA pentapetala, campanulata, aestivatione convolutâ; PETALA obovata, obtusa, glabra, alba, margine membranacea. STAMINA numerosa; FILAMENTA polydelpha, introrse glabra, extrorse hirsuta; ANTHERAE 4—5 seriales, basi affixae, oblongo-lineares, connectivo producto mucronatae, extus dense hirsutae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. OVARIUM liberum hemisphaericum, in stylum attenuatum, glabrum, spurio-quinqueloculare; OVULA numerosa, placentis ex axe loculi productis affixa. STYLUS cylindricus, sursum paulum attenuatus; STIGMA obtusum, subsulcatum. BACCA sicca, calyce suffulta, turbinata, in stylum persistentem attenuata, glabra, quinque- ad decem-locularis, dissepimentis crassis. SEMINA multa, saepe superimposita, biserialia, com-

(\*) De naam *Galangan-Kwo* doet aan den Juno-vogel denken, welke aldaar zeer menigvuldig voorkomt en de omstreken door zijn sehel geluid, als kœō klinkende, doet weërgalmen. Het geluid wordt door gālāngān zeer wel gekenmerkt; dit gālāngān brengt gewis het woord *klank* voor den geest, als metaalgeluid.

presso-nephroidca, laevia, spadicea; HILUM lineare et EXOSTOMIUM approximatis; TESTA crustacca; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in medio albuminis carnosi, cylindricus, bicurvis, cruribus inaequalibus; COTYLEDONES obtusae; RADICULA acuta.

*Crescit in Poeloe-lampeï, juxta Martapoera, in monte Pamatton: BORNEO.*

Aan de voorwerpen van iedere opgegevene grociplaats is iets eigenaardigs, hetwelk, zoo de overgangen niet bekend waren, tot de invoering van verscheidene soorten aanleiding zou kunnen geven. De voorwerpen van Poeloe-lampeï, hierboven beschreven, hebben de bladen het kleinste. Grooter zijn zij aan de op Martapoera geplukte takken; daarenboven hebben deze bladen niet zeer spitse punten en soms eene op de onderzijde dicht behaarde middelnerf. Aan andere voorwerpen van daar, zijn de bladen iets langer en aan de onderzijde van de middelnerf min of meer behaard; zij komen in vorm met die van Poeloe-lampeï overeen. De derde vorm, aan den berg Pamatton groeiende, gelijkt op dien van Poeloe-lampeï, doch verschilt door de meer rond-ovale gedaante der bladen en door de kortere bladstelen. Deze drie vormen kunnen als verscheidenheden, met de namen *A. angustata*, op Poeloe-lampeï; *obtusata*, aan den Pamatton; *acuta*, bij Martapoera, aangeduid worden.

### III. ADINANDRA DASYANTHA. KHS.

*A. foliis oblongo-ovalibus, pedunculis et petalis dense sericeis.*

ARBUSCULA 8 metrorum; RAMI erecto-patentes, teretes, pallide fumei, glabri; RAMULI subteretes, dense pubescentes. FOLIA alterna, oblongo-ovalia, basi acuta, apice acutiuscula, integerrima vel obsolete crenulata, ciliolata, supra glabra, subtus in nervo medio dense pubescentia, — novella subtus pubescentia, — coriacea, 0,04 lata, 0,11 longa; PETIOLI semi-teretes, supra plani, pubescentes, demum glabri, 0,015 longi. FLORES axillares, solitarii, bibracteolati; PEDUNCULI teretes, superne incrassati, pubescentes, admodum deciduae. CALYX pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ; SEPALA erecta, subaequalia, rotundata, obtusissima, saepe emarginata, ciliolata, extus in medio pubescentia, carnosae, margine membranaceae, 0,006 longa et lata. COROLLA pentapetala, patens, aestivatione convolutâ; PETALA obovata, obtusa, intus glabra, extus dense sericea, carnosae, alba, 0,014 longa, 0,01 lata. STAMINA 20—25; FILAMENTA basi monadelphae, parte libera lineari, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongae, acutae, dense hirsutae, pilis erectis, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. OVARIIUM hemisphaericum, apice attenuatum, pubescens, uniloculare; OVULA numerosa, campylotropa, in placentis tribus vel quinque ex ambitu cavitatis productis, bifidis affixa. STYLUS teres, glaber; STIGMA truncatum, sulcatum. FRUCTUS et SEMINA praecedentis speciei.

*Crescit in sylvis montis Melintang: SUMATRA.*



## IV. ADINANDRA EXCELSA. KHS.

A. foliis oblongo-ovalibus glabris, pedunculis in axillis sessilibus, petalis glabris.

ARBOR 10 metrorum; TRUNCUS rectus, cylindricus, cortice cinerascete tectus; CORONA pyramidalis, foliosa; RAMI alterni, patentes, teretes, fusci, glabri; RAMULI subteretes, glabri, raro pubescentes. GEMMAE elongato-conicae, pubescentes, praefoliatione equitante. FOLIA oblongo-ovalia, acutiuscula vel breviter obtuse-acuminata, basi angustata, obsolete serrulata, utrinque glabra vel subtus punctulis rugosa, coriacea, 0,14 longa, 0,055 lata; PETIOLI semiteretes, supra plani, glabri, 0,01 longi. FLORES axillares, solitarii, subnutantes, hibractcati; PEDUNCULI subteretes, glabri; BRACTEAE subrotundae, obtusissimae, glabrae, ciliolatae. CALYX pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ; SEPALA subaequalia, erecta, subrotunda, obtusissima, ciliolata, glabra, coriacea, 0,007 longa et lata. COROLLA pentapetala, subcampanulata, aestivatione convolutâ; PETALA basi connata, oblonga obtusa, extus intusque glabra, carnosa, 0,012 longa, 0,006 lata, alba vel flavescens. STAMINA multa; FILAMENTA subpolyadelpa: fasciculis tribus vel pluribus; FILAMENTORUM partes liberae lineares, glabrae; ANTHERAE basi affixae, oblongae, dense hirsutae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. OVARIIUM liberum, subglobosum, apice attenuatum, glabrum, uniloculare; OVULA numerosa, campylotropa. OVULORUM insertio; FRUCTUS et SEMINUM structura haud ab Adinandra Jackiana diversae.

*Crescit in montibus Sakoembang et Pamatton, ad ripas Pankinan: BORNEO.*

Tab. 18. 1. Figura Adinandrae excelsae. 1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Flos, calyce ablato. 4. Flos, calyce et corollâ ablatis. 5 et 6. Stamina. 7. Antherae sectio transversalis. 8. Ovarium, calyce, corollâ et staminibus ablatis. 9. Ovarium verticaliter sectum. 10. Ovarii sectio transversalis. 11. Loculi pars. 12. Placentae sectio transversalis valde aucta ex ovario juniore. 13 et 14. Ovula. 15. Fructus. 16. Fructus transversaliter sectus. 17. Fructus transversalis sectio. 18. Semen. 19. Semen verticaliter sectum. 20. Symmetria floris.

Door den ongunstigen invloed van den diorietbodem des bergs Pamatton, zijn de hier groeiende Adinandra excelsa veel minder ontwikkeld dan die, welke langs de Pankinan-rivier en aan den berg Sakoembang zijn waargenomen. De laatsten hebben dit eigenaardige, dat de schutblaadjes dicht bij den kelk staan en kleine kelkbladen gelijken; de beide eerst opgegevenen komen in de plaatsing op eenigen afstand van den kelk, en in de gedaante van deze schutblaadjes overeen.

## V. ADINANDRA ACUMINATA. KHS.

A. foliis ovalibus acuminatis, pedunculis in pulvinis insertis verrucosis.

ARBUSCULA 6—8 metrorum; RAMI patentes, teretes, fusci, glabri; RAMULI subcompressi, pubescentes. GEMMAE subteretes, elongatae, dense sericeo-pubescentes. FOLIA alterna, saepe subdisticha, ovalia vel oblongo-ovalia, saepe obliqua, acuminata, acumine mucronulatâ, basi acuta, serrulata, supra

glabra, subtus pubescentia, — adultiora saepe glabra, — coriacea, 0,12 longa, 0,04 lata; PETIOLI semi-teretes, supra plani, 0,004 longi. PEDUNCULI alares vel axillares, in pulvinis insertis, solitarii, uniflori, teretes, verrucosi, 0,01 longi. BRACTEAE ovatae, obtusae, minutae. CALYX pentasepalus; SEPALA subaequalia, subrotunda, obtusa, glabra, coriacea. BACCA sicca, globosa, stylo mucronata, pubescens, quadri- vel bilocularis; DISSEPIENTUM subcarnosum. SEMINA plurima, hippocrepiformi-complicata, oblonga, compressa, utroque obtusa; TESTA crustacea; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in medio albuminis carnosus, hieruris, cylindricus; RADICULA et COTYLEDONES longitudine fere aequales.

*Crescit in sylvis montis Melintang: SUMATRA.*

EURYA. THUNBERG, R. BROWN, DE CANDOLLE, BLUME, ETC.

FLORES polygami. CALYX bibracteolatus, pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ, sepalis subaequalibus. COROLLA pentapetala, campanulata, aestivatione imbricatâ, petalis saepe cohaerentibus. STAMINA 10—25, uni- vel biserialia; FILAMENTA basi subcohaerentia, glabra; ANTHERAE basi affixae, saepe basi cordatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes, connectivo in laminam mucronulatam producto. — Flos femineus eum rudimentis filiformibus staminum. — OVARIIUM liberum, tri- quinqueloculare; OVULA in singulo loculo plura 4—20, placentis ex angulo centrali productis pendula vel biserialiter superimposita, campylotropa. STYLUS tri- quinquefidus vel-partitus; STIGMATA acuta. BACCA pisiformis tri- quinquelocularis. SEMINA plura, pendula vel biserialiter superimposita, hippocrepiformi-complicata, compressa vel angulata; EPIDERMIS SEMINALIS membranacea; TESTA crustacea; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS bicurvis, cylindricus, albus. EMBRYO in axi albuminis granulati, cylindricus, radiculâ et cotyledonibus superis.

ARBUSCULAE semperviventes. FOLIA alterna, coriacea, serrata. FLORES axillares, solitarii vel conferti, parvi, albi vel flavi; PEDUNCULI uniflori.

Dit geslacht werd door Thunberg voor eene, door hem op Japan gevondene plant, *E. japonica*, gevormd, die, volgens hem, onder andere kenmerken, kapselaardige vruchten had. Genoemd kenmerk is door den Heer De Candolle in zijne Monographie der Ternströmiaceae overgenomen; onder bijvoeging, dat Kämpfer aan deze plant eene bes toeschreef. De Heer R. Brown bevestigde de juistheid der beschrijving van den laatsten, bij de bekendmaking van eene uit China afkomstige soort, *E. chinensis*. Het kenmerk van den Heer R. Brown herhaalde de Heer Cambessèdes in zijne Monographie (*Mémoires du Museum d'Histoire Naturelle*, Tom. 16, pag. 403 etc.). Daarentegen gaf de Heer Blume, misleid door de verkeerde opgave van Thunberg, voor *Eurya*, onder den naam *Geeria*, een op eigene onderzoekingen steunend geslachtskenmerk, bij de beschrijving der op Java en Celebes gevondene soorten. Even zoo deden de Heeren Wight en Arnott, *Prodromus Florae Peninsulae*, pag. 86, die in hun kenmerk *albumen none* opnemen; terwijl de Heer Blume, en ook ik, dit kenmerk in alle soorten gevonden hebben.

Door verscheidene der opgenoemde schrijvers is de verwantschap van *Eurya* en *Freziera* (Swartz), en door den Heer Endlicher nog onlangs die van *Freziera* en *Lettsomia* (Ruiz en Pavon) opgegeven. Het onderscheid der beide eerstgenoemde geslachten is in de dikwerf plaats hebbende afzondering der geslachtsdeelen, in de aan den voet hartvormige insnede en in de aanhechting der helmknopjes gezocht. Deze kenteekenen ter onderscheiding hebben, door de juistere beschouwing der bekende soorten van *Eurya*, hunne waarde verloren, omdat in dezelfde bloemen, dikwerf de beide geslachten voorkomen, de helmknopjes niet zelden aan den voet eene hartvormige insnede hebben en steeds aan den voet zijn vastgehecht. Het onderzoek van een vruchtbeginsel van *Freziera thaeoides* doet mij vermoeden, dat men door eene naauwkeurige waarneming van de bloem- en vruchtdeelen eenige afwijking, die tot onderscheidend kenmerk kan dienen, zal vinden; daar ik bij de eitjes de Chalaza tegenover het Exostomium vond. Hierom heb ik de geslachten niet vereenigd. Omtrent *Lettsomia* (Ruiz en Pavon), hetwelk, volgens de beschrijving, niet van *Freziera* afwijkt, kan ik alleen naar de, in den Prodrromus van gemelde schrijvers voorkomende opgave en afbeeldsel oordeelen, en schijnt mij de vereeniging van *Freziera* en *Lettsomia* niet ongepast. Het nader onderzoek zal hier beslissen omtrent de verdeling in geslachten; doch als natuurlijke vormen zijn de *Euryae* voor de Flora van Azia's zuid-oostelijke deelen, hetgeen de *Frezierae* voor die der oostelijke streken, en de *Lettsomiae* voor die der westelijke oorden van Zuid-Amerika zijn.

De soorten van *Eurya* behooren aan de Chineesch-Japansche, de Emodische, de Indische en de Polynesische Flora. Twee derzelve, *Eurya japonica* en *E. littoralis*, zijn door de Heeren Thunberg en von Siebold op Japan gevonden. Op zijnen togt naar Peking, werd de *Eurya chinensis* door Abel waargenomen. Andere soorten zijn door de Heeren Wallich en Royle aan den voet van het Himalaya-gebergte verzameld: de *E. acuminata* op 30° N. Br. tot op eene hoogte van 2200 N. ellen. Enkele soorten zijn ons door de Heeren Wight en Arnott, als op het schiereiland Decan groeiende, bekend gemaakt. De Heeren Wallich en W. Jack vermelden Pinang als hare groeiplaats; de Heeren Reinwardt en Blume verzamelden soorten van *Eurya* op Java en Celebes, en wij vonden dezelve op Java, Sumatra en Borneo. — Omtrent de gelijkheid of het onderscheid der in deze verschillende gewesten voorkomende soorten, waag ik het niet, eenige beslissing te doen, omdat, in een zoo natuurlijk geslacht, alleen eene vergelijking van voorwerpen en zeer uitvoerige beschrijvingen of afbeeldingen, tot derzelve bepaling kunnen dienen.

Op de gemelde groote Sunda-eilanden groeijen de soorten van *Eurya* van het zeestrand af tot op eene hoogte van ongeveer drie duizend N. ellen boven het zeevlak; de *Eurya glabra* en *E. coneocarpa* op Java, op ongeveer 2600 N. ellen, tegen den berg Gédé; de *E. obovata* Bl., op het gebergte van de noord-oostkust van Celebes; de *E. reticulata*, op eene hoogte van 3000 N. ellen, op den Merapi op Sumatra; de *E. Blumeana*, aan den Patjeha, Tankoeban-prahoe enzv. op Java, op 2000 N. ellen; de *E. nitida*, van het zeestrand af tot op eene hoogte van 1000 N. ellen, op Borneo; de *E. angustifolia*, op Sumatra aan het zeestrand en op ongeveer 600 N. ellen boven het zeevlak. De bodem, welke haar tot standplaats strekte was, in al de door ons bezochte streken, kiezelaardig, of min of meer, in de nabijheid der kraters, verglaasd en moeilijk tot verwerking overgaande: zoodat de *Euryae*, als bewijzen van eenen niet zeer

vruehtbaren grond kunnen worden beshouwd. Zij groeijen gezellig, als kleine groepen verspreid, in de vlakke, of als hoofdplanten in de nabijheid der kraters. Op de laatste groeiplaatsen zijn zij dikwerf slechts kleine struikvormige, op de eerste meer ontwikkelde boompjes. Derzelver kroonen zijn langwerpig, soms open en door geel-groene bladen bedekt. Aan het einde der jonge takjes zijn de pas ontwikkelende bladen soms blaauw gekleurd, en er wordt alsdan een overgang van deze kleur door het donker-groene naar het geel-groene waargenomen. Tusschen de geel-groene bladen staan de kleine bloemen in de oksels alleen, gepaard of in grooter aantal vereenigd. Zij versieren, telkens vervangen wordende, de planten het geheele jaar. Ongeveer vier maanden na derzelver bloei vertoont zich de rijpe vrucht, eene kleine blaauwe ronde bes, en niet zelden prijken dan de pas ontluikende bloemen en de rijpe vruchten naast elkander.

De bloemen der door mij onderzochte soorten waren tweeslachtig, mannelijk, of vrouwelijk. Meestal hadden dezelfde planten deze drie verscheidenheden vereenigd; zelden waren zij tweehuizig. De mannelijke, vrouwelijke en tweeslachtige bloemen hebben een zelfde zamenstel, met eene vijfvoudige verdeeling en eenen afwisselenden stand der vershillende kransen. In dezelve zijn twee- of vijfmaal zooveel helmraden als deelen, in eene, twee tot drie rijen geplaatst. Deze hebben de helmraden niet zelden aan den voet met elkander en met de bloembladen zamengegroeid. Hunne helmknopjes zijn langwerpig, vóór de opening dikwerf tot kleine vierkante vakjes ingesnoerd; zij beginnen van den top af aan open te springen, en openen zich verder in de lengte. Hun stuifmeel is kogelrond, somwijlen met eenen ring omgeven; bevochtigd, wordt het eivormig en springt dan aan de beide einden open. — Het vruchtbeginsel versehilt weinig in uiterlijken vorm en inwendig zamenstel; het is bijna rond, drietot vijfhoekig. Daarentegen zijn bij de aanhechting der eitjes, en later nog duidelijker in de vrucht, twee grondvormen te onderscheiden. De eerste, de *Eurya Blumeana* enzv., heeft den moederkoek van het jonge vruchtbeginsel in twee naast elkander staande plaatjes verdeeld, langs welke de eitjes boven elkander zijn vastgehecht: dus in loodrechte rijen. In de vruchten zijn de beide deelen van de plaenta door een uitgegroeid vliezig plaatje van het middelpunt verwijderd, en aan de einden omgebogen. Hierdoor zijn nu de zaden nog in twee rijen gesteld, doch nu door het gemeld verlengend vliesje van het onverdeeld gedeelte van de plaenta verwijderd. Somwijlen is dit vliezig plaatje genoegzaam verlengd, om de hokjes in tweeën te verdeelen, en dus het getal te verdubbelen. Bij de tweede, *Eurya nitida* enzv., komt de plaenta, als een bijna rolrond ligehaam, uit den binnensten hoek van het hokje, en verdeelt zij zich vervolgens in even zoo vele takken, als er eitjes zijn. Aan deze takken hangen de eerst rechte en vervolgens omgebogen eitjes. In de vruchten vullen de zaden de geheele hokjes zoodanig, dat de plaenta geheel door hen bedekt wordt. Zij zijn dikwerf aan kleine vleezige takken, vermoedelijk de verdikte deelen van de plaenta, bevestigd. Hun vorm, door de voor hunne ontwikkeling aanwezige ruimte bepaald, is dikwerf zeer onregelmatig, zaamgedrukt, niervormig of hoekig. In hun zamenstel hebben zij eene vleezige epidermis seminalis, eene bruine, brooze testa, een vliezig tegmen en eene witte, als een hoefijzer gebogene kern, waarin eene rolronde, gebogene kiem, door een korrelig kiemwit volkomen omgeven wordt.

## I. EURYA EUPRISTA. Khs.

*E. ramulis pilosis, foliis elliptico-oblongis acuminatis serratis, floribus confertis, sepalis emarginatis, fructibus oblongo-rotundatis.*

ARBUSCULA 3—6 metrorum; TRUNCUS brevis, cylindricus, laete fuscus; CORONA elongato-pyramidalis, aperta; RAMI alterni, patentes, teretes, fusci, glabriusculi; RAMULI compressi, dense et laete fusco-pilosi. GEMMAE elongatae, compressae, dense pilosae. FOLIA alterna, patentia, elliptico-oblonga, acuminata, supra basin serrata, supra nitida, subtus pubescentia, — juniora subtus, praesertim in nervo medio dense pubescentia, — coriacea, 0,07 longa, 0,02 lata; PETIOLI subteretes, pubescentes, 0,002 longi. FLORES polygami, axillares, saepe 4—10 conferti, raro geminati vel solitarii; PEDUNCULI uniflori, teretes, glabriusculi, 0,002 longi. FLORES masculi. CALYX bibracteolatus, pentasepalus, persistens, aestivatione subimbricatâ; BRACTEOLAE ovatae, acutae, glabrae; SEPALA inaequalia, rotundata, emarginata, glabra. COROLLA pentapetala, subcampanulata, aestivatione imbricatâ; PETALA aequalia, ovato-oblonga, obtusa, emarginata, glabra, trinervia. STAMINA 20, biserialia; FILAMENTA basi subcohaerentia, subuliformia, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongae, basi cordatae, longitudinaliter dehiscentes, connectivo brevi mucronulato. PISTILLI rudimentum semi-ovoïdeum, attenuatum. FLORES feminei. CALYX et COROLLA floris masculi. STAMINUM rudimenta filiformia, glabra. OVARIUM ovoïdeum, acutum, glabrum, tri-quadriloculare; OVULA 10—16 in singulo loculo, placentis ex angulo loculi productis et bipartitis affixa, biserialia, superimposita, campylotropa, disciformia. STYLI tres ad quinque, filiformes, patentes; STIGMATA acuta, recurvata. BACCA pisiformis, oblongo-rotundata, tri-quadrilocularis, glabriuscula, stylos persistentes ferens, epicarpio membranaceo, sarcocarpio succoso, fibroso, endocarpio subcrustaceo, fragili, tri-quadrilocularis. SEMINA 10 vel plura in singulo loculo, in placentis ex axi anguli loculi productis, bipartitis et membranaceis affixa, biseriata, superimposita, oblonga, compressa vel quadriquetra, scrobiculata, fusca; TESTA crustacea, fragilis; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS cylindricus, hippocrepiformis, albus. EMBRYO in medio albuminis granulosi, bicurvis, cylindricus; RADICULA et COTYLEDONES fere aquales.

*Crescit juxta Doekoe, Pinang etc.: SUMATRA.*

Als struiken met langwerpige of ronde kroonen, of als kortstammige boompjes met piramidenvormige, naar beneden versmallende of geknotte kroonen, was de *Eurya euprista*, in de door ons bezochte streken van Sumatra, tamelijk verspreid. Zij groeit daar in de nabijheid van het meir Samawang, in de zogenaamde twintig Kotta's, op eene hoogte van 500 tot 700 N. ellen, in eenen bruinen, leemigen zandgrond, uit welken, wel is waar, goud wordt opgedolven, doch waar de rijst slechts een' vijfvoudigen en soms nog geen' tweevoudigen oogst oplevert. Hier stond zij in gezelschap van *Myrtus spectabilis*. In de lage streken, bewesten de bergketen, is zij op de opene, onbeschaduwde plaatsen, waar de afgespoelde grond de bovenlaag vormt, tot aan het groote bosch vrij menigvuldig. Over deze glooiende vlakke wast de *Eurya euprista* alleen staaude, of als gezellige plant, of in vereeniging met andere gewassen. Nu eens bestaan deze groepen uit struikvormige gewassen, dan weder uit boomen, struiken en slingerplanten. Bij de eerstgenoemden zijn het vooral *Myrtus tomentosa*, *Glochidion littorale* en

Melanthesa; bij de laatste vereenigingen groeijen rondom *Dicalyx odoratissimus*, de gemelde gewassen, *Melastoma polyanthum*, *Tetracera rigida*, niet zelden *Uncaria*, en de eene of andere soort van *Uvaria*. — De jonge loten waren in de streken van Paauw door de Tapieren afgebeten.

De in de omstreken van Samawang groeiende planten hebben de bladen puntig; die van de benedenlanden meer toegespitst. Daarenboven bestaat er bij de verzamelde voorwerpen eenig verschil in de haarbekleding der takken en der bladen, welke bij die van Doekoe niet aanmerkelijk, doch bij die van andere plaatsen, aan de jongere takjes zeer aanzienlijk is.

De *Eurya euprista* is zeer verwant aan de *Eurya serrata*, door den Heer Blume in de Bijdragen, bl. 124, beschreven; zij kan door den meer platgedrukten vorm der vrucht en door de aanhechting der zaden aan de, in de hoeken van de hokjes vastzittende placentae, onderscheiden worden. Op Amboina groeit een vorm van *Eurya*, die met *E. euprista*, even als met *E. serrata* zeer gelijkvormig is: van beiden verschilt zij door den tolvorm, en van al degenen, die ik gezien heb, ook door de haarbekleding der vruchten: hetgeen den naam *E. trichocarpa* zeer eigenaardig maakt.

## II. EURYA GLABRA. Bl.

*E. ramulis glabris, foliis ellipticis serratis utrinque glabris, floribus confertis, sepalis orbiculatis, fructubus depressosphaeroïdeis.*

Blume, Bijdragen tot de Flora van Neerl. Indië, pag. 125.

ARBUSCULA 2—6 metropum; TRUNCUS brevis, cylindricus; CORONA elongato-conica, aperta; RAMI diffusi, alterni, teretes, nigro-fusci, glabri; RAMULI subteretes aut compressi, glabri. GEMMAE compressae, glabrae. FOLIA elliptica, obtuse vel emarginato-acuminata, sursum serrata, utrinque glabra, coriacea, 0,08 longa, 0,025 lata; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,007 longi. FLORES polygami, axillares vel foliorum abortu alares, conferti. FLORES masculi. CALYX bibracteolatus, pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ; BRACTEOLAE inaequales, concavae, extus subcarinatae, subrotundae acutiusculae, calloso-mucronulatae, glabrae, carnosae; SEPALA subaequalia, orbiculata, subconcava, glabra, 0,005 longa, 0,003 lata. COROLLA pentapetala, subcampanulata, aestivatione imbricatâ; PETALA basi adhaerentia, oblonga, obtusa, 0,007 longa, 0,003 lata. STAMINA 20, raro 10, biserialia, alterna; FILAMENTA subuliformia, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongo-ovatae, basi cordatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes, connectivo in mucronulum producto. PISTILLI rudimentum cylindricum, acutum, glabrum. FLORES feminei. CALYX et COROLLA floris masculi. OVARIUM liberum, depresso globosum, glabrum, tri-quadriloculare; OVULA 8—10 in singulo loculo, campylotropa. STYLUS teres; STIGMATA quatuor, patentia, filiformia, acuta. BACCA depresso-sphaeroïdea, subtri-quadrisulcata, stylo mucronata, glabra, coerulea. BACCAE et SEMINIS structura haud diversa, ab eadem *Euryae serratae*.

*Crescit in summo montis Gédé: JAVA.*

De *Eurya glabra* hebben wij alleen op den berg Gédé, op Java, verzameld. Zij begint daar op ongeveer 2400 N. ellen met enkele groepen, en is vervolgens tot aan den top van dezen berg in grooter aantal verspreid. Op enkele plaatsen vormt zij de hoofdplant, en is zij van *Myrica javanica*, *Gaultheria*, *Thibaudia*, *Photinia integrifolia* enzv. vergezeld. Op andere oorden zijn de soorten van *Thibaudia* en *Vireya* Bl. (*Rhododendron*) talrijker. Dan rijst de *Eurya glabra* door piramidenvormige kroonen boven dezen uit, en is zij daarenboven, door het geel-groene loof, van de lagere gewassen te onderscheiden.

Zij bloeit gedurende het geheele jaar; doch het rijkste in het drooge jaargetijde, en de vruchten erlangen in drie tot vier maanden hare rijpheid. Hare vruchten worden, wegens het saprijke vleesch, dat dezelve omkleedt, door den *Ixos himaculatus* en eene soort van duif, die op *Columba Capellei* gelijkt, gegeten. Daardoor is de verspreiding der plant tusschen de blokken van den lavastroom, onder den naam Goenong Batoe bekend, verklaarbaar. Daarentegen kan het bepaalde voorkomen van de *Eurya glabra* op het gebergte Gédé, aanleiding geven tot het geloof, dat de beide gemelde soorten van vogels, die hier leven, zich tot deze hooge oorden bepalen en uiterst zelden naar andere bergtoppen verhuizen.

De *Eurya glabra* bezit van al de mij bekende soorten de grootste bloemen, welke, vóór de ontwikkeling, tusschen twee kleine, afwisselende, eironde, spitse, gekielde blaadjes zijn verborgen. Hare bladen hebben over het algemeen eene langwerpige elliptische gedaante, met puntige of stomp toegespitste uiteinden. Bij sommigen zijn de punten stomp en verkrijgt het blad daardoor eene omgekeerd eivormige gedaante; deze vorm is dikwerf tusschen den gewonen gemengd, en in het Herbarium van den Hoogleeraar Reinwardt zijn bij voorwerpen, die aan de zuidelijke helling van den berg verzameld werden, bijna al de bladen omgekeerd eivormig. Hun rand is door een kraakbeenig randje bezoomd en stomp gezaagd; zoowel op de onder- als op de bovenzijde vertoont zich de nervuur netvormig. — De knoppen der bladen, vooral bij deze soort, door mij nagegaan, zijn vóór hunne uitgroeiing naakt, of door een klein, langwerpige, schubvormige blaadje bedekt, hetwelk niet boven de oksels der bladen, waar de knoppen zijn geplaatst, uitgroeit. In dezelve omvat ieder blad het volgende schrijlings.

Deze soort verschilt van de *Eurya japonica* door de ongeveugelde takjes, de grootere, met fijnere en scherpere tandjes gezaagde bladen; van de *E. reticulata*, door de van eenen uitstekenden rand voorziene takjes, door de meer langwerpige, scherper gezaagde blaadjes, en door de ronde, van boven dikwerf platgedrukte vruchten; van de *E. nitida*, door de nervuur der bladen en den kegelvorm der vruchten; en van deze en al de opgenoemde soorten door de grootte der kelkbladen.

### III. EURYA NITIDA. KHS.

*E. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis serratis nitidis, floribus geminatis vel solitariis, sepalis late ovatis, fructibus sphaeroïdeis.*

ARBUSCULA 3—6 metrorum; TRUNCUS brevis, cortice nigrescente tectus, ligno rubescente, sat valido; RAMI diffusi, alterni, teretes, grisei; RAMULI compressi, glabri, fusciscentes. FOLIA lanceolato-elliptica,

vel ovalia, acutiuscula, serrata, basi cuneata et integerrima, utrinque nitida, coriacea, 0,055 longa, 0,02 lata; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,003 longi. GEMMAE subteretes, attenuatae. FLORES axillares, solitarii vel geminati, polygami. FLORES masculi. CALYX bibracteolatus, pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ; BRACTEOLAE suboppositae, calyci approximatae, ovatae, acutae, glabrae, minutae; SEPALA inaequalia [duo exteriora minora, ovata, obtusa; tria interiora subrotunda, obtusissima] glabra 0,002 longa et lata. COROLLA pentapetala, campanulata, aestivatione imbricatâ; PETALA basi adhaerentia, obovata, emarginata, crenulata vel integerrima, basi squamulata, glabra, 0,004 longa, 0,002 lata. STAMINA 10, libera; FILAMENTA teretia, sursum attenuata, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongae, basi cordatae, connectivo in mucronulum producto, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. POLLEN sphaericum. PISTILLI rudimentum hemisphaericum glabrum. FLORES feminei. CALYX et COROLLA floris masculi. STAMINA nulla vel rudimenta eorum filiformia. OVARIVM liberum, ovoideum, versus apicem attenuatum, glabrum, triloculare; OVULA 6—10, campylotropa, placentis partitis ex axi loculi productis affixa. STYLUS subteres, glaber; STIGMATA tria approximata, demum patentia, filiformia. BACCA pisiformis, parte styli mucronata, saepe obsolete trisulcata, glabra, coerulea, trilocularis; DISSEPIENTA membranacea. SEMINA 4—8 in singulo loculo, hippocrepiformi-complicata, ovata, compressa, hilo et exostomio approximatis; TESTA crustacea, scrobiculata; TEGMEN membranaceum, tenue. EMBRYO in medio albuminis albi et granulati, cylindricus, hieruris; RADICULA acutiuscula; COTYLEDONES obtusae.

*Crescit in montibus Pamatton, Sakoembang, Batoe, Rantau: BORNEO.*

Tab. 17. Figura hujus speciei. 1. Ramus femineus. 2. Ramus masculus. 1. Flos. 2. Flos, calyce ablato. 3. Calyx explicatus. 4. Petalum intus visum. 5. Flos masculus, calyce et corolla ablatis. 6 et 7. Stamina. 8. Pistilli rudimentum et stamen unieum. 9. Ovarium. 10. Ovarium verticaliter sectum. 11. Ovarii transversalis sectio. 12. Fructus cum calyce persistente. 13. Fructus verticaliter sectus. 14. Semina denudata. 15. Placenta cum ovulis. 16. Semen. 17. Semen verticaliter sectum. 18. Embryo.

De door mij, onder den naam *Eurya nitida* vereenigde gewassen, kunnen misschien later tot de vermeerdering van het getal soorten des geslachts *Eurya*, het hunne bijdragen. Wanneer men de verschillendste vormen met elkander vergelijkt, vindt men dezelve wezentlijk zeer afwijkend. Op iedere plaats, waar wij deze gewassen verzamelden, leverden zij het eene of andere verschil op in hunnen vorm. De aan den voet van den Sakoembang groeiende planten hebben de bladen elliptisch, naar den voet versmald in een steeltje van ongeveer  $\frac{1}{3}$  der lengte van het blad, aan of naar de punt zeer toegespitst, met stompe zaagtanden. Aan dien van den Goenong Batoe, een' voorheuvel van een meer westelijk gelegen gebergte, zijn de bladen grooter, verder van elkander verwijderd, veel korter gesteeld, aan den top in eene kortere spits uitlopende, en met grootere stompe zaagtanden voorzien. Op de kruin en langs den voet van den berg Pamatton groeijen twee vormen. De voorwerpen van de kruin, ten gevolge van het eigenaardige des bodems, alleen door regenbuijen bevochtigd, zijn op het aanzien minder uitgegroeid; de takken zijn door eenen breeden rand bezoomd, de bladen zeer kort gesteeld, ovaal, met eene stompe punt, kleine stompe zaagtanden en tamelijk dik. Aan dezelve zijn de bloemen, welke gewoonlijk gepaard in de oksels der bladen staan, aan eenige takjes zeer dicht bij elkander; zoodat zij,



ingeval de boven dezelve geplaatste bladen niet ontwikkeld waren, aren zouden vormen. Deze afwijking, aan takjes van eene gelijke ontwikkeling voorkomende, is een gevolg van de standplaats, en schijnt mij toe, veroorzaakt te worden door eenen stilstand van groei, welke bij gemis van den noodigen regen plaats heeft. De andere vorm uit deze streken heeft de bladen langwerpig-ovaal, aan de beide einden toegespitst, met scherpere zaagtanden, en van eene dunnere zelfstandigheid.

Deze soort is bij de bewoners van de boorden der Doeson-rivier, onder den naam *Toeangau* bekend.

#### IV. EURYA CONEOCARPA. KHS.

*E. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis serratis glabris, floribus geminatis, sepalis ovatis, fructibus turbinatis.*

ARBUSCULA facie *Euryae glabrae*. RAMI patentes vel erecto-patentes, subterctes, saepe compressi, glabri, fusci vel glandacei; RAMULI subcompressi, glabri, saepe marginati. FOLIA alterna, subdisticha, erecto-patentia, lanceolato-elliptica in planta mascula, oblongo-ovata in planta feminea, basi angustata, obtuse acuta vel acuminata, a medio ad apicem usque obtuse serratis, serraturis mucronulatis vel callosis, utrinque glabra, nitida, coriacea, 0,06 longa, 0,015 lata vel 0,05 longa, 0,02 lata, nervis reticulatis, supra exsculptis, subtus prominentibus; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,003—0,005 longi. GEMMAE compresso-subulatae, glabrae. FLORES axillares, geminati, raro solitarii; PEDUNCULI tetragono-compressi, glabri; BRACTEAE flori approximatae, subaequales, ovatae, obtusae, glabrae. ALABASTRUM ovoïdeum. FLOS masculus. CALYX pentasepalus, aestivatione imbricatâ; SEPALA erecta, late ovata, obtusa, apice cum mucronulo calloso, utrinque glabra. COROLLA campanulata, pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA basi adhaerentia, obovata, obtusa, glabra. STAMINA 10—15, biserialia, alterna saepe breviora; FILAMENTA linearia, attenuata, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongo-ovatae, connectivo in mucronulum producto. PISTILLI rudimentum attenuato-conicum, glabrum. FLOS femineus. CALYX et COROLLA floris masculi. OVARIUM semi-ovoïdeum, attenuatum in stylum tri-quinquepartitum, glabrum, tri-quinqueloculare; OVULA in singulo loculo 10—20, biserialia, placentae lineari axi loculi insertae affixa; STIGMATA 3—5, subuliformia, intus papillata. BACCA turbinata, subattenuata, glabra, trilocularis. SEMINA 8—10 in singulo loculo, superimposita, placentae lineari lamellae ope in loculum productae affixa, deformia, saepe compressa, hilo et exostomio approximatis. STRUCTURA seminum similis *Euryae serratae*.

*Crescit in monte Gédé: JAVA.*

Deze soort groeit, even als de *Eurya glabra*, op of even beneden de kruin van het gebergte Gédé. De laatstgenoemde is echter meer langs het zuidelijk en zuid-oostelijk gedeelte verspreid, en wast tevens langs de helling van het, onder den naam Seda-ratoe bekende, gedeelte van het gebergte; de *Eurya coneocarpa* daarentegen, wordt menigvuldiger gevonden op de noordelijke grenzen der kruin. Door de groeiwijze en de plaats, waar zij voorkomt, is zij zeer verwant aan de soort, welke met haar in de gemelde oorden wordt aangetroffen; doch door den vorm der bladen en vooral door de bloeiwijze, met

gepaarde vrouwelijke bloemen, en ook door den tolvorm der bessen, van deze gemakkelijk te onderscheiden. Onder elkander verschillen de waargenomene gewassen in de groeiwijze, welke met den bodem, waarin zij geworteld zijn, in verband staat. Die van steenachtigen grond zijn meer zaamgedrongen, hebben de bladen digter bij elkander en iets breeder; de anderen, in meer verweerde aarde wortel schietende, zijn slanker, met langere en meer van elkander verwijderd staande bladen. Aan beide vormen vindt men, nevens den gewonen bladvorm, kleinere, omgekeerd eivormige, soms gcheel gaafrandige bladen, digt bij den oorsprong der takjes.

#### V. EURYA OBOVATA. Bl.

E. ramulis glabris, foliis obovalibus serratis glabris, floribus axillaribus solitariis vel geminatis, fructibus oblongo-rotundatis.

Eurya celebica. Rwdt. Hb. (Anno 1821).

ARBUSCULA; RAMI teretes, saepe marginati, glabri; RAMULI subtriangulares, angulis saepe ancipitibus, glabri, fuscescentes. FOLIA alterna, approximata, patentia, obovalia, obtusa, basi cuneata integerrima, supra basin obtuse serrata, utrinque glabra, coriacea, 0,02 longa, 0,01 lata; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,002 longi. PEDUNCULI axillares, solitarii vel geminati, glabri. CALYX bibracteolatus, pentasepalus, persistens; BRACTEOLAE suboppositae, calyci approximatae, ovatae, mucronulatae, glabrae; SEPALA inaequalia: duo minora ovata obtusa, tria subrotunda emarginata, glabra. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA subaequalia, obovata, obtusa, glabra, membranacea. OVARIIUM subovoïdeum, glabrum, triloculare; OVULA 10—12 in singulo loculo, superposita, subcampylotropa; STYLUS teres, brevis; STIGMATA tria, filiformia. BACCA pisiformis, subdepressa, styli parte mucronata, glabra, trilocularis. SEMINA 6—10 in singulo loculo, superposita, ovata, compressa, hippocrepiformi-complicata, STRUCTURA seminis Euryae nitidae.

*Crescit in monte Klabat: CELEBES (fide Clar. Reinwardt); in montibus Gédé et Pangerango: JAVA (fide Clar. Blume).*

#### VI. EURYA RETICULATA. Khs.

E. ramulis glabris, foliis ovalibus acutiusculis grosse serratis, floribus geminatis, sepalis subrotundis, fructibus turbinatis.

ARBUSCULA unius ad trium metrorum; TRUNCUS cylindricus, nigrescens; CORONA subrotunda, dense foliata; RAMI diffusi, approximati, teretes, glabri, fusci; RAMULI alterni, patentes, teretes vel compressi, marginati vel subtriangulares, glabri. GEMMAE glabrae. FOLIA alterna, ovalia, acutiuscula, saepe emarginata, basi cuneata integerrima, sursum obtuse serrata, utrinque glabra, coriacea, 0,035 longa, 0,02 lata; PETIOLI glabri, 0,062 longi. FLORES axillares, geminati, raro solitarii; PEDUNCULI glabri. CALYX bibracteatus, pentasepalus, aestivatione imbricatâ; BRACTEAE ovatae, acutae; SEPALA inaequalia,

subrotunda, acutiuscula, glabra. COROLLA pentapetala, campanulata, aestivatione subimbricatâ; PETALA basi adhaerentia, obcordata, glabra. STAMINA 25, pluriserialia; FILAMENTA subcohaerentia, filiformia, glabra; ANTHERAE basi affixae, lineares, connectivo in mucronem producto. — BACCA turbinata, glabra, coerulea, trilocularis, epicarpio membranaceo, sarcocarpio succoso, endocarpio membranaceo. SEMINA 3—6 in singulo loculo, axi loculi affixa, subdisciformia, in centro excavata, hippocrepiformi-curvata; SPERMODERMIS tenuissime membranacea; TESTA crustacea, scrobiculata, fusca; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in axi albuminis albi, hippocrepiformis, cylindricus; RADICULA obtusa; COTYLEDONES breves, subaequales; PLUMULA haud conspicua.

*Crescit in summo montis Merapi: SUMATRA.*

Tab. 17. 3. Figura Euryae reticulatae.

Rondom den krater van den vuurberg Merapi wordt de Eurya reticulata als kleine struiken opgemerkt. Zij dragen in haar geheele voorkomen het kenmerk der hooge groeiplaats en der weinige beschutting, tegen de in deze hooge streken heerschende koude en harde winden. De struiken zijn ineengedrongen, met zeer brooze takken. Hunne bladen staan dicht boven elkander, hebben de nerven zeer uitgegroeid en als in een net verbonden. Aan dezelve zijn de tandjes dieper, dan bij andere soorten, ingesneden en als een eenigermate rond lobje boven de insnede uitstekende.

## VII. EURYA BLUMEANA. KHS.

E. ramulis pubescentibus, foliis oblongo-ellipticis serratis, floribus solitariis vel geminatis, sepalis rotundatis, fructus globosis.

ARBUSCULA sex ad octo metrorum; CORONA aperta, hemisphaerica; RAMI patentes, teretes, glabri, fuscii; RAMULI alterni, subteretes vel compressi, pubescentes. GEMMAE elongatae, dense pubescentes. FOLIA alterna, oblongo-elliptica, raro elliptica, obtuse acuminata, basi cuneata integerrima, supra basin serrata, serraturis obtusis saepe mucronulatis, supra glabra, subtus praesertim in nervo medio pilosa, coriacea, 0,07 longa, 0,02 lata; PETIOLI semiteretes, supra plani, pubescentes, 0,003 longi. FLORES unisexuales, raro hermaphroditi, axillares, geminati vel solitarii; PEDUNCULI teretes, pubescentes, 0,002 longi. FLORES masculi. CALYX bibracteolatus, pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ; BRACTEOLAE suboppositae, ovatae, acutae, pubescentes, minutae; SEPALA pubescentia, inaequalia: duo minora ovata, obtusa; tria majora subrotunda, obtusissima, saepe emarginata. COROLLA pentapetala, subcampanulata, aestivatione imbricatâ; PETALA oblonga, obtusa, integerrima, glabra, subcarnosa. STAMINA 15, uniserialia; FILAMENTA basi cohaerentia, filiformia, basi incrassata, glabra; ANTHERAE basi affixae, lineares, basi subcordatae, biloculares, loculis rimis longitudinalibus dehiscentibus, connectivo in laminam acutam producto. PISTILLI rudimentum elongato-conicum, glabrum. FLORIS feminei calyx et corolla eadem ac floris masculi. OVARIUM globosum, attenuatum, glabrum, triloculare; OVULA 6—10 in singulo loculo, superimposita, hippocrepiformi-complicata. STYLUS subtrigonus, glaber;

STIGMATA tria, filiformia, patentia. FRUCTUS pisiformis, subdepressus, styli parte mucronatus, glaber. FRUCTUS et SEMINIS structura eadem ac Euryae serratae.

*Crescit in montibus Patoeha, Talaga-Bodas etc.: JAVA.*

De bovengenoemde soort groeit in de nabijheid der kraters van den Patoeha, Papandajang en Talaga-Bodas, in eenen naar de Eurya glabra gelijkenden vorm. Zij is aldaar nergens hoofdplant, doch slechts in groepen of alleenstaande, tusschen andere kleine boomsoorten verspreid. Zoo vonden wij haar om den Talaga-Bodas, tusschen Myrica javanica, Aconodia punctata, Melastoma sylvaticum, Bongsoa elliptica, Vireya (Rhododendron) retusa, enzv. Met de beide eerstgenoemden komt zij door hare hoogte overeen, terwijl zij door het lichter groene loof en de minder bladrijke kroonen verschilt. De anderen, met donker groene bladen: Melastoma en Bongsoa, of met bladen, wier bovenvlakte groen en ondervlakte bruin geschubd zijn: Vireya, groeiden onder hare kroonen en vormden op enkele plaatsen zeer digte groepen. Hier en daar stond zij, met Myrica javanica, tusschen Gleichenia vulcanica, en droeg, even als deze, in hare schrale, ranke groeiwijze, het bewijs van eenen onderdrukten wasdom. De vruchten van de Eurya Blumeana, benevens die der Myrica javanica, strekken tot voedsel aan de Columba oxyura en C. porphyrea, welke hier zeer talrijk zijn, en in de Myrica hare nesten van takjes dezer boomsoorten en van de schubben der boomvaren gemaakt hadden. Aan het vleesch dezer vogels deelt zich de eigenaardige aromatische, naar terpentijn zweemende reuk van de vruchten der Myrica mede.

SAURAUJA. WILDENOW, DE CANDOLLE, BLUME, ENZV.

De geschiedenis van het geslacht Saurauja, tot in 1822, is uitvoerig door den Heer De Candolle (Mémoires de la soc. physique de Genève, Tom. I. pag. 393 et suiv.) en onlangs, van dat tijdvak tot op den tegenwoordigen tijd, door den Heer Bennet (Plantae Javanicae rariores a Clarissimo Horsfield lectae, pag. 171) behandeld. Ik zal haar hier slechts met weinige woorden en eene kleine bijvoeging herhalen. De eerste soort van dit geslacht, welke Willdenow bekend maakte, berustte op eene, door Bredemeyer, uit Caracas overgezondene plant. De latere, door den Heer De Candolle beschrevene en afgebeelde soorten, waren door Sessé en Mocino in Mexico, door Noronha, Commerson, La Haye en Leschenault op Java, en door den Heer Wallich in Nepaul verzameld. Noronha gaf aan deze gewassen den geslachtsnaam Scapha; Leschenault dien van Van Alphenia; Sessé en Mocino noemden haar Davya en Leucothea. Bij deze namen moet die van Overstratia, welke Deschamps aan zijne op Java gevondene soorten gaf, worden gevoegd. Kort na de bekendmaking der verhandeling van den Heer De Candolle werden er eenige soorten door den Hoogleraar Reinwardt, onder den naam Marumia beschreven en, een paar jaren later, negen soorten, waarvan eenige door de Heeren De Candolle en Reinwardt vermeld, als soorten van Saurauja, door den Heer Blume bekend gemaakt. Bij deze in den Archipel gevondene soorten, voegde de Heer Wallich, in zijne lijst, vier soorten van Pinang, Nepaul, Silhet en Pundua; terwijl er, volgens de opgave van den Heer Bennet, nog verscheidene

onbeschrevene soorten in het Herbarium, dat de Heer Horsfield op Java bijeenbragt, bestaan. In de verzameling van Kuhl en van Hasselt bevinden zich verscheidene der, op Java gevonden, reeds bekend gemaakte soorten. Die van Zippelius bevat soorten van Ambon en van Nieuw-Guinea. Onder onze op Java, Borneo en Sumatra bijeengebragte gewassen zijn verscheidene nieuwe soorten van dit geslacht. — Bij dit geslacht behooren, volgens den Heer Kunth, de als Palava, door Ruiz en Pavon (*Apatelia* De Candolle) beschrevene gewassen en, naar de beschrijving oordeelende, ééne door Roxburgh en meerdere door W. Jack, als soorten van *Ternstroemia* gekenmerkte planten.

De bekende soorten van dit geslacht zijn in Zuid-Amerika en in de zuid-oostelijke deelen van Azië verzameld. In het eerstgemelde werelddeel groeijen zij in de gebergten van Venezuela, Mexico en Peru. In Azië zijn eenige soorten op het vasteland van Indië gevonden; zij verspreiden zich daar tot in Nepaul. De anderen, ongeveer het drie vierde gedeelte van het geslacht, zijn op de zuid-oostelijke eilanden, van Sumatra tot Nieuw-Guinea, tussehen de 100° en 138° lengte, bijeengebragt. Zij groeijen daar van het zee-strand af, of soms op een weinig boven hetzelfde verhevene plaatsen, tot op ruim 2300 ellen. Somwijlen worden zij op onbeshaduwde, doch gewoonlijk op beschaduwde plaatsen, als gezellige gewassen gevonden. Op Java wassen de *Saurauja Noronhiana* en *S. cauliflora* menigvuldig in de dalen, door welke de bergbeken stroomen; de *S. micrantha*, aan den waterval van den Tjikondoel, langs eene steile, rotsige helling; de *S. Reinwardtiana*, *hirsuta* en *braeteosa*, meer binnen in de bosschen, vooral op vlakke ruggen; de *S. leprosa* onbeshaduwd, in de nabijheid van de kraters van den Papandajang, Talaga-Bodas enzv.; allen tussehen 300 en 2000 ellen. Op Sumatra groeit de *S. vulcani* tegen den berg Merapi, op ongeveer 2000 ellen; de *Saurauja Singalagensis* enzv., in de bosschen, van 200 tot 800 ellen, en de *S. media* en *S. Jaekiana*, op dezelfde standplaatsen als de *S. Noronhiana* en *S. cauliflora*, op Java. In het zuid-oostelijk gedeelte van Borneo wast de *S. subcordata*, *ferox*, *Tewensis* enzv., niet zeldzaam op de kleine heuvels langs de Téwe-rivier, 50 tot 100 ellen boven het zeevlak, en de *S. exeavata*, *Sakoembangensis* enzv., hier en daar op den berg Sakoembang, tot op ongeveer 1000 ellen hoogte. Aan den noord-oostelijken hoek van Celebes groeijen, blijkens het Herbarium van den Hoogleraar Reinwardt, de *S. spadicea* en *S. pentapetala*. Het eiland Ambon is, volgens de onderzoekingen van de Heeren Reinwardt en Zippelius, de groeiplaats der *Saurauja tristyla*, en bezit, met Nieuw-Guinea, eenige aan de *S. hirsuta* en *Reinwardtiana* verwante soorten.

De door ons verzamelde soorten zijn boomen of struiken, met piramidenvormige, langwerpige of halfronde kroonen, die dikwerf van binnen zeer sehaars en naar den omtrek digt met bladeren zijn voorzien. Haar stam is, bij de boomvormende soorten, onregelmatig rolrond; hij bestaat uit eene bruine of grijze, niet zeer dikke schors, uit een wit of bleek-rood gekleurd, ligt, fijndradig hout, en een aanzienlijk merg, dat veelal in een rond mergkanaal is besloten. De takken zijn in spiralen, waarin van den vierden tot den zevenden boven den eersten staat, om den stam geplaatst, meestal, indien de boomen op opene plaatsen groeijen, openstaande, zelden naar boven gerigt of naar beneden gebogen. De ouden zijn bijna rolrond, de jongeren hoekig, bij hunne eerste ontwikkeling zaamgedrukt. De jonge takken, de knoppen, de bladen en de kelkdeelen zijn bij enkele soorten glad; bij de meesten met eene eigenaardige bedekking voorzien. — Bij eenigen bestaat deze bedekking uit eivormige, langwerpige of lancetvormige, toegespitste

sehujes; bij anderen uit schubben en borstelharen (*S. ferox*), of uit schubjes en zachtere haren, die enkelvoudig of stervormig zijn. De bedekking is in het laatste geval glanzend, wanneer de schubjes talrijk zijn: *S. spadicea*; als bestoven, zoo de haren zeer kort zijn en opeengedrongen staan: *S. Jackiana*; of donzig, ingeval de haren langer zijn: *S. cauliflora*. — De knoppen zijn bijna rolrond, zelden glad. In dezelve liggen de blaadjes met de randen tegen elkander gevouwen, en omgeven zij de jongeren. De bladen zijn even zoo om de takken, als deze om den stam, geplaatst. Hun vorm is lang, met de lengte tot de breedte als 1 tot 2—4. Zij zijn zelden met gave randen, doch over het algemeen gezaagd of getand: bij de oudere bladen met stompe, en bij de jongere met scherpe tandjes. Eenige soorten hebben de beide vlakken der bladen met de bovengemelde bekleeding voorzien, anderen slechts eene derzelve, en enkelen bezitten bijna geheel gladde bladen. Hunne nervuur verschilt door eenige geringe afwijkingen. De middelnerf, meestal in een klein uitstekend puntje eindigende, is op de ondervlakte als eene rib verheven. De hoofdnerven vormen met de middelnerf hoeken van  $10^\circ$  bij *S. cauliflora*, van  $30^\circ$  bij *S. subcordata*, van  $45^\circ$  bij *S. Reinwardtiana*. De tusschen deze gelegene zijnerfven zijn bijna evenwijdig met S-vormige bogten: bij eenige soorten, *S. Reinwardtiana* enzv., zeer dicht bij elkander, en bij anderen, *S. pendula* enzv., van elkander verwijderd. — De bloemen groeijen uit de oksels der bladstelen, langs de takken, of langs den stam. Bij eenige soorten staan zij alleen, bij anderen in bijschermen, en somwijlen in kleine sehermen. Hare stelen zijn rond of zaamgedrukt, dragende meestal twee, soms echter een of drie schutblaadjes, in de nabijheid van de bloem of op het midden van het bloemsteeltje, in eenen afwisselenden stand. Op de soorten, welke bijschermen hebben, zijn deze schutblaadjes op de hoofdstelen van eene aanzienlijke grootte, doch op de anderen zeer klein. — De kelk, door zamengroeijing der kelkbladen vijf-, zelden vierdeelig, heeft zijne deelen vóór de opening als dakpannen (*imbricata* of *quincuncialis*) gelegerd, ongelijk van grootte, eirkelrond of langer dan breed. — De bloemkroon vertoont vóór de opening eenen ronden of eivormigen knop, waarin de deelen elkander met de randen dekken, allen naar dezelfde zijde gebogen zijn, en dus de bij de *Dipterocarpeae* opgegevene waarneming versterken. Zij is, door de zamengroeijing der bloembladen, vijf-, zelden vierdeelig. Deze deelen zijn omgekeerd-eivormig, aan den top stomp of met twee ongelijke lobben, glad, wit of zacht rozenrood, met drie of meer, van den voet naar den top loopende aderen. — De helmraden, op den torus geplaatst, zijn in een drie- tot achtvoudig getal van de bloemkroondeelen, aan den voet met elkander en met de bloemkroon, waarmede zij te gelijk afvallen, zaamgegroeid; lijnvormig. De helmknopjes zijn even beneden hun midden met de draden verbonden, doch niet beweegbaar; lijnvormig, aan de beide einden geknot, of het eene einde ingesneden of tweelobbig. Zij bestaan uit een paar hokjes en eenen kleinen, lijnvormigen helmknoop. De opening der hokjes begint aan den top met een gaatje, dat dikwerf niet grooter wordt, doch soms het begin eener spleet is, die langs de geheele lengte voortgaat. De helmknopjes, het stuifmeel uitgestort hebbende, buigen zich aan de beide einden om. Zij bestaan uit een zeer fijn buitenvlies, en uit een endothecium met eene laag kleine, bijna ronde cellen. — Het vruchtbeginsel is bij de meeste soorten halfkogelvormig, somwijlen eivormig, naar het einde smaller toeloopende, geknot of zelfs ingedeukt; op eenige soorten vindt men het glad, op anderen behaard. Het heeft drie, vier of vijf hokjes, waarin de moederkoeken aan vleezigé steeltjes, even beneden den top, in den binnensten hoek zijn vastgehecht. De moederkoeken zijn halfkogelvormig, met de bolle zijde naar buiten, aan den omtrek ongedeeld of, door eene insnede, bijna tweelobbig. Zij worden

door eene menigte eitjes geheel bedekt. Reeds in zeer jonge vruchtbeginsels hebben deze eitjes eenen langwerpigen vorm en den eimond naar den moederkoek gebogen. — Drie tot vijf stijlen, tot op eenigen afstand van het vruchtbeginsel zaamgegroeid: *S. exeavata* enzv., of van hetzelfde af aan geheel vrij, zijn gewoonlijk aanwezig. Ieder derzelve eindigt in een' knopvormigen of puntigen stempel, welke de opening van het stempelkanaal, even beneden den top, aan de binnenzijde heeft. — De vrucht is kapsel- of besaardig: een verschil, dat men — ten minste het onderzoek der geziene soorten doet mij dit vooronderstellen — reeds uit de beshouwing van het vruchtbeginsel kan vermoeden: want bij de soorten, welke eenen boven hetzelfde onverdeelde stijl hebben, zag ik besaardige vruchten, en bij die, wier stijlen van het vruchtbeginsel af aan verdeeld zijn, worden later kapselaardige vruchten waargenomen. De vrucht bezit een dun epicarpium, dat somwijlen bij de bessen rood of wit gekleurd is; een vezelig, droog of vleezig sarcoeparium, en een vleezig endocarpium. De tusseheshotten zijn vliezig. De kapsels springen in even zoo vele kleppen, als er hokjes zijn, open. Bij de opening scheiden zich de kleppen tegen over het midden der hokjes, tot op de helft harer lengte. De laatste soort van vruchten, aan *S. ferox*, *S. media* enzv. eigen, hebben de moederkoeken halfbolrond, van eene vaste vleezige zelfstandigheid, met talrijke kleine groefjes, waarin de zaadjes gehecht zijn. — De besaardige vruchten, door *S. cauliflora*, *S. braeteosa* enzv. gedragen, bezitten de moederkoeken halfbolvormig, saprijk, omhuld door eene talrijke hoeveelheid zaden en eene geleiaardige stof, welke de geheele holte der vrucht vult. — Deze geleiaardige stof is van eenen zuren smaak, vermengt zich gemakkelijk met het water, lost in Ammonia op, en wordt hieruit door zuren afgescheiden, hetgeen mij doet vooronderstellen, dat zij door Peetenzuur geleiaardig is. Zij bestaat uit kleine doorschijnende cellen, tegen wier wanden korreltjes zijn. Naar mijne waarnemingen, behoort deze stof tot de moederkoeken en tot de zeer ontwikkelde epidermis seminalis.

De zaden hebben den vorm van piramiden met drie of vier zijden, en zijn aan het smalste einde vastgehecht. De opperhuid (epidermis seminalis) is vliezig of saprijk. De buitenhuid (testa) is gegroefd — bij vergrooting waargenomen, met kleine, vier- tot zeshoekige, door opstaande wanden beperkte diepten (\*) — broos, bruin gekleurd. Op dezelve zijn de navel en zaadmond alleen bij sterke vergrooting zichtbaar. Beiden zijn zeer nabij elkander, als twee ronde holten. De binnenhuid (tegmen) is vliezig, zeer dun en, alleen bij zeer sterke vergrooting, eclachtig. Tussehen deze beide zaadbekleedsels is eene laag van zeer dunwandige cellen, waaronder enkele met bundels van naaldvormige kristallen, die door den Heer Bennet bij *S. braeteosa* enzv., en door mij bij *S. ferox*, *S. pendula* enzv. zijn waargenomen. Daarenboven loopt tusschen de testa en het tegmen, langs de eerstgenoemde, de raphe van den navel tot aan de kruin van het zaad, waar zij naar het tegmen is omgebogen.

De kern is eivormig, soms naar de zijde der raphe een weinig platgedrukt. Het kiemwit, dat het grootste gedeelte derzelve vormt, is wit en omgeeft de kiem geheel. De kiem ligt dicht bij de ehalaza en heeft de helft tot twee derden van de lengte der kern. Zij is rolrond, aan de einden stomp of puntig,

---

(\*) Deze diepten zijn de verharde, naar de binnenzijde gekeerde wanden der cellen, welke de testa vormen. Zij vertoonen niet zelden, bij eene sterke vergrooting waargenomen, het buitenste gedeelte der cellen als een zeer fijn, doorschijnend vliesje.

eenigzins gebogen: *S. distasosa*, *S. pendula*; of geheel regt: *S. ferox* enzv. De zaadlobben en het worteltje derzelve zijn even lang, of het laatste vormt het grootste gedeelte der kiem. De kiem is in een zeer fijn vliesje besloten, hetwelk naar den zaadmond als een dun draadje uitloopt.

Naar deze beschrijving de door de schrijvers opgegevene geslachtskenmerken nagaande, kan het verschil derzelve gemakkelijk worden opgelost. Ruiz en Pavon hebben den kelk, als door sehutblaadjes ondersteund, beschreven; zij hadden zeker voorwerpen met éénbloemige steeltjes voor zich, op welke de beide sehutblaadjes dicht bij den kelk stonden: zoo als *S. ferox* enzv. zulks heeft. De Heer Kunth geeft op, dat de bloembladen geheel vrij zijn; de Heeren De Candolle en Blume, dat zij aan den voet zijn verbonden; bij de Indisehe soorten zijn de *S. media* voor de bijna geheel vrije bloembladen en de *S. Noronhiana* enzv. voor de zaamgegroeide als voorbeelden op te noemen. Even zoo bestaat er een overgang van vrije tot zaamgegroeide helmdraden. De soorten met bes- en kapselaardige vruchten, zijn door ons in den Arehipel gevonden. Het verschil sehijnt voornamelijk door eene meerdere ontwikkeling of opvulling van het celweefsel der moederkoeken enzv. met waterige sappen, veroorzaakt te worden.

Het voorkomen der met kapsels en bessen voorziene soorten in den Arehipel, doet het denkbeeld vervallen, om naar dit onderscheid de Aziatische en Amerikaanse soorten tot bijzondere geslachten te maken. Dit verschil kan echter gebruikt worden om de soorten, ten minste zoover zij mij bekend zijn, in het algemeen te verdeelen. De eene afdeeling, met de *Noronhianae* Bl. zamenvallende, zoude dan de met vleezige vruchten en gedeeltelijk zaamgegroeide stijlen voorziene soorten moeten opnemen. De andere, ten naastenbij aan de *Reinwardtiana*e gelijk, konde de soorten opnemen, welke kapsels, vrije stijlen en veelal bekleede kelken bezitten.

Zoover mij bekend is, gebruiken de inlanders, van deze planten alleen de saprijke vruchten, gekneusd en met water gemengd zijnde, als middel ter verfrissing en verkoeling in heete koortsen. Zij kennen deze gewassen onder den algemeenen naam *Kileho*, en de soorten daarenboven nog onder andere namen, die het een of ander eigenaardigs van het uiterlijk aanzien kenmerken. Den gemelden algemeenen naam hebben zij, wegens den zuren smaak der vruchten, die den mond en het gezicht doet zamentrekken, aan dezelve gegeven.

#### I. SAURAUJA SUBCORDATA. Kns.

*S. ramulis glabriusculis, foliis ovalibus acutis basi subcordatis serrulatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus unifloris congregatis, calycibus glabris, sepalis inaequalibus.*

ARBUSCULA 2—3 METRORUM; RAMI subteretes, subsuleati, einerei, glabri; RAMULI subeompressi, squamulis nonnullis ovatis, acutis vestiti. FOLIA ovalia, acuta, mueronulata, basi obtusa vel subeordata, serrulata vel crenulata, utrinque glabra — juniora eum squamulis nonnullis — subeoriaeae, 0,25 longa, 0,05 lata, nervis secundariis parallelis, approximatis; PETIOLI eompressi, supra suleati, subsquamulati.



FLORES axillares, congregati; PEDUNCULI uniflori, filiformes, squamulati, bibracteolati; BRACTEOLAE alternae, oblongae, acutae, fere glabrae, minutae. CALYX pentasepalus, fructum includens; SEPALA erecta, inaequalia: duo exteriora minora, subrotunda, obtusa; tria interiora late ovata, acutiusecula, subcoriacea, extus et intus glabra. OVARIVM subglobosum, truncate, trisuleatum, glabrum, triloculare; OVULA numerosa, placentis oblongis, carnis, breviter stipitatis, affixa. STYLUS basi simplex, cylindricus, medio tripartitum, glabrum; STIGMATA capitulata.

*Crescit ad flumen Tewe: BORNEO.*

## II. SAURAUJA LEUCOPHLOIA. KHS.

S. ramulis glabris, foliis elliptico-lanceolatis acuminatis obsolete serrulatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus unifloris, calycibus glabriusculis, sepalis subaequalibus.

ARBUSCULA 3—5 metrorum; RAMI patentes, teretes, glabri, einerei; RAMULI compressi, glabri vel squamulis nonnullis ovatis muniti. FOLIA ad ramulorum apices conferta, elliptico-lanceolata, acuminata, subserrulata, serraturis distantibus callosis, supra et subtus glabra, coriacea, 0,3 longa, 0,07 lata, nervis primariis in angulo 20°, nervis secundariis reticulatis; PETIOLI subtrigoni, glabriusculi, 0,02 longi. INFLORESCENTIA axillaris vel foliorum abortu alaris; PEDUNCULI solitarii vel geminati, uni- raro biflori, compressi, glabriusculi, bibracteolati; BRACTEOLAE alternae, distantes, ovatae, acutae, deciduae. CALYX fructum eiciens, pentasepalus, basi truncate vel excavatus; SEPALA subaequalia, subrotunda, obtusa vel acuta, intus glabra, extus basi fusco-pubescentia. CAPSULA globoso-trigona, trisuleata, vertice rotundata, glabra, loculicida, trivalvis; VALVULAE ad medium usque dehiscentes. STYLI tres, subteretes, glabri; STIGMATA capitellata. SEMINA plura, 10—20 in singulo loculo, inserta in placentis hemisphaericis ope laminae angulo interno loculi affixis, angulata, saepe tetragonaria, foveolata, foveolis rotundatis vel hexagonis, fusca. STRUCTURA eorum similis Sauraujae ferocis.

*Crescit in monte Singalang: SUMATRA.*

## III. SAURAUJA MEDIA. KHS.

S. ramulis sparsim squamulatis, foliis obovalibus acuminatis basi cuneatis sinuato-serratis utrinque glabris, pedunculis axillaribus vel alaribus congregatis, calycibus glabriusculis, sepalis subaequalibus.

ARBUSCULA; RAMI tetragoni vel subteretes, glabri, fusei; RAMULI compressi, squamis subrotundis vestiti. FOLIA alterna, obovalia, acuminatissima, basi cuneata vel obtusiusecula, sinuato-serrata, serraturis acutis saepe incurvis, supra subtusque glabra, — juniora supra et subtus squamulis subrotundis minutis vestita — coriacea, 0,2 longa, 0,08 lata, nervis secundariis subparallelis distantibus; PETIOLI compressi, squamulati, 0,05 longi. INFLORESCENTIA axillaris vel alaris; PEDUNCULI congregati, uniflori, filiformes, squamulati, bibracteolati; BRACTEOLAE alternae, distantes, ovatae, minutae, deciduae. ALABASTRUM

subovoïdeum, basi truncatum vel excavatum. CALYX rotatus, pentasepalus, aestivatione quincunciali; SEPALA subaequalia, rotundata, obtusiuscula, intus glabra, extus pubescentia vel glabriuscula. COROLLA pentapetala, rotata, aestivatione convolutâ; PETALA basi connata, obovata, apice emarginata vel subbiloba, membranacea. STAMINA 15, libera; FILAMENTA linearia, glabra; ANTHERAE in medio affixae, cordiformes, rimis apicalibus dehiscentes. OVARIVM hemisphaericum, pubescens, triloculare; OVULA plura, placentis semi-ovoïdeis, ope stipitis cum angulo interno loculi connatis, affixa; STYLI tres, subteretes, glabri; STIGMATA capitellata. FRUCTUS capsularis, calyce inclusus, hemisphaericus, depressus, pubescens, trivalvis, loculicide dehiscens; VALVULAE ad medium longitudinis usque dehiscentes. SEMINUM numerus, insertio et structura similes Sauraujae ferocis.

*Crescit in sylvis montis Singalang: SUMATRA.*

De verwantschap van Saurauja media en S. nudiflora is, zoo de habitus in aanmerking genomen wordt, zeer in het ooglopend. Beiden bloeijen uit de oksels en later uit de takken of uit den stam, en hebben de bladen vrij gelijkvormig; terwijl deze, benevens de jonge takken, eene wratachtige haarbekleding bezitten, die uit eene menigte vereenigde haartjes bestaat. Daarentegen zijn zij door den rand der bladen, de grootte der bloemen en den aard der vrucht genoegzaam van elkander te onderscheiden. — De S. media groeit langs de beken van het gebergte Singalang, als kleine boompjes met talrijke kleine, bijna witte bloempjes.

#### IV. SAURAUJA NUDIFLORA. D. C.

S. ramulis verrucosis, foliis obovalibus breviter acuminatis basi cuneatis serrulatis sparsim squamatis, pedunculis axillaribus vel alaribus unifloris, calyceibus glabris, sepalis subaequalibus.

De Candolle, Mém. de Genève I. pag. 422. Tab. V; De C., Prodromus I. pag. 526; Saurauja Noronhiana Blume, Bijdr. pag. 126; S. Blumiana Bennet, in Horsfield Plantae Javan. rar. pag. 174. Tab. 37.

*Crescit in umbrosis montium: JAVA.*

#### V. SAURAUJA CAULIFLORA. DE C., BLUME.

S. ramulis squamulatis et setosis, foliis ovali-oblongis breviter acuminatis basi obtusis mucronato-serrulatis subtus rubigineo-villosis, pedunculis unifloris axillaribus vel in trunco aggregatis, calyceibus glabris, sepalis subaequalibus.

De Candolle, Mém. de Gen. I. pag. 425; De C., Prod. I. pag. 526; Blume, Bijdr. pag. 126; Scapha, Noronha.

*Crescit in montosis: JAVA.*

Langs de bergbeken, somwijlen in de kleine moerassige vlakten der bergen van het westelijk gedeelte van Java, groeit de Saurauja cauliflora als gezellige plant: soms verspreid, soms in groepen dicht bij elkander staande. Op de jonge planten zitten de bloemen in de oksels der bladen; op de ouden, langs het bladerlooze gedeelte van den stam. Zij komen hier bij voortdoring uit dezelfde knoestige uitwassen, die het geheele jaar door, met bloemen en vruchten bedekt zijn. — Deze plant, een sieraad van den tuin te Buitenzorg, heeft aldaar hare bloemen ongeveer de helft grooter, dan op de oorspronkelijke groeiplaatsen.

## VI. SAURAUJA JACKIANA. KUNZ.

*S. ramulis glabris, foliis ellipticis breviter acuminatis serrulatis subtus dense rubiginoso-lepidotis, pedunculis axillaribus unifloris, sepalis aequalibus.*

*Ternstroemia rubiginosa* W. Jack, in Hooker Companion, pag. 83; De Candolle, Prodr. I. pag. 524.

*Crescit in sylvis montis Singalang: SUMATRA.*

Deze soort werd door mij in de bosschen van den Singalang, op eenen kleinen vlakken rug, ongeveer zeven honderd ellen boven zee, waargenomen. Zij is door de bijna regelmatige elliptische gedaante der bladen van *S. cauliflora*, welke zij op Sumatra vertegenwoordigt, gemakkelijk te onderscheiden. Daarenboven dient de bekleeding als een goed kenteeken ter vermindering van verwisseling: *S. Jackiana* heeft tusschen de digte, donzige haarbeksleding, vooral op de hoofdnerven, eenige weinige ovale schubjes; *S. cauliflora* bezit eene menigte borstelharen of priemvormig uitlopende schubjes in de donzige bekleeding. Beide soorten zijn door de haarbeksleding min of meer rood-bruin gekleurd.

## VII. SAURAUJA SPADICEA. BL.

*S. ramulis leproso-squamulatis, foliis oblongis serrulatis supra glabris subtus spadiceo-leproso-squamulatis, umbellulis axillaribus paucifloris, calycibus sparsim squamulatis.*

*Marumia oblonga*, Rwdt.

*Crescit in montosis: CELEBES (fide Herb. Clar. Reinwardt).*

## VIII. SAURAUJA PENDULA. BL.

*S. ramulis sparsim squamulatis, foliis ovali-oblongis mucronulato-acutis serrulatis supra et subtus glabriusculis, pedunculis corymbosis, calycibus junioribus glabris.*

Blume, Bijdr. pag. 127.

*Crescit in montosis: JAVA.*

De voorwerpen dezer soort, welke op de bergen Malabar, Tjikoerai en Passir-Kiamis zijn verzameld, verschillen door de grootte hunner bloemen, en door den vorm en de grootte der bladen: die van den Tjikoerai zijn het meest ontwikkeld en hebben de bladen bijna omgekeerd-eivormig; die van Passir-Kiamis zijn kleiner, met langwerpige bladen; de voorwerpen van den Malabar maken den overgang tusschen deze beide uitersten. De bladen hebben in den zeer jeugdigen staat, langs den rand, op de middelnerf der beide vlakten, en op de hoofdzijnerf van het ondervlak, eene menigte eivormige en puntige schubjes, die later, bij de uitgroeijing derzelve, bijna allen afvallen.

## IX. SAURAUJA NIGRESCENS. KHS.

S. ramulis sparsim squamulatis, foliis oblongo-obovatis breviter acuminatis basi cuneatis crenulato-serrulatis utrinque glabris, pedunculis subcorymbosis, calycibus junioribus fusco-pubescentibus.

ARBUSCULA; RAMI in angulo  $45^\circ$ , teretes vel subtetragoni, glabri, nigrescentes; RAMULI compressi, squamulis ovatis, acutis vestiti. FOLIA distantia, oblongo-obovata, raro oblonga, breviter acuminata, mucronulata, basi cuneata, supra basin obsolete serrulata vel crenulato-serrulata, serraturis saepe vix conspicuis, utrinque glabra, — juniora subtus in nervis praedita squamulis et pilis sparsis, — coriacea, 0,2 longa, 0,07 lata; PETIOLI semiteretes, glabriusculi, 0,03 longi. FLORES axillares vel alares, racemoso-corymbosi; PEDUNCULUS COMMUNIS compressus, saepe anceps, glaber; PEDUNCULI PARTIALES tetragoni, fusco-leprosi. BRACTEAE oblongo-ovatae, obtusiusculae, intus glabrae, extus fusco-leprosa. ALABASTRUM ovoideum, apice et basi truncatum, fusco-pubescentis. FLORES nondum expansi. CALYX pentasepalus, aestivatione subimbricatâ; SEPALA concava, subrotunda, obtusiuscula, glabriuscula. COROLLA pentapetala, aestivatione convolutâ; PETALA spathulata, biloba, glabra. STAMINA 20; FILAMENTA linearia; ANTHERAE in medio affixae, oblongae, loculis disjunctis, bisulcatae. OVARIVM hemisphaericum, glabrum; STYLI 3; STIGMATA capitellata. FRUCTUS capsularis, globoso-trigonus, subtrisulcatus, apice rotundatus, glaber, loculicidus; VALVULAE ad duas tertias dehiscentes, stylis persistentibus terminatae, partem dissepimenti membranacei gerentes. SEMINA multa, affixa placentis oblongis, trigonis: uno latere rotundato, duobus planis, lamellae ope in axi loculi insertis, superimposita, saepe 6 serialia, angulata, foveolata, foveolis hexagonis.

*Crescit ad flumen Tewe: BORNEO.*

## X. SAURAUJA VULCANI. KHS.

S. ramulis glabris, foliis oblongo-ovatis acuminatis basi cordatis serratis vel serrulatis utrinque glabris, — junioribus utrinque dense setigeris, — floribus corymbosis, sepalis junioribus leprosis.

ARBUSCULA 2—6 metrorum; TRUNCUS brevis, subcylindricus, cinereus, ligno laete rufo; RAMI patentes, versus apices foliati, teretes, glabri; RAMULI adultiores compressi, glabri; RAMULI novelli dense setosi, setis subulatis, admodum deciduis. FOLIA oblongo-ovata vel ovalia, breviter acuminata, basi cordata, saepe inaequilatera, serrata vel serrulata, serraturis acutis, saepe subulatis, utrinque glabra, — juniora dense setosa, — coriacea, 0,22 longa, 0,1 lata; PETIOLI 0,03 longi, compressi, glabri vel setigeri. FLORES axillares, corymbosi; PEDUNCULUS COMMUNIS compressus, leprosus vel glaber, saepe 0,1 longus; PEDUNCULI PARTIALES multipartiti, compressi, setosi et leprosi. BRACTEAE oblongo-ovatae vel oblongae, acutae, setosae. ALABASTRUM subglobosum, basi truncate, fusco-leprosum. CALYX pentasepalus, aestivatione quincunciali; SEPALA subaequalia, rotundata, obtusa vel acuta, intus glabra, extus fusco-leprosa. COROLLA gamopetala, quinquepartita, aestivatione convolutâ; LACINIAE obovatae, bilobae, lobis fere aequalibus crenulatis, glabrae. STAMINA 30—40; FILAMENTA basi coalita et corollae adnata, linearia, glabra; ANTHERAE in medio affixae, oblongae, basi emarginatae, apice bilobae, rimis apicalibus dehiscentes. OVARIVM hemisphaericum, subpentagonum, truncate vel exeavatum, parte superiore

dense pilosum, parte inferiore glabrum, quinqueloculare; OVULA multa, tegentia placentas breviter stipitatas, trigonas: uno latere rotundato, duobus planis. STYLUS simplex, supra basin quinquepartitus; STIGMATA capitulata, depressa. FRUCTUS subglobosus, quinesulcatus, depressus, apice dense pilosus, basi glaber, quinquelocularis, dissepimentis membranaeis. SEMINA plura, affixa placentis trigonis ope laminae ex axi anguli loculi productis, diseiformia vel oblongo-rotundata, foveolata, foveolis tetra- vel pentagonis, profundis.

*Crescit in monte Merapi: SUMATRA.*

Deze soort heeft de gedaante der bladen tamelijk gelijkvormig en de randen zeer fijn gezaagd of met vrij groote tanden. Hare kelkbladen zijn bijna even groot; de beide buitensten zijn gelijkvormig en eindigen in kleine puntjes, naar welke de, uit den voet voortkomende nerven uitloopen; de drie binnensten hebben stompe toppen en de nerven waaijersgewijze uitgespreid. — Door de gedaante der bladen en in het geheel door den habitus, is de *Saurauja vulcani* zeer verwant aan de *Saurauja bracteosa* D. C.; doch de digtere haarbekleding der takken, der bladen en der kelken, benevens de meerdere grootte der bloemen van de laatstgenoemde, geven genoegzame kenteekenen ter onderscheiding. Van de *Saurauja excavata* verschilt zij door de gedaante en de haarbekleding der bladen.

Alleen aan de westelijke helling van den vulkaan Merapi, op Sumatra, werd deze soort door ons verzameld. Omtrent deze groeiplaats en haar voorkomen heb ik het volgende opgeteekend: »Heden wandelde ik van ons verblijf — wij bevonden ons op ongeveer 1000 ellen boven de zee, te Goegoer Singandang — naar het hooger gedeelte van den berg Merapi. De weg derwaarts leidde eerst over eene, met gras en eenige verspreide groepen van struiken: *Vitex*, *Conyza*, enzv. begroeide, heuvelige helling. Op ongeveer 1200 ellen sloot zich aan dezen schralen groei eene strook van Bamboes, welke ongeveer de hoogte van 1390 ellen bereikte. Hier werd de helling steiler en tevens meer begroeid. De *Saurauja vulcani* en *Gleichenia* waren, van hier tot op 1470 ellen, hoofdgewassen: nu eens met elkander vereenigd, dan weder elkander de plaats inruimende. De eerste vormde kleine struiken van twee ellen hoogte, hadden korte stammen en zeer ijle kroonen met aan de einden bebladerde takken en kleine licht rozen-roode bloemen. Of de struiken waren hooger en meer boomvormig. In het laatste geval waren de kroonen hoog genoeg boven den grond om er onder door te gaan, doch niet digt genoeg om als schaduw tegen de zonnestralen te dienen. Evenwel was, niettegenstaande de broosheid der takken en der bladen, de wandeling, zoowel tusschen de kleine als grootere gewassen, moeilijk; omdat de eerste, door hunne digte, opeengehoopte groeiwijze, en de laatste, door de rankvormende *Gleichenia* als doorengeweven of gevlochten waren. Door het voortdurende gebruik van het kapmes baanden wij ons eenen weg tusschen deze struiken, waar eene warmte van 86° was, tot aan het, uit groote boomen bestaande bosch. Hier heerschte, onder eene grootere verscheidenheid van vormen, eene gewenschte schaduw. Vooral groeiden er eenige Laurineae, doch noch *Shima*, noch eiken, beiden anders, op Java, ter hoogte van 1600 ellen, zoo gewone boomsoorten. Tegen deze boomen groeiden, tusschen mossen, vooral *Hypna* en *Jungermanniae*, *Grammitis*, *Lindsaea* en enkele voorwerpen van *Pedilonum*. Van dezelve hingen vooral schoone, met witte rozenvormige bloemen voorziene *Marumiae* en enkele *Passiflorae* naar beneden. — De stam van de *Marumia* leverde, bij gebrek

van beken in de nabijheid, aan eenige hier werkende houthakkers, een verfrisschend vocht, hetgeen, door afkapping van den stam, uit denzelfden voortvloeide. — Eenige Psychotriae, Cyrtandrae, Axanthides enzv., vormden een struikgewas, hetwelk zoowel door den vorm en grootte der bladen, als door de verscheidenheid van kleur, eene aangename afwisseling onder de boomen opleverde. De beschrevene plantengroei ondergaat, tot op ongeveer 1800 ellen, weinig verandering in soorten. Naarmate men hooger stijgt, wordt de helling minder glooiend, en dragen de boomen, in derzelve hoekig gebogene takken, de bewijzen, dat hun wasdom onderdrukt wordt. Terwijl op eene hoogte van 1700 ellen de gemelde Rubiaceae en Cyrtandrae hoofdgewassen zijn, en hier en daar eene boomvormige Chnoophora verspreid is, wordt deze vorm, op 1900 ellen, hoofdgewas. Van deze hoogte af aan blijft hij dit, en op 2100 ellen, waar de andere boomen grootendeels verdwijnen of, ten gevolge van den verglaasden grond, struikvormig worden, groeit deze nog zeer welig. Aan deze grens, daar wij toeh later den berg zouden bestijgen, eindigde onze wandeling. Wij hebben op dezelve bijna geene dieren gezien, noch gehoord. De stilte werd alleen door het geluid van het houtkappen en, nu en dan, op 1600 ellen hoogte, door dat van eenen koekoek: *gōē — gōē — gōēk*, afgebroken.”

#### XI. SAURAUJA EXCAVATA. KHS.

S. ramulis squamatis, foliis oblongo-obovalibus acutis mucronulatis basi obtusis serrulatis supra glabris subtus sparsim squamulatis, pedunculis corymbosis, calycibus squamulatis basi excavatis.

ARBUSCULA 2—4 metrorum; RAMI patentes, angulati, glabri, cinerei; RAMULI angulati vel compressi, squamati, squamis ovatis, subulato-acuminatis. FOLIA oblongo-obovata, acuta, basi obtusa vel obtusiuscula, serrulata, raro apice serrata, supra glabra, subtus in nervis sparsim squamulatis, squamulis saepe setiformibus, — adultiora utrinque glabra, — coriacea, 0,065 lata, 0,17 longa; PETIOLI trigoni, supra plani, squamati, 0,02 longi. INFLORESCENTIA corymbosa; PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, subcompressus, squamulatus, pubescens; PEDUNCULI PARTIALES alterni, uniflori, subcompressi, squamulati, fuseo-pubescentes. BRACTEAE ovatae vel oblongae, acutae, basi cordatae, glabriuseulae. CALYX gamosepalus, fructifer basi excavatus, sparsim squamulatus, intus glaber; SEPALA quinque, erecta, subaequalia: tria ovata, obtusiuscula; duo oblonga, obtusa, subcoriacea. STYLI quatuor ad sex, liberi, filiformes, glabri; STIGMATA punctiformia. FRUCTUS immaturus hemisphaericus, quinquesuleatus, depressus, dense fuseo-leprosus, quinquelocularis, dissepimentis membranaceis. SEMINA numerosa, in mucilagine gelatinoso immersa, angulata, ventre plana, dorso et lateribus rotundata; TESTA foveolata, badia, crustacea; CHALAZA hilo subopposita; RAPHE testae adnata; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in medio albuminis carnosus, cylindricus, saepe curvatus; RADICULA obtusa; COTYLEDONES subaequales, obtusae.

*Crescit in summo montis Sakoembang: BORNEO.*

## XII. SAURAUJA LEPROSA. KHS.

S. ramulis squamulatis, foliis ovali-oblongis acuminatis basi obtusiusculis vel angustatis crenulatis supra glabris subtus leprosis, floribus axillaribus corymbosis, calycibus squamulatis et leprosis.

ARBUSCULA; RAMI in angulis  $45^\circ$  patentés, teretes, sparsim squamulati, cinereo-fusci; RAMULI compressi, saepe sulcati, squamulati. FOLIA alterna, ovali-oblonga, raro ovata, acuminata vel acuta, mucronulata, basi angustata aut obtusiuscula, crenulata, supra glabra, subtus pube et squamulis minutis leprosa, 0,21 longa, 0,06 lata, coriacea, nervis primariis in angulis  $45^\circ$ ; nervis secundariis subparallelis, distantibus; PETIOLI subteretes, supra sulcati, squamulati, 0,03 longi. FLORES corymbosi, raro solitarii; PEDUNCULUS COMMUNIS et PEDUNCULI PARTIALES subteretes, dense squamulati; BRACTEAE alternae, oblongae, acutae, supra glabrae, subtus squamatae. ALABASTRUM ovoideum, basi truncatum, pube et squamulis rufis vestitum. CALYX pentasepalus, aestivatione quincunciali; SEPALA recta, inaequalia, rotundato-ovata, acuta vel obtusissima, intus glabra, extus squamulis et pube leprosa munita, — interiora saepe glabra, — nervis a basi ad marginem procurrentibus, flabellatis. COROLLA pentapetala, subcampanulata, aestivatione convolutâ; PETALA basi connata, obovata, biloba, lobis inaequalibus obtusis, glabra, membranacea, laete rosea, 0,006 longa, 0,004 lata. STAMINA 25; FILAMENTA basi connata inter se et cum corolla, linearia, glabra; ANTHERAE supra medium affixae, lineares, apice subbilobae. OVARIUM subovoideum, apice truncatum, dense pilosum, quadri- vel quinquelocularis; PLACENTAE oblongae, curvatae, subtrigonae, ab apice axeos loculi pendulae; OVULA numerosa, placentas ubique tegentia. STYLUS basi subpentagonus, supra basin quinquepartitus, glaber; STIGMATA punctiformia. FRUCTUS immaturus calyce excreto cinctus, stylo excreto munitus, subpentagonus, depressus, fusco-hirsutus, quadri- vel quinquelocularis, dissepimentis subcoriaceis. SEMINA numerosa, affixa placentis semiovoideis, — intus planis, extus rotundatis, ope stipitis brevis cum axi loculi connatis, — mucilagine cincta, hemisphaerica vel angulata; TESTA crustacea, fusca, foveolata, foveolis saepe hexangularibus; TEGMEN membranaceum. EMBRYO et ALBUMEN similes Sauraujae excavatae.

*Crescit in montibus Talaga-Bodas et Papandajang: JAVA.*

In de omstreken der kraters van den Talaga-Bodas en den Papandajang groeit deze soort met een gering verschil van vorm. De voorwerpen van den Talaga-Bodas hebben bladen met langere stelen, dikwerf van eene omgekeerd-civormige gedaante. Behalve dezen afwijkenden bladvorm, welke aan de voorwerpen een geheel eigenaardig aanzien geeft, bestaat er geen verschil. De haarbekleeding is uit priemvormige, aan den voet verbreedte schubben en uit gewone haren, die soms tot sterretjes vereenigd zijn, zamengesteld.

## XIII. SAURAUJA DISTASOSA. KHS.

S. ramulis squamulatis, foliis oblongo-obovalibus breviter acuminatis subtus sparsim leprosis, floribus corymbosis, calycibus basi rotundatis squamulatis.

*Crescit in monte Probakti: JAVA.*

Deze soort gelijkt door haar uiterlijk aanzien op *S. bracteosa*, *S. vulcani* en *S. pendula*. Van de laatste verschilt zij door de bekleeding, welke *S. pendula* geheel mist. Van de beide eersten kan zij onder-

scheiden worden door de bekleeding der vershillende deelen, en door andere kenmerken van vorm en grootte, welke aan eenige deelen eigen zijn. Bij de *S. bracteosa* is de bekleeding over de gansche plant digter, zijn de bloemen bijna even groot en de schutblaadjes dikwerf tot blaadjes uitgegroeid. Bij *S. vulcani* eindigen de schubben in priemen, zijn de bladen korter gesteeld, de bloemen kleiner en, als knop, door eene bruine haarbekleeding bedekt. Voor het overige bezit deze soort, bij een nader onderzoek, in de bloem- en vruchtdeelen eene opmerkelijke gelijkheid met deze deelen van *S. bracteosa*.

#### XIV. SAURAUJA FEROX. KHS.

*S. ramulis dense setosis et squamulatis, foliis oblongo-ovalibus acuminatis serratis supra et subtus setigeris, floribus subcorymbosis, calycibus setosis.*

ARBUSCULA 3—7 metrorum, coronâ aperta; TRUNCUS cylindricus, cinereus; RAMI teretes vel tetragoni, squamulis oblongis, acuminatis, saepe denticulatis et setis laete fuscis vestiti; RAMULI compressi, setosi. FOLIA oblongo-ovalia vel oblongo-obovalia, acuminata, saepe acuta, basi obtusa, serrata, serraturis subulatis, supra sparsim subtus praesertim in nervis dense setosa, coriacea, 0,18 longa, 0,06 lata, nervis primariis in angulo 45°, nervis secundariis parallelis, approximatis; PETIOLI teretes, supra sulcati, dense setosi, 0,02 longi. INFLORESCENTIA axillaris, subcorymbosa; PEDUNCULUS COMMUNIS et PEDUNCULI PARTIALES subcompressi, setosi. BRACTEAE alternae, approximatae, oblongae vel lanceolatae, setosae. ALABASTRUM rotundato-ovoïdeum, dense setosum. CALYX pentasepalus, aestivatione subimbricatâ; SEPALA subaequalia, ovata, acutiuscula, intus glabra: tria extus in totâ superficie, duo in medio setosa. COROLLA pentapetala, aestivatione convolutâ; PETALA basi connata, obovata, apice profunde emarginata vel biloba, integerrima, glabra, nervis a basi sejunctis. STAMINA 15—20, basi connata; FILAMENTA filiformia, attenuata, glabra; ANTHERAE in medio affixae, lineari-oblongae. OVARIVM hemisphaericum, tri- vel quadrisulcatum, glabrum, tri- vel quadriloculare; OVULA numerosa; PLACENTAE ope stipitis carnosae axis loculi affixae, hemisphaericae, apice emarginatae, ovulis tectae. STYLI 3 vel 4, liberi, filiformes, glabri; STIGMATA capitellata. CAPSULA sphaeroïdea, sulcata, glabra, loculicida, tri- vel quadrivalvis; VALVULAE ad duas tertias debiscentes. SEMINA multa, areolis placentarum hemisphaericarum affixa, oblonga, tetra- vel pentagona; TESTA fusca, foveolata, crustacea; RAPHE testae adnata; CHALAZA hilo opposita; TEGMEN membranaceum, tenue. ALBUMEN carnosum, album. EMBRYO albumine cinctus, cylindricus; COTYLEDONES chalazae approximatae, subaequales, obtusae; RADICULA obtusa.

*Crescit in monte Pamatton, prope riam Arinawe: BORNEO.*

Tab. 30. Figura Sauraujae ferocis. 1. Flos expansus. 2. Flos, calyce ablato. 3. Petalum unicum cum staminibus oppositis. 4. Filamentum a latere et 5. ab anteriore visum. 6. Filamentum adultius postice et 7. lateraliter visum. 8. Antherae sectio transversalis. 9. Antherae apex. 10. Ovarium verticaliter sectum. 11. Fructus. 12. Fructus verticaliter sectus. 13. Fructus loculus cum placenta denudata. 14. Valvula intus visa. 15. Axis fructus verticaliter secta cum placenta integra. 16 et 17. Semina immatura. 18. Semen admodum auctum. 19. Semen verticaliter sectum. 20. Embryo nudus cum parte saeculi embryonis ad extremitatem radieulae.



## XV. SAURAUJA SETIGERA. KHS.

S. ramulis setosis et squamatis, foliis obovatis acuminatis basi obtusis vel emarginatis supra sparsim subtus dense setosis, floribus axillaribus geminatis, calycibus dense setosis.

ARBUSCULA 5—7 metrorum; RAMI patentes, teretes, rimosi, glabri, cinerei; RAMULI subteretes, vestiti squamis ovatis, cuspidatis et setis subuliformibus. FOLIA obovata vel oblongo-obovata, breviter acuminata, basi saepe inaequalia obtusa vel emarginata, margine setigera, setis subuliformibus, supra sparsim setosa, subtus dense setosa et hirsuta, coriacea, 0,2 longa, 0,09 lata, nervis primariis in angulo 40°, nervis secundariis sigmoideis, parallelis, approximatis; PETIOLI subteretes, setosi, 0,03 longi. FLORES axillares; PEDUNCULI biflori, subteretes, dense setosi; BRACTEAE oblongae, acutiusculae, setosae. CALYX pentasepalus, aestivatione subimbricatâ; SEPALA inaequalia: tria rotundato-ovata, acuta, intus glabra, extus dense setosa; duo spathulata, obtusa, glabra, petaloidea. COROLLA pentapetala, rotata, aestivatione convolutâ; PETALA basi connata, subaequalia, late obovata, apice bi- vel triloba, lobis inaequalibus, glabra. STAMINA 20—25, uniserialia; FILAMENTA basi connata, filiformia, glabra; ANTHERAE infra medium affixae, lineari-oblongae, rimis apicalibus dehiscentes. OVARIUM semi-ovoideum, apice subtruncatum, glabrum, quinqueloculare; OVULA numerosa, tegentia placentas in axi loculi subsessiles et semi-ovoideas; STYLI 5; STIGMATA capitata. FRUCTUS capsularis, sphaeroideus, depressus, glaber, quinquelocularis, loculis polyspermis. SEMINUM forma et structura similes Sauraujae ferocis.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

## XVI. SAURAUJA TEWENSIS. KHS.

S. ramulis strigosis squamulatis, foliis obovatis acuminatis basi cuneatis serrulatis supra glabriusculis subtus setosis, pedunculis axillaribus unifloris, calycibus strigoso-squamulatis.

ARBUSCULA; RAMI teretes, fusci, sparsim squamulati; RAMULI compressi, squamulis lanceolatis, cuspidatis vestiti. FOLIA obovata, saepe oblongo-obovata, breviter acuminata, basi cuneata raro obtusiuscula, serrulata, supra in nervo medio setosa, subtus squamulata et setosa, setis brevibus appressis, coriacea, 0,09 longa, 3,5 lata, nervis primariis distantibus in angulo 45°, nervis secundariis approximatis, fere rectis, subparallelis; PETIOLI semiteretes, squamulati, 0,015 longi. FLORES axillares, geminati vel solitarii; PEDUNCULI compressi, squamulati; BRACTEAE minutae, oblongae vel penicilliformes. ALABASTRUM subglobosum, squamulatum. CALYX pentasepalus, aestivatione quincunciali; SEPALA biformia (tria majora, subrotunda, acutiuscula; duo minora, ovato-oblonga), intus glabra, extus squamulata. COROLLA pentapetala, subcampanulata, aestivatione convolutâ; PETALA obovata, profunde emarginata, integerrima, glabra. STAMINA multa, basi connata et corollae adnata; FILAMENTA linearia, glabra, brevia; ANTHERAE in medio affixae, oblongae. OVARIUM sphaeroideum, quadri- vel quinquesulcatum, truncatum, glabrum, quadri- ad quinqueloculare; OVULA numerosa, affixa placentis subsessilibus, trigonis, dorso rotundatis et lateribus planis; STYLI 4—5; STIGMATA capitellata. CAPSULA sphaeroidea, 4—5 sulcata, glabra, loculicida, 4—5 valvis; VALVULAE ad medium usque dehiscentes. SEMINUM numerus, forma et structura similes Sauraujae ferocis.

*Crescit ad flumen Tewe: BORNEO.*

## XVII. SAURAUJA REINWARDTIANA. BL.

S. ramulis tuberculatis et squamulatis, foliis oblongis acuminatis basi obtusiuseulis obsolete serrulatis glabriuseulis, pedunculis corymbiferis saepe trifloris, calycibus breviter setosis, sepalis exterioribus late rotundatis.

Blume, Bijdragen tot de Flora van Neêrl. Indië, bl. 126.

*Crescit in sylvis montium Wajang, Patoeha, etc.: JAVA.*

In de bosseken, welke de bergen van het westelijk gedeelte van Java bedekken, is deze soort, tot op eene hoogte van ongeveer 1500 ellen, vrij algemeen. Bij andere kenmerken, kan het dicht bij elkander staan der tussehnerven ter onderscheiding dienen, hetwelk insgelijks aan *S. Tewensis* eigen is.

## XVIII. SAURAUJA SAKOEMBANGENSIS. KHS.

S. ramulis leprosis et squamulatis, foliis oblongo-ovalibus acuminatis utrinque setosis, floribus subcorymbosis, calycibus breviter setosis, sepalis exterioribus ovatis.

ARBUSCULA; RAMI glabriuseuli, einerei; RAMULI compressi, subsuleati, fuseo-leprosi, squamulati, squamulis lanceolatis, subulatis. FOLIA oblongo-ovalia, breviter acuminata, basi inaequilatera et obtusa, subintegerrima, supra et subtus setosa, 0,13 longa, 0,055 lata, nervis primariis in angulo 45°, nervis secundariis subparallelis, distantibus; PETIOLI 0,01 longi, semi-teretes, dense hirsuti. FLORES subcorymbosi. BRACTEAE oblongae, utrinque setosae. PEDUNCULI compressi, dense setosi. CALYX pentasepalus, aestivatione imbricatâ; SEPALA inaequalia: tria exteriora majora, ovata, obtusiuseula, intus glabra, extus setosa; duo interiora minora, ovato-oblonga, intus glabra, extus in medio cum stria setarum. COROLLA pentapetala, aestivatione convolutâ; PETALA floris nondum explicatae basi sublibera, obovata, biloba, glabra. STAMINA 20, biserialia alternantia, in serie posteriore majora; ANTHERAE oblongae. OVARIIUM hemisphaericum, glabrum, quinqueloculare; OVULA numerosa; STYLI quinque, lineares; STIGMATA capitellata.

*Crescit in monte Sakoembang: BORNEO.*

## XIX. SAURAUJA SINGALANGENSIS. KHS.

S. ramulis tuberculatis et squamulatis, foliis obovato-oblongis acuminatis utrinque setosis, floribus subcorymbosis, calycibus longe setosis, sepalis exterioribus ovatis.

*Crescit in sylvis Singalang: SUMATRA.*

Deze soort en de *S. Sakoembangensis* zijn zeer na verwant aan de *S. Reinwardtiana*. Zij zijn door de haar eigene haarbekleding van de laatste te onderscheiden. Van elkander verschillen zij door de ontwikkeling dezer haarbekleding, welke bij de *S. Sakoembangensis* veel aanzienlijker is, dan bij de *S. Singalangensis*.

## PLOIARIUM. KHS.

CALYX pentasepalus, aestivatione imbricatâ. COROLLA pentapetala, aestivatione convolutâ, petalis subbilobis. STAMINA numerosa; FILAMENTA pentadelpha, apicem versus libera; ANTHERAE cordiformes, rimis longitudinalibus dehiscentes. OVARIVM ovoïdeum, quinesulcatum, quineloculare; OVULA numerosa, affixa placentis subcylindricis. STYLI quinque; STIGMATA capitellata. CAPSULA quinesulcata, septicida, valvulis cymbiformibus a basi dehiscentibus. SEMINA numerosa, multiseriata, adscendentia, linearia, apice et basi membranacea; TESTA membranacea; TEGMEN membranaceum, sinuato-costatum. ALBUMEN carnosum. EMBRYO rectus, cylindricus, utrinque obtusus.

ARBORES. FOLIA alterna, versus apicem ramulorum approximata, coriacea. PEDUNCULI axillares, uniflori.

Het geslacht Ploiarium vertegenwoordigt, in den Indischen Archipel, de in Amerika voorkomende geslachten Bonnetia, Archytaea en Mahurea. Bonnetia verschilt van hetzelfde door de niet zamengroeide helmraden, in de wijze van openspringen der helmknopjes door poren aan den voet, en door de driekleppige vrucht; Mahurea heeft in de mindere zamengroeiing der helmraden, in den van boven schotelvormig verwijden helmknoop, en in de hangende eitjes, eigene kenmerken; Archytaea is te onderscheiden door den niet wegvallenden kelk, door den enkelvoudigen stijl en door de plaatsing der eitjes in twee rijen. — De naam, aan dit geslacht gegeven, doelt op den vorm van de kleppen der kapsels, die naar eene kleine kano gelijken.

## PLOIARIUM ELEGANS. KHS.

P. foliis alternis oblongis, floribus axillaribus solitariis.

ARBOR 6—8 metropum; TRUNCUS rectus, cylindricus, cortice cinereo tectus; CORONA rotundata vel pyramidalis; RAMI patentes vel diffusi, subteretes, cicatrisati, glabri, cinerei; RAMULI compressi, saepe angulati, glabri, rubri. GEMMAE teretes, acutae vel acuminatae, glabrae, involutae, partibus junioribus involutis. FOLIA versus apicem ramorum conferta, alterna, oblonga vel obovato-oblonga, acuta, basi truncata vel subcordata, margine recurva et rubra, basi integerrima, apice serrulata, utrinque glabra, coriacea, 0,095 longa, 0,025 lata, nervo medio costatim prominente rubro; PETIOLI compressi, glabri, brevissimi. FLORES axillares, solitarii, longe pedunculati; PEDUNCULI compressi, saepe ancipites, versus apicem subteretes, bibracteati, glabri, rubri. BRACTEAE oblongae, acutae, apice serrulatae. CALYX pentasepalus, campanulatus, deciduus, aestivatione imbricatâ; SEPALA subaequalia, rotundato-ovata, acuta vel emarginata, saepe crenulata, utrinque glabra, coriacea, rubro-marginata. COROLLA pentapetala, aestivatione convolutâ; PETALA unguiculata, obliqua, obovata, apice emarginata, crenulata, basi integerrima, glabra, subcoriacea. STAMINA numerosa; FILAMENTA pentadelpha (fasciculi petalis oppositi et glandulis pyramidalibus et acutis alternantes; parte concreta oblonga, partibus liberis filiformibus), glabra; ANTHERAE basi affixae, cordiformes, emarginatae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. OVARIVM oblongo-ovoïdeum, quinesulcatum, glabrum, quineloculare; OVULA numerosa,

linearia, inserta placentis subteretibus, axi loculi affixis. *STYLI* 5, subteretes, glabri; *STIGMATA* truncata. *CAPSULA* oblongo-ovoidea, attenuata, quinqueloba, glabra, lignea, septicida, quinquevalvis; *VALVULAE* a basi dehiscentes, navicellatae, endocarpio crustaceo, apice columnae pentagonae affixae. *SEMINA* numerosa, multiserialia, adscendentia, linearia vel oblonga, glabra, minuta, apice et basi cum membranula lineari; *EXOSTOMIUM* et *HILUM* approximata et chalazae opposita; *TESTA* tenue membranacea; *RAPHE* simplex, testae adnata; *TEGMEN* membranaceum, costis longitudinalibus undulatis. *ALBUMEN* periphericum. *EMBRYO* centralis, erectus, fere rectus, cylindricus, utrinque obtusus.

*Crescit juxta Poeloe-lampeii: BORNEO.*

Tab. 25. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos. 3. Petalum. 4. Bractea. 5. Staminum fasciculus. 6. Staminis pars libera. 7. Ovarium, integumentis floralibus et staminibus ablati. 8. Ovarii transversalis sectio. 9. Fructus. 10. Capsula dehiscens. 11. Capsula, valvulâ unâ ablatâ. 12. Valvula intus visa. 13. Capsula verticaliter secta. 14. Columnae et valvulae sectio transversalis. 15. Placenta cum seminibus. 16. Semina aucta. 17. Semen immaturum cum sacco embryonis. 18. Nucleus immaturus. 19, 20, 21. Semina valde aucta. 22. Semen dissectum cum parte testae, raphe libera, tegminis dimidia parte et tegumento nuclei. 23. Nuclei tegumentum cum massis granulatis rotundatis. 24. Tegminis pars admodum aucta. 25. Nucleus verticaliter sectus.

#### LAPLACEA. KUNTH, CAMBESSÈDES, ETC.

#### LAPLACEA VULCANICA. KHS.

L. foliis ovalibus obtusis vel emarginatis integerrimis.

*ARBUSCULA* 2—4 metrorum, diffusa; *TRUNCUS* brevis, angulatus, nigrescens; *RAMI* subpatentes, trigoni vel tetragoni, rimosi, cicatrisati, glabri; *RAMULI* trigoni, subcompressi, cinereo-leprosi. *GEMMAE* conicae, obtusiusculae, sericeae, foliis amplectentibus teretibus, folio exteriori involvente axi opposito. *FOLIA* versus apices ramorum conferta, patentia, ovalia vel ovata, basi obtusa, apice obtusiuscula vel emarginata, integerrima, utrinque glabra, crasso-coriacea, nervis supra exsculptis, 0,06 longa, 0,04 lata; *PETIOLI* semi-teretes, glabri, 0,004 longi. *FLORES* axillares, solitarii; *PEDUNCULI* breves, teretes, pubescentes; *BRACTEAE* duae, suboppositae, calyci approximatae, ovatae, acutiusculae, extus sericeae. *ALABASTRUM* ovoideum, obtusiusculum, sericeum. *CALYX* pentasepalus, aestivatione imbricatâ. *SEPALA* inaequalia, duo petaloidea, subrotunda, obtusissima, integerrima, saepe irregulariter fissa, intus glabra, extus sericea. *COROLLA* pentapetala, aestivatione subconvolutâ; *PETALA* inaequalia, breviter unguiculata, rotundata, obtusissima vel emarginata, glabra. *STAMINA* numerosa; *FILAMENTA* biserialia, monadelphica vel pentadelphica, corollae adnata, lineari-oblonga, attenuata, glabra; *ANTHERAE* in medio affixae, vacillantes, ovatae, utrinque emarginatae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. *OVARIUM* ovoideum, quinqsulcatum, dense sericeum, quinqueloculare; *OVULA* 4—6 in singulo loculo, axi loculi affixa, descendencia. *STYLI* 5, breves, subconnati; *STIGMATA* 5, obtusiuscula. *CAPSULA* obovoidea, subtruncata, pentagona, dense pubescens, quinquelocularis, loculicida; *VALVULAE* primum in medio,

deinde ab apice ad basin usque disjunctae, oblongae, intus septigeræ et glabrae, extus sulcatae et pubescentes; COLUMELLA pentagona. SEMINA 3—5, descendencia, in medio affixa, compressa, oblonga, utrinque obtusa, apice in alam expansa; UMBILICUS supra exostomium positus; TESTA apice expansa, subcoriacea; RAPHIS in dorso seminis ad chalazam umbilico oppositam, inter cellulas mesospermii procurrens; TEGMEN membranaceum. ALBUMEN paululum. EMBRYO albus, erectus; COTYLEDONES subrotundae, obtusae, basi subcordatae, planae; RADICULA teres, obtusiuscula.

*Crescit in summo montis Merapi: SUMATRA.*

Tab. 26. Figura Laplaceae vulcanicae. 1 et 2. Alabastrum. 3. Flos, calyce ablato. 4 et 5. Petala. 6. Staminum pars extus, et 7. intus visa. 8. Stamen. 9. Anthera antice et 10. postice visa. 11. Ovarium et stamina. 12. Ovarium longitudinaliter sectum. 13. Ovarii sectio transversalis. 14. Ovarium adultius longitudinaliter sectum. 15. Fructus. 16. Fructus, valvis duabis abscissis. 17. Fructus pars transversaliter secti, valvâ unâ ablata. 18. Valvula intus visa. 19. Columella a partibus circumpositis denudata. 20, 21, 22. Semina. 23. Semen, parte testae abscissâ. 24. Seminis pars, *a.* micropyle, *b.* umbilicus. 25. Seminis transversalis sectio. 26. Seminis immaturi pars, consistens: e mesospermio cellulari, parte raphis, tegmine et embryone. 27. Seminis immaturi pars. 28. Embryo.

### ANTHEËSCHIMA. KHS.

Gordoniae species. BLUME, etc.

CALYX trisepalus vel profunde tripartitus, aestivatione imbricatâ, sepalis basi connatis. COROLLA hexapetala, aestivatione imbricatâ, petalis subaequalibus. STAMINA numerosa, multiserialia; FILAMENTA basi inter se et petalis adnata; ANTHERAE dorso affixae, vacillantes, longitudinaliter dehiscentes. OVARIIUM quinqueloculare; OVULA 3—7 in singulo loculo, descendencia; STYLUS simplex; STIGMA capitatum. CAPSULA lignosa, oblonga, pentagona, quinquelocularis, loculicida, valvulis ad medium longitudinis usque dehiscentibus, circum columellam dispositis. SEMINA 3—5, vertice alata, basi alae affixa columellae angulatae; TESTA vertice seminis chartacea et basi ejusdem lignosa; TEGMEN membranaceum.

ARBORES. FOLIA alterna, ovali-oblonga, coriacea. FLORES axillares, solitarii.

De gewassen, uit welke de geslachten *Antheëschima* en *Closaschima* gevormd zijn, waren vroeger onder den geslachtsnaam *Gordonia* beschreven en afgebeeld. Eene nadere vergelijking met voorwerpen van de Amerikaansche grondsoort heeft mij echter doen zien, dat deze vereeniging van Indische en Amerikaansche gewassen kan worden gesplitst, en heeft mij tot het voorstellen van twee verschillende geslachten voor de Indische soorten van *Gordonia* doen overgaan. Het eerstgenoemd geslacht, *Antheëschima*, heeft de kelkbladen, even als *Gordonia*, in eenen krans staande, doch bezit er slechts drie. De bloemkroon bestaat bij hetzelfde uit zes, bij *Gordonia* uit vijf bloembladen. De stuifdraden zijn, bij het laatste geslacht, geheel vrij of in vijf bundels verbonden; bij *Antheëschima*, aan den voet met elkander in eenen ring en met de bloembladen zamengegroeid. De overige bloemdeelen en de vruchten der ware soorten

van *Gordonia*, heb ik niet onderzocht; doch, naar de beschrijving oordeelende, verschillen zij van die der Indische gewassen. Het aanzien der voorwerpen van *Antheëschima* en van *Gordonia* verschilt weinig; dat der gewassen, welke ik onder den geslachtsnaam *Closaschima* heb vereenigd, is geheel anders, door de meer struikaardige groeiwijze en door de mindere ontwikkeling der bladen en bloemen; bovendien verschilt *Closaschima* van *Antheëschima* door eenige kenmerken der bloem: de eerste heeft vijf, soms, door de vergrooting van een der schutblaadjes, schijnbaar zes kelkbladen en vijf bloembladen, spiraalsgewijze geplaatst, en vijf stempels, welke bijna zonder stijlen zijn.

De gewassen van het geslacht *Antheëschima* behooren onder de fraaiste boomen, welke op Java, tussehen eene hoogte van 1500 tot 2000 N. ellen worden gevonden. Hunne stammen zijn dikwerf tot op eene lengte van 15 tot 20 N. ellen ongedeeld, doch verdeelen zich op die hoogte in bogtige takken en takjes, aan wier einden de bladen en bloemen geplaatst zijn. Door deze groeiwijze ontstaat eene zeer digte bladkroon, door welke de zonnestralen naauwelijks henendringen. Deze, alsmede de talrijke menigte bloemen, die hare oppervlakte versieren, deed mij den naam kiezen, dien ik heb voorgesteld. — Bij de Sundanezen heeten deze boomen *Kimangal*, hetwelk boom van geluk beteekent.

#### ANTHEËSCHIMA EXCELSA.

*Gordonia excelsa*. BL.

A. ramulis sericeo-pilosis, foliis ovali-oblongis serratis vel serrulatis, sepalis inaequalibus, petalis late rotundatis unguiculatis.

Blume, Bijdr. tot de Flora van Neêrl. Indië, bl. 130.

ARBOR speciosa; TRUNCUS reectus, subeylindricus; CORTEX crassus rimatus, fuscus; LIGNUM rubicundum, fibris tenuibus; CORONA semi-ovata vel hemisphaerica, dense foliosa; RAMI patentes vel diffusi, teretes, cinerei, epidermide saepe rimis transversalibus solutâ et ad lamellas reductâ; RAMULI alterni, teretes vel subteretes, dense sericeo-pilosi. FOLIA ovali-oblonga, acutiuscula, saepe emarginata, raro obtusissima, basi cuneata, serrata vel serrulata, utrinque glabrata, — juniora in et prope nervo medio in pagina inferiore pubescentia, — coriacea, 0,12 longa, 0,045 lata, nervis primariis approximatis. GEMMAE subteretes, acuminatae, dense sericeo-pilosae, foliis equitantibus et conduplicatis. FLORES axillares, solitarii, speciosi; PEDUNCULI subteretes, dense sericei, breves. ALABASTRUM globosum, dense sericeum. CALYX trisepalus, deciduus, aestivatione quincunciali; SEPALA inaequalia, rotundata, obtusissima, crenulata, intus glabra, extus sericeo-pubescentia, coriacea. COROLLA rosacea, hexapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA breviter unguiculata, late rotundata, emarginata vel excisa, basi cuneata, extus sericea, intus glabra, basi pubescentia, subearnosa, margine membranacea, 0,025 longa, 0,02 lata. STAMINA numerosa, pluri-serialia; FILAMENTA monadelphica, subulata, glabra; ANTHERAE dorso affixae, vacillantes, ovatae vel oblongae, utrinque obtusae vel emarginatae, longitudinaliter dehiscentes. POLLEN sphaericum. OVARIIUM subglobosum, dense sericeo-pubescentia, quinqueloculare; OVULA 3—7 in singulo loculo, biserialia, alterna, descendencia, angulo interno loculi affixa, oblonga, compressa; STYLUS pentagonus, quinquesulcatus, basi pubescentia; STIGMA quinquelobatum, lobis obtusis. CAPSULA oblongo-

ovoïdea, pentagona, acuta, pubescens, quinquelocularis, loculida; VALVULAE ab apice ad medium sejunctae, oblongae, septigeræ, trigonae, dorso excavatae vel planae, lateribus planis infra medium excavatis, apice ancipites, infra apicem truncatae, endocarpio nitido fusco; COLUMELLA quinquangulata. SEMINA 3—5, in medio affixa, imbricata, oblonga, vertice obtusa, basi obliqua obtusiuscula, apice in alam chartaccam expansa, glabra, fusco nitida; HILUM lineare, supra micropylam punctiformem positum; TESTAE pars nucleum involvens lignoso-coriacea, pars alaeformis chartacca; RAPHE in dorso seminis ad chalazam hilo oppositam procurrens; MESOSPERMIUM cellulosum; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS ovoïdeus; RUDIMENTUM embryonis chalazae approximatum.

*Crescit in sylvis montanis: JAVA.*

Tab. 27. 1, 2. Alabastrum. 3. Flos expansus. 4. Petalum cum staminibus. 5. Stamen admodum auctum postice visum. 6. Antherae pars admodum auctum ad indicandum structuram endothecii. 7. Ovarium, integumentis floralibus et staminibus ablatis. 8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Capsula dehiscens. 10. Capsula, duabus valvulis ablatis. 11 et 12. Semina. 13 et 14. Semina immatura dissecta: *b.* hilum; *c.* chalaza. 15. Tegmen, cum sacco embryonis. 16. Semen immaturum admodum auctum: *a.* funiculus umbilicalis et placenta; *b.* hilum; *c.* micropyla; *d.* raphe; *e.* testa; *f.* mesospermium; *g.* tegmen; *h.* nucleus; *i.* saccus embryonis. 17. Seminis pars, membranis explicatis. 18. Saccus embryonis valde auctus. 19. Raphe seminis junior. 20. Raphe seminis adultioris.

### CLOSASCHIMA. KHS.

Gordoniae spec. KHS.

CALYX bibracteatus, pentasepalus, aestivatione imbricatâ, sepalis spiraliter dispositis. COROLLA pentapetala, aestivatione subimbricatâ. STAMINA numerosa; FILAMENTA monadelphæ, inter se et cum corolla connata; ANTHERAE dorso affixae, vacillantes, longitudinaliter dehiscentes. OVARIUM quinqueloculare; OVULA 2—6 in singulo loculo, descendenti; STYLI 5, breves; STIGMATA 5. CAPSULA lignosa, oblonga, pentagona, quinquelocularis, loculida, valvulis fere ad basin usque dehiscentibus, circum columellam pentagonam dispositis. SEMINA 2—5, vertice alata, basi partis expansi et alaeformis testae affixa; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in albumine tenui, erectus, rectus, radiculâ terete, cotyledonibus planis.

ARBORES. FOLIA alterna, oblonga, coriacea. FLORES axillares, solitarii.

Uit de vroegere ophelderingen, bij *Antheischima* gegeven, en uit de bovenstaande kenmerken, blijkt, dat de kelk en de stijlen de voornaamste middelen ter onderscheiding tusschen dit geslacht en *Gordonia* zijn, terwijl de groeiwijze een bijkomend middel ter erkenning aanbiedt. Deze laatste heeft mij den naam doen kiezen van *Closaschima*, omdat de schaduw door de mindere digtheid van de kroon gebroken is. — De eene der volgende soorten is op Sumatra, in de bosschen van het gebergte Melintang verzameld; de andere in de lage streken der zuid-oostkust van Borneo, op plaatsen, welke aan de zon zijn blootgesteld.

## I. CLOSASCHIMA OVALIS. KHS.

Gordoniac spec. KHS.

C. ramulis subpubescentibus, foliis oblongo-ovalibus acutiusculis serrulatis, sepalis subaequalibus, petalis obovatis. (Nervi foliorum approximati.)

ARBOR 10—15 metrorum; TRUNCUS rectus, cortice fusco vel fusco-cinereo; CORONA aperta; RAMI patentes, distantes, teretes, cinerei; RAMULI subcompressi, subpubescentes. GEMMAE lineares, acutae, dense sericeo-pubescentes, foliis conduplicatis et equitantibus. FOLIA alterna, distantia, oblongo-ovalia, apice acutiuscula vel emarginata, serrulata vel crenulata, basi integerrima, supra glabra, subtus glabrata, — juniora subtus pubescentia, — coriacea, 0,02 lata, 0,07 longa, nervis primariis approximatis; PETIOLI in ramis articulati, semiteretes, glabri, 0,002 longi. FLORES axillares, solitarii; PEDUNCULI breves, subteretes, pubescentes. BRACTEAE calyci approximatae, sublunares, intus glabrae, extus sericeae, minutae, deciduae. CALYX petasepalus, deciduus, aestivatione imbricatâ; SEPALA subaequalia, suborbiculata, obtusa, intus glabra, extus sericea, carnosio-coriacea, 0,005 lata, 0,003 longa. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ, PETALA inaequalia, obovata, obtusa vel emarginata, saepe margine undulata, intus glabra, extus in medio paginae sericea, subcarnosa, 0,008 longa, 4—6 lata. STAMINA numerosa 3—4 serialia; FILAMENTA basi connata, filiformia, glabra; ANTHERAE dorso affixae, vacillantes, subrotundae, utrinque emarginatae, rimis longitudinalibus dehiscentes. POLLEN sphaericum, elevato-punctatum. OVARIVM ovoïdeum, apice truncatum, sericeum, quinqueloculare; OVULA 2—5 in singulo loculo, fere in medio loculi angulo interno affixa, biserialia, alterna, sursum imbricantia, compressa; STYLUS haud manifestus; STIGMATA 5, acutiuscula, recurva. CAPSULA oblonga, pentagona, mucronulata, basi rotundata, pubescens, loculicida, quinquelocularis, quinquevalvis; VALVULAE fere ad basin usque disjunctae, septigerae, oblongae, triangulares, lateribus interioribus fusco-nitidis superne planis et inferne excavatis, acie truncatâ, COLUMELLA seminifera angulata, saepe marginata. SEMINA geminata ad quaternata, descendencia, alterna, compressa, dimidiato-oblonga, apice acutiuscula, basi obliqua et acutiuscula, superne in alam chartaceam extensa, glabra; HILUM micropylae approximatum et superpositum; TESTA in parte alari chartacea, in parte nucleum involvente sublignosa; RAPHE in dorso seminis; TEGMEN membranaceum. ALBUMEN tenue, album, periphericum. EMBRYO erectus; COTYLEDONES ovaes, obtusiusculae, planae; RADICULA teres, acuta.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Tab. 28. Fig. 1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Corolla postice visa. 4. Stamina floris nondum apertae. 5. Stamen postice et 6. antice visum. 7. Ovarium, integumentis floralibus et staminibus ablatis. 8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Capsula, duabus valvulis ablatis. 10. Valvula antice visa. 11. Semen immaturum. 12 et 13. Semina. 14. Semen sectum. 15. Embryo denudatus.



## II. CLOSASCHIMA MARGINATA. KHS.

C. ramulis glabris, foliis oblongo-ovalibus obtusiusculis obsolete serrulatis, sepalis subaequalibus, petalis subrotundis. (Nervi foliorum distantes.)

ARBOR; RAMI patentes, subteretes, fusei, rimati; RAMULI subcompressi, glabri. GEMMAE elongato-conicae, glabrae, foliis equitantibus, apice conduplicato-involutis. FOLIA alterna, versus ramulorum apices conferta, oblongo-ovalia vel oblongo-obovata, obtusiuscula, saepe emarginata, supra basin integerrimam obsolete serrulata, serraturis distantibus, margine saepe recurvo rubro, glabra, coriacea, 0,08 longa, 0,03 lata, nervis primariis distantibus; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,005 longi. FLORES axillares, saepe ad ramulorum apices positi, solitarii; PEDUNCULI subteretes, pubescentes, breves. BRACTEAE calyci approximatae, lunatae, intus glabrae, extus pubescentes. ALABASTRUM subglobosum, dense sericeum. CALYX pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ; SEPALA subrotundata, obtusissima, margine saepe irregulariter incisa, intus glabra, extus sericeo-pubescentia, coriacea, subaequalia, 0,005 longa et lata. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA subrotunda, obtusa, integerrima, extus pubescentia. STAMINA numerosa, bi- vel triserialia; FILAMENTA basi connata, subteretia, versus apicem subulata, glabra; ANTHERAE versus basin affixae, vacillantes, ovatae, cordatae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes, connectivo oblongo, aeuto, basi cordato. OVARIUM oblongo-ovoïdeum, dense sericeum, quinqueloculare; OVULA 4—6 in singulo loculo, angulo interno loculi affixa, descendente, oblonga, compressa. STYLUS pentagonus, quinquesuleatus, sericeus, brevis; STIGMATA 5, apiculata. CAPSULA oblonga, pentagona, mucronata, basi obtusa vel subtruncata, quinquelocularis, loculicida; VALVULAE fere ad basin usque disjunctae, lineari-oblongae, mucronatae, septigerae, trigonae, dorso eum sinu rotundato, lateribus una parte plana, duabus partibus profunde excavatis; COLUMELLA centralis pentagona. SEMINA 2—4 in singulo loculo, biserialia, alterna, obovata vel lineari-oblonga, extremitate superiore obtusa et in alam membranaceam expansa, extremitate inferiore acuta vel obliquobtusata, glabra. SEMINUM structura eadem ac Closaschimae ovatae.

*Crescit in monte Tirin et juxta Martapoera: BORNEO.*

De voorwerpen van de gemelde plaatsen verschillen van elkander door de grootte der bladen. Aan anderen, te Poeloe-lampeï en bij den berg Pamatton verzameld, zijn de jongere takken vierhoekig en, even als de knoppen der bladen, met eene soms vrij digte haarbekleeding voorzien. Voor het overige bestaan er kleine verschillen in den kelk en in de vrucht; doch zij sehijnen mij niet van genoegzaam aanbelang, om deze voorwerpen als eene eigene soort voor te stellen; als verscheidenheid beschouwd, kunnen de laatsten *C. dasyopthalma* worden genoemd. Bij deze soort zijn de vijf stempels vóór de opening der bloem, op dezelfde wijze als de bloemkroonbladen, over elkander liggende.

## SCHIMA. REINWARDT, BLUME.

Gordoniac species. WALLICH, DE CANDOLLE, etc.

CALYX pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ, sepalis aequalibus. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ, petalis inaequalibus: unum majus, caetera ante explieationem calyptratim tegens. STAMINA numerosa, pluriserialia; FILAMENTA basi inter se et petalis adnata; ANTHERAE basi affixae, longitudinaliter dehiscentes. OVARIVM quinqueloculare; OVULA 2—4 in singulo loculo, descendencia; stylus quinquesuleatus; STIGMA quinquelobum. CAPSULA lignosa, subglobosa, quinquelocularis, loculicida, valvulis ad medium longitudinis dehiscentibus, circum columellam dispositis. SEMINA 2—4, in sinu ventris affixa columellae, reniformia; TESTA in alam chartaceam periphericam expansa; TEGMEN membranaeum. ALBUMEN tenue. EMBRYO subplanum, radioulâ in marginem cotyledonum inflexâ, cotyledonibus contiguis subplanis.

ARBORES. FOLIA alterna, coriacea. FLORES axillares, foliorum abortu racemosi.

Het geslacht Schima, in 1820, door den Heer Reinwardt voor door hem op Java gevondene gewassen gevormd, werd in 1825, door den Heer Blume beschreven (Bijdragen tot de Flora van Neêrland sch Indië, bl. 129). Volgens deze beschrijving verschilt het van Gordonia door den vorm van den kelk en door eenige kenmerken der vrucht, welke de vorm, de maat van openspringen der kapsels en het standertje, rondom hetwelk de laatsten geplaatst zijn, vertoonen. Deze kenmerken, door latere schrijvers (de Heeren Sprengel en Endlicher) van te weinig belang beschouwd zijnde, missehien wel, omdat de zamenstelling van eenige soorten van Gordonia hiermede overeenkomt, hebben dit geslacht van Gordonia niet afgescheiden kunnen houden. Het wordt door den Heer Endlicher onder het geslacht Gordonia, in de afdeeling Lasianthus gebracht. Door het geheel verschillende aanzien der planten, mij met deze verbinding niet kunnende vereenigen, heb ik de voorwerpen aan een naauwkeurig onderzoek onderworpen, ten einde voor den indruk, dien de vorm op mij te weeg bracht, kenmerken te vinden, waardoor aan denzelven een wetenschappelijke grond wierde bijgezet. Door dit onderzoek is het mij gelukt, een van de weinige geslachten, die met den naam van den stichter in het stelsel bestaan, als genoegzaam afwijkende te leeren kennen, om hetzelve, zoo als ik vertrouw, met regt, onder den vroegeren naam Schima te herstellen: een' naam, die het eigenaardige van een der bladen der bloemkroon, dat de anderen vóór de opening als eene huid bedekt, zeer juist uitdrukt. Bij dit in het oogvallend verschil van Gordonia, moeten nog eenige kenmerken, die de vrucht en de zaden opleveren, gevoegd worden: de vorm, namelijk, van het standertje, dat het benedenste gedeelte bijna rolrond en het bovenste vijfdeelig, eenigerwijze stervormig heeft; de vorm der kleppen, welke naar beneden eene diepe insnede hebben, en vooral de gedaante en de zamenstelling der zaden. Bij Gordonia zijn de zaden langwerpig, met het bovenste of het eene einde in een' vleugel eindigende; bij Schima hebben zij eene niervormige gedaante, met een vliezig, dikwerf vrij aanzienlijk uitgroeisel, dat het geheele zaad omringt. De raphe omgeeft bij Antheëschima, in haren loop, van den navel naar den binnennavel, die tegenover elkander aan de beide einden van het ligchaam des zaads gelegen zijn, den geheelen rug van hetzelve;

daarentegen is de raphe bij *Schima* kort, loopende met eene kleine bogt, van den navel naar den binnennavel, welke in het bovenste einde van het zaad is. De kiem van *Schima* heeft de zaadlobben met zeer ongelijke zijden, soms zelfs alleen de naar binnengerigte ontwikkeld, en het worteltje tegen den rand van het benedenste der zaadlobben teruggebogen; die van *Gordonia* bestaat uit vrij regelmatig gevormde zaadlobben, en uit een worteltje, hetwelk met deze in eene rechte lijn ligt.

Bij *Schima Noronhae*, de grondsoort van het geslacht, moeten nog *S.* (*Gordonia* D. C.) *Wallichii*, *S. erenata* benevens *S. antherisosa* gevoegd worden.

*Schima Wallichii* (*Gordonia Chilaunea* Hamilton, Don Flor. Nepaulensis, pag. 215) groeit in het hooggelegen Nepaul, waar zij eenen naam draagt, die haar als eenen lang bloeienden en eenen aangenaamen geur verspreidenden boom doet kennen. Op de eilanden van den Archipel komen de anderen voor: *S. Noronhae* op Java, *S. crenata* op Borneo, en *S. antherisosa*, zeer verwant aan *S. Noronhae*, op Sumatra. *Schima erenata* werd door ons, op oorden weinig boven het zeevlak gelegen, in het zuid-oostelijk gedeelte van Borneo verzameld; de beide anderen versieren de hoogere bergstreken van Sumatra en Java.

Naar de tijden, waarop wij deze gewassen waargenomen hebben, oordeelende, bloeijen zij het geheele jaar in dezelfde mate. Hunne bladeren verwisselen vooral in den regentijd. De schutblaadjes, welke zeer klein zijn, vallen zeer spoedig af. De kelk neemt na de opening van de bloem weinig in grootte toe; doch blijft tot aan het afvallen der vrucht, onder dezelve, terwijl hij bij *Gordonia* soms in grootte toeneemt en voor de scheiding der vrucht van de plant dikmaals, wegvalt. Door de zamengroeiing van de bloembladen en de helmdraden vallen deze te zamen af. Bij de kapsels is het openen derzelve opmerkelijk. Dit gaat vergezeld van het ontstaan eener dwarse spleet in de tusschenwanden, welke vermoedelijk de opening bevordert, daar het hierdoor vrij geworden bovengedeelte van den wand, tegen het standertje drukkende, de verwijdering der kleppen ten gevolge kan hebben.

#### I. SCHIMA CRENATA. KHS.

*S. foliis oblongo-ovalibus serrato-crenatis, columella apice truncata quinquangulari, seminibus oblongo-reniformibus.*

ARBOR 10—15 metrorum; TRUNCUS rectus, cylindricus, basi saepe angulatus, angulis expansis in laminae; CORTEX subfuscus, rimatus, sat crassus; LIGNUM pallide vel obscure rubicundum, molle; CORONA hemisphaerica, basi truncata, peripheriâ sinuato-undulatâ, intus nuda; RAMI patentes, recti, apice saepe nutantes, teretes, rimati, fusci, glabri; RAMULI novelli subcompressi vel compressi, dense pubescentes; adultiores glabrati. GEMMAE conicae, dense sericeae, foliis equitantibus et apice conduplicatis intus sericeis. FOLIA versus apicem ramulorum conferta, alterna, oblongo-ovalia vel obovalia, apiculata, serrato-crenata, supra glabra, subtus pubescentia vel glabrescentia, 0,11 longa, 0,045 lata, coriacea; PETIOLI semiteretes, glabrati, 0,02 longi. FLORES axillares, solitarii vel foliorum abortu terminales, racemosi; PEDUNCULI subcompressi, pubescentes vel glabrati; BRACTEARUM rudimenta squami-

formia in parte superiore pedunculi. ALABASTRUM globosum, sericeo-pubesccns. CALYX persistens, pentasepalus, patens, aestivatione imbricatâ; SEPALA uniserialia, aequalia, rotundata, obtusa, extus pubescentia, intus dense sericea. COROLLA pentapetala, rosacea, aestivatione imbricatâ, petalis quatuor unico calyptriformi tectis; PETALA inaequalia, uno majore subcalyptrata, subrotunda, integerrima, saepe undulata, intus glabra, extus basi sericea, pallide rosea vel alba. STAMINA numerosa, 3—5 serialia; FILAMENTA basi monadelpha, corollae adnata, subuliformia, glabra; ANTHERAE basi affixae, subdidymae, connectivo ovali, biloculares, loculis rimis longitudinalibus dehiscentibus. OVARIUM hemisphaericum, dense sericeum, 4—5 locale; OVULA 3—4 in singulo loculo, angulo interno loculi affixa, descendencia, hiserialia, alterna, oblonga. STYLUS subpentagonus, quinesulcatus, glaber; STIGMA quinelobum, lobis obtusis. CAPSULA sphaeroïdea, parte styli persistente mucronata, basi obtusa vel subattenuata, sericea vel glabrescens, quinelocularis, loculicida, quinevalvis, lignosa; VALVULAE septigeræ, ad medium usque liberæ, oblongo-ovales; DISSEPIENTUM apice rectum, carinatum, in medio cum sinu obtuso, versus basin cum lobo semiovato acutiusculo et sinu acuto, crassum, fuscum, glabrum; COLUMELLA basi subpentagona, sursum crassior, obconica, truncata, apice quinquangulata, acie rectâ vel subcurvatâ. SEMINA 2—4 in singulo loculo, columellae alternatim affixa, sursum imbricata, oblongoreniformia, sinu obtusissima, rugosiuscula; HILUM in medio sinûs; MICROPYLA in extremitate inferiore sinûs; TESTA in membranam peripteralem expansa, chartacea, subrugosa; RAPHE ad chalazam, vertice seminis approximata et hilo subcontrariam, procurrens; TEGMEN membranaceum. ALBUMEN tenue, album. EMBRYO longitudinalis, subplanus; COTYLEDONES contiguae, subplanæ, margine saepe involutæ, dimidiato-ovatae vel subreniformes; RADICULA subteres, obtusa, in marginem cotyledonum inflexa.

*Crescit prope Martapoera, Poeloc-lampeï: BORNEO.*

Tab. 29. Figura Schimæ crenatæ. 1. Flos. 2. Flos, sepalis duobus, petalis et parte staminum abscissis. 3. Stamina. 4. Anthera et pars filamenti longitudinaliter sectæ. 5. Pollen siccum et 6. humectatum. 7. Pollen cum sacco. 8. Ovarium et calyx longitudinaliter secti. 9 et 10. Ovula. 11. Fructus longitudinaliter sectus. 12. Columella denudata. 13. Capsula calyce suffultâ, valvulis duabus ablatis. 14. Capsula calyce suffultâ, valvularum duarum superiore parte abscissâ. 15. Semen abortivum. 16. Seminis abortivi pars superior valde aucta. 17. Semen immaturum. 18. Semen, testæ et tegminis parte ablatâ. 19. Embryo, cotyledonibus sejunctis. 20. Symmetria floris.

## II. SCHIMA NORONHAE. RWDT.

S. foliis ovali-oblongis acuminatis subintegerrimis, columellæ apice stellæformi, seminibus reniformibus.

ARBOR speciosa, saepe 20 metrorum; RAMI, RAMULI et GEMMAE Schimæ crenatæ. FOLIA alterna, ovali-oblonga vel ovalia, acuminata, apiculata, basi angustata, integerrima vel cum nonnullis serraturis distantibus, supra nitida, subtus glabra, — juniora subtus sericea, — 0,08 longa, 0,025 lata, coriacea, nervis primariis distantibus, in angulo 45° patentibus; PETIOLI compressi, glabri, 0,01 longi. CALYX, COROLLA, STAMINA, OVARIUM, STYLUS et STIGMA similes Schimæ crenatæ. CAPSULA sphaeroïdea, truncata vel excavata, parte persistente styli mucronata, basi rotundata, sparsim sericea vel glabrata,

lignosa, quinquelocularis, loculicida; VALVULAE ad duas tertias disjunetae, ovales, septigeræ; DISSEPI-  
MENTUM apice carinatum, in medio sigmoideo-excisum, versus basin eum lobo semiovato acuto et sinu  
acuto, crassum, subtriangulare; COLUMELLA obconica, truncata, pentagona, versus apicem quinque-  
partita; partes sinubus rotundatis sejunctae, acuminatae; vertice cum quinque cavitatibus exsculptis.  
SEMINA 2—4, sinubus columellae affixa, biserialia, subalterna, reniformia, sinu acuto; structura eadem  
ae Schimae erenatae.

*Crescit in montanis: JAVA.*

Tab. 29. Fig. 21. Capsula a latere visa, valvulae parte unius abscissâ. 22. Eadem ab apice visa. 23. Semen. 24. Se-  
men, testae et tegminis parte abscissâ. 25. Seminis sectio longitudinalis. 26. Embryo. 27. Embryo,  
cotyledonibus sejunctis.

De voorwerpen dezer soort, welke ik uit den tuin van Buitenzorg heb, en aldaar vermoedelijk van den  
berg Salak zijn overgebracht, hebben de bladen lancetvormig, aan de beide einden zeer toegespitst, en  
de bloemen iets kleiner dan gewoonlijk. Voor het overige hebben zij geene kenmerken, die mij tot de  
voorstelling eener eigene soort kunnen doen besluiten.

### III. SCHIMA ANTHERISOSA. KHS.

S. foliis lanceolatis acuminatis serratis, columellae apice ovoïdeo truncato.

*Crescit in monte Merapi: SUMATRA.*

Deze staat tusschen de beide beschrevene soorten in. Zij heeft door den vorm der bladen de meeste  
verwantschap met de langbladerige Schima Noronhae, doch verschilt door de zeer duidelijke zaagtanden.  
Zij is aan Schima erenata verwant door den vorm der vrucht, welke nauwelijks verschilt, en door den  
vorm van het standertje der vrucht, die echter meer regelmatig eivormig is.

### PYRENARIA. BLUME.

Bijdragen tot de Flora van Neêrlandsch Indië, bl. 1119.

CALYX pentasepalus, bibracteatus, aestivatione imbricatâ. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ.  
STAMINA numerosa; FILAMENTA monadelphæ, corollae adnata, filiformia; ANTHERAE medio dorsi affixae,  
vaeillantes, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. OVARIUM liberum, quinqueloculare; OVULA bina,  
superimposita, angulo interno loculi affixa, anatropa. STYLI 5, approximati; STIGMATA emarginata.  
POMUM quinqueloculare. SEMINA (Pyrena) 2 in singulo loculo, sursum imbricata; TESTA ossea; TEGMEN  
membranaceum. EMBRYO longitudinalis, rectus; RADICULA teres; COTYLEDONES foliaceae, contortuplicatae.

ARBORES. FOLIA alterna, oblonga, serrata, coriacea. FLORES axillares, solitarii.

Naar den eersten indruk te oordeelen, welken het aanzien der planten maakt, behoort het geslacht *Pyrenaria* tot de *Gordonieae*. Deze verwantschap wordt verder bevestigd door de bij een nader onderzoek gevondene kenmerken. Die der bloemdeelen zijn niet zeer afwijkende van *Gordonia*, enzv. De ontwikkeling van het zaad geschiedt even als bij deze geslachten, doch brengt eenen vorm voort die meer overeenkomt met dien van het zaad van *Malaehodendron*. De vrucht wijkt door de samenstelling harer bekleedselen van de andere geslachten der *Gordonieae* af, zijnde het *sarcocarpium* zeer ontwikkeld; doch dit vershil is van geen genoegzaam aanbelang, dewijl in het geslacht *Saurauja* openspringende en vleezige vruchten worden gevonden.

### I. PYRENARIA SERRATA. Bl.

*P. foliis ovali-oblongis serratis, bracteis lunulatis obtusis, fructubus sphaeroïdeis.*

ARBOR 15—20 metrorum; TRUNCUS rectus, cylindricus, cortice longitudinaliter rimoso tectus; RAMI patentcs, teretes, fusci, glabri; RAMULI compressi, — novelli saepe compressi, sulcati, subpubescentes. GEMMAE conicae, dense sericeae, foliis equitantibus, apice conduplicatis, intus glabriusculis. FOLIA alterna, ovali-oblonga, breviter acuminata, serrata, serraturis argutis, basi integerrima, utrinque glabra, 0,15 longa, 0,05 lata, coriacea; PETIOLI semiteretes, supra sulcati, glabri, 0,01 longi. FLORES axillares, solitarii; PEDUNCULI subteretes, pubescentes, 0,05 longi; BRACTEAE duae calyci approximatae, lunulatae, obtusae, subtus sericeae, supra glabriusculae. ALABASTRUM subglobosum, dense sericeum. CALYX pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ; SEPALA inaequalia, (duo exteriora minora, rotundata, obtusa; tria interiora majora, semi-orbiculata, obtusissima) supra glabra, subtus dense sericea. COROLLA pentapetala vel quinquepartita, tubo brevissimo, aestivatione imbricatâ; PETALA subaequalia, ovata, obtusa, intus glabra, extus piloso-sericea, carnosa, margine membranacea. STAMINA numerosa; FILAMENTA monadelphica, petalis adnata, linearia, glabra; ANTHERAE infra medium affixae, vacillantes, ovatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. POLLEN sphaericum. OVARIVM subhemisphaericum, sericeo-pilosum, quinqueloculare; OVULA geminata, angulo interno loculi affixa, superimposita, hemisphaerica, anatropa. STYLI 5, coëlitii; STIGMATA capitellata. POMUM sphaeroïdeum, obsolete decemsulcatum, glabrum, epicarpio coriáceo, mesocarpio carnoso, endocarpio chartaceo, quinque- abortu tri- vel quadriloculare. SEMINA 2 in singulo loculo, angulo interno loculi affixa, superposita, oblonga, compressa, fusca; HILUM infra micropylam punctiformem; TESTA ossea, sat crassa; RAPHE ramificans intra testam et TEGMEN membranaceum, ad chalazam basilarem hiloque contrariam procurrens. ALBUMEN nullum vel tenue. EMBRYO longitudinalis, erectus; RADICULA cylindrica; COTYLEDONES contortuplicatae, foliaceae.

*Crescit in sylvis montanis: JAVA.*

Tab. 30. Figura speciei. 1, 2. Alabastrum. 3. Flos expansus. 4. Pars staminum. 5, 6. Pollen. 7. Ovarium, tegumentis floralibus et staminibus ablatis. 8. Ovarium sectum longitudinaliter. 9. Ovarii transversalis sectio. 10. Ovulum admodum auctum. 11. Fructus. 12. Fructus verticaliter sectus. 13. Semen. 14. Semen immaturum verticaliter sectum, ad indicandum directionem raphis. 15. Semen longitudinaliter sectum cum Embryone. 16. Embryo (15 et 16 Clarissimus Blume mihi communicavit).

## II. PYRENARIA OÏDOCARPA. KHS.

*P. foliis oblongo-ovalibus argute serratis, bracteis ovatis acutis, fructubus ovoïdeis.*

*Crescit in monte Tankoeban Prahoe: JAVA.*

De overeenkomst tusschen de voorwerpen dezer soort en der voorgaande, maakt eene beschrijving onnoodig, en het onderzoek der voorwerpen op hunne standplaatsen wenschelijk en zelfs noodzakelijk, om de verwantchap nader te bepalen. Bij de vroeger plaats gehad hebbende bewerking der familie, had ik deze en de beide volgende met *P. serrata* vereenigd en allen als verscheidenheden van haar aangemerkt. De tegenwoordige herziening heeft mij doen overgaan om allen onder eigene namen voor te stellen, minder om het getal soorten te vermeerderen, dan wel om de aandacht van de in Indië werkzaam zijnde Kruidkundigen op deze boomen te vestigen. — Behalve door de eivormige vrucht, is de *P. oïdocarpa* van de *P. serrata* door den vorm van de schutblaadjes en buitenste kelkbladen onderscheiden, zijnde de laatsten bij de eerste soort ovaal, min of meer puntig, en de schutblaadjes soms tot langwerpige, puntige blaadjes uitgegroeid.

## III. PYRENARIA MASOCARPA. KHS.

*P. foliis obovatis crenato-serratis, bracteis obtusis, fructubus ovoïdeis mammellatis.*

*Crescit in monte Balaran: BORNEO.*

Deze soort heeft de bloemsteeltjes meer dan viermaal langer, dan de beide voorgaande, en met twee kleine, halfronde schutblaadjes op het midden der lengte. Hare kelk- en bloembladen verschillen niet met die van *P. serrata*, doch het geringer aantal stuifdraden en vooral de eivorm der vrucht, kunnen ter onderscheiding dienen.

## IV. PYRENARIA LASIOCARPA. KHS.

*P. dense pilosa, foliis ovalibus serratis, bracteis ovalibus obtusis, fructubus obovoïdeis dense pilosis.*

*Crescit in monte Patocha: JAVA.*

Deze soort verschilt van de voorgaande door de digte haarbekleding, welke niet alleen de takken en bladen, maar ook de bijna rijpe vrucht bedekt, en door de gedaante der vrucht, die ten naastenbij omgekeerd eivormig is. Zij bezit de bloemdeelen gelijk aan die der *P. serrata*, en de bloemsteeltjes iets korter, doch mede van twee kleine schutblaadjes voorzien, even als bij *P. masocarpa*.

## CALPANDRIA. BLUME.

Bijdragen tot de Flora van Neêrlandsch Indië, bl. 178.

**CALYX** tetra-pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ. **COROLLA** tetra-pentapetala, aestivatione imbricatâ. **STAMINA** 25—40, biserialia, exteriora in tubo cylindrico concreta, interiora 10 libera; **FILAMENTA** staminum liberorum filiformia, et staminum concretorum brevissima; **ANTHERAE** in medio affixae, vacillantes, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. **OVARIUM** liberum, tri- ad quinqueloculare; **OVULA** 3—5 in singulo loculo, angulo interno loculi affixa, biserialia, alterna, superposita, anatropa; **STYLI** 5, coaliti; **STIGMATA** obtusa. **CAPSULA** lignosa, abortu trilocularis, loculicida, trivalvis; **VALVULAE** septigeræ. **SEMINA** (Pyrena) tria in singulo loculo, superposita; **TESTA** ossea; **TEGMEN** membranaceum. **EMBRYO** rectus; **RADICULA** teres; **COTYLEDONES** foliaceae.

**ARBUSCULAE.** **FOLIA** alterna, serrata, coriacea. **FLORES** axillares vel terminales, solitarii vel geminati.

Dit geslacht, vroeger bij de Meliaceae gerangshikt, is nader aan de Ternstroemiaceae verwant. Deszelfs voorwerpen hebben het aanzien van de gewassen der Ternstroemiaceae. Hunne helmraden zijn in een onbepaald getal en in ieder hokje van drie tot vijf eitjes aanwezig; de zaadlobben zijn bladvormig en, volkomen rijp zijnde, vrij groot en zamengeplooid; de Meliaceae, daarentegen, hebben een bepaald getal helmraden, dat meestal het dubbele van de bloemkroonverdeelingen is, een kleiner aantal eitjes, twee tot vier, en vooral dikke, vleezige zaadlobben. — Met de geslachten der Ternstroemiaceae vergeleken, lijkt Calpandria door de groeiwijze van de geheele plant, door de ontwikkeling der bladen, welke met de bloemen in knoppen besloten zijn, en door de samenstelling van de bloem, welke de binnenste helmraden dikwerf vrij heeft, op Camellia.

## I. CALPANDRIA LANCEOLATA. BLUME.

C. foliis ellipticis acuminatis serratis, stylo pubescente.

**ARBUSCULA** 3 metrorum; **RAMI** patentes, glabri, cinerei, lineati; **RAMULI** compressi, dense pilosi. **GEMMAE** conicae, acutae, glabriusculae, foliolis equitantibus, extus dense piloso-sericeis et extus glabriusculis. **FOLIA** alterna, distantia, elliptica, utroque acuminata, serrata, serraturis obtusiusculis, supra et subtus glabra, — juniora subtus, praesertim in nervo medio pubescentia, — coriacea, 0,08 longa, 0,035 lata; **PETIOLI** semiteretes, supra sulcati, glabri, 0,005 longi. **FLORES** terminales vel axillares, solitarii, raro geminati; **PEDUNCULI** teretes, pubescentes. **CALYX** tetra-pentasepalus, aestivatione imbricatâ; **SEPALA** inaequalia, subrotunda, obtusissima, saepe margine incisa, intus glabra, extus pubescentia. **COROLLA** tetra-pentapetala, aestivatione imbricatâ; **PETALA** ovalia, obtusa, glabra. **STAMINA** biserialia (exteriora in tubo cylindrico, apice decemdentato coalita; interiora decem libera); **FILAMENTA** staminum liberorum filiformia, glabra, sat longa, partes liberae filamentorum concretorum brevissimae; **ANTHERAE** in medio dorsi affixae, vacillantes, ovatae, utroque obtusae vel emarginatae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. **OVARIUM** liberum, oblongo-ovoïdeum, dense pubescens, tri-quinque-



loculare; OVULA 5 in singulo loculo, anatropa, biserialia, alterna, superimposita, angulo interno loculi affixa, subglobosa; STYLI 3—5, conereti, crassi, dense pilosi; STIGMATA obtusa. CAPSULA trigona, acuta, lignosa, abortu trilocularis, loculieida, trivalvis; VALVULAE ad medium usque disjunetae, rotundo-ovatae, acutae, endocarpio coriaceo, partem septorum ferentes; COLUMELLA triangularis, erassa. SEMINA 2—3, in singulo loculo, superimposita, deformia, angulata, rugosa; HILUM micropylae approximatum, saepe excavatum; TESTA ossea; RAPHE ad chalazam hilo oppositam proeurrens; TEGMEN membranaceum. EMBRYO erectus; RADICULA teres, obtusa; COTYLEDONES foliaceae, subrotundae, utroque obtusae.

*Crescit ad ripas fluminis Doesson: BORNEO.*

Tab. 31. Figura speciei. 1, 2. Alabastrum. 3. Flos expansus. 4. Staminum cylindrus, integumentis floralibus ablatis. 5. Pars cylindri intus visa. 6. Flos, calyce, corollâ et parte cylindri ablatis. 7. Flos, integumentis floralibus et cylindro staminum ablatis. 8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Ovarii sectio transversalis. 10. Ovulum admodum auctum. 11. Capsula, valvulâ unâ ablatâ. 12. Capsulae pars, valvula una et spermophorum. 13. Valvula intus visa. 14, 15, 16, 17, 18. Semina. 19. Semen immaturum verticaliter sectum. 20. Embryo.

## II. CALPANDRIA QUISCOSAURA. Kins.

C. foliis oblongo-ovatis acutis serratis, stylo glabro.

ARBUSCULA 2—4 metrorum; RAMI stricti, teretes, glabri, cinerei; RAMULI patentes, stricti, subteretes, pubescentes; — novelli compressi, dense pilosi. GEMMAE compresso-ovoideae, tegumentis inaequalibus ovatis glabris, foliolis aequitantibus extus dense hirsutis et intus glabris. FOLIA oblongo-ovata, acuta, obtuse serrata, utrinque glabra, — juniora subtus pilosa, — coriacea, 0,08 longa, 0,03 lata; PEDUNCULI 0,005 longi, semiteretes, glabrati vel pilosi. FLORES axillares vel terminales, solitarii; PEDUNCULI breves, teretes, pilosi. CALYX tetrasepalus, aestivatione imbricatâ; SEPALA biserialia, inaequalia, subrotunda, utrinque glabra. — OVARIUM oblongo-ovoideum, dense pilosum, triloculare; OVULA 3—6 in singulo loculo, superimposita. STYLUS unicus, subcylindricus; STIGMA trilobum, lobis obtusis.

*Crescit in montibus Tjikoerai et Kiamis: JAVA.*

Deze voorwerpen zijn tussehen de 1000 en 1800 N. ellen hoogte, in de digte bosschen van de beide opgenoemde bergen, verzameld. Hunne boomen tot de kleinste gewassen behoorende, hebben, door de bijna loodregte rigting der takken, een zeer stijf aanzien en, door het donker groen der bladen, een somber voorkomen. Zij bezitten kleine, in de oksels geplaatste bloemen, die door hare witte kleur zeer uitkomen en op eenigen afstand, door eenen aangename, specerijachtigen reuk, haar aanwezen verraden. Daar deze reuk het eenige opmerkelijke is, wat de inlanders aan deze boomen vonden, hebben zij hun den naam *Drangdan angien* gegeven, waardoor zij aan dezelve invloed op den wind toekennen: eene voorstelling, die zeker de verspreiding van den geur zeer juist aantoont.

OVER HET GESLACHT

N A U C L E A

EN EENIGE VERWANTE GESLACHTEN,

DOOR

P. W. KORTHALS.



Het geslacht *Nauclea* werd door Linnaeus voor het eerst in 1762 (\*) genoemd, en voor eene plant opgegeven, die hij vroeger als *Cephalanthus orientalis* aanduidde. Bij deze opgave haalt hij, onder anderen, Rheede's afbeelding (†) van de *Katoe Sjaka* aan, en geeft hij, met een vraagteeken, de afbeelding op van den *Bancalus* van Rumphius (§). Later, in 1764, deelde Linnaeus (•) het geslachtskenmerk mede, naar de beschrijving van de door Rheede afgebeelde *Katoe Sjaka*, met de volgende beschrijving der vrucht: *Semina solitaria, oblonga, subtrigona, inferne attenuata, apice obtusa, bilocularia*. Dezelfde beschrijving diende Jussieu voor zijn geslachtskenmerk van *Nauclea*, waarin hij zegt: *Capsula subtrigona, ab adjacentibus undique compressa, 2-locularis, 2-sperma, non dehiscens*; doch hij voegde bij dit geslacht de door Rumphius en Aublet afgebeelde slingerende gewassen, met in hoofdjes vereenigde bloemen. Lamarek beeldde onder den naam van *Nauclea orientalis* eene plant af, welke hij vroeger als *Cephalanthus ehinensis* had beschreven, en als de door Rumphius voorgestelde *Banealus* beschouwde. Naar de plant, volgens welke deze afbeelding is gemaakt, beschreef Poiret (‡) het geslacht *Nauclea* met: *une capsule à deux loges, à deux semences; un receptacle globuleux*.

---

(\*) *Spec. plant. Ed. II. T. I. p. 243.*

(†) *Hortus Malabaricus III. Tab. 33.*

(§) *Hort. Amboinensis III. Tab. 55.*

(•) *Gen. plantarum. Ed. VI. n. 223.*

(‡) *Encyclopédie Botanique. T. V. p. 434.*

Hij merkte daarbij op, dat *Cephalanthus* en *Nauclea* zeer verwant waren, en bragt onder het geslacht *Nauclea*: *N. orientalis*, *N. citrifolia*, de Katoe Sjaka Rheede, en de door Aublet afgebeelde *Ouropari* onder den naam van *N. guianensis*. Ongeveer in dien tijd leverde Gaertner (\*) eene beschrijving en afbeelding van *Nauclea orientalis*, daarbij als kenmerk voor *Nauclea* opgevend: *Capsula infera, calyce corticata, bicocca, bilocularis, polysperma. Semina setaceo-caudata*, en de platen van Rheede en Rumphius aanhalende. Dit kenmerk der vrucht werd door Schreber (†), met eene kleine verandering, afgeleid uit de beschrijving der door Gaertner gegevene soort, overgenomen. Roxburgh heeft dit kenmerk van Schreber, bij de bepaling der door hem afgebeelde soorten van *Nauclea*, gevolgd. Hetzelfde deed Willdenow (§), die de *Nauclea parvifolia* en *africana* kon vergelijken. Met het kenmerk van Linnaeus komt *Nauclea* weder bij Roemer en Schultes (x) voor, en daarbij tevens de opgaven van Jussieu en Lamarck. Sprengel neemt een gemengd kenmerk aan: *fructus drupacei, congesti, dicocci, coccis polyspermis, seminibus membranaceo-marginatis*, en vereenigt hiermede de boomvormige en slingerende gewassen, welke door Schreber in *Nauclea* en *Uncaria* waren verdeeld. De Candolle nam de scheiding der verschillend groeiende gewassen aan, en gaf een kenmerk van *Nauclea*, aan de afbeelding en beschrijving van Gaertner ontleend. Richard vereenigde de beide vormen: hij gaf een geslachtskenmerk, vooral van die soorten genomen, welke de *Nauclea orientalis* van Lamarck naderen; daarenboven beschreef hij de Katoe Sjaka van Rheede, onder de geslachtsnamen *Anthocephalus*, naar de plant zelve, en van *Cephalidium*, naar de beschrijving van Poiret. De kenmerken, door de Heeren Blume (‡), Wight en Arnott (\*\*\*) gegeven, bewijzen, dat zij het denkbeeld van Gaertner volgen. Dat van den Heer Endlicher (††) is gewijzigd, ten einde *Uncaria* te kunnen opnemen, en bevat de opgave van *flores bracteolis interstincti*; voor het overige schijnt hetzelfde op de waarnemingen van Gaertner te berusten.

Er zijn dus voornamelijk drie verschillende planten, onder den naam *Nauclea orientalis* beschreven, en van dezelve vier afbeeldingen gegeven. De eene, de Katoe Sjaka van Rheede, welke aan Linnaeus tot voorwerp van beschrijving heeft gestrekt, is door Poiret als *Nauclea citrifolia* beschreven, en door Roxburgh als met *Nauclea cadamba* overeenkomende beschouwd. Zij maakt den grondvorm uit van het geslacht *Cephalidium* en *Anthocephalus*. De andere, door Gaertner als *N. orientalis* aangemerkt, is door Willdenow en Roxburgh onder den naam van *Nauclea parvifolia* beschreven en afgebeeld. De derde plant, welke dien naam draagt, is door Lamarck, eerst onder den naam *Cephalanthus chinensis*, vervolgens onder dien van *Nauclea orientalis* beschreven en door Poiret uitvoerig vermeld. En de afbeelding van Rumphius, welke volgens de beschrijving ééne vrucht heeft en waar dus de vruchtbeginsels zijn zamengegroeid, is van eene plant, welke tot de eerste afdeeling der *Nauelearia* D. C. behoort.

(\*) De fructibus et seminibus. pag. 151. Tab. 30. f. 8.

(†) Genera plantarum. n. 295.

(§) Spec. plant. I. pag. 928.

(x) Systema Vegetabilium. V. pag. XIII.

(‡) Bijdr. t. d. Flora van Neêrl. Ind. pag. 1008.

(\*\*) Prodr. Penins. Ind. pag. 390.

(††) Genera plantarum. n. 3280.

Indien er nu naar het gewone beginsel van naamgeving gehandeld werd, dan zou *Anthocephalus* den naam *Nauclea* moeten dragen. Doch daar dit tot eene te groote verandering en tot verwarring aanleiding zoude geven, stel ik voor, om den geslachtsnaam *Nauclea* aan die planten te laten, welke aan de *Nauclea orientalis* Lamarck, zoo als zij door de Heeren De Candolle en Blume is aangenomen en beschreven, verwant zijn. Hierdoor blijft in het geslacht *Nauclea* het grootste aantal soorten. Want, met het denkbeeld om den geslachtsnaam *Nauclea* voor al de planten, welke sommige schrijvers er onder willen rangschikken, aan te nemen, zal men zich moeilijk vereenigen, zoodra men de planten zelve ziet, alswanneer men, als algemeen kenmerk, alleen de bloeiwijze kan opgeven. Ik geloof derhalve, dat de verdeeling van het geslacht *Nauclea* naar de groeiwijze en het voorkomen, gepaard met eenige kenmerken, die de vrucht leveren, in den tegenwoordigen stand der wetenschap, als wenschelijk kan worden beschouwd. Zij wordt dus door mij voorgesteld, met inachtneming van de reeds bestaande verdeeling, als volgt: met zamengegroeide vruchten, *Anthocephalus* met bijvoeging van *Cephalidium*, *Platanocarpum*, voor de eerste afdeeling van de *Nauclearia*; en met vrije, openspringende vruchten, *Uncaria*, voor de slingerplanten met aan den binnennaad der vrucht vastgehechte placentae en aan den voet vastgehechte zaden; *Nauclea* voor de boomvormige gewassen met hangende placentae en als schildjes vastgehechte zaden, en *Stephegyne*, vroeger *Mitragyne* genoemd, voor boomvormige gewassen met hangende placentae en opgerigte zaden, benevens talrijke, rondom de bloemen staande schutblaadjes.

---

#### PLATANOCARPUM. ENDLICHER.

Genera Plantarum. p. 557; Naucleae sectio D. C. Prodromus IV. p. 343.

**FLORES** supra receptaculum subglobosum concreti. **CALYX** superus, limbo quadri- vel quinque-dentato. **COROLLA** aestivatione subimbricatâ, tubo elongato-infundibuliformi, limbo quadri- quinque-partito. **STAMINA** 4—5 corollae fauci inserta, segmentis corollinis alternantia; **FILAMENTA** brevia; **ANTHERAE** basi affixae, acutae. **OVARIUM** inferum, biloculare, pluriovulatum; **OVULA** placentis linearibus affixa. **STYLUS** cylindricus; **STIGMA** subclaviforme. **FRUCTUS** concreti in massam sphaericam, subcarnosam, calycis rudimentis areolatam, biloculares. **SEMINA** pauca, placentis membranaceis ope carunculae formae variabilis affixa, subrhombea, compressa; **TESTA** in membranam peripteralem expansa; **TEGMEN** membranaceum. **EMBRYO** in medio albuminis carnosi, erectus.

**ARBORES.** **FOLIA** opposita. **STIPULAE** interpetiolares. **FLORES** capitulati, terminales vel axillares.

Dit geslacht zal vermoedelijk later met *Sarcocephalus* Afzelius vereenigd worden. Het behoort in allen gevalle bij de zoogenaamde *Sarcocephaleae*, even als de door Rumphius afgebeelde *Bancalus*.

---

## PLATANOCARPUM SUBDITUM. KHS.

P. ramulis glabris, foliis ellipticis obtusiusculis glabris, stipulis oblongo-ovalibus acutiusculis glabris, pedunculis terminalibus solitariis.

ARBOR 6—8 metrorum, trunco recto, coronâ ovoideâ; RAMI subteretes vel obtuso-quadrangulares, nodis incrassatis compressi, cinerascens; RAMULI obtuse quadrangulares, lateribus sulcatis, glabri. FOLIA dispersa, opposita, elliptica, obtusiuscula, integerrima, saepe undulata, utrinque glabra, subtus in nervorum axillis subbarbata, 0,12 longa, 0,05 lata, nervis primariis erectis, prominentibus, nervis secundariis subparallelis, flexuosis, vix conspicuis, saepe exsculptis; PETIOLI semiteretes, supra sulcati, glabri, 0,006 longi. STIPULAE oblongo-ovales, acutiusculae, glabrae. FLORES in capitulo hemisphaerico connati, terminales vel axillares, odorati; PEDUNCULUS COMMUNIS obtuse quadrangularis, pubescens; BRACTEAE oblongo-ovatae, carinatae, acutae. CALYCIS tubo quadrangulâri, brevi, quadridentato: dentibus acutis. COROLLA aestivatione imbricatâ, elongato-infundibuliformis, limbo quadri- ad quinquepartito: partibus obtusis, glabra, flavescens. STAMINA 4—5, fauci corollae inserta, segmentis corollinis alternantia; FILAMENTA brevissima; ANTHERAE basi affixae, ovatae, acutae, biloculares. OVARIVM coalitione cum apposis deformis, biloculare; OVULA 10—20, placentis linearibus dissepimento connatis affixa. STYLUS teres, glaber; STIGMA conicum, acutum, vel parte inferiore cylindricum, parte superiore conicum. FRUCTUS compositus coalitione singulorum ovariorum, sphaericus, areolatus et tuberculatus: areolis et tuberculis sulcatis. SEMINA 6—12, placentis membranaceis prominentibus affixa, adscendentia, subrhombica; TESTA in alam periphaericam expansa, cellulosa; TEGMEN tenue. NUCLEUS ovoideus. ALBUMEN carnosum, albidum, periphaericum. EMBRYO erectus.

*Crescit in fruticetis: JAVA, SUMATRA, BORNEO.*

Tab. 32. Figura speciei. 1. Flos completus cum duobus ovariiis. 2. Corollae pars. 3. Stamen. 4. Stamen cum quatuor antherarum loculis. 5. Ovarium longitudinaliter dissectum. 6. Fructus longitudinaliter sectus. 7 et 8. Semina. 9. Semen longitudinaliter sectum.

## ANTHOCEPHALUS. RICHARD.

Nauclea Linn. Richard. Mémoires de la société d'Histoire naturelle, Tom. V. pag. 235; Naucleae species Roxburgh, De Candolle, Blume.

FLORES supra receptaculum subglobosum congregati, sessiles. CALYX superus, tubo infundibiliformi, limbo quinquepartito: segmentis acutis vel acuminatis, corpusculis claviformibus terminatis. COROLLA aestivatione imbricatâ, tubo elongato-infundibiliformi, limbo quinquepartito. STAMINA 5, segmentis corollae alternantia; FILAMENTA versus faucem corollae inserta, brevissima; ANTHERAE basi affixae, apiculatae. OVARIVM apice quadri-, basi bi-loculare, loculis multiovulatis; OVULA in placentis ab apice ad medium usque bipartitis affixa. STYLUS teres; STIGMA bipartitum: segmentis approximatis. FRUCTUS subcarnosus, calyce carnosus coronatus, indehiscens, parte superiore tetrapyrenâ, parte inferiore biloculâri et subcarnosâ,

pleiosporus. SEMINA deformatia; TESTA membranacea, foveolata, in marginem peripteralem expansa; TEGMEN membranaceum. ALBUMEN carnosum. EMBRYO erectus in medio albuminis.

ARBORES. FOLIA opposita, petiolata, costata. STIPULAE interpetiolares. FLORES in capitulis terminalibus vel axillaribus congregati.

De bloemen blijven ook later, bij de rijpwording der vruchten, van elkander afgezonderd. Zij verliezen niet zelden de knodsvormige aanhangsels van de slippen des kelks, die vóór de opening der bloemen min of meer zamengekleefd zijn. Het vruchtbeginsel bestaat eigenlijk uit twee hokken, die in het bovenste gedeelte weder in twee hokjes zijn verdeeld. De vrucht heeft hetzelfde zamenstel, doeh, door de verharding van het endocarpium, in het bovenste gedeelte vier driehoekige nootjes. De plaecenta is in het benedenste onverdeeld en splijt aan het begin van de holte der nootjes in twee takken, welke binnen deze nootjes de zaadjes dragen.

Bij dit geslacht behoort de *Nauclea eadamba* Roxb. (*N. citrifolia* Poiret) en dus ook het geslacht *Cephalidium* Richard.

#### ANTHOCEPHALUS MORINDAEFOLIUS. KHS.

A. ramulis glabris, foliis ovatis breviter acuminatis basi subcordatis glabris, pedunculis terminalibus solitariis, receptaculo glabro, claviculis calycis oblongis obtusis.

ARBOR saepe 20 metrorum, speciosa; TRUNCUS rectus, cylindricus, cortice fusco, admodum adstringente; CORONA hemisphaerica, dense foliata; RAMI patentes, subteretes, glabri, laete fusci; RAMULI obtuse quadrangulares, sulcati, glabriuseuli. FOLIA decussata, ovata vel oblongo-ovata, breviter acuminata, basi obtusa vel subcordata, margine undulata, utrinque glabra, 0,14 longa, 0,08 lata, nervis primariis patentibus subparallelis utrinque prominentibus, nervis secundariis curvatis parallelis approximatis; PETIOLI semiteretes, supra plani, sulcati, glabriuseuli, 0,02 longi; STIPULAE deciduae. FLORES in capitulo globoso terminali solitarii dense congregati, in receptaculo subsphaerico areolato glabro sessiles; PEDUNCULUS COMMUNIS subteres, glaber. CALYX superus, aestivatione valvatâ; TUBUS infundibuliformis, quinqsulfatus, intus pubescens, extus glaber; LIMBUS quinquepartitus, segmentis inaequalibus: quaedam lanceolata acuminata, caetera lanceolato-lineararia, apice oblongo-claviformia, erectus, hirsutus. COROLLA aestivatione subimbricatâ, extus glabra, intus pubescens 0,001 longa; TUBUS elongato-infundibiliformis, saepe obtuse quinquangularis; LIMBUS quinquepartitus, segmentis oblongis obtusiusculis. STAMINA 5, segmentis corollae alternantia; FILAMENTA infra faucem affixa, brevia, glabra; ANTHERAE basi affixae, lineares, mucronulatae, basi obtusae, biloculares, loculis basi disjunctis. OVARIUM inferum, obconicum, quinquecostatum, glabrum, biloculare, pluriovulatum; OVULA plaecentis cum dissepimento connatis affixa. STYLUS teres, glaber; STIGMA obtuse oblongo-claviforme. FRUCTUS oblongus, compressus, calyce incrassato pentagono quinquedentato hirsuto coronatus, glaber, subcarnosus, parte inferiore bilocularis endocarpio membranaceo, parte superiore quadriloeularis endocarpio

osseo; vel bilocularis, loeulis in parte superiore bipartitis. SEMINA numerosa, affixa placentis duabus basi simplicibus, supra basin bipartitis, polymorpha: angulata vel subrotunda serobiculata; TESTA subcrustacea; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS ovoideus, embryone erecto, dicotyledoneo.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Explicatio Tabulae 48. Figura speciei. 1. Flos. 2. Corollae pars explicatae. 3. Ovarium longitudinaliter sectum. 4. Ovarii sectio: pars infera. 5. Ovarii sectio: pars supera. 6. Fructus. 7. Fructus longitudinaliter sectus, parte superâ integrâ. 8. Fructus longitudinaliter sectus, parte superâ dissectâ. 9. Semina cum parte placentae et funiculis umbilicalibus. 10. Testa. 11. Semen, parte testae ablatâ. 12. Semen, testâ ablatâ. 13. Nucleus. 14. Semen, in longitudine dissectum.

Behalve de bovenbeschrevene voorwerpen bezitten wij nog andere, welke van jonge boomen, die langs de Doeson-rivier op Borneo groeiden, zijn geplukt. Aan dezen zijn de bladen langwerpig eirond, min of meer bchaard, voor het overige door andere kenteekenen niet te onderscheiden.

De *Anthocephalus morindacfolius* behoort tot de gewassen, welke het lagere gedeelte van de beoosten Padang gelegene bergketen bedekken. Zelden is hij daar boven eene hoogte van tweeduizend voet waargenomen, zijnde hij meestal tusschen de 1000 en 1500 voet beperkt. In deze streek staat hij ten naastenbij in talrijkheid gelijk met de eiken. Zijn stam rijst bijna loodregt naar boven en draagt half-ronde, tamelijk uitgebreide kroonen, die haar loof aan dat der eiken aansluiten. Hetzelve is echter door den meer opeengehoopten stand der bladen en door den glans, welke deze kenmerkt, wel te onderscheiden. Buitendien doen de bloemhoofdjes, meestal aan het einde der takken gezeten, de in den bloeitijd bij elkander groeiende kroonen, reeds in de verte erkennen. Met deze bloemhoofdjes is de kroon, in het begin van het drooge jaargetijde, als bezaaid, en zij komen als geel-witte kogels, overal tusschen het glanzig groene loof te voorschijn.

Aan dezelfde boomen zijn door ons ook nog, behalve de bloemen, enkele vruchten, ronde en een weinig vleezige bollen, uit eene menigte dicht bij elkander staande vruchtjes gevormd, waargenomen. Daar deze echter slechts in gering getal aanwezig waren, schijnt de boom voortdurend te bloeijen, doch ook tevens een tijdperk te hebben, welk men meer bepaald zijnen bloeitijd kan noemen. De bloemen, dikwerf tot hoofdjes van zes Nederlandsche duimen middellijn vereenigd, verraden de nabijheid der bloeijende boomen, door haren onaangenaam doordringenden reuk, aan rottende dierlijke zelfstandigheden herinnerende en zich door aanraking aan de handen mededeelende, vermoedelijk omdat aan dezelve stuifmeel blijft kleven. — Het hout der boomen is weck, fijndradig, gemakkelijk te bewerken; doch niet bestand tegen den invloed van vochtigheid en lueht. — De bewoners van de Doeson-rivier noemen dezen boom *Kilädën*.

## NAUCLEA. LAMARCK ET AUCTORUM NEC LINNAEI.

Lamarck. Illustrations des Genres, Tab. 153.

FLORES supra receptaculum subglobosum aggregati, sessiles. CALYX superus, tubo brevi, limbo quinquepartito: segmentis saepe appendiculis claviformibus terminatis. COROLLA aestivatione imbricatâ, tubo elongato-infundibuliformi, limbo quinquepartito. STAMINA 5, infra vel versus faucem corollae inserta; FILAMENTA brevissima; ANTHERAE basi affixae, muticae. OVARIUM biloculare, pluriovulatum; OVULA placentis semicylindricis affixa. STYLUS cylindricus; STIGMA clavatum. CAPSULAE distinctae, dicoccae, loculicidae et septicidae. SEMINA adscendentia, linearia; TESTA utrinque in alam expansa; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in albumine carnosissimo, erectus.

ARBORES vel ARBUSCULAE. FOLIA petiolata, opposita. STIPULAE interpetiolares. FLORES capitulati, terminales vel axillares.

Het geslacht Nauclea, zoo als het hier wordt voorgesteld, heeft tot grondsoort de Nauclea orientalis Lamarck, Blume, enzv., en bevat verscheidene soorten van de tweede afdeeling der Nauclearia en der afdeeling Pentacoryne De Candolle. Deszelfs gewassen zijn boomaardig, soms van eene aanzienlijke hoogte. Hunne bladen staan tegenover elkander, zijn dikwerf glanzig en eenigzins lederachtig. Vóór de ontwikkeling liggen zij tegen elkander in de nevenblaadjes besloten. De nevenblaadjes zitten tusschen de bladstelen. Zij zijn met de randen, tot op ongeveer twee derden van de lengte, soms zelfs hooger, zamengegroeid, en de bovenste rand is door eene harsachtige zelfstandigheid aan elkander gekleefd. Uit de scheede, welke zij vormen, groeijen drie of, bij eene minder regelmatige ontwikkeling, een of twee bladdragende takjes of bloemhoofdjes. De laatste zijn door een, uit zamengegroeide schutblaadjes gevormd bekleedsel bedekt, hetwelk later in vier tot zes deelen gespleten wordt. Zij zijn bijna kogelrond en in den jeugdigen staat door kleine sterretjes bedekt. Deze sterretjes bestaan uit de knodsvormige aanhangsels der kelkklippen, welke alsdan zijn zamengekleefd en de bloemkroonen als huifjes bedekken. Bij eene verdere uitgroeiing vallen deze knodsjes, naarmate de bloemen meer of min dicht bij elkander staan, in grooter of geringer getal van de kelkklippen af, zoodat aan de ontwikkelde bloemen soms vijf, maar ook niet zelden slechts één knodsje wordt waargenomen. Op de vruchten blijven zij zelden aanwezig. Deze hebben eenen omgekeerden piramidenvorm, een zeer dun buitenbkleedsel en een kraakbeenig endocarpium. Zij bestaan uit twee kraakbeenige nootjes, welke aan de binnenzijde vlak zijn, en daar, in eene voor, het middelstandertje opnemen. De nootjes splijten door een' naad tegen het standertje en door eenen anderen tegenover hetzelfde, in twee klepjes. Aan den top van het standertje zijn de beide placentae vastgehecht, welke vrij in de hokjes hangen. Op haar zitten de zaden als schildjes. Hunne buitenhuid is in kleine, lijnvormige plaatjes uitgegroeid en bestaat in dit uitgegroeid gedeelte uit kleine, inwendig gestipte buizen. Zij is aan het eene cinde, dat tegenover den wortel ligt, open. De binnenhuid is vliezig; slechts bij eene sterke vergrooting neemt men waar, dat zij celaar dig is.

Nauclea verschilt van Platanocarpum door de niet zamengegroeide vruchten; van Anthocephalus, door de kapselaardige vruchten; van Stephegyne, door den verdeelden boord van den kelk, door de



schutblaadjes, welke de bloempjes omringen, en andere kenmerken meer; van *Uncaria*, door de groeiwijze, de ongesteelde vruchtjes en het gemis van het middelstandertje. Het geslacht is verwant aan *Adina* Salisbury, aan *Breonia* Richard, en aan *Cephalanthus* Linnaeus.

### I. NAUCLEA STRIGOSA. KHS.

*N. ramulis hirsutis, foliis oblongis utrinque glabris, stipulis oblongo-ovalibus obtusis glabrescentibus, pedunculis terminalibus solitariis, receptaculo glabro, claviculis calycis tetraëdris.*

**ARBUSCULA** 3—6 metrorum; **TRUNCUS** brevis, subteres, cortice laete fusco; **CORONA** irregulari-hemisphaerica, foliosa; **RAMI** diffusi, subteretes, annulati, fusco-cinerei, glabri; **RAMULI** subteretes vel compressiusculi, hirsuti. **FOLIA** decussata, oblonga, breviter acuminata, basi angustata, integerrima vel suberenulata, utrinque glabra, — juniora utrinque praesertim subtus hirsuta, — 0,1 longa, 0,055 lata, nervis primariis prominentibus, erectis, glabrescentibus, nervis secundariis subparallelis, distantibus, flexuosis; **PETIOLI** semiteretes, inferne rotundati, glabrescentes, 0,015 longi. **STIPULAE** intrapetiolares, adpressae, oblongo-ovales, obtusiusculae, supra glabrae, subtus hirsutae, glabrescentes, 0,012 longae, 0,006 latae. **FLORES** in capitulo subgloboso congregati, in receptaculo subgloboso glabro sessiles; **PEDUNCULUS COMMUNIS** obtuse quadrangularis, glaber. **CALYX** profunde quinquepartitus, segmentis lanceolatis, acuminatis vel angustatis in appendices lineares apice corpuscula tetraëdria inaequilatera gerentes, glaber. **COROLLA** aestivatione valvatâ, clavata, glabra, 1,012 longa, tubo subpentagono; **LIMBUS** quinquepartitus, erectus, segmentis obovatis, obtusiusculis, incrassatis. **STAMINA** 5, cum segmentis corollae alternantia, infra faucem inserta; **FILAMENTA** brevissima; **ANTHERAE** basi affixae, lineares, mucronulatae, basi subcordatae et bimucronulatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. **OVARIUM** inferum, obconicum, glabrum, biloculare, loculis pluriovulatis; **OVULA** in placentis productis affixa. **STYLUS** teres, sursum crassior, glaber; **STIGMA** clavatum, acutiusculum.

*Crescit in montibus Pamatton et Sakoembang: BORNEO.*

### II. NAUCLEA PURPURASCENS. KHS.

*N. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis obtuse acuminatis glabris, stipulis oblongis obtusis glabriusculis, pedunculis terminalibus solitariis vel ternis, receptaculo hirsuto, claviculis calycis tetraëdris.*

**ARBUSCULA**; **RAMI** diffusi, subteretes, rimosi, fuliginosi, glabri; **RAMULI** compressiusculi, nodis dilatatis, glabri. **FOLIA** decussata, lanceolato-elliptica, obtuse acuminata, integerrima, utrinque glabra, coriacea, 0,12 longa, 0,05 lata, nervis primariis erectis, prominentibus, nervis secundariis distantibus, curvatis vel flexuosis; **PETIOLI** semiteretes, glabri, 0,015 longi. **STIPULAE** interpetiolares, oblongae, obtusae, glabriusculae, 0,02 longae, 0,005 latae. **FLORES** in capitulo ovoïdeo-rotundato congregati, in receptaculo subgloboso, areolato, hirsuto sessiles; **PEDUNCULUS COMMUNIS** obtuse quadrangularis, glaber. **CALYX** aestivatione valvatâ, dense hirsutus; **TUBUS** subinfundibuliformis, intus hirsutus; **LIMBUS** quinque-

partitus: segmentis lanceolatis, angustatis, sursum incrassatis, terminatis corpusculis tetraëdris. *COROLLA* aestivatione valvatâ, elongato-infundibuliformis, glabra, 0,012 longa; *LIMBUS* erectus, quinquepartitus, segmentis obtusis. *STAMINA* 5, cum segmentis corollae alternantia, infra faucem inserta; *FILAMENTA* brevia, filiformia; *ANTHERAE* basi affixae, oblongo-lineares, membranulâ obtusâ terminatae, basi obtusae, biloculares, loculis apice disjunctis. *OVARIUM* inferum, obconicum, hirsutum, biloculare, multiovulatum; *OVULA* placentis lamelliformibus affixa. *STYLUS* teres, glaber; *STIGMA* conicum, acutum.

*Crescit in sylvis montanis: JAVA et SUMATRA.*

### III. NAUCLEA SYNKORYNES. KHS.

N. ramulis glabris, foliis ellipticis vel ovalibus glabris, stipulis obovato-oblongis obtusis glabris, pedunculis terminalibus solitariis vel ternis, receptaculo pubescente, elavieulis calycis tetraëdris.

*ARBUSCULA*; *RAMI* erecti, teretes, glabri, fusco-cinerei; *RAMULI* compressi, bisulcati, nodis dilatati, glabri. *FOLIA* decussata, elliptica, raro ovalia vel obovata, acutiuscula, utrinque glabra, integerrima, margine subrecurva, 0,15 longa, 0,08 lata, coriacea, nervis primariis erectis, parallelis, prominentibus, nervis secundariis rectis vel subcurvatis; *PETIOLI* semiteretes, supra sulcati, glabri, 0,026 longi. *STIPULAE* interpetiolares, obovato-oblongae, obtusae, glabrae, 0,014 longae, 0,005 latae. *FLORES* in capitulis globosis, solitariis ternisve, terminalibus conferti, in receptaculo sphaerico pubescente sessiles; *PEDUNCULUS COMMUNIS* obtuse quadrangularis, pubescens. *CALYX* hirsutus; *TUBUS* brevis; *LIMBUS* erectus, quinquepartitus: segmentis linearibus apice incrassatis in corpuscula tetraëdra cucullata terminatae. *COROLLA* elongato-infundibuliformis, glabra, limbo erecto, segmentis ovatis obtusiusculis, 0,01 longa. *STAMINA* 5, cum segmentis corollae alternantia, infra faucem inserta; *FILAMENTA* filiformia, brevia; *ANTHERAE* basi affixae, oblongo-ovatae, appendice truncato terminatae, basi cordatae, biloculares. *OVARIUM* obconicum, glabrum, biloculare, pluriovulatum. *STYLUS* teres. — *CAPSULA* quinquangulâ-pyramidalis, calyce quinquedentato hirsuto coronata, glabra, septicida et loelicida, bilocularis, crustacea. *PLACENTAE* compresse fusiformes. *SEMINA* plurima, imbricata, oblonga vel ovata, minuta; *TESTA* in alam periphaericam producta, cellulosa; *TEGMEN* membranaeum. *NUCLEUS* oblongus.

*Crescit ad ripas fluminis Doesson: BORNEO.*

### IV. NAUCLEA OBTUSA. BL.

N. ramulis glabris, foliis rotundato-ellipticis obtusiusculis glabris, stipulis obovato-oblongis obtusis glabris, pedunculis terminalibus solitariis binis vel ternis, receptaculo pubescente, segmentis calycis tetraëdris.

*ARBOR*; *RAMI* erecti, teretes, cinerascens; *RAMULI* compressi, glabriusculi, saepe terni. *FOLIA* decussata, rotundato-elliptica, obtusiuscula, basi angustata, utrinque glabra, nervis primariis erectis, prominentibus, nervis secundariis curvatis vix conspicuis, 0,18 longa, 0,11 lata; *PETIOLI* semiteretes, glabri, 0,04 longi. *STIPULAE* interpetiolares, obovato-oblongae, obtusae, glabrae, 0,015 latae, 0,03 longae. *FLORES* in capitulis globosis solitariis vel ternis congregati, in receptaculo subgloboso pubescente

sessiles; PEDUNCULUS COMMUNIS obtuse quadrangularis, glabriusculus. CALYX aestivatione valvatâ, hirsutus; TUBUS brevis, infundibuliformis; LIMBUS erectus, quinquepartitus, segmentis inaequalibus: duo ad quatuor lanceolata acuta, caetera lanceolata et angustata in appendices lineares corpusculis pyramidalibus basi excavatis terminata. COROLLA aestivatione subvalvatâ, elongato-infundibuliformis, glabra, 0,009 longa; LIMBUS erectus, quinquepartitus, segmentis subrotundatis acutiusculis. STAMINA 5, cum segmentis corollae alternantia; FILAMENTA in medio tubi corollae affixa, brevia, glabra; ANTHERAE basi affixae, late ovaes, mucronulo brevi obtuso apiculatae, basi subcordatae, biloculares, loculis basi disjunctis apiceque conjunctis. OVARIUM inferum, obconicum, pubescens, biloculare, pluriovulatum; OVULA in placentis membranaceis imbricata. STYLUS cylindricus, glaber; STIGMA sphaericum. CAPSULA obverse quinquangulato-pyramidalis, quinesulcata, calyce incrassato dense hirsuto coronata, pubescens, loculicide-dehiscens, bilocularis, papyracea. PLACENTAE affixae columellae filiformi apice incrassatae, lanceolatae, apice crassiores. SEMINA placentas omnino tegentia, oblonga, utrinque acuta vel vertice acuta et basi obtusa; TESTA utrinque in membranam expansa; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS compressus ovoideus, albumine periphaerico, embryone dicotyledoneo.

*Crescit in sylvis montanis: JAVA.*

#### V. NAUCLEA LANCEOLATA. BLUME.

N. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis obtuse acuminatis glabris, stipulis late obovatis obtusis glabris, pedunculis solitariis, receptaculo pubescente.

ARBUSCULA; RAMI erecti, cinereo-fusci, verruculosi, verruculis oblongis, glabri; RAMULI subcompressi, glabri. FOLIA subdecussata, lanceolato-elliptica, obtuse acuminata, utrinque glabra, in nervorum axillis pubescentia, 0,07 longa, 0,025 lata, nervis primariis paucis 7—9 erectis prominentibus, nervis secundariis subreticulatis; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,005 longi. STIPULAE interpetiolares, late obovatae, obtusae, glabrae, 0,007 longae, 0,005 latae. FLORES in capitulo sphaerico terminali congregati, in receptaculo subgloboso pubescente inserti; PEDUNCULUS COMMUNIS obtuse quadrangularis, glaber. CALYX hirsutus; TUBUS brevissimus; LIMBUS quinquepartitus, segmentis inaequalibus: quaedam lanceolata acuta, caetera lanceolata et in fila angustata claviculis subrotundis sub excavatis terminata. COROLLA aestivatione subimbricatâ, infundibuliformis, intus glabra, extus hirsuta, 0,008 longa; LIMBUS erectus, quinquepartitus: segmentis ovalibus, obtusis. STAMINA 5, infra faucem inserta, segmentis corollae alternantia; FILAMENTA glabra, brevia; ANTHERAE basi affixae, ovaes, obtusae, basi subcordatae, biloculares. OVARIUM obconicum, hirsutum, breve, biloculare, pluriovulatum. STYLUS teres, glaber; STIGMA hemisphaericum, basi conicum. CAPSULA pyramidiformis, calyce incrassato pubescente coronata, glabriuscula, bilocularis, loculicide dehiscens, quadrivalvis, papyracea. PLACENTAE duae, affixae columellae lineari ancipiti, tetraëdrae. SEMINA 6—10, imbricata, ovata; TESTA cellulosa, in alam periphaericam vertice et basi magis elongatam expansa; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS compressus sphaericus, albumine carnosio periphaerico, embryone dicotyledoneo.

*Crescit in montanis: JAVA et SUMATRA.*

De voorwerpen van Java en Sumatra, op ongeveer 500 tot 600 Ned. ellen hoogte verzameld, zijn niet van elkander te onderscheiden. Enkelen van het eerstgenoemde eiland verschillen van de anderen, door den meer langwerpigen vorm der bladen en der nevenblaadjes, terwijl zij in de overige kenteekenen overeenkomen. Deze soort heeft de kleinste vruchten, welke naauwelijks 4 strepen lang zijn, en ook het geringste getal zaden. Daarentegen is bij haar de kern der zaden, in vergelijking tot de vliezige uitbreiding van de buitenste zaadhuid, zeer ontwikkeld, zoodat zij ongeveer de helft der geheele grootte van het zaad bedraagt, terwijl bij andere soorten de kern een vierde, of minder nog, der lengte van het zaad inncent.

---

### STEPHEGYNE. KHS.

Mitragyne Khs. Naucleae species Gaertner, Roxburgh, Wallich, De Candolle.

FLORES supra receptaculum subglobosum commune aggregati, sessiles, bracteis cincti. CALYX superus, tubo brevi, limbo integerrimo vel obsolete denticulato. COROLLA aestivatione valvatâ, tubo infundibuliformi, limbo quinquefido, erecto. STAMINA 5, fauci corollae inserta; FILAMENTA brevissima; ANTHERAE basi affixae, apiculatae. OVARIIUM biloculare, multiovulatum; OVULA adscendentia, in placentis pendulis affixa. STYLUS teres; STIGMA mitraeforme. CAPSULA dicocca, coccis crustaceis bipartilibus. SEMINA in placentis oblongis ab columellae apice pendulis affixa; TESTA in marginem membranaceam expansa; TEGMEN membranaceum. ALBUMEN carnosum. EMBRYO in medio albuminis.

ARBORES. FOLIA petiolata, costata. STIPULAE interpetiolares. FLORES capitati, bracteolati, terminales vel axillares.

---

#### I. STEPHEGYNE SPECIOSA. KHS.

S. foliis ellipticis glabris vel glabriusculis, stipulis oblongis acutis.

Mitragyne speciosa Khs.

ARBOR speciosa, saepe 15 metrorum; TRUNCUS rectus, subcylindricus, cortice subfusco, ligni fibris tenuibus; CORONA hemisphaerica vel conica, in ambitu foliata, laete viridis; RAMI oppositi vel subverticillati, patentes, — superiores erecti, — obtuse quadrangulares, duobus lateribus oppositis sulcatis, cinerascens; RAMULI compresse quadrangulares, quadrisulcati, glabri. FOLIA versus apices ramorum decussatim disposita, opposita, elliptica vel ovata, acuminata, basi obtusa aut subcordata, utrinque glabra, juniora subtus pubescentia, subtus in nervorum axillis barbata, integerrima, 0,065 lata, 0,14 longa, nervis primariis in pagina inferiore costatim productis, inferioribus saepe subhorizontalibus et superioribus erectis, nervis secundariis subparallelis; PETIOLI semiteretes, supra plani saepe leviter sulcati, glabri, 0,03 longi; STIPULAE oblongae, acutae, subglabrae. FLORES in capitulis terminalibus solitariis vel ternis congregati, sessiles in receptaculo hemisphaerico piloso, bracteis pluribus verticillatis spatulatis mucronulatis glabris cincti. ALABASTRUM ellipsoideum. CALYX superus; TUBUS

brevis, integerrimus. **COROLLA** aestivatione valvatâ, extus glabra; **TUBUS** infundibuliformis, cylindricus vel subpentagonus, intus praesertim ad faucem hirsutus; **LIMBUS** glaber, 4—5 partitus: segmentis oblongis, acutis, apicem versus subcarnosis. **STAMINA** 4—5, in fauce corollae segmentis alternantia; **FILAMENTA** linearia, brevia; **ANTHERAE** paulo supra basin affixae, oblongae, apice connectivo producto mucronulatae, basi obtusae, biloculares, loculis parallelis approximatis, longitudinaliter dehiscentes. **POLLEN** sphaericum, leviter madefactum unimammillatum. **DISCUS** subpelviformis, saepe pentagonus. **OVARIUM** obconicum, pentagonum, glabrum, biloculare, loculis multiovulatis; **OVULA** adscendentia, placentis subcylindricis descendentes affixa. **STYLUS** teres, utrinque attenuatus, glaber; **STIGMA** mitraeforme, cavum, apice apertum. **CAPSULA** sessilis, obovoïdea, saepe elongato-cordiformis, costata, calyce persistente coronata, nigrescens, glabra, septicida, dicocca: coccis endocarpio crustaceo, columellae affixis, extus rotundatis, intus planis et ibidem ab apice inde dehiscentibus. **SEMINA** numerosa, placentis semiteretibus basi cum appendiculo hastato munitis affixa, adscendentia, imbricata, elongato-obovata, obtusa, ambitu membranacea. **NUCLEUS** in medio seminis, ovoïdeus.

*Crescit ad ripas fluminis Doesson, etc. BORNEO.*

Tab. 35. Figura speciei. 1. Flos. 2. Corollae pars. 3. Ovarium longitudinaliter sectum. 4 et 5. Capsulae. 6. Coccae, capsulâ ab epicarpio denudatâ. 7. Cocca cum columella intus visa. 8. Coccae dimidia pars cum columella. 9. Placenta cum seminibus. 10. Placenta, seminibus ablatis. 11. Semen valde auctum. 12. Nucleus verticaliter sectus.

De voorwerpen van Banjermassing en van Mantalet, beiden moerassige streken, verschillen van die, welke te Martapoera, op droogen grond verzameld zijn, in de grootte der bloemen. Dit verschil is echter niet zeer opmerkelijk.

## II. STEPHEGYNE PARVIFOLIA. KHS.

S. foliis ovatis vel obovalibus obtusis subtus pubescentibus, stipulis obovatis obtusis.

*Nauclea parvifolia* Willd. Spec. Plant. I. pag. 929; Roxburgh. Plants of Corom. I. pag. 40. Tab. 52; Roxb. Flora Indica I. pag. 513; De Candolle. Prodr. IV. pag. 344; Wight et Arnott. Prodr. penins. Indiae I. pag. 391; *Nauclea orientalis* Gaertner de Fruct. et Seminibus I. Tab. 30.

*Colligitur in sylvis humilioribus provinciae Krawang: JAVA.*

Een bloeiende tak dezer plant is door Roxburgh, en de vruchten, benevens de zaden en derzelve samenstelling, zijn door Gaertner afgebeeld. Dit een en ander, gevoegd bij de uitvoerige beschrijvingen, door deze Kruidkundigen gegeven, maakt de verdere opgave der kenteekenen overbodig.

Deze boomen groeijen in de lagere, moerassige streken van de Residentie Krawang. Zij bloeijen tegen het einde van den regentijd. Hun hout is zeer fijn van draad, zacht en gemakkelijk te bewerken; doch niet bestand zijnde tegen de vochtigheid der lucht, wordt hetzelfde alleen voor doosjes en dergelijke huishoudelijke voorwerpen gebezigd.

## UNCARIA. SCHREBER.

Schreber. Genera n. 311; Wallich et Roxburgh. Flora Indica. 2<sup>a</sup> ed. II. p. 125; De Candolle. Prodromus IV. p. 347.

FLORES supra receptaculum subglobosum commune, pedicellati, raro sessiles. CALYX superus, tubo brevi, limbo quinquedentato vel partito. COROLLA aestivatione imbricatâ, tubo infundibuliformi, limbo quinquepartito. STAMINA 5, fauci corollae inserta; FILAMENTA brevissima; ANTHERAЕ basi affixae, basi biappendiculatae. OVARIVM biloculare, pluriovulatum; OVULA in placentis semiteretibus in medio partis planae loculi affixis inserta, adscendentia. STYLUS teres; STIGMA clavatum. CAPSULA stipitata vel sessilis, dicocca, coccis bipartilibus. SEMINA numerosa, raro definita, placentis semiteretibus utrinque attenuatis affixa; TESTA basi in membranam bifidam, apice in membranam integram expansa; TEGMEN membranaceum. EMBRYO in medio albuminis carnosissimi, erectus.

FRUTICES scandentes. FOLIA opposita. STIPULAE interpetiolares, saepe bifidae. FLORES capitati, axillares; PEDUNCULI steriles uncinati.

De gewassen van het geslacht *Uncaria* zijn allen slingerende struiken. Hunne stammen hebben dikwerf 0,15 N. E. omtrek, bestaan uit eene dikke, gespleten, kurkachtige schors, een zeer los hout en rond of hoekig merg. De vierkantige vorm is aan den stam minder duidelijk, dan aan de takken. Die vorm vertoont zich bij de takken dikwerf met zeer scherpe hoeken, en gaat bij de jongere takken in een langwerpige vierkant over, zijnde zij naar hunne einden platgedrukt, met scherpe hoeken. De knoppen zijn zamengedrukt, bestaan uit twee tegenover elkander staande nevenblaadjes, welke zelden met de randen zijn zamengegroeid, doch meestal bij den toenemenden groei der in hen beslotene blaadjes, in twee deelen splijten en vervolgens afvallen. De bladen staan juist tegenover elkander. Bij eenige soorten: *Uncaria Hallii*, enzv. zijn zij vrij groot, dik, lederachtig en, vooral wanneer deze planten op opene, zonnige plaatsen groeijen, zeer glanzig; bij anderen zijn zij van eene dunnere zelfstandigheid: *Uncaria ferrea*, enzv. Deze laatsten hebben de nerven netsgewijze verdeeld en verbonden; de eersten hebben ze evenwijdig, soms als ribben blootliggende. De bladstelen zijn meest half rond, van boven gevoerd. Uit hunne oksels komen de bloemdeelen, welke meestal alleen, zelden gepaard of in grooter getal aanwezig zijn. Aan de jongere planten groeijen de bloemstelen reeds uit; doch zij worden dan slechts haken, waardoor de plant, bij hare verlenging, aan nevenstaande gewassen steun vindt. De oudere planten hebben gewoonlijk den eenen bloemsteel bloemdragend en den tegenoverstaanden in de gedaante van een' gebogen haak; soms zijn de beide bloemstelen bloemdragend, en dit meest aan de uiteinden der planten of wanneer deze langs den bodem slingeren.

Op eenen ongelijken afstand van het begin en van het einde dragen de bloemstelen een vier- of zesdeelig omhulsel, dat in den jeugdigen staat geheel is zamengegroeid en de bloemen omvat. De meeste soorten hebben dit omhulsel zeer klein en lederachtig; anderen vliezig en aanzienlijk uitgegroeid: *U. ferrea*, *U. glabrata*. De bloemstelen eindigen in een' min of meer regelmatig ronden knop. Op hen zitten de bloemen meestal aan kleine steeltjes, welke zeer zelden twee bloempjes dragen, zelden zonder steeltjes. Zij bestaan uit eenen boven het vruchtbeginsel zittenden kelk. Bij eenige soorten heeft deze eene trech-

tervormige buis en den zoom in vijf tanden verdeeld: *U. Hallii*, enzv.; bij anderen is die buis zeer klein en de zoom in vijf deelen verdeeld: *U. canescens*, enzv.; en bij nog anderen bestaat de kelk alleen uit vijf deelen: *U. ferrea*, enzv. De slippen van den kelk staan meestal klepvormig. De bloemkroon is min of meer regelmatig trechtervormig. Zij heeft den zoom in vijf deelen verdeeld, en deze vóór de opening als dakpannen geplaatst. Naar de opening, tegenover de insneden, draagt zij de meeldraden, welke uit zeer korte helmraden en aan den voet vastgehechte helmknopjes bestaan. De laatsten zijn langwerpig ovaal, hebben de stuifmeelhokjes beneden in kleine puntjes uitlopende, en den helmknoop toegespitst of puntig. In de tweehokkige vruchtbeginsels zijn de placentae, in het midden van den tus-schenwand, aan een uitstekend randje bevestigd en door de eitjes bedekt. De vruchten hebben eenen verlengden eivorm, tien ribben, en zijn van den terugblijvenden kelk voorzien. Zij zijn zamengesteld uit een lederachtig sarcocarpium en mesocarpium, en uit een kraakbeenig endocarpium, en verdeeld in twee hokjes, welke door het laatste worden gevormd. Zij scheiden, door de scheuring van den tus-schenwand, in twee deelen, zonder standertje na te laten. Ieder dezer deelen springt aan de binnenzijde, in den naad, tegenover de placentae, en aan de buitenzijde, tot op het midden, soms niet zoo diep, soms dieper, open. De placentae zijn na de opening der vruchten geheel vrij. Haar vorm is half rol-rond, aan de einden min of meer toegespitst, en aan de binnenzijde van twee kleine voren voorzien. Op dezelve zijn de zaden aan het benedeneinde vastgehecht. Bij de meeste soorten hebben zij het naar boven gerigte gedeelte onverdeeld en het andere in tweeën gespleten. Deze uitgegroeide gedeelten worden door de testa gevormd, en geven aan het wezentlijk gedeelte van het zaad, waar de eivormige kern ligt, eene lijnvormige gedaante. Het uitgegroeide gedeelte van de testa bestaat uit lange buizen; het andere, dat de kern omringt, uit hoekige cellen. Het tegmen is zeer fijn en, alleen bij eene sterke vergrooting, als een celachtig weefsel erkenbaar.

In het algemeen ontwikkelen deze gewassen hunne bladen voornamelijk in den regentijd en bloeijen zij in het drooge jaargetijde. Hunne vruchten komen ongeveer drie tot vier maanden na het bloeijen tot rijpheid.

De soorten van het geslacht *Uncaria*, zoo als zij worden opgegeven, zijn in Zuid-Amerika, op het vasteland van Indië en in den Indischen Archipel, tot aan Nieuw-Guinea gevonden. De Archipel is echter het ware vaderland van dit geslacht. Zijne soorten behooren daar, vooral op de groote Sunda-eilanden, te huis, en zijn van het zeestrand tot op ruim 1000 N. ellen verzameld. Hare groeiplaats is zoowel op de opene velden, als in de bosschen. Op de eersten ontwikkelen zich vooral de bloemen en de bladen; in de laatsten heeft eene meerdere uitgroeiing van de steng plaats. Zij staan in de bosschen niet zelden alleen; daarentegen zijn er op opene plaatsen dikwerf eenigen bij elkander, tusschen de kleine groepen van struiken verspreid.

Het geslacht *Uncaria* verschilt van *Platanocarpum* en *Anthoecephalus*, door de openspringende vruchten; van *Nauclea* en *Stephegyne*, door het gemis van het standertje tusschen de beide hokjes van de vrucht, en van alle de opgenoemden, door de aan deze gewassen eigene slingerende groeiwijze.

## I. UNCARIA FERRUGINEA. BL.

U. calyce infundibuliformi limbo partito, ramulis pubescentibus, foliis ovatis acutis basi obtusis vel subcordatis supra nitidis subtus pubescentibus, fructibus stipitatis.

Nauclea ferruginea Blume. Bijdragen tot de Flor. v. Neerl. Indië, pag. 1013; De Candolle. Prodrömus. Tom. IV. pag. 348.

CAULIS scandens, subtetragonus, cortice fusco, suberoso; RAMULI tetragoni, fusco-pubescens: pili sparsi vel aggregati; RAMULI tetragonales vel subcompressi, aneipites, pubescentes. FOLIA ovata, acuta, raro breviter acuminata, basi obtusa vel subcordata, supra glabra nervis pubescentibus, subtus fusco-pubescens, 0,095 longa, 0,055 lata, nervis primariis subparallelis, nervis secundariis parallelis, approximatis; PETIOLI semiteretes, supra plani, pubescentes, 0,01 longi. STIPULAE semirotae, obtusiusculae, in ramis adultioribus bifidis, supra glabriusculae, subtus pubescentes. PEDUNCULI COMMUNES axillares, basi compressi, versus apicem subteretes, sulcati, fusco-pubescens. UNCI pedunculanei axillares, compressi, attenuati, sulcati, fusco-pubescens. INVOLUCRUM floribus approximatum, utrinque pubescens, deciduum, 4—6 partitum: partes ovatae, acutae. PEDUNCULI PARTIALES in summo capituliformi pedunculi communis aggregati, tetragoni, pubescens, juniores breves, adultiores longi. ALABASTRUM constrictum: pars inferior obscure pentagona, fumeo-pubescens; pars superior ovoïdea, badio-pubescens. CALYX infundibuliformis, leviter quinquecarinatus, pubescens, limbo quinque-fido vel profunde-dentato: partes aestivatione valvatâ et induplicativâ, acutae. COROLLA aestivatione imbricatâ, elongato-infundibuliformis, extus ferrugineo-pilosa, intus glabra; TUBUS gracilis, 0,012 longus; LIMBUS quinquepartitus: partes rectae, oblongae, obtusae. STAMINA quinque, fauci corollae inserta, cum partibus corollae alternantia; FILAMENTA brevissima; ANTHERAE basi affixae, lineari-oblongae, obtusae, biloculares: loculis approximatis, linearibus, basi in subulas productis. OVARIUM inferum, rotundato-pentagonum, quinesulcatum, badio-pubescens, quineloculare: loculis multiovulatis. STYLUS teres. STIGMA oblongo-ovoïdeum. CAPSULA plantae Borneënsis ellipsoïdea, decemsulcata, calyce persistente munita, dense badio-pubescens, bilocularis, loculicida, bivalvis: valvulae bifidae. SEMINA numerosa, placentis lineari-lanceolatis apice subulatis basi acutis affixa, adscendentia, subrotunda, utrinque in appendicem linearem protensa, scrobiculata; TESTA et TEGMEN membranacea.

*Crescit in locis humilioribus: JAVA, SUMATRA, BORNEO.*

De voorwerpen van de drie genoemde eilanden verschillen weinig in uiterlijk aanzien; doch leveren, bij eene nauwkeurige vergelijking, eenige kleine kenmerken ter onderscheiding. Die van Sumatra hebben de bloemstelen en de kelken iets langer, dan die van Java; aan die van Borneo zijn daarenboven de bloemkroonen ten naastenbij de helft langer, en de bladen van eenen langwerpigen ovalen vorm, welke, aan den top afgerond zijnde, de voorwerpen een eigenaardig aanzien geeft. Die van laatstgenoemd eiland hebben aan de takjes, op Martapoera verzameld, de bloemkroonen iets korter dan die, welke wij langs de Doeson plukten.



## II. UNCARIA HALLII. KHS.

U. calyce campanulato limbo partito, ramulis glabriusculis, foliis ovato-rotundatis acutis basi obtusis subtus pubescentibus, nervis secundariis approximatis, fructibus stipitatis.

CAULIS tetragonus; RAMI obtuse quadrangulares, glabri vel glabriusculi; RAMULI quadrangulares, subsulcati, pubescentes. FOLIA opposita, ovato-rotundata, saepe rotundato-ovata, acuta, basi obtusa vel subcordata, supra nitida, subtus fumoso-pubescentia, 0,09 lata, 0,12 longa, nervis primariis et nervis secundariis approximatis parallelis; PETIOLI subteres, glabri, 0,02 longi. STIPULAE subintrapetiolares, bifidae: laciniae ovato-oblongae, acutae, supra glabrae, subtus pubescentes. UNCI pedunculanei, compressi. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, basi compressus, versus apicem subteres, subglaber. INVOLUCRUM quadri-sex-partitum: laciniae ovatae, acutae, utrinque badio-pubescentes. PEDUNCULI PARTIALES in receptaculo subgloboso dense pubescente inserti, obtuse quadrangulares, badio-pubescentes. ALABASTRUM pentagono-oblongum, subconstrictum. CALYX elongato-campanulatus, intus badio-pilosus, extus fumoso-pubescentis, aestivatione valvatâ; LIMBUS quinquepartitus: laciniae triangulares, acutae. COROLLA infundibuliformis, intus glabra, extus dense pilosa, limbo quinquepartito: laciniae ovaes, obtusae, margine glabrae, aestivatione imbricatâ. STAMINA quinque; FILAMENTA fauci corollae inserta, cum laciniis alternantia, brevissima; ANTHERAE basi affixae, oblongae, obtusae, biloculares: loculi paralleli, sejuncti, apice approximati vel connati, lineares, basi subulati. OVARIUM oblongum, obtuse quinqueangulare, fusco-pubescente, biloculare: loculi multiovulati; OVULA in placentis semiteretibus affixa. STYLUS teres. STIGMA ovoïdeum, apice subexcavatum. CAPSULA calyce munita, elongato-ellipsoïdea, decem-costata, badio-pubescentis, bilocularis, septicida, endocarpio secedente, apice bifido. PLACENTAE lanceolato-lineares, acuminatae. SEMINA numerosa, erecta, subrotunda, utrinque in membranulas lineares expansa. ALBUMEN carnosum, album. EMBRYO ovoïdeum; COTYLEDONES et RADICULA obtusae.

*Crescit ad flumen Doesson: BORNEO.*

Explicatio Tabulae 33. Figura Uncariae Hallii. 1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Corollae pars cum staminibus. 4. Calyx et ovarium dissectum. 5. Ovarium in longitudine dissectum. 6. Ovarii transversalis sectio. 7. Ovulum. 8. Fructus. 9, 10. Fructus dehiscentes. 11. Valva unica intus visa, endocarpio sejuncto. 12. Endocarpium. 13. Placenta. 14. Placentae pars admodum aucta. 15. Semen valde auctum. 16. Semen dissectum. 17. Symmetria floris.

Deze plant, een der schoonste slingergewassen, door ons langs de Doeson-rivier gevonden, heb ik genoemd naar den Hoogleraar H. C. van Hall, welke als onvermoeid en gelukkig bevorderaar der Kruidkunde in het algemeen en van onze inlandsche gewassen in het bijzonder, bekend en geacht is. Moge hem deze toewijding, als eene erkenning zijner edele pogingen, aangenaam zijn en tevens ten bewijze verstrekken, dat een zijner vroegere leerlingen zich dankbaar de oogenblikken herinnert, waarin denzelfden een deel van het groote boek der natuur, uit zulk een veelvormig en veelkleurig schrift te zamengesteld, door hem werd verstaanbaar gemaakt.

## III. UNCARIA NEMOROSA. KHS.

U. calyce campanulato limbo partito, ramulis subglabris, foliis rotundato-ovatis acuminatis basi subcordatis subtus hirsutiusculis, nervis secundariis distantibus, fructibus stipitatis.

CAULIS scandens; RAMI obtuse quadrangulares, glabri; RAMULI acute quadrangulares, subglabri. FOLIA opposita, rotundato-ovata, breviter acuminata, basi subcordata, supra glabra, in nervo medio pubescentia, subtus hirsutiuscula, coriacea, 0,09 lata, 0,14 longa, nervis primariis et nervis secundariis distantibus, parallelis; PETIOLI semiteretes, supra subpilosi, subtus pubescentes, 0,005 longi. STIPULAE subinterpetiolares, ovatae, profunde bifidae: laciniae lanceolatae, supra glabriusculae, subtus basi fusco-pilosae. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, compresse-tetragonus, fusco-pubescentis. INVOLUCRUM 4—6 fidum, laciniis lanceolatis, acuminatis, utrinque pubescens. — FLORUM structura nondum explicatorum vix ab *Uncariae Hallii* floribus diversa.

*Crescit in sylvis montis Singalang: SUMATRA.*

## IV. UNCARIA PEDICELLATA. ROXBURGH.

U. calyce campanulato limbo partito, ramulis hirsutis, foliis ovatis acutis basi cordatis supra nitidis subtus pubescentibus, fructibus stipitatis.

Roxburgh. *Flora Indica*. II. pag. 520; De Candolle. *Prod.* IV. pag. 348; *Nauclca pedicellata* Blume. *Bijdragen*, bl. 1013.

CAULIS scandens, compresse-quadrangularis, cortice fusco-suberoso; RAMI obtuse quadrangulares, subglabri; RAMULI ADULTIORES acute quadrangulares, sulcati, ferrugineo-hirsuti; RAMULI NOVELLI compresse quadrangulares, dense hirsuti. FOLIA opposita, ovata, saepe oblongo-ovata, acuta, basi cordata vel obtusa, supra nitida, in nervis medio et primariis dense ferrugineo-pubescentia, subtus laete fusco-pubescentia, 0,14 longa, 0,11 lata, nervis parallelis; PETIOLI subteretes, ferrugineo-pubescentes, 0,015 longi. STIPULAE interpetiolares, profunde bifidae: laciniae semilanceolatae, pubescentes. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, raro terminalis, compressus, versus apicem teres, subsulcatus, dense ferrugineo-hirsuto-pubescentis. INVOLUCRUM tetra- hexa-fidum: laciniae ovatae, acutae, fusco-pubescentes. PEDUNCULI PARTIALES subteretes, fusco-pubescentes. CALYX elongato-campanulatus, quinquecostatus, extus fusco-pubescentis, intus glandaceo-pubescentis, limbo quinque-partito vel profunde-dentato: laciniae acutae. COROLLA aestivatione subimbricatâ, elongato-infundibuliformis, limbo quinquepartito: laciniae oblongae, obtusae, intus glabrae, extus dense pilosae. STAMINA quinque, laciniis corollae alternantia; FILAMENTA fauci corollae inserta, brevissima; ANTHERAE basi affixae, oblongae, obtusae, basi cordatae, segmentis subulatis, biloculares: loculi approximati, rimis longitudinalibus dehiscentes. POLLEN sphaericum. OVARIUM oblongum, obtuse quinquangulare, albido- vel fusco-pubescentis, biloculare, multiovulatum. STYLUS teres, glaber. STIGMA ovoideum, subpentagonum. CAPSULA et SEMINA cum praecedente specie conformia.

*Crescit in fruticetis regionum humiliorum: JAVA, BORNEO, SUMATRA.*

Tusschen de voorwerpen van Java en Borneo bestaat geen verschil, hetwelk tot derzelver onderscheiding zou kunnen aanleiding geven; tusschen deze en die van Sumatra meende ik eerst genoegzaam verschil, om hen als soorten te onderscheiden, gevonden te hebben, in de diepere indeelingen van den kelk, in deszelfs vorm en in dien der vruchten, welke meer verlengd is. Beide deze afwijkingen zijn echter niet van die waarde, dat zij de *Uncaria eumececarpa* kunnen doen behouden, daar ik bij enkele voorwerpen overgangen tot den gewonen, meer gedrongen vorm heb waargenomen.

Op onbeschaduwde plaatsen, vooral op opene, met enkele groepen van boomen en struikgewassen begroeide vlakten der lagere streken, is de *Uncaria pedicellata*, als gezellig groeiende plant verspreid, en bereiken hare bladen en bloemen eene aanzienlijke ontwikkeling. Zij klimt hier, door de haakvormig uitgegroeide, onvruchtbare bloemstelen ondersteund, tot in de hoogste boomen, of kruipt, wanneer deze middelen ter ondersteuning van de zwakke steng ontbreken, langs den grond.

#### V. UNCARIA GAMBIR. HUNTER.

*U. calyce campanulato profunde dentato, ramulis subglabris, foliis ellipticis obtuse acuminatis utrinque glabris, fructibus stipitatis.*

Hunter in Linn. Transactions. IX. pag. 218, Tab. 22; Roxburgh. Flora Indica. II. pag. 517; De Candolle. Prodrômus etc. IV. pag. 347.

**CAULIS** scandens vel culturâ frutescens; **RAMI** obtuse quadrangulares vel subteres, fusci, glabri; **RAMULI** quadrangulares, subsulcati, subglabri. **FOLIA** opposita, elliptica, breviter obtuse acuminata, basi angustata, utrinque glabra, subtus in nervorum axillis barbata, 0,09 longa, 0,05 lata, nervis primariis costatim prominentibus, nervis secundariis linearibus, vix prominentibus; **PETIOLI** semiteretes, supra plani, bisulcati, subglabri. **STIPULAE** interpetiolares, ovatae, obtusae, raro bifidae, supra sparsim pubescentes, subtus glabriusculae. **PEDUNCULUS COMMUNIS** axillaris, compressus, versus apicem teres, glaber. **UNCUS** pedunculaneus, compressus, attenuatus. **INVOLUCRUM** quadripartitum, lacinae inaequales: duae minores lanceolatae; duae majores ovatae, obtusiusculae, utrinque glabriusculae, ciliolatae. **PEDUNCULI PARTIALES** in capitulo hemisphaerico subpubescente aggregati, subteres, subpubescentes. **ALABASTRUM** obconoïdeum, quinquecostatum, griseo-pubescent. **CALYX** aestivatione valvatâ et induplicatâ, campanulatus, limbo quinquentato partitove: lacinae dentesve oblongae, apice incrassatae. **COROLLA** aestivatione imbricatâ, elongato-infundibuliformis, limbo quinquepartito: lacinae oblongae, obtusae, intus glabra, extus subsericea. **STAMINA** quinque, laciniis corollae alternantia; **FILAMENTA** fauce corollae inserta, brevia; **ANTHERAE** basi affixae, ovato-oblongae, basi subcordatae cum subulis duabus, biloculares: loculi approximati. **STYLUS** teres, glaber; **STIGMA** ellipsoïdeum. **OVARIUM** obconicum, quinquecostatum, subsericeum, biloculare, multiovulatum. **CAPSULA** calyce munita, ellipsoïdea vel elongato-ellipsoïdea, saepe compressa, bisulcata, laevia vel quinquecarinata, glabriuscula, apice dense fumoso-pubescent, bilocularis, septicida. **PLACENTA** lineari-lanceolata, utroque subulata. **SEMINA** numerosa, adscendentia, subrotunda, utroque in membranas lineares extensa. **EMBRYO** in medio albuminis carnosus, ovoïdeus.

*Collegi juxta Siri-Lama: SUMATRA.*

Tab. 34. 1—2. Figura speciei. 1. Flos nondum expansus. 2. Floris pars intus visa. 3. Ovarium verticaliter sectum, stylus et stigma. 4. Fructus immaturus. 5. Fructus immaturi sectio transversalis. 6. Capsula dehiscens. 7. Capsulae dimidia pars intus visa. 8. Capsulae sectio transversalis. 9. Semen valde auctum. 10. Semen testâ ablatâ. 11. Nucleus verticaliter sectus.

Volgens sommigen groeit de *Uncaria Gambir* wild op de eilanden rondom het schiereiland Malacca. In hoeverre deze opgave waar zij, zal door de aldaar gevestigde of reizende Natuuronderzoekers moeten bevestigd worden. Zeker is het echter, dat deze plant vroeger op Sumatra, Malacca, Bintang, enz. werd gekweekt; dat deze teelt nu op Bintang en Singapoera eene aanzienlijke uitbreiding heeft verkregen en op eenige plaatsen van Malacca en Sumatra nog wordt voortgezet. Op het laatstgemelde eiland is zij door mij te Siri-Lama, een distrikt van de vijftig Kottas, op ruim 400 N. ellen boven zee gelegen, waargenomen. Zij is zeer eenvoudig. De zaden worden op een met zorg bewerkt stukje grond gezaaid en de jonge plantjes blijven daar, tot zij zes tot acht Nederlandsche duimen hoog zijn. Dan worden zij, ten einde de worteltjes niet te beschadigen, met veel voorzigtigheid overgeplant en gewoonlijk op drie voet afstands van elkander gezet. In den eersten tijd na die verplanting, worden deze plantsoenen zeer zuiver gehouden; later echter doet het onkruid aan de groeiende boompjes minder nadeel. Ongeveer twee en bij sommigen eerst drie jaar na de overplanting, begint de planter voordeel van zijnen arbeid te trekken, ter bereiding van den Gambir. De boompjes worden dan twee-, drie- of viermaal 's jaars van hunne bladen of ook wel van de jonge loten beroofd. Diegenen, welke slechts tweemaal oogsten, beweren, dat zij daardoor hunne aanplantingen langer behouden en bijna dezelfde voordeelen genieten als diegenen, welke hunne boomen meermalen ontbladeren. Beiden hebben de gewoonte, zulks tegen den regentijd te verrigten, alswanneer zij dan tevens een groot gedeelte der takken wegsnijden. Deze bladen en takken worden met water gekookt en het dus verkregen vocht vervolgens uitgedampt, tot de dikte van siroop, en in houten bakjes of bamboezen kokers gegoten, ten einde te stollen. Verkoeld zijnde, wordt de verkregene stof in kleine vierkante stukjes of in ronde schijfjes gesneden. De Gambir van Singapoera en Bintang komt onder den eersten vorm voor, is bruin, doch niet geheel oplosbaar, misschien wel door de bijgevoegde Sago, welke aan denzelfden meerdere vastheid geeft. De Gambir van Siri-Lama is in schijfjes, bruin-geel, meer oplosbaar en zuiverder van smaak: eigenschappen, welke de bewoners aan eene meerdere zorgvuldige bereiding en vooral aan eene schielijker koking toeschrijven.

Het distrikt, waar ik dezen tak van landbouw heb waargenomen, heeft eenen kiezelaardigen ijzerhoudenden bodem, en is niet bijzonder geschikt voor de aankweeking van andere gewassen. Even zoo moet het met de andere streken zijn, waar de Gambir wordt aangebouwd en hij, benevens de peper, de voornaamste middelen van bestaan oplevert. In vergelijking met deze laatste aangekweekte plant zoude de Gambir, volgens de ingewonnen narigten oordeelende, niet zoo veel voordeel geven. Want alsdan levert een stuk grond, hetwelk op Malabar 174 N. p., en op Poeloe Pinang, door de Chinezen bewerkt, 580 N. p. peper opbrengt, slechts 125 N. p. Gambir. Vermoedelijk zal echter de nijverheid der Chinezen op Bintang en Singapoera het voortbrengsel aanzienlijk hebben vermeerderd. Op deze laatste eilanden wordt de bereiding in het groot gedreven, en misschien wel overdreven; omdat het

gebruik van den Gambir met de betelbladen, kalk en tabak, eene soort van weelde is en zijne grenzen heeft. De Gambir van Bintang wordt voor een gedeelte naar Java vervoerd en het overige brengen inlandsche kooplieden naar de oostelijke deelen van den Archipel, of wel wordt in jonken naar China, enzv. gezonden. Die van Singapoera wordt in dezelfde streken afgezet, en is ook reeds naar Engeland verzonden, ten einde te beproeven, of hij daar, als looistof aangewend, de eikenschors, van welke acht ponden niet meer looistof bevatten, dan één pond Gambir, zoude kunnen vervangen. Het schijnt echter, dat deze proef, uithoofde der hooge regten, welke op den invoer van den Gambir geheven worden, bedragende dezelve twee ponden sterlings per honderd N. ponden, tot geene gunstige uitkomst aanleiding heeft gegeven.

De oorsprong van dezen tak van landbouw moet waarschijnlijk bij de volkplanters worden gezocht, die zich van het vasteland over den Archipel verspreid hebben. Zij hadden in hun vaderland eenen boom, onder den naam *Khädir*, *Khādir* of *Khoedir* (*Mimosa catechu* Roxb.), uit welken zij, door koking, de *Khadirasara* of geest van den *Khadir* vervaardigden. Dezen naam bragten zij mede, en op de eilanden vonden zij bladen van planten in gebruik, onder den naam *Katja* of *Katjoe*, of, naar de Engelsche spelling, *Katcha* of *Katchoe*, welke de Indianen hunne *Khadirasara* herinnerden. Zij kwamen op het denkbeeld, om hetgeen zij in hun vaderland met den stam van den *Khadir* deden, in hunne nieuwe woonplaats met de planten, welke de *Katjoe*-bladen leverden, te beproeven, en gaven aan het voortbrengsel den naam *Khadir*, die in *Gambir* is overgegaan. — De naam *Catechu*, welken de Gambir in Europa draagt, staat vermoedelijk in verband met het gemelde *Katja*, *Katjoe*, beiden van Sanskritschen oorsprong. Het eerste beteekent *blinken*, en dus aan eene eigenschap der bladen ontleend; het andere duidt *binden* aan, naar de groeiwijze dier planten, wanneer zij aan zichzelf zijn overgelaten.

## VI. UNCARIA DASYONEURA. KHS.

U. calyce campanulato limbo dentato, ramulis glabris, foliis ovalibus obtuse acuminatis supra glabris subtus in nervis hirsutis, stipulis suborbiculatis.

CAULIS frutescens. RAMI obtuse quadrangulares, sulcati; RAMULI obtuse quadrangulares, sulcati, glabri. FOLIA opposita, ovalia, obtuse acuminata, basi angustata, supra glabra, subtus in nervis, praesertim in nervo medio hirsuta, nervis primariis distantibus, prominentibus, nervis secundariis subparallelis vix conspicuis, 0,085 longa, 0,05 lata; PETIOLI semiteretes, supra plani bisulcati et glabri, subtus rotundati et hirsuti. STIPULAE intrapetiolares, suborbiculatae, utrinque glabrae. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, parte inferiore compressus, angustatus, glaber; parte superiore subteres, fumoso-pubescens. INVOLUCRUM inaequaliter quadripartitum: partes duae minores oblongae, partes majores ovatae, acutiusculae, glabrum. PEDUNCULI PARTIALES in receptaculo hemisphaerico inserti, brevissimi, fumoso-pubescens. CALYX campanulatus, limbo obsolete quinquentatus: dentes obtusae, intus glaber, extus pubescens. COROLLA elongato-infundibuliformis, intus glabra, extus pubescens, limbo quinquepartito: laciniis obovatis, obtusis. STAMINA quinque, laciniis alternantia; FILAMENTA fauei co-

rollae inserta, brevia; ANTHERAЕ basi affixae, oblongae, obtusae, basi cordatae et bimueronulatae: mucronulae breves, biloculares. OVARIIUM oblongo-ovoideum, dense fumoso-pubescens, biloculare. STYLUS teres, glaber. STIGMA clavaeforme.

*Crescit ad ripas fluminis Salaut: SUMATRA.*

#### VII. UNCARIA ATTENUATA. KHS.

U. calyce campanulato limbo dentato, ramulis pubescentibus, foliis ellipticis obtuse acuminatis supra glabris subtus pubescentibus, stipulis oblongo-ovatis.

CAULIS frutescens, scandens; RAMI obtuse quadrangulares, subglabri; RAMULI tetragoni, sulcati, dense fusco-pubescentes. FOLIA opposita, elliptica, breviter obtuse acuminata, supra glabra, subtus pubescentia et in nervorum axillis pilosa, 0,12 longa, 0,05 lata, nervis primariis et nervis secundariis approximatis parallelis; PETIOLI semiteretes, supra plani, pubescentes, 0,015 longi. STIPULAE interpetiolares, oblongo-ovatae, obtusae, utrinque badio-pubescentes. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, parte inferiore compressa, parte superiore subterete, dense pubescens. INVOLUCRUM badio-pubescentis, quadripartitum: partibus inaequalibus: duae ovatae, obtusae, caeterae oblongae. PEDUNCULI PARTIALES in receptaculo hemisphaerico inserti, subteretes, pubescentes. CALYX aestivatione valvatâ imbricatâve, campanulatus, limbo quinquentato: dentes obtusae, intus glaber, extus laete fusco-pubescentis. COROLLA elongato-infundibuliformis, intus glabra, extus cinereo-pubescentis, limbo quinquepartito: lacinae obovatae, obtusae, margine recurvae. STAMINA quinque, cum laciniis corollae alternantia; FILAMENTA fauci corollae inserta; ANTHERAЕ basi affixae, oblongae, obtusae, basi cordatae segmentis mueronulatis, biloculares: loculi lineares, paralleli, in connectivo oblongo affixi. OVARIIUM ellipsoideum, fusco-pubescentis, biloculare. STYLUS filiformis, glaber; STIGMA elongato-clavaeforme.

*Crescit ad flumen Salaut, in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Tab. 34. 3. Figura hujus speciei.

Van deze soort hebben wij twee vormen verzameld. De een, langs de rivier Salaut gevonden, heeft de bladen langwerpig-elliptisch; de ander, in het gebergte Melintang groeiende, rondachtig-elliptisch, iets grooter dan de eerste.

#### VIII. UNCARIA CALLOPHYLLA. BLUME.

U. calyce partito partibus oblongis, ramulis glabris, foliis ellipticis obtuse acuminatis utrinque glabris, fructibus stipitatis.

RAMI obtuse quadrangulares, sulcati, glabri; RAMULI compressi, obtuse quadrangulares, sulcati, glabri. FOLIA opposita, elliptica, saepe lanceolato-elliptica, obtuse acuminata, utrinque glabra, subtus in axillis

nervorum primariorum barbata, 0,07 longa, 0,03 lata, nervo medio et nervis primariis rufis, nervis secundariis approximatis parallelis tenuibus; PETIOLI semiteretes, supra plani, glabri. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, basi compressus, versus apicem subteres, fumoso-pubescent. UNCUS pedunculaneus attenuatus, compressus, pubescens. CALYX quinquepartitus: lacinae oblongae obtusae, intus glaber, extus pubescens. OVARIIUM elongato-ellipsoideum, compressum, bisuleatum, biloculare. CAPSULA calyce munita, ellipsoidea, leviter decem-costata, pubescens, bilocularis, multiovulata, septieida. PLACENTAE subuliformes, apice acutiusculae. SEMINA numerosa, adscendentia, ovoidea, utrinque in membranas lineares extensa.

*Colligitur in monte Pamatton, juxta Martapoera: BORNEO.*

Onder den soortnaam *U. callophylla* heb ik drie verschillende vormen vereenigd, van welke twee, alleen door de gedaante der bladen, te onderscheiden zijn. Deze is namelijk bij de voorwerpen van Martapoera rondachtig-elliptisch, met de breedte tot de lengte, als 5 tot 8, en bij de voorwerpen van den berg Pamatton langwerpig-elliptisch, met de breedte tot de lengte, als 1 tot 2. De derde vorm, aan den voet van den Sakoembang geplukt, heeft de bladen eivormig en minder toegespitst; doch hij verschilt, vooral door het geringer aantal zijneren, hetwelk in de verzamelde bladen zelden drie paar te boven gaat, en in die der andere voorwerpen vijf tot zes paar bedraagt. Hij kan voorloopig, als verscheidenheid der *Uncaria callophylla*, den naam *U. oligoneura* dragen.

#### IX. UNCARIA ACIDA. HUNTER.

*U. calyce partito laciniis oblongis, ramulis subglabris, foliis ovatis obtusiusculis basi obtusis supra glabris subtus subglabris, fructibus stipitatis.*

Roxburgh. *Flora Indica* II. pag. 129; De Candolle. *Prodromus* IV. pag. 347; *Nauvea acida* Hunter. *Transactions of the Linnean Society* IX. pag. 223; Blume. *Bijdragen tot de Flora van Neêrlandseh Indië*, bl. 1011.

CAULIS scandens; cortex irregulariter fissus, fuscus, suberosus; RAMI obtuse quadrangulares, glabri, fusei; RAMULI compressae quadrangulares, sub lente pubescentes. FOLIA opposita, ovata, obtusiuscula, basi obtusa, saepe subeordata, supra glabra, subtus sub lente praesertim in nervis pubescentia, 0,08 longa, 0,05 lata, nervis primariis 6—8 sub angulo 45° patentibus, nervis secundariis reticulatis vix prominentibus; PETIOLI subteretes, glabriusculi, 0,015 longi. STIPULAE intrapetiolares, ovatae, acutiuseulae, saepe bifidae, utrinque glabrae. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, parte inferiore compressus, parte superiore subteres. UNCUS pedunculaneus, compressus, glaber. INVOLUCRUM bi- ad quadripartitum: lacinae ovatae, obtusiusculae, eiliolatae, utrinque glabrum. CALYX quinquepartitum: lacinae ovatae, obtusae, pubescens. COROLLA tubuloso-infundibuliformis, limbo quinque partito: lacinae ovatae, obtusae, intus glabra, extus pubescens. STAMINA 5, laciniis corollae alternantia; FILAMENTA in fauce corollae affixa, brevia; ANTHERAE basi affixae, oblongo-ovatae, basi subeordatae bimucronulatae. OVARIIUM ellipsoideum, dense laete fusco-tomentosum, biloculare, multiovulatum. STYLUS teres, glaber; STIGMA clavaeforme, acutiuseulum.

*Crescit in fruticetis: JAVA, SUMATRA, BORNEO.*

De voorwerpen der verschillende eilanden zijn volmaakt gelijkvormig. Zij zijn allen in de lagere streken, op onbeschaduwde plaatsen verzameld. Onder die van Borneo zijn eenige takken belangrijk, door de vergroeiing van de bloemcelen, die bladaardig zijn geworden, en bij sommige bloemen geheel, bij anderen voor een gedeelte zijn misvormd: zoodat de kelk en de bloemkroon met de meeldraden het vergroeide vruchtbeginsel omringen, óf de kelk en de bloemkroon om het, tot blaadjes vergroeide vruchtbeginsel en vijf bundeltjes van bladen, de plaatsen der meeldraden innemende, zijn gezeten, óf alleen de kelk duidelijk kan waargenomen worden.

Door de gedaante der bladen is deze soort verwant aan de *U. callophylla*, doch door de nerven, welke netvormig zijn, is zij gemakkelijk van de *U. callophylla*, die dezelve evenwijdig en veel duidelijker bezit, te onderscheiden. — Zij wordt door de Sundanezen *Kait-bessir*, ijzerbrander of ijzereter, genoemd. Dezen naam verdient zij, wegens de scherpte van het sap, waardoor het ijzer, bij de doorkapping van een' tak, terstond zwart uitgebeten wordt.

#### X. UNCARIA CANESCENS. Khs.

*U. calyce partito laciniis ovatis obtusis, ramulis pubescentibus, foliis late ovalibus breviter acuminatis supra glabris subtus lepidotis, fructibus stipitatis.*

CAULIS scandens; RAMI obtuse quadrangulares, glabri; RAMULI compressi, acute quadrangulares, pubescentes. FOLIA opposita, rotundato-ovalia, saepe obovalia, breviter obtusc-acuminata, supra glabra, subtus cano-lepidota et in nervorum axillis dense pilosa, longa 0,1, lata 0,06, nervis primariis prominentibus, nervis secundariis subparallelis, vix conspicuis; PETIOLI subteres, supra sulcati, 0,015 longi. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, compressus, superne subteres, fusco-pubescens. INVOLUCRUM 4—6 partitum: lacinae ovatae, obtusae, supra pubescens, subtus dense fusco-pubescens. PEDUNCULI PARTIALES teretes, laete fusco-pubescentes. FLORUM characteres similes *Uncariae acidae*.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

#### XI. UNCARIA ROXBURGHIANA. Khs.

*U. calyce partito laciniis linearibus, ramulis hirsutis, foliis ovatis acuminatis basi subcordatis utrinque hirsutis, fructibus sessilibus.*

RAMI obtuse quadrangulares, hirsuti; RAMULI compressi, acute quadrangulares, dense hirsuti. FOLIA opposita, ovata, acuminata, raro acuta, basi cordata, utrinque hirsuta, 0,08 longa, 0,045 lata, nervis primariis et nervis secundariis prominentibus; PETIOLI semiteretes, hirsuti, 0,005 longi. STIPULAE interpetiolares, ovatae, bifidae: lacinae oblongae, acutae, utrinque glabrae. PEDUNCULUS COMMUNIS basi compressus, superne subteres, dense hirsutus. INVOLUCRUM quadripartitum: lacinae ovatae, acutae, utrinque glabrum. FLORES in receptaculo piloso aggregati. CALYX quinquepartitus: lacinae lineares,



dense pilosus. CAPSULA sessilis, oblonga, compressa, sulcata, pilosa, bilocularis, septicida. PLACENTAE lineari-oblongae, utrinque acutiuseulae. SEMINA multa, adscendentia, ovata, utrinque in membranas extensa.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA; in monte Sakoembang: BORNEO.*

## XII. UNCARIA GLABRATA. BL.

U. calyce partito laciniis oblongo-linearibus, ramulis glabriusculis, foliis ovatis acuminatis basi obtusis utrinque subglabris, fructibus stipitatis.

Blume. Bijdragen tot de Flora van Neêrl. Indië, bl. 1012; De Candolle. Prodrômus IV. pag. 348.

CAULIS et RAMI obscure quadrangulares; RAMULI obscure quadrangulares, subsuleati, — novelli compresso-quadrangulares. FOLIA opposita, ovata, acuminata, basi obtusa, utrinque subglabra, — juniora utrinque sparsim pilosa, — in nervorum axillis pilosa, 0,085 longa, 0,04 lata, nervis primariis eostatim prominentibus, nervis secundariis subparallelis vix conspicuis; PETIOLI semiteretes, glabriusculi, 0,005 longi. STIPULAE intrapetiolares, ovatae, acutae, saepe bifidae, utrinque glabrae, submembranaceae. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, parte inferiore compressus, parte superiore subteres, pilosus. INVOLUCRUM 4—8 partitum, laciniis lanceolatis et acutis, utrinque glabriusculum, membranaceum. PEDUNCULI PARTIALES in receptaculo hemisphaerico inserti, subteretes, pubescentes. CALYX quinquepartitus, laciniis oblongo-linearibus obtusis, pubescentibus. — CAPSULA elongato-ellipsoidea, decemcostata, subpubescens, bilocularis, septicida, multiovulata. PLACENTAE lineares, utrinque attenuatae. SEMINA numerosa, adscendentia.

*Crescit in sylvis montis Singalang: SUMATRA; in sylvis montanis: JAVA.*

## XIII. UNCARIA FERREA. BL.

U. calyce partito laciniis linearibus, ramulis dense pilosis, foliis ovatis acutis basi subcordatis utrinque pilosis, fructibus stipitatis.

De Candolle. Prodrômus IV. pag. 348; Nauclea ferrea Blume. Bijdragen tot de Flora van Neêrl. Indië, bl. 1014.

CAULIS compressus tetragonus, fuscus; RAMI adultiores obtuse quadrangulares, glabri; RAMULI subteretes vel obtuse quadrangulares, dense fusco-pilosi. FOLIA opposita, ovata, acuta, breviter acuminata, basi subcordata, supra sparsim et subtus dense pilosa, 0,075 longa, 0,04 lata, nervis primariis similibus eostis prominentibus, nervis secundariis vix conspicuis, subparallelibus, distantibus; PETIOLI subteretes, dense pilosi, 0,004 longi. STIPULAE intrapetiolares, subrotundatae, bifidae, laciniis acutis, ciliatae, utrinque glabriusculae, membranaceae. PEDUNCULUS COMMUNIS axillaris, parte inferiore compressus, parte superiore subteres, dense fusco-pilosus; INVOLUCRUM quadripartitum, laciniis inaequalibus (majores subrotundato-ovatae et acutae vel emarginatae, minores oblongo-ovatae et acuminatae), ciliatum, utrinque subpubescens, membranaceum; PEDUNCULI PARTIALES in receptaculo hemisphaerico inserti, subte-

retes, pilosi. CALYX quinquepartitus, laciniis linearibus, pilosus. COROLLA elongato-infundibuliformis, tubo gracili, limbo quinquepartito, laciniis ovalibus et obtusis, intus extusque glabra. STAMINA 5, cum laciniis corollae alternantia; FILAMENTA brevissima; ANTHERAE basi affixae, oblongae, obtusae, basi subcordatae et bimucronulatae. OVARIIUM oblongo-ovoïdeum, dense pilosum; STYLUS teres, glaber; STIGMA ellipsoïdeum. CAPSULA elongato-ellipsoïdea, decemcostata, pilosa, bilocularis, septicida. PLACENTAE lanceolatae utrinque acutae. OVULA numerosa, adscendentia, utrinque membranacea, membranâ apiculari acuminatâ, membranâ basilari bifidâ.

*Crescit in sylvis montanis: JAVA; in monte Singalang: SUMATRA; in monte Pamatton: BORNEO.*

De voorwerpen van Java en van Sumatra zijn door het aanzien en door de kenmerken der deelen aan elkander gelijk. Die van Borneo hebben hetzelfde voorkomen, doch in de vrucht eenig verschil, daar deze aan de voorwerpen van de eerstgenoemde eilanden met tien ribben voorzien en aan die van Borneo effen is. Wegens deze verscheidenheid echter, hoezeer zij als een duidelijk kenmerk kan beschouwd worden, zijn de voorwerpen van de verschillende eilanden door mij niet als soorten gescheiden, daar ik bij andere soorten, op dezelfde stammen, den overgang van ongeribde naar geribde vruchten duidelijk heb waargenomen. — Deze soort groeit in de nabijheid van het zeestrand en verder binnenlands, tot op 800 N. ellen boven hetzelfde, in de bosschen van de genoemde en ook van andere eilanden van den Archipel.

BIJDRAGEN TOT DE GESLACHTEN

# CRATOXYLON EN TRIDESMIS,

DOOR

P. W. KORTHALS.

De geslachten *Cratoxylon* en *Tridesmis* vormen met *Eliaea* eene afzonderlijke groep onder de *Hypericineae*, gekenmerkt door schubjes, die met de bundels van de helmdraden afwisselen, en door zaaddoozen met gevleugelde zaden. Met het eerstgenoemde geslacht, hetwelk door eene drukfout als tweebroederig is vermeld, zal *Ancistrolobus* Spach. moeten worden vereenigd. De beide geslachten, vooral door het zamenstel der zaaddoozen van *Eliaea* afwijkende, verschillen van elkander door het aantal en de aanhechting der zaden, alsmede door het al of niet aanwezig zijn van schubjes aan den voet der bloembladen. *Tridesmis* bezit aan den voet der bloembladen de gemelde schubjes, en zijne zaden zijn langs den binnenrand van den tusschenrand in een onbepaald, vrij groot getal aangehecht. *Cratoxylon* mist deze schubben, en bezit een bepaald getal, vier tot acht, zaden in het benedenste gedeelte van het hokje aangehecht.

## I. CRATOXYLON POLYANTHUM. KHS.

*C. foliis ellipticis acuminatis basi acutis, squamulis acutis.*

ARBUSCULA 6—8 metrorum. RAMI teretes, cinerei; RAMULI basi subteretes, sursum compressi, saepe ancipites, glabri. FOLIA decussata, elliptica, acuminata, basi acuta saepe appendiculis duobus filiformibus aucta, integerrima vel absolute crenulata, utrinque glabra, coriacea, 0<sup>m</sup>,09 longa, 0<sup>m</sup>,04 lata; PETIOLI semiteretes, supra plani, glabri, 0,005 longi. PEDUNCULI supra-axillares, solitarii vel abortu foliorum in racemos dispositi, 1—3 flori, compressi, glabri; PEDICELLI subquadrangulares, glabri.

**CALYX** pentasepalus, persistens; **SEPALA** biserialia, crecta, subaequalia, ovata, obtusa, concava, glabra, nervis a basi procedentibus. **COROLLA** pentapetala, hypogyna, aestivatione subconvolutâ; **PETALA** obovata, basi inaequaliter angustata, integerrima, glabra, nervis subdichotomis intermixtis glandulis linearibus cellulosis. **STAMINA** plurima, hypogyna, in phalngos tres coalita; columnae staminum lineares, glabrae; **FILAMENTA** libera, exteriora linearia; **ANTHERAE** medio dorsi affixae, biloculares, loculis saepe discretis, longitudinaliter dehiscentes. **SQUAMULAE** 3, hypogynae, staminum phalangibus alternae, triangulares, attenuatae, apice saepe recurvae. **OVARIVM** sessile, pyramidale, obtusangulum, lateribus sulcatum, glabrum, triloculare; **OVULA** 4—8, affixa loculi angulo centrali et basilari. **STYLI** 3, triangulares, glabri; **STIGMATA** capitellata. **CAPSULA** calyce excreto cincta, obovoïdea, acuta, basi subteres, glabra, coriacea, trilocularis, loculicida, trivalvis, valvis in medio septigeris, basi seminiferis. **SEMINA** 4—8 in singulo loculo, compressa, obliquo-obovata, obtusa, altero tantum latere superne membranaceo-alata; **TESTA** membranacea, in alam extensa; **TEGMEN** tenue; **HILUM** approximatum exostomio; **RAPHE** expansione alaeformi cincta. **NUCLEUS** cylindricus, utrinque obtusus. **EMBRYO** erectus, diotyledoneus.

*Crescit in monte Pamatton, ad ripas fluminis Doeson, juxta Poeloe-lampeï: BORNEO.*

Tab. 36. Figura speciei. 1. Alabastra. 2. Alabastrum petalis ablatis. 3. Flos explicatus. 4. Petalum. 5. Anthera ab anteriore et 6. a posteriore. 7. Flos, tegumentis ablatis, fasciculo staminum unico reflexo. 8. Flos, tegumentis et staminibus abseisis. 9. Ovarium adultius eum squamulis. 10. Sectio longitudinalis ovarii. 11. Sectio longitudinalis ovarii eum ovulis. 12. Sectio transversalis ovarii. 13, 14. Semina. 15. Sectio longitudinalis partis seminis, cum mesospernio, tegmine, saeculo embryonis et embryone.

De voorwerpen van de drie genoemde plaatsen verschillen van elkander door de grootte der bladen. Die van de Doeson-rivier, in de nabijheid van Mantalet verzameld, hebben dezelve het grootste; doch missen daarentegen dikwerf de aanhangseltjes van den voet: die van den berg Pamatton houden het midden tusschen de opgenoemde en die van Poeloe-lampeï, bij welke de gemelde aanhangseltjes zelden ontbreken.

## II. CRATOXYLON GLAUCUM. KHS.

C. foliis obovatis vel ellipticis, squamulis obtusis eueullatis.

**ARBUSCULA** 4—8 metrofum. **RAMI** subteretes, fusci, glabri; **RAMULI** teretes, sursum ancipites, glabri. **FOLIA** decussata, obovata, raro elliptica, obtusa, apiculata, basi acuta, integerrima, utrinque glabra, subpellucide punctata, coriacea, 0,045 longa, 0,03 lata; **PETIOLI** compressi, glabri, 0,002 longi. **FLORES** terminales vel axillares, racemosi; **PEDUNCULUS** communis anceps, glaber; **PEDUNCULI** partiales subteretes, basi bituberculati, glabri. **CALYX** pentasepalus, aestivatione quincunciali; **SEPALA** subbiseriaria, subaequalia, ovalia, obtusa, integerrima. **COROLLA** pentapetala, aestivatione subconvolutâ; **PETALA** oblique rotundato-obovata, obtusissima, glabra, membranacea, subrosea, nervis e basi petalorum procedentibus versus apicem bifidis, glandulis oblongis vel subrotundis inter nervos seriatim dispositis.

STAMINA numerosa, hypogyna, in phalanges tres coalita; COLUMNAE staminiferae ligulatae, apice latiores; FILAMENTA libera exteriora pluriserialia; in serie interiore latiora, linearia; in seriebus exterioribus filiformia, glabra; ANTHERAE medio affixae, ovatae, obtusae, basi emarginatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. SQUAMULAE 3, phalangibus staminum alternae, hypogynae, subrotundae, extrorse cucullatae, obtusae, glabrae, carnosae. OVARIUM sessile, elongato-pyramidatum, lateribus sulcatum, glabrum, triloculare. OVULA 4—6, axi interno baseos loculi affixae. STYLI 3, subtrigoni, glabri; STIGMATA 3, capitellata. CAPSULA oblonga, subtrigona, glabra, coriacea, trilocularis, trivalvis; valvis ovatis, acuminatis, stylis persistentibus, dissepimenta coriacea in medio gerentibus. SEMINA 4—6 in singulo loculo, placentae hemisphaericae axillari affixa, erecta, collateralia, lineari-oblonga, utrinque obtusa, margine membranaceo-alata; TESTA membranacea, alato-expansa, cellulis hexagonis sat regularibus formata; MESOSPERMIUM in uno latere et in apice conspicuum, laxe cellulosum; TEGMEN membranaceum, tenue. HILUM approximatum micropylae. RAPHE filiformis, cum margine seminis paralleliter, demum supra basin incurva, procurrens ad nucleum. NUCLEUS in medio seminis, teres, utrinque acutus. EMBRYO erectus, rectus, dicotyledoneus.

*Crescit ad ripas Karrau, ad montem Rantau, etc.: BORNEO.*

Over het algemeen zijn de bladen dezer soort omgekeerd eirond, doch soms heeft zij dezelve elliptisch. Hare bloemen zijn van elkander verspreid, of getropt bij elkander staande. De laatste bloeiwijze komt voornamelijk bij de voorwerpen van Poeloe-lampeï voor, en gaat niet zelden met den elliptischen vorm der bladen gepaard. Beiden vereenigd, geven aan de voorwerpen een geheel eigen aanzien, hetgeen hen ligt voor verschillende soorten kan doen houden. De gemelde bladvorm komt echter aan dezelfde boomen, soms aan dezelfde takken voor, en de bloemen zelve leveren, bij een nader onderzoek, geen genoegzaam verschil, dat deze scheiding kan ondersteunen.

Al de waargenomene voorwerpen groeiden op kiezelaardige gronden. Zij waren niet zeer bladrijk, doch rijk aan bloemen of vruchten. Van de beide laatsten voorzien, hebben wij hen van augustus tot november waargenomen; het hoofdtijdperk van bloeijen schijnt echter, volgens deze waarneming oordeelende, in juni en juli plaats te hebben.

Bij de afwijking, welke de vorm der bladen en de bloeiwijze opleveren, komen vooral die van de schubjes en van de zaden in aanmerking. De schubjes hebben de gedaante van kapjes, welke naar buiten geopend zijn, en op deze opening een, van één tandje voorzien, klepje dragen. Hunne bestemming durf ik niet bepalen; misschien omsluiten zij de helmknopjes in den jeugdigen staat. De zaden hebben bij deze soort de kern in het midden, en den geheelen omtrek vliezig. — Deze vliezige uitbreiding bestaat uit de testa en het mesospermium. Aan de zijde, waar de raphe loopt, zijn beide, en aan de tegenoverliggende is alleen de testa aanwezig. Dit laatste gedeelte is zeer fijn en doet den regelmatigigen vorm der zeshoekige cellen het beste waarnemen. Het andere is dikker, door het losse celweefsel van het mesospermium. De raphe loopt als een fijn draadje, eerst langs den rand van het zaad, evenwijdig met of over de kern, vervolgens op eenigen afstand van denzelfden, buigt zich dan in eene ronde,

scherpe of ook wel in eene ecnigzins slingerende bogt om, en daalt weder naar de kern af. De kern wordt door een fijn vliesje, hetwelk uit een, door geslingerde cellen gevormd weefsel bestaat, omgeven. Dit tegmen is van boven geheel gesloten; de testa is daarentegen aan de micropyle open, zoodat er eene duidelijke trechtvormige opening tusschen de micropyle en het begin van de kern bestaat, die met eene menigte cellen is voorzien. Binnen het tegmen toonen de nog onrijpe zaden een fijn vliesje, zonder eenig duidelijk celweefsel, waarin de kiem, aan het naar de micropyle gelegen einde, zich begint te vormen.

### III. CRATOXYLON HORNSCHUCHII. BL.

C. foliis ovatis acuminatis basi obtusis utrinque glabris, squamulis obtusis cucullatis.

ARBOR speciosa; TRUNCUS rectus, cortice fusco; CORONA pyramidalis, foliosa. RAMI in angulo 45° patentes, teretes, glabri, cinerei vel fusco-cinerei; RAMULI tetragoni, compressi, apicem versus ancipites, glabri. GEMMAE pyramidales, glabrae, foliolis duobus oppositis. FOLIA decussata, patentia, ovata vel clongato-ovata, acuminata, basi obtusa saepe biauriculata, integerrima, utrinque glabra, coriacea, 0,08 longa, 0,035 lata, nervis primariis fere horizontalibus, — secundariis reticulatis; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,003 longi. FLORES axillares vel terminales, paniculati vel ramoso-paniculati, umbellulati; PEDUNCULUS COMMUNIS anceps, glaber; PEDUNCULI PARTIALES subteretes, glabri; BRACTEAE rudimentares, tuberculatae vel squamulatae, acutae. CALYX pentasepalus, persistens, aestivatione quincunciali; SEPALA biserialia: duobus in serie interiore et tribus in serie exteriori, recta, subaequalia, ovalia, obtusa, concava, extus subcarinata, utrinque glabra. COROLLA pentapetala, aestivatione subconvoluta; PETALA subaequalia, oblique ovalia, obtusiuscula, utrinque glabra, nervis e basi proegredientibus apicem versus bifidis, glandulis linearibus inter nervos dispositis. STAMINA numerosa, hypogyna, in phalanges coalita; COLUMNAE staminum lineares, apicem versus vix latiores, glabrae; FILAMENTA extorsa, pluriserialia, in serie internâ linearia, in serie externa filiformia, glabra; ANTHERAE peltatae, oblongae, utrinque emarginatae, rimis longitudinalibus dehiscentes; POLLEN sphaericum, sacco unico auram emittente. SQUAMULAE 3, hypogynae, phalangibus staminum alternae, oblongae, obtusae, cucullatae, glabrae. OVARIIUM sessile, triangulato-pyramidale, aciebus obtusiusculis, lateribus subsulcatis, glabrum, triloculare; OVULA 4—8 in singulo loculo, placentae rotundatae basilari et axillari affixa, erecta, subcollateralia. STYLI 3, subteretes, glabri; STIGMATA 3, capituliformia, raro bifida. CAPSULA subovoïdea, obtuse triangulata, stylis persistentibus munita, glabra, coriacea, trilocularis, loculicide trivalvis, valvis in medio dissepimentum cartilagineum gerentibus. SEMINA 4—8 in singulo loculo, placentis basi dissepimenti accretis inserta, subcollateralia, erecta, oblique obovata, obtusa; TESTA altero tantum latere et apice nuclei in alam membranaceam protensa; TEGMEN tenue; HILUM approximatum micropylae; RAPHE marginalis, nucleo approximata, incrassata. NUCLEUS teres, utrinque acutus. EMBRYO erectus, rectus, dicotyledoneus.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA; et in sylvis montanis: JAVA.*

## TRIDESMIS FORMOSA. KHS.

T. foliis ellipticis vel ovalibus, floribus fasciculatis vel solitariis.

ARBOR 8—16 metrorum; RAMI patentes, subteretes, cinerascetes, glabri; RAMULI compressi, superne ancipites, glabri. GEMMAE elongato-pyramidatae, subulatae, glabrae, foliolis appositis. FOLIA decussata, patentia, elliptica in ramulis junioribus, ovalia vel oblongo-ovalia breviter acuminata basi angustata in ramulis adultioribus, subintegerrima, utrinque glabra, coriacea, oblonga, 0,035 lata, nervis primariis subhorizontalibus, nervis secundariis reticulatis, instante anthesi decidua; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,005 longi. FLORES axillares vel supra axillares, fasciculati, raro solitaires; PEDUNCULI subteretes, glabri. CALYX campanulatus, pentasepalus, aestivatione subimbricatâ; SEPALA biserialia, tribus in serie exteriori, duobus in serie interiori, subaequalia, oblongo-ovalia, obtusa, integerrima, extus subcarinata, utrinque glabra, persistentia. COROLLA pentapetala, aestivatione subconvolutâ; PETALA oblongo-ovalia, obtusa, basi unguiculata et squamulata, squamulis lingulatis truncatis, utrinque glabra, membranacea, nervis basi ortis. STAMINA numerosa, hypogyna, in phalanges tres coalita, squamulis alternantia; COLUMNAE staminum lineares, apicem versus paulo latiores, glabrae; FILAMENTA filiformia, glabra; ANTHERAE peltatae, oblongae, utrinque obtusae vel emarginatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. SQUAMULAE 3, hypogynae, triangulares, attenuatae, glabrae. OVARIUM sessile, elongato-pyramidale, obtuse triangulare, lateribus subsulcatis, glabrum, triloculare; OVULA numerosa, in axi loculi biseriata, adscendentia. STYLI 3, subteretes, glabri. STIGMATA 3, capitata. CAPSULA basi calyce cincta, elongato-ovoïdea, obscure triangularis, stylis persistentibus mucronata, subsulcata, sulcis senis, glabra, coriacea, trilocularis, loculicide trivalvis, valvis in medio dissepimentum subcoriaceum gerentibus intus glabris. SEMINA numerosa, biseriata in singulo loculo, placentis margini interiori dissepimenti adnatis affixa, compressa, oblique spathulata, obtusa; TESTA semialata, membranacea; MESOSPERMIUM laxè cellulosum; TEGMEN tenue; HILUM micropylae approximatum; RAPHE marginalis. NUCLEUS basilaris, marginalis, teres, utrinque acutus. EMBRYO erectus, rectus, utrinque obtusus.

*Crescit juxta Peinang, Doekoe: SUMATRA; ad ripas fluminis Doeson,  
in monte Pamatton: BORNEO.*

Explicatio Tabulae 37. Figurae speciei. 1. Alabastrum floris. 2. Flos expansus. 3. Petalum ab interiore. 4. Flos calyce et corollâ ablatis. 5. Ovarium, loculo uno dissecto. 6. Ovarii sectio horizontalis. 7. Capsula. 8. Capsula dehiscens, valvulâ unâ abscissâ. 9. Valvula ab interiore cum seminibus. 10. Valvula seminibus ablatis. 11. Semen. 12. Embryo.

Op Sumatra groeijen deze gewassen in de lagere streken. Vruchtdragend zijn zij in de nabijheid van Doekoe, in december verzameld, en bloeiend vonden wij hen in julij aan het zeestrand. Op Borneo namen wij hen waar langs de groote rivier, langs de kleinere rivieren, die uit het oosten vloeijen en in de Baritto uitmonden, en in de zuid-oostelijke bergachtige streken, tot op ongeveer 300 N. ellen boven het zeevlak. De voorwerpen van alle deze oorden hebben geen wezentlijk verschil. Die van Doekoe en van de oevers van het benedengedeelte van de Baritto-rivier, in de gunstigste standplaatsen groeiende, hebben de

grootste bladen. De vruchten van Doekoe en die van de Pamatton en Balaran zijn iets langer, dan de anderen; de zaden zijn in de eersten soms regelmatig ovaal, en in de laatsten scheef spadelvormig. — De in julij opgemerkte boomen waren bijna bladerloos — volgens zeggen der inlanders laten zij in mei de bladen vallen — doch door tallooze bloemen bedekt; hetgeen hen op bloeiende perzikenboomen deed gelijken. Aan de in het laatst van augustus, langs de Baritto, geziene boomen, vonden wij alleen opengesprongene vruchten, en de, in oktober en november, in de bergachtige oorden van Borneo waargenomene boomen, waren allen van nog geslotene vruchten voorzien. Zij waren dus bij de eerste, langs de rivier groeiende, een drietal maanden ten achtere, vermoedelijk door de drooge en minder gunstige groeiplaats.

Deze boomen worden op Sumatra *Maron* genoemd. Vermoedelijk is deze naam van sanskritschen oorsprong en aan het wortelwoord, *mar*, dood, verwant; of is hij eene zamenstelling van *ma*, dood, en *roeh*, groeijen, bewegen. Het laatste komt mij het aannemelijkste voor en doet ons de inlanders als trouwe waarnemers der natuur kennen, die in de woorden een afbeeldsel der voorstellingen geven. De boom, welken zij als dood en bewegend voorstellen, behoort tot de weinige, die alle bladeren verliezen, daarna met tallooze bloemen bedekt worden en later eenen nieuwen bladtooi verkrijgen.

---



BIJDRAGEN TOT DE GESLACHTEN

# SALACIA EN HIPPOCRATEA,

DOOR

P. W. KORTHALS.



De geslachten *Salacia* en *Hippocratea* zijn, door houding en groeiwijze, zeer gelijkvormig. Hunne bloeiwijze, hoewel in het wezen overeenstemmende, kan echter als toevallig kenmerk ter onderscheiding der bloeiende voorwerpen dienen: *Salacia* heeft de bloemen meestal op korte, zaamgedrongene bloemstelen vereenigd; *Hippocratea* in pluimen. Een beter kenmerk, dat reeds als van groote waarde door de Heeren Wight en Arnott is opgegeven, ter onderscheiding der bloeiende voorwerpen, leveren de eitjes. Deze zijn bij *Salacia* boven elkander gezeten, meestal paarsgewijze in ieder hokje, en bij *Hippocratea* op den bodem van ieder hokje naast elkander vastgehecht.



SALACIA. L., WIGHT EN ARNOTT.

Dit geslacht is, volgens de opgave van de Heeren Wight en Arnott; alleen in Afrika en Azië gevonden. De *Salacia oblonga* Wall. zal, vermoedelijk wel als een eigen geslacht, van hetzelfde moeten worden afgezonderd.



## I. SALACIA POLYANTHA. KHS.

S. foliis ovalibus obtuse acuminatis basi acutiusculis obtuse serratis, pedunculis unifloris aggregatis, floribus triandris.

FRUTEX scandens; RAMI subteretes, glabri, subverrucosi, pulvinati; RAMULI alterni, suboppositi vel ad ramorum apices verticellati, subpatentes, basi subteretes, apicem versus triangulares, glabri, verruculosi; verruculis albidis, badii. FOLIA ovalia, raro ovata, obtuse acuminata, in quibusdam acutiuscula, basi acutiuscula, breviter angustata, obtuse serrata, serraturis approximatis subaequalibus, utrinque glabra, nitida, coriacea, 0,1 longa, 0,05 lata; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,005 longi. FLORES axillares, in pulvinis hemisphaericis, aggregati; PEDUNCULI uniflori, subteretes, glabri, 0,01 longi. CALYX pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatâ; SEPALA patentia, subaequalia, ovalia, obtusa, glabra. COROLLA pentapetala, hypogyna, rotata, aestivatione subimbricata; PETALA rotundato-ovalia, obtusa, utrinque glabra, medio disci carnosam margine submembranacea, 0,002 longa. DISCUS perigynus annulariformis, carnosus, glaber. STAMINA 3; FILAMENTA medio vel basin versus partis interioris disci affixa, linearia, inferne latiora, glabra, foecundatione peractâ reflexa; ANTHERAE peltatae, immobiles, oblongae, subquadrilobae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. OVARIVM sessile, hemisphaericum, subtrilobum, in stylum attenuatum, glabrum, triloculare. OVULA bina, in axi loculi superimposita: altero descendente, altero adscendente. STYLUS brevis, triangularis; STIGMA capitatum, subtrilobum. FRUCTUS solitarius, globosus, baccatus, glaber, abortu 1—3 spermus. SEMINA immatura, difformia, rotunda vel ovoïdea; ARILLUS carnosus; TESTA crustacea; TEGMEN subcoriaceum. NUCLEUS deest.

*Crescit juxta Martapoera, Poeloe-lampeï, in monte Pamatton: BORNEO.*

## II. SALACIA OVALIS. KHS.

S. foliis oblongo-ovalibus breviter et obtuse acuminatis, basi acutis, subintegerrimis, pedunculis aggregatis unifloris, floribus triandris.

FRUTEX scandens; RAMI subteretes, glabri, verrucosi, cinerei; RAMULI compressi, bisulcati, glabri. FOLIA patentia, subopposita, oblongo-ovalia, breviter et obtuse acuminata, basi acuta, subintegerrima, utrinque glabra, coriacea; 0,09 longa, 0,04 lata, nervis primariis patentibus distantibus; PETIOLI subteretes, glabri, 0,007 longi. FLORES axillares, in pulvinos hemisphaericos dense aggregati; PEDUNCULI uniflori, filiformes, glabri, 0,01 longi. CALYX rotatus, pentasepalus, persistens; SEPALA late rotundata, obtusissima vel submarginata, subciliolata, glabra. COROLLA rotata, pentapetala, glabra; PETALA late obovato-rotundata, septemnervia. DISCUS perigynus, peltiformis, subquingularis, glaber. STAMINA 3; FILAMENTA in parte interiore disci affixa, lamelliformia, basin versus dilatata, glabra; ANTHERAE peltatae, oblongae, subquadrilobae, longitudinaliter dehiscentes. OVARIVM sessile, breve pyramidale triangulare, glabrum, triloculare. OVULA geminata, rarius solitaria in singulo loculo, axillaria, superimposita: altero adscendente, altero descendente, solitario descendente. STYLUS brevis; STIGMA subtrilobum. FRUCTUS longe pedunculatus, pisiformis, glaber.

*Crescit prope Tjikao: JAVA.*

## III. SALACIA KALAHIENSIS. KHS.

S. foliis ellipticis acuminatis basi acutis serratis, pedunculis unifloris aggregatis, floribus triandris.

FRUTEX scandens; RAMI horizontales, obsolete tetragonales, glabri, lenticellis verrucosis albis muniti, fusci; RAMULI obtuse tetragonales, apicem versus compressi, glabri, cinerei. FOLIA subhorizontalia, subopposita, elliptica, saepe late ovalia, obtuse acuminata, basi acuta, serrata, serraturis distantibus obtusis, utrinque glabra, coriacea, 0,08 longa, 0,045 lata, nervis primariis patentibus. FLORES axillares, aggregati; PEDUNCULI uniflori, filiformes, glabri, 0,01 longi. CALYX rotatus, pentasepalus; SEPALA subrotunda, obtusiuscula, utrinque glabra. COROLLA subcampanulata, pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA hypogyna, ovalia, obtusiuscula, integerrima, utrinque glabra. DISCUS perigynus, annuliformis, utrinque attenuatus, glaber. STAMINA 3; FILAMENTA in parte interiore et superiore disci affixa, linearia, glabra, erecta, foecundatione peractâ reflexa; ANTHERAE peltatae, extrossae, oblongae, subquadrilobae, longitudinaliter dehiscentes. OVARIUM stipitatum, triangulato-pyramidale, glabrum, triloculare. OVULA in singulo loculo geminata, raro solitaria, axillaria, superimposita, approximativim inserta: superiore ascendente, inferiore descendente. STYLUS brevis; STIGMA capitatum, trilobum. FRUCTUS substipitatus, globosus, glaber, trilocularis, abortu unilocularis. SEMINA descendente, plura vel solitaria, multiformia, saepe subglobosa; ARILLUS succosus; TESTA crustacea, fusca; TEGMEN subcoriaceum; HILUM micropylae approximatum. NUCLEUS conformis, exalbuminosus; COTYLEDONES hemisphaericae, conglutinatae; EMBRYO pyriformis; RADICULA teres, obtusa; GEMMULA subrotunda.

*Crescit ad lacum Kalahiën: BORNEO.*

Explicatio Tabulae 38. Figura speciei. 1. Alabastrum floris. 2. Flos expansus. 3. Flos, calyce et corollâ ablati. 4. Petalum revolutum. 5. Stamen. 6. Anthera dehiscentis. 7. Ovarium longitudinaliter dissectum. 8. Ovarii transversa sectio. 9. Ovulum. 10. Fructus. 11. Fructus longitudinaliter sectus, semine demto. 12. Semen a latere. 13. Semen cum parte dissepimenti. 14. *a.* Hilum, *b.* micropyla. 15. Semen longitudinaliter sectum. 16. Vasa raphis: *c.* vasa exteriora, *d.* vas interius.

## IV. SALACIA EXSCULPTA. KHS.

S. foliis oblongo-ovalibus obtuse acuminatis basi acutiusculis integerrimis vel obsolete serratis, pedunculis unifloris aggregatis, floribus triandris, latere disci exsculpto.

*Crescit in monte Singalang: SUMATRA.*

Deze plant is door haar aanzien en hare groeiwijze zeer verwant aan *S. Kalahiensis*. Hare takjes zijn witter, soms geel-wit; de bladen kunnen in hunne gedaante nauwelijks onderscheiden worden; zij hebben meestal ongezaagde randen. In de bloeiwijze neemt men eenig verschil in de lengte der bloemsteeltjes waar, zijnde die van *S. exsculpta* eenigermate korter. De kelkbladen zijn soms een weinig puntiger; de bloembladen hebben eene meer regelmatige, ovale gedaante. De discus levert echter van al de deelen het voornaamste verschil op. Hij bestaat bij deze soort uit eenen breeden ring,

die van boven eene kleine groeve heeft en in den omtrek eene breedte, doch niet zeer diepe voor bezit. Deze afwijking van den discus der *S. Kalahiensis* heeft mij de beide planten doen scheiden. Zij is, wel is waar, van een niet zeer aanzienlijk orgaan, doch in dit geslacht van een, in de verschillende soorten niet zeer veranderlijk deel der bloem genomen. Bij dit verschil voegt de vrucht, wanneer zij bekend wordt, welligt nog andere kenmerken ter onderscheiding.

#### V. SALACIA PRINOÏDES. DE CANDOLLE.

*S. foliis ellipticis obtuse acuminatis basi angustatis serratis, pedunculis unifloris aggregatis, floribus triandris, disco superne attenuato.*

*Colligitur juxta Santjan: JAVA; juxta Peinang: SUMATRA.*

De voorwerpen, welke door mij zijn waargenomen, komen met de beschrijvingen van Tonsella of *Salacia prinoïdes* zóózeer overeen, dat ik niet aarzel, hen onder dien naam te brengen. Deze soort behoort dus onder de, aan het vasteland van Indië en aan den Archipel gemeenschappelijk eigen zijnde gewassen. Op de laatste groeiplaatsen is zij, tot nu toe, alleen aan de westelijke en zuidelijke stranden waargenomen, en op de eerste groeit zij op de bergen en aan het strand. Volgens de opgave van de Heeren Wight en Arnott wordt deze plant in de Tamoultaal *Kadelanchi* genoemd, en aan het zuiderstrand van Java noemen de inlanders haar *Mata-Kantjil*. De laatste benaming toont aan, dat de inlanders tusschen deze plant en de oogen van den Kantjil (*Moschus javanicus*), eenige overeenkomst vonden, en de andere, *Kadelanchi*, welke de oogen of het heldere van den Kadala (vermoedelijk *Moschus napoe*) beteekent, wijst op eene soortgelijke verbinding van denkbelden. Van deze diertjes, welke in de lommerrijke bosschen, waar de *Salacia prinoïdes* groeit, rondzwerven, zijn waarschijnlijk de groote oogen, met de heldere of geel-oranjekleurige vruchten onzer plant, die in donkere bosschen zeer spoedig in het gezigt vallen, vergeleken geworden.

Gedurende den droogen tijd bloeijen deze planten, en ongeveer zeven tot acht maanden later dragen zij rijpe vruchten.

#### VI. SALACIA MACROCARPA. KHS.

*S. foliis ovali-oblongis mucronulato-acutis basi obtusis subserratis, pedunculis breviter racemosis multifloris raro unifloris, floribus triandris, disco pelviformi.*

**FRUTEX** scandens; **RAMI** subhorizontales, obtuse quadrangulares, fusci; **RAMULI** subhorizontales, quadrangulares, angulis obtusis, saepe octies sulcati, tuberculati, glabri, fusci. **FOLIA** subopposita, ovali-oblonga, raro ovata, mucronulato-acuta, basi obtusa, subserrata, serraturis obtusis, utrinque glabra, 0,13 longa, 0,04 lata, coriacea, nervis primariis patentibus distantibus; **PETIOLI** subteretes, supra sulcati, glabri, 0,005 longi. **FLORES** axillares, racemosi, racemo 6—10 floro, vel solitaires;

PEDUNCULUS et PEDICELLI glabri, demum incrassati. CALYX 4—5 sepalus; SEPALA rotundata, obtusissima, saepe fimbriata, utrinque glabra. COROLLA rotata, pentapetala, aestivatione imbricata; PETALA suborbiculata, basi unguiculata, utrinque glabra, disco carnosae, margine membranacea. DISCUS pelviformis, glaber, coriaceus. STAMINA 3; FILAMENTA disci parti interna affixa, lamelliformia, basi dilatata approximata, cupulam mentientia, glabra; ANTHERAEL peltatae, extrorsae, oblongae, in longitudine dehiscentes. OVARIVM trigono-pyramidatum, obtusangulum, glabrum, triloeulare. OVULA in singulo loculo geminata, axillaria, superimposita. STYLUS brevis; STIGMA capitatum. FRUCTUS subglobosus, 1—3 locularis: loculis mono- vel dispermis. SEMINA multiformia, rotundata vel angulata; ARILLUS tenuis; TESTA crustacea; TEGMEN coriaceum.

*Crescit juxta Martapoera, Poeloe-lampeï: BORNEO.*

De gedroogde takjes dezer plant hebben eene geel-groene kleur, hetgeen hun het aanzien der *Symplococae* geeft. De discus omringt, in den vorm van een bekken, het vruchtbeginsel, heeft den buitenrand bijna gaaf en den binnenrand tegen het vruchtbeginsel opgebogen. Zijne zelfstandigheid is lederachtig, bruin gekleurd. Aan de binnenzijde van den omgebogen rand zijn de helmraden vastgehecht, die zóó breed zijn, dat zij een' driehoekigen ring onder het vruchtbeginsel vormen. De helmknopjes zijn, vóór de opening der bloem, op den stempel gelegerd, openen zich kort vóór de ontsluiting der bloembladen, en buigen zich daarna buitenwaarts. De testa is, als bij de andere soorten, tamelijk dik en broos. Zij bedekt een mesospermium, waarin eene menigte draden tusschen het celweefsel zijn verspreid. Het tegmen is lederachtig, van buiten ruw, door het zaamgegroeide mesospermium, aan de binnenzijde glad. Door de kleur der bladen en den vorm van den discus is deze soort van de andere, door mij onderzochte, te onderscheiden, en misschien zullen meerdere voorwerpen en rijpere vruchten haar later tot grondvorm eener eigene onderafdeeling maken.

## HIPPOCRATEA. L.

De Indische soorten van het geslacht *Hippocratea* zouden in twee natuurlijke groepen kunnen worden gesplitst, van welke de eene de soorten konde bevatten, die de kern aan den voet van het zaad, en de andere, die de kern aan den top van het zaad hebben. De overeenstemming dezer soorten met de Amerikaansche, is mij geene bewezene daadzaak; zij kan door hen, welke talrijke voorwerpen van de nieuwe-wereld bezitten, buiten twijfel worden gesteld.

### I. HIPPOCRATEA INDICA. WILLD.

H. carpellis oblongis utrinque obtusis, paniculis corymbosis dichotomis, foliis ellipticis acuminatis serratis vel integerrimis.

*Crescit in parte occidentali JAVAEL.*

Deze plant groeit in het wild als eene slingerplant, doch in den tuin te Buitenzorg heb ik haar als een klein struikje gezien. Zij wordt door de Sundanezen *Aroi-mengander* of *mangender* genoemd: waardoor

hare slingerende groeiwijze aangetoond en eene der eigenschappen van de bloeiende plant wordt kenbaar gemaakt. Het woord *mengander*, de Sanskritsche woorden *men* (achten, eeren) en *gandha* (ruiken) herinnerende, kan zeer goed door welriekend worden vertaald.

De voorwerpen van Java bezitten, even als de Heeren Wight en Arnott aan hunne, op het vasteland verzamelde planten hebben opgemerkt, bladen met gave en met gezaagde randen. Zij verschillen niet van de bloeiende voorwerpen van het vasteland, in het Rijks-Herbarium aanwezig. Dit heeft mij hen onder den genoemden soortnaam doen opgeven.

## II. HIPPOCRATEA GLAGA. KHS.

*H. carpellis oblongo-obovatis retusis, corymbis dichotomis, foliis ovalibus acuminatis.*

FRUTEX scandens; RAMI teretes, transverse rimati, cinerei glabri, saepe uncinato-recurvi; RAMULI patentes, alterni vel suboppositi, obscure quadrangulares, in foliorum insertione nodosi, apicem versus compressi, pubescentes, fusci, novelli fusco-cinerci. FOLIA subhorizontalia, opposita vel subopposita, ovalia vel oblongo-ovalia, raro oblongo-ovata, acuminata, basi angustata, raro obtusiuscula, integerrima, interdum obsolete crenulata, utrinque glabra, subtus nitida, 0,11 longa, 0,055 lata, nervis primariis patentibus, distantibus, nervis secundariis subparallelis; PETIOLI subteretes, superne sulcati, pubescentes, 0,015 longi. FLORES axillares, dichotomo-corymbosi; PEDUNCULUS COMMUNIS compressus, subsulcatus, glaber; PEDUNCULI PARTIALES semi-teretes, supra sulcati; PEDICELLI obscure quadrangulares, glabri, saepe brevissimi; BRACTEAE ovatae, acutae, basi concavae, glabrae, minutae. CALYX campanulatus, pentasepalus; SEPALA ovata, acutiuscula, utrinque glabra. COROLLA campanulata, pentapetala, aestivatione imbricata; PETALA obovata vel ovalia, obtusa, intus pubescentia, extus glabra. DISCUS subhypogynus, peltiformis, margine quinquedentatus, extus intusque glaber. STAMINA 3; FILAMENTA parti interiori disci affixa, lamelliformia, versus apicem et basin dilatata, glabra; ANTHERAE peltatae, oblongae, longitudinaliter dehiscentes. OVARIVM sessile, hemisphaericum, subtrilobum, glabrum, triloculare. OVULA 4—8, axi interni loculi ad basin affixa, erecta, subcollateralia. STYLUS brevis, glaber; STIGMA trilobum. CAPSULAE 3, abortu pauciores, basi approximatae, oblongo-obovatae, retusae vel emarginatae, striatae, glabrae, uniloculares, in medio lateris dehiscentes, bivalves, valvis carinatis. SEMINA 4—8 in singula capsula, placentis axillaribus basilaribus compressis affixa, collateralia, erecta, compressa, oblonga, apice recurva, glabra; TESTA membranacea, versus basin seminis, in alam expansa; MESOSPERMIUM cellulare; TEGMEN membranaceum. HILUM micropylae approximatum. RAPHE per medium expansionis alaeformis ad verticem seminis procurrens. NUCLEUS in vertice seminis compresse ellipsoideus, subexalbuminosus. EMBRYO compressus, oblongus; COTYLEDONES planae, obtusae; RADICULA teres, obtusa, brevis.

*Crescit in monte Salak: JAVA.*

Explicatio Tabulae 40. Figura Hippocrateae glagae. 1. Flos. 2. Petalum unicum ab interiore. 3. Flos, ealyce et corollâ ablatâ. 4. Ovarium cum disco. 5. Ovarium longitudinaliter dissectum. 6. Ovulum valde auctum. 7. Capsula dehiscentis. 8. Semina cum parte placentae. 9. Semen. 10. Semen longitudinaliter dissectum, *d.* raphe, *f.* mesospermium, *g.* tegmen, *i.* cavitas nuclei. 11. Sectio transversalis apicis seminis, *d.* raphe, *e.* testa, *g.* tegmen, *i.* cavitas, *h.* embryo. 12. Embryo.

### III. HIPPOCRATEA MACRANTHA. KHS.

H. carpellis ovalibus obtusis, corymbis dichotomis, foliis oblongo-ovalibus obtuse acuminatis vel acutis integerrimis.

FRUTEX scandens; RAMI subhorizontales vel patentes, teretes, fusci, albo-striati, glabri; RAMULI subtetragoni versus apicem compresses tetragoni, nodosi, glabri. FOLIA subhorizontalia, opposita, oblongo-ovalia, saepe elliptica, obtuse acuminata vel acuta, basi obtusa vel angustata, integerrima, glabra, 0,13 longa, 0,05 lata, coriacea, nervis primariis patentibus, nervis secundariis reticulatis; PETIOLI in pulvinis inserti, semiteretes, supra subsulcati, glabri, 0,001 longi. STIPELLAE? subuliformes, parvae, caducae. FLORES axillares, dichotome corymbosi; PEDUNCULUS COMMUNIS compresses tetragonus, aciebus obtusis, glaber; PEDUNCULI PARTIALES compresses quadrangulares, subsulcati, pubescentes; PEDICELLI obtuse quadrangulares, pubescentes. BRACTEAE oppositae, ovatae, acutae, concavae, pubescentes. CALYX profunde quinquepartitus vel pentasepalus, glaber, persistens; SEPALA (lacinae) ovata, acutiuscula. COROLLA campanulata, pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA oblongo-ovata, acuta, integerrima, extus subcarinata, glabra, intus basi glabra, apicem versus pilosa. DISCUS hypogynus, quinqueangularis, basi glaber, apice hirsutus. STAMINA 3; FILAMENTA apici disci inserta, linearia, basi dilatata, glabra; ANTHERAE peltatae, oblongae, utrinque emarginatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. POLLEN sphaericum, subcancellatum. OVARIVM stipitatum, hemisphaericum, obscure trigonum, glabrum, triloculare. OVULA 4—8, basi axeos loculi in placentam productae affixa, subcollateralis, erecta, recta. STYLUS subteres, glaber; STIGMA punctiforme. CAPSULAE tres vel abortu pauciores, basi approximatae, subhorizontales, oblongo-ovales, obtusae, striatae, glabrae, uniloculares, bivalves, in medio lateris dehiscentes, valvis navicellatis acute carinatis. SEMINA 4—8 in singula capsula, in basi capsulae funiculis umbilicalibus linearibus brevibus affixa, crecta, ovato-oblonga, obtusiuscula, basi truncata; TESTA versus basin seminis alaeformis, subcoriacea; MESOSPERMIUM cellulosum; TEGMEN membranaceum; HILUM micropylae approximatum; RAPHE a basi seminis ad verticem procurrens. NUCLEUS in parte superiore seminis, oblongus, compressus, utrinque acutiusculus, exalbuminosus; COTYLEDONES planae; RADICULA teres.

*Crescit juxta Banjermassing: BORNEO.*

Explicatio Tabulae 39. Figura speciei. 1. Flos. 2. Petalum unicum ab interiore. 3. Flos, corollâ ablatâ. 4. Anthera nondum aperta. 5. Anthera dehiscentis, *a.* filamentum, *b.* connectivum, *c.* loculi. 6. Anthera dehiscentis posteriore. 7. Pollen. 8. Flos, corollâ ablatâ, longitudinaliter dissectus. 9. Ovarii locus unus longitudinaliter dissectus. 10. Ovula. 11. Capsulae immaturae pars cum seminibus immaturis. 12. Semina immatura cum parte placentae et funiculis umbilicalibus. 13. Capsula dehiscentis. 14. Pedunculi apex eum

calyce, disco et basi capsularum: A. stylus, B. epicarpium, C. mesocarpium, D. endocarpium, E. cavitas capsulae cum funiculis persistentibus. 15. Eadem organa. 16. Seminum duorum bases. 17. Semen immaturum longitudinaliter dissectum, nucleo ablato: *a.* hilum, *c.* micropyla. 18. Seminis basis: *a.* hilum, *b.* omphalodium, *c.* micropyla. 19, 20. Semina matura. 21. Seminis vertex: *d.* chalaza. 22. Seminis sectio transversalis: *d.* raphe, *e.* testa, *f.* mesospermium, *g.* tegmen, *h.* nucleus. 23. Sectio transversalis partis seminis inferioris. 24. Testae fragmentum.

#### IV. HIPPOCRATEA SALACIOIDES. KHS.

II. floribus paniculatis, foliis ovalibus acuminatis serrulatis.

FRUTEX scandens; RAMI subteretes, glabri, fusci; RAMULI teretiusculi, versus apicem compressi, in nodos dilatati, glabri. FOLIA opposita, patentia, ovalia vel rotundato-ovalia, breviter acuminata, basi acutiuscula, serrulata, utrinque glabra. FLORES axillares, paniculati; PEDUNCULUS COMMUNIS compressus, glaber; PEDUNCULI PARTIALES suboppositi, compressi, glabri; BRACTEAE ovatae, acutae, glabrae. CALYX profunde quinquepartitus, laciniis obtusis, glaber. COROLLA pentapetala, aestivatione imbricatâ; PETALA oblongo-obovata, obtusa, post anthesin recurva, glabra. DISCUS hypogynus, subpentagonus, subcarnosus, glaber. STAMINA 3; FILAMENTA basi partis interioris disci inserta, linearia, basi latiora, glabra; ANTHERAE basi affixae, biloculares, rimis transversalibus dehiscentes. OVARIUM sessile, subtrilobum, triloculare; OVULA bina in singulo loculo, basi loculi affixa, collateralia; STYLUS brevis, glaber; STIGMA capitellatum, trifidum.

*Crescit in sylvis montis Singalang: SUMATRA.*

Deze plant zal waarschijnlijk een nieuw geslacht moeten vormen, wanneer zij vruchtdragende wordt gevonden. Hare bloeiwijze wijkt geheel af van de andere, mij bekende soorten. Zij is daardoor nader vermaagschapt aan *Salacia*, doch door de plaatsing van de eitjes en de helmknopjes behoort zij bij *Hippocratea*.



OVER DE GESLACHTEN

# PRARAVINIA EN OMPHACARPUS,

DOOR

P. W. KORTHALS.



## PRARAVINIA. KHS.

**FLORES** monoici, raro hermaphroditi. **CALYX** superus, tubo brevi, limbo 4—6 partito. **COROLLA** aestivatione imbricatâ, tubo cylindrico, limbo 4—6 fido, erecto. **STAMINA** 8—12, infra faucem inserta; **FILAMENTA** brevissima; **ANTHERAE** basi affixae, connectivo producto. **OVARIUM** 8—10 locale, disco epigyno conico; **OVULA** numerosa, placentis carnosissimis affixa. **STYLUS** subteres; **STIGMA** 4—12 partitum. **BACCA** calycis limbo coronata, 8—10 locularis, mucilaginis impleta. **SEMINA** numerosa, placentis partitis carnosissimis inserta; **TESTA** crustacea, foveolata; **TEGMINA** membranacea. **EMBRYO** in medio albuminis carnosissimi, erectus.

**ARBUSCULA.** **FOLIA** opposita, petiolata. **STIPULAE** subintrapetiolares. **FLORES** axillares, bracteati.

Het geslacht *Praravinia* behoort tot de *Hamelieae* D. C. Door houding en kenmerken heeft het eenige gelijkheid met de geslachten *Axanthes* Bl. en *Urophyllum* Jack en Wallich. Het heeft de houding van het eerste geslacht, doch verschilt van hetzelfde door de bloeiwijze en vooral door de verdeling van de bloem en van de vrucht, beiden vijfvoudig in *Axanthes*. Volgens de beschrijving oordeelende, moet het door houding en bloeiwijze vrij gelijkvormig zijn met *Urophyllum*; doch van dit geslacht, even als *Axanthes*, door bloem en vrucht afwijken. Na deze natuurlijke verwantschap komt die tot *Alibertia* Rich. en *Schradera* Vahl, welke misschien wel op eene gelijkvormigheid van enkele kenmerken berust, in aanmerking. *Alibertia* heeft, even als *Praravinia*, de bloemen in de oksels en de beide geslachten in afzonderlijke bloemen, maar eene andere bloemverdeling; daarentegen bestaat de overeenkomst met *Schradera* in een gelijk getal bloemkroondeelen en helmdraden.

## PRARAVINIA DENSIFLORA. KHS.

P. foliis oblongis acuminatis, floribus axillaribus.

ARBUSCULA 2—6 metrorum; RAMI patentes, subteretes, glabri; RAMULI obtuse quadrangulares, sulcati, glabrati, — novelli compresse quadrangulares, sulcati, pilosi. FOLIA opposita, oblonga, saepe elliptico-lanceolata, acuminata, basi acuta, integerrima, utrinque glabra, — juniora utrinque pilosa, — subcoriacea, longa 0,16, lata 0,045; PETIOLI semiteretes, superne sulcati, pilosi vel glabrati, 0,015 longi. STIPULAE subintrafoliares, oblongo-lineares, acutae vel acutiuseulae, supra glabrae, subtus pilosae, membranaceae. FLORES axillares; MASCULI fasciculati, saepe 3—6 eongregati; FEMINEI solitares. BRACTEAE FLORUM MASCULORUM: *inferiores* calyciformes, verticillatim dispositae, verticillis binis, in verticillo inferiore ovatae eueullatae acutiuseulae utrinque pubescentes, in verticillo superiore duae inferiores suborbiculatae et duae superiores ovato-rotundatae utrinque pilosae, nervis e basi productis reticulatae; — *superiores* ovatae, obtusae, utrinque pilosae vel intus glabriusculae; — FLORUM FEMINEORUM: *inferiores* similes bracteis florum masculorum; — *superiores* duae, tubo calycis eum ovario connato affixae, suborbiculatae, utrinque dense pubescentes vel glabratae; PEDUNCULI subtetragoni, pilosi. FLOS MASCULUS. CALYX campanulatus, aestivatione imbricatâ; TUBUS brevissimus; LIMBUS 4—6 partitus: lacinae ovatae, obtusae, utrinque praecipue basi pilosae. COROLLA subcampanulata, intus extusque pilosa, aestivatione valvatâ; TUBUS cylindricus brevis; LIMBUS 4—6 partitum: lacinae rotundatae, breves. STAMINA 8—12, laciniis corollae alterna; FILAMENTA infra faucem corollae affixa, linearia, brevia, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongae, connectivo producto acuminatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. DISCUS epigynus, obtuse conicus, saepe sulcatus, glaber. STYLUS subteres, sulcatus, glaber; STIGMATA 4—12, reflexa vel patentia, acuta, in flore nondum explicato inflexa conniventia. FLOS FEMINEUS. CALYX dense pilosus, aestivatione imbricatâ; TUBUS ovatus, basi eum ovario connatus; LIMBUS 4—6 partitus: lacinae late ovatae, obtusae, reticulatim nervosae, persistentes, exerescentes. COROLLA subcampanulata, intus extusque pubescens, aestivatione valvata; TUBUS brevis; LIMBUS 4—6 partitus: lacinae rotundatae, breves. STAMINA 4—6, abortiva; laciniis corollae alterna; FILAMENTA brevia, glabra; ANTHERARUM rudimenta oblonga, acuminata. DISCUS epigynus, subhemisphaericus, subsulcatus. OVARIIUM 8—10 loculare; OVULA numerosa, placentis connatis eum dissepimentis et in singulo loculo binis affixa. STYLUS sulcatus, glaber; STIGMATA 4—10, radiata, ante floris explicationem reflexa et conniventia, acuta. FRUCTUS baccatus, subglobosus, calyce persistente exereto coronatus, pilosus, 8—10 locularis, mucilagine impletus, dissepimentis subeoriaceis. SEMINA numerosa, placentis ramosis carnosis coalitis affixa, subglobosa, foveolata; EPIDERMIS SEMINALIS tenuis; TESTA crustacea, sat crassa; TEGMEN membranaceum; HILUM approximatum micropylae, mammillatum. EMBRYO in medio albuminis, erectus, pyriformis.

*Crescit in monte Praravin, juxta Tangong Java: BORNEO.*

Explicatio Tabulae 41. Figura speciei. 1. Gemma floris. 2. Gemma floris adultior. 3 et 4. Calyces florum masculorum cum bracteis. 5. Flos femineus. 6. Corollae pars ab interiore. 7. Fructus. 8. Bractea calyciformes verticillares. 9. Pistilli rudimentum in flore masculo. 10. Idem longitudinaliter dissectum. 11. Ovarii sectio transversalis. 12. Pars ovarii transversaliter dissecti aucta. 13. Fructus longitudinaliter sectus.

14. Partis fructus transversalis sectio cum placentis coalitis admodum aucta. 15. Loculus unicus fructus longitudinaliter dissectus cum placenta dissecta. 16. Semen admodum auctum. 17. Semen longitudinaliter dissectum cum embryone integro.

Deze plant heeft, door hare groeiwijze, het voorkomen van de tot het geslacht *Axanthes* behoorende gewassen. Zij bezit, even als deze, de licht groene bladen op eenigen afstand van elkander verwijderd en, door dezen stand, zeer opene kroonen. Aan dezelve zijn de jonge bladen met haren bedekt, doch de oudere glad. Hare bloemen zijn in de oksels der bladen gezeten, gewoonlijk éénhuizig, met de beide geslachten op verschillende takken zoodanig geplaatst, dat het bovenste gedeelte der kroon de mannelijke bloemen draagt. Zij zitten geheel alleen, wanneer zij vrouwelijk zijn; doch van 3—6 vereenigd, zoo zij alleen de helmraden omsluiten. In beiden zijn aan den voet van den bloemsteel twee kelkjes, ieder uit vier schutblaadjes bestaande, waarmede de bloemen, vóór de ontwikkeling, omsloten worden. De helmknopjes der mannelijke bloemen hebben voornamelijk eene aanzienlijke uitgroeiing van den helmknoop, die bij de aanhechting der stuifmeelhokjes dik en aan het einde dezer puntig is. In de vrouwelijke bloemen zijn deze organen zelden volmaakt ontwikkeld; zij blijven hier meestal in dien staat, dat men de deelen kan onderscheiden; soms echter zijn zij alleen door kleine draadjes voorgesteld. De discus der mannelijke bloemen verschilt door zijne grootte en door zijnen vorm van dien der vrouwelijke, welke het vruchtbeginsel als een dun schijfje bedekt. Hij komt in de eerste onder de gedaante van een kegelvormig ligchaam voor, dat met den stijl is zaamgegroeid. De stempels van de bloemen der beide geslachten zijn tamelijk gelijkvormig. In beiden liggen hunne toppen, vóór de opening der bloem, binnenwaarts gebogen, en vormen zij dus een afgeknot kopje, even als bij *Axanthes*.

Het vruchtbeginsel heeft de twee placentae van ieder hokje met de tusschenwanden verbonden en van elkander gescheiden. In de vrucht zijn deze twee zamengegroeid en vormen zij een langwerpig, driehoekig, vleezig ligchaam, hetwelk door zaden bedekt is en daarenboven verscheidene zaden insluit. De vrucht, waarop gewoonlijk twee schutblaadjes, die de mannelijke bloem op den steel heeft, zijn gezeten, wordt door een taai slijm gevuld, hetwelk, naar het mij voorkomt, door een der vruchtdeelen wordt afgescheiden. In dit slijm toch heb ik geene bewerktuiging gevonden.

In de maand september zagen wij deze planten vruchtdragend, slechts enkele bloeiend. Zij groeiden in de nabijheid van de Doeson-rivier, langs den oever, en eenige ellen boven haar, op den berg Praravin.

## OMPHACARPUS. KHS.

CALYX hypogynus, pentasepalus, sepalis linearibus, intus coloratis, aestivatione valvatis apice induplicativis. COROLLA pentapetala, petalis hypogynis, calyce multo brevioribus, basi intus glandulâ instructis. STAMINA numerosa, in apice dilatato stipitis inserta; FILAMENTA filiformia, libera; ANTHERAE basi affixae, longitudinaliter dehiscentes. OVARIIUM in apice stipitis insertum, bi-triloculare; OVULA gemina vel terna, in axi loculi superimposita, adscendentia. STYLUS simplex; STIGMA truncatum. FRUCTUS baecatus, abortu unilocularis, monospermus, sarcocarpio fibroso, endocarpio coriaceo. SEMEN solitare; SPERMODERMIS membranacea. ALBUMEN periphaericum. EMBRYO rectus in albumine, erectus; RADICULA cylindricâ; COTYLEDONIBUS planis, foliaceis.

ARBUSCULAE pube stellatâ. FOLIA alterna, integerrima. STIPULAE geminae. FLORES axillares vel terminales, paniculati, umbellulati, umbellulis involucrentis.

Dit geslacht bevat struiken, die soms, wanneer zij gedrongen staan, tot kleine boomen uitgroeijen. Zij hebben in beide gevallen ijle kroonen en de bladen en bloemen naar het einde der takken geplaatst. Een stervormig hair bekleedt hunne jonge deelen, hetwelk, bij het ouder worden, langzamerhand afvallende, eerst van de vlakke der bladen en vervolgens van de nerven verdwijnt. De bloembladen en het vruchtbeginsel zijn met enkelvoudige haren bedekt. Deze soort van haren vormt eenen krans om den verbreedten top van den steel, die de helmdraden en het vruchtbeginsel draagt. Op de vrucht van *Omphacarpus* zijn de enkelvoudige haren verdwenen en stervormige in hunne plaats ontstaan. In hunne plaats meen ik, volgens door mij gedane waarnemingen, te mogen zeggen, want de sterren der vruchten zijn vlak en hebben in het midden een rond knopje, het overblijfsel van dit enkelvoudige hair, en op jongere vruchten soms dit hair zelf. Het vruchtbeginsel, zeer jong zijnde, toont duidelijk verscheidene regelmatige hokjes aan, doch, bij het uitgroeijen, laat het weldra slechts één hokje zien, terwijl de andere alleen door genoegzame vergrooting te herkennen zijn. In dit eenige uitgroeijende hokje verwijderen zich de eitjes van elkander, groeit het benedenste gewoonlijk tot zaad uit, en wordt dus het overblijvende eitje, in de rijpe vrucht, in het boveneinde van het hokje gevonden.

Dit geslacht is zeer na verwant aan *Grewia*, van welke het, zoo *Grewia* in den uitgebreidsten zin genomen wordt, eene afdeeling zou wezen. Het behoort dicht bij *Microcos*, hetgeen door de zamenstelling der vrucht genoegzaam onderscheiden kan worden.

Het zuur der vruchten, hetwelk dat der tamarinden evenaart, heeft mij den naam doen kiezen, onder welken het geslacht beschreven wordt.

## I. OMPHACARPUS OPACUS. KHS.

O. foliis oblongo-ovalibus breviter acuminatis, stipulis lineari-lanceolatis, fructibus obovoïdeis opacis.

ARBUSCULA 2—3 metrorum, coronâ apertâ; RAMI alterni, patentes, teretes, glabri, cinerei; RAMULI patentes, teretes, — novelli compressiusculi, dense hirsuti, hirsutie stellata. GEMMAE axillares, solitariae, sessiles, compressae, obtusae, hirsutae. FOLIA distantia, alterna, oblongo-ovalia, rariter oblongo-obovata, saepe obliqua, breviter et obtuse acuminata, quaedam acutiuscula, basi obtusa vel altero latere obtusa altero angustata, integerrima, supra glabra et in nervo medio hirsuta, subtus dense hirsuta, pilis stellatis, 0,13 longa, 0,06 lata, nervis primariis paucis 10, patentibus apicem versus incurvis, nervis secundariis subparallelis; PETIOLI semiteretes, dense hirsuti, 0,01 longi. STIPULAE intrapetiolares, lineari-lanceolatae, acutae, utrinque hirsutae. FLORES corymboso-paniculati, terminales; PEDUNCULUS COMMUNIS subteres, dense hirsutus; PEDUNCULI PARTIALES alterni, subteretes, hirsuti; PEDICELLI terni vel quaterni, umbellulati, subteretes, breves, dense hirsuti; BRACTEAE bifformes; majores florem involucentes rotundato-ovatae, indivisae, acutae vel bi-tridentatae; minores oblongo-obovatae, acutae, utrinque hirsutae; BRACTEOLAE saepe quaedam filiformes vel lineares, hirsutae. ALABASTRUM obovoïdeum, quinquangulare, hirsutum. CALYX hypogynus, campanulatus, pentasepalus, aestivatione valvatâ apice induplicativâ; SEPALA linearia, apice obtusiuscula et cucullata, intus glabra, colorata, extus dense hirsuta. COROLLA pentapetala, brevis; PETALA oblongo-linearia, breviter acuminata, extus dense hirsuta, intus glabra et basi glandulâ minutâ instructa. STAMINA numerosa, uniserialia, apici hirsuto stipitis quinquangularis glabri inserta; FILAMENTA filiformia, glabra; ANTHERAE basi affixae, bilobae, connectivo apiculato. OVARIVM apici stipitis insertum, ovoïdeum, hirsutum, bi-triloculare, loculis biovulatis; OVULA angulo centrali affixa, adscendentia, superimposita; STYLUS teres, glaber; STIGMA truncatum, papillatum. FRUCTUS baccatus, obovoïdeus, glaber, opacus, abortu unilocularis, pericarpio pergamenotenui, sarcocarpio succulento fibroso, endocarpio coriaceo tenui. SEMEN solitarium, compresso-ovoïdeum, glabrum; TESTA membranacea; TEGMEN membranaceum. ALBUMEN periphaericum, carnosum. EMBRYO erectus, rectus; COTYLEDONES oblongae, obtusae, basi subcordatae; RADICULA teres, obtusa.

*Crescit in sylvis montis Sakoembang: BORNEO.*

## II. OMPHACARPUS HIRSUTUS. KHS.

O. foliis ovalibus vel ovatis, stipulis tripartitis, fructibus obovatis hirsutis.

ARBUSCULA 2—6 metrorum, coronâ apertâ; RAMI patentes, teretes, striati, glabri, nigrescentes; RAMULI alterni vel in apice ramorum oppositi aut verticillati, subteretes, dense hirsuti. GEMMAE axillares, sessiles, compresso-ovoïdeae, hirsutae. FOLIA alterna, ovata vel ovalia, acuta vel acuminata, saepe mucronulata, basi obtusa, integerrima, supra glabra, nervo mediano hirsuta vel glabrescentia, subtus in nervis hirsuta, hirsutie stellata, subcoriacea, 0,06 lata, 0,15 longa, nervis primariis patentibus, nervis secundariis parallelis; PETIOLI semiteretes, hirsuti, 0,01 longi. STIPULAE intrapetiolares, obconicae, tripartitae: laciniae inaequales acutae, utrinque pubescentes. FLORES axillares vel terminales, corym-

boso-paniculati, umbellulati, terni vel quaterni; PEDUNCULUS COMMUNIS, PEDUNCULI PARTIALES et PEDICELLI subteretes, hirsuti. BRACTEAE bifformes, ovaes acutae vel oblongo-obovales saepe falcatae acutae, utrinque hirsutae, involuerum mentientes. CALYX hypogynus, pentasepalus, aestivatione valvatâ apice induplicativâ; SEPALA erecta, linearia, obtusiuseula, apice incurva, margine inflexa, intus glabra, colorata, extus dense hirsuta. COROLLA pentapetala; PETALA lineari-oblonga, basi latiora, obtusiuseula, extus hirsuta, intus ad basin uni-biglandulosa, tertiam partem sepali adaequantia. STAMINA numerosa, uniserialia, apice dilatato eiliato stipitis quinquangularis glabri inserta; FILAMENTA linearia, glabra; ANTHERAE basi affixae, didymae. OVARIVM apice stipitis insertum, rotundato-ovoideum, hirsutum, triloeulare; OVULA gemina ternave, axi anguli interni loculi affixa, superimposita; STYLUS teres, glaber; STIGMA truneatum. FRUCTUS subbaecatus, obovatus, hirsutus, uniloeularis, monospermus, pericarpio pergameno, sareocarpio subsieeo fibroso, endocarpio coriaceo. SEMEN ovoideum, glabrum; TESTA et TEGMEN membranacea. ALBUMEN corneo-carnosum, albidum. EMBRYO erectus, in medio albuminis rectus; COTYLEDONES ovaes, obtusae, basi cordatae, foliaceae; RADICULA teres, obtusiuseula.

*Crescit ad ripas fluminis Doeson: BORNEO.*

Explicatio Tabulae 42. Figura speciei. 1. Umbellula florum cum bracteis quibusdam. 2. Flos. 3. Alabastrum. 4. Flos, calyce ablato. 5. Stamen. 6. Petalum ab interiore. 7. Petalum ab exteriore. 8. Flos, calycis parte, corollâ et staminibus abscissis. 9. Ovarium longitudinaliter dissectum. 10. Ovarii sectio transversalis. 11. Fructus. 12. Endocarpium, caeteris partibus fructûs ablati. 13, 14, 15. Endocarpium. 16. Seminis sectio longitudinalis. 17. Embryo denudatus.

BIJDRAGEN TOT DE KENNIS

DER

# EIKEN VAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL,

DOOR

P. W. KORTHALS.



De eiken, welke het onderwerp dezer bijdragen uitmaken, hebben een zeer vershillend voorkomen. Zelden zijn zij door mij geheel alleenstaande, en dus zich geheel vrij ontwikkelende, waargenomen; doch, voor zooverre dit is kunnen gedaan worden en indien eene vergelijking der takken als bijkomend middel wordt gebruikt, blijft er geen twijfel, dat zij een' even zoo vershillenden indruk maken, als hunne akers in derzelve vormen onderscheiden zijn. Eenigen hebben niet zeer digte kroonen; de bladeren bevinden zich, bij het minste windje, in eene sidderende beweging en geven alsdan een kletterend geluid: *Q. argentata*; anderen hebben de kroonen met boven elkander liggende lagen van bladen, die, wanneer de zonnestralen op hen vallen, eenen zilverglans verkrijgen: *Q. Reinwardtii*; lommerrijk en tevens met wijd uitgestrekte takken komt *Q. induta* en anderen voor; door den vorm der bladen herinnert *Q. gemelliflora* de wilgen, doch door den groei en bloei der bladerlooze loten de *Q. robur*; ook de vorm van den laurier wordt zeer eigenaardig in *Q. omalokos* voorgesteld, die met digte kroonen, naar boven strevende twijgen en loten, en glanzend loof werd waargenomen.

De beschrevene soorten behooren alle tot de grootere boomen, en eenige verheffen zich, vooral in de bosschen, tot de aanmerkelijke hoogte van niet zelden dertig tot veertig meters. De stammen, welke van deze hoogte één of twee derden, ja, soms meer innemen, stijgen loodregt naar boven, hebben aan den voet dikwerf verscheidene scherp eindigende selijven, waardoor een afgekapte boom-

stronk de gedaante van eene ster en eenen bijna rolronden vorm, niet zelden van drie meters middellijn heeft. Zij zijn door eene grijze of grijs-bruine, dikke schors bedekt, die bij de meeste door diepe voren gedeeld is. Op de bergruggen en andere plaatsen, waar de boomen eenen meer onafhankelijken groei hebben en de kroonen niet naar het licht streven, bereiken de stammen deze buitengewone lengte niet. Zij hebben dan één vierde of één zesde van de lengte der boomen, en de kroonen nemen dan in hoogte, doch naar evenredigheid niet altijd in omvang, toe. De kroonen zijn halfrond of meer piramiedvormig. De eersten zijn aan *Q. oïdoearpa* enzv. eigen. Zij ontstaan door de verdeling van den hoofdstam in verscheidene takken en het onontwikkeld blijven van den middelknop: een verschijnsel, dat de loten reeds doen voorzien, die in mannelijke of in vrouwelijke bloemen eindigen. De piramiedvormige kroonen, welke de meeste soorten bezitten, hebben den stam doorgroeijende, en uit dezen ontwikkelen zich de zijtakken als stralen. De takken der eersten zijn gebogen, met de kniegewijze bogt naar beneden gerigt; die der anderen zijn regter en over het algemeen regelmatiger. Vooral naar het einde zijn zij in vele twijgen verdeeld, en ontwikkelen zich talrijke loten. De takken hebben gewoonlijk eene rolronde gedaante en zijn door eene grijze of bruin-grijze, meer of min met voren gegroefde schors bedekt. De jonge takken zijn hoekiger en de loten driehoekig, soms met snijdende kanten. Bij de meeste soorten zijn de laatste met eene digte, soms glanzige hairbekleding voorzien. De knoppen van eenige soorten: *Q. argentata* enzv., zijn gelijk aan die van *Q. robur*. Zij zijn naar het einde der loten zaamgehoopt, of staan alleen of paarsgewijze, soms in grooter getal, in de oksels der bladen. Hunne bedekking bestaat in kleine schubjes, die als dakpannen over elkander liggen, en onder deze bevinden zich de bladen en bloemen: de laatste meestal de benedenste ruimte innemende. De knoppen van de meeste soorten zijn in de oksels der bladen, zelden aan het einde der loten gezeten. Zij missen de gemelde schubvormige bedekking, en worden alleen door de nevenblaadjes omsloten. Bij de soorten, welke bedekte knoppen hebben, zijn de nevenblaadjes vliezig, doch vrij uitgebreid; bij de anderen zijn zij van eene vastere zelfstandigheid en kleiner. De bladen zijn in spiralen van drie tot zes om de takken geplaatst; bij *Q. argentata* zijn zij naar het einde in risten vereenigd; bij anderen, en wel bij de meesten, meer geregeld langs de takken verdeeld. Zelden zijn zij horizontaal, doch gewoonlijk meer of min naar boven gerigt. Zij worden door, dikwijls zeer lange bladstelen: *Q. oïdoearpa* enzv., gedragen en zijn door deze op de takken geleed, zoo als bij de zoo even genoemde soort, òf met dezelve zaamgegroeid: *Q. hystrix* enzv. In hunnen vorm overtreft de lengte altijd de breedte, en wordt nu een gave, dan een gezaagde rand waargenomen. De vlakke derzelve is bij de pas ontvouwde bladen dikwerf met eene bruine hairbekleding bedekt, die later vermindert, en bij vele soorten, alsmede op de oudere bladen geheel ontbreekt; of zij is door eene glanzige, harsaardige zelfstandigheid overtoegen, die wel vermindert, doch niet geheel verdwijnt. De zelfstandigheid der bladen is lederachtig, zelfs bij eenige soorten dik en vrij vast. Door haar loopen de gevederde nerven, die dikwerf, wanneer zij in dikte afneemt, als ribben uitsteken, en dus aan het blad een eigenaardig voorkomen geven.

De bloeiwijze is bij allen in katjes. Zij komt uit de oksels der bladen, of, door de onderdrukte ontwikkeling der hooger geplaatste bladen, uit de einden der loten, waar de katjes alleen, of in grooter getal vereenigd zijn. De *Q. turbinata* en de verwante soorten hebben de katjes met mannelijke bloemen nederhangende, de andere soorten regt opstaande. Zij zijn bij de laatste ongedeeld of in pluimen gedeeld.



De bloemstelen zijn bij de mannelijke bloemen der *Q. turbinata* zeer dun, bij de andere soorten dikker, zelden volmaakt rolrond, meestal hoekig, eenigermate gevoerd, en met langere of kortere haren bedekt. Met uitzondering van *Q. leptogyne*, welke tweeslachtige bezit, hebben al de andere soorten éénslachtige bloemen. Gewoonlijk is het bovenste gedeelte van het katje met mannelijke bloemen, en het benedenste met vrouwelijke bloemen bedekt; zelden zijn de vrouwelijke bloemen in het midden van het katje. Soms zijn echter alleen mannelijke bloemen aan de katjes, terwijl bij *Q. pruinosa* somwijlen, doch bij *Q. turbinata* en verwante soorten meest altijd vrouwelijke bloemen afgescheiden voorkomen. De mannelijke en vrouwelijke bloemen staan afzonderlijk, of in kleine hoopjes bij elkander, soms wel op eenen vleezigen steel, als waren zij ingegroeid. Zij hebben gewoonlijk drie schutblaadjes: een grooter, onder de bloem, en twee kleinere, bezijden de bloem (\*).

De mannelijke bloemen der *Q. turbinata*, enzv. hebben veel overeenkomst met die der *Q. pubescens*. Zij bestaan uit een vliezig bloembekleedsel, dat in vier tot zes slippen is gedeeld, uit zes tot twaalf helmdraden en een klein beginsel van een' stamper. Hare helmdraden zijn draadvormig, staan tegenover en tussehen de verdeelingen van het bloembekleedsel, en dragen de helmknopjes, die in de lengte openspringen en dan de ruggen der beide hokjes tegen elkander hebben. De mannelijke bloemen van *Q. hystrix*, enzv. hebben het bloembekleedsel eenigerwijze bekkenvormig, met vier of zes tanden, gewoonlijk acht tot twaalf helmdraden en een beginsel van stamper, hetwelk door eene, soms viltige, haarbekleding bedekt wordt. Behalve de genoemde drie, hebben de vrouwelijke bloemen soms nog meer schutblaadjes, waardoor zij als met een' krans omringd zijn. Zij bestaan uit een, boven het vruchtbeginsel vrij bloembekleedsel en uit de wezentlijke bloemdeelen. Het vruchtbeginsel is met het benedenste gedeelte van den kelk zaamgegroeid en van eenen meer of min regelmatigen ronden vorm, bezit drie hokjes, die bij verseheidene soorten behaard zijn. In ieder dezer hokjes zijn twee eitjes naast elkander, bijna op gelijke hoogte, in den middelhoek vastgehecht. Zij behooren door hunne ontwikkeling tot de Anatrophen. Boven het vruchtbeginsel zijn drie stijlen, zelden meer. Zij groeijen van het vruchtbeginsel af, geheel vrij uit, of blijven van daar, tot op zekere hoogte, vereenigd en verspreiden zich vervolgens wijd van elkander. Aan het einde, of aan de binnenzijde naar het einde der stijlen toe, zijn de stempels met kleine ronde holten of langwerpige groeven voorzien. Rondsom deze werktuigen bevindt zich het bloembekleedsel als een klokvormig ligchaam, met vier of zes seherpe of stompe tanden. In dit bloembekleedsel zijn dikwerf vier tot zes kleine ligehaampjes, onvruchtbare helmknopjes op korte steeltjes, en bij *Q. leptogyne* vruchtbare helmknopjes. De laatstbeschrevene wezentlijke bloemdeelen, benevens het hen omringende gedeelte van het vruchtbeginsel, ondergaan bij de ontwikkeling der vrucht weinig verandering; het benedenste gedeelte van het bekleedsel en het vruchtbeginsel vergroeijen daarentegen bijna geheel. Het benedenste gedeelte van het bekleedsel wordt bij de meeste soorten, door de meerdere uitgroeiing van het vruchtbeginsel, weldra van het bovenste afgescheurd, en vormt nu een bekleedsel rondsom een grooter of kleiner gedeelte van het vruchtbeginsel; bij andere, *Q. Blumeana*, vergroeit het zoodanig, dat het bloembekleedsel in den jeugdigen staat door hetzelfde als door eene klok omringd wordt. Dit benedenste gedeelte, met den naam *Cupula*, kuipje, bestempeld, komt ontwikkeld

(\*) *Q. robur*, *pubescens*, enzv. bezitten ook schutblaadjes.

onder verschillende vormen voor: bij de vruchten van *Q. encleisocarpa* bedekt het de akers geheel; die van *Q. Blumeana* zijn er bijna geheel door bekleed; bij andere soorten is een kleiner gedeelte van de akers door het kuipje omgeven en bij *Q. omalokos* is hetzelfde slechts eene platte schijf onder de akers. Van binnen is het kuipje glad of met eene zijdeardige haarbekleding bedekt. De buitenste oppervlakte is met uitstekende ringen: *Q. Ewyekii*, enzv.; met uitstekende randen: *Q. argentata*; of met stekels: *Q. hystrix*, voorzien. Het is bij de meeste soorten van eene harde, soms houtige zelfstandigheid, alleen bij *Q. encleisocarpa* papierachtig. Omtrent het wezen van hetzelfde verschil ik in gevoelen van diegenen, welke de cupula voor een eigen omhulsel of voor eene verzameling van sehutblaadjes houden, daar ik, na het onderzoek van de ontwikkeling der vrouwelijke bloemen, ook van *Q. pubescens*, het voor zeker houd, dat hetzelfde een uitgegroeid gedeelte van het benedenste des bloembekleedsels is, hetwelk gewoonlijk, niet altijd, zoo als *Q. encleisocarpa* leert, reeds zeer vroeg van het bovenste gedeelte wordt afgescheiden. — Het vruchtbeginsel is, korten tijd na de bevruchting, bij de meeste soorten, éénhokkig. In het bovenste van de holte zijn de tussehenwanden dan als uitstekende randjes zichtbaar, en in het benedenste komen zij als kleine plaatjes tusschen de eitjes voor. De uitgroeiing der eitjes is, in deze vruchtbeginsels, zeer onregelmatig. Door haar worden zij schijnbaar, wijl het gedeelte, waarin de kern ligt, eene overmatige vergrooting verkrijgt, homotropa. — De akers verschillen door hunnen vorm en grootte, en kunnen over het algemeen zeer wel ter onderscheiding der soorten dienen. Zij zijn schijfvormig, half kogelrond, kogelrond of eivormig, en hebben het bovenste gedeelte uitgehold, rond of puntig, en het benedenste gewoonlijk uitgehold, zelden rond. Hun pericarpium is lederachtig of kraakbeenig. Het sareocarpium van *Q. argentata*, enzv. is houtig, vast, niet zeer dik; bij *Q. omalokos*, enzv. bestaat het uit eene vezelige zelfstandigheid, die vooral aan de zijde der vrucht van eenigen omvang is; bij *Q. annulata* vormt hetzelfde het grootste gedeelte van de akers als eene losse, vezelige, door eelweefsel verbondene stof; in de akers van *Q. induta*, enzv. bestaat het uit eene korrelig-houtige en eene vezelige zelfstandigheid; in die van *Q. racemosa* is het in eenige holten verdeeld. Het endocarpium heeft bij *Q. omalokos*, enzv. eene zeer dichte haarbekleding; bij *Q. induta* eene bijna gladde oppervlakte, en bij *Q. argentata*, enzv. eenige zijdeardige haren. De holte der akers is soms door de uitgroeiing van het sareocarpium tot eene kleine ruimte bepaald. Zij is soms, bij *Q. racemosa* en *induta*, volmaakt driehokkig; doch ook bij deze onvolkomen driehokkig, door de te geringe uitgroeiing van de tussehenwanden. Bij anderen is zij éénhokkig, met uitstekende ribben in den omtrek en een klein zuiltje in het midden: *Q. Reinwardtii*, enzv.; en bij *Q. argentata* éénhokkig, soms met twee niet ontwikkelde, onvruchtbare hokjes. De zaaddrager is óf als een zuiltje in het midden van de holte der akers, óf langs den omtrek van dezelve, óf in het benedenste gedeelte van de holte. Hij heeft echter geenen vasten vorm en sehijnt door de ontwikkeling van het zaad bepaald te worden. — Bij de meeste soorten komt slechts één zaad tot rijpheid; bij *Q. induta*, *racemosa*, enzv. daarentegen soms drie tot zes. Het is bij *Q. argentata* in het benedenste gedeelte van de holte vastgehecht, heeft het hilum over de chalaza en de micropyla aan het andere uiteinde van het zaad. Bij de andere soorten is het hangende, met het hilum naast de micropyla. Het is bij *Q. racemosa*, *induta*, enzv. klein; bij de andere soorten vult het de holte van de vrucht en neemt het soms eenen kegelvorm aan, die den zaaddrager beneden als een klokje bedekt. Het zaadbekleedsel is dun, lederachtig. Door hetzelfde verspreiden zich de takken van de raphe, voornamelijk bij *Q. argentata*, enzv. op eene zeer zichtbare wijze.

De kern bestaat uit vleezige zaadlobben en eene peervormige kiem, die in eene holte der zaadlobben ligt.

De kieming van de waargenomene soorten vershilt niet van die der *Quereus robur*. Het einde van den aker splitst niet zelden in drie lappen. — Omtrent den tijd, welke van de kieming tot de eerste bloeiing verloopt, heb ik geene narigten. De meeste soorten zijn gedurende het geheele jaar met bladen bedekt, welke alleen bij *Q. argentata*, enzv. omstreeks den bloeitijd verloren gaan. Bij het uitgroeijen ondergaan de bladen dezelfde veranderingen, als die der ons omringende eiken; hunne ontvouwing begint met eene bruine of olijfbuine kleur, welke vervolgens in den groenen tint overgaat, aan de verschillende soorten eigen. De bloei heeft na en somwijlen ook even vóór den regentijd plaats, en van daar, tot aan de rijpwording der vruchten, verloopt gewoonlijk een tiental maanden.

Uit de voorafgaande beschrijving blijkt, dat de Indische eiken twee hoofdvormen bevatten, van welke de een aan *Q. robur* verwant is: *Q. argentata*, *Q. oïdoearpa*, *Q. lineata*, *Q. turbinata*, *Q. gemelliflora*; terwijl de ander hiervan geheel afwijkt. De laatste, gekenmerkt door bloeiwijze, vorm van knoppen, enzv. zoude onder twee groepen kunnen worden vereenigd: eene met kleine zaden: *Q. induta*, enzv.; de andere met grootere zaden en eene, gewoonlijk met dons bekleede vruchtholte: *Q. hystrix*, enzv.

De waargenomene soorten verspreiden zich van het zeestrand tot op 2700 N. ellen hoogte. Op Sumatra groeit de *Q. raemosa* op de zich tot zee uitstreckende voorgebergten en soms langs hunne, door de zee bespoeld wordende wanden. Op deze standplaatsen en in de alluviale streken om Doekoe werd *Q. oligoneura* gevonden. De andere soorten van dit eiland zijn door ons langs de bergketen op eene hoogte tusschen de drie honderd en duizend N. ellen verzameld en ééne in het gebergte Singalang. Zij vormden, vooral tusschen 400 en 600 N. ellen, een hoofddeel van het bosc, dat zij, als het ware, onder elkander verdeeld hadden. — Het zuid-oostelijk gedeelte van Borneo leverde ons verseheidene soorten. Wij vonden aldaar de *Q. Blumeana* langs de Doeson-rivier, tot dicht bij de streek, waar eb en vloed nog merkbaar zijn. De overige soorten verzamelden wij in het meer oostelijk liggende gedeelte, in weinig boven de zee verhevene en in bergaachtige oorden, tot aan en op den Sakoembang. Over het algemeen seheen iedere soort hier een eigen grondgebied te hebben. Het eiland Java heeft het grootste aantal eiken tusschen de 1000 en 2000 N. ellen hoogte. Daar zijn de bergen en hoogere voorgebergten of bergketens de hoofdzetels der bekende eiksoorten. In hoeverre ieder oord daar eigene vormen heeft, zal een naauwkeuriger onderzoek moeten leeren; doch men kan als zeker aannemen, dat op verschillende gebergten bijzondere vormen dezer boomsoorten voorkomen.

Ten einde een algemeen overzicht der verspreiding van het geslacht *Quereus* te geven, zal ik, bij mijne eigene waarnemingen, nog eenige opgaven van anderen voegen. Door deze gezamentlijk weten wij thans, dat Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië dit geslacht opleveren. In Noord-Amerika groeijen de eiken van Canada tot aan de landengte, waar de bergketen afgebroken wordt. Zij behooren in de Vereenigde Staten tot de bewoners van de gebergten en van de vlakten, die de rivieren begrenzen, en treden daar, over het algemeen, in het vierde tijdperk van wasdom, langs de oevers te voorschijn, om

de noten-, olmen- en moerbeziënboomen op te volgen. Meer zuidelijk naar Mexiko en vooral in dezen Staat zelve, verandert hunne standplaats, naarmate men de evenaachtslijn nadert. Zij stijgen hier steeds hooger tegen de berghellingen op en verliezen op sommige plaatsen, 2500 N. ellen boven zee, hunne bladen. Bij Jalapa, ongeveer op de zoo even gemelde hoogte, staan de eiken in gezelschap van *Alnus*, *Ternströmia*, *Melastomaceae* en *Croton*; rondsom het hoogvlak van Mexiko groeijen eenige eiken, met *Arbutus*, boven 3700 N. ellen, en op den berg Orizaba, tussehen 4000 en 5000 N. ellen, herinneren *Pinus*, *Quereus*, *Viola* en *Ranunculus* den wasdom der gematigde streken. — Als bewoners van Zuid-Amerika, voornamelijk van de Andes, leerden wij de eiken door de Heeren Humboldt en Bonpland kennen. Zij zijn, volgens de waarnemingen dezer Geleerden, tussehen de 940 en 3240 N. ellen boven zee, over de bergketen der Andes verspreid, en schijnen dáár, vooral langs de westelijke helling, in gezelschap der *Cinchona* voor te komen. — In Europa zijn de eiken tot op 60° 47' N. Br. aan de kust van Zweden en tot op 63° N. Br. aan die van Noorwegen gevonden. Van deze breedte zijn zij, meer zuidwaarts tot aan de Middellandse zee, door geheel Europa en, bezuiden deze zee, in Noord-Afrika aangetroffen. Door de geheele lengte van Europa tot in Azië, van Portugal tot aan den Baikal, waar de Heer Turtschaninof *Quereus mongolia* verzamelde, zijn groeiplaatsen van eiken. Het noordelijke van Europa bezit *Quereus robur* of aan haar verwante soorten, die hare bladen laten vallen; het zuidelijke bezit altijd groenende eiken, in de weinige boven zee verhevene streken en, boven deze, in hoogere streken vindt men de eiken van het noorden. In Europa en in Amerika groeijen de kegeldragende *Pinus* of besdragende *Juniperus* hooger, dan de eiken. — Door de onvermoeide pogingen van de Engelsche Kruidkundigen is de hooge bergketen van middel-Azië eene rijke schatkamer van *Quereus* geworden. Een aantal soorten zijn daar, tussehen 2000 en 3700 N. ellen boven den oceaan verzameld. Op den Bissahir wast *Q. semecarpifolia* in eenen dwergaachtigen staat met *Juniperus*, *Betula* en *Rosa*. Kumaon heeft, op 3654 N. ellen, dezelfde boomsoort eerst in gezelschap van verschillende soorten van *Pinus* en, hooger, geheel afgezonderd gevonden. Op den Tschur komt *Q. lanata* met *Rhododendron* op 2000 N. ellen voor; bij Sumla en Landour groeijen, tussehen eene hoogte van 2200 en 2500 N. ellen, verschillende soorten van eiken met *Rhododendron*, *Acer* en *Ulmus*. Bezuiden het dal van den Ganges zijn echter nog geene eiken gevonden. Daarentegen heeft Assam reeds enkele geleverd. Ook schijnt China, zoo men de bewoners en de taal raadpleegt, soorten van dit geslacht te bezitten. Uit Japan zijn, door de onderzoekingen van den Heer von Siebold, een aantal soorten bekend geworden, die belangrijk zijn voor het systeem, en voornamelijk merkwaardig mogen heeten wegens haar voorkomen. Zij behooren door dit laatste tot de Noord-Amerikaansche, de Noord- en Zuid-Europesche en de Indische vormen. Zuidelijker zijn de eiken op de Philippijnen, ongeveer 450 N. ellen boven zee, door Meyen waargenomen. Verder zuid-oostelijk schijnen zij niet verspreid te zijn; mij ten minste is noch van Nieuw-Guinea, noch van Nieuw-Holland eene soort bekend.

Het hout der eiken behoort, zoo als de Hoogleraar Blume reeds heeft aangemerkt, tot het bruikbaarste in Indië, vooral dát der op zekere hoogte of op bergruggen groeiende soorten.

De waargenomene soorten waren dikwerf de groeiplaatsen van *Viscum* en *Loranthus*. Beiden ontwikkelden zich zeer weelderig op dezelve, en de soorten van *Loranthus* versierden niet zelden, door

haren rijkdom aan bloemen, de takken, ten koste van welke zij bestonden. Behalve deze gewassen, welke de uitgroeiing benadeelen, zijn, voor de verspreiding der eiken, de eekhoorns, zoo lang de vruchten nog aan de boomen zijn, en op Sumatra de tapiers, wanneer de akers op den grond liggen, zeer schadelijk. Andere vijanden, voor de ontwikkeling der vruchten, zijn eenige insekten, die het binnenste der vrucht, of soms alleen het sareoearpium, hetwelk hun als verblijfplaats ter hunner ontwikkeling dient, geheel uitknagen. Nog andere insekten (eureulioniden) leven in en voeden zich met de zaadlobben, zonder de kiem van het zaad, om welke zij heenknagen, aan te doen. Ook strekken de akers tot voedsel van den olifant, en schijnt diens Sanskritsehe naam *poennaga*, aanleiding te hebben gegeven tot dien van *poening* of *poenig*, door welken op Sumatra de eik wordt aangeduid. De naam *passan*, onder welken de eiken op Java bekend zijn, schijnt mij, daar de inlanders meestal van *boea* (vruchten) *passan* spreken, aan de wijze, waarop de akker in het kuipje gevat is, ontleend te zijn, en dus het woord *pasan* (boei, net) te herinneren.

### I. QUERCUS HYSTRIX. Khs.

Q. ramulis pubescentibus, foliis lanceolato-ellipticis breviter acuminatis supra praesertim in nervis pubescentibus subtus argentato-lepidotis, stipulis ovatis acutiusculis, amentis paniculatis, floribus solitariis, squamulis cupulae junioris lanceolatis, cupulis infundibuliformibus, glandibus hemisphaerico-conicis.

ARBOR; RAMI teretes, glabriuseuli; RAMULI versus apicem ramorum conferti, sparsi, patentes, subtretes, subsulcati, pubescentes. GEMMAE axillares, subglobosae, pubescentes. FOLIA alterna, in spiram quaternatam disposita, patentia, lanceolato-elliptica, breviter acuminata, basi acuta, supra praesertim in nervis pubescentia, subtus argentato-lepidota et in nervis puberulis, — nervis primariis patentibus, nervis secundariis parallelis approximatis, — 0,18 longa, 0,06 lata; PETIOLI semiteretes, pubescentes, 0,01 longi. STIPULAE laterales, ovatae, acutiuseulae, utrinque pubescentes. AMENTA axillaria vel terminalia, paniculata vel solitaria, reeta, pubescentia, androgyna vel monoïca, floribus femineis solitariis. FLORES MASCULI in spica androgyna superiores, tribracteati; BRACTEAE laterales superiores, ovatae, minores; BRACTEA inferior lanceolata. PERIGONIUM sexpartitum, laciniis semi-ovalibus obtusis intus glabris extus pubescentibus. STAMINA 6—9, laciniis perigonii opposita vel alterna; FILAMENTA annulo submembranaceo affixa, erecta, filiformia, glabra; ANTHERAE supra basin affixae, mobiles, subdidymae, rimis longitudinalibus dehiscentes. PISTILLI rudimentum hemisphaericum, pubescentia. FLORES FEMINEI multibracteati; BRACTEAE pluriseriales, ovales vel oblongae, acutiuseulae, pubescentes. In cupula BRACTEAE coalitae, lanceolatae, acuminatae. PERIGONIUM sexpartitum, partibus semi-ovatis acutis, pubescens. OVARIUM inferum, in cupula immersum, hemisphaericum, trilobulare; OVULA bina, descendencia, eolateralialia. STYLI tres, erecto-patentes, pubescentes; STIGMATA conica, acutiuseula, glabra. CUPULA subsessilis, breviter infundibuliformis, pubescentia, squamulis triangularibus acuminatis carnosis versus apicem numerosioribus; cavitatis basi plana, latere excavato glabro. GLANS in cupula semi-immersa, hemisphaerico-conica, basi truncate subexcavata, apice perigonio exerescente pubescente mammillata, nitida, pericarpio crustaceo, sarcocarpio fibroso inani, endocarpio membranaceo, abortu unilocularis. SEMINA ab apice loculi pendula, plurima abortiva, unicum (saepe nullum) maturum, eavitatem explentia.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Tab. 43. Figura speciei. 1. Flos masculus apertus. 2. Gemma floris feminei junior. 3. Gemma adultior floris feminei. 4. Cupula junior. 5. Cupulae junioris sectio longitudinalis. 6. Cupula junior, parte superiore abscissâ. 7. Glans cum parte cupulae. 8 et 9. Glandes. 10. Glans longitudinaliter dissecta cum semine immaturo.

De *Quercus hystrix* groeit in de bosschen der westelijke helling van het gebergte beoosten Padang, op ongeveer 300 N. ellen boven de oppervlakte der zee. Zij bloeit en draagt ten gelijken tijde hare vruchten in october, weshalve de laatste tot derzelver rijpwording omtrent een jaar noodig schijnen te hebben. Ongeveer in denzelfden tijd vallen de bladen gedeeltelijk af, en andere vervangen hen, welke door eene donzige, bruine haarbekleding bedekt worden.

Deze soort is zeer na verwant aan *Quercus pruinosa*, en heeft eenige overeenkomst met *Q. pallida* en *Q. sundaica* van Java. Van de eerste is zij gemakkelijk door den meer elliptischen vorm en de minder digte haarbekleding der bladen, de kleinere nevenblaadjes, den kegelvorm der akers en de weekere stekels der kuipjes te onderscheiden. Zij verschilt van *Q. pallida* door de haarbekleding, welke bij deze soort alleen op de bloemen en hare stelen aanwezig is, en van *Q. sundaica*, welke platgedrukte, halfronde akers, hardstekelige kuipjes, half lancetvormige nevenblaadjes en bijna gladde takken heeft. Daarenboven is zij in hare standplaats, wat de hoogte betreft, afwijkend van de *Quercus pruinosa*, die op hogere gedeelten van den berg Gédé, ongeveer op 2500 N. ellen, en van de *Q. pallida*, welke op 1200 N. ellen hoogte wordt gevonden, en stemt zij met de *Q. sundaica* in dit opzigt overeen, dewijl deze tevens in de lagere bergstreken voorkomt.

## II. QUERCUS MAPPACEA. KHS.

*Q. ramulis pubescentibus, foliis late ovalibus breviter acuminatis supra glabris subtus pubescentibus, stipulis semi-oblongis, amentis paniculatis, floribus solitariis, squamulis cupulae junioris oblongis obtusis.*

ARBOR; RAMI subteretes, glabri; RAMULI alterni, erecti vel erecto-patentes, subteretes, subsulcati, vel subtriangulares trisulcati, dense pubescentes. FOLIA sparsa, alterna, erecto-patentia, late ovalia, breviter acuminata, basi acuta, juniora utrinque dense pubescentia, adultiora glabrescentia vel glabra subtus laete fusca, integerrima, nervis primariis patentibus curvatis, nervis secundariis approximatis parallelis, 0,15 longa, 0,09 lata; PETIOLI semiteretes, pubescentes, 0,01 longi. STIPULAE laterales, semi-oblongae vel ovatae, acutiusculae, utrinque pubescentes. AMENTA axillaria vel terminalia, paniculata, alterna, erecto-patentia, pubescentia, androgyna vel mascula; PEDUNCULUS COMMUNIS et PARTIALES triangulares, sulcati, pubescentes. FLORES MASCULI sessiles, in amento androgyno superiores, in spira ternata versus apicem conferti, congregati, inferiores subsolitarii, tribracteati; BRACTEAE inaequales, inferior major semi-ovalis cucullata pubescens, laterales oblongae obtusae pubescentes minores minutae. PERIGONIUM pelviforme, obtuse sexdentatum, pubescens. STAMINA 6—12, perigonii laciniis opposita et alterna, inaequalia, omnia fertilia vel quaedam abortiva, ante explicationem geniculata; FILAMENTA basi perigonii affixa, filiformia attenuata, apice incurva, glabra; ANTHERAE supra basin affixae, introrsum cernuae, mobiles, subdidymae, rimis longitudinalibus dehiscentes. PISTILLI rudimentum cuneiforme,

pubescens. FLORES FEMINEI in spira ternata vel quinata, solitares, bracteati; BRACTEA inferior semi-ovalis, acuminata, extus pubescens, intus glabriuscula; BRACTEA superior calyciformis, obtuse dentata, pubescens; BRACTEAE cupulae junioris coalitae, cum basi perigonii connatae, oblongae, obtusiusculae, pubescentes. PERIGONIUM superum, campanulatum, obtuse quinquedentatum, extus pubescens, intus glabriusculum. OVARIUM inferum, cupulâ occultum, depresso sphaeroïdeum, pubescens, tri- vel uniloculare; OVULA bina, in angulis loculi vel margine interno dissepimentorum nondum evolutorum inserta, infra apicem affixa, collateralia, oblonga, apice incurva; STYLI tres, erecto patentes, pubescentes; STIGMATA terminalia, conica, acutiuscula.

*Crescit in Poeloe-lampeï: BORNEO.*

De *Quercus mappacea*, aldus genaamd wegens de overeenkomst der bladen met die der soorten van het geslacht *Mappa*, komt als een boom van tien N. ellen, in Poeloe-lampeï voor. Deze eik bloeide in oktober. Bij hem verdient, onder anderen, opmerking het kelkvormige schutblaadje, dat het jonge vruchtbeginsel omvat en van de oudere vruchtbeginsels, wanneer deze afvallen, wordt afgescheiden en terugblijft. Van *Q. pallida*, met welke *Q. mappacea* de meeste overeenkomst heeft, is hij gemakkelijk door de haarbekleding der takken te onderscheiden, terwijl hij door den vorm van de schutblaadjes der kuipjes, benevens andere kenmerken, van *Q. sundaica* verschilt.

### III. QUERCUS OLIGONEURA. Khs.

*Q. ramulis pubescentibus, foliis ovalibus acutis basi angustatis utrinque glabriusculis, stipulis semi-lanceolatis, floribus femineis solitariis in amentis, squamulis cupulae junioris semi-lanceolatis acutiusculis.*

ARBOR; RAMULI erecto-patentes, subteretes, pubescentes. GEMMAE axillares, ovoïdeae, pubescentes. FOLIA alterna, patentia, ovalia vel oblongo-ovalia, acuta, basi angustata, margine recurva, utrinque glabriuscula, nervis primariis distantibus patentibus curvatis, nervis secundariis parallelis, coriacea, 0,3 longa, 0,1 lata; PETIOLI subteretes, glabriusculi, 0,02 longi. STIPULAE laterales, semi-lanceolatae, utrinque pubescentes. AMENTA terminalia, androgyna, floribus superioribus masculis confertis, floribus inferioribus femineis solitariis; PEDUNCULI basi nudi subteretes, apice florifero triangulares, pubescentes. FLORES MASCULI tribracteati; BRACTEA inferior semi-lanceolata, acuminata, pubescens. — FLORES FEMINEI multibracteati; BRACTEAE tres liberae, semi-oblongae, acutiusculae; BRACTEAE in cupulam coalitae semi-lanceolatae, acutae, farinosae. PERIGONIUM superum, breve urceolatum, sexdentatum, dentibus triangularibus acutis, pubescens. OVARIUM in cupula immersum, inferum, depresso sphaeroïdium, farinosum, triloculare; OVULA in singulo loculo geminata, mediae axi loculi affixa, collateralia; STYLI tres, patentes, ad medium usque connati, elongato-conici, glabri, in parte connata cavi; STIGMATA terminalia, punctiformia.

*Crescit juxta Doekoe: SUMATRA.*

De *Quercus oligoneura* werd in november, met jonge vruchten, in de lage streek om Doekoe verzameld. Door de grootte en dikte der bladen en de ronde bladstelen is deze soort opmerkelijk, als ook door de

kleine holten, welke de stijlen boven het zaaddoosje hebben, hetwelk zeer eigenaardig is. Zij heeft eenige gelijkenis met *Q. angustata*, doch deze heeft het beneden het kuipje staande schutblaadje toegespitst, half lancetvormig, de kuipjes ongesteeld en half kogelrond; daarenboven bezit de *Q. oligoneura* een puntig schutblaadje, zijnde het kuipje omgkeerd kegelvormig.

#### IV. QUERCUS ANCEPS. KHS.

*Q. ramulis glabriusculis, foliis ovalibus vel obovatis breviter et obtuse acuminatis basi angustatis, stipulis semi-lanceolatis acuminatis, floribus masculis in glomerulis sparsis, femineis in glomerulis confertis, squamulis cupulae junioris subrotundae attenuato-elongatis triangularibus.*

ARBOR; RAMI subteretes, sulcati, glabri; RAMULI versus apicem ramorum conferti, alterni vel subverticillati, diffusi, subteretes, novelli compresse triangulares, in nodis dilatati, glabriusculi. GEMMAE axillares, sessiles, hemisphaericae, glabrae. FOLIA alterna, in spira quinata, diffusa, ovalia vel obovata, breviter et obtuse saepe emarginatim acuminata, basi angustata, subrepanda, margine recurva, utrinque glabra, nervis primariis diffusis apice inflexis, nervis secundariis subreticulatis, coriacea, 0,12 longa, 0,055 lata; PETIOLI semiteretes, subsulcati, glabri, 0,005 longi. STIPULAE laterales, semi-lanceolatae, acuminatae, pubescentes. AMENTA axillaria solitaria vel terminalia, subverticillata, erecta, androgyna vel mascula; PEDUNCULUS obtuse triangularis, molliter pubescens. FLORES MASCULI in glomerulis oblongis suffultis bractea inferiore semi-lanceolata acuta pubescente apice glabra et duabus lateralibus altius insertis semi-ovalibus acuminatis pubescentibus, tribracteati; BRACTEA unica, major, inferior, spatulata, cucullata, pubescens; BRACTEAE duae laterales, minores, oblongae obtusae, pubescentes. PERIGONIUM pelviforme, 4—6 dentatum, dentibus obtusis, intus glabrum, extus pubescens. STAMINA 8—12, quaedam saepe abortiva vel rudimentaria; FILAMENTA ad basin rudimenti pistilli inserta, linearia, attenuata, glabra. ANTHERAE supra basin affixae, introrsum pendulae, cordiformes, rimis longitudinalibus dehiscentes. PISTILLI rudimentum turbinatum, basi glabrum, apice pubescens. FLORES FEMINEI in glomerulis saepe trifloris tribracteatis, — bractea unâ inferiore semi-ellipticâ acuminatâ subcucullatâ pubescente, bracteis duabus lateralibus semi-rotundis pubescentibus, — multibracteati; BRACTEOLAE liberae semi-lanceolatae, acutae, pubescentes, apice glabriusculae; BRACTEAE in cupulam subrotundam coalitae elongato-conicae, pubescentes, confluentes. PERIGONIUM superum, basi cum cupula bractearum connatum, breve urceolatum, 4—6 dentatum, dentibus acutis, intus glabriusculum, extus pubescens. OVARIUM in cupula occultum, depresso sphaeroïdeum, glabrum, triloculare; OVULA in singulo loculo geminata, versus apicem axcos loculi in medio ventris affixa, collateralia, elongato-ovoïdea, apice recta. STYLI 3—4, basi connati, erecto-patentes, elongato-conici, basi pubescentes; STIGMATA terminalia, punctiformia. CUPULA fructûs immaturi sphaeroïdeo-turbinata, intus sericeo pubescens, squamulis elongato-pyramidalibus saepe sulcatis, pubescentibus. GLANS ejusdem fructûs subimmersa, hemisphaerica, perigonio breviter stipitato mammillata, basi excavata, glabra.

*Crescit in Poeloe-lampeï, in monte Pamatton: BORNEO.*



*Quercus anceps* komt onder twee vormen voor: de een, hierboven beschreven, groeit in Poeloe-lampeï; de ander, aan den berg Pamatton verzameld, verschilt van den eerstgenoemde door de meer langwerpige en meer toegespitste bladen. Aan eenige takken der, op de laatste plaats verzamelde gewassen, waren de katjes pluimvormig. Zij hadden de benedenste bloemhoopjes als kleine katjes van den hoofdbloemsteel verwijderd, en de bovenste aan denzelfden vastgegroeid.

#### V. QUERCUS RACEMOSA. W. JACK.

*Q. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis utrinque glabris, stipulis semi-lanceolatis, floribus femineis in glomerulas confertis, squamulis cupulae junioris semi-lanceolatis acutis, squamis cupulae adultioris dilatato-triangularibus acutis, glandibus disciformibus basi excavatis.*

ARBOR; RAMI, RAMULI, FOLIA, INFLORESCENTIA, FLORES MASCULI et FLORES FEMINEI haud a *Quercu ancipite* diversi. OVARIIUM cupulâ occultum, depresso-sphaeroïdeum, — adultius disciforme vertice basique excavatum, glabrum, triloculare; OVULA in singulo loculo geminata, apici loculi in axi inserta, ventri paulo supra basin affixa, subcollateralia, elongato-ovoïdea, vertice recta. STYLI et STIGMATA vix ab *Q. ancipite* diversi. CUPULA urceolato-pelviformis, extus basi subplana squamulis patentibus dilatato-triangularibus mucronulatis pubescentibus carnosis, intus basi paulo elevata, planiuscula sericea. GLANS cupulâ semitecta, disciformis, vertice excavata mammillata, basi excavata, cavitate subplana margine cincta, glabra, nitida, pericarpio crustaceo, sarcocarpio fibroso, endocarpio coriaceo glabriusculo, trilocularis, dissepimentis completis triangularibus lignosis. SEMINA plurima abortiva, unica matura, versus apicem loculi inserta, medio ventris affixa, ovoïdea, glabra; TESTA coriacea, fusca; TEGMEN membranaceum.

*Crescit juxta Oedjong-mammon: SUMATRA.*

In de lage streken van de westkust van Sumatra is *Quercus racemosa* door ons verzameld. Deze boom groeide aldaar, te Doekoe, in eenen alluvialen bodem, en te Oedjong-mammon aan de oevers der zee. De boomen, welke het rotsige zeestrand, achter de naakte en losse rotsklompen, versierden, waren tusschen de acht en tien N. ellen hoog. Zij vertoonden zich in julij niet zeer bladrijk, doch droegen toen rijpe vruchten en enkele bloeiende takken. Daardoor was de overgang van den stam in de takken, uithoofde der splitsing of verdeeling van denzelfden, als ook de stijve, hoekige buiging der takken zichtbaar.

*Quercus racemosa* heeft eenige overeenkomst met *Q. anceps* van Borneo en *Q. placentaria* van Java. Van de eerste is zij door de akers, die reeds zeer jong eenen schijfvorm hebben, te onderscheiden. Van *Q. placentaria* verschilt zij door het kuipje en de akers. Het eerste heeft bij *Q. placentaria* de holte half kogelvormig; de laatsten zijn bij deze soort half kogelrond, het benedenste einde afgerond.

## VI. QUERCUS MICROCALYX. KHS.

Q. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis acuminatis, stipulis semilineari-lanceolatis, floribus masculis et femineis in glomerulas confertis, squamulis cupulae junioris semi-lanceolatis, squamis cupulae adultioris triangularibus, glandibus hemisphaericis.

ARBOR; RAMI, RAMULI, FOLIA, INFLORESCENTIA et FLORES MASCULI haud ab Quereu ancipite diversi. FLORES FEMINEI glomerati, glomerulis bracteatis; BRACTEA inferior triangularis, acuta, cucullata, pubescens; BRACTEAE laterales semi-rotundatae, pubescentes. BRACTEAE cupulae junioris semi-lanceolatae, pubescentes. PERIGONIUM superum, breve urceolatum, pubescens, sexdentatum, dentibus minutis obtusis. OVARIIUM cupula inclusum, semi-ovoïdeum, glabriusculum, triloculare; OVULA in singulo loculo geminata, versus apicem loculi ab axi descendente, paulo infra verticem affixa, subcollateralis, oblonga. STYLI tres, erecto-patentes, basi connati, elongato conici, pubescentes; STIGMATA introrsa, linearia. CUPULA dilatato-pelviformis, basi applanata, squamulis in zonas concentricas confluentibus mucronulatis pubescentibus, cavitatis basi subplana, sericea. GLANS dimidia parte cupulâ cincta, hemisphaerica, vertice perigonio persistente mammillata vel punctata, basi plana, nitida, pericarpio crustaceo, sarcocarpio subfibroso, endocarpio coriaceo, trilocularis, dissepimentis coriaceis completis vel incompletis. SEMINA plurima abortiva, solitaria, ab apice loculi descendente, ovoïdea, glabra; TESTA coriacea; TEGMEN membranaceum; MICROPYLA hylo approximata; CHALAZA micropylae opposita. EMBRYO in speciminibus meis abortivus, suberectus.

*Crescit in Poeloe-lampeii: BORNEO.*

## VII. QUERCUS LEPTOGYNE. KHS.

Q. ramulis dense pubescentibus, foliis oblongis acuminatis basi acutis, stipulis semi-lanceolatis, amentorum floribus masculis glomerulatis et floribus hermaphroditis vel femineis solitariis, squamulis cupulae junioris oblongis.

ARBOR; RAMI subteretes, glabri, obscure fusci; RAMULI erecto-patentes, teretes, versus apicem angulati sulcati, dense pubescentes. FOLIA alterna, sparsa vel in spira ternata, patentia, oblonga, acuminata, basi acuta, utrinque glabra, juniora utrinque pubescentia, nervis primariis patentibus curvatis prominentibus, nervis secundariis subparallelis, 0,12 longa, 0,04 lata; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,005 longi. STIPULAE laterales, semi-lanceolatae, pubescentes. AMENTA terminalia vel axillaria, solitaria, androgyna vel mascula; PEDUNCULUS triangularis, dense pubescens. FLORES MASCULI glomerulati, raro solitarii, glomerulis tribracteatis, tribracteolati; BRACTEA major inferior, ovata, acuminata, pubescens; BRACTEAE minores oblongae, acutae. PERIGONIUM pelviforme, sexpartitum, laciniis acutis vel subacuminatis, pubescens. STAMINA 12, basi rudimenti pistilli inserta, laciniis perigonii alternantia et opposita; FILAMENTA filiformia, glabra; ANTHERAE medio affixae, introrsum cernuae, subdidymae, longitudinaliter dehiscentes. PISTILLI rudimentum obconicum, dense pubescens. FLORES hermaphroditis vel feminei solitarii, tribracteati; BRACTEA inferior ovata, acuminata, pubescens; BRACTEAE laterales auriculatae pubescentes; BRACTEAE cupulae junioris oblongae, pubescentes. PERIGONIUM superum, basi liberum,

pelviforme, sexdentatum, dentibus triangularibus acutis, pubescens. STAMINA 12; FILAMENTA annulo perigyno affixa. OVARIUM inferum, cupulâ obtectum, hemisphaericum, triloculare; OVULA geminata subcollateralia. STYLI 3, diffusi, basi connati, subteres, sparse pubescentes; STIGMATA apicularia, punctiformia.

*Crescit in sylvis montis Sakoembang: BORNEO.*

### VIII. QUERCUS GRACILIS. KHS.

Q. ramulis glabriusculis, foliis ovali-oblongis acuminatis basi acutis, stipulis lanceolato-linearibus, amentis paniculatis floribus femineis solitariis, squamulis cupulae junioris oblongis in zonas concentricas connatis.

ARBOR; RAMI subteres, glabri; RAMULI patentes, triangulares, sulcati, glabriusculi. FOLIA alterna, in spira quinata, patentia, ovali-oblonga, mucronulato-vel emarginato-acuminata, basi acuta saepe inaequilatera, altero latere rotundato altero angustato, margine undulata, utrinque glabra, nervis primariis patentibus rectis versus apicem incurvis, nervis secundariis subparallelis, coriacea, 0,2 longa, 0,07 lata; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,005 longi. STIPULAE laterales, lanceolato-lineares, margine et apice incurvae, glabriusculae. AMENTA axillaria vel terminalia, paniculata, androgyna vel mascula; PEDUNCULI triangulares, sulcati, cano-pubescentes. FLORES MASCULI in amentis androgynis superiores, glomerulati vel solitarii, in spiram dispositi, tribracteati; BRACTEA inferior major et BRACTEAE superiores laterales minores triangulares acutae pubescentes. PERIGONIUM pelviforme, sexdentatum, dentibus triangularibus acutiusculis, pubescens. STAMINA 12, dentibus perigonii alterna et opposita; FILAMENTA basi pistilli rudimentarii inserta, filiformia, glabra; ANTHERAE basi affixae, pendulae, obcordiformes vel subbilobae, lobis obtusis, longitudinaliter dehiscentes. PISTILLI rudimentum subsphaericum, pubescens. FLORES FEMINEI solitares, alterni, tribracteati; BRACTEIS similibus floris masculi; BRACTEAE cupulae junioris conicae, oblongae, in zonas concentricas coalitae, pubescentes. PERIGONIUM superum, basi liberum, breviter urceolatum, sexdentatum, dentibus brevibus triangularibus acutiusculis, pubescens, basi supra cupulam annulo villorum praeditum. OVARIUM cupulâ obtectum, semi-ellipsoideum, subtrigonum, glabrum, triloculare; OVULA in singulo loculo geminata, in media axi loculi descendente, infra verticem affixa, ovoïdea, subtrigona. STYLI 3, erecti, fere ad apicem usque connati, conici, pubescentes; STIGMATA terminalia, punctiformia.

*Crescit in monte Balaran: BORNEO.*

Quercus gracilis heeft de nevenblaadjes, in vergelijking met de andere soorten, vrij groot, soms 0,01 lang. Hare katjes zijn in pluimen verdeeld en door een wit dons bedekt. De vrouwelijke bloemen hebben het kuipje omgekeerd tolvormig, met drie ringen van zaamgegroeide schubjes, en het bloembekleedsel kruikvormig, met eenen digten viltring boven het kuipje.

Zij is van Quercus leptogyne, aan welke zij het naaste verwant is, gemakkelijk te onderscheiden door de gladde takjes, den vorm der nevenblaadjes, den gemelden ring om het benedenste van het bloembekleedsel, en door den vorm der helmknopjes.

## IX. QUERCUS BLUMEANA. KHS.

Q. ramulis glabris, foliis oblongo-ellipticis acuminatis, stipulis lineari-lanceolatis, amentorum floribus femineis solitaris, squamulis cupulae junioris semi-lanceolatis, cupulis glandes includentibus, squamulis in zonas concentricas confluentibus.

ARBOR 6—10 metrorum, coronâ aperta; RAMI subteretes, glabri, laete fusci; RAMULI alterni, sparsi, patentes, subteretes, glabri, novelli subtriangulares sparse pubescentes. FOLIA versus apicem ramorum, alterna, patentia, oblongo-elliptica, acuminata, basi acuta, margine plana, utrinque glabra, nervis primariis patentibus curvis apice incurvis, nervis secundariis reticulatis, coriacea, 0,10 longa, 0,045 lata; PETIOLI subteretes, supra sulcati, glabri, 0,005 longi. STIPULAE laterales, lineari-lanceolatae, glabriusculae. AMENTA axillaria simplicia, terminalia paniculata, androgyna vel mascula; PEDUNCULUS triangularis, dense pubescens. FLORES MASCULI in amento androgyno superiores, solitarii, in amento juniore saepe subverticillati, in amento adultiore in spira ternata vel quinata, tribracteati; BRACTEA inferior major, triangularis, acuminata, intus glabriuscula, extus dense pubescens; BRACTEAE laterales minores, semi-lanceolatae, pubescentes. PERIGONIUM pelviforme, sexpartitum laciniis triangularibus acutiusculis, intus subglabrum, extus pubescens. STAMINA 12, laciniis opposita et alternantia; FILAMENTA basi rudimentariae pistilli affixa, filiformia, glabra; ANTHERAE paulo supra basin affixae, ovatae, basi cordatae, rimis longitudinalibus dehiscentes. PISTILLI rudimentum sphaeroideum, pubescens. FLORES FEMINEI solitarii, in spira quinata, breviter stipitati, bracteati; BRACTEAE liberae calyculatae, inaequales: superior major semi-rotundato-cucullata, duae laterales auriculatae, inferior minor semi-lanceolata; BRACTEAE cupulares in zonas concentricas connatae, semi-lanceolatae, pubescentes; CUPULA junior hemisphaerica, paulo adultior cylindrica, florem totum includens, apice excavata. PERIGONIUM superum, discoideo-urceolatum, in medio concentrico-carinatum, sexdentatum, dentibus triangularibus obtusis, extus pubescens, intus glabriusculum. OVARIUM inferum, cupula inclusum, ovoideum, glabriusculum, triloculare; OVULA in singulo loculo geminata, ab apice axeos loculi descendencia, infra verticem affixa, elongato-ovoidea. STYLI tres, ad medium longitudinis connati, patentes, elongato-conici, parte connatâ pubescente, partibus liberis glabris; STIGMATA apicalia, punctiformia. CUPULA stipitata, hemisphaerica, basi excavata, squamulis mucronatis coalitis in zonas concentricas; superficie exteriori prorsus, interiore basi plana solummodo, pubescens. GLANS cupulâ inclusâ, hemisphaerica vel depresso hemisphaerica, conico-mammillata, basi plana elevato-marginata, glabra, apice pubescens, pericarpio crustaceo, sarcocarpio basi glandis loculoso et versus apicem medullari, endocarpio coriaceo dense piloso, abortu unilocularis. SEMEN solitare, descendens, conicum, basi attenuatum.

*Crescit ad ripas fluminis Doeson: BORNEO.*

Explicatio Tab. 44. Figura speciei. 1. Flores masculi. 2. Flos femineus. 3. Flos femineus longitudinaliter dissecta. 4. Ovarii sectio transversalis. 5. Cupula. 6. Eadem longitudinaliter dissecta. 7. Cupula cum ovario longitudinaliter dissecta. 8. Glans cum parte cupulae. 9. Cupulae pars. 10. Glans cum parte cupulae a superiore. 11. Eadem ab inferiore. 12. Glans ab inferiore.

Deze belangrijke soort verdient eenen naam, harer waardig. Ik draag haar daarom op aan den ijverigen beoefenaar der Kruidkunde, welke de Flora van den Archipel onderzocht, en de kennis derzelve, door

zijne geschriften, zoozeer heeft bevorderd en uitgebreid. — Wij hebben deze soort langs de oevers van de Doeson-rivier, en vooral in het hoogere gedeelte, hetwelk inzonderheid dezen naam draagt, waargenomen. Elders, op onze landreis langs Borneo's zuid-oostkust, werd zij niet gezien. Ook langs de boorden van de genoemde rivier vonden wij slechts weinige voorwerpen. Deze bijzonderheid en de zoo even medegedeelde opmerking doen mij vooronderstellen, dat *Q. Blumeana* op de bergen van het middelgedeelte van Borneo, uit welke de Moerong-rivier ontspringt, hare wezentlijke standplaats heeft. De langs de rivier groeiende boomen waren alle in een' onderdrukten toestand. Korte, niet zelden kronkelend gebogene stammen, droegen bijna eivormige kroonen, welker ijl loof niet in staat was, de lichtstralen af te sluiten. Hunne bloemen waren, tijdens onze reis, in augustus en september, geopend, tot vruchtjes gezet, of als akers uitgegroeid. De pas ontlokene vrouwelijke bloempjes hebben het bloembekleedsel naakt. Vervolgens wordt dit bekleedsel, door de uitgroeijing van de benedenste deelen der bloem, in eene trechtervormige holte verborgen. Door de vergrooting van het onderste gedeelte komt hetzelfde later weder te voorschijn, en blijft het als een rond knopje op de akers. De akers zijn, even onder dit knopje, naakt, voor het overige echter door het kuipje ingesloten. Zij hebben, ten gevolge van miswassing, slechts één hokje, hetwelk ongeveer een vierde gedeelte der vrucht inneemt en met donzige haren digt bekleed is. Rondom hetzelfde is een lederachtig endocarpium. Het hieraan sluitende gedeelte van het sarcocarpium bestaat uit een zamenhangend merg, en het nader aan het epicarpium, voornamelijk in het benedenste van den aker gelegen gedeelte, is in kleine, onregelmatige vakjes, door mergachtige tusschenwanden verdeeld.

#### X. QUERCUS ENCLEISACARPA. KHS.

*Q. ramulis lepidotis, foliis ellipticis acuminatis, amentorum floribus femineis solitariis, cupulis concentricis zonatis, cupulis adultioribus glandem depresso-sphaericam includentibus.*

ARBOR 20—25 metrorum, coronâ depresso-hemisphaericâ apertâ; RAMI subteretes; RAMULI versus apicem ramorum sparsi, alterni, patentés, teretes, sulcati: novelli compresse angulati, lepidoti. FOLIA versus apicem ramulorum conferta, alterna, patentia, elliptica, acuminata, basi acuta, integerrima, quaedam sinuata, utrinque sublepidota, nervis primariis patentibus incurvis, nervis secundariis subparallelis, coriacea, 0,12 longa, 0,05 longa; PETIOLI subteretes, supra sulcati, sublepidoti, 0,015 longi. GENNAE axillares, sphaericae, lepidotae. AMENTA axillaria vel terminalia, mascula vel androgyna; PEDUNCULUS angulatus, sulcatus, lepidotus. FLORES MASCULI glomerati, tribracteati; BRACTEA inferior major, triangularis, acuta, pubescens; BRACTEAE laterales minores, falcato-semilanceolatae, subpubescentes. PERIGONIUM sexpartitum, laciniis semirotundatis acutiusculis, glabriusculum. STAMINA 6—12, laciniis perigonii alterna vel alterna et opposita; FILAMENTA basi pistilli rudimentarii affixa, filiformia, glabra; ANTHERAE medio dorsi affixae, mobiles, subdidymae, longitudinaliter dehiscentes. PISTILLI rudimentum turbinatum, pubescens. FLORES FEMINEI solitarii, bracteati; BRACTEA una libera, distans, triangularis, puberula; BRACTEAE cupulae in zonas concentricas denticulatas concretae, pubescentes. PERIGONIUM superum, basi cum bractearum cupula connatum, pelviforme, sexdentatum, dentibus triangularibus obtusiusculis,

pubescens. OVARIIUM inferum, cupulâ inclusum, sphaeroidium, pubescens, triloculare; OVULA in singulo loculo geminata, infra apicem loculi axi adnexa, infra verticem affixa, descendens, subcollateralis, ovoïdea; STYLI 3—4, basi connati, erecto-patentes, conici, glabriusculi; STIGMATA apicalia. CUPULA junior turbinata, subpubescens. CUPULA adultior stipitata, stipite versus apicem incrassato, hemisphaerica, vertice acuta, irregulariter et concentricè zonata, sublepidota, chartacea, glandem prorsus includens, intus basi umbonata, glabriuscula, versus basin sericeo-pubescens. GLANS hemisphaerica, vertice mammillata, versus basin rotundata, basi excavata, cavitate pelviformi, dense sericeo-pilosa, epicarpio crustaceo, sarcocarpio inani fibroso, endocarpio coriaceo, abortu unilocularis, loculo glabro. SEMEN unicum, pendulum, excavato-pelviforme, sulcatum, basi obtuse dentatum, glabrum; TESTA coriacea; TEGMEN membranaceum.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 45. Figura speciei. 1. Florum masculorum glomerulus. 2. Flos masculus expansus. 3. Flos femineus junior. 4. Flos femineus junior dissectus. 5. Flos femineus magis evolutus. 6. Flos femineus, cupulae parte abscissâ. 7. Flos femineus longitudinaliter dissectus. 8 et 9. Glandes. 10. Cupula cum glande longitudinaliter dissecta. 11 et 13. Semen a vertice et ab apice. 12. Semen a latere.

Deze *Quercus* hebben wij in het midden der bosschen, als boomen met kegelvormige kroonen en aanzienlijk hooge stammen waargenomen. Langs de helling der dalen zijn zij minder hoog: de stam is daar korter, dan de kroon. De kroon heeft eenen langwerpigen eivorm. De takken zijn met eene zilverachtige schors bedekt. De bladen, vooral de jonge, zijn dof zilverachtig, en het eind der takken met jonge blaadjes, schittert in de zonnestralen. De mannelijke bloemen behooren tot de grootste onder de eiken. Zij hebben dikwerf slechts zes ontwikkelde helmraden, en daarenboven, tusschen deze, eenige draden of kleine kopjes. Bij de zeer jonge vrouwelijke bloemen zijn de stijlen en stempels, in vergelijking met den kelk en het vruchtbeginsel, zeer ontwikkeld. Zij hebben het vruchtbeginsel geheel ingesloten. Hetzelve is in den jeugdigen toestand behaard, en krijgt, ouder wordende, langere haren, zoodat de aker met een bekleedsel van lange, zijdeachtige haren bedekt is. De holte der akers neemt ongeveer een derde van de vrucht in, is geheel glad en heeft een lederachtig bekleedsel.

In de maanden oktober en november hebben wij deze soort, beoosten Padang, bloeiend en vruchtdragend gezien. Zij verkreeg toen nieuw loof, en was aan de uiteinden der takjes, met zamengevouwen blaadjes voorzien.

*Q. incleisacarpa* verschilt van de door mij waargenomene soorten, vooral door de geheel ingeslotene akers.

## XI. QUERCUS REINWARDTII. KHS.

Q. ramulis sublepidotis, foliis ellipticis breviter acuminatis subtus argentato-lepidotis, amentorum floribus femineis solitariis, cupulis junioribus elongato-turbinatis cum zonis concentricis, cupulis adultioribus pelviformibus concentricis zonatis, glandibus ovoïdeis basi excavatis.

ARBOR excelsa; RAMI diffusi, subteretes, fusci, lenticellati, glabri; RAMULI versus apicem ramorum sparsi, patentes, basi incrassati, subteretes, sublepidoti; novelli triangulares, sulcati, lepidoti. FOLIA versus apicem ramulorum, alterna, in spira quinata, patentia, elliptica, breviter et obtuse acuminata, basi angustata, margine recurva, supra nitida, subtus argentato-lepidota, nervis primariis parallelibus diffusis curvatis, nervis secundariis reticulatis, coriacea, 0,11 longa, 0,05 lata. GEMMAE axillares, subrotundae. AMENTA axillaria vel terminalia, simplicia, curvata, androgyna vel mascula; PEDUNCULUS angulatus, furfuraceus. FLORES MASCULI glomerati, tribracteati; BRACTEAE aequales, triangulares, acutiusculae, pubescentes. PERIGONIUM pelviforme, integerrimum vel obsolete denticulatum, intus glabrum, extus pubescens. STAMINA 6-12; FILAMENTA filiformia, glabra; ANTHERAE supra basin affixae, subdidymae, longitudinaliter dehiscentes. PISTILLI rudimentum sphaericum, dense pubescens. FLORES FEMINEI solitarii, bracteati; BRACTEA unica libera, triangularis, acuta, sublepidota; CUPULA cum zonis concentricis denticulatis. PERIGONIUM superum, pelviforme, dentatum, dentibus acutiusculis, lepidotum. OVARIUM cupulâ tectum, conicum, pubescens, triloculare; OVULA in singulo loculo geminata, versus apicem axi loculi inserta, descendente, infra extremitatem superiorem affixa, elongato-ovoïdea; STYLI 3-6, breves, connati, conici, glabri; STIGMATA apicalia, obtusa. CUPULA stipitata, stipite basi cupulae crassiore, pelviformis, extus cum zonis concentricis marginatis, lepidota, intus basi umbonata glabriuscula. GLANS tertia parte cupulam immersa, ovoïdea, apice acutiuscula, basi excavata, cavitate hemisphaerica, sericeo-pubescenti, epicarpio crustaceo, sarcocarpio in parte inferiore glandis majore, endocarpio subcoriaceo lanuginoso, abortu unilocularis, loculo sulcato. SEMEN unicum, conicum, basi excavatum, sulcatum, glabrum; SPERMODERMIS subcoriacea. EMBRYO erectus, cotyledonibus carnosis, plumulâ minutâ.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Quercus Reinwardtii komt onder twee vormen voor: de een is hierboven beschreven; de ander verschilt door de langwerpige bladen en ook door de vruchten, die ronde, kruikvormige kuipjes bezitten en korte, kegelvormige akers hebben, van welke ongeveer het drie vierde of vier vijfde gedeelte in de kuipjes is besloten.

Zij behoort tot de hoogste boomen van de bosschen beoosten Padang en bereikt 25-35, soms 40 N. ellen hoogte. Haar stam heeft dikwijls meer dan twee ellen omvang, en onder eene grijze schors een hard hout. De kroon der, in het midden der bosschen groeiende boomen is kegelvormig, aan het benedenste einde een weinig bol. Aan den top is zij geheel doorzigtig, en lager kunnen de bogtige takken duidelijk onderscheiden worden. De bladen zijn op de bovenzijde glanzig en op de ondervlakte verzilverd. De akers zitten aan het einde der takken in trossen, meestal in één vlak aan twee zijden van den steel. Zij zijn van binnen met eene donzige haarbekleding bedekt en geheel door het zaad gevuld.

Deze soort, in het gebergte beoosten Padang verzameld, groeit aldaar digt bij den top, vooral tegen de zachthellende ruggen. Zij bloeide en droeg vruchten in het begin der maand november.

## XII. QUERCUS COSTATA. BL.

*Q. ramulis glabris, foliis ovalibus breviter acuminatis, stipulis lanceolato-linearibus, amentorum floribus femineis solitariis, cupulis junioribus concentricè zonatis, cupulis adultioribus concentricè zonatis costatis, glandibus apice depressis cum cupulis connatis.*

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

De op Sumatra verzamelde voorwerpen verschillen weinig met die van Java, welke in de Flora Javae zijn beschreven. Eenige derzelve hebben dikkere bladen en grootere schutblaadjes. Het vruchtbeginsel is, jong zijnde, tot op twee derde gedeelten met het kuipje vastgegroeid. Deszelfs holte heeft drie hokjes, met de placentae beneden den top. In ieder der hokjes zijn twee eitjes. Deze liggen niet, zoo als bij de genoemde soorten, naast elkander, maar, aan eene kleine vooruitstekende placenta, over elkander. De akers zijn half eivormig, van boven vlak met een klein puntje. Het ronde gedeelte is met het kuipje zamengegroeid. Zij hebben een dik, houtachtig, korrelig epicarpium, een vezelig, niet zeer aanzienlijk sareocarpium, en een vliezig, licht bruin behaard endocarpium.

## XIII. QUERCUS EWYCKII. KHS.

*Q. ramulis glabriusculis, foliis elliptico-lanceolatis acuminatis, stipulis semi-lanceolatis, amentorum floribus femineis solitariis, cupulis cum zonis concentricis, glandibus hemisphaericis.*

ARBOR 20—25 metrorum, coronâ dense foliatâ; RAMI erecto-patentes, subteretes, fusci; RAMULI versus ramorum apices conferti, alterni, erecto-patentes, curvati, subteretes, novelli angulati, sulcati, glabriusculi. FOLIA alterna, in spira quinata, erecto-patentia, elliptico-lanceolata vel elliptica, acuminata, basi acuta, margine recurva, supra glabra, subtus pubescentia, nervis primariis patentibus curvatis approximatis prominentibus, nervis secundariis parallelibus approximatis, coriacea, 0,14 longa, 0,04 lata; PETIOLI subteretes, supra sulcati, glabriusculi, 0,015 longi. STIPULAE laterales, semilanceolatae, pubescentes. GEMMAE axillares, conicae, pubescentes. AMENTA axillaria vel terminalia, simplicia vel paniculata, erecta, mascula vel androgyna; PEDUNCULUS angulatus, sulcatus, pubescens. FLORES MASCULI solitarii vel glomerulati, tribracteati; BRACTEA inferior semilanceolata, cucullata, pubescens; BRACTEAE duae laterales semi-ovales, acutae, pubescentes. PERIGONIUM pelviforme, obsolete sexdentatum, pubescens. STAMINA 12; FILAMENTA basi perigonii affixa, filiformia, glabra; ANTHERAE supra basin affixae, didymae, longitudinaliter dehiscentes. PISTILLI rudimentum sphaeroïdeum, dense tomentosum. FLORES FEMINEI solitarii, bracteati; BRACTEA unica libera, triangularis, acuta, pubescens; CUPULA elongato-obovoïdea, concentricè zonata, margine superiore zonarum dentato, glabriuscula. PERIGONIUM superum, depresso urceolatum, sexdentatum, dentibus acutiusculis, pubescens. OVARIIUM cupulâ tectum, sphae-



roideum, glabriuseulum, triloeulare; OVULA in singulo loculo geminata, infra apicem axis loculi descendentia, versus extremitatem superiorem affixa, ovoïdea. STYLI 3, fere ad apicem usque connati, pubescentes; STIGMATA apicalia. CUPULA stipitata, pelviformis, basi depressa, concentrice zonata, zonis approximatis, pubescens, intus basi umbonata, sericeo-pubescens, margine glabriusculo. GLANS cupulâ semi-inclusa, hemisphaerica, apice longe mammillata, basi excavata, nitida, epicarpio crustaceo tenui, sarcocarpio fibroso inani loculoso magno, endocarpio subcoriaceo, unilocularis, loculo tomento laete ferrugineo vestito. SEMEN unicum, deforme.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 46. Figura speciei. 1. Amenti masculi pars. 2. Flores masculi a latere. 3. Flos masculus ab anteriore. 4. Flos masculus, rudimento pistilli ablato. 5, 6, 7. Antherae. 8. Cupula. 9. Ovarium, parte cupulae abscissa. 10. Ovarium cum cupula longitudinaliter descissa. 11. Cupula adultior. 12. Glans immatura, dimidia parte cupulae longitudinaliter abscissa. 13. Glans cum cupula. 14. Cupula. 15. Glans basis. 17. Glans longitudinaliter descissa cum sarcocarpio fibroso et loculoso. 18. Semen. 19. Seminis rudimentum. 20. Seminis rudimentum descissum.

De eik was in vroegere tijden voor de volken van het noordelijk, het midden- en het zuidelijk Europa een hoogstvereerd voorwerp in het plantenrijk. Onder zijne schaduw kwamen Hellenen, Batavieren en Celten raad vragen, ontvingen zij tijdelijke hulp en ondersteuning, en ontvlamde bij hen nieuwe geestdrift voor hunne ondernemingen. Doch ook bragten zij onder deze boomen hunne bewijzen van dankbaarheid. Vruchten en wapentuigen werden daar nedergelegd, geloften voor hun volgend leven onder dezelve uitgesproken. Door eene naamgeving volg ik hun voorbeeld. Dit zij den edelen bevorderaar van kunsten en wetenschappen, haren, in zijne vroegere hooge betrekking, zoo werkdadigen beschermer, die in haar de waarborgen en steun van Nêrlandsch welvaart zag, tot bewijs, dat ik, die ook in hem eenen welwillenden beschermer mogt vinden, na het verloop eener reeks van jaren, mij deze goedheid dankbaar herinner.

#### XIV. QUERCUS ANNULATA. KHS.

Q. ramulis glabris, foliis oblongis acuminatis, stipulis falcato-lanceolatis, amentorum floribus femineis solitariis, cupulis junioribus concentrice zonatis, cupulis adultioribus breviter pelviformibus concentrice zonatis, glandibus depresso hemisphaericis.

ARBOR; RAMI subteretes, glabri, nigrescentes, lenticellis albis; RAMULI erecto-patentes, subteretes, novelli angulati sulcati, glabri. FOLIA erecto-patentia, oblonga, acuminata, basi acuta, margine recurva, utrinque glabra, nervis primariis erecto-patentibus nitidis, nervis secundariis subparallelis, 0,12 longa, 0,04 lata; PETIOLI subteretes, supra canaliculati, 0,01 longi; STIPULAE laterales, falcato-lanceolatae, subtus sublepidotae. AMENTA axillaria vel terminalia, erecta, mascula vel androgyna; PEDUNCULUS angulatus, dense pubescens, glabrescens. FLORES MASCULI glomerulati vel solitarii, tribracteati; BRACTEA inferior semi-oblonga, acuta, subpubescens; BRACTEAE laterales semi-oblongae, obtusius-

culae, subpubescentes. PERIGONIUM breviter pelviforme, sexdentatum, dentibus obtusis, intus glabrum, extus pubescens. STAMINA 12, quaedam abortiva vel deformia; FILAMENTA basi perigonii in anulum connata, filiformia, glabra; ANTHERAЕ cordiformes, basi in sinu affixae. PISTILLI rudimentum cylindricum, truncatum, pubescens. FLORES FEMINEI solitariis, bracteati; BRACTEA triangularis, acuta; CUPULA cum zonis concentricis, irregulariter denticulatis, subleprosis. PERIGONIUM superum, basi liberum, breve urcolatum, sexdentatum, dentibus acutiusculis, leprosum. OVARIUM cupulâ tectum, depressosphaeroïdeum, pubescens, subtriloculare; OVULA in singulo loculo geminata, apposita, in medio axis loculi descendencia, infra extremitatem superiorem affixa, elongato-ovoïdea; STYLI tres, basi connati, conici, pubescentes; STIGMATA apicalia, obtusiuscula. CUPULA sessilis, pelviformis, basi plana, concentricè zonata et sulcata, leprosa, crassa, lignosa, intus basi plana et latere pubescens. GLANS dimidia parte cupulâ cincta, depresso-hemisphaerica, conico-mammillata, basi plana, nitida, epicarpio tenuiter crustaceo, sarcocarpio inani loculamentoso, endocarpio membranaceo, unilocularis, loculo dense piloso.

*Crescit in sylvis Singalang: SUMATRA.*

Tab. 46. 21. Glandes. 22. Folium hujus speciei.

*Quercus annulata* droeg in de maand augustus bijna rijpe vruchten, benevens bloemen en jonge vruchten. Zij was langs de rivier de Ane en hooger tot op 1000 ellen in het gebergte Singalang verspreid.

#### XV. QUERCUS OMALOKOS. KHS.

*Q. ramulis glabris, foliis obovatis breviter obtuse acuminatis, stipulis lanceolatis, amentorum floribus femineis solitariis vel ternatis, cupulis junioribus concentricè zonatis, cupulis adultioribus planiusculis concentricè zonatis, glandibus semi-ovoïdeis.*

ARBOR; RAMI teretes, fusco-olivacei; RAMULI versus ramorum apices conferti, patentcs, subteretes vel angulati, novelli compresse quadrangulares sulcati, glabri, novelli leprosi. FOLIA approximata, alterna, patentia, obovata vel elongato-obovata, breviter obtuse acuminata, basi angustata, marginata, utrinque glabra, nervis primariis patentibus apice curvatis, nervis secundariis reticulatis, coriacea, 0,1 longa, 0,04 longa; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,004 longi. STIPULAE laterales, obliquae, lanceolatae, acutiusculae, leprosaе. GEMMAE axillares, subrotundae, leprosaе. AMENTA axillaria vel terminalia, erecta, androgyna vel mascula; PEDUNCULUS angulatus, leprosus. FLORES MASCULI desunt. FLORES FEMINEI solitariis vel ternati, tribracteati; BRACTEA inferior major, cucullata, triangularis, acuta, leprosa; BRACTEAE duae laterales, auriculatae; CUPULA cum zonis concentricis denticulatis leprosis. PERIGONIUM superum, basi liberum, breviter pelviforme, sexdentatum, dentibus minutis obtusis, leprosum. OVARIUM cupulâ cinctum, breviter conicum, basi rotundatum, versus apicem leprosum, triloculare; OVULA bina, in medio axis loculi descendencia, in medio ventris affixa, apposita, elongato-ovoïdea; STYLI 3, breves, basi connati, glabriusculi; STIGMATA apicalia, obtusa. CUPULA sessilis, plana, concentricè zonata, leprosa, intus cum disco elevato plano sericeo-pubescens. GLANS basi cupula cincta, semi-ovoïdea, conice mammillata, basi excavata, cavitatis margine cavo, nitida, apice leprosa, epicarpio lignoso, sarcocarpio

fibroso, endocarpio subcoriaceo, unilocularis, loculo cum septis quibusdam incompletis dense pubescente. SEMEN solitarius, loculum explens, vertici affixum, obconicum, basi excavatum, sulcatum, glabrum; SPERMODERMIS coriacea. EMBRYO erectus; RADICULA minuta obtusa; COTYLEDONES carnosae, crassae.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Deze soort heeft eene digte kroon met zeer glanzend loof. De takjes zijn hoekig, somwijlen zelfs zamengedrukt, met snijdende kanten. Hare kuipjes bezitten eene vlakke, bijna schotelvormige gedaante. Zij hebben in het midden der holte eene bijna vlakke schijf. De eikel, half eivormig, zelden half kogelrond, is éénehokkig, met uit den omtrek vooruitspringende scherpe ribben, die op de doorsnede driekantig zijn. Doorgesneden, vertoont hij eene stervormige holte. In het midden van deze holte, welke door een digt viltig haar wordt bekleed, is, in eikels, wier zaden onvolkomen ontwikkelen, eene piramide, aan welker top de zaadjes zijn vastgehecht. In eikels, die daarentegen rijp zaad bevatten, wordt de geheele holte door dit zaad, aan welks top de niet ontwikkelde eitjes liggen, gevuld.

In october droeg deze soort vruchten, in de bosschen van het gebergte beoosten Padang, waar zij tot op 400 N. ellen hoogte boven zee groeide.

Door den vorm van het kuipje verschilt *Q. omalokos* van de andere Indische soorten, en door het inwendige zamenstel van de akers heeft zij eenige overeenkomst met *Quercus platycarpa*.

## XVI. QUERCUS ARGENTATA. KHS.

*Q. ramulis tuberculatis, foliis oblongis breviter acuminatis, stipulis falcato-lanceolatis, amentorum floribus femineis solitariis, cupulis junioribus et adultioribus concentrice zonatis, glandibus rotundato-ovoïdeis basi disciformibus.*

ARBOR 30 metrorum; RAMI patentes, subteretes, fusco-grisei; RAMULI patentes, subteretes tuberculati, novelli compressiusculi pilosi. FOLIA longe petiolata, alterna, oblonga, quaedam oblongo-obovata, breviter acuminata, basi acuta, subintegerrima, supra nitida, subtus argentata, nervis primariis patentibus apice curvis nitidis, nervis secundariis parallelis approximatis, coriacea, 0,14 longa, 0,045 lata; PETIOLI subteretes, basi incrassati, lepidoti, 0,03 longi. STIPULAE laterales, falcato-lanceolatae, intus glabrae, extus pubescentes. GEMMAE axillares, ovoïdeae, tegmentis semi-rotundis et semi-oblongis obtusis imbricantibus. AMENTA feminea, axillaria vel alaria; PEDUNCULUS subteres, glaber. FLORES solitariis, tribracteati; BRACTEA inferior triangularis, acuta; BRACTEAE laterales auriculatae, pubescentes; CUPULA cum zonis concentricis obtuse dentatis, pubescens. PERIGONIUM superum, basi liberum, breve pelviforme, sexdentatum, dentibus triangularibus acutis, glabriusculum. OVARIUM hemisphaericum, glabriusculum, triloculare; OVULA bina, fere in medio loculi ab axi descendencia, opposita, ovoïdea; STYLI 3, basi connati, glabri; STIGMATA capituliformia. CUPULA sessilis, crateriformis, cum zonis concentricis calyculatis dentatis, pilosa, intus basi excavata sericeo pubescens. GLANS cupulâ subinclusa, rotundato-ovoïdea, mammillata, basi cum disco, nitida, epicarpio erustacco, sarcocarpio parvo fibroso,

endocarpio coriaceo, abortu unilocularis, loculo sparse piloso. SEMEN unieum, loculum explens, ovoïdeum, glabrum; SPERMODERMIS coriacea; CHALAZA micropylae opposita. EMBRYO erectus; COTYLEDONES semi-ovoïdeae; RADICULA et PLUMULA inclusae, turbinatae.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA; in monte Sakoembang: BORNEO.*

Explicatio Tab. 47. Figura Quercus argentatae. 1. Cupula junior. 2. Cupula junior, parte abseissa, eum ovario. 3. Ovarium longitudinaliter descissum. 4. Cupula adultior. 5. Cupula parte abseissâ, eum ovario. 6. Ovarii pars longitudinaliter dissecta. 7. Cupula fere matura. 8. Cupulae sectio longitudinalis cum glande et 9. Eadem, glande ablatâ. 10. Glandis basis. 11. Glans longitudinaliter dissecta. 12. Semen immaturum a latere, 13. postice et 14. basi. 15 et 16. Semina longitudinaliter dissecta. 17. Embryo, cotyledonibus abseissis.

De voorwerpen, welke van *Quercus argentata* op Borneo verzameld zijn, kunnen van die van Sumatra onderscheiden worden door de groene ondervlakte der bladen en door de jonge eikels. De laatste hebben, bij de voorwerpen van Borneo, eene meer regelmatige, half ronde of kegelvormige gedaante. Beide deze kenmerken zijn mij echter niet voldoende voorgekomen, om de, voor het overige zoo gelijke vormen, als soorten te onderscheiden.

Bij deze soort behooren waarschijnlijk, naar de takjes te oordeelen, eenige takken met mannelijke en zeer jonge vrouwelijke bloemen, welke wij in juli te Indrapoera verzamelden. Hare bladen zijn nog zeer klein. De mannelijke bloemen hebben eene volkomene ontwikkeling. Zij zijn, even als bij *Q. pubescens*, in hangende katjes. Onder iedere bloem zit een bijna rond schutblaadje met eenen behaarden rand. Het bloembekleedsel is in vier of vijf ongelijke deelen verdeeld. In hetzelfde zijn acht tot tien helmraden, van welke vier of vijf dikwerf iets langer zijn, dan de anderen. De helmknopjes bestaan uit twee lobjes, soms gelijkmatig, soms onregelmatig ontwikkeld, namelijk met het eene lobje, als een klein knopje, op den rug van het volmaakte. Van het onontwikkelde vruchtbeginsel is in dezelve nauwelijks een spoor zichtbaar. De vrouwelijke bloemen staan in kleine katjes, zonder mannelijke bloemen. Zij hebben een vierdeelig bekleedsel en zeer groote stempels.

## XVII. QUERCUS OÏDOCARPA. KHS.

*Q. ramulis glabris, foliis oblongis acuminatis, apicem versus serratis, amentorum fructibus solitariis, cupulis concentricè zonatis, glandibus ovoïdeis.*

ARBOR; RAMI subteretes, fusci; RAMULI patentes, teretes, lenticellati, nigrescentes, glabri. FOLIA versus apicem ramorum conferta, longe petiolata, oblonga, acuminata, basi acuta, versus apicem serrata, supra nitida, subtus pubescentia, nervis primariis erecto-patentibus rectis apice curvatis, nervis secundariis parallelis approximatis, coriacea, 0,19 longa, 0,06 lata; PETIOLI semiteretes, basi incrassati, glabri, 0,04 longi. GEMMAE axillares, obovoïdeae glabrae, tegumentis semi-rotundis et semi-oblongis. FRUCTUS solitarii. CUPULA sessilis, pelviformis, concentricè zonata, zonis calyculatis denticulatis, pu-

bescens, intus basi planiusculâ sericeo-pubescens. GLANS dimidia parte cupula cincta, ovoïdea, obtuse mammillata, basi plana cum disco parvo, epicarpio crustaceo, sarcocarpio fibroso, endocarpio coriaceo, abortu unilocularis, loculo glabro. SEMEN unicum, loculum implens, ovoïdeum, vertice acutum, glabrum.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Tab. 47. 18. Figura ramuli.

*Quercus oïdocarpa* is door houding en groeiwijze zeer na verwant aan *Quercus argentata*, in welker nabijheid zij wast. Beiden zijn hooge boomen met zeer ijle kroonen en cenen scherpen bladslag. Zij hebben ronde knoppen, welke eenige overeenkomst met die van *Quercus pedunculata* bezitten en uit talrijke schubjes bestaan. De vorm der bladen is van beiden tamelijk gelijk, alleen verschillende door de zaagtanden, welke bij *Q. oïdocarpa* aanwezig zijn. Hare vruchten wijken van elkander af door het uiterlijke, doch komen door hun inwendig zamenstel overeen. Bij *Q. oïdocarpa* is het kuipje kleiner in verhouding tot de akers, met minder ringen en bekkenvormig; bij *Q. argentata* is het bekervormig. De eikels der laatste soort hebben aan het beneden einde eene vrij aanzienlijke schijf; die der eerste slechts een zeer dun schijfje.

In october droegen beide soorten vruchten. *Q. argentata* had toen nog jonge en bijna rijpe vruchten. *Q. oïdocarpa* hebben wij toen met enkele vruchten verzameld. De mannelijke bloemen zijn door ons in geene van beiden waargenomen.

BIJDRAGE TOT DE KENNIS

DER

INDISCHE MELASTOMACEAE,

DOOR

P. W. KORTHALS.



Het uitwendig aanzien dezer gewassen heeft veel bijgedragen, om het aantal bekende soorten zoo aanmerkelijk te vermeerderen: want, over het algemeen behooren zij tot die planten, welke door den verzamelaar gemakkelijk zijn waar te nemen. Eenige weinigen slechts verheffen zich tot aanzienlijke boomen, waardoor zij hunne bloemen aan eene gemakkelijke waarneming onttrekken. Deze, en vooral de *Astronia spectabilis*, schieten met loodregte stammen tusschen de andere boschbewoners op en vermengen hunne vrij digte kroonen met die hunner naburen. Van minderen omvang zijn de *Astronia humilis* en de *Ewyckia galeata*, beiden met ijlere kroonen getooid. De andere soorten behooren tot de struiken of kruidachtige vormen. Als regte struiken zijn de *Melastoma* de meest uitgegroeide. Over het algemeen hebben zij verscheidene stengen uit denzelfden stoel ontwikkeld en ondergaan zij eene vrij snelle ontwikkeling. Kleinere struiken vormen andere geslachten: *Medinilla*, *Pachycentra*, *Pogonanthera*, *Osbeckia* enzv. Het laatste is soms een klein struikje, soms eenejarige plant. De eersten daarentegen zijn alle struikvormig. Hunne groeiplaats is bijna altijd op andere gewassen; soms op levende boomen, welke met mossen en varen bekleed zijn, soms op afgestorvene boomstammen. In de oksels der takken vestigt zich de hoofdstam, of wel vast tegen den stam aangeleund, en alsdan met zijne wortels tusschen de schors indringende, groeit hij naar boven. Tevens is aan deze struiken het voortbrengen van luchtwortels, gewoonlijk langs den stam loopende tot zij eenige humus vinden, eigen. Hun stam is gewoonlijk wit gekleurd, met talrijke verdikkingen. Andere gewassen zijn klimmende. Zij hebben eene aanzienlijke lengtontwikkeling en verheffen hunne bloemen somtijds in de kroonen der hoogste boomen.

De Marumiae komen bij deze groeiwijze het meeste in aanmerking en behooren met Cissus, eenige Bauhiniae en Apocynae, tot de grootste slingerplanten der bosschen. De Dissochaetae en verwante geslachten bereiken gewoonlijk zulk eenen grooten wasdom niet. Bij al deze klimmende planten heeft de stam een zeer los weefsel, hetwelk de opvoering eener groote hoeveelheid sappen bevordert. De kruidachtige gewassen zijn even verschillend van grootte: de Sonerila zijn dikwerf geen palm groot, terwijl Ochthocharis niet zelden tot twee ellen hoogte uitgroeit. De wortels van de onderzochte soorten zijn rijk aan vezels, soms tot wortelstok overgaande, bij de Melastoma; de luchtwortels zijn bij eenigen een gewoon verschijnsel, en verscheidene Medinillae hebben kleefwortels (alligatores). De laatste zijn opmerkenswaardig door hun ontstaan in ééne lijn boven elkander en door het splijten van den tak, ten einde dezen, nabij het mergkanaal ontstaande uitgroeisels doorgang te geven. De vorm van den stam is verschillend, al de figuren, van het ronde tot het zamengedrukt vierhoekige, doorlopende. Hetzelfde geldt van de takken, zijnde deze echter over het algemeen vierhoekig, met stompe kanten, scherp snij-dend of bladaardig uitgroeid. Bijzondere opmerking verdienen in dit laatste opzigt de takken eeniger soorten van Medinilla, welke de kanten als golvende randen gebogen hebben. De jongere takken zijn dikwerf hoekig, de oudere rond; zelden blijven zij bij het uitgroeijen den hoekigen vorm behouden. Hunne plaatsing is gewoonlijk naar het einde der takken, bij eene regelmatige ontwikkeling tegenover elkander, doch meestal afwisselend. Aan de inhechting is eene verdikking. De jongere takken en soms ook de oudere, worden door eene meerdere of mindere digte bekleeding bedekt, uit schubben, borstels, en bij vele uit stervormige haren bestaande. Het hoofdkenmerk der Melastomaceae leveren de bladen. Hunne schijf, hoe afwijkende ook in vorm, heeft gewoonlijk een bepaald getal hoofderven en evenwijdig loopende zijnerven. De eerste doorloopen soms de schijf tot aan den top, waar zij met de middelnerf zamenvloeijen. Bij eenigen steken deze nerven, voornamelijk op de ondervlakte, uit; bij anderen zijn zij in de zelfstandigheid van het blad bijna verborgen. De vleezige Medinillae-bladen behooren tot de laatste, en de lederachtige Dissochaetae, benevens de vleezige Sonerilae tot de eerste. De kleur der bladen wordt bij vele soorten door eene bruine hairbekleeding gewijzigd. Bij vele soorten is zij op de beide oppervlakten groen, alleen in tint verschillende; bij enkele tweekleurig: van boven groen en van onderen purper; bij de Sonerila picta geschakeerd. Hunne bekleeding is gelijk aan die der jongere takken, dikwerf uit borstels en stervormige haren bestaande, voortdurend of bij het ouder worden der bladen afvallende. Zij staan tegenover elkander en zijn gelijkvormig of ongelijkvormig. Het laatste is voornamelijk der Sonerilae eigen en gaat vergezeld van eene onregelmatige ontwikkeling van de beide helften der bladschijf van het grootere blad. De aanhechting der bladschijf gaat bij eenige Marumiae naar het schildsgewijze over; bij de meesten heeft zij aan den voet plaats. Geene der Indische soorten bezit de aan eenige Amerikaansche soorten eigene uitgroeijingen van of aan den bladsteel; doch wel, even boven denzelfden, ronde uitgroeijingen van de bladschijf. Daarenboven zijn de verbredingen van den bladsteel en de daarmee verbondene uitgroeijing van den tak, aan het punt van aanhechting, bij sommige planten (*Dalenia*, *Aplectrum*, enzv.) op te merken.

De bloemen staan alleen of zijn in kleine schermen, in tuilen, in pluimen of in trossen vereenigd, door grootere schutbladjes vóór de opening geheel bedekt of door kleinere aan den voet ondersteund; somtijds, vooral wanneer er drie bloemen vereenigd zitten, is de middelste bloem zonder schutbladen.

Hare orde van opening is middelpuntvliedend. De kelk bestaat uit eene buis en een' zoom. De eerste heeft de gedaante eener piramide, is vierhoekig of rond tot den kogelvorm, en ondergaat door de uitgroeijing aanzienlijke veranderingen. De zoom verschijnt als eene voortzetting der buis, zonder merkbare verwijding, of eenigzins verwijd met kleine tanden, in versehedene deelen, van drie tot vijf, gespleten, gaafrandig, nadat de deelen afgevallen (*Melastoma*), of nadat de zaamgegroeide deelen, als eene huid, rondsom afgesneden, gescheiden zijn (*Dalenia*, *Kibessia*). De bloemkroon maakt vele soorten tot ware sierplanten. Rozenrood, purperkleurig, helder blaauw of wit zijn hare bladen, wier grootte in sommige *Melastomae* en *Marumiae* uitmunt.

De bloembladen zijn vóór de opening gedraaid; na dezelve rozenvormig, soms klokvormig, dikwerf ongelijkzijdig, stomp of spits, op eenen rand in de buis van den kelk vastgehecht. — De stuifdraden staan op denzelfden rand als de bloembladen; tegenover en tussehen deze zijn, in gelijk of in een dubbel getal, allen vruehtbaar of voor de helft onvruehtbaar, in de nog ongeopende bloemen, naar binnen gebogen. De helmraden zijn lijnvormig of rolrond, glad, zelden behaard. De helmknopjes zijn vóór de opening, terug gebogen in de holte van de buis, om den stijl geplaatst: *Astronia*, *Kibessia*, *Ewyekia*; of in kleine holten tussehen de kelkbuis en het vruchtbeginsel besloten. De onvruchtbaren hebben grootere of kleine sporen van de stuifmeelhokjes en een' zeer ontwikkelde helmknoop. De vruchtbaren staan dikwerf tegenover de bloembladen. Zij zijn aan den voet of hooger, tot zelfs in het midden, vastgehecht; bij eenigen buitenwaarts (*extrorsae*): *Dissochaeta*, bij anderen binnenwaarts (*introrsae*): *Melastomae*, *Medinilla*. Hunne knopjes zijn langwerpig tot rolrond, regt of S-vormig gebogen, aan den top door één of twee gaatjes het stuifmeel uitstortende, of door twee spleten openspringende; zij bestaan uit twee hokjes, ieder weder met tussehenwanden voorzien. De helmknoop is gemeenlijk, zowel naar de binnen- als naar de buitenzijde, zeer vershillend uitgegroeid, en gaaf of in slippen of draden gespleten; hij heeft in sommige *Melastomata* eene aanzienlijke lengte, in sommige *Marumiae* eene opmerkelijke verdeling, en in andere geenen buitengewonen vorm.

Het vruchtbeginsel is bij *Kibessia* en verwante geslachten met de kelkbuis zamengegroeid, bij de anderen gedeeltelijk met dezelve door plaatjes verbonden, bij eenigen door eenen discus, uit borstels bestaande: *Melastoma*, *Osbeckia*; eene buis vormende: *Driessenia*; met vier stompe tanden gekroond: *Anerineleistus*, in het vrije gedeelte glad of bekleed, van drie- tot vijfhoekig. De eitjes behooren tot de *campylotropa*: *Melastoma*, *Otanthera*; of de *anatropa*: *Astronia*, *Dissochaeta*, en bedekken den zaaddrager geheel, zijn gewoonlijk talrijk en alleen bij *Pachycentria* in bepaald getal aanwezig. De zaaddragers zitten bij *Astronia* op den bodem van het vruchtbeginsel in het midden, bij *Ewyekia* en *Kibessia* tegen de wanden van hetzelfde, en bij de overige geslachten zijn zij door kleine stoelen of plaatjes aan de spil van het vruchtbeginsel vastgehecht. De stijl is bij de meeste soorten rolrond en de stempel als een puntje of kopje, zelden gedeeld.

De vrueht heeft veel verscheidenheid. Zij is bij al de Indische soorten geheel of gedeeltelijk door den kelk bedekt en met dezen zamengegroeid. De kelk deelt bij de meesten in de uitgroeijing en verandert soms geheel van vorm, door de mindere vergrooing van zoom, en van zelfstandigheid door de samen-



groeiing met de vrucht. De vrucht is eene bes, eene drooge bes of zaaddoos. Besaardig is zij bij *Medinilla*, *Pachycentria*, *Pogonanthera*, in welke al de deelen saprijk worden; bij *Dissochaeta*, *Aplectrum*, *Creochiton* is zij minder saprijk; nog drooger bij *Marumia*; bij *Melastoma* is de vrucht droog, maar groeijen de zaaddragers vleezig uit, en bij *Kibessia* en *Ewyckia* neemt de kelk, voornamelijk in dikte toe. De openspringende vruchten zijn allen *loculicidae*; zij springen geheel open en laten het staandertje naakt: *Ochthocharis*; of tot op of over het midden, blijvende door de kelkbuis omsloten: *Osbeckia*, *Anerinoleistus*, *Phyllagathis*; of aan den top door klepjes, aan de binnenzijde losgaande: *Sonerila*; of aan den top door klepjes, aan de buitenzijde vrij: *Driessenia*; of de kelk en vruchten verdroogen en scheuren als vezels van elkander: *Astronia*. De zaaddrager heeft bij de meeste soorten de zelfstandigheid der vruchtbekleedsels, doch wijkt bij *Melastoma*, zoo als de Heer Blume te regt aanmerkt, af, dewijl hij hier vleezig wordt en daardoor het openbarsten der vrucht veroorzaakt. Hij heeft vele kleine, door vliezige randjes omgevene holten. De zaden zijn talrijk en zeer klein, of minder talrijk en grooter, digt tegen elkander geplaatst, kromloopend (*campylotropa*): *Melastoma*, *Osbeckia*, *Otanthera*; gelijkloopend (*anatropa*): bij de andere geslachten. De laatsten, gewoonlijk de regte genocmd, zijn onregelmatig hartvormig bij *Sonerila*; hoekig, piramiedvormig, soms bijna halfrond, bij velen; strooachtig bij *Astronia*. Het eene gedeelte derzelve, dat de kern bevat, is rond of onregelmatig hoekig; het andere, dat de raphe inneemt, is bij de meeste soorten vlak; bij *Ewyckia*, *Driessenia*, enzv. als een klein vleugeltje; bij *Sonerila* rond, grooter dan het kerngedeelte. De testa is bij de meeste soorten hoornachtig, met kleine, hoekige gaatjes of met slingerende, netsgewijze verbondene ribben; bij *Astronia* vliezig, uit langwerpige cellen bestaande. Op haar is de navel bij *Melastoma* van eene cirkelvormige gedaante; bij de anderen is hij minder duidelijk en soms als een krans van cellen zichtbaar. Van dezen gaat de raphe langs het zaad, tot aan den voet of tot aan de zijde van den voet, naar de chalaza, die bij *Astronia* aan den voet, en bij de anderen meer naar de zijde van het zaad ligt. De raphe is bij al de onderzochte soorten onverdeeld. Het mesospermium heeft alleen bij *Astronia* eene celaardige, eenigzins belangrijke ontwikkeling. Het tegmen is bij allen vliezig. De kern is rolrond: *Astronia*; eivormig: *Medinilla*; gebogen rolrond: *Melastoma*. Bij de meesten zijn de zaadlobben het dikste en vormen deze een derde van de kern; maar bij de *Melastoma* is het worteltje het dikste.

De groeikracht van eenige soorten dezer familie is opmerkelijk. Zij vertoont zich bij *Phyllagathis* in de bladen, die in drie maanden drie vierkante ellen oppervlakte ontwikkelden; bij *Melastoma* en *Ochthocharis* openbaart zij zich in de uitgroeiing der stengen en loten; bij velen in de vorming der bloemen. Ook bij de laatsten is zij ongelijk, zoodat zij òf den kelk òf de bloemkroon begunstigt. Even als bij al de door mij waargenomene, gedraaide bloemkroonen, zijn de bloembladen in de jonge knoppen geheel regt en vrij. Eerst later groeijen zij rondom elkander, en vormen aldus den gewoonlijk kegelvormigen knop. Voor zoover ik heb waargenomen, openen zich de bloemkroonen des morgens en blijven zij, eenmaal geopend zijnde, tot haar afvallen of verwelken, in dienzelfden toestand. — De stuifdraden openbaren, in hunne ontwikkeling nagegaan, de oorzaak van de eigenaardige rigting en opening der helmknopjes. In zeer jonge knoppen zijn zij regtstandig; vervolgens zijn de helmknopjes omgebogen en tussehen het vruchtbeginsel vastgekneld. In een later tijdperk, wanneer de kelkbuis recds grooter geworden is, zijn de helmknopjes meer verlengd en nog steeds tussehen de kelkbuis en het vruchtbeginsel,

in eigene hokjes besloten, of dicht naast elkander geplaatst. Dan begint, wanneer het helmknopje gevormd is, de uitgroeiing van den helmknoop en van den helmknop. Over het algemeen is het mij voorgekomen, dat de ombuiging van de helmdraden, alleen bij de aanhechting van den helmdraad en helmknoop plaats heeft, dat de helmdraad regtop groeit en dat de helmknop naar binnen gebogen is. De meerdere vergrooing van den helmdraad in den jongen knop schijnt dus de eerste ombuiging te veroorzaken. De beknelling van de helmknopjes tusschen kelkbuis en vruchtbeginsel is daarentegen de oorzaak van de verdere eigenaardige zamenstelling. Het bovenste gedeelte van den helmknop wordt daardoor ingesloten en soms zeer verlengd. De zeer jonge helmknopjes zijn regelmatig, en eerst later nemen zij, door de onregelmatige ontwikkeling, den eigenaardigen vorm aan. Echter kan het onderzoek van de ontwikkeling, even als de vergelijkende beschouwing van de verschillende geslachten, gemakkelijk den gewonen grondvorm aantoonen. Zeer jong zijnde, bestaan de helmknopjes uit twee, in tweeën verdeelde hokjes. Dan zijn voornamelijk de twee hokjes zichtbaar en de tusschenwanden bijna geheel tot randjes zaamgetrokken of als vliesjes aanwezig. Tevens verlengt zich het bovenste gedeelte in eene buis, en het gewone zamenstel der hokjes wordt tot het benedenste gedeelte der helmknopjes bepaald. De opening door poren, aan velen eigen, wordt door de ontwikkeling veroorzaakt, en is een gevolg van de buisvormige uitgroeiing van een gedeelte der helmknopjes. Jong, zijn zij geheel gesloten, en zelfs in eenen zeer ontwikkelden toestand zijn er vliezen in de opening aanwezig, of bestaat de opening uit gescheurde lobjes: *Phyllagathis*. Het openspringen door een' of twee poren staat in verband met de meerdere of mindere uitgroeiing van den tusschenwand der helmknopjes. Is deze niet in verhouding tot den groei der helmknopjes, dan ontstaat er één poot; is de uitgroeiing gelijkmatig, dan springen de knopjes door twee poren open. De geslachten *Melastoma* en *Dissochaeta* leveren hiervan duidelijke bewijzen. — De bevruchting, na de opening der bloem geschiedende, wordt door de, zamentrekkend op de stuifmeelhokjes werkende en daardoor de uitstorting van het stuifmeel bevorderende, zonnewarmte begunstigd. — De ontwikkeling der kiem begint boven in het ei, dicht aan den mond, of beneden in hetzelfde, dicht bij de chalaza. In het eerste geval zijn de cellen van de chalaza, die men zeer goed den *kiemknop* kon noemen, verlengd tot aan den mond van het ei, en komen daar met de stuifmeelbuizen, wier werking geheel opwekkend schijnt te zijn, in aanraking; in het andere geval dringen deze buizen dieper in de eitjes, tot op de hoofdstof der chalaza.

De eilanden Java, Sumatra en Borneo zijn, voor zoover het onderzoek strekt, het rijkste aan deze familie. Over het algemeen heeft ieder derzelve zijne eigene soorten en ook enkele hunne eigene geslachten. Borneo heeft *Driessenia*, *Dalenia*; Sumatra *Anerincleistus*; beiden bezitten in *Phyllagathis* en *Ewyckia* aan Java vreemde geslachten. Dit eiland heeft daarentegen *Creochiton*. Daarenboven is Java het hoofdland voor de *Medinilla*, en bezit met Sumatra de meeste soorten van *Dissochaeta*. Aan *Melastoma* zijn zij even rijk, en *Marumia* behoort vooral op Sumatra en Borneo te huis. Op deze eilanden groeijen die gewassen, van het zeestrand tot boven de 2000 N. ellen hoogte. Zonnige drooge en beschaduwde vochtige plaatsen hebben hare *Melastomaceae*. Betreden wij de vlakte van Borneo's zuidoostkust, dan vinden wij soorten van *Melastoma* met purperkleurige bloemen, *Ewyckia* met helder blaauwe bloemen, over de vlakte verspreid of langs den boschzoom groeiende, en somwijlen *Pachycentria* met hare kleine bloempjes en stijve witgrijze stengen. Elders vermengt zich met deze eene helder groene,

naauwelijks eenige voeten hooge *Astronia*. Van de vlakte het gebergte beklimmende, verschijnen in de schaduw, de door bloemenpracht voortreffelijke en zich om de stammen windende *Marumia*; op de opene plaatsen *Melastoma* en in de schaduw de nederig groeiende *Sonnerilae*. Langs de rivieren hebben *Ochthocharis* hier en daar de moerassen ingenomen; groeijen meer ontwikkelde *Melastoma* op de hogere oevers; zijn *Ewyckia* een sieraad van de hellingen der heuvels; klimmen *Marumiae*, met *Dalania* door bloemenpracht wedijverende, tegen de boomen op, en verlevendigen *Pogonantherae* de naakte bogten van de verdeelde takken. Ook aan Sumatra's bodem strekken deze gewassen tot eenen uitmuntenden tooi, als herscheppende zij de vlakte in een bloemenveld. Hetzelfde is hier met *Melastoma* het geval. Boschwaarts, langs de rivieren, blijft deze soms hoofdplant, en in de schaduw zijn vooral de steenrijke oevers, met kleine, doch door kleur en vorm opmerkelijke *Sonerila* gesierd. De vleezige *Medinilla* zijn daar het talrijkst. Meer binnen in de bosschen prijkt de bodem met de purperbladerige *Phyllagathis*; groeijen de blaauwe, bloemendragende *Kibessia* soms zeer talrijk, en trekken *Marumia* en *Dissochaeta* door steng en bloemen de aandaekt. Hooger in het gebergte vermindert *Kibessia*, en wordt zij door *Astronia* vervangen. Java vertoont, door de uitgroeiing der soorten dezer familie, zijne buitengewone vruchtbaarheid. De *Melastoma*, welke op den, aan diamanten rijken grond van Borneo naauwelijks eenige duimen bereiken, zijn hier tot eenige ellen uitgegroeid. In zijne bosschen is dit geslacht menigvuldiger, dan op de andere eilanden. Hier groeijen tevens talrijke, kleine *Sonerilae*, klimmende *Dissochaeta* en soms *Marumia*. Langs de boorden der rivieren trekken de *Medinilla*, zoo door getal als ontwikkeling, door hare rijke bloempluimen en wasachtige beziën, de opmerksaamheid. Doch boven allen munt de *Astronia spectabilis* uit, en draagt haren naam met het grootste regt.

---

#### OSBECKIA. LINN.

Het geslacht *Osbeckia* werd door den stichter vermoedelijk voor de *Osbeckia chinensis* gemaakt en is vrij juist door hem gekenmerkt. Later heeft het door verschillende schrijvers zoodanige veranderingen ondergaan, dat het een mengsel is geworden van planten, noch aanzien, noch kenmerken gemeen hebbende. Met zijne wezentlijke kenmerken hersteld — een' discus uit schubjes bestaande, vierhokkige, in het bovenste gedeelte loculicide openspringende zaaddoozen, kromgebogene zaden — zal het eene natuurlijke groep vormen met *O. linearis*, *Zeylanica*, enzv. *O. Wallichii*, *O. stellata* en *ternifolia* zullen uit het geslacht *Osbeckia* moeten verwijderd worden, en een nieuw geslacht vormen. Haar aanzien, de vorm van den kelk, de, in eenen dubbelen krans verdeelden discus en de wijze van openspringen, geven hiertoe genoegzamen grond, en doen mij voor deze gewassen den naam *Ceramiocalyx*, die op den vorm van den kelk doelt, voorstellen. *Osbeckia glomerata*, mede door mij in het Rijks Herbarium gezien, behoort evenmin tot *Osbeckia*. Zij mist al de eigenaardige kenmerken van dit geslacht; eene opmerking, welke voor meerdere Amerikaansche soorten kan geldig zijn, en aan het onderzoek van hem, die de zoodanigen bezit en de kennis dier voorwerpen wil bevorderen, wordt aanbevolen. Het geslacht *Osbeckia* verschilt van *Lasiandra*, waarmede het vermaagschapt is, in aanzien en kenmerken, vooral door den vorm der zaden, welke, naar de afbeeldingen van Martius te oordeelen, anatropa in het Amerikaansche geslacht zijn.

---

## OSBECKIA LINEARIS. BL.

In de lagere streken van Java en Sumatra tiert deze soort gezellig op kleiaardige gronden, tusschen het gras. Haar bloei is in den droogen tijd, en vóór den regen zijn hare kapsels rijp en opengesprongen. Het aanzien dezer plant en dat der in de Molukken verzamelde, is gelijkvormig, doch in de kenmerken bestaat eenig verschil, waardoor beide zouden kunnen gescheiden worden.

Behalve de buitengewone verlenging van den snuit der helmknopjes, heeft deze soort nog soms den stijl spiraalsgewijze gewonden en den stempel naar de opening der helmknopjes gebogen.

## MELASTOMA. BURM.

CALYCIS tubus truncato-ovoïdeus, squamulis paleis vel setis vestitus; limbus quinque- rarius sexfidus, laciniis cum totidem appendicibus alternantibus, deciduus. PETALA 5—6. STAMINA numero duplo petalorum, saepe longitudine subaequalia. ANTHERAE oblongo-lineares, poro dehiscentes, connectivo inaequali in aliis calycis laciniis oppositis saepe elongato, in aliis petalis oppositis brevior antice biauriculato vel emarginato, postice nudo. OVARIIUM calyci semiadhaerens, disco carnosio excavato coronatum setigerum. STYLUS teres, apice subincrassatus. STIGMA punctiforme. CAPSULA baccata 5-ocularis, irregulariter disrumpens. SEMINA cochleata, hilo circulari micropylae punctiformi approximato.

Het geslacht Melastoma bevat drie eigenaardige groepen, die zoowel door haar uiterlijk aanzien, als door hare bepaalde kenmerken kunnen worden onderscheiden. De eene heeft *M. polyanthum* tot grondvorm, de andere *M. asperum* en de derde *M. pulcherrimum*. In ieder derzelve is vooral de bekleeding een in het oogvallend middel ter onderscheiding, en de vorm van den helmknoop een bij het onderzoek belangrijk kenmerk.

De bekende soorten zijn bezuiden het Himalaya gebergte, op de Sunda-eilanden en in Polynesië verzameld. Opmerkelijk is het, dat zoo weinige soorten op het vasteland van Indië voorkomen, en dat *M. denticulatum* op Nieuw-Caledonië, *M. taitense* op Otaheite, en talrijke soorten in de Sunda-eilanden gevonden worden. Op deze laatste behooren de meesten tot die kenmerkende gewassen, welke het aanzien of de physionomie der streek uitmaken. Gezellig verspreiden zij zich daar, hetzij met *Myrtus tomentosa*, hetzij met *Psidium*, over vlakten en bergruggen, soms tot aan het oorspronkelijke bosch, doch dikwerf worden zij door het Glagagras (*Imperata*) verdrongen. In de bosschen nemen weder anderen aanzienlijke ruimten in en worden daar door de steile hellingen begrensd. Hun voorkomen staat eigenaardig met hunne standplaats in verband. In vruchtbare gronden of in lage streken vonden wij *M. polyanthum*, enzv. met de schubvormige, teedere bekleeding; op droogere gronden verzamelden wij *M. Boryanum*, enzv. met de stevige borstelharen, en in de hoogere bergstreken van den Gédé enzv., aan de koude winden blootgesteld, werd gewoonlijk *M. setigerum* met zijne harde, broze bedekking en bultige bladen waargenomen.

Melastoma is door uitwendige overeenkomst, met Lasiandra, Chaetogastra, Pleroma, enzv. verwant. Het laatste geslacht heeft daarenboven veel overeenkomst met Melastoma door de kenmerken, welke De Candolle opgeeft, doch is, indien *Rhexia viminea* (*Lasiandra Maximiliana* Mart.) wezentlijk eene Pleroma zij, ligtelijk van Melastoma, door eenige kenmerken te onderscheiden. Deze plant heeft, volgens de afbeelding, geen' discus op het vruchtbeginsel, vermoedelijk ovula anatropa, boven, door spleten openspringende zaaddoozen, enzv.

### I. MELASTOMA POLYANTHUM. Bl.

Onder dezen naam heb ik verscheidene vormen van Java en Borneo vereenigd, die, hoewel zij eenig verschil opleveren, niet genoegzaam onderscheiden zijn, om als bijzondere soorten beschouwd te worden. De vormen van Java, waarop de Hoogleeraar Blume reeds de aandacht vestigde, hebben een aanmerkelijk verschil in de grootte der bloemen: de langs de rivier Tjisidani groeiende gewassen hebben gewoonlijk kleinere bloemen, dan die, welke in de velden verspreid staan. Die van Borneo zijn naar hunne standplaats te onderscheiden. De langs de Doeson-rivier verzamelde voorwerpen komen het meest met die van Java overeen. Zij groeiden over het algemeen in vruchtbare gronden. Hunne bekleeding is, even als die der Javaansche, niet zeer opmerkelijk. In den vorm der bladen bestaat bij hen eenen overgang van het eironde, aan het einde afgestompt, naar het elliptische. In het water groeiende of op plaatsen, die soms onderloopen, ontwikkelt zich de plant en worden al de deelen langer, doch ook lossen, terwijl de bekleeding insgelijks toeneemt.

Bij Banjermassing en hooger langs de rivier wast een breed- en een smalbladerige vorm. Beiden hebben de takken met eene digte, tegen de steng aangedrukte of meer openstaande, schubvormige, bruine bekleeding. Hunne bladen zijn voornamelijk van onderen digter behaard. Aan den berg Pamatton groeit, in eenen diorietbodern, een vorm, welks uiterlijk aanzien het zoude billijken, dat hij als eene bijzondere soort wierde aangeduid, ware het niet, dat de kenmerken, hoe bepaald ook aan eenige individuën eigen, bij andere minder bepaald voorkomen, en, vooral met die van Banjermassing, te veel overeenstemmen. De bekleeding verdient, door hare bijzondere ruwheid op de takken en door hare digtheid op de bladen, de opmerking. Daarenboven zijn de kelkslippen dikwijls zeer ontwikkeld en gewoonlijk vóór de opening van den kelk te zamengedraaid. In eenige bloemen staan zij vervolgens, door de uitgroeiing der tusschenruimten, aan den voet van elkander, doch in andere bloemen aan denzelfden tak zeer na aan elkander geplaatst. Eene andere verscheidenheid werd bij Poeloe-lampeï, in eenen kiezelaardigen grond verzameld. Deze is soms nauwelijks eenige duimen hoog. Hare bloemen, over het algemeen van dezelfde grootte, als de kleinbloemige vorm van Java, zijn niet zeer talrijk, zoodat sommige stengen drie, anderen slechts eene bloem dragen.

Deze, door uitwendige oorzaken te weeg gebragte mindere ontwikkeling, gaat gepaard met een ander onderscheid in den vorm en de grootte der kelkslippen, welke dikwerf langer zijn, dan de kelkbuis en eene bijna lijnvormige gedaante hebben.

Bij de opgegevene onderscheidingen kunnen nog die gevoegd worden, welke het onderzoek der bloemen oplevert. Zij zouden, inzonderheid de eigene vormen der oortjes van den helmknoop, tot kenmerken kunnen dienen. In de voorwerpen van Java en Pamatton zijn de oortjes van de kortere helmdraden sikkelvormig, die der langere stomp. In de voorwerpen van Banjermassing zijn die der kortere knodsvormig, die der langere met stompe, naar boven gekeerde punten. De voorwerpen van de Doeson-rivier hebben de oortjes der korte, als kleine kegeltjes en die der langere met spitse, naar boven gekeerde punten. De met lange kelkklippen voorziene gewassen van Poeloe-lampeï hebben, wat de gedaante dezer oortjes betreft, vele overeenkomst met die van de helmdraden der planten van Banjermassing.

In gunstige standplaatsen groeit *M. polyanthum* tot twee ellen hoge struiken. Zijne langwerpige, soms bijna ronde kroon, is gewoonlijk geheel met rozenroode of licht purperroode, rozenvormige bloemen bedekt, welke tusschen de licht groene bladen verspreid zijn.

Hij vormt in het algemeen geen hoofdstam, maar verspreidt zijne loten naar alle zijden uit een' stronk, even boven den grond. Zonnige of niet digt belommerde oorden, vooral de eerste, zijn zijne voornaamste standplaatsen. Hier groeit hij in kleine groepen of gezellig; op Java vooral in gezelschap van *Psidium*, met hetwelk hij geheele streken van vroeger bebouwd geweest zijnde gronden bedekt — groeiplaatsen, welke hem, volgens Rumphius, ook op Ambon eigen zijn. Op Borneo groeit hij gezellig aan den Pamatton en te Poeloe-lampeï, doch op geene dier plaatsen is zijne ontwikkeling aanzienlijk genoeg, om eenen merkbaren invloed op het aanzien der streek uit te oefenen. Hier hebben deze planten haar aanzijn aan den bodem ontwoekerd, terwijl op Java de bodem aan de plant overmaat van voedsel schenkt.

## II. MELASTOMA ERECTUM. W. JAËK.

De beschrijving van Jaek doet mij vooronderstellen, dat de plant, op Bantam door van Hasselt, en door mij op den Javaanschen berg Bebakti, ongeveer ter hoogte van 650 N. ellen verzameld, dezen naam moet dragen. Door hare groeiplaats in digte bosseken wijkt zij reeds van *M. polyanthum* af, terwijl hare groeiwijze meer gestrekt en haar loof ijler zijn. Voorts komen daar nog andere kenmerken bij, vooral de bekleeding der plant in het algemeen en van den kelk in het bijzonder. Deze doet de plant gemakkelijk onderscheiden. Zij geeft haar een zeer ruig voorkomen en bestaat uit toegespitste, langwerpige, drooge, vliezige schubjes of strooblaadjes op de kelken, uit kleinere schubjes op de takjes en uit wollige haren op de ondervlakte der bladen.

## III. MELASTOMA LANUGINOSUM. BL.

Deze soort is zeer vermaagschapt aan *M. Wallichii* D. C., van hetwelk zij door de bekleeding, voornamelijk der hoofdnerven, verschilt. Deze kan desgelijks dienen om haar, op het eerste gezigt, van *M. erectum* af te zonderen. Ook komt de, over het algemeen stomp eivormige, gewoonlijk korter gesteelde vorm der bladen, alsook de meer zamengedrongene bloeiwijze hierbij in aanmerking. Bij nader onderzoek dienen tot deze afscheiding ook de oortjes van den helmknoop, welke bij *M. erectum* sikkelvormig, puntig, en bij *M. lanuginosum* bijna rond zijn. Het voorkomen dezer plant is struikaardig. Uit eenen korten stam of stoel schieten bijna loodregt, tot eene hoogte van twee tot drie ellen, onderscheidene stengen, welker hooger gedeelte vooral, van takken, met eenigzins van elkander verwijderde bladparen voorzien is. Het lagere gedeelte dezer stengen is dikwerf bladerloos. De geheele plant heeft eene geelgroene, soms naar het bruine trekkende kleur. Hare aan het einde der takjes geplaatste bloemen zijn licht rozenrood. Zij versierde het hoogere gedeelte van den tegenwoordigen top des beruchten bergs Papandayang, waar zij tegen het donkergroen van de *Myrica* eene aangename schakering te weeg bragt. Daarenboven was zij op de steile en zonnige plaatsen van den berg Salak vrij menigvuldig en aanmerkelijk ontwikkeld.

## IV. MELASTOMA JACKIANUM. KHS.

*M. ramulis squamulatis, foliis oblongo-ovatis acutis basi obtusis supra setosis subtus setosis nervis squamulatis, floribus corymbosis ternis vel solitariis, calyce paleaceo, staminibus alternis connectivo elongato biauriculato.*

ARBUSCULA duorum triumve metrorum, habitu varia; RAMI saepe distantes, subtetragoni, squamulis parvis triangularibus vestiti, cinerei; RAMULI oppositi, erecto-patentes, apicem versus saepe incurvati, quadrangulares, quadrisulcati, squamulis triangularibus muniti; — novelli compresse tetrangulares, dense squamulati; rami ramulique saepe nodosi vel dilatati in ramulorum et foliorum insertione, ibidemque squamuloso-setosi. FOLIA decussata, erecto-patentia, oblongo-ovata, basi obtusa, apice acuta apiculata, subintegerrima vel minute crenulata, supra setosa setis margine crebrioribus, subtus setosa in nervis cum squamulis elongato-triangularibus, coriacea, 0,10 longa, 0,035 lata, quinquenervia: nervi curvati in apice folii cum nervo mediano confluentes. GEMMAE elongato-conicae, dense setosae et squamulosae, foliolis conduplicatis; PETIOLI semiteretes, supra sulcati, squamulati, 0,01 longi. FLORES terminales, raro axillares, corymbosi, terni vel solitares; PEDUNCULI subtetragoni, paleacei. ALABASTRUM ovoïdeum, bracteis duabus subrotundatis obtusis extus in medio paginae squamulosis involucreatum. CALYX tubo elongato-campanulato, paleis lanceolatis imbricatis dense vestito, limbo quinquepartito: partes ante anthesin convolutae, apice saepe contortae, breviter triangulatae, acutae, in medio paleaceae, marginae ciliatae. COROLLA pentapetala, fauci calycis inserta, aestivatione convolutâ; PETALA cum laciniis calycis alternantia, late obovata, obliqua, obtusissima, sparse ciliata, glabra, laete rosea. STAMINA 10, inaequalia, 5 majora calycis laciniis, 5 minora petalis opposita; FILAMENTA subaequalia, magnitudine parumper diversa; ANTHERAE oblongae, apice recurvae, basi obtusae, intus sulcatae, apice poro unico pollen emittentes, connectivo majorum elongatum falcatum in insertione in auriculas duas

acutas producto, connectivo minorum brevi ad basin lateris interni cum auriculis duabus obtusis. OVARIIUM dimidia parte cum calyce concretum, disco perigyno carnosio coronatum, subrotundum, parte libera setosum, quinqueloculare, loculis multiovulatis; OVULA placentas triangulares tegentia. STYLUS teres, sigmoideus, glaber; STIGMA papillatum, capitatum. CAPSULA calyce inclusa, rotundo-ovoidea, apice constrictâ annulo setarum coronata, irregulariter tamen saepe circumscisse dirumpens, quinquelocularis; DISSEPIENTA subcoriacea. PLACENTAE triangulares, carnosae, purpureae, lamellae ope axi affixae. SEMINA numerosa, minuta, basi in placenta immersa, compresse cochleata, apice rotundata, basi truncata, albida; HILUM circulare, excavatum; EXOSTOMIUM curvatum. TESTA crustacea, foveolata; TEGMEN membranaceum. EMBRYO hippocrepiformis, cylindricus, radiculâ obtusiusculâ, cotyledonibus obtusis.

*Crescit in parte occidentali Sumatrae.*

De gewassen, onder den naam *M. Jackianum* vereenigd, vormen, door de groeiplaatsen in hunne ontwikkeling gewijzigd, struiken, van twee tot drie, somwijlen van meerdere N. ellen hoogte. In de lage streken van Bangkahoeloe tot aan Priaman, groeiden zij gewoonlijk in korte, zaamgedrongene, digte struiken, tusschen *Myrtus tomentosa*, *Melanthesa*, *Glochidion* enzv., als gezellige planten. In de hoogere, bij Padang-bessie, hadden zij meerdere lengte. Hier was hunne groeiwijze slanker en de afstand van de takken, bladen en bloemen onderling grooter. Daarbij hebben de laatsten een veel lossere weefsel en zijn de stengen en takken ook met een los en ligtelijk verdroogend celweefsel opgevuld. Over het algemeen is aan deze gewassen een geelgroen, op de bovenvlakte eenigzins donkerder loof eigen, en hebben zij purperkleurige bloemen, welke de kroon gewoonlijk aan alle zijden omgeven. Deze gewassen bieden, bij een naauwkeurig onderzoek, eenig verschil, hetwelk, de uitersten genomen wordende, tot de afzondering van enkelen, onder eigene soortnamen, zoude aanleiding geven. Sommigen hebben de bladen minder behaard, de schutblaadjes kleiner, soms lancetvormig of langwerpig, de stroo aardige schubjes der kelken lang en smal, of korter, de kelkslippen verlengd of kort. Deze vorm, welke *Gymnanthum* konde genoemd worden, komt in de bovenlanden voor. Anderen hebben de schubjes der takjes openstaande, de bladen fijner behaard, dikwijls tamelijk lange kelkslippen en stompe oortjes aan den helmknop. En, als derde vorm, zouden de slanke gewassen van Padang-bessie kunnen genomen worden, die door langwerpiger bladen en de digte plaatsing der schubjes van den kelk te onderscheiden zijn. Al deze onderscheidingen gaan echter in elkander over, en zelfs de vorm der schutblaadjes is, blijkens de aan denzelfden tak voorkomende verscheidenheid, een zeer onzeker kenmerk.

Door haar voorkomen is deze soort vermaagschapt òf aan *M. polyanthum*, òf aan *M. sylvaticum*, naarmate zij meer of minder slank is uitgegroeid. Zij verschilt van beiden, als ook van *Melastoma malabathricum*, vooral door de bekleeding van den kelk.

De opengesprongene vruchten, in welke de zaden, als geelwitte korreltjes, over eene donker purperkleurige, vleezige stof liggen, worden soms, wegens het eetbare vleesch der zaaddragers, geplukt. Ook zijn zij dikwerf het voedsel van de langstaartige lijster.



## V. MELASTOMA PUNCTATUM. KRS.

M. ramulis squamatis, foliis oblongo-ovatis acuminatis basi obtusis supra setigeris subtus setigeris vel punctatis nervis squamatis, floribus corymbosis vel solitariis, calyce scarioso-squamato laciniis linearibus acuminatis, staminibus alternis connectivo elongato hamato-appendiculato.

ARBUSCULA 3—6 metrorum, stirpibus pluribus e trunco brevi productis, strictis, subteretibus, glabriusculis, cinereo-fuscis; RAMI pauci, praesertim versus apicem conferti, erecto-patentes vel patentes, subteretes, glabrescentes; RAMULI oppositi vel decussati, axiles saepe abortivi, erecto-patentes, obtuse quadrangulares, novelli compresse quadrangulares et quadrisulcati, dense squamati, squamis elongato-ovatis acuminatis serratis scariosis in nodis ovato-linearibus vel setiformibus. FOLIA versus apicem ramulorum aggregata, decussata, patentia, oblongo-ovata, acuminata, basi obtusa, crenulata, supra setigera, subtus in nervis primariis squamata et in nervis secundariis venisque setigera vel abortu setarum punctata, coriacea, quinquenervia, nervis mediis supra basin folii productis, nervis lateralibus margine approximatis minoribus e basi progredientibus, 0,035 lata, 0,09 longa; PETIOLI semiteretes basi incrassati, supra canaliculati, squamis setisque scariosis tecti, 0,015 longi. GEMMAE cuneiformes, setosae. FLORES in ramulorum apicibus terminales, solitares, terni vel plures, subcorymbosi; PEDUNCULI triangulares, aciebus acutis, dense scarioso-squamulati. BRACTEAE sessiles, basi pedunculorum insertae, solitares vel geminatae, elongato-ovatae, acuminatae, supra ad basin glabrae versusque apicem setosae, subtus squamatae, subcoriaceae, uninerves. ALABASTRUM ovoïdum. CALYCIS extus squamis lanceolatis dentatis scariosis vestiti; TUBUS campanulatus, obscure pentagonus, basi obtusus; LIMBUS quinquepartitus, partibus linearibus, acuminatis, intus supra basin setosis, tubo longioribus, deciduis, aestivatione contortâ, appendicibus quinque cum laciniis alternantibus lanceolatis. COROLLA subcampanulata, pentapetala, aestivatione contortâ in alabastrum obtusum; PETALA infra faucem calycis inserta, oblongo-obovata, obtusa, apice barbata, basi in unguiculam angustata, utrinque glabra, 0,02 longa, 0,01 lata, subcoriacea, purpurea. STAMINA 10, alterna inaequalia; FILAMENTA calycis et corollae partitus opposita, recta vel paulo curvata, subtetragona, glabra, carnosae; ANTHERAE minores corollae oppositae, elongato-ovatae, obtusae, basi subcordatae, antice sulcatae, postice subrotundatae, connectivo abbreviato, antice in auriculas duas falcatas acutas producto; antherae majores formae ejusdem, connectivo fere longitudine loculorum, curvato, antice in auriculas duas hamatas obtusas producto, semiterete, glabro. OVARIVM ad duas tertias partes usque vel semi-adnatum, ovoïdeum, acutiusculum, setosum, disco annuliformi setoso terminatum, quinqueloculare; OVULA numerosa, placentas subcylindricas lamellae ope axi affixas tegentia. STYLUS apice recurvus, teres, basi crassior, glaber; STIGMA calycem spectans, apiculare, subcapitatum, papillosum. CAPSULA calycis tubo ovato-globoso disrupto cincta, rotundato-ovoïdea, apice in tubum campanuliformem attenuata, setosa, irregulariter disrumpens, coriacea vel subcrustacea, quinquelocularis. DISSEPIENTA cartilaginea. SPERMOPHORUM lamellae versus marginem dilatatae ope axi loculi affixum, obtuse triangulare, extremitatibus acutum, foveolatum, carnosum, purpureum. SEMINA minuta, numerosa, in foveolis placentae disposita, placentas seriatim tegentia, approximata, nephroïdea, extremitate inferiore majore et crassiore, compressa, albida; HILUM basin seminis occupans, circulare, marginatum, margine in latere exteriori latiore; OMPHALODIVM in parte interiori hili rectangulare, chalazae approximatum; MICROPILA hilo approximata, uncinata. TESTA foveolata, foveolis circularibus radiatim

e circulo centrali versus marginem progredientibus, crustacea; **TEGMEN** membranaceum. **EMBRYO** seminis cavitatem replens, subhippocrepiformis, teres, extremitatibus obtusus, carnosus, albus; **RADICULA** duas tertias partes embryonis occupans; **COTYLEDONES** adpressae.

*Crescit in sylvis Burangrang: JAVA.*

De groeiwijze dezer plant doet vermoeden, dat zij van tijd tot tijd afsterft. Aan de meeste stronken toch vonden wij overblijfselen van stengen tusschen de nog levende, die in grooter of kleiner getal uit de stronken opgroeiden. Over het algemeen waren deze stengen regtstandig, vooral naar het einde van takken voorzien, soms in dezelve verdeeld. Door de van elkander verwijderde bladen waren zij zeer los en zonder kroon. Het loof is op de bovenzijde donker-, op de ondervlakte lichtgroen. Tusschen of tegen hetzelfde komen de purperkleurige bloemen zeer goed uit. — Alleen aan den berg Burangrang, op ongeveer 1500 ellen hoogte, is deze soort door ons waargenomen. Zij groeide daar gezellig in eene vochtige streek, alle andere, kleinere gewassen verdringende.

Deze soort heeft in den vorm van den stijl het eigenaardige, dat hij aan het uiteinde zoodanig omgebogen is, dat de stempel daardoor boven de poren van de helmknopjes komt.

Van de reeds beschrevene soorten is deze, door de grootte en den vorm der helmknopjes en van den helmknoop, alsook door de bedekking van de takjes en den kelk te onderscheiden.

#### VI. MELASTOMA ASPERUM. BL.

Het aanzien dezer soort heeft veel van de vorige plant, en de verdere kenmerken zijn mede in vele opzichten vrij gelijk. Bijzonder echter komt de vorm van de helmdraden ter onderscheiding in aanmerking: hunne helmknopjes zijn een weinig meer gedrongen en hebben niet, als bij de vorige soort, de uitstortingsporen aan den top, maar even beneden denzelfden; ook wijkt de helmknoop en door de mindere uitgroeiing en door den vorm af. Deze toch heeft aan de kortere helmdraden twee kleine, puntige oortjes en aan de langere een vleezig, ingesneden lobje, hetwelk soms van enkele, draadvormige aanhangsels is voorzien.

#### VII. MELASTOMA SETIGERUM. BL.

Deze plant wordt aan den Gedé tot op 1700 ellen, aan den Salak tot op 1500 ellen, en aan den Papandayang tot op dezelfde hoogte, boven den oceaan, gevonden. Zij groeit daar gezellig op de vlakke ruggen of op de tusschen de jukken liggende kleine vlakten. Haar aanzien is gelijk aan dat van *M. punctatum*, doch hare kenmerken doen haar gemakkelijk van hetzelfde onderscheiden. Tot deze onderscheiding komt onder anderen de oppervlakte der bladen bovenal in aanmerking. Deze hebben aan de ondervlakte kleine groefjes en op de bovenzijde priemvormige borstels, welke als het ware de punten van de verhevenheden uitmaken. Na dit kenmerk volgt de bedekking der takken, uit kleine, ruitvor-

mige, van boven getande, dicht over elkander liggende, bruine schubjes bestaande. Daarenboven herinneren de kelkslippen *M. punctatum*, terwijl de vorm der helmdraden daarentegen nader aan dien van *Melastoma Jackianum* verwant is.

### VIII. MELASTOMA PULCHERRIMUM. KHS.

*M. ramulis setoso-paleaceis, foliis ovatis vel oblongo ovatis acuminatis basi obtusis supra hirsutis, subtus in nervulis hirsutis in nervis setoso-paleaceis, floribus solitariis vel ternis, calyce setoso-paleaceo, staminibus calycis laciniis oppositis connectivo elongato et petalis oppositis connectivo brevissimo.*

**ARBUSCULA** 1—2 metrorum; **TRUNCUS** brevis; **CORONA** sphaerica vel obovoïdea; **STIRPES** plures ex eodem trunco productae; **RAMI** subteretes, subtetragoni, in nodis incrassati, glabri, vel glabrescentes, cinerei, fusco-maculati; **RAMULI** versus apicem ramorum aggregati, oppositi vel abortu alterni, ramulo axili abortiente subverticillati, erecto-patentes, apicem versus incurvati, compressi, aciebus obtusis, bicarinati, paleis setiformibus recurvis apice incurvis rubris vel purpureis tecti. **FOLIA** deeussata, subpatentia, distantia, ovata vel oblongo-ovata, acuminata, basi obtusa, in quibusdam subcordata, in aliis angustata, integerima vel subcrenulata, crenulis setos emittentibus, supra hirsuta, hirsutie flexuosa, subtus in nervis primariis setoso-paleacea, et in nervis secundariis hirsuta, coriacea, quinque-septemnervia, nervis tribus vel quinque in foliorum apicem excurrentibus, 0,13 longa, 0,06 lata; **PETIOLI** semiteretes, supra sulcati, basi dilatati, setoso-paleacei, 0,03 longi. **FLORES** in apice ramulorum terminales, solitares vel terni; **PEDUNCULI** breves, subteretes, setis subuliformibus patentibus incurvatis muniti; **BRACTEAE** geminatae, basi pedunculi affixae, suboppositae, sessiles, erectae, ovatae, acuminatae, supra glabrae, subtus setosae, membranaceae, uninerviae. **ALABASTRUM** junius bracteis inclusum, adultius ovoïdeum, setoso-paleaceum. **CALYCIS TUBUS** campanulatus, setoso-paleaceus, paleis pluribus ex uno puncto productis subuliformibus curvatis flavescentibus; **LIMBUS** quinquepartitus, quinqueappendiculatus, deciduus, aestivatione convolutâ; **PARTES** elongato-triangulares, intus glabrae, extus setosae; **APPENDICES** lineares, apice dilatatae, obtusae, setigerae. **COROLLA** pentapetala, aestivatione contorta obtusa; **PETALA** infra limbi divisionem annulo inserta, patentia, obovata, obtusa, basi lata, subcarnosa. **STAMINA** 10, inaequalia, perigyna, laciniis calycis et petalis opposita; 5 majora petalis opposita, filamentis subteretibus glabris, antheris subteretibus versus apicem tenuioribus sigmoïdeis poro apicali dehiscentibus, connectivo subterete curvato antice in auriculos duos obtusos vel obtusiusculos producto longitudine antherarum loculi; 5 minora, antheris forma majorum et magnitudine paulo minoribus, connectivo brevissimo antice in auriculos duos parvos obtusiusculos producto. **OVARIUM** dimidia parte cum calycis tubo concretum, ovoïdeum, subpentagonum, vertice in discum carnosum excavatum attenuato, dense setosum, quinqueloculare; **OVULA** numerosa, placentas teretes utrinque attenuatas lamellae ope axi affixas tegentia; **STYLUS** basi disco cinctus, rectus, teres, glaber; **STIGMA** apicale, truncatum, papillatum. **CAPSULA** immatura oblongo-pentagona, vertice cylindro brevi discoïdeo coronata, dimidia parte cum calyce concreta, parte libera setosa, quinquelocularis, epicarpio et mesocarpio coriaceo, endocarpio crustaceo. **PLACENTAE** axi loculi lamellae ope affixae, oblongae, extremitatibus obtusae, foveolatae, carnosae. **SEMINA** numerosa, parva, basi affixa, seriatim disposita, nephroïdea vel hippocrepica, basi truncata, apice rotundata, compressa, foveolata.

*Crescit in monte Bahay: BORNEO.*

Explicatio Tab. 49. Figura speciei. 1. Alabastrum cum folio florali et bracteis. 2. Alabastrum, calycis parte abscissâ. 3. Alabastrum, parte calycis et corollâ ablatâ, antheris retroflexis. 4. Floris, corollâ ablatâ. 5. Floris, longitudinalis sectio, corollâ et staminibus quibusdam ablati. 6. Ovarium, parte seminiferâ apertâ. 7. Capsula immatura, calycis parte longitudinaliter abscissa. 8. Capsula eadem longitudinaliter dissecta. 9, 10. Semina.

Aan den heuvel Bahai, langs de oevers van de Doeson-rivier, groeide deze plant in eenen kiezel-aardigen bodem. Als een ronde of eivormige struik met blinkend groene bladen en groote donker rozen- of purperkleurige bloemen, versierde zij in augustus en september, met de geel-groene Ewyckia gepaard, de onvruchtbare grijs-witte helling. Door den vorm is deze struik aan *M. polyanthum* verwant, doch door de grootte, de helder roode kleur der bloem en inzonderheid door de bekleeding der takjes niet alleen van deze, maar ook van al de beschrevene onderscheiden. De bekleeding, uit priemvormige, openstaande, kromgebogene strooblaadjes gevormd, geeft aan de jongere deelen der plant eene levendig purperroode kleur, en doet eenige verwantschap met *M. macrocarpum* en *M. sanguineum* van Don vooronderstellen. De bekleeding der kelkbuis herinnert die der *Osbeckia*. Zij bestaat uit verscheidene, aan één punt ontspringende borstelharen of uit bandjes, welke verschillend van lengte, in borstelharen verdeeld zijn. In beiden zijn deze deelen met eene ronde bogt naar boven gerigt.

Deze soort is door ons alleen op den heuvel Bahai, langs de rivier waargenomen. Daardoor wordt de mij gedane opgave waarschijnlijk, dat zij niet noordelijker, in het midden van Borneo hare standplaats heeft, maar dat zij meer westelijk menigvuldiger is en zich dus langs de ruggen, welke tusschen de groote Dajak-, de Kapocas- en de Doeson-rivier gelegen zijn, verspreid heeft.

#### IX. MELASTOMA BORYANUM. KHS.

*M. ramulis setosis, foliis ovalibus vel ovatis acutis vel emarginatis basi acutiusculis supra appresse hirtis subtus hirtis vel glabrescentibus nervis setosis, floribus terminalibus, calycis laciniis lincari-triangularibus acuminatis, staminibus connectivo elongato calycis laciniis et connectivo brevi petalis oppositis.*

**FRUTICULUS** magnitudine unius vel duo dodrantium, stirpibus pluribus ex eodum trunco brevi saepe rhizomatoïdeo nodoso productis; **CAULES** subteretes, basi crassiores, in ramulorum insertionem nodosi, rimosi, cortice saepe in lacinias longitudinaliter secedente, glabrescentes, fusci; **RAMULI** basi caulis saepe alterni, apicem versus oppositi vel decussati, erecto-patentes, obscure tetragoni, novelli compresse tetragoni sulcati, setis appressis brevibus in internodiis et setis longioribus subuliformibus in nodis ipsis muniti. **FOLIA** versus ramulorum apice conferta, opposita, ultima subverticillata, ovalia vel ovata, basi acutiuscula in quibusdam obtusa, apicem acuta vel emarginata, crenulata, supra appresse hirta, subtus in nervis primariis setosa, inter nervos hirta, adultiora glabrescentia, coriacea, trinervia, latiora subquinenervia, nervis lateralibus margine approximatis vix conspicuis, 0,04 longa, 0,015 lata; **PETIOLI** subteretes, supra sulcati, setosi, 0,005 longi. **GEMMAE** sessiles, axillares, dense setosae. **FLORES** in apicibus ramulorum terminales; **PEDUNCULI** subteretes, dense setosi, breves; **BRACTEAE** nullae vel subulatae; alabastrum elongato-ovoïdeum, attenuatum. **CALYX** aestivatione subcontortus, setis subuliformibus basi in tuberculos incrassatis

tectus, tubo campanulato basi rotundato vel acutiusculo, limbo quinquepartito quinqueappendiculato, deciduo, partibus lineari-triangulatis acuminatis utrinque setosis longitudine tubi vel longioribus, appendiculis inter calycis lacinias dispositis spathulatis setosis. COROLLA infra faucem calycis inserta, pentapetala, aestivatione contorta; PETALA calycis partibus alterna, obovata, inaequilatera, obtusa truncatave, apice barbata, margine saepe undulata, glabra, subcoriacea, rosea, 0,035 longa, 0,02 lata. STAMINA 10, inaequalia, majora calycis partibus, minora petalis opposita; FILAMENTA linearia, in medio longitudinis latiora, glabra; ANTHERAE ovato-cylindricae, antice sulcatae, apice dehiscentes; connectivo majorum longitudinem loculorum superante, arcuato, obscure tetragono, intus ad basin in auriculas duas obtusas producto; connectivo minorum brevi, intus breviter obtuse biauriculato. OVARIUM calycis tubo duabus tertiis partibus adnatum et paulo ultra eundem productum, oblongo-ovoïdeum, disco vertice carnosose setoso cylindrico, parte libera setosum, quinqueloculare; OVULA numerosa, placentas oblongas extremitatibus obtusas foveolatas carnosas lamellae ope axi loculi affixas tegentia, campylotropa. STYLUS basi annulo discoïdeo cinctus, teres, versus apicem subclavatus, glaber; STIGMA cylindricum, parte inferiore substrictum. CAPSULA calycis limbo obtuse quinquedentato cincta, ovoïdea vel subrotunda, parte libera dense setosa, irregulariter cum tubo calycis longitudinaliter vel in parte superiore circumscisse disrumpens, epicarpio et sarcocarpio coriaceo, endocarpio crustaceo foveolato, quinquelocularis. PLACENTA carnososa, obscure purpurea, profunde foveolata. SEMINA numerosa, minuta, tertia parte in foveolis placentae immersa, erecta, seriatim disposita, difformia, alia ovata angulata, alia inaequaliter nephroïdea, foveolata, foveolis serialibus approximatis circularibus; HILUM micropylae approximatum, oblongum, marginatum, omphalodio occupatum; MICROPYLA in apice, parte uncinata, seminis. TESTA crustacea; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS oblongo-ovoïdeus vel teres, curvatus, extremitatibus obtusus, parte cotyledonea emarginatus, parte radiculari saepe apiculatus.

*Crescit in monte Pamatton: BORNEO.*

Explicatio Tab. 50. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Alabastrum adultius. 3. Flos expansus. 4. Calycis tubus longitudinaliter descissus cum ovario. 5. Calyx cum fructuo immaturo. 6. Idem apice visus. 7. Fructus immaturus transverse dissectus. 8 et 9. Capsulae ruptae cum calycibus. 10, 11, 12. Semina.

Onder de gedaante van kleine, ééne tot twee span hooge, schraal van bladeren voorziene struikjes, groeit deze plant aan den voet van den Pamatton. Zij is hier over de geheele zuidelijke helling verspreid, groepsgewijze met *Nepenthes gracilis* de plaatsen innemende, waar de rotsen niet te naakt zijn. Even als deze *Nepenthes* heeft zij eene soort van wortelstok, waardoor de plant bij te sterke droogte behouden wordt. Door de grootte harer bloemen draagt zij bij, om aan het onvruchtbare land het aanzien van den weelderigen plantengroei der tropen mede te deelen.

Vroeger is deze soort, even als *M. nitidum*, door mij voor eene verscheidenheid van *M. porphyratum* gehouden. Deze planten verschillen evenwel onderling genoegzaam van elkander, om haar bijzondere namen te geven en daardoor een nieuw onderzoek over de juistheid dezer afscheiding uit te lokken. *M. porphyratum*, in de Molukken gevonden, heeft de bladen minder bekleed en de kelkbuis met lange, kromgebogene, priemvormige strooschubjes bedekt; *M. nitidum*, aan den berg Sakoembang gevonden,

verschilt door de schubvormige bedekking der takken, de priemvormige borstels der bladen en gewoonlijk door den oorsprong der beide zijnerven, welke even boven den voet van het blad, uit de andere, naar binnen gelegene hoofdnerven, plaats heeft.

#### X. MELASTOMA NITIDUM. KHS.

M. ramulis squamulatis, foliis ovatis acutis basi obtusis vel angustatis, floribus solitariis, calycis setosi laciniis oblongo-linearibus acuminatis.

FRUTEX 1—2 metrorum, stirpibus pluribus ex eodem trunco brevi productis erectis vel erecto-patentibus teretibus glabrescentibus cinereis; RAMI sparsi, alterni, subteretes, squamulis subulatis basi incrassatis arcte appressis sparsis vestiti; RAMULI versus ramorum apices dispositi, alterni vel oppositi; RAMULI axiles saepe abortivi, obscure tetragoni, squamulati, in nodis squamis subuliformibus paucis saepe tribus obsiti, fuscii. FOLIA decussata, patentia, ovata, quaedam ovalia, basi obtusa vel angustata, apice acuta apiculata, integerrima vel crenulata, supra setis brevibus subuliformibus e vaginis albidis productis vestite, subtus in nervis primariis squamulis subulatis basi incrassatis praedita, inter nervos hirsuta, glabrescentia, coriacea, quinquenervia, nervis omnibus e basi folii productis vel lateralibus supra basin bifidis, 0,04 lata, 0,065 longa; — juniora et evolventia supra dense vestita, subtus in nervis primariis dense et inter nervos sparsim vestita; PETIOLI 0,015 longi, semi-teretes, supra canaliculati ibidemque setis squamulatis dense obsiti, margine setis subulatis vestiti. FLORES in apice ramulorum solitaires, terminales; PEDUNCULUS teres, setosus, basi setarum subuliformium annulo cinctus. CALYX fructum immaturum includens, campanulatus, basi rotundatus, versus limbum paulo constrictus, setis subuliformibus basi incrassatis erecto-patentibus vestitus; LIMBUS quinquepartitus, quinqueappendiculatus; partes deciduae, oblongo-lineares, acuminatae, intus apice, extus omnino setosae; appendiculae calycis partibus alternantes, semiteretes, in setas excurrentes. CAPSULA duabus tertiis partibus calyci adnata, rotundato-ovoïdea, quinesulcata, disco carnosio excavato obsolete quinquentato setoso coronata, parte libera setosa; epicarpio et mesocarpio tenui, endocarpio crustaceo, quinquelocularis. PLACENTAE lamellae ope affixae axi quinquangulari, oblongae, compresse trigonae, coriaceae. SEMINA numerosa, serialia, placentas tegentia, nephroïdea, basi truncata, vertice obtusa, approximate foveolata.

*Crescit in monte Sakoembang, ad ripas Pankinan: BORNEO.*

De onder deze soort vereenigde gewassen kunnen tot drie verscheidenheden worden gebragt. Twee derzelve hebben den berg Sakoembang tot standplaats. Aldaar groeit er eene op den top, met eene ruwe, stijve bekleeding; terwijl de andere aan de helling, met gladdere, soms geheel onbehaarde bladen wast. Bij dit verschil kan nog de meerdere uitgroeiing der kelkbuis en de daardoor ontstaande verberging van de eivormige zaaddoos in dezelve, gevoegd worden. De derde verscheidenheid, vroeger door mij, wegens den dubbelen borstelkrans op de kruin der zaaddoos, *Distemma* genoemd, heeft de bladen soms bijna geheel onbekleed en van boven alleen van witte streepjes voorzien. Daarbij heeft zij duidelijke, vierkante takken, en over het algemeen in alle deelen eenen meer gestrekten vorm. Van *M. pulcherrimum* en *M. Boryanum* kan deze soort door de bekleeding, welke bij de eerste stroo aardig en bij de tweede borstelharig is, als ook door de scheeden, waaruit de haren ontspringen, onderscheiden worden.

## OTHANTHERA. BLUME.

## OTHANTHERA BRACTEATA. KHS.

O. ramis ramulisque obscure tetragonis setigeris, foliis ovalibus acutis utrinque setigeris, floribus racemoso-paniculatis bracteolatis.

ARBUSCULA 2—3 metrorum; RAMI patentes, abortu alterni, obscure tetragoni, duobus lateribus rotundatis caeteris planis, setigeri, in nodos dilatati, crebre setosi; RAMULI patentes, ultimi saepe incurvati, compresse et obscure tetragoni, in nodis latiores, quadrisulcati, setosi, novelli setis omnino tecti. FOLIA diffusa, versus apicem ramorum sita, decussata, ovalia, adultiora saepe ovata subcordata, juniora ovalia vel oblongo-ovalia, acuta, basi obtusa, serrulata, supra breviter setosa, subtus praesertim in nervis primariis et secundariis setosa, coriacea, septemnervia, nervis secundariis subparallelis approximatis, 0,11 longa, 0,05 lata; PETIOLI semiteretes, supra sulcati, dense setosi, 0,015 longi. FLORES terminales vel axillares, subsessiles vel pedunculati, racemosi, racemis subpaniculatis, bracteis 4—5 sessilibus subrotundis vel reniformibus cucullatis acutis vel obtusiusculis intus glabris extus setosis suffulti. CALYX in alabastro ovoïdeus, dense setis longis saepe partitis vestitus; TUBUS rotundato-ovoïdeus, basi obtuse-rotundatus, limbum versus constrictus; LIMBUS quinquepartitus, quinqueappendiculatus; appendiculis linearibus, apice trifidis, cum partibus triangularibus acutis intus glabris alternantibus. COROLLA in alabastro semi-ovoïdeo obtuso aestivatione convoluta, pentapetala; PETALA margini annulari inserta, obovata, obtusa, breviter unguiculata, dentata, membranacea, paucinervia. STAMINA 10, in alabastro inflexa, calycis et corollae partibus opposita, inaequalia; FILAMENTA calycis fauci inserta, linearia, alterna, calyci opposita versus antheras triappendiculata, appendiculis ovatis acutis verticillatis, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongae, poro subapicali dehiscentes, basi in auriculas duas compressas desinentes. OVARIUM calyci semiadnatum, ovoïdeum, disco decemdentato coronatum, setosum, quinqueloculare; OVULA numerosa, placentis oblongis carnosissimis inserta, campylotropa; STYLUS teres, glaber; STIGMA simplex vel quinquedenticulatum. FRUCTUS calycis limbo coronante velatus, rotundato-ovoïdeus, basi rotundatus, apice truncatus, centro conico, setosus, siccus, quinquelocularis, endocarpio crustaceo. SEMINA numerosa, parva, placentas oblongo-ovoïdeas laminis ope axi affixas tegentia, cochleata, extremitate hili circularis magis evolutâ; TESTA foveolata, crustacea; TEGMEN membranaceum. NUCLEUS subcircularis, teres, exalbuminosus; RADICULA obtusa; COTYLEDONES aequales.

*Crescit in sylvis Singalang: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 51. Figura speciei. 1. Alabastrum et bractearum verticillus flore ablato. 2. Alabastrum longitudinaliter sectum. 3. Alabastrum calycis parte ablata. 4. Flos. 5. Anthera antice visa. 6 et 7. Anthera a latere visa. 8. Ovarium longitudinaliter sectum. 9. Placenta ab interiore visa. 10. Calyx fructifer. 11. Idem calycis parte ablata. 12. Fructus transversalis sectis. 13. Fructus longitudinalis sectis. 15 et 16. Semina immatura a latere visa.

Het eigenaardige van deze soort is de, uit drie lobjes bestaande krans, welke het bovenste gedeelte der helmraden omgeeft, de dikwerf voortdurende kelkslippen en het, met deze afwisselende aanhangsel. Dit laatste komt vooral in aanmerking, dewijl het de plant aan het geslacht *Melastoma* nabijbrengt.

Bij de ontwikkeling ondergaan de buitenste vruchtdeelen geringe verandering. De zaaddragers worden een weinig vleeziger en de zaden brozer. De laatste schijnen in de, aan de plant blijvende vruchten te kiemen. Daarbij springt het bij den navel gelegen deel als een deksel open, hetwelk, naar den zaadmond gekeerd, blijft vastgehecht.

In de bosschen van den Singalang groeit deze soort op de vochtige vlakten. Zij trekt aldaar noch door haar aanzien, noch door hare menigte, bijzonder de aandacht. Zij is ijl, verradt eenen overmatigen stenggroei en mist het sieraad van bijzonder groote of talrijke bloemen. De geringe hoeveelheid onder de, anders voor haar in dit opzigt zoo gunstige omstandigheden, was misschien alleen plaatselijk en veroorzaakt, doordien deze plantensoort tot de voedingsmiddelen van den tapir behoort, en inzonderheid de jonge planten daartoe strekken zullen.

Het geslacht *Othanthera*, waartoe deze plant, uithoofde van haar aanzien, behoort, moet eene wijziging in het onderscheidende kenmerk ondergaan, waardoor hetzelfde meer beperkt en bepaald wordt tot de beide oortjes der helmknopjes.

---

## DISSOCHAETA. BLUME.

### I. DISSOCHAETA FALLAX. BL.

Deze soort kan tot de aanzienlijkste slingerplanten der bosschen van Melintang en van die, welke de oevers der rivier Salaut op Sumatra bezoomen, gerekend worden. Bij eene groote uitgroeiing der steng heeft zij talrijke bloemen, die in pluimen, met rozenroode bloemkroonen, vereenigd zijn. De bijzondere wijze van vasthechting der helmknopjes, ongeveer in het midden, is aan deze soort eigen.

Bloeiend en vruchtdragend te gelijk, werd zij in de maanden julij en augustus verzameld. De bloemdragende takken waren de hoogste, terwijl de vruchtdragende, welker ronde, drooge vruchten naar beneden gekromd waren, lager stonden.

---

### II. DISSOCHAETA INTERMEDIA. BL.

Door het aanzien en de groeiwijze aan de vorige verwant, kan de *Dissochaeta intermedia* alleen door een oplettend onderzoek der bloem worden onderscheiden. Niet alleen de aanhechting der helmknopjes aan den voet, maar ook bovendien de zeisvormige bogt derzelve, is alsdan het middel ter onderkenning.

Eenige bloemen der voorwerpen van Java hebben een ziekteverschijnsel, daarin bestaande, dat de stijl bolvormig uitgroeit en van binnen hol is.

Java en Sumatra zijn het vaderland van deze soort; op Sumatra echter is zij zeldzamer, dan de *Dissochaeta fallax*.

---



## III. DISSOCHAETA GRACILIS. BL.

Deze soort, door den ontdekker te regt de slanke genaamd, verzamelden wij langs de boorden van de Tewe-rivier op Borneo, langs die der Indrapoera-rivier op Sumatra, en in de lagere streken van Java. Op al deze groeiplaatsen was zij vrij menigvuldig langs de zoomen der bosschen, waar zij rondsom de kleinere stammen hecnkronkelde. De talrijke witte, in pluimen vereenigde bloemen en de regtstandige, blaauwe vruchtjes versieren, beide te gelijk, de geelgroene plant en doen zulks, naar den tijd der inzameling te oordeelen, het geheele jaar door.

Het slanke aanzien, de geelgroene kleur, de witte bloemen doen de *Dissochaeta gracilis* van de verwante soorten onderscheiden, en de vorm der, naar den voet verdund uitlopende en met twee draden voorziene helmknoopjes geeft een bepaald kenmerk van onderscheiding.

## IV. DISSOCHAETA BRACTEATA. KHS.

D. foliis quinquenerviis cordato-ovatis acutis subtus stellulatis, paniculis terminalibus vel axillaribus, antheris 8 alternis sterilibus basi affixis, connectivo bisetosus.

FRUTEX sarmentosus; RAMI obscure tetragoni, nodis incrassatis annulatis, glabrescentes; RAMULI erecto-patentes, obscure tetragoni, pube stellulatâ badia vestiti. FOLIA decussata, cordato-ovata vel ovata basi obtusa, acuta, supra glabra, subtus stellulata rufa, crasse coriacea, quinquenervia, nervis secundariis parallelis distantibus, 0,08 longa, 0,04 lata, decidua; PETIOLI in ramis articulati, subteretes, pubescentes, 0,005 longi. FLORES pedunculati, in alabastro oblongo-obtusi, pube ferruginea dense tecti, juniores bracteis duabus obovatis obtusis pubescentibus membranaceis fugacibus involucrati, paniculati; PEDUNCULUS COMMUNIS obscure tetragonus; PEDUNCULI secundarii dichotomi, compresse-tetragoni, nodis dilatati. CALYX intus glaber, extus dense ferrugineo-pubescentis; TUBUS elongato-obconicus; LIMBUS integerrimus, erectus in floribus junioribus, pateriformis in floribus adultioribus. COROLLA in alabastro semiovoïdeo obtuso aestivatione convoluta, fauci calycis inserta, tetrapetala; PETALA ovata, acutiuscula vel obtusa, saepe emarginata, utrimque glabra, carnosae. STAMINA 8, fertilia 4 petalis opposita, sterilia 4 iisdem alterna; FILAMENTA foveolis annuli faucis calycinae inserta, linearia, glabra; ANTHERAE fertiles curvatae, poro dehiscentes, connectivo basi introrsum bisetosae; ANTHERAE steriles lineares, rectae, basi introrsum bisetosae, roseae. OVARIUM dimidia parte calyci adhaerens membranarum ope locellos antherarum formantium, obtusum, hirsutum, quadriloculare; OVULA numerosa, placentas oblongas carnosas laminae membranaceae ope axi affixas tegentia, anatropa; STYLUS teres, parte inferiore pilosus; STIGMA capitellatum, in flore juniore erectum, demum recurvum. FRUCTUS calycis excreti limbo plano-pateriformi velatus, ovoïdeus, apice truncatus, styli rudimento umbonatus, stellulis sparsis vestitus, quadrilocularis. SEMINA numerosa, placentas carnosas oblongas basi latiores tegentia, irregulariter tetraëdra, basi angustiora; TESTA coriacea, foveolata, marginibus daedaleis foveolas argentibus; TEGMEN membranaceum. HILUS micropylae approximatum; RAPHE linearis in semine maculâ nigrâ indicata; CHALAZA hilo subopposita laterali-basilaris. NUCLEUS exalbuminosus; RADICULA obtusa; COTYLEDONES inaequales, oblongae, obtusae.

*Crescit juxta Doekoe: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 55. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flores tres cum bracteis. 3. Calyx. 4. Idem, dimidia parte abscissa ut ovarium appareat. 5. Idem longitudinaliter sectus. 6. Fructus calyce velatus. 7. Idem, calycis parte abscissâ. 8. Idem in longitudine dissectus. 9. Ejusdem sectio transversalis. 10. Semen. 11. Idem, testâ ablatâ, raphe distinctâ. 12. Embryo.

#### V. DISSOCHAETA CYANOCARPA. BL.

D. ramulis petiolisque setis simplicibus sparsis vestitis, foliis trinerviis (cum nervis 2 marginalibus) ovato-oblongis acuminatis basi cordatis, paniculis terminalibus glabris, staminibus 8, alternis effoetis. BLUME.

CAULIS sarmentosus; RAMI alterni, sparsi, versus caulis apicem conferti, subteretes, nodis paulo crassioribus annulatis, setosis; RAMULI erecti, obscure tetragoni, apicem versus compresse tetragoni, lateribus latioribus sulcati, nodis incrassati, setis diffusis vestiti. FOLIA opposita, ovato-oblonga, obtuse acuminata, basi cordata, utrinque glabra, coriacea, trinervia cum duobus nervis minoribus lateralibus, nervis secundariis parallelis distantibus, 0,12 longa, 0,05 lata; PETIOLI setigeri, 0,005 longi. FLORES in paniculis terminalibus subdichotomis, pedunculo communi quadrangulari quadrisulcato nodis incrassato sparsim setigero, pedicellis subteretibus farinosis, saepe terni, medio ebracteato, duobus lateralibus bracteatis; BRACTEAE obovatae, laciniatae, vel in lacinias lineares fissae. CALYX in alabastro obscure octogonus parte inferiore obconica majore; TUBUS obconicus, glabriusculus; LIMBUS truncatus, glaber, coerulescens. COROLLA in alabastro acutiuscula, aestivatione convolutâ, tetrapetala; PETALA versus apicem tubo calycis inserta, ovata, acuta, carnosa, glabra. STAMINA 8, alterna petalis opposita sterilia; FILAMENTA linearia, glabra, subcarnosa; ANTHERAE basi affixae, sigmoïdeae, teretes, bisulcatae, apice poro ovali dehiscentes; connectivum basi bilabiatum, labio exteriori acuto, labio interiori trilobo lobis lateralibus oblongis obtusis lobo medio triangulato acuto; ANTHERARUM rudimentum filiforme et connectivum subbilabiatum in staminibus sterilibus. OVARIUM membranarum ope calyci adhaerens, ovoïdeum, glabrum, quadriloculare. OVULA numerosa, placentas carnosas tegentia, anatropa. STYLUS teres, glaber; STIGMA truncatum, papillatum. FRUCTUS calyce velatus, baccatus, subglobosus, glaber, coeruleus, apice calycis limbo marginatus, truncatus, quadrilocularis, dissepimentis membranaceis. PLACENTAE laminae subcarnosae ope axi loculi affixae, subcarnosae, saepe laciniatae. SEMINA numerosa, parva, placentas tegentia, tetraëdra vel dimidiate ovoïdea, structurae uti in *Dissochaeta bracteata*.

*Crescit in sylvis humilioribus JAVAE et SUMATRAE.*

Explicatio Tab. 56. Figura speciei. 1. Flores cum bracteolis. 2. Alabastrum. 3. Alabastrum corollâ decidua calypratum. 4. Idem corollâ ablatâ. 5. Flos expansus. 6. Stamen sterile. 7. Anthera postice visa. 8. Stamen a latere visum. 9. Ovarium cum calyce longitudinaliter dissectum. 10. Fructus. 11. Fructus longitudinaliter sectus. 12. Idem transversaliter sectus. 13 et 14. Semina: *a.* hilum, *b.* micropyla.

## VI. DISSOCHAETA BIPULVINATA. KHS.

*D. ramulis petiolis nervis subtus setosis et rufo tomentosus, foliis trinerviis (cum nervis duobus marginalibus) ovato-oblongis acuminatis basi cordatis subtus basi bipulvinatis.*

*Crescit in monticulo Rantau: BORNEO.*

De bovengenoemde soorten, *D. cyanocarpa* en *D. bipulvinata*, hebben een gelijkvormig aanzien. Het zijn beiden rankende gewassen, van de andere soorten van dit geslacht, door de borstelvormige, openstaande, zwart-bruine haren, reeds als zij blad dragen, te onderscheiden. Daarenboven is de helder blaauwe kleur der vrucht aan *D. cyanocarpa* eigen, zijnde deze tot dusverre alleen vruchtdragend waargenomen.

In de lage streken van Oedjong-Karang groeide de *D. cyanocarpa* langs den zoom van het hoofdbosch, gewoonlijk de kleine boomen omwindende, in de schaduw. Aan den Rantau vond men haar onder gelijke omstandigheden. Zij droeg op de eerste plaats in november en december bloemen en bijna rijpe, blaauwe vruchten.

## VII. DISSOCHAETA ROSTRATA. KHS.

*D. hirsuta, ramulis teretibus, foliis rotundato-ovatis acuminatissimis basi cordatis quinquenerviis.*

*Crescit in monte Prarawin: BORNEO.*

Aan den berg Prarawin, hooger dan de berg Rantau, langs de Doeson-rivier gelegen, verzamelden wij takken van deze *Dissochaeta*-soort, die door de haarbekleding en den vorm der bladen, van al de vorigen afwijkt, en vermoedelijk aan de beide vorigen verwant is.

## VIII. DISSOCHAETA NODOSA. KHS.

*D. ramulis subteretibus, foliis ovatis acuminatis cordatis trinerviis (cum duobus nervis marginalibus) supra glabris subtus puberulis, paniculis terminalibus axillaribusve, staminibus 8, alternis sterilibus, antheris ovatis.*

CAULIS sarmentosus; RAMI subteretes, glabrescentes; RAMULI subteretes, obscure tetragoni, ultimi compressi, nodis incrassatis annulatis, fusco-farinosi. FOLIA decussata, petiolata, petiolis triangularibus supra planis farinosis, 0,01 longis, ovata, obtuse acuminata, basi cordata, supra glabra, subtus pube sparsâ vestita vel glabrescentia, trinervia, nervis lateralibus duobus margini approximatis, coriacea, 0,1 longa, 0,05 lata. FLORES terminales vel axillares paniculati; PEDUNCULUS COMMUNIS obscure tetragonus, quadrisulcatus, nodis incrassatis, farinosus, pedunculi et pedicelli subteretes; BRACTEAE anguste obovatae, deciduae. CALYX brevis, campanulatus, tubo subtetragono, limbo dilatato, extus farinosus, intus glaber. COROLLA in alabastro conico acuto aestivatione convoluta, tetrapetala; PETALA obovata, obtusa, glabra, subcarnosa. STAMINA 8: 4 fertilia, 4 sterilia; FILAMENTA annulo faucis calycinae inserta, linearia, basi paulo latiora,

glabra; ANTHERAE basi affixae, eompresse elongato-ovoïdeae, apice attenuatae ibidemque poro oblongo dehiseentes; 4 minores, eonnectivo quadrifido introrsum appendieibus duobus filiformibus rectis, extrorsum appendieibus flexuosis adaueto; 4 majores, eonneetivo extrorsum lamello rhombiformi, introrsum appendieibus duobus filiformibus munito. OVARIUM hirsuti quadrilocularis tres partes calycis tubo adhaerentes, parte quarta liberâ truneato-eoniea; OVULA numerosa anatropa. STYLUS in vertice ovarii articulatus, teres, versus apicem incrassatus; STIGMA capitellatum. FRUCTUS calyce velatus subcarnosus, sphaeroïdeus, ealyeis limbo pateriformi obvallatus, vertice truneatus, acumine eonio terminatus, 4-locularis, dissepimentis membranaeis. SEMINA numerosa, plaentas lamelliformes tegentia, structurae seminis Dissochaetae bracteatae.

*Crescit juxta Indrapoera: SUMATRA.*

De Dissochaeta nodosa is door haar aanzien verwant aan *D. bracteata*, met welke zij de licht groene kleur gemeen heeft. Zij wijkt echter van deze af, door de helmknopjes, door den kegelvorm der vruchten, en door de toegespitste punt der bladen. Zij heeft vooral den vorm en het samenstel der stuifdraden zeer eigenaardig, terwijl de uitgroeiing van den top der vrucht, in een kegelvormig puntje, de opmerking verdient.

#### IX. DISSOCHAETA BILIGULATA. KHS.

*D. ramulis fusco-farinosis, foliis oblongis obtuse acuminatis basi obtusis trinerviis (cum nervis 2 minoribus margini approximatis), floribus paniculatis, staminibus 8, alternis fertilibus, antheris subbiporosis, connectivo bilamellato.*

*Crescit in sylvis humilioribus juxta Paauw: SUMATRA.*

Door het aanzien en de kenmerken is deze soort vermaagsehaft aan *D. leprosa* en *D. sagitta* BLUME. Zij heeft de helmknopjes, op eene eigenaardige wijze zamengedrukt, eivormig, aan den top afgeknot, door de verlenging van den tusschenwand der knopjes, in twee poren openende, met eenen helmknop, welke uit eene bijna ongedeelde, afgeknotte buitenlip en eene in twee tongjes gedeelde binnenlip bestaat.

#### MARUMIA. BL.

Dit, door de fraaiheid zijner soorten uitmuntende geslacht, is door deszelfs stichter met regt als een der vertegenwoordigers van de familie der Melastomaceae, in de Rumphia afgebeeld. Zijn kelkvorm en het samenstel der vrucht geven aanleiding, hetzelfde met *Henriettia*, *Calycogonium* en *Clidemia*, vooral met het eerste geslacht te vergelijken, doch het viervoudige getal doet het afzonderen. Hierdoor nadert het aan *Dissochaeta*, dat door de gedaante van den, met tanden voorzien kelkzoom afwijkt. Daarenboven is het uiterlijk aanzien geheel vershillend: de eigenaardige donzige bekleeding, de groote, uit de oksels voortkomende, gewoonlijk drie- of vijftallige, aan stijve stelen gehechte bloemen, doen vele soorten van *Marumia* gemakkelijk onderscheiden van die van *Dissochaeta*, welke gewoonlijk minder bekleed en slanker van groei zijn, terwijl de, in pluimen vereenigde bloemen, door haar getal het gemis aan grootte vergoeden. Indien wij *Apleetrum* tot *Dissochaeta* brengen, dan verkrijgen wij daardoor

voor dit geslacht eenen tegenover de *Marumia stellulata* staanden vorm, met witte bloemen. Het geslacht bevat drie hoofdvormen. Twee derzelve hebben de kelken met enkelvoudige of stervormig verdeelde borstels; de derde heeft eene donzige bekleeding. Kenmerkend is het bij allen, dat zelfs de kleinste haartjes stervormig zijn, en de borstels niet zelden door deze sterretjes bedekt worden.

### I. MARUMIA AFFINIS. KHS.

*M. foliis oblongis acuminatis basi cordatis subtus fusco-tomentosis, pedunculis axillaribus trifloris, calyce ferrugineo-tomentoso, limbi laciniis triangularibus acutis integris.*

CAULIS scandens; RAMULI flexuosi, versus apicem conferti, teretes, laete fusco-tomentosi. FOLIA erecta, decussata, oblonga, breviter acuminata, basi cordata, supra glabra, subtus laete fusco-tomentosa, coriacea, quinquenervia, 0,07 longa, 0,03 lata; PETIOLI quadrangulares, fusco-tomentosi, 0,01 longi. FLORES axillares, terni; PEDUNCULI subteretes, fusco-tomentosi. CALYX in alabastro tubuloso-obconicus, parte superiore conicus, latere excavatus, fusco-tomentosus, aestivatione valvatus; calyx explicatus tubulosus, tubo apice angustiore, intus glaber; LIMBUS 4-partitus, persistens, intus tomentosus, glabrescens, laciniis triangularibus acutis vel acuminatis integris. COROLLA in alabastro conico aestivatione convoluta; PETALA 4, obovata, obtusa, glabra, membranacea, caduca. STAMINA 8, dissimilia, aestivatione inflexa; FILAMENTA linearia, glabra, subcarnosa; ANTHERAE FERTILES teretes, sigmoïdeae, apice poro dehiscentes, connectivo introrsum bisetoso extrorsum nudo vel setoso; — STERILES subteretes utrinque attenuatae, connectivo lamellato intus bisetoso extus setigero. OVARIUM dimidia parte calyci adhaerens, parte liberà semi-ovoïdea stellato-tomentosa, quadriloculare; OVULA numerosa, anatropa, placentas subcarnosae extus sulcatas tegentia; STYLUS teres, glaber; STIGMA punctiforme. FRUCTUS calyce velatus, siccus, pericarpio crustaceo, ovoïdeus, acumine truncato terminatus. PLACENTAE subcarnosae. SEMINA numerosa, tetraëdra, apice latiora; TESTA daedaleo-reticulata; HILUM micropylae approximatum; CHALAZA laterali-basilaris; NUCLEUS curvatus, teres, utroque angustatus.

*Crescit in montibus Sakoembang, Pamattong: BORNEO.*

Explicatio Tab. 60. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Alabastrum adultius. 3. Flos expansus. 4, 5. Stamina sterilia. 6, 7. Stamina fertilia. 8. Calyx dimidiatus cum ovario. 9. Fructus immaturus calyce velatus. 10. Idem parte calycis abscissa. 11. Idem, parte pericarpium abscissâ. 12. Axis fructus, parte placentae denudatâ. 13. Fructus sectio transversalis. 14, 15. Semina immatura. 16. Ovarii sectio. 17, 18, 19. Ovula. 20. Indumentum.

### II. MARUMIA LEPROSA. KHS.

*M. foliis oblongo-ovatis basi cordatis subtus in nervis ochraceo- et inter nervos flavido-tomentosis, pedunculis axillaribus unifloris, calycis laete ochraceo-tomentosi laciniis ovatis dentatis.*

*Crescit in declivie montis Sakoembang: BORNEO.*

Deze soort heeft den vorm der bladen bijna gelijk aan dien der *Marumia affinis*. Zij is evenwel door de bekleeding op den eersten blik te onderscheiden, zijnde deze bij *M. affinis* roestkleurig en bij *M. leprosa*

roestkleurig op en geelbruin tusschen de nerven. Daarbij komen de langere bladstelen en ook de langere, gewoonlijk slechts ééne bloem dragende bloemstelen, als onderscheidingsteeken. — Wij hebben haar alleen tegen de helling van den Sakoembang, op ongeveer 600 N. ellen hoogte, in de digte bosschen aangetroffen, terwijl de *M. affinis* aldaar hooger, op meer opene plaatsen, of lager, langs den rand van het bosch groeide. In eene, met deze standplaats overeenkomende gelegenheid vonden wij de *M. affinis* aan den berg Pamatton, met een zuiverder bruingekleurd dons op de ondervlakte der bladen. De jonge bladen van beide soorten bezitten op hunne bovenvlakte een grijs dons, hetwelk spoedig verdwijnt.

### III. MARUMIA PACHYGYNA. KHS.

*M. foliis ovali-ovatis breviter acuminatis basi cordatis quinquenerviis subtus ferrugineo-tomentosis, pedunculis axillaribus, calyce stellulato, limbi lobis laciniatis fusco-tomentosis, antherarum fertilium connectivo bisetosio.*

**CAULIS** scandens, ligno poroso, cortice crasso rimoso suberoso; **RAMI** subteretes, glabrescentes; **RAMULI** erecto-patentes, alterni ultimi oppositi, subteretes, in nodos incrassati ibidemque compressi, fusco-tomentosi. **FOLIA** patentia vel diffusa, decussata, ovali-ovata, quaedam ovalia, breviter acuminata, basi cordata vel subcordata, supra glabra, subtus ferrugineo-tomentosa nervis fuscis, crasse coriacea, quinquenervia cum duobus nervis minoribus margini approximatis, 0,13 longa, 0,08 lata; **PETIOLI** subteretes, fusco-tomentosi, 0,01 longi. **FLORES** axillares, saepe terni, in alabastro ovoidei; **PEDUNCULI** in pulvinis articulati, teretes, basi incrassati, apice latiores, saepe triflori vel subdichotomi; **BRACTEAE** oblongae, obtusae, parvae, deciduae. **CALYX** in alabastro aestivatione subvalvata; **TUBUS** tubuloso-campanulatus, extus setis stellatis ferrugineis et tomento vestitus, intus cinereo-tomentosus; **LIMBUS** 4-partitus, laciniis triangularibus obtusiusculis laciniatis fusco-tomentosis. **COROLLA** in alabastro semi-ovoideo convoluto-aestivata; **PETALA** 4, obovalia, obtusa, intus glabra, extus leprosa, membranacea. **STAMINA** 8, in alabastro inflexa, dissimilia; **FILAMENTA** linearia, glabra; **ANTHERAE** steriles teretes, subrectae, connectivo basi in lamellas duas laciniatas producto; **ANTHERAE** fertiles teretes, basin versus crassiores, sigmoïdeae, apice porosae, connectivo basi bisetosio. **OVARIUM** duabus tertiis partibus calycis tubo adhaerens, disco carnosio setigero coronatum, quadriloculare; **OVULA** numerosa, anatropa, placentas carnosas tegentia; **STYLUS** teres, in medio crassior, glaber; **STIGMA** punctatum. **FRUCTUS** calyce velatus, subsiccus, quadrilocularis, dissepimentis membranaceis. **PLACENTAE** laminae subcarnosae ope axi affixae, subcarnosae, oblongae, in transversali sectione cordatae. **SEMINA** immatura obconica; **HILUM** exostomio approximatum; **CHALAZA** basilaris, hilo opposita.

*Crescit ad ripas Tewe: BORNEO.*

Explicatio Tab. 58. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos, petalis ablatis. 3. Petalum. 4. Calycis longitudinalis sectio, ut ovarium appareat. 5. Ovarium longitudinalis dissectum. 6. Calyx dimidiatus, ovario adultiore denudato. 7. Ovarii sectio longitudinalis. 9, 10, 11. Semina immatura. 12. Vestimenti particula.

## IV. MARUMIA VULCANICA. KHS.

M. foliis oblongo-ovatis acutis basi cordatis subtus [uti et ramulis] fusco-tomentosis, pedunculis axillaribus tri-quinque-floris, calycis fusco-tomentosi et stellato-setosi laciniis semi-ovatis laciniatis, antherarum fertilium connectivo quadrisetosus.

*Crescit in monte Merapi: SUMATRA.*

Aan de noordelijke helling, op 2000 N. ellen hoogte, slingerde de *M. vulcanica*, in gezelschap eener soort van *Passiflora*, langs de talrijke soorten van *Laurineae*. Hare afgekapte steng was voor de hier werkende houthakkers eene wezentlijke bron van drinkwater, en vergoedde het gemis van nabijliggende beken. Door de kenmerken is deze, in een waar tropenklimaat, aan de oevers van de Téwé groeiende soort, verwant aan *M. pachygyna*; doch zij overtreft *M. vulcanica* verre door hare gestalte. Alle deelen zijn in de plant van de Borneosche rivier meer uitgegroeid, met uitzondering der, den kelk bekleedende sterren.

## V. MARUMIA JACKII. KHS.

M. ramis petiolis foliisque subtus fusco-tomentosis, foliis ovato-oblongis acuminatis basi cordatis, pedunculis axillaribus tri-quinque-floris, calycis tomentosi et stellulati limbi laciniis semi-ovatis obtusis integris.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Door gestalte en bekleeding is *M. Jackii* gelijkvormig aan *M. affinis*, maar door de kenmerken staat zij der beide voorgaande soorten nader. Hare groeiplaats, op 300 ellen hoogte, tegen het gebergte Melintang, beoosten Padang, schijnt bijzonder gunstig voor hare ontwikkeling, bereikende de steng somwijlen 20 en meerdere ellen lengte.

## VI. MARUMIA STELLULATA. KHS.

M. foliis ovato-oblongis acuminatis basi cordatis subtus sparsim stellulatis; pedunculis axillaribus tri-quinque-floris, calycis tomentosi et stellato-setosi limbi laciniis semi-ovatis obtusis integris.

*Crescit ad flumen Indrapoera: SUMATRA.*

Van al de opgenoemde soorten wijkt deze door de witte bloemkronen af. Zij heeft echter de groeiwijze en al de wezentlijke kenmerken met dezelve gemeen. In hare, weinig boven de zee verhevene standplaats, versierde zij, door talrijkheid en pracht van bloemen, de oevers der rivier van Indrapoera en de naakte boomstammen, welke haar ten steun verstrekten.

## DALENIA. KHS.

CALYCIS tubus suburceolatus; limbus circumscissus, calyptratim deciduus. PETALA 4, obtusiuscula, aestivatione convoluta. STAMINA 8, aestivatione inflexa; ANTHERAE poro dehiscentes, connectivo introrsum extrorsumque appendiculato. OVARIUM membranarum ope calycis tubo adhaerens, apice nudum, 4-loculare; OVULA anatropa, numerosa; STYLUS teres; STIGMA punctiforme. FRUCTUS calyce velatus, baccatus, 4-ocularis. SEMINA numerosa, angulata; HILUM micropylae approximatum; CHALAZA laterali-basilaris.

FRUTEX scandens. FOLIA opposita, ovato-rotundata, cordata, glabra. FLORES paniculati.

Door de groeiwijze behoort deze plant bij *Dissochaeta*, maar door haar eigenaardig aanzien en hare bijzondere kenmerken is zij de grondvorm van een eigen geslacht, hetwelk, door de opening van den bloemknop, *Jucunda* en *Diplogenea* herinnert, en door de uitgroeijing der knopen in vlakke schijven, aan *Aplectrum stipulare* verwant is.

Als geslacht heb ik dit, uit de binnenlanden van Borneo afkomstige gewas, den naam gegeven van eenen, te Rotterdam algemeen geachten Geneesheer, den Heer J. C. Dalen, die, als beoefenaar en beschermer der natuurlijke geschiedenis en kruidkunde, een opwekkend voorbeeld geeft aan zijne stadgenooten, en door het besteden van den, hem van de vervulling zijner maatschappelijke pligten overblijvenden tijd en van de hem door een gunstig lot geschonkene middelen, de wetenschappen tracht te bevorderen.

#### DALENIA SPECIOSA. KHS.

*D. ramulis in nodis dilatatis, foliis ovato-rotundatis acuminatis basi obtusis, floribus paniculatis.*

CAULIS scandens; RAMULI radicanes, obscure tetragoni, nodis incrassatis carnos-marginatis, ultimi compresse quadrangulares subsulcati, glabri. FOLIA opposita, ovato-rotundata, acuminata, basi rotundata vel subcordata, utrinque glabra, quinquenervia cum duobus nervis lateralibus margini approximatis, subcoriacea, 1,2 longa, 0,12 lata, basi subtus inter nervum medium et ambos laterales biglandulosa; PETIOLI 0,025 longi, semiteretes, glabri. FLORES terminales, paniculati, in alabastro elongato-octagono; PEDUNCULI obscure quadrangulares, glabriusculi; PEDICELLI subteretes. CALYCIS limbus circumscissus calyptraeformis; tubus obconicus truncatus intus glaber. COROLLA in alabastro conico aestivatione convoluta; PETALA 4, ovata, acuta, glabra, membranacea. STAMINA 8, dissimilia, omnia fertilia, inflexo-aestivata; FILAMENTA teretia, glabra; ANTHERAE teretes, versus apicem poro dehiscentem angustiores, sigmoideae; CONNECTIVUM introrsum bisetosum vel bipartitum, extrorsum simplex acutum vel truncatum. OVARIIUM membranarum ope calyci adhaerens, ovoideum, glabrum, quadriloculare; OVULA numerosa, placentas bifidas tegentia, anatropa; STYLUS teres, glaber; STIGMA punctiforme. FRUCTUS calyce velatus, baccatus, rotundato-ovoideus, apice truncatus et umbilicatus, quadrilocularis. SEMINA numerosa, tetraëdra; TESTA coriacea, daedaleo-reticulata; TEGMEN membranaceum; HILUM micropylae approximatum; RAPHE linearis cellulis majoribus cincta; CHALAZA laterali-basilaris. NUCLEUS ovoideus.

*Crescit ad flumen Tewe: BORNEO.*

Explicatio Tab. 58. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Alabastrum, calyce circumscisso. 3. Alabastrum, calycis calyptrâ ablata. 4. Flos expansus. 5. Stamen antice visum. 6. Stamen ex alabastro postice visum. 7. Idem a latere visum. 8. Idem antice. 9. Idem, filamentum abscisso. 10. Stamen a latere. 12. Stamen majus. 13, 14, 15. Sectiones antherae a basi ad apicem. 16. Stamen minus. 16<sup>a</sup>. Pollen. 17. Sectio longitudinalis alabastri. 18. Calycis et ovarii longitudinalis sectio. 19. Apex ejusdem objecti. 20. Fructus calycis parte abscissâ. 21. Idem longitudinaliter dissectus. 22. Fructus calyce velatus. 23. Ejusdem sectio transversalis. 24. Particula placentae cum seminibus. 25, 26, 27. Semina. 29, 30. Nuclei.



## MEDINILLA. GAUDICHAUD, BLUME.

Het geslacht *Medinilla* vormt, met *Pogonanthera*, *Pachycentria* en *Apateon*, eene natuurlijke groep, door vleezige bladen, donker- of licht-rozenkleurige bloemen en besaardige vruchten gekenmerkt. Zij zijn door het aanzien en voornamelijk door den helmknoop van elkander te onderscheiden. Deze laatste heeft bij *Pachycentria*, alleen aan de achterzijde, een spoorvormig uitgroeisels; bezit bij *Pogonanthera*, op dezelfde plaats, vele knodsdragende aanhangsels; draagt bij *Apateon* aan de achterste zijde geen, doch aan de voorste zijde een kort uitgroeisels en is bij *Medinilla* aan de voorzijde met twee en aan de achterzijde met één uitgroeisels voorzien. Het laatstgenoemde geslacht, door den Hoogleraar Blume juist omschreven en met de daartoe gebragte Indische planten verrijkt, bezit tot nu toe zijne meeste soorten op Java en Sumatra, enkele in de Molukken, en ééne op Borneo. Op de eerstgemelde eilanden zijn deze planten boschbewoners, zoowel der lagere als der hoogere bosschen, tot op ongeveer 1600 N. ellen. Hare standplaats, op levende of vermolmden boomstammen, hetzij in de oksels der takken of tegen de stammen, bevordert de vorming van talrijke, uit de oksels der bladen voortkomende worteltjes. Deze, gewoonlijk meer vastklemmend, dan voedselopnemend, zijn zeer schaars van wortelvezeltjes voorzien, indien zij op levende planten gehecht zijn. Door dezelve is de steng tegen den stam, die de plant draagt, aangedrukt, en bij de pluimdragende soorten alleen aan den top vrij, dikwijls omgebogen. De steng van vele soorten heeft eene grijs-witte kleur en eene rolronde of vierkante gedaante, bij enkele soorten met vleezige uitbreidingen aan de kanten of rondsom de steng. De bladen zijn bij de meeste zeegroen, verschillend van gedaante, doch inzonderheid opmerkelijk door de nervuur. De bloemen zijn bij de soorten der afdeeling *Campsoplacuntia* aanzienlijk groot, gewoonlijk licht-rozenkleurig. De helmraden zijn, even als in *Dissochaeta*, door derzelve gestalte, een middel ter onderscheiding der soorten. De helmknoop vooral is zeer verschillend: bij eenigen eindigt hij aan den voet in puntige sporen; bij anderen in knodsjes, die soms eene aanzienlijke lengte hebben. Van belang is vervolgens de gedaante en zelfstandigheid van den zaaddrager, reeds door den Heer Blume ter verdeeling gebruikt, en het zaad, dat, bij een nader onderzoek, zal bijdragen om de reeds bestaande afdeelingen te bevestigen of te wijzigen. De testa is bij eenigen aan twee zijden, bij anderen slechts aan eene zijde der kern uitgegroeid. Zij omgeeft daardoor de kern met een los omhulsel, waarin de raphe, door een fijn celweefsel, naar de zijdelings of meer aan den voet van het zaad gelegene chalaza loopt.

## MEDINILLA POLYANTHA. KHS.

*M. ramulis teretibus, foliis quaternis oblongo-obovalibus acutis triplinerviis, floribus subumbellatis.*

CAULIS pseudoparasiticus, teres; RAMI teretes, nodis incrassatis, cinerei, glabri; RAMULI curvati, teretes, glabri. FOLIA quaterna, saepe terna vel quinata, oblongo-obovalia, acuta, basi cuneata, triplinervia, utrinque glabra, coriacea, 0,13 longa, 0,05 lata; PETIOLI semiteretes, glabri, 0,025 longi. FLORES alares, umbellulati; PEDUNCULI obscure tetragoni, glabri. CALYX tubuloso-campanulatus, fauce latiore, limbo truncato, glaber. COROLLA in alabastro semi-ovoïdeo convoluto-aestivata; PETALA 4, obovata, obtusa, glabra, carnosae, roseae. STAMINA 8, aestivatione inflexa, dimorpha; FILAMENTA filiformia, glabra; ANTHERAE fertiles sigmoïdeae, apicem versus attenuatae, poro dehiscentes, connectivo introrsum

bifido extrorsum simplici appendicibus subelavatis; ANTHERAE steriles subrectae, connectivi appendicibus brevioribus. OVARIUM membranarum ope calycis tubo adhaerens, disco circulari coronatum, quadriloculare; OVULA numerosa, placentas carnosas subbifidas tegentia, anatropa; STYLUS teres, glaber; STIGMA punctiforme. FRUCTUS cum calyce connatus, carnosus, globosus in vertice truncato calycis limbo tubuloso angustiore cinctus, quadrilocularis. PLACENTAE carnosae, bifidae, lamellae ope axi affixae. SEMINA numerosa, obconica; TESTA daedaleo-reticulata, coriacea; TEGMEN membranaceum; HILUM micropylae approximatum; RAPHE linearis; CHALAZA laterali-basilaris.

*Crescit juxta Doekoe: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 61. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos junior. 3. Flos expansus. 4, 5, 6. Antherae fertiles a latere, a posteriore, ab anteriore. 7, 8, 9. Antherae steriles a latere, a posteriore et ab anteriore. 10. Flos, petalis et staminibus ablati. 11. Calyx et ovarium, limbo calycis partim abscisso. 12. Ovarium transversaliter sectum. 13. Fructus. 14. Idem longitudinaliter dissectus. 15. Idem transversaliter dissectus. 16, 17. Semina. 18. Testae particula.

## PACHYCENTRIA. BLUME.

### PACHYCENTRIA TUBERCULATA. KHS.

P. foliis superioribus subsessilibus oblongis acutis basi subcordatis, paniculis terminalibus.

FRUTICULUS pseudoparasiticus; CAULIS geniculatus, nodosus, cicatricibus excavatis fuscis; RAMI obscure tetragoni, glabrescentes; RAMULI compresse tetragoni, fusci, pube ferruginea vestiti. FOLIA decussata, breviter petiolata, superiora subsessilia, oblonga, vel oblongo-ovata, acuta, basi subcordata, utrinque glabra, carnosula, trinervia, 0,10 longa, 0,04 lata. FLORES terminales, paniculati; PEDUNCULI compressi, in nodis latiores, pubescentes. ALABASTRUM elongato-octagonum. CALYCIS glabri tubus obconicus, limbus dilatato-campanulatus obsolete quadridentatus. COROLLA aestivatione convoluta; PETALA 4, oblonga, obtusiuscula, glabra, rosea. STAMINA 8, subaequalia; FILAMENTA subteretia, glabra; ANTHERAE subteretes, curvatae, poro dehiscentes, connectivo postice in calcar curvatum producto. OVARIUM calyci adhaerens, disco carnosulo coronatum, quadriloculare; OVULA pauca, 4—8 in singulo loculo, anatropa; STYLUS teres, glaber; STIGMA capitatum.

*Crescit in monte Pamatton: BORNEO.*

Explicatio Tab. 63. Figura ramuli florentis Pachycentriae tuberculatae 1—6 et fructiferae P. varingiaefoliae 7—10. 1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Idem, petalis ablati. 4, 5. Stamina. 6. Ovarium longitudinaliter dissectum. 7. Fructus. 8. Idem in longitudine dissectus. 9. Semen immaturum cum embryone. 10. Semen.

## POGONANTHERA. BLUME.

## POGONANTHERA PULVERULENTA. BL.

P. foliis oblongo-ovalibus basi biauriculatis trinerviis coriaceis.

FRUTEX pseudoparasiticus; CAULIS subteres; RAMI obscure tetragoni, glabrescentes; RAMULI subteres, ultimi compressi, ferrugineo-farinosi. FOLIA decussata, oblongo-ovalia, obtuse acuminata, basi biauriculata, utrinque glabra, coriacea, trinervia, nervis secundariis distantibus, 0,14 longa, 0,06 lata; PETIOLI compressi, supra sulcati, glabriusculi, 0,015 longi. FLORES axillares vel terminales, paniculati; PEDUNCULI compressi, glabriusculi. CALYCIS tubus obscure tetragonus, limbo campanulato quadridentato. COROLLA in alabastro obtuso aestivatione convoluta; PETALA 4, oblique subrotunda, obtusa, extus pubescentia, rosea. STAMINA 8, aequalia, fauci tubi inserta; FILAMENTA tetragona, linearia, medio saepe incrassata, glabra; ANTHERAE basi affixae, ovatae, obtusae, poro apicali dehiscentes, connectivo basi posteriore in appendices clavatas producto. OVARIUM calycis tubo adhaerens, disco carnosio apice tubuloso coronatum, quadriloculare; OVULA numerosa; STYLUS teres, glaber; STIGMA minutum, denticulatum. FRUCTUS calyci adnatus et limbo ejusdem quadridentato apice obvallatus, bacca globosa, quadrilocularis. SEMINA numerosa, funiculorum filiformium ope placenti subcarnosis affixa, ovoïdea; TESTA reticulata; TEGMEN membranaceum; HILUM micropylae approximatum; CHALAZA basilaris. EMBRYO oviformis.

*Crescit in sylvis juxta Doekoe: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 65. Figura speciei. 1, 2. Alabastra. 3. Flos expansus. 4, 5. Petala. 6. Flos, corollâ ablatâ, in longitudine dissectus. 7, 8, 9. Stamina lateraliter, antice, postice visa. 10. Stamen: *a.* epidermis, *b.* endothecium, *c.* exothecium. 11. Fructus limbi parte abscissâ. 12. Idem longitudinaliter dissectus. 13. Ejusdem sectio transversalis. 14. Pollen cum endothecii particula. 15. Semen. 16. Semen longitudinaliter dissectum. 17. Embryo.

## OCHTHOCHARIS. BLUME.

## OCHTHOCHARIS PANICULATA. KHS.

O. ramulis quadrangularibus, foliis oblongis acuminatis quinquenerviis serrulatis, floribus paniculatis.

PLANTA suffruticosa; RAMI tetragoni, glabri; RAMULI tetragoni, sulcati, glabri, ultimi compressi tetragoni rufo-farinosi. FOLIA patentia, distantia, decussata, oblonga vel oblongo-ovata, acuminata, mucronulata, basi obtusa, serrulata, membranacea, quinquenervia, nervis secundariis parallelis distantibus, utrinque glabra, basi rufo-pubescentia, 0,12 longa, 0,03 lata; PETIOLI semiteretes, glabriusculi, 0,03 longi. FLORES terminales vel axillares, paniculati, bracteati, bracteis oblongis parvis; PEDUNCULI compressi tetragoni, fusco-farinosi. CALYCIS tubus campanulatus intus glaber extus sparsim farinosus, limbo quinquentato, dentibus obtusis. COROLLA in alabastro obtuso aestivatione convoluta; PETALA 5, ovalia, acutiuscula, membranacea. STAMINA 10, in aestivatione inflexa; FILAMENTA subteretia, medio paulo

crassiora, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongae, compressae, apice uniporosae, connectivo postice calcarato. OVARIUM basi calycis tubo adhaerens, ovoïdum, obtusum, quinqueloculare; OVULA numerosa, anatropa; STYLUS teres, medio crassior; STIGMA capitatum; CAPSULA cum calyce concreta, sicca, loculicide dehiscens, quinquevalvis, valvis in medio septigeris ab axi secedentibus. COLUMNA denudata, placentas lamellae ope affixas gerens. SEMINA numerosa, trigona, duobus lateribus planis, tertio rotundato; HILUM micropylae approximatum; CHALAZA laterali-basilaris. NUCLEUS ovoïdeus.

*Crescit juxta Poeloe-lampeï, etc.: BORNEO.*

Explicatio Tab. 64. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Idem, calycis parte et corollâ abscissa, staminibus inflexis. 3. Flos. 4. Sectio longitudinalis ovarii et calycis. 5, 6, 7. Stamina. 8. Capsula calyce velata. 9. Capsula nuda. 10. Valvula cum septo. 11. Columna cum seminibus, valvis ablatis. 12. Eadem seminum parte ablata. 13. Columna cum trophospermio. 14. Eadem ab apice visa. 15, 16, 17. Semina.

### SONERILA. ROXBURGH.

Het geslacht *Sonerila* bezit een aantal soorten in de Engelsch-Indische Bezittingen, voornamelijk op Ceilon, waar deze gewassen, in de bosschen van het gebergte, zeer talrijk schijnen te zijn; ééne soort groeit op Poeloe-Pinang en verscheidene soorten komen op Sumatra en Java voor. Zij groeijen op de laatstgenoemde eilanden gewoonlijk gezellig. *Sonerila tenuifolia* en *S. pauciflora* zijn op den berg Patoeha, over de, nabij den top gelegene vlakte verspreid, in de moerassige plaatsen, met enkele soorten van *Procris* gezellig groeiende; *S. begoniaefolia* wast op steenachtige plaatsen, tegen verwerende trachietrotsen op den Papandayang, tegen conglomeraatgesteente in het gebergte Melintang.

De waargenomene en door afbeeldingen bekende soorten doen mij vooronderstellen, dat het geslacht *Sonerila* eene splitsing in verschillende geslachten, die door hun voorkomen kennelijk zijn, zoude toelaten. Daarenboven zal dit geslacht, door zijn zamengegroeid vruchtbeginsel, de ovula anatropa en het zamenstel en de wijze van openspringen der vruchten, eene bijzondere afdeeling van de Melastomaceae vormen, wanneer deze familie, bij eene herziening, verdeeld wordt volgens het vrij of zamengegroeid zijn van het vruchtbeginsel, de ontwikkelingswijze der eitjes, de geaardheid der vrucht en de gedaante benevens het zamenstel der zaden.

#### I. SONERILA BEGONIAEFOLIA. BL.

*S. herbacea, hirsuta, foliis septuplinerviis oblique cordatis acuminatis ciliatis, altero minuto cordato, racemis axillaribus, calycibus setosis.*

PLANTA herbacea, socialis; CAULIS subteres, glabrescens, fusco-hirsuta. FOLIA opposita vel abortu alterna, inaequalia, majora oblique dimidiata vel cordata, breviter acuminata, altero angulo basilari rotundato auriculato, altero angustato, integerrima, ciliata, supra setis sparsis obsita, subtus hirsuta, septuplinervia, membranacea; minora cordata, aequilatera. FLORES axillares, racemosi, bracteati, bracteis obovato-

oblongis, pedunculo compresso fuseo hirsuto. CALYCIS hirsuti tubus campanulatus, limbo e partibus 3 late triangularibus aetis. COROLLA in alabastro obtuso convoluto-aestivata; PETALA 3, ovata, acuta glabra. STAMINA 3, in aestivatione inflexa; FILAMENTA linearia, glabra; ANTHERAE basi affixae, biporosae, connectivo exappendieulato. OVARIUM calyceis tubo adnatum, disco parvo circulari, triloculare; OVULA anatropa, placentas stipite carnosa axi affixas tegentia; STYLUS teres glaber; STIGMA truneatum. CAPSULA cum calyce muricato connata, vertice limbo calyceis membranaceo subocculta, apice valvis tribus bifidis dehiscens, dissepimentis membranaceis. COLUMELLA capitata, placentas oblongas fovealatas gerens. SEMINA subdidyma; parte nucleum includente minore testâ, cellulis hexagonis; parte rapheos duplo majore, daedaleo-reticulatâ. HILUM myeropylae approximatum; CHALAZA laterali-basilaris. EMBRYONIS radícula subteres, cotyledonibus subrotundis.

*Crescit in sylvis Melintang et Singalang: SUMATRA.*

Explicatio Tabulae. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos. 3. Capsula. 4. Capsula transversaliter dissecta. 5. Capsulae vertice cum limbo calycis. 6. Eadem, limbo abscisso. 7. Capsula longitudinaliter divisa. 8, 9. Columellae cum placentis. 10. Columella cum placentis ab apice visa. 11, 12, 13, 14. Semina.

## II. SONERILA PICTA. KHS.

*S. glabra*, foliis oppositis aequalibus vel inaequalibus ellipticis pinninerviis, floribus racemosis secundis, calycibus glabris.

PLANTA herbacea; CAULIS flexuosus, nodosus, subtetragonus, glaber; RAMULI obscure tetragoni, fuseo-leprosi. FOLIA deussata, caulina opposita aequalia, superiora inaequalia, elliptica utroque acuminata, supra glabra, subtus in nervis pubescentia, membranacea, pinninervia, 0,05 longa, 0,02 lata; PETIOLI semiteretes. FLORES axillares vel terminales, racemosi, secundi, braeteati, braetis lanceolatis. CALYCIS tubus trigono-conicus, sparsim leprosus, limbo tridentato. COROLLA in alabastro conico aestivatione convoluta; PETALA 3, oblonga, acutiusecula, intus glabra, extus pilis glandulosis obsita. STAMINA 3, aestivatione inflexa; FILAMENTA filiformia, glabra; ANTHERAE basi affixae et subeordatae, connectivo exappendieulato. OVARIUM calyceis tubo adnatum, triloculare; OVULA numerosa, anatropa; STYLUS subteres, glaber; STIGMA capitatum. CAPSULA cum calyce connata, trigono-obpyramidata, glabra, apice valvis tribus dehiscens. COLUMELLA vertice capitata; PLACENTAE subteretes, unisuleatae, foveolatae, lamellae ope columellae affixae. SEMINA *Sonerilae begoniaefoliae*.

*Crescit in saxis ad flumen Batang-Bessie: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 52. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos. 3, 4. Ovarium cum calyce. 5. Sectio transversalis ovarii. 6. Capsula cum limbo calycis a vertice visa. 7. Eadem, limbo abscisso. 8. Capsulae valvula. 9. Capsulae pars cum columella et placentis. 10. Columella. 11, 12, 13, 14. Semina.

In gezelschap van Argostemma, Trichomanes en Procris groeide de *S. picta* langs de steenige oevers der beken van het gebergte Melintang. Zij vormde daar, met deze kleine gewassen, fraaije groepjes, welke door het grijsgroen van Argostemma, het olijsgroen van Trichomanes, het geelgroen van Procris

en het veelkleurige van de *Sonerila*, aangenaam geschakeerd waren. Hare, door den wind uitgestootene zaden drijven dikwerf langs de bergwanden, hetgeen bij mij het vermoeden doet ontstaan, dat de natuur die zaden met eene zoo aanzienlijke, blaasvormige raphe voorzien heeft, om hen daardoor drijvende te houden, en dat de hun eigene ruwheid strekken moet, om hen des te gemakkelijker vast te hechten.

### III. SONERILA OBLIQUA. KHS.

*S. herbacea*, foliis dissimilibus majoribus oblique-ovatis acutis minoribus ovatis, floribus racemosis secundis, antheris medio affixis, capsulis trigonis glabris.

*Crescit in sylvis Ambadjang: SUMATRA.*

### ANERINCLEISTUS. KHS.

CALYCIS tubus campanulatus, limbo quadripartito persistente. COROLLA calycis fauci inserta; PETALA 4, ovata, aestivatione convolutâ. STAMINA 8, aequalia; ANTHERAE oblongae, uniporosae, connectivo brevi. OVARIIUM basi calycis tubo adhaerens, disco quadrisquamoso, 4 locale, multiovulatum; STYLUS teres; STIGMA subcapitatum. CAPSULA calyce irregulariter rupto vestita, loculicide quadrivalvis, quadri-ocularis. SEMINA angulata, hilo micropylae approximato, chalazâ laterali-basilari.

ARBUSCULA foliis oppositis obovatis, floribus umbellulatis, sylvas montanas insulae Sumatrae inhabitans.

De *AnerinCLEISTUS* behoort tot de *Lavoisierieae* en is verwant aan *Behuria*, *Huberia* en *Centradenia*, welke allen in den vorm der zaden en ook door andere kenmerken, middelen ter onderscheiding opleveren. Verder komt, tot eene vergelijking, het geslacht *Pyramia*, dat echter eene vijfvoudige verdeling heeft, in aanmerking.

### ANERINCLEISTUS HIRSUTUS. KHS.

ARBUSCULA 2—4 metrorum; RAMI teretes, cinereo-fusci, glabri; RAMULI teretes, hirsuti. FOLIA opposita, obovata, breviter acuminata, basi cuneata, supra glabra, subtus hirsuta, quintuplinervia, coriacea, 0,09 longa, 0,035 lata; PETIOLI semiteretes, hirsuti, 0,01 longi. FLORES axillares vel terminales umbellulati; PEDUNCULI subtetragoni hirsuti; BRACTEAE semilanceolatae, minutae. CALYX extus hirsutus intus tubo tubuloso-campanulato glaber, limbo quadripartito, partibus triangularibus acuminatis. COROLLA in alabastro conico aestivatione convoluta; PETALA 4 oblongo-ovalia, acuta, glabra. STAMINA 8, aequalia, aestivatione inflexa; FILAMENTA linearia, apice latiora, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongae, apice uniporosae, basi subcordatae, connectivo postice in calcar breve producto. OVARIIUM calyci adhaerens, subrotundum, apice excavatum, disco quadridentato crenato coronatum, quadriloculare; OVULA numerosa, anatropa, placentas oblongas breviter stipitatas tegentia; STYLUS teres, medio incrassatus;

STIGMA capitatum. CAPSULA basi cum calyce connata, apice libera supra calycem excreta, quadrilocularis, loculicide quadrivalvis, valvis ovatis truncatis septigeris; PLACENTAE oblongo-ovoïdeae, foveolatae, stipitatae. SEMINA numerosa, tetraëdra; TESTA reticulata; TEGMEN membranaceum; HILUM micropylae approximatum; RAPHE simplex; CHALAZA subbasilaris. NUCLEUS ovoïdeus.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 68. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Idem, corollâ et calycis parte abscissa. 3. Flos expansus. 4, 5. Stamina. 6. Calycis pars cum cavitatibus antheras includentibus. 7. Pistillum. 8. Sectio longitudinalis ovarii, placentâ unicâ denudata. 9. Ovarii vertex. 10. Sectio transversalis ovarii. 11. Capsula cum calyce persistente. 12. Capsula dehiscens, valvulâ unicâ reflexâ. 13. Semen, parte testae abscissâ. 14. Tegmen cum raphe. 15. Nucleus.

### DRIESSENIA. KHS.

CALYCIS tubus brevis, tetragonus, limbo 4 dentato. PETALA 4, faucem versus tubo calycis inserta, ovata. STAMINA 8, antheris basi affixis, connectivo basi tripartito. OVARIUM calycis tubo adnatum, disco tubuloso apice setis 8 capitatis terminato coronatum; STYLUS basi incrassatus; STIGMA capitatum. CAPSULA cum calyce connata, quadrilocularis, apice extrorsum valvis quatuor loculicide dehiscens. SEMINA ovoïdea; hilo micropylae approximato, chalazâ subbasilari.

PLANTA herbacea, foliis longe petiolatis ellipticis, floribus minutis axillaribus.

Dit geslacht heb ik den ijverigen en gelukkigen beoefenaar der Natuurkundige wetenschappen, wijlen den Hoogleraar Driessen, vroeger een sieraad der Groningsche Hoogeschool, toegewijd. Het wijkt, door zijn uiterlijk aanzien, geheel van de andere Indische geslachten af; doch komt, door zijne kenmerken, Sonerila, waar de kapsels echter van binnen naar buiten openspringen, terwijl zij tevens cene drieledige verdeeling heeft, zeer nabij.

### DRIESSENIA EXANTHA. KHS.

D. foliis ellipticis, floribus axillaribus congregatis.

PLANTA herbacea, saepe 2 metrorum; CAULIS subteres, glabriusculus; RAMI tetragoni, sulcati, farinosi. FOLIA opposita, longe petiolata, elliptica, utroque acuminata, supra glabra, subtus farinosa, membranacea, quinquenervia, 0,2 longa, 0,07 lata. FLORES axillares, congregati; PEDUNCULI quadrigoni apicem versus incrassati. CALYCIS tubus ovoïdeus, limbo subconstricto quadridentato, glaber. COROLLA in alabastro pyramidalis obtuso aestivatione convoluta; PETALA 4, oblonga, obtusa, glabra. STAMINA 8, aestivatione inflexa; FILAMENTA teretia; ANTHERAE oblongo-ovatae, apice uniporosae, connectivo introrsum bi- et extrorsum uni-calcarato inaequali. OVARIUM cum calyce connatum, vertice tubo membranaceo decedentato, quadriloculare; OVULA numerosa, placentas stipitatas oblongas tegentia; STYLUS teres, basi incrassatus; STIGMA punctiforme. CAPSULA cum calyce connata, apice extrorsum valvis qua-

tuor loculicidae dehiscens. PLACENTAE partitae, subpendulae. SEMINA ovoidea; TESTA foveolata; HILUM micropylae approximatum; CHALAZA laterali-basilaris. NUCLEUS ovoideus.

*Crescit in monte Prarawin: BORNEO.*

Explicatio Tab. 53. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos. 3. Petalum. 4. Flos, corollâ ablatâ. 5, 7. Stamina antice, 6, 8. postice visa. 9. Flos, corollâ et staminibus ablatis, calycis parte reflexâ, ut appareat membrana disci. 10. Dens membranae disci. 11. Sectio longitudinalis objecti 9. 12. Calyx adultior. 13. Calyx fructiger. 14. Sectio longitudinalis ejusdem. 15, 16. Capsula matura. 17. Semen. 18. Embryo.

## PHYLLAGATHIS. BLUME.

### I. PHYLLAGATHIS ROTUNDIFOLIA. BL.

P. foliis rotundatis, floribus bracteatis congestis.

PLANTÂ herbacea; CAULIS obscure tetragonus; setosus. FOLIA pauca, opposita, abortu alterna, longe petiolata, petiolo trigono supra sulcato fusco-farinoso praesertim in aciebus setoso-0,1 longo, rotunda, breviter acuminata, basi obtusa vel truncata, supra glabra, subtus glabra saepe purpurea, septupl-nervia, 0,3 longa, 0,2 lata. FLORES terminales, involucrati bracteis subrotundis obtusis, in racemo abbreviato secundi. CALYX obpyramidatus, octosulcatus, limbo quadripartito, partibus obtusis carinatis carinâ setigerâ. COROLLA aestivatione convoluta; PETALA 4, ovata, acuta, carnosa. STAMINA 8, aestivatione inflexa; FILAMENTA subteretia, glabra; ANTHERAE basi affixae, oblongae, apice poro bilabiato labio altero abbreviato altero rotundato dehiscens, basi cordatae, connectivo inappendiculato. OVARIVM cum calycis tubo concretum, vertice disco crenulato excavato, quadrilocularis; OVULA numerosa, anatropa, placentas ovoideas in parte inferiore stipitis ope axi loculi affixas tegentia; STYLUS teres; STIGMA punctiforme. CAPSULA cum calyce connata obpyramidata, glabra, apice loculicidae dehiscens. COLUMELLA angulata, placentas semiteretes apice acutas basi obtusas foveolatas stipitatas gerens. SEMINA numerosa, hilo et micropylae approximata.

*Crescit in sylvis juxta Paauw: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 57. Figura speciei. 1. Inflorescentiae pars. 2. Alabastrum. 3. Flos. 4. Floris pars, ut ovarium appareat. 5. Sectio ovarii longitudinalis. 6. Sectio transversalis ejusdem. 7. Ovulum. 8. Capsula a latere, 9. ab apice visa. 10. Capsula dehiscens. 11. Columella cum placentis.

### II. PHYLLAGATHIS GYMNANTHA. KHS.

P. caule brevi et petiolis hirsutis, foliis rotundatis cordatis supra sparsim subtus in nervis hirsutis, floribus umbellatis nudis.

*Crescit in monte Batoe: BORNEO.*



## KIBESSIA. DE CANDOLLE.

De eilanden Java, Borneo en Sumatra hebben ieder eene soort van Kibessia. Zij groeijen daar in de donkere schaduw der bosschen tot struiken of kleine boomen, ontwikkelen hare jonge bladen met een helder azuurblauw, dat vervolgens in donkergroen overgaat, en bloeijen met weinige, doch door de blauwe kleur het oog trekkende bloemen. Gezellig in hare verspreiding, nemen zij op enkele plaatsen belangrijke ruimten in, en vertoonen zij zich in gemeenschap met Memecylon en scharlakenkleurige bloemen dragende Pavetta. Kibessia azurea groeit op Java tot op ongeveer 2000 N. ellen hoogte; Kibessia cordata van 300 tot 1000 ellen op Sumatra, en Kibessia simplex is, langs de helling van den Sakoembang en Balaran, op Borneo verspreid. Zij hebben allen een gelijkvormig aanzien en maken derhalve een zeer natuurlijk geslacht uit. Van het verwante geslacht Ewyckia onderscheiden deze planten zich, op het eerste aanzien, door de grootte der bloemen en, bij een oppervlakkig onderzoek, door de openingswijze des kelks.

## I. KIBESSIA CORDATA. KHS.

K. foliis oblongo-ovatis cordatis.

ARBUSCULA 2—4 metrorum; RAMI teretes, cinerei, glabri; RAMULI obscure tetragoni, fusco-cinerei, glabri. FOLIA opposita, oblongo-ovata, acuminata, basi cordata, utrinque glabra, coriacea, trinervia, 0,12 longa, 0,05 lata; PETIOLI semi-teretes, 0,005 longi. FLORES axillares, saepe solitaires, rarius terni; BRACTEAE oppositae, parvae, ovatae; PEDUNCULUS teres, glaber. CALYX tubo campanulato muricatus, limbo in calyptra circumscisso deciduo. COROLLA in alabastro acute conico aestivatione convoluta; PETALA 4, ovata, obtusa, carnosae. STAMINA 8, aestivatione inflexa; FILAMENTA linearia, glabra; ANTHERAE basi affixae, locellis discretis, rimis longitudinalibus dehiscentes, connectivo postice breviter appendiculato. OVARIUM cum calycis tubo connatum, apice excavatum, quadriloculare; OVULA numerosa, placentas lateraliter connatas hemisphaericas tegentia; STYLUS subtetragonus, glaber; STIGMA quadrifidum. SEMINA numerosa, ovata, testâ daedaleo-reticulatâ, hilo micropylae approximato, chalazâ laterali-basilari.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA.*

Explicatio Tab. 66. Figura speciei. 1, 2. Alabastrum. 3. Alabastrum cum calycis calyptra. 4. Flos. 5, 6. Stamina. 7. Anthera ab anteriore. 8. Flos longitudinaliter dissectus. 9. Ovarium transverse dissectum. 10. Ovarium longitudinaliter dissectum. 11. Semen immaturum. 12. Idem longitudinaliter dissectum. 13. Idem, parte testae ablatâ.

## II. KIBESSIA SIMPLEX. KHS.

K. foliis ovalibus basi acutis acumine obtuso, floribus axillaribus vel alaribus solitariis, calycis setis simplicibus, calyptrâ subnuda.

*Crescit in sylvis Sakoembang: BORNEO.*

## EWYCKIA. BLUME.

Dit geslacht, door den Hoogleraar Blume aan den grootmoedigen bevorderaar der natuurkundige wetenschappen, den Heer van Ewyck, gewijd, bevatte tot heden slechts ééne soort, welke de ijverige Zippelius op Amboina verzamelde. Door onze onderzoekingen is dit geslacht met drie andere soorten verrijkt: eene derzelve groeide in de moerassige streken nabij Indrapoera, langs de rivier Salaut: *E. tuberculata*; de andere, *E. galeata*, wies op drooge, een weinig verbevene plaatsen, aan de Karraurivier en in de vlakte nabij Martapoera; de derde, *E. cordata*, vond ik op het heuvelig gebergte Rantau op Borneo; terwijl een, nauwelijks van *E. cyanea* te onderscheiden vorm, op den berg Pamatton en de omliggende vlakte werd verzameld. Deze soorten vormen door haar voorkomen, drie verschillende groepen. Tot de eerste behooren *E. cyanea* en *tuberculata*, welke beiden het geslachtskenmerk volkomen hebben; de tweede vorm, *E. galeata*, bezit hetzelfde niet volledig en wijkt, door het zamenstel van den kelk en door de verdere onregelmatige uitgroeiing van denzelfden, af; en de derde vorm, *E. cordata*, verschilt door het aanzien, den puntigen stempel en het viertal vruchtbare helmraden. Dit verschil zoude, wanneer men getrouw bleef aan de, bij familiën gebruikelijke wijze van geslachtsvorming, het invoceren van drie geslachten vorderen. Ik heb dit verschil echter alleen aangetoond, om de toekomstige hervormers dezer familie op deze Indische planten opmerkzaam te maken, en tevens om aan te toonen, dat de Chariantheae even gelijke wijzigingen in de organen bezitten, als de Melastomeae. Daarenboven blijft het ter beslissing over, of de Indische geslachten *Kibessia*, *Ewyckia* en *Astronia* tot de Charantheae behooren, dan wel of zij eene eigene afdeeling moeten vormen, die, door de wijze van zaaddragen, van de Melastomeae en Memecyleae kan onderscheiden worden.

## I. EWYCKIA GALEATA. KHS.

*E. calyce quadripartito.*

ARBOR 8—10 metrorum; TRUNCUS subteres, cortice cinereo rimoso, ligno albida; RAMI teretes, cinerei, rimosi, glabri; RAMULI teretes, nodis incrassatis, cicatrisati, cavitatibus semicircularibus, cinereo-fusci, glabri. FOLIA distantia, opposita, breviter petiolata, ovalia, acuminata, basi acuta, utrinque glabra, coriacea, trinervia, 0,10 longa, 0,05 lata. FLORES axillares vel alares, breviter pedunculati, aggregati; BRACTEAE duae, cucullatae. CALYX aestivatione valvatâ; TUBUS campanulatus; LIMBUS quadripartitus; partibus aequalibus, triangularibus, demum inaequalibus excretionem partium duarum in ligulas obtusas. COROLLA aestivatione convoluta; PETALA 4, obovata, obtusa, carnosae. STAMINA 8, aestivatione inflexa; FILAMENTA gemiculata glabra; ANTHERAE basi affixae, locellis duabus rimis dehiscentibus, connectivo postice in calcar obtusum productum. OVARIUM cum calyce connatum, quadriloculare; OVULA numerosa, placentas lateraliter affixas tegentia; STYLUS tetragonus; STIGMA capitatum. SEMINA anatropa, obovata.

*Crescit juxta Martapoera: BORNEO.*

Explicatio Tab. 67. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Alabastrum longitudinaliter dissectum. 3, 4. Alabastra. 5. Flos expansus. 6. Flos, corollâ ablatâ. 7. Stamen a posteriore, 8. ab anteriore. 9. Calyx cum ovario longitudinaliter dissectus. 10. Idem transverse dissectus. 11. Semina immatura.

*Ewyckia galeata* verzamelden wij in de lage streken om Martapoera en Poeloe-lampeï, alsmede gedurende onzen togt op de Doeson-rivier, langs de oevers. Beide groeiplaatsen hebben aan de plant een eigenaardig voorkomen gegeven. Op de eerste is zij met lederachtige, dikke, en op de andere van vleeziger, dunne bladen voorzien.

---

II. EWYCKIA TUBERCULATA. KHS.

E. calyce quadridentato tuberculato, foliis obovalibus.

*Crescit in paludosis juxta Indrapoera: SUMATRA.*

---

III. EWYCKIA CORDATA. KHS.

E. calyce quadridentato tuberculato, foliis sessilibus ovatis basi cordatis quintuplinerviis.

*Crescit in monticula Rantau: BORNEO.*

---

BIJDRAGEN TOT DE GESLACHTEN

**CLEISOCRATERA, BOSCHIA EN MARANTHES,**

DOOR

P. W. KORTHALS.



CLEISOCRATERA. KHS.

**C**ALYCIS tubus obconicus, basi cum ovario connatus, limbo quadridentato. **COROLLA** supera, tubo brevissimo, limbo quadripartito, partibus tubo longioribus patentibus, aestivatione valvata. **STAMINA** 4, corollae tubo affixa, exserta; **ANTHERAE** supra basin affixae. **OVARIUM** disco epigyno carnoso coronatum, biloculare; **OVULA** in loculis solitaria, basi affixa in axi; **STYLUS** teres; **STIGMA** bipartitum. **BACCA** sicca, dipyrena, pyrenis osseis intus planis extus gibbis sulcatis. **SEMINA** semi-ovata, intus plana, extus gibba; **TESTA** membranacea. **EMBRYO** in medio albuminis subcornei, longitudinem nuclei adaequans, rectus, cotyledonibus ovatis; radiculâ terete, basi clavatâ, cotyledones longitudine duplo superante.

**ARBUSCULUM** gracile Borneanum, foliis oppositis, stipulis subulatis, inflorescentiâ subcymosâ longe pedunculatâ.

Deze gewassen zijn door hun voorkomen aan die van het geslacht Saprosmia, en door hunne kenmerken aan Psychotria en Amaracarpus verwant. Met de beide eerste geslachten heeft Cleisocratera slechts eene verwijderde overeenkomst; van het laatste kan het onderscheiden worden door de verdeeling van den kelkzoom, de vasthechting der helmknopjes, de verhouding van de kiem tot de kern, zijnde de kiem van Amaracarpus zeer klein, en op het eerste gezigt, door het slanke voorkomen. De eenige soort verzamelden wij op Borneo, langs de boorden der zij-rivieren, van eenen moerassigen, in den regentijd overstroomden bodem.



## CLEISOCRATERA ELEGANS. KHS.

ARBUSCULA coronâ patente; RAMI abortu alterni, ultimi oppositi, teretes, cinereo-fusci; RAMULI glabri, fusci. FOLIA sessilia, opposita, inaequalia, ovata, acuminata, basi subcordata, subserrulata, utrinque glabra; STIPULAE intrapetiolares, subulatae, scariosae, munitae, terminalis subcymosa. INFLORESCENTIA subcymosa; pedunculo communi longo, filiformi, versus apicem applanato, glabro; pedunculi partiales breve, medianis brevissimis; BRACTEAE oblongae, acuminatae, minutae. CALYCIS tubus obconicus, basi cum ovario connatus, limbo quadridentato, dentibus obtusis, sinibus obtusis, glaber. COROLLA aestivatione valvata; TUBUS brevis, intus hirsutus, extus glaber; LIMBUS quadripartitus, partibus ovalibus obtusis patentibus apice apiculatis. STAMINA 4, fauci corollae inter partes affixa; FILAMENTA brevia, linearia, glabra; ANTHERAE dorso supra basin affixae, ovaes, utrinque obtusae, emarginatae. OVARIUM ovoïdeum, disco carnosio coronatum, glabrum, biloculare; OVULA in loculis solitaria, basi in fundo ovarii axi affixa, adscendentia; STYLUS teres, glaber; STIGMA bifidum, laciniis obtusis intus planis extus gibbis. BACCA sicca, calyce excreto urceolato cincta, ovoïdea, acutiusecula, dipyrena, pyrenis intus planis extus gibbis longitudinaliter sulcatis monospermis. SEMINA pyrenis replententia, semiovata, intus plana, extus rotundata; TESTA membranacea. ALBUMEN subcorneum. EMBRYO in medio albuminis, longitudinem nuclei aequans, radiculâ cylindricâ basi incrassatâ, cotyledonibus brevibus ovalibus subcarnosis.

*Crescit juxta flumen Doeson, praesertim ad lacum Babay: BORNEO.*

Explicatio Tab. 62. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Corolla scissa et expansa. 4. Flos, corollâ ablatâ. 5. Idem apertus. 6. Florum capitulum. 7. Fructus. 8. Idem, dimidiâ parte calycis abscissâ. 9. Fructus, pyrenis sejunctis. 10, 11. Pyrenae nudaes. 12. Pyrenae longitudinaliter dissectae cum seminibus.

## BOSCHIA. KHS.

CALYX bracteâ integrâ caducâ involutus, pentasepalus, aestivatione valvatâ. COROLLA pentapetala, hypogyna, aestivatione contortâ. STAMINA numerosa, hypogyna, pluriserialia, interiora sterilia vel antherae loculum unicum, exteriora loculos plures gerentia, loculis apice poro dehiscentibus. OVARIUM sessile, 4—5 locale; OVULA 4, biserialia, in medio loculi axi affixa, superimposita, anatropa; STYLUS teres; STIGMA capitatum. CAPSULA lignosa, muricato-tessellata, quinquelocularis, loculicide quinquevalvis, valvis septam crassissimam glabram gerentibus.

ARBOR excelsa, partibus junioribus lepidotis, foliis ovalibus subtus albidis, floribus solitariis axillaribus vel alaribus albis.

Het geslacht *Boschia* behoort tot de familie der *Herculiaceae*, waar het nabij *Durio* en *Neesia* kan worden gerangschikt. Bij hetzelfde zijn inzonderheid de helmknopjes, door hunne vasthechting, gedaante en wijze van opening, opmerkenswaardig. Ieder helmknopje is tolvormig, in het dunste gedeelte vastgehecht, en springt aan den top, waarschijnlijk door het afvallen van een klepje, met een rond gaatje open.

De gewassen van dit geslacht behooren, zoowel door hunne grootte, als door hunne bladkroon en rijken bloementooi, tot de voortreffelijkste boomen der bosschen. Zij werden in de Indische wouden door mij toegewijd aan den werkzamen en wijsgeerigen Staatsman, welke, het welzijn der aan zijne zorg toevertrouwde Indische bevolking, in verband met de welvaart van Nederland, willende bevorderen, talloze bunders grond, het verblijf van wilde dieren, met nuttige gewassen heeft doen beplanten.

---

BOSCHIA EXCELSA. KHS.

ARBOR 30 metrorum, trunco cylindrico, cortice cinereo-fusco, ligno rubescente, coronâ hemisphaericâ; RAMI patentes, fusi, ligno albescente; RAMULI alterni, subteretes, lepidoti, novelli angulati. GEMMAE axillares, semi-oblongae. FOLIA alterna, ovalia, obtuse acuminata, basi obtusa, supra nitida, subtus albida, coriacea, nervis pinnatis lepidotis; PETIOLI subteretes, lepidoti. FLORES axillares vel alares, solitarii; PEDUNCULI tetragoni, lepidoti. BRACTEA unica, florem juniorem includens, demum bifida, laciniis subaequalibus, extus lepidota, intus tomentosa. CALYX pentasepalus, aestivatione valvatus, sepalis ovatis acutiusculis extus dense lepidotis intus tomentosis. COROLLA hypogyna, aestivatione convolutâ, pentapetala; petalis spathulatis, obtusiusculis, intus glabris, extus sparsim lepidotis. STAMINA numerosa, hypogyna, pluriserialia; FILAMENTA filiformia, glabra; ANTHERAE terminales; locellis 4 vel pluribus, in seriebus exterioribus 1—2, vel 1 in serie interiore, discretis, turbinatis, apice poro dehiscentibus. OVARIVM superum, ovoïdeum, setis apice stellatis vestitum, quadri- vel quinque-loculare; OVULA 4 in singulo loculo, in medio loculi axi affixa, 2 descendentia, 2 adscendentia, anatropa; STYLUS teres, glaber; STIGMA capitatum, vertice excavatum. CAPSULA obovoïdea, muricato-tessellata, lignosa, 4—5 locularis, loculicide dehiscens, valvis fere ad basin usque secedentibus septas crassas ancipites glabras gerentibus. SEMINA mihi desunt.

*Crescit in sylvis Melintang: SUMATRA, et Balaran: BORNEO.*

Explicatio Tab. 69. Figura speciei. 1. Alabastrum bractea inclusum. 2. Alabastrum, bractea bifida. 3. Flos, calyce ablato. 4. Flos expansus cum bractea bifida. 5. Flos, calyce et petalorum parte ablatis. 6. Petalum. 7. Ovarium, aliis partibus floris abscissis. 8. Idem secundum longitudinem sectum. 9, 10, 11, 12. Antherae. 13. Sectio longitudinalis antherae. 14. Sectio transversalis ovarii. 15. Capsula.

---

MARANTHES. BL.

De boomen, uit welke het geslacht Maranthes gevormd is, groeijen in de hoogere streken van Java, ongeveer 800 tot 900 N. ellen boven de zee, en in de lagere oorden van Borneo. Zij zijn zeer rijk aan bloemen, doch slechts weinige vruchtbeginsels komen tot rijpe vruchten. De kleine, aan den voet der bladen gezeten kliertjes, zijn opmerkelijk. — Het geslacht Maranthes behoort, met nog twee andere geslachten van Sumatra (Lepidocarpa en Diemenia), tot de familie der Chrysobalaneae, welke buitendien nog een, aan Chrysobalanus verwant gewas op Borneo bezit.

---

## MARANTHES MULTIFLORA. KHS.

ARBOR speciosa, coronâ patente subrotundâ; RAMI teretes, nigrescentes, fusco-punctati, glabri; RAMULI subteretes, pubescentes. FOLIA alterna, ovali-oblonga, acuminata, basi attenuata biglandulosa, glandulis sessilibus cupulatis, margine saepe undulata, supra glabra, subtus glabriuscula, in nervis venisque pube minuta adpressa vestita, coriacea, 4,5 cm. lata, 11 cm. longa, venis vix productis; PETIOLI 7 mm. longi, glabri, subtus teretes, supra plani. STIPULAE nullae. INFLORESCENTIA terminalis axillarisve, paniculata, tomentosa; PEDUNCULI bi- vel tri-fidi; PEDICELLI compressi; BRACTEAE ovatae, acutiusculae, dorso carinatae, extus tomentosae, admodum deciduae, 2 mm. longae. CALYX extus dense tomentosus, tubo obconico, limbo quinquepartito, partibus subrotundis obtusis margine ciliatis 4 mm. longis et latis, aestivatione quincunciali. COROLLA pentapetala; PETALA perigyna, obovata, obtusa, subintegerrima, ciliata, intus glabra, extus pubescentia, subcarnosa, subaequalia, 6 mm. longa, 4 mm. lata, rosea, decidua. STAMINA perigyna 20 ad 30, saepe in parte ab axi remotâ disposita, abortientia, atque tunc in anulum obtuse crenatum transientia, aestivatione erecta; FILAMENTA filiformia, glabra; ANTHERAE ovatae, paulo supra basin dorso affixae, vacillantes; POLLEN sphaericum. OVARIIUM parte laterali cum tubo calycis connatum, subrotundum, saepe didymum, dense pilosum, biloculare; OVULA in singulo loculo geminata vel solitaria, basi loculorum affixa; STYLUS lateralis, aestivatione circinatim inflexus, teres, glaber; STIGMA capitatum. FRUCTUS nondum maturus siccus, obovoïdeus, pubescens, epicarpio subcarnoso, sarcocarpio fibroso, endocarpio subcorneo dense piloso, bilocularis. SEMINA in loculis solitaria, erecta, oblonga, obtusa, compressa, glabra. SPERMODERMIS membranacea, testâ fuscâ, tegmine albo arcte cum albumine albo parco coöalito. EMBRYO erectus, subcarnosus; RADICULA minuta, subcompressa; COTYLEDONES ovati, acutiusculi, basi truncati, albi.

*Crescit juxta Martapoera: BORNEO.*

Explicatio Tab. 70. Figura speciei. 1, 3. Alabastra. 2. Flos, calyce ablato. 4, 6. Flores expansi. 5. Calyx lateraliter scissus et expansus cum ovario filamentorumque partibus. 7. Ovarium longitudinaliter dissectum cum ovulis et styli parte. 8 et 9. Fructus. 10. Fructus secus longitudinem dissectum cum semine. 10. Ejusdem transversalis sectio. 11. Semen cum funiculo. 12. Idem longitudinaliter dissectum.







*J. Gaykema, ad nat. del.*

NEPENTHES GRACILIS.

*J. M. Kierdorff, impr.*

*D. A. S. Mulder, in lap. del.*





*J. Gaykema, ad nat. del.*

**NEPENTHES BOSCHIANA.**

*J. M. Kierloff, impr.*

*Bruening, in lap. del.*





*J. Gaykema, ad nat. del.*

**NEPENTHES GYMNAMPHORA.**

*J. M. Kierdorff, impr.*

*D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in lap. del.*





P. W. Korthals et J. Gaykema ad nat. del.

D. A. S. Muller, in lapp. del.

1-58. NEPENTHES GRACILIS. 59-70 N. BOSCHIANA. 71-75. N. GYMNAMPHORA. 71-75. N. PHYLLAMPHORA.

J. M. Kierdorff, sculp.







*J. Gaykema, ad nat. del.*

**DIPTEROCARPUS BAUDII.**

*J. M. Hierdorff, impr.*

*D. A. S. Mulder, sculp. del.*





*J. Gaykema, ad nat. del.*

1-5. ANISOPTERA COSTATA 1-9. A. MARGINATA 1<sup>a</sup>-15<sup>a</sup>

*J. M. Kierdorff, impr.*

*D<sup>r</sup>. A. S. Mulder, in lap. del.*





*J. Gaykema, ad nat. del.*

HOPEA BALANGERAN 1-14. H. ODORATA 15-21.

*D. A. S. Mulden in lap. del.*

*J. M. Kierdorff, impr.*





*J. Gaykema, aut. nat. del.*

**RETINODENDRON RASSAK.**

*J. M. Kuerdorff, impr.*

*D. A. S. Muller, in lap. del.*







P. W. Korthals ex J. Gujtona ad nat. del.

1-2. BAUHINIA HIRSUTA 1-21. 3. B. ACUMINATA.

Dr A. S. Mulder, in lap. del.

J. M. Kosteroff, engr.





*D. van Gelder et J. Gaykema, ad nat. del.*

**BAUHINIA KOCKIANA.**

*J. M. Kierdorff, imp.*

*Dr. A. S. Mulder, in lap. del.*





*J. Gaykema, ad nat. del.*

**BAUHINIA PYRRANEURA.**

*J. M. Kierdorff, sculp.*

*Dr. A. S. Mulder, in cap. viv.*

P. 2. 11



J. Gaykema, ad nat. del.

1. REINWARDTIA PATENS 1-19.

2. R. ELONGATA 1<sup>a</sup> - 7<sup>a</sup>

D. A. S. Mulder in lap. del.

J. M. Hierdorff, sculp.







*J. Gaykema et D. van Gelder, ad nat. del.*

NEPENTHES AMPULLARIA.

*J. M. Kierdorff, imp.*

*D<sup>r</sup>. A. S. Mulder, in lap. inc.*





*J. Beijerinck, ad nat. del.*

NEPENTHES BONGSO.

*J. M. Kierulff, inq.*

*D. A. S. Mulder in lap. del.*





*J. Gaykema, ad nat. del.*

NEPENTHES PHYLLAMPHORA.

*J. M. Kierloff, imp.*

*T. C. Brunning, in lap. del.*





*J. Gaykema et P. W. Korthals ad nat. del.*

**SAROSANTHA EXCELSA.**

*D<sup>r</sup> A. S. Muller in Lap. del.*

*J. M. Kierdorff, impr.*







*J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.*

1-2. EURYA NITIDA. 3. E. RETICULATA.

*D<sup>r</sup>. A. S. Muller, in lap. inc.*

*J. M. Kierdorff, impr.*





*J. Gaykema et P. W. Horstals, ad nat. del.*

1. ADINANDRA EXCELSA 1-20. 2. A. ACUMINATA.

*D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in lap. del.*

*J. M. Kierdorff, impr.*





*J. Gaykema et P. W. Korthals ad nat. del.*

**SAURAUJA FEROX.**

*J. M. Eicardoff, impr.*


*D. A. S. Mulder in lap. del.*











D. A. S. Mulder et P. W. Northals, del.

NEPENTHES.

J. M. Kienboff, impr.

D. A. S. Mulder, in lap. del.





NEPENTHES.





*J. Gaybema, ad nat. del.*

**BAUHINIA FERRUGINEA.**

*J. M. Hierdorff, impr.*

*D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in lap. inc.*





*J. Balfema, ad nat. del.*

**BAUHINIA ELONGATA.**

*D<sup>c</sup>A.S. Mulder, in lap. inc.*

*J.M. Kerckhoff, in pr. - Aruz et Comp. Amst. color*







*J. Gujken et P. W. Korthals, ad nat. del.*

**PLOIARIUM ELEGANS.**

*J. M. Kierdorff, impr.*

*D. A. S. Mulder, in lap. inc.*





*J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.*

LAPLACEA VULCANICA.

*J. M. Kierdorff, impr.*

*D<sup>e</sup>. A. S. Mulder, in lap. inc.*





J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.

GORDONIA EXCELSA.

J. M. Kierdorff, impr.

Df. A. S. Mulder, in lap. inc.





*J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.*

**GORDONIA OVALIS.**

*J. M. Kierdorff, inpr. Amst. et Comp. Amst. color.*

*D. A. S. Mulder, in lap. inc.*







*J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.*

1-2. SCHIMA CRENATA 1-20.- S. NORONHAE 21-27.

*J. M. Kuerdoff, sculp. - Arniz, et Comp. Aust. color.*

*D. A. S. Muller, in lap. inc.*





*J. Gaykoma et P.W. Korthals, ad nat. del.*

**PYRENARIA SERRATA.**

*D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in lign. inc.*

*J.M. Luedorff, impr. - Aruz. et Comp. Amst. color.*





*J. Gaykoma, ad nat. del.*

CALPANDRIA LANCEOLATA.

*D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in. lap. del.*

*J. M. Koerdoff, impr.*





*J. Gaykema et P. W. Forthale, ad nat. del.*

**PLATANOCARPUM SUBDITUM.**

*J. M. Kierdorff, impr. - Arnx et Comp. Amst. color.*

*D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in lyp. inc.*







*J. vankenia et P. W. Korthals, ad nat. del.*

**UNCARIA HALLII.**

*J. M. Kierdorff, impn. Arnz et Comp. Arnst. Coln.*

*D. A. S. Mulder, in lap. del.*





*J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.*

1, 2. UNCARIA GAMBIER, 1-10. - 3. U. ATTENUATA.

*D. A. S. Mulder, in lap. del.*

*J. M. Herdoff, inpr. - Arnz et Comp. Amst. color.*





*J. Gaykoma et P. W. Korthals, ad nat. del.*

**MITRAGYNA SPECIOSA.**

*J. M. Kierdorff, inpr. - Aruz et Comp. Amst. color.*

*D. A. S. Muller, in lap. del.*





*J. Gaykema, ad nat. del.*

**CRATOXYLON POLYANTHUM.**

*Dr. A. S. Mulder, in lyp. del.*

*J. M. Kienloeff, inpr. - Aruz et Comp. Amst. color.*







*J. Gaykema, ad nat. del.*

**TRIDESMIS FORMOSA.**

*J. M. Kierdorff, impr. - Aruz et Comp. Amst. color.*

*D<sup>r</sup>. A. S. Mulder, in top. del.*





J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.

SALACIA KALAHIENSIS.

Dr. A. S. Muller, in lap. del.

J. M. Kierdorff, impr. - Aruz et Comp. Anst. color.





J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.

HIPPOCRATEA MACRANTHA.

D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in lap. del.

J. M. Kierdorff, impr. - Arnz et Comp. Amst. color.





J. Gaykema et P. W. Korthals, ad nat. del.

HIPPOCRATEA GLAGA.

D.F.A. S. Müller, in lap. del.

J. M. Kierdorff, impr. - Arnz. et Comp. Amst. color.







*J. Gaykema, ad nat. del.*

**PRARAVINIA DENSIFLORA.**

*D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in lap. del.*

*J. M. Kierdorff, impr. - Arsz. et Comp. Leiden, color.*





J. Gaykema, ad nat. del.

OMPHACARPUS HIRSUTUS.

D<sup>r</sup>. A. S. Mulder, in lep. del.

Arx et Comp. Leiden, color.

P.P.A.N.



QUERCUS HYSTRIX.

J. M. Kierdorff, impr. - Arsz et Comp., Leiden, color.

Gordon, ad nat. del.

Gordon, in lap. del.





W. T. Gordon, in lap. del.

QUERCUS BLUMEANA.

Arax et Comp., Leiden, color.

J. M. Korschoff, imp.

P.P.A.N.





Gordon, ad nat. del.

QUERCUS ENCLEISACARPA.

J. M. Kierdorff, impr. - Arnx. et Comp. Leiden, color.

Gordon, in lap. del.





W. T. Gordon, in lap. del.

QUERCUS EWYCKII 1-20. Q. ANNULATA 21-22.

J. M. Hieronimus, inpr.

Amst. et Comp., Leiden, color.





W. T. Gordon ex D. v. Gelder, ad nat. del.

QUERCUS ARGENTATA 1-17. - Q. OÏDOCARPA 18.

W. T. Gordon, in lap. del.

J. M. Hierdorff, impr - Arnx et Comp. Leiden, color.





W. T. Gordon, ad nat. del.

ANTHOCEPHALUS MORINDAEFOLIUS.

W. T. Gordon, in lyp. del.

J. M. Kierdorff, impr. - Aruz et Comp. color.







*J. Gaykema, ad nat. del.*

MELASTOMA PULCHERRIMUM.

*W. T. Gordon, in lap. del.*

*J. M. Kierckhoff, impm. Anst. et Comp. Laiden, color.*

PPAM



W. T. Gordon, in lap. del.

MELASTOMA BORJANUM.

J. M. Kierdorff, impr.

Arnz et Comp. Leiden, color.

P.P.A.N.



*H. T. Gordon, in lap. del.*

**OTANTHERA BRACTEATA.**

*Arenz & Comp., color.*

*J. M. Hierdorff, impr.*





*H. T. Gordon et D. v. Gelder, in lap. del.*

**SONERILA PICTA.**

*Arnz et Comp., color.*

*J. M. Kierlaff, impr.*

PPAN





*J. Gaykema, ad nat. del.*

**DRIESSENIA AXANTHA.**

*D<sup>r</sup> A. S. Mulder, in lap. del.*

*J. M. Kierdorff, impr. - Arnz et comp. Leiden, color.*





Vin Gelder et W. T. Gordon, in lap. del.

SONERILA BEGONIAE-FOLIA.

J. M. Hierdtz, imp.

Araz et Comp., color





W. T. Gordon, in lap. del.

DISSOCHAETA BRACTEATA.

J. M. Kerckhoff, impr.

Aruz et Comp., color.





H. T. Gordon, in lap. del.

DISSOCHAETA CYANOCARPA.

J. M. Kierdorff, impn

Arax et Comp. color

P.P.A.N.





*J. Gaykema, ad nat. del.*

PHYLLAGATHIS ROTUMIFOLIA.

*Leuz et Comp., color.*

*W. T. Gordon, in lap. del.*

PPAN



*J. Gaykema et P. W. Korthals ad nat. del.*

**DALENIA PULCHRA.**

*J. M. Hierdorff; impr. - Arn. et Comp. Leiden, color.*

*D. A. S. Mulder, in l'op. del.*

P.P.A.N.



*J. Gaykema, ad nat. del.*

MARUMIA PACHYGYNA.

*W. T. Gordon, sc. lap. del.*

*J. M. Kierdorff, impr. - Aras et Comp., col.*





MARUMIA AFFINIS.

W. T. Gordon, in lapp. del.

Ariz. et Comp., color.

J. M. Woodruff, 1886







J. Gaytheria, ad nat. del.

MEDINILLA POLYANTHA.

J. M. Kiersteadt, impr. Arn. et Camp. color.

T. W. Gordon, in lyp. del.





*Gaykema et Gordon, ad nat. del.*

**CLEISOCRATERA ELEGANS**

*W.J. Gordon, in lap. del.*

*H.J. Backer, imp.*

*Arntz et Comp., col.*

P.P.A.N.



1. PACHYCENTRIA TUBERCULATA. - 2. P. VARINGIAEFOLIA.

J. Gayhera, ad nat. del.

T. W. Gordon, in lap. del.

J. H. Kierulff, inpr. - Arnz et Comp. col.





*J. Gaykema, ad nat. del.*

**OCHTHOCHARIS PANICULATA.**

*J. M. Hierstorff, impr. - Arn. et Comp., col.*

*W. T. Gordon, in lap. del.*

P.P.A.N.





*Gaikema et Gordon, ad nat. del.*

**POGONANTHERA PULVERULENTA.**

*W. J. Gordon, in lap. del.*

*H. J. Baker, impr.*

*Arno. et Comp. col.*

PPAN.



H. T. Gordon, in lap. del.

KIBESSIA CORDATA.

J. M. Kiersteadt, impr.

Ann. et Comp. color.





H. T. Gordon, in lap. del.

EWYCKIA GALEATA.

Arx et temp. color.

J. H. Isidoroff, imp.





Gordon ad nat. del.

W. J. Gordon. in lap. del.

**ANERINCLEISTUS HIRSUTUS.**

H. J. Baker. imp.

Arns. et Comp. col.

P.P.A.N.





*J. Gaykema ad nat. del.*

**BOSCHIA EXCELSA**

*W. J. Gordon in lap. del.*

*H. J. Baker imp. Anz. et Comp. ex.*

P.P.A.N.



J. Gaykema et W. J. Gordon, ad nat. del.

MARANTHES MULTIFLORA.

H. J. Baker imp. Arn. et Comp. scul.

W. J. Gordon, sculp. del.

P.P.A.N.













