

永樂大典

卷一萬四千九百

四十八

永樂大典卷之一萬四千九百四十八 六暮

婦人積聚

婦人積聚論

果元方病源積者五臟所積。聚者六腑所成。五臟之氣精。名曰積。六腑之氣聚。名曰聚也。積痛不離其部。聚者其痛無有常處。皆由陰陽不和。風冷搏於臟腑。而生積聚也。婦人病積經久。則合無子。亦合月水不通。所以然者。積聚起於冷。結入于臟。故合無子。若冷氣入於胞絡。冷搏於血。血冷則凝結。故合月水不通也。王好古醫壘元戎黃帝問曰。婦人重身毒之何如。岐伯曰。有故無殞。亦無殞也。帝曰。請願聞其故。何謂也。夫積大聚。其可犯也。衰其大半而止。過者死。衰其大半不足以害生。故止其藥。若過則毒氣內餘。則敗損中和。故成積聚。潔古老人治積別有法。壯人無積。虛人則有之。脾胃怯弱。氣血兩衰。四時有感。皆能成積。若遠以磨堅破結之藥。治之疾能去。而人已衰矣。乾漆。硃砂。三棱。牽牛。大黃之類。得之則暫快。渠遇

則依然。氣愈消。疾愈甚。竟何益哉。故善治者。當先補虛。氣血壯。積自消。如

滿座皆君子。縱有一小人。自無容地而出矣。不問何臟。先調其中。使能飲食。是其本也。類用方藥。潘思故加減集證方。治婦人積於四物中。加蓬

木。三棱。桂。乾漆。依法制各一兩。名增損四物湯。治婦人血塊不散。腹脇冷痛。於四物中加酒半盞煎服。治婦人血氣凝滯。潮熱。腸中癖塊。於四物中加蓬木。桂枝各半兩。名六合湯。治婦人經血凝滯。臍內血積。氣塊作疼。於四物中加蓬木。桂等分煎。名破血六合湯。治婦人血不散。於四物內加木香。檳榔各半兩煎。治婦人積塊癥瘕。煎桃仁湯。調下益元散。治婦人心腹膨脹。悶煎木香酒。調下天水散。治婦人血積。煎紅花沉香湯。下加減三黃丸。治婦人產後惡物不下。結聚成塊。心胃痞悶。及臍下堅痛。於四物中去地黃。川芎。加血竭。蓬木四味等分。倍加五靈脂為主。醋糊丸。如梧子大。每四五十九丸。酒下。或不飲。食前名當歸血竭丸。治婦人諸般冷疾。艾調下太白散。

方

孫思邈千金要方蓮甲丸。治女人小腹中積聚。大如七八寸盤面。上下周流痛不可忍。手足苦冷。欬意腥臭。兩脇熱如火炙。玉門冷如風吹。經水不

通或在月前或在月後服之三十日使瘕有孕。此是河內太守魏夫人方

薏甲 桂心各一兩半 蜂房半兩 苦參

玄參 蜀椒 細辛 人參

丹參 沙參 吳茱萸各十八銖

廣蟲 水蛭 乾薑 牡丹

附子 皂莢 當歸 芍藥

甘草 防葵各一兩 蟬蛸二十枚 蟲蟲

大黃各一兩六銖

右二十四味為末。蜜和丸如梧子大。酒下七丸。日三稍加之。以知為度。

五京丸。治婦人腹中積聚。九痛七害。及腰中冷引小腹。害食得冷便下方

乾薑 蜀椒各三兩 附子一兩 吳茱萸一升

當歸 狼毒 黃芩 牡蠣各二兩

右八味為末。蜜和丸如梧子。初服三丸。日二。加至十丸。此出京氏五

君。故名五京。久患冷困當服之。千金翼方。無蜀椒。

雞鳴紫丸。治婦人癥瘕積聚方。

藥集卷之四十九百四十八

皂莢一分 藜蘆 甘草 礬石

烏喙 杏仁 乾薑 桂心

巴豆各二分 前胡 人參各四分 代赭五分

阿膠六分 大黃八分

右十四味為末。蜜丸如梧子。雞鳴時服一丸。日益一丸。至五丸止。仍從一起。下白者風也。赤者癥瘕也。青微黃者心腹痛。千金翼方云。如

白汁調腐者水也。

治婦人勞氣。食氣胃滿吐逆。其病頭重結痛。小便亦黃。大下氣方。千金翼

石烏頭丸

烏頭 黃芩 巴豆各半兩 半夏三兩

大黃八兩 戎鹽一兩半 麩蟲 桂心

苦參五十八銖 人參 消石各一兩

右十一味為末。以蜜青牛膽拌和。搗三萬杵。丸如梧子。宿不食酒服五丸。安卧。須臾當下。下黃者。小腹積也。青者。疝也。白者。內風也。如水者。留飲也。青如粥汁。隔上邪氣也。血如腐肉者。傷也。赤如血者。乳餘疾也。如蟲刺者。蠱也。既下必渴。渴飲粥。飢食酥糜。三日。後當溫食。食

必肥濃。三十日平復。亦名破積烏頭丸。主心腹積聚氣悶脹。疝瘕。內傷瘀血。產乳餘疾。及諸不足。

太平聖惠方防葵散。治婦人心腹積聚氣。時有赤痛。經絡不利。四肢漸瘦。食少腹脹。

防葵一兩 木香一兩 川大黃二兩。剉碎微炒
白朮一兩 赤芍藥一兩 當歸一兩。剉碎微炒

牛膝一兩。去苗 桂心一兩 桃仁二兩。湯浸去皮。炙令乾。炒

右件藥。搗羅為散。每服三錢。水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。食前稍熱服。

龍甲散。治婦人積聚氣。心腹脹硬。或時疼痛。體瘦乏力。不能飲食。

龍甲二兩。塗醋炙令黃。去骨。燻當歸一兩。剉微炒

防葵一兩 吳茱萸半兩。湯浸七遍。焙乾微炒

桂心一兩 白朮一兩 青橘皮一兩。湯浸去白。微炒

木香一兩 赤芍藥一兩 甘草半兩。炙微赤。剉

桃仁一兩。湯浸去皮。炙令乾。微炒

表集卷之九

三

右件藥。搗碎為散。每服三錢。水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。食前稍熱服之。

鬼箭散。治婦人積聚氣。心腹脹痛。經絡滯澀。四肢疼痛。生卧不安。

鬼箭羽一兩 琥珀一兩 牛李子一兩 穿山甲一兩。塗醋

炙令黃 當歸一兩。剉碎微炒 桂心一兩

川大黃一兩。剉碎微炒 桃仁一兩。湯浸去皮。炙令乾。微炒

右件藥。搗細羅為散。每服二錢。以溫酒調下。食前服。

龍甲丸。治婦人腹中積聚。大如杯。上下周流。痛不可忍。食噎。脛。四肢寒熱。經水不通。惡血停滯。體瘦無力。面色痿黃。

龍甲一兩。半。塗醋炙令黃。去骨。燻

牡丹三分 川椒三分。去目。及閉口者。微炒。去汗

牛膝三分。去苗 川大黃一兩。剉碎微炒 乾薑三分。微炒

烏菴一兩。微炒。附子一兩。炮裂。去皮。解

吳茱萸三分。湯浸七遍。焙乾微炒 水蛭一兩。微炒

金銀花半兩 當歸一兩。剉碎微炒 赤芍藥一兩

桂心一兩 琥珀一兩 防葵一兩 蟾蜍二十枚。微炒

永樂大典

卷一四九四八

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前以溫酒下十丸。

龜甲丸。治婦人虛冷。或腹中積聚。月事住來。時苦腹滿。繞臍下引腰背。手足煩或冷。或熱。時優心中悶。體瘦不欲食。

龜甲一兩半。塗醋炙令黃。

乾薑一兩半。炮裂剉。

赤石脂一兩。丹參一兩。

代赭三分。甘草五分。炙微赤剉。

桂心一兩。細辛一兩。

川椒一兩。去日及閉口者。微炒去汗。

附子一兩。炮裂去皮臍。

鹿茸三分。去毛。塗酥炙令黃。

當歸一兩。剉微炒。

烏賊魚骨三分。白鹽豉半兩。微炒。

生乾地黃一兩。

烏餘糧二兩。燒令赤。醋泔十遍。細研。干膝一兩。去油。

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前以溫酒下三十丸。

紫桂丸。治婦人虛冷積聚。宿食不消。冷氣時攻。心腹脹滿。逆膈疝痛。

桂心一兩。

吳茱萸半兩。湯洗七遍。焙乾微炒。

葛蒲半兩。

猪牙皂莢半兩。去皮。塗酥炙令黃。去子。

藥本卷萬四千九百四十八

四

紫苑半兩。洗去苗土。

乾薑半兩。炮裂剉。

川烏頭一兩。炮裂去皮臍。

當歸三分。剉微炒。

川椒半兩。去日及閉口者。微炒去汗。

蓬莪茂三分。

桃仁半兩。湯洗去皮尖。微炒微黃。

附子半兩。炮裂去

文膽

木香半兩。

干膝半兩。去苗。

琥珀三分。

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及

病時以熱酒下二十丸。

綱砂丸。治婦人虛冷。血氣積聚疼痛。

綱砂三分。細研。

百草霜半兩。川烏頭半兩。炮裂去皮臍。

硫黃一分。

凌霄花半兩。

香墨一分。巴豆一分。去皮心

研。紙裹壓去油。

右件藥搗羅為末。入巴豆霜同研令勻。軟飯和丸如菡豆大。每於食

前以溫酒三丸下。

薑黃丸。治婦人虛冷。血氣積聚。心腹妨悶。月候久不通。少思飲食。四肢羸瘦。

薑黃三分。

牡丹半兩。

赤芍藥半兩。桂心三分。

芫花一分。醋伴炒乾。

當歸半兩。剉微炒。

薑甲一兩。塗醋大分黃土。福桐。琥珀半兩。 玄胡索半兩
鬼箭羽半兩。 木香半兩。 硃砂半兩。 凌霄花半兩

京三稜三分。微炮剉。 惡毒一分。炒分微黃土炒。 又
水蛭一分。炒分微黃土炒。 川大黃三分。剉分微炒。

乾漆三分。搗碎炒分埋出。

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三五百杵。无如梧桐子大。食前以温酒
下七丸。

乾漆丸。治婦人積聚。及惡血不散。多攻心腹疼痛。面無顏色。四肢不和。

乾漆一兩。搗碎炒分埋出。 穿山甲一兩。大分黃土炒。

檳榔三分。 京三稜半兩。微炮剉。 乳香半兩。

桂心三分。 川高頭半兩。地漿土皮。 硃砂一兩。不炙石。

香如研。 阿魏半兩。麩裏煨熟為度。 朱砂三分。細研水。

看過。 薑甲一兩。塗醋大分黃土。福桐。木香半兩。

巴豆二十枚。去心皮研。紙裏壓去油。

右件藥搗羅為末。煉蜜和丸如麻子大。每服不計時候。以熱生薑酒
下五丸。當歸酒下亦得。

金葉香膏

麝香丸。治婦人積聚氣。心腹疼痛。面色痿黃。不能飲食。

麝香半兩。研入木香三分。 當歸三分。剉碎微炒。

附子半兩。地漿土皮。 香墨三分。 防葵半兩。

硃砂三分。不炙石者細研。 朱砂半兩。細研。巴豆半兩。去皮心。

紙裏壓去油。研其葉。薑半兩。湯浸七遍。焙乾。炒。

右件藥搗細羅為末。入研了藥。合勻。以醋煮麩糊和丸。如麻子大。每
服空心。以橘皮湯下三丸。以利下惡滯物為度。

大黃丸。治婦人積聚。氣久不散。

川大黃三兩。剉碎微炒。 薑甲二兩。塗醋大分黃土。福桐。

防葵一兩。半。 琥珀一兩。 乾漆一兩。搗碎炒分埋出。

右件藥搗細羅為末。以米醋二升。煎合稠。入少麩煮作糊。和搗為丸
如梧桐子大。每服食前。以温酒下十五丸。

草粉丸。治婦人積聚。氣久不散。心腹疼痛。

飛天白六兩。准厚真。冬月者佳。炒分埋熟為末。

右件藥都研合勻。以糯米飯和丸。如梧桐子大。每服空心。以生薑湯

麝香半兩。細研。巴豆三分。去皮心。紙裏壓去油。

下二九

楊侯家藏方磨積丸。治女人三十六疾積氣內攻。經候不調。腹脇多脹。或時刺痛。不進飲食。

京三稜

切蓬莪茂

苗香微炒

附子炮去皮臍白芍藥

乾薑炮去一兩半

當歸洗焙一兩三分

巴戟去心微炒一兩

艾葉醋炒一兩三分

川味子肉炒一兩

右件為細末。酒煮麩糊丸如梧桐子大。每服五十九。溫酒下。食前。

劉智經驗普濟加減方千金丸。治婦人一切積聚。血塊。血刺。腰腿疼。繞臍痛。

川大黃土龜皮為泥。二兩。白芍

右用末三錢。醋一小盞。熬膏和乾末丸。梧子大。每服一十九。酒下。宜取驗。又如當歸一兩。酒調三五錢。蜜丸亦妙。

素當時大方分膈丸。治血氣。及一切積聚。敗血為病。兼治產後注。憑心腹。喉涎脹。秘不通。

人參一兩 檳榔

肉豆蔻二兩。煨。南木香不見火。

白茯苓各一兩。土硫

水銀四兩。水煮一伏時。和棗肉研。

永樂大典卷五十四千九百零八

六

五五

沒藥剉研

青皮各一兩。土硫

當歸八兩

不蛀皂角一錢。血竭半兩

右為細末。分作兩處。一半藥末。別入燈心。燒過。巴豆杏仁各二十一箇。研細入。勻。同用麩糊丸。如梧桐子大。每服十丸。艾醋湯下。有巴豆。

杏仁名大藥。治乾血氣積聚。一半藥。只煉蜜為劑。而東杆一千下。實時旋丸。如小豆大。每服七丸。看大小加減丸數。艾醋湯下。無巴豆杏。

仁名小藥。治產後病。及血氣悶。不下食。并血運大効。

婦人瘕癖

論

巢元方病源癖病由冷氣結聚。飲食不消。停積於脇下。則成癖病。其狀。急刺痛。得冷則發作也。太平聖惠方。夫婦人瘕癖者。本因邪氣積聚而生也。瘕者在腹內。近臍左右。各有一條。筋脉急痛。大者如臂。次者如指。因氣而成。如弦之狀。名曰瘕氣也。癖者為僻。側在兩肋之間。有時而痛。故曰癖也。大瘕之與癖。皆陰陽不和。經絡否隔。飲食停滯。不得宣流。邪冷之氣。搏結不散。得冷則發作疼痛。故曰瘕癖者也。

方

珠恩選千金要方治婦人患癖。按時如有三五箇。而作水聲。殊不得寢食。常心悶方。

牽牛子三升治下節。飲服方寸匕。日一服。三十服後可服好硫黃。一兩。

連水都尉所上丸。治臍下堅癖。無所不治方。

恒山 大黃 巴豆各一分 天雄二枚

苦參 白薇 乾薑 人參

細辛 狼牙 龍膽 沙參

玄參 升參各三分 芍藥 附子

牛膝 茯苓各五分 牡荊四分 藿蘆六分一方云

二兩三分

右二十味為末。蜜丸。宿勿食。服五丸。日三。大羸瘦。月水不調。當二十。五日服之下。長蟲。或下種種病。出二十五日。服中所苦悉愈。肌膚感。五十日。萬病除矣。斷緒者皆有子也。

太平聖惠方。桃仁散。治婦人痰癖氣。令人羸瘦。寒熱食少。

桃仁半兩。湯洗去皮尖雙仁。乾炒微黃。柴胡一兩。去苗。

金華英卷萬軍音甲八

七

厚朴三分。去麤皮。塗土薑汁。炙令香熟。檳榔三分。

龜甲一兩。醋炙令黃。去裙襖。枳殼三分。乾炒微黃。去瓢。

烏梅肉三分。微炒。赤芍藥三分。白朮三分。

甘草半兩。炙微赤。川大黃一兩。剉碎微炒。

右件藥搗羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。每於食前稍熱服。

當歸散。治婦人痰癖氣。攻心腹疼痛。不能飲食。

當歸三分。剉微炒。木香半兩。京三稜一兩。炮剉。

檳榔三分。桂心半兩。陳橘皮半兩。湯洗去白。紙焙。

吳茱萸一分。湯浸七遍。焙乾微炒。郁李仁一兩。湯洗。

去皮微炒。桃仁一兩。湯洗去皮尖雙仁。乾炒微黃。

右件藥搗羅為散。每服三錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。不計時。候稍熱服。

木香散。治婦人痰癖。心腹疼痛。不欲飲食。

木香三分。檳榔半兩。蓬義茂半兩。京三稜三分。炮剉。

玄胡索三分。當歸三分。剉微炒。芍藥三分。

永樂大典

卷一四九四八

桃仁一兩。湯洗去皮尖雙仁。麩炒微黃。牛李子三分。琥珀三分。桂心三分。麝香一分研入。

右件藥搗細羅為散。每服不計時候。以熱酒調下一錢。大黃丸。治婦人產後氣多疼痛。

川大黃二兩。剉碎微炒。麝香一分細研。硃砂三分細研。京三稜一兩。剉碎微炒。巴豆一分。去皮心研。乾薑壓去油。

川烏頭三分。炮裂去皮。桂心三分。當歸三分剉微炒。木香三分。檳榔三分。乾薑三分炮裂。

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三二百杵。丸如小豆大。空心及晚食前。以粥飲下五丸。以利為度。

牛李子丸。治婦人產後氣。每發攻心膈疼痛。不能飲食。牛李子二兩。一半土用。一半微炒。蟪蟪真一兩微炒。

川烏頭三分。炮裂去皮。川大黃一兩。剉碎微炒。藏靈仙三分。桃仁三分。湯洗去皮尖雙仁。麩炒微黃。

青橘皮三分。湯洗去白紙。京三稜一兩。微炮。檳榔一兩。麝香一分細研。牛膝三分。赤芍藥二分。

琥珀一兩。加何阿魏一分。麩炒微黃。右件藥搗羅為末。以乾漆三兩為末。用陳醋二升。熬成膏。和藥末。搗三五百杵。丸如梧子大。每日空心及晚食前。以熱酒下三十丸。桃仁湯下亦得。

京三稜丸。治婦人產後氣。攻腹脇妨痛。面色痿黃。羸瘦少力。不能飲食。京三稜三分。微炮。鼈甲三分。鹽醋天。分黃。去殼。檳榔。

木香三分。桂心半兩。川大黃一兩。剉碎微炒。檳榔三分。訶梨勒三分。煨用皮。當歸半兩。剉微炒。

芎藭半兩。郁李仁三分。湯洗去皮微炒。右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧子大。食前以粥飲下三十丸。

枳殼煎丸。治婦人產後氣。嘔吐酸水。腹脇脹痛。面色痿黃。不能飲食。枳殼三兩。麩炒微黃。去殼。搗羅為末。以米醋二升。慢火熬如錫。

五靈脂一兩。川大黃一兩。半。剉碎微炒。蓮莖茂一兩。桂心一兩。川烏頭一兩。炮裂去皮。訶梨勒皮一兩。

當歸一兩。剉微炒。木香一兩。

右件藥搗細羅為末。入煎煎中和按為丸如梧桐子大。每服食前生薑湯下十五丸。漸加至二十丸。

麝香丸。治婦人產後冷氣兼症氣。心腹痛不可忍。

麝香半兩。細研入。

阿魏一分。麝香煨。以麝香為度。

五靈脂三分。蓬莪朮半兩。

芫花一兩。醋拌炒。全乾。

京三稜三分。微炮。剉。

沒藥半兩。桂心半兩。

木香半兩。

當歸半兩。剉。微炒。

檳榔一兩。

桃仁三分。湯浸。去皮。尖。雙仁。麝炒。微黃。

右件藥搗羅為末。研入麝香。令勻。用粳米軟飯。和丸如梧桐子大。每服不計時候。以醋湯送下十丸。

蓬莪朮丸。治婦人產後氣。兩脇妨脹。或時疼痛。不欲飲食。

蓬莪朮三分。草薢半兩。剉。

芫花一兩。醋拌炒。全乾。

京三稜三分。微炮。剉。

神麴一兩。炒。全微黃。

木香半兩。

麥蘖一兩。炒。全微黃。

龜甲一兩。塗醋炙。

全黃土。細研。

麝香一分。細研。

右件藥搗羅為末。用醋煮麴糊。和丸如梧桐子大。每服不計時候。以

熱酒下二十丸。

龜甲丸。治婦人產後。及血氣不調。或時腹臍脹痛。

龜甲二兩。塗醋炙。全微黃。去裙襖。為末。

川大黃二兩。剉。碎。

做。吃。別。搗。為。木。附。子。一。兩。炮。製。去。皮。膜。

京三稜一兩。炮。剉。

木香一兩。

乾漆一兩。麝炒。微。全。煙。出。

枳殼一兩。麝炒。微。

黃土。細研。

當歸一兩。剉。微炒。

琥珀一兩。

沒藥一兩。

右件藥搗羅為末。以陳頭醋二升。先煎龜甲大黃。未成膏。入諸藥末。和搗。三二百杵。丸如梧桐子大。每服不計時候。以熱酒下二十丸。

沒藥散。治婦人產後氣。攻心腹疼痛。

沒藥一兩。

芎藭一兩。半。

龜甲二兩。塗醋炙。全微黃。去裙襖。

右件藥搗細羅為散。每服不計時候。以熱葱酒調下一錢。

大黃丸。治婦人產後氣。心腹冷痛。食飲不消。

川大黃一兩。剉。碎。微炒。

訶梨勒皮一兩。檳榔一兩。

木香一兩。

右件藥搗細羅為末。以酒煮麴糊。和丸如梧桐子大。每服食前生薑

橘皮湯下十五丸。溫酒下亦得。

又方

龍甲二兩。塗醋炙。各黃。大楓。獨川。大黃一兩。剉碎。微炒。京三稜一兩。炮裂。

右件藥搗細羅為末。以醋煮麩糊和丸。每日食前以生薑湯下十九丸。

又方

附子一兩。炮裂。去皮。爛。芫花一兩。醋拌。炒。令乾。桃仁一兩。湯浸。去皮。尖。雙仁。麩炒。微黃。

右件藥搗羅為末。用醋煮麩糊和丸。如梧桐子大。每日食前以生薑湯下十九丸。

陳自明大全良方治婦人痰癖。及血氣等神効方。

右以積猪肝一具。可及十兩者。用巴豆五十枚。去殼皮。剉在肝內。用醋醋三椀。慢火熬。令肝爛熟。入砂鉢內。研令極爛。入京三稜末。和就。俾所為丸。如梧桐子大。每服五丸。食前熱酒下。想熱後。去已不用。若大症。辨痰癖。血氣。塊。塊。於易。對。高。甚。則。欲。死。免。而。言。之。皆。血。之。所。為。候。皆。治。一。婦。人。以。氣。刺。痛。極。不。可。忍。甚。而。死。一。二。日。方。有。醫。至。付。治。

永樂大典卷萬四四八

十

數年不愈。僕以葱白散。為難丸。遂安。又嘗治一婦人。血氣作苦。如一小盤。樣。先。注。刺。痛。要。一。人。扶。定。方。少。止。亦。用。此。二。藥。而。愈。子。常。小。人。血。氣。用。此。二。藥。亦。有。奇。効。故。錄。于。後。
葱白散。專治一切冷氣不和。及本臟膀胱氣攻衝疼痛。大治婦人產前後腹痛胎不安。或血刺痛者。兼能治血凝宿冷。百節倦疼。肌體怯弱。勞傷帶癖。及眼盡除。但婦人一切疾病。最宜服之。

- | | | | |
|----|-----|----|------|
| 川芎 | 當歸 | 枳殼 | 厚朴 |
| 桂心 | 乾薑 | 芍藥 | 舶上茴香 |
| 青皮 | 苦楝子 | 木香 | 熟地黃 |
| 麥牙 | 三稜 | 義茂 | 茯苓 |

神麩 人參各等分

右為細末。每服三錢。水一錢。連根葱白二寸。擘破。鹽半錢。煎至七分。溫服。內大黃。訶子。宜相度。病狀。如大便秘。不利。入大黃。同煎。却不入鹽。如大便秘。自利。入訶子。煎。未。先。生。云。此。藥。大。治。心。氣。脾。疼。用。之。見。効。僕。嘗。以。此。藥。治。浮。腫。立。効。陳。宜。人。病。血。氣。作。楚。痛。不。可。忍。服。諸。藥。無。効。召。僕。診。之。兩。關。脈。沉。弱。為。肝。脾。沉。差。紫。此。血。氣。漸。成。痼。疾。也。只。以。此。

二藥安愈。四明為期。本後院亦此病。因此二藥愈。

劉曾經驗普濟加減方。逐氣丸。治婦人血氣衰弱。小腹痠痛。氣痛。幸心。陰戶浮腫。脹悶。兼治男子疝氣。下墜。

縮砂仁

紅豆

良薑

青皮

陳皮

枳殼

甘草

乾薑

木香

硃砂

木瓜

當歸

右為細末。煉蜜丸。如彈子大。每服一粒。細嚼酒下。食前一日三丸。生薑湯下。亦得。病重每服三丸。或作散子酒調三五錢。老幼加減。

奪命散。治婦人血氣風虛。冷積痲痺。臍腹脹痛。

山梔子

茯苓

白朮

川乾薑

右為細末。每服五錢。水一升。煎至七分。去滓。更入鹽半錢。溫服。三五服見效。老少加減。如陰戶腫痛不可忍者。用椒末半兩。白麩兩匙。乾薑末半兩。鹽水和作餅劑。安陰戶內。生三兩次。小便取了再生。

木香散。治婦人氣血火冷。痲痺牽引。小腸內急痛。嘔逆減飲食。頭旋眼黑。

木香

十一

木香

蓬莪茂

右三味為末。每服五錢。熱酒調下。一日三服。多驗。以意加減。

劉守真病機氣宜保命集。治血痲腹痛。及血刺腰痛。

四物湯。細末二兩。加酒煮玄胡索末三兩。

右每服三錢。酒調下。

治血運血結。聚於胃中。或偏於小腹。或連於脇肋。

四物湯。四兩。倍用當歸。川芎。加鬼箭。紅花。玄胡索。各一兩。

右同為末。加四物煎取清汁。調後沒藥散服之。

沒藥散方

無蟲一錢。去足。別炒。

水蛭一錢。炒。

麝香

沒藥

右為細末。煎前藥末調服。血下痛止。只服前藥。

羅謙甫衛生寶鑑。木香硃砂丸。治婦人痲痺積聚。血塊刺痛。脾胃虛寒。食不消。大便不寢。

丁香

硃砂

木香

官桂

附子

乾漆

細香墨

大黃

永樂大典

卷一四九四八

乳香研

蓬木

京三棱

青皮

巴豆霜法半

猪牙皂角

沒藥研

乾薑也之上各等分

右除明乳沒為末。以好醋一升化開。研砂去了。粗銀器中慢火熬。次下巴豆霜。大黃末。熬成膏。將前藥末入膏。為丸。麻子大。每三十九。至五十丸。食後溫酒送下。如至大便利為度。量用之。

危亦林得効方。小烏雞煎丸。治瘰癧癥瘕。血氣塊硬。發欬刺痛。甚則欲死。或塊如小盤。每作痛。要人伏定方少止。數年不愈者。與葱白散。開服尤効。

吳茱萸

良薑

白薑

當歸去頭

赤芍藥

玄胡索

破故紙

川椒

生乾地黄

劉寄奴

蓮菽茂

橘紅

青皮

川芎各二兩

荷葉灰四兩

熟艾二兩

右為末。醋煮。麩糊。九梧桐子大。每服三五十丸。熱酒下。忌食酸。方見前。殊九賢醫方。集成靈寶齋。治血氣攻刺。痛引兩脇。并治瘰癧冷氣。

丁香

木香

乳香各一錢。半當歸

玄胡索

白芍藥各半兩

右為末。每服一錢。食前溫酒調下。

婦人疝瘕

婦人疝瘕

論

素問脉解篇。厥陰所謂癰疝。婦人少腹腫者。厥陰者辰也。三月陽中之陰。邪在中。故曰癰疝。少腹腫也。以其脉循陰股入毛中。環陰器抵少腹故也。靈樞水脹篇。腸胃何如。岐伯曰。寒氣客於腸外。與衛氣相搏。氣不得榮。因有所繫。辭而內着。惡氣乃起。瘕肉乃生。其始生也。大如雞卵。稍以益大。至其成如懷子之狀。又者離歲。按之則堅。推之則移。月事以時下。此其候也。巢元方病源疝瘕之病。由飲食不節。寒濕不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。受於風冷。令人腹內與血氣相結。所生。疝者痛也。瘕者假也。其結散浮假而痛。推移而動。婦人病之有異於丈夫者。或因產後。臟虛受寒。或因經水往來。取冷過度。非獨關飲食失節。多挾有血氣所成也。診婦人疝瘕。其脉弦急者生。虛弱小者死。又尺脉滿而浮。半為血實。氣虛也。其發腹痛。逆滿氣上行。此為婦人胞中絕傷。有惡血。又成結瘕。得病以冬時來。其真則亦治。驗羅謙甫衛生寶鑑。趙運使夫人年五十八。至元甲戌。三月中。病臍腹冷痛。相引脇下。痛不可忍。反復悶亂不安。則予以當歸四逆湯。主之。先灸中庭一穴。在臍中下一寸六分。陷中。任脉氣所發。可灸五壯。鍼入三分。或二

七三七壯無妨 類用方藥 孫思邈千金要方 女子疝瘕 按之如以湯沃
兩股中 小腹腫 陰挺出痛 經水來下陰中 腫或癢 澀青汁如菴薑 血閉無
子 不嗜食 刺曲泉 在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中 在膝乃得之 刺入
六分灸三壯 疝瘕按之 如以湯沃股內至膝 瘕泄陰中痛 小腹痛 坐
重下濕 不嗜食 刺陰陵泉入二分 灸三壯 在膝下內側輔骨下陷中 伸足
乃得之 經逆四肢淫漑 淫暴跳疝 小腹偏痛 刺陰踳入三分 灸三壯 在
內踝下 容爪甲即無澤穴也

孫思邈千金翼方 烏頭丸 主心腹積聚 胸中氣悶 脹滿 疝瘕 內傷 瘀血 產
乳 等病 及諸不足 方見前 候取門千金方
乾薑丸 治婦人瘕結 脇肋下疾

- 乾薑 一兩半 芍藥 二兩 前胡 煎
- 乾地黃 煎 桃仁 煎 土瓜 大兩 仁者 茯苓 各一兩
- 人參 當歸 各二兩 杏仁 煎 去尖 尖兩 仁者
- 朴消 蜀椒 十 蟾蜍 煎
- 蠱毒 去翅 足 熱水 蛭 各一分 煎

金匱要略 萬里膏

右一十六味 搗篩為末 煉蜜和丸 如梧桐子大 未食以飲服三丸 可
增至十丸 千金用大黃 柴胡 各二兩 無前胡 地黃

生地黃丸 主婦人臍下結 堅大如杯升 月經不通 發熱往來 下利 瘕瘕 或
為氣瘕也 若生肉瘕 不可瘕 未主瘕者可瘕方

生地黃 三十斤 搗取汁 乾漆 一斤 熬搗篩為末
右二味 相和 微火煎 令可圓 藥作丸 如梧桐子大 食後以酒服五丸
千金云 服三丸 藥驗至七八丸止

太平聖惠方 當歸散 治婦人疝瘕 及血氣攻刺 心腹疼痛 不可忍

- 當歸 一兩 剉微炒 龜甲 二兩 塗醋炙令黃 去裙襖
- 芍藥 半兩 蓬莪 茂三分 吳茱萸 半兩 湯淘七遍 焙乾 微炒
- 桂心 一兩 赤芍藥 三分 木香 半兩 檳榔 一兩
- 青橘皮 半兩 湯洗去白 瓤焙 川大黃 一兩 剉碎 微炒
- 桃仁 三分 湯浸去尖 尖 雙仁 炒微黃

右件藥 搗羅為散 每服三錢 以水一中盞 入生薑半份 煎至六分

去滓 不計時 候稍熱 服
桃仁散 治婦人疝瘕 腹中拘急 心脇脹滿

桃仁一兩。湯洗。去皮。尖。雙仁。麩炒。微黃。
今貴。去。福。潤。枳殼一兩。麩炒。微黃。去。飯。
桑寄生一兩。芎藭一兩。續斷一兩。郁李仁一兩。湯洗。
去。皮。微。炒。

右件藥搗碎為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。食前溫酒服之。

乾漆散。治婦人疝瘕。久不消。令人黃瘦。疝瘕。兩脇妨悶。心腹疼痛。

乾漆一兩。搗碎。炒。令。煙。出。木香半兩。芫花半兩。醋。拌。炒。

亦芍藥半兩。桂心半兩。川大黃二兩。剉。碎。

當歸半兩。剉。微。炒。芎藭半兩。

琥珀半兩。牛膝三分。去。苗。桃仁一兩。湯洗。去。皮。尖。雙仁。麩炒。

麝香一分。研。入。

右件藥搗細羅為散。每服一錢。不計時候。以溫酒調下。

龍甲散。治婦人疝瘕。及血氣心腹疼痛。

龍甲一。枚。中。者。以。小。便。一。中。盞。浸。去。合。盞。高。度。去。福。潤。

乾漆一兩。搗碎。炒。令。煙。出。當歸一兩。剉。微。炒。

金葉大藥卷萬單音甲八

琥珀一兩。桂心半兩。

右件藥搗細羅為散。每服不計時候。以熱酒調下二錢。

琥珀丸。治婦人疝瘕。兼血氣膈腹疼痛。不欲飲食。四肢羸瘦。

琥珀半兩。細研。當歸半兩。剉。微。炒。芎藭半兩。

牛膝一兩。去。苗。京三稜一兩。微。剉。桂心半兩。

川大黃一兩。剉。碎。微。炒。川烏頭半兩。炮。裂。去。皮。臍。

乾漆半兩。搗碎。炒。令。煙。出。桃仁三分。湯洗。去。皮。尖。雙仁。麩炒。

龍甲一兩。望。醋。大。令。黃。去。福。潤。

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每服不計時候。以暖酒下二十丸。

大黃丸。治婦人疝瘕。及胞中積瘀。諸病並宜服。

川大黃四兩。蒸。飯。熟。為。皮。曝。乾。土。瓜。根。二。兩。桃仁二兩。湯洗。去。

皮。尖。雙仁。麩炒。微黃。牛膝二兩。去。苗。

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每於服食前。以粥飲下三十丸。

硃砂丸。治婦人疝瘕。及積瘀血在臍。時攻腹脇疼痛。

硃砂一兩細研當歸半兩到微炒 雄黃半兩細研
桂心半兩 川芒消一兩 京三棱一兩次也到

川大黃二兩到微炒

右件藥搗羅為末。用米醋一大碗熬大黃末為膏。次入餘藥末和丸。如梧桐子大。每服空心以煖酒下十丸。漸漸加至二十丸。以利下惡物為度。

抵聖丸。治婦人疝瘕惡血積聚。并月候不通。

硃砂半兩細研 沒藥半兩 桂心半兩

斑貓半兩。按末伴炒。合香末。又 蘇草半兩微炒

狼毒半兩 鬼前胡半兩 沒心草半兩

右件藥搗羅為末。以醋煮麩糊和丸。如梧桐子大。每日空心煎紅藍花酒放溫下五丸。

巴豆丸。治婦人疝瘕。及血氣疼痛。

巴豆一分。去皮心。醋煮半日 硃砂一兩細研

川大黃一兩。到碎微炒 五靈脂三分 木香半兩

桃仁三分。去皮尖。微炒

金葉藥卷萬聖膏

十五

右件藥搗羅為末。煉蜜和丸。如棗豆大。每服淡醋湯空心下五丸。以熱酒亦可。

木香散。治婦人疝瘕。及血氣積聚。時攻腹脇疼痛。

木香半兩 巴豆一分。去皮心。炒黃。紙裹壓去油

乾漆半兩。搗碎炒。合煙出 吳茱萸一分。湯淘七遍。焙乾微炒

檳榔半兩 猪牙皂莢一分。去黑皮。蜜酥炙。余黃去子

附子一分。炮。暴。土。炙。漬 白蕪荑一分 當歸一分。到微炒

桂心一分 乾薑一分。炮。裂。到

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗。三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及痛發時。煎紅藍花當歸酒下三丸。

味自明。大金良方黑神丸

茴香半兩 木香 椒炒。香。出。汗

丁香半兩 檳榔四枚 漆六兩半生。半用重湯煮半日。合香

右除椒漆。五物皆半生。半炒為細末。用前生熟漆和丸。如彈子大。茴香末十二兩。鋪陰地。陰乾。候外乾。茴香收器中。極乾。去茴香。腎餘膏。腸膀胱瘰癧。及疝墜。五膈血崩。產後諸血漏下。赤白。並一丸分四服。

永樂大典

卷一四九四八

死胎一丸。皆綿灰酒下。難產炒葵子四十丸。枝梅碎。酒煎下一丸。諸疾不遇三服。瘕氣十服。腸氣瘕癖五服。血瘕三九當差。于使子婦病腹中有大塊如杯。身發痛不可忍。于婦已責。亦下苦醫。悉常服有樂莫愈。陳庭之曰。此血瘕也。使黑仲丸。五三九。杯氣立消。終身不

反作

羅謙甫衛生寶鑑當歸四逆湯治脾胃冷痛相引腰膝而痛

當歸梢七分

附子炮

官桂

茴香炒

柴胡五分

芍藥四分

玄胡

川棟

茯苓二分

澤瀉二分

右咀作一服。水二盞半。煎一盞溫服。空心食前。數服良愈。難經云。任之為病。內結七疝。此寒疾所致也。內經云。寒淫於內。治以辛熱。佐以苦溫。以附子官桂甘辛大熱。助陽退陰為君。以茴香玄胡辛溫。除下焦虛寒。當歸辛溫。和血止痛為臣。芍藥之酸。寒補中焦之氣。又防熱藥損其肝。澤瀉鹹平。茯苓甘平。去膀胱中留垢。川棟子苦寒。酒煮之止痛。又為引用。乃在下者。引而竭之之意也。柴胡苦平。行其本經。故以為使。

永樂大典卷一四九四八

六

婦人瘕痞

論

巢元方病源。夫婦人瘕痞者。由冷熱不調。飲食不節。積在腹內。或腸胃之間。與臟相結。其牢強推之不移。名曰瘕。言其病形微可驗也。氣壅塞為瘕。言其氣痞澀不宣暢也。皆得冷則發動刺痛。瘕痞之病。其形冷結。若冷氣入於子藏。則使無子。若冷氣入於胞絡。搏於血氣。血得冷則澀。合月水不通也。

方

太平聖惠方穿山甲散。治婦人瘕痞。及血氣凝滯。心腹妨痛。四肢羸瘦。時吐清水。不欲飲食。

穿山甲二兩。天全黃已

荆三棱二兩。微炮。剉

木香一兩

檳榔一兩

桂心一兩

白朮三分

鬼箭羽半兩

桃仁三分

湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃

川大黃一兩。剉碎微炒

龜甲一兩。半。剉碎。炙。分。黃。去。裙。爛

當歸三分。剉微炒

防葵三分

右件藥搗羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。

去滓食前稍熱服

桃仁散治婦人癥瘕心腹脹滿不能飲食體瘦無力

桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃 訶梨勒皮三分

白朮三分 當歸三分 京三稜一兩微炮剉

赤芍藥三分 鼈甲一兩半。塗醋炙令黃。去裙襖

陳橘皮三分湯浸去白瓤焙

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服之

防葵散治婦人癥瘕心腹脹硬如石經絡不利四肢瘦弱少思飲食

防葵一兩 郁李仁一兩湯浸去皮微炒 桂心一分

鬼箭羽一兩 桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃

川大黃一兩剉碎微炒 吳茱萸一分湯浸七遍曬乾微炒

當歸一兩 枳實半兩麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

食前稍熱服之

穿山甲散治婦人癥瘕及惡血氣攻刺心腹疼痛面無顏色四肢瘦弱

金匱要略卷之五

穿山甲一兩炙令黃色 鼈甲一兩塗醋炙令黃去裙襖

赤芍藥一兩 芎藭半兩 當歸半兩剉微炒

麝香一分細研川大黃一兩剉碎微炒 乾漆一兩搗碎炒

桂心一兩 芫花半兩醋拌炒令乾

右件藥搗細羅為散入麝香同研令勻每服不計時候以熱酒調下一錢

蓮莖茂丸治婦人癥瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

蓮莖茂三分 桂心半兩 當歸半兩剉微炒

赤芍藥半兩 檳榔半兩 鼈甲一兩塗醋炙令黃去裙襖

川大黃二兩剉碎微炒 枳殼半兩麩炒微黃去瓤

木香半兩 昆布半兩洗去鹹味 琥珀半兩

桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃

右件藥搗羅為末煉蜜丸搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸

鼈甲丸治婦人癥瘕冷氣或時攻心腹痛不能食四肢瘦弱

鼈甲一兩塗醋炙令黃去裙襖木香半兩 川大黃一兩半剉

碎微炒 當歸三分剉微炒 安息香半兩
桂心半兩 附子半兩。焙去皮臍 阿膠半兩。熬去膠

以酒為度

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。食前以煖酒

下二十九

硃砂煎丸。治婦人積年血氣。癥痞不消。四肢黃瘦。腹脇妨痛。經絡不通

硃砂一兩。細研。乾漆一兩。川大黃一兩。以上三味。並搗羅為末。以酒漬一升。以慢火煎成膏。次入後藥

龜甲半兩。酒醋炙。分黃土。研。沒藥一兩。五靈脂一兩。狗膽一枚。斑貓十枚。糯米半斤。炒。分黃土。炮。水蛭十枚。炒。分黃土

巴豆七枚。去皮。心。研。紙裏壓去油

右件藥搗羅為末。入前膏和搗三二百杵。丸如小豆大。每於食前。以

煖酒下五丸

大黃丸。治婦人癥痞。及惡血氣。築心。悶亂疼痛。四肢不和。身體羸瘦。不欲飲食

川大黃一兩。剉碎微炒 龜甲一兩。酒醋炙。分黃土。研

大藥大卷二萬早九百四八

大

乾漆三分。搗碎。炒。分黃土。出 京三稜一兩。微炮。剉
吳茱萸半兩。湯。向。心。通。焙。乾。微炒 琥珀三分。細研 桂心半兩

檳榔三分 防葵半兩 川烏頭三分。炮。去。皮。臍

右件藥搗羅為末。以醋醋一升半。熬令稠。煮麩糊和丸。如梧桐子大。每服不計時候。以生薑醋湯下二十九

芫花丸。治婦人癥痞。心腹脹硬疼痛
芫花一兩 大戟一兩 甘遂一兩 木香半兩。剉搗羅

為末 巴豆一兩。去皮。心。紙裏壓去油。研

右件藥先以芫花等四味搗碎。用米醋一大盞。煮令乾。搗細羅為末。研入巴豆。以醋煮麩糊和丸。如菉豆大。每服空心。以生薑湯下二九

香墨丸。治婦人癥痞

香墨半兩 硃黃半兩 硃砂半兩 朱砂半兩

麝香一分 巴豆半兩。去皮。心。紙裏壓去油

右件藥同研。分極細。以醋煮麩糊和丸。如菉豆大。每服空心。以溫酒下三九

水銀丸。治婦人癥痞。結塊不散。心腹疼痛

成塊或成堅癥。及血氣攻症。腹脇疼痛。小腹急脹。或時虛鳴。面色痿黃。肢體浮腫。月水欲行。先若重病。或多或少。帶下亦白。崩漏不止。驚悸健忘。小便頻數。或下白水。時發虛熱。盜汗羸瘦。此藥不問胎前產後室女。並宜服之。常服安心神。去邪氣。逐敗血。養新血。令人有子。

琥珀別研 沒藥別研 當歸洗淨別木 木香煨別取木 各一兩 滴乳別研一分 麝香別研 辰砂別研各一錢

右件研令細和停酒冷熱水搗為丸。每一兩作十五丸。每服一丸。溫酒化下。胎息不順腹痛。一切難產。溫酒童子小便化下。產後血運。敗血奔心。口噤舌強。或惡露未及盡。發渴面浮。煎烏梅湯併童子小便化下。產後氣力虛羸。諸藥不効。以童子小便化下。室女桂水不調。每半丸。溫酒化下。不拘時候。

黃氏鯨網砂丸。治血蟲塊癖等疾。
硃砂半兩 靈龜四十九箇 水桂炒焦 丁香
乾漆炒黑煙止 白丁香 甘遂炮 杜蠟炮
大麥炒 檳榔各五錢 粉霜三錢 膠礬三錢
阿魏一錢研 大棗五十箇去皮核 木香五錢

永樂大典卷一四九四八

二十

右末用棗肉丸。每十九。任湯使下。
柳森可用方當歸散。治婦人癥瘕。及血氣攻刺。心腹刺痛。不可忍。

當歸微炒 桂心 檳榔 川大黃各一兩
龜甲 芎藭 吳茱萸 木香
青楠皮各半兩 蓬義木 赤芍藥 桃仁各三分
右搗為散。每服三錢。水一中盞。生薑半分。煎至六分。稍熱服。

龜甲散。治同前。
龜甲一枚。中者。以小。大一中。美。塗大。良。已。今。在。去。泥。爛。
乾漆 琥珀各一兩 桂心半兩 當歸一兩
右末。不計時。溫酒。調下。二錢。

婦人食癥論

太平聖惠方。夫婦人食癥者。由臟腑虛弱。月候來時。食生冷之物。脾胃既虛。不能消化。與穢氣相搏。結聚成塊。日漸生長。盤牢不移。故謂之食癥也。

太平聖惠方。硃砂丸。治婦人食癥。又不消。令人瘦弱。食少。

硃砂半兩細研青礞石半兩 硃黃半兩細研京三稜半兩改炮剉
乾漆半兩搗碎炒令煙出 穿山甲半兩炙令黃焦

巴豆三十枚去皮炒令黃色。不出油

右件藥搗羅為末。用軟飯和丸如小豆大。每服空心以主薑橘皮湯
下五丸

礞石丸。治婦人食癥塊。久不消。攻刺心腹疼痛

青礞石一分木香一分木 硃砂半兩。不炙石者。細研

朱砂一分細研粉霜一分研入巴豆一分去皮心。研紙裹壓去油

右件藥都研令勻。以糯米飯和丸如菜豆大。每服空腹。以溫酒下二
丸。取下惡物為効

破癥丸。治婦人食癥塊。攻心腹疼痛

巴豆十枚去皮心皮研。紙裹壓去油

川烏頭一分。炮裂

去皮癬

膽子礬一分

五靈脂一分

芫花一分。醋拌炒令乾

百草霜一分

右件藥搗羅為末。黃素肉和丸如菜豆大。每服以生薑醋湯下五丸
續隨子丸。治婦人食癥積年不瘥

續隨子丸

主

續隨子一兩微炒

雄黃一分細研木香一分

臘脂一分

麝香一錢研入乾薑一分炮裂剉

朱砂一分細研硃砂不炙石者一分細研

右件藥搗細羅為末。入研了藥令勻。以酒黃麩糊和丸如菜豆大。每
服以生薑湯下三丸

乾漆丸。治婦人食癥。夾惡血氣。攻刺腹脇疼痛不止

乾漆一分搗碎。炒令煙出

芫花一分。醋拌炒令乾

當歸一分剉微炒

五靈脂一分

硃砂半兩細研

麝香半分細研巴豆十枚去皮心研。紙裹壓去油

香墨一分

右件藥搗羅為末。同研令勻。用醋黃麩糊和丸如菜豆大。每服空心
以溫酒下五丸

化癥丸。治婦人食癥。腹脹氣急。面目浮腫。四肢無力

硃砂半兩細研巴豆十枚去皮心研。紙裹壓去油

五靈脂半兩 乾薑半兩炮裂剉

雄雀糞半兩微炒黃

猪牙皂莢半兩去皮。紙裹壓去子

右件藥搗羅為末。同研令勻。用醋煮麩糊和丸如菉豆大。每服空心。以溫酒下五丸。

膩粉丸。治婦人遠年食癥。黃瘦不欲飲食。

膩粉一錢 硃砂一分 青黛一錢 慈愷脂一錢

巴豆十枚。去皮。心研。紙裹壓去油。

右件藥都研令極細。以蒸餅和丸如菉豆大。每日五更初。以溫酒下

三丸。如下得惡物看多少。次日更加減服之。

芫花丸。治婦人宿食不消。結成癥塊。兼血氣疼痛。

芫花一兩。醋拌炒令乾。川烏頭半兩。地漿去皮。鹽

防葵一分。硃砂半兩。細研。巴豆二十枚。去皮。心。紙裹壓去油。

麝香一錢。細研。

右件藥搗羅為末。同研令勻。用頭醋煎為膏。和丸如梧桐子大。每服

以當歸酒下三丸。

香墨丸。治婦人積年食癥及血氣。

香墨半兩。芫花一兩。醋拌炒令乾。川大黃半兩。剉碎

微炒。青礬石半兩。巴豆一分。去皮。心。紙裹壓去油。

永樂大典萬四千九百四十八

三

硃砂半兩。細研。

右件藥搗羅為末。同研令勻。用醋煮麩糊和丸如小豆大。每服空心

燒乾薑湯下五丸。

硫黃丸。治婦人食癥。久不散。

硫黃半兩。細研。朱砂半兩。細研。青礬石半兩。細研。

芫花一分。醋拌炒令乾。為末。麝香一錢。細研。巴豆半兩。去心。皮

紙裹壓去油。

右件藥搗細羅為末。入研了藥。令勻。以酒煮麩糊和丸如菉豆大。每

服空心。以生薑酒下三丸。

膩粉丸。治婦人久積食癥。及經脈不通。心腹疼痛。

膩粉一兩。細研。巴豆一兩。去皮。心。紙裹壓去油。

芫花一兩。醋拌炒令乾。為末。

右件藥同細研令勻。用醪醋二升。同煎成膏。候可丸。即丸。如菉米大。

空心。以當歸酒下三丸。

草粉散。治婦人久積食癥。腹中結塊。面身浮腫。

雄雀糞半兩。微炒。細研。膩粉半兩。

右件藥以捺了麩一雞子大。相和擗作餅子。焙熟候乾。搗細羅為散。每服一錢。五更初以溫酒調服。以利下惡物為効。

五靈脂丸。治婦人食癥。體瘦成勞。心腹脹痛。不能飲食。常吐酸水。

五靈脂半兩。硫黃半兩。細研。砂半兩。不大石者。細研。

芫花半兩。醋拌炒。各乾。巴豆四十九粒。去尖。紙裹。壓去油。

右件藥搗細羅為末。入研了藥。合勻。以醋煮麩糊和丸。如菉豆大。每

服空心。以生薑橘皮湯下二丸。

婦人積年血癥塊。

論

太平聖惠方。夫婦人積年血癥塊者。由寒溫失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相結。新生顆塊。盤牢不移。動者是也。皆因血氣勞傷。月水往來。經絡否澀。惡血不除。結聚所生也。久而不瘥。則心腹兩脇苦痛。害於飲食。肌膚羸瘦。治驗宋彥修丹溪醫按。台州團浦陳氏婦。年五十五歲。形氣俱實。富而神勞。味厚性急。嘗經水過多。醫每用瀉藥止之。後病氣痛。胃腹共有積塊。大小十三枚。遇夜痛甚。臥床屢月。飲食雖減。應接家事如故。其塊兩手皆濡而弱。此屢用瀉藥。因致敗血積聚不行。故爾。三月間用

余樂與卷萬聖丸百單

三

蜀葵根煎湯。再煎人參。白朮。陳皮。青皮。甘草。稍半。膝成湯。入玄明粉少許。研桃仁調熱飲之。服至二貼。腹痛下塊一枚。再併粗服。又下一枚。時以病久。好血耗竭。不敢急下塊。就於前藥中。葵根。玄明粉。徐徐服之。其後塊漸消。而病安。

方

葛洪時後備急方。治婦人臍下結物。大如杯升。月經不通。發作往來。下痢。瘕瘕。此為氣瘕。按之若牢。強肉瘕者。不可治。未者可治。

末乾漆一斤。生地黄三十斤。

右搗絞取汁。大煎乾漆。合可丸。食後服。如梧子大。三九日。三服。即瘕瘕悉。避千金要方。治療子門閉。血聚腹中。生肉瘕。藏寒所致。方王素外臺

秘要方云。茶赤如物。此子為瘕氣。右生地黄煎破血丸。

乾漆一斤。生地黄汁三升。生牛膝汁一升。

右三味先搗漆為散。內汁中攪。微火煎為丸。如梧子大。酒服三九日。再若覺腹中痛。食後服之。

當歸丸。治女人臍下癥結刺痛。如蟲所啣。及如錐刀所刺。或赤白帶下。十二疾。腰背疼痛。月水或在月前。或在月後。

永樂大典

卷一四九四八

雷蹄

葶藶

附子

吳茱萸

大黃五二兩

黃芩

桂心

乾薑

牡丹

芍藥各一兩半細辛

秦椒

柴胡

厚朴各一兩六錢

牡蠣一方無

甘草各一兩

蟬蛻

水蛭各五十枚

右十八味為末。蜜和丸如梧子大。空心酒下十五丸。日再有胎勿服之。

太平聖惠方乾漆丸。治婦人積年血癥塊。或攻心腹疼痛。四肢不和。面少血色。飲食全微。

乾漆一兩。搗碎炒令煙出。

川大黃一兩。剉碎微炒。

琥珀三分

紅藍花半兩

玄胡索半兩

消石三分

蓬莪朮三分

膩粉一分

硃砂三分

桂心半兩

巴豆三七枚。去皮研。紙裹壓去油。用漿水二盞煎如饒。

右件藥搗羅為末。入巴豆拌勻。用熟棗瓤和丸梧子大。每服五丸。於日未出時。煎蘇木湯下十九。更量患人輕重加減服之。妙。

琥珀丸。治婦人積年血癥塊不消。狀若鬼胎之候。

琥珀三分細研。生乾地黃半兩。桂心三分。

牛膝三分。去苗。

藥大卷萬單九百八

五

龜甲二兩。塗醋炙令黃。去裙襖。雷蹄五兩。剉微炒。

京三棱一兩。微炮剉。

玄胡索半兩

乾漆一兩。搗碎炒。

小地出

芫花三分。醋拌炒令乾。

水蛭四十九枚。炒令黃。

蟬蛻四十九枚。炒令黃。去翅足。

檳榔三分

硃砂一兩。研

川大黃二兩。剉碎微炒。

桃仁三分。湯浸去尖。雙仁。麩炒微黃。

右件藥搗羅為末。醋煮硃砂為膏。入藥末和搗。三二百杵。丸如梧桐子大。每服十九。空心以溫酒下。

芫花丸。治婦人積年血癥塊不消。時有疼痛。

芫花半兩。醋拌炒令乾。

朱砂三分。細研。硃砂一兩。不炙。

青細研

川大黃半兩。剉碎。微炒。搗作末。麝香一錢。

桃仁半兩。湯浸去皮。尖。雙仁。麩炒微黃。

右件藥都研為末。用醋煮麩糊和丸如小豆大。每日空心以溫酒下十九。

硃砂丸。治婦人積年血癥塊不消。

硃砂一分

乾漆一分。搗碎炒令煙出。

水銀一分。以少棗。

肉研合星五 雄黃一分 雄雀糞一分炒黃
巴豆十枚去皮心研。紙裏壓去油

右件藥都細研合勻。用棗肉和丸如棗豆大。每服以當歸酒下三丸。空心一服。臨卧一服。取下惡物為効。

烏頭丸。治婦人積年血氣癥塊。往來疼痛。或吐逆不納食。漸黃瘦。至極者。川烏頭半兩。炮裂去皮臍 乾薑半兩炮裂

當歸半兩剉微炒 桂心半兩 赤芍藥半兩 川大黃一兩剉碎 微炒 斑猫二十一枚。糯米拌炒。合黃土

右件藥搗羅為末。用醋煮麩糊和丸如棗豆大。每服空心。以溫酒下

五九 抵聖丸。治婦人血癥。積久不散。值天陰。即疼痛

硃砂一分 硝石一分。已上三味。同研如粉 當歸一兩。剉搗羅為末 桂心 乾薑炮裂

半李子酒拌炒乾。已上各半兩。一處搗羅為末。巴豆去皮心細研。紙裏壓去油半兩

余集醫書萬全堂

三五

右件藥用無灰酒一升。入當歸末。及巴豆於甕器中。慢火熬成膏。下硃砂三味攪合勻。次下諸藥末拌和為丸。如棗豆大。每日空心溫酒

下三丸。晚食前再服。以利下惡物為度 五靈脂丸。治婦人積年癥塊。及惡血氣久不除

五靈脂一兩 川烏頭一兩。炮裂去皮臍 麝香半兩細研 乾漆一兩。搗碎炒令煙出 巴豆三十枚去皮。用醋煮令赤

硫黃半兩細研 硃砂半兩細研 右件藥搗羅為末。入研了藥合勻。以醋煮麩糊和丸如棗豆大。每服

空心。以溫酒下五丸 治婦人積年血癥塊不消。發歇疼痛

硃砂三分 硫黃三分。水三大盞。煮盡取出 驢驘竭五分末 巴豆一分去皮心。紙裏壓去油炒令黃

右件藥都細研。用糯米飯和丸如棗粒大。每服空心。以當歸酒下五丸 抵聖散。治婦人積年血氣癥塊。攻心腹疼痛。悶亂。偏宜服此

白馬護干一兩燒灰 赤驢護干燒灰一兩 麝香一分細研 紫驢護干燒灰一兩 乾漆一兩搗碎炒

今埋出

右件藥搗細羅為散。入麝香更研令勻。每服不計時候。用熱酒調下

一錢
大黃煎。治婦人積年血氣。癥塊結痛

川大黃三兩。切碎微炒
龜甲二兩。塗醋炙令焦。去裙襖
牛膝一兩。去白。乾漆一兩。搗碎炒令煙出

右件藥搗羅為末。用米醋一升煎為膏。每服食前。用熱酒調下一錢

又方
芫花一兩。醋拌炒令乾
當歸一兩。剉微炒
桂心一兩

右件藥搗羅為末。以軟飯和丸如梧桐子大。每服食前。以熱酒下十九
揚子建萬全護命方。治婦人或產後起早。并誤喫生冷物。
傷損血氣。血氣俱病。因生積聚。又無所療。變成惡物。其狀腹中成塊如蛇。
如鼠。如蝦蟇。蠶之類。發作有時。疼痛不可勝忍。以手按之。即衝手跳起。宜
服此方。但此病經到年深。其惡物帶命與人血盡。或絕無經候通行。或經
候行時。只如淡紅水。如此即傾危人也。急宜治之。所病年深不請喫

永樂大典卷萬四千四百四十八

三

吳茱萸三味
龜甲醋炙黃
玄胡索
梔子各半兩

芫花
檳榔各一兩
狼毒九銖。提淨。同芫花。用醋三碗。

於土器內。煮令乾。炒令色黃。以微黑。色為度
芫花
附子火炮。去皮。桔梗
牛膝

牡丹皮去心
附子火炮。去皮。桔梗
牛膝

白蕪荑
芎
半夏
當歸

川椒
麝香
蜜陀僧
通草各一分

水蛭二十條

右件藥除芫花。狼毒二味。自作一處。杆羅為末。蟲毒水蛭。龜甲三味。
修製了。亦自作一處。杆羅為末。所餘數件藥。修合作一處。杆羅為末。
上件藥盡。修製杆羅了。三處合作一處。相窠令均。每服三錢。空心葱

湯調下
玉瑛百一選方。滿腹內血塊。大慶通監院方

胎上茴香
益智仁
玄胡索
陳橘紅

肉桂
蓮木
川薑各半兩
附子兩。鹽炮。去皮。臍

乳香
沉香
白木
人參

當歸
木香
白芍藥各一兩

右為細末。棗肉為丸。每服六十九。米醋湯吞下。溫酒亦得。

陳自明大全良方沒藥丸。理五積氣癖。及驚悸血積。癥癖血癥。發渴。攻刺疼痛。嘔逆噎塞。心中迷悶。不醒人事。及血鼓癥。癥脹滿。經脈不行者。靈苑方。

芫花。去枝梗。取二兩。用好米醋三升。煮至一升半。去滓不用。以將

醋入石臼內。入研砂霜二兩。已內七粒。搗研。入醋內煎成膏。宿

丸藥用。木香。沒藥。別研。當歸。

桂心。華撥。各一兩。檳榔。一分。肉豆蔻。二枚。地

斑。搗。二枚。去頭足。想。搗。末。炒。令。焦。黃。土。末。研。細。附。子。一。兩。土。用。

右一十二味。除斑。搗。沒藥。餘。為。細。末。與。斑。搗。沒藥。一。處。合。研。令。停。入。前。膏。子。勻。和。搗。千。百。杵。丸。如。赤。豆。大。初。服。一。丸。用。醋。炒。蘿蔔。子。令。焦。

黑。以。酒。浸。同。煎。一。二。沸。就。溫。吞。下。漸。加。至。五。九。七。九。即。止。如。急。卒。血。氣。攻。心。脾。以。酒。醋。共。一。銀。錢。煎。沸。吞。下。婦。人。血。癥。癥。癖。結。塊。攻。心。疼。

痛。悶。絕。久。醫。不。效。者。入。高。除。糧。二。兩。大。煨。醋。焯。七。次。研。細。和。藥。為。丸。每。服。五。九。用。蘇。木。節。二。兩。細。剉。酒。三。升。煎。至。七。合。去。滓。分。為。三。服。吞。

藥。併。進。三。服。當。汗。出。則。癥。隨。大。小。腸。逐。下。其。病。立。瘥。人。弱。者。每。服。只。二。九。如。是。丈。夫。元。氣。小。腸。氣。脾。積。氣。癥。塊。等。疾。即。入。丹。砂。一。兩。細。研。

水藥卷五十四

七

和停。以。生。薑。鹽。湯。吞。下。三。九。

三稜煎。治。婦。人。血。癥。血。癥。食。積。痰。滯。

三稜。莪。朮。各。二。兩。青。橘。皮。去。白。半。夏。

麥。芽。炒。各。一。兩。

右。用。好。醋。六。升。煮。乾。培。為。末。醋。糊。丸。如。梧。桐。子。大。每。服。三。四。十。九。溫。

醋。湯。下。痰。積。多。薑。湯。下。

水府丹。治。婦。人。久。虛。積。冷。經。候。不。行。癥。癥。癥。塊。腹。中。卒。暴。疼。痛。面。有。點。點。薰。黑。癥。瘕。百。病。方。

經。燉。花。蘇。石。研。兩。半。硃。砂。紙。隔。湯。淋。煎。取。膏。半。兩。

桂。心。剉。兩。末。木。香。乾。薑。各。一。兩。縮。砂。仁。二。兩。

紅。豆。半。兩。斑。貓。百。箇。臘。月。狗。膽。七。枚。生。地。黃。汁。

童子小便。各一升。玩。青。三。百。箇。斑。貓。玩。青。二。物。並。去。

頭。天。想。以。糯米。一。升。同。炒。分。黃。土。米。不。用。

右。九。味。為。末。同。參。汁。熬。為。膏。和。上。末。丸。如。鷄。頭。大。朱。砂。為。衣。每。服。一。

丸。溫。酒。爵。破。食。前。服。米。飲。亦。可。孕。婦。莫。服。

劉。智。桂。驗。普。濟。加。減。方。摩。挲。丸。治。婦。人。諸。積。滯。血。塊。血。閉。疼。痛。

永樂大典

卷一四九四八

珊瑚砂

珊瑚砂

粉霜

砒霜

赤頭胡

元菁

水蛭

蘇蘇本三錢。是砂

馮木 好石硃一兩
右丸味同於沙盆內研極細。旋添米醋復研如甜瓜色。再入米醋慢火熬稠。欲驗滴在羊指无血上。其血化為清水是成。至冷調丸如梧子大。每服三丸。至五丸。看老衰少壯。加減丸數服之。

酌聖丹。治婦人血積血塊。血氣。產後諸血滯疼痛寒熱。四肢困倦。腰脚麻沉黃瘦。脾腹火冷。

巴豆二十箇。去皮細研。入鹽醋一盞。熬膏半盞。入沒藥半兩。木蓬莪茂四錢。

右丸如梧桐子大。每服三五丸。紅花酒下三兩服。積滯惡血自過。効空心食前。虛衰婦人。加乾薑一兩。

水通散。治婦人血積血塊。血刺血痛。血癖血癥。

木通 大黃 黑牽牛各一兩
右為末。每服三五錢。蜜酒調下。食前或蜜丸二十丸。梧桐子大。酒下宜取効。

集毒卷萬里會天

劉守真宣明論 紅花丸。治婦人血積聚癥瘕。經絡注滯。

川大黃

紅花各二兩 蘇蘇十箇。土州天

右取大黃七錢。醋熬成膏。和藥丸如梧桐子大。每服五七丸。溫酒下。食後日三服。

李東垣試効方增損四物湯。治婦人血積。

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

廣茂 京三稜 桂 乾漆炒埋出
右件等分為麩末。每服三錢。水二大盞。煎至一盞。去滓。稍熱服。食前。

釋維洪治察方 穿山甲散。治婦人血積血塊。往來刺痛。或經脉欲行之時。腹脇疼痛。或作寒熱。肌肉消瘦。

當歸洗焙

乾漆米醋炒令埋出

穿山甲石灰炒如

既霖經驗良方 枳實積柳丸。治婦人癥瘕癖塊。有似妊子。服此藥安養胎氣。調和經候。血氣通和。寬膈美食。可以久服。

枳實炒

積柳

黃連

黃藥土厚皮

黃芩

當歸

木香

阿膠 蛤粉炒研

已上各半兩

右為末水丸小豆大。溫米飲下三十丸。日三服。艾元英如宜方桃仁丸。如似癥瘕。血積不通。體疼腹痛。宜服。

桃仁集

朴消

大黃 各一兩

蘇毒 半兩 炒合黑

色

右各為末。以好醋二升半。於銀石器內慢火煎至一半。入桃仁。大黃。蘇毒末。不住手攪。却入朴消更攪良久出之。丸如梧桐子大。五更溫酒下五丸。至午取下如赤豆汁。鷄肝等類惡物。

疎元賢醫方集成小三稜煎。治食癥酒癖。血癥氣塊。時發刺痛。及積滯不消。心腹堅脹。痰逆嘔穢。

京三稜

蓬莪朮 各四兩 芫花 一兩

右同入茺瓶內。用米醋五升浸。封瓶口。以灰水煨令乾。却取出。按末。將芫花以餘醋炒令焦培乾。同為末。醋糊丸如菉豆大。每服十五丸。

薑湯桑白皮湯任下

朱當時大方丁香當歸丸。治血氣十生丸死。腹中作塊。不問久新。

朱當時大方丁香當歸丸

元

當歸

牡丹皮

母丁香

紅花

桂子 分

右為細末。麩糊丸如梧桐子大。每服三十丸。空心溫酒調下。不過十服立効。

永樂大典卷之一萬四千九百四十八