

硫化剝亞斯 四勺 温湯 三十瓦

右調勻為浴湯

○方 主治捩挫

硝砂 一匙 泉水 六勺

醋 一勺 阿芙蓉丁幾 一匙

右溶和蘸布片貼于患部

○方 可 主治關節水腫、捩挫及強直

沃實丁幾 半勺

右以毛筆塗擦于患部至發泡

○龍腦醋 主治捩挫及脫臼

龍腦 二匙 亞刺比亞末 二匙

醋 半勺 蒸餾水 五勺

右先取前二味研和加後二味外用

○的列並鹼 主治關節強直關節滲出物

斯巴尼石鹼 各三勺 的列並油 各三勺

炭酸加里 四匙

右調和以水十二倍溶解為外用劑

○拔爾撒謨鹼 主治同前

斯巴尼石鹼 五勺 銳烈燒酒 二匙

龍腦 一勺 迷迭香油 半勺

右調和

熱病

刺衝熱

○重炭酸加里飲 丹方出 于風濕

○里歇利氏飲料

炭酸加里 二錢

拘櫟汁 適宜飽 和為度

蒸餾水 二錢

覆盆子舍利別 一錢

右調勻、每二時服、二食匕

○拘櫟酸加里飲 越 主治熱性諸病

拘櫟絞汁 一錢

炭酸利亞斯 二錢

水 十二錢

白糖 半錢

右調勻、為飲劑

○攝度律篤散 丹方出 于丸血

○鹽製解熱飲 丹 主治熱証、兼惡心者

重炭酸曹達 二十錢

老利兒水 十密

拘櫟油糖 一錢

水 二錢

右調勻、每一時、或每六時、取一劑、加拘櫟汁

一食匕、或拘櫟酸十八錢、乘沸騰服之

○英國曹達散 主治熱性諸症

酒石酸 十錢

重炭酸曹達 十五錢

右各別、以水二錢、溶解、臨用混和、乘沸騰、頓

服、日數次、或方中、加白糖、及拘櫟油一二滴、

調味

○辛溫吐劑 獨 舌上污苦、惡心嘔噦者

吐根末

炭酸安沒尼 各二十錢

複方刺賢堙兒丁幾 一錢 水二錢

右調勻、頓服、後服野菊花浸一盞

○常用黑飲 丹 舌上污苔、腹肚緊脹、而便秘者

瀉利塩 百二十錢

滿那 百六十錢

旃那丁幾 二錢

幾那浸 一錢半

右調勻、早朝、頓服

○芒硝蒲公英飲 方出 腫癆 主治同前

○大黃麻瘋濕火劑 丹 主治同前

炭酸麻瘋濕火 百二 十八 大黃末 六十 十八

芳香散 四十八 薄荷水 八十

吐根酒 二錢

右調勻、每朝服三食匕

○方 越 主治同前

答麻林皮 六錢 旃那葉 半斤

右先取前味水煎、加後味浸出、取液十二寸、

每二時服一食匕、或劑中加芒硝、或瀉利塩

一弓

○酒石飲 丹 主治熱症、便秘、而大渴者

純精酒石 一弓 枸橼油 十五錢

白糖 二弓 熱湯 二巴

右調勻、冷定、為飲劑

○鹽製下劑 丹 方出 主治兼便秘、及肝充血者

越的兒安沒尼水 丹 諸般熱病及炎証初起

硝石 三十八 至 六十 十八 甘硝石精 三錢

民埕列里精 十二 竜腦水 八十

右調勻、每服六分劑、一日三四次

○安沒尼清涼飲 丹 主治熱病初期

民埕列里精 十錢 硝砂香鼠精 三錢

枸橼舍利別 六錢 水 八十

右調勻、每四時服六分之一

○吐根罌粟殼糖煉 丹 小兒熱病初期

吐根酒 二錢 罌粟舍利別 三錢

民埕列里精 四錢 甘硝石精 一錢

水 二弓

右調勻、每二時服一茶匕

○方 越 主治煩渴惡心者

枸橼酸 一刃至半刃 水 十二寸

枸橼油 二滴 白糖 半寸

右調勻為飲劑

○方 越 主治同前

枸橼絞汁 半寸或拘水 十二寸
白糖 半寸 枸橼油 一二滴

右調勻為飲劑

○方 越 主治同前

醋 一匙至半寸 或
醇醋酸 半寸
白糖 半寸 或 舍
利別 一寸

右調勻為飲劑

○方 主治同前

酒石酸 一匙 覆盆子舍利別 一寸

覆盆子水 五寸

右調勻每二時服一食匕

○硝酸里沒奈埕 越 主治諸熱証

稀硝酸 半匙至一匙 水 十二寸

舍利別 或蜂密一寸或白糖半寸

右調勻每二時服一二食匕

○皇水里沒奈埕 越 舌上污苔食機缺之者

皇水 半匙至二刃 水 十二寸

單舍利別 一寸或白糖半寸

右調勻每一時服一二食匕

○方

稀硫酸 一匙至二匙 沙列布煎 六寸

覆盆子舍利別 一寸至一寸半

右調勻每二時服一食匕

○方 沙

華氏酸味越栗失兒 三匙

覆盆子舍利別 一寸

右調勻、每日取一二茶匙、冷水一匕和服

○安波尼攝爾扁答劑每 稽留熱退期

炭酸安波尼三十 格羅兒曹達水 一匙

攝爾扁答里浸八

右調勻、每六時服六分劑之一

○刺衝灌腸方越 主治熱証兼便秘者

瀉利塩 一匙 水 十二匙

護謨 半匙 扁桃油 或橄欖油 一匙

右調勻為灌腸劑

第扶斯

○鹽製里汶奈埕

格羅兒曹胃母二百 格羅兒剝亞斯二百四

酒酸曹達百八 燐酸曹達五十

枸椽搾汁六 枸椽舍利別十四

水七巴

右調勻

○酸性幾那合劑丹方由于紫斑証腫

傷關節炎及痛腫

○燐酸里汶奈埕越 主治疫狀諸熱

燐酸 一匙至 水 十二匙

蜂蜜 一匙半 或舍利別

右調勻為飲劑

○方糖 主治第扶斯初期及發黃熱

稀鹽酸 一匙至 蜀葵根煎 或水 八匙

覆盆子舍利別 一匙 或單舍利別

右調勻、每二時服一食匕

○鹽酸飲丹 稀鹽酸 二匙至 蜂蜜 一匙

大麥煎 一巴

右調勻為飲料

○又方 [丹]

稀鹽酸 二錢

鹽酸加里 百八十八

薑舍利別 一錢

大麥水 二巴

右調勻為飲料

○鹽酸越的兒飲 [丹] 主治呼氣有惡臭者

稀鹽酸 一錢

越的兒精 三錢

橙皮舍利別 六錢

橙皮浸 八錢

右調勻每六時服六分之一

○方 [丹] 主治弟扶斯

鹽酸加里 百二十八 里沒奈埕 或大麥水 一二巴

右調勻為飲料一日盡之

○方 [越] 主治弟扶斯壞疽水瀉

鹽酸加里 半錢至 一錢 水 八錢

右調勻每服一食匕一日用

○方 [越] 主治弟扶斯

格羅倪水 一錢至 二錢 水 八錢

右調勻每一時服一食匕

○方 [越] 主治熱症每便秘者

磷酸曹達 半錢至 一錢 水 四錢

右溶解

○方 [越] 主治小兒熱病

磷酸曹達 一錢 單舍利別 半錢

水 二錢

右溶解

○亞硫酸規尼劑 [丹] 方出 膿毒証

○方 [斯] 主治弟扶斯等

硫酸規尼 三錢至 六錢 稀硫酸 三滴

橙皮舍利別 四錢 蒸餾水 三錢至 四錢

右調勻每一時服一食匕

○方 小兒弟扶斯

硫酸規尼 六分 蜀葵根末 一分

右加單舍利別適宜為十二丸

○亞鈿幾那油質劑 神經過敏便秘者

皓攀 十二分至 廿油 十二分

複方幾那丁幾 一弓 薄荷水 八弓

右調勻每服六分劑一日三次

○方 主治小兒熱症

聖古尼涅 四分 甘草末 半分

右為散分八服每一時一服

○規尼鐵劑 每方出 主治衰弱者

○方 主治譫妄

阿芙蓉丁幾 一匙

右每夜服十五滴至二十滴

○方 主治弟扶斯發大譫妄者

阿芙蓉 一分 白糖 十分

右為散製劑四個夜間服一二劑

○方 主治譫妄劇烈而不眠者

鹽酸莫爾非 四分 白糖 半分

右為散製劑四個每夜服一二劑

○方 主治虛性熱兼不寐者

呀羅防精 六匙 武蘭寶鷄卵飲 八弓

右調勻每六時服六分之一

○鹽酸曹達水 虛性熱虛脫甚者

哈羅酸曹達水 一匙 複方幾那丁幾 六匙

武蘭寶 十二弓 羌菁丁幾 四十滴

水 八弓

右調勻每三四時服六分之一

○越的兒武蘭寶飲 主治熱病恢復期

越的兒精 三匙 武蘭寶 十二匙

黃幾那浸 八勺

右調勻、每四時、或每六時、服六分之一

○方 瀉 主治弟扶斯、虛脫者

亞爾尼加華 一匙浸出 取液八勺 單舍利別 一勺

右調勻、每一時服一食匕

○方 瀉 主治同前

亞爾尼加華 二匙浸出 取液五勺 忽氏鎮痛液 二匙

薄荷舍利別 二匙

右調勻、每二時、服一食匕

○方 瀉 主治同前

纈草根

亞爾尼加華 各一匙

右浸出、取液五勺、加桂皮舍利別半勺、每二

時、服一食匕

○方 瀉 主治同前

攝爾扁答

二匙浸出 取液六勺

龍腦 三勺至 十勺

越的兒 一匙

越的兒 一匙

橙皮舍利別 半勺

右調勻、每二時服一匙

○方 瀉 主治同前

龍腦 十勺

護謨末 一匙

甘扁桃乳 八勺

右調勻、每二時、服二食匕

○方 瀉 主治疫後、虛脫

麝香 半匙

甘草膏 二匙

右為二十九、每二時、服一丸、至二丸

○方 瀉 主治弟扶斯、有虛脫、痙攣、及粘汗者

麝香 六勺至 十二勺

龍腦 四勺至 六勺

白糖 一匙

右為散、分六服、每二時、或每三時、一服

○方 瀉 主治同前

炭酸安沒尼 一匙

甘草膏 二勺

右為十五丸每二時服一丸至二丸

○枸橼酸鐵加里劑 再方出 恢復期有惡心及消化不良者

○方 主治第扶斯、恢復期、元氣衰乏者

幾那皮 半勺 忽弗滿鎮痛液 半匙

桂舍利別 半勺

右先取幾那皮加水適宜煮四時、濾過、取液四勺、加後二味、每三時服一食匕

○方 獨 主治同前

燐 半勺 甘扁挑油 二匙

護謨漿 二勺

右先取前二味、丁寧混和、令溶解、加後味、每二時服一茶匕

○方 再 肌熱、熾盛者

醋 一分 冷水 二分或三分

右蘸布片、或海綿、洗滌全身

○方 五 主治眠瘡

單寧酸鉛 半勺 家猪脂 或單軟膏

右為軟膏

○方 六 主治同前

龍腦 半匙至一匙 護謨漿 二勺

右調勻、蘸撒系、施用

○方 獨 主治同前

龍腦 二八 阿列機油 一勺

右為塗擦劑

○赤石脂鉛膏 再 預防毒瘡、凡治之

赤石脂 金密陀 各三十八

竜腦 五八 黄蠟 百八十八

家猪脂 三百六十八

右煉和攤厚布貼于患部

○方^{〔鈴〕}越有口內及咽喉証者

鹽酸加里 一匙 蒸餾水 一匙

右調勻為含嗽劑

○方^{〔瀝〕}主治小兒第扶斯

鈴糖 十二分 醇醋 二十四滴

蒸餾水 六分

右調勻為外用劑

○斯密篤氏薰法 撲滅病室之傳染毒

硝石 一匙 醇硫酸 二匙

右調勻

○方^{〔務〕}主治同前

不清石炭酸 二巴 水 四瓦

右撒灌于病室圍中及溝渠等

○格羅兒瓦斯方^{〔丹〕}

食塩 一分 過酸滿掩 一分

右研和入磁器注硫酸二分和水二分者以

玻璃搥攪和令蒸昇格羅兒瓦斯

○過酸滿掩加里清氣方

罕埕氏液 一酒盞 單水 或塩水 二巴

右溶和注于便器

○昆爾涅篤氏傳染預防水

格羅兒亞鉛 五瓦 蒸餾水 一匙

右溶和取此液一瓦和水二巴蘸布帛一大

片拭于病室或注之于便器

腸第扶斯

○方^{〔列〕}

甘汞 四瓦八瓦至 白糖 四瓦

右為散分八服每二時或每三時一服

○方

甘汞 八瓦 阿芙蓉 二瓦

白糖 四勺

右為散分八服每二時一服

○方 透

青承丸料 十二丸

吐根末

阿芙蓉 各二丸

水適宜

右為十二丸每一時或每二時服一丸

○方 敵 腸疫下利

亞爾尼加根

格綸僕 各二錢

葛私加栗刺 三錢

橙皮舍利別 一錢

右先取前三味注熱湯浸漬取液六勺加後

一味每二時服一食匕

○阿仙藥合劑 丹 方由 主治同前

○沒食吐根散 丹 主治同前

沒食酸 十二丸

挖弗兒散 五丸

右為散每八時或每十二時服一劑

○麻知胡刺答尼飲 丹 主治同前

刺答尼丁幾 十二錢

罌粟舍利別 六錢

麻知胡浸 八勺

右調勻每三四時服一食匕

○硫酸銅阿片丸 丹

硫酸銅

阿片越幾 各四分

竜胆越幾 三丸

右為一丸每服一劑一日三四次

○吉納坎百設劑 丹

吉納丁幾 六錢

吐根酒 二錢

坎百設木煎 八勺

右調勻每服六分劑一日三次

○安沒尼鐵水 丹 主治腸疫

硫酸安沒尼鐵 三十丸至

六十丸 蒸餾水 八勺

右調勻每六時或八時服六分劑一

○方 第扶斯下利
硫酸規尼 六八至十二八
阿芙蓉 一八或明礬末半匙
白糖 一匙

右為散分六包每服一包一日三次
○炭酸蒼鈿劑 每 主治同前
炭酸蒼鈿 一匙
罌粟舍利別 四匙
達刺侃篤漿 四匙
水 八匙

右調勻每六時或八時服六分之一
○方 主治小兒腸疫
沙列布 六八水煎
番木鱉越幾 一八
舍電阿芙蓉液 六滴

右調勻每一時服一琶布七
○方 主治同前
蒸餾水 一匙
硝酸銀晶 半八
阿芙蓉丁幾 八滴
橙皮舍利別 三匙

右調勻每二時服一琶布七

○方 主治腸疫
明礬 五八
乳糖 半八

右為散分十二服每一時一服
○方 主治同前
明礬 六八至十二八
阿芙蓉 二八

龍腦 六八至九八
白糖 一匙

右為散分六服每一時一服
○收斂灌腸法 每
的列並油 三十滴
吉納丁幾 二匙

阿芙蓉液 十滴至二十滴
澱粉漿 二匙

右調勻為灌腸劑日二三次
○又方 主治同前
硝酸蒼鈿 二十八
阿仙藥丁幾 一匙

鹽酸莫爾非水 三十
澱粉漿 一匙

右調勻、每十二時、取一劑、注于腸內

○方 掃 主治同前

硝酸銀 二八至四八 蒸餾水 四勺

右為灌腸劑

間歇熱

○方 越 主治間歇熱、及寒熱往來、諸症

硫酸規尼 二十八 甘草膏 一刃

蒲公英越幾 或蘆根越幾 適宜

右為二十九、每服三丸、至五丸、日四次、免熱時間、用

○方 斲

規尼 六八至十二八 橙皮油糖 十八

右為散、製劑三個

○方 提 主治既單用規尼、而無効者

硫酸規尼 五八 阿芙蓉 半八

白糖 五八

右為散、日服三劑

○方 瀝 主治間歇熱

硫酸規尼 十五八 蒸餾水 四勺

硫酸 三滴至五滴 橙皮舍利別 一勺

右調勻、三四分服

○方 匳 主治同前

硫酸規尼 二十八 硫酸私的列幾尼 一八

白糖 一匙

右為散、分二十服、日二服、至三服

○方 暴 主治小兒間歇熱

硫酸規尼 八八 單舍利別 四勺

右調勻、每二時、服一茶匕

○方 登

硫酸規尼 五八

規餒實涅 一戈

亞爾箇兒 一弓

右調勻、每服五十滴、日四次、白糖和服

○方 登

蒸餾水 三弓

硫酸規尼 四八至六八

酒石酸 半戈

右調勻、三四分服

○規尼鐵劑 丹方出于紫班病

○方 彌 主治頑固間歇熱

砒酸規尼 半八

甘草膏 二刃

右為二十丸、日服二丸、至四丸

○方 越 主治同前

福烏列兒氏砒酸溶液

右每服十滴、十二滴、至二十滴、日二三次或

每四分時、服二滴、至發頭痛、惡心等、而止、後服、三日後、再服如初、或每服二滴、日三次

○方 彌 主治同前

福烏列兒水 五滴至十滴 薄荷水 二弓

右調勻、頓服、或二回、分服

○方 權 主治同前

福烏列兒水 三十滴 阿芙蓉丁幾 半戈

蒸餾水 三弓 單舍利別 半弓

右調勻、每服一食匕、日三次

○方 焉 主治同前

幾那皮 三戈水煎 福烏列兒水 半戈
取液五弓

舍電阿芙蓉液 一戈 覆盆子舍利別 一弓

右調勻、每三時、服二食匕

○方 丹 主治同前

砒石液 三密至九密

忽布丁幾 三十密

枯失亞浸 一弓

右調勻、每服一劑、日三次

○必兒宋氏液ビールソン 主治同前

砒酸曹達 一丸 蒸餾水 一匙

右溶和、每服四滴、至十滴、或至二十滴

○方愚 主治同前

白砒石 一丸 炭酸安沒尼 四十丸

竜胆末 一匙 甘草末 一刃

右為散、分六包、發熱前、服一包

○溴素加里劑丹

溴素加里 二十丸至四十丸 龍腦水 三弓

右調勻、臨卧頓服

○撒里失涅劑丹 主治胃弱家不堪規尼者

撒里失涅 百二十丸 甘油 一弓

○橙皮丁幾 三弓

右調勻、朝夕各取一茶匕、水一盞和服

○方鳥 主治同前

撒里失涅 半匙 竜胆末 一匙

黑椒末 半弓 野菊花越幾 適宜

右為百丸、每三時服六丸、至八九丸

○方鈴 主治同前

單尼酸聖古尼 半匙 白糖 一刃

右研和、分三服、日三四、三服

○方丹 主治間歇熱、及間歇性神經痛

硫酸別別里涅 三十丸 芳香硫酸 四十密

橙皮舍利別 一弓 橙花水 八弓

右調勻、每服六分劑之一、日三次

○方鳥 主治間歇熱

硫酸別別里涅 二刃 稀硫酸 二十六滴

單舍利別 橙皮丁幾 各一弓

蒸餾水 四勺

右調勻每服一食匕日三四次

○方[蜀]

規餒實涅 一匙

阿芙蓉 一丸

菖蒲油糖 半勺

右為散分十二服每二三時一服

○刺埕末歌兒氏解熱丁幾

規餒實涅 一匙

硫酸規尼 十八

銳烈燒酒 二勺

右調勻每服五十滴白糖和服日四次

○方[塔]

必百里涅 六八至十八八

橙皮油糖 一匙

右為散分六服日三服

○方[爾] 主治不整熱証兼虛脫者

攝爾扁答根

二匙浸出液六勺

橙皮舍利別 一勺

右調勻每一時服一食匕

○方[寫] 主治間歇熱

黃幾那末 半勺

菖蒲根末

黑椒末 各一刃

過泥子 半匙

右為散分十六服每三時一服

○方[寫] 主治同前

鱗 四八

的列並油 半勺

丁香油 或水楊梅油十五滴

右丁寧溶和每服取八滴至十六滴燕麥煎

汁和服日三四次

○伍爾涅乙氏解熱越的兒 主治頑固瘧疾

鱗 一丸

的列並油

亞爾箇兒 各一匙

水楊梅油 十滴

右先取前三味丁寧溶和加後味每服取十

五滴葡萄酒一盞和服日三次

○方〔發〕 主治間歇熱

龍腦 一丸半
至二丸

護謨 二錢半

白糖 一錢

右為散分三服每發作前一服

○方〔發〕

香水蠶丁幾

右每服三滴至四滴一日五六次

○方〔發〕

硝酸銀 三丸

蒸餾水 六錢

右調勻每服一茶匕日二三次

○方〔發〕

青酸鍊 一丸

白糖 十丸

右為散分六服免熱時中用

○皓礬阿芙蓉丸〔烏〕 主治瘡疾及癩癩

皓礬

桂皮末 各二十
四丸

阿芙蓉 三丸

蒲公英越幾 適宜

右為二十四丸每服一丸日三次

○方〔訶〕 主治間歇熱

硫酸規尼 十二丸

鷄子黃 一個

菖蒲根浸 八錢

舍電阿芙蓉液 十二滴

右調勻為灌腸劑

○方〔敵〕 主治瘡疾

幾那皮 半錢煎取
四錢之液

鷄子黃 一個

幾那末 三錢

舍電阿芙蓉液 十二滴

右調勻為灌腸劑

○規尼注入水〔丑〕 主治間歇熱等

硫酸規尼 六十
四丸

稀硫酸 十密

蒸餾水 四錢

右丁寧溶和每次取十五密至半錢即四
至八丸

注入于皮下施此法三四次乃可得効

○又方越 主治同前

鹽酸規尼 或醋酸規尼或纈草酸規尼

鹽酸 一滴 蒸餾水 二十五滴或

右溶和注射皮下、日數次

○方丹 主治頑固瘡疾

白砒石 四分 蒸餾水 一分

右溶和取三密注射于皮下、日一次、第四日
後、日二次、第十二日後、每次取五密

發疹熱

痘瘡

○攝度律篤散 方出 充血 痘瘡初起、灼熱已甚者

○枸橼酸加里 方出 刺 衝熱 主治同前

○常用黑飲 方出 刺 衝熱 主治同前

○病院白飲 丹方出 尿毒 舌上有汚苔而便秘者

○亞爾加里下劑 丹方出 腫瘍 主治同前

○鹽酸加里水 越方出 第扶斯 主治痘瘡及猩紅疹

○格羅兒水 越方出 第扶斯 主治同前

○方搨 主治痘瘡見点期、熱灼太甚者

硫酸曹達 一分 水 三分

稀硫酸 半分

右調勻、每一時服一食匕、至得下

○方登 主治貫膿期、膿熱

枸橼酸 十分 泉水 一斗

枸橼舍利別 一分

右調勻、為飲劑

○方登 主治同前

磷酸 半匙 至 泉水 一斗

覆盆子舍利別 一分

右調勻為飲劑

○菲阿斯竟腦漿 [丹]方出 于癩狂 主治有刺衝過盛及神經諸症者

○莫非飲 [丹]方出 于痘腫 主治同前

○莫非哥囉叻大麻合劑 [丹]方出 于痘腫 主治同前

○方 [燈] 痘毒眼炊衝

昇汞 半人 蒸餾水 二勺

右溶和為點眼水

○方 [麩] 主治同前

硝酸銀 五八至 十人 蒸餾水 一勺

右溶和為點眼水

○方 [糖] 主治角膜炎痘瘡

亞篤魯比涅 一人 蒸餾水 一匙

右溶和點眼中日二次

○方 [糖] 主治面部痘瘡

水銀藍膏 十二分 蜜蠟 五分

滑 三分

右煉和貼面部

○方 [麩] 主治同前

昇汞 二八至 四人 蒸餾水 六勺

右溶和蘸布斤被面部

○方 [燈] 痘漿滿溢者

純沃實謨 一刃 亞爾箇兒 一勺

右溶和以毛筆貼瘡上日一二次

○方 [燈] 主治同前

鹽酸鍊液 一匙 蒸餾水 一勺

右溶和用法如前

麻疹

○方 [糖] 主治麻疹

蜀葵根煎 三勺 吐酒石 三分八

雙鸞菊丁幾 二滴 蒸餾水 一弓

右調勻、每服一茶匕、日三四次

○方 治咳嗽甚者

甘扁桃油 新榨者 泉水 二弓

護謨漿 適宜為乳劑為度 菲阿斯越幾 二弓

扁桃舍利別 一弓

右調勻、為乳劑、每二時、服一茶匕、四歲乃至六歲兒服量

○方 治麻疹

甘扁桃油 亞刺比亞漿 各半弓

蜀葵舍利別 一弓

右調勻、為乳劑、每二時、服一茶匕

○方 治麻疹發見不全者

民埕列里精 一茶匕 接骨木花浸 一碗

右調勻、時々服一劑

○方 治麻疹內陷、或發神經症者

炭酸安浸尼 四至五 龍腦水 三匙

遠志舍利別 半匙

右調勻、每二時、服一匙布匕

猩紅疹

○方 治猩紅疹初起

柿鹽酸 半弓 蒸餾水 四弓

蜀葵舍利別 一弓

右調勻、每四分時、服一匙布匙

○方 治同前

硝石 半匙至 接骨木花水 四弓

民埕列里精 醋蜜 各三匙至

右調勻、每二時、服一匙布匕、至一食匕

○方 痘 猩紅疹預防劑

莫若越幾 一錢 桂露水 半錢

右調勻、一歲兒每服二滴、至三滴、稍長者、至十二滴、日二次

○方 痘 主治同前

莫若越幾 三錢 蒸餾水 一錢

燒酒 少許

右調勻、從患兒年齡、每服數滴、日二次

○方 痘 主治血行亢盛、心悸脈搏、駛疾者

雙鸞菊越幾 一錢 乳糖 一錢

右為散、分十二服、每三四時、一服

○方 酒 主治同前

雙鸞菊丁幾 二滴 蒸餾水 一錢

右每服一茶匙、日三四次

○方 痘 主治猩紅疹

格羅兒水 覆盆子舍利別 各二錢

右調勻、取一食匕、大麥煎一盞、和服

○方 湯 主治同前

攝爾篇答利根 半錢至一錢、沸湯適宜、浸出、取液三錢

桂皮水 橙花舍利別 各二錢

右調勻、每二三時、服一匙布匕

○方 湯 主治虛性猩紅疹

龍腦 三分八之一 護謨末 至一錢

白糖 各六錢

右為散、製劑六個、每二時、服一劑

○方 露 主治同前

炭酸安汶尼 一錢至二錢 蒸餾水 五錢

蜀葵舍利別 一錢

右調勻、每半時、每一時、或每二時、服一茶匙

○苦味安汶尼水 丹 猩紅疹及丹毒後期

炭酸安汶尼 三十八 迷栗薩水 二錢

複方哥羅叻精 一錢 複方益智丁幾 六錢

丁香浸 八錢

右調勻每四時或六時服六分劑一

○幾那安汶尼水 卅方出 于癰疽 主治同前

○鹽酸加里飲 卅 猩紅疹發咽喉炎証者

咯味酸加里 一錢 薩爾撒舍利別 一錢

水一已

右調勻

○方 拔 律 主治咽喉症

玫瑰蜜 一錢 鹽酸 一錢至 二錢

右調勻塗擦咽喉

○方 寬 主治咽喉潰爛者

鹽酸加里 一錢 蒸餾水 一北

右調勻為含嗽劑

○方 括 主治惡性咽喉炎

硝酸銀 一錢 蒸餾水 二錢

右溶和以毛筆貼于咽喉

○方 括 主治同前

食塩 半錢 淨水 五錢

右調勻為含嗽劑

丹毒

○辛温吐劑 獨方出 舌上污苔有惡心者

○方 燈 丹毒初期發熱煩渴太甚者

枸橛汁 二錢 扁桃舍利別 一錢

泉水 一北

右調勻為飲劑

○方 壓 主治同前

重炭酸曹達 半錢 酒石酸 三錢

枸橛油糖 一錢

右為散每服取一茶匕糖水半盞和服一日二三服

○方福 主治輕症丹毒

荅麻林度 二勺

硫酸曹達 半勺

滿那舍利別 一勺

右先取前一味注水十二勺煮取八勺之液加後味每一時服一食匕

○方沙 主治諸急性皮膚疹就中丹毒猩紅疹

硫酸苦土 三勺

接骨木花水 三勺

安質汲酒 一匙

民埕列里精

蜀葵根舍利別 各三

右調勻每二時服一食匕

○方搥 主治同前

硫酸苦土 一勺半

華氏越栗失兒 半匙

覆盆子舍利別 一勺水 四勺

右調勻每二時服一食匕

○方丹 主治發疹熱

薩爾撒舍利別 二勺 油甘 一勺

大麥水 九勺

右調勻每服二食匕日數次

○方丹 主治慢性毒麻丹毒

炭酸麻偶涅失 重炭酸曹達 各十五人

攝爾扁答里浸 一勺半

右調勻每服一劑日二三次

○苦味安汲尼水 方出猩紅疹 丹毒終期

○幾那安汲尼水 方出癰疽 主治同前

○方馬 丹毒後期虛脫者

鹽酸鐵液 二十五滴 高荳水 一勺半

薄荷水 六匙 護謨舍利別 一勺

右調勻每半時服二匕

○方^鈴 主治小兒丹毒

蒸餾水 一弓半 硝石 十八

滿那舍利別 半弓

右調勻、每一時、服一匙布也

○方^鈴 主治丹毒

水銀軟膏 半弓

右塗擦患皮、日二次

○方^搗 主治同前

水銀軟膏 三匙

右調勻、外敷

○方^鈴 主治同前

結列阿曹篤 二匙 家猪脂 一弓半

右為軟膏、每二時、塗擦患部

○方^鈴 主治小兒丹毒

菲阿斯油 二弓 阿芙蓉丁幾 十二滴

右調勻、外用

○方^搗 主治同前

硝酸銀 四弓 稀硝酸 八滴

蒸餾水 半弓

右溶和、以毛筆、貼于患部

○方^搗 主治丹毒

沃實謨丁幾 或過羅順 二匙

右以毛筆、貼患部

○沃度油^透 主治同前

沃度加里 一分 甘油 二分

沃實謨 一分

右溶和、以毛筆、塗擦患部、以毛布、覆之

對症方選卷之一終

版權免許 明治八年十二月八日

白川縣士族

著述
藏版

從六位高橋正純

大阪府箕一大區十七小區
淡路町四丁目六番地寓

大阪心齋橋通南二丁目

松村九兵衛

同 唐物町四丁目

淺井吉兵衛


東京馬喰町二丁目

嶋村利助

西京御幸町姉小路七

藤井孫兵衛

發兌書肆





特57

806

共四本

058707-001-2

特57-806

对症方選

高橋 正純/著

M8

CBC-0251



對症方選
不為

東京府立圖書館
門部
類函
一十棚
四二八五号
LIBRARY

特57

806

共四本