

孫真人千金方卷之三十二

磨二

孫真人備急千金要方卷之三十二 磨三

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

傷寒方

傷寒雜治第一

論方
灸法

論曰凡除熱解毒無過苦酢等物故多用苦

參青箱艾梔子葶藶苦酒烏梅之屬是其要也夫熱盛非苦酢物不解也熱在身中既不時治治之又不用苦酢等藥比如救火不以水也必不可得脫免也

又曰今諸療多用辛甘薑桂人參之屬此皆

貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參
青箱葶藶艾之屬所在盡有除熱解毒最良
勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內
熱者不必按藥次也便以青箱苦參艾苦酒
療之但稍與促其間無不解也

磨二

扁鵲曰病在腠理湯熨之所及病在血脉針
石之所及病在骨髓無可柰何而凡醫治病
或言且待使病成乃頓去之此為妄矣當預
約束家中及所部曲具語解此意使有病者
知之為要

治温氣病欲死方

苦參一兩以酒二升煮取一升盡飲之

當吐則除諸毒病服之覆取汗皆愈

張文

仲及肘後云治熱毒氣死破棺千金湯

苦參湯治熱病五六日已上方

苦參

三兩

黃芩

二兩

生地黃

八兩

右三味呔咀以水八升煎取二升適寒温

服一升日再

凝雪湯治時行毒病七八日熱積聚留中煩

亂欲死起死人搗湯方

芫花一升以水三升煮取一升半漬故
布薄曾上不過三薄熱即除當溫暖四
肢護厥逆也

栝蒌湯治傷寒中風五六日已上但曾中煩
乾嘔方

栝蒌實一枚

磨二

黃芩

甘草各三

生薑四兩

大棗十二枚

柴胡半斤

右六味以水一斗二升煮取五升絞
去滓適寒溫服一升日三

蘆根飲子治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下

食方

生蘆根

切

青竹茹

各一升

粳米

三合

生薑

三兩

右四味以水七升先煮千里鞋底二隻取五升澄清下藥煮取二升半隨便飲不瘥

重作取瘥

治傷寒後嘔噦方

通草

三兩

生蘆根

切一升

橘皮

二兩

粳米

三合

右四味以水五升煮取二升隨便稍

飲不瘥更作取瘥止

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏

麥門冬

半夏各一升

竹葉二把

人參二兩

右五味㕮咀以水一斗煮取六升去滓內

卷二

三

粳米一升米熟湯成飲一升日三服一方

加生薑五兩

此方正是仲景竹葉湯方前有此方仍少

甘草分兩不別

治熱毒攻手足赤腫焮熱疼腫痛欲脫方

煮馬屎若羊屎汁漬之日三度

又方濃煮虎杖根適寒温以漬手足令至踝
上一尺止

又方稻穰灰汁漬之

又方取好酒煮苦參以漬之

又方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳

漏蘆連翹湯治時行熱毒變作赤色癰疽丹
疹毒熱赤腫赤痛生障醫方

漏蘆

連翹

黃芩

麻黃

白朮

升麻

甘草 各一兩

枳實

大黃 各三兩

右九味以水九升煮取三升分三服相去如人行五里久更服熱盛者可加芒

消二兩

猪膽湯治傷寒五六日斑出方

猪膽

苦酒 各三合

雞子 一

右三味合煎三沸強者盡服之羸者須煎六七沸分為二服汗出即愈

治人及六畜時氣熱病豌豆瘡方

濃煮黍穰汁洗之一莖是穉穰即不瘡

瘡若黑者搗蒜封之

又方煮芸薹洗之

治熱病後豌豆瘡方

黃連三兩以水二升煮取八合頓服之

又方真波斯青黛大如棗水服之瘥

唐二

四

又方青木香二兩以水三升煮取一升頓服

之愈

又方若赤黑發如疥大一作疾火者煎羊脂摩傳

之

又方小豆屑雞子白和而傳之

又方以婦人月水帛以拭之

又方小兒著取月水汁和水浴之

又方灸兩手腕硯子骨尖上三壯男左女右

木香湯治瘡煩疼者方

青木香兩二 薰陸香

礬石

丁香各一兩 麝香兩半

右五味呖咀以水四升煮取一升半再服

熱毒盛者加犀角一兩無犀角以升麻代

之病輕者去礬石神驗

又方芒消和猪膽塗上勿動痂落無痕仍卧

黄土末上良此病小便澀有血者內壞瘡皆
黑靨不出膿者死不治也

治內發瘡盛方

酢合四

大猪膽具一

右二味合煎三沸服一合日五服之良

唐二

五

治豌豆瘡初發覺欲作者方

煮大黃五兩服之愈

治時行病發瘡方

取好蜜徧身摩瘡上亦可以蜜煎升麻

摩之并數數食之

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上
不止用此方

牡蠣

二兩半

石膏

一兩六銖

右二味治下篩酒服方寸七日三四亦可
蜜丸如梧子大用治大病瘥後小勞便鼻

衄者

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通方

生烏扇

一斤切

猪脂

一斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄

綿裹之內喉中稍稍咽之取瘥

又方

升麻

芍藥

羚羊角各三兩

通草

四兩

射干

二兩

生蘆根

切升

右六味以水七升煮取二升半分作二服

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

石膏

半升

蜜

一升

右二味以水三升先煮石膏取二升次內蜜復煎取如飴含如棗核許盡復含之大

良

治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛方

大棗二十枚

烏梅十枚

右二味合搗蜜和含如杏核大咽其汁甚
驗矣

禹餘糧湯傷寒服湯藥而下利不止心下痞

唐二

六

堅服瀉心湯竟復以他藥下之利不止醫以
理中與之而利益甚理中治中焦此利在下
焦治之方

禹餘糧

赤石脂

各一斤碎

右二味以水六升煮取二升分三服若不

止當利小便

治傷寒後下利膿血方

阿膠一兩

黃蘗二兩

黃連四兩

梔子十四枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓內

阿膠更煎令消分為三服

甲乙方無黃蘗有黃芩

治赤白下膿小兒得之三日皆死此有膿蟲在下部方

麝香

礬石

巴豆

付子

真珠

雌黃各等分

右六味治合取桑條如箭籛長三寸以綿
纏頭二寸唾濡綿展取藥著綿上內穀道
中半日復易之日再神效

麻黃升麻湯治傷寒六七日其人大下後脉
沈遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿

磨二

七

血泄痢不止為難治者方

麻黃

知母

姜蕤

亦作
菖蒲

黃芩

各三
兩

升麻

芍藥

當歸

乾薑

石膏

茯苓

白朮

桂心

甘草

麥門冬各二兩

右十四味咬咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫次內諸藥煮取三升分服一升

微取汗愈

治溫毒及傷寒內虛外熱攻胃下黃赤汁及

爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱毒方

梔子二七枚

豉一升

薤白一握

右三味以水四升先煮梔子薤白令熟次

內豉煮取二升半分三服頻服取瘥

治病後虛腫方

豉五升

醇酒一斗

右二味煮三沸及熱頓服不耐酒者隨性

覆取汗

治汗不止方

地黄三斤切以水一斗煮取三升分作

三服

又方白朮葉作飲飲之

又方白朮方寸匕以飲服之

治卒得汗不止方

以溫酒服牛羊脂愈

又方服屎亦止

治盜汗及汗無時方

以韭根四十九枚水二升煮一升頓服

之為度

又方豉一升以酒二升漬三日服不瘥更合

唐二

服不過三劑即止

又方死人席緣燒灰煮汁洗身瘥

止汗方

杜仲

牡蠣各等分

右二味治下節臨夜卧以水服五錢也

又方

牡蠣

雷丸

麻黃根

各三兩

乾薑

甘草

米粉

各一兩

右六味治下篩隨汗處粉之

牡蠣散治卧即盜汗風虛頭痛方

牡蠣

白朮

防風

各三兩

右三味治下篩酒服方寸七日二止汗無
出此方一切泄汗服之三日皆愈

孫真人備急千金要方卷之三十二

