

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

農政全書

(九)

徐光啓著

商務印書館發行



農政全書

(九)

著徐光啓

國學基本叢書

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者  
王雲五

商務印書館發行

# 農政全書卷之四十九

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯  
明欽差總理糧餉提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽號因雄鑒定

荒政採用憲王教荒本草

直隸松江府知府穀城方岳賈同鑒

草部 菜可食

山 梗 菜



山梗菜 生鄭州賈峪山山野中。苗高二尺許莖淡紫色葉似桃葉而短小又似柳葉菜葉亦小稍間開淡紫花其葉味甜。

救飢 採嫩葉焯熟淘洗淨油鹽調食。

狗掉尾苗



狗掉尾苗 生南陽府馬鞍山中。苗長二三尺，拖蔓而生。莖方色青，其葉似莧頭菜葉，稍大而尖，角色深綠，紋脉微多。又似狗筋蔓葉，稍間開五瓣，小白花黃心，眾花攢開，其狀如穗葉，味微酸。

救飢 採嫩葉，焯熟水浸去酸味，淘淨，油鹽調食。

石

芥



石芥 生輝縣鴉子口山谷中。苗高一二尺葉似地棠菜葉而闊短。每三葉或五葉擴生一處。開淡黃花。結黑子。苗葉味苦微辣。

救飢 採嫩葉煤熟換水浸去苦味。油鹽調食。

獮耳菜



壅耳菜 生中平野中苗長尺餘莖多枝叉其莖上有細線楞葉似竹葉而短小亦軟又似篇蓄葉卻頗闊大而又尖莖葉俱有微毛開小蝶白花結細灰青子苗葉味甘  
救飢採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

回 回 蒜



回回蒜 一名水胡椒。又名蠍虎草。生水邊下濕地。苗高一尺許。葉似野艾蒿而硬。又甚花  
叉。又似前胡葉頗大。亦多花叉。苗莖稍頭。開五瓣黃花。結穗如初生桑椹子而小。又似初生  
蒼耳實亦小。色青味極辛辣。其葉味甜。

救飢 採葉焯熟換水浸淘澆油鹽調食子可擣爛調菜用。

地槐菜



地槐菜 一名小蟲兒麥。生荒野中。苗高四五寸。葉似石竹子。葉極細短。開小黃白花。結小黑子。其葉味甜。

救飢 採葉煤熟水浸淘淨。油鹽調食。

螺  
麌  
兒



螺麌兒 一名地桑又名痴見草。生荒野中。莖微紅葉似野人莧葉微長窄而尖。開花作赤色。小細穗兒其葉味甘。

救飢 採苗葉燥熟水浸淘去邪味。油鹽調食。  
治病 今人傳說治痢疾。採苗用水煮服甚效。

泥胡菜



泥胡菜 生田野中。苗高一二尺。莖梗繁多。葉似水芥菜葉。頗大。花又甚深。又似風花菜葉。卻比短小。葉中攢萼。分生莖叉。稍間開淡紫花。似刺薺花。苗葉味辣。

救飢 採嫩苗葉。焯熟水浸淘淨。油鹽調食。

兔兒絲



兔兒絲 生田野中。其苗就地拖蔓。節間生葉如指頂大。葉邊似雲頭樣。小黃花。苗葉味甜。  
救飢 採嫩苗葉爛熟水浸淘淨油鹽調食。

老鶴筋



老鶴筋 生田野中。就地掩秧而生。莖微紫色。莖又繁稠。葉似園荽葉而頭不尖。又似野胡蘿蔔葉而短小。葉間開五瓣小黃花。味甜。

救飢 採嫩苗葉焯熟。水浸去邪味。淘洗淨。油鹽調食。

絞股藍



絞股藍 生田野中延蔓而生葉似小藍葉短小軟薄邊有鋸齒又似痢見草葉亦軟淡綠  
五葉攢生一處開小花黃色又有開白花者結子如豌豆大生則青色熟則紫黑色葉味甜  
救飢 採葉焯熟水浸去邪味涎沫淘洗澆油鹽調食。

擗 娘 萩



擗娘蒿 生田野中。苗高二尺許。莖似黃蒿莖。其葉碎小。茸細如針。色頗黃綠。嫩則可食。老則爲柴。苗葉味甜。


救飢 採嫩苗葉。焯熟。換水浸淘去蒿氣。油鹽調食。

雞腸菜



雞腸菜 生南陽府馬鞍山荒野中。苗高二尺許，莖方色紫。其葉對生，葉似菱葉樣而無花  
叉。又似小灰菜葉形樣微圓，開粉紅花，結碗子蒴兒，葉味甜。  
救飢 採苗葉熟水淘淨，油鹽調食。

### 水 胡 蘆 苗



水胡蘆苗 生水邊就地施蔓而生。每節間開四葉，而葉如指頂大。其葉尖上皆作三叉味。  
甜  
救飢 採嫩莖連葉煮熟，水浸淘淨，油鹽調食。

胡 蒼 耳



胡蒼耳 又名回回蒼耳。生田野中。葉似皂莢葉微長大。又似望江南葉而小頗硬。色微淡綠。莖有線樸結實如蒼耳實。但長筍味微苦。

救飢

採嫩苗葉焯熟水浸去苦味。淘淨油鹽調食。

治病

今人傳說治諸般瘡。採葉用好酒熬喫消腫。

水 棘 针 苗



水棘針苗 又名山油子。生田野中。苗高一二尺。莖方四楞。對分莖叉葉亦對生。其葉似荊葉而軟鋸齒尖葉莖葉紫綠開小紫碧花。葉味辛辣微甜。故飢採苗葉熟水淘洗淨。油鹽調食。

沙蓬



沙蓬 又名雞爪菜。生田野中。苗高一尺餘。初就地上蔓生。後分莖叉。其莖有細線楞。葉似獨  
掃葉狹窄而厚。又似石竹子葉亦窄。莖葉稍間結小青子。小如粟粒。其葉味甘。性溫。  
救飢。採苗葉焯熟水浸淘淨。油鹽調食。

麥藍菜




麥藍菜 生田野中。莖葉俱深青色。葉似大藍稍葉而小。頗尖。其葉抱莖對生。每一葉間。

攢生一叉。莖叉稍頭開小肉紅花。結蒴有子。似小桃紅子。苗葉味微苦。

救飢 採嫩苗葉熟。水浸淘淨。油鹽調食。

女 婦 菜



女婆菜 生密縣韶華山山谷中苗高一二尺莖叉相對分生葉似覆旋花葉頗短色微深綠  
捕莖對生稍間出青苔莖開花微吐白葉結實青子如枸杞微小其葉味苦  
救飢 採嫩苗葉燂熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食

## 委陵菜



委陵菜 一名翻白菜。生田野中。苗初揭地生。後分莖。又莖節稠密。上有白毛。葉彷彿類柏葉而極闊大。邊如锯齒形。面青背白。又似雞腿兒葉而卻窄。又類鹿麻葉亦窄。莖葉稍間開五瓣黃花。其葉味苦微辣。

救飢 採苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食。

## 獨行菜



獨行菜 又名麥稈菜。生田野中。科苗高一尺許。葉似水棘針菜。微短小。又似水蘇子。葉亦短小狹窄。作瓦籬樣。稍出細莖。開小紫白花。結小青苔菜。小如菉豆粒。葉味甜。  
救飢 採嫩苗葉燥熟。換水淘淨。油鹽調食。



山蓼 生密縣山野間苗高一二尺葉似芍藥葉而長細窄又似野菊花葉而硬厚文似水  
胡椒葉亦硬開碎瓣白花其葉味微辣。

數飢 採嫩葉熟換水浸去辣氣作成黃色淘洗淨油鹽調食。

葛

公

菜



葛公菜 生密縣韶華山山谷間 苗高二三尺 莖方 密面四棱 對分莖叉葉 方對生 葉似蘇子葉而小 又似莊子葉而大 稍間開粉紅花 結子如小米粒 而茶褐色 其葉味甜微苦 救飢 採葉焯熟水浸去苦味 捲水淘淨油鹽調食

鯽

鱗



鯽魚鱗 生密縣韶華山山野中。苗一二尺。莖方而茶褐色。對分莖叉葉亦對生。葉似雞腸菜葉頗大。又似桔梗葉而微軟薄。葉面微絞繖。稍間開粉紅花。結子如小粟粒。而茶褐色。其葉味甜。

救飢 採葉燥熟水浸淘淨。油鹽調食。

尖刀兒苗




尖刀兒苗 生密縣梁家衝山野中。苗高二三尺。葉似細柳葉。硬而細長而尖。葉皆兩兩拗  
普布莖對葉生。間開淡黃花。結尖角兒。長二寸許。龐如蘿蔔。角中有白穰及小圓黑子。其葉味甘。

救飢 採葉焯熟水淘洗淨。油鹽調食。


珍

珠



珍珠菜 生密縣山野中。苗高二尺許。莖似萬稈。微帶紅色。其葉狀似柳葉而極細小。又似地稍瓜葉頭出穗狀頸鼠尾草穗。開白花。結子小如菜豆粒。黃褐色。葉味苦澀。救飢。採菜熟。撈水浸去澀味。淘淨油鹽調食。

杜當歸



杜當歸 生密縣山野中。其莖圓而有線，葉似山芹菜葉而硬，邊有細鋸齒刺。又似蒼朮葉而大，每三葉叢生一處，開黃花，根似前胡根，又似野胡蘿蔔根。其葉味甜，救飢。採葉，焯水浸成黃色，換水淘洗淨，油鹽調食。治病。今人遇當歸缺以此藥代之。

薔



薔

薔  
音牆  
又名刺薔。今處處有之。生荒野崗嶺間。人家園圃中亦裁科條青色。莖上多刺葉似椒葉而長。鋸齒又細。背頗白。開紅白花。亦有千葉者。味甜淡。

救飢 採芽葉燂熟，換水浸淘淨，油鹽調食。

風

輪

菜



風輪菜 生密縣山野中。苗高二尺餘。方莖四楞色淡綠微白。葉似荏子葉而小。又似威靈仙葉微寬邊有鋸齒。兩葉對生。而葉節間又生子葉極小。四葉相接對生。開淡粉紅花。其葉味苦。

救飢 採葉燂熟水浸去邪味淘洗淨。油鹽調食。

拖

白

練


苗



拖白練苗 生田野中。苗塌地生葉似垂盆草葉而又小葉間開小白花。結細黃子。其葉味甜。

救飢 採苗葉炒熟油鹽調食。

# 酸 桶 筍



酸桶筍 生密縣韶華山。山間邊初發筍葉其後分生莖叉科苗高四五尺莖稈似水葷莖而紅赤色其葉似白槿葉而澁又似山格刺菜葉亦澁紋脉亦澁味甘微酸。  
救飢 採嫩筍葉焯熟水浸去邪味淘淨油鹽調食。

鹿 蕨 菜



鹿蕨菜 生輝縣山野中。苗高一尺許。其葉之莖背圓而面窪。五化切葉似紫香蒿腳葉。而肥闊頗硬。又似胡蘿蔔葉。亦肥硬味甜。

救飢 採苗葉熟水浸淘淨油鹽調食。

—— —— —— —— —— —— —— —— ——



山芹菜 生輝縣山野間苗高一尺餘葉似野蜀葵葉稍大而有五叉又似地牡丹葉亦大葉中攢生莖叉稍結刺毬如鼠粘子刺毬而小開花點白色葉味甘  
救飢 採苗葉爛熟水浸淘淨油鹽調食。

# 金

## 剛



金剛刺 又名老君鬚。生輝縣鴉子口山野間。科條高三四尺。條似刺蘆。音梅花條。其上多刺。葉似牛尾菜葉。又似龍鬚菜葉。比此二葉俱大。葉間生細絲蔓。其葉味甘。救飢。採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食。

柳

菜



柳葉菜 生中半荒野中。科苗高二尺餘，莖似蒿莖，葉似柳葉而短，掃莖而生，開小白花，銀褐色心，其葉味微辛。

救飢 採嫩葉燥熟水浸淘淨油鹽調食。



大蓬蒿 生富縣山野中 草似黃蒿葉色微帶紫葉似山芥菜葉而長大極多花叉又似風  
花菜葉亦多又似漏蘆葉卻微短開碎瓣黃花苗葉味苦  
救飢 採葉焯熟水浸淘去苦味油鹽調食。

狗

蔓

筋



狗筋蔓 生中牟縣沙崗間。小科就地拖蔓。生葉似狗掉尾葉而短小。又似月芽菜葉微尖  
鞘而軟亦多紋脈。兩葉對生。稍間開白花。其葉味苦。

救飢 採葉焯水浸淘去苦味油鹽調食。

農政全書卷之四十九 終

1  
t  
r  
J  
s  
t  
t  
t  
t  
t  
t  
t  
t  
t  
t

---

# 農政全書卷之五十

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯  
明欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫順天等處地方都察院右僉都御史東陽張國祚鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政

救荒本草草部○葉可食

花

蒿



花蒿 生荒野中。苗葉就地叢生。葉長三四寸。四散分垂。葉似獨掃葉而長硬。其頭頗齊。微有毛。滋味微辛。

救飢 採葉焯熟。水浸淘淨。油鹽調食。



兔兒傘 生萊陽塔兒山荒野中。其苗高二三尺許。每科初生一莖。莖端生葉一層。有七八葉。每葉分作四叉。排生如傘蓋狀。故以爲名。後於葉間攢生莖叉。上開淡紅白花。根似牛膝而疎短。味苦微辛。

救飢 採嫩葉焯熟。換水浸淘去苦味。油鹽調食。

地

花

菜



地花菜 又名墓頭灰。生密縣山野中。苗高尺餘。葉似野菊花葉而窄細。又似鼠尾草葉亦瘦  
細。稍葉間開五瓣小黃花。其葉味微苦。

救飢 採葉燂熟水浸淘洗淨油鹽調食。




杓兒菜 生密縣山野中苗高一二尺葉類狗掉尾葉而窄頗長黑綠色微有毛濁又似耐驚  
菜葉而小軟薄稍葉更小開碎瓣淡黃白花其葉味苦。  
救飢 採葉焯熟水浸去苦味淘洗潑油鹽調食。

佛

指

甲



佛指甲 生密縣山谷中。科苗高一二尺。莖微帶赤黃色。其葉淡綠。背皆微帶白色。葉如長匙頭樣。似黑豆葉而微寬。又似鶩兒腸葉甚大。皆兩葉對生。開黃花。結實形如連翹微小。中有黑子。小如粟粒。其葉味甜。

救飢 採嫩葉燥熟。換水淘洗淨。油鹽調食。

虎尾草



虎尾草 生密縣山谷中。科苗高三二尺。莖圓葉頗似柳葉而瘦短。又似兔兒尾葉亦瘦窄。又似黃精葉頗軟。捕草揀生味甜微苦。

救飢 採苗葉燥熟，換水淘去澆味油鹽調食。

野

蜀

葵



野蜀葵

生荒野中就地叢生苗高五寸許葉似葛勒子秧葉而厚大又似地牡丹葉味辣

救飢

採嫩葉燥熟水浸淘淨油鹽調食



葛

蛇

蛇葡萄 生荒野中。拖蔓而生。葉似菊葉而小。花又繁碎。又似前胡葉亦細。莖葉間開五瓣。小銀褐色。結子如豌豆大。生青熟則紅色。苗葉味甜。  
救飢 採葉燥熟。換水浸淘淨。油鹽調食。

星

宿 菜



星宿菜 生田野中。作小科苗生葉似石竹子葉而細小。又似米布袋葉微長。稍上開五瓣。

小尖白花苗葉味甜。

救飢 採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食。

水


蓑

衣



水  
蓑  
衣  
生水泊邊葉似地稍瓜葉而窄側音每葉間皆結小青荳笑音骨其葉味苦。  
救飢  
採苗葉燥熟水浸淘去苦味油鹽調食

牛 媚 菜



牛媚菜 出輝縣山野中。拖藤蔓而生。葉似牛皮硝葉而大。又似馬兜鈴葉極大。葉皆對節。生。稍間開青白小花。其葉味甜。救飢。採嫩苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食。

小蟲兒臥單



小蟲兒臥單 一名鐵線草 生田野中 苗場地生葉似星宿葉而極小又似雞眼草葉亦小。其莖色紅開小紅花 苗味甜 救飢 採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

兔兒尾苗



兔兒尾苗 生田野中。苗高一二尺。葉似水藻葉而短。其目大。其葉味酸。  
救飢。採嫩葉。焯熟。水浸淘淨。油鹽調食。

地錦苗



地錦苗 生田野中。小科苗高五七寸。莖葉似圓菱。葉間開紫花。結小角兒。苗葉味苦。  
拔飢採苗葉熟水浸淘淨油鹽調食。

# 野西瓜苗



野西瓜苗 俗名禿漢頭生田野中。苗高一尺許葉似家西瓜葉而小頗硬葉間生穗開五瓣  
銀褐色紫心黃葉花紫作蒴果內結實如棟子大苗葉味微苦  
救飢 採嫩苗葉煤熟水浸去邪味淘過油鹽調食  
治病 今人傳說採苗搗爛瘡癩拔毒

香 茶 菜



香茶菜 生田野中。莖方直切。面四楞葉似薄荷葉微大。捕莖稍頭出穗開粉紫花。結蒴。音如蕎麥莢而微小。葉味苦。

救飢 採葉焯熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食。

透

骨

草



透骨草 一名天芝麻。生中半荒野中。苗高三四尺。莖方窓面四楞。其莖脚紫對節分生莖叉。

葉似蘭蒿葉而多花。又葉皆對生。莖節間擴開粉紅花。結子似胡麻子。葉味苦。

救飢 採嫩苗葉燂熟水浸去苦味。淘淨油鹽調食。

治病 今人傳說採苗搗傅腫毒。

毛女兒菜



毛女兒菜 生南陽府馬鞍山中。苗高一尺許。葉似綿系菜葉而微尖。又似免兒尾葉而小。莖葉皆有白毛。稍間開淡黃花。如大黍粒。數十顆攢成一穗。味甘酸。

救飢 採苗葉焯熟水浸淘淨。油鹽調食。或拌米麵蒸食亦可。

# 牻牛兒苗



牻牛兒苗音屬又名牻牛兒苗。生田野中。就地拖秧而生。莖蔓細弱。其莖紅紫色。葉似蕓荽葉。瘦細而稀疎。開五瓣小紫花。結青苔葵音音兒。上有一嘴切即甚尖銳。音追如細錐音子狀。小兒取以爲鬪戲。葉味微苦。

救餓採葉燂熟水浸去苦味淘淨油鹽調食。



箒


鐵

鐵掃箒 生荒野中就地叢生。一本二三十莖，苗高三四尺。葉似苜蓿葉而細長，又似細葉胡枝子，葉亦短小，開小白花，其葉味苦。  
救飢 採嫩苗葉，燂熟，換水浸去苦味，油鹽調食。

山

小

菜



山小菜 生密縣山野中。科苗高二尺餘。就地叢生。葉似酸漿子葉而窄小。面有細紋。脉邊有鋸齒。色深綠。又似桔梗葉。頗長鈍。味苦。

救飢 採葉焯熟。水浸淘去苦味。油鹽調食。

羊角

角

菜



羊角菜 又名羊蹄科亦名合鉢兒俗名婆婆針扎兒又名細絲藤一名過路黃生田野下濕地中拖藤蔓而生莖色青白葉似馬兜鈴葉而長大又似山藥葉亦長大而青背頗白皆兩葉相對生莖葉折之俱有白汁出葉間出蒴開五瓣小白花結角似羊角狀中有白穰其葉味甘微苦。

救飢 採嫩葉焯熟換水浸去苦味邪氣淘淨油鹽調食。

糲

斗

菜



糲斗菜 生輝縣太行山山野中小科苗就地叢生。苗高一尺許莖梗細弱葉似牡丹葉而小其頭頗圓味甜。

救飢 採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食。

甌

菜



甌某 生輝縣山野中就地作小科苗生莖叉葉似山蕪菜葉而有鋸齒又似山小菜葉其鋸齒比之却小味甜。

救飢 採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食。

變

豆

菜



變豆菜 生輝縣太行山山野中。其苗葉初作地攤科生，葉似地牡丹葉極大。五花叉鋸齒尖。  
其後葉中分生莖叉。稍葉頗小。上開白花。其葉味甘。

救飢 採葉燂熟，作成黃色。撈水淘淨。油鹽調食。

和尚菜



和尚菜 田野處處有之初生掘地布葉葉似野天茄兒葉而大背微紅紫色後擴苗高二三尺葉似蕷蓬葉短小而尖又似紅落葵葉而色不紅結子如灰菜子葉味辛酸微醸  
救飢 採嫩葉燥熟換水浸去邪味淘淨油鹽調食或晒乾燥食亦可或云不可多食火食  
令人面腫

農政全書卷之五十一

明特選光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯  
明欽天總理糧餉提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張同鑑鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貞同鑒

荒政

救荒本草

草部○根可食



沙參 一名知母 一名苦心 一名志取

名虎鬚 一名白參 一名識美 一名文希生

河內川谷及陝西般陽續山并淄濟潞隨

歸州而江淮荆湖州郡皆有之輝縣太行山邊亦有之苗長一二尺叢生崖坡間葉似枸杞葉微長而有叉牙鋸齒開紫花根如葵根赤黃色中正白實者佳味微苦性微寒無毒惡防已反藜蘆又有杏葉沙參及細葉沙參氣味與此相類但

醫經內不曾該載此二種葉苗形客求敢併入本條今皆另條開載

掘根浸洗極淨換水煮去苦味再以火煮熟熱食之

救荒

百 合



百合 一名重箱。一名摩羅。一名中逢花。一名強瞿。生荊州山谷今處處有之。苗高數尺。幹直如箭。面有葉如鷄距。又似大柳葉而寬青色稀疏。葉近莖微紫。莖端碧白。開淡黃白花。如石榴嘴而大四垂向下。覆長蕊花心有檀色。每一顆須五六花子。色圓如梧桐子。生於枝葉間。每葉一子。不在花中。此又異也。根色白。形如松子殼。四面橫生。中間出苗。又如葫蘆重疊。生二三十用。

根飴 捏根煮熟食之甚益人氣又云蒸過與蜜食之或爲粉尤佳  
元扈先生曰。嘗過拔本嘉蔬不必救荒。

萎  
蕤



萎蕤 本草一名女萎。一名莢。一名玉竹。一名馬薰。生太山山谷及舒州滁州均州今南陽府馬鞍山亦有。苗高一二尺莖斑葉似竹葉潤短而肥厚。葉尖處有黃點又似百合葉却頗窄小。葉下結青子如椒粒大。其根似黃精而小異。節上有鬚味甘性平無毒。

救飢 採根換水煮熟食之。



冬

門

天

天門冬 俗名萬歲藤 又名婆羅樹 本草一名頓勒 或名地門冬 或名筵門冬 或名蘿棘 或名  
涅羊食 或名晉松生奉高山谷及建州漢州今處處有之春生藤蔓大如敍股長至丈餘延附  
草木上葉如荀香極尖細而薄滑有逆刺亦有緣而無刺者其葉如絲杉而細散皆  
名天門冬夏生白花亦有黃花及紫花者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白  
或黃紫色大如手葛長二三寸大者爲勝其生高者根短味甜氣香者上其生水倒下地者葉  
細似蘿而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服味甘性平大寒無毒  
追去地黃及貝母爲之使畏曾青服天門冬誤食經魚中毒浮萍解之  
救亂 採根換水浸去邪味去心煮食或晒乾煮熟入蜜食

# 章柳根



## 章柳根

本草一名商陸一名蕷根一名夜呼一名白昌一名當陸一名章陸爾雅則謂之遂廣雅則謂之馬尾亦謂之莧陸生咸陽川谷今處處有之苗高三四尺幹龜似鵝冠花幹微有

線棕色微紫赤葉青如牛舌微圓而長根如人形者有神亦有赤白二種花亦根亦赤花白根苗葉絕相類不可用須細辨之赤者不堪服食傷人乃至崩血不已白者堪服食亦有一種名赤昌一云味苦性平有毒一云性冷得大毒良

救飢取白色根切作片子還然浸水漫流淨浸食得大蒜良凡剝薄切以東流水浸二宿擣出與豆葉隔開入甑蒸從午至亥如魚葉用豆依法蒸之亦可花白者年多仙人採之作脯可爲下酒

麥門冬



麥門冬。本草云秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊蕡一名禹葭一名禹餘糧生隨州陸州及函谷堤板肥土石間火燒處有之今輝縣山野中亦有葉似韭葉而長冬夏長生根如積麥而白色出江寧者小潤出新安者大白大者苗如鹿葥小者如韭味苦性平微寒無毒地黃車前爲之使惡欬冬苦瓠苦芙蓉木耳苦參青蘿。

救飢採根換水浸去邪味淘洗淨蒸熟去心食

苧根 舊云閩蜀江浙多有之。今許州人家田園中亦有種者。苗高七八尺。一科十數莖。葉如楮葉而不花。乂面青背白。上有短毛。又似蘇子葉。其葉間出細穗花。如白楊而長。每一朵凡數穗。花青白色。子熟茶褐色。其根黃白色。如手指。盆宿根地中。至春自生。不須藏種。根味甘性寒。

救飢 採根刮洗去皮。煮極熟食之。甜美。



蒼朮



蒼朮 一名山薊。一名山薑。一名山連。一名山精。生山漢中山谷。今近郡山谷亦有嵩山茅山者佳。<sup>佳</sup>田淡青色高二三尺。莖作蒿蕪葉。拂莖而生。稍葉似棠葉。脚葉有三五叉。皆有鋸齒小刺。開花深碧色。亦似刺薊花。或有黃白花者。根長如指大。而肥實皮黑茶褐色。味苦甘。云味甘辛。性溫無毒。防風地榆爲之使。救飢採根去黑皮薄切浸二三宿去苦味。煮熟食亦作煎。

菖蒲



菖蒲  
一名堯韭。一名昌陽。生上洛池澤及蜀郡嚴道戎衛衡州。并嵩岳石磧上。今池澤處處有之。葉似蒲而圓有脊。一如劍刃。其根盤屈有節狀如馬鞭。大根傍引三四小根。一寸九節者良。節尤密者佳。亦有十二節者。露根者不可用。又一種名蘭蓀。又謂溪蓀。根形氣色極似石上菖蒲。葉正如蒲無脊。俗謂菖蒲生於水次。失水則枯。其菖蒲味辛。性溫無毒。秦皮秦艽爲之使。惡地榆。麻黃不可犯。鐵令人吐逆。

救飢。採根肥大節稀水浸去邪味製造作果食之。

元扈先生曰。雜食。



薑子根 俗名打碗花。一名兔兒苗。一名狗兒秧。幽薊間謂之蕪薑根。千葉者呼爲經枝牡丹。亦名穰花。生平澤中。今處處有之。延蔓而生葉似山藥葉而狹小。開花狀似牽牛花微短而圓。粉紅色。其根甚多。大者如小筋籠長一二尺。色白味甘性溫。

救飢 採根洗淨蒸食之。或晒乾杵碎。炒飯食亦好。或磨作麵。作燒餅蒸食皆可。少食則頭暈破腹。間食則宜。

元扈先生曰嘗遇吳人呼秧子根。弃地直移植備荒。

荳 蓼

根



荳 蓼 根 俗名麵碌碡音碌  
碡 生水邊下濕地其葉就地叢生葉似蒲葉而肥短葉背如劍脊樣葉叢中間擴莖上開淡粉紅花俱皆六瓣花頭擴開如傘蓋狀結子如韭花蓇葖其根如鷹爪黃連樣色如瑾泥色味甘

救飢 採根揩去皮及毛用水淘淨蒸熟食或晒乾炒熟食或磨作麵蒸食皆可

野胡蘿蔔



野胡蘿蔔 生荒野中。苗葉似家胡蘿蔔，俱細小。葉間攢生莖，又稍頭開小白花，衆花攢開如傘狀，比蛇床子花頭又大。結子比蛇床子亦大。其根比家胡蘿蔔尤細小，味甘。  
救飢採根洗淨去皮生食亦可。

綿

棗兒



綿棗兒 一名石棗兒。出密縣山谷中。生石間。苗高三五寸。葉似韭葉而潤。瓦礪樣。葉中掠等  
出穗似鷄冠。莖穗而細小。開淡紅花。微帶紫色。結小蒴兒。其子似大藍子而小。黑色。根類獨顆  
蒜。又似棗形而白。味甜性寒。

救飢 採取根添水火煮極熟食之。不換水煮。食後腹中鳴有下氣。

土

兒



土圓兒 一名地栗子。出新鄭山野中。細莖延蔓而生葉似菉豆葉微尖角。每三葉叢生一

處根似土瓜兒根微圓味甜。

救飢 採根煮熟食之。

野山藥



野山藥 生輝縣太行山山野中。蔓藤而生其藤似葡萄條稍細。藤頗紫色。其葉似家山藥葉而大微尖。根比家山藥極細瘦甚硬皮色微赤味微甜溫平無毒。  
救飢 採根煮熟食之。

金 瓜 兒



金瓜兒 生鄭山田野中。苗初生似小葫蘆葉而微小，又似赤霞兒葉。莖方，莖葉俱有毛刺。每葉間出一細藤，延蔓而生。開五瓣尖碗子黃花。結子如馬豆音大。生青熟紅，根形如雞彈，微小。

救飢 挖取根，換水煮浸去苦味，再以水煮極熟食之。

細葉沙參



細葉沙參 生輝縣太行山山衝間苗高二二尺莖似蕷莖葉似石竹子葉而細長又似水  
蓑衣葉亦細長稍間開紫花根似葵根而大如拇指<sup>音</sup>大皮色灰中間白色味甜性微寒本  
草有沙參苗葉莖狀所說與此不同未敢併入條下今另爲一條開載於此

救飢 挖取根洗淨煮熟食之。

雞 腿 兒



雞腿兒 一名綠白草。出釣州山野中。苗高七八寸。細長鋸齒。葉硬厚。背白。其葉似地榆葉而細長。開黃花。根如指大。長三寸許。皮赤內白。兩頭尖角。味甜。救飢。採根煮熟食。生食亦可。

山


蔓

菁



山蕷菁 出鈞州山野中。苗高一二尺。莖葉皆萬芭色。葉似桔梗葉。頗長削而不對生。又似山小菜葉微窄。根形類沙參。如手指薦。其皮灰色。中間白色。味甜。  
救飢 採根煮熟。生食亦可。

老鴉蒜



老鴉蒜 生水邊下濕地中。其葉直生。出土四垂。葉狀似蒲而短。背起鋸脊。其根形如蒜瓣。味甜。

救飢 採根燥熟。水浸淘淨。油鹽調食。

元扈先生曰。此草中顏料用。

山蘿蔔 葛



山蘿蔔 生山谷間田野中亦有之。苗高五七寸，四散分生莖葉。其葉似菊葉而闊大，微有艾香。每莖五葉排生，如一大葉。稍間開紫花。根似野胡蘿蔔根，而帶點白色，味苦。

救飢 採根燂熟水浸淘去苦味，油鹽調食。



地參 又名山薑。生鄭州沙崗間。田高一二尺。葉似初生桑科小葉。微短。又似桔梗葉。微長。開花似鈴鐺樣。紅紫花。根如拇指大。皮色蒼。內紫白色。味甜。  
救飢 採根貪食。

樟牙菜



樟牙草 生水邊。苗初塌地生葉似龍鬚菜葉而長窄。菜頭頗圓而不尖。其葉嫩薄又似牛尾  
菜葉亦長窄。其根如芽根而嫩皮色黑灰味甜。  
救飢 挖根洗淨煮熟油鹽調食。

雞兒頭苗



雞兒頭苗 生祥符西田野中就地妄秧生葉甚疎稀每五葉攢生狀如一葉其葉花又有小鋸齒間生蔓開五瓣黃花根叉甚多其根形如香附子而長皮黑肉白味甜  
救飢採根換水煮熟食

農政全書卷之五十二

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謹文定上海徐光啟纂輯  
明欽差總理糧餉世督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政採周憲王救荒本草

草部實可食



雀麥 本草一名薺麥。一名蕎麥音。生於荒野林下。今處處有之。苗似薺麥而又細弱。結穗像麥穗而極細小。每穗又分作小叉穗十數個。子甚細小。味甘性平無毒。救飢採子春去皮搗作麵蒸食作餅食亦可。



回回米 本草名薏苡仁。一名解靈音商。二名屋英。一名起實。一名藉珠。音繙俗名草珠兒。又呼爲西番葛穀。生翼定平澤及田野交阯生者子最大。彼土人呼爲藉珠。今處處有之。苗高三四尺。葉似黍葉而稍大。開紅白花作穗子。結實青白色。形如珠而稍長。故名薏珠子。味甘微寒無毒。今人俗亦呼爲菩提子。

救飢 采實春去就其中仁煮粥食取葉煮飲亦香。

元履先生曰 嘉穀良藥不必救荒。

蒺

藜

子




蒺藜子 本草一名旁通。一名屈人。一名止行。一名獮<sub>音羽</sub>。一名升推。一名卽藜。一名芙蓉。馬翊平澤道傍。今處處有之。布地蔓生。細葉小黃花。結子有三角刺人是也。味苦。辛性溫。微寒無毒。烏頭爲之使。又有一種白蒺藜。出同州沙苑。開黃紫花。作莢子。結子狀如腰子。樣小如黍粒。補腎藥多用。味甘有小毒。

救飢 收子炒微黃。搗去刺磨麪作燒餅或蒸食皆可。

元扈先生曰。本是勝藥。嘗過。

穄子



穄子 本草名蕡與穄同 實處處有之。北人種以打繩索。苗高五六尺。葉似芋葉而短薄。微毛澁。開金黃花。結實殼似蜀葵實殼而圓大。俗呼爲穄饅頭子。黑色如黃豆大。味苦。性平無毒。救飢採嫩穄饅頭取子生食。子堅實時收取。取子浸去苦味。曬乾磨麵食。

元扈先生曰可食。

稗子



稗子 有二種水稗生水田邊旱稗生田野中今皆處處有之苗葉似稻子色深綠腳葉頗帶紫色稍頭出圃穗結子如黍粒大茶褐色味微苦性微溫。

救飢

採子搗米煮粥食蒸食尤佳或磨作麵食皆可。

元扈先生曰稗自穀屬十得五米下田種之甚有益野生者可拾積貯用備飢者


穉子



穉子 生水田中及下濕地內。苗葉似稻但差短。稍頭結穗彷彿稗子穗。其子如黍粒大。茶禡色味甘。

救飢 採子搗米煮粥或磨作麵蒸食亦可。

川 裂




川穀 生汜水縣田野中苗高三四尺葉似初生葛葉微小葉圓叢開小黃白花結子似草珠兒微小味甘。

救飢 採子搗爲米生用冷水淘淨後以滾水湯三五次去水下鍋或作粥或作炊飯食皆可亦堪造酒。

莠

艸子



莠草子 生田野中 苗葉似穀而葉微瘦 稍間開茸毛  
白毛其子比穀細小 春米類折米熟

時卽收不收卽落味微苦性溫

救餓 採莠穗採取子搗米作粥或作水飯皆可食。

野

黍



野黍 生荒野中。科苗皆類家黍而莖葉細弱。穗甚瘦小。黍粒亦極細小。味甜性微溫。  
救飢 採子春去粗糠或搗或磨麵蒸餅食甚甜。

鷄

眼

草



雞眼草 又名搗不齊。以其葉用指甲搗之。作劑不齊。故名。生荒野中。攢地生葉。如雞眼大。似三葉酸漿葉而圓。又似小蟲兒臥單葉而大。繖子小如粟粒。黑茶褐色。味微苦。氣與槐相類。性溫。

救飢 採子搗取米。其米青色。先用冷水淘淨。卻以滾水泡三五次。去水下鍋。或煮粥。或作炊飯食之。或磨麵作餅食亦可。

鷺


麥



鷺麥 田野處處有之。其苗似麥。攢七官切。夢但細弱。葉亦瘦細。捕莖而生。結細長穗。其麥粒極細小。味甘。

救飢 採子春去皮搗磨爲麵食。

澆盤



澆盤 一名托盤。生汝南荒野中。陳蔡間多有之。苗高五七寸。莖葉有小刺。其葉彷彿似艾葉。稍圓葉背亦白。每三葉攢生一處。結子作穗。如半柿大。類小盤堆石榴顆狀。下有蒂承如柿蒂。形味甘酸。性溫。

救飢 以澆盤顆粒。紅熟時採食之。彼土人取以當果。

絲瓜

苗



絲瓜苗 人家園籬邊多種之。延蔓而生。葉似括樓葉。而花又大。每葉開出一絲藤纏附草木上。莖葉間五瓣大黃花。結瓜形如黃瓜而大。色青嫩時可食。老則去皮內有絲縷。可以擦洗油膩器皿。味微甜。

救飢  
採嫩瓜切碎。燂熟水浸淘淨。油鹽調食。

元扈先生曰。嘉蔬不必救荒。不實之花。作蔬更佳。


### 地角兒苗



地角兒苗 一名地牛兒苗。生田野中，撲地生。一根就分數十莖，其莖甚稠，葉似胡豆葉，微小。葉生莖面，每攢四葉對生，作一處。莖傍另又生葉，稍頭開淡紫花，結角似連翹角而小。中有子，狀似豌豆顆，味甘。

救飢 採嫩角生食，硬角熟食。

馬臉兒




馬臉兒音電 生田野中就地拖秧而生葉似甜瓜葉極小莖蔓亦細開黃花結實比雞彈微小味微酸。

救飢 摘取馬臉熟者食之。

山

黧

豆



山黧豆 一名山豌豆。生密縣山野中。苗高尺許。其莢正面劍脊葉似竹葉而齊短。兩兩對生。開淡紫花。結小角兒。其豆屬如豌豆味甜。

救飢 採取角兒煮食或打取豆食皆可。

龍芽草



龍芽草 一名瓜香草。生輝縣鷄子口山野間。苗高一尺餘。莖多澀毛。葉形如地棠葉而寬大。葉頭齊圓。每五葉或七葉作一莖。排生。葉莖腳上又有小芽葉兩兩對生。稍開出穗。開五瓣小圓黃花。結青毛蓇葖。有子大如黍粒。味甜。救飢。收取其子。或搗或磨。作麵食之。

地 稍 瓜



地稍瓜 生田野中。苗高尺許。作地攤科生葉似獨掃葉而細窄。光硬。又似沙蓬葉亦硬。遇圓攢莖而生。莖葉開小白花。結角長大如蓮子。兩頭尖角狀又似鴉嘴形。名地稍瓜味甘。

救飢 其角嫩時摘取熟食。角若皮硬剥取角中嫩瓢生食。

錦

荔 枝



錦荔枝 又名癩葡萄人家園籬邊多種苗引藤蔓延附草木生莖長七八尺莖有毛澁葉似野葡萄葉而花又多葉間生細絲蔓開五瓣花碗子花結實如雞子大尖角紋皺狀似荔枝而大生青熟黃內有紅氣味甜。

救飢 採荔枝黃熟者食瓢。

元尾先生曰南中人甚食此物不止于瓢實青時採者或生食與瓜同用名苦瓜也青瓜頗苦亦清脆可食耳聞廣人爭詫爲極甘也此恒蔬不必教荒嘗過

鷄冠果



雞冠果 一名野楊梅。生密縣山谷中。苗高五七寸。葉似澇盤葉而小。又似雞兒頭葉微圓。開五瓣黃花。結實似紅小楊梅狀。味甜酸。  
效飢 採取其果紅熟者食之。

羊

蹄

苗



草部 葉及實皆可食

羊蹄苗 一名東方宿。一名連蟲陸。一名鬼目。一名蕷。俗呼猪耳朵。生陳留川澤。今所在有之。

苗初揭地生。後纖生莖。又高二尺餘。其葉狹長。頗似蕷。而色深青。又似大藍葉。微闊。莖節間紫赤色。其花青白成穗。其子三稜。根似牛蒡。而堅實。味苦。性寒。無毒。

救飢 採嫩苗葉。熟水浸淘淨。苦味油鹽調食。其子熟時打子搗爲米。以滾水湯三五次

淘淨下鍋。作水飯食。微破腹。

蒼耳



蒼耳 本草名葉音徒耳。俗名道人頭又名喝起草。一名胡菜。一名地葵。一名施詩一名常思。一名羊負末。詩謂之卷耳。爾雅謂之蒼耳。生安陸川谷及六安田野。今處處有之。葉青白。類粘糊菜葉。莖葉稍圓。結實比桑椹短小而多刺。其實味苦甘。性溫。菜味苦辛。性微寒。有小毒。又云無毒。

救飢 採嫩苗葉熟換水浸去苦味。淘淨。油鹽調食。其子炒微黃。搗去皮。磨爲麵。作燒餅。

蒸食亦可。或用子熬油點燈。  
元尾先生曰。油可食。北人多用以燂寒具。

姑 娘 菜



姑娘菜 俗名燈籠兒。又名掛金燈。本草名酸漿。一名醋漿。生荆楚川澤及人家田園中。今處處有之。苗高一尺餘。苗似水薺而小。葉似天茄兒葉窄小。又似人莧葉頗大而尖。開白花。結房如囊。似野西瓜。蒴形如燈口布袋。又類燈籠樣。囊中有黃如櫻桃大。赤黃色。味酸。性平寒無毒。葉味微苦。別條又有一種酸漿草。三葉與此不同。治證亦別。

救飢 採葉燥熱水浸。淘去苦味。油鹽調食。子熟摘取食之。

土

茜

苗



土茜苗 本草根名茜根。一名地血。一名茹蘆。一名茅蒐。一名蒨。生喬山川谷。徐州人謂之牛蔓。西土出者佳。今北土處處有之。名土茜根。可以染紅葉似棗葉形。頭尖下闊。紋脈堅直。莖方。莖葉俱綠。四五葉對生節間。莖蔓延附草木。開五瓣淡銀褐花。結子小如菉豆粒。生青熟紅。根紫赤色。味苦性寒無毒。一云味甘。一云味酸。長鼠姑。葉味微酸。

救飢 採葉燥熟水浸作成黃色。淘淨油鹽調食。其子紅熟摘食。

王不留行



王不留行 又名剪金草。一名禁宮花。一名剪金花。生太山山谷。今祥符沙岡間亦有之。苗高一尺餘。其莖對節生叉葉似石竹子葉而寬短。捕莖對生腳葉似槐葉而狹長。開粉紅花結蒴如松子大。似罂粟殼樣極小。有子如葶苈子大而黑色味苦甘。性平無毒。

救飢 採嫩葉燥熟。換水淘去苦味。油鹽調食。子可搗爲麵食。

白  
薇



白薇 一名白幕。一名薇草。一名春草。一名骨美。生平原川谷。并陝西諸郡及滁州。今鈞州密縣山野中亦有之。苗高一二尺。莖葉俱青。頗類柳葉而潤短。又似女婁腳葉而長硬。毛澁。開花紅色。又云紫花結角似地稍瓜而大。中有白瓢。根狀如牛膝根而短黃白色。味苦鹹性平。大寒無毒。惡黃芪。大黃。大戟。乾姜。乾漆。山茱萸。大棗。

救飢 採嫩葉燂熟水淘淨油鹽調食。并取嫩角搗熟亦可食。

蓬子菜



蓬子菜 生田野中所在處處有之。其苗嫩時莖有紅紫線，葉似嫌蓬葉微細。苗老結子，葉則生出叉刺，其子如獨掃子大。苗葉味甜。


救飢 採嫩苗葉，煤熱水浸淘淨，油鹽調食。曬乾煤食尤佳。及採子，搗米青色，或煮熟或磨麵作餅蒸食皆可。

胡枝子



胡枝子 俗亦名隨軍茶。生平澤中。有二種葉形。有大小。大葉者類黑豆葉。小葉者莖類蕕草葉。似苜蓿葉而長大。花色有紫白結子如栗粒大。氣味與槐相類性溫。救飢採子微春即成米。先用冷水淘淨。復以滾水湯三五次。去水下鍋。或作粥或作炒飯。皆可食。加野菜豆味尤佳。及採嫩葉蒸曬為茶。煮飲亦可。

米 布 袋



米布袋 生田野中。苗掘地生葉似澤漆葉而窄。其葉順莖排生。稍頭攢結三四角。中有子如  
黍粒大。微圓味甜。

救飢 採角取子。水淘洗淨下鍋煮食。其嫩苗葉炒熟油鹽調食亦可。

天茄苗兒




天茄苗兒 生田野中。苗高二尺許。莖有線樞。葉似姑娘草葉而大。又似和尙菜葉卻小。開五瓣小白花。結子似野葡萄大。紫黑色。味甜。

救飢 採嫩葉燥熟。水浸去邪味。淘淨。油鹽調食。其子熟時。亦可摘食。

治病 今人傳說採葉傅貼腫毒。金瘡。拔毒。

苦馬豆



苦馬豆 生延津縣郊野中。在處有之。苗高二尺許。莖似黃芪莖。莖上有細毛。葉似胡豆葉。微小。又似蒺藜葉。卻大枝葉間開紅紫花。結殼如拇指頂大。半頂開多虛。俗呼爲羊尿胞。內有子。如蠶子大。茶褐色。子葉俱味苦。

救飢 採葉燥熟。換水浸去苦味。淘淨。油鹽調食。及取子水浸淘去苦味。曬乾。或磨或搗爲

麵作燒餅蒸食皆可。

豬尾把苗



豬尾把苗 一名狗腳菜。生荒野中。苗長尺餘。葉似甘露兒葉而甚短小。其頭頗齊。莖葉皆有細毛。每葉間頸條開小白花。結小蒴兒。中有子。小如粟粒。黑色。苗葉味甜。救飢。採嫩葉熟。換水浸淘淨。油鹽調食。子可搗爲麵食。

農政全書卷之五十三

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯  
明欽差總理糧餉庫督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽陳繼儒鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政

救荒本草

草部

根葉可食


奈 三 草



草三柰 生密縣梁家衝山谷中。苗高一尺許葉似蓑草而狹長。開小淡紅花。根似雞爪形而  
麤亦香其味甘微辛。

救飢 採根換水煮食近根嫩白新葉亦可燂食。

### 黃精苗



黃精苗 俗名筆管菜。一名重樓。一名蕘竹。一名雞格。一名雞頭。一名鹿竹。一名萎蕤。一名仙人條根。一名垂珠。一名馬箭。一名白及。生山谷南北皆有之。萬山茅山者佳。根生肥地者大如拳。薄地者猶如拇指。葉似竹葉或二葉或三葉。四五葉俱皆對節而生。味甘性平無毒。又云。莖光滑者謂之太陽之草。名曰黃精。食之可以長生。其葉不對節。莖葉毛鈎子者謂之太陰之草。名曰鈎喫。食之入口立死。又云。莖不紫花不黃爲異。

又云。莖不紫花不黃爲異。  
拔飢採嫩葉燒熟換水浸去苦味。淘淨油鹽調食。山中人採根九蒸九暴。食甚甘美。具蒸暴用。瓮去底安釜上。裝滿黃精密蓋蒸之。令氣溜即暴之。如此九蒸九暴。令極熱不然則刺人喉咽。久食長生。解藥其生者若初服只可一寸半。漸漸增之。十日不食他食能長服之。食止三尺。服三百日後盡見鬼神。餌必升天。又云花實可食罕見難得。

元尾先生曰。嘗過。根本勝藥苗亦恒蔬。

地  
苗



地黃苗 俗名婆婆嫗。一名地鬚。一名莢。一名芑。生咸陽川澤。今處處有之。苗初塌地。生葉如山白菜葉而毛滅。葉面深青色。又似芥菜葉而不花。又比芥菜葉頗厚。葉中攢莖上有細毛。莖稍開筒子花。紅黃色。北人謂之牛嫗子。花結實如小麥粒。根長四五寸。細如手指皮。赤黃色。味甘苦性寒無毒。惡貝母畏無黃得夢門冬。清酒良急鐵器。

救餓 採葉煮羹食。或搗根汁。搜麵作餅。及冷淘食之。或取根浸洗淨。九蒸九暴。任意服食。或煎以爲煎食。久服輕身不老。變白延年。

牛 旁 子



牛旁子 本草名惡實。未去萼名鼠粘子。俗名夜叉頭。根謂之牛菜。生魯平山澤。今處處有之。苗高二三尺。葉如芋葉。長大而澀。花淡紫色。實似蘿蔔而褐色。外殼如粟粒而小。多刺。鼠過之則痏惹。不可脫。故名。殼中有子。如半粒麥而圓小。根長尺餘。莖如拇指。其色灰黑。味辛。性平。一云味甘無毒。

救飢

採葉焯熟水浸去邪氣。淘洗淨。油鹽調食。及取根洗淨煮熟食之。久食甚益人身。輕耐老。

遠

志



遠志 一名棘蕘。一名蔓繞。一名細草。生太山及寃句川谷河陝商齊泗州亦有。俗傳夷門遠志最佳。今密縣梁家衝山谷間多有之。苗名小草葉似石竹子葉又極細開小紫花亦有開小

紅白花者。根黃色形如蒿根長及一尺許。亦有根黑色者。根葉俱味苦性溫無毒得茯苓冬葵子龍骨良。殺天雄附子毒畏珍珠藜蘆蠭蠐螬蟻。

救飢 採嫩苗葉焯熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食及搗取根搗水煮浸淘去苦味去心

杏



參

杏葉沙參 一名白麪根。生懷縣山野中。苗高一二尺。莖色青白。葉似杏葉而小。邊有叉牙。又似山小菜葉。微尖而背白。稍圓。開五瓣白碗子花。根形如野胡蘿蔔。頗肥。皮色灰黑。中間白色。味甜。性微寒。本草有沙參。苗葉根莖其說與此形狀皆不同。未敢併入條下。乃另開於此。其杏葉沙參又有開碧色花者。

救飢 採苗葉煮熟水浸淘淨。油鹽調食。掘根換水煮食亦佳。



藤長苗 又名旋菜。生密縣山坡中。拖蔓而生。苗長三四尺。條莖有細毛。葉似滴滴金葉而窄小。頭頗齊。開五瓣粉紅大花。根似打碗花根。根葉皆味甜。  
救飢 採嫩苗葉燂熟。水浸淘淨。油鹽調食。掘根換水煮熟亦可食。

牛皮消




牛皮消 生密縣野中。拖蔓而生。藤蔓長四五尺。葉似馬兜零葉寬大。面薄。又似何首烏葉亦寬大。開白花。結小角兒。根類葛根而細小。皮黑肉白味苦。

救飢採葉焯熱水浸去苦味。油鹽調食。及取根去黑皮切作片。換水煮去苦味。淘洗淨再以水煮極熟食之。

菹


草



菹草上音  
雖 即水藻也。生陂塘及水泊中。莖如蘆線長三四尺。葉形似柳葉而狹長。故名柳葉菹。又有葉似蓬子菜者。根茎如釵股而色白。味微鹹性微寒。

救飢 撈取葉連嫩根揀擇洗淘潔淨。剉碎煮熟。油鹽調食。或加少米煮粥食尤佳。

水豆兒




水豆兒 一名蕨菜。生陂塘水澤中。其莖葉比菹草又細狀類細線連繩不絕。根如釵股而色白。根下有豆如退皮菉豆瓣味甘。

救飢 採秧及根豆擇洗潔淨煮食生醃食亦可。

水

葱



水葱 生水邊及淺水中。科苗彷彿類家葱而極細長，稍頭結蕩莢，彷彿類葱蕩莢而小開繁白花。其根類葱根，皮色紫黑，根苗俱味甘微鹹。

救飢 採嫩苗連根揀擇洗淨，燉熟水浸淘淨，油鹽調食。




蒲笋 木草名其苗爲香蒲卽甘蒲也。一名睢。一名藨。俚俗名此蒲爲香蒲。謂菖蒲爲臭蒲。其香蒲水邊處處有之。根比菖蒲根極肥大而少節。其葉初未出水時葉莖紅白色。採以爲筍。後攢梗於叢葉中。花抱梗端如武士棒杵故俚俗謂蒲棒。蒲黃卽花中藥屑也。細若金粉當欲開時。有便取之。市蜃間亦採以蜜搜作果食。貨賣甚益。小兒味甘。性平無毒。

救飢 採近根白筍。揀剥洗淨熟油鹽調食。蒸食亦可。可採根刮去皮。剉乾磨麪打餅。蒸食皆可。

蘆

筍



蘆筍 其苗名葦子草。本草有蘆根，爾雅謂之葭葦。生下隰陂澤中。其狀都似竹但差小。而葉抱莖生，無枝叉。花白作穗。如茅花根如竹根亦差小。而節疎，露出浮水者不堪用。味甘。一云辛性寒。

救飢 採嫩筍燥熟油鹽調食。其根甘甜亦可生啖食之。

元扈先生曰嘗過根本勝菜。北方亦作果食。其筍則北方者可食。南產不可食。

茅

芽

根



茅芽根 本草名茅根。一名蘭根。一名茹根。一名地管。一名地筋。一名兼杜。又名白茅。昔其芽一名茅針。生楚地山谷。今田野處處有之。春初生苗。布地如針。夏生白花。莖莖然。至秋而枯。其根至潔白。亦甚甘美。根性寒。茅針性平。花性溫。俱味甘無毒。

救飢 採嫩芽剝取嫩穰食。甚益小兒。及取根咂食。甜味久服利人。服食此可斷穀。

元扈先生曰嘗過

葛



葛根 名雞齊根。一名鹿藿。一名黃斤。生汶山川谷及成州海州浙江并澧鼎之間。今處處有之。苗引藤蔓長二三丈。莖淡紫色。葉頗似楸葉而小。色青。開花似豌豆花。粉紫色。結實如皂莢而小。根形如手臂。味甘。性平無毒。一云性冷殺野葛巴豆百藥毒。

救飢 挖取根入土深者。水浸洗淨蒸食之。或以水中採出粉。澄濾成塊。蒸煮皆可食。及採花曬乾燥食亦可。

元扈先生曰嘗過。

何首烏



何首烏 一名野苗。一名交藤。一名夜合。一名地精。一名陳知白。又名桃柳藤。亦名九真藤。出順州南河縣。其嶺外江南諸州及虔州皆有。以西洛嵩山歸德柘城縣者爲勝。今鈞州密縣山谷中亦有之。蔓延而生。莖蔓紫色。葉似山藥葉而不光嫩。葉間開黃白花。葛勒花。結子有稜似蕎麥而極細。小如粟粒。大根者如拳。各有五楞瓣狀似甜瓜樣中有花紋形如鳥獸。山嶽之狀者極珍。有赤白二種。赤者雄。白者雌。又云雄者苗葉黃白。雌者赤黃色。一云雄苗赤生必相

對遠不過三四尺。夜則苗蔓相交或隱化不見。凡修合藥須雌雄相合。服有驗。宜偶日服。二四六八日是也。其藥本無名。因何首烏見藤夜交採服有功。因以採人爲名耳。又云仙草。其爲五十年者如拳大。號山伯服之一年。髭髮烏黑。百年如碗大。號山哥服之一年。顏色紅悅。百五十年如盆大。號山伯服之一年。齒落重生。二百年如斗。栲栳大。號山翁服之一年。顏如童子。行及奔馬。三百年如三斗。栲栳大。號山精服之一年。延齡純陽之體。久服成地仙。又云其頭九數者。服之乃仙。味苦澀性微溫無毒。一云味甘。茯苓爲之使。酒下最良。忌鐵器。猪羊血及豬肉無鱗魚與蘿蔔相惡。若並食令人髭鬚早白。腸風多熱。

救飢 挖根洗去泥土。以苦竹刀切作片。米泔浸經宿。換水煮去苦味。再以水淘洗淨。或蒸或煮食之。花亦可燥食。

元扈先生曰：嘗過根本勝藥不必救荒。

瓜

根



瓜樓根 俗名天花粉。本草名括樓實。一名地樓。一名果羸。一名天瓜。一名澤姑。一名黃瓜。生宏農川谷及山陰地。今處處有之。入土深者良。生鹵地者有毒。

詩所謂果蓏之實是也。根亦名白藥。大者細如手臂。皮黃肉白。苗引藤蔓葉似甜瓜葉而作花。又有細毛。開花似葫蘆花。淡黃色。實在花下。大如拳。

生青熟黃。根味苦性寒。無毒。柯相爲之使。惡乾姜。長牛膝。乾漆。反烏頭。

救飢 教飢。採根削皮至白處。寸切之。水浸一日。一次換水。浸經四五日。取出爛搗研。以絹袋盛之。澄濁令極細如粉。或將根曬乾搗爲麵。水浸澄濁二十餘遍。使極膩如粉。或爲燒餅。或作煎餅。切細絲皆可食。採括樓根煮粥食。極甘。取子炒乾搗爛用油熬。水熬油亦可。

元扈先生曰：嘗過。根本瓦藥。

磚子苗



磚子苗 一名閼子苗。生水邊。苗似水葱而龐大。肉質又似蒲葦。稍開碎白花。結穗似水莎草穗。紫赤色。其子如黍粒大。根似蒲根而堅實。味甜。子味亦甜。救飢。採子磨麪食。及採根擇洗淨。換水煮食。或曬乾磨爲麪食亦可。



花

菊花 一名節華。一名日精。一名文節。一名女華。一名文莖。一名更生。一名周盈。一名傅延年。一名陰成。生雍州川澤及鄧衡齊州田野。今處處有之。味苦甘性平無毒。尤枸杞桑根白皮爲之使。

救飢 取莖紫氣香而味甘者。採葉煮食或作羹皆可。青莖而大氣味作苦者不堪食。名苦蕙。其花亦可煮食。或炒茶食。

元扈先生曰嘗過。

金

花



金銀花 本草名忍冬。一名鶯鶯藤。一名左纏藤。一名金釵股。又名老翁鬚。亦名忍冬藤。舊不載所出州土。今輝縣山野中亦有之。其藤凌冬不凋。故名忍冬。草附樹延蔓而生。莖微紫色。對節生葉。葉似薜荔葉而青。又似水茶臼葉。頭微圓而軟背頗澀。又似黑豆葉而大。開花五出。微香。蒂帶紅色。花初開白色。經一二日則色黃。故名金銀花。本草中不言善治癰疽發人。用之奇效。味甘性溫無毒。

救亂  
採花熟油鹽調食。及採嫩葉換水煮熟浸去邪味。潤溼油鹽調食。  
元履先生曰。嘗過花本勝藥。

望江 南



望江南 其花名茶花兒。人家園圃中多種。苗高二尺許。莖微淡赤色。葉似槐葉而肥大微尖。又似胡蒼耳葉。頗大。又似皂角葉。亦大。開五瓣金黃花。結角長三寸許。葉味微苦。救飢採嫩苗葉爌熟水浸淘去苦味。油鹽調食。花可炒食亦可燂食。


元扈先生曰：嘗過或名槐豆。或直稱決明。

大

蓼



大蓼 生密縣梁家衝山谷中。拖藤而生。莖有線楞而頗硬。對節分生莖。葉亦對生。葉似山蓼葉微短。拳曲。節間開白花。其葉味苦。微辣。  
救飢 採葉焯熟。換水浸去辣味。作成黃色。淘洗淨。油鹽調食。花亦可焯食。



草部  
莖可食

黑三稜 舊云河陝江淮荆襄間皆有之。今鄭州賈峪山澗水邊亦有。苗高三四尺。葉似菖蒲葉而厚大。背皆三稜劍脊葉中攢葉。葉上結實。攢爲刺毬。狀如楮桃樣而三顆瓣甚多。其顆瓣形似草決明子而大。生則青。熟則紅黃色。根狀如烏梅而頗大。有纊蔓莖相連。比京三稜體微輕。治療並同。其莖味甜。根味苦。性平無毒。

救飢 采嫩莖剝去龜皮。燉熟油鹽調食。

荇 菜 絲




荇絲菜 又名金蓮兒。一名藕蔬菜。水中拖蔓而生。葉似初生小荷葉。近莖有樅刺。葉浮水土。  
葉中蘊莖上開金黃花。莖味甜。  
救飢 採嫩苗焯熟油鹽調食。

水 蕃



水慈菰 俗名爲剪刀草。又名剪搭草。生水中。其莖面寬背方。背有線楞。其葉三角似剪刀形。葉中藏生莖。又稍間開三瓣白花黃心。結青蓇葖。如青桔桃狀。頗小。根類慈根而龐大。其味甜。救飢。採近根嫩筍莖燂熟油鹽調食。


茭



草部 茭及實皆可食

**茭筍** 本草有菰根，又名菰蔣草。江南人呼爲茭草。俗又呼爲茭白。生江東池澤水中，及岸際。今在處水澤邊皆有之。苗高二三尺，葉似蕪荻，又似茅菜，而長闊厚，葉間藏孽，開花如葦。結實青子，根肥，剝取嫩白筍可啖。久根盤厚生菌，筍細嫩葉可啖，名菰菜。三年已上，心中生孽如藕，白軟中有黑脈，甚堪噉。名菰首。味甘性大寒無毒。

**救飢** 採茭菰筍，蒸熟油鹽調食，或採子春爲米合粟煮粥食之，甚濟飢。  
**元尾先生曰：**嘗過。



# 農政全書卷之五十四

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謹文定上海徐光啟纂輯  
明欽差總理糧餉提督軍務兼巡撫廣天等處地方都察院右僉都御史東陽張國祚鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政 採周憲王救荒本草

木部 葉可食



茶樹 本草有茗苦茶圖經云生山南漢中山谷閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之

惟建州北苑數處產者性味獨與諸方不同

同今密縣梁家衝山谷間亦有之其樹大小皆類榧子春初生芽爲雀舌麥顆又有新芽一發微龜如針漸至環腳軟枝條之葉葉老則似水茶白葉而長又似初生青圓綠葉而小先澤又云冬生葉可作羹飲世呼早採者爲採啜取者爲茗一名茱蜀人謂之苦茶今通謂之茶茶葉聲近故呼之又有研治作餅名爲臘茶者皆味甘苦性微寒無毒如茱萸姜等良又別有一種蒙山中頂上清峯茶云春分前後多聚人九候雷初發聲併手齊採若得四兩服之卽爲地仙。

救飢 採嫩葉或冬生葉可煮作羹食或蒸焙作茶皆可。

夜合樹



夜合樹 本草名合歡。一名合昏。生益州及雍洛山谷。今鈞州鄭州山野中亦有之。木似梧桐。其枝甚柔弱似皂莢葉。又似槐葉。極細而密。互相交結。每一風來。輒似相解了。不相牽綴。其葉至暮而合。故名合昏。花發紅白色。瓣上若絲茸然。散垂結實。作芡子極薄細。味甘。性平。無毒。

救飢 採嫩葉。燂熟水浸淘淨。油鹽調食。晒乾燥食尤好。

木

槿  
樹



木槿樹 本草云木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植爲籬障亦有千葉者人家園圃多栽種性平無毒菜味甜。


救飢 採嫩葉燥熟冷水淘淨油鹽調食

白楊樹



白楊樹 本草。白楊樹皮舊不載所出州土。今處處有之。此木高大。皮白似楊。故名葉圓如梨。肥大而尖。葉背甚白。葉邊鋸齒狀。葉蒂小無風自動也。味苦性平無毒。救飢。採嫩葉熟作成黃色。換水淘去苦味。洗淨油鹽調食。

黃  
櫟



黃櫟 生商洛山谷。今鈞州鄭州山野中亦有之。葉圓木黃枝莖色紫赤。葉似杏葉而圓大。味苦性寒無毒不可染黃。

救飢 採嫩芽焯熟水淘去苦味油鹽調食。

元扈先生曰嘗過

椿

樹  
芽



椿樹芽 本草有椿木。樗木舊不載所出州土。今處處有之。二木形幹大抵相類。椿木實而葉香可噉。樗木疏而氣臭。膳夫熬去其氣亦可噉。北人呼樗爲山椿。江東人呼爲虎目。葉脫處有痕如樗蒲子。又如眼目。故得此名。夏中生莢。椿之有花者無莢。有莢者無花。莢常生臭椿上。末兒椿上有莢者。然世俗不辨椿樗之異。故俗名爲椿莢。其實椿莢耳。其無花不實木大端直爲椿。有花而莢大。小幹多枝。嫩者爲椿。椿味苦。有小毒。性溫。一云性平。無毒。

樗味苦。有小毒。性溫。一云性平。無毒。


元尾先生曰。曾過救飢採嫩芽燒熟水浸潤淨油鹽調食。

椒  
樹



椒樹 本草蜀椒。一名南椒。一名巴椒。一名荳荳。生武都川谷及巴郡歸峽蜀川陝洛間。人家園圃多種之。高四五尺。似茱萸而小。有針刺。葉似刺蘿葉微小。葉堅而滑。可煮食。甚辛香。結實無花。但生於葉間。如豆類而圓。皮紫赤。此椒江淮及北土皆有之。莖皆相類。但不及蜀中者皮肉厚。腹裏白。氣味濃烈耳。又云出金州西城者佳。味辛性溫。大熱。有小毒。多食令人乏氣口開者殺人十月不食。椒損氣傷心。令人多忘。杏仁爲之使。畏軟冬花。  
救飢 挑椒葉燥熟。換水浸淘淨油鹽調食。椒鹽調和百味香美。

棕子樹




棕色樹 本草有棕色木，舊不載所出州土。今密縣山野中亦有之。其樹有大者，木則堅重，堪為車輶。初生作科條狀，類荆條，對生枝叉葉似柿葉而薄小，兩葉相當，對生，開白花，結子細圓，如牛李子，大如豌豆。生青熟黑，味甘鹹，性平無毒，葉味苦。

救飢 採葉燂熱水浸淘去苦味，洗淨油鹽調食。

雲

葉



雲葉 生密縣山野中。其樹枝葉皆類乘。但其葉如雲頭花。又似木欒樹葉。微潤。開細青黃花。其葉味微苦。

救飢 採嫩葉燥熟。換水浸淘去苦味。油鹽調食。或蒸晒作茶尤佳。




黃棟樹 生鄭州南山野中葉似初生椿樹葉而極小又似棟葉色微帶黃開花紫赤色結子如豌豆大生青熟亦紫赤色葉味苦  
救飢 採嫩芽葉焯熟換水浸去苦味油鹽調食蒸芽曝乾亦可作茶煮飲

凍

青

樹



凍青樹 生密縣山谷間。樹高丈許。枝葉似枸骨子樹而極茂盛。凌冬不凋。又似楂子樹葉而小。亦似桺芽葉微窄。頭頗圓而不尖。開白花。結子如豆粒大。青黑色。葉味苦。

救飢 採芽葉煤熟水浸去苦味。淘洗淨。油鹽調食。

穡芽樹



穡芽樹 生輝縣山野中。科條似槐條。葉似冬青葉微長。開白花。結青白子。其葉味甜。救飢。採嫩葉焯熟。水淘淨。油鹽調食。

月

芽



月芽樹 又名彷芽。生田野中。莖似槐條。葉似歪頭菜葉。微短。稍硬。又似稗芽葉。頗長。角其葉  
兩兩對生。味甘微苦。

救飢 採嫩葉燥熟。水浸淘淨。油鹽調食。




女兒茶 一名牛李子。一名牛筋子。生田野中。科條高五六尺。葉似郁李子葉而長大。稍尖。葉色光滑。又似白棠子葉而色微黃。綠結子如豌豆大。生則青。熟則黑。茶褐色。其葉味淡微苦。救飢。採嫩葉燥熟。水浸淘淨。油鹽調食。亦可蒸曝作茶煮飲。

省 沽 油



省沽油 又名珍珠花生。鈞州風谷頂山谷中。科條似荆條而圓。野生枝叉葉亦對生。葉似蠶  
施布袋葉而大。又似葛藤葉而小。每三葉簇生一處。開白花似珍珠色。葉味甘苦性。  
救飢 採葉煤熟水浸淘淨。油鹽調食。

同 醋



回回醋 一名淋樸樹生密縣韶華山山野中。樹高丈餘葉似兜櫨樹葉而厚大。邊有大鋸齒。又似厚椿葉而亦大。或三葉或五葉排生一莖。開白花結子大如豌豆。熟則紅紫色味酸葉味微酸。


救飢 採葉焯熟水浸去酸味淘淨。油鹽調食其子調和湯味如醋。

白 檉



白槿樹 生密縣梁家衝山谷中樹高五七尺葉似茶葉而甚闊大光潤又似初生青岡葉而無花叉又似山格刺樹葉亦大開白花其葉味苦

救飢 採葉煤熟水浸淘淨油鹽調食



械樹芽 生筠州風谷頂山谷間木高一二丈其葉狀類野蘿蔔葉五花尖叉亦似棉花葉而薄小又似絲瓜葉卻甚小而淡黃綠色開白花葉味甜。


救飢 採葉燥熟以水浸作成黃色換水淘淨油鹽調食

老

葉

兒

樹



老葉兒樹 生宿縣山野中。樹高六七尺。葉似茶葉而窄瘦尖銳。又似李子葉而長。其葉味甘。  
微澀。

救飢 採葉爛熟水浸去澀味淘洗油鹽調食。

青楊樹



青楊樹 在處有之。今密縣山野間亦多有。其樹高大葉似白楊樹葉而狹小色青皮亦頗青。  
故名青楊。其葉味微苦。


救飢 採葉焯熟水浸作成黃色。換水淘洗。油鹽調食。

龍柏芽

龍

柏

芽




龍柏芽 出南陽府馬鞍山中。此木久則亦大。葉似初生櫟櫟小葉而短。味微苦。  
救飢 採芽葉燥熟。換水浸淘淨。油鹽調食。

兜 檀 樹



兜檀樹 生密縣梁家衝山谷中。樹甚高大。其木枯朽極透。可作香焚。俗名壞香。葉似回回薑。樹葉而薄窄。又似花椒樹葉。卻少花。葉皆對生。味苦。

救飢 採嫩芽葉燥熟水浸去苦味。淘洗淨。油鹽調食。



青岡樹 舊不載所出州土。今處處有之。其木大而結櫟斗者。爲櫟櫟。小而不結櫟斗者。爲青岡。其青岡樹枝葉條幹皆類櫟櫟。但葉色頗青而少花。味苦。性平無毒。  
 救飢 採嫩葉熟。以水浸漬作成黃色。換水淘洗淨。油鹽調食。

樟樹芽



樟樹芽 生富縣山野中。樹高一二丈葉似槐葉而長大。開淡粉紫花。葉味苦。

救飢 採嫩芽葉炒熟。換水浸去苦味。淘洗淨。油鹽調食。

山 茶

科



山茶科 生中半土山田野中。科條高四五尺。枝梗灰白色。葉似皂莢葉而圓。又似梔葉亦圓。四五葉擴生一處。葉甚稠密。味苦。

救飢 採嫩葉燥熟。水淘洗淨。油鹽調食。亦可蒸晒乾。做茶煮飲。


木葛

葛




木葛 生新鄭縣山野中。樹高丈餘。枝似杏桃葉似杏葉而圓。又似葛根葉而小。味微苦。  
救飢 採葉燥熟。水漫淘淨。油鹽調食。

# 花 枸 樹



花 枸 樹 生 密 縣 山 野 中。其 樹 高 大。葉 似 回 回 酢 葉 微 薄。又 似 兜 檵 葉。邊 有 銳 齒。又 其 葉 味 苦。

救 饑 採 嫩 芽 葉 煮 熟。撈 水 浸 去 苦 味。淘 洗 淨。油 鹽 調 食。



白辛樹 生榮陽塔兒山崗野間樹高丈許葉似青檀樹葉頗長而薄色微淡綠又似月芽樹葉而大色亦差淡其葉味甘微澀  
救飢 採葉燂熟水浸淘去澁味油鹽調食

木藥樹



木藥樹 生密縣山谷中。樹高丈餘。葉似棟葉而寬大稍薄。開淡黃花。結薄殼。中有子大如豌豆。烏黑色。人多摘取串作數珠。葉味淡甜。

救飢 採嫩芽葉燂熟。換水浸淘淨。油鹽調食。


烏 棱 樹



烏棱樹 生密縣梁家街山谷中。樹高丈餘。葉似省沽油樹葉。而背白。又似老婆布粘葉。微小而削。開白花。結子如梧桐子大。生青熟則烏黑。其葉味苦。

救飢 採葉燂熟。換水浸去苦味。作湯淘洗。浸油鹽調食。

刺 楸



刺楸樹 生密縣山谷中其樹高大皮色蒼白上有黃白班文枝梗間多有大刺葉似楸葉而薄味甘

救飢 採嫩芽葉熟水浸淘洗淨油鹽調食



黃絲

藤

黃絲藤 生輝縣太行山山谷中。條類葛條。葉似山格刺葉而小。又似婆婆枕頭葉頗硬。背微白。邊有細鋸齒味苦。


救飢 採葉煑熟水浸淘淨油鹽調食。

山

格

刺

樹



山格刺樹 生密縣韶華山山野中。作科條。生葉似白櫟樹葉。頗短而尖鈍。又似茶樹葉而潤大。及似老婆布黏葉亦大。味甘。

教飢 採葉燥熟水浸作成黃色。淘洗淨油鹽調食。

筍

樹



筍樹 生輝縣太行山山谷中。其樹高丈餘葉似槐葉而大。卻頗軟薄。又似檀樹葉而薄小。開淡紅色花。結子如菉豆大。熟則黃茶褐色。其葉味甜。

救飢 採葉焯熟水浸淘淨。油鹽調食。

報

馬

樹



報馬樹 生輝縣太行山山谷間。枝條似桑條色。葉似青檀葉而大。邊有花叉。又似白辛葉  
頗大而長硬。葉味甜。

救飢 採嫩葉焯熟水淘淨油鹽調食。硬葉焯熟水浸作成黃色。淘去涎沫。油鹽調食。

板  
樹




板樹 生輝縣太行山山谷間樹甚高大其木細膩可爲卓器板又對生葉似木槿葉而長大  
微薄色頗淡綠皆作五花梗又邊有鋸齒開黃花結子如豆粒大色青白葉味苦。

救飢 採嫩葉燥熟水浸去苦味淘洗潰油鹽調食。

臭

葵



臭葵，生密縣楊家衝山谷中。科條高四五尺葉似梓瓜葉而尖角又似金銀花葉亦尖角五葉叢生如一葉開花白色其葉味甜。

救飢 採葉熟水浸淘淨油鹽調食

堅  
莢  
樹



堅莢樹 生輝縣太行山山谷中。其樹枝幹堅勁，可以作桿。皮色烏黑，對分枝叉，葉亦對生。葉似拐棗葉而大，微薄，其色淡綠，又似土欒樹葉，極大而光潤，開黃花，結小紅子。其葉味苦。

救飢 採嫩葉，焯熟水，浸去苦味，淘油鹽調食。

臭

竹



臭竹樹 生輝縣太行山山野中。樹甚高大葉似楸葉而厚。頗耐寒却少花。又似楊棗葉亦大。其葉而青背白味甜。

救飢 採葉燥熱水浸去邪臭氣味油鹽調食。

馬

魚兒

條



馬魚兒條 俗名山皂角。生荒野中。葉似初生刺蘚花葉而小。枝梗色紅。有刺似棘針微小。  
葉味甘微酸。


救飢 採葉燒熟水浸淘淨。油鹽調食。

老

婆

布

黏



老婆布黏 生鈞州風谷頂山野間。科條淡黃色。葉似匙頭樣。色嫩綠而光俊。又似山格刺葉却小。味甘性平。

救飢 採葉煤熱水浸作湯。淘淨油鹽調食。

農政全書卷之五十四 終