

眉州枇杷葉



枇杷葉味苦平無毒主卒喉不下氣

陶隱居云其葉不暇黃但

嚼食亦差人以作飲則小冷
射人肺令欬不已又主欬逆不下食
唐本注云用葉湏火炙布拭去毛不爾
執中內錫等謹按蜀本圖經云樹高丈餘葉大如盤耳背有黃毛子
核生如小李黃色味甘酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月
熟凌冬不凋生江南山南今處處有植說云枇杷溫利五藏久食亦
發熱黃子食之潤肺熱上脣若和熱炙肉及執麵食之令人患熱毒
黃病藥性論云枇杷葉使牛甘能主胃氣冷惱微不止
杷子平無毒治肺氣潤五臟下氣止吐逆并渴疾又云藥濟婦人產
後口乾圖經曰枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吳蜀閩嶺皆有
可愛四時不周盛冬開白花至三四月而成實故謝瞻枇杷賦云
金秋之青條抱東陽之和氣纍纍葩之結霸成炎果乎纖露是也其
雷公兩乾者三葉重一兩者是氣足

寶作掠如黃梅皮肉甚薄味甘中核如小栗四月採葉暴乾治肺氣
主渴疾用時湏火炙布拭去上黃毛去之難盡當用粟稈作刷刷之
乃盡人以作飲則小冷其木白皮止吐逆不下食
堪用使鹿布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用
綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度

雷公兩乾者三葉重一兩者是氣足

食療卒惱喉不欲食

又煮汁飲之止渴備理孫真人咳嗽以葉去毛煎湯服之衍義曰枇杷葉江
北二川皆有之以其形如枇杷故名之治肺熱嗽有功花白最先春
也子大如彈九四五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同
有婦人患肺熱久嗽身如焚肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通款冬花
紫菀杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同爲末蜜丸如
櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終一劑而愈

荔枝



化一丸未終一劑而愈

荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅羅紋肉青白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆肥矣

今附圖經曰

荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪州興化軍及二廣州郡皆有

之其品閩中第一蜀川次之嶺南為下扶南記云此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而蒂牢不可摘取以刀斧剗音利取其枝故以為名耳其木高三丈自徑尺至于合抱頗類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋其木性至堅勁工人取其根作阮咸槽及彈碁局木之大者子至百斛其花青白狀若冠之蕤纓實如松花之初生者殼若羅文初青漸約肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月盛熟時彼方皆燕會其下以賞之實主極量取數雖多亦不傷人小過度則飲蜜漿一盃便解荔枝始傳於漢世初惟出嶺南後出蜀中蜀都賦所云旁挺龍目側生荔枝是也蜀中之品在唐尤盛白居易圖序論之詳矣今閩中四郡所出特奇而種類僅至三十餘品肌肉甚厚甘香瑩白非廣蜀之比也福唐歲貢白暴荔枝并蜜煎荔枝肉俱為上方之珍果白暴湏佳實乃堪其市貨者多用雕色荔枝入鹽梅暴之成而皮深紅味亦少酸殊失本真凡經暴皆可經歲好者寄至都下及關陝河外諸處味猶不斂百果流布之盛皆不及此又有焦核荔

枝味更誇美或云是木生於陽結實不完就者曰暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者木上亦自難得其獨嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥治元光海上方治喉腫痛以荔枝花并根共十二分以水三升外煮去滓含細嚥之差止

器

味酸子如卵廣州記云荔枝精者子如雞卵大殼朱肉白核如

器雞舌香廣志曰荔枝名青實如雞子核黃黑似熟蓮子實白如脂肪甘而多汁美極益人也

海藥云

謹按廣州記云生嶺南及波斯國樹似

勞闊並宜食之嘉州已下渝州並有其實熟甘美荔枝熟人未採則百蟲不敢近人才採之烏鵲蝙蝠之類無不殘傷故採荔枝者日中而衆採之荔枝子一日色變二日味變三日色味俱變古詩云色味不踰三日變白安宇荔枝詩云香味三日變今瀉人食之多則發熱

瘡

微溫食之通神益智健氣及顏色多食則發熱

衍義曰

荔枝藥品中今未見用惟崔元亮方中收之果實中為上品多食亦令人發虛熱此物喜雙實尤可愛

本朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生置之長安也以核熳火中燒存性為末

新酒調一枚末服治心痛及小腸氣

乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利

小便多食令人脾冷發癰癬大腸洩又有沙柑青柑山

柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用

其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未

經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南

附今

無毒皮炙作湯可解酒毒及酒渴多食發除醉

陳藏器皮為末酒下

聖惠方治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方取柑皮二兩焙乾為末以三錢七

水一中盞煎三五沸入鹽如茶法服妙

獨醒湯柑子皮去瓤

多令人肺燥冷中發痃癖

圖經文具橘柚條下

方少焙乾為末入鹽點半錢

衍義曰乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦

橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方官

名不同亦互有緊慢者人食其肉多致藏寒或成冷

石蜜乳糖味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利

出益州及西戎前煉沙糖為之可作餅塊黃白色

云用水牛乳米粉和煎得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝蜀青云用牛乳汁和沙糖煎之並作解堅丸此石蜜其實乳糖也前卷已有石蜜之名故注心絳為乳糖唐本先附目尚湯


文具詳下

說云石蜜治目中熱膜明目蜀中波斯者良東吳亦有並不如此處者此皆前甘蔗汁及牛乳則易細白耳和棗內及巨勝末丸每食後含一丸潤肺氣助五臟津

圖經文具詳下

衍義曰石蜜川浙最佳味厚其次之前煉成以鋤象物達京都至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及絲裹外用石夾埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黃白色者今人又謂之捻糖易消化入藥至少

甘蕉



甘蕉味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸

陶隱居

馬王堆漢墓竹簡云今出江東為勝廬陵亦有好者廣州一鍾數年生皆如大竹長丈餘取汁以爲沙糖甚甘人又有軟蕉節疎而細亦可啖也今微別

本注云甘蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南為勝並前為沙糖今江東甚多而劣於蜀者亦甚計美時用前為稀沙糖也今會稽作乳糖殆勝於蜀去煩止渴解酒毒自高麗等國按蜀本圖經云藥似荻高丈許有竹蔗二種竹蔗或蘆山江南荻蔗莖細出江北霜

下後收莖其汁為沙糖練沙糖和牛乳為石蜜並好曰華子云今利大
小腸不氣痢補脾消痰止渴除心煩熱作沙糖潤心肺殺蟲解酒毒

臘月寄黃坑中患天行熱紅人絞外服甚良也

圖經曰

甘蔗舊不著所出州土陶隱居云

今江東者為勝蘆陵亦有好者廣州種數年生皆如大竹長丈餘今江浙閩廣蜀川所生大者亦高丈許葉有三種一種似荻節疎而細短謂之荻蔗一種似竹長筍其汁以

為沙糖皆用竹蔗泉福吉勝州多作之練沙糖和牛乳為石蜜即製惟蜀川作之荻蔗但甚酸或云力可煎稀糖商入販貨至都下者荻蔗多而竹蔗少也

食療

主補氣兼下氣不外服可共酒食發疫

外臺秘要

主卒乾嘔不息甘蔗汁溫令熱服半升服之

肘後方

主卒乾嘔不息又以生薑汁一升二味相和分為三服

食醫心鏡

理正氣止煩渴

梅師方

挫斯蔗而療渴

張協都蔗賦

若漱醴而含齧

衍義曰 甘蔗今川廣湖南江西浙江東西皆有自八九月已堪食收削甘蔗去皮食後嗽之至三四月方酸壞石蜜少糖霜皆自此出惟川浙者為勝

食療云

主胃反朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者以甘蔗汁七外生薑汁一升二味相和分為三服

圖經

水中浦脾利大腸解酒毒朝吐又以生薑汁一升外服並差

食醫心鏡

理正氣止煩渴

梅師方

挫斯蔗而療渴

張協都蔗賦

若漱醴而含齧

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之筭音甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有之

衍義曰

唐本先附甘禹錫等謹按孟說云沙糖多食令人痛不與鯉魚同食成瘡蟲又不與葵同食

生流澼又不與笋同食使筭不消成癥身重不能行履耳

甘蔗條下

食療云

主心熱口渴多食生長蟲消肌

圖經

具治腹

子母秘錄

緊白

糖以酒二升者

服不過再差

桺

音甲柿味甘寒無毒主厭石蜜發熱利水解酒熱以食

令人寒中去胃中熱生江淮南似柿而青里闊居賦云梁侯烏桺之柿是也

今附巨禹錫等謹教曰華子云桺柿止渴則損齒土制水也及生柿

蟲裸蟲屬土故因甘遂生

同食令人腹疼并大瀉矣

圖經

文具柿潤心肺除腹藏冷熱作深甚妙不宜與蟹

同食令人腹疼并大瀉矣

圖經

除丁

卷之三

三

核桃人



下品 桃核人味苦甘平無毒主瘀血血閉瘕邪氣殺小蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通

月水止痛七月採取人陰乾○

桃花殺疰惡鬼令人好顏色味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下

三蟲悅澤人面三月三日採取陰乾○

桃梟味苦微

溫手殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不祥

一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正月採

之○桃毛王

堅閉刮取毛用之

開闢等謹按本經月閏通用藥云桃毛平

惡不祥食桃樹蟲也○莖白皮味苦辛無毒主除尸蟲

鬼中惡腹痛去胃中熱○葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲膠鍊之主保中不飢忍風寒○實味酸多

食令人有熱生太山川谷

開闢等謹按本經月閏云今處處有京口者亦

其人不堪用排人作隔乃言令排膠入仙家用三月三日採花亦供丹方所須方言服三拗排花盡則面色如排花人亦無試之者服

术人云禁食排也唐本法云排膠味苦平無毒主下石淋破血中惡

症排花主下惡氣消腫滿利大小腸目開闢等謹按本經月閏云排人使排符主中惡孟說云排人溫殺三蟲止心痛又女人陰中生瘡如

蟲癰疼痛者可生擣築綿裹內陰中日三四易差又三月三日牧花暖乾杵末以水服二錢七小兒半錢治心腹痛又充瘡後未開花陰乾與桑椹赤者等分作末以猪脂和先用灰汁洗去瘡痂即塗藥又

云挑能發丹石不可食之生者尤損人又白毛主惡鬼邪氣膠亦然
又挑符及奴主精魅邪氣符者汁飲之奴者丸散服之挑人每夜齧
一顆和蜜塗手面良日云挑熱微毒益色多食令人生熱樹上
自乾者治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血治心痛酒摩暖服之又云挑
葉暖治惡氣小兒寒熱客忤挑毛摩崩中破癩氣挑蠭食之肥悅人顏色也

圖經曰

挑核人并花實等生泰山今處處皆

有之京東陝西出者尤大而美大都佳果多是圃人以他木接根上
栽之遂至肥美殊失本性此等藥中不可用之當以一生者為佳七
月採核破之取人陰乾今都下市賣多取炒貨之云食之亦益人然
亦多雜接實之核為不堪也千金方挑人煎藥婦人產後百病諸氣
取挑人一千二百枚去雙人尖皮熟搗令極細以清酒一斗半研如
麥粥法以極細為佳內小項處瓶中密以麪封之內湯中煮一復時
藥成溫酒和服一匙日再其花三月三日採陰乾太清卉木方云酒
漬挑花飲之除百疾益顏色崔元亮海上方治面上瘡黃水出并眼
瘡一百五日收取挑花不計多少細末之食後以水半盞調服方寸
匕日三甚良其實已乾著水上經冬不落者名挑鼻正月採之以中
寶者良胡治中惡毒氣在有挑女湯是此也其實上毛刮取之
以治女子崩中食挑木蟲名挑蠭食之悅人顏色墮白皮中惡方用
之藥多用作湯導藥標嫩者名挑心尤勝張文仲治天行有支太醫
挑葉湯薰身法水一石煮挑葉取七升以爲鋪席自圍衣被蓋上安
桃湯於床簷下乘熱自重停少時當雨汗出遍去湯待歇速粉之并
灸大椎則愈陳康丘基法經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風

法以問張扁曲曾有拔極汗出用單簾中冷但苦寒倦四日凡八過
發汗汗不出燒地挑葉蒸之則得大汗被中傅粉極燥便差後用此發
汗得出甚發者燒地良久歸除去火可以水小洒取蠭沙若挑葉拍
葉糠及麥麸皆可趣用易得者牛馬糞亦可用但臭耳取挑葉欲落
令過此法舊云出所河南山挑皮亦主病集驗肺熱悶不止脣中喘
急擗客熱往來欲死不眠服藥泄胃中喘氣用挑皮芫花各一外二
物以水四外貲取一外五金去滓以故布巾內汁中薄脣溫四肢
不盈數刻即歇又必効方蠭毒用大戟挑白皮東引者以大火烘
之班獨去足廻然三物等分擗篩為散以冷水服半方寸匕其毒即
出不出更一服蠭並出此李銳州法云奇効若以酒中得則以酒服
以食中得以飲服之挑膠入腹食蠭仙方皆其法取膠三十斤絹袋
盛擗木灰汁石中炭三五沸并袋出掛高處候乾用費如此三度
止暴暑節木炭和空腹酒下悟洞子大二十九服當仙去又主石
漏古今錄驗著其方云取挑木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三
合和為眼日三當下石石盡即止其竇亦不可多食喜令人熱發人同於
任用之扎勿使子染者能使人臯動不止目黃丸用揀令淨以絹袋
盛於簷下懸令乾去壅了用壯觸體勿使乾挑子其鬼體只是子
禁挑花結子在樹上不落者乾然於十一月內採得可爲神妙凡修

事以酒拌蒸從巳至未服

乾以銅刀切焙取肉用

補心虛治健忘令耳目聰明用

子金

又方 治伏梁氣在心

下結聚不散用桃

千金翼同 妥三兩爲末空心溫酒調二錢七

又方 治小兒中蠱毒

目青黃淋露骨立病變無常方以排

樹寄生二兩末如茶點服日四五服

外臺秘要 治霍亂腹痛吐

一切以水五外煮取一

又方 治虛熱渴桃膠人一

外六合分湯二服

如彈丸含之佳

又方 百二十枚去皮

雙人留尖并和爲九平升水頓服令盡服訖量性酌酒

治偏風半身不遂及癱症方桃人一千七百枚去雙人小皮以好酒

一斗三外浸經二十一日出日乾杵令細作丸每服二十粒還服桃

酒服

又方 治三蟲絞藥又方 淚清桃仁飴之除口病好

易取汁外飲之容色又桃人服之長生

又方 治少小鵩耳桃人

熟末以糲裹塞耳

又方 人有食桃病時已晚無復咬

千金翼 累年去風令光潤則人百合去皮川椒米飯燒研

之令細以製水搗取汁令桃人盡仰仰微溫用漱

汗出良 又方 治產後遍身如粟粒熱如火

以善日

又方 治頭瘡片猪脂調傅

吐病 又方 就亂糰間得裏桃核服之轉

即愈

千金翼 延年去風令光潤則人百合去皮川椒米飯燒研

之令細以製水搗取汁令桃人盡仰仰微溫用漱

汗出良 又方 治諸蟲入耳取桃

外服 葉熟搗塞兩耳出

孫真人 治胎下血不出取桃搗上乾不落桃子燒作

梅師方 治諸蟲入耳取桃

又方 治狂狗咬人取桃

又方 白皮一瓣水三升

煎取一通桃葉取汁和

商施 又方 以五月五日取東向排故日未出時
妙 作三寸木人着衣帶中令人不忘

病者葛云即是五尸之一注又挾諸鬼邪爲祟其病變動及有三十
六種至九十九種大略使人寒熱沉沉默默不知其所苦而無數
不還累年積月漸就轉滯以至於死死後復傳傍人乃至滅門譬如
此候者便宜急治桃人五十枚研末以水煮取四外一服盡當吐
病不盡三兩日 又方 卒心痛東引能挾一把切以
不吐再服也

飲四五合稍增至一升 方 治小兒卽癩并桃人傳
七枚去皮尖熟研末一合 頤服良亦可治三十年患

葛氏 又方 器中密封之蒸一次日乾綿袋盛

之亦治婦人瘞腫癰庠 又方 蒸之內小口器中以下部漏上
坐瘞 又方 治胎下血不出取桃搗上乾不落桃子燒作

瘞已汎洞者並皮葉杵桃人傳
自出 漢去滓着盆中瀆之有蟲出

瘞病後下部生瘞瘞桃白皮如稀餳 又方 治腸痔大腸常血并桃葉一
內少許熊膽研以綿蘸藥內下部瘞上 部

煎取一 桃味辛肺病宜食又桃味 又方 治狂狗咬人取桃

酸無毒多食令人有熱 又方 主大小腸並不

腰痛

外冬

又方

主卒患癰疽子不痛

方取樹皮貼上

灸二七壯

又方

主卒解惡瘡不

用桃樹皮

者取桃皮作酒內

醫心鏡

主上氣咳嗽脅滿氣喘

方挑人三兩去皮

又方

備急鬼疰心痛

人食

戶鬼氣咳

注氣血不通日漸消瘦

桃人一大兩

又方

凡風

去皮尖杵碎以水一升半煮汁着米煮粥空心食之

腫疼癢痛或牽引小腹及腰痛挑人一小合黃粥食之

又方

小毒

寒類要

根切細如筋若銳股以下者搘以水一大升外煎取

小

外適溫空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散唯服最後差百日

方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忘

食熟麵猪魚等肉此

方

治溫病令不相染方

人搗之才家秘方

方

治天行瘧下部生瘡濃煎桃枝如

糖以通下部中若口中生瘡含之

方

治天行瘧方

人搗之又方小兒瘡初起疎繫似火瘡

方

小兒傷寒苦得時氣能築三兩杵和水五升煎十

沸取汁日五六遍淋之後燒雄鼠糞一枚服妙

方

治陰陽挑人搗之又方名爛瘡

桃人同膚傳上

方

小兒瘡初起疎繫似火瘡

行桃枝細剉黃浴之

方

小兒瘡初起疎繫似火瘡

桃板貼戶上道通還以紙寫之貼戶

方

小兒瘡初起疎繫似火瘡

桃膠以桑灰漬之服百病

方

令人成淋病抱朴子

桃膠以桑灰漬之服百病

方

數月斬穀荆楚歲時記

謝通登羅浮山見數童子以朱書

方

周禮中會同充革申臯則以七敷辟盟遂役之替牛

馬刺荆注鬼所畏也

方

宋王微

兒定仙人知明門胡不墮年

方

抱朴子

桃膠以桑灰漬之服百病

方

李接桃而本周禮中會同充革申臯則以七敷辟盟遂役之替牛

方

五木之精也今之作此符

着門上厭邪氣此仙木也

方

家語襄公曰請用孔子先秦而後食

方

別藝幕所以掃不祥

二言山大谷之民熟以爲飯也術曰

方

者所以雪桃非爲食之也

桃左右皆掩口而笑公曰秦

方

上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閭白鬼無道理者縛牛

以葦索而飼虎今人作桃符板云左神荼右鬱壘者以此

方

用桃人一百箇夫皮尖於乳鍤中細研成膏不得犯生水候成膏入

黃丹三錢丸如梧桐子大每服三丸當發日面比用溫酒吞下如不

方

飲酒井花水亦得五月五

日午時合忌雞犬婦人見

方

衍義曰小於衆桃不益脾有小點而

光如金油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪咀惟
堪取人唐文選謂山桃發紅萬者是矣又太原有金桃色深黃西京
有崑崙桃肉深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此
數種入藥惟以山中自生者爲正蓋取走泄爲用不取肥好者如傷
寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血用桃人三十箇湯去
皮尖皴炒赤色別研蜜出三十枚去水蛭二十枚各炒川大黃一
兩同爲末再與婦人同擣令勻煉蜜丸如小豆大每
服二十九桃人陽下利下瘀血惡物便愈未利再服

杏核人



杏核人味甘苦溫冷利有毒氣雷鳴喉瘻
丁氣壅塞金瘡寒氣驚癇心下煩熱風氣去來

時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩者
殺人可以毒狗○花味苦無毒主補不足女子傷中
寒熱癰厥逆○實味酸不可多食傷筋骨生晉山川

谷得火良惡黃芩黃耆葛根解錫毒畏襄草陶隱居云處處有藥
中多用之湯浸大尖皮熬令黃白禹錫等譜授華生論云杏人
能治腹痺不通發汗主溫病治心下急滿痛除心腹煩悶悶肺氣數
數上氣喘促入天門冬前門肺可和酪作湯益潤聲氣宿即動冷氣
孟詵云杏熟面膚者取人大皮搗和雞子白夜因塗面明早以炭清
酒洗之人患卒症取杏人三分去皮尖熬別杵桂一分和如泥取李
核大綿裹含細細咽之日五夜三謹按心腹中結伏氣杏人橘皮桂
心調梨勒皮爲丸空心服三十九無忌又燒令金盡研如泥綿裹內
女人陰中治蟲疽陳藏器云杏人本外殺蟲燒令雀未盡細研如
脂物裹內塞齒孔中亦主產門中蟲瘡癩不忍者去人及諸畜瘡中
風取人去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如指大舍之利喉咽去喉
蟬癩唾液喉中熱結生瘡杏酪濃煎如膏服之間五藏去痰嗽生
熟喫俱得半生半熟殺人日華子

云杏熟有毒不可多食傷神李時珍曰杏核人生晉山川山谷今處處
者名金杏相傳云種出濟南郡之分流入山彼人謂之漢帝杏今近都
多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味醇不及金杏杏子入藥今

以東來者為勝仍用家園種者山杏不堪入藥五月採破核去雙人
者古方有單服杏人修治如法自朝蒸之至午而止便以慢火微烘
至七日乃收貯之每旦腹空時不約多少任意取之積久不止駐頸
延年云是夏姬本然杏人能使人血溢少悞之必出血不已或至委
頓故近人少有服者又有杏酥法去風虛除百病擣爛杏人一石以
好酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻封於新瓮中
勿洩氣三十日看酒上酥出即掠取內甕器中貯之取其酒滓圍如
梨大置空屋中作格安之候成蛤脯狀旦服一枚以前酒下其酒任
性飲之杏花乾之亦入藥杏枝主隨傷取一握水一大外煮半下酒
三合分再服大效其實不可多食傷神損筋骨屬禹錫傳信方治
補肺丸杏人二大外山者不中擣却雙人及陳膜以童子小便一斗
浸之春夏七日秋冬二七日并皮尖於砂盆子中研細濾取汁煮令
魚眼沸候軟如鷄糊即成仍時以布袋下之如取乘藥法
任意茶酒下忌白水粥只是爲米泔耳自初浸至成常以紙蓋
之以畏塵土也如無馬尾羅即以鹿布袋下之如取乘藥法
或鹿布下之日暴通丸即丸服之時食前後總須服三十九五十九
浸之春夏七日秋冬二七日并皮尖於砂盆子中下東流水煮從巳至午其杏人色
烏頭三合水旋添勿令闊免反血爲妙也

公云 凡使須以沸湯浸少時去皮膜去尖等作兩片用白火石并
渴黃則去尖然用每條一斤

烏豆杏人三件於鍋子中下東流水煮從巳至午其杏人色
烏頭三合水旋添勿令闊免反血爲妙也

瘞盡去皮以舌舐裏之咬於所患齒下其痛
便止熏諸蟲出并去風便差重者不過再服

外臺秘要 治偏風主熱風頭痛又燒令半身不

食療云 治偏風主熱風頭痛又燒令半身不

又方 治頭面風眼瞼牽塞眼暗冷泪杏仁熬黑杵膏傳之

又方 治頭面風眼瞼牽塞眼暗冷泪杏仁熬黑杵膏傳之

又方 治頭面風眼瞼牽塞眼暗冷泪杏仁熬黑杵膏傳之

又方 治頭面風眼瞼牽塞眼暗冷泪杏仁熬黑杵膏傳之

又方 治頭面風眼瞼牽塞眼暗冷泪杏仁熬黑杵膏傳之

汗盡三度差 治小兒大人效速上氣杏人三分內杏人杵令得所更內一分杵如膏又內一分杵熟止先食

方 治喉瘡杏人熬黑杵丸如彈子含蘇其汁爲末帛裹舍之亦得

又方 治喉瘡杏人熬黑杵丸如彈子含蘇其汁爲末帛裹舍之亦得

又方 治喉瘡杏人熬黑杵丸如彈子含蘇其汁爲末帛裹舍之亦得

又方 治喉瘡杏人熬黑杵丸如彈子含蘇其汁爲末帛裹舍之亦得

汗盡三度差 治小兒大人效速上氣杏人三分內杏人杵令得所更內一分杵如膏又內一分杵熟止先食

舍之

又方

治諸牙斷疼杏人一百枚去皮大兩人以鹽方寸

水研煮令沫出舍之未盡吐却更舍之三度差

肘後方

燕汁

七水研煮令沫出

舍之未盡吐却更舍之三度差

人杵杵骨傳之良

治穀道赤痛熬杏

心下堅或脹口乾忽發熱妄語

方杏人一升去皮水三升煎沸去滓取汁爲三服

下肉爲度

人杵杵骨傳之良

四度易之或竄頭裏塞之亦妙

欲好聲杏人一升熬去皮尖酥兩蜜少許

爲丸如梧桐子大空心米湯下十五丸狗咬去皮尖杵傳

野雞病杏人一升去皮尖雙人搗碎水三升研濾

前以杓攬勿住手候三分減二冷呷之不孰及熱呷即令人吐

治久患肺氣喘急至効杏人去皮尖二兩童子小便浸一日

解食之令氣壅身熱

又方

主五痔下血不止去尖皮及雙人水三升研

分食後溫服甚者不過三劑

差永不發動忌腥物

又方

主氣喘促浮腫小便澀杏人一升

解食之令氣壅身熱

又方

杏味苦心

病宜服

傷筋損

又方

主氣喘促浮腫小便澀杏人一升

解食之令氣壅身熱

又方

杏核人

令內煩悶取東引

又方

治金瘡中風角弓反張以杏人碎之

令溜絞取脂服一小升兼以瘡上摩勑

又方

能下氣主

除風去

又方

喙除風去

去皮尖炒黃米飲服之差

欄勿使人跡畜獸踐踏只元旱即泉源水涸潤其樹下初春有霜雪即樹下燒火以燉之恐損花苞莖至五月杏熟收取當月旬內自落者去核取人六斗以熱湯退皮去雙人取南流水三石和研取汁兩石八斗去滓并小美者亦得取新鐵釜受三石已來作罈須具五嶽三台形用朱砂圖畫之其罈通四脚天地五寸着鑄不得絕綢恐下灰不得其釜用酥三斤以擦火及炭然釜少少磨三斤酥盡即內釜中釜上安盆上鑄孔用第紵懸車轄至釜底其孔以希繩塞勿令泄氣初着糖火并輓牛糞火一日三動車轄以叢其汁五日有露液生十日白霜起又三日白霜盡即金挖出若見此候即知丹霜成開盆用炭火炙乾以雄雞翎掃取以棗肉和爲九如梧桐子大釜中獨角成者爲上其釜口次也丹滓亦能治冷疾服丹法如人喫一斗酒醉即契五外與一外者只契半外下藥取滿日空心燒酒服三九至七日宿疾除愈聲啞目擊破瘀氣野雞癆氣風癰痃氣瘡腫萬病皆除愈頭白却黑齒落更生張先師云二兩爲一劑一劑延八十年兩劑延二百四十年三劑延靈不死若爲天仙一萬年永居房室若爲地仙五千年三年忌房室若爲人仙一千五百年百日忌房室居士上表十月已後泥爐爲雷息之時亦不用車馬轎駕何以十月造天雷二月起八月息初造丹時祭五嶽神仙地祇并取童子看火候二十四氣五星五行陰陽十二時取此氣候用火丹乃成矣聖所服皆致長生久壽壯人不能常服或言此藥無効若精心確志必就神仙行義曰杏核入大傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛裹定至差無苦又湯大皮研一升以水一升半飴

衍義曰

繫定至差無苦又湯大皮研一升以水一升半飴

安石榴



臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

復敍取稠汁入生蜜四兩川草一莖約一錢銀石器中慢火熬成稀膏燒器盛食後夜間入少許沸湯點一匙七服治肺燥喘熱大腸秘潤罩五藏如無上證更入益黑力佳杏實本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱小兒尤不可食多致瘧癱及上鬲熱致蓄爲乾果其深褐色核仁而味者爲金杏此等須接其他皆不遠也如杏輩只可收人又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸

安石榴味甘酸無毒主咽喉燥渴損人肺不可多食酸實殼療下痢止漏精東行根療蛇蟲寸白

愛故人多植之尤爲外國所重入藥惟根殼而已其味有甜醋藥家用醋者子爲服食者所忌

自摘錫等譜校蜀李圖經云子味甘酸其

鴻臚居云石榴以花赤可

酸者尤能止癆。《藥性論》云：石榴皮使味酸無毒，能治筋骨風、腰脚不遂，行步攀急，疼痛。主泄腸止赤白下痢，一方取汁止目淚，下治漏精。根青者入染長方用，用臘藏器。云：石榴本功外東引根及皮，主蛇蟲前服子止渴，花葉乾之為末和鐵丹服之一年，變毛髮色黑如漆。鐵丹飛鐵為丹亦鐵粉之屬是也。《孟說》云：石榴溫多食損齒令黑皮炎，令黃柏末以棗肉為丸空腹三九日二服治赤白痢，腹痛者取醋者一枚，并子搗汁頓服。段成式《酉陽雜俎》云：石榴甜者謂之天漿，能理乳石毒。陸機與弟雲書云：張騫為漢使外國十八年得塗林安石榴是也。今處處有之，一名丹若，廣雅謂之若榴。木不甚高，大枝柯附幹自地便生，作叢種極易息折。其條盤土中便生花有黃赤二色實亦有甘酢二種，甘者可食，酢者入藥多食其實則損人。肺東行根并殼入殺蟲及雜鬚髮口齒等，葬其花百葉者，主心熱吐血及衄血等，乾之作末咬鼻中立差。崔元亮海上方療金瘡刀斧傷破血流以石灰一升，石榴花半斤搗末取少許傅之，捺少時血斷便差。又治寸白蟲，取醋石榴根切一外，東南引者良。二升三合者取八合去滓，著少米作稀粥，空腹食之即愈。下又一種山石榴形頗相類而絕小，不作房，生青齊間甚多，不入藥。山石榴蜜漬以當果或寄京下甚美。

公云 凡使皮葉根勿令犯鐵，若使石榴殼不計乾濕先用蜜水浸一宿至明灑出其水，如墨汁，若使枝根葉並用漿水浸一宿可。

肘後方 治赤白痢。石榴皮燒赤為末服，方寸匕。

圖經曰 安石榴舊不著所出州土，或云本生西域。

百一方 治丁腫以雷公藥。

又方 治吐血，妙無比。以石榴花作末吹在鼻孔上，作孔如大窟窿子，內米醋滿石榴中，却以麝子大留，蓋前有血令人面色黃石，前法佳。

古今錄 治吐血，妙無比。以石榴花作末吹在鼻孔上，作孔如大窟窿子，內米醋滿石榴中，却以麝子大留，蓋前有血令人面色黃石，前法佳。

十全方 治吐血，妙無比。以石榴花作末吹在鼻孔上，作孔如大窟窿子，內米醋滿石榴中，却以麝子大留，蓋前有血令人面色黃石，前法佳。

廣利方 治吐血，妙無比。以石榴花作末吹在鼻孔上，作孔如大窟窿子，內米醋滿石榴中，却以麝子大留，蓋前有血令人面色黃石，前法佳。

衍義曰 治冷熱不調，或下帶水，或赤白青黃，脉不通，通用。

本草綱目 石榴子五枚合殼，春絞取二升，秋後經兩刑，自坼裂道家謂之三尸酒，云三尸得此果則醉。河陰縣最多，又有一種，白瑩澈如水晶者，味亦甘，謂之水晶石榴。惟酸石榴。

本草綱目 皮合，斷下藥仍以生木所結及收之，陳久者佳，微炙為末，以燒粟米飯為丸，梧桐子大，食前熟米飲下三十至五十丸，以知為度，如寒滑。

加附子赤石脂各一倍

梨



梨味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食

陶隱居云梨種復殊多並皆冷利俗人以爲快果不入藥用食之多損人也唐李主云梨削貼湯火瘡不爛止痛易差又主熱嗽止渴華主霍亂吐病不止煮汁服之宋本注云梨有數種其消梨味甘寒無毒主客熱中風不語又癆傷寒熱發解石熱氣驚邪嗽消渴利大小便又有青梨茅梨等並不任用又有桑梨惟蜜煮食主口乾生食不益人冷中不可多食

王漁陽云梨除客熱止心煩不可多食又卒欬嗽以一顆刺作五十孔每孔內以椒一粒以麪裹於熱火灰中煨令熟出停冷去椒食之又方去核內酥蜜麵裹燒令熟食之又取梨肉內酥中前停冷食之又搗汁一外酥一兩蜜一兩黃汁一外緩火煎細細含咽凡治欬皆須待冷喘息定後方食效

食之反傷矣令嗽更極不可救如此者可作羊肉湯餅餌食之便開少時又胃中痞塞結者可多食好生梨即通卒間風火音不語者生搗汁一合頓服之日再服止

王漁陽

云梨冷無毒消

圓經曰

梨舊不著所出州土今處處皆有而種類殊別醫家相承用剉梨搗薑而漿多味差短於乳梨其香則過之剉梨執風疾實藥多用之其餘水梨消梨紫梨赤梨甘梨藥兒梨之類甚多俱不謂入藥也梨葉亦主霍亂吐下煮汁服亦可作煎治風徐王效驗方主小兒腹痛大汗出名白寒病濃煮梨華一合以意消息可作三四服飲之大良崔元亮海上方療嗽單驗方取好梨去核搗汁一茶碗著椒四十粒煎一沸去滓加內黑鯈一大兩背泣細細含漱立定又治卒瘧亦同努肉坐卧痛者取好梨一顆搗絞取汁苦連三枝碎之以綿裹瀝令色變仰卧注目中又有紫花梨療心熱唐武宗有此疾百醫不效青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因纖實以進帝多食之解煩躁殊效歲久木枯不復有種者今人不得而用之又江寧府信州出一種小梨名鹿梨華如茶根如小拇指彼勦人取其皮治瘡癰及疥癩云甚效八月採近處亦有但採其實作

不能食用梨三枚切以水二升煮取

升一升外去滓入粳米一合煮粥食之

食療云不可食大忌

金瘡及產婦

梅師方

治霍亂心痛利

汗方取梨葉

拔一大握水一外煎取一外

錢相公

療癰瘍尿瘡黃水出
梨汁傳之乾即易

又方

三

服又云正月二勿食梨

金相公

濟梨汁傳之乾即易

又方

治中水毒取梨葉一

合頓服以意消息可作三四度飲之

比夢鎖言

有一朝士見眾奉御訴之曰

風疾已深請速歸去

所說同矣曰只有一法請官人試與消梨不限多少

且蘿不及酸汁而飲到家旬日唯喫消梨頓瘳矣

又方

把熟杵以酒一盞攪

橘袖耶其味相反而皆可於口魏文詔曰若薑可以解煩渴

動脾火則不及病用藥之意須當斟酌

惟病酒渴人食之甚佳然不能却疾

莊子

譬猶多

食則

林檎味酸甘溫不可多食發熱澀氣令人好睡發冷

又方

治水毒取梨葉一

合頓服以意消息可作三四度飲之

林檎



瘦生瘡癩脉閉不行其樹似柰其形圓如柰六月七月孰今在處有之

今附消渴

林檎夏熟小者味酸爲柰秋熟

子云林檎無毒下氣治霍亂肚痛消瘀

圖經曰

出州上今在處

林檎舊不著所

有之或謂之柰木似柰實比柰差圓六七月熟亦有甘酢二種甘者早熟而味晚美酢者苦晚熟則酸乃堪取病消渴者宜食之亦不可多反令人心中生冷瘡人亦可入治傷寒藥謂之林檎散

林檎散

治水毒以十枚半熟者

水煎取一外和

食醫心鏡

治水毒以水一

外煎取一外和

心食

瘡瘍羸瘦林檎末以和

醋傅上癬和移處就停之

蜀州李核人



李核人味苦平無毒主僵仆躰瘀血骨痛○根皮大
寒主消渴止心煩逆奔氣○實味苦除痼熱調中

附

云李類又多京口有麥李麥秀時熟小而甜脆核不入藥今此用
嫩熟所出南居李解核如杏子者為佳凡實熟食之皆好不可合雀
肉食又不可臨水上服之李皮水煎含之療齒痛佳今安別本注云
李類甚多有綠李黃李紫李生李水李並點食味極甘美其中人不
入藥用有野李味苦名郁李子核人入藥用之曰禹錫等謂此爾雅
云林無實李座接慮李駁赤李釋曰李之無實者名作郭云一名趙
李座接慮李郭云今之麥李與麥同熟因名云李之子赤者名駁
性論云李核人臣治女子小腹腫滿土膝折骨疼肉傷利小腸下水
氣除腫滿又云李根皮使苦李若入用味鹹治脚下氣主執毒煩躁
根黃汁止消渴云李子女人卒赤白干取李樹東面皮去皴皮
灸令黃香以水三外煮汁去滓服之日再驗詳按生子方去骨節間
勞熱不可多食臨水食令人發癢瘡又牛李有毒煮汁使濃含之治
風齒脊骨有宿毒可後摩此汁更空腹服一盞其子中人主皺脹研
和麵作餅子空腹食之少頃當寫矣華子李溫無毒益氣多食令
人虛熱又云李樹根涼無毒主赤白痢濃煎
服華平無毒治小兒壯熱沾灰鹽糊作浴湯
今處處有之李之類甚多見爾雅者有休無實李李之無實者一名
趙李李座接慮李即今之麥李細實有清道御麥同熟故名之

圖經曰

皆所出川土

孫真人肝病宜食食醫心

鏡李味酸無毒主除固執調中黃帝

云李不可和蜜食食之損五臟

衍義曰

李核人其窠人者高及大今醫家少用實合漿水食令人

黃李散見書傳美其味之可食陶隱居云皆不入藥用用姑孰所出
南居李解核如杏子者為佳全不復識此醫家但用核若杏子形者
根皮亦入藥用崔元亮海上方治面黑子取李核中人去皮細研
以雞子白和如稀鴨壅至晚每以淡醬水洗之後塗胡粉不過五六日有効慎風

野李宋書名郁李子核人入藥此自是郁李人別是一種在木部中第十四卷非野李也

楊梅味酸溫無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑
臨飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若
荔枝樹而葉細陰青其形似水楊子而生青熟紅肉
在核上無皮殼生江南嶺南山谷四月五月採

今附目禹錫等

胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取鹽燒
 令黑末斷煙和松脂研傅療癰瘍又和胡粉為泥拔
 白鬚髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉
 頭風故也去五痔外青皮染髮及帛皆黑其樹皮止
 水痢可染褐仙方取青皮壓油和脣糖香塗毛髮色
 如漆生北土云張騫從西域將來其木春斫皮中出
 水承取冰頭至黑今附周易錄等譜按孟說云胡桃不可多食經脉相而脉黑髮又服法初日一顆五日加一顆至二十顆止之常服骨肉細膩光潤能養一切老病疾
日華子云潤肌肉益髮食酸齒齒細解之
圖經曰亦有房秋冬熟時採之性熱不可多食補下方亦用之取肉合破故帝擣篩蜜丸朝服梧桐子大三十九又齊壓楔損傷擣肉和酒溫頓服便差崔元亮海上方療石淋便中有石子者胡桃肉一升細米黃梨搗一升外搗和頓服即差實上青皮染髮及帛皆黑其木皮中水春斫取冰頭至黑此果本出羌胡漢張騫使西域還

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

實甘者其

食療 溫和五藏腹胃除煩憊惡氣去痰實亦不可以食 摘齒及筋皮根煎湯洗惡瘡疥癬忌生葱也甚能消下痢又燒爲灰亦消下痢甚酸美小有勝白梅又蒸令人煩憊好食斯物也 **陳藏器** 止渴張口空云地瘴無 **圖經** 文具梅實條下 **後方** 主一切傷損不可者瘡和盐核杵之如泥成挺子竹筒中收遇破即填小可即停之此藥之外神聖 **宋齊丘化書** 止血生肌無瘢痕絕妙梅接杏而本強

胡桃



始得其種植之秦中後漸生東土故曰陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡桃大而皮脆急扳則碎江表亦有之梁沈約集有謝賜樂遊園胡桃營乃其事也今京東亦有其種而實不佳南方則無取胡桃穰燒令黑

并如脂傅瘡上

衍義曰

胡桃發風熱名之間甚多外有青皮包之胡桃乃核也核中穰為胡桃肉須如此說用時須以湯剝去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒痘風鼻上赤將橘子核微炒為末每用一錢匕研胡桃肉一箇同以溫酒調服以知為度

獮猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動液辟壓丹石下淋熱壅反胃等取汁和生薑汁服之一名藤梨一名木子一名獮猴梨生山谷藤生著樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺蟲煮汁飼狗療癆也

藏器

味鹹溫無毒主骨節風癱緩不隨長年癰白野雞肉痔病調

中下氣皮中作唇膜中汁至滑下石柏主胃附取汁和生薑

附

陳

升服食療

候氣火之症瓢和蜜煎作煎大人之佳煩熱久食之得令人冷能止消渴

衍義曰

獮猴桃今衣臘南山甚多食之解寶熟過多則令人藏

條柔弱高二三丈多附木而生淺山

傍道則有存者深山則多為猿所食

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不飢至新羅如小栗三角其中人香美東夷食之當果與中土松子不同

分附目禹錫等諸

曰華子云松子逐風

寒氣虛羸小氣補不足閭皮膚肥五臟東人以代麻腐食用

海藥云

去皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子

似巴豆其味不厚多食發熱毒松子味甘美大溫無毒主諸風溫腸胃久服輕身延年不老味與卑占國松子之相似其偏桃人用與比桃人無異是也

柰味苦寒多食令人臚

音張病人尤甚

陶隱居云江南

曲良曰作脯不宜人有外癰相似而小亦恐非益人也分注有小毒主耐飢益心氣臣烏鵲等著按孟法云柰主脯中膳諸不足氣和脾卒

惠食後氣不通生搗汁服之

日華子

圖經

文獻林

食醫心鏡

云柰冷無毒治飽食多肺壅氣脹
柰子味苦寒滋無毒主忍飢益心氣多食虛脹

菴羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食良令人患黃病

樹生狀若林檎而極大今附臣禹錫等謹按陳士良云微寒無毒主婦人經脈不通丈夫營衛中

血脉不行久食令人不飢似茶葉可以作湯療渴疾前後已堪白色黃如鵝梨纔熟便驅入藥繼希用

衍義曰

菴羅果西洛甚多亦梨之類其狀亦梨先諸梨熟七夕

泉州橄欖



臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

橄欖音攬覽味酸甘溫無毒主消酒療鯁魚台音毒人
悞食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木核橄欖
薯魚皆浮出故知物有相畏如此也○核中人研傳
脣吻燥痛其樹似木核子樹而高端直其形似生訶
子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名波斯橄
欖色類亦相似其形核作二瓣可以蜜漬食之生薑

州今附臣禹錫等謹按孟珙云橄欖主鯁魚痘汗服之中此魚引子
毒人立死惟此木能解生嶺南山谷樹大數圍實長寸許其子先
生者向下後生者漸高八月熟蜜藏
橄欖甜同華子云橄欖開胃下氣止渴
德而高且端直可愛秋晚實成南人尤重之叫爵之滿口香久不歇
生取及煮飲並解消毒人誤食鯁魚肝至迷悶者飲其汁立差山野
中生者子繁而木峻不可攀緣但剥其根下方寸許內塗於中女子
膏落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠南人採得剉其皮葉煎之
如黑鰯謂之橄欖用膠船膏冰益乾牢於膠漆邕州又
有一種波斯橄欖與此無異但其核作三瓣可密漬食之
陳藏器

云樹大圓實長寸許南方人以爲果生實味酸南州異物志曰橄欖者漸高南方草木狀曰橄欖子大如棗八月熟生交趾生至八月乃熟其香橄欖木高大難採以鹽擦木身則其實自落海藥謹按異物志云生南海浦嶼間橘高丈餘其實如棗二月有花

衍義曰甘嚼汁嚥治魚鱗



榅桲

榅桲味酸甘微溫無毒主溫中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚生北土似楂子而小

今陞臣萬錫等謹按陳士良云發毒熱秘血脈同華子云除煩渴治氣

圖經曰

榅桲擣不著所出刑土今謂啖有之沙苑者更佳

其實大抵類楂但膚慢而多毛味尤甘治脅痛中積食去醋水下氣止渴故臥取一兩枚而寢生熟皆宜楂子處處有之孟州特多亦主霍亂轉筋近黃牙飲之可敵不平常食之亦夫心間醋皮皮肉傳瘡止黃水實初熟時真氣氣馥人將致衣笥中亦香少有不神者獨細言故臘根內

藏器云

樹如林檎花白綠色

衍義曰

肺花亦香白色諸果中惟此多生蟲

少有不神者獨細言故臘根內肥白人止飢調中開胃甚驗

鵝黃記按曰新羅榛子生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄭注禮云榛似栗而小關中鄜坊甚多

今附臣禹

肥白人止飢調中開胃甚驗

圖經文具栗條下

一十三種陳藏器餘

榛子味甘平無毒主益氣力寬腸胃令人不肌健行靈床上果子主人夜卧讌語食之差也

無漏子味甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損好

顏色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗海藥

云

樹若栗木其實如棗子有三角消食止嗽安羸悅人以服無損也

都角子味酸澁平無毒久食益氣止洩生南方樹高

丈餘子如卵徐表南方記云都角樹二月花花連著

實也

海藥云

謹按徐表廣州記云生廣南山谷二月開花至夏末結實如卵主益氣安神遺洩痔溫腸久服無所損也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文

林郎因以此爲名也

海藥云

又竹山亦出彼人呼榅桲是味酸香微溫無毒主水

木感子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷

為勝虛煩熱並宜生食散酒氣也

樹葉似棟子如橄欖而堅亦似棗也

摩厨子味甘香平無毒主益氣潤五臟久服令人肥健生西域及南海子如瓜可爲茹異物志云木有摩厨生自斯調研斗肥潤其澤如膏馨香馥射可以煎熬彼州之人仰以爲勝將謂國名也

海藥云

謹按波斯國物志云生西域二月開花四月五月結實如瓜許冷氣去酒氣

血生肌久服健人也

縣鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不卡破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶少患痢不問亦白膿血腹痛並癰者服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰睡去酒毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒爲末服之亦主喉中塞也鈎粟味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似粟而圓小

生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀
子小圓黑味甘久食不飢生高山子小圓黑又有櫧
諸子小於橡子味苦涩止洩痢破血食之不飢令健
行木皮葉煮取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月
不凋生江南子能除惡血止渴也

石都念子味酸小溫無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高
丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬爲粉
甘美益人隋朝植於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南
樹高丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷

海藥云

謹按劉蕡交州記云其實中有乳汁甜美香好微寒無毒主消渴煩熱鎮心久服輕身亦得悅人顏色也

韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如粟
皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺研皮肉白
脂如猪味甘酸亦云核如荔枝也

採子味甘溫平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去
嗽子似利生江南吳都賦云採擣藥霜是也

諸果有毒桃杏入雙有毒食未成核果令人發
癰節及寒熱又秋夏果落地爲惡蟲緣食之令人
患九漏桃花食之令人患淋李不可和雞子食
之患內結不消

重修政和經史證類備用本草卷第二十三

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第二十七

成都唐慎微續證類

醫藥圖書館藏書

敕校勘

菜部上品總三十種

五種神農本經

白字

七種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

洪云
唐附

二種今附

皆醫家家用有
效注云今附

十種新補

一種新定

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

冬葵子

根藥附

覓實

胡荽

子附新補

邪蒿

新補

同蒿

新補

羅勒

新補

石胡荽

新補

蕪菁

即蔓菁也

瓜蒂

花附莖續注

白冬瓜

白瓜子

甜瓜

藥附子附新補

胡瓜葉

亦呼黃瓜實附新補

越瓜

今附

白芥

子附新補

苦菜

苦藶續注

薺菔

即蘿蔔也唐附

菘

紫花菘續注

蜀葵

花附新補

龍葵

附葉

黃蜀葵花

定新

苦苣

新補

苜蓿

蘇

三種陳藏器餘

蕨

翹搖

甘藍

冬葵子



冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱羸瘦五
癃利小便療婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉輕
身延年生少室山十二月採之

黃芩爲之使

葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒
葉爲百菜主其心傷人

陶隱居云以秋擗葵覆養經水至春作子謂之冬葵多入藥用

至滑利能下石春葵子亦滑不堪餘藥用報故是常英勝葉尤冷利不可多食術家取此葵子微炒令燶音畢火散著濕地遍路之朝種暮生遠不過宿又云取半角馬蹄燒作灰散著於濕地遍路之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中又有胡荽莧臺白苣耶蒿並不可多食大都服藥通忘生菜爾佛家亦須忌食薰染不的知是何菜多言今芸薹憎其臭矣唐本注云羅勒比人謂之蘭香避石勒諱故也又薰渠者婆羅門云阿魏是言以草茹根似白芷取根汁暴之如膠或截根日乾並極臭西國持呪人禁食之常食中用之云去臭氣疚人重此猶俗中貴胡椒巴人重負鑿音鑿等非禁臺也臣禹錫等謹按藥性論云冬葵子甘滑平能治五淋主婦腫能下乳十根治惡瘡小兒吞錢不出煮飲之即出神妙若患天行病後食之頓瘳明又薰燒灰及搗乾莧末治金瘡黃汁能滑小腸單煮汁主治時行黃病孟詒云葵令主瘡瘍生身面上汁黃者可取根作灰和猪脂塗之其性冷甚熱食之令人熱悶甚動風氣久服丹石人時與一頓佳也冬月葵菹汁服丹石人發軾舌乾皴嘴每食後飲一盞便卧少時其子患瘡者吞一枚便作頭女人產時可煮頓服之佳若生時困悶以子一合水二外者取半外大滓頓服之少時便產曰華子云冬葵久服堅筋骨秋葵即月補早者俗呼為葵菜了生少室山今處處有之其子是秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵子占方入藥用最多者葵作菜始更山美大抵性滑利能宣導積壅服丹石人尤相宜夏汗孕婦臨產煮葵食之則胎滑易產暴乾葉及燒灰同作末主金瘡根主惡瘡小兒吞

圖經曰冬

葵

主患腫未得頭破者三日

錢煮汁飲之立出凡葵有數種有蜀葵爾雅所謂蒼古田切戎葵者是也郭璞云以葵華如槿華戎葵蓋其所自出因以名之花有五色白者主瘡瘍及邪熱陰乾末服之乍取花授手亦去瘡黃者主瘡癰乾末水調塗之立愈小花者名錦葵功用更論黃葵子主淋澀又令婦人易產又有終葵繁露者是也一名承露俗呼曰胡燕脂子可婦人塗面及作口脂又有菟葵似葵而果小狀若葵有毛汎而啖之甚滑爾雅所謂蓴蕘葵是也亦名天葵葉主淋澀熱結皆有功效故并載之

唐本注

此即常食者葵根也左傳能衛其足

食療

主患腫未得頭破者三日

後取葵子一百粒吞之當口瘡頭開又凡有難產若生未得者取一合擣破以水二升煮取一升已下只可半外去滓頓服之則小便與兒便出切須在意勿上廁昔有人如此立撲兒入廁中又細剉以水煎服一盞食之能滑小腸女人產時煮一頓食令兒易生天行病後食一頓便失目吞錢不出煮汁冷飲之即出無蒜勿食四季月食生葵令飲食不消化發宿疾又霜葵生食動五種留飲黃葵尤忌

惠心方

小兒發班散惡毒氣用生葵菜葉絞取汁少少與服之

外臺秘要

天行班瘡湧史

此惡毒氣永微四年此瘡自西域東流于海內但煮葵菜葉以蒜薑啖之則止

又方

治消渴利葵根五大斤切以水五升煮取

三升宿不食平

又方

治口吻瘡掘經年

千金方

小兒死腹中葵子末酒服方寸

七若口噤不開格口灌

治姪娠卒下血葵子一外水

又方

治姪娠卒下血葵子一外水五外煮取二外分三服差

之藥下即活肘後方同

又方

姪娠患淋葵子一外水三外煮取二

外分三服差

外分為二服無葵子用葵根一把

一外去滓服

不差更作

又方

治卒關格大小便不通支滿欲死葵子二外水四

經

驗後方

治一切癰腫無頭以葵菜子一粒新汲水吞下須臾

大便不通十日至一月

食已

葵能充脾氣又霜葵多食

必効方

治諸癰先以泔清溫洗

吐水葵合鯉魚食害人矣

必効方以綿拭水取葵菜微火

燒貼之瘡引膿不過二三百葉膿

盡即肉生忌諸雜魚蒜房室等

子母秘錄

小兒蓐瘡燒葵根未傳之炒

乳及癰葵莖及子

為末酒服方寸匕愈

產書

治倒生手足冷口噤以葵子炒黃搗末酒服二錢七則順

水吞三五枚遂作竅膿出

葵實



子葵菜子也四方皆有
苗性滑利不益人患癰
癰毒熱內攻木出膿者

水吞三五枚遂作竅膿出

孫真人

治

食已

吐水葵合鯉魚食害人矣

必効方

以綿拭水取葵菜微火

燒貼之瘡引膿不過二三百葉膿

盡即肉生忌諸雜魚蒜房室等

子母秘錄

小兒蓐瘡燒葵根未傳之炒

乳及癰葵莖及子

為末酒服方寸匕愈

產書

治倒生手足冷口噤以葵子炒黃搗末酒服二錢七則順

衍義曰

葵

冬

子葵菜子也四方皆有
苗性滑利不益人患癰
癰毒熱內攻木出膿者

水吞三五枚遂作竅膿出

紅



紫



覓實味甘寒大寒無毒主青盲白翳明目除邪利大
小便去寒熱殺蛇蟲久服益氣力不飢輕身一名馬
覓一名莫實細覓亦同生淮陽川澤及田中葉如藍

十一月採

閩隱居云李云即莧菜也今馬覓別一種布地生實至

當是白覓所以云細覓亦可食小酸恐非今覓實其覓實並冷利被霜乃熟故云十一月採又有赤覓莖純紫能療赤而不堪食藥方用覓實甚稀斷殺方中時用之唐本註云赤覓一名蘆音圓今覓實一名莫實疑莫字誤矣赤覓味辛寒無毒主赤痢又主射工

沙蟲此是赤葉莧也馬莧一名馬齒草味辛寒無毒主諸腫癰疣目

搗搗之飲汁主反胃諸淋金瘡血流破血癥癰小兒尤良用汁洗繫

脣面

炮馬汁射工

毒塗之差今按陳藏器本草云忌與鼈同食今以

惟人白二莧實入藥用按人莧小白莧大馬莧如馬齒赤莧味辛俱

別有功紫及五色二莧不入藥孟說云莧補氣除熱其子明日九月霜後採之葉亦動氣令人煩悶冷中損腹日華子云莧菜通九竅子

精圖經曰

莧實生淮陽川澤及田中今處處有之即人莧也經云

細莧亦同葉如藍是也謹按莧有六種有人莧赤莧白

莧紫莧馬莧五色莧令熟實細而黑主冒目黑花肝風客熱等紫莧

莧葉通紫矣人用染菜瓜者諸莧中此無毒不寒兼主氣痢赤莧亦謂

俱大寒亦謂之糠莧亦謂之胡莧亦謂之細莧其實一也但人莧小

而白莧大耳其子霜後方熟實細而黑主冒目黑花肝風客熱等紫莧

莧葉通紫矣人用染菜瓜者諸莧中此無毒不寒兼主氣痢赤莧亦謂

之花莧莧葉深赤爾雅所謂蕷亦莧是也根莖亦可糟藏食之甚美然

性微寒故主血痢五色莧令亦稀有細莧俗謂之野莧猪好食之又

名猪莧集驗方治衆蛇蟄人取紫莧搗絞汁飲一升滓以水和塗瘡上又射工毒中人令寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莧合莧

葉搗絞汁飲一升日再差

陳藏器云

陶以馬齒與莧同類蘇亦於莧條出馬齒功用按此二物厥類既殊合從別品

食療

葉食動氣令人煩悶冷中損腹不可與鼈肉同食生鼈癰又

取鼈甲如豆片大者以莧菜封裹之置於土坑內上以土蓋

之一宿盡變成鼈甲也又五月五日採莧葉和馬齒莧爲末等分調與妊娠服之易產

衍義曰

莧實入藥亦稀西又謂之人莧人多食之莧高而葉紅黃二色者謂之紅人莧可淹菜用

胡荽味辛溫

微寒

消穀治五藏補不足利大小腸

通小腹氣拔四肢止頭痛療沙癰豌豆瘡不出作酒歟之立出通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發痼疾○子未兒禿瘡油前傳之亦主蠱五痔及食肉中毒下血者冷取汁服并州人呼爲香荽入藥炒用

陳藏器

胡荽防風注蘇云防風子似胡荽味辛溫消穀久食令

主蟲毒五野雞病及食肉中毒下血者令子拆服汁石勒諱胡并汾人呼爲香荽也

多則令人多忘又食着諸毒肉吐下血不止頓痞黃者取淨胡荽子外煮食腹破取汁停冷服半升一日一夜二服即止又狐臭齷齒高同食食之令人汗鳬難差不得久食此是董菜損人精神秋冬季

病人不可食疾更加久令人食之脚弱患氣滯不得食又不得與斜

蒿同食食之令人汗鳬難差不得久食此是董菜損人精神秋冬季

子醋煮懸腸頭出甚効可和生
菜食治腸風熱餅裹食甚良

外臺秘要

主齒喉胡蘿子五升
應是胡荽子也以水

五外者取經驗後方

治小兒胗肚欲令速出宜用胡荽三二兩切
一外含之

必効方

治蠱毒神驗以根絞汁半
外和酒服之立下又治熱氣結帶經年數發以半斤五月五日採陰乾水七升煮取一升

兵

部手集

治孩子赤丹不止以汁傳之差譚氏方同

子

孫真人食之令人多忘發痼疾
胡臭蛋齒口氣臭金瘡

母秘錄

治肛帶出切一外燒以奎薰肛即入

邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主胃膈中臭爛惡
邪氣利腸胃通血脉續不足氣生食微動風氣作羹

食良不與胡荽同食令人汗臭氣

食醫心鏡

治五藏邪氣狀

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心

令人氣滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食
又療齒根爛瘡爲灰用甚良不可過多食壅關節澀
滌衛令血脉不行又動風發脚氣患豌取汁服半合
定冬月用乾者煮之子主目腎及物入目三五顆致
目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眼淚根主小
兒黃爛瘡燒灰傅之佳北人呼爲蘭香爲石勒諱也

此有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香一種似紫蘇葉之即生羅勒俗呼爲西王母菜食之益人爲末以傅之用醋漿漬百日出日乾未服方得七

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去

醫學按內臍中腎自落俗名鵝不食草

已上五種新病
見孟談陳藥器

蕭炳陳士
良日華子

蕷菁



蕷菁及蘆菔味苦溫無毒主利五臟輕身益氣可長食之蕷菁子主明目

蕷菁云蘆菔是今溫菘其根可食葉好食西川惟種此而其子與溫菘甚相似小細爾俗方無用服食家亦煉餌之而不云蘆菔子恐不用也俗人蒸其根及作菹皆好但小董莫爾又有莖根細而過辛不宜服之周本注云蕷菁北人又名蔓菁根葉及子乃是菘類與蘆菔全別至於體用亦殊今言蕷菁子似蘆菔或謂蘆菔葉不堪食無言小薰體是江表不產二物斟酌注記喪其真爾其蔓菁子療瘧疽利小便水者三升取濃汁服主癩癰

積聚少飲汁主霍亂心腹脹末服主目暗其蘆菔別顯後條今按陳藏器本草云蕷菁主急黃疽痘及內黃腹結不通搗爲末水絞汁服當得嚏鼻中出黃水及下利仙經云長服可斷穀長生和油傅蜘蛛咬忍毒入肉亦搗爲末酒服蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也爲油入面膏令人去黑點今并汾河朝開燒食其根呼爲蕷根猶是蕷菁之號蕷菁南北之通稱也塞北種者名九英蔓菁根大并將爲軍糧菘菜南土所種多是也目禹錫等謹按爾雅云湏蕷蕷釋曰詩谷風云采葑采菲毛云葑湏也先儒即以湏葑擬當之孫炎云湏一名葑蓯郭注云蕷蕷似羊蹄葉細味酢可食礼坊記注云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陸機云葑蕷幽州人謂之芥方言云曹蕷蕷菁也陳楚謂之蕷齊魯謂之蕷開西謂之蕷趙魏之部謂之大芥曹葑音同然則葑也湏也蕷菁也蔓菁也蕷蕷也蕷也芥也七者一物也孟詡云蔓菁消食下氣其子久蒸久暴搗爲粉服之長生壓油塗頭能變蒜髮又研子入面脂極去皺又搗子水和服治熱黃結實不通少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出又利小便又女子奶乳腫取其根生搗後和醯醋漿水煮取汁洗之五六度差又搗和雞子白封之亦妙諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其嫩出甲可生啖一也葉舒可煮食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也廻則易尋而採五也冬有根可鬻而食六也比諸蔬屬其利不亦博矣三蜀之人今呼蔓菁爲諸葛菜江陵亦然目華子云蔓菁舊不著所出

州土今南北皆通有之蕪菁即蔓菁也蘆菔即下萊菔音荀今俗呼
蘆菔是也此二菜北七種之尤多蕪菁四時仍有春食苗夏食心亦
謂之薹子秋食莖冬食根河朔尤多種亦可以備飢歲菜中之最有
益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健嘉話錄云諸葛亮所止令
兵士獨種蔓菁者取其莖出甲可生啖一也葉舒可煮食三也久居
則隨以滋長三也棄不令惜四也回即易尋而採之五也冬有根可
斷食六也比諸蔬屬其利不亦博乎劉禹錫曰信矣三蜀江陵之人
今呼蔓菁爲諸葛菜是也其實夏秋熟時採之仙方亦單服用水煮
十得九愈蔓菁子六外一物蒸之看氣遍合甑下以釜中熱湯淋之乃
三過令苦味盡暴乾擣篩水服二錢七日三火增服可以辟穀又治
發黃下小腸藥用之又主青盲崔元亮海上方云但瞳子不壞者療
水洗以鹽擣傅乳上熱即換不過三五易之即差冬月無葉但空用
根亦可切湏避風耳南人取此種種之初年相類至二三歲則變爲
面膏亦有用者又療乳癰痛寒熱者取蔓菁根并葉淨擇去土不用
菘矣萊菔功用亦同然力猛更出其右斷下方亦用其根燒熟入藥
丸能製麴毒皆有皮蘿蔔根來見食麥麴者云此大熱何以食之又
見食中有蘆菔云賴有此以解其性自此相傳食麴必啖蘆菔凡人
飲食過度飽宜生嚼之佳了研水服吐風涎甚效此有大小二種大
者肉堅宜蒸食小者白而脆宜生啖爾雅所謂葵蘆肥郭璞云紫花
菘也俗呼溫菘似蘆菁大根一名葵俗呼菘突然則紫花菘溫菘皆
南人所呼也吳人呼楚菘廣南人呼秦菘河朔蘆菔極有大者其說

食療

溫下氣治黃疸利小便根主消渴治

汗又方陰黃汗染衣涕唾黃取蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日愈亦一時種痔之力也又今醫以治消渴其方山子蘿蔔三枚淨洗薄切暴乾一味擣羅爲散每服二錢前猪肉湯送下食後臨卧日三服漸增全三錢差

臺秘要

治心腹脹蔓菁子大合揀淨擣熟研水一升更和研濾取汁可得一盞頓服之少頃自得轉利或亦自吐腹中自寬或得

聖惠方

治風癆入腹身體強舌乾躁硬用蔓菁子三兩爲末每服溫酒下一錢七外

汗又方陰黃汗染衣涕唾黃取蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日愈再加至兩匙以知爲度每夜小便重浸少許帛子各書記日色漸退白則差不可復服五升已來

又方

輕身益氣明目燕菁子一升水九升外煮令汁盡日乾如此三度搗末水服方寸匕日三

又方

常服明目洞視肥腸燕菁子三升以花水服方寸匕加

又方

研究常用固脂中良

又方

治豌豆瘡蔓菁根搗汁挑之

千金方

治頭秃燕菁子末酢和傅之日三

又方

常服明目洞視肥腸燕菁子三升以

葛氏方

卒腫毒起急痛蕪菁子熟搗帛裹傅之爛止

驗後方

治虛勞眼暗採三月蔓菁花陰乾爲末以井花水每空心調下二錢七夕服長生可夜讀書

葛氏方

卒腫毒起急痛蕪菁子熟搗帛裹傅之爛止

驗後方

治虛勞眼暗採三月蔓菁花陰乾爲末以井花水每空心調下二錢七夕服長生可夜讀書

孫真人食經

和如泥煮三沸急攬之出傅腫帛裹上日再三易

忌 治黃疸皮膚眼睛加金色小便赤
生蔓菁子末熟水調下方寸匕日三傳腫上

集療

男子陰腫如斗大核痛人所日三易

又方

主一切熱腫毒取生蔓菁根一握薑花入少許和搗

乳上熱即搗不渴三五度冬無葉即用根切湏避風

傷寒要類

神仙教子法立春後有庚子日溫蕷菁汁合家大小並服不限多少可理時疾

又方 治黃服蔓菁子油一盞頓服之臨時無由則蔓菁

子杵汁水和之服亦得候顏色黃或精神急用之有効

兵部手集 治妊娠小便不利蔓菁

楊氏產乳同

抱朴子 治姪娠小便不利蔓菁

大醋煮蕷菁子令熟日乾爲末井花水服方寸匕日三盡一斗能夜覩有所見

子母秘錄

治姪娠小便不利蔓菁子末水服方寸匕日二

時記

採經霜者乾之詩云我有旨蓄可以禦冬

衍義曰

蕷菁蘆菔二菜也蘆菔即蘿蔔也蕷菁今世俗謂之蔓菁夏則枯當此之時蔬圃中復種之謂之雞毛菜食心正在

春時諸菜之中有益無損於州有功採擷之餘收子爲油根過食動氣河東太原所出極大他處不及也又出吐谷渾後於菜菔條中爾雅釋但名蘆菔今謂之蘿蔔是也則蕷菁條中不合更言及蘆菔三字顯見重複從爾雅爲正

荆楚歲

瓜蒂



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.



瓜蒂味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺鹽
毒欬逆上氣及食諸果病在胃腹中皆吐下之
中息肉療黃疸○花主心痛欬逆生嵩高平澤七月

七日採陰乾

陶隱居云瓜蒂多用早青蒂此云七月採便是甜論其蒂所主爾今瓜例皆冷利早青者尤甚熟瓜乃有數種除飢食之不害人若覺多即入水自清便即消永嘉有寒瓜甚大今每取蘿蔔食之亦有再熟式又有越瓜人作蘿食之亦冷並非藥用爾今注

甜瓜有青白二種入藥當用青瓜蒂前條白瓜子唐注云甘瓜子主

腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內藥標正此甜瓜子之功前條便以白瓜子為甘瓜子非也

曰華子云無毒治臍塞熱臍眼腎吐痰

曰禹卿等註本草性論云瓜蒂即甜瓜蒂使並主臍中息肉臍皯和小豆丁香吹臍治黃

今處處有之亦園圃所持舊說瓜有青白二種入藥當用青瓜蒂七月採陰乾方書所用多入吹臍及吐臍散中莖亦主臍中息肉臍皯等藥主無驗搗汁塗之即生花主心痛熱逆肉主煩渴除熱多食則動痼疾又有越瓜色正白生越中胡瓜黃色亦謂之黃瓜別無功用食之亦不益人故可略之

雷公

凡使勿用白瓜蒂要採取青綠色瓜待瓜氣足其

裏於東牆有風處掛令吹乾用瓜子凡使勿用瓜子實恐誤採得後便於日中曝令内外乾便杵用馬尾篩過成粉末了用其藥不出油其妙力短若要出油生杵作膏用三重紙裹用車物覆壓之取無油用黃疸及暴急黃取瓜蒂丁香各七枚小豆七粒爲末吹黑豆許於臍中少時黃水出差其子熱補中宜人瓜有毒止渴益氣除煩熱利小便通三焦壅塞氣多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷病癰癰人不可食之若食之飽脹入水自消多食令人噯噯虛弱腳手無力葉生搗汁生髮又補中打搗搗末酒服去瘀血治小兒疳龍魚河圖云瓜有兩臍者殺人沉水者殺人食多腹脹可食鹽花成水瓜蒂七枚杵末如大豆許吹兩臍中令黃水出殘末水調服

殺蟲去臍中瘻內瘻瘻人不可

食鹽花成水

聖

治時氣三日外忽覺心滿堅硬腳手心熱變黃不治殺人以

食療

殺蟲去臍中瘻內瘻瘻人不可

食鹽花成水

也生嵩高平澤

惠方

治急中風寒潮等此藥不大吐逆只出涎水小兒服一字瓜蒂不限多少細研爲末小兒用半字吹臍內及揩牙大人只用一字

早晨井花水下一食頃含沙糖一塊良久涎如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑矣吐盡食粥一兩日如吐多困甚即燕麝香湯一盞即止矣麝知研溫水調下昔天平尚書覺昏眩即服之取涎有五分匕亦減之若吹臍中兩三黑豆許黃水出歇

又方

治黃疸目

丁散瓜丁細末如大豆許內臍中令病人深吸取臍中黃水出

之得吐黃水 又方 治臍中瘻肉陳瓜蒂一分爲末一二外差 羊脂和少許傅瘻肉上一日三

金色瓜蒂四十九箇須用六月六日收者丁香四十九箇用甘鍋子燒盡爲度細研爲末小兒用半字吹臍內及揩牙大人只用一字吹臍內 經驗後方 治大人小兒久患風瘤經喉風吸嗽遍身風立差

兒服一字瓜蒂不限多少細研爲末壯年一字十五已下老怯半字早晨井花水下一食頃含沙糖一塊良久涎如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑矣吐盡食粥一兩日如吐多困甚即燕麝香湯一盞即止矣麝知研溫水調下昔天平尚書覺昏眩即服之取涎有五分匕亦減之若吹臍中兩三黑豆許黃水出歇

丁散瓜丁細末如大豆許內臍中令病人深吸取臍中黃水出

衍義曰瓜蒂此即甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許黑極乾不限

調勻蜜之治風涎暴作氣塞倒卧服之良久涎自出或覽有涎用諸藥行化不下但如此服涎即出或服藥良久涎未出含沙糖一塊下咽即涎出此物甚不損人全勝石碌硝砂黃

卷二十二

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

居云陶

被霜後合取置經年破取核水洗燥乃搗取人用之冬瓜性冷利解毒消渴止煩悶直搗絞汁服之今注此物經霜後皮上白如粉塗故云白冬瓜也前條即冬瓜子之功此乃說皮肉之效爾陶注爲子人非也

白禹鼎言生論云冬瓜練亦可單用味甘平汗止煩躁

熱練壓丹石毒止熱渴利小腸能除消渴差五淋

醫說云冬瓜益氣

耐老除胃心滿去頭面熱熱者食之佳冷者食之瘦人

日華子云冬瓜冷無毒除煩渴利小腸能除熱毒離腫切摩拂子甚良藥殺蜂可脩

事蜂兒并燒腫毒及蜂丁藤燒灰可出繡點點洗黑點并洗瘡疥濕

壞亦可漱

食療

壓丹石又取瓜一顆和桐葉與豬肉食之久更不要與諸物食自然不能長三四倍矣又貪食之練五藏爲下氣故也

欲得瘦輕健者則可長食之若要肥則勿食

孟說說肺熱消渴取濮

益氣能老除心胃滿取瓜子七外下同白瓜條

練白練

頭合瘡上瓜當爛截去更合之瓜

治小兒渴利單方

擣取瓜汁飲之

治小兒渴利單方

發背欲死取冬瓜截去

未盡瘡已欵小矣即用膏養之

治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

九月勿食被霜瓜食

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

之令人成反胃病

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

煨令爛熟去

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

土絞汁服之

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

小品方

食魚中毒冬瓜最驗

古今錄驗

驗治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

頭合瘡上瓜當爛截去更合之瓜

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

未盡瘡已欵小矣即用膏養之

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

九月勿食被霜瓜食

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

之令人成反胃病

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

煨令爛熟去

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

土絞汁服之

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

孫真人子母秘錄

小兒

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

未盡瘡已欵小矣即用膏養之

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

九月勿食被霜瓜食

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

之令人成反胃病

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

煨令爛熟去

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

土絞汁服之

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

九月勿食被霜瓜食

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

之令人成反胃病

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

煨令爛熟去

火燒治傷寒後創口久津液枯竭四肢浮

白瓜子



臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC

冬瓜人也八月採

唐本云綱云冬瓜人也八月採之已下爲
冬瓜人說非謂冬瓜別名族無及下條瓜帶

並生嵩高平澤此即一物但以甘字似白字後人誤以爲白也若其
不是甘瓜何因一名白瓜此即甘瓜不惑且朱書論白瓜之效墨書

說冬瓜之功效異條同陶爲深誤按廣雅冬瓜一名地芝與甘瓜全
別墨書宜附冬瓜科下瓜帶與甘瓜共條別錄云甘瓜子主腹內結

聚破潰膿血最爲腸胃脾內壅要藥本草以爲冬瓜但用帶不云子也
今賜癩湯中用之俗人或用冬瓜子也又按諸本草云瓜子或云甘
瓜子今此本誤作白字當改從甘也今按此即冬瓜子也唐注稱是

甘瓜子謂甘字似白字後人誤以爲白此之所言何孟浪之甚耶且

本經云主令人悅澤別錄云可作面脂令人悅澤而又面脂方中多
用冬瓜人不見用甘瓜子按此即是冬瓜子明矣故屬於後條注中
云取瘦水洗燥乃擂取人用之且此物與甘瓜全別其甘瓜有青白
二種子色皆黃主療與白瓜子有異而冬瓜皮雖青經霜亦有白衣
其中子白白瓜子之號因斯而得況陶隱居以別錄白冬瓜附於白
矣本經云即冬瓜人也蘇注蓋以冬瓜色青乃云是甘瓜者且甘瓜
絞切今以讀作瓜字唐注誤誤都不可憑曰禹錫等謹按蜀本江蘇
云是甘瓜子也圖經云別有胡瓜黃赤無味今據此兩說俱不可憑
疑也按冬瓜雖色青而其中子甚白謂如白瓜子者猶如蟲部有白
龍骨焉人但看骨之白而不知龍之色也若以甘瓜子爲之則甘瓜

青白二種其子並黃色而千金面藥方只用冬瓜人信蘇注爲妄圖
經難憑矣孟說云取冬瓜人七外以絹袋盛之投三沸湯中湏臾出
暴乾如此三度止火與清苦酒漬經一宿暴乾爲末日服之方寸匕令
人肥悅明日延年不老又取子三五外退去皮搗爲丸空腹服三十
丸令人白淨如玉曰華子

圖經

白瓜子即冬瓜人也生嵩
高平澤今處處有之皆園
圃所蔭其實生苗蔓下大者如斗而更長皮厚而有毛初生正青綠
經霜則白如塗粉其中肉乃子亦白故謂之白瓜人家多藏蓄鬻年
作菜果入藥湏霜後合取置之經年破出核洗燥乃擂取人用之亦
堪單作服餌又有末作湯飲又作面藥並令人顏色光澤宗德荆楚
歲時記云七月採瓜犀以爲面脂牟辦也飄亦甚作潔豆其肉主三
消渴疾解積熱利大小腸壓丹石毒廣雅一名地芝是也皮可作丸
酒服亦入面脂中

功用與上等醉五升漬一宿暴乾搗下絲酒服方寸匕日三久服差

外臺秘要 子升絹袋盛絞沸湯中三遍訖以

孫真人治多年損傷不差熟瓜子末溫酒服之

衍義曰白瓜子寃冬瓜人

也服食中亦稀用

甜瓜寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡
動宿冷病發虛熱破腹又令人憊憊弱脚手無力少

食即止渴利小便通三焦開壅塞氣兼主口鼻瘡

目禹錫等譜云無毒○葉治人無髮擣汁塗之即生○圖經文

武帝縣下陳藏器序云甘瓜子止月經太過

千金方

治口臭并

作末

蜜和丸每旦洗净漱含

孫真人食已

患脚氣人勿食甜

一丸如棗核大亦用傅齒五月甜瓜沉水者殺人又多食發黃疸病動冷疾令人虛羸解藥力兩蒂者殺人後熟之黃皮作羹亦佳

衍義曰

甜瓜暑月服之不中暑氣多食未有不下

拘陽氣故也亦可以如白甜瓜煎瀉收

胡瓜葉味苦平小毒主小兒門癬一歲服一葉已上斟酌與之生搾絞汁服得吐下根擣傅胡刺毒腫其實味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積瘀熱發症氣令人虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脉

氣發脚氣天行後不可食小兒切忌滑中生瘻蟲不與醋同食北人亦呼為黃瓜為石勒諱因而改上

二種新捕見千金方及孟試陳藏器日華子

圖經

文具瓜

帶縣下

千金髓

水病肚脹至四

破作兩片不出子以醋煮一半俱爛空心頓服須臾下水

孫真人

主蛇咬取胡瓜

傳之數易良

越瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得

與牛乳酪及鯉同食及空心食令人心痛

今附目禹錫等謹按陳藏器

醫云越瓜大者色正白越人當果食之利小便去煩熱解酒毒宣脾氣小者糟藏之為灰傅口吻瘡及陰莖熱瘡

圖經文

瓜蒂下食療小兒夏月不可與食又發諸瘡令人虛弱冷中

食

常令人臍下為癰痛不止又天行病後不可食

醫心鏡

越瓜鮮火食益腸胃和飯作餅并薑菹之並得

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子

主射工及疰氣上氣發汗背膈癆冷面黃生河東今用

錫等謹按陳藏器云白芥生太原如芥而葉白為茹食之甚美
曰華子云白芥能安五藏功用與芥頗同子燒及服可辟邪魅

經文具林

陳藏器云

主令氣子主上氣發汗背膈癆

千金方治反胃吐食上氣小芥子日乾

外臺秘

圖

要

治氣小芥子一升搗碎以絹袋盛好酒

三升浸七日空心溫服三合日二服

千金方治反胃吐食上氣小芥子日乾

外臺秘

又方

三種射工即水弩子以芥子杵令孰苦酒和厚博上半日痛即便止

又方諸癰以

治中風卒不得語以苦酒者芥子博

泥傳上日三易之月後方頤一周以帛筭之一日一夕乃差

蜀州芥



芥味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中以食溫中

陳藏器

云似菘而有毛味粹好作菹亦生食其子可藏冬瓜又有甚旨即以作菹甚粹皮唐本

注云此芥有三種菜大麌者葉濃食子入藥用熨惡疰至良葉小子細者葉不堪食其子但堪為羹爾又有白芥子麌大白色如白梁米甚辛美從戎中來別錄云子主射工及疰氣發無常劇丸服之或搗爲末醋和塗之隨手有驗目高錫等謹按蜀本圖經云一種葉大子白且麌名曰胡芥取之及薦用最佳而人間未多用之高錫云芥煮食之亦動氣生食發丹石不可多食曰華子云除邢氣止嗽嗽上氣冷氣疾子治風毒腫及麻痺醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研微暖塗貼心痛酒醋服之

圖經曰

芥舊不著而出

州土今處亦有之似菘而有毛味極辛辣此所謂青芥也芥之種亦多土多芥亦如菘類相摩嶺南無芥著有人攜種至彼種之皆變作芥言地氣暖使然耳續傳信方主腹冷夜起以白芥子一升炒熟勿令焦細研以湯浸蒸餅丸如赤小豆薑湯吞七丸甚効生食發丹石其子微熬研之作西香美有辛氣能通利五藏其葉不可多食又細葉有毛者殺人

食療

主欬逆下氣明日去頭面風大

聖惠方

治走風

毒瘡、癰用小芥子末和雞子白調傳之

婦人中風口噤舌本縮用芥子一升細研以醋三升煎取一升用博領頰下立効

外臺秘要

治瘡有九種不過此方取芥子搗碎和綿裹塞耳差

孫真人

食之成惡瘡

廣濟方

又方

治瘡有九種不過此方取芥子搗碎和綿裹塞耳差

孫真人

食之成惡瘡

脣血出傳之日七遍馬外即刺芥也

左傳季氏與郈氏鬪雞季氏金其距郤

又方

以醋三升煎取一升用博領頰下立効

行義曰芥似蘆薈葉上紋皺起色尤深綠爲異子與苗皆辛子尤

亦動風又白芥子比諸芥稍大其色白入藥用

孫真人

食之成惡瘡

菜菔



菜菔 音根味辛甘溫無毒散服及炮者服食大下氣消穀去痰癖肥健人生擣汁服主消渴試大有驗

云陶謂溫菘是也其嫩華爲生菜食之大葉熟散消食和中根效在蕷菁之右今俗呼爲蘆菔唐本先附自禹湯謹按蜀本圖經云名蘆菔生江北秦晉最多蘭淮云葵蘆菔釋曰紫花菘也俗呼溫

菘似蕷菁大根一名焯俗呼頭芥一名蘆菔今謂之蘆菔是也

蘆菔

蘆菔根消食利關節理頤色練五藏惡氣制麵毒凡人飲食過度生

爵熟之便消研如泥制麵作餽飴佳飽食亦不發熱亦主肺嗽吐血

蘆菔

酥前食下氣孟說云蘆菔性冷利五藏輕身根服之令人白淨肌細

蘆菔

溫榮肅令食醫心鏡治消渴口乾蘆菔絞汁一升飲之則定

蘆菔

人疑早白又方下氣消穀去痰癖肥健作羹食之生絞汁服理消渴

蘆菔

勝散出子了蘆菔三枚淨洗薄切日乾爲末每服二錢煎豬肉汁澄清調下食後并夜臥日三服

蘆菔

子爲末溫水調一匙頭良久吐出涎沫如是繚繚風以此吐後用緊疎藥服疎後服和氣散差

蘆菔

又方

主積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血

圖經

文具蘆菔條下

孫真人

治肺疾咳嗽半外治風痰久服消渴

蘆菔

擇洗焙乾於銚子內炒令黃熟

蘿蔔解毒

楊文公談苑

爲末以沙糖丸如彈錠裹含之江東居民歲課種藝初年種芋三十畝計省米三十斛次年種蘿蔔三十畝計益米三十斛可知蘿蔔消食也爾雅突蘆施郭璞注范為

旅蕪菁屬紫花大根俗呼蕪突更始敗被庭中宮女數百人幽閨殿門內掘庭中蘆菔根食之今蘿蔔是也

蘿蔔是也

偏頭疼用蘿蔔汁一塊殼仰臥注之鼻左竇注左右痛注右左右俱注亦得神效

蘿蔔汁一塊殼仰臥注之鼻左竇注左右痛注右左右俱注亦得神效

衍義曰

蘿蔔根即前條所謂蘆菔今人止謂之蘿蔔河北甚多登萊亦好服地黃何首烏人食之則令人髮長白壯皆言草木中惟此下氣速者爲其辛也不然如生薑芥子又辛也何止能散而已

蘆菔辛而又甘故能散緩而又下氣速也散氣用生薑下氣用蘆菔

松菜



菘味甘溫無毒主通利腸胃除口中煩解酒渴

陶

居云菜中有菘最爲常食性和利人無餘逆忤今人多食如似小冷而又耐霜雪其子可作油傅頭長髮塗刀劍令不鏽音秀其有數種猶是一類正論其美與不美爾服藥有升草而食菘即令病不除唐本草云

松菜不生北土有人將子北種初一年半爲蕪菁二年菘種郁絕將蕪菁子南種亦二年都變土地所宜頗有此例其子亦隨色變但葉細無異爾菘子黑蔓蕪菁子紫赤大小相似推蘆菔子黃赤色大數倍復不圓也其菘有三種有牛肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味少苦白菘似蔓蕪菁也臣禹錫等謹按陳藏器云去魚腥動氣發病薑能制其毒藥大多毛者是薑炳云北人居南方不勝土地之宜遂病足尤宜忌菘菜又云消食下氣治癆氣止熱氣散冬汁尤佳

華子云涼微毒多食發皮膚風癬痒梗長葉瘦高者爲菘葉闊厚短肥而薄及梗細者爲蕪菁菜也陳士良云紫花菘平無毒行風氣去邪熱氣花可以糟下酒藏甚美顏雅云荀菜吳國晉書云荀菜吳人呼楚菘廣南人呼秦菘此菘薹不毒宜食之

所出州七今南北皆有之蕪菁相類梗長葉不光者爲蕪菁梗短葉闊厚而肥痺者爲菘舊說菘不生北土人有將子北七種之初一年半爲蕪菁二年菘種都絕猶南人之種蕪菁而今京都種菘都類南種但肥厚差不及耳楊州一種菘葉圓而大或若箋噉之無滓絕勝他土者此所謂白菘也又有牛肚菘葉最大厚味甘疑今楊州菘近之紫菘葉薄細味小苦北土無有菘比蕪菁有小毒不宜多食然

圖經曰

菘舊不載目

能殺魚腥最相宜也多食

過度

性生

薑

可解其性

草云溫末解又消食亦少

下氣九英菘

出河西藥及大根亦

龐長和

羊內甚美常食之都

不見發

病其冬月作

蘿

煮作

羹食之能消宿食

下氣治嗽

諸家商畧性

令非溫恐誤也

又北

無

菘菜南無蘿

菁其蔓菁子細

菜子癰也

合細研井華水

一盞調爲二服

食醫心鏡

主通利腸胃除

肖中煩熱解酒渴

菘菜

二斤煮作羹啜之止渴作羹茹食亦得

方寸匕日三辟五年溫

又方治發背杵地菘汁一

傷寒要類

辟溫病

菘菜如粟米酒服

至心即死杵菘菜傅上

聖惠方治酒醉不醒

用菘菜子二

者是此菘菜也葉如蘿菁綠色差淡其味

微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之脾見冷

子母秘錄

主小兒赤遊行於上下

老耐飢寒高氣不老

又方外日再服以差止

益州川谷山陵道傍凌冬不死三月三日採陰乾

衍義曰凡用甘草皆禁菘菜

穀胃彈腸

於協切

唐本注云苦菜詩輩

謂茶苦又云董荼如餡皆苦菜異名也陶謂之茗茗乃木類殊

非茶流茗春採爲苦茶音遲遐反非途音也按爾雅釋草云荼苦菜

擇木云槚苦茶二物全別不得爲例又顧氏家訓按易通卦驗玄圖

曰苦菜生於寒秋經冬歷春得夏乃成一名游冬葉似苦苣而細

之有白汁花黃似菊此則與桐君略同今所在有之苦識乃龍葵尔

俗亦名苦菜非茶也

日馬卿等註按蜀本圖經云春花夏實至秋復

生花而不實經冬不凋陳先生云苦蘿味苦寒有小毒擇葉傅小兒

開瓣煮汁服去暑熱目黃秘塞葉極似龍葵但龍葵子無殼苦蘿子

有殼蘇云是龍葵誤也人亦呼爲小苦耽崔豹古今注云苦蘿一名

識子有實形如

皮弁子圓如珠

月令

王瓜生

衍義曰苦菜四方皆有在北道則冬方厭燒生南方則冬夏常青

此月令小滿節後所謂苦菜秀者是此葉如苦苣更狹其

微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之脾見冷

者是此菘菜也葉如蘿菁綠色差淡其味

微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之脾見冷

者是此菘菜也葉如蘿菁綠色差淡其味

微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之脾見冷

者是此菘菜也葉如蘿菁綠色差淡其味

微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之脾見冷

者是此菘菜也葉如蘿菁綠色差淡其味

微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之脾見冷

綠色差淡折之白乳汁出常常點瘊子自落味苦
花與野菊相似春夏秋皆簇開花去中熱安心神

桂子味辛溫無毒主欬逆下氣溫中補體○葉主調

中去臭氣九月採陰乾

國隱居云桂狀如蘇高大白色不甚
香其子研之雜米作糜甚肥美下氣

補益東人呼爲蒲音魚以其似蘇字但除木邊故也管其子作油日
煎之即今油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名爲重油

唐本王云別錄桂葉人常生食其子故不及蘇也余按陳藏器本草云桂葉

擣傳蟲咬及男子陰腫江東以桂子爲油比上以大麻爲油此二油俱堪油物若其和漆桂者爲強爾臣禹錫等謹按子孟說云桂子其葉性溫用時擣之治男子陰腫生擣和醋封之女人絲裏內三四易
綱云又有大桂形似野荳高大葉大小桂一倍不堪食人收其子以充油帛與大麻子同其小桂子欲丸人採其角食之甚香美大桂葉不堪食日華子云桂調氣潤心肺長肌膚益顏色消宿食止上氣嗽去狐臭傳蛇咬子下氣止嗽補中填精髓

主欬逆下氣其葉杵之治男子陰腫謹按子孟作油用亦少破氣多食發心悶溫補中益氣通血脉填精髓可蒸令熱烈日乾之當口開

春取米食之亦可休梅師方治酒中人以桂葉爛

糲生食止渴潤肺杵猪脂和薄傅上

黃蜀葵

黃蜀葵



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差者作末傅之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月採

之陰乾用

新定

圖經文具卷一

經

葵條下

經驗後方

治臨產催生以黃

蜀葵子焙乾爲末

井華水下三錢匕如無子以根細切煎汁令濃滑待冷服

衍義曰

黃蜀葵花與蜀葵別種非爲擅色摘之則為數處就日乾之不爾即遇爛瘡家為要藥子臨產時取四十九粒研爛用溫水調服良久產