

卷九目次

蟲部

卵生八種

蜂蜜

一
合黃白蠟

露蜂房

二

五倍子

三附
藥煎百

桑螵蛸

四

白殭蠶

五
合

蚕脫原蠶

原蠶

原蠶

斑蝥

六

蝥

七

水蛭

八

化生五種

蟬蛻

一

蟻蟎

二

蝼蛄

三

麿蟲

四

蜚蠊

五

濕生二種

蟾蜍

一
蜈蚣

龍顙三種

龍骨

一
合龍齒

鯀鯉甲

二

蛤蚧

三

蛇顙三種

蛇蛻

一

蚺蛇膽

二

白花蛇

三

魚顙五種

鯉魚

一

青魚膽

二

石首魚

三

合乾鯛

鯽魚

四

鱸魚

五

無鱗魚四種

蠡魚

一

鰻鱷

二

鱠魚

三

鳥賊魚骨

四

介部

龜鱉類二種

龜甲

一

鱉甲

二

蚌蛤類七種

牡蠣

一

蚌粉

二

真珠

三

石決明

四

蛤蜊

五

蛤粉

六

瓦璽子

六

彙纂卷九

昆蟲 十二類

蟲部依舊本分卵化濕三類

蜂蜜

卵之
一

合黃白蠟

蜂采無毒之花。釀以糞穢而成蜜。所謂臭腐爲神奇也。又朝得露氣之清華。晝得太陽之和煦。故能補中。又能清熱。又能潤燥。又能解毒而止痛。施之內外。虛實諸病。罔不相宜。

蜜蠟者。蜜之凝結於底者也。莫甘於蜜。莫淡於蠟。蜜性緩質柔。故主潤臟腑。蠟性喬質堅。故能療久病。洩澼後重下膿血也。若火熱暴癆者。不宜遽用。

蜂性寒。蜜之性溫。又蜜生涼而熟溫。或清或補。分別爲用。又諸蜜氣味當以花爲主。冬夏爲上。秋次之。春則易酸。閩廣蜜極熱。以南方少霜雪。諸花多熟也。川蜜溫。西蜜則涼矣。近世宜州有黃連蜜。色黃味小苦。主目熱。雍洛間有梨花蜜。白如凝脂。毫州太清宮有榆花蜜。色小赤。柘城縣有何首烏蜜。

色更赤並蜂採其花作之各隨花性之溫涼也
醫家宜用白蠟蠟固蜜底取蜜後煉過濾入水中
候凝取之色黃者名黃蠟煎煉極淨色白者爲白
蠟若以黃蠟烊內水中十餘遍亦能令白與今時
所用蟲造白蠟不同

蟲造白蠟今人爲澆燭之用其蟲大如蟻虱生蠟
樹上芒種後延緣樹枝食汁吐涎粘於嫩莖化爲
白脂處暑後人剝取煉淨成塊其色雪白若蜜蠟
之白蠟不過白色勝於黃蠟耳

露蜂房 卵之二

露蜂房。陽明藥也。故以治婦人乳病。其外科齒科多用之。亦皆取其以毒攻毒。散邪殺蟲之功耳。

入藥宜草蜂房。大如拳者。山蜂房。大有一二丈圍樹上。重重如樓臺。有厚毒服食塗抹。皆非所宜。

五倍子

卵之三
附百藥煎

五倍子。乃鹽膚木之上。有小蟲如蟻。食其汁。老則遺種。結小毬於葉間者。鹽膚子及葉皆酸。鹽寒涼。能除痰飲咳嗽。生津止渴。解熱毒。酒毒。治喉痺。下血。血痢。

諸病故五倍子所主治與之同功其味酸鹹亦能斂肺止血化痰止渴收汗其氣寒亦能散熱毒瘡腫其性收亦能除泄痢氣脫也蓋凡黃昏咳嗽者乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五倍五味斂而降之

百藥煎功與五倍子同但經釀造其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺咳嗽痰飲熱渴諸症含噙爲宜

膚木子曝乾染家用之故五倍子造爲百藥煎以染皂色

自汗盜汗以五倍子研末津漬調填臍中縛定一
夜卽止亦治小兒夜啼

小兒下血腸風臟毒五倍子末煉蜜丸小豆大每
米飲服二十丸

脫肛不收用五倍子百草霜等分爲末醋熬成膏
鵝翎掃傳之卽入

桑螵蛸

卵之四

桑螵蛸稟秋金之陰氣走腎利膀胱其能事也以其
輕飄如絳故謂之螵蛸乃螳螂乳子作房粘着枝上

者獨取桑螵蛸以其兼得桑皮之津氣耳

桑螵蛸散治男子房勞小便日數十次。如獨米甘
心神恍惚瘦瘁食減此方能安神魂定心志治健
忘補心氣止小便數用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人
參茯神當歸龜甲各如法製各一兩爲末臥時人
參湯調下二錢如無桑上者卽用他樹者以炙桑
白皮佐之桑白皮行水以接螵蛸就腎經也

村人每用桑螵蛸炙焦飼小兒云止夜尿

白蠟蠶

卵之五

合蠶蛻雄原蠶蛾原蠶沙

殭蠶蠶之病風者治風化痰散結行經所謂因其
相感而以意使之者也其氣味輕薄而升故能去皮
膚諸風之如蟲行者凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽
立愈又取其清化之氣從治相火散濁逆結滯之痰
也然其性辛溫能散惟祛有餘之客邪今世治小兒
驚風不問虛實一概混施者非也

蠶退卽如蟬蛻蛇蛻之類因其本質以爲用蠶退得
蠶氣之餘故能入血治風近世以之療痘疹去目翳
其義猶蟬蛻也

原蠶茅二蠶也。用二蠶蛾取其敏于生。有鬼蠶蛾性淫。出蘭卽媾。至於枯槁乃已。故強陰益精者用雄。原蠶蛾然觀其後來枯槁之狀。人亦如是可爲惕然。蠶沙亦須用原蠶者。蠶屬火性燥。燥能勝濕去風。故其沙主療風濕之病。

蠶蟲屬陽。喜燥惡濕。食而不飲。故殼蠶又兼能燥濕也。殼則其色白白。其長直者爲雄。

蠶蛻。今人多用初出蠶子。敷在紙上者。古方惟用老蠶眠起所退皮。功用相近。常以蛻皮爲正。入藥

微炒用。

痔漏下血。以蠶退紙半張。碗內燒灰酒服。自除。
蠶沙酒用蠶沙炒黃。袋盛浸酒去風緩諸節皮膚
頑癆手足不遂等證。若因血虛不能榮養經絡而
無風濕外邪侵犯者。又非蠶沙所能愈。

周禮禁原蠶爲其妨馬。養蠶多卽馬不蕃息。龍馬
同氣。蠶亦其餘氣也。今以蠶蠶未塗馬齒。卽不能
食。以桑葉拭去乃還食。豈非蠶馬同類歟。蠶之屬
火爲陽明矣。

班蝥 卵之六

班蝥人獲得之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走下竅直至精溺之處蚀下敗物也惟瘰癧癰犬咬二症或可暫施餘證必不可餌戒之

治療癩用肥皂二筋去核每莢入班蝥四枚線縛蒸取出斑蝥并肥皂皮筋得淨肉十兩入貝母二兩括樓根玄參甘草薄荷葉各一兩五錢共末以肥皂搗如泥丸梧子大每服一錢自湯吞服後腹疼勿慮此藥力追毒之故蓋瘰癧之毒莫不有

根大抵以斑蝥地膽爲主。制度如法，能使其根從小便中出。或如粉片，或如血塊，或如爛皮，皆其驗也。但毒之行，小便必澀痛不可當。以木通滑石燈心輩導之。

治癩犬咬方斑蝥七箇去頭足翅，酒洗和濕糯米，銅杓內炒米熟爲度。隨將二物研成細末，加六一散三兩，分作七服。每清晨一服，白湯調下。本人頭頂心必有紅髮二三莖，要不時尋覓摘去。

斑蝥乃大豆葉上甲蟲也。長五六分，黃黑斑文，鳥

腹尖喙蓋一物而四季各異春食芫花爲芫青夏
食葛花爲亭長秋食豆花爲班蝥冬入地中爲地
膽四蟲色亦不同芫青色青故名青娘子以配紅
娘子葛上亭長黑身赤頭如亭長之着玄衣赤幘
也地膽其色如膽芫青功同班蝥今醫家多用班
蝥芫青而稀用亭長地膽也

蟹卵之七

蟹乃治風之藥諸風掉眩屬於肝木風客是經非辛
溫走散之性則不能祛風逐邪兼引諸風藥入達病

所施大人真中風。事兒急驚風。皆須用之。

蟹蠻尾蟲也。古語云。蜂蠻垂芒。其毒在尾。今入藥有全用者。有用尾者。謂之蟹稍。其力尤緊。

水蛭 卵之八

水蛭生於溪澗陰濕之處。其味鹹苦。鹹走血。苦泄結。故能入肝經血分以除蓄血也。其用與蟲蟲相似。故仲景方中往往與之並施。

收乾蛭當展其身令長。腹中有子者去之。性最難死。雖以火炙亦如魚子。煙熏經年得水尤活也。

水蛭蟲蟲皆破逐瘀血血瘀發病之惡藥而水蛭入腹蝦之若尚存性尚能變爲水蛭齧人腸臍非細故也破瘀消血之藥儘多正足選用奚必用此難制之物戒之可也

右卵類八種

蟬蛻

化之一

蟬乃土木餘氣所化吸風飲露其味甘寒其氣清虛故其主療皆一切風熱之證古人用蛻蓋凡風熱之在皮膚者當用蟬蛻也其鳴清響能發音聲又主小

兒夜啼者取其晝鳴而夜息也。其性善脫能去翳故云蟬性蛻而退翳。蛇性竄而祛風。因其質而爲也。又主婦人生子不下。總皆取其蛻脫之義。

蠶食而不飲。蟬飲而不食。飲者飲風露也。觀其不糞而溺可見矣。

治小兒夜啼用蟬蛻四十九枚去前截用後半截爲末分四服。鈞藤湯調灌之。或用薄荷湯入酒少許調亦可。有不信者將上半截爲末煎湯調下卽復啼也。豈蟬以翅鳴而翅在上半截之故耶。

蟬花散治肝經蘿熱風毒之氣內搏上攻眼目赤
腫翳膜疼痛昏濛內外障翳咸治之用蟬脫殼精
草刺蒺藜甘菊花防風草決明蜜蒙花甘草羌活
黃芩蔓荆子川芎木賊草荆芥等分爲末每茶清
調食二錢食後臨臥各一服

蟬蟇

化之二

蟬蟇稟陰濕之氣氣味鹹寒故所主手足陽明足厥
陰邪熱之症古方治小兒驚癇蟬蟇爲第一今人以
治一切痔瘻及疔腫疽瘡出箭鏃之用

蜣螂之智在於轉丸。以土包糞。轉而成丸。雄曳
推置於坎中。覆之而去。數日有小蜣螂出。蓋孚乳
於中也。俗呼推車客。其狀深目高鼻。有類羌胡。故
名蜣螂。

其類有三四種。以大而鼻頭扁者爲真。此物有毒。
外用易於臻功。若內服。大不宜於虛人也。

痔漏出水。以蜣螂一枚入冰片少許。爲細末。紙搘
蘸末入孔內。漸漸生肉。藥自退出。卽愈。又方。一切
漏瘡。以蜣螂燒末。醋和敷。

螻蛄 化之三

螻蛄治水之蟲也。今方家治水腫石淋小便秘等症。以之導水。然自腰以前甚澀。能止大小便。腰以後甚利。能下大小便。亦如蟬之下半截。方止兒啼一體而異用也。

螻蛄穴土而居。短翅四足。雄者善鳴而飛。雌者腹大羽小。不善飛翔。吸風食土。善就燈光。入藥宜用。雄者或云火燒地赤。置螻於上。任其跳死。覆者雄。仰者雌。

小便不通。用蠻二枚。取下體。以水一升。漬飲。須臾卽通。或用焙研調服。或生研俱可。或加車前草同搗汁服。或用後截和麝納臍中。縛定。卽通。

廣蟲 化之四

廣蟲有破堅下血之功。故留血積聚。用之神效。若無瘀血。停留者。不宜用也。此物以刀斷之。復能湊接行走。凡治跌撲傷損者。用之。以續筋骨。

蜚蠆 化之五

蜚蠆。卽方家所用蜚蠆。噉牛馬血者。善飲血而卽用。

以治血。故主積聚癰瘕。一切血結爲病。其功大略似
廬蟲。而此則更以苦勝。苦能泄結也。

右化生類五種

蟾蜍 濁之一

蟾蜍稟土金之氣。上應月魄。性亦靈異。味辛氣寒。主
散熱解毒。療小兒勞瘦疳疾最良。且辛能發汗。能使
邪氣散而不留。治廣瘡有金蟾脫甲酒。卽此一物也。
其眉酥爲發背疔瘡之要藥。外用之能拔能攻。內用
之能發能解。但其性有毒。不宜多用。卽入發汗散毒。

藥中服者尤不可多

其肪塗玉則刻之如蠟近世治小兒疳疾多用之
以其走陽明而能消積滯也

蟾蜍鼈墓功用雖不甚遠實二物也古人多用蟾
蜍今人亦只用蟾蜍甚效而鼈墓不復入藥蓋蟾
蜍在人家下濕處形大背多辨癟磊行極遲緩不
能跳躍亦不解鳴鼈墓多在陂澤間形小皮上多
黑斑點能跳接百蟲舉動極急以此辨之

其青蠹亦能解熱毒利水氣但係熟化之物其骨

性復熱而今人每同辛辣及脂油煎炙抱薪救火安能有益

蝦蟆青蛙之子是名蝌蚪二三月蛙蟆曳腸於水際草上纏繖如索日見黑點漸至春水發時則鳴以聒之蝌蚪皆出謂之聒子所謂蜃幕聲抱是矣

蟻蛇 濁之二

蜈蚣有毒惟風氣暴烈者可以當之蓋行而疾者唯風與蛇蜈蚣能制蛇故亦能截風所主皆厥陰經病淮南子云騰蛇游霧而殆於螂蛆卽此義也但貴藥

病相當設或過劑以蚯蚓桑皮解之。

足赤腹黃者入藥。足黃者不堪用。頭上有白肉面
并嘴尖者誤用之。則殺人製法以木末於土器中
炒令木末焦黑。以竹刀去足甲用。今人惟以火炙
頭足。或去尾足。

蜈蚣能制龍蛇而反畏蜘蛛。所謂禽之制在
氣也。

右濕生類二種

鱗部依舊本分龍蛇魚無鱗魚四類

龍骨

龍之
合齒

龍者神靈之物屬東方木內應乎肝心藏神肝藏魂神魂不安則或爲驚癇或爲恚怒或爲夢寐遺洟用龍骨以鎮伏神魂則驚氣自寧魂返乎肝則恚怒亦消矣其止夢寐遺洟者不但斂其神魂而濯能收脫并可固其精氣也且骨屬腎故又能益腎久病膿血及女子漏下者用之亦俱取其收澀之義。

齒者骨之餘其功用宜相似但龍骨兼入心腎及腸胃故兼有止瀉濇精之用龍齒單入肝心惟鎮驚安

魂魄而已。

龍呵氣成雲。既能變水。又能變火。龍火得濕則燔。得水則燔。以人火逐之。卽息。故人之相火似之。

取脊腦骨白地錦文。舐之着舌者良。黑色者不用。又骨細文廣者是雌。骨粗文狹者是雄。多生晉地川谷及太山巖水岸土穴中。或云龍處。或云春水至時魚登龍門。蛻骨甚多人採爲藥。有五色者。龍門在晉地。與本經合。龍骨卽此魚骨乎。

製法酒浸一宿。燔研粉水飛三度。用如急用。以

酒煮煆乾今人但煅赤爲粉亦有生用者

鮫鯉甲

龍之二

鮫鯉甲穴山而居。寓水而食。出陰入陽。能竄經絡。達於病所。但其性專行散。中病卽止。不可過服。

凡油籠滲漏。剥穿山甲裏面肉膚。投入自能至漏處。補塞。又此物不可於隄岸上殺之。恐血入土。則隄岸滲漏。觀此二說。是山可使穿。隄可使漏。而又能至滲處。其性之走竄可知矣。尾甲力更勝。

凡風濕冷痺之證。因水濕所致。渾身上下強直不

能屈伸。痛不可忍者。於五積散加穿山甲七片。看
病在左右手足或臂脅疼痛處。卽於鰥鯉身上取
甲炮熟同全蝎炒十一枚。葱姜同水煎入無灰酒
一匙服。取汗避風。

蛤蚧 龍之三

蛤蚧屬陰能補水之上源。故爲肺腎之聖藥。凡勞熱
咳嗽諸藥不效者。用之有神功。其治消渴及淋瀝或
水道不通者。肺朝百脉通調水道下輸膀胱。肺氣清
則諸症自愈也。

試法口含少許奔走不喘息者爲真故爲定喘要品。

廣西橫州甚多。牝牡上下相呼累日。情洽乃交。兩相抱負自墮於地。人往捕之。亦不知覺。以手分劈。雖死不開。乃用熟稻草綑纏蒸過曝乾售之。煉爲房中之藥。尋常捕者不論雌雄。但可爲雜藥用。雄爲蛤皮粗口大身小尾粗。雌爲蚧皮細口尖身大尾。其毒在眼。須去眼及甲上尾上腹上肉毛。以酒浸透。隔兩重紙緩焙令乾。以甕器盛懸屋東角。

上一夜用之。力可十倍。勿傷尾也。其功在尾。

久嗽不愈。肺積虛熱成癰。欬出膿血。曉夜不止。喉中氣塞。胸膈噎痛。用蛤蚧阿膠鹿角膠生犀角羚羊角各二錢半。用河水三升。銀石器內文火熬至半升。濾汁時時仰臥細呷。日一服。

右龍類三種

蛇蛻 蛇類之一

蛇蛻蛇之餘性猶存。不以氣味爲用者。其入藥有四義。一能辟惡。取其變化性靈也。故治邪僻鬼魅蠱虐。

諸疾一能去風取其屬異性竈也故治驚癇癲駭喉舌諸疾一能殺蟲故治惡瘡痔漏疥癬諸疾用其毒也一有蛻義故治翳膜胎產皮膚諸疾會意而從類也蓋蛇蛻從口退出眼睛亦退故今眼藥及去翳膜多用之

凡用須擇白色如銀者若青黃蒼色者勿用

蚺蛇膽 蛇之二

蚺稟己土之氣其膽受甲乙風木之化故其味苦中
有甘所主皆厥陰太陰之病能明目涼血除疳殺蟲

今世惟爲受杖人所需。他症稀使。蓋人受杖時。用此噙化。可得不死。其功能護心止痛。使惡血不上薄心。有神力也。

真膽絕難得。狹長通黑皮膜極薄。舐之甜苦。剔取粟許。着淨水中。浮游水上。回旋行走者爲真。其徑沉者非也。勿多着。亦令沉散。

雷州有養蛇戶。每端午日。卽昇蛇入官。取膽暴乾。以充土貢。每先以軟草藉蛇於籃中。盤屈之。將取則出於地上。用櫂枴十數。翻轉蛇腹。按定約分寸。

於腹間剖出肝膽。膽狀若鴨子大。取訖。內肝於腹以線縫合。昇放之。他日再相值。則遠遠露腹瘡。以明無膽。或云肉極腴美。皮可冒鼓。及飭刀劙藥器。豈有取膽而復縱之。

白花蛇

蛇之三
附烏稍蛇

白花蛇多在石南藤上食其花葉。所以能透骨搜風。截驚定搐。爲風痺驚搐癩癬惡瘡要藥。取其內走腹腑外徹皮膚無處不到也。

出蘄州者佳。龍頸虎扣黑質白花。目開如生。尾

爪甲真斬州也。蓋凡蛇死目皆閉。惟斬州花蛇開如生。舒斬兩界者。則一開一閉。人以此驗之。又名塞鼻蛇。諸蛇鼻向下。獨此鼻向上。

頭尾各一尺有大毒不可用。只用中段乾者以酒浸去皮骨炙過收之。則不蛀。其骨刺須遠棄之。傷人毒與生者同也。或云黔蛇長大。故頭尾可去一尺。斬蛇止可頭尾各去三寸。大蛇一條只得淨肉四兩。

烏蛇卽烏梢蛇氣味所主。與白花蛇同。第性善狂。

毒耳。色黑如漆，尾細有劙脊者良。

凡一切蛇須辨雌雄方土。斬州烏蛇頭上有逆毛二寸。一路可長半分入藥。如神只重一兩以下。得之甚難。蛇腹下有白帶子一條長一寸者雄也。宜入藥。

右蛇類三種

鯉魚

魚之一

鯉爲諸魚之長。能飛越江湖。亦神變之物也。又稟至陰之氣。其腸鱗一道。從首至尾無大小。皆三十六。

乃陰極陽復之象。故又曰魚熟中熟則生風。食之多發風熱。蓋諸魚在水無一息之停。皆能動風動火。不獨鯉也。鯉爲陰中之陽。其功長於利小便。能消腫脹。黃疸。脚氣。喘嗽。濕熱之病。作鱠尤溫。能去痰結。冷氣之疾。燒之則從火化。能發散風寒。平肺通乳。解腸胃及腫毒之邪。河濶云。鯉之治水。因其氣以相感者是矣。膽走厥陰。亦主明日及目熱赤痛。青盲之症。鱗主入血散滯。故婦人產後腹痛及血氣不和者用之。

水腫脹滿。用赤尾鯉魚一劙。破開不見水及鹽。以

生礬五錢研末入腹內火紙包裹再以黃土泥包裹內煨熟取出去紙泥送粥食頭者上消食身尾者下消一日用盡屢驗

睛上生暈不問久新用鯉魚長一尺二寸者取膽滴銅鏡上陰乾竹刀刮下每點少許

青魚膽

魚之二

青魚青屬東方膽又與膽同屬故青魚膽治目疾尤勝於諸膽其治喉蛾骨鰓則取漏泄係乎酸苦之義

石首魚

魚之三
合乾鯗

石首魚產於海。海水土氣混濁。土能養胃。故有開胃益氣之功。乾鰲其性疎利。能入腸胃。寬中消食止痢。蓋凡泄痢腹痛與腸胃諸疾。最忌油膩魚腥。惟自鰲不忌。鰲飲鹹水而性平。不熱且無脂膩。既無熱中之患。更有消食理脾實腸胃之益也。頭中石堅重下走。故主下石淋。又石與石爲同類耳。

石首魚出水能鳴。夜視有光。頭中有白石二枚。至秋化爲冠兒。卽野鴨之有冠者。腹中白鱠作膠。亦能清瘡解毒。

鯽魚 魚類之四

鯽喜恨泥。不食雜物。故能調胃實腸。與病無礙。但既爲常食之品。人所忽畧。其畏忌不可不知。與沙糖同食。則生疳蟲。與芥菜同食。則成腫疾。同猪肝雞肉雉肉鹿肉食。則生癰疽。同麥門冬食。害人。且鯽雖屬土。多食之亦能動火。

膈氣吐食。用大鯽去腸留鱗。切大蒜片填滿腹紙。包十重泥固。晒半乾。炭火煨熟。單取肉用。平胃散一兩。杵丸梧子大。密藏。每服三十丸。米飲下。

臂上便毒鯽魚一枚。山藥五錢。同擣敷卽消。

鱸魚 魚之五

鱸魚秋月方美。其得水中之清氣者乎。味甘淡氣平。雖有小毒。不至發病。乃與脾胃相宜之物。

右魚類五種

蠡魚 無鱗之一

蠡魚卽黑鰐。首有七星。夜朝北斗。稟北方玄水之精。得中央陰土之氣。乃益脾除水之要藥也。凡治浮腫之藥。或專於利水。或專於補脾。其性各自爲用。惟蠡

魚色黑色象水能從其類以導橫流之勢味甘土化能
補其不足以遂敦阜之性補瀉兼施故主下大水及
濕痺面目浮腫有神效。

喉痺將死者以蠡魚膽點入少許卽差病深者水
調灌之諸魚膽皆苦惟此膽甘可食爲異。

鰻鱺魚

無鱗之二

鰻鱺所主諸病其功專在殺蟲去風耳與蛇同類故
主治近之凡骨蒸勞瘵及五痔瘻瘻人常食之有大
益。

腹下有黑斑。背上有白點者。毒甚。不可食。重三四
觔。及水行昂頭者。不可食。妊娠不宜食鰻。脾胃薄。
弱易泄者勿食。

鱣魚血無鱗之三

鱣氣味甘溫。能補中益血。又能通經脈而療風邪。其
血同麝香治口眼喎斜者。以鱣善穿穴無足。而竄與
蛇同性。故走經脈。能療口喎耳目諸竅之病。風中血
脈。則口眼喎斜。用血主之。從其類也。

鱣性熱而補。時行病後食之。多復黑者有毒。

烏賊魚骨 無鱗之四

烏賊魚骨卽海螵蛸味鹹走血入厥陰肝經凡血枯
血瘕經閉帶下痢疳疾厥陰本病也寒熱癆疾癰癧
少腹痛陰痛厥陰經病也目翳流淚厥陰竅病也故
烏賊骨皆能治之其條析具在本草但氣溫不宜於
血熱若外用則總無礙

沙魚骨形相似但以上文順者真橫者卽僞

小兒臍瘻出血及臍烏鵲骨乾臍脂爲末油調搽
之

右無鱗魚四種

介部依舊本分龜鰐蚌蛤二類

龜甲 龜鰐之一

龜爲陰中之至陰。其底甲又屬純陰。氣味厚濁。專入腎臟。方家用入補心藥。蓋以心藏神。而龜性有神。借其氣以相通。且得水火既濟之義。實非補心之正藥也。其主咽痛口燥乾咳喘嗽。勞熱骨蒸及產婦陰脫。發躁者。皆由腎虛相火無依。此非氣柔貞靜者不能息其炎上之火。所謂靜能制動。誠爲至理。其主潮熱。

盜汗遺精腰痛腿酸癱瘓拘攣久瘧血枯小兒顛顚
不合者皆由真臟衰致元陰不生非此味厚純陰者
不能補其不足之陰所云寒養腎精職是義耳

甲蟲三百六十而神龜爲之長。龜形象離其神在
坎上隆而文以法天下平而理以法地背陰向陽。
蛇頭龍頸外骨內肉腸屬於首能運任脈廣肩大
腰卵生恩抱其息以耳雖雄尾交亦與蛇匹或云
大腰無雄者謬也今人視其底甲以辨雌雄。
敗龜版者乃經灼過之龜版若謂自死枯敗之龜。

不惟甲已枯槁而病龜自死之。甲反爲有損。

龜性神靈能變化。凡入藥勿令中濕。中濕則遂其變化之性。而成癥瘕於腹中。且用宜研之極細。不爾留滯腸胃。亦能變瘕。

龜鱉二甲主用略同。二者咸至陰之物。但鱉甲走肝益腎。以除熱。龜甲通心入腎。以滋陰。第鱉甲無毒。可多用。龜甲則未免有毒。

凡難產三五日不下垂危。及短小女子交骨不開者。用乾龜一枚。麻灸頭髮一握。燒灰。用芎當歸。

各一兩爲末和勻。每服七錢水煎服。如人行五里。
許再一服。生胎死胎俱下。

腫毒初起。敗龜版燒研酒服四錢。婦人乳毒亦同。

鱉甲

龜鱉之二

鱉色青。入肝故所主者瘡勞寒熱。痃癖驚癇。經水癰腫。陰瘡皆厥陰血分之病也。其甲用七肋九肋者。取陰中之陽也。凡陰虛水衰之人。爲暑所中。邪入陰分。故出併於陽而熱甚。入并於陰而寒甚。元氣虛羸。則邪陷而中焦不治。甚則結爲瘡。母鼈甲益陰除熱而

卷第十九
消散故爲治瘧之要藥其勞熱在骨及血瘕腰痛小兒脇下堅皆陰分血病宜其悉主之矣。

龜甲裏肉鱉肉裏甲鱉無耳以目爲聽入藥宜生取甲剔去肉今皆用煮熟者非法也。鱉肉性冷發水病凡久勞氣癥瘦人不宜食食之者和以椒姜熟物太多失其本性耳性本不熱也其膽味辣破入湯中可代姜椒辟腥氣。

右龜鱉類二種

牡蠣 蚌蛤之一

牡蠣入足少陰爲要堅之劑。以柴胡引之能去脇下硬。以茶引之能消項上結核。以大黃引之能消股間腫。以地黃爲使能益精收澁止小便。今人每以之合龍骨治夢遺滑精亦有腎虛無火寒精自出者不可不辨。

蛤蚌之屬皆有胎生卵生獨此係鹹水結成附石而生。冤礪相連塊然不動陰陽之道何從而生故總名牡蠣別無牝蠣也。

蚌粉 蚌蛤之二

卷之三
九
蚌粉與海蛤粉同功。皆水產也。治病之要。只在清熱行濕而已。

雀入大水爲蜃。蜃卽蚌也。老蚌含珠。殼堪爲粉。蚌長而蛤圓。

痰飲咳嗽。用真蚌粉新瓦炒紅。入青黛少許。每用淡鹽水滴麻油數點調服。

癰疽赤腫者。用米醋和蚌蛤灰塗乾。卽易之。或加

米片。

真珠 蚌蛤之三

真珠味甘微鹹氣寒無毒入手少陰足厥陰二經心虛有熱則神氣飛越肝虛有熱則目生膚翳障膜除二經之熱故能鎮心去目中翳障也耳聾本屬腎虛以其有熱故亦主之諸濕腫滿本屬脾土以其脾虛有熱故亦用真珠之甘以益脾寒以除熱質堅能磨積消滯耳

珠稟太陰之精氣而結中秋無月則蚌無胎其體光明其性堅硬大小無定要以新完未經鑽綴者爲上

石決明 蟹蛤之四

石決明乃足厥陰經藥能入血除熱故目疾外他用甚稀小兒疳積亦用之以其爲肝經病也。

石決明最名千里光附石生惟一片無對乘其不意卽易得之否則緊粘難脫入藥用七孔九孔者故又名九孔螺宜以東流水入鹽煮一伏時研末水飛用今人多煅研者非法。

蛤蜊

蚌蛤之五
合蛤粉

蛤蜊烹水中之陰其性滋潤而助津液故有止渴開

胃之能其主婦人血塊。及老癥爲寒熱者。以鹹能入
血而軟堅也。殼煅成粉爲諸瘍證之要藥。蓋瘍未有。
不由火氣炎上。煎熬津液而成。鹹能軟堅潤下。得之。
則火自降。痰結自消。氣自潤。帶下皆腎經爲病。鹹
爲水化氣類相從。故能入腎以除其所苦。其主心痛
者。心虛而熱邪客之則痛。五臟苦欲補鴻云。心欲軟。
急食鹹以軟之。此之謂也。

蛤粉須用紫口者。

白濁遺精無非陽盛陰虛所致。宜真珠粉丸用蛤

粉一筋。黃柏蜜炙一筋爲末。水跌丸梧子大。每服百丸。空心溫酒下。日二次。蓋蛤粉味鹹而能補腎陰。黃柏苦而降心火。堅腎故也。

瓦壘子 蟬蛤之六

瓦壘子卽蚶殼也。鹹走血而更堅。故能消血塊而散痰積。其肉味甘氣溫。故并能益氣補中。安五臟而健胃氣。

胃氣
田蔬 蝉蛤之七

田蔬俗稱田螺。其汁大寒。寒能除熱。故解一切有餘。

之熟

治噤口痢以活大田螺二枚搗爛入麝香三分作餅熑熟貼臍間半日熱氣下行卽愈食矣

治小便不通腹脹如鼓者用田螺一枚鹽半七生搗傅脐下一寸三分卽通

右蚌蛤類七種