


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇二六・子部・醫學類

類證治裁八卷

〔清〕林珮琴撰

.....

醫林改錯二卷

〔清〕王清任撰

.....

醫學三字經四卷

〔清〕陳念祖撰

.....

簡明中西匯參醫學圖說二卷

〔清〕王有忠撰

.....

醫案五卷

〔明〕孫一奎撰

.....

五七一

類證治裁

翻刻必究



咸豐元年
辛未暮鑄

丹陽林研經堂藏板

類證治裁序

類證治裁序

醫之為道必其人

仁智之德而又洞乎陰陽

之理性命之源寒暑異宜

南北異稟之故沉潛焉以

察其微反覆焉以窮其變

而後能消痼癘益虛孱以


平造物之憾此治病之道

昔人所以謂通於治國與

丹陽林君雲和與余同舉

戊辰鄉試訂交於京師既

而別去不相問者三十餘



載丁未冬君之子芝本攜君所輯方書曰類證治裁者乞序於余始知君之亡亦且八載矣君直外方內治學有根柢已已禮闈報罷退而學醫活人甚多術

既益精而病世之業醫者空疎不學或又拘於成法以蹈偏駭失中之弊於是彙輯古方別裁至當蘄與人：共明之嗚乎其用心若此可不謂中和仁智之

君子乎余固嘗於醫於養身濟世之術未之有得春官十上幸獲通籍而衰態遽侵今茲待罪吳越當時同榜中如顧畊石諸君均先朝露無可與語回首今

昔益信窮達一致勞：於仕宦而以隳其所業曾不若君之窮居著述猶得就一藝以自名此則序君書而不能無慨於中也至於是書之蘊足以挾陰陽而

託性命後之讀者當自得之且已詳於君所自為序故不贅述云
道光歲次丁未十月知江蘇蘇州府事年愚弟桂超萬拜謨



類證治裁序

先祖大銀臺涇厓公於乾隆間奉命摠閱四庫全書獲見神農以來醫家言著錄於文淵閣者九十六部一千八百十有三卷附存其目者九十四

序

部六百八十一卷嘗語類曰舊史醫家多置之簡末今四庫全書子部分十四家儒家第一兵家第二法家第三農家第四醫家第五醫雜一技民命攸關其特升諸他藝術上

有以也。渭厓公博涉於陰陽術數，六壬、耶律之書，手錄甚夥。獨醫類無手定本，家傳唯先大夫澹松公批訂葉氏《診證指南》、手澤猶新。頌類卒未能讀也。林義祠先生嘉慶戊辰

舉鄉魁，墨執膾炙人口。九精岐黃家言，貫串於靈樞素問，雜經諸書，以意為變化而不泥於古。著作之暇，以濟時為心。士大夫皆禮敬之。余久耳其名，丙戌余服闋入都，謁部先

生公車北上，相晤於都門。獲聞緒論，感德君子。一望皆知。辛亥春，嗣君筠石茂才將刊先生所著類證治裁書，為以序。囑余書凡八卷外科附焉。別類分門前列論，方次之。案

又次之。殆與沈氏《尊生書體例略》相近。然詳略輕重之際，妙於剪裁，用卷了然。言辭簡而法弥備，使夫新修之士既得所範圍，中材而下亦得循塗以赴。學者固當分別以觀。

矣昔人論雜經在義設滑壽
以文士而精於醫故所著較
諸家所得為多予於先生心
云均石嗣其先業授度步恒
無不三效叩其所學蓋得於
是書成法為多願不肯私為

序

家傳而公諸同好其體先
生流時之心者矣先生所著
有東野草堂四書文五百餘
篇東野草堂古文二卷駢體
文二卷高以樓古今體詩二
卷百鳥詩一卷詩餘一卷皆

類證治裁 序

予所服膺者均石倘能次第
開雕以昭先澤是又余之厚
望也夫

咸豐元年歲次辛亥孟夏之月
賜進士出身
誥授奉直大夫四川會理州知州

序

同里愚弟吉鍾穎頓首拜撰時
年八十有五



自序

司命之難也在識證識證之難也在辨證識其為陰為陽為虛為實為六淫為七情而不同揣合也辨其在經在絡在腑在臟在營衛在筋骨而非關臆度也顧脈理易滑洞垣誰屬賴古作家別類分門條列治要且於一證錯綜疑似縷析絲分參合脈象詳哉言之仰見心裁獨出矣然不先窺內經奧旨則皆無本之學也遠古聖人盡己性盡人性參贊元化仁壽斯民其心法備載靈素各八十一篇自越人祖述心法垂為難經嗣後長沙論傷寒分究六經河間治溫熱專主三焦東垣倡益氣補中丹溪制滋陰降火濟偏補缺要皆上闡經訓下啟法門卓然自成大家由有明迄今諸名

自序

家亦無不根柢聖經發揮心得以著於篇學者研經旁及諸家說覽沈酣深造自得久之源流條貫自然胸有主義第學不博無以通其變思不精無以燭其微惟博也故腕妙於應而生面別開惟精也故悟徹於元而重關直闢平時灼有定見臨證不設成心診畢矣審用何法法合矣選用何方權衡平裏之厚薄病之淺深治之標本藥之浮沈及一切正治從治上取下取或上病取下下病取上或從陰引陽從陽引陰必先歲氣母伐天和乃知執一者拘多岐者泛師心者復隨俗者庸至於體貼病情曲折都盡刀圭所授立起沈疴善矣若猶未也一法未合雖古法宜裁一方未純雖古方宜裁必脗合而後已此其難殆又在識證辨證後乎乃觀近

日懸壺家大率學殖荒蕪心思膚淺甚則治溫疫以傷寒法治血枯以通痰法與夫喜行溫補不顧留邪動輒攻消不知扶正輕者重重者死矣予思矯而正之己巳計借後歸而就館筆墨少閒爰始蒐輯丙戌後又苦南北奔馳今老矣分編討究懼有遺珠除傷寒全帙無容贅衍外餘多宗經立論酌古用方更欲畧輯傷科兼及幼科而老病浸尋來日苦短缺畧之憾統俟續成且生平本不業醫間有治案附於證後非云程式也聊存梗概以寓別裁之微意云爾編名治裁願與有志醫學者共裁之

道光十九年歲次己亥端午日丹陽林珮琴自題



自序

類證治裁序

先伯父義桐先生以制舉之學者聲藝林垂六十年學者覽其遺文叱咤而嘆意謂先生畢生之精力殆竭於此而弗暇以他及而不知自其少壯喜讀方書五色奇咳術隨年進洎乎手訂治裁書壹志殫心與老病相終始固自有不朽之業而如是乎身心以之者在也今夫方伎之事浸久失傳則益肆為鄙誕以相煽惑獨醫學以切於民生日用理近而事常得以相緣於勿替自仲景著方後賢續而衍之湯液之功遂加於鍼石未可謂所傳之不永矣然而玉版真言靈蘭秘典儒者弗問醫亦舍旃證若繭絲法同射覆所施失當視他方伎為禍尤烈則豈非不學之咎哉然且果於自

序

信率其謬誤出應人急呼可悲矣先生精醫素之旨因遂博覽仲景以下諸名家書既已窮極源流然猶探自船海遊跡所至有主賓數年無識其能醫者里居日久觀察奇恒醫藥所歸巧請至莫可却則慨然以生人自任羸童貧賤前勸借鑒靡不樂効其術乃至富家大族介其所親延緣造請輒十不一二應曰彼豈藉僕生之者其不屑於應酬如此是書稱凡數易嘗語植本曰著書貴適於用吾年且老用吾術生人固有盡吾書成度救時之心與無終極耳又曰近世名家著述其就為集大成者卷帙繁富學者恒憚於誦習又或主辨析名理治法弗取其備中材之士亦無由就一人一證而悟其全吾書務言簡意賅使人開卷了然而已嗚呼

此殆即先生晚年刊落浮華粹然有用之言乎植本愚情無識於先生著述精意不能有所闡發第就先生勤於學術而慎於用術之實以及當時碎呷之言涉是書者著於篇俾讀者有所據以考焉先生生時子芝本方習科舉先生未嘗授以醫及卒而求醫者謂當有異聞仍踵相接不得已循是書成法以應求者而所投輒驗所以勉勉於是刻者又豈徒存先人手澤之意云爾哉時成豐元年歲次辛亥端陽前二日姪植本謹撰



皇清例授文林郎先考魏桐府君傳

府君諱某字某和號義桐先祖翠巖公夫子幼謹愿不好戲弄
嘗自塾中歸有忤之者怒而色赤翠巖公見之教曰君子所以學
為能變化氣質汝坐不離此語耳府君誌之終身不敢忘乾隆戊
申翠巖公以會祖父母命視叔祖養三公於武都府君作憶親詩
轉憶翠巖公之念會祖父母也有秦關雪盡增春水漢塞天低望
白雲之句公歸見之為淚下方公之歸曉行抵邗上策驟過霜橋
履而溺沈浮亂流中掣驟尾得出時冬月衣履沾濡行數里始抵
逆旅由是感寒嘔噦其明年會祖志開公病屬瘴公設神位空室
中伏地祈禱常至夜分及秋反得熱疾竟先志開公卒越數月志

開公亦卒家計管甚府君與叔父叔父叔父叔父叔父叔父叔父
公從張斐園先生學而脩脯無所出府君慮屢叔祖升儒公憂乃
攜約權叔父館於鄉村叔父亦館村塾為西珍叔父課讀伯
父韓五公助升儒公經理家政俄而伯父亦以瘵卒所得館穀絲
粟悉歸升儒公胡希呂憲院試府君以第一名入縣庠諸叔父
亦相繼遊庠諸屢茂屢恩科鄉試府君中式經魁人謂吾祖孝行
食報之始云府君湛深經術為文苦心融鍊務去陳言每屬稿成
弗復檢棄去更草如是數四不厭為生徒點竄課作亦一字不苟
或病其典重謂於場屋風氣非宜笑應曰詎有是耶性沈潛書史
一寓目輒已默識所居室躬自洒滌几席無纖塵獨坐晏如足跡

罕履城市已巳禮闈報罷旋歸先有訛傳中途被盜劫者祖母鄒
大孺人大憂因是終祖母之身不與會試丙子八月祖母卒先兄
舫淮先一月殤道光甲申先兄偉堂暨先姊三姑相繼歿府君嘗
自言獨居循省萬念都盡丙戌歲親友謂府君當預挑選迫促登
程行至固安渡桑乾值大風雪太息作客路吟謂此生不宜再慕
虛名渡河而北也蓋自己已至丙戌始再入都然已大非府君意
矣初志開公嘗以手錄方書付府君日後日習此可以救世府君
讀之有省因遂博觀靈素以下諸名家書窮日課生徒舉業燈下
披閱方書以油盡為率凡數十年以疾就者皆急之起奇疾甚多
其有證非不治卒遷延至死者雖年久仍恨之以語兒輩因嘆世

俗之多誤治也思有以正之丙戌自都中歸始令就醫者遵所服
方擇其要者著為醫案前列證論題曰類證治裁丙申夏患熱疾
幾殆冬月復病欬喘精神大衰唯眼獨明於未病先作小行楷無
須眼鏡喜曰此天助我成此書也為之愈恐不及已亥春欬喘益
劇自知不起而深以治教書未成為憾實則所撰凡三十萬言分
八卷列證一百一十有奇內科可稱大備床褥間自製書序及凡
例命芝本錄之自謂如春蠶到死絲方盡也嗚呼傷哉府君孝愛
仁慈篤於骨肉之誼而閔凶天折所以處之獨難擴乎同仁之情
而澹泊貞廉所以取於世至約隱居懷道以著述自娛行誼文章
卓然可師表後進不肖之本學行無似不能信於當世賢士大夫

邀誌銘以光泉壤大懼先業遂就湮沒謹撰次其畧俟後世君子
樂聞幽德者採焉府君所著四書文及詩古文詩餘共十餘卷類
證治裁八卷均皆手訂府君生於乾隆壬辰十月初六日卒於道
光己亥六月十六日享壽六十有八配吾母薛氏生不肖男三人
長偉堂次舫淮先府君卒次即芝本女一字畦亦早卒孫五人崧
慶崧屏崧福崧庚崧虞皆業儒男芝本泣血謹述
賜同進士出身知江蘇蘇州府事年愚弟桂超萬頓首拜填諱

傳略

三

類證治裁 傳略 凡例

凡例

- 一醫籍浩如烟海求其搜羅該備分析詳明莫如準繩一書茲編
務期簡括俾觀者豁目爽心故徑途各出
- 一仲景傷寒宜參各家辨論茲但取醫學心悟數條不能備載
- 一春溫夏熱兩症多伏氣傷寒邪從腎出此即經所云冬傷於寒
春必病溫冬不藏精春必病溫者也與口鼻吸入之邪伏於募
原淺深異治學者當分別觀之
- 一時疫症張景岳既失之溫補吳又可又但主急下張氏醫通揭
明地氣鬱蒸一義最宜參究
- 一香巖葉先生所傳臨症指南案隨診立不暇修飾然如脾臟胃
腑歷來混治先生獨因經旨喜燥喜涼悟出臟主守腑主通二
義論東垣補中益氣治在脾仲景急下存陰治在胃何等超妙
即如不食一症粗工但知燥脾愈燥愈結先生獨議養胃陰遵
治輒驗此類皆素所服膺
- 一肝風眩暈與類中相近原可併為一門茲依指南例另為拈出
意在醒目
- 一目喉乳俱系專科病症治法繁瑣不能備載茲但撮舉其要
- 一各症宗經立論酌古用方列綱分目首層層推勘而出但方中
品味未能一一細心商訂皆垂暮精神不能周浹之故閱者諒
之

類證治裁

卷之首

凡例

一論中於精要處用○提綱處用、俾閱者得其意指一目了然
一方名重複者則不註藥味但書見某卷某症至於方名同而藥
味不同者則仍載原方

一外科另屬一門今附論數篇列於卷末俾閱者畧知要領

類證治裁

卷之首

凡例

二

類證治裁目錄

丹陽林珮琴義桐甫著

男

芝本校

孫

崧慶閱字

崧屏

崧庚

崧福

崧廣

卷之首

序

內景綜要

凡例

卷之一

類證治裁

卷之首

目錄

中風類中

傷風

傷寒

溫春溫

風溫

溼溫

冬溫

溫毒

熱

暑

暑冒暑

傷暑

中暑

中暈

伏暑

次暑

暑風

暑厥

暑瘧

疰夏

溼溫

暑瀉

暑瀉

伏暑

溼

風溼

溼熱

寒溼

暑溼

中溼

燥

火

疫

大頭瘟

捻頸瘟

瓜瓢瘟

楊梅瘟

疔瘡瘟

絞腸瘟

軟腳瘟

卷之二

虛損	勞瘵	卷之三	類證治裁
欬嗽	肺痿	脫	卷之三
肺癰	失音	血溢	心漏
哮喘	喘短氣	脾血	汗
痰飲	諸血	吐血	欬血
			嗽血
			咯血
			唾血
			嘔血
			衄
			口鼻衄
			耳衄
			眼衄
			齒衄
			舌衄
			肌衄
			九竅衄
			脾胃
			飲食
			噎膈
			關格
			肝氣
			肝火
			肝風
			嘔吐
			反胃
			諸氣
			鬱
			嘔
			噎
			體
			疔
			痞滿
			積聚
			癰
			癩
			癩狂
			癩之四
			癩之四

類證治裁 目錄

怔忡	卑慄	驚恐	健忘	多寐	疸	黃疸	穀疸	酒疸	女勞疸	卷之五	類證治裁
煩躁	不寐	三消	黃汗疸	黃胖	脫力黃疸	陰瘡	霍亂	泄瀉	痢	頭風	雷頭風
											蛇皮風
											鵝掌風
											赤遊風
											白遊風
											紫癩風
											白癩風
											癩風
											腎臟風
											繡毯風
											雁來風
											紫雲風
											牛皮癬
											疥癩
											汗斑
											雀斑
											酒刺
											白屑
											痺
											痿
											痛風
											歷節風
											麻木
											眩暈
											厥
											腳氣
											鶴膝風
											膝遊風
											膝眼毒
											膝癰
											破傷風
											破傷溼
											破傷火
											卷之六
											頭痛
											大頭痛
											發頭
											眉稜骨痛
											眼眶痛
											耳
											目

鼻口 齒舌 牙疔 骨槽風 牙疳
 多骨疽 咽喉 喉連 嚙喉風 乳蛾
 喉癰 喉疔 喉菌 蟻舌喉疔 喉閉 喉杵 爛喉痧
 胸痺 心痛 心疝 心瘕
 胃脘痛 胃脘瘕
 腹痛 腹中窄狹 脇痛
 腰脊腿足痛 腰痠 腰囊廢 腰軟 尻 膝 跟
 身痛 肩背手臂痛
 卷之七 腸鳴 腸瘕

類證治法

卷之七

目錄

同

疝氣 淋濁
 遺精 陽痿 九冷 莖縮 莖縱 強中
 下疳 畜血
 溺血 便血 腸風 藏毒
 二便不通 閉癰遺溺 胞痺
 轉胞交腸 脫肛 肛瘻 肛痛
 痔漏 耳痔 鼻痔 腦漏 偷糞鼠 跨馬瘻
 諸蟲
 卷之八 調經 經閉 經早 經遲 經亂 經痛

經色 倒經 居經 淋瀝不止 乍多乍少
 崩漏 胎前 惡阻 胎漏 胎動 胎不
 長 胎大 胎墮 半產 子煩 子懸 子腫 子嗽
 子瘡 子癩 子暈 子淋 遺溺 轉胞 傷風 傷寒
 孕瘧 孕痢 傷暑 諸痛 孕瘕 乳泣 腹痛 鬼胎
 胎死 過期不產 臨產 血暈 產後諸禁
 產後 乳
 熱入血室 疔瘕癥瘕諸積
 帶下 赤白帶 白濁 白淫
 前陰諸疾

類證治法

卷之七

目錄

五

外科附
 諸瘡 瘰癧結核癭瘤馬刀
 梅毒結毒 疔毒
 發背搭手 蓮子發 蜂窩發 竟體疽

內景綜要

自天以氣照地以形。生其間者。陽化氣而陰成形。喉以通天和。咽以納地產。喉前受穀者濁。受氣者清。清者注肺。濁者走胃。濁則為衛。清則為營。營陰衛陽。營行脈中。衛行脈外。陰陽相貫。如環無端。中氣出上焦。營氣出中焦。衛氣出下焦。皆水穀之精悍。水穀之營。水穀之悍。氣為衛。流布於藏腑者也。藏有五。心藏神。肺藏魄。肝藏魂。脾藏意。腎藏志也。腑有六。膽無出入。胃受水穀。大小腸主津液。膀胱三焦。司氣化也。五藏藏精。不瀉滿而不能實。故以守為補。焉。六腑傳化不藏。實而不能滿。故以通為補。焉。肺右降。肝左升。脾陰運。胃陽納。膀胱司開。腎司闔。胃喜涼。腸喜熱。膽喜溫。心惡熱。肺惡寒。肝惡

類證治裁

榮之貴

內景

風腎惡燥。脾惡溼。知五藏之苦。欲而補瀉。殊。肝苦急。心苦緩。脾苦燥。肝欲散。心欲栗。脾欲緩。肺欲收。腎欲堅。審六腑之出入。而清濁別。由藏陰腑陽之不一。其性也。五藏外加心包絡。即膻代心行令。與三焦相配。則十二藏腑具焉。其十二經之隸於各藏腑者。行有順逆。手之三陰。手少陰心。手少陰心。從臑走手。手之三陽。手太陽小腸。手少陽三焦。手陽明大腸。從手走頭。厥陰心包。從臑走手。手之三陽。手太陽小腸。手少陽三焦。手陽明大腸。從手走頭。足之三陽。足太陽膀胱。足少陽膽。足陽明胃。從頭走足。足之三陰。足太陰脾。足少陰腎。足厥陰肝。從足走腹。太陽與少陰為表裏。少陽與厥陰為表裏。陽明與太陰為表裏。皆一藏一腑相配也。諸陽經會頭而於上。諸陰經至胸頭而還。惟厥陰肝經上入顛。連目。其行身之後者。足太陽經也。主表。痛脊強。行身之前者。足陽明經也。主表之裏。熱目痛。行身之側者。

類證治裁 內景綜要

足少陽經也。主半表半裏。病主脇痛耳。足厥陰為陰中之陽。病主滿。足少陰為陰中之陰。病主舌。足太陰為陰中之至陰。病主腹。皆主裏。若夫奇經八脈。陰維由內踝而上。主身之裏。陽維由外踝而上。主身之表。所以綱維周身之營衛也。陰維為病。苦心痛。陽維為病。苦寒熱。陰蹻起跟中。循內踝上行。主一身左右之陰。陽蹻起跟中。循外踝上行。主一身左右之陽。所以統陰陽而行。蹻捷也。陰蹻病。陰急而足直。督起會陰。循背而行。身之後。所以督率諸陽。強折厥任。起會陰。循腹而行。身之前。所以擔任諸陰。疝女瘕。衝亦起會陰。夾臍而上。行胸中。當諸氣之衝要。蓋一源而三歧。帶起季肋。橫束於腰。為諸脈之總約。帶病腹痛。八者無表裏配合。故謂之奇經。經脈蓄溢。則注奇脈。

類證治裁

榮之貴

內景

猶溝渠雨溢。旁流湖澤也。既有經脈。復有絡脈。絡凡十五。各有二絡。又陽蹻陰蹻二絡。蓋直行為經。橫支為絡。絡之別為孫絡。凡三百六十有五。初病在絡。所以行氣血通陰陽。以榮於身者也。且夫氣主响。血主濡。太陽膀胱。常多血少氣。少陰腎。常少血多氣。陽明胃。常多血多氣。太陰脾。常多氣少血。少陽膽。常少血多氣。厥陰肝。常多血少氣。其盈虧有如此者。氣血所周。子時注膽。丑時注肝。寅時注肺。卯時注大腸。辰時注胃。巳時注脾。午時注心。未時注小腸。申時注膀胱。酉時注腎。戌時注心包。亥時注三焦。其迭更有如此者。血隨氣運。春氣在經脈。夏氣在孫絡。長夏氣在肌肉。秋氣在皮膚。冬氣在骨髓。其深淺有如此者。海有四衝。為血海。膻中為氣海。

腦為髓海。胃為水穀海。門有七。唇為飛門。齒為戶門。會厭為吸門。胃上口為賁門。下口為幽門。小腸下口為闌門。大腸下為魄門。即門。竅有九。肺竅於鼻。脾竅於口。心竅於舌。肝竅於目。腎竅於耳。亦竅二陰。脊二十一椎。肺六葉。兩附脊第三椎為華蓋。心七孔。附脊第五椎如蓮蕊。外有包絡。中通肺脾。肝腎心下有膈膜。周遮濁氣。肝七葉。左三右四。附脊第九椎。膽三寸。居肝葉下。為清淨府。脾象刀鎌。與胃連膜。胃當脊第十一椎。分上中下。腕以達腸。為太倉。腎兩枚。附脊第十四椎下。中間命門。真陽為生身根蒂。小腸連胃下口。前附臍後近脊。左迴疊十六曲。以泌別清濁。大腸屬小腸下口。當臍右迴疊十六曲。達廣腸。抵直腸。傳濁出後陰。膀胱無上口。當脊第十九椎。化氣滲水。以出前陰。細思交膈一疝。知膀胱亦有上口。而常閉。得此焦氣化水。滲肝中。而為溺。

耳。三焦相火。遊行諸經。周身上下。上焦如霧。在胃上腕。主出陽氣。中焦如漚。當胃中腕。蒸化精微。下焦如瀆。當臍下。濟泌別汁。此十三藏腑之象形部位。宜按圖而審指者也。驗於內。則諸氣皆屬於肺。諸血皆統於脾。諸脈皆應於心。諸筋皆隸於肝。諸髓皆司於腎。諸藏皆稟氣於胃。驗乎外。則肺主皮毛。脾主肌肉。肝主爪甲。胃主四肢。腎主五液。心為汗。肺為涕。肝為淚。脾為涎。腎為唾。心主舌色。一身所寶。惟精氣神。神生於氣。氣生於精。精化氣。氣化神。故精者身之本。氣者神之主。形者神之宅也。精者神倚之如魚得水。氣依之如霧覆淵。故陰精所奉。其人壽。言乎形。則頭者陽之會。顛者髓之門。髮者腦之華。庭者眉之宇。瞳者腎之精明堂。

類證治裁

卷之四

內景

四

者色之應。口角者地之倉。眼者胃之絡。齒者骨之餘。會厭者音聲之戶。廉泉者津之道。舌者心之苗。咽者脈之聚。脾胃心腎肝小腸脈循咽挾咽。者營之居。元腑者肝之孔。胸中者陽氣之郭。離宮者神之舍。募原者五藏之空。膈盲者上下之蔽。氣街者經之隧。神闕者臍之宮。背者經之俞。十二經俞穴。脊者身之柱。膂者脊之輔。腋者肩之谷。肘者肢之節。臂者身之使。肩下臂上。內為膈。外為腋。節次為肘。肘下為臂。臂下為腕。腕下為掌。者關之前。尺者關之後。合谷者骨之歧。大次指陷中。虎口穴。勞宮者掌之心。腰者精之府。命門者生之根。腎者胃之關。季肋者膽之部。肋骨男二十四。女二十八。宗筋者莖之系。舉丸者腎之外候。胞宮者任之內維。任主胎。胎居者節之氐。節者骨之樞。股者脾之續。膝者筋之總。膕者膝之曲。膕者足之趾。踝者骨之突。跗者足之面。躡者足之跟。湧泉者足之心。此按部定名。所可臚指者也。

類證治裁

卷之四

內景

四

丹陽林珮琴撰桐甫著

男 芝本校

中風論治

風為百病之長。故六淫先之。以其善行數變。受之者輕。為感冒。重則為傷。最重則為中。然有真中。類中。中血脈。經絡。腑臟之辨。西北高寒。風勁真氣虛者。猝為所中。是名真中。經所謂風中六腑五臟之俞也。真中者。風邪在表。身痛拘急。宜汗。小續命湯。或疏風散風。邪在經。口眼喎斜。偏枯。痿痺。犬秦。九湯。或愈風湯。風邪入裏。多滯。九竅。唇緩。便秘。口不能言。耳聾。鼻。東南卑溼。釀熱。真陰虧。塞目。昏。痰涎。昏。胃。宜下。三化湯。或麻仁丸。東南卑溼。釀熱。真陰虧。者。風自內生。虛陽上冒。亦致昏仆。是為類中。實與外風無涉。經所

類證治裁

卷之一

中風

謂陽之氣以天地之疾風名之也。類中者。痰多。壅塞。搗。蘿蔔子。以君湯。異功散。腎虛水泛。為痰者。六味丸。或八味丸。夫以地分真類。謂真味丸。湯服。中氣虛者。補中湯。陰虛者。補陰煎。中者。西北為劇。類中者。東南為多。未可膠柱以談也。善乎石頑張氏之說。曰。嘗診西北中風者。驗其瘡。非遺尿。詎非下元之憊。當從事地黃。三生等飲乎。嗚。僻。不遂。詎非血脈之廢。當從事建中。十全等湯乎。東南類中。豈無六經形症。見於外。便溺阻。隔。見於內。當從事續命。三化等湯乎。是真通論矣。其中血脈。則口眼喎。僻。中絡。則肌膚不仁。中經。則脊重。不伸。中腑。則肢節廢。便溺阻。中臟。則舌瘡。吐沫。金匱分析。既明。至于金引岐伯論中風。大法有四。一偏枯。半身不遂也。二風。痺。四肢不收也。三風。懿。奄忽。不知人。舌強。不能言

也。四風。痺。諸痺。類風。狀也。迄乎河間。主火。謂心火暴盛。東垣主氣。謂脾中乃丹溪主痰。謂溼生痰。痰總之氣。虛則火動。痰升。其症似本氣自病。丹溪主痰。生熱。熱生風。總之氣。虛則火動。痰升。其症似風。非風。皆辨明類中之。宜養氣。血。兼清痰。火。大忌風燥之劑。凡虛風外中。輕則麻痺。不仁。羌活愈。重則癱瘓。不用。羌湯。其痰。火。內生。輕則舌強。難語。湯。重則痰壅。神昏。丹。既辨其中絡。中經。中腑。中臟。及中經絡。兼中腑臟。并審其兼虛。兼實。兼寒。兼熱。兼痰。而入手先分閉症。脫症。如牙關緊閉。兩手握固。是為閉症。蘇合香丸。如口開。脾絕。手撒。心絕。眼合。肝絕。遺尿。腎絕。鼻鼾。肺絕。以及吐沫。直視。搖頭。面赤。如妝。汗出。如珠。皆為脫症。大劑理中。兼灸臍下。凡初中。先用通關。吹鼻。有嚏。可治。無嚏。多死。

類證治裁

卷之一

中風

足陽明之經。上夾口。風寒乘虛。入則急。口。先用烏梅肉。為末。擦牙。宜竹瀝。薑汁。調。蘇合香丸。灌之。再用巴豆。油。紙。捲。其。禁。可。開。稀。涎。散。加。橘。紅。或。薑。湯。灌。之。以。驚。入。鼻。中。人。事。自。省。痰。宜。吐。之。稀。涎。散。或。三。聖。散。瓜。蒂。散。加。蠟。吐。之。後。用。星。香。散。二。陳。湯。挾。虛。加。竹。瀝。挾。寒。加。薑。汁。脾。虛。嘔。痰。六。君。湯。中。氣。虛。理。中。湯。口。因。血。液。衰。涸。不。能。榮。潤。筋。脈。則。急。引。頰。移。口。有。熱。則。筋。弛。有。寒。緩。不。勝。收。故。僻。又。云。足。陽。明。宜。潤。燥。以。熄。風。大。秦。九。湯。或。十。手。太。陽。經。急。則。口。目。為。僻。宜。潤。燥。以。熄。風。大。秦。九。湯。或。十。半。身。因。氣。血。不。至。故。痛。癢。不。知。經。曰。營。虛。則。不。仁。衛。虛。則。不。用。營。衛。俱。虛。則。不。仁。且。不。用。自。丹。溪。以。左。枯。屬。血。虛。用。四。右。枯。屬。氣。虛。用。四。氣。血。兩。虛。而。挾。痰。用。二。加。鉤。藤。竹。瀝。薑。汁。宗。其。治。者。多。不。效。何。也。治。偏。枯。宜。從。陰。引。陽。從。陽。引。陰。從。右。引。左。從。左。引。右。

使氣血灌注周流不息。莫如養血溫經。補中湯少加附子。以附子能行參耆之力。而陽和自轉。肉桂能通血脈。而筋節自榮。挾痰者。八珍十全等湯加營衛俱虛者。黃耆五物湯。膝骨軟加木瓜當歸。南星半夏薑汁。四肢不收。諸陽經皆起於手足。循行身體。如邪氣客於肌膚。隨其虛處。停滯與氣血相搏。故肢不舉。脈緩大有力。土太過也。當瀉其溼。胃苓。脈細小無力。土不足也。當補其氣。補中。瘦人血枯筋急。木旺風淫者。四物湯加鈞藤。肥人色白多痰者。六君湯加秦艽。秦艽防風木瓜。角弓反張。邪入經絡。則腰背反折。攣急如角弓狀。命湯如先受風復感寒無汗惡寒為剛瘓。先受風復感溼惡風有汗為柔瘓。剛瘓命湯去柔瘓。續命湯去麻黃。

癱因肝熱風火搏於經絡。則手足抽搐。或伸或縮。而動不止。由血虛不能榮筋。而燥氣乘之。宜滋肝腎。灌輸筋脈。使水旺火熄。則風木自平。大秦艽湯。或十補湯加減。

猝倒。凡類中病出於臟。精去則氣去。所以眩暈猝倒。氣去則神去。所以昏憤無知。陰陽脫離。精氣不交。須參附大劑。峻補其陽。繼以地黃丸。加杞子當歸。或十補丸。填補真陰。若心火盛。腎水衰。致猝倒神昏。肢掣口喎。宜地黃飲子。去峻補其陰。繼以散。生脈滋其化源。
舌強。舌為心脾肝腎四經所系。邪中其經。則痰涎閉其脈道。舌機不語。因痰迷心竅者。清心火。痰因溼痰者。清脾熱。六君湯加枳實竹茹。

因風熱者。清肝火。涼膈散。腎虛內奪為瘖非。地黃。舌強口角流涎。脾不能攝者。六君湯加竹瀝薑汁。驚痰堵塞。舌本強硬者。正舌散。舌麻語蹇者。省風湯。唇緩舌強者。解語湯。肥人舌本強作溼痰治。瘦人作心火治。不可純補。恐堵塞經絡中痰火。轉舌膏。外取龜尿少許。點舌神效。置龜於新荷葉上。以有飲食照常。但失音不語者。名曰啞風。宜小續命湯去附子。益智五味。以係元陽之脫。火虛者。地黃水虛者。遺尿。係腎氣虧極。用參耆木附子。以係元陽之脫。火虛者。地黃水虛者。六味丸。

凡虛陽上巔。得痰升則眩暈。經所謂上虛則眩也。宜培其中氣。五福飲。或大補元煎。加此猝倒所由來也。

麻木。遍體頑麻。無汗氣實。烏藥順氣散。十指及面麻木。乃氣虛風襲中。不仁。湯去木歸陳。加麻木體軟。搔起白屑。乃脾血不榮。補中湯去柴胡。加地黃白芍。五味子。真中風。雖風從外。中亦由內。虛召風。其攣急偏枯。口喎舌強。二便不爽。由風挾痰火壅塞。致營衛脈絡失和。先用通關。繼則養血順氣。佐以消痰清火。大秦艽湯。宜通經。風閉。用桂枝羌活。寒凝。用膏溼。用蒼朮。五苓。血瘀。用桃仁。牛膝。氣滯。用枳實。石菖蒲。用木香。枳殼。青陳。痰阻。用星夏。浮石。牛黃。類中風。本非外風。猝仆昏厥。無喎斜偏廢等症。是宜辨也。故葉氏謂內風。乃身中陽氣變化。肝為風臟。因血液衰耗。水不涵木。肝陽偏亢。內風時起。宜滋液熄風。濡養營絡。以熟地首烏。杞子。當歸。牛膝。補陰。潛陽。如虎潛。胡麻。石劑。五味子。甘菊。牡蠣。固本。復

脈之陰陽並損無陽則陰無以化宜溫柔濡潤如沙苑子菴藎杞
 通補如地黃飲子風木過動中土受戕致不寐不食衛疏汗泄飲
 食變燥如六君湯玉屏風散痰風陽上升痰火阻竅神識不清至
 丹芳香宜竅或辛涼之品如菊葉葛蒲山梔羚羊角天麻丹皮鉤藤清上痰火若陰陽
 失交真氣欲絕用湯參附回陽佐以攝陰骨牡蠣此其治也自土
 材以類中症條分火中虛中溼中寒中暑中氣中食中惡中而金
 鑑因之火中即河間所謂癱瘓多山火盛水衰心神昏胃筋骨不
 用也心火盛涼膈散虛中即東垣所謂猝中昏憤皆屬氣虛煩勞
 補中湯房勞精溼中即丹溪所謂東南溼土生痰痰熱生風因而
 脫生脈補精湯溼中即丹溪所謂東南溼土生痰痰熱生風因而
 昏胃內中溼者醇酒厚味生冷過節溼溼湯寒中體強口紫冷痛
 昏胃外中溼者陰雨露霧坐臥溼地除溼湯寒中體強口紫冷痛

類證治裁
 類之
 中風
 葛附湯身寒無暑中面垢暈倒須分陰陽得之受暑納涼寒外暑
 汪附子麻黃湯暑中外皆熱昏仆不醒蒜汁合水灌之繼以辰
 赤日長途中外皆熱昏仆不醒蒜汁合水灌之繼以辰
 砂益元散氣實者蒼朮白虎湯氣虛者人參白虎湯氣中氣逆
 痰潮牙關緊急極似中風但中風身溫中氣身冷中風脈浮應人
 迎中氣脈沈應氣口蘇合香侯醒以八味順氣因怒氣逆忽然昏
 禁木香調有痰散星香食中醉飽後或感寒或惱怒胃氣不行忽然
 厥逆誤作中風中氣治必死薑鹽探吐感寒者藿香正氣散惡中
 飛尸鬼擊卒厥客忤肢冷口噤蘇合香侯少甦服調氣平
 中風脈候
 浮遲者吉堅大急疾者凶浮大為風浮遲為寒浮滑為痰浮數有
 力為火浮弦有力為氣沈澁而數為血凝寸關虛滑而大為真氣

散尺脈浮而無力為腎氣不足尺脈洪弦而數為腎陰大虧類中
 風脈遲緩可生急數弦大者死舉止搏大按之絕無為孤陽無依
 者死口開眼閉手撒遺尿鼻鼾吐沫直視昏沈不醒髮直搖頭上
 竄而赤頭重山根青黑皆不治

類證治裁
 類之
 中風
 小續命湯 麻黃 人參 黃芩 芍藥 甘草 川芎
 疏風散 麻黃 三兩 杏仁 益智仁 各一兩 升麻 一錢
 大秦丸湯 茯苓 羌活 獨活 秦艽 石膏 白芷
 防風 細辛 羌活 獨活 秦艽 石膏 白芷
 愈風散 大秦 羌湯 加 人參 黃耆 桂心 厚樸 柴胡
 枳殼 杜仲 防己 知母 半夏 薄荷 蔓荊

府實中藏脾虛嘔痰腎虛陽虛中滋
 甘菊 前胡 蒼朮 地骨皮
 麻黃 枸杞 枳實 厚樸 羌活
 三化湯 大黃 枳實 厚樸 芍藥 麻仁 杏仁 蜜丸
 麻仁丸 大黃 枳實 厚樸 芍藥 麻仁 杏仁 蜜丸
 六君子湯 人參 白朮 茯苓 各二錢 甘草 一錢 薑三
 片 棗二枚 名四君子湯 此加陳皮 半夏
 異功散 六君子湯除去半夏
 六味地黃丸 熟地 黃酒 蒸晒 八兩 黃肉 山藥 各四兩
 茯苓 丹皮 澤瀉 各三兩 蜜丸
 八味地黃丸 此再加附子 一兩 桂心 一兩 名七味地黃丸
 補中益氣湯 黃耆 錢半 當歸 各五分 甘草 各一錢 白朮
 陳皮 當歸 各五分 升麻 柴胡 各三分
 補陰煎 熟地 黃藥 知母 龜板 白芍 當歸 牛膝
 虎脛骨 瑣陽 廣皮

除痰宣蔽 辟邪 閉症脫症 取嚏吐涎吐痰 痰化痰滯痰化 痰膠痰溫中補氣 營衛瀉瀉 陰補

滌痰湯 人參 南星 半夏 枳實 茯苓 橘紅 菖蒲
至寶丹 烏犀角 珠砂 雄黃 玳瑁 琥珀各研一兩
研半兩 麝香 龍腦各研一錢 金銀箔各十五片 牛黃
丸蠟護 安息香一兩 將安息香熬膏和諸藥末分作百

蘇合香丸 蘇合香 安息香各二兩 薰陸香 龍腦 丁
香附 烏犀角各研一兩 加煉白蜜和分作五十九丸另以
硃砂一兩水飛爲衣蠟護原方又有檀香 藜蘆 訶黎勒
三生飲 生南星 生川烏 生附子 木香 人參 薑

理中湯 白朮 土炒二兩 人參 炮薑 炙草各一兩 每
服四錢 加附子名附子理中湯

通關散 南星 皂角 細辛 薄荷 生半夏 爲末吹鼻
又南星 冰片 烏梅肉 擦牙開喉名開關散

稀涎散 剛子仁六粒劈開 牙皂角三錢 礬一兩 將礬
化開入二味攪勻待礬枯研末用三分吹喉

三聖散 防風 藜蘆 甜瓜蒂

瓜蒂散 甜瓜蒂 赤小豆 全蠍 又名全蠍散

星香散 南星四錢 木香五分

二陳湯 半夏二錢 陳皮 茯苓各一錢 甘草五分
加薑煎 二陳湯再加 膽南星 枳實

導痰湯 人參 白朮 炮薑 扁豆 當歸 陳皮 炙草

溫胃飲 人參 白朮 炮薑 扁豆 當歸 陳皮 炙草

十全大補湯 當歸 生地各三錢 芍藥二錢 川芎錢半
名四物湯 合四君子湯名八珍湯 再加黃

黃耆五物湯 黃耆 白芍 桂枝 薑 棗

胃苓湯 蒼朮 厚樸 陳皮 甘草 名平胃散 白朮
澤瀉 豬苓 茯苓 名四苓散 二方名胃苓湯

地黃飲子 熟地 桂心 附子 菴蓉 巴戟 遠志 茯苓
肉 石斛 麥冬 五味 薄荷 菖蒲 茯苓

瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉

瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉

涼膈散 大黃 芒硝 連翹 山梔 甘草 黃芩 薄荷
正舌散 蜜尾醋泡炒三錢 茯苓 薑汁并晒一兩 爲末每
省風湯 防風 生南星各二錢 并擦牙齦
解語湯 防風 羌活各八分 附子 藜蘆各錢半 羚羊角
加味轉舌膏 防風 羌活 薄荷 犀角 大黃
元明粉 川芎

五福飲 人參 熟地 當歸 白朮 炙草

大補元煎 人參 熟地 山藥 杞子 黃肉 當歸
烏藥順氣散 陳皮 枳實 桔梗 烏藥 薑 白芷

虎潛丸 黃蘗 知母 熟地 龜板 虎脛骨 鎖陽
當歸 牛膝 白芍 陳皮 羯羊肉 鴉片

固本丸 人參 天冬 麥冬 生地 熟地各四兩
復脈湯 炙草四兩 生薑 桂枝 人參 阿膠各二兩
水酒各半煎 麥冬 麻仁各八兩 大棗十二枚
一名炙甘草湯

還少丹 熟地二兩 山藥 中膝 杞子各兩半 黃肉
菴蓉各一兩 杜仲 遠志 五味 枳實 茴香 巴戟
加棗肉 蜜丸 鹽湯下

玉屏風散 黃耆 防風各一兩 白朮二兩

外臺茯苓飲 茯苓 人參 白朮 枳實 橘皮 生薑

酸棗仁湯 棗仁 甘草 知母 茯苓 川芎

生脈補精湯 人參 麥冬 五味 熟地 當歸 鹿茸

滲瀉湯 即胃苓湯加 香附 川芎 砂仁 黃連

瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉

外 濕 身 寒 驅 暑 陰 暑 除 暑 熱 調 氣 暴 怒 中 暑 惡 中

除溼湯 羌活 藥本 升麻 柴胡 防風 蒼朮
附子麻黃湯 附子 麻黃 甘草
香薷飲 香薷 厚樸 扁豆 黃連 除扁豆名黃連香薷
二香湯 香薷飲合藿香正氣散名二香湯

蒼水白虎湯 石膏一觔 知母六兩 甘草二兩 粳米六
八味順氣散 人參 茯苓 白朮 甘草 烏藥 白芷

木香調氣飲 木香 藿香 砂仁 蔻仁 炙草 丁香

藿香正氣散 藿香 紫蘇 白芷 腹皮 茯苓各三兩
甘草一兩 加薑 陳皮 半夏 厚樸 桔梗各二兩

每服五錢

調氣平胃散 木香 檀香 砂仁 蔻仁 厚樸 陳皮

類證治裁 卷之一 九

中風

楊 冬月辦公夜半猝倒榻下不省人事身熱痰壅口喎舌強四肢不收脈左虛滑右浮滑先用薑汁熱挑與之痰頓豁暫用疏風化痰藥宣通經隧神識漸清右體稍能轉側但左體不遂語言糲糊症屬真陰素虛以河間地黃飲子去桂附巴戟加杞子牛膝俱酒木瓜何首烏數十服諸症漸退稍能步履惟左手不隨前方加桂枝薑黃數劑左腋時時微汗不一月左手如常按此症乃風自火出火自陰虧水不涵木肝風內煽痰火上乘堵塞清竅是以猝倒無知也口喎者胃脈夾口環唇寒則筋急熱則筋弛或左急右緩或右急左緩張氏醫通曰左寒右熱則左急而右緩右寒左熱則

類證治裁 卷之一 中風

右急而左緩蓋左中寒則通熱於右右中寒則通熱於左陽氣不得宣通故也舌強者舌本心苗腎脈系舌本心火盛腎水衰故舌強肝主筋胃主四肢肝胃血虛則筋不榮而成痿軟也左脈滑則水虧右脈滑則痰盛此偏枯之象已具但非暫進豁痰則經隧不開湯液難下用地黃飲子減去陽藥正以五志過極而生火法當滋陰而風火自熄 河間謂中風癱瘓非肝木之風亦非外中於風乃心火暴盛腎水虛衰不能制之而熱氣怫鬱心神昏冒猝倒無知也亦有因五志過極而猝中者皆為熱甚俗云風者言末而忘其本也製地黃飲子原主補腎之真陰但陰虛有二有陰中之水虛有陰中之火虛火虛者桂附巴戟可全用水虛者非所宜也

族某左體麻木脛骨刺痛腰膝痿軟能飲多痰脈左大右濡此陰虛生熱而挾溼痰也用薛氏六味地黃丸作湯劑君茯苓加生木薏仁牛膝黃蘗俱酒炒十數服諸症悉退步履如初 丹溪以麻為氣虛木為溼痰敗血其脛骨刺痛者腎虛挾火也腰膝痿軟腎將憊矣法當戒飲以六味湯滋化源而君茯苓佐木薏引用牛膝黃蘗以泄濕熱利腰膝不犯先哲類中禁用風燥之例

李 右體不遂艱於行步已為三年痼疾辭以難治詢所苦曰大便甚難但得爽利為幸耳診其脈右三部全伏左三部洪大無倫因思右枯既久腑陽必衰大腸曲折至右畔傳送自遲宜從風秘法以辛通濡潤如搜風順氣丸但命火衰微右體冰冷先

類證治裁

卷之二

中風

出

用崔氏桂附八味丸作煎劑二服便爽右肢運動稍活後於八味丸加茯苓當歸蜜丸服效

孫 高年上盛下虛頭眩肢麻耳鳴舌強值少陽司令肝風內震脈象浮洪消穀善饑便溏汗泄皆液虛風動之咎交夏火旺遂口喎言蹇此火風襲絡類中顯然最防傾仆痰湧又午刻火升頭汗身熱其由來則本陰不交陽無攻風劫痰之理治以水涵木兼攝虛陽熟地五錢五味子五分麥冬錢茯苓三錢牡蠣醋煨研甘菊炒錢鮮石斛三錢白芍二錢川貝母半錢丹皮一錢阿膠水化二錢三服諸症悉退脈漸平惟夜臥少安帖此肝虛而魂失靜鎮也原劑中加龍骨煨七分接服勿間另訂膏方即用前味加洋參黃肉蓮實

桑枝取嫩者熬膏收貯嘗退火氣每服五錢能加意調攝可望回春

類證治裁

卷之二

中風

出

傷風論治

風者天之陽經云。虛邪賊風。陽先受之。風邪傷衛。故腠理疏者。善病風。其症惡風有汗。脈浮頭痛。鼻塞聲重。欬嗽痰多。或憎寒發熱。惟其人衛氣有疏密。感冒有淺深。故見症有輕重。治法不宜表散。太過不宜補益。太早須察虛實。審輕重。辨寒熱。順時令。經云。風淫所勝。平以辛涼。佐以苦甘。凡體實者。春夏治以辛涼。秋冬治以辛溫。解其肌表。風從汗散。體虛者。固其衛氣。兼解風邪。恐其行發散。汗多亡陽也。如初起風兼寒。宜辛溫發表。鬱久成熱。又宜辛涼疏解。忌初用寒涼。致外邪不得疏散。鬱熱不得發越。重傷肺氣也。如體虛感風。微覺寒熱。參歸桂枝湯。傷風。傷肺。傷寒。熱頭痛。欬嗽。腕悶。桔

類證治裁

傷風

傷風

傷風

傷風。傷管。衛頭痛。欬則閃爍筋掣。當歸補。太陽傷風。發熱自汗。惡風。桂枝湯。傷風。頭痛。鼻塞。聲重。川芎茶。傷風。兼寒。欬嗽。發熱。煎。柴。陳。風。溫。傷。肺。身。痛。腕。痺。梔。枝。湯。加。象。貝。杏。仁。暑。風。上。受。痰。熱。喘。嗽。石。膏。湯。加。桔。杏。薑。風。兼。溼。頭。目。如。蒙。痰。稠。胸。悶。通。草。豆。豉。厚。樸。滑。石。草。陳。皮。滑。石。風。兼。溼。頭。目。如。蒙。痰。稠。胸。悶。石。桔。梗。杏。仁。桔。薑。火。傷。風。火。鬱。燥。嗽。咽。痛。甘。桔。湯。加。薄。荷。元。熱。傷。風。欬。而。咽。痛。鼻。塞。吐。痰。消。風。散。風。邪。外。閉。肢。節。煩。痛。裏。有。鬱。熱。羌。活。散。時。行。感。冒。寒。熱。往。來。傷。風。無。汗。毒。散。神。水。散。總。之。傷。風。須。察。其。六。淫。兼。症。且。經。疏。解。後。若。仍。惡。風。自。汗。但。當。調。衛。和。營。湯。八。珍。或。表。虛。易。感。受。風。邪。必。固。實。腠。理。玉。屏。斯。為。善。後。之。防。矣。

傷風脈候

脈浮為傷風。浮而緊者兼寒。浮而緩者兼溼。浮而洪者兼火。浮而滑者多痰。浮而有力為表實。無力為表虛。

附方

參歸桂枝湯 桂枝 芍藥 甘草 生薑 大棗 名桂枝 湯 此加人參 當歸 厚樸 蘇梗 連翹 杏仁 鼓桔湯 豆豉 桔梗 滑石 厚樸 蘇梗 連翹 杏仁 當歸建中湯 桂枝 芍藥 甘草 饴糖 生薑 大棗 名建中湯 此加當歸 川芎茶調散 薄荷 川芎 羌活 甘草 荆芥 白芷 柴陳煎 柴胡 黃芩 製半夏 茯苓 陳皮 甘草 梔枝湯 豆豉 山梔 竹葉石膏湯 竹葉二把 石膏一觔 人參三兩 炙草一兩 麥冬一升 半夏 梗米各半升 加薑煎

類證治裁

傷風

傷風

傷風

消風散 蒼朮 麻黃 荆芥 白芷 甘草 陳皮 蘇白 羌活散 羌活 麻黃 防風 細辛 川芎 甘菊 枳殼 參蘇飲 人參 蘇葉 葛根 半夏 前胡 桔梗 枳殼 人參敗毒散 枳殼 茯苓 甘草 木香 薑 獨活 羌活 神水散 蒼朮 防風 甘草 生薑 蘇白 局方加川芎 八珍湯 見前中風大補湯下 玉屏風散 見前中風

傷風

某 風傷衛陽欬頻嚏多涕怯風頭目重眩宜辛以散之用防風

蘇葉杏仁川芎桔梗甘菊薑微汗而愈

某 冬春喜浴腠疏感風以玉屏風散固之

某 風溫傷肺欬而眩用輕涼煎上丹皮杏仁桑葉山梔貝母枇

杷葉再服效

類證治裁

卷之一

傷風

三

傷寒治要

自霜降後天令沍寒感之即病者傷寒也。脈浮緊為傷寒。脈浮緩
春為溫。一日太陽受之。尺寸俱浮。以其脈上連風府。故頭項痛。腰
夏為熱。二日陽明受之。尺寸俱長。以其脈挾鼻絡於目。故身熱目痛。
脊強。三日少陽受之。尺寸俱弦。以其脈循脇絡於耳。故脇
鼻乾不得臥。四日太陰受之。尺寸俱濡。以其脈循胃絡於口。故口
痛而耳聾。此三陽受病未入腑可汗而已。若不汗。四日太陰受之。
尺寸俱沈。細以其脈布胃中絡於噎。故腹滿而噎乾。五日少陰受
之。尺寸俱沈。以其脈絡於肺繫舌本。故口燥舌乾而渴。六日厥陰
受之。尺寸俱微。緩以其脈循陰器絡於肝。故煩滿而囊縮。此三陰
受病已入腑可下而已。但可下而已也。腑謂胃腑。其兩感於寒者。
三陰經有汗下溫三法不

類證治裁

卷之一

傷寒

共

一日太陽與少陰俱病。有頭痛項強而又口乾煩渴也。二日陽明
與太陰俱病。有身熱譫語而又腹滿不欲食也。三日少陽與厥陰
俱病。有脇痛耳聾而又囊縮厥逆也。此陰陽表裏俱病欲汗之則
有裏症欲下之則有表症。故內經仲景皆云必死。活古大羌
有傳經有直中傳經者。由太陽傳陽明。由陽明傳少陽。由少陽傳
太陰。由太陰傳少陰。由少陰傳厥陰。此為循經傳。太陽傳少陽。為
越經傳。太陽傳太陰。為誤下傳。太陽傳少陰。為表裏傳。太陽傳厥
陰。為首尾傳。太陽傳本腑。勝為傳本。陽明有不傳少陽。而徑入本
腑者。胃少陽有不傳三陰。而徑入胃腑者。有傳一二經而止者。有
始終止在一經者。當隨症施治。其直中者。則不由陽經傳入。而徑

中三陰者也。夫傳經之邪。在表為寒。入裏即化熱。不比直中之邪。但寒無熱。為急宜溫也。先明傳經直中。庶寒熱之劑不致混投。而表裏寒熱。尤所宜辨。太陽為表之表。陽明為表之裏。少陽居表裏之間。為半表半裏。太陰少陰厥陰俱為裏。凡傷寒自陽經傳入陰經者。為熱邪。不由陽經傳入而直入陰經者。謂之中寒。則為寒邪。鍾齡程氏條而析之。附錄於此。

傷寒症有表寒。有裏寒。有表熱。有裏熱。有表裏皆熱。有表裏皆寒。有表寒裏熱。有表熱裏寒。何謂表寒。傷寒初客太陽。頭痛發熱。而惡寒者。名曰外感。經所謂體若燔炭。汗出而散是也。陽明解肌。少陽和解。其理一也。何謂裏寒。凡傷寒不由陽經傳入而直入陰經。

類證治裁

卷之十

傷寒

者。手足厥冷。脈微細。下利清穀。名曰中寒。仲景所謂急溫之宜。四逆湯是也。何謂表熱。凡傷於寒。則為病熱。表邪壅遏。不得外洩。或榮弱衛強。自汗不解。宜桂芍和榮。柴葛解肌是也。何謂裏熱。凡傷寒漸次傳裏。與春溫夏熱症。熱邪內發。皆為裏熱。其在太陰則津液少。少陰則咽乾口燥。厥陰則消渴。仲景所謂急下之。而用大柴胡。三承氣者是也。何謂表裏皆熱。如傷寒陽明症。傳於本腑。外而肌肉內而胃腑。熱氣薰蒸。口渴譫語。此散漫之熱邪。未結聚。治用白虎湯。外透肌膚。內清腑臟。俾表裏兩解。不比邪熱結實。專在腸胃。可下而愈也。正傷寒有此溫熱症。更多有此何謂表裏皆寒。凡傷寒表受寒邪。更兼直中於裏。此為兩感寒症。仲景用麻黃附子。

細辛湯是也。何謂表寒裏熱。如兩感熱症。一日太陽與少陰同病。二日陽明與太陰同病。三日少陽與厥陰同病。三陽為寒。三陰已成熟症。豈非表寒而裏熱乎。亦有火鬱在內。更加外感於寒。亦為表寒裏熱之候。又有火亢已極。反兼水化。內熱閉結。而外有惡寒之狀者。表似寒而裏實熱。誤投熱劑。下咽即敗矣。何謂表熱裏寒。如人本體虛寒。而外感溫熱之邪。此為標熱本寒。清劑不宜太過。更有陰寒在下。逼其無根失守之火。發揚於上。肌膚大熱。欲坐臥泥水中。表似熱而裏實寒。誤投寒劑。入胃即危矣。傷寒變症不一。總不外表裏寒熱。其表裏寒熱之變。總不外此八言。以為綱領。

經腑論

類證治裁

卷之十一

傷寒

程氏曰。經者。滲也。行於皮之內。肉之中者也。腑者。器也。所以盛水穀者也。傷寒諸書。以經為腑。以腑為經。混同立言。惑人滋甚。今特辨之。夫邪之在三陽也。有太陽之經。有陽明之經。有少陽之經。凡三陽在經之邪。未入腑者。可汗而已。邪之在三陰也。有太陰之經。有少陰之經。有厥陰之經。凡三陰之邪。已入腑者。可下而已。所謂入腑之腑。指陽明胃腑而言也。三陽三陰之邪。一入胃腑。則無復傳矣。胃者土也。萬物歸土之義也。傷寒論云。有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。此陽明即胃腑。非陽明之經也。假令邪在太陽。不傳陽明經。而徑入胃腑。曰太陽陽明。邪在陽明經。不傳少陽。而自入本腑。曰正陽陽明。邪在少陽經。不傳三陰。而徑入胃腑。曰少。

陽陽明。凡三陽之邪。已入胃腑。俱下之勿疑矣。雖然三陽入腑。人所共知。三陰入腑。鮮或能識。夫三陽之經。去腑尚遠。三陰之經。與腑為近。然既曰經。則猶在徑路之間。未嘗歸併於一處也。傷寒論云。太陰病。脈浮者可發汗。宜桂枝湯。少陰中風。脈陽微陰浮者。為欲愈。厥陰中風。脈微浮。為欲愈。不浮。為未愈。俱言邪在於經。故有還表向汗之時。若既入腑。則無外出之路。惟有通其大便。令邪從內出也。此大小承氣。調胃承氣。所由設也。然則以白虎湯治腑病。何謂也。以三陽之邪。初入胃腑。表裏皆熱。邪未結聚。熱勢散漫。而無胃實不大便之症。故用白虎湯。內清胃腑。外透肌膚。令表裏兩解。若邪已結聚。如太陰之實痛。少陰之咽乾口燥。下利清水。心下

類証治法 卷之一 傷寒

硬。厥陰之煩滿。囊縮。白虎不中與也。惟急下之而已。此無他。經腑明則施治不致舛錯矣。然則太陽之邪。自入本腑。何謂也。太陽之腑。膀胱也。膀胱主盛溺。太陽病盛。則移邪於腑。而為口渴。渴溺赤。外現太陽病。而兼有此症者。名曰太陽傳本。當五苓散。以桂枝解外邪。以猪苓澤瀉利小便而愈也。或問陽邪入陰。復有還表向汗之時。其信然乎。曰。古人之言。豈欺我哉。夫經者徑也。猶徑路然。三陽之邪。既有路以達三陰。三陰之邪。即有路以返三陽。此循環之至理。非若邪入胃腑。更無外出之路也。嘗見病人體質素厚。有傳經盡而自愈者。皆由汗解也。傷寒論云。其不再傳經。不加異氣者。七日太陽病衰。頭痛稍愈。八日陽明病衰。身熱稍歇。九日少陽病衰。

耳聾微聞。十日太陰病衰。腹減思食。十一日少陰病衰。渴止。舌乾已而噤也。十二日厥陰病衰。囊縱。小腹微下。大氣已去。病人精神爽慧也。由是觀之。豈非經盡而愈。還表向汗之明驗乎。或曰。陰不得有汗。今太陰脈浮。用桂枝湯。然則三陰亦可汗解乎。桂枝湯將為太陰正藥乎。曰。不然。讀仲景書。當會而通之。夫邪已入裏。而復發其表。是增其熱矣。故曰。陰不得有汗。邪雖入裏。而復返乎表。是邪外出矣。故曰。還陽而向汗。夫桂枝湯。太陽傷風藥也。今太陰用桂枝者。由太陽傷風。為醫誤下。而傳入太陰者也。太陰脈當沈。今反浮。是症在太陰。脈在太陽。太陽之邪。未盡入於陰。太陰之邪。大有還陽向汗之勢。故用桂枝湯。以徹散之。令其從太陽來者。仍自

類証治法 卷之一 傷寒

太陽出也。推而論之。若從太陽傷寒來。得傷寒脈。則桂枝可易麻黃。仲景麻黃石膏湯之意。可推也。若從陽明來。得陽明脈。則桂枝可易葛根。仲景葛根黃連黃芩湯之意。可推也。若從少陽來。得少陽脈。則桂枝可易柴胡。是以大柴胡湯。為少陽傳入太陰之的方也。然必腹中實痛。乃為脾邪干胃。甫用大黃下之。否則只於本方加芍藥以和之而已。傷寒論云。本太陽症。為醫誤下。傳入太陰。而腹痛者。桂枝湯加芍藥。大實痛者。桂枝湯加大黃。亦此意也。太陰如此。少陰厥陰。何獨不然。仲景少陰篇內。以四逆散治陽厥。方用柴胡黃芩甘草枳實。豈少陰亦用柴胡散之歟。誠以熱邪傳裏。遊行於少陰經絡之間。尚未結聚成實。內陷於胃腑中。則用黃芩甘

草以清傳經之熱邪用枳實以導胃中之宿滯使邪氣不得乘機而內合以作胃實不大便之症更用柴胡疏通三陽之路俾其從此來者仍從此出不必擾動中宮而病勢已解此仲景用藥之微權也愚遇陽邪入陰猶未結實之症倣古人三黃解毒之意而加以石膏以守陽明之中路加柴胡者亦望其返之故道而還陽向汗也大抵傷寒治法急於解表而緩於攻裏非惟三陽之邪務從表散即三陰未結之邪且冀其還陽而之表必俟邪氣結實乃用承氣湯攻下之且戒曰欲行大承氣先與小承氣腹中轉失氣者方與大承氣若不轉失氣慎未可再攻兢兢然不苟下也有如此仲景又曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而下之

類證治裁

卷之二

傷寒

三

因作痞熱入者言入胃也三陰下早雖不至成結胸而已不免為痞氣矣噫經腑之間其可不辨哉

傷寒

王 正月傷寒頭痛項強煩熱無汗脈浮緊雖立春後氣候尚寒非麻黃湯腠理不開一吸汗透而愈

冷 初春傷寒失表五六日後太陽症猶在頭痛身痛煩熱脈洪醫但用杏仁枳殼陳熱遂甚耳聾譫語自利予謂表症未除原不宜拘日數况邪不透表勢必循經傳裏宜表裏分解用梔豉湯合芎蘇飲蓋以梔豉除煩芎蘇達表柴胡達半表半裏茯苓溲溼加黃芩麥冬清熱日再服汗透熱除

族某冬季傷寒發熱頭痛拘急無汗嘔吐自利脈右緊左浮用葛根加半夏湯再服症退

類證治裁

卷之二

傷寒

三

堂姪傷寒發熱頭重渴飲脇滿脈微緊此陽明而兼少陽症也用局方柴胡升麻湯去黃芩石膏二服汗出愈

李氏寒熱煩渴耳聾胸滿腫痛或疑為外症用攻毒藥予曰此傷寒少陽症若外症安得耳聾做陶節庵法小柴胡湯去參棗加枳殼薑陳諸症自愈 陶氏曰表邪傳至胸中未入府故為半表半裏只須小柴胡湯加枳殼或對小陷胸湯一服豁然王海藏亦謂小陷胸為少陽藥以其能滌膈土結熱也

族姪傷寒身熱澀旬脈沈微吐虺足厥少腹滿而渴邪傳厥陰做仲景烏梅丸如減烏梅二枚川椒炒十粒赤芍錢三赤芍杏仁炒各當歸山梔枳殼炒各一錢生薑片一服脈浮微汗而解傷寒論云厥陰病脈微浮為欲

愈以建中湯調理而平

類證治表

卷之十一

傷寒

三

溫症論治

風溫 溼溫 冬溫 溫毒附

溫為春氣其病溫者因時令溫暖腠理開泄或引動伏邪或乍感異氣當春而發為春溫其因冬月傷寒至春變為溫病者伏邪所發非寒毒藏於肌膚亦非傷寒過經不解之謂王叔和雲岐子之說吳又可柯韻伯已辯乃由冬藏不密腎陰素虧虛陽為寒令所遏仍陷入陰中至春則裏氣大泄木火內燃始見必壯熱煩冤口乾舌燥經所謂冬不藏精春必病溫也故其發熱而渴不惡寒脈數盛右倍於左溫脈多在肌肉之分不甚浮大異傷寒浮緊之脈若左脈盛或浮必右倍於左者熱鬱在內也大異傷寒浮緊之脈重感風寒否則非溫症是非此熱邪自內達外最忌發汗溫熱病無寒在表若誤與時暴寒耳此熱邪自內達外最忌發汗表散必至躁熱悶亂以至死宜辛涼以解表熱苦寒以泄裏熱黃芩裏氣一通自然

類證治表

卷之十一

傷寒

三

作汗若舌乾便秘涼膈或協熱下利葛根黃連咽痛甘桔心煩黃阿膠此伏邪自內發無表症也其不由傷寒伏邪第從口鼻吸入而病溫者異氣所感邪由上受首先犯肺手太逆傳心包手厥或留三焦手少陽葉香巖謂溫由吸受乃手經為病非如傷寒足夫肺主氣溫邪傷肺胸滿氣窒者宜辛涼輕劑杏仁桔梗括萎挾風加薄荷挾溼加滑石或透溼於熱外或滲溼於熱下俾風溼不與熱相搏則不貽風溫溼溫之患如辛涼散風甘淡驅溼熱勢不解則入心營而血液受劫咽燥舌黑煩渴不寐或見斑疹者宜清解營熱犀角生地麥冬石斛兼透斑牛蒡山梔連翹出熱不解者胃津亡也主以甘寒梨皮蔗漿之類若邪入心包神昏譫語

類證治裁

卷之一

溫

證

目眩而內閉者宜芳香逐穢宣神明之竅驅熱痰之結牛黃丸蓋
 熱氣蒸灼瀾漫無形若藥味重濁直走腸胃全與病隔矣若氣病
 不傳血分而邪留三焦宜分消其上下之勢如杏仁厚樸茯苓
 仍在氣分猶可冀其戰汗解或轉瘧也若三焦不得從外解必致
 裏結腸胃宜用下法承氣湯加元明粉若脘痞胸膈陷胸湯若腹脹滿
 或痛邪已入裏必驗其舌或灰黃或老黃或中有斷紋皆當下之
 承氣湯加檳榔其病溫復感風者為風溫必陽脈浮滑陰脈濡弱
 風屬陽溫化熱兩陽薰灼先傷上焦上焦近肺肺氣既阻致頭脹
 腕痞身熱汗出宜微苦以清降微辛以宣通杏仁香薷鬱金栝蒌
 忌溫散劫津葶藶湯去麻黃羌活木香若風溫誤汗身灼熱者脈陰陽俱浮自

煩悶嘔欬甚則狂言下利而發斑凡煩悶躁熱起臥不安皆發斑
 候也傷寒溫疫諸症失於宣熱毒內攻陷入營分乃發斑毒黃連
 湯解邪蘊胃腑發出肌表熱毒內攻陷入營分乃發斑毒黃連
 斑不透者犀角大凡紅赤為胃熱人參化紫為胃傷犀角地
 為胃爛不治鮮紅起發者吉紫色成片者重黑色者凶青色者不
 治由失表者求之汗由失下者取乎攻火盛清之毒盛化之營氣
 不足助其虛而和之托之其輕者則有疹痧細碎如粟主治不外
 肺胃二經宜辛涼或甘寒淡滲等法皆溫症中所宜細審者
 春溫熱病不可作傷寒正治而用大汗大下初病憎寒發熱頭痛
 蔥豉得汗則解溫邪化熱傷肺上焦氣阻用辛涼輕劑梔枝茶
 花粉鬱嘔吐黃芩湯加溼邪內搏熱迫下泄稀水枳殼赤苓蘆
 金之屬嘔吐半夏生薑溼邪內搏熱迫下泄稀水枳殼赤苓蘆

類證治裁

卷之一

溫

證

汗身重多眠鼻鼾語言難出危症也急用蔗漿麥冬白芍生地誤
 下誤火煎亦危其病溫而溼勝者為溼溫身熱頭重胸滿嘔惡足
 脛冷蒼朮白虎湯或滑石其冬行春令襲溫氣而成病者為冬溫
 蓋本秋燥之餘氣故發熱欬嗽喉腫咽乾痰結甚則見血與傷風
 者不同其脈虛緩或虛大無力亦有先病冬溫更加暴寒寒鬱熱
 邪則壯熱頭痛自汗喘欬陽旦湯加桔梗茯苓切忌風藥升舉其邪致欬愈
 劇熱愈甚遂變風溫灼熱以死亦忌辛散致咽喉不利痰唾膿血
 加減葱白香若兼風寒外襲葱豉湯加寒邪盛汗不出而煩擾者
 豉湯調之若冬溫誤汗致發斑毒者加犀角元參如昏憤譫妄
 許麻黃石膏若冬溫誤汗致發斑毒者加犀角元參如昏憤譫妄
 者大便瀉手足冷不治其病溫更過時毒者為溫毒脈浮沈俱盛

用寒涼恐成功反棄何也。溼熱一去陽亦衰微也。面色蒼者須顧其津液清涼到十分之六七往往熱減身寒不可遽謂虛寒而投補劑恐爐焰雖熄灰中有火也。凡溫熱病救陰易通陽難救陰不在血而在津與汗通陽不在溫而在利小便較難症自不同也。如三焦不得從外解則熱結於腑必舌灰黃或老黃乃下之。小承氣湯加減傷寒熱邪在裏下之猛此多溼邪內搏下之輕傷寒大便溼為邪已盡溼溫病大便溼為邪未盡至大便硬慎不可再攻以屎燥為無溼也。若舌胎黃不厚而帶滑者熱未傷津猶可清熱透表若胎薄而乾者津傷也宜禁苦寒以甘寒輕劑治若熱傳營舌色必絳。深紅其絳色中兼黃白色者氣分之邪未盡泄衛透營兩和可也。純絳鮮澤者胞絡受

類證治裁

卷之一

溫

病

病也。宜犀角鮮生地連翹鬱金石菖蒲等舌色絳而粘膩似胎非胎溼熱熏蒸為痰將閉心胞也。急加芳香逐之。醒頭蘭菴香鬱金石菖蒲以開其閉恐昏厥為瘧也。平昔心虛有痰外熱一陷裏絡就閉非鬱金所能開須至寶丹。舌絳而乾燥者火邪劫營涼血清火為要。舌絳而有碎點黃白者當生疔也。大紅點者熱毒乘心也。黃連用金汁色絳而不鮮乾枯而痿者此腎陰涸急以阿膠雞子黃救之緩則不及矣。舌獨中心絳乾者胃熱而心營受燥也。清胃方中加入清心之品否則延及舌尖為火盛津乾也。舌尖絳獨乾此心火上炎用導赤利其腑胎白而薄外感風寒也。當疏散之白而乾薄肺津傷也。用麥冬花露瀝根汁輕清之品白胎絳底者溼遏熱伏也。當先泄溼透熱

防其就乾也。再從裏透於外則變潤矣。舌生芒刺上焦熱極也。以絹蘸薄荷汁指之。即退者輕旋生者險舌胎不燥自覺悶極者脾溼盛也。舌胎粘膩吐出濁沫者口必甜味。此為脾癰乃溼熱與穀氣相搏用醒頭草芳香辛散以逐之。則退若胎如碱胃中宿滯挾穢濁鬱伏當急急開泄否則閉結中焦不能從募原達出矣。舌黑而滑者水來克火為陰症宜溫之。若見短縮為腎氣竭欲救之。如參五勉希萬一舌黑而乾者津枯火熾急瀉火補水。舌淡紅無味或乾而色不榮胃津傷氣不化液也。草湯勿用寒涼舌色紫而暗潤之溼乃熱傳營血或素有瘀傷宿血在胸膈為熱所搏宜加散血之品。琥珀丹參桃仁丹皮之屬不爾瘀血與熱結阻遏正氣遂變

類證治裁

卷之二

溫

病

如狂發狂症舌脹大不能出口者脾溼胃熱鬱極化風而毒延口也。用大黃磨汁入當用劑內舌脹自消其舌白如粉滑四邊色紫絳者溫疫病初入募原未歸胃腑急急透解莫待傳陷而為險惡症。婦人病溫有娠者保胎為要古法用四物湯護胎法。用伏龍肝研三寸乾用井底泥塗或青布浸冷蓋腹產後慎用苦寒察其邪可從上中解者從症用之勿犯下焦恐血去多邪易內陷也。至經水適來適斷熱陷血室與瘀血結少腹必滿痛。小柴胡湯去參棗加丹挾寒加桂氣滯加皮枳殼若譫語如狂血結者身必重宜去瘀通絡若延久上逆心包胸痛不可按是血結胸也。海蛤散杏貝梔蕤花粉身風溫症感風寸口脈大肺受熱燥宜辛涼清上。沙參桑葉之屬

痛腕痺。肺氣不舒。梔殼。杏葉。鬱金。貝母。熱灼。劫陰。煩躁。生地。阿膠。之屬。餘參春溫治法。

傷於溼。又中暑。暑挾溼邪。鬱蒸為熱。其脈寸濡而弱。尺小而急。身痛頭重。妄言自汗。兩脛逆冷。湯。忌發汗。汗之名重。喝必死。

蒼朮。白朮。香薷。飲。加。頭脹耳聾。邪與氣混也。正氣散。去。腹皮。虎湯。胸滿。半夏。蒼朮。頭脹耳聾。邪與氣混也。白朮。薑棗。加連。翹。銀花。小便不利。大便反快。湯。或。夫。水。散。

冬氣溫。暖感而即發。身熱頭痛。不惡寒。面腫。欬嗽。咽痛。下利。湯。加。忌。風。藥。升。舉。初。感。頭。痛。身。熱。湯。甘。桔。風。寒。外。襲。或。減。湯。加。羌。活。蘇。葉。餘。參。春。溫。治。法。

病溫更遇時毒。面赤。斑如錦紋。咽痛。煩躁。黃連。解毒。自汗而渴。胃。

類證治裁 卷之一 溫 熱發斑者。人參。化。斑。已。透。熱。不。退。者。犀。角。大。青。湯。去。黃。芩。升。快。用。熱。藥。邪。毒。深。陷。發。為。狂。亂。面。赤。眼。紅。舌。黑。鼻。燥。下。利。脈。洪。數。

者。消。斑。青。忌。下。藥。惟。便。秘。燥。渴。可。微。下。之。大。柴。胡。湯。凡。斑。疹。初。見。胸。兩。點。大。為。斑。粒。小。為。疹。斑。屬。血。多。或。陽。症。誤。用。熱。藥。或。當。下。不。下。或。下。後。不。解。皆。能。致。之。不。可。發。汗。重。令。斑。紫。點。小。心。胞。熱。也。

點大而紫。胃中熱也。斑黑而光亮。熱毒盛也。黑而晦者。死。若黑。而。暈。腳。紅。者。火。內。伏。用。清。涼。發。散。間。有。轉。紅。成。可。救。者。凡。斑。疹。皆。邪。氣。外。透。發。出。宜。神。情。清。爽。為。外。解。裏。和。如。斑。疹。出。而。昏。者。

內有白泡。如水晶者。溼邪鬱於衛分。汗不徹。故也。當理氣分之。邪。若。毒。壅。消。毒。犀。角。飲。大。青。四。物。湯。

類證治裁 卷一

溫症脈候 溫病脈多在肉分。不甚浮。右脈倍於左。熱氣佛鬱在裏。故也。劉復。真曰。寒病傳經。故脈日變。溫熱不傳經。故不變。寒病浮洪有力。易。治。花。細。無。力。難。治。無。脈。不。治。溫。熱。不。然。溫。有。一。二。部。無。脈。者。有。三。四。部。無。脈。者。被。火。所。逼。而。伏。非。絕。無。也。於。病。無。妨。照。經。用。辛。寒。火。散。脈。起。病。愈。矣。蓋。溫。熱。病。發。在。一。二。經。始。終。在。此。更。不。遞。傳。他。經。其。一。二。經。或。洪。數。他。經。弱。且。伏。依。經。調。之。伏。者。起。洪。者。平。自。愈。

附方 葛根黃連黃芩湯 葛根 黃連 黃芩 甘草 甘桔湯 甘草 桔梗 黃連阿膠湯 黃連 黃芩 芍藥 阿膠 雞旦黃 玉女煎 生石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝 牛黃清心丸 黃連 黃芩 山梔 鬱金 辰砂 西牛黃 至寶丹 見前中風 溫膽湯 半夏 陳皮 茯苓 甘草 名二陳湯 加竹茹 承氣湯 枳實 名溫膽湯 厚樸 名大承氣湯 瀉心湯 湯名有五。若半夏 黃連 黃芩 人參 甘草 乾薑 大棗 名半夏瀉心湯。去熱開痞。

類證治裁 卷之一 溫 涼膈散 見前中風 葛根黃連黃芩湯 葛根 黃連 黃芩 甘草 甘桔湯 甘草 桔梗 黃連阿膠湯 黃連 黃芩 芍藥 阿膠 雞旦黃 玉女煎 生石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝 牛黃清心丸 黃連 黃芩 山梔 鬱金 辰砂 西牛黃 至寶丹 見前中風 溫膽湯 半夏 陳皮 茯苓 甘草 名二陳湯 加竹茹 承氣湯 枳實 名溫膽湯 厚樸 名大承氣湯 瀉心湯 湯名有五。若半夏 黃連 黃芩 人參 甘草 乾薑 大棗 名半夏瀉心湯。去熱開痞。

類證治裁 卷一

類證治裁 卷一

類證治裁 卷一

類證治裁 卷一

類證治裁 卷一

類證治裁 卷一

類證治裁 卷一

類證治裁 卷一

散	小陷胸湯	黃連 半夏 栝蒌
風	葶藶湯	葛根 白芷 麻黃 羌活 杏仁 甘草 麩炒
溫	蒼水白虎湯	見前中風
溫	陽旦湯	麻黃 桂枝 杏仁 甘草 名麻黃湯 加黃芩
冬	升麻葛根湯	升麻 葛根 白芍 甘草 加紫草茸
發	黃連解毒湯	黃連 黃芩 黃蘗 山梔 毒盛加大青
斑	犀角大青湯	大青 犀角 梔子 香豉
透	人參化斑湯	即白虎湯加人參
胃	犀角地黃湯	犀角 生地 赤芍 丹皮
熱	導赤散	生地 木通 甘草梢 竹葉
利	炙甘草湯	見前中風
滋	四物湯	見前中風
液	小柴胡湯	柴胡 半夏 人參 甘草 黃芩 薑 棗
胎	海蛤散	海蛤 滑石 甘草 芒硝 每服二錢雞子湯調
陷	香薷飲	見前中風
結	正氣散	見前中風
胸	五苓散	猪苓 茯苓 白朮 澤泄 桂
溼	天水散	即六一散 滑石六兩 名益元散 甘草一兩 燈心湯調下
瀉	消斑青黛飲	犀角 人參 石膏 知母 甘草 青黛 黃連 黃芩 柴胡 苦酒煎
溫	大柴胡湯	柴胡 半夏 黃芩 芍藥 枳實 大黃 煎
毒		
便		
秘		

毒	消毒犀角飲	犀角 牛蒡子炒研 荆芥穗 防風 甘草
毒	大青四物湯	大青 錢半 阿膠 甘草各一錢 豆豉百粒
毒		
毒		
毒		

類證治裁

卷之二

溫

三

溫

房師午園張公高年上盛下虛案牘勞神冬春不寐感溫噲欬並
休兩寸脈洪大由平昔陽不交陰內風上冒兼引溫邪表裏煽
動症見眩仆喉痛聲啞舌如煤熏夫心為君主義不受邪因春
溫傷肺逆傳心包神明俱為震動且素餌桂附致炎陽獨亢營
液內劫此怔忡無寐根由師言昔病足痺椒醫用祛風藥兼桂
附得效近三年矣愚謂風藥多燥况桂附乎以脈症參時令宜
辛涼輕劑於熄風潤燥中佐以滋陰安神不過一劑當夜自能
成寐再劑噲嗽除悸眩止矣
瓜萸仁甘菊 炒 山梔茯神 各二錢 貝母甜杏仁 炒研各 棗仁 八分 蔗

類證治裁

卷之一

溫

諸品清輕涼潤能除上焦瀰漫之邪兼入空
杯 竅熄風火除悸眩清音平嗽若重濁便無效
加天冬玉竹百合減萸仁六七服諸症平舌色復故 後用 膏方三
才膏加五味核桃牛膝茯神棗仁柏子仁白芍玉竹杞子熬膏
白蜜收白湯化服 諸品能交心腎安神志利腰膝兼使金水
相涵陰陽和平自無上盛下虛之患矣
韋氏邪由鼻吸伏於募原發則頭暈痛口渴飲熱煩嘔悶溺痛帶
下邪踞上中焦主以慈鼓湯散邪佐以清泄膽火豆豉葱白山
梔羚羊角嫩桑葉薄荷銀花花粉滑石 汗出熱解 此午發散
族某溫邪內鬱頭眩熱渴手心似烙舌胎淡黃寸脈浮大而數是
邪留上焦宜肅清太陰氣分用黃芩 酒 炒 川貝母杏仁山梔瓜萸
仁麥冬嫩桑葉荷葉邊煎湯一啜眩渴稍定原方去芩梔加鮮

石斛元參花粉蔗汁 沖 二服愈 此溫邪上受治
從氣分得解者

族某邪從口入嘔渴惡熱舌膩脘痞溫從溼化宜與開泄中上豆
豉萸霜通草半夏薏苡赤苓竹茹枳壳鬱金汁 沖 蘆根煎湯一
啜汗津津而愈同時李某症同但潮瀉痛前方加燈心車前穗
亦一劑愈 此溼滯中上焦治
從透滲得解者

某 脈浮大右數有汗熱熾渴眩譫煩溫邪挾風熱將陷營分用
薄荷牛蒡羚羊角梔皮丹皮連翹嫩桑葉日再服夜半汗透身
涼 此清少陽騰
熱得解者

吳 邪入膻中舌縮唇裂目瞑神迷沈昏不醒者七晝夜脈沈數
此邪深將成內閉矣勉用鮮佩蘭菖蒲連翹銀花以解穢通閉

類證治裁

卷之一

溫

請

鮮生地麥冬梨蔗汁以生津黃芩知母元參石斛以徹熱兼下
牛黃丸二服神識漸清因尿管熱痛去佩蘭菖蒲黃芩加甘草
梢車前穗以利腑熱而愈 此清理心包
熱閉得解者
朱 風木司天溫邪內熾脈數頭眩嗽血由木火並炎上迫竅絡
舌鮮絳邪已入營用鮮生地羚羊角元參連翹山梔萸霜貝母
丹皮鮮藕三四服脈靜身涼 此清營熱
得解者
蔣 勞力傷陰感溫噲欬不寐鼻衄痰紅下利血沫脈虛大不數
誤用柴葛升散劫液動風法以甘酸平潤調之阿膠 木 麥冬 炙
草潞參茯神白芍棗仁五味生地紅棗二服神安血止即飲糜
粥原方去膠加甜杏仁山藥再劑而痊 此邪傷血絡用
調補得愈者

族子溫邪鬱而化熱頭暈口乾舌燥唇血右脈大左模糊有汗不
 解胸腹悶濁渾濁熱邪蒸淫治宜上下分消淡豉荊芥羚羊
 丹皮麥冬山梔赤芍滑石嫩桑葉金銀花露二服熱輕渴減量
 止舌潤但宵分譫語溺管滿痛齒燥液虛熱劫鮮石斛蘆根黑
 豆皮花粉天冬元參蔗汁二服疹現稀紅肺衛之邪已從外泄
 仍用輕清透發連翹牛蒡鮮生地丹皮赤芍沙參竹葉疹色淡
 忽又煩躁不寐舌心灰燥而尖絳邪入心營恐其蒸痰蔽竅急
 清營熱兼豁痰犀角尖此溼熱俱盛兼治生地鮮藕元參丹皮竹茹貝母菖蒲
 再服汗透而解肺衛心營得解者
 姪孫溫邪化熱頭眩痰嗽用辛涼清上豆豉杏仁貝母各錢半薄荷

類證治裁 卷之十一 溫 暑

山梔花粉各錢滑石赤芍各錢加燈心桑葉二服熱退用甘涼
 調理胃陰得安此清降痰熱治
 族某溫邪逆入心包神識忽明忽昧舌乾津潤全無顛狂不近衣
 被欲掃熱痰熏灼急用芳香解穢犀角尖八分鮮生一元參麥冬
 各五錢連翹山梔鬱金各二錢梨蔗汁各一杯再加至寶丹一九日再
 服諸症立退此大劑救液
 某 壯熱目赤煩冤不昧痧疹遍體急用救液養陰舌轉黑而燥
 呃逆昏厥服大劑犀角地黃湯加至寶丹不應仍用大劑犀角
 地黃湯日三四服加紫雪三呃止厥回身涼而愈此大劑涼心
 馬氏有年溫邪夾滯溼阻脛悶舌縮渴飲瀉污水甚多此熱結旁

流也用大承氣湯直至所下皆黑硬然後溼滯乃盡脛痞乃寬
 舌乾乃潤此攻蕩溼
 潘 伏邪內發兼旬未解譫語肉脫自利純血唇縮舌強脈沈數
 邪陷血分症已瀕險急用犀角地黃湯加阿膠元參山梔鮮藕
 黑豆皮竹葉心四劑譫聲漸清利血止思糜粥矣此伏邪治從
 陳姓兒周歲感溫邪熱內閉舌絳津乾用麥冬連翹梔心菖蒲竹
 茹加紫雪分二汗解而愈此直瀉心包
 李 寒熱微汗口渴喉脈浮洪乃春溫犯肺用辛涼輕劑為手
 太陰治法山梔淡豉桔梗花粉杏仁象貝桑皮此邪干肺從
 二服嗽減去梔豉桔梗粉加栝蒌橘紅前胡服愈衛分得解者

類證治裁 卷之十一 溫 暑

何 氣粗目赤舌絳疹紅神機不發脈洪數背煩無寐邪已入營
 急宜清透若再消導劫津必至液涸成癩犀角汁鮮生地天冬
 麥冬元參赤芍丹皮連翹藕汁菖蒲日三服汗液熱退神識亦
 清但右脈長大胃火猶熾用石膏白芍黃芩知母甘草大便數
 次脈較平寐中手指微搐乃液虛風動欲成瘧也用阿膠水
 地鈞藤當歸白芍石斛棗仁數劑症平此營虛用滋液
 王 夏至前驟喝邪從吸入踞募原熱渴引飲中脘格拒熱蒸溼
 膈喉問午煩舌膩白脈數潮渾是溼勝也治先透溼於熱下則
 熱勢孤矣用藿梗佩蘭以逐穢通草滑石蘆根以驅溼栝蒌貝
 母以滌痰羚羊角山梔丹皮以清膽火鮮生地連翹麥冬以瀉

心火日再服汗出溺清嘔悶除熱渴減然脈仍疾數兩寸大時
煩不寐是欲發疹也明晨疹出舌胎轉黃是熱勝也治在透熱
於溼外則溼不升矣原方去蘆薈通草滑石蘆根羚羊等加黃
芩梨汁以清肺牛蒡銀花連翹赤芍以透疹青蒿石斛知母沙
參以退熱生津二三服汗徹脈勻舌黃退日用大麥仁粥熱服
陰復全瘳此分利溼熱清涼疹毒得解者

類證治裁

卷之一

溫

三

風溫

王氏七旬有三風溫傷肺頭暈目瞑舌縮無津身痛肢厥口乾不
飲昏昧鼻鼾語言難出寸脈大症屬痰熱阻竅先清氣分熱邪
杏仁象貝花粉羚羊角沙參嫩桑葉竹茹山梔一服症減肢和
但舌心黑而尖絳乃心胃火熾懼其入營劫液用鮮生地犀角
汁元參丹皮麥冬阿膠煨蔗汁三服舌潤神甦身涼脈靜但大
便未通不嗜粥飲乃灼熱傷陰津液未復繼與調養胃陰兼佐
醒脾旬日霍然

類證治裁

卷之一

風溫

三

冬溫

傷 高年冬溫犯肺醫用傷寒發表致燥渴熱煩又進柴葛解肌
嗆欬痰多竟夜無寐夫傷寒傳足經溫邪直犯手經原不同治
况溫邪忌汗表散即是劫津診脈虛數目赤舌絳溫已化熱再
令液涸必延昏瘡宜甘潤生津苦辛降氣麥冬杏仁栝蒌山梔
知母貝母桑皮橘紅二服熱減嗽定因小溲赤瀉去桑皮加沙
參赤苓木通百合煎湯再經調理而康

李 冬溫表熱傳裏唇燥舌乾渴飲嘔沫大便迫瀉稀水無度脈
濡緩乃溼甚生熱飲以鮮蘆根湯隨用黃芩栝蒌通草赤苓車
前子猪苓半夏麴數服嘔渴自利悉定去猪苓夏麴加滑石燈

類證治表 卷之十一 冬溫 心滲利溼熱而愈

景氏冬溫挾虛灼熱欬嗽因誤治邪陷營分便血甚多陰液內涸
舌黑齒焦神機不發脈左虛數右浮疾耳聾目瞑頰紅遺溺失
禁此陰欲竭而孤陽浮也急救液以存陰用生地犀角汁五味
子阿膠沙參麥冬石斛雞子黃三服能呻吟轉側第脈虛全不
受按去犀角加洋參茯神棗仁白芍再服舌潤神清不饑不食
此上脫熱痰結也再加川貝薑霜嗣因肺虛氣不化液用復脈
湯去薑桂麻仁加歸芍濁痰降大便得行脈勻有神而納穀頗
少此脾陽困而未甦也改用潞參茯神炙草白水穀芽歸芍蓮
棗而食進

耿 深秋陰瘧冬初重感異氣寒熱嘔悶醫謂傷寒發表不應即

川承氣更加蒼朮頭暈壯熱煩渴下利更醫亦謂傷寒漏底症
屬不治延至目閉語謔唇泡齒黑舌乾焦而縮伊祖係子隔邑
從姑丈年八十矣來曰三子僅存此一稜今病至危奈何診脈
右虛數左弦數予謂此溫邪耳病在上焦只宜輕劑疏解氣分
硝黃苦寒直降與無形瀾漫熱邪何干蒼朮溫燥劫津助灼今
液涸神昏邪入心包急速生津清熱掃滌心包痰阻庶望轉機
犀角五分鮮菖蒲三錢山梔連翹八分鮮生地鮮石斛五錢沙參
蘆霜麥冬貝母二錢竹茹三錢一服舌潤神甦熱減因小水短赤原
方加元參二錢燈心車前五分再服熱退索食頤下腫痛是名遺毒

由感症初失於疏理仍須清解主治用豆豉桔梗花粉竹葉牛
蒡貝母翹陳歸草數服而消

衰 陰瘧數年既傷生冷更感異氣始則寒熱欬喘繼則譫煩不
寐上則唇燥舌灰鼻燥中則欬嘔胸脇牽痛下則遺溺自利汚
溼脈弦大數醫不識何症漫言陰虛垂絕舉家哀懇勉疏蛤粉
熟地補劑予謂此溫邪化燥三焦皆受豈堪瀉膩壅邪治以疏
泄則愈安得此脈便死耶因思邪從上受取之上用薄荷山梔
桑皮杏仁蘆仁貝母橘紅石斛梨皮赤苓燈心明晨嗽煩悉定
胸脇痛平舌胎浮潤矣越三日因心事擾觸午寒喘熱氣粗語
謔脈弦大而浮舌心乾唇齒燥予謂脈易得汗但須救液以清

心胃燔灼先用生地天冬麥冬犀角花粉石斛蓮子心等再診
胃脈大舌心無潤用石膏知母竹葉白芍生二冬等脈候乃平
汗出熱退七八逾日舌尖再見乾絳印堂發出紅斑仍屬心陽
熾盛隨用生地鮮藕阿膠另化葛蒲元參丹參天冬防其熱陷心
營二服舌尖潤紅斑較淡後用生地阿膠龜甲生丹皮白芍青
蒿等汗徹身涼調理而平

類證治裁

卷之一

冬溫

四

熱症論治

夏至前發為溫症。夏至後發為熱症。二症有因冬時伏寒有因當
時乍感其冬月傷寒。至春夏變為溫熱者。邪有淺深。則發有遲速。
柯韻伯曰。凡病傷寒而成者。根實種於鬱火。其人腎陽有餘。好行
淫慾。外傷於寒。虛陽陷入陰中。冬不速發。果日少而蓄熱。淺則陽
火應。春氣而病溫。寒日多而鬱熱深。則陽火應。夏氣而病暑。沈芊
綠曰。春溫有不盡由伏寒。由現感春時之邪。而病亦名溫者。夏熱
有不盡由伏寒。由現感夏時之邪。而病亦名溫者。夏熱
時之邪。而病亦名熱者。皆自內達外。無表症。若有表症。必
以黃芩湯為主方。因春溫之發。當少陽司令也。熱病以白虎湯為
主方。因夏熱之發。當陽明司令也。且熱甚於溫。必以白虎湯重為
肅清。以其時方炎暑。其症不惡寒。反惡熱。自汗而渴。脈洪大。故以
石膏之辛寒。清胃腑蘊蓄之熱。以知母之苦寒。淨少陽伏邪之源。

類證治裁

卷之一

熱

壁

以甘草粳米之甘平。保肺胃之氣。而熱可除也。若舌上胎滑者。尚
有表邪。梔子散。若渴欲飲水。口乾舌燥者。熱在裏。必耗津。人參白
芍。如惡熱煩渴。腹滿舌黃燥。或乾黑者。宜下。涼膈散。承氣湯。熱兼暑溼者。
涼膈散。合小便不利者。竹葉石膏湯。其感夏令之邪。當時即發者。邪出
口鼻吸入。治在手經。不當用足經方。其法與前乍感溫症條同。參
方見溫症

熱

姪 夏至後伏氣自裏而發熱渴心煩頭汗氣促舌灰疹現厥逆

譫語脈濡數夫濡為溼數為熱裏邪蒸溼則為頭汗溼邪鬱熱

則為渴煩邪壅肺竅則為氣促為紅疹于心包則為譫語為舌

灰其手足厥逆乃熱深厥深誤用風藥升舉助邪遂致暈厥無

寐躁擾宜清營中伏邪犀角汁羚羊角丹皮鮮生地鮮藕元參

茯苓赤芍日再服汗透脈和諸症悉退調理得平

族女熱症脈緩而濡溼甚於熱頭暈目眩唇痞齒燥胸腹滿痛溼

蒸為熱小溲赤濇三焦皆邪勢瀰漫况疹現肢厥急須透解勿

使熱醱溼痰蒙蔽膈中致成內閉危症所用枳椇墮損胎元柴

類說

卷之一

熱

三

葛乃傷寒足經藥與三焦無涉醫不中窾焉望獲效通草豆豉

羚羊角藜蘆麥冬連翹牛蒡山梔赤苓燈心鮮蘆根二服熱勢

退手足和去通草香豉羚羊連翹芫梔加鮮生地鮮石斛沙參

象貝黃芩以防熱邪內陷兼以護胎數服汗解而愈

幼孫哺熱頭暈汗渴煩躁脈洪數用大劑白虎湯加羚羊角一啜

汗透而愈

姪 少陰伏邪內發壯熱煩冤頭目如蒙耳聾舌尖絳唇紫口乾

手心如烙脈浮洪溢指外右尤甚交巳午刻症重初用辛涼以

泄衛熱如薄荷露甘菊竹葉杏仁梔皮豆豉之屬頭目暑清微

汗不徹脘痞痰沫用疏利以滲痰溼如枳壳大貝藜蘆通草蘆

根燈心之屬痰稀滑爽而臂膊紅疹隱現胸背全無再加清透

之品如赤芍丹皮連翹牛蒡青蒿麥冬之屬疹雖淡而舌心灰

膩舌尖紅暈必心胃火燔用導赤散加石膏午前服向晚防其

邪入心營用透營救液法如犀角尖磨鮮生地鮮石斛元參花

粉丹皮沙參之屬舌色未退轉益乾燥脈洪長防其入腑急用

涼膈散芒硝改元明粉
法甘草大棗得便二次裏結乍通熱勢較退而神迷

昏寐脈數譫語乃熱燦心包慮其蒸痰內閉用犀角汁下至寶

丹及牛黃清心丸以宣竅驅熱數脈減再用清鎮神明佐豁痰

通絡如血珀石決明茯苓羚羊角象貝杏仁竹茹夜交藤通草

之屬神識稍清脈仍浮大巳午為甚額額疹現喜其邪從外解

類說

卷之一

熱

四

再與清透用茅根梨藕汁服明早浮脈稍斂灰舌轉潤決其陽

極於午必俟夏至陰生陽退乃冀轉機且舌尖暈痕未消溺後

色變渾濁用黃連人中黃山梔赤芍麥冬之屬加六一散冲服

微汗脈平身始涼解乃用燕窩湯及粥飲調理漸次培養胃陰

得安 此症乃熱兼疫邪

余於丙夏因診視時邪染恙寒熱脈浮大服梔豉白湯胸背汗

三日後熱甚渴煩少寐舌胎黃變黑服犀角羚羊角竹葉蘆根

藕蔗諸汁熱稍平逾夕復壯熱譫神昏服至寶丹分鮮葛蒲

根汁下神稍清又用前各汁加洋參鮮生地象貝龜版青蒿連

翹滑石清營滋液尚驅痰熱兼瀉三焦舌黑煩淡但汗出微涼

汗收仍熱脈數氣亂煩擾竟夕又服至寶丹分半神未定直視氣促再服前丹二分昏睡進洋參湯汗出熱退但舌心乾用石膏煎清胃加梨藕汁稍津潤逾日目赤舌再灰黑神再煩擾改服牛黃清心丸二分橘紅湯下得寐備服洋參藕蔗汁麥冬橘紅湯寐熱熱輕再啜洋參湯汗出涼解越五宿欲大便以蜜煎導當夜感寒復熱舌胎如粉吐痰欲嘔此為復感用半夏麴杏仁茯苓紫蘇薄荷佩蘭葉加薑熱未退口燥脈數煩擾不寐再服牛黃清心丸五分犀角磨汁冲服逾日大汗如雨乃涼然已兼旬外矣此案芝本日記附誌之見熱邪之劫燥津液甚熾也憶是夏坐臥樓窗吸受暑喝更加傳染病中苦熱見曦炎出如膏自焚口

占七絕日十餘首有自笑吳牛喘明月簷梢怕見石榴紅之句左氏謂明淫心疾良不予欺

類證治裁 卷之一 暑

暑症論治
暑厥 傷暑 中暑 中暈 夾暑 暑風
伏暑 暑瘧 庄夏 溼溫 暑瀉 暑癘

暑為陽邪感之者從口鼻吸入先阻上焦氣分則為頭脹腕悶漸至面垢舌胎煩渴自汗熱則或嘔惡腹痛泄瀉肢冷倦怠少神經所謂熱傷氣也仲景言傷暑脈虛夫肺主氣夏火鑠金則肺傷而氣虛心主血暑先入心則煩汗而脈虛此千金生脈散所以重保肺而清心也經云因於暑汗煩則喘喝靜則多言蓋暑內擾於營則汗上迫於肺則喘內干於心則言多知暑邪始傷肺繼傳心胞也節齋曰夏至後病熱為暑相火行令入感之自口齒入傷心胞絡經煩渴而熱頭疼自汗甚者火熱制金不能平木搖擗不省人事名曰暑風張兼善曰清邪中上濁邪中下其風寒溼皆地之氣係濁邪所以俱中足經惟暑乃天之氣係清邪所以中手少陰

暑本屬火而兼風寒溼燥其傳變為瘧痢霍亂而條其淺深同異變症則有冒有傷有中有中暈暑風暑厥暑瘧溼溫之不同其感而不即病者至秋時為伏暑其候寒熱渴悶午後為甚日暮更陰化燥溼滯則傷陽化濁以致神昏內閉腕痞肢厥斯危候矣葉香巖宗河間三焦立法在上以辛涼清解如竹葉蓮翹杏仁薄荷在中以辛苦宣通如半夏瀉心下以溫行寒性質重開下如桂苓甘此治三焦之大旨也更宜細審邪在氣分營分治氣分有寒溫之別寒則宗白虎湯及天水散溫則從二陳湯及正氣散理營有清補之宜清則犀角地黃湯加入心之品補則如三才湯人參固本丸復脈湯又如溼熱沈混宜蒼朮氣血兩燔宜玉宜閉逐穢宜至寶丹牛黃丸紫雪等扶虛養正如參及兩儀膏隨其變幻審其陰陽而治要得矣

胃腹痛水瀉。係胃與大腸受之。飲香薷惡心者。胃口有痰飲也。飲下香薷消暑丸。此暑病之輕者。

傷由靜而得之。陰症也。傷及內分。納涼廣廈。起居不時。惡寒肢厥。面垢煩躁。汗出脈虛。細清暑益。或過襲陰涼。惡寒頭痛。肢體拘急。膚熱無汗。脈弦緊。全散。或外感暑邪。內傷生冷。腹痛吐利。正氣散。身熱煩渴。小便不利。乃溼盛而氣不施化。益元煩熱。頭痛燥渴。乃溼蒸而熱耗津液。病之稍重者。此暑。

中由動而得之。陽症也。中暑則暑邪。夏日遠行。陽氣內伏。熱舍於腎水不勝。火煩渴喘促。猝然昏暈。用蒜搗汁。和待甦醒後。隨症用藥。參白虎湯。或人忌用香薷辛溫之品。治中暑。此暑病之尤重者。

中者。行旅農夫。日中勞役。忽頭痛壯熱。汗泄肌肉如火。大渴引飲。無氣以動。乃熱傷元氣。益元散。白虎湯。或清暑益氣湯。若吐瀉脈沈微。不宜用涼藥。六和湯。大順散。脈虛身熱。得之傷暑。脈盛身熱。得之中暑。此暑與暈微有辨也。

內傷暑。月房勞。兼膏粱水果雜進。致陽氣不得伸越。脈沈細。或弦緊。面垢無汗。惡寒。四肢厥逆。拘急。霍亂嘔吐。飲子。或吐利兼作。脈微欲絕。急宜散。溫之。又有暑痿症。暑月膏粱之人。陽事頓痿。不可全用熱藥。亦不可全用涼藥。黃連解毒湯。合生脈散。

風暑。因病暑。忽手足搐搦。昏迷不醒。脈浮虛急。先以溫水化蘇。俟醒再用藥。黃連香薷飲。此因痰火鼓風。蒙蔽心胞。若嘔吐。前藥加加羌活。大效。

香。小便不利。加茯苓。猪苓。痰多。加石菖蒲。口渴。去半夏。瀉利。加白轉筋。瓜。腹滿身重。難以轉側。口不仁。面垢。譫語遺尿。此熱兼喝也。白虎湯。

暑。中暑手足逆冷。二香散。或人參羌活散。合香薷飲。有熱深厥亦深。煩躁昏冒。便秘溺赤。脈沈滑而數者。大小承氣湯。加減。有溼熱沈混者。蒼朮白虎湯。加減。若寒厥脈微者。逆湯加減。

暑熱劫陰。欬血吐血。六味湯。加阿膠。麥冬。丹皮。或夏月患頭痛。足軟。食少。體羸。倦怠嗜臥。五心煩熱。多屬元氣不足。補中湯。去升麻。加半夏。肺胃陰虛。生脈散。或加玉竹。白芍。薏米。五味子。沙參。杞子。扁豆。石斛等。甘潤之品。

類證行裁 卷之 暑 其人傷溼。因而中暑。兩脛逆冷。胸滿頭重。妄言多汗。脈陽滿而弱。陰小而急。切不可汗。汗之必死。蒼朮白虎湯。又有冷水澡浴。致暑溼相搏。一身盡痛。自汗發熱。五苓散。若冒暑作勞。乘汗冷浴。身痺如針刺。間有赤腫處。或發水泡者。蒼朮荆防湯。

暑傷腸胃。或挾食挾溼。煩渴溺赤。腹痛陣瀉如水。桂苓甘露瀉丸。玉龍丸。暑傷心脾。嘔瀉浮腫。霍亂轉筋。六和暑熱引飲過多。致水暑交併。上吐下瀉。解暑三傷暑吐瀉兼煩亂。飲子。脾胃停積。冷溼致成吐瀉。散。大順散。若盛暑傷於外。陰冷傷於內。內外受迫。連理湯。桂苓丸。縮脾飲。

暑月頭項赤腫。咽喉腫痛。或腿足焮腫。長至數寸。不堪步履。日

夜發熱散。熱解。腫自消。暑瘡發泡。由溼熱入經。黃連解毒。湯香薷飲。伏暑秋發為伏暑。初由口鼻吸受。繼而內結募原。至伏邪為新涼引。動頭痛腕悶。漸至唇燥齒乾。烈內熾。內熱煩冤。忽然鼻冷氣窒。夫暑穢熏蒸。則為粘涎。過鬱則為厥冷。得汗則涼。然有一厥而熱。便得汗解者。有再厥三厥四厥而熱。但頭汗出者。有四末不和。身溫而躁擾益甚者。蓋邪伏募原之裏。熱內結外反不熱。仲景所謂熱深厥亦深也。若用苦寒直降。竟走腸胃。與膈上結邪無干。宜山梔石膏天冬淡竹葉。若初但氣分阻痺。陰肺宜治。上焦宜杏仁貝母薄荷薏米滑石。若由氣分延及血分。神呆舌縮。鼻煤唇血。邪已逆走膈中。包絡既入營絡。神識漸昏。內閉外

脫危期至。速急宜石菖蒲犀角尖磨汁連翹。或芳香逐穢宜蘇如藿香佩蘭鬱金。牛黃丸至寶丹紫雪等。若熱痰粘膩。用竹瀝貝母橘紅栝蒌。俱可選用。最忌脈象瀉數。正虛邪陷。手足厥逆。神昏液涸。若瀉短自利。潮熱不解。中下焦均受。或參用六一散。然總以清理上中焦為要。

治暑。嗚汗液大泄。中氣先傷。雖有膈滿潮熱。最忌攻下。以無形之熱。不能隨藥攻散也。雖有頭額重痛。最忌發汗。以表藥皆能升舉痰食濁氣。支撐膈上也。

許學士治溼溫病。胸項多汗。兩足逆冷。譫語。其脈關前濡。關後數。此先受暑。後受溼。暑溼相搏。濡弱見於陽部。溼氣搏暑也。小急見於陰部。暑氣蒸溼也。許氏以關前為

陽關後為陰。紀氏是名溼溫。先以白虎。次用蒼朮湯。頭痛漸退。足漸溫。汗漸止。三日愈。

孫兆治溼溫病。遍身皆潤。兩足冷。腹滿。不省人事。脈小弱而急。以五苓散。合白虎湯。十餘劑。少甦。更與清燥湯。調理而安。凡陰病厥冷。脛臂皆冷。今脛冷臂不冷。故知非下厥上行。是陽微寒厥。而合用祛熱藥也。

張石頑曰。中暈用白虎湯。熱傷氣之治也。用人參白虎湯。兼傷無形之氣也。中暑用生脈散。暑傷無形之氣也。用清暑益氣湯。暑傷於氣。兼挾風熱。乘虛傷其經也。傷暑用十味香薷飲。風熱溼合而傷形氣也。偏於表則變香薷飲為消暑十全。偏於裏則變香薷飲為六和湯。此夏月解暑。其用消暑丸者。上盛之溼。泛濫而為瘧滿也。用益元散者。下盛之熱。阻滯而為溺瀉也。用大順散者。水果傷於脾也。用冷香飲者。冷食內傷於腎也。用來復丹者。陰氣固結於下也。用五苓散者。陽氣遏絕於內也。

暑症脈候。暑脈虛而微弱。或虛大而散。或隱伏。仲景以弦細芤遲為傷暑。皆類活人書曰。中暑與熱病相似。但熱病脈盛。中暑脈虛。以此辨之。

附方。半夏瀉心湯。見前溫。桂苓甘露飲。肉桂。茯苓。猪苓。白朮。澤瀉。名五苓散。加石膏。滑石。寒水石。名桂苓甘露飲。

中風 暑濕 除痰 中調 涼血 滋陰 液滋 溼熱 生津 宣敷 清心 開閉 陽回 補潤 除溼 胃目

白虎湯 見前中風

天水散 見前溫

二陳湯 見前中風

藿香正氣散 見前中風

犀角地黄湯 見前溫

三才湯 天冬 地黃 人參 名三才湯 再加 麥冬 生地黃 蜜丸 名人參固本丸

復脈湯 見前中風

蒼水石膏湯 即蒼水白虎湯見前中風

玉女煎 見前溫

至寶丹 見前中風

牛黃丸 見前溫

紫雪丹 黃金拾兩 或真金葉 煮取汁一斗 去金入石 汁煮五升 去渣入烏犀角 羚羊角 甘草 木香 丁香 研

各五錢 元參 升麻 各一兩 六錢 甘草 木香 丁香 研

一錢以八味入前汁煮取一升五合去渣 入芒硝 煇研

各二兩入盆中半日欲凝入柳木槌攪不住 候熬至七合

半傾入盆中半日欲凝入柳木槌攪不住 候熬至七合

子研一錢二分攪勻候結成霜砂研細水飛五錢 麝香當門

切實火閉結狂越躁亂口舌生瘡

參附湯 人參 附子 兩儀膏 人參 熟地 熬膏白蜜收

四苓散 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 加桂名五苓散

香薷飲 見前中風

消暑丸 半夏 茯苓 甘草 薑汁糊丸

清暑益氣湯 黃耆 人參 白朮 蒼朮 神麴 青皮 澤瀉 升麻 陳皮 甘草 麥冬 五味 當歸 黃蘗

消暑十全飲 香薷一錢半 扁豆 厚樸 蘇木 赤茯苓 厚樸 木香 檀香各一錢 甘草五分 砂仁

六和湯 香薷 厚樸 扁豆 甘草 赤茯苓 藿香 砂仁 木瓜 人參 半夏 杏仁 薑

麥冬湯 石膏 知母 茯苓 白芍 山梔 竹茹 麥冬 白朮 扁豆 人參 官桂 甘草 烏梅 蓮子 甘草

大順散 乾薑 杏仁 官桂 甘草

冷香飲 生附子 草果 橘紅 甘草各一錢 薑五片 水煎冷服

漿水散 肉桂 附子 乾薑 甘草各五錢 良薑 半夏 各二錢五分 漿水即淡醋 調藥末每服一錢

黃連解毒湯 見前溫

生脈散 人參 麥冬 五味

二香散 香附 香薷各二錢 蘇葉 蒼朮 陳皮各一錢 厚樸 扁豆 甘草各五分 木瓜 二片 葱 薑

人參羌活散 桔梗各六分 天麻 地骨 薄荷各三分 見前溫

大小承氣湯 見前溫

理中湯 見前中風

四逆湯 生附子 乾薑 甘草 葱 冷服

六味湯 見前中風

補中益氣湯 見前中風

玉龍丸 硫黃 硝石 滑石 明礬 水丸

解暑三白散 茯苓 白朮 澤瀉各二錢 薑三片 燈心

二十莖

二十莖

瀉 煩 理 中 止 瀉 祛 暑 暑 傷 濕 溫

香樸飲 香薷 厚樸 扁豆 甘草 赤茯苓 澤瀉 陳皮

連理湯 木瓜 半夏 人參 烏梅 蘇葉 薑 棗

桂苓丸 肉桂 茯苓 蜜丸

縮脾飲 砂仁 錢半 草果 烏梅 香薷 甘草各一錢 葛根 扁豆各七分 薑五片

荆防敗毒散 人參 敗毒散 見前 傷風 此再加 荆芥 防風

清燥湯 人參 黃耆 白朮 茯苓 甘草 當歸 麥冬 五味 生地 升麻 猪苓 神麴 柴胡 蒼朮

黃蘗 澤泄 陳皮

類證治裁

卷之一

暑

畫

暑

吳 脈虛傷暑得汗身涼頭眩神疲懈言不食溺少而痛生脈散

合六一散主之 路參 錢五 麥冬 錢三 五味 錢五 赤苓 錢二 滑石 甘草 各六

荷葉一燈心分三玉竹 錢半 二服效

族某感暑頭暈微熱額汗左脇痞鞭湯飲格拒不下脈濡清此中

焦氣阻溼聚用香薷飲加減香薷厚樸杏仁枳壳栝蒌橘白半

夏 薤 薄荷梗二服痞鞭除熱眩減去樸枳蒌夏加梔子丹皮茯

薏米燈心再劑而瘳

厲氏暑熱傷氣勞倦食少煩滿口乾下部骨蒸足心如烙做清暑

益氣湯加減潞參麥冬五味陳皮神麴當歸生地沙參地骨皮

類證治裁

卷之一

暑

畫

數服效

李 暑症用傷寒六經治法致壯熱煩冤頭目重脹喉梗氣窒呼

吸不利舌白不饑夫暑暈所傷必脈虛少氣自汗而垢縱有兼

症大異傷寒浮緊脈象豈堪例治迨失治而症加重本症尙自

顯然何者暑入心故煩冤暑挾溼故重脹暑犯肺故氣窒不利

葉氏所謂暑由鼻吸必傷上焦氣分每引經義云自上受者治

其上法宜辛涼微苦廓清上焦氣分自愈黃芩 酒炒 八分 黑山梔 梔

白鬱金 磨汁各一錢 栝蒌仁 炒赤苓 各二錢 薄荷梗 八分 沙參 薤仁 三錢

荷梗 錢五 二服頭清咽爽煩熱大減去黃芩鬱金加麥冬鮮藕湯

熱退而思食矣

族某有年力農中暍惡熱無汗腹痛自利唇乾肌稿舌焦而燥脈
小數乃熱燥肌消腸津陰液俱涸也經曰熱淫於內治以鹹寒
佐以苦甘用花粉麥冬沙參黃芩酒炒枳壳白芍丹皮鮮石斛甘
草三服舌潤利稀腹不痛身熱減去沙參黃芩枳壳加青蒿知
母酒炒滑石赤苓生地車前子燈心數服熱退利止呃逆間作少
寐此胃虛有痰用淡竹茹杏仁路參茯神當歸白芍柿蒂橘紅
棗仁二服呃止熱寐又調補乃平

族某稟賦素弱中年暑熱傷氣神倦嗜臥食少肢麻聞腥欲嘔服
右虛左促按東垣論長夏溼熱損傷元氣肢倦神少足痿軟早
晚發寒厥日午熱如火乃陰陽氣血俱不足也此症雖未至甚

列註

卷之二

毒

然熱傷元氣久則水不勝火發為骨癢先服清暑益氣湯蒼朮
改生白朮去澤泄升麻乾葛加歸芍半夏石斛茯苓神後服生脈
散又服大補元煎加橘絡桑枝膏九服而安

張 暑熱作勞汗泄面垢初起吐衄厥陰受病已非淺恙消導表
散延至譫妄神昏舌心灰而尖絳齒燥鼻燥津液告涸脈虛細
瀉數邪陷營絡治者徒知下焦火亢用黃蘗知母苦寒直降與
心包襲入暑邪全不相涉更醫用羚羊角陳海蛇泄膽熱而降
肺火究竟治不中病使熱邪漫布神明漸昏昔人治邪入心包
每周芳香宣竅逐穢如至寶丹之類若得痰熱淨掃如清風捲
霧神識稍開方不至內閉外脫然症險難挽姑據理論治而已

犀角尖磨汁連翹心赤芍丹皮佩蘭葉琥珀石菖蒲搗汁鮮荷
梗煎服明晨頗覺神氣清爽更酌加梨皮燈心麥冬銀花煎送
至寶丹乃窮鄉一時竟同返魂香無覓處矣

王 脈不鼓指渴不多飲舌尖絳身熱語譫肢冷溺渾赤伏暑晚
發熱深厥深之象川連酒製元參連翹山梔麥冬各錢石斛梨
肉赤苓各二錢燈心滑石各四分一服而手足溫譫語息去川連加
生地再服再汗而解

幼兒伏暑秋發頭痛壯熱燥渴引飲自汗手足心如烙脈洪而疾
溺赤而濁山素稟陰虛伏邪內燥仲景所謂陰氣先傷陽氣獨
發不寒痺熱令人肌肉消燥者也宜甘寒生津以解熱煩用生

類註

卷之二

毒

地知母麥冬石斛丹皮花粉甘草鮮蘆根鮮荷梗煎服汗徹身
涼越日再發覺熱氣由腹背上蒸頃刻如焚一日夜渴飲唇乾
前方去丹皮荷梗加石膏一服熱退越日又發一日兩夜汗出
熱不解去石膏加鮮地黃萊豆皮車前穗又服又退越二日夜
分又發熱勢較輕原方再加通草滑石青蒿半夜熱退調理而
安暑必挾溼此症歷四五發於清 按暑溼傷人隨發者淺遲
至秋後為伏氣晚發者深其候脈色必滯口舌必膩或微寒或
單熱頭重脘痞渴煩溺濁午則甚暮尤劇一次汗則邪一次散
比傷寒勢較緩比瘧疾發無時秋來此症最多名曰伏暑晚發
不似風寒之邪一汗輒解溫熱之症投涼即安以暑溼為熏蒸

粘膩之邪故難驟卻耳

湯氏灼熱無汗下瀉後重舌乾少潤脈緩大乃溼熱交蒸用六一散加薄荷青蒿麥冬麝香赤苓石斛萊菔皮車前穗燈心一吸熱退去首四味加猪苓枳壳瀉止

類證治裁

卷之一

暑

三

溼症論治

風溼 溼熱 寒溼 暑溼 中溼附

溼為陰邪。乃重濁有質。不比暑熱瀰漫無形。其自外受者。霧露泥水。由地氣之上蒸。經所謂地之溼氣。感則害人皮肉筋脈也。自内生者。水穀生冷。由脾陽之不運。經所謂諸溼腫滿。皆屬於脾也。溼蒸於上。則頭脹如蒙。經所謂因於溼。首如裹也。溼感於下。則跗腫攻注。經所謂傷於溼者。下先受之也。在經絡則痺痿重著。經所謂溼熱不攘。大筋縲短。小筋弛長。縲短為拘。弛長為痿也。在臟腑則嘔惡腫脹。小水赤澀。經所謂溼勝則瀉瀉也。又或在肌表則惡寒自汗。在肉分則麻木浮腫。其身重如山。不利轉側。腰膝腫痛。筋骨痛小。洩秘大便澀。則有溼兼風者。有溼兼熱者。有溼兼寒者。有溼兼

類證治裁

卷之一

溼

榮

暑者有中溼。而口喎舌強。昏不知人。類中風者。不得誤作中風症治。在表在上宜微汗。在裏在下宜滲泄。中虛宜實脾。挾風而外感者宜解肌。挾寒而在半表半裏者宜溫散。挾暑熱而滯於三焦者宜清利。分消其溼。熱蒸痰內閉昏厥者宜宣竅逐穢。此治溼之要也。
上焦阻滯。脹腕悶。不饑渴。宜開肺氣。通膀胱。桔梗 通草 滑石 半夏 薏米 茯苓 香 豉 淡竹 葉 等
中焦滯。腸胃屬腑。溼久生熱。傳送既純。大便不爽。宜主溫通。佐淡滲。如枳壳 砂仁 壳 橘白 草果 藿香 脾陽不運 溼鬱腹膨 用木 槿 並 半 夏 麩 大 腹 皮 猪 苓 澤 瀉 之 類
以溫運之。以荖 澤 腹 皮 以 滲 泄 之 兼 寒 飲 兼 風 勝 溼
濕痰溼鬱。蒸痰神呆。語塞。宜主開鬱。佐辛香。鬱金 石 菖 蒲 厚 樸 半 夏 佩 蘭 金 銀 花 茯 神

枯藁枳殼之類。神昏內閉。邪入心胞。宜芳香宣竅。佩蘭銀花露。犀角連翹。心等。送至寶丹。獨活寄生湯。其夾風者。必加煩熱。流走

拘急。防風。夾寒者。必加攣痛浮腫。五積散。風寒溼。合則成痺。詳

風。一身盡痛。屬風溼。相搏。活湯。肢體煩痛。頭重鼻塞。或瀉利。或

下清血。為風木之邪。內干溼土。神水。脈浮身重。汗出惡風。防已

湯。仲景論風溼之脈。浮虛而漉。熱溼。脈滑數。溺赤。引飲自汗。屬溼熱。宜主清火。佐分利。清熱溼

飲溼。盛身痛。溺瀉。體重發渴。五苓散。身黃如橘色。溺瀉腹微滿。茵陳

蒿湯。身黃溺瀉而渴。五苓散。煩熱溺瀉而渴。露飲。溼熱相搏。清熱溼

溼湯。肩背沈重。肢節煩痛。或遍身痛。脚膝腫痛。屬外因之溼

熱。當歸。抽。溼熱之內因。則水腫。小溲不利。五苓散。神。分輕重。以

泄後用實脾之劑。調理。六君湯。陰虛多火。兼走精者。溼襲精。厥

也。虎潛丸。或加。有氣如火。從腳下起。入腹。屬濕鬱成熱。二妙丸。防已。叔和脈經

云。溼熱之脈。滑疾。寒。脈不滑數。溺清便利。身痛無汗。關節不利。牽掣作痛。屬寒溼。宜

溫利。七味滲溼。脈虛者。宜溫補。理中湯。加。茯苓。薏米。四肢浮腫。不利。屈伸

大便多。溼。除溼湯。或升。腰痛身重。小便不利。腎著。如寒熱之氣

中於外。此與內生之溼不同。宜溫而兼散。五積散。或加味五苓

大而浮。虛而。瀉皆寒溼。六和。先傷於溼。因而中暑。兩脛逆冷。胸滿

溼。暑。酸溼。嘔吐瀉利。湯。六和。先傷於溼。因而中暑。兩脛逆冷。胸滿

頭重。妄言多汗。脈陽弱陰急。病名溼溫。切不可汗。蒼朮白虎湯。暑之脈。弦細。乳遲。若

兼溼。則虛濡。或虛瀉。中。關節重痛。浮腫。喘滿。腹脹。昏悶。不知人。脈必沈緩。或沈微。屬中

溼。除溼。有破傷處。因澡浴溼入瘡口。昏迷沈重。身強直。口噤。狀

類中溼。名破傷溼。白朮酒。或用煨牡蠣粉二錢。甘草湯調服。仍

細。中溼。沈氏云。溼在上。宜防。風能燥溼也。溼在中。宜蒼。土乾燥溼也。溼在

下。宜利。開溝利溼也。溼在周身。宜烏。藥。溼在兩臂。宜桑。條。溼在兩

股。宜牛。膝。防。分部治之。其傷溼由腎虛者。腰冷如坐水中。腎著

由脾虛者。腹滿吐酸。桂。湯。體氣虛弱者。身重便溼。清。燥。酒溼者

嘔瀉發熱。葛。花。解。坐臥溼地。當風涼。足膝拘攣者。獨。活。寄。年。老。衰

憊。婦人腎虛血竭。致腰脚痛者。獨。活。寄。脾胃不和。伏溼水瀉者。加

散。脾胃溼泄瀉者。蒼。朮。丸。溼家治法。大概宜發微汗。利小便。使上下分消。仲景謂溼家忌

汗。以身本多汗。易至亡陽。故溼溫症。誤發其汗。名曰重喝。所宜深

戒。然久冒風涼。以水灌汗。過鬱生陽。又不得不微汗之。不可大發

則溼去熱留。東垣謂治溼不利小便。非其治也。然真陽素虛之

人。汗出小便滴瀝。正泉竭而陽欲亡之候。若以為溼熱而太利之

真陽無水。頃刻脫離而死矣。不宜過利。第去其六七。即改

羅氏曰。春夏之交。病如傷寒。其人汗自出。肢體重痛。轉側難。小便

不利此名風溼。因時令陰雨。或坐臥卑溼。或引飲過多。宜利小便。五苓。溼去則愈。切忌汗下。誤則不救。醫不識症。誤作傷風治。丹溪曰。溼本土氣。火熱能生溼。土故夏熱則萬物潤。秋涼則萬物燥也。夫熱鬱生溼。溼生痰。用二陳湯加酒。去風行溼。以風能勝溼也。又曰。溼甚而熱。治以苦溫。佐以甘辛。平胃散。溼在上。宜微汗而解。不欲汗多。忌麻黃葛根等。溼在中下。宜利小便。五苓散。此淡滲治溼也。

溼症脈候

傷溼之脈。細濡溼熱之脈。緩大。浮緩溼在表。沈緩溼在裏。細與溼脈相似。而症不同。溼。弦緩為風溼。相搏身痛。脈沈為中溼。脈浮為則身痛。溼則身不痛。

類證治裁

卷之一

溼

三

風溼。虛瀆為寒溼。溼流關節。一身盡痛。脈沈而細。為中溼。為溼痺。溼溫。脈陽濡而弱。陰小而急。

附方

寒溼	實脾飲	白朮	茯苓	甘草	厚樸	大腹子	草薺
風溼	勝溼湯	羌活	防風	蒼朮	黃連	黃蘗	猪苓
宜	至寶丹	見前	中風				
經絡	獨活寄生湯	獨活	桑寄生	秦朮	熟地	人參	茯苓
		杜仲	秦朮	白芍	當歸	細辛	牛膝
		甘草					
風溼	羌活勝溼湯	羌活	獨活	各五分	蔓荊子	三分	藁本
風溼	防風湯	防風	葛根	羌活	秦朮	桂枝	甘草
風溼		杏仁	黃芩	赤芍	薑	酒煎	當歸

大寒 加減五積散 歸 乾薑 桔梗 赤芍 蒼朮 厚樸 當歸 神水散 見前傷風 防己黃耆湯 防己 白朮 黃耆 甘草 薑 棗 清熱溼溼湯 黃蘗 黃連 茯苓 澤瀉 猪苓 薏仁 枳壳 厚樸 小分清飲 茯苓 澤瀉 猪苓 薏仁 枳壳 厚樸 五苓散 見前溫 茵陳蒿湯 茵陳 大黃 梔子 桂苓甘露飲 見前暑 當歸拈痛散 當歸 知母 苦參 防風 茵陳 升麻

類證治裁

卷之一

三

導水 神芎丸 黃連 黃芩 川芎 大黃 薄荷 滑石 牽牛 脾理 六君湯 見前中風 異功散 見前中風 虎潛丸 見前中風 二妙丸 黃蘗 蒼朮 七味溼溼湯 蒼朮 白朮 茯苓 炮薑 丁香 橘紅 利溫 理中湯 見前中風 除溼湯 六君湯加 藿香 蒼朮 大腹皮 寒溼 升陽除溼湯 升麻 柴胡 神麴 澤瀉 猪苓 蒼朮 腎著湯 炮薑 茯苓 白朮 甘草 益智 半夏 如溺赤便澀加蒼朮

溫

加味五苓散 五苓散加 羌活

暑

六和湯 見前暑

濕

蒼水白虎湯 見前中風

傷

白水酒 白水一兩 酒三盞 煎一盞

腹

苓薑水桂湯 苓 薑 水 桂

滿

清燥湯 見前暑

體

葛花解醒湯 葛花 砂仁 薤仁 木香 青皮 陳皮
澤瀉 茯苓 白朮 茯苓 神麴 乾薑 猪苓

酒

除

平胃散 見前中風

脾

胃苓湯 見前中風

瀉

類證治裁 卷之十一 瀉 蒼水丸 茯苓 薤水 厚樸 白芍 炙草 川椒 茴香
破故紙 糯米 粥丸 二陳湯 見前中風

止

類證治裁 卷之十一 瀉 蒼水丸 茯苓 薤水 厚樸 白芍 炙草 川椒 茴香
破故紙 糯米 粥丸 二陳湯 見前中風

瀉

二陳湯 見前中風

瀉

潘 溼暑蒸溼水穀聚溼致胸膈煩悶呃逆嘔噦口甜燥手心熱
頭汗舌白不饑便溏溺少由溼邪瀰漫膈間鬱蒸成熟所服湯
飲盡變濁痰上泛脈息亦三五不調治宜辛以通壅苦以降逆
佩蘭香薷白荳蔻公丁香柿蒂鬱金半夏麴枳壳杏仁俱按口
甜經名脾痺用蘭草除陳遵經立治一服脾痺已除諸症俱減
改用清輕淡滲淡竹茹通草滑石石斛薑霜象貝赤苓薑梗燈
心二服嘔止呃稀乃胃虛客氣上逆用一味大麥仁湯脘舒呃
止汗徹知饑思食治用調補胃陰太子參麥冬沙參扁豆炒 茯
神棗仁薤仁小麥南棗數服進食如常

類證治裁

卷之十一

瀉

杏

潘 六旬以上感冒春溫治者用傷寒法雜進桂枝柴葛兼旬不
解延至溼熱釀痰舌膩口甜溺少赤痛不思傷寒遞傳足經溫
邪專傷手經桂柴等溫升已屬誤治更醫見其裏迫欲下竟用
桂心焦朮尤為可駭無怪唇乾舌灰矣夫病者自言不惡寒而
但熱身重難移則春溫化溼了然况脈來氣口濡大溼甚生熱
脈候可按更兼口味作甜經名脾痺粘痰稠膩氣窒不利皆溼
熱混處上中焦顯象其欲瀉者亦溼邪下注得小水分利自不
至下迫耳治法透熱泄溼數劑可安香豉杏仁貝母各二錢 佩蘭
前胡梔皮竹茹各錢半 赤苓三錢 滑石五錢 蔗汁半杯 燈心一錢 一服微汗
煩熱退下迫除去香豉佩蘭加通草栝萸沙參各一錢 一日再服痰

較滑利舌灰漸脫可知溫邪本溼熱內搏用辛涼透熱甘淡驅
溼口甜身重俱除惟小溼濁猶是溼邪未淨此輕清泄熱滲
溼為一定治法花粉鮮生地麥冬各二錢赤苓薏仁各三錢梔皮川
貝木通各八分燈心五分鮮蘆根日再服溺清粥飲漸加轉側如常
矣繼進調補胃陰法玉竹釵斛潞參各二錢麥冬一錢薏仁生二錢
小麥湘蓮各三錢甜杏仁半錢蔗汁冲服此甘潤以養胃陰兼用火
肉汁吹去油而飲之待腸腑一充大便得解則脫腹爽矣

類證治裁

卷之一

溼

五

胃津再用丁香參甘以止呃溫補焉能利溼夫時邪本溼土鬱
蒸所發感受不時熱騰溼滯先宜疏解再行滲利俾氣機升降
如常豆豉枳殼梔皮萸皮半夏製藿梗通草茯苓猪苓荷葉煎
湯一服諸症俱減時或嘔渴乃中焦水穀之氣不運用半夏橘
白茯苓杏仁薏米粉砂仁再服得安

族某客路感邪風熱上壅嘔渴頭重痛脈浮濡此熱蒸溼伏也治
先宜解表分則風熱不與溼搏用薄荷牛蒡桔梗山梔甘菊桑
葉赤苓薑皮汗解身涼因食葶藶重發熱下利煩悶乃溫邪未
盡生冷引動溼濁用胃苓湯去二水加枳殼燈心蘆根煎服愈
姪頭蒙如裏胸悶便艱腑氣失降以溼鬱論治通草白蔻壳枳

亮葉霜川芎山梔杏仁半夏淡竹葉冬桑葉三服愈

姪絡熱蒸痰膠緊口甜脈沈濡左寸差大此風熱鬱於膈絡兼
脾有溼痰壅熱而為脾痺也鈎藤絲瓜絡桔梗連翹象貝薄荷
鮮佩蘭橘紅鬱金三服而愈

類證治裁

卷之一

溼

案

族弟嗜酒蘊溼又醉渴飲冷寒熱挾旬口乾舌膩嘔惡胸悶耐冷
便瀉脈濡數溼甚於熱醫混稱溫瘧屢用芩膏生地溼愈搏結
宜輕透溼於熱外無能互相煽熾病可立除通草枳殼半夏赤
苓車前石斛薏仁麥冬燈心花粉蘆根日再服汗微熱退瀉止
足和但微嗽去枳殼車前蘆根加杏仁象貝更適粥飲既進脾
陽未醒間或腹痛川廣皮砂仁茯苓薏仁半夏麴生白朮枳
子又數劑全愈

燥症論治

燥為陽明秋金之化。金燥則水源竭而灌溉不周。兼以風生燥火。化燥原病式所謂諸澇枯涸。乾勁被揭。皆屬於燥也。燥有外因。有內因。因乎外者。天氣肅而燥勝。或風熱致傷氣分。則津液不騰。宜甘潤以滋肺胃。佐以氣味辛通。因乎內者。精血奪而燥生。或服餌偏助陽火。則化源日涸。宜柔膩以養腎肝。尤資血肉。填補葉氏以上燥治氣下燥治血。二語括之最為簡當。今析言之。燥在上必乘肺為燥嗽。俞氏清燥救肺湯加減。肺中有火為乾咳。申先生瓊玉膏主之。外內合邪。金麥門冬湯。肺痿欬唾。心中溫溫液液者。甘草湯。燥在中必傷脾胃之陰。為熱壅食不下。金匱麥門冬湯。胃腕有死血。乾燥枯槁。食下痛。胃翻便秘。

類証治裁

卷之十一

燥

卷

丹溪非汁。胃熱善消水穀。丹溪消燥在下必乘大腸為大便燥結。其氣秘濁陰不降者。東垣通幽湯潤燥。風秘血燥。東垣潤腸丸。加津枯秘結。丹溪潤燥生津湯。血枯膈噎便結如栗。生料六味丸。去歸或加肉苁蓉。桃仁。搗此燥在臟腑者也。若燥在血脈多見風症。水煎服。兼食人乳酥蜜。此燥在血脈也。若燥在血脈多見風症。宜滋燥養。治外黃湯。治內血虛外燥。皮膚皴揭筋急爪枯。滋燥湯。諸痿由於肺熱亢則液耗百骸無所榮養。故手足痿弱不能自收持。反似痺溼之症。養陰藥中加黃以堅之。如虎潛之類。切忌用風藥。又婦人藏燥也。肺燥悲傷欲泣。仲景甘麥以生肺津。凡諸燥症多火灼真陰。血液衰少。故其脈皆細微而澇也。通治滋燥飲。生燥症脈候。

燥症脈微細澇小。間有虛大急數浮芤。重按無不細澇而微者。門入

曰傷燥脈澇。

附方

清燥救肺湯。霜桑葉三錢。杏仁七分。麥冬錢二分。石膏二錢半。人參七分。阿膠八分。胡麻。

枇杷葉一張。地黃四兩。茯苓十二兩。人參六兩。白蜜二兩。

千金麥門冬湯。麥冬二錢。桔梗。桑皮。半夏。生地。五味子十粒。竹茹。麻黃各七分。炙草五分。

薑一片。炙甘草湯。見前中風。金匱麥門冬湯。麥冬。半夏。人參。甘草。梗米。大棗。

非汁牛乳飲。非汁。牛乳。有痰加薑汁。血隔去牛乳。消渴方。黃連。花粉。生地汁。藕汁。牛乳。

通幽湯。當歸。升麻。桃仁。紅花。甘草。生地。熟地。潤燥湯。大黃。歸尾。桃仁。麻仁。升麻。紅花。生地。

麻仁丸。厚樸。芍藥。枳實各二錢。大黃四錢。麻仁。杏仁。各一錢五分。煉蜜為丸。潤腸丸。麻仁。桃仁。羌活。當歸。大黃。皂角。秦艽。蜜煎導。白蜜。熬捻如棗核納穀道中。

六味丸。見前中風。滋燥養營湯。當歸。生地。熟地。白芍。甘草。黃芩。

燥血陰滋燥便枯津秘風約脾結陽秘氣熱胃槁胃。類証治裁。卷之十一。燥。卷。

燥血 痰弱 藏燥 通治 通治

大補地黃湯 二地 元參 山藥 山黃 杞子 白芍 當歸

虎潛丸 見前中風

甘麥大棗湯 甘草 小麥 大棗

滋燥飲 秦朮 花粉 牛乳 白芍 生地 天冬 麥冬 蜜

生血潤膚飲 當歸 熟地各二錢 蔗汁亦可 天冬錢半 麥冬 黃耆各一錢 黃芩 桃仁 桔槿各

五分 紅花一分 五味子九粒

類證治裁

卷之一

燥

三

燥

徐 老年上盛下虛嗆嗽上氣聲啞噎乾欬則起坐臥不安枕溺

黃便鞭此由溫邪化燥漸傳入腑脈虛瀉兩寸俱大治仍清上

用生地麥冬竹葉沙參貝母玉竹山梔甘草枇杷膏數服遂平

朱 邑 瘡瘰復感秋燥虛陽上冒則為頭眩耳鳴津不上供則為舌

乾咽燥加以公事勞心渴飲院悶不饑左寸關脈大於右是秋

令亢陽致病後液涸最忌燥藥劫津用釵斛丹皮沙參麥冬鮮

生地栝藹霜洋參茯神二劑霍然

王女秋感風燥頭暈熱欬連胸脇震痛吸氣有音治宜清肅上

焦勿令氣痺豆豉杏仁貝母橘紅葉皮桑皮 蜜 桔梗嫩桑葉枇

類證治裁

卷之一

燥

中

杷膏和服三劑而平

董氏經閉忽通下損佳兆近逢秋燥寒熱渴煩脈數唇乾嗽多寐

少症由陰液不足肺脾感燥而成治在滋養營液用局方甘露

飲生熟地黃麥冬石斛甘草茯神枇杷葉加五味杞子甜杏仁

梨肉四服症退數服頓改但著左臥則欬而脇痛去五味梨肉

加桑皮 蜜 白芍四服更適飲食亦加調理漸愈

岳 老年因怒失血渴煩羸瘦延秋燥氣加臨舌紫黑乾薄無津

潮瀉痛右尺偏旺肺腎液涸心胃火熾恐延瘕厥用犀角地黃

湯加麥冬石斛鮮藕再服舌潤胎浮但呃逆領動肉關筋惕乃

風火成瘕急宜滋液熄風復脈湯去薑桂麻仁加竹茹鉤藤乃

定

湯氏衰年食少病羸胃陰虛弱冬感風燥瘡疥播癢時或寒熱譫
煩口渴舌焦額汗冰指脈左虛大右疾數此陰陽交損乘風燥
劫津治先甘潤除煩鮮地黃玉竹沙參石斛各一麥冬當歸各
半黃耆八分霜桑葉二錢蔗汁半杯冲服熱退舌潤隨用路參黃耆扶
神棗仁當歸白芍玉竹蓮棗平補陰陽症愈

類證治裁

卷之二

燥

三

火症論治

風寒暑溼燥皆外因。惟火多屬內因。經言壯火食氣。少火生氣。註
謂火在丹田之下為少火。少火則生氣。是為真火。火離丹田而上
為壯火。壯火則食氣。是為邪火。然有實火。虛火。溼火。鬱火。陰火。五
臟六腑火。遊行不歸經之火。治實火上焦熱。清心湯。加中焦積熱。
渴燥便秘。涼膈三焦火盛。狂躁吐衄。黃連解毒湯。陽明潮熱。白虎
火瀉血淋閉。立效。一切血分火熱丹毒。四順清。治虛火飲食勞倦
內生虛熱。此傷脾陽也。補中益氣湯。思慮房勞血虛火亢。此傷腎陰也。
六味地黃湯。腎陰虛極。火升躁渴。舌刺脈洪。此虛陽無附也。急用八味
黃湯。產後陰傷發熱。口渴面紅。為無根之火。獨參湯。治溼火溼甚生熱腫

類證治裁

卷之一

火

三

脹滿閉。胃滯。治鬱火肌表熱。五心煩如火燎。及胃虛食冷。遏抑脾
陽。升陽散。手心熱如烙。脈沈數。下部骨蒸。屬血虛。五蒸丸。血
中伏火。如味四。風勞骨蒸。秦九龜。治陰火氣從臍下起。坎離既濟
丸。氣從足下起。入腹為虛極難治。七味地黃丸。外以附子末津調敷湧泉穴。治五臟火
氣鬱火起於肺。瀉白散。大怒火起於肝。加味逍遙散。醉飽火起於
脾。葛黃散。加怵惕思慮火起於心。導赤散。房慾火起於腎。八味
治六腑火。胃火牙疼。頰腫。清胃。膽火眩暈。口苦。羚羊角。丹皮。山梔
大腸火便秘不通。通幽湯。小腸火癢閉淋瀝。八正散。膀胱火腹痛。
弱瀋丸。大補。三焦火肢熱體倦。上焦山梔。中焦連。心胞火怔忡不安。
麥冬。丹皮。犀角。其遊行之火。或宜散宜清。宜降。各隨微甚而調之。
連翹。菖蒲。燈心。

諸病屬火者多。內經病機屬火五條。其曰諸熱發瘧。皆屬於火。謂邪熱傷神。則昏亂。亢陽傷血。則抽掣。治以清心養肝。地冬連。曰諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。謂熱極反寒。治以透熱安神。梔連珠。曰諸逆衝上。皆屬於火。謂龍相上升。治以鎮逆潛陽。青鉛牡蠣之病人言冷氣自下而上。非真冷也。上升之氣自肝而出。中挾龍相火。自下而上。其熱為甚。自覺冷者。火極似水。積熱之甚也。陽亢陰微。故見曰諸躁狂越。皆屬於火。謂重陽便秘。治以清鎮通降。石膏硝黃。曰諸病附腫。酸痛驚駭。皆屬於火。謂熱鬱神擾。一治以升揚升麻。薤仁。當一治以斂鎮。龍骨之屬。此其概也。丹溪云。治火症不可驟用寒涼。須兼溫散。火甚用甘涼以緩之。生甘草兼火盛癲狂人壯氣實者。可用正治。冰水之虛者。用生薑若投水立死。或補陰令

類證治裁

卷之十

火

火自降。地黃白。其勞倦內傷為氣虛。火起於脾。宜甘平溫養以退之。參耆甘。經言勞者溫之。損者溫之是也。如陰虛燥煩。唾痰如湧。面目俱赤。口渴便秘。外極似火。脈亦洪大。然按之不鼓。指此腎陰虛而陽浮越。非火也。乃假熱症。用承氣白。當峻補真陰。七味丸料。水煎冷服。諸症必退。翼日畏寒足冷。真候自現。乃峻補其陽。丸料煎此脈症變常。不可以常法治也。又產後及大失血後。陰傷發熱。切忌涼劑。即以滋陰亦屬不宜。須補氣方見陽生。陰長之妙。此宜辨陽虛陰虛。陽虛者面必赤。無根之火。戴於上也。果屬陽盛。火鬱於內。面必不赤。其口渴者。腎液乾引水自救耳。且口雖渴。舌必滑潤。脈雖數。尺必無力。惟過服涼藥。脈反有力。而鼓指戴

復庵曰。服涼藥而脈反數。此火鬱也。宜升宜補。切忌寒涼。犯之必死。經曰。一水不能勝二火。二火君火相火也。心為君火。神屬陽。在天為太陽之火。相火附於肝腎。代君行。在天為龍雷之火。心火過亢。可以寒涼正治。如黃連生。如天上太陽火。人感之而傷熱中。喝亦可以涼水苦寒解。若龍蟠於海。雷伏於地。木水中之焰也。秋後則蟄隨陽而升。得雨益熾。此不可以水滅矣。人身命門相火龍火也。少陽相火雷火也。龍雷相附。命火衰。右尺脈弱。治須益火之源。附八味。與火同氣。據其窟宅而招之。腎水虛。左尺脈弱。須壯水之主。六味。與火相配。滋其真陰。以潛之。或腎陰弱。相火強。須從其性而

類證治裁

卷之十

火

火

伏之。滋腎。腎水虧。龍火升。須從其類而引之。七味。火起臍下。衝脈上衝而喘。黑錫丹。補而鎮之。不可以水折也。經曰。一水不能勝五火。五火者。五志之火。臨於五位。即相火之煽而妄動者也。相火易動。五志激之。變幻莫測。煎灼真陰。陰虛則病。陰絕則死。故東垣謂火為元氣之賊。古云神靜則心火自降。慾斷則腎水自升。有以夫。凡治五志火起於五位者。肺火以黃芩清肺。飲加豆。降之以平。散調之心火。以瀉心泄之以補心。養之脾火。以瀉黃發之以補中。湯升之肝火。以左金平之以龍骨折之。腎火。見上。虛火。以三黃清之以保元。補之。虛火盛而狂亂。以生薑從治之。實火。以三黃瀉之。痰火。以淡竹瀉之。火以發散之。一切壯火。狂陽。痰壅。心胞

內外熱熾。以紫平之。積熱煩躁。咽腫口瘡。以雪主之。好餌丹石藥。毒發渴壯熱。千金朴主之。

東垣曰。黃連瀉心火。黃芩瀉肺火。白芍瀉脾火。柴胡瀉肝火。黃連瀉之。知母瀉腎火。木通瀉小腸火。條芩瀉大腸火。羚羊瀉膽火。龍膽草瀉之。滑石瀉膀胱火。麥冬瀉心胞火。連翹山梔瀉三焦火。地骨皮佐之。石膏大黃瀉胃火。

火症脈候

火脈洪數。虛則浮。經火性熾。烈抑之則空。故火盛脈浮。取洪大。中按軟闊。重按空豁。洪盛滿指。為實火。數大無力。為虛火。惡寒戰慄。脈小匿者。為火鬱弦細。而數按之益堅。為少火氣衰。而見肝腎真

類證治裁

卷之一

火

火

脈非火使然。乃虛勞劇候。或更虛大疾。數為壯火。食氣耗竭。真陰虛陽飛越之象。久病得此。百不一生。惟元氣暴脫。猶可峻補以斂固之。脈洪而重按益實者。有形之溼熱與火無預。張氏醫通

附方

清心湯 甘草錢七分 連翹 山梔 薄荷 黃連 黃芩 大黃各七分 朴硝五分 竹葉七片 白蜜乙匙

加減涼膈散 涼膈散見前中風 此加桔梗竹葉 減大黃 芒硝

黃連解毒湯 見前溫

白虎湯 見前中風

立效散 瞿麥四錢 山梔二錢 甘草一錢 薑一片 燈心五條

四順清涼飲 蒸大黃 赤芍 歸身 炙草各一錢二分 薄荷十葉

補中益氣湯 見前中風

六味地黃湯 七味八味俱見前中風

胃苓湯 見前中風

升陽散火湯 升麻 葛根 羌活 獨活 人參 白芍各一錢 柴胡 甘草各七分 防風五分

炙草一錢

火鬱湯 羌活 升麻 白芍 人參 葛根 銀柴胡 甘草 草各一錢 防風五分 羌活 獨活 人參 白芍各一錢 柴胡 甘草各七分 防風五分

五蒸丸 青蒿 便浸 防風 地骨皮 生地 石膏 各一兩 當歸 歸七錢 胡黃連 五錢 醋製龜甲 一片 蜜丸 加丹皮 山梔 柴胡 各一錢

加味四物湯 地 芍 芩 歸 加丹皮 山梔 柴胡 各一錢

秦艽鼈甲散 天冬 桂 地骨皮 桑皮 紫苑 知母 半夏 人參

大補陰丸 黃藥 知母 各六兩 熟地 龜板酒炒 坎離既濟丸 生地 熟地 山黃 牛膝 天冬 麥冬 各四兩 白芍 五味 山藥 龜板各三兩

類證治裁

卷之一

火

火

瀉白散 桑皮 地骨皮 各一錢 甘草五分 粳米百粒

清金丸 黃芩 炒研 經氣分之火 水丸 加味逍遙散 歸 芍 芩 歸 加丹皮 山梔 柴胡 各一錢

瀉黃散 防風 四兩 薄荷 少許 名道 遙散 此加丹皮 梔子 甘草 二兩 蜜酒調服 山梔 一兩 石膏 五錢

導赤散 見前溫

清心蓮子飲 蓮子 二錢 人參 茯苓 黃耆 各一錢 黃芩 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清胃散 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清心蓮子飲 蓮子 二錢 人參 茯苓 黃耆 各一錢 黃芩 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清胃散 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清心蓮子飲 蓮子 二錢 人參 茯苓 黃耆 各一錢 黃芩 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清胃散 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清心蓮子飲 蓮子 二錢 人參 茯苓 黃耆 各一錢 黃芩 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清胃散 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清心蓮子飲 蓮子 二錢 人參 茯苓 黃耆 各一錢 黃芩 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

清胃散 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

大腸小腸腸膀胱相火火喘氣衝降肺調肺心瀉

通幽湯 見前燥

八正散 車前子 木通 瞿麥 扁蓄 滑石 甘草梢

大補丸 黃蘗鹽酒炒研 氣血虛八珍湯下 血虛四物湯下 氣

滋腎丸 黃蘗二兩 知母一兩俱酒炒 肉桂一錢 蜜丸

都氣丸 卽六味丸加 五味子三兩

黑錫丹 黑鉛 硫黃各二兩 將錫鎔化入硫黃候結成片

黃芩清肺飲 黃芩 山梔 或加鹽豉

人參平肺散 人參 青皮 天冬各四分 茯苓七分 陳

五味子十一粒 地骨皮 炙草各伍分 桑皮一錢 陳

加薑煎 瀉心湯 黃連一味煎

天王補心丹 生地四兩 人參 元參 丹參 茯神 柏子仁 五味子 當歸各一兩 天冬 麥冬 棗仁

蜜丸彈子大味砂為衣 左金丸 黃連六兩薑汁炒 吳茱萸鹽水泡一兩 水丸

龍薈丸 當歸 龍膽草 山梔炒 黃連 黃蘗 黃芩各 麝香五分 炒一兩 大黃 青蘗 蘆薈各伍錢 木香二錢

人參竹葉湯 石膏 麥冬各二錢 半夏一錢 炙草 人 參各五分 竹葉七片 梗米一撮 陳皮五

保元湯 人參 黃耆 白朮各一錢 炙草六分 陳皮五

三黃湯 黃連 黃芩 大黃

淡竹茹湯 麥冬 小麥各二錢 半夏錢半 茯苓 人 參 各一錢 甘草五分 竹茹錢二分 薑 棗

發鬱湯 升麻 葛根 羌活 柴胡 細辛 香附 葱白

類證治裁

火

三

類證治裁

火

天

紫雪 見前暑

碧雪 寒水石 芒硝 朴硝 煅硝 馬牙硝 石膏

煎用柳木梃攪不住手入青黛和勻傾入砂盆內候冷結成

霜研末每用少許含化津咽如喉閉用鵝管吹入喉中神效

千金朴硝煎 朴硝一兩 芒硝八兩 石膏二兩 寒水石

宿取清納銅器中另搗二石碎如豆粒以絹袋盛化以紙封一

以微火煎至沫起以箸投之著箸如雪凝白卽傾瀉盆中待

凝取出日乾如積熱成悶不已者以方寸匕白蜜一合和冷

水五合攪和令消頓服日二次熱定卽止

火

胡 時毒誤藥成淋欬嗽聲啞脈沈細模糊思面色蒼赤體質屬
火時毒謬用補托潮道不清淋久腎虛火炎金燥致嗆嗽失音
遂成重症今夏初已火主令嗜寐健忘恍惚心神潰散焉能攝
腎速用滋陰瀉火冀秋深氣肅得金水相涵火毒平音漸復元
參生地麥冬貝母丹皮龜甲茯神遠志土茯苓淡竹葉井華木
煎甘服淋愈音响加熱地阿膠甜杏仁棗仁蜜丸服症平

類證治表

卷之一

火

七九

疫症論治

大頭瘟 捻頭瘟 瓜瓢瘟 楊梅瘟 疔瘡瘟 後腸瘟 軟脚瘟附

疫為時行毒氣有大疫有常疫大疫沿門闔境多發於兵荒之後
不數見常疫則一隅數家一家數人症多相似春夏秋三時皆有
之而夏秋為甚其病邪之來皆從溼土鬱蒸而發觸之成病其後
更相傳染必由口鼻吸受流入募原募原乃陽明胃絡在夾脊前
為表裏從鼻吸入故頭額暈脹背微畏寒從口吸入故嘔惡滿悶
臍痛下利足膝逆冷邪出募原故壯熱有汗不解必俟表氣入內
精氣達外大發戰汗然後脈靜身涼亦有自汗而解者但以出表
為順陷裏為逆從表解者戰汗自汗發斑從裏陷者胸腹痞痛便
秘熱結旁流協熱下利嘔惡譫語舌黃黑刺疫症脈不沈不浮而

類證治表

卷之一

疫

七九

數然必右盛於左以溼土之邪多犯陽明胃經也募原亦附胃陽明居
太陽之裏少陽之外為三陽經之中道傷寒之邪自表傳裏溫熱
之邪自裏達表疫癘之邪自陽明中道隨表裏虛實而發不循經
傳也邪伏中道必表裏分解然不能一發便盡故有得汗熱除二
三日復熱如前者有得下裏和二三日復見表症者有表和復見
裏症者有表裏偏勝者有表裏分傳者吳氏溫疫論謂疫總由伏
邪既瀆傳變不一故屢奪屢發也疫症治法外解如香豉葱白連
內清如山梔芩連人中黃滑石之屬下奪如芒硝大黃且疫為穢濁之邪若熏蒸
熱痰蒙蔽心胞則神識漸昏必用芳香宣逐清血絡以防結閉如
犀角青蒲銀花煩渴多汗用石膏斑發咽痛用犀角牛
犀角佩蘭之屬

用山梔屎發熱自利。川芎、葛根、胸膈痞滿。川芎、枳實、嘔吐呃逆。用竹茹、

邪混三焦熱結血分宜大製鹹苦。元參、金銀花、人中黃、尤為

時疫之專藥。香豉、黑豆、所食得淫熱之氣釀成敗壞之質能引內

解腸腑惡毒從下而以其總解溫熱時行內外熱毒也。蓋疫為燥

熱毒癘從無辛溫發散之例。一切風燥辛熱皆不可犯。至於大疫

又宜斟酌司天歲氣方向不拘一轍也。其發於外者有大頭捻頸

瓜瓢、楊梅、疔瘡、絞腸、轉腳等症亦條列治法。備查用焉。此症宜與溫熱同參

傷寒時疫辨
吳又可曰傷寒必有感冒之因。然後頭疼身痛發熱惡寒。時疫原

無感冒之因。忽覺稟藥以後但惡熱不惡寒。傷寒不傳染。時疫多

傳染。傷寒邪從毛竅入。時疫邪從口鼻入。傷寒感而即發。時疫感

久乃發。傷寒投劑一汗而解。時疫發散有汗不解。傷寒汗解在前

時疫汗解在後。傷寒投劑可使立汗。時疫俟其內潰乃得自汗。戰

汗。疫邪始匿募原。根深蒂固發時與營衛交并。客邪經由之處。營

衛無不受傷。故曰潰然不潰則不能傳。不傳則邪不出。邪不出

則疾傷寒發斑則病篤。時疫發斑則病衰。傷寒感邪在經以經傳

經。時疫感邪在內內溢於經。經不自傳。傷寒感發甚暴。時疫卻淹

纏加重。傷寒必先發表。時疫必先疏利。種種不同。所同者傷寒時

疫皆能傳胃。故同用承氣湯導邪以出也。然疫症下後多有未能

表下後裏氣通。表氣亦順。向鬱肌肉。乃或斑或汗。脫然而愈。傷寒

下後無是矣。葱豉湯加汗之不汗少頃更服以汗出熱除為度。三

症初起三日。重便熱服汗之。白虎見裏症用承氣湯。表裏不分

服不解而脈浮。向屬表症。用湯。承氣湯。表裏不分

用涼藥散雙汗下後復見表症再與湯。復見裏症更與承氣

表裏熱結。用湯。三黃石膏湯。汗之有汗下三四次而熱退者有熱退

後忽復壯熱。用再汗再下而愈者。若脈症皆虛。用湯。清熱解毒湯

調之。非如傷寒有下早變症之慮。亦非溫熱不可頻下之比。總

當以熱除邪盡為度。惟下元虛者。非六味生料補其真陰。不能

化其餘熱。葉張氏初發邪伏募原營衛交阻稟寒發熱甚則厥

逆迨陽鬱而通厥回而中外皆熱不可發汗。宜遵其邪用。連原

輕者舌胎白而薄。脈不數。可從汗解。重者舌胎如粉。舌根先黃

延及中央。邪漸入胃。須下之。達原飲。若脈長洪而數。大汗而渴

此邪適離募原欲表未表也。白虎。舌黃兼裏症邪已入胃。承氣

湯。凡舌胎白邪在募原不可下。胎黃邪在胃宜下。黑而芒刺。急

下。目赤咽乾。氣噴如火。揚手擲足。脈沈數下之。俱承。凡失下循

衣摸床撮空。肉惕目不了了。邪熱愈甚。元氣將脫者。宜湯。陶氏黃

既下急用。生脈散。痰滯胸膈。瓜貝養。斑不透仍熱湯。屢汗而

液枯。人參白。表症多裏症少。達原飲。裏症多表症少。大柴。燥

結便秘。熱結旁流。日久失下。協熱下利。潮熱便。承氣。疫兼痢

白利黑水。作泄瀉。俱湯。

疫兼痢

類證治裁

卷之一

疫

全

類證治裁

卷之一

疫

全

類證治裁

卷之一

疫

全

者危。檳榔順氣湯。熱結下焦。小便不利。導赤散。熱痰發黃。茵陳蒿湯。血蓄膀胱。夜熱譫語。桃仁承氣湯。婦人病疫。經水適來。邪入血海。熱隨血下。自愈。小柴胡湯。加赤芍。如結胸狀者。血因邪結也。宜刺期經水適斷。血室乍空。邪乘虛入。難治。柴胡養榮湯。新產亡血。柴胡養榮湯。孕婦病疫。隨症施治。以安胎保胎為主。亦有宜用承氣者。用之反得母子俱全。慎勿生疑。掣肘也。葉氏溫疫論。

大頭。溼熱傷。腫大如斗。赤癩無頭。或結核有根。令人多汗。氣蒸。天行癘氣。染之多死。乃邪熱客於心肺。上攻頭面。而為腫也。初則憎寒。壯熱。體重。頭面痛。目不能開。上喘。咽喉不利。甚則堵塞。不能飲食。舌乾。口燥。恍惚。不安。不速治。十死八九。人中黃丸。普濟消毒飲子。便硬。加酒。若潰。大黃一二錢。緩服。或沈氏頭瘟湯。

類證治裁 卷之十一 疫

膿必染人。若發於面部。焮赤腫痛。屬陽明。普濟消毒飲子。發於耳前後。額角旁。紅腫。屬少陽。普濟消毒飲子。發於腦頂後。并耳後。赤熱腫痛。屬太陽。荆防敗毒散。去人參。加茶連。

喉痺失音。項大腹脹。如蝦蟆狀。亦名蝦蟆瘟。荆防敗毒散。

胸高脇起。嘔血如汁。生犀飲。便結。加大黃。湯加花粉。虛加鹽。膿血倍黃土。加黃藥便。滑以人中黃代金汁。

楊梅。遍身紫塊。忽然發出。癰瘡。清熱解毒湯。下人中黃丸。并宜刺塊出血。

疔瘡。發塊如瘤。遍身流走。且發夕死。急用三稜針刺入委中。絞腸。腸鳴乾嘔。水洩不通。類絞腸痧。急宜探吐。服雙解散。

軟腳。便清洩。白足腫難移。此即溼溫症。宜蒼朮白虎湯。

初起表症 裏症 裏毒 解症 裏症 起症 表症 裏症 裏毒 解症 裏症 起症 表症

附方

葱豉湯 葱白 豆豉

白虎湯 見前中風 白虎湯辛涼發散清肅肌表氣分藥也

承氣湯 見前溫

解毒湯 見前溫

涼膈散 見前中風

雙解散 荆防 芩 連 歸 芍 桔 草 麻黃 薄荷 川芎 連翹 石膏 滑石 白朮 此加石

三黃石膏湯 芩 連 豆豉 麻黃

梔豉湯 梔子 豆豉

清熱解毒湯 白虎湯去粳米 加入參 羌活 升麻 葛根 白芍 黃芩 黃連 生地黃 龍

類證治裁 卷之十一 疫

人中黃丸 大黃三兩 人參 芩 連 各一兩 桔梗 滑石 各二兩

一兩 五錢

達原飲 黃芩 錢半 炙草 白芍 厚樸 草果 各一錢

除邪破結散 檳榔 各二錢 薑 七片 棗 一枚 達原飲

黃龍湯 大承氣湯 加參 草 歸 桔 薑 棗

生脈散 見前暑

栝貝養榮湯 知母 花粉 貝母 栝蔞 橘紅 白芍

舉斑湯 白芍 當歸 蘇子 薑 升麻 五分 白芷 柴胡 各七分 甲片 二錢 薑

大柴胡湯 見前溫

檳榔順氣湯 檳榔 芍藥 枳實 厚樸 大黃 薑

瀉瀉黃發黃蓄和了解清血大頭大頭風熱瓜瓠疔瘡

導赤散 見前溫

茵陳蒿湯 見前溼

桃仁承氣湯 大黃 芒硝 桃仁 桂枝 甘草

小柴胡湯 見前溫

柴胡養營湯 柴胡 黃芩 陳皮 甘草 當歸 白芍

普濟消毒飲 升麻 薄荷 板藍根 馬勃 元參 連翹

頭瘟湯 川芎 歸尾 各二錢 桔各錢半 柴胡七分

荆防敗毒散 敗毒散見前傷風 此再加荆芥 防風

生犀飲 黃土二錢 犀角二錢 黃連 蒼朮各一錢

人中黃散 辰砂 雄黃各錢半 人中黃一兩 為末薄荷

類證治裁 卷之十一

全

疫

本 疫邪傳胃舌黃脈洪數汗渴白虎湯一服熱退明午復煩恐

散漫之邪雖去已成裏結也用苦辛寒方人中黃元明粉黃芩

知母枳殼檳榔三服脈症俱平用蜜煎導糞下而解

冷 高年染疫脈右大於左由邪從口鼻吸受客於夾脊溢自募

原見症頭痛胸中怫鬱務微其邪使速離募原做達原飲用黃

芩知母花粉厚樸枳殼赤芍豆豉汗出熱退間日前症仍作惡

熱更加謔妄診時揚手擲足揭去衣被臥不安席此欲戰汗也

頃之臂脛冷身振戰逾一炊時肢溫汗透脈靜身涼

白 甲戌春大疫初病渴煩五日後液復神甦毘陵醫按傷寒論

類證治裁 卷之十一

疫

全

治拘定日數謂邪入陽明之腑子言疫邪始伏募原繼乃表裏

分傳不比風寒自表傳裏治法必分微表裏之熱方不逆入心

包變現痙厥今邪有轉機再與透解營熱則不虞內陷矣乃用

鮮生地石斛丹皮知母麥冬竹茹甘肅參鬚一劑神識清洪脈

退加青蒿地骨皮汗津津而熱退

冷 時邪傷肺逆傳膈中由衛入營釀毒發疹密如雲片竟至神

昏遺溺是邪方張而陰氣已虧也用沙參麥冬以保肺陰牛蒡

連翹以泄疹毒生地五味以固腎氣丹皮鮮藕引入血分菖蒲

鬱金開心竅降熱痰二服疹消加減症平

張氏疫症投補壯熱煩冤齒焦唇舌芒刺昏譫循衣撮空領顛

手戰脈小數此熱邪深陷液涸風生已顯瘰象速用生地六錢

斛天冬各四錢赤芍元參各三錢連翹梔子知母各一錢鮮藕二兩石菖

蒲汁冲服唇舌稍潤躁擾漸平三服神識清爽調理得痊

趙氏疫癘用五積散煩渴昏譫不寐舌縮唇黑又誤進麻黃湯肢

搗鼻衄脈數無度竊謂五積散治傷寒惡寒方中薑桂蒼樸皆

熱燥疫症本不惡寒服此營液愈涸邪燄益熾是抱薪救焚再

服麻桂強汗劫津更傷表氣與內陷熱邪風馬不及勢必瘰厥

衄紅矣勉用鮮生地石斛各五錢天冬麥冬各二錢山梔知母赤芍

連翹各錢半犀角磨汁七分蔗汁一杯冲服即安睡醒而神甦

王氏初春感疫寒熱不時頭脹面腫此鼻吸癘邪襲入竅絡目閉

類證行表 卷之一 疫

項痛失治則結核潰膿急須解散做普濟消毒飲升麻柴胡桔

梗薄荷陳皮連翹甘草加山梔荆芥冬桑葉三服而消

韋姬病疫兼旬煩渴脈數舌黑神迷症成內閉用犀角尖元參牛

黃鮮生地連翹麥冬石菖蒲銀花露二服熱減神清

曹氏病起頭暈欲嘔是穢邪從口鼻吸入壯熱肢冷昏譫多寐邪

已熏灼心包神明蒙蔽急宜開解勿令竅閉羚羊角八分人中黃

一豆豉二錢梔心連翹心各錢半薄荷一錢竹葉心五錢菖蒲五匙一服

神甦汗出而解

何氏暑疫汗煩疹出目瞑舌焦脈洪長症已傳胃做石頑以穢攻

穢人中黃豆豉石膏犀角汁銀花露知母山梔症退

貢氏妹時疫秋發傳染必深初起寒熱耳後結核頭眩脛冷疹出

便瀉宜從少陽透熱泄溼表裏分解醫慮其體素陰虛早投阿

膠熟地雞子黃滋膩致壅氣分之邪脈來沈數熱勢深陷必難

汗解姑用清裏微熱法黃芩羚羊角人中黃梔皮連翹滑石通

草燈心日再服頭汗劑頸熱猶蒸溼思欲清掃瀾漫雖核消疹

退瀉止脛溫而舌心已乾邪劫胃液隨用鮮地黃石斛麥冬沙

參花粉白蘆根舌已強光燥無津脈更促數用透營滋液犀角

尖磨鮮地黃藕汁天冬西瓜翠衣蘆根淡竹葉梔心知母舌猶

乾黑而縮目瞑多睡三焦受邪幸前藥沁透心包腹中不為熱

痰蒸破然機竅不靈仍用昨犀角方加水甜梨肉二服即以梨

類證行表 卷之一 疫

片安舌上咀其涼潤越宿活津黑虬汗出熱解

張氏據病經旬餘仍頭暈脫悶熱煩汗潮今夏延境疹疫皆溼土

鬱蒸致病節交處暑炎熾未除必是時氣晚發膽火上冒溼熱

交搏灼及心營神呆液涸撮空齒齦熱極生風遂成瘰厥速宜

透邪救液遙擬一方生地犀角羚羊角元參赤芍鮮梨麥冬黃

仁連翹蘆根三服症平

蕭 體微熱而虛煩不渴不寐是疫症已退脈虛大按之如無此

禁穀而胃虛也經云胃不和則臥不安得胃陰一復煩熱自除

用路參玉竹白芍歸身麥冬茯神棗仁石斛半夏麴甘草香稻

葉數服全瘳

哇女口鼻吸入癘邪頭暈腕痞煩熱面紅適值經行連小腹亦脹
悶脈右小數左模糊乃溼熱與氣血混併治宜上下分解梔皮
嫩桑葉枳殼栝蒌霜鬱金杏仁薄荷丹參丹皮赤芍桃仁日二
服頭暈腹脹已減但熱煩中腕微痛猶是熱蒸溼痰阻氣且煩
出於肺防其變現斑疹用宣通法枳殼栝蒌霜白蔻壳大貝母
杏仁丹皮赤芍牛蒡子連翹燈心二服汗出未徹紅疹稀疏邪
已外透渴不多飲而溺赤便溲胸仍不寬脈仍小數溼熱尙熾
法用辛涼透熱於表甘淡滲溼於裏薄荷豆豉通草牛蒡子杏
仁貝母栝蒌枳殼赤芍滑石車前子燈心數服諸症漸平但口
燥饑不思食乃病後胃津未復法宜涼潤調養胃陰麥冬石斛

玉竹白芍沙參薏仁茯神蔗汁數服而癒

哇女熱渴腕悶舌胎裏黃尖赤頭痛未解手心如烙溼邪搏熱僭
踞上中焦速速透解毋俾出入募原釀成陷裏重症枯茶酒炒豆
豉枳殼萹霜梔皮薄荷杏仁荷葉邊二服汗出熱減去豆豉荷
葉邊加連翹牛蒡子丹皮預防入營發疹忽致而此蘊熱迫
血直犯清道為疫毒將解之兆用黑山梔鮮生地杏仁大貝母
花粉沙參蘆根蔗汁數服愈

族某疫後感暑舌光薄而乾渴飲肢厥脈右緩左微便溲語謔仍
理三焦在裏溼熱元參麥冬花粉石斛赤芍車前薏米知母二
服肢和舌潤去元參車前知母加沙參玉竹大麥仁數服而安

姪 熱渴嘔眩而煩舌胎黃膩耳垢唇燥疫邪化熱由募原分布
上中焦閱所服方未能透邪勢必表裏分傳宜急急宣解為要
淡豆豉人中黃黃芩枳殼梔皮連翹半夏牛蒡子嫩桑葉二服
煩眩嘔渴俱止舌胎黃膩亦消脈來虛大數象較退邪留氣分
不難透解原方去人中黃枳殼連翹半夏桑葉加薄荷青蒿麥
冬赤芍蔗汁一服微汗未徹兩寸脈仍大舌心灰尖絳火邪劫
營用透熱救陰鮮生地花粉石斛麥冬知母元參丹皮赤芍蔗
汁一服汗至胸項而還邪猶未徹舌心黑燥邊絳乾心胃火熾
清營熱以透表犀角尖汁鮮生地丹皮花粉元參滑石麥冬蘇
梗燈心蔗汁甘草一服汗週熱解

貢 據時疫脈數熱渴暈悶誤用蒼芷劫液柴葛升陽遂至燥煩譫
妄舌黑齒焦循衣撮空此邪熱入營將變昏瘧為棘手重症遙
擬透營宣竅救液法用犀角磨汁五分鮮生地錢五乾生地錢三山梔連
翹赤芍各二錢鮮石菖蒲四錢鮮藕西瓜翠衣各二兩二服神清舌潤
去犀角鮮生地菖蒲西瓜翠衣加茯苓二錢燈心八分六一散六分
服徹熱滲溼而平

潘 疫熱挾磨火上升頭痛如裂旬日外汗出熱減渴煩震眩不
解脈虛面垢此疫兼暑也用羚羊角天麻嫩桑葉薄荷香檳山
梔麥冬花粉石斛燈心日二服諸症悉平惟液涸目燥不思納
食宜調脾胃之陰麥冬沙參玉竹白芍生地扁豆一服服愈

類證治裁卷之一

丹陽林珮琴義捐補書

男 芝

虛損勞瘵論治

經言精氣奪則虛。凡營虛衛虛。上損下損。不外精與氣而已。精氣內奪。則積虛成損。積損成勞。甚而為瘵。乃精與氣虛憊之極也。素問論五勞。謂久視傷血。久臥傷氣。久坐傷肉。久立傷骨。久行傷筋。金匱論五勞。謂肺勞損氣。心勞損神。脾勞損食。肝勞損血。腎勞損精。越人謂白上損下者。一損肺。勞二損心。盜汗三損胃。食減四損肝。鬱五損腎。淋過胃則不治。自下損上者。一損腎。遺濁二損肝。痛三損

類證治裁

卷之二

虛損

脾。脹四損心。驚悸不寐。五損肺。喘過脾。則不治。誠以脾胃為精與氣生化之源也。故治虛勞。以能食為主。考難經治法。損其肺者。益其氣。保元。損其心者。調其營衛。八珍。損其脾者。調其飲食。適其寒溫。四湯。損其肝者。緩其中。牛膝。損其腎者。益其精。金剛丸。此固治損之要矣。尤必先辨其陽虛陰虛。經曰。陽虛生外寒。陰虛生內熱。凡怯寒少氣。自汗喘乏。食減無味。嘔脹泄泄。皆陽虛症也。此脾肺虧損。由憂思鬱結。營衛失和。惟四君保元。建中養營。歸脾諸湯。宜之。若怔忡盜汗。欬血吐衄。淋遺崩漏。經閉骨蒸。皆陰虛症也。此心肝腎虧損。由君相火炎。精髓枯竭。惟補心三才。六味大造。固本諸湯。宜之。又若腎中真陽虛者。右尺宜甘溫益火之品。補陽以配陰。八味

或景岳右歸丸。所謂益火之源。以消陰翳也。腎中真陰虛者。左尺宜純甘補水之品。滋陰以配陽。六味丸。或景岳左歸丸。所謂壯

水之主。以鎮陽光也。陽虛不復。久則吸短偏臥。脈弱陽痿。宜參朮

子山藥。胡桃。龍眼。蓮。棗。沙。苑。子。骨。脂。人。乳。鹿。茸。鹿。膠。羊。肉。羊。腎。海。參。陰。虛。不。復。久。則。咽。瘡。音。啞。色。悴

肌。羸。宜。麥。味。杏。貝。熟。地。首。烏。從。容。燕。窩。烏。雞。而。勞。瘵。成。矣。由。是。火

炎。於。上。為。嗽。血。宜。五。為。潮。熱。骨。散。火。動。於。下。為。遺。濁。宜。龍。為。泄。瀉

宜。三。白。而。治。瘵。難。矣。夫。水。為。萬。物。之。元。孫。真。人。所。以。云。補。脾。不。若

補。腎。土。為。萬。物。之。母。許。學。士。所。以。云。補。腎。不。若。補。脾。然。喜。燥。者。脾

喜。涼。者。腎。欲。補。腎。易。傷。脾。欲。補。脾。易。傷。腎。不。知。土。為。金。母。金。為。水

母。勞。瘵。至。陽。虛。泄。瀉。宜。溫。以。補。脾。然。補。脾。須。不。礙。肺。勞。瘵。至。陰。虛

類證治裁

卷之二

虛損

類證治裁

卷之二

虛損

嗽。熱。宜。潤。以。滋。腎。然。滋。腎。須。不。妨。脾。滋。腎。佐。以。五。味。杞。子。不。得。偏

用。辛。溫。以。助。火。之。桂。附。亦。不。得。偏。用。苦。寒。以。敗。胃。之。屬。且。虛。勞。以。受

補。為。可。治。不。受。補。為。不。治。如。用。人。參。之。甘。溫。則。大。熱。可。除。乃。陽。生

陰。長。之。理。所。謂。血。脫。者。益。氣。而。葛。可。久。治。勞。十。方。用。參。者。七。也。故

曰。土。旺。而。金。生。勿。拘。拘。於。保。肺。水。壯。而。火。熄。毋。汲。汲。於。清。心

夫。五。勞。者。勞。傷。五。臟。乃。虛。損。之。源。而。六。極。七。傷。又。虛。損。之。流。極。勞

瘵。之。深。根。也。如。皮。毛。枯。槁。為。肺。勞。人。參。黃。血。脈。不。榮。為。心。勞。大。五

食。少。肌。消。為。脾。勞。橘。皮。血。虛。筋。緩。為。肝。勞。黑。腹。腫。足。弱。為。腎。勞。腎

九。六。極。者。數。轉。筋。指。甲。痛。為。筋。極。滋。補。養。營。丸。牙。疼。踵。痛。不。耐。久

立。為。骨。極。茸。珠。面。色。無。華。頭。髮。墮。落。為。血。極。補。營。膚。如。蟲。行。體。肉

乾黑為肉極。參。肌無膏澤。目無精光。羸瘦肌癢。搔則為瘡。為精極。巴戟。胸脇逆滿。吸短難言。為氣極。益氣。七傷者。一陰寒。二陰痿。三裏急。四精漏。五精少。六精清。七溺數。併宜鎖陽。凡虛損症。多起於脾胃。勞瘵症。多起於腎經。虛損潮熱。多起於內傷。勞瘵陰虛。火動多起於傷風似瘧。虛損蒸蒸發熱。按至皮膚間。甚熱不能食。不覺瘦。脉豁大。重按無力。勞瘵骨蒸。按之皮膚不熱。按至筋骨乃熱。能食而瘦。脉弦數。虛損轉潮熱泄瀉。脉短數者。不治。勞瘵轉陰虛。火動喉痛。脉細數者。死。虛症頰赤。或唇紅。陰虛逼陽於上也。音瘖。腎氣竭也。欬而喘急。肺虛氣不歸腎也。喉乾咽痛。真水涸。虛火炎也。不眠恍惚。血不養心。神不能藏也。時多煩躁。陽

類證治裁

卷之二

虛損

五

中無陰。柔不濟剛也。飲食不甘。肌肉漸消。脾元敗也。盜汗不止。有火則陰不能攝。無火則陽不能固也。骨痛如折。腎主骨。其陰竭也。筋急痠痛。水虧木燥。肝失養也。足心如烙。虛火燥陰湧泉涸也。

虛損勞瘵候

脉大為勞。脉虛亦為勞。大而無力為陽虛。數而無力為陰虛。沈遲小為脫氣。大而扎為脫血。細微而小為氣血俱虛。寸弱而軟為上虛。尺弱而瀉為下虛。兩關沈細為胃虛。弦為中虛。凡細數弱瀉弦。皆勞傷脉。但漸緩則有生意。若弦甚者。病必進。數甚者。病必危。

附方

益氣 保元湯 見一卷火

緩肝	益精	益精	補陽	補陰	補陰	陰效	熱潮	遺瀉	瀉肺	勞心	勞脾	勞肝	勞腎	筋勞				
牛膝丸	金剛丸	煨腎丸	右歸飲	右歸丸	左歸飲	左歸丸	五汁膏	龍齒丸	三白廣生湯	人參黃耆湯	黃耆	大五補丸	橘皮煎	鹿茸	沙鍋內	黑丸	腎氣丸	滋補養營丸
牛膝 兔絲餅 杜仲 防風 菴蓉 桂心 茯苓	草薢 杜仲 菴蓉 兔絲餅 猪腰子酒煮為丸	牛膝 胡盧巴 兔絲餅 猪腰子酒煮 菴蓉 桂心 故紙	人參 白朮 山藥 杞子 杜仲 熟地 炙甘草	前飲去朮草杞子 加鹿膠 兔絲餅 蜜丸	熟地 山藥 杞子 炙甘草 茯苓 山黃	前飲去茯苓炙甘草 加牛膝 兔絲餅 鹿膠	天冬 麥冬 犀角 羚羊角 人乳汁 梨汁 藕汁	人參 茯苓 遠志 龍齒 菴蒲 知母 黃蘗	山藥 丹皮 天冬 桑皮 秦九 生地 柴胡	地骨皮 各七分 甘草 各五分 桔梗 各三分	赤芍 茯苓 天冬 人參 熟地 益智子 枸杞子	麥冬 遠志 地骨皮 茯苓 當歸 草薢 菴蓉	橘皮 五兩 厚樸 肉桂 巴戟 石斛 附子 牛膝	杜仲 兔絲子 乾薑 各一兩 烏梅肉為丸 酒下	鹿茸 再入諸藥末為丸	當歸 鹿茸 各一兩 烏梅肉為丸 酒下	八味丸 見一卷中風此再加 牛膝 車前	遠志 白芍 黃耆 白朮 各兩半 熟地 五味 芎 歸 山藥 各二兩 陳皮

類證治裁

卷之二

虛損

四

筋	八錢 茯苓七錢 生地五錢
骨	山黃四錢 蜜丸 酒煮木瓜粥 大木瓜 水酒煮爛研膏裹轉筋處冷即易之
極	茸珠丸 鹿茸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 當歸各兩半 附子 陽
血	起石各二錢 酒糊丸 補營湯 參 苓 陳 草 歸 芍 二地 梔子 麥冬
肉	參苓丸 參 苓 菖蒲 遠志 牛膝 地骨皮 蜜丸
情	巴戟丸 五味 巴戟 茯苓 兔絲 覆盆 益智 牡蠣
氣	益氣丸 人參 麥冬 陳皮 桔梗 炙草 五味 蜜丸
七傷	鎖陽丹 桑螵蛸三兩 龍骨 茯苓各一兩 糊丸
七傷	九龍丹 金櫻子 杞子 蓮鬚 熟地 芡實 茯苓

有證治表 卷之十一 虛損

虛損

楊 弱冠成損嗽血喘促身熱汗泄食減便溏脈弱數此上損及中補土生金自不易定法四君湯加熟地砂仁 山藥 茯苓 五味白芍蓮子小麥煎湯數服血止喘熱亦定然一陽初生必交節不至加重乃得轉危為安

胡氏女寒熱欬嗽經斷食少肌削口乾無寐脈虛數損象已具經云二陽之病發心脾有不得隱曲在女子為不月二陽足陽明胃也胃虛則受穀少而血無由生故症見心脾心主血脾統血情志不遂日為憂思煩擾以耗竭之故月水枯也宜滋化源倣立齋先生法朝用歸脾湯加柏子仁夕用都氣丸加杞子白芍

有證治表 卷之十一 虛損

東仁貝母兩月諸症悉退後經自通而病霍然
狄氏月閉勞熱醫用通經之品喘嗽氣促怔忡自汗又用寒涼退熱食減肌削乍寒乍熱診其脈弱數而促此下損及中也急用潞參茯苓黃耆炙草白芍當歸五味棗仁銀柴胡四劑諸症漸減加山藥熟地炭蓮棗補心脾兼調肺腎熱嗽悉除能進食矣逾月後忽腰腹痛下胎形三寸許兒頭已半損爛子深自咎臨診未審其母舌青黑與否然計其經閉後已六閱月乃知胞宮血涸胎形不長乾熱累月必反枯癢深隱通經破血藥數十劑不能令墮俟氣血通調癥腐之隔膜者乃去而不復留也况血枯經閉漫與三稜莪朮牛膝桃仁不速之斃乎誌此為榨乾汁

者鑑

李 肩挑傷力欬嗽胸膈其損在肺川黃耆潞參扶神百合貝母
杏仁當歸白芍甘草紅棗二服即應此從安肺湯加減經所謂
損其肺者益其氣也

旺 肝腎陰虛損久不復冬至後痰欬粉紅嗽聲子夜特甚想虛
陽失藏龍火不伏交子時陽氣一動炎灼上陵浸至嬌臟受戕
身熱喘促近又食減無味午後頰紅時覺慄慄冷寒是陰傷及
陽非莫地酸膩可效必用甘藥培元佐以介屬潛陽冀其封固
蟄藏至立春前後地氣上騰症不加重為幸潞參山藥百合甘
草五味白芍牡蠣淡菜阿膠數服漸平

類證治裁

卷之二

虛損

七

堂弟嗜嗽氣急脈弦數適逢秋令予謂此火刑金象也當滋化源
以自知醫雜用梨膏止咳于謂非法入冬寒熱間作厥氣衝逆
灰痰帶紅良由陽亢陰虧龍雷並擾冬藏不密今近立春地氣
上升內氣應之喘嗽勢必加重擬方阿膠化山藥炒各洋參熟
地炒茯神藕節各三錢川貝母炒研甜杏仁炒研棗仁炒研五味
分數服頗效又五更服燕窩湯晚服秋石湯降虛火而喘定
堂弟肺主出氣腎主納氣今腎少攝納時交驚擾陽氣大升兩關
尺通滑兼弦氣由衝脈逆衝而上子夜陽動喘嗽汗洩必起坐
不能安卧皆真元不納之咎屢用參耆保固肺脾既屬不濟即
用知藥名為滋腎豈能驟安做葉氏鎮攝法青鉛三錢牡蠣煨研
錢半

扶神三錢五味八分炮薑四分遠志炒炭故紙鹽水炒三服氣平嗽止
飲食大進弦脈頓減後用峻補膏方得痊

王 勞力傷精右尺偏旺是火水未濟之象日哺寒熱嗽血神疲
大宜小心調攝否則火燃金燥吐紅嗽喘行將日甚矣五味三錢
熟地山藥茯苓杞子丹皮各二錢潞參三錢白芍川貝各一錢遠志八分
蓮子十粒十數服諸症俱平

妹 積年羸怯經當斷不斷熱從腿膝上蒸今歲厥陰風木司天
又值溫候地氣濕蒸連朝寒熱煩渴寤不成寐悸欬善驚總由
陰虧心火燔灼兼乘木火司令氣洩不主內守陽維奇脈不振
網維越人云陽維為病苦寒熱今藩衛欲空足寒骨熱所固然

類證治裁

卷之三

虛損

八

已先培元氣退寒熱待津液上朝冀煩渴漸平用潞參扶神麥
冬白芍丹皮龜板熟地柏子仁紅棗蔗汁三服寒熱大減煩渴
漸止但覺寒起足脛原方去麥冬龜板加首烏杞子牛膝炒壯
其奇脈二服不寒但熱原方又去首烏杞子柏子仁加蓮子龍
眼肉數十服遂安

賈 弱冠未室勞力傷陽寒熱痰紅欬則氣促嘔沫頭眩食減色
悴肌羸半載不復脈來虛數右部尤少神乃肺氣受傷脾元亦
憊理陽兼泄瀉為宜用六君湯加山藥蓮子南棗淡薑煎服四
劑寒熱止瀉逆平去半夏加貝母茯神五味嗽稀而食進數脈
較減又加薏米芡實耆歸芍煎丸兼服而瘳 後因自服地

黃滋膩丸劑食減便溏餌牛肚瀉痢不止又迫於完咽虛嗽聲
啞午餘寒熱旦夕利數行脉益虛數思食減脾損病久腎傷陰
陽告殘迺求挽揀用藥頗難且終罔濟姑與扶肺脾以攝腎壽
參茯苓炙草白芍山藥益智訶子五味蓮棗數服甚平但氣下
陷則痢迫體懷寒手足心熱寐必口乾此陽虛生寒陰虛生熱
而津不上朝也朝用補中湯去柴歸加益智茯神晚用熟地炭
五味棗仁白芍貝母薏米麥冬俱炒煎汁沖服寒熱輕痢如故與
桃花湯加參苓五味烏梅溫攝下焦痢仍不減由腸液滑泄已
久氣虛不受溫攝而喉痛聲嘶欬吐白沫因春分節後氣溫升
泄故也轉方仍用參苓蓮藥補脾五味白芍斂肺沙參桔梗清

咽熱地炭斂射育陰訶子牡蠣清酒下

謝氏崩帶後蒸熱頭暈齒痛食後愛腐痞惡不時便瀉始由衝任
經傷陰虛生火醫用青鉛鎮攝虛火愈炎中氣愈陷反使變際
汗多如水下部泄氣如風不知症緣陰虧肝陽失制上則為眩
暈下則為蒸瀉中則為風翔浪掀食入漾漾欲嘔治宜和陽熄
風佐以運脾否則補虛添脹滋腎礙脾勢必食減肌削延成下
損及中之咎杞子炭甘菊炭牡蠣粉白芍山梔神麩俱炒半夏青鹽
炒 茯神丹皮嫩桑葉浮小麥煎湯三服諸症漸平原方去梔麩加
鱉甲山藥熟地炭蒸熱漸愈

族弟嗜飲傷中濕熱內蘊欬潮熱腹痛嘔瀉脉沈小數左尤瀯

不戒飲則成酒勞生尤茯苓薏米橘紅茴香製半夏枳椇子砂
仁湘蓮炒數服諸症稍定乃用葛花解醒湯去青皮乾薑加製
半夏數十服全愈

沈 少年羸怯嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜嗜
秘脉弦數右尺搏指由相火太强疏泄失司痰濁不降必夢泄
足心如烙先驅濕熱以熄龍雷黃蘗酒炒半夏青鹽製 茯苓薏
米各三錢 吳萸鹽湯泡五分 遠志山梔澤瀉各八分 橘紅一錢 六服痰火降
遺泄止去吳萸山梔加生白朮半錢 五味三分 牡蠣粉二錢 諸症俱減
調理得平

服姪誦讀神疲嗜寒宵熱汗嗽食減脉虛右尺弦大此為童損由

心脾肺兼及腎陰倣立齋先生治法朝用補中益氣湯去升柴
加茯苓棗仁小麥晚用六味湯去山萸加白芍鱉甲五味十數
劑寒熱止而精神復

勞瘵論治

凡男子之勞起於傷精。女子之勞由於經閉。小兒之勞得於母胎。無不始於陰虛。生熱然其源流。宜條列施治焉。有雜病久不愈。因積損成勞者。宜調營。有思慮太過。鬱損心脾。而成勞者。宜歸。有房勞傷腎。遺淋痿弱。而成勞者。宜鹿。有飢飽傷脾。而成勞者。宜補。中藥。有積勞疲瘦。嗜臥寒熱。而成勞者。宜十四味。有負重致傷。而成勞者。宜補。有傷暑咯血。而成勞者。宜清。暑益氣。有縱酒傷脾。而成勞者。宜葛花。有童年稟賦怯弱。骨蒸黃瘦。而成勞者。宜麥。有婦女經閉。由血熱血枯。而成勞者。宜逍遙散。補。有情竇初開。積想在心。真陰煎耗。而成勞者。宜清。離。其為勞熱。也有氣虛熱。必兼少氣自

汗體倦。心煩。加。有血虛熱。必兼燥渴。睡臥不安。宜滋。有往來潮熱。必兼膝軟骨節痛。宜參。有骨蒸熱。必兼肌瘦頰紅。宜散。河車丸。有五心熱。必兼體痛口乾。宜道。有遍體熱。必兼神困。宜肌。十四味。有病久結痰注絡。腹脇常熱。惟頭面手足於寅卯時乍涼。宜六。君子湯。加。其為勞嗽也。或由陰傷陽。浮金燥喉。癆致嗽。宜甘潤養肺。宜清。安。或由腎水虛。涸火燥肺。金致嗽。宜壯水滋液。宜加。麥。味。或由脾土先虛。不能制水。水泛為痰。致嗽。宜立。效。方。加。或由元陽下虧。痰涎喘促。虛寒致嗽。宜六。味。回。陽。飲。理。至。勞。嗽。失。音。會。厭。傷。也。宜。猪。脂。和。肺。痿。吐。膿。形。肉。脫。也。宜。太。平。丸。白。鳳。膏。勞。嗽。兼。喘。腎。不。納。氣。也。宜。都。氣。丸。加。參。耆。牛。其。見。為。血。症。也。嗽。血。出。於。肺。憂。悲。所。致。也。宜。二。宜。膝。蛤。蚶。或。杏。仁。膏。

冬二母白皮百合。枯。痰血出於脾。思慮所致也。宜。甘。草。或。酸。棗。仁。湯。梗。阿。膠。或。潤。肺。膏。宜。丹。參。山。藥。茯。苓。神。當。歸。血。成。塊。出。於。肝。吐血出於心。驚恐所致也。宜。地。黃。麥。冬。或。養。心。湯。血。成。塊。出。於。肝。悲。怒。所。致。也。宜。沈。香。或。柴。胡。疏。肝。散。咯。血。出。於。腎。房。慾。所。致。也。宜。膠。丹。杏。遠。志。童。便。阿。膠。血。出。於。胃。中。氣。失。調。火。迫。絡。傷。也。宜。犀。角。膠。或。坎。離。既。濟。丹。嘔。血。出。於。胃。中。氣。失。調。火。迫。絡。傷。也。宜。犀。角。膠。或。坎。離。既。濟。丹。凡。積。勞。失。血。久。病。吐。血。宜。獨。若。夫。尸。疰。瘵。症。由。瘵。久。生。蟲。食。人。臟。腑。其。症。蒸。熱。哈。嗽。胸。悶。背。痛。或。面。色。晄。白。兩。頰。時。紅。亦。有。面。色。不。衰。肌。肉。不。損。名。桃。花。疰。宜。紫。金。錠。又。有。尸。鬼。作。祟。其。症。沈。沈。默。默。不。知。所。苦。累。月。經。時。羸。頓。至。死。同。氣。連。枝。多。遭。傳。染。名。傳。尸。勞。當。補。虛。以。復。其。元。宜。養。營。湯。殺。蟲。以。絕。其。根。桃。奴。丸。凡。診。視。者。不。宜。空。腹。宜。飽。食。或。佩。安。息。香。及。麝。香。則。蟲。鬼。不。敢。侵。也。

類證治裁

勞瘵

附方

勞瘵

久勞 調營養胃湯 參 朮 陳 苓 歸 芍 麥 味 二地 黃 耆 山 藥 遠 志 山 黃 鴨 血 蜜 煎 歸 脾 湯 人 參 焦 朮 茯 苓 遠 志 各 一 錢 木 香 甘 草 各 五 分 薑 棗 水 煎 房勞 鹿胎丸 鹿胎煮 熟地八兩用人乳粉山藥各一兩并蒸 乳浸晒 兔絲子十兩酒煮 杷子八兩乳浸 製首烏六兩 黃耆五兩酥炙 人參四兩 金石斛六兩酒炒 巴戟五兩酒炒 補中益氣湯 見一卷中風 十四味建中湯 參 耆 桂 附 朮 草 歸 芍 芎 清暑益氣湯 見一卷暑 葛花解酲湯 見一卷濕

麥煎散 赤苓 歸朮 地 草 柴胡 龜甲 小麥
石青 常山 乾藤 大黃 末四味俱用
逍遙散 見一卷中風

補血養陰丸 歸 芍 丹 地 麥 味 牛膝 杞子
青蒿 龍甲 川斷 茯苓 益母膏丸
清離滋坎丸 六味丸料加 二冬 生地 當歸 白芍

蓮子 欬加枇杷葉 貝母 栝蒌 痰加橘紅 熱加骨
皮 嗽加五味 怔忡加遠志 棗仁 遺精加龍骨 牡
蠣 咽瘡加甘草 桔梗 痰喘加蘇子
久欬加阿膠 五味 紫苑 麥冬

八珍湯 見一卷中風

聖愈湯 參 耆 芎 歸 二地

人中白丸 歸 芍 二地 人中白 白朮 龜甲 青蒿
羚羊角 阿膠 百部膏丸 桂枝 半夏

參茸建中湯 參 苓 前胡 細辛 陳 草 桂枝 半夏

鱉甲散 柴胡 鱉甲 知母 秦艽 當歸 烏梅 青蒿
地骨皮 早晚服

河車丸 紫河車 人中白 秋石 五味 人參 阿膠
人乳 地骨 龜甲 銀柴胡 以百部 青蒿
童便 陳酒

二仙膠 鹿膠 龜膠 人參 杞子

生豚散 見一卷暑

六君湯 見一卷中風

清安膏 麥冬 生地各十兩 橋紅三兩 栝梗 甘草
貝母各二兩 龍眼 苡仁各八兩 薄荷五錢

六味丸 見一卷中風

禽化丸 玉露霜 柿霜 貝母 百合 茯苓 海石 秋
石 甘草 薄荷 礪砂少許 蜜丸

立效方 川椒每歲一粒共為末納指肺中荷葉包蒸五更食

六味回陽飲 參 附 薑各二錢 熟地五錢 當歸三錢
理中湯 見一卷中風 汗加黃耆 泄加白朮 烏梅

八味丸 見一卷中風

太平丸 二冬 二母 二地 杏 栝 歸 款冬 阿膠
蒲黃 薄荷 京墨 麝 蜜丸

白鳳膏 白鴨一隻 元稟二升 參苓平胃散一升 陳酒
淨將棗去核每瓶納參苓平胃未入鴨腹麻線紮定砂鍋內
煨將酒三次添入以乾為度其搗為丸煎人參湯下

都氣丸 六味丸加五味子

潤肺膏 羊肺 杏仁 柿霜 蛤粉各一兩 真酥一兩
將四味納肺中煮食 此與白鳳膏可久方也

酸棗仁湯 見一卷中風

養心湯 耆 歸 二茯 川芎 半夏各一兩 柏子仁
棗仁 遠志 五味 人參 桂心各五錢 炙草

煎服五錢 為散

柴胡疏肝湯 香附 柴胡 陳皮 芎 芍 枳 草
二地 二冬 二茯 歸 芍 參 味 黃

坎離既濟丹 杞 茯苓 黃藥 遠志 棗仁 丹 蜜丸
見一卷溫

犀角地黃湯 見一卷溫

紫金錠 芙蓉 五格 大戟 辰砂 雄黃 麝香

蘇合香丸 見一卷中風

養營湯 參 苓 朮 草 地 芍 歸 味 青 志
陳 桂 薑 棗 水煎

十疰丸 雄黃 巴霜各一兩 人參 細辛 附子 麥冬
皂角 栝梗 川椒 甘草各五錢 蜜丸

桃奴丸 桃奴七個另研 玳瑁 犀角各五錢 琥珀 一兩
同熬成膏 另以辰砂 犀角各五錢 桃仁 十四個 椎
黃各三錢 麝香 冰片 牛黃各二錢 桃仁 十四個 椎
共研細和膏為丸 茨子大封固陰乾每一丸參湯下

癆瘵

劉氏陰瘵延久暫愈臨蓐後將息失宜膚粟骨戰寒熱沈綿陰陽
二維不司統束護衛用理陽攝陰法鹿角霜補骨脂當歸各一
游參杞子遠志各二錢 茯神三錢 生白朮八分 炙甘草六分 小麥半合 紅棗五枚
十服諸症漸減但右脉沈小左寸虛原方去鹿角杞子骨脂加
補心脾之藥用山藥棗仁蓮子白芍俱炒 數服飲食進寒熱除繼
由變生反目氣逆欬嗽失音面晦是臟真日漓神采內奪也切
忌清肺理嗽速用五味山藥茯神游參杞子核桃肉訶子皮蓮
棗數十服嗽止音復後加調補獲痊

印氏脉細瀉營衛素虧秋冬背寒脛冷經事愆期從未孕育乃衝
類證治裁 卷之二 癆瘵 壹

任督經虛宿恙延為勞怯重症近日欬嗽唾痰多在夜半及清
晨為劇想脾聚宿痰瘕時為呼吸引動因喘欬不已先服平嗽
煎劑再訂膏方端理奇脉川貝甜杏仁萹皮俱炒 茯苓前胡橘
紅白朮炙草游參桑皮炙 薑棗煎三服嗽定去萹皮前胡加蓮
子山藥五味杞子俱炒 再服數劑俟嗽愈服膏方骨脂杞子沙苑
歸身杜仲兔絲餅核桃肉芡實炒 牛膝酒蒸 首烏製 茯神玉竹同
熬用鹿角膠加倍收膠日服五錢宿恙漸瘳

欬論治

肺為華蓋職司肅清。自氣逆而為欬。痰動而為嗽。其症之寒熱虛
實外因內因宜審辨也。肺寒嗽必痰稀面白畏風多涕當溫肺固
衛。秋冬紫苑之屬。肺熱嗽必痰稠面紅身熱喘滿當降火清痰。
衛。秋冬紫苑之屬。肺熱嗽必痰稠面紅身熱喘滿當降火清痰。
花粉海石栝蒌竹茹。肺虛嗽必氣逆汗出顏白飢泄當補脾斂肺
之屬。加入清肺飲。六君湯加山藥。肺實嗽必頓欬抱首面赤反食當利膈化痰。
五味子之屬。外因者六淫之邪自表侵肺治用辛散則肺清而嗽止內
因者五損之病自下及上治在甘潤則肺清而嗽安治外因嗽感
風者辛平解之。桂枝防風散寒者辛溫散之。紫蘇薑。感暑者辛涼除
之。香薷薄荷。感濕者苦降淡滲之。厚樸通草。感燥者甘涼清潤之。
竹葉之屬。慈仁之屬。

類證治裁

卷之二

欬

玉竹花粉。感火者甘寒苦辛滌之。山梔貝母之屬。濕熱痰火阻氣
百合之屬。感火者甘寒苦辛滌之。山梔貝母之屬。濕熱痰火阻氣
清降辛泄之。茯苓沙參杏仁。治內因嗽肝膽氣升犯肺者泄木降
逆。鈎藤梔子枳殼。土虛不生金者胃用甘涼。參麥山藥。脾用甘溫。
丹皮陳皮之屬。熱地五味人乳燕。滋液填精。腎陽虛
者。若。腎陰虛。火炎金燥者。歸何膠。胡桃之屬。歸脾湯去木
水泛為痰者。益智沈香沙苑。納氣歸腎。勞心動火者。歸脾湯去木
味。養心。心血久嗽不已。化如。參蛤散。
經云五藏六腑皆令人欬。非獨肺也。肺欬則喘息有音。千金五味
斷地黃。赤小豆。加。心欬則心痛喉中如梗。涼膈散去硝黃。肝欬則
麥冬玉竹。枳殼。去。脾欬則右胛下。肺下。痛引肩背。六君湯加
腸痛。加肉桂橘紅蘇子。胃欬則嘔甚。長蟲出。異功散加。膽欬則
腎欬則腰背引痛。加參。胃欬則嘔甚。長蟲出。異功散加。膽欬則

嘔。膽汁。小柴。大腸。欬則遺矢。赤石脂湯。小腸。欬則失氣。芍藥湯。肺。欬則遺溺。茯苓湯。三焦。欬腹滿不欲食飲。黃連枳實湯。夫五臟久欬。乃移六腑。脾。欬不已。則胃受。肝。欬不已。則膽受。心。欬不已。則小腸受。肺。欬不已。則大腸受。腎。欬不已。則膀胱受。六腑久欬。不已。則三焦受。然終不離乎肺脾腎也。蓋肺為貯痰之器。脾為生痰之源。而腎與肺實子母之臟。因痰致欬者。痰為重。主治在脾。因欬動痰者。欬為重。主治在肺。無痰乾欬者。陰虛為重。主治在腎。景岳謂虛勞乾欬。乃肺腎不交。氣不生。精不化。氣當分有火無火治之。如臟平無火。止因肺虛。補氣自能生精。飲之類。如臟氣微寒。非辛不潤。補陽自可生陰。或六君湯。如內熱有火。須葆真陰。壯水自能制火。或貝母煎。切忌消痰開鬱。使氣愈耗。水愈涸也。其脾肺虧損。

類證治裁 卷之十一 欬

致欬喘促。畏寒嘔瀉。及脈見細弱。症見虛寒。欬久不已者。均勿清嗽。但補元氣。嗽自止。六味回陽飲。或理中湯。以四時論之。春季。欬木氣升也。治宜兼降。前胡杏仁海浮石。枯藁仁之屬。夏季。欬火氣炎也。治宜兼涼。沙參花粉麥冬。秋季。欬燥氣乘金也。治宜清潤。玉竹貝母杏仁阿膠。冬季。欬風寒侵肺也。治宜溫散。蘇葉川芎百合枇杷膏之屬。冬。春季。欬風寒侵肺也。治宜溫散。桂枝麻黃湯。以一日計之。清晨。欬為氣動宿痰。二陳湯。加貝母枳殼。上午。欬屬胃火。石膏川午。後。欬屬陰虛。四物湯。黃昏。欬屬火浮於肺。當斂而降之。五味子。五夜。半。欬為陽火升動。宜滋陰潛陽。六味丸。加牡肺本嬌。臟畏熱畏寒。火刑金。燥故。欬。無痰。水。冷。金。寒。故。欬。有聲。當分新久。虛實。治之。感風暴。嗽。鼻流清涕。桂枝湯。感寒暴。嗽。肩背怯。

冷。華。蓋。兼感風寒。暴。嗽。鼻。塞。聲。重。欬。逆。倚。息。不。得。卧。小。青。風。溫。化。燥。喘。欬。加。玉。竹。沙。參。杏。仁。貝。母。火。熱。嗽。喉。啞。痰。稠。加。減。涼。濕。致。嗽。面。目。浮。腫。豆。豉。杏。仁。通。草。滑。石。欬。痰。即。出。脾。濕。勝。也。二。湯。加。朮。連。欬。痰。不。出。肺。燥。甚。也。桔。梗。湯。去。桑。皮。客。邪。傷。肺。久。嗽。不。止。安。嗽。化。久。嗽。中。氣。虛。營。衛。兼。損。歸。者。建。肉。傷。嗽。脈。虛。氣。乏。補。中。湯。去。升。柴。脾。虛。食。減。久。嗽。歸。者。異。功。散。胃。虛。嘔。逆。作。欬。加。砂。仁。茯。苓。橘。紅。肺。胃。虛。寒。欬。沫。吐。食。湯。寒。飲。停。胃。攻。肺。致。欬。肺。湯。上。氣。喘。欬。脇。痛。肝。木。乘。肺。也。七。氣。湯。加。思。慮。勞。神。乾。嗽。心。火。刑。金。也。生。脈。散。加。菖。神。貝。母。腎。虛。肺。燥。喘。欬。都。氣。丸。喘。嗽。痰。多。怯。冷。腎。氣。熱。地。黃。仁。龍。眼。肉。腎。虛。肺。燥。喘。欬。加。麥。冬。喘。嗽。痰。多。怯。冷。腎。氣。丸。煎。肺。虛。喘。嗽。吐。血。肺。門。冬。清。欬。痰。見。血。脈。虛。數。加。阿。膠。秋。石。

類證治裁 卷之十一 欬

傷風。惡風。自汗。脈浮。加。味。桂。枝。湯。傷寒。惡寒。無汗。脈緊。加。味。麻。嗽。痰多。氣逆。六。安。寒。包。熱。鬱。肺。俞。遇。秋。冬。寒。涼。輒。發。欬。寸。脈。堅。聲。音。窒。但。解。其。寒。而。熱。自。散。或。金。沸。草。散。寒。熱。包。先。傷。風。寒。痰。嗽。未。止。更。傷。炎。熱。喘。欬。聲。嘶。宜。兩。解。其。邪。葳。蕤。湯。風。熱。風。鬱。化。熱。宜。辛。涼。散。解。薄。荷。桔。梗。杏。仁。風。溫。風。溫。上。侵。頭。脹。咽。痛。喘。欬。失。音。宜。清。輕。涼。解。桑。葉。象。貝。連。翹。薄。荷。溫。邪。春。冬。溫。邪。犯。肺。喘。欬。氣。窒。喉。痛。治。同。如。熱。鬱。者。加。山。梔。豆。豉。鬱。金。暑。暑。熱。蒸。嗽。及。暑。襲。入。肺。衛。寸。脈。大。喉。癢。口。渴。俱。宜。微。辛。微。涼。竹。葉。皮。杏。仁。石。暑。兼。欬。而。痰。稠。氣。阻。溺。瀉。宜。苦。降。淡。滲。厚。樸。黃。青。薄。荷。香。薷。濕。欬。秋。燥。嗽。渴。氣。促。宜。甘。潤。玉。竹。沙。參。麥。苳。仁。滑。石。通。草。花。粉。燥。秋。燥。嗽。渴。氣。促。宜。甘。潤。玉。竹。沙。參。麥。西。瓜。翠。衣。或。益。元。散。嗽。秋。燥。嗽。渴。氣。促。宜。甘。潤。玉。竹。沙。參。麥。

蔗汁之屬或復。火逆上氣咽喉不利。金匱麥門冬湯去半。脈湯去薑桂。

火熱乘肺。欬唾有血。千金麥門冬。湯去麻黃薑。

射干麻。肺脹喘欬。鼻扇肩擗。越婢加。欬而喘急。咽燥如有物塞。

黃湯。杏仁。肺虛久嗽。作喘。補肺阿。喘促脈沈數。五味。

唾血者。青。肺虛久嗽。作喘。補肺阿。喘促脈沈數。五味。

勞。虛勞乾欬。水六君煎。或金。脾肺傷損。勞嗽憎寒壯熱。團參。心腎虛。

發熱盜汗。勞嗽無痰。劫勞。欬而無痰者。人參同蜜煎。胡桃肉細。

散。應夢。脾肺虛寒。怯冷痰嗽。加味理。腎陰虛。脈細數。下午寒熱。乾。

欬頰紅。晨服異功散。腎陽虛。脈微弱。水泛為痰。七味地。肺勞久。

嗽。飢則胸中大痛。視上唇有白點如粉者。此蟲嚙其肺。加烏梅。

類證治裁 卷之二 欬嗽

橫下其蟲自愈。經年嗽。藥不痊。餘無他症者。與勞嗽異。一味百。

有暴嗽諸藥不效。服生料鹿。茸丸即愈。乃腎虛也。不可以暴嗽而疑遠補。

之非。

氣促滿悶失音。通聲。肺實痰壅。宜杏。桔。薑。橘。貝。肺虛喉燥。宜生。

加玉竹。秋。外感寒包熱者。細辛。半夏。蜜。內傷火刑金者。六味湯。

冬花。蜜。頓欬至聲不出者。痰鬱火邪。桔梗湯。加貝。久嗽失音。杏仁。

散。肺上氣喘脹。脈浮大。越婢加。肺脹欬喘。脈浮。心下有水氣。小。青。龍。

湯。肺脹欬。左右一偏不得卧。動則喘急。息重。此痰挾血。瘀。歸。丹。

皮赤。芍。桃。仁。枳。殼。桔。梗。如外邪去後。宜。半。夏。海。石。香。附。枳。殼。仁。

半。夏。甘。草。竹。瀝。薑。汁。如外邪去後。宜。半。夏。海。石。香。附。枳。殼。仁。

嗽。嘔。并。作。為。肺。胃。俱。病。先。安。胃。氣。二。陳。湯。加。薑。根。薑。汁。枳。杷。欬。

嗽。嘔。并。作。為。肺。胃。俱。病。先。安。胃。氣。二。陳。湯。加。薑。根。薑。汁。枳。杷。欬。

吐痰食俱出。二陳湯加枳。食積痰嗽。二陳湯加枳。山查。

欬嗽脈候

欬嗽脈浮為風。緊為寒。洪數為熱。濡細為濕。寸關瀋難。而尺內弦。

緊為房勞陰虛。右關濡大為飲食傷脾。左關弦數為疲極肝傷。遲。

瀋肺寒。洪滑痰多。弦瀋血少。脈出魚際為逆氣喘急。肺脈微急。欬。

而唾血。脈或沈或浮。聲不嘶者可治。脈來洪數。形瘦面赤。腎氣衰。

而聲啞者難療。亦有肺絡痰壅聲啞者。不在此例。暴嗽不得卧。為。

肺脹可治。久嗽左不能卧。為肝傷。右不能卧。為肺損。皆難治。久嗽。

脈弱者生。實大數者死。欬嗽形羸。脈形堅大者死。沈緊伏匿者死。

浮直者可治。浮軟者易治。欬而脈虛。必苦胃。以有支飲在胸中也。

類證治裁 卷之二 欬嗽

附方

玉屏風散

見一卷中風。杏仁。貝。各一錢。桔。草。味。陳。各五分。

清肺飲

杏仁。貝。各一錢。桔。草。味。陳。各五分。

清肺飲

杏仁。貝。各一錢。桔。草。味。陳。各五分。

六君湯

見一卷中風。杏仁。貝。各一錢。桔。草。味。陳。各五分。

瀉白散

見一卷火。杏仁。貝。各一錢。桔。草。味。陳。各五分。

腎氣丸

八味丸加。牛膝。車前。

歸脾湯

見本卷勞瘵。杏仁。貝。各一錢。桔。草。味。陳。各五分。

人參蛤蚧散

人參五錢。蛤蚧酥炙一對。杏仁。甘草各。

久嗽	劫嗽丸 訶子 百藥煎 荆芥 薑丸
肺嗽	千金五味子湯 五味 桔梗 紫菀 炙草 續斷各一錢 竹茹三錢 赤小豆一撮 生地 桑皮各
心	涼膈散 見一卷中風
肝	枳殼散 枳殼 桔梗 甘草 細辛 葛根 肉桂 橘
腎	都氣丸 見一卷中風
胃	異功散 見一卷中風
胆	小柴胡湯 見一卷中風
大	赤石脂禹餘糧湯 赤石脂 禹餘糧各二兩 研水煎
小	芍藥甘草湯 芍藥 甘草各四錢 水煎
三	茯苓甘草湯 茯苓二錢 炙草一錢 桂枝二錢半 薑五
氣	七氣湯 半夏五錢 厚樸三錢 茯苓四錢 紫蘇二錢
補	五福飲 見一卷中風
壯	理陰煎 熟地三錢 當歸 炮薑各二錢 炙草 肉桂各
壯	一陰煎 熟地三錢 生地 白芍 麥冬 丹參各二錢
壯	貝母丸 二母 二冬 二地 歸芍 甘草
壯	六味回陽飲 見本卷勞瘵
壯	理中湯 參 薑 朮 草 加陳 苓 辛 夏 味 棗
壯	劫勞散 歸芍各錢半 熟地二錢 參 耆 苓 草
壯	八味丸 見一卷中風

消痰	二陳湯 見一卷中風 加蘇 杏 桔 名加味二陳湯
血	四物湯 地 芍 歸 芎 或加阿膠
風	桂枝湯 桂 芍 草 薑 棗
散	華蓋散 麻黃 蘇子 桑皮 杏仁 赤茯 橘紅各一錢
寒	芎蘇飲 參 蘇 夏 葛根 薑 棗 陳 草 枳 桔 芍 柴
疏	小青龙湯 麻 桂 辛 芍 薑 草 夏 味
行	金匱麥門冬湯 見一卷燥
潤	加減涼膈散 翹 梔 芩 草 荷 桔 竹葉
降	桔梗湯 杏 防已 枳 歸 香 草 貝 苡 仁 桑
火	安嗽化痰湯 杏 葛 枳 桔 半夏 橘紅 桑皮 炙
肺	歸耆建中湯 桂 芍 草 棗 飴糖 名小建中湯
止	補中益氣湯 見一卷中風
中	歸耆異功散 即異功散加 歸 耆
扶	大半夏湯 半夏 人參 白蜜
胃	溫肺湯 白芍 桂 汁 炒 半夏 薑 味 辛 枳 肉桂
肺	生脈散 見一卷暑
清	加味桂枝湯 即桂枝湯加 防風 杏仁 前胡 細辛
風	加味麻黃湯 麻 桂 杏 草 名麻黃湯 此加半夏
嗽	六安煎 陳皮 錢半 白芥子 伍分 茯苓各二錢 炙草 杏仁各
痰	麻杏石甘湯 麻 杏 石 草

散 風 包 寒 利 濕 潤 燥 清 熱 定 喘 保 肺 上 氣 肺 脹 喘 咳 久 咳 喘 促 乾 欬 勞 嗽 脾 肺 無 痰 水 泛 殺 蟲 補 陽

金沸草散 旋覆花即金沸草 前胡 細辛各一錢 荆芥 錢半 赤茯苓六分 半夏五分 炙草三分 薑棗

茂莖湯 見一卷溫

益元散 見一卷溫

復脈湯 見一卷中風

千金麥門冬湯 見一卷燥

蘇子膏 蘇子 杏仁 生地 薑汁 白蜜收膏

安肺湯 參 苓 朮 草 歸 芍 芎 芩 麥 味 桑皮 各一錢 阿膠錢半 薑三片

射干麻黃湯 射干三錢 麻黃 五味各一錢 細辛八分 紫苑 款冬各三錢 半夏二錢 薑 棗 此加

越婢加半夏湯 麻石 薑 草 棗 名越婢湯 此加 杏仁膏 杏仁 阿膠 蘇子各二兩 真酥三兩 薑汁一

杏仁膏 杏仁 阿膠 蘇子各二兩 真酥三兩 薑汁一

補肺阿膠散 人參 阿膠各二兩 三錢 茯苓 馬兜鈴 糯米各五錢 杏仁廿粒 炙草四錢 爲末

每服 三錢

五味子湯 參 杏 麥 味 陳 薑 棗

瓊玉膏 見一卷燥

金水六君煎 熟地三錢 當歸 半夏 茯苓各二錢 陳皮錢半 炙草一錢

團參飲子 人參 紫苑 阿膠 百合 細辛 款冬 杏仁 天冬 半夏 五味 桑葉 甘草

觀音應夢散 人參 白蜜 核桃肉 或煎服

七味地黃丸 見一卷中風

百部膏 百部一味熬

鹿茸丸 鹿茸 牛膝 五味各二兩 石斛 巴戟 附子 川棟 山藥 肉桂 杜仲 澤瀉各一兩 沉香

鹿茸丸 鹿茸 牛膝 五味各二兩 石斛 巴戟 附子 川棟 山藥 肉桂 杜仲 澤瀉各一兩 沉香

五錢 酒糊丸 杏仁 五味 木通 苜蒲 人參 桂心 款冬 通聲煎 細辛 竹茹 真酥 薑汁 白蜜 棗肉 香附 桔梗湯 薄荷 梔子 黃芩 前胡 貝母 知母

類證治裁 卷二 欬嗽

欬嗽

楊氏秋間嗜嗽子午刻尤甚欬則傾吐哺後熱渴面赤經期錯亂此肺受燥邪不司肅降為標金受火克不能生水為本急則治標先於潤劑兼佐鹹降用杏仁蕁仁蘇子半夏丹皮麥冬百合三服欬吐已止能納食而虛火亦退後用燕窩清補肺氣再用六味丸料加白芍五味淡菜熬膏蜜收服愈

張氏產後感風欬嗽用辛散輕劑不效改用阿膠五味當歸潞參茯苓甘草甜杏仁炒一吸而安可知橘桔芍蘇虛體慎用

族某乾欬無痰臥覺氣自丹田衝逆而上則連欬不已必起坐稍定是氣海失納矣診脉右尺偏大腎陽易旺厥後肺氣不敢下

類證治裁

卷之十一

欬嗽

其

交於腎延久即喘之萌速固其根蒂為要三才固本丸服效按肺主氣而氣根於丹田腎部故肺腎為子母之臟必水能制火而後火不刑金也二冬清肺熱二地益腎水人參補元氣氣者水之母也

毛 衰年久嗽自秋入冬憎寒食減口不知味脉虛少力為脾肺俱傷中氣不足之候宜扶脾陽以生肺金潞參茯苓神炙草山藥黃耆炮薑五味紅棗湖蓮數服漸愈

洪 冬季乾欬夜半特甚醫用杏萋橘薑桑皮等藥氣促不止診其脉兩尺洪而大此陽失潛藏金畏火炎象也六味湯去黃丹加五味百合白芍漸愈 此症若尚治肺延久不痊必成上損

須壯水以制龍火之亢逆而嗽自平

鍾 中年肝腎陰虛尺脉偏旺夜熱欬嗽醫藥數月或以欬為肺有蓄水或以嗽為外感寒邪浸至頭眩口乾下元乏力近又憎寒減食面色萎悴足心如烙據脉論症必由夢洩傷精漸成勞嗽無疑今慄慄怯寒食不甘味毋使陰傷及陽延成下損及中之咎六味湯熟地炒用加參味貝蓮七服熱減嗽輕又照六味湯去黃耆加石斛麥冬貝母五味潞參蓮子煎服數劑接服丸方用前藥加魚鱉淡菜等蜜丸而愈

毛 久嗽夜甚晨吐宿痰酸沫脉右虛濡左浮長已似木氣貫膈犯肺乃因臂痛服桂枝川烏等藥酒肺為嬌臟不受燥烈若欬

類證治裁

卷之十一

欬嗽

其

益加喘急上氣此為治病添病當主以辛潤佐以酸收經所謂肺苦氣上逆以酸補以辛泄也清肺飲去桔梗加白芍蘇子桑皮蜜炙數服痰稀喘亦定但納穀少用培土生金法去桑皮五味加山藥苡米俱炒潞參茯苓神蓮子炙草南棗粳米煎湯數服而食進

王姓兒秋涼感風夜熱頓欬連聲臥則起坐立則曲腰喘促吐沫汗出痰響由風邪侵入肺俞又為新涼所束痰氣交阻法宜辛散邪苦降逆用桔梗紫蘇杏仁前胡橘紅淡薑熟嗽減一外科以為症感秋燥用生地五味白芍貝母等藥子曰風邪貯肺可酸斂平痰涎阻氣可膩潤乎即單用薑汁一盃溫服可也頻以匙挑與而愈

李 春溫痰火壅肺宵欬上氣臥不著枕心神恍惚脈浮洪舌絳
口乾渴赤治先肅清太陰兼佐除煩杏仁萹仁桔梗貝母豆豉
山梔連翹枇杷葉蔗汁二服嗽稀得寐因遠客勞神心營耗損
參用養營安神生地百合棗仁杏仁茯神貝母沙參甘草二服
心神安胃陰亦復可冀加餐嗣因內人語言根觸氣鬱生涎改
用溫膽湯而痊

巫氏 年十四乾欬脈數頰紅夜熱無汗此虛陽升動肺金受燥若
不滋化源陰日涸損根伏矣據述天癸未至白帶頻下始信真
元不固乃以潞參山藥茯神扶脾元白芍丹皮瀉陰火甜杏仁
百合止嗽五味訶子斂肺炙草紅棗和中調營一服嗽輕加熟

類證治裁

卷之二

欬嗽

結

地石斛而蒸熱退即用前藥去百合訶子石斛加次實蓮子蜜

丸常服效

糜 六旬素患失血今冬溫來虛痰嗽氣阻欬則脇痛汗出熱煩
口乾脈歇止醫用消散痰嗽益劇更醫乃用炒朮半夏樸柴等
味余曰朮夏守而燥樸柴溫而升此症所忌况質本陰虧溫易
化燥宜辛潤以利肺氣則安用杏仁栝萸貝母桑皮蜜橘皮欬
斛前胡赤苓一服安寐嗽去八九脇痛頓減脈亦和乃用燕窩
湯煎潞參茯神杏仁貝母山藥栝萸桑皮再服更適轉側如意
矣

服姪勞倦內傷嗽用栝萸旋覆等劑病加診脈小數右尺稍大乃

陰虛致嗽忌服表散以五味甜杏仁白芍貝母潞參杞子茯苓
蓮棗二服嗽減又三服加熱地山藥等尺脈乃斂

冬陽不潛龍燄上擾灼肺喘帶紅劇在背分少年氣促脈
虛數懷寒夜熱損怯已成想誦讀陽升寐中必有遺泄心腎不
交精關失固且口不甘味食減於前下損及脾無清嗽治痰之
理燕窩清補希冀嗽止痰消恐初之氣已交懷寒必增安望嗽
減益脾肺交心腎調理如法寒熱可止喘嗽可平潞參山藥茯
神生黃耆皮桑皮蜜甜杏仁五味枇杷葉蓮子棗仁阿膠龍骨
數服嗽減寒止痰血若失去枇杷葉龍骨阿膠加炒熟地丹皮
熱漸退嗣用潞參熟地山藥茯神遠志黃耆蜜龍骨白芍棗仁

類證治裁

卷之二

欬嗽

結

五味龍眼肉熬膏二料全愈

肺痿肺癰論治

肺痿者津枯葉悴因熱在上焦。欬久傷肺。始則寒熱自汗。口吐濁沫。或唾紅絲膿血。脈數而虛者是也。肺癰者咽乾吐膿。因風熱客肺。蘊毒成癰。始則惡寒。毛聳。喉間燥欬。胸膈痛。痰膿腥臭。按右脇必痛。著左臥則喘。脈滑數有力者是也。肺痿傷在無形之氣。氣傷者調其元。肺癰毒結有形之血。血結者排其毒。此治法之概也。分而論之。肺痿由津液枯燥。至肺管日窒。欬聲不揚。動即氣喘。治在補氣血生津液。佐以止咳消痰。宜人參玉竹五味阿膠白芍麥冬當歸熟地紫苑川貝杏仁等其肺勞成痿。虛熱嗽血者。人參固本丸肺虛喘急自汗者。安肺往來寒熱自汗煩渴者。紫苑散加銀柴。欬膿血發熱盜汗者。却勞涎

類證治裁

卷之二

肺痿肺癰

完

唾多。心中溫溫液液者。炙甘草痰嗽午熱聲嘶者。紫苑散加丹皮薏草喘欬失音。咯血者。人參蛤蚧散其虛寒羸瘦。噓吸胸滿者。千金生薑湯凡肺痿症。欬唾咽燥。欲飲水者。自愈。張口短氣者。危。肺傷咯血。喉啞者。不治。肺癰由熱蒸肺。竅至欬吐臭痰。胸脇刺痛。呼吸不利。治在利氣疏痰。降火排膿。宜安肺湯初起肺受風寒。喘嗽者。小青龙湯喘不得臥。胸脹者。葶藶大棗湯肺氣不化。水道不利者。葶藶湯疏利之。葶藶從溺欬逆上氣。時時唾濁者。皂莢丸肺氣使濕濁。悉孔去。欬逆上氣時時唾濁者。皂莢丸肺氣使濕濁。悉枯梗湯。欬而短氣。溺少者。參耆補肺湯體倦食少。脾虛者。參朮補脾開提之欬而短氣。溺少者。參耆補肺湯體倦食少。脾虛者。參朮補脾膿已潰者排膿散。或金鯉湯。或痰中帶血。胸痛者。桔梗杏仁煎或吐膿咽痛者。甘桔湯加。難久不斂者。川槿如思慮勞心。致動陰火。

痰臭轉甚者。六味丸加一症潰後。宜補脾肺。滋腎水。不宜專攻其瘡。凡肺癰症。初起痰覺腥臭。煎陳海芥瀉溫服。或濃煎荷葉汁。加白蜜服。效欬則微痛。痛在胸右。為肺之長葉。坐臥如常。飲食知味者。易治。若潰後寒熱脇痛。在胸左。為肺之短葉。或坐臥不安。飲食無味者。難治。若喘鳴不休。坐不得臥。咯吐膿血。色如敗瀉。飲食艱進。聲啞鼻扇者。不治。肺癰已破。入風者。濃煎葱白香豉湯頻服。然多不效。

肺痿肺癰脈候

脈數而虛者。肺痿。數而實者。肺癰。微緊而數者。未成膿。緊甚而數者。已成膿。吐膿如米粥者。難治。嘔膿不止者。脈浮洪而大者。難治。肺痿六脈浮瀉而急。或細數無神者。死。肺癰潰後。脈忌短滑。緩滑。

類證治裁

卷之二

肺痿肺癰

完

面白者。生。苈急。面赤者。死。

附方

固本丸 見一卷中風

安肺湯 見本卷欬嗽

紫苑散 人參 桔梗 茯苓各一錢 阿膠 甘草 各五分 知母 貝母各錢半 五味子十五粒

劫勞散 見本卷欬嗽

炙甘草湯 見一卷中風

蛤蚧散 蛤蚧十對 酥炙 二母 桑皮 茯苓各二兩 人參 甘草各三兩 杏仁五錢 為末 每服三錢

生薑溫中湯 薑 桂 陳 草 麻黃

安肺桔梗湯 杏 薑 枳 桔 歸 者 二母 桑皮 防已 百合 苈仁 地骨 葶藶 味 草

表邪宿水疏利降濁開提補肺健脾化膿排膿膿胸痛吐膿久陰火通用

小青龍湯 見本卷欬嗽

葶藶大棗湯 甜葶藶三錢炒研 大棗十枚去核

葶藶湯 蘆管取節 薏仁 桃仁 瓜瓣 甜瓜子

皂莢丸 皂莢去皮弦子酥炙研末蜜丸梧子大以東湯服三九日三服夜一服

桔梗湯 見本卷欬嗽疏肺

參耆補肺湯 參 耆 五味 紫苑各八分 熟地 桑皮 各錢半 水煎 加白蜜

參朮補脾湯 參 朮 各二錢 黃耆二錢半 苓 歸 陳 各一錢 桔 麥各八分 味 草各四分

排膿散 參 耆 芷 味 爲末每服三錢

金鯉湯 活鯉魚四兩 貝母一錢研 以鯉魚去鱗雜不見 水入貝母於魚腹外以線紮之浸童便煮熱食之

桔梗杏仁煎 膠 杏 貝 枳 桔 麩 麥 草 銀花 阿 膠 百合 夏枯草 紅藤 肺痿肺癰

卷之二

甘桔湯 甘草 桔梗 等分水煎

川槿湯 川槿皮 白斂 等分水煎

六味丸 見一卷中風 炙耆 白芨各一錢 苒仁五錢

肺癰神湯 桔梗 銀花 甘草節錢半 陳皮錢二分

甜葶藶炒八分 薑二片 水煎

肺癰肺痿

本 老年嗜飲熱火酒致熱毒熏肺發瘡生瘰欬吐穢膿胸右痛

不利轉側脉左大初用桔梗湯去耆薑加連翹山梔四服欬稀

痛止仍宜排膿解毒用桔梗銀花各一錢 貝母半錢 生薑五分 當歸

甘草節廣皮各一錢 白芨生耆各一錢 甜葶藶炒七分 數服膿稀瘡

瘰皆平

韋 嗽重痰腥胸背隱痛脉數有力已成肺癰此肺受風寒蘊邪

壅熱宜疏痰導熱則呼吸自利不至脹痛喘急而腥痰漸少桔

梗湯三服兼用陳醃芥瀉汁一杯温服愈

戴氏元氣久削痰嗽肺痿寸脉虛數少神難治之症紫苑湯三服

阿膠水服後去桔梗知母加山藥蓮子黃耆取補土以生金嗽

熱漸減

失音論治

肺為音所自出。而腎為之根。以肺通會脈。而腎脈挾舌本也。夫金空則鳴。失音一症。亦如金實則瘖。金碎則啞。必辨其虛實。而後治法可詳。其寒包內熱。閉塞氣分。致失音者。以麻杏湯之屬。開其痺。其醉臥當風。邪干肺竅。猝失音者。以蘇子湯之屬。降其痰。其木火犯肺。咽乾喉痺。致失音者。以麥冬湯之屬。潤其燥。其痰熱客肺。喘急上氣。致失音者。以桔干湯之屬。疏其壅。其逆風叫號。致傷會厭者。以養金湯之屬。清其音。其暴嗽失音者。杏仁桑久。欬失音者。蛤散。若由陰虛勞嗽。聲啞者。相火燥金也。百合固金湯。去元參。桔梗。秦芩。其內奪而厥。為瘖者。腎虛也。地黃飲子。其中風症。舌瘖。不

類證治裁

卷之二

失音

能言者音如故。而舌不掉也。虛者六君湯。加竹茹薑汁。其總治氣血虛燥。喉音不清者。清音湯。加減訶子湯。脂蜜膏方。此失音症。治大約潤肺滋腎之品為宜也。

醫通曰。失音大都。不越於肺。須分暴瘖久瘖。暴瘖多是寒包熱邪。宜辛涼和解。消風散。用薑汁沖服。肺虛傷風。喘欬聲嘶。千金酥。火邪傷肺。咽痛聲啞。生豚散。合六味丸。或久病失音。氣虛挾痰。宜滋肺腎之化源。生豚散。下咽乾聲槁。潤肺為主。加玉竹。若不應。生豚散。童真丸。景岳全書。因陣載秘方。竹葉麥冬湯。治勞瘵痰嗽。聲啞不出。難治者。服此神效。竹衣一錢。竹茹三錢。麥冬二錢。竹葉十四片。甘草五分。橘紅五分。茯苓各一錢。杏仁七粒。竹瀝一錢。煎七分。竹瀝和勻服。

徐靈胎指南批本曰。諸症失音。皆有可愈之理。惟用麥冬五味。熟補住肺中痰火。以致失音。則百無一生。又云。久嗽失音。必由藥誤。五味是失音之靈丹也。服之久。無不失音者。倘風寒痰火。偶爾失音。即不治亦愈。但更加以五味。則弄假成真矣。

附方

麻杏石甘湯 麻 杏 石 草

蘇子降氣湯 蘇子 橘紅 半夏 當歸 前胡 肉桂 厚樸 炙草 薑 一方有沈香無肉桂

麥門冬湯 見一卷燥

桔干湯 荆 防 翹 桔 牛蒡 射干 元參 山豆根 竹葉 甘草

養金湯 生地 桑皮 杏仁 阿膠 知母 沙參 白蜜 麥冬 水煎

類證治裁

卷之二

失音

瘖

暴瘖 杏仁桑皮湯 杏仁 桑皮 五味 紫苑 通草 貝母 薑汁 白蜜 砂糖

久瘖 蛤蚧散 見本卷肺痿

補肺 百合固金湯 二地 歸芍 桔 貝 麥 草 元參 柴胡 二錢 人參 秦芩 當歸 鼈甲 地 骨皮 各錢半 紫苑 半夏 炙草 各一錢 薑 棗 水煎

瘖 地黃飲子 見一卷中風

瘖 六君子湯 見一卷中風

瘖 大秦芩湯 見一卷中風

瘖 清音湯 參 苓 歸 地 一冬 烏梅 訶子 阿膠 人乳 牛乳 梨汁 蜜 水煎

瘖 訶子湯 訶子 桔梗 童便 水煎

降清燥虛風亞風亞瘖瘖

喉勞氣弱補清補清肺潤邪散病咽

脂蜜膏 猪脂 白蜜

消風散 參 苓 陳 草 荆 防 羌 芎 藿香

千金酥 蜜膏 仁 真酥 崖蜜 節糖 薑汁 生百部汁 杏

生脉散 人參 五味 麥冬

六味丸 見一卷中風

都氣丸 六味丸加 五味

童真丸 秋石 貝母 紅棗肉為丸 薄荷湯下

類證治裁

卷之十一

失音

言

失音

某 肺受冬溫蘊而成熱脉洪搏指痰阻喉癢嗆欬失音與苦辛泄降痰火清音自出所謂金空則鳴也用杏仁桑皮薑皮川貝麥冬橘紅竹葉三服嗆嗽平惟渴赤間有寒熱前方加香豉梔皮赤苓燈心二服寒熱除膈間覺燥去桑皮香豉加白蜜三匙和服二劑音漸復

族弟怯症嗽久吐血曾用熟地黃阿膠淡秋石燕窩等藥獲愈經十數載至今秋寒熱宵嗽勞則喉痛欲裂氣急聲啞呼吸有音氣不歸源實水虧火炎金畏火灼重症古云金碎不鳴務滋腎陰俾金水相涵翼龍燄稍熄而已做大補元煎熟地黃八山藥

類證治裁

卷之十一

失音

言

白芍百合 各三錢 牛膝 蒸 五味 焙 各八分 洋參 棗仁 阿膠 水 煨 貝母 各三錢

龜板 多 女貞子 各三錢 三十劑後精神稍復兼服人乳數月喜其胃納頗健調理如法可望延年

族子因驚遺泄嗆嗽聲啞繼乃寒熱喉痛梗礙妨食口乾脉細數

醫與清金降火屢服不效予謂水涸於下火炎於上心腎諸脉挾咽循喉既非肺痺梅核無清肺降痰之理宜滋填鎮攝俾龍

飲伏潛喉痛息寒熱漸止方用熟地 錢 山藥 龍齒 杞子 炭 天冬 元參 女貞子 各二錢 茯神 錢 丹皮 栝子 仁 各八分 五味 分 淡萊 錢 煎

服甚適時用白蜜及猪膚湯潤喉喉痛寒熱若失若精關固

月餘不泄即用原方去元參加牡蠣蓮子煉蜜丸竹葉湯下庶

望音復後將煎劑去淡菜加龜甲心石斛淡秋石煎丸並服漸效乃誤信喉科鐵烙喉大痛暈絕遂成不救惜夫

王氏室女久嗽失音呼吸痰響勞則發熱頰紅乾飯稍納粥入隨出肺氣既失肅降痰火升逆擾及中官胃土運納不安然胃虛穀少脉來微數非降火滌痰所得效治以平氣降逆兼培胃氣倘痰火一清聲音可出海浮石蘇子貝母前胡茯苓山藥炙草葶汁竹瀝和服呼吸利痰嗽平再去前胡加訶子蛤粉數服哮喘止而音漸復

類證治裁

卷之二十一

失音

三十一

哮喘論治

哮喘者氣為痰阻呼吸有聲喉若拽鋸甚則喘欬不能臥息症由痰熱內鬱風寒外束初失表散邪留肺絡宿根積久隨感輒發或貪涼露臥喘嗜甜鹹膠痰與陽氣併於膈中不得洩越熱壅氣逆故聲粗為哮喘須避風寒節厚味審其新久虛實而治之大率新病多實久病多虛喉如軒聲者虛如水雞者實遇風寒而發者為冷哮喘有二三則中外皆寒宜溫肺以劫寒痰並以三建膏護肺俞穴一則寒包熱宜散寒以解鬱熱加半夏湯如邪滯於肺欬兼喘者六安煎加冬感寒邪甚者華蓋散外感寒內兼微火者黃芩半夏細辛蘇葉三拗湯

類證治裁

卷之二十一

哮喘

三十一

熱哮喘當暑月火盛痰喘者桑白皮湯或白虎湯加杏仁枳殼薑蘇子降氣湯氣痰多者吐之勿純用涼藥須帶辛散湯探吐腎哮喘火急降痰自清痰多者吐之勿純用涼藥須帶辛散湯探吐腎哮喘火急者勿驟用苦寒宜溫劫之用椒目五六錢研細俟哮喘止後因痰因火治之治實哮喘用百部炙甘草各二錢枳殼三錢半夏治虛哮喘用麥兩桔梗三錢甘草此煎劑內冷哮喘加乾薑一錢熱哮喘加元參三錢二錢一服可愈小兒二錢黑砂糖拌其遇厚味而發者消其食積傷鹹冷飲加飴糖三錢酒哮喘加柞木三錢糖哮喘加佩蘭三錢再用海螵蛸大人五錢小兒二錢白麵二錢砂糖二錢飴糖化汁捻作餅年幼體虛者分三四次服吐後用異功散脾胃陽微者急養正子湯久發中虛者急補中湯益氣宿哮喘沈痼者攝腎真加減總之哮喘既發主散邪哮喘

定則扶正為主也

附方

溫肺湯 見本卷欬嗽

鍾乳丸 鍾乳石甘草湯煮研 麻黃醋湯泡焙乾 杏仁
炙草 蜜丸

冷哮丸 麻杏 辛草 星夏 川烏 川椒 白礬
牙皂 紫菀茸 款冬 神麴糊丸

三建膏 天雄 川烏 川附 桂心 官桂 桂枝 細辛
川椒 乾薑各二兩 麻油熬加黃丹攤貼肺俞

麻黃湯 麻桂 杏 草

越婢加半夏湯 見本卷欬嗽

六安煎 見本卷欬嗽

華蓋散 見本卷欬嗽

類證治裁

卷之二

李

三拗湯 麻黃不去節 杏仁 甘草 薑

黃芩半夏湯 白芍 半夏 甘草各二錢 黃芩三錢 棗
四枚

桑白皮湯 芩 連 杏 貝 梔 夏 桑皮 蘇子 薑

白虎湯 見一卷中風

四磨飲 人參 沈香 檳榔 烏藥 等分磨汁煎服

蘇子降氣湯 見本卷失音

小青龍湯 見本卷欬嗽

清金丹 蘿蔔子蒸晒一兩 牙皂燒存性三錢 薑汁為丸

異功散 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

攝腎氣丸 見本卷虛損

類證治裁

卷之二

李

哮喘

包 哮喘每十日一發嗽痰夜甚脈形俱屬虛寒乃用六味滋陰
治不對症焉能奏效議補益中氣為虛哮喘治法用潞參山藥茯
苓半夏炙草於朮炒杏仁煨薑數服而效

一 小兒冬春久哮喘屢服治風痰之劑不應診其脈知為脾弱不能
化乳濕用四君子湯加薏苡山藥穀芽俱炒製半夏數服愈

湯氏宿哮喘發欬嘔氣急暑濕為新涼所遏宜辛平解散用橘皮
半夏湯加桔梗象貝杏仁茯苓枳殼香薷生薑數服而平

王 丹溪治哮喘專主痰每用吐法不用涼劑謂寒包熱也今弱冠
已抱宿根長夏必發呼吸短促欬則汗洩不能平臥脈虛左尺

類證治裁

卷之二

哮喘

四

搏大不任探吐乃勞力所傷暫與平氣疏痰俟哮喘欬定當收攝
真元先服桑白皮湯去苓連梔夏用桑白皮蜜甜杏仁炒茯苓神
竹茹貝母蘇子炒薄橘紅數劑後服生脉散潞參五味麥冬加
海浮石海螵蛸遠志肉山藥炙草茯苓

巫婦梅夏宿哮喘屢發痰多喘欬顯係濕痰鬱熱為寒邪所遏暫用

加減麻黃湯溫散麻黃三錢桂枝五分杏仁二錢蘇葉半夏製各錢半橘紅

一 桔梗八分薑汁三匙二服後隨用降氣疏痰栝萸皮桑皮俱炒貝

母杏仁俱炒研各二錢海浮石三錢前胡枳壳各八分蘇子炒研六分茯苓二錢薑

汁三匙數服哮喘除

喘症論治 短氣 少氣 逆氣附

肺為氣之主腎為氣之根肺主出氣腎主納氣陰陽相交呼吸乃
和若出納升降失常斯喘作焉張口擡肩氣道奔迫病機謂諸病
喘滿皆屬於熱海藏以為火鑠真氣氣衰而喘有由然矣夫喘分
虛實經云邪入六腑則身熱不時臥上為喘呼又云不得臥則
喘者水氣客之此舉喘之實也經曰秋脈不及謂肺金則令人喘
呼吸少氣又曰勞則喘息汗出此明喘之虛也實喘者氣長而有
餘虛喘者息促而不足實喘者胸滿聲粗客邪干肺上焦氣壅治
宜疏利通用定喘湯虛喘者呼長吸短腎不納氣孤陽無根治宜攝固
六味丸去丹泄加牛膝故實喘責在肺虛喘責在腎葉氏亦云喘

類證治裁

卷之二

喘

三

症之因在肺為實在腎為虛也徐靈胎指南批本云喘在肺為實
但疑似間極難辨認香嚴先生又以出氣不
爽為肺病入氣存音為腎病更為明確矣 治喘者凡肺竅壅塞
呼吸不利氣盛脈實滑數有力皆實候也如肺感風寒致喘三拗
蓋肺熱痰火作喘麻杏甘膏湯肺寒飲邪喘逆桂枝加麻杏湯感暑喝火盛而
喘香薷飲因濕邪濁逆而喘四苓散加杏撲撲杏湯肺氣不降浮腫發喘
麻黃湯去桂枝加桑皮通草葶藶肺氣不降浮腫發喘
桑皮薤白茯苓肺脹水停上氣喘欬豚沈小青龍加石膏湯水
病喘滿腎邪犯肺宜通陽泄濁真武湯合四苓散去白朮痰喘必滌其源生涎
溫膽湯火動怒喘兼平其氣四七如吸音頗促勞動則劇氣弱脉
微或浮大而弦按仍如無察其外無客邪內無實熱皆虛候也如
肺虛金燥生脉散胃虛陽升人參五味湯腎陰虧而精傷衝任經虛

丹田火熾。肺金受燥。大劑六味湯。加麥冬、五味。腎陽虛而氣脫。孤陽浮越而赤。煩躁。火不歸元。七味地黃丸。加人參、麥冬。腎不納氣。身動即喘。陰陽樞紐失交。急須鎮攝。腎氣湯。從陰引陽。入青鉛。從陽引陰。腎與肺胃俱虛。喘嗽乏力。人參一錢。胡桃三枚。連皮蜜炙煎服。病後氣喘為肺虛。生脈散。加阿膠。病後氣促。嗽痰而浮足冷。為陽虛。八味丸。產後喘為孤陽絕陰。最危。因營氣暴竭。衛氣無依。獨聚肺中。故喘急。獨參湯。若血入肺。面赤喘欲死。參蘇飲。如收血衝心。胸滿上氣。逐其敗血。喘自定。血竭散。老人久病。喘嗽不得卧。杏仁丸。動即作喘。多由虛衰。宜高崖脾腎丸。陰虛宜滋養。熟地、胡桃肉、蛤蚧尾、陽虛宜溫養。參耆歸朮茯苓神、蓮子、山藥、炙草。陰陽不交。攝納下元。海參膠、淡菜膠、熟地、茯苓、牛膝、遠志、骨脂、青鹽、石莖。以此分症施治。朗若列眉已。

類證治裁 卷之二 喘

短呼吸促而不能續。似喘而無痰聲。其症有二。一屬支飲。金匱云。短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯。主之。蓋呼吸短。用苓湯。以通其陽。陽氣通則小便能出矣。吸氣短。用腎氣湯。以化其陰。腎氣化則小便之關門利矣。一屬氣虛。東垣云。肺主諸氣。短氣者。五臟之氣皆不足。而陽道不行也。氣短。小便利者。四君湯。去茯苓。加腹中氣不轉者。倍甘。肺氣短促。倍人參。使肝膽之邪不敢犯之。若失血後。陰火上乘。短氣不足以息。或腎虛發熱。唾痰者。脈散。加當歸。黃芪。生地。少氣。少不足以言。經云。怯然少氣。是水道不行。形氣消索也。又曰。言而微。終日及復言者。此奪氣也。又曰。脾脈搏堅而長。其色黃。

當病少氣。獨參湯。生脈散。保元湯。異功散。逆氣上逆不得卧。而息有音。經曰。胃者六腑之海。其氣下行。陽明脈逆。不得從其道。故不得卧。而息有音也。起居如故。而息有音者。肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下。故留經而不行。絡脈之病人也。微故起居如故而息有音也。其不得卧。卧則喘者。是水氣之客也。水者循津液而流。腎為水臟。主津液。主臥與喘也。治陽明之氣逆。四磨湯。治肺絡之氣逆。杏子湯。小青龍湯。越氣之逆。麻黃附子細辛湯。經曰。寸口脈實者。肺實也。肺必脹。上氣喘逆。咽中塞。如嘔狀。自汗。皆肺實之候。右寸脈虛者。肺虛也。必咽乾無津。少氣不足以息。

類證治裁 卷之二 喘

醫通曰。肺虛受寒而喘。參蘇湯。寒鬱熱邪而喘。中有熱痰。遇冷即發。麻黃定喘湯。遠年欬逆上氣。胸滿痞塞。聲不出者。人參定喘湯。虛冷上氣。勞乏喘嗽。千金用半夏。人參。上氣不得卧。生薑。人參。橘紅。紫蘇。肥。盛多痰喘不能卧。元氣未衰者。干縉湯。或經年喘嗽。遇寒更甚者。九寶湯。安喘嗽。氣從臍下衝上。尺脈洪數。兼盜汗潮熱。屬陰虛。六。嗽化痰膏。喘嗽。氣從臍下衝上。尺脈洪數。兼盜汗潮熱。屬陰虛。味。送靈砂丹。凡衰病產後喘促者。均為少氣。雖素有痰火。亦由氣虛。須大劑。若虛而欲脫。元海根搖。火從臍下逆衝而上。似喘非喘。吞若不及。急須峻補。鎮攝丹。田。大劑六味湯。加五味。牛。喘與脹二症相因。皆小便不利。故喘則脹。脹必喘。先喘後脹者。治。

在肺先脹後喘者治在肺經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由肺氣降而下而輸化也若肺受邪則失降下之令以致水溢皮膚而生腫滿此喘為本腫為標治宜清金降氣為主而行水次之如脾主肌肉濕濕克水若脾虛不能制水則水濕妄行外侵肌肉內壅滯上使肺氣不得下降而喘乃生此腫為本喘為標當實脾行水為主而清金次之若肺病而用燥脾之藥則金得燥而愈喘脾病而用清金之藥則脾得寒而益脹矣

喘症脉候

喘脉宜浮遲不宜急疾喘逆上氣不得卧者死上氣面目腫肩息

類證治裁

卷之二

喘

四

脉浮大者危上氣喘息低昂脉滑手足温者生脉濇肢寒者死右寸沈實而緊為肺感寒邪亦有六部俱伏者宜發散則喘定

附方

定喘湯 麻杏 苈 夏 草 白果 款冬 蘇子

六味丸 見一卷中風

三拗湯 見本卷哮喘

華蓋散 見本卷咳嗽

麻杏石甘湯 麻 杏 石 草

桂枝加茯苓湯 桂 芍 薑 草 棧 杏

香薷飲 見一卷中風

暑

暑 濕 利 散 邪 肺 脹 水 停 水 逆 氣 痰 火 痰 喘 怒 喘 肺 虛 胃 虛 引 火 納 氣 產 喘 敗 血 老 人 虛 衰 支 飲 少 氣 少 氣

白虎湯 見一卷中風

四苓散 見一卷溫

麻黃湯 麻 桂 杏 草

小青龍加石膏湯 小青龍見本卷咳嗽此加 石膏

越婢加半夏湯 見本卷咳嗽

真武湯 附 苓 芍 薑

溫膽湯 見一卷溫

清膈煎 廣皮錢半 貝母 浮石各一錢 膽星一錢 木通錢半 白芥子七分

三因四七湯 苓 夏 蘇 棧 薑 棗

生脉散 參 味 麥冬

類證治裁

卷之二

喘

與

人參五味湯 參 朮 廣皮各一錢 五味九粒 麥冬 杏仁各八分 薑三片 棗二枚

七味八味丸 見一卷中風 八味丸加 牛膝 車前名腎

都氣丸 六味丸加 五味子

參蘇飲 人參一兩 蘇木二兩

血竭散 血竭 沒藥各一錢 以陳酒 童便各半煎沸調

杏仁丸 杏仁 核桃肉 蜜丸

嵩崖脾腎丸 腎氣丸 加骨脂 益智 砂仁

苓桂朮甘湯 苓 朮 草

保元湯 見一卷火

異功散 見一卷中風

逆氣 四磨湯 見本卷哮喘

逆氣 七氣湯 參 桂 夏 草 薑

逆氣 杏子湯 麻 桂 杏 芍 薑 天冬

降氣 蘇子降氣湯 見本卷失音

腎氣 麻黃附子細辛湯 麻 附 辛

氣 靈砂丹 水銀 硫黃 二味炒成砂子入水大鼎煨煉為末

氣 參蘇溫肺湯 木香 桑皮 薑 桂 夏 陳 蘇 味

寒 麻黃定喘湯 即前定喘湯

久咳 人參定喘湯 人參 麻黃 炙草 阿膠 半夏各一錢

喘 干縉湯 半夏七粒 皂角去皮弦 炙草各一寸 薑二片

類證治裁

膠 導痰湯 見一卷中風

喘 九寶湯 麻 杏 蘇 桂 陳 荷 薑 草 桑皮

喘 安嗽化痰膏 見本卷欬嗽

喘

趙 衰年喘嗽痰紅舌焦咽燥背寒耳鳴頰赤脉左弦疾右浮洪而尺搏指按脉症係冬陽不潛金為火燥背覺寒者非真寒也以父子懸壺忽而桂附忽而知藥忽而葶藶逐水忽而款冬泄肺致嗽血益加身動即喘坐則張口擗肩卧則體側喘劇因側卧則肺系緩而痰益壅也思桂附既辛熱助火知藥亦苦寒化燥非水焉用葶藶泄熱何藉款冬細察吸氣頗促治宜攝納但熱蒸膩痰氣衝咽痛急則治標理先清降用川百合貝母杏仁麥冬沙參牡蠣阿膠化水燕窩湯煎一啜嗽定而痰紅止去杏仁牡蠣阿膠加生地竹茹丹皮元參羚羊角午服以清上中浮游

類證治裁

之火用熟地五味茯苓神秋石龜板牛膝青鉛晚服以鎮納下焦

散越之氣脉症漸平

族某七旬以來冒寒奔馳欬喘急脉弦滑時愛冷氣夫寒痰停

腕必嘔宿痰阻氣必欬老人元海根微不任勞動勞則嗽嗽則

氣升而喘必靜攝為宜做溫肺湯用辛溫止嗽以定喘淡乾薑

五味 乾薑五味攝太陽而定喘 桑皮 茯苓潞參甜杏仁橘紅

製半夏款冬花紫衣胡桃數服喘嘔俱定十服全瘳

李 喘由外感者治肺由內傷者治腎以肺主出氣腎主納氣也

出氣阻而喘為肺病吸氣促而喘為腎病今上氣喘急遇煩勞

則發不得卧息必起坐伏案乃定近則行步亦喘是元海不司

收納之權致膠痰易阻升降之機急急攝固其元熟地炭牛膝
炭茯神五味黃肉補骨脂蓮子俱數服頗安

貢 積年痰嗽脉細形衰動則喘氣偏墜病因肝腎久損客冬心
事操勞身動即喘痰益劇肉銷骨立是五液悉化為痰偏臥
不舒是陰陽亦乖於用所謂因虛致病積損成癆候也右脉沈
數無力左脉浮數無根良由下元真氣失納以致下引上急吸
入頗促而為短氣若不納使歸源將下元根蒂都浮喘嗽易由
鎮靜况症本腎虛水泛為痰必非理嗽滌飲可效奈何臆星竺
黃芥子芩蘗等無理亂投不知顧忌昨議服攝固之品痰氣較
平而脉象未改是損極難復維繫不固有暴脫之憂今酌定晨

類證治法

卷之二

喘

見

服都氣丸加參朮遠志故紙晚服腎氣湯去黃泄丹皮桂附加
茯神五味杞子沙苑子蓮子棗仁冀其氣平而痰嗽自定

岳 少年體質陰虧兼傷煩勞脉虛促熱渴頰紅痰血喘急速進
糜粥以扶胃食頃喘定症宜清調肺衛潤補心營甜杏仁阿膠
水沙參川貝茯神棗仁麥冬石斛萸仁黃耆蜜炒三服脉勻症退
繼進燕窩湯嗽喘悉止治以培土生金潞參山藥炙草玉竹五
味茯神杏仁蓮子紅棗食進丸用加減都氣而安

服姪初春脉左弦長直上直下喘嗽吐紅夢泄冬陽不潛足少陰
經與衝脉同絡陰虛火炎氣衝為喘絡傷為血乃元海根蒂失
固醫者不知納氣歸原泛用歸者朮草症勢加劇寒熱欬逆血

升氣促衝脉動諸脉皆動總由肺腎失交急急收納務令陽潛
陰攝阿膠水化牡蠣醋煨龜板酥炙龍骨煨五味山藥高麗參茯神棗
仁坎杰研數服嗽平血止去坎杰加青鉛衝氣亦定

倪 年近七旬木火體質秋嗽上氣喘急痰深而黃甚則不得臥
息須防暈厥治先平氣定喘蜜桑皮蘇子杏仁川貝母茯神栝
蕤百合二服後加白芍麥冬述舊服兩儀膏痰多食減今訂膠
方減用熟地只用四兩砂仁末拌蒸晒乾高麗參一兩茯苓三兩甜杏仁炒研蓮
子八兩棗仁一兩批杷膏四兩燕窩兩橘紅八錢貝母一兩山藥三兩阿膠一兩
各味熬汁阿膠收開水化服

類證治法

卷之二

喘

丑

某 腎不納氣則喘息上奔脾不輸精則痰氣凝滯今痰哮不利
呼吸頗促病本在脾腎而肺胃其標也由冬延春脉候若斷若
續忽神煩不寐語謔舌灰虛中挾溫治先清降杏仁栝萸象貝
茯神潞參苜蒲汁冲服一劑嗽定得寐舌胎稍退進粳米粥喘
息仍奮脉見虛促急用納氣歸原冀根蒂漸固高麗參五味牛
膝炭遠志茯神杞子蓮子牡蠣粉六服間用七味地黃丸而安

痰飲論治

痰飲皆津液所化。痰濁飲清。痰因於火。飲因於濕也。痰生於脾。濕勝則精微不運。從而凝結。或壅肺竅。或流經隧。飲聚於胃。寒留則水液不行。從而泛濫。或停心下。或漬腸間。此由脾胃水濕陰凝。必陽氣健運。則濁陰下降。如烈日當空。則烟雲消散。宜以理脾逐濕為治者也。若夫腎陽虛。火不制水。水泛為痰。為飲。逆上攻。故清而澈。治宜通陽洩濕。忌用膩品助陰。如四物六腎。陰虛火必燦。金火結為痰。為痰。火上升。故稠而濁。治宜滋陰清潤。忌用溫品助燥。如陳六君。治法所必辨也。夫清液為飲。稠濁為痰。飲惟停蓄腸胃。而痰則隨氣升降。遍身皆到也。羅氏云。天下無逆流之水。因乎風。在肺

類證治裁

卷之二

痰飲

五

則欬在胃。則嘔在心。則悸在頭。則眩在背。則冷在胸。則痞在脇。則脹在腸。則瀉在經絡。則腫在四肢。則痺變幻百端。昔人所謂怪症多屬痰。暴病多屬火也。然又謂見痰休治痰者。以治必探本。恐端事消滌重虛。其胃氣反滋。膨脹耳。丹溪云。胃氣亦賴痰以養。亦有但治其痰者。如風痰散之。防風丸。加南星。生薑。寒痰溫之。理中丸。暑痰豁之。消暑濕痰燥之。二朮二陳。燥痰潤之。杏仁白蜜。清之。清氣化。食痰消之。保和丸。酒痰化之。瑞竹堂。鬱痰解之。三因湯。加鬱金。氣痰利之。咯不出。嚥不下。如敗絮。驚痰世之。控涎丹。加蒼蒲。香附。氣痰利之。如梅核。七氣湯。三仙丸。驚痰世之。控涎丹。尾老痰軟之。如海石。海粉。芒硝。瓦楞。頑痰吐之。三聖散。青綠丸。虛在上者。涌之。桔梗蘆散。在下者。導之。導痰湯。甚在脾者。黃滑而易出。

二陳湯。在肺者。白如米粒。澀而難出。利金湯。去薑枳。在肝者。青而多泡。川芎丸。加星枳。在心者。赤結如膠粘。半黃。在腎者。黑而多鹹。佳茶丸。加留腸下者。天陰隱痛。二陳湯。加滯經絡者。筋骨牽痛。刺澤泄車前。留腸下者。四肢者。手足疲軟。導痰湯。加桂枝。隱皮裏膜外。旋覆花湯。加桂枝。或成塊。流走不定。薑汁竹瀝。或成核者。腫而麻木。二陳湯。加白芥。或成塊。流走不定。薑汁竹瀝。或成核。結聚項間。痰核酒。膈上停痰痞悶。小陷胸湯。加茯苓。腕中伏痰臂痛。指迷花。痰滯氣逆嗽多。六安。寒涎沃膽不眠。溫膽湯。多驚。痰挾死血攻注。控涎丹。加韭汁。桃仁。痰結窠囊嘔吐。薑汁竹瀝。中風痰迷心竅。屬寒者。滌痰湯。下牛黃。癩癩痰悶抽掣。牛黃。此皆治其標也。如求其本。脾虛濕痰。宜健脾以運之。四君湯。參。肺熱火痰。宜清

類證治裁

卷之二

痰飲

五

肺以潤之。清肺飲。脾肺氣虛不運。生痰者。六君湯。脾胃氣虛不化。生痰者。六君湯。脾氣滯者。異功散。中氣弱者。補中益。脾胃虛挾濕者。麻濡緩痰清稀。六君湯。加砂仁。肝腎虛痰中見血者。六味湯。加烏雞。炮薑補中湯。加茯苓。半夏。相火燥痰津潤者。滋陰清。腎陰虧。火動痰升者。五味天冬。勞損痰白痰。如雞蛋清者。補肺。水泛為痰者。薛氏八味丸。如勞損痰白痰。俗名白血者。此乃治痰之本矣。且痰飲同稱。而殊治。豈可混乎。試由痰論飲。內經有飲無痰。其論飲病。皆由濕淫土鬱。至金匱乃立痰飲懸飲。溢飲。支飲。留飲。伏飲。等名。皆水停為患。如其人昔肥今瘦。水走腸間。漉漉有聲。為痰飲。必目眩短氣。飲在陽。則呼氣短。苓桂朮甘湯。飲在陰。飲當從小便利之。苓桂。飲後水流脇下。欬唾引痛。為懸飲。脈必沈。尤甘湯。腎氣丸。主之。

弦十棗 飲水流於四肢當汗不汗身體疼重為溢飲小龍湯欬逆倚息短氣不得臥形如腫為支飲葶藶散水停心下背寒冷如掌大短氣肢節痛脇痛引缺盆脈流為留飲導痰瀉滿欬嘔吐寒熱腰背痛身振嘔為伏飲倍尤丸加痰飲不渴小半夏湯支飲眩目澤瀉心下痞膈間有水悸眩茯苓湯茶飲過多成癖及飲酒成癖蓋桂飲癖嘔酸餽雜心懸如飢三聖丸別有非痰非飲吐清涎沫者脾虛不能收攝也六君湯加渴飲飲水水入即吐者名水逆五苓散大法外飲治脾內飲治腎治脾茶桂朮甘氣壅者開之小龍湯去麻射欬者平之鮮枇杷葉杏仁茯苓治腎腎氣丸龍湯外臺茯苓濕滯者滲之五苓散留伏者逐之桂苓支結入絡者通之

類證治裁 卷之二 痰飲

仲景曰飲而兼欬者但治飲不必治欬。仲景云治痰飲當以溫藥和之此可謂一言攝要者矣。仲景曰飲而兼欬者但治飲不必治欬。為痰是謂陰虛痰火痰在肺而本於腎治宜降氣清熱益陰滋水忌辛溫燥由脾胃寒濕生痰或飲啖過度致脾氣壅滯為痰此病熱補氣藥由脾胃寒濕生痰或飲啖過度致脾氣壅滯為痰此病在脾胃無關肺腎治宜燥脾利氣忌滯膩寒由風寒鬱熱生痰病亦在肺治宜豁痰清利中佐以辛溫麻黃生薑之類以散外寒忌溫補則藥無格拒之患夫痰質稠粘飲惟清水或青綠苦酸多因過飲茶酒或情抱抑鬱中寒濕阻治宜燥濕利水溫通陽氣以行之二陳五苓

張路玉曰痰飲變生諸症必以治飲為先諸症自愈如頭風肩稜骨痛屢用風藥不效投以痰劑收功患眼赤羞明而痛與涼藥弗瘳界以痰劑獲效凡此之類不一而足在審症回機耳如太陰痰喘治風亦此意也痰飲脈候 脈沈者留飲雙弦者寒也偏弦者飲也肺飲不弦但苦喘滿短氣支飲亦喘不得臥短氣其脈平沈而弦者懸飲肝脈軟而散色澤者溢飲提綱曰痰脈弦滑三四病人一臂不遂時復移在一臂其脈沈細非風也必有飲在上焦痰得瀉脈必費調理以痰膠固

類證治裁 卷之二 痰飲

痰道阻塞也左右關脈實大而浮膈上有稠痰也宜吐之病人百藥不效關上脈伏而滑者痰也眼胞上下如黑煤者亦痰也回春曰眼黑而行步呻吟舉動艱難入骨痰也非葶藶苦參不除其偏體骨節痛審氣血加化痰藥入門曰痰厥者因內虛受寒痰氣阻塞手足厥冷麻痺暈倒脈沈細也 用藥 濕痰主半夏佐風痰主南星佐燥痰主貝母佐火痰主竹瀝佐寒痰主蘇子佐食痰用神麩山酒痰用花粉白朮驚痰用天竺黃老痰用海浮石氣痰用廣皮枳膠痰用橘紅杏痰核用半夏連翹等痰用海浮石痰在四肢非竹不達痰在脇下非芥不除痰

在皮裏膜外非白汁竹瀝不到痰在經絡非竹瀝不行痰中帶血
宜非汁痰迷癩癩宜控涎氣貫痰盛宜三子養實熱老痰礞石滾
風寒痰湧及小兒驚風白州痰血塞心竅癩狂丸白金實痰積飲宜
小胃降痰氣宜湯潤下地海粉熱痰能清濕痰能燥堅痰能軟頑
痰能消石墮痰火極效黃茶治熱痰假其下行也實治痰有推牆
倒壁之功五倍治老痰元明治熱痰以其能降火軟堅也礞石大
能降火消痰結研細和白糖舌舐服效尤治痰飲成窠囊行痰極
效。

附方

防風丸 防風 川芎 天麻 甘草 蜜丸 殊砂為衣

類證治裁 卷之二 痰飲

寒痰 青州白子丸 生白附子 生南星 生半夏 川烏 糯米
寒痰 理中化痰丸 參 朮 薑 草 加苓 夏
暑痰 消暑丸 見一卷暑
濕痰 二朮二陳湯 二朮 苓 夏 陳 草
白朮丸 星 夏 朮 為丸薑湯下
燥痰 潤肺飲 二母 陳 苓 麥 桔 花粉 生地 草 薑
火痰 清氣化痰丸 杏 蕪 枳 夏 星 陳 苓 苓 薑汁
食痰 保和丸 查肉 二兩 黃連 半夏 神翅 橘紅 麥芽 茯苓各
食痰 栝婁丸 蕪仁 半夏 山查 神翅 糊丸
酒痰 瑞竹堂化痰丸 星 夏 青 陳 杏 葛 蘇子 薑汁

七氣湯 見本卷欬嗽
三仙丸 南星麴 半夏麴各四兩 香附二兩 糊丸
控涎丹 丸 甘遂 大戟 白芥子 糊丸薑湯下 一名妙應
青礞石丸 礞石打碎用焰硝二兩同入瓦罐內泥封煨石色
如金為度水丸 一名奪命丹
三聖散 半夏 陳皮 黃連 麴糊丸 薑湯下
青綠丸 石青一兩 石綠五錢 研飛麴糊丸豇豆大每服
參蘆散 參蘆二錢 或加竹瀝和服取吐虛人最宜
桔梗蘆散 桔梗蘆二二錢 研服探吐
稀涎散 見一卷中風
導痰湯 見一卷中風

類證治裁 卷之十一 痰飲

降痰 滾痰丸 礞石一兩 沈香五錢 大黃 黃芩各八兩 百
肺痰 利金湯 桔 貝 陳各三錢 茯苓二錢 枳殼錢半
肝痰 川芎丸 芎 荷 辛 防 桔 草 蜜丸
喘痰 千縉湯 見本卷喘
熱痰 半黃丸 南星 半夏 黃芩各一兩 薑汁浸蒸餅為丸
腎痰 桂苓丸 肉桂 茯苓 蜜丸
絡痰 旋覆花湯 旋覆花 葱管 新絳
痰核丸 礞砂 沈香 貝母 百草霜 鍾乳粉 陳 苓
痰核酒 都管草根三升 兔耳 一枝箭 白果 南星
小陷胸湯 黃連 半夏 栝婁

伏痰 嗽痰 虛痰 迷痰 癩痰 熱痰 健脾 補脾 潤燥 肺補 中痰 痰血 升痰 嗽痰 相火 陽衰 勞嗽 痰飲 逐飲

指迷茯苓丸 半夏二兩 茯苓一兩 枳壳五錢 風化

六安煎 見本卷欬嗽 薑汁糊丸 薑湯下

溫膽湯 見一卷溫 滌痰湯 見一卷中風

牛黃丸 麝星 全蠍 蟬蛻各二錢半 牛黃 白附子 防風 天麻各錢半 麝香五分 煑棗肉

水銀 二丹丸 丹參 熟地 天冬各兩半 麥冬 茯神 甘草 各一兩 丹砂 人參 菖蒲 遠志各五錢 蜜丸

四君六君湯 見一卷中風 參朮健脾丸 參 苓 朮 草 陳名異功散 此再加

清肺飲 見本卷欬嗽 四陰煎 生地 麥冬 白芍 百合 沙參 貝母 阿膠 各二錢 茯苓 花粉各錢半 生甘草五分

補中益氣湯 見一卷中風 六味丸 八味丸 見一卷中風 薛氏八味丸以茯苓為君

五味天冬丸 天冬 五味 搗丸 百花膏 百合 款冬 蜜丸 加紫苑 百部 烏梅 名

滋陰清化丸 二冬 二地 二母 苓 味 草 花粉 真武湯 朮 附 苓 芍 薑

補肺湯 參 耆 五味 紫苑 芥桂朮甘湯 芥 桂 朮 草

腎氣丸 即八味丸加 牛膝 車前

類證治裁 卷之二 痰飲

十棗湯 芫花 甘遂 大戟 大棗

小青龍湯 見本卷欬嗽 葶藶瀉肺湯 葶藶 大棗

五苓散 見一卷溫 倍朮丸 白朮 桂心 乾薑 蜜丸

小半夏湯 半夏 生薑 澤瀉湯 澤瀉 白朮

小半夏加茯苓湯 夏 苓 薑 薑桂丸 南星 半夏 肉桂

三聖丸 即前三聖散 蒼朮丸 蒼朮 棗為丸

外臺茯苓飲 見一卷中風 桂苓湯 茯苓四錢 桂枝 白朮各三錢 甘草一錢

茯苓桂枝湯 苓 桂 芍 草 薑 棗 五飲湯 參 朮 橘 枳 夏 樸 桂 芍 澤 草

三子養親湯 蘇子 白芥子 蘿蔔子 白金丸 白礬三兩 鬱金七兩 薄荷糊丸

小胃丹 芫花 甘遂 大戟 大黃 黃蘗 以白朮膏丸

蘇子降氣湯 見本卷失音 潤下丸 半夏二兩 南星 炙草 黃連 黃芩各一兩

類證治裁 卷之二 痰飲

痰飲

朱 氣逆濁飲上升甚則中夜起坐醫用二陳兼旋覆代赭湯不應診脈乃陽微濁逆用外臺茯苓飲加乾薑沈香汁愈

姪 脈沈弦為停飲由脾陽不運輸水濕留胃故食後清稀宿水傾吐而出按仲景論飲邪當以溫藥和之金匱治痰飲胸脇支滿苓桂朮甘湯主之今倣其法而更其製以茯苓泄水桂枝通陽白朮燥濕甘草和中加砂仁半夏枳殼蘇子運脾以降濁研末服薑湯下積飲遂除

貢 飲症吐青綠苦沫乃膽氣所溢用溫膽湯加吳萸乾薑蒼朮逐濕滌飲吐止嗣用蒼半苓陳散加益智仁焦朮粳米共為末

類證治裁

卷之二

痰飲

五

薑湯調服溫理脾陽而安

丁 積年痰飲脈虛右尺大宿痼因勞力中虛而發用六君子湯加薏苡煨薑椒目服效

貢 痰飲久嗽清晨濁沫上干必傾欬吐出膈上乃寬此由宿食化痰起胃虛隨氣上升故也然細參症脈必腎中陽虛仲景所謂腎虛水泛為痰以腎氣丸補而逐之向服崔氏八味丸雖未速效猶是對症主治惟客歲自用倒倉法洗滌停痰宿飲乃為間道出奇王節齋明醫雜著云腸胃為倉倉中有陳腐敗穀須倒出之腸胃中有痰血積滯須蕩滌之若病不屬腸胃不可輕用據此宜乎用之無益

王 脈沈弦始則頭痛悶嘔舌白惡食繼則氣阻脘痛攻注腰膈

隨觸輒嘔背寒心悸下利溺少九晝夜不能著枕固是濕阻氣痺但醫者混治謬託消和不知飲邪入絡上干為頭痛下滲為瀉利漬入太陽為背寒停於心下為悸動金匱云口乾不欲飲水者為飲邪未去故也今飲入支絡不用辛溫通逐痛嘔焉止倣小半夏湯加茯苓川椒目枳殼吳萸桂枝沈香磨日再服痛緩得臥糜粥得下背寒心悸俱却惟臍腹痞結時嘔時痛乃支絡濁滯未淨改用通絡導滯歸鬚小茴香生查肉橘核青鹽山梔薑汁炒茯苓枳殼降香末痛嘔悉平改用和中運濕製半夏砂仁茯苓炙草穀芽大豆黃卷薏苡陳皮全膠

類證治裁

卷之二

痰飲

六

血症總論

稟水穀之精華出於中焦以調和五臟。滲陳六腑者血也。生化於脾。宣布於肺。統於心。藏於肝。化精於腎。灌輸百脈。其清而純者為守臟之血清中之濁者為腑絡之血清中之清者為營經之血。皆有氣以護之。膜以隔之。絡以通之。原不至上溢而下脫也。一有偏傷。或怒勞迫而上升。或陰陽虛而失守。則為吐。為衄。為嘔。為咯。為欬。血唾。血經。所謂陽絡傷則血外溢也。或陰虛陽搏。或陽衰陰脫。或濕熱下陷。則為崩中。為漏下。為溺血。為便血。為腸風。血痢。經所謂陰絡傷則血內溢也。更有瘀血在裏。漱水不欲嚥。小腹滿。身黃。便黑。在上則喜忘。在下則如狂。傷寒論所謂三焦畜血證也。夫血

類證治裁

卷之二

血症

六

行清道出於鼻。行濁道出於口。吐血出於胃。衄血出於肺。嘔血出於肝。咯血出於心。痰涎之血出於脾。唾血出於腎。鼻血為衄。口鼻俱出為腦。耳血為耳。目血為眼。齒血為牙。舌血為舌。鼻九竅俱出為大衄。胸前一孔出血為心漏。臍間出為胃血。膚血為紅汗。為肌。上出如泉湧為血溢。衝任不攝為崩漏。由精竅出。溺孔痛為血淋。由膀胱出不痛為溺血。色稠紅為結陰。便血清而色鮮。四射如濺為腸風。濁而色暗為臟毒。膿血雜痢為腸澼。射血如線為痔血。凡血色鮮濃者屬火。紫黑者火極。晦淡無光者陽衰。不能攝陰。粉紅者肺血。赤如硃漆光者心胞血。鮮稠濃紫者脾肝。血痰唾雜紅點紅絲者腎血。治最難。吐多成碗成盆者胃血。氣多

欲知何臟之血。吐在水碗中。浮者肺血。沈者肝血。半沈半浮者。心血。各隨所見。以羊肺羊肝羊心。煮熟。蘸白芨末。日食之。吐血服。不止。乃肺上有竅也。用白芨末。以猪肺煮熟。蘸食之。日下注之血。服三四次。便為未填。滿其血自止。方名獨勝散。血淋多因房勞腎虛。溺血多因氣化移熱。便後血為遠血。由腸胃來。便前血為近血。由肛門出。濺射者風淫。點滴者濕著。血下行為順。其治易。上行為逆。其治難。得寒則凝。得溫則行。見黑則止。常隨氣行。氣和則血循。經氣逆則血越。絡上溢之血。火乘之。實氣逆之也。故治血宜調氣。不宜降火。猛進苦寒。以寒能凝。瀆且易傷脾。若脾傷則愈不能統攝諸血。以歸經矣。入手須辨陰陽。陽症吐衄。血色鮮紅。陰症血色紫暗。如猪肝。陽症脈洪滑。口渴面紅。喘煩溺。

類證治裁

卷之二

血症

六

赤火載血升。宜清降涼劑。陰症脈虛數。口乾頰赤。煩躁足冷。乃真陽失守。無根之火。上炎。宜引火歸元。切忌寒涼降火。治血前後調理。須按三經用藥。宜歸脾湯。蓋心主血。肝藏血。脾統血。此方乃三經主劑也。遠志補肝以生心火。茯神補心以生脾土。參耆補脾以固肺金。香先入脾。總欲使血歸於脾。故名歸脾湯。有鬱怒傷肝。思慮傷脾者。尤宜如火旺加黑梔。火衰加桂。再以入味地。培先天根本。治得其要矣。凡血症見咳嗽喘滿。及膈左右脹痛者。病在肺也。宜清降。不宜升。浮如腫中一絲牽痛。或懊惱錯雜者。病在心胞也。宜養營。不宜耗。散如腹膨不飢。食不知味。吐涎沫者。病在脾也。宜溫中。不宜酸寒。

如脇肋牽痛躁擾不安。往來寒熱者。病在肝也。宜甘緩。宜疏利。不宜秘滯。如氣短似喘。咽痛聲啞。骨蒸盜汗者。病在腎也。宜滋陰壯水。不宜香燥。如嘔吐煩渴。大熱不得臥者。病在胃也。補瀉當察兼症。勿謂陽明盡可攻也。至用藥有君臣。或常用兼用。當知其類。如治血虛。甘溫為主。宜人乳鹿膠。阿膠熟地。甘酸為佐。山藥茯苓。牛膝白芍。又如天真丸。海參膠。烏骨。血虛熱。當涼潤。生地麥冬。雞丸。河車。膏。燕窩。飲。皆血。肉。有情。補。法。蓮子。茯。神。小麥。沙。參。玉。竹。血。虛。寒。宜。辛。熱。桂。心。炮。薑。杜。仲。沈。香。氣。逆。血。升。藕。汁。茅。根。重。便。血。虛。寒。宜。辛。熱。必。火。不。歸。元。者。用。之。犀。角。元。參。三。宜。苦。降。山。梔。丹。皮。赤。芍。栝。樓。血。熱。妄。行。宜。鹹。寒。苦。寒。七。鮮。生。地。黃。連。黃。芩。知。母。血。虛。而。滯。宜。辛。甘。以。和。之。桂。枝。當。歸。橘。皮。丹。參。血。滯。而。母。青。黛。知。血。虛。而。滯。宜。辛。甘。以。和。之。澤。蘭。益。母。側。柏。葉。血。滯。而。痛。宜。辛。溫。以。行。之。便。香。附。五。靈。脂。降。香。末。血。陷。下。宜。辛。苦。香。以。舉。

類證治裁 卷之二 血症

之。白芷。川。血。滑。脫。宜。酸。澀。以。收。之。花。蕊。石。續。斷。白。芩。蓮。房。地。榆。百。芎。升。麻。血。枯。經。閉。宜。鹹。溫。以。通。之。烏。氣。虛。血。脫。宜。溫。補。以。攝。之。人。參。黃。耆。血。枯。經。閉。宜。鹹。溫。以。通。之。烏。魚。骨。鹿。筋。牛。血。瘀。而。結。宜。苦。瀉。之。酸。泄。之。大。黃。桃。仁。三。稜。蘇。木。紅。藤。肉。蓯。蓉。血。積。而。堅。宜。鹹。寒。以。軟。之。元。明。粉。牡。蠣。青。礬。血。燥。宜。甘。潤。以。滑。之。乳。酪。蜂。蜜。黃。明。膠。核。桃。肉。覆。花。秋。石。鱉。甲。血。燥。宜。甘。潤。以。滑。之。柏。子。仁。雞。蛋。黃。麻。仁。芝。麻。其。風。淫。襲。血。散。之。防。風。炒。荆。芥。溫。邪。嗜。血。清。之。花。露。天。冬。象。貝。母。暑。喝。嗽。血。涼。之。杏。仁。扁。豆。沙。參。竹。火。熱。迫。血。瀉。之。石。膏。花。粉。連。翹。犀。角。龍。膽。草。此。用。藥。類。例。也。凡。口。鼻。出。血。皆。陽。盛。陰。衰。有。升。無。降。血。隨。氣。上。越。出。上。竅。法。當。補。陰。抑。陽。氣。降。血。自。歸。經。矣。然。有。陽。氣。本。虛。復。為。寒。涼。所。傷。致。脈。沈。而。不。浮。尺。小。於。寸。右。弱。於。左。色。天。而。血。黧。宜。桂。枝。散。加。肉。桂。以。中。理。

湯。八。間。服。若。果。受。寒。氣。食。冷。物。血。得。寒。則。凝。不。歸。經。絡。色。必。黑。黯。脈。必。沈。遲。身。必。清。涼。若。此。者。不。用。薑。桂。而。用。涼。血。之。劑。殆。矣。吐。血。論。治。咳。血。嘔。血。咯。血。唾。血。噎。血。附。

吐血。陽。亢。陰。虛。症。也。症。有。三。因。外。因。係。火。風。暑。燥。之。邪。內。因。係。肝。腎。心。脾。之。損。不。內。外。因。係。墜。跌。努。力。烟。酒。之。傷。外。因。者。火。灼。風。溫。之。嗜。血。暑。瘵。燥。致。之。傷。血。邪。在。肺。衛。心。營。理。肺。衛。宜。甘。涼。肅。降。如。參。麥。冬。貝。母。花。治。心。營。宜。輕。清。滋。養。如。生。地。元。參。丹。參。以。此。二。法。粉。玉。竹。石。斛。治。心。營。宜。輕。清。滋。養。如。生。地。元。參。丹。參。以。此。二。法。為。宗。隨。症。加。減。火。灼。則。加。入。苦。寒。如。山。梔。黃。芩。風。溫。則。參。以。甘。涼。如。蔗。汁。蘆。根。暑。瘵。入。營。則。兼。清。潤。如。杏。仁。銀。花。燥。致。在。氣。則。佐。純。羚。羊。角。桑。葉。別。有。內。熱。外。寒。吐。血。者。宜。麻。黃。參。此。治。客。感。吐。血。大。甘。如。天。冬。梨。別。有。內。熱。外。寒。吐。血。者。宜。麻。黃。參。此。治。客。感。吐。血。大。

類證治裁 卷之二 吐血

暑。也。內。因。者。怒。動。肝。火。宜。苦。辛。降。氣。如。蘇。子。鬱。金。降。香。丹。鬱。損。肝。陽。宜。六。鬱。損。肝。陰。宜。甘。酸。熄。風。如。阿。膠。雞。蛋。黃。思。傷。心。脾。宜。甘。溫。益。營。如。保。元。湯。房。勞。傷。腎。其。陰。虛。失。納。者。宜。壯。水。鎮。陽。青。鉛。六。味。牛。膝。歸。脾。湯。房。勞。傷。腎。其。陰。虛。失。納。者。宜。壯。水。鎮。陽。青。鉛。六。味。童。便。陽。虛。不。攝。者。宜。導。火。歸。窟。肉。桂。七。味。奪。精。亡。血。者。急。固。真。元。大。填。精。血。如。人。參。海。參。熟。地。河。車。此。治。內。損。吐。血。大。畧。也。不。內。外。因。者。墜。跌。血。瘀。上。泛。先。須。導。下。復。元。活。血。湯。代。抵。當。再。用。通。補。元。四。物。湯。或。當。歸。鬱。鬱。若。努。力。傷。血。調。補。忌。用。凝。滯。宜。和。營。通。絡。理。虛。金。牛。膝。白。芍。三。七。若。烟。酒。傷。肺。胃。皆。能。助。火。動。血。倉。血。改。定。當。歸。建。中。湯。旋。覆。花。湯。若。烟。酒。傷。肺。胃。皆。能。助。火。動。血。倉。血。改。定。或。六。味。飲。加。牛。膝。杜。仲。若。烟。酒。傷。肺。胃。皆。能。助。火。動。血。倉。血。改。定。茸。湯。去。飲。多。傷。胃。失。血。香。砂。葛。花。此。治。不。內。外。因。大。畧。也。川。指。南。尤。加。芍。飲。多。傷。胃。失。血。香。砂。葛。花。此。治。不。內。外。因。大。畧。也。川。指。南。邵。凡。血。來。如。潮。湧。喘。息。未。定。飲。還。元。吐。血。乍。止。用。燕。窩。水。糖。各。序。

可不復發。血出汪洋。不即凝者。煩勞動胃火也。犀角地黃湯加桃仁藕汁童便。出散漫不聚者。煩勞傷肺氣也。補中益氣湯去柴胡。脇痛吐血者。肝氣逆也。化肝神勞吐血者。心氣損也。天冬龍飲升則吐。鯁驟加煎。宜潛陰火。海參淡菜龜甲心茯神熟地五味子熬膏秋石湯下。元海空則行動喘促。速固根蒂。人參核桃坎瓦杞子牛膝。胃納少則中宮乏鎮。須扶胃陽。切勿清嗽。人參建中湯。胃絡虛則厥陽易犯。急調胃陰。可免升逆。生脈散。白扁豆沙參玉竹石斛扶神。或金匱麥門冬湯。去半夏加杏仁。仁齋所謂血症經久。多以胃藥收功也。若夫肺痿吐血。人參固本膏。勞怯吐血。四陰煎。血虛發熱。當歸補血虛發瘧。十全大脾肺氣虛湯。絡脈不和。當歸髮雞血藤膏。牛血色鮮紫。吐後神疲懶言。以補氣藥攝之。獨參湯。血色晦淡。息微脈緩。

類證治裁 卷之二 吐血

為血寒不得歸經。以辛甘溫攝之。大劑理中湯。尺脈虛弦。大劑生料六其勞心動火。口津乾。能食。脈洪數。元霜紫雪膏。數吐血兩口。不渴不發熱。數月又發。胸中刺痛。小烏沈湯。吐後胸滿痛。脈洪大有力。用當皮酒大黃元明粉。從大便導之。不可驟用止瀉。不可尚行膩補。不可輕用苦寒。不可妄事攻伐。審症切脈。以調之。勿拘成法可耳。繆仲淳曰。吐血有三訣。宜行血。不宜止血。血不循經絡者。氣逆上壅也。行血令循經絡。不止自止。止之則血凝。血凝必發熱。胸脇痛病日痼矣。宜補肝。不宜伐肝。經云。五臟者。藏精氣而不瀉者也。肝主藏血。吐血者。肝失其職也。養肝則肝氣平。而血有所歸。伐肝則肝虛不能藏血。愈不止矣。宜降氣。不宜降火。氣有餘便是火。氣降

則火降。火降則氣不上升。血隨氣行。無溢上竅之患。且降火必寒涼之劑。反傷胃氣。胃氣傷則脾不能統血。血愈不能歸經矣。因欬見血。係火乘肺金。乾欬絡傷。而血滲出也。治同嗽血。嗽因嗽時氣急喘促。痰雜血絲。血點亦火傷血膜。而血隨痰出也。諸家以欬嗽血。出於肺。景岳謂欬嗽咯唾諸血。皆源於腎。以腎脈貫膈入肺。循喉。肺腎相聯。因腎水虧。則火炎燥。金肺燥。絡損液涸。成痰病之標。在肺。其本固由腎也。治主壯水清金。宜六味冬五兼潤肺止咳。宜阿膠貝母。血止後。胃虛食少。氣息不續。劫散去半夏。加紫苑。其先嗽痰。後見紅者。為積痰生熱。宜降痰火。茸及瓊玉膏等。先見紅。後嗽痰者。為陰虛火動。宜滋化源。紅水煎下。天門冬丸。

類證治裁 卷之二 吐血

六味阿膠陰虛久嗽。痰中血星如珠。生料六味丸。加茜膠飲。陰虛久嗽。痰中血星如珠。根烏鰂骨和童便。久嗽痰帶血絲如縷。六味丸加蛤粉阿膠。血潮熱。八珍湯加味。嗽血成勞。肌削神疲。五心煩熱。咽乾頰赤。盜汗減食。人參飲子。或四君湯。加黃耆。龍甲。麥冬。五味。天士先生曰。凡欬血之脈。右堅者。治在氣分。係震動胃絡所致。宜薄味調養胃陰。如生扁豆。茯苓。北沙參。薏苡仁。石斛等。左堅者。乃肝腎陰傷所致。宜地黃阿膠。脈弦脇痛者。宜蘇子。桃仁。成益。盈。梳者。葛。可久致。杞子。五味等。脈弦脇痛者。降香。鬱金等。散。仲景大黃一症。而縷析條分。從此再加分別。則臨症有據矣。黃連瀉心湯。一症而縷析條分。從此再加分別。則臨症有據矣。石頑老人曰。欬血之脈。微弱平緩。易治。弦數急實。氣促聲嘶。咽痛者。不治。咯不嗽而喉中咯出小血塊。或血點是也。症最重。由房勞傷腎。火

載血升咯血成塊。不比欬嗽痰中帶出也。亦有兼痰咯出者。係

腎虛痰泛。初起用山藥、山梔、麥冬、童便。以清手足少陽厥陰諸

經遊火。若膈熱煩紅。咽喉不清。清咽丸。後必滋補腎陰。以安其

血。六味飲加牛膝、麥冬、五味。景岳以爲心不主血。宜養。嘉言以爲陰氣上奔

宜四君湯黃耆。脾中陽氣旺而龍雷之火潛伏也。

血鮮血隨唾而出。或涎中有血。纏如絲。散如點者。多源於腎。右尺

虛者。都氣丸。右尺大者。清唾。其有兼心胃者。由脾虛不能攝也。

兼心則脾湯。兼胃則七珍。食少痰清者。異功散加批。勞嗽唾

血者。黃耆。肺痿唾血者。人參平。散。

嘔血。從腕脇嘔出。係木火乘胃所致。良由暴怒。火逆。胸滿脇痛。傷

類證治裁 卷之十一 吐血

肝動血。柴胡疏。或負重努力。傷胃動血。是齋白。或飲酒火熱。上

升嘔血。葛黃。或房勞竭力。傷腎嘔血。症必而紅。足冷。煩躁。口渴。渴

或虛勞火升。嘔血不止。花蕊。石散。

血症脈候

失血脈數大爲陽盛。濇細爲血少。細數爲陰火鬱於血中。孔爲失

血。弦緊脇痛爲瘀結。寸大尺微爲肺中伏火。尺盛而寸虛爲腎虛

陰火。尺滑而疾爲血虛有熱。右脈虛大爲脾胃火。左脈數盛爲肝

膽火。失血脈微弱細小和緩者易治。洪數實大弦急。或雖小。按之

如循。及及衄血身熱。脈至而搏。嘔血胸滿引背。脈小而疾。皆不治。

欬出白血。似肉似肺。淺紅色者死。喘欬失血。氣逆。脈見弦緊細數。

有熱不得卧者死。吐唾血脈細弱者生。實大者死。

附方

歸脾湯 見本卷勞瘵

生脈散 參 麥 五味

理中湯 參 朮 薑 草

六味七味八味丸 俱見一卷中風 六味丸加五味名都氣

麻黃人參芍藥湯 麻 桂 參 耆 歸 芍 麥 味

保元湯 見一卷火

青鉛六味飲 六味湯加青鉛

復元活血湯 柴胡 當歸 花粉 甲片 紅花 桃仁

類證治裁 卷之十一 吐血

代抵當湯 大黃 歸尾 生地 甲片 元明粉 桂

元戎四物湯 地 芍 歸 芎 加桃仁 紅花

當歸建中湯 見一卷傷風 加人參名人參建中湯

旋覆花湯 見本卷痰飲

紫菀茸湯 紫菀 茸 白朮 澤泄 丹皮 麥冬 犀角

犀角地黃湯 見一卷溫

補中益氣湯 見一卷中風

化肝煎 青 陳 芍 貝各二錢 丹 梔 澤各錢半

天冬湯 參 耆 歸 芍 地 草 二冬 遠志 阿膠

歸耆異功散 參 耆 朮 草 陳 歸 耆

胃陰肺痿勞怯血虛血虛氣虛津潤胸痛去瘀類證治裁

金匱麥門冬湯 見一卷燥

人參固本丸 見一卷中風

四陰煎 見本卷痰飲

當歸補血湯 者一兩 歸二錢

十全大補湯 見一卷中風

養營湯 見本卷勞瘵

元霜紫雪膏 雪梨六十枚 藕汁十杯 生地汁十杯 麥冬汁五杯 萊菔汁五杯 茅根汁十杯 煎去渣入煉蜜一觔 飴糖八兩 柿霜八兩 合

煎汁半杯 再蒸服

小烏沈湯 童便製香附三錢 烏藥錢半 炙草一錢 沈香五分 磨汁 加入鹽一字

黑神散 熟地 歸尾 赤芍 蒲黃 桂心 炮薑 甘草 黑豆炒去皮 童便 酒各半煎 嗽血

類證治裁 卷之二 痰

却勞散 見本卷痰嗽

瓊玉膏 見一卷燥

天門冬丸 天冬二兩 阿膠 茯苓 杏仁 貝母各五錢 蜜丸

六味阿膠飲 六味丸加 阿膠

八珍湯 見一卷中風

人參飲子 人參二錢 五味二拾粒 耆 麥 歸 芍 各錢半 甘草一錢

花蕊石散 花蕊石煨研細三錢 以童便煎溫調下 男用酒一半 女用醋一半和

大黃黃連瀉心湯 大黃 黃連

清咽太平丸 薄荷十兩 川芎 防風 犀角 柿霜 甘草 各二兩 桔梗三兩 蜜丸

養心湯 見本卷勞瘵

唾血 清唾湯 二母 桔梗 元參 黃蘗 熟地 天冬 連志 麥冬各一錢 炮薑五分 七珍散 參 苓 朮 草 者 山藥 粟米 黃耆散 炙者 糯米炒 阿膠 等分爲末米湯下三錢 人參平肺散 見一卷火 柴胡疏肝散 見本卷勞瘵 是齋白朮散 參 朮 者 芥各一錢 山藥 百合各八分 薑三片 棗二枚 葛黃散 黃連四兩 葛花三兩 用大黃末水熬成膏爲丸 或爲末服 溫湯下

類證治裁 卷之二 咯血

吐血

狀弟陰虛發熱吐衄脈洪虛疾左關尺為甚思積損幾及三年龍雷不伏直至真陰內燥肺絡受傷陰益虧陽益熾矣不從鹹降諒難猝止用秋石阿膠熟地五味山藥百合貝母丹皮白芍淡萊熬膏藕湯下紅止而損漸愈

勞怯失血尺寸脈俱洪數乃肺腎虧損用三才湯加丹皮白芍麥冬鮮藕數服血止惟喘熱欬嗽用六味丸去黃泄加五味白芍龜板多阿膠蜜丸服二料全痊

痰中血點漉後遺濁五更不夢自洩此腎陰虛相火強也六味去山黃加魚鱉炒蓮鬚兔絲餅稍佐黃藥鹽水炒蜜丸淡鹽湯

類證治裁

卷之二

吐血

七

下漸愈

韋氏喘熱嘔欬痰血此上損候也用阿膠蛤粉炒百合茯神鮮藕各錢潞參山藥白芍丹皮各二錢貝母一錢五味四分紅棗五枚二劑紅止熱漸退去丹皮阿膠鮮藕加栝蓏仁二服痰嗽亦除

初夏吐紅深秋未止或主燥火刑金或主龍雷亢逆診脈右寸短瀆左關沈弦應主鬱慮不舒由氣分傷及血絡自述每午後喉間氣窒不利則嗽作血腥夫陽主開陰主閉午後屬陽中之陰主斂而氣隧阻閉非鬱慮內因不至此用栝梗貝母木香栝蓏茯神當歸白芍降香末服二劑腕舒血止去木香降香加鬱金熟地二服脈平又服歸脾湯去耆朮加熟地貝母白芍蓮

子愈

失血三次皆由食頃今吐紅又適當飯時自係食入氣阻胃管滯血故咽津時腕間若噎也診脈各部俱弦宜調其逆氣兼彌其滲絡用栝蓏貝母當歸玉竹阿膠紅棗服愈後頻服牛乳永不發

立冬後陽伏地中龍潛海底今值冬至陽始生而龍已不藏致五夜陽升灰痰帶血右尺不平此知藥八味丸症也又夙有肝氣左脇刺痛則龍雷交發矣初服壯水潛陽痰血已減繼服加減歸脾湯左脇痛止灰痰亦少血絲淡而若無脈症將愈兆也昨診惟肝脈稍弦左尺強於右是水尙能制火從此平心靜

類證治裁

卷之二

吐血

七

攝戒怒節慾明春木火不至偏旺則痊平可冀熟地水炒丹皮酒炒澤瀉鹽水炒茯苓乳蒸山藥炒遠志甘草汁炒白芍炒女貞子藕粉淡萊牡蠣煨煉蜜丸服

蔣氏小產後痰嗽帶血喘寒宵熱食減肌削脈小弱此病損已久胞系不固胎墮後營衛益傷宜倣立齋先生治法以甘溫補陽則寒熱可減近人專事杏貝希冀嗽止恐寒涼損脾反致不效用潞參山藥茯神炙草阿膠白芍五味杞子蓮棗數服頗安再加黃耆鹿角霜數服諸症漸止飲食漸加又丸方調理得痊荆氏高年食後觸怒氣升血湧洞瀉稀水身熱背寒心煩頭眩經云怒則氣逆甚則嘔血及殮世故令氣上症由肝陽鬱勃震傷

血絡疏泄太甚木必侮土胃中水穀不化更兼暑濕司令地氣
泛潮故下迫暴注氣上故中脘失寬主以降逆佐以除滿則血
歸經而胃自和用厚樸製山梔炒鬱金磨蘇梗茯苓薏苡砂仁
降香枳壳一啜微汗前症若失

戴氏情志內損火迫絡傷嗽血補寒宵熱脈右虛左數營損衛怯
先以膩潤彌絡育陰和陽待夏至陰生陽不加灼復元可望阿
膠化水生地炒麥冬各一錢茯神三錢杞子山藥甜杏仁俱炒丹皮石
斛各錢五味分六服諸症向安惟胸右微痛加白芍二錢萹皮
入痛止

王 淋症愈後遂發漏瘍必固瀉藥用早瘍醫用線藥膜管未拔

類證治裁

卷之二

吐血

三

忽咯血塊左脈虛右尺搏指此龍火不潛上為咯紅下為漏膿
勞則淋遺溺痛非壯水制陽漏后何已勢將由下損上為勞嗽
為吐衄肛漏安可平也暫服煎劑做虎潛丸加減熟地水龜膠
淡菜白芍當歸五味杞子知母黃蘗俱酒炒六服脈症平後用煉
蜜為丸加茯苓山藥丹皮牛膝鹽湯下漏瘍亦愈

史氏胸痛嘔血色兼紅紫頭眩腕脈孔微此憂思損營宜斂補
心神兼舒脾結凡離絡之血色變紫非必積瘀使然潞參茯神
白芍五味棗仁炙草當歸醋炒合歡花鬱金木香俱磨三服已安
調理尋起

衄血論治 口鼻衄 耳衄 眼衄 齒衄 舌衄 肌衄

血從清道出於鼻為衄症多火迫血逆亦有因陽虛致衄者火亢
則治宜清降生地黃飲陽虛則治宜溫攝理中湯既於脈之洪滑
弦細別之暴衄則治須涼瀉犀角地黃久則治須滋養止衄散
更以血色之鮮濃暗淡辨之且火迫致衄有六淫之火有五志之
火如風寒壅盛於經迫而妄行表症仍在脈浮麻黃湯成氏
謂此非治衄仍以散邪仲景固言衄不可汗也若感溫熱風暑而
衄者宜辛潤清涼如杏仁丹皮山梔茅花丹參鮮地黃
極而衄者宜苦寒鹹寒如黃連黃芩山梔枳殼此治衄外因也其
思傷心脾驚悸不眠歸脾勞傷元氣欬嗽發熱補中益氣湯去白
當歸補血湯生地丹皮白芍山梔怒傷肝陰火冒頭暈阿膠甘菊鮮桑葉慾傷腎精
加薄荷杏仁都氣丸加杞若火不歸源喘促煩躁脈微肢
陰虛失納上喘下遺子兔絲餅厥入味地黃陰虛陽浮六味飲加秋石衛虛營損氣短色枯養營
氣衰血脫神疲昏憤獨參胃火血升犀角地黃此治衄內因也其
酒升血沸面赤汗多四生努力負重傷中損絡保元湯此治衄不
內外因也若衄多服涼劑不止係內虛寒而外假熱千金當衄久
不止熱在下焦血分六味飲加衄久成勞照虛損治病後小勞屢
衄石膏牡衄後屢發或洗面即衄並以茅花煎湯衄血未淨停瘀
入胃致面黃尿黑地黃湯大衄而頭痛口渴煎大衄不止面
目浮腫蘇子降使血隨氣下得力全在肉凡久衄須加氣藥如木

類證治裁

卷之二

衄血

三

當歸補血湯生地丹皮白芍山梔怒傷肝陰火冒頭暈阿膠甘菊鮮桑葉慾傷腎精
加薄荷杏仁都氣丸加杞若火不歸源喘促煩躁脈微肢
陰虛失納上喘下遺子兔絲餅厥入味地黃陰虛陽浮六味飲加秋石衛虛營損氣短色枯養營
氣衰血脫神疲昏憤獨參胃火血升犀角地黃此治衄內因也其
酒升血沸面赤汗多四生努力負重傷中損絡保元湯此治衄不
內外因也若衄多服涼劑不止係內虛寒而外假熱千金當衄久
不止熱在下焦血分六味飲加衄久成勞照虛損治病後小勞屢
衄石膏牡衄後屢發或洗面即衄並以茅花煎湯衄血未淨停瘀
入胃致面黃尿黑地黃湯大衄而頭痛口渴煎大衄不止面
目浮腫蘇子降使血隨氣下得力全在肉凡久衄須加氣藥如木

香附 所以引血歸經耳。

口鼻 血出口鼻屬肺脾二經。積勞傷脾。補中益氣湯。倍者歸。如不

耳 血出耳竅屬肝腎二經。暴厥腫痛。左關弦數。多肝經風火沸騰。

柴胡清 肝散。若常有點血。不腫痛。尺中沈數。多腎經陰虛火升。生料

丸。加五味。元參。外用。龍骨煨研。吹入即止。

眼 血出目眦屬肝火迫絡損系。若猝視無視。滋陰地黃。常流血淚。

駐景丸。外以炒黑。槐花末。研敷眼角。

齒 血出齒縫。牙齦屬胃腎二經。少陽入下齒。陽明火盛。必口臭。牙

齦腐腫。飲甘露。或血湧齒不搖。必酒食炙煇積熱。清胃散。外

氣湯。調胃承。陽明風壅。齒齦微腫。或牽引作痛。散。消風

出。係腎陰不固。虛火偶動。山梔赤芍。若隱隱作痛。係陽虛於下。

火炎於上。七味地黃丸。或鹽湯下。安。齦底成塊。血出。鹽湯下

血出舌上如線。或有針孔。多屬心包火。先以蒲黃煎湯漱之。內

服黃耆六一散。若舌出血如泉。塗舌丹。或川。舌脹大出血不止。

乾薑灰。生蒲。黃為末。搽。

肌 血出膚孔。屬衛氣不固。血乘陽分。脈洪。當歸六脈弱。保元。脈數。

當歸補。脈浮。黃耆建。有紅汗。色紅。染衣。黃耆建中湯。兼用妙

血湯。諸竅齊。厥總治。犀角湯。有中。毒者。童便。煩勞

傷者。補中益氣。若五臟內崩者。不治。有偏體無故血出。五花

血從上出。隨火妄行。原病式以為心火銷燬。用黃連。或偶觸破

傷。血湧不止。內服十全大補湯。外用百草霜。搽之。

心。胸前一孔。出血水。名心漏。用嫩鹿茸。去毛。酥炙。附子。炮。去皮。臍

血。出臍中。胃受火逼。不得運輸。宜熟地。當歸。白芍。丹皮。甘草。白

血。脈候。衄而。不止。脈大者。逆。脈至而搏。血衄。身熱者。死。素病。若吐衄。脈

當沈細。反浮。大而牢者。死。難。脈得。諸瀦。瀦弱。為亡血。經。脈浮。大數。

為邪。伏於經。宜發汗。大而虛。為脾虛。不能統血。宜補氣。小而數。為

陰虛。火乘。宜滋腎。弦瀦。為痰積。宜行滯。凡衄血之脈。數實。堅勁。或

急疾。不調。皆難治。久衄。脈虛。大頭。額痛。鼻流。淡黃水者。死。

類證治裁 卷之二 衄血

附方 生地黃飲子 生地 熟地 杞子 阿膠 白芍 天冬

茜根散 茜根 阿膠 黃芩 側柏葉 生地各一兩 甘

理中湯 見一卷中風

黑神散 見本卷血

犀角地黃湯 見一卷溫

七汁飲 韭汁 藕汁 鮮荷葉汁 京墨汁 側柏葉汁

止衄散 黃耆六錢 當歸 赤芍 白芍 生地 阿膠各

生脈散 參 麥 五味

麻黃湯 麻 杏 桂 草

風寒傷脾氣虛血喘逆火補火補逆喘血氣虛脾傷寒風

桂枝湯 桂芍草薑棗

歸脾湯 見本卷勞瘵

補中益氣湯 見一卷中風

當歸補血湯 炙者一兩 當歸二錢

都氣丸 見一卷火

八味丸 見一卷中風

鎮陰煎 熟地一兩 牛膝二錢 澤泄一錢五分 炙草 桂心各一錢 製附子七分 水煎冷服

六味丸 見一卷中風

養營湯 見本卷勞瘵

四生丸 生艾葉 生荷葉 生側柏葉 生地黃 搗丸如雞子大 水煎去渣服

類證治裁 卷之二

保元湯 見一卷火

千金當歸湯 當歸一錢 炮薑五分 白芍 阿膠 黃芩 各一錢半 石膏五錢 牡蠣一兩 研末酒服日三次

石膏牡蠣湯 石膏五錢 牡蠣一兩 研末酒服日三次

加味犀角地黃湯 犀角 丹犀角 再加 歸 枯 草 紅花 藕汁

玉女煎 見一卷溫

蘇子降氣湯 見本卷失音

單方 以大蒜頭搗如泥作餅如錢大貼足心左側貼右右側貼左兩孔俱貼左右俱貼即止

單方 用線紫中指中節左孔紫紫左中指右孔紫紫右中指兩孔俱紫兩指俱紫

單方 黑山梔 煨牡蠣 煨龍骨 京墨 百草霜 血餘 灰 等分 為末 用茅花水煎藥末入鼻孔立止

單方 用濕紙搭額上立止

耳眼眼眼齒齒齒齒外敷便秘風腫腎虛陽虛

柴胡清肝散 小柴胡湯去半夏枳實 加梔子 川芎 連翹 桔梗

滋陰地黃丸 二地 芩 連 參 草 歸 味 柴 枳 天冬 地骨皮 蜜丸茶下

駐景丸 杞子 車前子各二兩 熟地五兩 兔絲子八兩 蜜丸酒下

甘露飲 二地 二冬 石斛 茵陳 黃芩 枳壳 枇杷 葉 甘草

清胃散 生地四錢 升麻錢半 丹皮五錢 當歸 川連 各三錢 為末分三服

冰玉散 冰片五分 硼砂 元明粉各五錢 辰砂六分

調胃承氣湯 大黃 芒硝 炙草

消風散 見本卷失音

七味丸 六味加桂心

安腎丸 便製香附二兩 炮川烏 川椒各一兩 青鹽炒 小茴香三兩 熟地四兩 川棟子三錢 酒糊丸

類證治裁 卷之二

黃耆六一散 黃耆六兩 甘草一兩

塗舌丹 烏賊骨 蒲黃 等分 研末塗舌上

當歸六黃湯 當歸 黃耆 生地 熟地各一錢 黃芩 黃連 黃蘗 各五分

黃耆建中湯 黃耆 桂 芍 草 薑 棗 飴糖

妙香散 山藥二兩 人參 黃耆 遠志 茯苓 茯神各 一兩 桔梗三錢 甘草二錢 木香錢半 麝香 一錢

側柏散 側柏葉蒸乾二兩半 荆芥炭 人參各一兩 每 末三錢入白麪三錢調服

犀角湯 犀角汁 黃連 荊芥炭 小蘗各一錢 生龍骨 八分 黃芩錢半

五花湯 水蘆花 紅蓼花 槐花 茅花 白雞冠花 人參 等分 水煎入側柏葉汁和服

黃連瀉心湯 大黃 黃連

益血身偏

溢血 十全大補湯見一卷中風

類證治裁

卷之二

吐血

九

類證治裁 卷二

衄血

族子勞力傷陰口乾鼻衄頰赤神疲是冬陽不潛當春脈洪肺熱
係引動溫邪先治溫後治勞黑山梔生地白芍丹皮麥冬沙參
元參蔗汁三服脈洪已退鼻衄亦止而右尺不靜龍眼未熄宜
滋陰潛陽六味丸料去澤泄加龜板淡菜五味白芍煎服十劑
效

蕭 去秋陰瘧病延今夏三日兩發熱重寒輕鼻衄左孔膝脛熱
蒸乃腎陰下虧膽火上冒仍用柴防升動致汗多渴眩鼻衄不
已皆誤藥貽咎生地丹皮山梔知母酒炒牛膝酒蒸白芍烏梅桑葉
三四服病已嗣此多服六味丸以滋下元

類證治裁

卷之二

衄血

九

呂氏暑熱煩勞下崩上衄屢次暈絕肢冷胸溫醒後脇滿心忡
驚汗不寐脈虛托此心肝血失所統而氣隨血脫也急須固氣
以攝血乃陰從陽長之理用洋參五錢扶神三錢棗仁龍骨各二錢
甘草錢半龍眼五枚小麥二合五味八分三劑神安熟寐逾日血仍至復
暈而甦用理中湯加荆芥醋炒數服得止

王 春初鼻衄口乾惡熱由努力傷絡血凝氣聚臍左板硬如掌
腕痞不容側臥脈左大右小肝乘絡傷應地氣上騰直犯清道
先進緩肝降逆俟衄止再商理瘀黑山梔鬱金萸仁白芍阿膠
水當歸醋炒麥冬丹皮炙草一服甚適三服衄止脈左斂原方去
芍膠歸草加牡蠣降香牛膝歸鬚桃仁二服便下瘀黑腕腹俱

九九

寬蓋血以下行為順上行為逆故降逆佐甘緩理於佐軟堅

宗 而蒼赤體質陰虛病後微熱牙齦血衄成塊隨咽下不痛不

腫治用滋腎以潛龍火熟地水黃蘗酒茯苓丹皮牛膝蒸煎湯

冲真藕粉二服外用青鹽青黛石膏研細敷齒巖木日而衄止

王 當春大軋由情志拂逆膽火上迫致血直犯清道昏眩不時

速用清降以遏少陽升逆之威羚羊角黑山梔丹皮阿膠生地

鮮桑葉二服衄止脉來小瀉糶糊胸際隱痛時足腫由備作

傷陽元氣不振懼其過勞輒發法宜和補脾陽潞參白朮炙草

扶神白芍當歸醋鬱金汁數服愈

類證治裁

卷之二

衄血

△

汗症論治

汗為心液腎主五液故汗出皆由心腎虛致之有自汗有盜汗自

汗屬陽虛盜汗屬陰虛自汗者不因勞動不因發散澹然自出由

陽虛不能衛外而固密也盜汗者寐中竊出醒後倏收由陰虛不

能內營而斂藏也陽虛自汗治宜補氣以衛外陰虛盜汗治宜補

陰以營內固衛則表氣實而腠理不疏填營則裏真固而陰液不

洩條其治法表虛自汗失斂補陽裏虛盜汗有熱益陰表裏不固

汗出黃耆氣虛而陽弱者必自汗者附湯凡陰虛而火蒸者多

盜汗當歸地黃湯陽虛者陰必乘多發厥自汗黃耆建中湯

陽必湊多發熱盜汗當歸六黃湯陽蒸陰分則此從乎表裏陰

類證治裁

卷之二

汗

△

陽為治也然自汗有屬腑臟者經云飲食飽甚汗出於胃驚而奪

精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦

汗出於脾如胃熱食則汗出如洗二甘湯或飲酒漏風汗出如浴

白朮肺虛肺易疏泄玉屏心虛神不安珠砂安神丸腎虛元府

不開六味丸肝脾虛精血久耗三陰士材亦云肺虛者固其皮毛

黃耆六心虛者益其血脈當歸六腎虛者助其封藏五味脾虛者

壯其中氣補中益肝虛者禁其疏泄白芍此從乎腑臟為治也其

盜汗乃睡中自泄參苓水火不交心腎陰陽偏勝黃耆虛損心惕

柏子仁湯至如病後氣血俱虛自汗十全大產後血脫孤陽無依

牡蠣散獨參凡津脫者汗大泄大補元煎痰盛者汗自流理中

湯。發汗過劑。血虛成症。防風當歸湯。汗多亡陽。身冷拘急。桂枝加附子湯。若夫

風濕相搏。時自汗出。防已黃耆湯。惡風自汗。桂枝湯。傷寒陽明少陽症。盜

汗。柴胡湯。葛根湯。溫熱症。三陽合病。目合則汗。白虎湯。額汗濕熱。上蒸或

血高。胃口迫。其津液致之。畜血。頭汗。劑頭而還。犀角地黃湯。頭汗小便

不利。渴而不飲。此血瘀。膀胱也。桃仁承氣湯。胃熱上蒸。額汗發黃。小水

不利者。五苓散。加茵陳。甚傷寒。脇痛耳聾。寒熱口苦。頭汗劑頭而

還。屬少陽。小柴胡湯。加桂枝。少陽挾熱。或為盜汗。或腋汗。脇汗。須

知從陰陽交互時。及陰陽交互處。發泄者。皆陰陽不和。半表半裏

症。小柴胡湯。皆合劑也。外有頭汗。頭者。諸陽之會。邪搏諸

道。遙散。皆合劑也。外有頭汗。頭者。諸陽之會。邪搏諸

還屬血症。四物湯。濕邪搏陽。亦汗出。頭額。參用勝濕湯。水結胸。無大熱

亦汗出。頭額。扶苓湯。陽明胃實。亦汗出。頭額。調胃承氣湯。胃腑熱蒸

手足自汗。亦陽明病。當下。大柴胡湯。心液盜汗。久不止。參歸

津津自汗。名心汗。補心陰。囊汗。為腎虛有濕。安腎主之。兩腋汗。腳

心。肝為濕熱流注。牡丹。主之。有血汗。因膽經熱。血妄行。與少陰氣

併奪命。產後血汗。獨皮。有黃汗。因汗出。浴水濕熱。內鬱。者陳。一切

汗出。不止。外治法。散。紅粉。惟珠汗。不流。汗出。如油。額汗。如雨。喘促。肢

冷。皆陽脫不治。

經曰。陽有餘。為身熱。無汗。陰有餘。為多汗。身寒。又曰。血與汗異名

而同類。故奪血者。無汗。奪汗者。無血。註云。奪者。迫之使出也。又曰。

腎病者。寢汗。憎風。寢汗。即盜汗也。

東垣曰。凡內傷自汗。補中益氣湯。稍加附子。其效如神。但升少用。兼

蜜炙。以抑其升發。暴悍之性。又欲其引參耆等味。達肌表也。

凡服止汗固表藥。不應愈。斂愈出者。只理心血。以汗乃心液。心不

攝血。故溢為汗。大補黃耆。微熱者。加右歸。當心汗。為思慮傷脾。補心

凡久病不愈。必氣血兩虛。自汗熱不退。補中益氣湯。加川芎。如便燥

自汗熱不退。屬陰血。六味地黃湯。如病陽虛。熱極自汗。而解汗後

又熱汗出。如水。此陽被汗散。發泄在外。而不歸元。保元湯。加浮麥。

子煎。如心神不安者。神安。凡虛陽上攻。必求下達。使陽氣回元。

凡汗症。有陰陽。陽汗者。熱汗也。陰汗者。冷汗也。汗之冷者。以其陽

氣內虛。陰中無陽。而汗隨氣泄。凡大驚恐。及病後產後。失血後。多

有汗出。是皆陽氣消耗。真元失守候也。故經曰。陰勝則身寒。汗出

又曰。極寒反汗。出身必冷。如冰。是皆陰汗之謂。治必扶其正氣。其

汗乃止。若虛甚者。非速救真元不可。葛桂附子之

凡病不當汗。而誤汗。或當汗。而汗之過劑者。皆汗多亡陽之症。是

亦陰症之屬。當察其虛之或微。或甚。微虛者。三陰煎。或五陰

者。非用大補元煎。六味。不可。凡衛虛不固。腠理不密。而易汗者。是

亦陰症之屬。宜黃芪六一湯。或者附湯。

醫通曰。病後氣血俱虛。而汗服諸止汗藥。不應。用十全大補湯。半

劑。加熟棗仁五錢。若胸臆煩悶。不能勝陰藥者。生脈散。加黃耆二

錢。當歸六分。熟棗仁三錢。一服即驗。夏月汗止。半身由氣血不

充內挾寒飲偏枯及天之兆也。用大劑十全大補湯。人參養營湯。大建中湯。加行經。若元氣稍充。即間用命湯。一劑以開發其表。或防已黃耆。湯加以散其濕。此症雖屬血虛。不可用四物。以其閉滯經絡故也。丹溪曰。自汗大忌生薑。以其開腠理也。凡有汗一切辛辣之味。五辛之屬均忌之。

汗症脈候
寸微尺緊。虛損多汗。肺脈奕而散者。病瀉汗。平人脈虛微細者。盜汗。出自汗在寸。盜汗在尺。脈盛汗出。病不衰者。死。汗出而脈脫者。不治。

附方

類證治裁

汗

益

補陽湯 參 耆 朮 草 五 味 虛 加 附 子

益陰湯 黃 耆 地 骨 皮 蓮 子 虛 加 人 參 山 藥 澤 瀉 燈 草

黃耆湯 耆 一 錢 地 麥 味 防 風 各 八 分 歸 草 各 七 分

耆附湯 耆 附 各 二 錢 薑 十 片

當歸地黃湯 歸 芍 芩 朮 知 母 浮 麥 陳 草 人 參

黃耆建中湯 見本卷血

當歸六黃湯 見本卷血

二甘湯 生 甘 草 炙 甘 草 五 味 烏 梅 薑 棗

牡白散 煨 牡 蠣 白 朮 防 風 各 二 錢

白朮散 白 朮 一 兩 二 錢 五 分 防 風 一 兩 五 錢 牡 蠣 三 錢

玉屏風散 見一卷中風
硃砂安神丸 黃連五錢 炙草 生地各三錢半 當歸二錢半 硃砂一錢半
天王補心丹 見一卷火
六味丸 見一卷中風
還少丹 見一卷中風
三陰煎 歸 地 參 耆 芍 味 草 棗 仁
黃耆六一湯 耆 六 錢 草 一 兩 煎 服
五味子湯 五 味 子 山 黃 龍 骨 牡 蠣 何 首 烏 遠 志
補中益氣湯 見一卷中風
白芍湯 白 芍 棗 仁 烏 梅

類證治裁 卷之十一 汗
心腎丸 參 耆 歸 地 芩 味 牛 膝 菴 菴 兔 絲
柏子仁湯 柏 子 仁 山 藥 鹿 茸 附 子 龍 骨 遠 志
牡蠣散 黃 耆 麻 黃 根 牡 蠣 小 麥
十全大補湯 見一卷中風
大補元煎 見一卷中風
理中降痰湯 參 朮 薑 草 名 理 中 湯 此 加 苓 夏
防風當歸湯 防 風 歸 地
桂枝加附子湯 桂 枝 芍 草 薑 棗 名 桂 枝 湯 此 加
防已黃耆湯 見一卷濕

濕風陽亡瘧汗汗痰脫津後病汗斂揚心腎心汗盜類證治裁 卷之十一 汗
心腎丸 參 耆 歸 地 芩 味 牛 膝 菴 菴 兔 絲
柏子仁湯 柏 子 仁 山 藥 鹿 茸 附 子 龍 骨 遠 志
牡蠣散 黃 耆 麻 黃 根 牡 蠣 小 麥
十全大補湯 見一卷中風
大補元煎 見一卷中風
理中降痰湯 參 朮 薑 草 名 理 中 湯 此 加 苓 夏
防風當歸湯 防 風 歸 地
桂枝加附子湯 桂 枝 芍 草 薑 棗 名 桂 枝 湯 此 加
防已黃耆湯 見一卷濕

少陽 三陽 陽 陽 陽 陰 陽 濕 邪 濕 理 濕 結 胸 胃 實 陽 明 心 汗 腎 虛 外 治 血 產 汗 血 汗 黃 汗 外 治

小柴胡湯 見一卷溫

葛根湯 葛根 麻黃 薑 桂 芍 草 棗

白虎湯 見一卷中風

犀角地黃湯 見一卷溫

桃仁承氣湯 見一卷疫

五苓散 見一卷溫

茵陳蒿湯 見一卷濕

逍遙湯 見一卷火

勝濕湯 茅朮 厚樸 半夏 藿香 陳皮 甘草 薑

調衛湯 麻黃根 黃耆 羌 麥 地 歸 草 芩 夏

類證治裁 卷之二 汗

小半夏加茯苓湯 見本卷痰飲

調胃承氣湯 大黃 芒硝 甘草

大柴胡湯 見一卷溫

參歸腰子 人參 當歸各五錢 豬腰一個 煮 再蒸

安腎丸 蘆巴 補骨脂 川棟子 茴香 續斷各一兩半

牡蠣丹 牡蠣粉 黃丹各二兩 枯礬四兩 研擦

奪命散 硃砂 寒水石 麝香 等分每服五分 又名定

狷皮湯 狷皮燒灰 米飲下 狷肉煮食更妙

耆陳湯 石膏 耆 芍 麥 豉 草 茵陳 薑

紅粉散 麻黃根 煨牡蠣各一兩 赤石脂 龍骨各五錢

補虛 大補黃耆湯 參 耆 朮 草 芍 歸 黃 地 苳 蓉 各

三兩 薑 棗 生脈散 見一卷暑

保元湯 見一卷火

六味回陽飲 見本卷欬嗽

人參養營湯 見本卷勞瘵

大建中湯 蜀椒 乾薑 人參 飴糖

小續命湯 見一卷中風

表發 飲寒 枯偏 虛補 元培 血陰

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

類證治裁 卷之二 汗

脫症論治

生命以陰陽為樞紐。陰在內。陽在外。陰之使。陽互根。相抱不脫。素問所謂陰平陽秘。精神乃治也。若夫元海根微。精關直泄。上引下竭。陰陽脫離。命立傾矣。靈樞云。精脫者耳聾。氣脫者目不明。津脫者腠理開。汗大泄。液脫者骨屬屈伸不利。色天。腦髓消。脛痠耳數鳴。血脫者色白。天然不澤。其脈空虛。難經云。脫陽者見鬼。脫陰者目盲。嘉言喻氏又分上脫下脫。上下俱脫。今詳斯症。總由陰陽樞紐不固。如上脫者喘促不續。汗多亡陽。神氣亂。魂魄離。即脫陽也。下脫者血崩不止。大下亡陰。交合頻。精大泄。即脫陰也。上下俱脫者。類中眩仆。鼻聲斷絕。汗出遺尿失禁。即陰陽俱脫也。

類證治裁

卷之十一

脫

公

更有內閉外脫者。癩厥神昏。產後血暈等症。是也。治法在未脫之先。審其元陽欲絕者。於回陽劑中兼引陰。參附湯用真陰欲絕者。於攝陰劑中兼固陽。固陰煎其心神浮越。起臥不安者。招集潰散之陽。龍蠟救逆湯。去桂薑芩。脈微垂絕。氣短汗出者。收拾虛耗之金。生脈散。或血脫者益氣。吐衄不止。獨參湯。精脫者填營。救脫湯。人參飲子。血脫者益氣。加參三七童便。津脫者實衛。亡陽魂離者鎮肝。身外有身。崩中者固下。血漏暴注。汗收汗液脫者滋陰。血枯成癆。加喘促而吸入短者資化源。續都氣丹。類中而神昏者息風。火飲子。去桂附巴戟。至於內閉外脫。如癩厥神識不醒。暫用豁痰。鮮菖蒲根汁。產後血暈未甦。急為開竅。外燒鐵器。淬醋熏鼻。或燒蘇合香嗅氣。凡諸暴脫。或孤陽無根。竅內灌清魂散。若血閉用獨聖散。參蘇飲。

而陰失所繫。或精血驟去。而神失所依。洵有如喻氏所見。壯歲無病。一笑而逝。少年交合一注。而傾者。不早尋解。漏而緘固之。其能拯危於一綫也哉。

附方

參附湯 參 附 薑

固陰煎 參 地 黃 味 山 藥 蓮 志 炙 草 兔 絲 餅

龍蠟救逆湯 龍 骨 四 兩 牡 蠣 五 兩 炙 草 二 兩 大 棗 十 二 枚 桂 枝 薑 蜀 漆 各 三 兩

生脈散 見一卷暑

人參飲子 見本卷血

救脫湯 人參三兩 附子一錢 黃耆三兩 熟地 麥冬 各一兩 五味子一錢

類證治裁

卷之十一

脫

公

定魂丹 參 苓 歸 朮 麥 柏 子 仁 棗 仁 遠 志 白 芥 子 丹 砂 龍 齒 香 各 一 兩 三 七 根 末 五 錢 水 煮

安崩湯 參 朮 地 各 一 兩 炙 仁 五 錢 五 味 三 錢

收汗丹 參 耆 麥 地 各 一 兩 炙 仁 五 錢 五 味 三 錢 當 歸 五 錢 甘 草 一 錢

加減四斤丸 熟地 五味 茯苓 牛膝 木瓜 天麻 鹿茸 兔絲子

都氣丸 見一卷火

地黃飲子 見一卷中風

至寶丹 見一卷中風

清魂散 人參 甘草 川芎 澤蘭 荆芥

獨聖散 五靈脂半炒 半生水煎服

參蘇飲 人參 蘇木

脫

堂弟心力經營煩勞動火消殺善飢坐則手足俱顫寐則手足如
墮夢則體析為二神志恍惚呵欠氣洩右脉小弱左虛軟不受
按因操勞疲神元氣不司鎮攝若轉失氣須防暴脫食下煩饋
稍定足知中宮底柱之權急攝陽以交陰潞參茯神山藥五味
杞子白芍龍骨牡蠣俱煨 棗仁炒 三服神魂安帖諸症俱減惟
巔痛唾涎原方加嫩桑葉炒甘菊以熄肝膽風熱如益智半夏
青鹽 以攝脾涎又數服間服膏方而安 此症因其胃旺能納
尚受滋填川海參煨鴨及火腿雞蛋等皆血肉有情之品故未
及兩旬已瘥

類證治裁卷之二終

類證治裁卷之二終

類證治裁卷之三

丹陽林珮琴著

男

芝

脾胃論治

脾胃皆屬土。脾為己土。而臟腑分焉。脾為臟。胃為腑。凡臟主守。經
言胃為水穀之海。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸
於肺。通調水道。下輸膀胱。脾主為胃行其津液者也。故胃主納脾
主運。胃喜涼。脾喜燥。昔人每多混治。惟葉氏醫案謂脾宜升則健。
胃宜降則和。太陰溼土。得陽始運。陽明陽土。得陰始安。以脾喜剛
燥。胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。東垣大升陽氣。其治在

脾胃論治

脾胃

脾又言五臟以守為補。六腑以通為補。卓然有見。岫雲華氏稱其
議論超出千古。其敘葉案曰。脾胃論其詳於東垣。其中益氣升陽
諸湯。以勞倦內傷為主。故用人參以補中。蒼朮以溫燥。柴胡升下
陷之清陽。陳皮理中宮之氣滯。以太陰惡溼。而病人胃陽衰者。居
多用之得宜。效如桴鼓。若脾陽不虧。胃有燥火。則當用香嚴養胃
陰之法。凡病後熱傷肺胃津液。以致虛痞不食。舌絳噤乾煩渴不
寐。便不通爽。此九竅不和。皆胃病。豈可以升柴治乎。故先生必用
降胃之法。所謂胃宜降則和者。非辛開苦降。亦非苦寒下奪。以損
胃氣。不過甘平或甘涼濡潤。以養胃陰。則津液來復。使之通降。而
已。此即宗內經六腑者傳化物而不藏。以通為用之理也。故治胃

陰虛不饑不納。用清補。如麥冬、沙參、玉竹、杏仁、白芍、治胃陽虛。食穀不化。用通補。如人參、益氣、陳皮、厚樸、烏藥、茯苓、治脾陰虛。胸膈便難。用甘潤。如甘草、大麥、白芍、當歸、治脾陽虛。吞酸、噯腐。用香燥。如砂仁、丁香、炒朮、神麩、乾薑、治脾胃陽虛。運納俱少。食已欲瀉。用升降法。如補中益氣湯、加茯苓、治溼傷脾胃。用平胃散、或清治中氣虛。用補中益氣湯、或益氣散、治溼傷脾胃。用平胃散、或清養脾胃。當歸建治食傷。傷食惡食。當分消胃土。用生益、草果、廣查、肉神、病後調理脾元。或六君子湯。其分治合治於病情尤為允愜者矣。

白水炒用則守。生用則和。甘草炒用則補。生用則瀉。火右方分列。

脾胃大抵脾臟以守為補。胃腑以通為補。脾宜升。運胃宜通降也。其方治與飲食症參觀則備矣。

附方

- 補中益氣湯 見一卷中風
- 調中益氣湯 即補中益氣湯去歸朮加木香蒼朮
- 升陽益胃湯 六君子加蒼朮芍藥獨防柴連
- 四君湯 六君子湯
- 益黃散 陳皮一兩 青皮 訶子肉 炙草各五錢 丁香二錢
- 平胃散 見一卷溼
- 清暑益氣湯 見一卷暑

當歸建中湯 芍藥 桂 飴 草 薑 棗 當歸

參苓白朮散 參 苓 朮 薏仁 砂仁 木 草 山藥 扁豆 蓮子 桔

蟠桃果 芡實 蓮子 核桃 熟地 棗肉 用猪腰子抄

安胃飲 黃芩 石斛 澤瀉 木通 陳皮 查肉 麥芽

半夏枳朮丸 半夏 枳 朮 石膏 生地 麥冬

養胃湯 人參 蒼香 厚樸 蒼朮 各一錢 炙草 各六分 茯苓 錢二分 生薑 三片 水煎

類書治裁 卷之三 脾胃

脾胃

張 髻年寒熱肢冷食少便瀉尚作瘡治遂神疲色慘脉沈須防
慢驚急理脾陽先用理中湯少加附子手足乃溫專用異功散
加蓮棗理脾熱減瀉止

於 脇痛吞酸已止肝火悉平但中脘氣窒口燥不知饑右脉欠
和胃陰未復用沙參麥冬花粉當歸白芍栝蓰小麥蔗汁三服
得平

姜 左脉浮而鉤右弦緩腕中久痛納食稍緩乃饑傷脾絡所致
經言脾欲緩急食甘以緩之勿用平肝克伐生氣潑參當歸鬚
白芍飴糖紅棗甘草牡蠣粉糯稻根鬚降香末數劑而安

類證治裁

卷之三

脾胃

五

飲食症論治

飲以養陽。食以養陰。飲食人所以衛生。而脾胃實生之本也。胃旺
則多食不滯。過時不饑。脾運則分輸五臟。榮潤四肢。若生冷戕胃。
饑飽戕脾。中氣先餒。不宜專事消導。宜補中益氣湯。夫中氣即脾
胃沖和之元氣也。然胃氣以下行為順。脾氣以健運為能。胃強脾
弱。則消穀而便溏。脾強胃弱。則知饑而納少。故胃陽虛。飽食輒噯
者。宜溫通。如橘紅厚樸。益智枳殼。若守補則壅。白朮炮薑。脾陽虛
多食不化者。宜香燥。如砂仁丁香。木香白朮。牛黃。若膩補則滯。黃
肉。脾胃陰虛。不饑不食。口淡無味者。宜清潤以養之。如沙參扁豆
當歸白芍。麻仁。若消導則耗氣劫液。忌枳。橫查肉。傷飲惡飲。傷食
糲米大麥。仁。若消導則耗氣劫液。忌枳。橫查肉。傷飲惡飲。傷食

類證治裁

卷之三

飲食

五

惡食。嘔而腹滿。為胃寒生痰。和胃二。食填太陰。腹悶絞痛。為木鬱
食厥。急吐之。用陰陽水。燒鹽湯探。飲食留滯。脘痞腹脹者。為腑氣
不宜消導之。大和。飲冷吐利。脾元受困者。溫其寒。理中湯。或溫
下氣逆。噦呃噎膈者。開其鬱。神香散。加橘。食後動怒。脇滿而痛者。
平肝氣。柴胡枳殼。香附青。皮竹茹。半夏。食後動怒。脇滿而痛者。
肝胃不和。脉弦脘痺者。泄木安土。木瓜吳黃。白芍金橘。脾腎兩衰。
虛寒滑脫者。溫中補陽。四維散。但腎陽衰者。二神。凡嗜熱酒者。脫
必瘀血。宜鬱金。木香。丹。喜冷食者。症多中寒。宜八味。胃虛則嘔。悸
動風。宜牡蠣。白芍。茯神。人。胃實則痞滿內熱。枳實消痞丸。脾虛則
食後反飽。異功散。去甘草。脾痺則口甜畏食。佩蘭葉。胃上逆則導

其濁滯。豆豉、枳實、竹茹、橘皮、橋皮、脾下陷則升其清陽。舉元、溼傷脾胃、腹腫便難。宜兼升降。則運化宣通。厚樸、枳實、草薢、煨薑。白若飲食不甘。口苦不寐。膽熱乘脾者。宜導痰洩熱。則土鬱舒。溫膽湯去熟地。加丹皮。食已吐酸。肝逆犯胃者。宜降火洩濁。則木鬱達。山梔、桑葉、生棗、山梔。其飲食減少。有脾胃虛熱。安胃、有中氣虛寒。腸痞者。黃連瀉心湯。其飲食減少。有脾胃虛熱。安胃、有中氣虛寒。養中、有中寒虛痞。治中、有思慮傷脾。歸脾、有脾溼水瀉。加味平胃湯。有胃氣痛逆。調胃平、不能食而瘦多脾虛。宜山藥、茯苓、白朮、炙內金、砂仁、陳皮、蓮子。黃米、煎調服。善食而瘦多胃火。海黃散或用太清飲。一切食滯成積。凡日晝陽盛。穀氣易消。食可飽。暮則陰盛。穀氣難化。食宜少。夏暑秋涼。晚餐尤宜簡泊。則脾不困。胃不滯矣。

類證治裁 卷之三 飲食

補中益氣湯 見一卷中風
和胃二陳煎 夏 陳 芥 草 炮薑 砂仁 棗
大和中飲 查 樸 枳 夏 陳 乾薑 澤瀉 木香
理中湯 見一卷中風
溫胃飲 白蔻 人參 澤瀉 益智 砂仁 厚樸 甘草
神香散 丁香 蔻仁 薑黃 黃耆 陳皮
葛花解醒湯 見一卷溼
四維散 人參 四兩 附子 炮薑 各二錢 烏梅 五分 炙
二神湯 故紙 肉蔻 棗肉 薑汁 加吳茱 五味 名

八味理中丸 理中加茯苓 麥芽 神麴 砂仁
枳實消痞丸 枳實 黃連 各五錢 厚樸 四錢 芥 木
生薑瀉心湯 芥 連 參 草 夏 乾薑 生薑 大棗
異功散 見一卷中風
小承氣湯 見一卷溫
舉元煎 參 耆 各三錢 朮 草 各一錢 升麻 五分 薑
溫膽湯 見一卷溫 加入人參 遠志 棗仁 熟地 名十
戊己丸 黃連 吳茱 白芍
黃連瀉心湯 黃連 酒炒 水煎服
安胃飲 見本卷脾胃

類證治裁 卷之三 飲食

養中煎 參 苓 薑 草 山藥 扁豆
治中湯 參 朮 薑 草 青 陳 半 加生薑
歸脾湯 見二卷勞瘵
平胃散 見一卷溼 加扁豆 木通 名加味平胃散
胃苓湯 見一卷中風
調胃平氣湯 見一卷中風
瀉黃散 見一卷火
太清飲 知母 石斛 木通 各一錢半 石膏 三錢 麥冬
消食丸 附各二兩 神麴 麥芽 蘿蔔子 青皮 陳皮 香
參水膏 人參 白朮

嘔吐論治

嘔吐症。胃氣失降使然也。而多由肝逆衝胃致之。蓋樞謂足厥陰所生病者。胸滿嘔逆是也。夫胃司納食。主乎通降。其上逆而嘔吐者。乃肝邪犯胃。或胃虛肝乘。故治嘔吐必泄肝安胃。用藥主苦降。辛通。佐以酸泄。其肝陽上亢。食入嘔吐者。用苦辛降逆。如黃連。川芎。半夏。厚樸。或苦酸泄熱。如烏梅。白芍。木瓜。枳實。左金丸。戊己湯。其胃陽衰。風木乘克。食入不變者。用溫胃平肝。如人參。乾薑。丁香。香半。夏。能運化。腹脹痛嘔者。用辛溫行滯。益砂。六君。湯。加其胃虛。客氣上逆。噫噎欲嘔者。用鹹以軟痞。重以鎮逆。旋覆代赭。湯。加二陳。其中陽虛。濁陰犯胃。吐黑綠苦水者。用辛熱開濁。理中湯。加川椒。半。夏。附子。茯苓。之屬。其肢冷脈微。

類證治裁

卷之三

嘔吐

人

時吐清水者。用辛熱扶陽。附子。理中。湯。其肝火鬱熱。吞酸吐酸者。用辛鹹苦降。左金丸。或鹽炒。吳茱萸。湯。去毒。其胸痞痰阻。食已漾漾欲吐者。用辛泄。生薑。瀉心。湯。或二陳。其肝厥上逆。腕痛嘔涎者。用辛通。佐以酸泄。湯。加薤仁。吳茱萸。汁。其因驚怒動肝。致脇痛乾嘔而液虛者。用辛通。烏梅。白芍。半。夏。其因驚怒動肝。致脇痛乾嘔而液虛者。用辛通。潤補。冬。青皮。白芍。當歸。其支飲。湯水下咽嘔吐者。用辛泄。小。半。夏。其肝陰胃津兩虛。肝風擾胃嘔吐者。用柔劑。滋液熄風。養胃。如。芍。麥。冬。阿膠。小。麥。半。夏。其肝風犯胃嘔吐眩暈者。用苦酸以和陽。黃。夏。茯苓。梗。米。之。屬。其嘔傷胃津熱邪乘胃。食入即吐者。用辛涼化痰。溫。連。白。芍。烏。梅。其嘔傷胃津熱邪乘胃。食入即吐者。用辛涼化痰。溫。壯。嬌。之。屬。其氣衝膈。欬吐逆者。肝火上凌。過胃犯肺。用清肅苦降。如。蘇。山。梔。栝。樓。仁。降。香。末。其氣衝心痛。饑不欲食。吐蚘者。用苦辛酸以。

伏蟲。理中安。蚘厥者。臟寒蚘上入膈。口乾心煩。手足冷。脈沈遲。宜寒熱互用。酸苦雜投。烏梅。臟厥者。陽氣垂絕。痛嘔不納。躁擾不安。安胃丸。或半。夏。其久嘔致傷肝腎。并衝脈上逆者。用溫通柔潤。如。藜。藜。荅。當。歸。杞。子。桂。其厥陰濁邪上攻。痛從少腹逆衝為嘔者。用。心。沙。苑。子。鹿。角。霜。其厥陰濁邪上攻。痛從少腹逆衝為嘔者。用。辛。溫。泄。濁。如。吳。茱。萸。小。茴。桂。其嘔而絕粒者。取生鷲。每食必吐者。羊。血。熱。皆立止。

集諸名家嘔吐噦治法

有聲有物為嘔。有物無聲為吐。有聲無物為噦。昔人以嘔屬陽明。吐屬太陽。噦屬少陽。乾嘔。東垣以三者俱屬脾胃虛。潔古從三焦。分別三因。上焦在胃口。主納。中焦在中脘。主腐熟水穀。下焦在臍。

類證治裁

卷之三

嘔吐

九

下主出而不納。上焦吐者。因於氣。食已即吐。渴欲飲水。治當降氣。和中。中焦吐者。因於積。或先痛後吐。或先吐後痛。治當去積和氣。下焦吐者。因於寒。朝食暮吐。暮食朝吐。潮清便閉。治當通其閉。溫其寒。後人又分隨食隨吐為嘔。小。半。夏。食入乃吐為暴吐。生。薑。橘。已後吐為嘔吐。橘。皮。半。夏。湯。枳。桔。食久乃吐為反胃。金。花。丸。食再而吐者為翻胃。紫。沈。旦食暮吐。暮食朝吐。下焦病。半。夏。生。薑。食下久暫。分上中下。腕而治者也。古法嘔吐氣壅。穀不得下。小。半。胃虛。穀氣不行。嘔而液傷。大。半。胸滿食穀欲嘔。吳。茱。萸。腸鳴。半。夏。瀉。嘔而思水。飲停膈上。散。乾嘔。噦。手足厥。橘。皮。嘔逆。虛熱。橘。皮。竹。噦逆。虛寒。半。夏。乾。乾嘔。胃口有痰。二。陳。湯。寒吐者。肢。

冷脈細。二陳湯加丁香炮薑。熱吐者煩渴脈洪。二陳湯加梔連竹。根。客寒犯胃。湯。肝火入胃。丸。左金。由脾氣鬱結。加吳萸。由肝脾鬱。滯。香砂六。怒時飲食嘔吐胸滿膈脹。關格不通。二陳湯加青皮木。薤白。由痰積者遇寒輒發。乾薑半夏陳皮。由食滯者消導乃安。山查麥芽神麴陳皮。先吐後瀉。身熱腹悶名曰漏氣。因上焦傷風。枳殼厚樸砂仁雞金。吐後瀉。身熱腹悶名曰漏氣。因上焦傷風。門冬。二便不通。氣逆不續。名曰走哺。因下焦實熱。吐而中氣久虛。必借穀食以和之。焦米神麴參苓苡米。吐而諸藥不效。必假重鎮。以墜之。靈砂丹。病久胃虛嘔吐者。六君湯比和飲。病後胃熱煩嘔。者。竹葉石膏。嘔苦邪在膽經。陳皮茯苓半夏。吐酸責之肝臟。挾熱。金丸加竹茹山梔白蔻生薑枳殼。嘔清水者多停飲。二木二吐涎。者左金丸加丁香乾薑白朮沈香。嘔吐。

類證治裁 卷之三 嘔吐

沫者以脾寒。六君湯加益智生薑。吐蚘蟲者或由胃冷。理中湯加。下烏。或由胃熱。安蚘。或由寒熱交錯。烏梅。或由胃虛求食。溫胃飲。梅丸。或由胃熱。安蚘。或由寒熱交錯。烏梅。或由胃虛求食。溫胃飲。凡嘔吐而心痛當作火治。口吐清水當作蟲治。心中如火當作血。虛治。

嘔吐脈候

陽緊陰數為吐。陽浮而數亦為吐。脈緊而滑者吐逆。緊而滑者難。治寸口脈數者吐。脈弱而嘔。小便復利。身有微熱。見厥者死。嘔吐。大痛色如青茶汁者死。中焦噦逆。其聲短。是水穀之病。為胃火。易治。下焦噦逆。其聲長。是虛邪之病。為陰火。難治。低聲頻密相連。為實。易治。半响噦一聲。為虛。難治。暴病發噦。必痰食血。或怒氣所。

干易治。久病發噦者多難治。

附方

左金丸 見一卷火

戊己湯 見本卷飲食

吳茱萸湯 吳萸 人參 薑 棗

香砂六君湯 六君子加 木香 砂仁

旋覆代赭湯 人參 甘草 旋覆花 代赭石 半夏 薑

二陳湯 見一卷中風

理中湯 見一卷溼

真武湯 見二卷喘

類證治裁 卷之三 嘔吐

生薑瀉心湯 見本卷飲食

大半夏湯 半夏 人參 白蜜

小半夏湯 半夏 薑

溫膽湯 見一卷溫

理中安蚘湯 參三錢 烏梅三個 薑各一錢半 川椒炒十。烏梅丸 烏梅 細辛 附子 桂枝 人參 黃蘗 當歸。安胃丸 烏梅 川椒 黃連 川附 桂枝 乾薑 黃蘗 黃連。半夏瀉心湯 見一卷溫

生薑橘皮湯 橘皮 薑

橘皮半夏湯 橘皮 半夏 薑

暴吐反胃去積通閉世飲吐厥逆散逆寒溫胃脾

枳桔湯 枳 桔 陳 樸 木香

金花丸 生南星 生半夏各一兩 天麻五錢 雄黃二錢
白麴三兩 滴水為丸 薑湯下

紫沈丸 沈香 木香 夏 砂仁 烏梅 丁香 檳榔
木香 巴霜 醋糊丸

半夏生薑大黃湯 夏 薑 大黃

猪苓散 猪苓 赤苓 白朮

橘皮湯 橘皮 生薑
橘皮竹茹湯 橘皮 竹茹 加薑汁 人參 甘草 大棗

半夏乾薑湯 半夏 乾薑 漿水煎

紅豆丸 丁香 胡椒 砂仁 紅豆各二十一粒 薑汁糊
丸 以大棗一枚去核填入一九煨熟嚼之

歸脾湯 見二卷勞瘵

類證治裁

卷之三

嘔吐

五

類證治裁

嘔吐

五

麥冬湯 麥冬 參 木 陳 苓 竹茹 甘草 蘆根
玉竹 陳米 薑

人參湯 人參 黃芩 知母 玉竹 蘆根 竹茹 白朮
梔子 陳皮 石膏

靈砂丹 見二卷喘

養正丹 硝石 硫黃各一兩研末入磁器內微火炒再研次
用飛 元精石一兩 五靈脂 青皮 陳皮各
醋糊丸 豆大每服三十九丸空心米飲下

一名來復丹 又名黑錫丹
四君湯加 陳皮 砂仁 藿香 神麴 陳米
伏龍肝 薑 棗

比和飲 橘皮 人參 丁香 藿香各二錢五分

藿香安胃散 橘皮 人參 丁香 藿香各二錢五分

竹葉石膏湯 見一卷傷風

二朮二陳湯 見二卷痰飲
溫胃飲 見一卷中風

嘔吐

叔 深秋吸受穢邪嘔吐不已先服藿香正氣散入口即吐身熱
足厥面黑眶陷或進導痰溫胃飲嘔惡不納診之脈虛少神予

謂此中宮虛極也速用潞參山藥茯苓炙草白朮橘白蘇子蓮
子紅棗煨薑粳米煎稍稍與服竟不吐思食粥矣後加減數味

調理而康

李 嫗由腰痛續得寒熱嘔吐汗出畏冷寸關脈伏兩尺動數思高
年水穀不入嘔多胃氣先傷况寸關脈不見陽氣已虛足必時

厥宜其汗出而畏冷也自述脛寒至膝乃用煨薑汁熱服嘔定
即與粥湯右脈畧起因與吳茱萸湯脈症悉平

族某胸痛食減吐酸由肝逆濁泛用吳茱萸厚樸枳實青皮半夏
茯苓為末空心日再服金橘皮泡湯下效

夏氏兩寸洪大雨關弦滑嘔逆耳鳴口乾頭暈白帶連綿症屬肝
胃不和吳萸黃連生白芍山梔半夏青鹽 茯苓蘇子枳殼薑霜
三服症平

李 脈洪大搏指口乾頻欬食後吐水頭目震眩而心悸此勞力
傷陽陽化內風上冒清道風翔則水湧胃虛則木乘故嘔眩不
已其水停膈間心必悸津不上朝口必乾氣不下降便乃秘治
先和陽降逆山梔甘菊炒冬桑葉茯苓杏仁蘇子研炒 牡蠣煨
海浮石淡竹茹前胡三服症平脈較斂其神倦者火風逆勢已

折也減甘菊桑葉加白芍茯苓神芩萸半夏潞參和肝胃以清滌痰火遂愈

族女情志怫悒頭眩頰赤夏初食入即吐脈虛小經期錯亂由肝膽火風侮胃不及傳變傾翻甚速且胃虛作呃太氣乘土久則衝脈失瀆絡傷內溢以衝為血海隸在陽明也先在苦以降逆山梔羚羊角竹茹旋覆花半夏麴柿蒂三四服眩吐止去羚羊角半夏麴加阿膠另化丹皮白芍茯苓甘草調養肝胃而經期順

類證治裁

卷之三

嘔吐

噎膈反胃論治

陽結陰潤上下格拒而噎膈反胃之症成。人身上下七門自飛門至魄門咽為吸門即會厭氣喉胃上口為賁門胃下口為幽門幽門上衝吸門其吸氣不得下歸肝腎為陰火格拒故噎膈不通甚則反胃分言之則噎者咽下梗塞水飲可行食物難入由痰氣之阻於上也膈者胃脘窄隘食下拒痛由血液之槁於中也反胃者食入反出完穀不化由胃陽之衰於下也而昔人通謂之膈黃帝鍼經云不通飲食不下丹溪云血耗胃槁槁在賁門脘痛吐食上焦膈也食下良久復出槁在幽門中焦膈也朝食暮吐暮食朝吐槁在關門下焦經云三陽結謂之膈以手太陽小腸主液足太陽膀胱主津三陽上材指大小腸膀胱金鑑指二腑熱結則津液枯燥前後津胃大小腸此據內經王註注註

類證治裁

卷之三

噎膈反胃

症

秘瀉下關既扁勢必上湧故食噎不下即下而仍出是火上行而不下降矣王太僕亦云食不得入是有火也食入反出是無火也噎膈初起多因憂恚悲悵以致陽結於上陰潤於下醫鑑云五噎也飲食猝阻不能下五膈憂悲寒食氣也心脾之問上下不通或結咽嗝時覺妨礙吐不出噎不下治宜調心脾以舒結氣去桂再加歸芍香附填精血以滋枯燥反胃初起多因土弱火衰以致朝食暮吐暮食朝吐治宜扶胃土以通陽異功益智丁香乾薑砂仁梗米益命火以蒸化丸其立法要使辛滑通痞滯貝母杏仁栝蒌批而脘痺以開甘酸化陰人參天冬麥冬蔗汁而液枯把葉韭白汁而脘痺以開甘酸化陰人參天冬麥冬蔗汁而液枯以潤或健脾理痰二陳湯加竹茹或不偏任溫燥以劫液或滋陰養血生地阿膠牛乳梨汁不偏用清潤以助痰氣滯成噎者宜理氣芝麻柿霜或四物湯

九香蠟丁香皮鬱金檀香血瘀成膈者兼通血絡桃仁紅花延
石見穿枳殼廣皮廣木香五靈脂歸尾因胃陽虛而濁痰反
胃者用通補胃腑辛熱洩濁法參苓黃芩乾薑益智因氣鬱痰阻
用苦降辛通法黃連杏仁橘紅蘇子半夏因肝鬱氣逆用兩通厥陰陽明
法當歸白芍香附半夏因酒熱鬱傷肺胃用輕劑清降枇杷葉
金橘葉前及苦辛開肺法桔梗貝母杏仁薤白其由憂思傷脾氣鬱
胡桑白皮及苦辛開肺法生薑橘紅山梔由七情鬱結胸腕拒痛脈必沈
生涎飲可下食難入香砂寬中丸由七情鬱結胸腕拒痛脈必沈
瀉七氣湯加鬱金山痰飲阻滯嘔吐翻胃脈必結清先以來復丹
括麥砂仁木香由痰血積滯傳化不變反上行者脈必孔滿滋血
大半夏湯加茯苓由痰血積滯傳化不變反上行者脈必孔滿滋血
芥子壳竹瀝由痰血積滯傳化不變反上行者脈必孔滿滋血
九加至脾氣敗血液耗胃腕枯槁溺少便秘補氣健脾丸參入滋
減

類證治裁 卷之三 噎膈反胃

乳若口吐白沫糞如羊屎不可治矣勉用薑汁杏酪白蜜醫學心
悟云開關散最效又如五汁飲以清燥利膈丸以通壅承疏散以
止吐總忌香燥破氣辛熱耗液惟一種胃陽衰不能運化者暫用
辛溫開結繼仍以益陰養胃為宜粳米人參山藥膈症生蟲用河
散有梅核膈吐不出嚥不下咽喉妨礙由氣鬱痰結由死血
昆布當歸桃有翻胃食入即翻出或痰或熱壅阻膈間非如反胃
之早食晚吐晚食朝吐也清熱二陳湯
再論噎由氣結膈由痰與氣逆或血瘀一種氣噎臨食輟箸噎阻
沫升氣平食入病在上焦肺胃間治以輕揚利膈苦降則過病所
一種痛膈食下格拒嘔涎饋痛而饑饉中焚病在中焦治以辛香

通降不效必兼理血絡一種胃槁腕系窄隘即勺飲亦妨礙由衰
年血液漸枯胃管局閉飲入則涎升淚出二便俱少開合都廢治
以辛滑潤養大忌香燥耗液剛熱劫陰此腕血失榮下咽易梗一
切礙滯閉氣食品咸宜禁忌嘗見食冷山芋而成噎者食雞子而
哽咽成膈者若再憂思鬱怒結於中而莫解情志之病尤難霍然
徐靈胎謂噎膈症十死八九反胃症十愈八九再論反胃由食久
不化腐濁上攻徹底翻瀾二腸失司傳送病在幽門以下古法多
謂胃中無陽精微不能蒸化然經云諸嘔吐逆皆屬於熱且胃津
先奪熱燥難投必細參脈症或苦降辛通宣行壅滯曾記一壯年
反胃吐食服八味湯暫止復吐食羊血得愈又沈姓年高嗜飲兼

類證治裁 卷之三 噎膈反胃

情悒不遂吐沫拒食半載未愈一老醫投藥四劑病勢減半再用
十劑料浸酒服而全愈方用大生地五錢海浮石一兩烏藥半錢牛膝靈
慈石雲苓歸身各三錢玩此方兼溫清鎮泄升降氣血性味不偏傳
者目睹治驗因附記備參
病愈後禁忌
凡噎膈反胃得藥而愈者不可便與粥飯惟以真人參五錢陳皮二
老黃米兩作湯細啜旬日後方可食粥倉廩未固便進米穀常致
不救又一年之內切忌房慾犯之必舊症復發而死
噎膈反胃脈候
緊而滑者吐逆小弱而澹者反胃噎膈反胃脈浮緩者生沈澹者

死沈瀆而小為血不足大而弱為氣不足

附方

歸脾湯 見二卷勞瘵

養心湯 見二卷勞瘵

猪脂丸 杏仁 松子仁 白蜜 橘餅各四兩 猪脂熬淨

異功散 四君加陳皮

八味丸 見一卷中風

四君子湯 參 苓 朮 草 加陳 夏 名六君子

二陳湯 陳 夏 苓 草

四物湯 地 芍 歸 芎

噎膈反胃

雲歧人參散 人參一兩煎成 加麝香 冰片各五厘 治

香砂寬中丸 薤仁 香附 青皮 檳榔 薑 蜜丸

七氣湯 見二卷欬嗽

來復丹 見本卷嘔吐

大半夏湯 參 夏 棗

滋血潤腸丸 地 芍 歸 紅花 桃仁 枳殼 大黃

補氣健脾丸 參 苓 朮 陳 夏 草 砂仁 薑

韭汁牛乳飲 見一卷燥

啟膈散 沙參 丹參各三錢 茯苓一錢 川貝錢半 薑

分 水煎 虛加人參 砂仁壳四分 荷葉蒂兩枚 杵頭糠五

河間雄黃散 雄黃 瓜蒂 赤小豆各一錢 為末每服五

滌痰丸 南星 半夏 枳殼 橘紅 葛蒲 人參 茯苓

清熱二陳湯 二陳湯加 人參 烏梅 山梔 竹茹 砂

烏龍丸 九香蟲半 生半焙一兩 車前子炒 陳皮各四錢

枇杷葉煎 枇杷葉 橘紅各三錢 生薑五錢

五汁飲 蘆芽 葶藶 梨汁 甘蔗 竹瀝 薑汁溫服 又方

利膈丸 參 歸 藿 枳 草 檳榔 大黃

汞硫散 硫黃 水銀 同研細如煤色 用陳酒薑汁調服

丁香煮散 丁香三粒 蓮肉二七粒 二味另研 生薑七

狗寶散 用六君子加狗寶作散調服

噎膈反胃

千金五噎丸 乾薑 川椒 吳萸 桂心 細辛各一兩

千金五膈丸 參 朮 各二兩 陳 苓 各兩半 附子一兩

啄木鳥膏 啄木鳥去毛和骨 搗爛熬膏入麝香一錢 蜜收

雄黃二豆丸 雄黃各二錢 乳香一

為末和烏 梅肉杵丸

大七香丸 香附 麥芽 砂仁 薑香 甘草 官桂

五膈散 參 朮 薤 夏 桔 草 沈香 枇杷葉 薑

生薑汁煎 薑汁 白蜜 牛酥各五兩 人參 百合各二

神香散 丁香 薤仁 人參 百合湯下

膈噎膏 人參 牛乳 蔗汁 梨汁 蘆根汁 龍眼肉汁

一八五
力無作日人三三三
出方

痰 七聖湯 半夏 黃連 白朮 人參 茯苓 竹茹 生薑

類證治裁 卷之三 噎膈反胃

類證治裁 卷三

噎膈

蔣 色蒼形瘦是體質本屬木火食入脘阻嘔沫經言三陽結謂之膈夫三陽皆行津液而腎實五液之主有年腎水衰三陽熱結腐濁不行勢必上犯此格拒之由香巖先生所謂陽結於上陰衰於下也通陽不用辛熱存陰勿以滋膩一則瘦人慮虛其陰一則濁沫可導而下半夏青鹽拌製竹茹薑熟地炭杞子炭牛膝炭茯苓薤白薑汁數服漸受粥飲兼服牛乳數月不吐
耿 年近古稀兩尺脈微右關弦遲氣噎梗食吐出涎沫氣平食入夫弦為木旺遲為胃寒弦遲在右胃受肝克傳化失司治在泄肝溫胃痰水自降丁香益智仁煨蘇子霜茯苓青皮砂仁薑

類證治裁 卷之三 噎膈 數服痰氣兩平

陳 酒客中虛氣阻成噎必有蒸溼釀痰脈來遲弱中脘陽衰飲糜粥亦拒得熱酒輒行明係陽微欲結法宜通陽則胸脘得展溼痰得降而運納有權潞參茯苓砂仁丁香半夏薑製廣皮薑棗煎數服粥飲不拒矣後再加乾薑泡淡二分益智仁生研數服胸次舒而納食

某氏因惱怒會嘔痰血已是肝逆今胸脘吐沫脈濇元微食入反出火土兩衰蒸化無力乃脾腎陽衰候也然犯辛燥又虞動血擇其辛溫通降者宜之韭子炒研蘇子炒研沙苑子砂仁降香汁研茯苓半夏翹益智子煨研數服食進痛沫悉止

鍾氏脾胃陽衰濁飲不降食入脹痛有吐逆翻胃之虞右脈濡滑

左微弦宜洩肝濁以通腑陽厚樸製五分枳實製六分茯苓製三分半夏製

錢蘇子炒七分枳壳炒陳皮加薑此三因七氣湯加法氣降則飲

降矣再服嘔脹減大便得通嗣用溫脾胃兼辛通降逆半夏砂

仁韭子炒研益智仁研茯苓石見穿生薑數服漸納穀食矣

下 中年喪子悲惋成噎皖痛吐食此清陽不旋逆氣不降宜善

自排遣達觀隨化非藥石能愈之病貝母鬱金茯苓神製半夏括

蕤韭白汁薑汁蘇子汁沖服痛嘔俱減

族某客冬佛悒吐食粒米不納僅進粥飲今春怯寒吐沫二便俱

少脈細瀉糲糊濁逆陽微肝腎不主吸氣豈容再服莢地酸膩

有聲治表 卷之三 噎膈

閱所服方竟不識辛通大旨做兩通厥陰陽明主治為近理蘇

子杏仁川貝益智橘白潞參茯苓製半夏薑汁韭白汁沖服數劑

涎沫少粥飲多進間進牛乳亦不吐用香粳米炒黃九香蟲煎湯

煨藥更適轉方用大半夏湯穀食安而大便漸通

翻胃

某 長夏吐食症屬胃翻服四君異功加炮薑桂附不應子謂五

臟以守為補六腑以通為補此不易之經訓四君異功本脾藥

非胃藥胃腑宜通則和一與守中必致壅逆白朮炮薑皆守劑

且陽土喜柔涼忌剛燥劫液久吐則胃陰傷須辛通使胃氣下

行則效韭子炒研杏仁豆蔻衣半夏砂仁太子參薑汁粉括蕤仁

服頗適戒毋穀食暫用麪食蓋穀性陰而滯麪性陽而通加意

調養可痊

畢 嗜飲翻胃麪食頗安穀食則越宿傾吐無餘此胃陽衰酒食

化痰痰濁不降故也用通陽泄濁法製半夏茯苓益智仁乾薑

類龍治表 卷之三 翻胃

陳皮吳黃砂仁惜不能戒酒故時發時愈云

關格論治

下不得出為關。二便俱閉也。上不得入為格。水漿吐逆也。下關上格中焦氣不升降。乃陰陽離絕之危候。景岳以此為陽亢陰竭。元海無根。症見粒米不能下咽。渴飲茶湯少頃即吐。復飲復吐。熱藥入口隨出。冷藥過時亦出。大小便俱阻。關無出之由。格無入之理。急症難從緩治。內經以陰氣太盛則陽不能榮。故曰關。陽氣太盛則陰弗能榮。故曰格。陰陽俱盛。不得相榮。故曰關格。關格者不得盡期而死。因是症氣逆於上。津涸於下。與噎膈反胃同而勢較驟。最忌燥熱劫陰。法宜甘潤滋液。生脈散加甜杏仁、玉竹等。或甘酸化陰。參、麥、阿膠、地黃、白芍、烏梅、如脈洪大者先降火。山梔、犀角、竹茹、黃連等。沈滑者先豁痰。夏、牛膝等。

類證治裁

兼虛弦者先和陰。甘露飲去。喘滿者先降逆。降氣湯。陽結者先通痞。用半夏瀉液。虛者主通潤。煎。真陰素虧者滋化源。煎。大營氣血兩不足者填虛損。元煎。善治一老人吐欲死便不通。上格下關。參、苓、歸、芍、山藥、牛、吐、止。濃煨三陰煎。調理便通獲愈。可以審所治矣。厥、麥、冬、百合等。

關格脈候

經言寸口主中人迎主外。兩者相應俱往俱來。若引繩大小齊等。春夏人迎微大。秋冬寸口微大。如是者為平人。寸口即太陰氣口。六腑之陽氣。若人迎盛至四倍且大且數。名溢陽為外格。此孤獨存。水不濟火。寸口盛至四倍且大且數。名溢陰為內關。此元陰失陰。陽格也。寸口俱盛且大且數。為關格。與之短期。此陽氣不歸。陰關也。人迎氣口俱盛且大且數。為關格。與之短期。故陰中無陽。

陰氣不升。故陽中無陰。陰陽相離。死不治。越人以上魚為溢。為外關。內格。入尺為覆。為內關。外格及仲景東垣等。以在尺為關。在寸為格。皆與經背。

附方

- 生脈散 見一卷暑
- 大半夏湯 參 夏 白蜜
- 甘露飲 見二卷衄血
- 降氣湯 見二卷失音
- 半夏瀉心湯 見一卷溫
- 一陰煎 見二卷咳嗽
- 大營煎 熟地三錢 當歸 枳子 杜仲各二錢 牛膝錢
- 大補元煎 人參 山藥 當歸 枳子 杜仲各三錢
- 三陰煎 見二卷汗

諸氣論治

天地之氣和則診鼻不作。生人之氣和則諸疾不興。其氤氳一身。有宗氣有衛氣有元氣有中氣。宗氣積於胸中為氣之海。衛氣行於脈外為營之護。元氣根於脾土中氣出納丹田。願經云百病皆生於氣者。由六淫戕於外。七情戰於中。則氣之冲和者致偏。清純者化濁。流利者反滯。順行者多逆。如寒則氣收。暑則氣泄。喜則氣緩。怒則氣上。悲則氣消。恐則氣下。驚則氣亂。思則氣結。勞則氣耗。清氣在下則生飧泄。濁氣在上則生脹脹。甚則厥逆。噦呃痞嘔。噎膈攻注刺痛。無非氣所主病。局方治法通用辛香燥劑。然當審其虛實。新久如氣虛宜培。用四君補中。氣實宜泄。用七氣五磨。新病

頌證治裁

卷之三

諸氣

三

脹滿宜辛通。用半夏砂仁枳殼。蘇子杏仁生薑蒜。久抱悒鬱宜溫散。用越鞠丸去蒼鬱金。肺氣膈鬱宜開。用桔梗枳殼杏仁。批虛促宜斂。補肺肝氣升逆宜降。厚朴香附蘇子。燥急宜緩。白芍甘草木瓜。膽氣鬱滯宜和。溫膽。火熱宜泄。山梔龍胆草黃芩。胃氣結燥宜疏。蘇梗枳實藿香。疔痛宜調。烏藥香附半夏。木火乘土宜平。膽乘脾。戊己肝乘胃。白陳皮枳殼厚樸。腑不宜通宜升降。正氣散。腎氣厥逆宜溫。吳茱三焦痞塞宜運。丁香五。六氣失調傷暑霍亂。清不升濁不降。六和七情氣鬱。喉間如絮咯不出。噤不下。三因七氣痞。半夏瀉氣結。沈香丸。氣虛挾滯。異功散。寒挾痰。二陳湯。加挾火。左金丸。龍膽瀉肝挾寒。烏沈。挾食。大和中。飲挾血瘀。血鬱。噫噎。代精。旋呃逆。橘皮竹刺。

痛。木香調。膈噎。神香散。秘。怒後脇滿。解肝煎。去砂仁。暴怒氣厥。人。事不省。蘇合香。婦女血氣攻衝。心腹猝痛。湯。烏沈。大約氣行則痛止。氣調則血和。清者宜升。濁者宜降。鬱則生火。滯則挾痰。辛香暫用。開導燥熱。又易劫陰。以氣本屬陽。有餘便是火。且上升之氣。自肝。而出中挾相火。故氣病多屬肝逆。犯胃。肝陽化風。再若衝脈失鎮。丹田失納。肺腎不交。喘促交至。治氣者當從此際參之。

諸氣脈候

下手脈沈便知是氣。其或沈滑。氣兼痰飲。沈極則伏。瀉弱難治。沈實有力。宜辛散。沈弱少力。宜溫養。弦洪有火。宜苦降。細瀉無神。宜甘緩。

頌證治裁

卷之三

諸氣

三

補氣 補中益氣湯 見一卷火
補氣 四君湯 參 苓 朮 草
補氣 係元湯 見一卷火
補氣 三因七氣湯 見二卷欬嗽
溫散 五磨飲 檳榔 沈香 烏藥 枳實 木香 磨汁加白酒
氣降 蘇子降氣湯 見二卷失音
解鬱 越鞠丸 香附 蒼朮 川芎 神麴 梔子 麴糊丸
斂效 補肺湯 參 耆 五味 紫菀 各八分 熟地 桑皮 各錢
降 溫膽湯 見一卷溫

乘脾升降溫理三焦 傷暑散痞散結 虛滯 濕行痰氣鬱火肝火肝火清泄溫散消導消食理痰

戊己湯 參 苓 朮 草 陳 芍

正氣散 見一卷中風

吳茱萸湯 茱萸 參 薑 棗

丁香五套丸 丁香 木香 青皮 橘紅各五錢 白朮 茯苓 乾薑 良薑各一兩 南星 半夏各

二兩 湯浸

蒸餅為丸

六和湯 見一卷暑

半夏瀉心湯 見一卷溫 沈香化氣丸 大黃酒蒸 陳苓各二兩 參 朮各三兩 沈香五錢另研 前四味挫碎用薑汁 竹瀝

神麴糊丸 浸晒研末和沈香末

吳功散 見一卷中風

類證治裁 卷之三 諸氣

治中湯 見本卷飲食

二陳湯 陳 夏 苓 草

左金丸 見一卷火

龍膽瀉肝湯 龍膽草 黃芩 梔子 澤泄 生地 木通 車前 當歸 柴胡 甘草

戊己丸 見本卷飲食

火鬱湯 連翹 薄荷 黃芩 桃仁 麥冬 甘草 鬱金 枳實 竹葉

烏沈湯 烏藥 沈香 人參各一兩 炙草五錢 每服五錢 入薑三片 煎成加鹽一字

大和中飲 見本卷飲食

係和丸 見二卷痰飲

血鬱湯 丹皮 紅麴 紅花 降香 蘇木 山查 桃仁 韭汁 甲片

氣嘔 呃忒 止痛 噎膈 噎膈 怒傷 厥氣

代赭旋覆湯 代赭 旋覆

橘皮竹茹湯 見本卷嘔吐

木香調氣散 見一卷中風

神香散 丁香 蔻仁

膈噎膏 見本卷噎膈

解肝煎 陳 夏 苓 樸各錢半 蘇葉 白芍各一錢 砂仁七分

蘇合香丸 見一卷中風

類證治裁 卷之三 諸氣

諸氣

本 頭眩口苦膽氣泄也厥痛入腕肝氣逆也便不通爽膽氣結也清膽熱降肝逆以和膽氣用嫩桑葉粉丹皮生薑仁以瀉少陽枳壳金橘皮降香末以治厥陰蘇梗郁李仁殼芽以和陽明白芍木瓜緩中瀉木為統治服效

張氏氣攻胸腕脹痛身熱口乾便秘寸脈浮長關小數此肺脾鬱久化熱致津液不行故便燥而艱也用苦降法批杷葉鬱金汁枳壳杏仁百合麥冬蕪霜郁李仁生蜜沖入數服而平

陳氏氣阻胸膈引背食入脹痛膈上瘕瘕有形脈來虛緩胃逆不降少納五旬餘得此懼延中膈宜緩攻姑與辛通製半夏杏仁

通治法

卷之五

諸氣

注

陳皮草薤煨研枳壳砂仁壳淡薑渣酒炒胡酒白酒橘汁沖四服而病若失

蕪氏食入腕脹微渴便苦燥腑氣阻津液不行胃病治肝誤用牡蠣赭石斂鎮兼烏藥香附辛溫痞聚更增下壅益甚脈沈而駛藥忌溫瀉劫液阻隧主辛滑通潤於腑病為宜當歸杏仁郁李仁蕪仁俱研橘白蘇梗枳壳淡苳蓉韭白汁沖數服愈

本 久嗽氣促中夜必起坐是夕陽升丹田不納今長夏每食必臍下氣衝涌吐無餘更由勞動陰火擾胃劫痰直上冲咽先予降逆蘇子橘紅枳壳栝蕪杏仁降香貝母一吸吐止議鎮衝脈青鉛坎炁牛膝山藥五味熟地炭茯神三服氣定嗽滅

張 運息強通督任致動衝氣從陰股內廉入陰囊抵關元直上挾臍升至中脘氣即停泊偏繞右膈冲咽欲呃此震傷衝任經

氣由丹田交會入腕作呃靈樞亦謂衝任並起胞中為經絡之海其浮而外者循腹右上行會於咽喉也此氣升逆神不自持恍惚無寐自汗神煩身左虛墮良由精血失涵任乏擔承衝慣升逆不嘔不脹無關臟腑一切補臟通腑奚由入絡擬鎮養奇經診脈左右動數仍防喘熱耳牛膝黃肉俱酒炒當歸鬚酒拌各錢熟地炭龜甲心炙杞子焙各二錢茯神降香末各三錢桂心三分隔水煨沖

類證治法

卷之五

諸氣

注

肝氣肝火肝風論治

凡上升之氣。自肝而出。肝木性升散。不受過鬱。鬱則經氣逆。為嘔。為腹。為嘔吐。為暴怒。筋痛。為胸滿。不食。為飧泄。為疝。疝皆肝氣橫。決也。且相火附木。木鬱則化火。為吞酸。腸痛。為狂。為癢。為厥。為痞。為呃。噎。為失血。皆肝火衝激也。風依於木。木鬱則化風。為眩。為暈。為舌麻。為耳鳴。為瘧。為痺。為類中。皆肝風震動也。故諸病多自肝來。以其犯中宮之土。剛性難馴。挾風火之威。頂巔易到。藥不可以剛燥投也。經曰。肝苦急。食甘以緩之。肝欲散。急食辛以散之。用辛補之。酸瀉之。古聖治肝。法盡於此。夫肝主藏血。血燥則肝急。凡肝陰不足。必得腎水以滋之。血液以濡之。味取甘涼。或主辛潤。務

類證治裁

肝氣肝火肝風

遂其條暢之性。則鬱者舒矣。凡肝陽有餘。必需介屬以潛之。柔靜以攝之。味取酸收。或佐酸降。務清其營絡之熱。則升者伏矣。治肝氣先疏其鬱。宜道因怒動肝。小柴胡湯加。愛而吐沫。代赭旋。嘔而脹滿。三四七氣湯。怒傷筋痛。生白芍。金橘皮。山梔。腸鳴飧泄。則泄木安土。加人參。安胃散。瘰癧腫硬。則導滯和肝。加核丸。若氣有餘。便是火。治肝火實。吞酸。腸痛。左金丸。脇大痛。引腰背。汗泄。忌辛燥。耗氣劫液。宜甘酸化陰。甘草。柏子仁。杞子。棗仁。阿膠。牡蠣。虛痛。久痛。必入絡。宜理營絡。旋覆花。湯。加當歸。溼熱火盛。筋痛。筋痿。漫血。膽。薄。肝火盛。狂躁。胸痞。阻。便秘。當歸。龍。陰虛。痿弱。去鎖。陽。厥。逆。散。痞。滿。心。湯。呃。噎。橘。皮。竹。吐。衄。失。血。犀。角。地。黃。湯。至。於。肝。陽。化。

風上擾清竅。則巔痛頭暈。目眩耳鳴。心悸。痛煩。由營液內虛。水不涵木。火動。痰升。其實無風。可散宜滋液和陽。復脈湯去薑桂。或用棗仁。炒甘。菽。霜。桑。其由腎虛。陽浮者。宜填髓補精。阿膠。龜。甲。淡。菜。熟。地。其由土弱。木乘者。宜緩肝益胃。酸。棗。仁。湯。去。川。芎。其因怒勞。致舌麻。肢痺。筋惕。肉。瞤。由五志過極。陽亢。陰衰。風從火出。宜柔潤。熄風。河間地黃。飲。子。去。其火風上鬱。頭重。腕痺。宜清金肅降。鮮。菖。蒲。根。枯。藁。其年高。水虧。風火易升。頭暈。便秘。宜壯水滋燥。還。少。杜。仲。巴。戟。楮。實。茴。香。加。桑。葉。黑。其陽明絡虛。風火易震。食少。知。飢。芝。蔴。柏。子。仁。炒。甘。菽。茯。神。牡。蠣。大。抵。肝。為。剛。臟。職。司。疏。泄。用。藥。宜。填。實。空。際。人。參。山。藥。炙。草。牡。蠣。大。抵。肝。為。剛。臟。職。司。疏。泄。用。藥。不宜剛而宜柔。不宜伐而宜和。正做內經治肝之旨也。

類證治裁

肝氣肝火肝風

丹溪曰。病人自言冷氣。從下而上。非真冷也。此上升之氣。自肝而出。中挾相火。自下而上。其熱為甚。自覺冷者。火極似水。積熱之甚也。陽亢陰微。故見此症。又曰。氣從左邊起。肝火也。宜左氣從臍下起。陰火也。黃蘗丸。氣從足下起。入腹。虛之極也。滋陰降。外用。附子。末。塗湧泉。引熱下行。

附方

- 逍遙散 見一卷火
- 小柴胡湯 見一卷溫
- 代赭旋覆湯 見本卷嘔吐
- 二因七氣湯 見二卷欬嗽

瀉 痢 疝 肝 火 脇 痛 理 絡 火 盛 火 狂 火 痿 弱 陽 厥 胸 痞 瀉 逆 嘔 吐 蠅 液 益 胃 類 中 老 人 陰 火 陰 火 滋 火

人參安胃散 參一錢 蒼二錢 生草 炙草各五分 白芍七分 茯苓四分 陳皮三分 黃連二分

橘核丸 延胡 厚樸 枳實 木通 桂心 木香各五錢

左金丸 見一卷火

抑青丸 黃連一味以茱萸湯浸一宿為丸

旋覆花湯 見二卷痰飲

龍膽瀉肝湯 見本卷諸氣

當歸龍薈丸 見一卷火

虎潛丸 見一卷中風

四逆散 柴胡 白芍 枳實 炙草

半夏瀉心湯 見一卷溫

橘皮竹茹湯 見本卷嘔吐

犀角地黃湯 見一卷溫

復脈湯 見一卷中風

酸棗仁湯 見一卷中風

地黃飲子 見一卷中風

還少丹 見一卷中風

黃蘗丸 黃蘗一味酒炒水丸

坎離丸 見一卷火

滋陰降火湯 白芍一錢三分 當歸一錢二分 熟地 麥

炙草各五分 陳皮七分

加薑 棗 水煎

類證治法 卷之三 肝氣肝火肝風 請

肝氣

本 脇左隱痛胸間動氣頭眩肢麻寐即舌乾似辣中夜自汗清
晨欬痰便瀉覺爽肝陽挾風火上冒侵犯脾土使然秋深左關
脈弦長牢實醫謂金弱木強非時脈見來春木必侮土膈逆可
憂遂用滋腎鎮肝數十劑脈症未退更醫進胃愛丸服後痰較
少而泄氣多且皆健脾藥不能制肝陽歷冬并右脈亦弦勁胸
院引痛予謂前症自是肝陽肆橫但肝為剛臟不任克制專用
滋清恐又致痛為脹若做內經治肝以酸瀉之法自然柔伏矣
因用白芍木瓜烏梅黃肉五味金橘棗仁等加牡蠣醋橘絡木
香茯神芝蔴小麥桑枝膏為丸服後左關漸軟不見弦長矣且

類證治法 卷之三 肝氣

肝氣

請

示以靜攝戒怒節勞右脈亦和諸症漸除

王 高年胸脇氣阻痛脈虛弦用苦鹹酸以泄降厚樸 薑汁製 枳

殼旋覆花 各錢 牡蠣粉 醋煨白芍 炒三 木瓜 八分 降香末 二錢 三服

肝逆已平尚未嗜食用甘涼以調胃陰石斛 錢 麥冬 錢 甘草 半 錢 五分

茯苓白芍當歸 各二 錢 小麥 一 錢 紅棗 五 錢 五服全安

沈氏寒熱食減厥氣攻注痛連胸背脈弦左浮大服平肝鎮逆之

劑攻注稍緩宿有脹症曾用通膈法獲痊今懼其壅而成脹兼

用通鎮庶幾善後之防白雲苓 二 錢 鬱金厚樸 各六 分 砂仁烏藥 各

分 蘇梗枳殼 汁各代 精石石決明 各二 錢 金器同煎三五服愈

何氏肝鬱失暢循經則頭項作脹乘脾則痰濁化酸入絡則肌肉

刺痛脈下零濕經信愆期左關沈弦治在疏肝佐以滲濕厚樸
香附鬱金白芍茯苓金橘皮山梔鉤藤當歸麩三四服諸症減
自述平昔腸鳴必傾瀉乃爽亦木氣乘土之咎且肥人慮虛其
陽前方去鬱金山梔加製半夏炒白朮薏米炙草經亦調

蔡 小腹氣上衝膈食下嘔吐寒熱便瀉滿痛病久脈弦左虛乃

厥陰瀉逆為吐攻腸為瀉治在泄瀉安胃吳萸泡川棟子酒小

茴香酒炒茯苓車前子橘核白芍俱生薑半夏麩數服諸症退去

吳萸川棟子車前子生薑加砂仁炮薑廣皮服愈

東氏經阻疑孕胸痞嘔酸寒熱脛冷食減便難兩部脈沈弦乃氣

逆瀉非惡阻病宜和肝洩濁吳萸香附鹽水茯苓厚樸半夏

類證治裁 卷之三 肝氣

俱薑橘白蘇梗枳殼煨薑三服前症漸平

張 當春脈弦肝木乘土噫氣大便艱少常欲如廁皆肝氣忍升

忽降致之青皮旋覆花降香白芍牡蠣炙草當歸半夏薑汁二

服噫氣平大便不結惟舉丸注痛加橘核酒服全瘳

丁 神傷思慮則肉脫意傷憂愁則肢廢高年憂思菀結損動肝

脾右脇氣痛攻胸引背不能平臥氣粗液奪食少便難由肝胃

不和膈不司降耳鳴肢痺體瘦脈弦風動陽升脂肉消鑠有暈

仆之懼香巖謂肝為剛臟忌用剛藥仲景法肝病治胃是有取

乎酸泄通降之品矣白芍木瓜牡蠣金橘皮蘇子薏仁杏仁歸

鬚枳殼再服順適然症山情懷內起宜娛情善調不宜苛恃藥

餌也

陳 脇脹胸痛嘔吐肝氣上升陽明當其衝必犯腕傾液而出脈

左遲虛右弦小陰瘡宿恙未愈治在益胃和肝勿使瘡厥白芍

茯苓各二錢製厚樸六分製半夏錢橘白枳殼各一錢砂仁連壳

三烏梅二枚煨薑二片數服脹痛若失陰瘡亦瘳

於 先由吞酸漸次胸膈滿悶食後必吐病因肝鬱失暢延至木

氣犯土水濁不降勢必瀉少便結肝乘胃反矣苦降逆辛洩濁

主之製厚樸吳萸乾薑蘇子炒研各五分枳殼降香末半夏麩各錢

茯苓一錢椒目十粒數服漸安

潘 少腹本厥陰部分疝痛不已利下粘膩如魚腦又嘔紫血甚

類證治裁 卷之三 肝氣

多繼以鮮紅夜煩不寐足厥冷左脈虛弦右虛小此土受木侮

必飲啖後鬱勃動肝厥陰陵犯中下焦清濁互傷嘔利并劇節

交雨水風陽猝乘藥忌剛燥但柔肝熄風緩痛為宜阿膠水白

芍木香小茴香鹽水炒香附醋延胡酒炒茯苓一服血止痛利大減

足亦和再加炮薑黑查肉服症悉平改用潞參茯苓白芍山藥

炙草砂仁訶子肉梗米棗肉調脾而食進但嘔利傷陰精神未

復因事振觸寒熱煩痛按捶暑爽是營衛流行之機未免鈍窒

矣且欬喘痰灰腎虛氣少攝納必補中則營衛自和攝腎則喘

嗽可定潞參炙耆歸身炙草茯苓神五味山藥骨脂核桃肉沙苑

子漸次調理向安

從姪左乳下一縷氣升熱痛至項明是肝陽鬱久致然恰當暑濕
炎蒸每歲屢發本由佛悒肝久失暢經隧痰氣阻塞致肺胃不
主開降痞噎吞酸大便忽溏忽鞭脈來沈清做丹溪越鞠丸山
梔川芎神麴香附醋炒薑仁旋覆花杏仁貝母枳壳煎服輒安

巖 中年氣從季肋橫攻中上脘嘔沫失血年餘未愈近日食少
神衰服燕窩湯滋脹兩關虛緩冷涎上泛此肝濁瘀滯久則入
絡致滿宜辛溫泄濁吳萸鹽水炒半夏薑皮延胡酒厚樸製茯
苓降香末當歸鬚二服冷涎痛脹悉止但陽衰脛冷法在益陽
去吳萸加桂枝炮薑草果煨等三劑食進

吳 冬初由水瀉後腹脹是臟寒生滿脈虛食少治先溫通理陽

類證治裁 卷之三 肝氣 疑

用益智炮薑潞參茯苓製半夏縮砂壳廣皮陳粳米煎湯服數
劑頗適晚餐少運化加神麴雞內金俱炒脹寬冬季因佛逆動肝
脇腹脹痛寒熱脈微數轉方用白芍當歸潞參蘇梗鮮橘葉縮
砂壳鬱金汁兩和肝胃痛緩藥停春正上脘痛嘔沫由肝邪乘
胃胃氣失降則脹壅肝陽上升則嘔痛因肝為剛臟法當柔以
輒之甘以緩之且肝陰久虧觸事生怒脾元不復病先肉脫劣
手竟用精石重鎮桂心剛制炒木壅氣兼蒺藜青皮疏肝伐肝
一啜煩躁大痛再劑脇如及割腹絞痛欲絕子聞擬甘潤柔劑
用阿膠雞蛋白芍甘草棗仁當歸飴糖等遙寄片紙藥未及
撮而歿誌此為以剛治剛好言平肝者鑑

肝火 趙 左脇痛脈洪耳鳴時嘔脹腹痛皆肝火熾騰濁瘀不肯泄降
宜戒怒節飲可愈做梔萸湯山梔薑汁炒黃連吳茱萸汁炒白芍牡蠣
生丹皮金橘皮服效

類證治裁 卷之三 肝火 疑

用益智炮薑潞參茯苓製半夏縮砂壳廣皮陳粳米煎湯服數
劑頗適晚餐少運化加神麴雞內金俱炒脹寬冬季因佛逆動肝
脇腹脹痛寒熱脈微數轉方用白芍當歸潞參蘇梗鮮橘葉縮
砂壳鬱金汁兩和肝胃痛緩藥停春正上脘痛嘔沫由肝邪乘
胃胃氣失降則脹壅肝陽上升則嘔痛因肝為剛臟法當柔以
輒之甘以緩之且肝陰久虧觸事生怒脾元不復病先肉脫劣
手竟用精石重鎮桂心剛制炒木壅氣兼蒺藜青皮疏肝伐肝
一啜煩躁大痛再劑脇如及割腹絞痛欲絕子聞擬甘潤柔劑
用阿膠雞蛋白芍甘草棗仁當歸飴糖等遙寄片紙藥未及
撮而歿誌此為以剛治剛好言平肝者鑑

肝風

本寐醒舌乾辣華池津不上朝頭眩耳鳴肢麻肋痛肝風內震
腹滿腸鳴晨瀉不爽木氣直犯中宮矣左關浮弦右浮滑痰嗽
不利太陰受戕有年須防類中晨服方運轉壽以利濕生白朮
茯苓半夏青鹽炙草薏米炒砂仁益智仁煨山藥炒小麥晚服
方養肝陰以熄風阿膠化水杞子茯神麥冬石斛白芍桑枝甘菊
炒黑芝蔴牡蠣粉寐後用柿霜二匙含舌下以生廉泉之津服效
沈氏當春鬱怒不寐五更起坐倏然頭搖手戰目閉耳鳴暈絕身
冷此怒動肝陽內風挾痰火上冒也急煎淡青鹽湯以降風火
一啜得醒用牡蠣鈎藤山梔桑葉白芍茯神菊花炒二服神志

類證治裁

卷之三

肝風

類

已清轉方用熟地黃炒杞子焙石斛蒸仁炒龜板炙牡蠣粉慈
石鎮補肝陰而安

沃煩勞傷陽陽氣化風上巔兩太陽刺痛耳鳴口乾寒熱不寐
自汗便瀉下元疲乏脉模糊治先熄風鎮陽甘菊炒荷葉慈石
牡蠣粉煨神甘杞子焙熟地炭白芍五味炒數服諸症向安惟
不嗜味微嗽加甜杏仁潞參蓮棗以補脾肺原方去前四味嗣
用丸方牡蠣粉淡菜首烏熟地杞子牛膝酒五味焙阿膠水和
煉蜜丸以滋填下元匝月而愈

鬱症論治

凡病無不起於鬱者。如氣運之乖和也。則五鬱之病生。經言木鬱
達之。宣火鬱發之。散升土鬱奪之。攻金鬱泄之。解表利水鬱折之。其
衝此論勝復之變。情志之拂抑也。則六鬱之病作。經言怵惕思慮
則傷神。憂愁不解則傷意。悲哀動中則傷魂。喜樂無極則傷魄。盛
怒不止則傷志。恐懼不解則傷精。此論氣血之損。又言嘗貴後賤。
雖不中邪。病從内生。名曰脫營。嘗富後貧。名曰失精。以及病發心
脾。不得隱曲。思想無窮。所願不得。皆情志之鬱也。夫六氣外來之
鬱。多傷經。腑如寒火濕熱痰食。皆可以消散解。若思憂悲驚恐
之鬱。傷氣血。多損臟陰。可徒以消散治乎。七情內起之鬱。始而傷

類證治裁

卷之三

鬱

氣。繼必及血。終乃成勞。主治宜苦。辛。涼。潤。宣。通。苦能泄熱。辛能理
通。能解結。用劑必氣。以鬱為燥。邪必肺氣失宣。不能升降。中氣日
味相投。乃可取效。以鬱為燥。邪必肺氣失宣。不能升降。中氣日
結。不能運納。至血液日涸。肌消骨蒸。經閉失調。乳巖項癭。而鬱勞
之症。成不止。血嗽氣膈。狂癩失志而已。今分條列治。如思鬱傷脾
氣結。宜薤金。貝母。當歸。柏。思鬱傷神。精神清。神傷心。不寐。腎。故道。思
鬱傷肝。潮熱。道遙。思鬱傷心。脾失血。歸脾湯。去白。憂鬱傷肺。氣阻
杏仁。桔。薑。皮。鬱金。枳。殼。憂鬱傷中。食少。七。福。飲。去。熟。悲鬱。傷。燥。欲
枇杷。葉。竹。瀝。薑。汁。半夏。憂鬱。傷。人。參。萊。仁。茯。神。龍。骨。驚。鬱。神。亂。欲。狂。心。清
泣。甘。麥。大。驚。鬱。膽。怯。欲。迷。石。菖。蒲。南。棗。小。麥。驚。鬱。神。亂。欲。狂。心。清
溫。麻。怒。鬱。肝。傷。氣。逆。煎。解。肝。怒。鬱。火。升。動。血。煎。化。肝。恐。鬱。陽。消。精。怯。人
九。加。減。或。鹿。諸。鬱。久。風。陽。內。生。眩。悸。咽。痛。宜。阿。膠。生。地。石。斛。茯。神
角。膠。酒。化。服。

氣鬱脉沈而澹。七氣血鬱脉澹而乳。四物化氣鬱生涎心悸。溫膽
血鬱絡傷脇痛。金鈴子散加桃仁。肺脾鬱管損肌瘦。養營湯去桂
心脾鬱怔忡崩漏。肝膽鬱血燥結核。加味逍遙散。若脾胃鬱
氣噎噎呃。金匱麥門冬湯。三焦鬱口乾不食。梔子仁薑汁浸炒黑
梅煎。若夫六氣之火鬱散之湯。寒鬱成熱。瀉之。羚羊角山梔生
湯。濕鬱除之。除濕湯。痰鬱滌之。潤下丸。或二陳湯。加食鬱消之。
石斛。通治諸鬱。用鬱丸。六陰陽壅滯氣不升降。沈香降
保和。通治諸鬱。鬱湯加法。半夏厚。凡懷抱不舒。遭遇不遂。以及
中如有氣鬱。咯不出咽不下。樓湯。凡懷抱不舒。遭遇不遂。以及
怨曠積想在心。莫能排解。種種鬱悒。各推其原以治之。然以情病
者。當以理遣。以命安。若不能怡情放懷。至積鬱成勞。草木無能為

類證治法 卷之三 鬱

挽矣。豈可藉合歡損忿。萱草忘憂也哉。
丹溪立鬱鞠丸以治六鬱。用香附理氣。川芎調血。蒼朮去濕。開鬱
利氣為主。謂氣鬱則濕鬱。濕鬱則熱鬱。熱鬱則痰鬱。痰鬱則血鬱。
血鬱則食鬱。相因為病。趙養葵云。東方生木。火氣附焉。木鬱則土
鬱。土鬱則金鬱。金鬱則水鬱。五行相因之理。與以逍遙治木鬱。諸
鬱皆因而愈。甚者方中。加佐以黃連治心火。吳茱萸氣厥肝之氣亦燥。
同氣相求。而佐金以制木。此佐金之所以得名也。繼用柴胡白芍
以滋水生木。木火鬱舒。土亦滋潤。金水相生矣。
鬱症脉候
鬱脉多沈伏。或結促。或沈澹。鬱在肝腎見於左。鬱在心脾見於右。

氣血食積痰飲。一有留滯。脉必止澹。但須有神。有神有胃氣也。鬱
脉雖沈伏結促。有氣可散。氣通則和。若牢革弦強不和。正氣先傷。
無氣可散。即調補難效。况誤行耗氣藥乎。所以鬱症得強。強脉者
多成虛損。醫通

附方

越鞠丸 見本卷諸氣
六鬱湯 香附二錢 橘紅 蒼朮 撫芎 半夏各一錢
赤苓 山梔各七分 炙草 砂仁各五分 薑三
片 氣加木香 烏藥 蘇砂仁 濕加薏苡白朮 熱加黃
芩 倍山梔 痰加南星 枳殼 血加紅花丹皮 食加山查
麥芽 神翅
固陰煎 見二卷脫

類證治法 卷之三 鬱

熱鬱 逍遙散 見一卷火
失血 歸脾湯 見二卷勞瘵
食少 七福飲 參 地各三錢 當歸 棗仁各二錢 白朮錢半
甘草大棗湯 甘草 小麥 大棗
驚狂 清心溫膽湯 陳 夏 芩 草 竹茹 枳實 蘆 參
鬱怒 解肝煎 見本卷諸氣
傷肝 化肝煎 見二卷血
恐 八味丸 見一卷中風
鬱氣 七氣湯 見二卷咳嗽

痰	治土	治濕	治火	治火	治木	治鬱	治婦	治氣	治鬱	治食	治痰	治痰	治鬱	治濕	治鬱	治火	治散	治鬱	治酸	治吞	治損	治營	治傷	治絡	治鬱	治氣	治鬱	治血		
痰鬱湯	奪鬱湯	濕鬱湯	發鬱湯	火鬱湯	達鬱湯	火鬱湯	沈香降氣散	半夏厚樸湯	保和丸	二陳湯	潤下丸	除濕湯	平胃散	金匱麥冬湯	左金丸	人參養營湯	金鈴子散	溫膽湯	四物化鬱湯											
杏 芩 蘇	省頭草 蒼水 薑	附 木 樸 苓	見一卷火	見本卷諸氣	升麻 柴胡 川芎 香附 桑皮 橘葉 蒺藜	沈香二錢八分 砂仁七錢半 香附六兩二錢半 炙草五錢半 每服二錢 薑湯下	即七氣湯	見二卷痰飲	陳 夏 苓 草 薑	芩 連 星 草各一兩 半夏二兩 橘紅八兩 用鹽五錢水化浸橘紅煮乾焙共研蒸餅為丸	茅米四錢 防風二錢 茯苓 白朮 白芍各一錢 薑 棗	見一卷濕	見一卷燥	黃連 吳萸	見二卷勞瘵	金鈴子 延胡索各一兩 每服三錢 酒調下	見一卷濕	芍 歸 芍 桃仁 紅花 香附												

類證治裁 卷三

血	治水	治食	治金
血鬱湯	折鬱湯	食鬱湯	泄鬱湯
見本卷諸氣	白朮 茯苓 豬苓 澤瀉 肉桂 丁香 木通	神麴 枳壳 香附 砂仁 梔 樸 芩 陳	紫苑 貝母 桔梗 沙參 香附 砂仁 白痰

鬱

本 謀慮不遂臆鬱生火春季目眩紅暈驚悸口渴渴黃見聞錯
妄脉洪疾用龍膽瀉肝湯去芩柴通澤加丹皮白芍赤苓生棗
仁二服已定再用平調之劑而安

劉 年高胸悶氣從下焦逆上飢不思食此必鬱怒致病右關脉
浮長過本位兩尺搏大顯然氣逆不降少陽司令得此有膈噎
吐沫之憂鬱金栝蒌皮前胡枳壳蘇子青皮降香末郁李仁數
服效

眭氏食後皖痞嘔酸口燥鼻衄經四月乃行沈綿十載由氣分延
及血分乃肝鬱不舒致濁升血逆有終身絕孕之累生香附吳

類證治表 卷之三十一 鬱

黃連 黑山梔茯苓蘇子鬱金澤蘭數服痞嘔漸減去香附吳
荂加丹皮白芍當歸延胡俱酒炒 椒目數服經行再加金橘皮木
香汁加減前藥為丸漸平

王氏病久懷抱悒鬱脉細滴少神左尤甚嘔酸食脹胃陽不舒左
耳項痛連髮際虛陽上攻膽氣橫溢木鬱土衰必至便秘經阻
用吳茱萸湯去葶藶加製半夏橘白茯苓枳壳甘菊鉤藤嫩桑
葉三服甚適去吳荂加穀芽益智當歸又數服諸症漸除

謝氏右腋氣痛益大經先期至則渾身牽痛結禡十載從未孕育
頭暈帶下食後吐酸脉沈弦症由鬱久傷肝肝經氣逆致生風
火動血震絡腑氣失降嘔眩濁逆營衛失調脉隧阻痺治用兩

通厥陰陽明法黃連山梔俱薑汁炒香附童便製枳壳鬱金茯苓當歸
貝母鬱金汁合膠艾湯數服而經漸調

鄒氏因喪女哀悒漸次脇痞食入脹加疲濁不降嘔苦便澹脉虛
遲此悲愁鬱損生陽致氣窒濁壅治在泄肝温胃俟吳茱萸湯
吳荂乾薑各五分製半夏茯苓各二錢枳壳砂仁壳橘白烏藥各八分
三服嘔止脹寬食進改用通腑利濕大腹皮洗淨厚樸五分半夏
麴八分椒目十五粒茯苓二錢砂仁壳八分煨薑錢半數服而安

類證治表 卷之三十一 鬱

呃逆論治

呃逆症氣逆於下直衝於上作呃忒聲由肺胃氣不主降肝腎氣不主吸故也內經謂之噦內經治噦之法以草刺鼻嚏而已無今息而疾迎引之立已大驚之亦可已謂之呃其症因寒火痰食以及傷寒吐利病後產後多有之舉其綱則寒呃熱呃虛脫呃三者括之而已寒呃宜溫宜散寒去而氣自舒熱呃宜降宜清火靜而氣自平古方用柿蒂取其苦溫降逆散痰乃從虛脫呃則非大補真元必難鎮攝也其寒滯為呃者陰治之法丁香散二陳湯其肺痺為呃者咽阻胸悶枇杷葉川貝母凝濁逆橘皮乾薑湯其胃火為呃者脈實便堅安胃其胃虛為呃者虛陽上逆皮豆豉其胃氣旋其怒動肝火者脇痛吐酸佐金湯加白芍山梔金器其覆代赭湯旋其怒動肝火者脇痛吐酸佐金湯加白芍山梔金器其

類證治裁

卷之三

呃逆

附方

氣逆作呃者肝邪乘胃旋覆代赭湯加降香其痰滯為呃者飲停氣阻丁香湯其食滯為呃者腹痛嘔腐養胃湯去菴附肉果或傷寒少陽症噦逆者半表半裏氣為邪抑小柴胡湯或柴陳煎傷寒陽明症失下內熱三焦乾格陰道不行氣衝作呃者宜去火白虎湯竹葉去閉承氣逆氣降噦自止其吐利後胃虛膈熱而呃者橘皮竹茹湯病後發呃者察其中虛必補脾察其陰虛必補腎大補元煎其中焦脾胃虛寒氣滯為呃者丁香柿蒂散或理中其下焦虛寒肝腎不能暢達或虛人元陽無力易為遏抑而致呃者歸氣飲或理中溪謂呃逆因肝腎陰虛氣從膈下直衝於口由相火挾衝氣上逆者真陰承制相火東垣謂陰火上衝吸氣不得入胃脈反逆陰

類證治裁

卷之三

呃逆

中伏陽即為呃用滋腎丸壯水以瀉陰中伏熱此陽虛陰虛之辨所當詳審施治者也產後呃逆最危或桂心五錢薑汁三合水煎急灸期門左穴艾炷如豆大醫通日平人飲熱湯及食椒薑即呃者此胃有寒痰死血也死血用非汁童便虛人用理中湯加蓬朮夏蓋呃逆皆是寒熱錯雜二氣相搏故治之亦多寒熱相兼之劑如丁香柿蒂並投之類試觀平人令呃令其思想則止思則脾火氣乘而胃和矣
呃逆脈候
呃逆如身強氣盛脈見滑實者多宜清降若聲小氣微脈見微弱者多宜溫補

類證治裁

卷之三

呃逆

附方

丁香散 丁香 柿蒂各一錢 青皮 陳皮 炙草 良薑 各五分
二陳湯 夏 陳 苓 草 薑 加丁香名丁香二陳湯
橘皮乾薑湯 橘皮 通草各錢半 參 桂各一錢 乾薑 炙草各五分
安胃飲 見本卷脾胃
橘皮竹茹湯 見本卷嘔吐
旋覆代赭湯 見本卷嘔吐
左金湯 黃連 吳萸
養胃湯 藿 陳 皮 甘 苓 夏 各一錢 砂仁 肉果 人參 白朮 各一錢 神 川 附 三分 丁香 砂仁 蔻仁 沈香各七分

消食少陽少陽明胃火補脾補腎氣滯虛寒胃寒虛寒

大和中飲 見本卷飲食

小柴胡湯 見一卷溫

柴陳煎 卽二陳湯加柴胡

白虎湯 見一卷中風

竹葉石膏湯 見一卷傷風

大補元煎 見一卷中風

右歸飲 見二卷虛損

丁香柿蒂散 丁香 柿蒂 良薑 參 夏 陳 苓 草

理中湯 見一卷中風

溫胃飲 見一卷中風

歸氣飲 熟地三錢 茯苓 扁豆各一錢 藿香錢半 炮薑 丁香 陳皮各一錢 炙草八分

理陰煎 見一卷欬嗽

大補陰丸 見一卷火

滋腎丸 見一卷火

四逆湯 附子 乾薑 甘草

羌活附子湯 羌活 附子 炮薑各一錢 茴香八分 丁

越鞠丸 見本卷諸氣

呃

呃逆連聲日夜不止醫用丁香柿蒂散加白蔻木香刀豆等之屬隨止隨發悶絕而甦坐不能臥診其脈虛浮而疾逆氣自丹田上升直犯清道此肝邪犯胃也丁香蔻香辛溫助火何濟於事用重以鎮逆法旋覆代赭湯去人參加石決明醋刺痰熬醋以瀉肝半夏青鹽以�痰沈香汁以下氣一服逆氣鎮定神安熟寐夢一老嫗引小兒以手將其左脇曰愈矣醒而呃逆大減再劑若失問所夢何人予曰此鎮肝而心脾之神得安也蓋脾之神黃婆心之神嬰兒云

清下降之權治用苦辛降逆橘皮竹茹湯去參草加山梔杏仁前胡貝母栝藹豆豉鬱金汁再劑悉平

潘 冬初寒熱自利煩渴不寐嘔吐濁痰右脈小數糲糊左關弦而微勁是協熱下利胃虛木欲乘土必作噦逆治先表裏清解做景岳柴陳煎柴胡黃芩半夏麴茯苓陳皮栝藹枳殼薑寒熱退煩渴解而呃果作此繫濁痰不降木氣上升宜降痰兼鎮逆用蘇子杏仁俱炒橘紅竹茹茯苓石決明醋煎薑汁一服左關脈平再服呃逆亦定惟右關虛乃商鎮補中宮法所謂胃虛則呃也用山藥扁豆薏仁炒炙草半夏陳皮茯苓沈香汁呃平但宵分少寐上脘略悶則痰沫隨氣上泛呃仍間作治用通

攝佐以運脾所謂脾能為胃行其津液也。葉仁煨薑薏米生扶
神橘白砂仁半夏蓮子氣平呃止思食前方去。葉仁加潞參山
藥。葉仁健飯如初。

包 呃逆嘔沫食後為劇是肝胃病據述陰瘧愈後夏秋浴池兼
痰生冷遂致嘔呃不時寒慄夫肺主皮毛水寒外襲感病在經
胃主通納生冷傷陽氣隨濁逆怯寒乃肺衛虛非在經客邪伸
景以嘔涎沫為肝病肝病必犯陽明胃腑先用溫通泄濁吳茱
萸湯加半夏椒目嘔逆止再用旋覆代赭湯而呃平

桂 病後脈虛疾左關尺尤駛胃虛呃逆必肝腎之氣上奔而陽
明當其衝因作呃也化痰利氣是開其道矣有年體虛法宜鎮

類證治裁

卷之三

呃逆

聖

攝牡蠣三錢 醋煨石決明二錢 赭石三錢 竹茹二錢 潞參降香末各三錢
服呃止再劑去決明赭石加茯神棗仁遠志山藥服脈亦和

噎症論治

噎症屬胃。俗云心噎非也。其狀似飢非飢。似痛非痛。腕中懊懣不
安。或兼噎氣痞悶。漸至吞酸停飲。胸膈隱痛。丹溪謂皆痰火為患。
或食鬱有熱。華岫雲謂脾屬陰主血。胃屬陽主氣。胃易燥。全賴脾
陰以和之。脾易濕。必賴胃陽以運之。合冲和之德。為後天生化之
源。若胃過燥。則噎雜似飢。得食暫止。治當以涼潤養胃。陰如天冬
竹柏子仁石。或稍佐微酸。如白芍。棗仁。若熱病後。胃津未復。亦易
解。連棗之品。或稍佐微酸。如木瓜之屬。若熱病後。胃津未復。亦易
虛。噎治當以甘涼生胃液。如生熟地黃。當歸。或但調其飲食。凡甘
類。若胃有痰火。或惡心吞酸。微煩少寐。似飢非飢。治宜清火。如黃
梔。俱用薑汁炒。稍佐降痰。如二陳湯。及又有脾胃陽衰。積飲內聚。
及芥苧竹茹等。噎紅半夏。及

類證治裁

卷之三

噎

似酸非酸。似辣非辣。治宜溫通。外薑茯苓。但由脾虛。飲食不化。吐
沫。愛腐。治宜健運。砂仁。雞內金。或肝火作酸。佐金。噎雜醋心。黃湯
食後噎腐。保和。濕痰阻氣。婦女悒胸。噎。道遙散。下血虛心
噎。宜地黃。白芍。天冬。大抵脈洪數者多火。宜薑汁炒山。脈滑大者
多痰。宜導痰湯。加脈沈弦者多鬱。又有過用消克藥。飢不能
食。精神漸減。吳功散。加白芍。皆噎症所當審治者。
醫通曰。噎雜與吞酸一類。皆由肝氣不舒。木挾相火。以乘脾土。胃
之精微不行。濁液攢聚。為痰為飲。都從木氣化酸。肝木搖動。中土
中土擾擾不安。故噎雜如飢。求食自救。得食稍止。止則復作。蓋土
虛不禁。木所搖。治法必補脾運痰。土厚載物。則風木自安。不必伐

肝。但以子湯為專藥。若火盛作酸。加吳茱萸。黃連。若不開鬱補土。務攻其痰。久久致虛。必變反胃痞滿眩暈等病矣。

附方

二陳湯 見一卷中風

外臺茯苓飲 見一卷中風

六君子湯 參 苓 朮 草 加陳皮名異功 加半夏名

左金丸 見一卷火

吳茱萸湯 茱萸一味

保和丸 見二卷痰飲

氣鬱湯 香 夏 枳 芎 陳 貝 梔 草 香附 蒼朮

類證治裁

卷之三

毒

逍遙散 見一卷火

導痰湯 見一卷中風

越鞠丸 見本卷諸氣

鬱治疾降鬱散

噯氣論治

噯氣。即內經所謂噯也。經言脾病善噯。又言寒氣客於胃。厥逆從下上散復出於胃。故為噯。後人因謂脾胃氣滯。起自中焦。出于上焦。凡病後及老人脾胃虛弱者。多有之。願亦有肝氣逆乘。噯酸作飽。心下痞鞭。噯氣不除者。仲景謂胃虛。客氣上升。必假重墜以鎮逆。旋覆代。亦有肺氣失降。而作噯者。蘇子降氣湯。去桂。其胃虛氣滯而作噯者。十味保和湯。其胃寒氣滯而作噯者。和胃氣者。和胃二。其胃寒飲食難化。時作虛飽。噯氣者。養中煎。或腎虛寒命門火衰。濁陰不降。致痞滿噯氣者。加減。如胃有痰火。噯氣者。星夏梔。由脾胃陽虛。中氣為陰邪阻格者。和中為要。脾

附方

旋覆代赭湯 見本卷嘔吐

蘇子降氣湯 見二卷失音

十味保和湯 參 朮 苓 夏 陳 薑 草 香附 砂

和胃煎 枳 陳 薑 草 或加苓 夏 丁香 木香

和胃二陳煎 見本卷飲食

養中煎 見本卷飲食

理中丸 見一卷中風

理陰煎 見二卷咳嗽

衰火中温飽虛痰驅滯寒滯虛氣降逆鎮

炭 星夏 梔子湯 半夏 南星 香附 石膏 梔子
 和 健脾散 人參 白朮 丁香 藿香 砂仁 肉果 神效
 中 炙草 薑 棗

類證治裁

卷之三

變氣

五

嘔

姪 左脇痞悶上撐胸臆頻嘔不舒按丹溪云凡上升之氣自肝
 而出左脇肝部也痞而上逆必犯胃做仲景旋覆代赭湯成氏
 所謂鹹以輭堅重以鎮逆也代赭湯去甘草薑棗加廣皮栝蕒
 皮枳壳俱麩炒三服而愈

類證治裁

卷之三

變氣

五

痞滿論治

心下滿而鞭痛為結胸。滿而不痛為痞。痞則閉而不開。滿則悶而不舒。病在胸膈氣分。而外不脹急。但不知飢。不欲食。脈緩弱。或虛弦。不宜通用消積。重損元氣。經云。太陰所至為痞滿。保命集曰。脾不能行氣於肺。胃結而不散。則為痞。傷寒之病。從外之內。故宜苦泄。雜病之痞。從內之外。故宜辛散。治傷寒熱痞。用苦寒藥。連瀉心湯。治傷寒陰陽不和而痞。兼用寒熱藥。三黃加瀉心湯。治傷寒陰盛陽虛而痞。則辛甘藥多。而苦寒藥少。半夏甘草生薑瀉心湯。治傷寒心下痞。關上脈浮。治傷寒熱痞。半夏瀉心湯。治胸滿而嘔。甘草瀉心湯。治胃虛氣逆。生薑瀉心湯。痞雖虛邪。然表氣入裏。熱鬱於心胸之分。必用苦寒。治胸有水氣。痞雖虛邪。然表氣入裏。熱鬱於心胸之分。必用苦寒。

類證治裁

卷之三

痞滿

藥

為瀉。辛甘為散。諸瀉心湯。所以寒熱互用也。雜病痞滿。亦有寒熱虛實之不同。如胃口寒滯。停痰痞悶者。辛溫泄瀉。橘皮半夏湯。或飲食寒涼。傷胃致痞者。溫中化滯。和胃煎。加查肉。麥芽。脾胃陽微。胸不清曠者。辛甘理陽。蒼桂丸。中氣久虛。精微不化者。升清降濁。補中益氣湯。加猪苓。澤瀉。醫通曰。升柴從九地之下。而脾虛失升。其清。若泄從九天之上。而降。其濁。所以交否而為痞也。脾虛失運。食少虛痞者。溫補脾元。四君湯。胃虛氣滯而痞者。行氣散滿。保和湯。或三因。食滯未除。作痞者。導滯消積。大和中飲。或枳實消痞。七氣湯。食滯未除。作痞者。導滯消積。大和中飲。或枳實消痞。氣受傷者。宜調補。異功散。心脾鬱結而成痞者。調其氣。歸脾湯。怒傷肝氣。逆而痞者。舒其鬱。解肝肺失肅降。痰熱阻痺者。清理上焦。清肺飲。去五味。甘草。加豆豉。煎。氣閉化熱。不食便秘者。辛潤開降。枳實山梔。竹茹。枇杷。葉。枳殼。

薤仁杏仁。麻仁。栝蒌仁。貝母。竹茹。石解。鬱金。或小陷胸湯。熱邪裏結。惡心中痞者。苦酸泄降。半夏。加枳。芍。烏梅。暑邪阻氣。熱渴滿悶者。暑邪面垢。脈。香薷飲。消暑。加桔梗。竹瀝。邪阻氣。嘔惡胸痞者。不飲。脘痞惡心。茹。杏仁。茯苓。滑石。鬱金。竹瀝。邪阻氣。嘔惡胸痞者。不飲。脘痞惡心。脈。甘。淡。滲。濕。六一散。加蘆根。茯苓。杏仁。薤仁。寒熱往來。胸脇痞滿。緩。和。解。半。表。半。裏。小柴胡湯。加枳。芍。烏梅。噎膈痞塞。乃痰與氣搏。不得宣通。痰為氣激。而升。氣為痰膩。而滯。故痞。痰。挾。痰。血。成。窠。囊。作。痞。脈。沈。塞。而。成。噎。膈。也。連。理。湯。生。薑。瀉。心。湯。痰。挾。痰。血。成。窠。囊。作。痞。脈。沈。瀉。日。久。不。愈。惟。悲。哀。鬱。抑。之。人。有。之。宜。從。血。鬱。治。桃。仁。紅。花。丹。皮。重。槲。

痞滿脈候

脈弦急而滑。胸腹痞痞。乃肝氣與食滯所成。為實。脈弦。或沈。瀉。或虛。

類證治裁

卷之三

痞滿

藥

大無力。氣口為甚。此脾胃受傷。為虛。寸口脈沈滑遲滑。為有滯。附方。大黃黃連瀉心湯。大黃。黃連。加黃芩。名三黃瀉心湯。附子瀉心湯。附子。連。大黃。附子。半夏瀉心湯。見一卷溫。若除人參。加甘草。名甘草瀉心湯。生薑瀉心湯。即半夏瀉心湯。加生薑。橘皮半夏湯。陳。夏。薑。二陳湯。見一卷中風。和胃煎。見本卷愛氣。厚樸溫中湯。樸。陳。苔。草。木香。豆蔻。乾薑。

濕燥 濕除 滲淡 暑却 暑祛 結消 肺理 肝和 利溫 脾歸 類證 補溫 補清 補消 滯消 滿散 補和 脾補 中補 陽理

苓桂朮甘湯 見二卷痰飲

補中益氣湯 見一卷中風

四君子湯 參 苓 朮 草 加陳皮名異功散

保和湯 參 朮 藜 草 夏 陳 藿香 砂仁 香附

三因七氣湯 見二卷咳嗽

大和中飲 見本卷飲食

枳朮丸 枳實一兩 白朮二兩 為末以全荷葉裹燒飯湯

資生丸 參 朮 陳 苓 藜 扁豆 白朮 草 山藥 苡苳

枳梗 藿香 黃連 扁豆 白朮 蓮子 麥芽 芡實

養中煎 見本卷飲食

類證治裁 卷之三

痞滿

平

歸脾湯 見二卷勞瘵

治中湯 見本卷飲食

解肝煎 見本卷諸氣

清肺飲 見二卷痰飲

小陷胸湯 見一卷溫

三物香薷飲 香薷一兩 厚樸 扁豆各五錢 冷服

消暑丸 見一卷暑

六一散 見一卷溫

平胃散 朮 樸 陳 草

小柴胡湯 見一卷溫

暑 連理湯 見一卷暑

類證治裁 卷之三

痞滿

平

痞滿

金氏寒熱拘急脈不緊數胃痛飲入輒嘔中焦痞阻濁瀉痛宜宜
通法白通草製半夏橘白草豆蔻枳殼蘇梗赤苓甘草梢煨薑
一服症減痞滿未除用瀉心法半夏黃連俱薑汁炒黃芩乾薑陳皮
枳壳甘草梢木通山梔二服全安

殷氏身熱胸痞氣促微欬嘔吐粥飲痰粘滯瀉經止數月脈息三
五不調兼帶浮數醫投桂附熱劑致咽喉腫礙格陽於上予謂
此懷妊惡阻兼外感也宜辛涼以解痰熱用豆豉杏仁薑皮鮮
竹茹陳皮茯苓製半夏枇杷葉二服熱退痞消

張氏寒熱似瘧胸痞不食汗止腋下關所服方混用枳椇查藤積
類證治裁 卷之三 痞滿 查

柳青皮之屬此邪在上焦誤行克伐徒傷中下焦耳予用半夏
瀉心湯去芩連甘草加柴胡煨薑萋皮蘇梗茯苓數服隨愈
巢氏發熱胸痞時嘔脹入背脇脈沈小做小陷胸湯用半夏枳實
枳壳陳皮茯苓加薑煎二服病除

腫脹論治

腫在外屬水脹在內屬氣腫分陽水陰水脹別氣實氣虛因濕熱
濁滯致水腫者為陽水因肺脾腎虛致水溢者為陰水濁氣在上
為實脹中氣不運為虛脹辨其位則臟腑脈絡皮膚上下表裏皆
有之辨其因則寒熱濕痰氣血鬱滯蟲積皆致之經云三陰結謂
之水三陰手太陰肺也又云濁氣在上則生脹脹也又曰飲食起
居失節入五臟則腹滿閉實此虛也又曰臟寒生滿病此寒也又曰諸
脹腹大皆屬於熱此熱也又曰營氣循脈衛氣逆之為脈脹衛氣併
脈循分內為膚脹又經論五臟六腑之脹甚詳不備錄岐伯曰水
始起目窠微腫如新卧起之狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫

類證治裁

卷之三

腫脹

查

腹乃大水已成以手按其腹隨手而起如裹水之狀光腫如泡此水腫
也膚脹者寒氣客於皮膚發然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹
容而不起腹色不變此膚脹也皮厚色蒼一身盡腫或自上而下
自下而上鼓脹者腹身皆大大與膚脹等色蒼黃腹筋起此鼓
者多屬水鼓脹者腹身皆大大與膚脹等色蒼黃腹筋起此鼓
脹也膚脹屬脾別有蠱脹因氣血鬱痺久則凝滯不行腹形充大
中實有物非蠱即血非如鼓脹之腹皮弼急中空無物也有單腹
脹四肢不腫但腹脹也症最難治亦名蠱脹經言諸濕腫滿皆屬於脾
又言其本在腎其末在肺皆積水也腎何以聚水腎者胃之關也
關門不利故聚水而從其類也是知腫脹無不由肺脾腎者以肺
主氣化脾主運輸腎主藏液也且脹不必兼腫腫則或兼脹亦有

腫脹並至者。病在水分。以治水為主。而兼理氣。氣化水。自化也。病在氣分。以理氣為主。而兼利水。水行氣亦行也。但其間虛實必辨。凡陽症必熱。熱者多實。陰症必寒。寒者多虛。溺赤便秘。脈數有力。為實。溺清便瀉。脈微無力。為虛。實者六淫外客。飲食內傷。忽然浮腫。其來必速。虛者情志操勞。酒色過度。病後氣虛。其腫漸至。知此而後治法可詳。治水腫必健脾胃。導水。實脾。治鼓脹必通腑疏肝。果厚樸。益智。青皮。濕在下者用分利。小分清飲。濕在上中下者用分利。通草。杏仁。厚樸。海金沙。濕濁在裏者潔淨腑。膀胱為淨腑。潔淨。利風水。脈浮者開鬼門。越婢湯。勝理為肺脾不運者消皮水。已。茯苓湯。五皮飲。按五水。風水皮水。正水石水。黃汗也。仲景曰。風水脈浮。骨節疼痛。惡風。皮水脈亦浮。附腫。按之沒指。不惡風。腹如

類證治裁

卷之三

腫脹

鼓不渴。當發汗。正水脈沈。通身發熱。自當石水。脈沈。腹滿。不喘。黃汗。水脈沈。通身發熱。胸滿。四肢頭面腫。久不愈。必發癰。肺氣壅熱者用蕭降。麥門冬湯。加茯苓皮。山梔。脫痞鬱熱者用苦降。半。瀉心。清陽痺結者通腑陽。枳實。杏仁。半夏。胃滿濁逆者洩肝木。仁。厚樸。檳榔。椒目。胃陽虛者用溫通。人參。橋白。半夏。脾陽虛者用健。吳茱萸。川棟子。脾腎陽虛者用氣化。腎氣。中氣陷者用升提。補中。木。運。益智。神。脾。邪侮土者和肝胃。木香。枳殼。白芍。竹。肝經鬱熱者降逆火。山梔。丹。鉤藤。青。暴怒傷肝者平逆氣。解肝。三焦壅滯者用疏利。麻。清。熱。皮。金。橘。暴。滯者兼消利。雞。食滯中滿者專消導。和。中。氣虛中滿者兼消。補。導。寬。氣虛兼寒者宜溫補。理。中。湯。氣血鬱積夾濕熱者平肝。小。溫。清。濁。混。淆。氣。喘。溺。少。通。身。腫。脹。者。煖。下。洩。瀉。再。餘。濕。熱。痰。

積脈實有力者滌宿水。禹功散。導水。血沫凝滯經隧者利搜逐。元氣。六君湯。單腹脹症多屬肺腑宜通勿用滋膩。守補。沙苑。子。益。膝。枳。殼。中。前。子。砂。仁。殼。麻。仁。郁。李。仁。椒。目。杏。仁。括。蕪。仁。大。腹。皮。單。腹。脹。俗。名。蜘蛛。脹。腹。腫。四。肢。瘦。山。脾。氣。虛。極。真。臟。已。傷。也。論。中。宜。活。參。婦。人。先。腫。脹。而。後。經。斷。者。為。水。分。先。經。斷。而。後。腫。脹。者。為。血。分。水。分。通。經。丸。血。分。通。經。先。喘。而。後。脹。者。治。在。肺。子。飲。五。先。脹。而。後。喘。者。治。在。脾。理。中。湯。水。腫。先。起。於。腹。後。散。四。肢。者。可。治。先。起。於。四。肢。後。歸。於。腹。者。死。凡。病。水。分。皆。陰。勝。與。氣。分。不。同。水。腫。症。而。上。按。肉。如。泥。腫。有。分。界。痛。在。氣。分。則。其。皮。光。薄。其。腫。不。連。每。自。下。陽。症。陰。症。皆。有。之。若。病。在。水。分。多。陰。症。凡。虛。腫。溺。瀉。香。蘇。濕。勝。不。化。胃。苔。濕。滯。中。滿。白。朮。丸。因。於。肺。者。飲。五。皮。因。於。脾。者。湯。補。中。因。腎。陰。

類證治裁

卷之三

腫脹

虛。真。陽。無。以。化。者。六。味。丸。加。因。腎。中。命。火。衰。不。能。蒸。動。關。門。者。腎。丸。夫。水。為。至。陰。其。標。在。肺。其。本。在。腎。其。制。在。脾。腎。虛。則。關。閉。其。水。必。逆。而。上。泛。脾。不。能。制。而。反。為。水。所。漬。故。肌。肉。浮。腫。肺。不。能。化。而。反。為。水。所。凌。故。氣。息。喘。急。皆。陰。勝。之。害。也。經。言。膀。胱。藏。津。液。氣。化。則。能。出。所。謂。氣。化。者。即。右。腎。命。門。真。火。也。火。衰。則。不。能。蒸。動。腎。之。關。門。而。水。聚。焉。腎。氣。以。桂。附。蒸。動。其。關。積。水。始。下。以。陽。主。開。也。此。法。不。獨。治。水。腫。凡。治。脹。者。其。要。亦。在。通。陽。而。已。凡。下。氣。虛。乏。中。焦。氣。壅。欲。散。滿。則。恐。虛。其。下。欲。補。下。則。滿。甚。於。中。當。以。啓。峻。峻。補。其。下。疏。啓。其。中。故。氣。得。峻。補。則。上。行。而。將。其。中。中。焦。運。行。壅。滯。疏。通。中。滿。自。消。下。虛。自。實。經。所。謂。塞。因。塞。用。也。若。水。

腫喘促。清理肺氣為主。凡禽畜無肺者無溺。故水腫宜清肺也。腫脹症。須分陰陽。濕熱壅滯屬陽。濁氣凝聚屬陰。陽症按之痛。陰症按之不痛。陽症起於中焦。陰症起於下焦。陽症治在腑。陰症治在臟。陽症宜清陰。陰症宜溫。毫釐千里不可不辨。腫症易治。脹症難治。腫辨陽水。陰水。陽水易治。陰水難治。脹症頭緒更多。首辨有形無形。無形則輕劑宜通。有形則重劑攻伐。又須辨在絡在經。在腑在臟。經絡易治。臟腑難治。又須察虛實。實者可治。虛者難治。此其大綱也。然後再辨其因寒因熱。因濕因痰。因氣因血。因滯因積。審而治之。

類證治裁

卷之三

腫脹

寒

濕熱倘脹滿。或有有形之物。宜緩下之。積有其實宜緩按脹在腸胃。則食入脹。加治在通腑。若二便通調。則脹在臟。脾腎等臟如靈或脹在腸外。三焦脂膜間。靈樞所以謂脹皆在臟腑之外。排臟腑而廓胸膈也。治在辨其陰陽虛實。上下表裏。皮膚經絡。氣分血分。水分。因寒因熱。因濕因鬱。因痰飲。因積滯。或有形無形。宜汗宜利。宜分消。宜辛泄。宜清肅。宜溫通。宜升舉。宜疏利。宜補攝。宜開鬱。宜緩攻。宜軟堅。化痞宜理。癆導滯要在宜通。勿用守補。若腫症身面大勢已退。其肢節足跗之水濕。浸淫未消。宜針刺以決其流。此出路也。

腫脹脈候

沈而滑浮而遲。弦而緊者。皆水腫。盛而緊。大堅以瀉。通而滑者。皆脹滿。二病之脈。實大可治。虛微難治。腫由腹散入四肢。可治。由四肢脹入腹。難治。凡水腫病。唇黑肝傷。缺盆平心傷。臍突脾傷。背平肺傷。足心平腎傷。五者不治。靈樞經曰。腹脹身熱。脈大一逆也。腹鳴而滿。四肢清泄。脈大二逆也。腹脹大。四末清脫。形泄甚。三逆也。腹脹便血。四逆也。並不治。腹脹肚見青筋。腹脹便泄。久瘡虛腫。皆不治。

附方

實脾飲 見一卷濕

小分清飲 見一卷濕

類證治裁

卷之三

腫脹

寒

大橘皮湯 五苓散合六一散 再加陳皮 木香 檳榔

四苓散 見一卷暑

六一散 見一卷溫

越婢湯 見二卷痰嗽

防己茯苓湯 防己 黃耆 茯苓 甘草 桂枝

五皮飲 大腹皮 赤茯苓 陳皮 桑白皮 薑皮

麥門冬湯 麥冬五十枚 粳米五十粒

半夏瀉心湯 見一卷溫

六君子湯 見一卷中風

金匱腎氣丸 見二卷虛損

補中益氣湯 見一卷中風
解肝煎 見木卷諸氣
廓清飲 陳芥子 苓 枳 樸 澤瀉 大腹皮 萊菔子 白
雞金散 雞內金 沈香 砂仁 陳香櫟 爲末參湯下
和中丸 陳香附 苓 夏 枳 查 麴 麥芽 砂仁 五穀
寬中湯 陳香附 苓 夏 枳 查 麴 尤 樸 萊菔子
理中湯 見一卷中風
溫胃飲 見一卷中風
小溫中丸 二陳湯加白朮 神麴 生香附 苦參 黃連
禹餘糧丸 禹餘糧 醋水打神麴丸 羌活 川芎 蓬朮
三稜 白朮 蒺藜 陳皮 青皮 木香 大

類證治裁 卷之三
神麴 牛膝 當歸 炮薑 附子 肉桂 研細
神麴糊丸 葉天士去附子蓬朮青皮 加茯苓
禹功散 黑牽牛 茴香 薑汁調服 或加木香
神芎導水丸 苓 連 黑丑 川芎 薄荷 大黃 滑石
舟車神佑丸 甘遂 大戟 芫花 大黃 輕粉 黑丑
桃仁承氣湯 見一卷痰
大小承氣湯 見一卷溫
歸脾丸 見二卷勞瘵
通經丸 赤芍 歸尾 生地 川芎 牛膝 紅花 桃仁
香附 琥珀 蘇木屑 五靈脂
五皮五子飲 五皮飲加蘇子 車前子 大腹子 葶藶子
香蘇散 橘紅 防已 木通 蘇葉 生薑

類證治裁 卷三

胃苓湯 見一卷中風
白朮散 朮 苓 陳 麴 砂仁 五穀蟲 荷葉 米湯
枳朮丸 見木卷痞滿
六味丸 見一卷中風
安肺湯 黃芩 桑皮 貝母 花粉 杏仁 知母 天冬
加味枳朮丸 枳 朮 陳 真 苓 蘇 桔 草 桂
參朮健脾丸 參 朮 陳 苓 歸 芍 芎 藁 麥
導水茯苓湯 赤苓 麥冬 澤瀉 白朮 桑皮 紫蘇
燈心 水煎
二蛟散 芒硝三兩炒乾爲末 和老黃米三兩炒研 加黑

類證治裁 卷之三
調營飲 芍 歸 陳 檳榔 蓮肉 延胡 白芷
大調經散 大黑豆五錢 茯苓三錢三分 西琥珀三分半
每末三錢紫蘇湯下日三服
小調經散 沒藥 西琥珀 桂心 白芍 當歸各一錢
當歸散 歸 芍 丹 朮 陳 苓 桂心 木香 木通
當歸散 檳榔 芍 丹 朮 陳 苓 桂心 木香 木通

一三九

腫脹

弟 寒濕腫脹水漬經隧少腹陰囊腿足通腫大腹按之鞭缺益平肢冷目黃面頰俱浮便滑溺少脉沈遲而虛背寒腹熱坐不得臥病在水分法先分消佐以通陽防已木通大腹皮洗猪苓茯苓薏米半夏砂仁壳附子薑三服腫退肢暖命却鹹食淡然後主以健運佐以淡滲去防已木通腹皮附子加生朮雞內金炙半夏麴炒杜仲數服食進微汗出囊濕便乾此經腑水濕俱有出路惟診左尺虛酌腎氣湯桂心牛膝車前茯苓山藥椒目茵陳五加皮薏米十數服悉愈後常用八味丸調理得安
姪孫由腿脛腫入腹漸至胸脇堅滿法在不治姑與分消之劑得

類證治裁

卷之三

腫脹

三

汗腫畧退然寒濕內蘊非溫通不愈用厚樸桂心附子牛膝茯苓大腹皮砂仁壳老薑三服由面目退及胸腹又數服腿足腫全消

王 陰瘡服劫藥瘡止面色晦黑決其後必病脹不信予曰劫痰暫效邪原未淨一也今卯月中旬木火司令一逢辰上濕痰內動脾陽失運必變中滿二也毒品易犯食忌三也面黑無澤腎水侮土小便不利四也後果如言視其目窠微腫如新卧起狀知其裏水先用實脾利水之劑再用金匱腎氣丸料煎湯數十服腫脹悉退藥乍止時交未月濕土已旺漸脹小洩不利又服前丸兩月全愈

族某軀長體壯病腫脹或用破氣消滯之品服益劇行立腸幾裂

出臍突缺盆平法本不治診其脉細如絲度必勞力傷精脾腎兩德之症詢所由自言長途輦重池間出浴酒後入房忽覺瀉瀉通是濁血驚眩欲仆食減腹膨細急欲死遂用腎氣丸料大劑煎服減附子丹澤熟地炒炭用一劑腹有縞紋再劑缺盆現溺爽膈寬又數服腹脹漸退仍用加減腎氣丸服經言用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎故與腎氣方合後不守禁忌飽食山芋及未熟雞蛋服復作求治予言前方必不驗卒如言房兄病後失調面浮附腫腹膨食少小水短濇腰膝乏力經言諸濕腫滿皆屬於脾然土衰必補其母非命火不能生脾土且腎

類證治裁

卷之三

腫脹

三

為胃關關門不利故聚水必得桂附之陽蒸動腎氣其關始開積水乃下經所謂膀胱氣化則能出也用桂附參朮炮薑茯苓車前牛膝砂仁陳皮山藥為丸一料而安

陳 傷酒病單腹脹診其脉知脾陽虛用葛花解醒湯加牛膝枳椇子腹寬展能進食矣後用參朮健脾丸去炙草大棗加益智仁炒砂仁壳服愈

韋 病後感寒腹痛漸成脹滿脉沈微溺少食入脹加腑陽不行治以溫通則脹已小茴香大腹皮洗草果木通砂仁益智仁炒茯苓廣皮煨薑空心四服而愈

石 腹脹不飢小水不利脉沈瀉腑氣痺窒不宜用砂仁壳枳壳

木通茯苓益智仁草果俱五穀蟲雞內金俱萊菔子研數服愈

陳 五旬以上病單腹脹食後作飽得氣洩畧寬明係胃病服膠藥浸至腸滿跗冷脉來沈濡左關微弦症由腑氣久衰疏泄失職氣分延虛漸干水分致盛乾口燥小水不清化源乏力矣通陽佐以益腎通陽則傳送益腎則氣化行腹脹自寬沙苑子酒蒸各錢半 益智仁煨 橘白砂仁各一錢 茯苓三錢 杞子錢 大腹皮洗各錢二分 枳壳炒錢二分 十服脹寬口潤便爽跗温右脉漸起惟兩尺虛不受按加補骨脂核桃肉去腹皮枳壳食宜淡戒腥膩難化及一切壅氣食物再以猪肚納卵蒜其中紮定淡煮食之腑氣通則納食不壅服之甚通暢脹去七八矣又加沈香牡蠣十數服小腹之鞭者亦輒焉

類證治裁

卷之三

腫脹

三

蠲十數服小腹之鞭者亦輒焉

族女腕脹愛腐經連腹痛間發寒熱按東垣云胃為衛之本脾乃營之源脾胃陽衰納運不旺致脹滿瘵停宜乎營衛失度衝任不調矣做內經濁氣在上則生脹脹之例以通陽降濁一陳湯去甘草加白蔻壳韭子益智子俱小茴香穀芽神麴俱香附薑煨薑數服諸症皆平

沈氏胎前腹滿產後面目肢體浮腫效頻溺少此肺氣不降水溢高原也或勸用腎氣湯子力阻不可一服而小水漸滴全無服益甚脉虛濡欲絕用五皮飲參茯苓導水湯去白朮木瓜檳榔腹皮加杏仁蘇梗栝萐皮冬瓜皮製半夏數服腫消腹漸寬矣

後用茯苓半夏生朮砂仁薏仁陳皮蘇子木香厚樸水泛丸服

二料遂平 按肺為水之上源主氣此症水阻氣分以肺不能通調水道下輸膀胱故溢則水留而為脹其症年餘無汗得蘇杏微汗而腫消得五皮行水而便利兼做內經開鬼門潔淨府遺法也
李氏有年食入氣壅繞臍積冷脹連胸脇溺少便溏脉沈微全是腑陽向衰濁陰凝結前用二苓木通開太陽之裏砂仁陳夏理太陰之滯乾薑厚樸薏仁温通利濕冷脹減便溺爽而胸痺未舒猶是中脘清陽不旋之故其家用俗傳牛口中蝕出和稻草煎湯服甚適予做用仲景栝萐蘆白白酒湯加半夏青皮厚樸

類證治裁

卷之三

腫脹

三

烏藥木香旋轉清陽可以納穀

張氏腹膜脹連帶脉腰圍緊掣如束脉堅而搏指此病久兼入奇經宜通其腑並理帶脉枳實大腹皮懷牛膝酒蒸各錢半砂仁木通各錢二分當歸蘆花苓郁李仁二錢鬱金六分四劑脹寬帶脉亦不緊掣矣後去郁李仁枳實加沈香磨汁三匙數服全愈

姜氏五旬餘腹膨中空外縶急食入不加脹頭眩耳鳴口乾舌硬溺赤沫便艱足重墜脉沈微症屬三焦濕鬱生火內經亦謂諸腹脹大皆屬於熱諸病跗腫皆屬於火若鬱熱不除遂成鼓脹不治用山梔大腹皮黃蘗知母俱生地麥冬丹皮赤苓冬瓜皮車前子數服已效後去黃蘗丹皮加海金沙藜蘆服得安

眩暈脾宜升則健胃宜降則和今腕中食入作飽腑氣不司下行
醫用流氣之劑更致腰痛帶下吐痰診脈右關沈微經所謂濁
氣在上則生脹也藥以辛溫通陽泄濁為宜製半夏砂仁壳
枳壳益智仁韭子茯苓陳皮栝萸皮穀芽杜仲煨薑數服諸症
俱除

紀氏先因右脇痛繼而腕腹滿悶食入脹加腑氣失降實由肝失
疏泄左關脈不甚弦右寸近滑恐屬妊兆泄肝通腑仍不礙胎
為穩椒目砂仁壳茯苓栝萸皮杏仁陳皮木香數服而平

趙 童年色萎腹脹脈疾寒熱無汗溺瀉以腎氣湯治牛膝益智
仁車前子茯苓薏米熟地牡蠣數服病減加參桂砂仁壳服愈

類證治裁

卷之三

腫脹

一

張 小腹乃肝腎部分脹滿溺瀉已屬下焦氣化失司今通大腹
腫硬如石脈右弦大左虛瀉症屬單脹治宜通陽勿用守補黨
參茯苓牛膝炭沙苑子益智仁 煨 杞子炭沈香 磨 數服溺爽脹
寬

張 黃疸積年不愈近成單腹脹堅滿食減便瀉乃氣不化水然
神脈頹弱難挽之病姑用牡蠣薏仁茯苓車前子茵陳砂仁壳
益智仁牛膝桂心數服腹脹溺利伊兄復請終以沈疴辭之

本 陰水腹大腫鞭如石脈緩肢冷囊腫用腎氣湯桂心 五分 附子
三 蒸牛膝 二錢 車前子 一錢 茯苓 三錢 大腹皮 半錢 椒目 廿粒 八服囊濕如
淋腹軟溺利加乾薑山藥 末 大腹皮 湯 泛丸以通陽崇土防水

而安

張 脇痛脹少腹腫硬誤服攻蕩劫劑脹劇氣注舉丸脈沈小右

弦瀉乃肝失疏泄氣鬱留濁治先理肝以泄濁厚樸 七分 小茴香

青皮 各錢 枳壳 半錢 茯苓 核 各二錢 大腹皮 三錢 延胡 八分 椒目 廿粒 車

前子 三四服脇痛疝墜俱止但腹右硬痛不任偏臥食不加脹

二便如常按脈論症單脹何疑然病因臟損治在通攝兼施厚

樸 五分 枳壳 半錢 牡蠣 茯苓 各三錢 歸鬚 核 各二錢 牛膝 一錢 桂心 四分

服症平後做腎氣丸用牛膝車前桂心茯苓山藥當歸牡蠣白

芍莢肉蜜丸愈

金氏中年經斷腕腹脹大季脇緊掣如束食下滿逾時痛便瀉日

類證治裁

卷之三

腫脹

二

數行哺後股脛重墜脈陽搏陰微症由癩聚胞宮氣閉留可
導使下失治則衝病及帶腰圍急中下焦氣機鈍窒運納無
權滿痛瘕泄氣虛下陷由來漸矣前年立法溫通肺陽脹寬能
納今先主通降脹緩再議半夏薤白草果 煨 砂仁壳蘇子橘

白大腹皮川椒目降香三服滿痛除尚調帶絡為其氣虛則弼

急而陷下也滯參升麻益智子沙苑子茯苓神牛膝炭當歸鬚三

五服後腰肋鬆而股脛復常

鄒 六旬外由泄瀉漸次足腫入腹為脹延及通腹堅滿面浮肢

腫水濕不運瀉瀉未止若論平昔嗜飲便紅宜丹溪小溫中丸

分理濕熱然脈來沈小兩尺如絲明係脾腎久衰火土俱弱致

氣鈍濕壅清濁混淆此消導破氣決非治法但溫理脾腎兼佐
泄瀉自可向安炮薑三錢肉蔻神麴炒各一錢益智仁煨錢半茯苓三錢
膝蒸砂仁壳錢半大腹皮錢車前子橘白各八分冬瓜皮錢二倒
蝕牛口和稻草二兩煎湯代水數服腫退瀉止去薑蔻神麴加沙苑子
半夏麴粳米炒數十服脹全消匝月後不節葷茹濕麩復脹湯
少仍用牛膝車前茯苓益智仁炮薑萊菔子砂仁麥芽雞內金
俱脹消而健

韋 胸高突腹腫鞭面黃鼻臥足腫溺瀉夜分不寐想成童後恣
啖生冷秋冬以來邪痼氣窒延春身熱膝冷食入脹加臑腑經
脉窒痺治先分理濕熱佐以輭堅括蕞仁山梔茯苓砂仁壳大

類證治裁

卷之三

腫脹

矣

腹皮車前子牛膝炒神麴杏仁生牡蠣椒目六七劑脹寬腫輭
者十四五知肝失疏泄脾失運輸分消中宜佐暢肝運脾用陳
皮鬱金蘇梗當歸石斛山梔茯苓薏苡雞內金黃炙牡蠣表裏分
消而溺利汗出矣惟哺後陽升頰熱頭眩溺色渾行則氣急懼
當春鼻仍易臥治在降陽和陰熱地牛膝煨炒丹皮山梔石斛
薏仁赤苓大腹皮冬桑葉燈心小麥溺清眩熱已惟宵則氣急
寐不甚穩去赤苓加茯神萹霜桑皮蜜炙防已炙草數服氣舒而
胸突漸平腹寬而膝冷漸和

積聚論治

諸有形而堅着不移者為積。諸無形而留止不定者為聚。積在五
臟主陰病屬血分。血有形而聚在六腑主陽病屬氣分。動者而
難經既以積聚分屬臟腑。俞不通凝血蘊裏不散。津液滲著而
不去。積乃成。曰難經曰。積者五臟所生始發有常處。痛不離其部
上下有終始。左右有窮處。聚者六腑所成始發無根本。上下無留
止痛無常處。巢氏病源別立癥瘕之名。以不動者為癥。動者為瘕。亦猶
難經之積聚而已。第無形之瘕聚其散易有形之癥積其破難。治
之者先辨有形無形。在氣在血。可畧得其概矣。其生於五臟者。肺
之積曰息贖。在右脇下。肝之積曰肥氣。在左脇下。心之積曰伏梁
在臍上。上至心下。脾之積曰痞氣。在胃脘。腎之積曰奔豚。發於少

類證治裁

卷之三

積聚

矣

腹上至心。上下無時。其見於臍下為癥瘕。瘕者按之不移。即血瘕
食瘕之屬。瘕者假物成形。如血蠶石瘕之類。見於胸脇為痞。痞者
乃結塊在肌肉而可見。瘕由內著結。瘕由外結。既分其部。必原
所起。初由寒氣瘀血痰沫交結於胃。膜久而盤踞。堅牢至元氣日
削。盤踞日深。攻補兩難。措手惟先理其氣。大七氣湯。氣行則脈絡
通。或先調其中。湯中益氣。脾運則積滯化。其藥性宜辛散溫通。方
能入陰出陽。解散凝聚。然初為氣結在經。久則血傷入絡。必理血
分。如歸尾桃仁蘇木延。兼通絡。如歸尾。韭根。鱉甲。搜逐之中。
酌補元氣。如五積等丸。用。即邪深積。鋼務令脾胃氣旺。乃可消磨。
堅結。否則尚事攻削。正氣益衰。積聚何由去乎。知養正則邪可除。

而後結者散之。客者除之。留者行之。堅者削之。強者奪之。鹹以軟之。苦以瀉之。和其中外。可使必已。且經曰。大積大聚。毒可犯也。衰其大半而止。懼盡攻其邪。必傷其正也。今條列方治。有息積病。脇下滿氣逆。不妨於食。化氣湯。水。有腸覃。寒客腸外。與衛氣搏。因有所繫。癥而內著。瘕肉乃生。始如雞卵。稍以益大。狀如懷子。月事以時下。阿魏膠。有石瘕。生於胞中。寒氣客於子門。氣不得通。惡血留止。狀如懷子。月事不以時下。和血通經湯。若不應見。二症皆生於女子。有奔豚。病從少腹起。上衝咽喉。得之驚恐。金匱奔豚湯。有伏梁。環臍而痛。湯。加桂枝。其息賁。肥氣。痞氣。諸積。積。凡通治五積。成形堅久。攻積丸。通治六聚。隨氣上下。散聚。有血瘕。沈氏血瘕丸。

類證治裁

卷之三

積聚

疝

有食瘕。大和。有疝瘕。導氣。有蛇瘕。赤蜈。有蠶瘕。燕翼。有髮瘕。香澤。有痞塊。連羅。有痞積。脇堅如石。化痞散。有胸痞。心湯。有肋痞。右肋有形。有瘕痞。左肋有形。屬有飲瘕。湯。合五苓散。有酒瘕。傷成積。保。有茶瘕。嗜茶成積。好食茶葉成瘕。椒紅茶葉各一兩。研末和丸。好食生米土灰成瘕。大七氣湯。加有麩積。阿魏。或萊。有肉積。小魏。或狗肉積。杏仁。山查。有菜菔積。桂香。有魚鱉積。紫蘇。橘皮。有蛋積。白蔻。豆豉。有小腹瘕積。形如卵。攻痛。有蟲積。雷丸。檳榔。推子。有積。跌撲。蓄瘀。面黃。黃。有寒積。附子。理。有痰積。導痰。有疝積。肥兒血積。黑桃。仁。承氣湯。肝脾虛者。歸脾。肝火鬱者。蘆薈。憂思鬱者。六鬱。肝腎虧者。腎氣。量新久。酌虛實。或一補一攻。或三補一攻。以積聚由

漸而成。治必由漸而去。故緩攻通絡。勿峻用吐下。致傷胃氣。而損真元也。凡堅頑之積。多在腸胃以外。募原之間。非藥力所能猝及。宜用。阿魏膏。琥珀膏。水。以攻其外。用鍼法。以攻其內。且以艾火灸法。消散固結。為尤效。仲景曰。積聚瘕瘕。不轉動者。難治。五積中。奔豚症。最難治。得效曰。宿血滯氣。結為瘕瘕。腹中痞塊。堅硬。作痛。當以破氣藥治之。或以類從。如敗梳。治蝨瘕。銅屑。治龍瘕。麴藥。治米瘕。石灰。治髮瘕。叔微曰。治積要法。大抵所惡者。攻之。所喜者。誘之。則易愈。入門曰。積初屬寒。宜辛溫消導。大七氣湯。久則為熱。宜辛寒推盪。

類證治裁

卷之三

積聚

疝

木香。檳榔。丸。壯人無積。虛者有之。先補虛。使氣血旺。則積消。木香。通元。二八丹。士材曰。嘗製陰陽攻積丸。通治五積六聚。七瘕八瘕。疰瘕。蠱血。瘕食。不問陰陽。皆效。藥品稍峻。用之有度。補中數日。然後攻伐。不問積去多少。又與補中。待其神壯。則復攻之。屢攻屢補。以平為期。此予獨得之訣。百發百中者也。積聚脈候。右脇有積氣。肺脈結。結甚則積甚。結微則積微。難。五積為陰。沈伏。附骨。六聚沈結。痼則沈伏。脈。脈弦緊為積。弦緊而微細者。瘕也。積聚瘕瘕之脈。皆弦緊在心下。即寸脈弦緊在胃脘。即關脈弦緊在

臍下即尺脉弦緊積脉堅強者生虛弱者死沈而有力為積沈緊為寒積弦而牢為積聚弦而伏腹有癥不可轉不治經癥瘕脉多弦弦細為癥弦急為瘕春鬱脉沈瀦積脉弦堅淡丹

附方

陰陽攻積丸 茱萸 乾薑 官桂 川芎各一兩 黃連 茵蔯 延胡 人參 橘紅 茯苓 積榔 厚樸 枳實 另研五錢 皂角六兩煎汁泛丸 每服八分漸加至一錢 半煎湯下 此丸通治五積六聚 七癥八瘕症瘕血痰食皆效
息黃丸 厚樸八錢 黃連一兩二錢 人參二錢 炮薑 茯苓 川椒 紫苑各錢半 桔梗 三稜 天冬 陳皮 川烏 薏仁各一錢 青皮五分 巴霜四分 各研末方入巴霜蜜丸桐子大初服二丸日加一丸至大便溏日減一丸仍至二丸再日加增

類證治裁

卷之三

積聚

公

積肝 肥氣丸 柴胡二兩 黃連七錢 厚樸五錢 川椒四錢 炙草三錢 莪朮 昆布 人參各二錢半 皂角 去皮弦子煨 茯苓各錢半 服法照前積塊減半勿服 巴霜 各五分 巴霜後入蜜丸 厚樸各五錢 黃芩二錢 伏梁丸 肉桂 茯苓 丹參各一錢 川烏 炮薑 紅豆 菖蒲 巴霜各五分 丸同前
積脾 痞氣丸 厚樸五錢 黃連八錢 茶黃三錢 黃芩 白朮 各二錢 茵陳 砂仁 乾薑各錢半 茯苓 人參 澤泄各一錢 川烏 川椒各五分
積腎 奔豚丸 厚樸七錢 黃連五錢 苦棟子酒煮三錢 茯苓 澤泄 茵蔯 各二錢 延胡錢半 全蠍 川附 獨活各一錢 川烏 丁香 巴霜另研各五分 肉桂二 分 蜜丸如前 東垣五積丸多用人參且磨積用丸不用 湯取漸次消 磨之義也
氣行 大七氣湯 青 陳 桔 藿 桂 草 三稜 蓬朮 益 香附各一錢 一方加大黃 檳榔

類證治裁 卷三

初積 排氣飲 香附 烏藥 澤瀉 陳皮 藿香 枳壳各 木香 厚樸各一錢 食加麩藥 寒加薑桂
調中 補中益氣湯 見一卷中風 參苓湯 參 朮 草 芎 歸 芍 木香 香附 延胡 薏苡 青皮 陳皮 丁香 茵蔯 炙草 化氣湯 各五錢 桂心 木香各二錢半 胡椒 沈香各 一錢一分 每服 二錢 薑湯下

息積 木香調氣散 蒼朮各一錢 桂心 甘草各三分 砂仁五 分 阿魏府香膏 阿魏五錢 麝香一錢 雄黃三錢 紅蓼花 每服 子四兩 人參 白朮各一兩 肉桂五錢 三錢 蘇木各二錢 三稜 莪朮 和血通經湯 當歸 熟地 蘇木各二錢 紅花三分 血 木香 貫仲 肉桂各八分

石癥 見眼丸 附子四錢 鬼箭羽 紫石英各三錢 澤泄 肉 桂 延胡 木香各二錢 檳榔二錢半 血竭錢 半 大黃三錢 桃仁三十枚 三稜五錢 水蛭一錢 糊丸 十全大補湯 見一卷中風

人虛 金匱奔豚湯 歸 芍 芎 芩 草各一錢 半夏 甘李 根白皮 葛根各二錢 薑三片 此治衝脉 為病未嘗用少陰藥也設泥奔豚 為腎積而用代腎之劑則謬矣 大建中湯 川椒 乾薑 人參 饴糖

伏梁 攻積丸 茶黃 乾薑 官桂 川烏各一兩 黃連 檳榔 茯苓 厚樸 枳實 人參 沈香 琥珀 延胡 半夏麩各入錢 巴霜五錢 蘇朮 阿魏 浮石 香附 雄黃 檳榔 化積丸 蘇朮 瓦楞子 五靈脂 水丸

類證治裁

卷之三

積聚

公

散聚湯 二陳湯加當歸 杏仁 桂心 檳榔
血癥丸 五靈脂 大黃 甘草梢 桃仁各五錢 生地七
三稜 莪朮 赤芍 官桂二錢 延胡 當歸各六錢
乳香 沒藥各一錢

大和中飲 見本卷飲食

導氣湯 川棟子四錢 木香三錢 茴香二錢 茱萸一錢

赤蜈蚣散 蜈蚣一條炙研酒服 治誤食菜中蛇精或食蛇
肉致成蛇瘕腹內常飢食物即吐

蕪荑湯 蕪荑炒 不拘分兩煎水代茶亦有雷丸錫灰之
屬治之者

香澤油 香油一升 入香澤煎成置頭邊令氣入鼻蟲當口
出急以石灰手捉取抽盡 又方以敗梳煎湯服

連蘿丸 黃連 吳茱 白芥子 蘿菔子 山梔 川芎
香附 查肉 神麴 蒸餅為丸

潰堅湯 木香汁 歸朮 陳夏 枳 查 檉 香附 砂仁

類證治裁 卷之三 積聚

大黃散 三稜 大黃 薑橘湯下

化痞膏 三稜 莪朮 當歸各五錢 大黃三錢 全蠍十
四個 甲片十四片 蜈蚣五條 木鱧子七個

入香油二筋四兩 煎去渣熬 下黃丹一筋 阿魏二兩
乳香 沒藥各五錢 硝石三錢 開水和服

半夏瀉心湯 見一卷溫

推氣散 砂仁 肉桂各二分半 木香三分 炙草 茴香
丁香 陳皮 青皮 乾薑各五分 蓬朮四分

胡椒 沈香 各一分

髓甲丸 醋炙髓甲一兩 三稜 莪朮 香附 青皮 桃
仁 紅花 神麴 麥芽 海粉各五錢 醋糊丸

六君子湯 見一卷中風

五苓散 見一卷溫

保和丸 見二卷痰飲

星朮丸 星朮 青陳
阿魏丸 酒浸阿魏 肉桂 莪朮 麥芽 神麴 茱萸子
三七粒 糊丸 白朮 乾薑各五錢 百草霜三錢 巴霜

小阿魏丸 阿魏 山查各一兩 黃連六錢 連翹五錢

桂香丸 肉桂 麝香 飯丸

茵香丸 蘆巴八錢 小茵香六錢 巴戟 川烏各二錢
川棟肉四錢 茱萸五錢 酒糊丸 鹽酒湯下

妙應丸 附子四個去皮臍刺孔入 陶砂一兩七錢麩裏煨
華撥 故紙 青皮各三兩半 糊丸 薑陳皮湯下

桃仁承氣湯 見一卷痰

附子理中湯 見一卷中風

導痰湯 見一卷中風

類證治裁 卷之三 積聚

肥兒丸 胡黃連 神麴 麥芽各五錢 檳榔一八 肉蔻
二錢 史君子二錢半 木香一錢 蒸餅為丸

歸脾丸 見二卷勞瘵 胡黃連 木香 青皮 蕪荑各五
錢 蘆薈 川連 苓各一兩半 炙草七錢 米糊丸

六鬱湯 見本卷鬱 元參 官桂 赤芍 甲片 生地
見二卷虛損

腎氣丸 見二卷虛損 獨活 元參 官桂 赤芍 甲片 生地
獨活 大黃 白芷 天麻各五錢 紅花五錢

阿魏膏 見二卷虛損 獨活 元參 官桂 赤芍 甲片 生地
獨活 大黃 白芷 天麻各五錢 紅花五錢

土木龍丸 獨活 大黃 白芷 天麻各五錢 紅花五錢
獨活 大黃 白芷 天麻各五錢 紅花五錢

芒硝丸 阿魏 乳香 沒藥各五錢 再入蘇合油五錢
阿魏 乳香 沒藥各五錢 再入蘇合油五錢

麝香三錢 調勻成膏取兩計攤貼 再入蘇合油五錢
麝香三錢 調勻成膏取兩計攤貼 再入蘇合油五錢

琥珀膏 大黃 撲硝各一兩 為末大蒜搗膏和勻作片貼
大黃 撲硝各一兩 為末大蒜搗膏和勻作片貼

水紅花膏 紅麥子二錢 大黃 撲硝各一兩 為末大蒜搗膏和勻作片貼
紅麥子二錢 大黃 撲硝各一兩 為末大蒜搗膏和勻作片貼

治外 水紅花膏 紅麥子二錢 大黃 撲硝各一兩 為末大蒜搗膏和勻作片貼

治外 三聖膏 石灰半觔為末瓦器炒令淡紅少頃下大黃末一

以紙 難貼 烏白丸 烏梅肉 生薑各四兩 白礬 半夏各二兩 揚

初積 烏白丸 烏梅肉 生薑各四兩 白礬 半夏各二兩 揚

丁香皮 夫腹子 神麴 麥芽 青皮 陳皮 蓬朮

積久 木香檳榔丸 大黃四兩 黑丑 黃芩各二兩 木香 檳

皮 蓬朮 黃連 枳壳 當歸 香附 青皮 陳

熱積 通元二八丹 黃連八兩 白芍 當歸 生地 烏梅各五

下 薤湯 雄猪肚一箇入藥末於內線縫蒸熟搗丸

補攻 木香枳壳丸 大黃 黑丑各二兩 茯苓 白朮 厚樸

神麴 三稜 蓬朮 麥芽 木香 青皮 陳皮 檳榔

類證治裁 卷之三 積聚 命

積聚

姜 左脇氣逆攻胸久而宿聚妨食作脹醫用硝黃攻奪無形元

氣受傷腹鳴便瀉脘中堅聚成塊診脈左強右弱食少不運木

旺土衰必延吐逆之咎議和肝通腑降濁驅脹白芍牡蠣粉枳

壳栝藟仁俱炒青皮砂仁壳益智仁煨茯苓製半夏煨薑五服病

減食加塊亦輒小去枳殼加黨參生朮扶脾陽而右脈亦振

張 小腹積聚自用大黃鬱金枳實等下瘀血數次暫寬恃氣壯

頻年屢用子謂積聚隨元氣為消長元氣衰而後邪氣踞之屢

行攻奪終損脾元經言大積大聚其可去也衰其半而止宜扶

脾兼消積為穩方用六君子料加木香青皮歸尾延胡白芍官

類證治裁 卷之三 積聚 命

桂之屬水泛丸庶痞積日漸消磨不至損動真元耳

房弟少腹偏左瘕聚有形感寒墜痛昔用鍼刺原得痛緩今宿疴

遇勞輒發塊腫不任峻攻做痛久傷絡之例兼鹹以軟堅主治

宜效特下焦深遠之鄉乃厥陰宗筋所主直達病所良復不易

船茴香橘核俱酒焙當歸鬚韭子炒延胡胡蘆巴俱酒炒牡蠣煨沈

香沖服三劑痛定腫消塊亦漸軟

房姪右脇上痞脹按之腫滿翹急漸妨飽食做石室秘錄輕治法

用生朮茯苓神麴地栗粉鼈甲炙白芍製半夏煨桂

心滯參蜜丸服以食物壓之效

類證治裁卷之三終



類證治裁卷之四

丹陽林珮琴義祠

男 蔡

癲狂論治

癲狂。心脾肝胃病也。經曰。重陰者癲。重陽者狂。陽併於陰則癲。陰併於陽則狂。癲多喜笑。症屬心脾不足。狂多忿怒。症屬肝胃有餘。癲則或笑或歌。或悲或泣。如醉如癡。語言顛倒。穢潔不知。經年不愈。多由心脾鬱結。志願不遂。更或因驚恐致神不守舍者。有之狂則自悲喜忘。善怒善恐。少臥不飢。自賢自貴。或邪併陽明發狂。罵詈不避親疏。登高而歌。棄衣而走。不食數日。踰垣上屋。

類證治裁

卷之四

癲狂

一

或陽氣暴折而難決為怒狂。此名陽厥。多由肝膽謀慮不決。屈無所伸。怒無所洩。木火合邪。乘心則神魂失守。乘胃則暴橫。莫制總之癲狂。皆心火自焚。痰迷竅絡。故癲始發。其情志失常。狀亦如狂。狂經久。其神魂迷替。狀乃類癲。治癲先逐其痰。次復其神。養其陰。滋陰安。治狂先奪其食。長氣於陽。次下其痰。降其火。生鐵落飲。用生鐵落者。二症如因怒動肝火。風痰上湧而發。導全以制木。木平則火降也。成入辰砂。沈香。此如痰火久鬱。神志恍惚。心驚氣結。痰血壅蔽。心虛悸動。寐不穩寐。心氣不足。神不守舍。歸神丹。參。癲久不愈。必養神通志。歸脾湯。狂久不愈。必壯水制火。二陰煎。湯。此治之大要在參求脈症之虛實而分治之。

症。因驚憂而致。抱膽。因鬱怒而致。安神導。痰火俱盛。甘遂散。驟。壅發為怪狀。清心。滋陰。安。痰迷心竅。金箔鎮。思慮鬱結。歸脾湯。連。清心。陰虧暈仆。神湯。痰迷心竅。心。加辰砂。心。虛疑畏。定志。心。臟氣血不足。清心。溫。病後神虛氣怯。歸神。久癲。神魂不定。靈苑。癲已愈復發。斷癩。婦人患癲。由血不調。加味逍。別有悲哭。呻吟。為邪所憑。非狂也。好酒。調服。二錢許。

症。狂。上焦實者。從高抑之。生鐵。陽明實者。脈伏。大承氣。痰火在上。因。而越之。來蘇。三聖散。後用。瀉心散。調之。形症。脈氣俱實。當涌吐。兼利之。勝。肝。膽火旺。木來乘心。降龍丹。心火狂亂。黃連。痰。擾心胞。鬱。風。涎。暴。仆。通。泄。失。魄。若。神。靈。所。憑。鎮。心。因。勞。神。致。

類證治裁

卷之四

癲狂

二

傷心。血驚悸不安。辰砂。安。悲哀動中。則傷魂。魂傷則狂妄不精。當以喜勝之。以溫藥補魂之。陽。龍齒。因喜樂無極。則傷魄。魄傷則狂。當以恐勝之。以涼藥補魄之。陰。清神湯。肺虛喘乏。加沙。虛驚恐。加。熱入血室。發狂。小柴胡湯。加。猝發狂言。鍼。手。大。指。甲。少商。肝盛怒狂。鍼。足。大。指。甲。角。一。韭。葉。許。穴。

癲狂脈候

凡脈急甚。皆癲狂脈候。癲脈搏大滑。久自已。脈小堅急。死不治。癲脈虛則可治。實則死。狂脈實大者生。沈小者死。恍惚癲狂。實大為順。沈細為逆。

附方

控涎丹 見二卷痰飲

琥珀散 琥珀 人參 茯神 遠志 菖蒲 乳香 棗仁

滋陰安神湯 地 芍 歸 芎 參 朮 茯神 遠志 南星各一錢 棗仁 甘草各五分 黃連四分

安神滾痰丸 煨礞石 風化硝 硃砂各一兩 沉香 珍珠 各五錢 爲細末用天麻煎成膏杵丸 芩實

大每服 三十九 生鐵落飲 各兩半 元參 秦艽各一兩 煎成入竹瀝一

服 杯 導痰湯 見一卷中風

牛黃清心丸 見二卷溫

白金丸 見二卷痰飲

天王補心丹 見一卷火

歸神丹 硃砂二兩入猪心血酒蒸研 人參 棗仁 茯神 當歸各二兩 西琥珀 薑炒遠志 龍齒各一兩

金箔 銀箔各二十片爲衣 酒糊丸 麥冬湯下九丸

歸脾湯 見二卷勞瘵

枕中丹 龜甲 龍骨 遠志 石菖蒲 爲末酒調一錢日

二陰煎 生地三錢 麥冬 棗仁各二錢 元參 茯苓 木通各錢半 黃連一錢 生甘草五分 燈心

竹葉各十四片 水煎服

生熟養心湯 生地 熟地 當歸 茯神各二錢 人參 仁各八分 麥冬各一錢半 五味十五粒 棗仁 柏子

炙草五分

抱脂丸 水銀二兩 黑鉛一兩半 硃砂 乳香各一兩 將鉛入鐵內鎔化下水銀結成砂子次下硃砂乳香

因 滋 壯 通 神 養 虛 神 虛 心 痰 瘵 痰 肝 平 痰 降 陰 養 神 安 痰 逐

木槿 安神導痰湯 陳 夏 芩 星 枳 草 芩 連 遠志 菖蒲 硃砂

清心滾痰丸 犀角 皂角 黃芩各四兩 礞石同煨研散 香五分 硃砂各五錢 沈香二錢 麝

水丸 甘遂散 甘遂一兩研末猪心血和勻將猪心切開入甘遂末 於內紮緊煨熟取藥末 入辰砂末一錢和勻分作

四九每 服一丸

四七湯 一名七氣湯見二卷欬嗽

芩連清心湯 黃芩 黃連 麥冬 花粉 茯神 丹參 牛黃 菖蒲 遠志

金箔鎮心丸 膽星一兩 天竺黃 琥珀 硃砂各五錢 牛黃 雄黃 珍珠各二錢 麝香五分 蜜

丸 金箔 爲衣

定志丸 人參 茯神 茯苓各三兩 菖蒲 薑炒遠志各 二兩 硃砂一兩半爲衣 蜜丸

清心溫膽湯 二陳湯加 竹茹 枳實名溫膽湯 此加白 朮 菖蒲 香附 當歸 白芍 黃連 麥

冬 人參 遠志 生薑 靈苑丹 硃砂一兩 棗仁 乳香各五錢 共研細酒調勻 作一服服後安臥勿喚醒則神魂自定若喚醒驚寐

則不 可治

斷癇丹 黃耆 鉤藤 細辛 甘草各五錢 蛇蛻一條 蟬蛻四個 牛黃二厘 棗肉爲丸桐子大每服二

十九人參 湯下

加味道遙散 見一卷火

大承氣湯 見一卷溫

來蘇膏 皂角二兩酸漿水浸透研汁砂鍋內熬用槐柳枝攪 熬成膏攤紙上陰乾用溫水化入左右鼻孔取涎

痰 瀉 火 瀉 癲 婦 發 復 攝 補 血 氣 虛 心 類 證 治 裁 卷 之 四 癲 狂 四

三聖散 見一卷中風

洗心散 當歸二兩 麻黃 大黃 生朮 白芍 荆芥 炙草各一兩 每服三四錢 薑五片 薄荷七葉

煎水

涼膈散 見一卷中風

勝金丹 白朮一錢 棗豆三百六十粒浸去壳同白朮研泥 山梔十四枚 雄黃 雌黃各一錢 急性

子二錢 為末入牛黃 冰片和糕餅食

降龍丹 黑鉛 水銀各一兩 先將鉛入醋鎔化 次入水 銀炒成粉 入金銀箔各五百章 辰砂 蛇含石

各五錢 蜜丸芡實大 扶神湯下三九

黃連瀉心湯 黃連 生地 知母各一兩 黃芩二兩 甘 鬱金丸 鬱金 硃砂 白礬

類證治裁

卷之四

癲狂

五

通泄散 瓜蒂末三錢 加輕粉一字 水調勻灌之涎自出 如未出含沙糖一塊下咽涎即出

鎮心丹 硃砂 枯礬 水丸芡實大 參湯下一九

辰砂安志丸 辰砂二兩 薑炒遠志 菖蒲 棗仁 乳香 歸身 茯苓 茯神各七錢 人參五錢 猪

心一個 研如泥酒丸 棗湯下

龍齒清魂散 龍齒 遠志 人參 歸身各兩半 茯神 麥冬 桂心 甘草各三錢 延胡一兩 細

服四錢 每 辛錢半 清神湯 黃連 茯苓 柏子仁 遠志 菖蒲 棗仁各錢 甘草五分 薑汁 竹瀝各乙匙 水煎

小柴胡湯 見一卷溫

室血補

補

魂補

驚

癲狂

某氏因驚致癲向暗悲泣坐臥如癡十餘年神衰肌削此失心難治瘡疾非大補元氣不為功做安志丸人參黃精茯神當歸遠志棗仁菖蒲乳香各研極細用猪心切開入硃砂以線縛定再簪裹紫緊酒煮研爛入各藥末加煮棗肉搗丸桐子大另用硃六七十九參湯下以無力用參而止惜夫

王 因鬱發狂笑詈善怒面赤目紅脈洪大此陽氣暴折因怒觸發木火失制熱痰上乘心包病名陽厥用生鐵落飲去芫防加山梔連翹羚羊角竹瀝石菖蒲丹皮數劑而狂定

張氏恍惚狂妄視夫若仇持械棄衣莫之敢近脈滑而弦用獨聖散吐之去粘涎宿沫頗多捶胸言痛診脈稍平然猶獨言獨笑知其痰沫去而心舍虛神魂未復也用枯薑仁貝母橘紅膽星菖蒲汁鬱金汁薑汁枳殼茯苓一劑胸膈痛定乃做龍齒清魂散用龍齒 茯神鐵粉牡蠣乳香遠志棗仁當歸二劑如常

包 因恐發狂神擾語妄脈右大左軛症由心虛受嚇驚痰亂其神明非癲疾也癲乃一時昏仆醒即明了既用膽星川連等泄降痰火月來神識稍清宜用白金丸六服再以清心溫膽湯安神定志可冀向安潞參淡竹茹枳殼橘紅茯神生棗仁梔心遠志麥冬蓮子心鮮菖蒲沖三四劑已效改湯為丸服遂復常

王氏獨言獨笑痰多氣鬱用溫膽湯降滌擾心涎沫數服效

張

少年懷抱不遂漸次神明恍惚言語失倫面赤眼斜棄衣裂
帳曾服草藥吐瀉痰火畧定今交午火升獨言獨笑半味半明
左脉弦長自屬肝膽火逆直犯膈中神明遂為痰涎所蔽經謂
肝者謀慮所出膽者決斷所出凡肝膽謀慮不決屈何所伸怒
何所泄木火熾煽君主無權從此厥逆不寐重陽必狂前已服
牛黃清心丸今擬平肝膽之火滌心包之痰暫服煎劑期於清
降火逆掃蕩粘涎後服丸方緩收其效煎龍膽草山梔鬱金
貝母連翹茯神天竺黃知母石菖蒲搗汁橘紅金器同煎五六服
狂態大斂談及前轍深知愧赧一切如常診脉左右已勻沈按
有力再疏丸方膽南星川貝各二錢山梔五錢鬱金龍齒各三錢牛黃

八分羚羊角二錢扶神五錢生地一兩用淡竹瀝為丸硃砂為衣開水下
一料遂不復發

癇症論治

癇症肝膽心腎病而旁及陰陽維蹻督諸經俱動也。脉經曰前部
蹻也動則苦癲癇羊鳴從少陰斜至太陽者陽維也動苦癲癇羊
鳴從少陽斜至厥陰者陰維也動苦癲癇三部俱浮直上直下為
督脉動則大經言二陰急為癲厥。足少陰腎謂少陰氣逆於經而
上行則喉塞音瘖而癲發矣。症由心腎虛怯肝風膽火條逆痰涎
上壅心胞經脉閉阻猝然暈仆口眼牽掣腰背反張手足抽搐此
熱極喊作畜聲因其近似分馬癲。搖頭張牛癲。直視腹猪癲。吐沫
生風。嗚目吐雞癲。折應肝以內應五臟而五癲名焉。癲症幼小為
羊癲。舌應肺。雞癲。折應肝。以內應五臟而五癲名焉。癲症幼小為
多大人亦有之經久失調遂成癲疾一觸厥氣鼓風涎沫升逆莫
遏痰在膈間則眩微不休痰溢膈上則眩甚而倒必待其氣反吐

去驚涎宿沫而後甦若元氣虛甚乃屢發不止。癲與中風中寒中
同癲仆時口中作聲將醒吐沫醒後又發若中風等病仆時無聲
醒時無沫後不復發又與癲症相似但癲發身軟時醒則身強
直角弓反張不時雖分五癲治要在火與痰通治或人參琥珀丸
醒症比癲為重。雖分五癲治要在火與痰通治或人參琥珀丸
愈後必斷其根。河車其因驚發癲者神出舍空驚涎乍服。溫膽湯
星愈後必復其神。七福飲其膽火生風者熱痰阻絡直視吐沫。用
羊角鈎藤丹皮天麻連。怒觸肝火者咬牙嚙舌叫吼遺尿。小柴胡
翹膳星竹瀝橘紅前胡。痰火阻竅者神機不發昏不知人。龍腦安神丸或胆
草加青皮甚。痰火阻竅者神機不發昏不知人。星牛黃菖蒲鬱金
則瀉肝湯。痰火阻竅者神機不發昏不知人。星牛黃菖蒲鬱金
汁薑汁橘。因抑鬱發者調其氣。四七湯加。因腎經虛者培其源。六
紅湯灌之。因抑鬱發者調其氣。木香南星。因腎經虛者培其源。味
湯加首烏白。肝腎陽亢者和其陰。虎濟。心氣不足者安其神。養心
芍棗仁龍骨。肝腎陽亢者和其陰。九。心氣不足者安其神。湯。
思慮煩勞者補其營。益營。胎癲得之母腹中者鎮其怯。燒丹丸。

又按千金方分陽癇陰癇以先體熱癉癉驚啼而後發脈浮洪者為陽癇病在腑易治妙香先身冷不驚掣啼病發脈沈微者為陰癇病在臟難治五生丸引古方通治五癇五癇丸五色風癇發項強直視此肝經有熱咬牙者導赤散痰火俱盛清膈飲下丸痰多控涎丹痰迷心竅金箔鎮心熱痰迷湯精神火盛抽薪氣逆食滯大和因驚丸抱膽因怒安神導心氣血不足清心溫膽湯神不守舍丹神癲癲屢發五癇神病久則成窠囊日久必生蟲妙功效婦人患癇由血失調加味道肥人多痰加味毒瘦人多火清心丸癲愈復發斷癲癲病晝發炎陽躄宜補中益氣湯加益智足外踝下五分陷夜發灸陰躄宜六味丸加鹿角膠陰躄起於足石中申脈穴也

癇症治法

癇之因

癇

頑謂癇以補腎為本癉痰為標其由來不外肝腎龍雷上衝所致豈不信哉

丹溪治癇主痰與熱以星半芩連為主熱多者涼膈散加川連麥冬以泄之痰多者戴人三聖散吐之如驚者東垣安神丸平之

癇症脈候

脈浮滑洪數為風癇細弦微緩為虛癇浮為陽癇沈為陰癇虛弦為驚沈數為實熱沈實弦急及虛散者皆不治細緩者雖久劇可治又目啞如果者不治

附方

通定癲丸 天麻 川貝 膽星 半夏 陳皮 茯苓 茯神 丹參 菖蒲 麥冬 遠志 全蠍 殭蠶 琥珀

癇症治法

癇之因

癇

辰砂 竹瀝 薑汁 糊丸 見本卷癲狂 琥珀丸 見本卷癲狂 河車丸 芩河車 人參 茯苓 茯苓 遠志 丹參 煉溫膽湯 見一卷溫 七福飲 見三卷鬱 遠志丸 遠志 菖蒲 茯苓 茯苓 人參 龍齒 蜜丸 小柴胡湯 見一卷溫 瀉肝湯 見三卷諸氣 龍腦安神丸 冰片 麝香 牛黃 犀角 人參 茯神 金箔 甘草 珠砂 桑白皮 地骨皮 馬牙硝 蜜丸

調氣 培源 補陰 補心 補營 胎癇 瀉火 吐痰 除痰 癲癇 妙香丸 珠砂 牛黃 膩粉 巴霜 金箔 黃蠟 冰片 安神丸 見本卷癲狂 三聖散 見一卷中風 涼膈散 見一卷中風 燒丹丸 元精石 輕粉 各一錢 水丸 再用麪裹煨黃研丸 益營煎 參 者 歸 芍 芎 草 茯苓 棗仁 遠志 紫 虎潛丸 見一卷中風 養心湯 見二卷勞瘵 益營煎 石 木 香 柏 子 仁 粉 霜 礪 砂 各 五 分 研 細 入 寒 食 麪 一 錢 水 丸 再 用 麪 裹 煨 黃 研 丸

虛心	血心	怒心	因驚	鎮滯	消火	清竅	透痰	降痰	逐痰	火清	類證治裁	盛火	火心	火清	火肝	治通	治通	治通	陰癩	陰癩	
清心溫膽湯	滋陰安神湯	安神導痰湯	抱膽丸	大和中飲	抽薪飲	金箔鎮心丸	導痰湯	控涎丹	珠砂安神丸	清神湯	清膈飲	清神湯	導赤散	瀉青丸	六珍丹	錢氏五色丸	五癩丸	引神歸舍丹	五生丸		
見本卷癩狂	見本卷癩狂	見本卷癩狂	見本卷癩狂	見三卷飲食	黃芩 石斛 木通 梔子 黃蘗 連翹 花粉 各一錢 枳殼 澤瀉 各一錢半 甘草三分	見本卷癩狂	見一卷中風	見二卷痰飲	見二卷汗	見本卷癩狂	膽星一錢 木通 陳皮各八分 貝母 海石各二錢 白芥子五分 或加重便	見本卷癩狂	見一卷溫	竹葉湯下	水銀兩半 黑鉛一兩 熬屑 雄黃 雌黃 珍珠 各一兩 辰砂五錢 蜜丸	珍珠 雄黃 黑鉛 水銀同鉛炒 辰砂	白附子 半夏 蜈蚣 礬石 辰砂 雄黃 麝香 薑汁糊丸	膽星二兩 辰砂一兩 川附童便製七錢	南星 半夏 川烏 白附 黑荳各生用一兩		

中補	根除	痰火	痰化	血調	類證治裁	神安
補中益氣湯	斷癩丹	清心滾痰丸	加味壽星丸	加味逍遙散	歸神丹	妙功丸
見一卷中風	見本卷癩狂	見本卷癩狂	南星 辰砂 琥珀 枯礬 母珍珠	見一卷火	見本卷癩狂	丁香 木香 沉香 各兩半 乳香 麝香 熊膽 各二錢半 雄雀屎 三百粒 直者即是 鶴神 即天 赤小豆 即赤豆之細者 勿誤 半兩 飛一半 為衣 用三百粒 巴豆七粒 去皮 研壓去油 硃砂一兩 飛一半 為衣 用三百粒 未蕎麥一兩 作糊 每兩作十九丸 硃砂為衣 每用一九 溫水 浸一宿 去水 再用溫水化開 空心服之 症重不過三服

癩

張 中年宿癩頻發先必觸事生怒情不自禁發則猝倒無知齧舌糜爛驚恐發搐痰響便遺此腎陰素虧肝陽易亢痰隨火升阻蔽心胞故來驟難遲且數發也急則治標用前胡青皮川貝連翹鈎藤竹瀝菖蒲山梔礬水煎二劑諸症退神識清隨服補腎平肝丸料發稀後用丸方常服茯神_{六錢}羚羊角_{三錢}膽星_{錢半}天竺黃_{五錢}鬱金_{四錢}川貝_{四錢}蓮子心_{六錢}西牛黃_{七分}梔心_{三錢}礬水滴丸硃砂為衣服愈

趙 髻年陰癩屢仆初更後聲喊涎湧播擄逾時乃醒此風火痰交煽顯然足少陽手厥陰受病主熄風火佐以豁痰羚羊角鮮

類證詳載

卷之四

癩

五

石菖蒲山梔鈎藤膽星橘紅防風前胡竹瀝數服發必稀然數年久恙須調補其本用潞參綿耆茯神炙草山藥貝母熟地炭當歸白芍為末服調粳米屑俾脾元充旺間服抱龍丸可免癩疾之累

怔忡驚恐

怔忡者。心動不安。無所見聞。驚恐而胸間惕惕自動也。驚者。神氣失守。由見聞奪氣而駭出暫時也。恐者。膽怯股慄。如人將捕之。乃歷久而懼難自釋也。怔忡傷心。神驚傷膽。液恐傷腎。精三者。心膽肝腎病。恐甚於驚。驚久則為怔忡。而心膽之虛。無不由腎精之虛也。昔人論陽統於陰。心本於腎。上不安者。由乎下。心氣虛者。因乎精。此精氣互根。君相相資之理。固然矣。然怔忡驚恐。與悲思憂怒。皆情志之病。患者非節勞慾。攝心神。壯膽力。則病根難拔。治者務審其病情。而調之。如心脾氣血本虛。而致怔忡驚恐。或因大驚猝恐。神志昏亂者。_{七福飲甚者。大補元煎。}如腎水虧。真陰不足。致怔忡者。_{左歸飲。}

類證詳載

卷之四

怔忡

四

如命火衰。真陽不足。致怔忡者。_{右歸飲。}如三陰精血虧損。陰中之陽不足。而致怔忡驚恐者。_{大營煎或理陰煎。}如水虧火盛。煩躁熱渴。而為怔忡驚悸者。_{二陰煎。或加減一陰煎。}如思慮鬱損心營。而為怔忡驚悸者。_{道遙煎。}如痰火盛。心下怔忡者。_{溫膽湯。加炒黃連。}如寒痰停蓄。心下而怔忡者。_{薑木湯。}如痰迷心竅。驚悸者。_{溫膽湯。甚者。硃砂消痰飲。}此景岳治法也。
分治 卑樸附
怔忡 由心包血虛。相火下迫。震動君主神明。或思慮勞神。或鬱怒動火。致頭暈汗出不寐。便濁等因。宜養心血。調心氣。降火安神。為主。如心火熾甚。_{安神丸。}心血虛熱。_{四物安神湯。}心神浮越。_{酌用清心丹。}衰火旺。心動不安。_{天王補心丹。}由汗下後。氣虛。_{益營煎。}營衛俱衰。脈來

結代心惕不安。養心湯。心動而臥不安。養心湯。思慮煩勞。心動不寐。

養營湯。憂思鬱結。怔忡不已。歸脾湯。心虛怔忡自汗。養營湯去木香。

氣鬱不宣。怔忡不定。加味四七湯。痰火怔忡時作時止。參胡溫。

箔鎮心丸。水停心下水氣乘心為悸。茯苓甘草湯。半夏茯苓湯。心。

不安。膈下悸動為腎氣上凌。五苓散。加辰砂。腎因痰飲而悸。

導痰湯。通治怔忡恍惚健忘。降火安神。加味安。

加參桂。與怔忡類。其症胸中痞塞。不能飲食。心常有歉。愛居暗室。見。

人則驚避無地。病至數年。不得以癩症治之。人參養。

症。內經以驚屬肝胃。雖風木震動。胃土受尅之理。良由心主先虛。

乍有所觸。而心駭神亂也。故曰驚則心無所依。神無所歸。慮無。

類證治裁

卷之四

怔忡驚恐

五

所定。丹溪云。驚則神出於舍。舍空液。痰涎着於包絡之間。神。

不得歸。長砂遠志。多致目睛不轉。不能言。短氣自汗。臥不安。或。

眠多異夢。隨即驚覺。溫膽湯。臥多驚。口中有聲。溫膽湯下。

臥則魂夢飛揚。驚悸多。寤通夕不寐。乃肝虛風襲入之。先用獨。

服。後用珍。至因大驚而病者。寸脈必動如豆粒。而無頭尾。急宜。

鎮定。神丸。驚則氣亂。鬱而生火。生痰。痰與氣搏。變生諸症。溫。

湯。加棗仁。蓮子。金銀器煎。或膽虛善驚。人參肉桂。熟地。棗仁。肝。

膽俱虛。百藥不效。宜補腎。酒化鹿角。心氣虛。神不定。而驚。妙香。

心血虛。神易擾。而驚。神丸。氣血俱虛。恍惚煩躁。而驚。養心。思。

慮過度。清心補。痰擾心包。加味定。被物所驚。心跳不安。菝葜。心。

云驚悸多。勇血虛。與痰瘦人多。是血虛。肥人多。是痰飲。時時心。

跳。亦是血虛。或陰火上衝所致。驚症有二。有因病而驚者。當。

安養心神。滋培肝膽。培扶元氣為主。

症。內經兼心腎胃肝膽包絡諸經。經曰。足少陰之脈。病善恐。又曰。

氣下。又曰。精氣併於腎。則恐。肝臟血不足。則恐。又曰。胃為恐。

註云。胃熱則腎水微。故恐。又曰。心休惕。思慮則傷神。神傷則恐。

懼。自失。膽病者。驚悸。恐人將捕之。肝病如人將。而恐。為腎志。屬。

捕之心。包絡動。心澹。澹大動。又曰。恐則精却。而恐。為腎志。屬。

水本臟。因旁及他經。故治法亦別焉。恐由於腎傷者。補精髓。人。

散。去桂心。加。由於肝膽虛者。養陰血。酸棗仁湯。去耆。蓮。由。於。心。

牛膝。遠志。由於肝膽虛者。養陰血。酸棗仁湯。去耆。蓮。由。於。心。

包絡者。鎮其神。琥珀。犀角。金銀。治在陽明胃者。壯其氣。四。

湯。倍。其思慮勞心而善恐者。一味鹿角膠。因腎中陽虛而善恐。

者。八味。

者。八味。

者。八味。

者。八味。

者。八味。

者。八味。

類證治裁

卷之四

怔忡驚恐

共

怔忡驚恐脈候

手厥陰脈甚動。則心澹澹。大動。胃絡名虛里。貫膈絡肺。出左乳下。

其動應衣。虛而有痰。則動更須與發。一陣熱者是也。以上怔。

驚悸。脈必結代。寸口脈動而弱。動為驚。弱為悸。病在心膽。其脈必。

大動。驚者。其脈止而復來。其人目睛不轉。不能呼氣。以上。

恐則脈沈。恐傷腎。脈必沈。其人恐怖。其脈形如循絲。蠱蠱然。其面。

白色。脫也。以上。

附方

七福飲 見三卷鬱

大補元煎 見一卷中風

腎 人參散 人參 枳殼 桂心 甘菊 茯苓 山萸 五味 酒下

二錢 定志丸 見木卷癲狂

四君子湯 參 苓 朮 草

八味丸 見一卷中風

補膽防風湯 防風一錢 人參七分 細辛 甘草 川芎 茯苓 獨活 前胡各八分 為末煎

心 胃 陽 虛 膽 惡

類證治裁

朱之田

怔忡驚恐

丸

怔忡

吳氏產後不寐心虛不安此去血多而心神失養也做養心湯意 熟地棗仁茯苓柏子仁麥冬潞參五味子炙草白芍三服愈 樊 館課神勞心虛生熱治以天王補心丹

汪氏病久失調延成虛損怔忡汗出手足心熱坐起眩暈善飢無 寐診左寸虛散右寸關虛弦兩尺稍大此陰虧火炎之漸惟營 虛生內熱故手足如烙瘡煩神不安故汗液自洩虛陽挾風上 蒙清竅故頭目眩暈肝陽肆橫陽明當其衝風火消鑠故善飢 滋液熄風全用柔劑歸脾湯去耆朮木香歸薑加白芍丹皮熟 地甘菊 炒 六服漸安去丹皮甘菊再加山藥柏子仁晚服六味

類證治裁

朱之田

怔忡

丸

丸全愈

殷氏吐紅夜嗽舌嚙心惕自汗不寐嘔寒食減脘痞不舒脈虛芤 兩寸浮此營損及衛也用黃精柏子霜生耆炙草杞子棗仁茯 神白芍川貝龍眼肉小麥煎湯緩服當晚穩寐三劑汗收嗽定 矣又十餘服諸症俱愈

驚恐

黃氏驚悸恍惚不食不寐脉虛促病因怒恐而得膽火上冒則頭暈心中胸腕刺痛氣結呵欠怯冷倏煩熱多驚皆陽越失鎮服藥鮮效總由治失其要先鎮浮陽再議和陰牡蠣龍骨俱研二 慈石一 柏子仁連翹心各五分 茯神生棗仁各二錢 大減改用羚羊角六分 嫩桑葉三錢 熟地棗仁茯神白芍各二錢 小麥一合 麥冬半夏各錢 數服能寐思食矣
族女產後心虛善恐見聞錯妄此由肝膽怯也用酸棗仁湯養陰血棗仁潞參當歸茯神熟地遠志蓮子炙草服稍定時恍惚不思食去熟地加竹茹菖蒲服漸瘳

類證治裁

卷之四

驚恐

五

煩躁論治

內熱為煩外熱為躁煩出於肺躁出於腎熱傳肺腎則煩躁俱作然煩為陽屬有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆易治躁為陰繫無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆難治傷寒論中有煩煩滿煩熱煩渴胸煩心煩虛煩大煩皆熱煩多屬熱亦有陰寒也先煩漸躁者為煩躁先躁復煩者為躁煩煩多屬熱亦有陰寒而煩者傷寒熱在表而煩宜散湯桂枝在裏而煩宜下湯承氣在半表半裏而煩宜和胡湯在胸膈以上而煩宜吐湯梔豉其陰寒而煩則有惡寒踰臥及下利厥逆吐蚘之症宜溫湯用烏梅丸若煩而足冷脉沈微者此陰症之煩也急用附熱劑溫之悸而煩為虛湯建中煩而悸為熱氣湯如內傷陰虛火動而煩宜生脉散加生地黃熟地黃茯神棗仁

類證治裁

卷之四

煩躁

五

或不得臥而煩朱砂安神丸若不煩而躁欲臥泥水中但飲水不得入口者此為陰盛格陽活人書用犀角散或附子理中湯附子四逆湯其脉必沈細疾肢體厥冷躁擾不欲飲水是也若誤認為熱投以涼藥頃刻死矣傷寒有邪在表而煩躁者脉浮緊發熱身痛汗之則定大青龙湯有邪在裏而煩躁者脉數實有力不大便繞臍痛下之則定承氣湯有陽虛而煩躁者汗下後晝煩躁夜安靜脉沈微身無大熱乾薑附子湯有陰盛而煩躁者少陰症吐利手足冷煩躁欲死吳茱萸湯更有陰中伏陽煩躁者頭疼身溫指末冷胸滿惡心脉沈伏按至骨若有力須破散陰氣導達真火本專用破陰丹陰中伏陽症用熱藥助陽則為見消亡用破陰丹陰所隔絕不能導引真陽用冷藥則所伏真火立升火降得汗而解矣其雜症虛煩因津涸燥結而煩者人參湯

素仁。因血虛煩渴。至夜躁熱尤甚者。當歸補。因腎水下竭。心火上炎而煩者。生料六味。病後餘熱欲吐。虛煩不安者。人參竹葉湯。久煩熱不止。六味湯。肥人虛煩不眠為痰。溫膽。煩而潮溼者。五苓散。煩而嘔者。橘皮湯。

活人書曰。陰氣少。陽氣勝。則熱而煩。故太陽經傷風。多煩而躁也。戴元禮曰。煩躁。陰陽經皆有之。陽明經有燥屎。故煩。此當下。承氣。太陽經已得汗。渴煩者。五苓。少陽胸滿而煩。小柴。陰煩。少陰為。多由陽氣傳入陰經。陰得陽而煩。自利而渴。煩不眠者。辰砂。若非是陽氣傳陰。陰氣犯陰。經吐利。手足厥冷而煩。經云。陽虛。陰乘之。故煩。又云。陰盛發躁。欲坐井中。吳茱萸湯。甚者。四逆湯。加葱白。二逆。外有虛煩。

類證治裁

卷之四

煩燥

一症

一症。乃病愈後。陰陽未復。時發煩熱。竹葉石。李東垣曰。血虛發躁。煩渴引飲。至夜尤甚。脉洪大。按之無力。當歸湯。若以白虎。服之。則誤矣。若脉浮大。按之散。此虛極將脫。人參生許學士治李信道。六脉沈伏。不見。按至骨。若有力。頭痛身溫。煩躁。指冷。胸中滿。惡心。此陰中伏陽。仲景法中。無此症。用冷藥。則所伏真火愈消。即用熱劑助陽。先為陰退絕。不能導引真陽。須用破散。陰氣導達。真火之藥。使水升火降。然後得汗而解。與破陰丹二百。鹽湯。不時煩躁。狂熱。手足躁擾。其家大驚。許曰。俗所謂換陽也。須與稍定。畧睡。身汗涼解。又治一人。傷寒身熱。無汗。譫語。下後大便不通三日矣。非躁非煩。終夜不得臥。時發嘆息。許曰。此懊憹。佛。

二症俱作。由胃中有燥屎也。與承氣下之。愈。素問云。胃不和則臥不安。仲景云。陽明病下之。心中懊憹。微煩。有燥屎者可攻。又云。有微熱。佛鬱不臥者。有燥屎。又云。胃中燥。大便堅。必譫語。皆湯症也。

附方

- 桂枝湯 桂 芍 草 薑 棗
- 大承氣湯 見一卷溫
- 小柴胡湯 見一卷溫
- 梔豉湯 梔子 豆豉
- 四逆湯 見一卷暑

類證治裁

卷之四

煩燥

一症

烏梅丸 見三卷嘔吐
建中湯 見二卷嘔血 小建中湯加黃耆名黃耆建中湯
調胃承氣湯 見二卷汗
生脉散 參 味 麥
硃砂安神丸 見二卷汗
霹靂散 川附子一枚 煨灰存性為末作一服蜜水調
附子理中湯 見一卷中風
大青龍湯 麻 桂 杏 膏 草 薑 棗
乾薑附子湯 四逆湯去甘草
吳茱萸湯 見三卷嘔吐

伏陽 破陰丹 硫黃 水銀各一兩 陳皮 青皮各半兩 先將

丸糊

人參固本丸 見一卷中風

當歸補血湯 黃耆一兩 當歸二錢

六味丸 見一卷中風

人參竹葉湯 一名竹葉石膏湯見一卷傷風

竹茹湯 麥冬 小麥 炙草 參 夏 苓 竹茹

溫膽湯 見一卷溫

五苓散 見一卷溫

辰砂五苓散 五苓散加 辰砂

類證治法 卷之四 煩躁

嘔煩 橘皮湯 橘皮 生薑

健忘論治

健忘者陡然忘之盡力思索不來也夫人之神宅於心心之精依於腎而腦為元神之府精髓之海實記性所憑也正希金先生嘗曰凡人外有所見必留其影於腦小兒善忘者腦未滿也老人健忘者腦漸空也。觀此則知人每記憶必閉目上瞬而追索之亦疑神於腦之義故治健忘者必交其心腎使心之神明下通於腎腎之精華上升於腦精能生氣氣能生神神定氣清自鮮遺忘之失惟因病善忘者或精血虧損務培肝腎。六味丸加或紫思過度。或精神短乏兼補氣血。人參養營湯。或上盛下虛。或上虛下盛。龍眼。或心火不降。腎水不升。神明不定。雀

類證治法 卷之四 健忘

丸。或素有痰飲。或痰迷心竅。或勞心誦讀。精神恍惚。安神定志丸。或心氣不足。怔忡健忘。辰砂妙。或稟賦不足。神志虛擾。定志丸。孔。或年老神衰。加減固本丸。若血瘀於內而喜忘如狂。當丸。聖枕中丹。

附方

六味丸 見一卷中風

歸脾湯 見二卷勞瘵

人參養營湯 見二卷勞瘵

遠志丸 見本卷癩

養心湯 參 耆 歸 朮 二冬 菖蒲 遠志 茯神 牛膝 熟地 木通 柴胡 升麻 茯神 丹參 龍眼湯 龍眼 遠志 草

用 腎 心 脾 氣 血 熱 煩 下 虛 上 虛

朱雀丸 沈香一兩 茯神四兩 人參二兩 蜜丸

茯苓湯 參 陳 夏 苓 草 香附 益智各一錢 烏

導痰湯 見一卷中風 薑汁各二匙

壽星丸 參 者 木 草 陳 苓 地 芍 歸 味

安神定志丸 桂心 膽星 琥珀 硃砂 遠志 菖蒲 遠志

辰砂妙香散 見二卷 貝 龍眼 蜜丸

定志丸 見本卷癲狂

枕中丹 見本卷癲狂

加減固本丸 熟地 天冬各一兩半 麥冬 炙草 茯苓

老神 補 虛 怔 惚 恍 攝 補 迷 痰 飲 痰 腎 心

類證治裁 卷之四 建志

代抵當湯 見一卷血

不寐論治

陽氣自動而之靜則寐。陰氣自靜而之動則寤。不寐者病在陽不交陰也。靈樞曰：衛氣日行於陽，夜行於陰。厥氣客於臟腑，則衛氣不得入於陰，則陰氣虛，故目不瞑。衛氣留於陰，不得行於陽，留於陰則陰氣盛，陰氣盛則陰踴滿，不得行於陽，則陽氣虛，故目閉。素問曰：陰虛故目不瞑，補其不足，瀉其有餘，調其虛實，以通其道而去其邪。飲以半夏湯，其臥立至。蓋不寐多由思慮勞神，驚憂怒火，氣鬱生涎，用半夏湯，半夏除痰而利，則陰陽交通而得臥也。又曰：胃不和則臥不安，蓋胃氣主降，若痰火阻痺，則煩擾不寐也。宜紅茯苓石斛半夏炙甘草。又曰：臥則喘者是水氣之客也。此水停心，不得眠，宜茯苓湯。若夫心血不足，或神不守舍，宜歸脾湯。琥珀心丹，由肝

類證治裁 卷之四 不寐

虛受邪，夢中驚悸，魂不守舍。先服獨活湯，後服珍珠母丸。綱目：歸肝故驚悸。由營衛俱虛，神魂失守。七福飲，或由膽火鬱熱，口苦不得臥也。由營衛俱虛，神魂失守。大補元煎，或由膽火鬱熱，口苦神煩。山梔鉤藤蘇葉。由腎陰久虧，孤陽浮越。六味湯，加淡菜，由心火焦煩，津乾口渴。宜補丹。由驚恐傷神，心虛不安。養心湯。由思慮傷脾，脾血虧損，經年不寐。歸芍六君湯，或由膽虛不眠。定志丸，加熟仁一兩，研末酒調服。由心膽俱怯，觸事易驚。十味湯。由病後虛煩不眠。竹葉湯。由虛勞煩熱不寐。金匱酸棗湯。由高年血衰不寐。聖愈湯。由補心湯。由虛勞煩熱不寐。或桑半湯。由高年血衰不寐。聖愈湯。有喘不得寐者。蘇子竹茹湯。經曰：肺者嬌之，有臥易驚醒者。龍甲丸。有通宵不寐者。安神如。有煩不得寐。服藥不效者。梔豉湯。下硃丸。有病久餘熱不止，遺精不寐者。六味丸，加炒。病後及吐下後與潰

傷不得眠者屬膽虛。人參、茯神、棗仁、陳皮、麥冬、龍眼為主。有火醫通曰：凡婦人肥盛多鬱，不得眠者吐之，從鬱結痰火治。溫膽湯用牛夏、麴、加柴。凡怔忡驚恐健忘癡狂失志不寐，皆由痰涎沃心，以致心氣不足。若涼心之劑太過，則心火愈微，痰涎愈盛，惟以理痰順氣養心安神為第一義。導痰湯加茯神。

附方

半夏湯 半夏五合 秫米一升 用清水揚萬遍煮服汗出即已

茯苓甘草湯 見本卷怔忡

歸脾湯 見二卷勞瘵

琥珀養心丹 見本卷怔忡

類證治裁

卷之四

不寐

五

獨活湯 見本卷怔忡

珍珠母丸 見本卷怔忡

七福飲 見三卷鬱

大補元煎 見一卷中風

溫膽湯 見一卷溫

六味湯 見一卷中風

補心丹 見一卷火

養心湯 見二卷勞瘵

定志丸 見本卷癲狂

歸芍六君子湯 六君加 歸芍

虛脾

虛心

虛心

火心

陰心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

熱心

益氣安神湯 遠志、棗仁、竹葉、歸地、麥冬、棗仁、十味溫膽湯 溫膽湯加人參、熟地、棗仁、遠志、五竹葉石膏湯 見一卷傷風

茯苓補心湯 茯苓、夏、陳、草、歸地、麥冬、茯神

金匱酸棗仁湯 見一卷中風

聖愈湯 見二卷勞瘵

蘇子竹茹湯 蘇子、竹茹、陳皮、桔梗、甘草

龍甲羌活丸 羌、獨、防、芎、參、首、味、草、龍甲、安臥如神湯 各一錢、遠志、白朮、山藥、寒水石、棗仁、各五分、人參四分

類證治裁

卷之四

不寐

五

辰砂

梔子 豆豉

硃砂安神丸 見二卷汗

導痰湯 見一卷中風

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

虛心

多寐論治

多寐者陽虛陰盛之病。靈樞曰足太陽有通項入於腦者正屬目。本名曰眼系在項中兩筋間入腦乃別陽。目內背陽氣盛則曠目陰氣盛則瞑目。心神昏濁不能自主脾氣困頓食已即倦皆能致之。欲清心神如麥冬石菖蒲欲醒脾困六君加身重脉緩多寐溼勝也。平胃散加神倦肢惰嗜臥氣弱也。參湯益氣。長夏倦午四肢不收脾肺氣弱而傷暑也。清暑益病後身熱好眠餘邪未清正氣未復也。沈氏葳蕤湯。膽實口苦嗜寐少陽經熱也。生棗仁一兩研。狐惑症。病後腸胃空虛三蟲求食食人喉為四肢末茶清調服。黃連犀角湯。風温症身熱脉浮自汗體重多眠鼻。沈重默默多眠。治葳桃仁湯。葳蕤湯。熱症得汗後脉沈。軒語言難出治在少陰厥陰不可發汗。去麻羌。

類證治裁

卷之四

多寐

至

細身冷喜臥。四逆少陰症欲寐從本病治。

附方

六君子湯 見一卷中風

平胃散 木 樸 陳 草

人參益氣湯 黃耆錢半 人參 防風 升麻各七分 熟地六分 生地 白芍各五分 炙草三分

肉桂二分 五味 二十粒

清暑益氣湯 見一卷暑

沈氏葳蕤湯 葳蕤 茯苓 棗仁 石膏各一錢 人參七分

黃連犀角湯 黃連 犀角 烏梅 木香 桃仁各一錢

治葳桃仁湯 桃仁 生槐子研 艾葉各二錢

熱症風温 四逆湯 見一卷暑 葳蕤湯 見一卷温

類證治裁

卷之四

多寐

至

三消論治

消分上中下三症謂消渴消穀消腎也皆水火不交燥熱傷陰所致故經云二陽結謂之消主陽明大腸主津足陽明胃上消主肺肺熱化燥渴飲無度是為消渴經所謂心移熱於肺傳為鬲消也中消主胃胃熱善飢能食而瘦是為消穀經所謂瘰成爲消中也下消主腎虛陽燥陰引水自救溺濁如膏精髓枯竭是為腎消經所謂腎熱病苦渴數飲身熱也三消之症上輕中重下危然上中不甚則不傳下矣故腎消者乃上中消之傳變肺胃之熱入腎消燥腎脂飲一洩二洩如膏油蓋肺主氣肺病則不能管束津液上朝咽盛而盡輸於下其精微亦隨洩下也且消之由於火盛者陽

類證治裁

卷之四

三消

五

消症也亦有氣血消乏而爲陰消症者如經曰心移寒於肺爲肺消飲一洩二死不消景岳以爲元陽大衰金寒水冷不化氣而氣悉化爲水也脈經曰心脈微小爲消瘵可知症多陽虛而火多假火故治三消者必察其脈氣病氣形氣但見本源虧竭及假火症當速救根本以滋化源勿專以清火爲急故金匱云男子消渴小便反多飲一斗小便一斗人味丸所以助氣化使津液得升也趙養葵亦曰治消症無分上中下但滋肺腎上消小劑中消中劑下消大劑加麥冬五味或命門火不歸源遊於肺爲上消遊於胃爲中消惟引火歸源味丸使火歸釜底水火既濟氣上熏蒸肺受津潤渴病自止若過用寒涼恐內熱未除中寒又起古法以白虎

湯治上消以調胃承氣湯治中消者非也必右寸滑數熱傷肺氣乃可熱內蘊乃可又經云二陽之病發心脾有不得隱曲其傳爲風消謂憂傷心思傷脾鬱結不遂則營液暗耗胃大腸俱失通潤而肌肉風消也宜歸脾湯送固此亦陰消之類今統論之消症氣分渴者喜飲冷水宜寒涼溼劑以清熱血分渴者喜飲熱茶宜甘溫峻劑以和陰細須細診脈之上下左右滑數沈如上消氣分燥渴者黃湯血分燥熱者黃飲子氣血燥熱者竹葉黃肺火消渴咽乾便秘者生津心火消渴小水赤澀者清心蓮心火上炎腎水不濟氣血日消者降心消渴夜甚者加減地消渴溺少身腫者紫蘇消渴脈浮微熱小水不利者五苓高消胃滿心煩者麥門冬老人虛人消

類證治裁

卷之四

三消

六

渴者人參麥冬通治上消天花中消能食而瘦渴飲便秘渴數者香飲食已如飢胃熱脈盛面黃肌瘦胸滿腸脹者七味白胃火易飢熱在肌肉者散黃胃熱乾渴水虧火炎者煎玉女心肺熱渴者藕汁育脾肺津乾不思飲食者本專黃通治中消肚丸黃連猪中消後胃熱傳腎消燥脂液腿細足痿者白茯苓下消渴飲溺如膏油者治宜攝固元丸腎消虛瀆者通攝兼施丸雙補腎消淋濁有火者補而兼瀉六味丸加知藥淋濁無火者補而兼攝左歸飲或火衰不能化氣氣虛不能化液者益火之源八味丸右歸飲無火而滑小洩無度者益陽固陰丸鹿茸腎消強中莖長而堅精自出者此孤陽外張陰不內守難治由好色縱淫或餌丹石陽起石鍾乳粉之類直

石性獨留腸道與藥不交其飲食如湯沃雪久則腸強精脫石子精洩名曰強中不可治

通治下消加減丸三消久小水不臭反甜者此脾氣下脫症最

重七味白若溺後溺面浮脂者此膏液下流腎不約制白木散外

有脾熱口甜為消瘴經謂數食肥甘其氣上溢轉為消渴經用蘭

肥令人內熱甘令人中此膏梁釀熱潤津即消中之漸宜地黃

泉有食併而過不生肌肉也經謂大腸移熱於胃善食而瘦胃移

熱於膽皆名食併治同有酒渴由嗜酒積熱煩渴專嗜冷物烏梅

有蟲渴臟腑生蟲耗津液而成消渴苦棟其有渴飲一二口即

厭少頃復渴但不若消飲者之無厭此中氣虛寒寒水上泛逼其

浮游之火於喉舌間故上焦欲得水救水到中焦以水遇水即厭

也如面赤煩躁宜理中湯凡渴而不能食者末傳中滿鼓脹能食

而渴者必發腦疽背癰皆不治此又消渴之傳變所必防者

本事曰消渴全因坎水衰少腎陽不升肺為華蓋譬板覆釜煖氣

上騰則板能潤若腎氣能蒸化則飲食精液上升自免乾渴宜入

徐忠可曰消因腎虛或因二陽結或為厥陰病其能食而渴者宜

重二陽論治其飢不欲食氣撞心者宜重厥陰論治仲景傷寒論

消渴氣上撞心飢而不欲食皆由厥陰風鬱火燔也其飲一洩二者宜重腎虛論治此臨症

時所宜細辨也

繆仲淳曰三消渴疾以鮎魚涎和黃連末為丸每五七丸烏梅湯

下日三服效以白芍甘草等分為末每一錢水煎日三服有患

消渴九年服藥止而復作得是方服之七日頓愈不可以其平易

而忽之以括蕪根即天黃連各三兩為末蜜丸每三十九麥冬

湯下日二服其飲水無度小便數者用田螺五升水一斗浸一

夜湯即飲之每日一換水及螺或者煮食飲汁亦妙飲水無度小

便赤澀者用秋麻子仁一升水三升煮三四沸飲不過五升癯

腎消飲水渴如膏油者用茴香苦楝子等分炒研末食前酒服二

錢消渴下元虛者用牛膝末酒蒸五兩生地汁五升浸日晒夜浸

汁盡為度蜜丸酒下三十九久服津液自生胃虛消渴者羊肚

煮爛空腹食之消渴煩亂者乾冬瓜瓢一兩水煎服消渴羸

瘦小便不禁者兔骨和大麥苗煮汁服極效消中易飢者用菘

菘山黃五味蜜丸每鹽酒下三十九三消骨蒸者以冬瓜自然

汁浸晒黃連末七次又以冬瓜汁和丸每三四十九大麥湯下尋

常口渴一服效

三消脉候

消渴脉實大病久可治脉懸小堅病久不可治內跌陽脉數胃中

有熱即消穀引飲大便必堅小便即數仲消渴脉當緊實而數反

沈瀆而微者死心脉滑為渴滑者陽氣勝也心脉微小為消瘴凡

消症脉數大者生沈小者死經真陰耗竭腎氣不升肺臟枯燥寸

口數盛為上消竭力房室服食剽悍火土太強恣情肥美氣口動

滑為中消虛陽不守封藏不固右尺數大為下消張氏醫通消

瘧診論宜參玩

附方

六味丸 見一卷中風

人參白虎湯 見一卷中風 加人參

調胃承氣湯 見二卷汗

歸脾湯 見二卷勞瘵

人參同本丸 見一卷中風

生脉散 參 麥 五味

黃芩湯 芩 梔 桔 麥 歸 芍 參 地 花粉 葛

地黃飲子 見一卷中風

類證治裁

參之四

三消

參

參 草

黃耆竹葉湯 參 耆 石膏 各一錢 歸 芍 地 麥 葛 草

生津飲 二冬 二地 歸 味 薑 草 麻仁 花粉 各一錢

清心蓮子飲 見一卷火

降心湯 花粉二錢 參 耆 歸 地 味 草 苓 遠 志 各一錢 棗 二枚 山藥 山萸 丹皮 五味 百藥煎

加減地黃丸 熟地 山藥 山萸 丹皮 五味 百藥煎

紫蘇湯 紫蘇 桑皮 赤茯苓 各一錢 郁李仁 二錢 羚羊 角七分半 檳榔 七分 肉桂 木香 獨活 枳 壳 各五分

五苓散 見一卷溫

麥門冬飲 麥冬 二錢 生地 知母 花粉 人參 五味 葛根 茯苓 甘草 各一錢 杞子 竹葉 十張

人參麥冬湯 參 苓 麥 味 草 杞子

利

瀉

上消

天花粉散 花粉 生地 麥冬 乾葛 各二錢 五味 甘草 藜香 飲子 石膏 三錢 知母 錢半 連翹 薏仁 桔梗 升麻 各五分 半夏 二分

中消

七味白朮散 參 朮 苓 草 藿香 各五分 乾葛 一錢

虛氣

瀉黃散 見一卷火

胃火

玉女煎 見一卷溫

熱

藕汁膏 人乳 生地汁 藕汁 各一大盞 先熬為膏 加黃 芩 連 猪 肚 丸 麥冬 各二兩 為末 以猪肚 一个 洗淨 入藥 糲

肺

黃耆湯 耆 地 芍 麥 味 各三兩 參 草 天冬 各 三錢 茯苓 一兩 每服 三錢 加烏梅 薑 棗

脾

黃連猪肚丸 黃連 梁米 花粉 茯苓 各四兩 知母 麥冬 各二兩 為末 以猪肚 一个 洗淨 入藥 糲

通

口煎爛 梓細蜜丸

痰

白茯苓丸 茯苓 黃連 花粉 草薢 熟地 覆盆子 人參 元參 各一兩 石斛 蛇床子 各七錢半

下

雞內金 炒三十个 蜜丸 磁石湯下 元兔丸 免絲子酒浸 研焙乾 十兩 五味子酒浸 研焙乾 七兩 浸酒打糊 為丸 茯苓 蓮肉 各三兩 山藥 六兩 共研 將所 空心米飲下 山藥 芡實 棗仁 各炒 金櫻子 各二錢 秘元煎 遠志 茯苓 各錢半 炙草 人參 各一錢 五味 十四粒 水煎

攝

雙補丸 鹿角膠 人參 茯苓 苡仁 熟地 菴菴 當 歸 石斛 黃耆 木瓜 五味子 兔絲子 益子 各一兩 沈香 澤瀉 各五分 麝香 一錢

補

大補地黃丸 見一卷燥

左歸飲 見二卷虛損

大補元煎 見一卷中風

加減腎氣丸 熟地二兩 丹皮 澤瀉 茯苓 山藥 山
錢 蜜丸 黃 五味 鹿茸各一兩 肉桂 沉香各五

空心服

右歸飲 見二卷虛損

鹿茸丸 麥冬二兩 鹿茸 熟地 黃耆 五味 雞內金
茯苓 故紙 牛膝 山萸 人參各七錢五分

地骨 茯苓 元參

各五錢 蜜丸 石子薺芫湯 黑豆一升 煮汁去渣 人猪腎一个 煮汁
入薺芫 石膏各三兩 人參 茯苓 磁石

知母 葛根 黃芩 花粉 甘草各二兩 分三服 水煎 加減八味丸 八味減附子 加五味

消下 加減八味丸 八味減附子 加五味

類證治裁 卷之四 三消

玉泉丸 花粉 葛根各一兩 五錢 人參 麥冬 烏梅
草各一兩 生者 炙者各五錢 蜜丸

烏梅木瓜湯 烏梅 木瓜各二錢 麥芽 草果 甘草各
一錢 薑五片

苦楝子湯 苦楝根皮一握 切焙 麝香少許 水煎

理中丸 見一卷中風

湯煩渴 湯煩渴 湯煩渴

三消

何 六旬外脉數消穀善飢動則氣喘是脂液內涸火亢鑠金之
候經所謂壯火食氣固本丸加生白芍炒知母效

族女類食易飢手足暈動此消中症經云痺成爲消中以初病胃
熱消穀而瘦煎熬日久胃脂內消水液不爲宣布下注直降勢
必延爲燥涸局方甘露飲宜之

朱 渴飲消水日夜無度自夏歷冬閱所服方寒熱互進尋不一
效今飲一洩一渴則飢餓明繫腎陰竭於下虛陽灼於上脉轉

沈遲沈爲厥陰受病遲則熱極反有寒象也思壯火銷鑠腎陰
腎液既涸必引水自救症成下消急滋化源遲則難挽做易簡

類證治裁 卷之四 三消

地黃飲子加減生地熟地人參麥冬石斛花粉阿膠甘草服之
效又令服六味丸加猪脊髓龜膠女貞子杞子五味去澤瀉茯
苓得安

黃疸論治 黃疸 穀疸 酒疸 女勞疸 黃汗 黃胖

黃疸由脾胃溼熱鬱蒸漸致身目如金。汗暢皆黃。經謂溼熱相交。

民病癰也。丹溪云。此如蠶麴醬相似。溼熱久居。其黃乃成。此發黃。

傷寒論發熱但頭汗出。小便不利。渴飲痰熱在裏。必發黃。又云。傷

寒汗已。身目為黃。以寒溼在裏不解。非但溼熱發黃。寒溼亦發黃。

也。溼熱發陽黃。寒溼發陰黃。所由。海藏云。凡病當汗不汗。當利小便不利。

皆生黃疸。有五黃疸。穀疸。酒疸。女勞疸。黃汗。身目悉黃。寒熱體倦。

者為黃疸。茵陳五苓散。食已如飢。頭眩煩熱。身黃者為穀疸。猪肚丸。實

湯。或龍膽苦參丸。經云。食大醉當風入水。心中懊懣。不食欲嘔。

己如飢者。胃疸。即穀疸也。大醉當風入水。心中懊懣。不食欲嘔。

面黃赤斑者為酒疸。葛花解酲房勞小腹痛急。額上黑。手足心熱。

類證治裁 卷之四 黃疸

薄暮發者為女勞疸。加味四君子湯。經云。黃疸赤安。汗出染衣。

色如藥汁。因身熱汗出。澡浴水入毛孔。而成者為黃汗。黃者。既分

五疸。宜辨陰陽。陽黃多由熱熾。煩渴。頭汗。脈必滑數。陰黃多出寒

溼。身冷。汗出。脈必沈微。陽黃係胃腑溼熱。熏蒸與膽液泄。越上侵

肺。則發而為黃。其色明如橘子。治在胃。茵陳蒿湯。陰黃係脾臟寒溼。不

運與膽液浸淫外漬。肌肉則發而為黃。其色晦如烟熏。治在脾。茵

陳四逆湯。陰黃亦有體痛發熱者。但身如熏黃。終不似陽黃明。如橘子

色也。海藏治陰黃。小便不利。煩躁而渴。茵陳茯苓黃疸煩躁。喘嘔不

湯。茵陳陳發黃。四肢偏身冷。茵陳附發黃。肢體逆冷。腰自汗。茵陳

冷中寒。脈弱氣虛。理中湯。挾表脈浮。桂枝加往來寒熱。小柴胡湯。

胸滿嘔吐。夏湯。小便利而色白者。仲景作虛勞治。中湯。一種虛黃。

口淡怔忡。耳鳴足軟。神疲無力。人參養營湯。穆仲醇曰。因勞發

或利便止。有風黃。其人肥風不外洩。身不黃。獨目黃者。散。有痰

血發黃。身熱小便自利。大便反黑。脈扎澹。當下盡黑物。桃仁承

疫癘發黃。殺人最急。茵陳蒿湯。黃湯。生茵陳湯。膠。別有黑疸。因

女勞傷腎。額色黑。膀胱急。腹脹如水。便黑多滯。散。酒疸下之久

亦成黑疸。目青面黑。心中如噉蒜。莖狀大便正黑。沈氏俱用。若黃

變腫脹。必疏導。腑中溼熱。扶苓溼湯。去苓連。凡葛。若絡脈瘀熱

發黃。金鈴子散。疸久不愈。則補脾。參朮健脾丸。色疸。總之黃而不

湯。易治。湯者難治。初起宜汗。有食宜消。湯少宜利。小水利黃。自退

通用化疸湯。久而虛。脈症宜溫補者。養營湯。四君。酒疸多蘊熱。先

當歸白朮湯。加分利。加減五苓散。後必顧其脾陽。加枳椇子。女勞

有穢濁。始用解毒。黑疸。繼滑竅。二石。終當峻補腎陰。湯。外有黃

胖症。與黃疸異。黃疸目黃。身不腫。黃胖多腫。其色黃中帶白。目如

故疲。倦少。神病源。雖同。屬脾。然黃疸由溼熱鬱蒸而成。黃胖則溼

熱未甚。多蟲與食積所致。必吐黃水。毛髮皆直。或嗜食生米茶葉

土炭。宜四寶丹。有食積則消導。加紅麴。或健脾去溼藥中。加針砂。重

疸屬暴病。故仲景以十八日為期。黃胖為宿病。有久而不愈者。正

傳曰。綠蠶丸。二方治黃胖病最捷。又勞力受傷。亦成黃胖。能食易

飢疲倦無力。沈氏雙砂丸。俗名脫力黃。此又在蟲食黃病之外者。參沈氏

黃疸脈候

五疸實熱。脈必洪數。其或微瀼。悉屬虛弱。直指曰。疸脈緩大者。順。弦急而堅者。逆。脈小。澀利不渴者。生。脈洪泄利而渴者。死。疸毒入腹。喘滿者。死。寸口近掌處無脈。口鼻冷者。死。

附方

茵陳五苓散 茵陳 蒼朮 澤泄 猪苓 茯苓 官桂
猪肚丸 白朮 苦參 牡蠣 入猪肚煮爛搗丸 燈心
茵陳蒿湯 茵陳 山梔 大黃

類證治裁 卷四
龍膽苦參丸 龍草一兩 苦參三兩 牛膽汁九 食前
葛花解酩湯 見一卷溫

加味四君湯 參 苓 朮 草 加黃耆 白芍 扁豆
黃耆湯 黃耆 赤芍 茵陳 石膏 麥冬 豆豉 甘草
茵陳四逆湯 附 薑 草 加茵陳
茵陳茯苓湯 茵陳 茯苓 猪苓 滑石 當歸 官桂
茵陳陳皮湯 茵陳 陳皮 白朮 半夏 茯苓 生薑
茵陳附子湯 茵陳 附子 甘草
茵陳薑附湯 即茵陳四逆湯
茵陳茱萸湯 茵陳 茱萸 附子 乾薑 木通 當歸

理中湯 參 朮 薑 草
桂枝黃耆湯 桂 芍 草 薑 棗 加黃耆

小柴胡湯

小半夏湯

小建中湯

人參養營湯

青龍散

桃仁承氣湯

小麥湯

茵陳瀉黃散

濟生茵陳湯

硝礬散

沈氏黑疸方

茯苓滲溼湯

金鈴子散

參朮健脾丸

化疸湯

當歸白朮湯

腎氣丸

加減五苓散

加減五苓散

見一卷溫
見一卷溫
見三卷血
見二卷勞瘵
防風 荆芥 生地 首烏 威靈仙 每服一錢
見一卷疫
小麥 竹葉 石膏 水煎
茵陳 葛根 黃連 山梔 白朮 赤芍
茵陳 木通 人參 薑 棗
茵陳 四錢 犬黃 二錢 山梔 一錢 即茵陳
茵陳 兩 分兩 不同
此方散熱解毒 出仲景
沈氏黑疸方 茵陳 兩 搗汁 沈金鰲製以泄疸毒 和服黃水
茵陳 兩 小便下 此 猪苓 澤瀉 白朮 蒼朮
茯苓 黃連 山梔 秦艽 防己 葛根
見三卷鬱
見三卷腫脹
茵陳 蒼朮 茯苓 猪苓 木通 山梔 薏仁
茵陳 酒 加葛根 女勞 加當歸 紅花 棗
歸 朮 荅 夏 荅 枳 草 茵陳 棗
見二卷虛損
加茵陳 減肉桂 見一卷溫

香砂六君丸 見三卷嘔吐

二石散 滑石 石膏 等分爲末大麥汁服

六味湯 見一卷中風

四寶丹 使君子肉二兩 檳榔 南星各一兩 蜜丸 吃 炭加黑炭 砂糖 吃茶葉加細茶 吃土加聖土 吃 水送下

保和丸 見二卷痰飲

綠礬丸 綠礬炒白 五倍子炒黑 神麴炒黃 鉞砂醋淬 薑汁煮棗肉爲丸 酒下

褪金丸 針砂 香附各六兩 白朮 蒼朮各二兩五錢 陳皮 神麴 麥芽各一兩五錢 厚樸 甘草各 一兩 麴糊丸 米湯下

沈氏雙砂丸 鉞砂四兩炒紅醋淬 砂仁一兩生研 香附 便製五錢 皂礬麴包 煨紅一兩 大麥粉三

卷之四

黃疸

舉

升木香生研一兩元 棗一觔煮肉爲丸

黃疸

許 傷精發黃頭眩面浮腰膝乏力足心如烙脉洪大而虛用薛

氏六味丸君茯苓去澤泄加生地牛膝酒蒸蓮子薏仁湯丸兼

服飯後用甘菊炒黑山梔嫩桑葉鈎藤泡湯服數月而痊

貢 勞傷元氣發黃食減氣少目黃面晦做仲景法以黃耆建中

湯去桂參入參苓白朮散治之效後服蓮子薏米紅棗等調理

此端調補脾元不與諸疸例治若一例茵陳梔子滌除溼熱恐

變成脹滿矣

石 陽黃乃溼從熱化癉熱在裏蒸動膽液洩而爲黃明如橘子

今日黃面色亮頭眩胸痞不渴肢倦少力手足心熱大腸結過

黃疸

黃疸

舉

勞則甚脉右大左虛濡雖繫溼甚生熱然平人脉大爲勞且疸

久不愈乃勞力傷氣之候用補中參溼溼法潞參茯苓薏米於

水各錢半雞內金茵陳鉞砂各二錢山梔甘菊丹皮各一錢炙草五分數

服眩痞除食頗加去甘菊山梔加黃耆白芍俱炒蓮子炒十又

數服黃漸退

某 長夏暑溼外蒸水穀內蘊脾陽失運頭眩欲嘔面如熏黃食

入作脹午候煩而渴赤脉濡左畧大先宜分清法羚羊角山梔

茵陳赤茯苓仁製半夏砂仁壳滑石石斛車前子燈心三服諸

症已減改用厚樸薑製枳壳炒陳皮大腹皮薄荷茵陳二服脹除

黃未退欲速更醫用沈香焦朮等燥品忽發額疸又用犀角黃

連午前後潮熱用生地知母黃芩更劇面晦黑寒熱額汗腹滿
嘔瀉舌胎膩白膈有粘涎復商治予謂此溼勝也溼壅則生熱
治宜滲溼用四苓散加半夏麴橘白薏仁煨薑午前服瀉減嘔
沫猶是暑溼交蒸濁涎失降脉見濡數亦熱從溼化象也更用
胃苓湯去白朮加製半夏生薏仁煨薑其蒼朮生用鍋巴湯煎嘔
止瀉少惟煩熱之起伏隨太陽之升沈午未特甚則溼去而熱
兩也因用黃芩丹皮山梔赤苓地骨皮栝藹根汁加六一散錢一
冲服瀉熱悉止惟神倦嗜臥覺口燥津不上朝於肺用參麥
入加味逍遙散內扶元生津兼散鬱蒸脉息乃平惟左關較大
做石室秘錄用白朮五錢茯苓三錢薏仁一兩龍膽草山梔茵陳各一錢

類證治裁

卷之四

黃疸

嬰

游參黃耆各二錢燥脾溼培真元佐瀉火後仍欲速效慎服前醫
滋陰之劑遂成不治

薛 脾虛傷溼病發陰黃數年面浮足腫頭眩唇白便後血與調
補藥稍愈近便血雖止溼而不爽小水短數腹大而鞭身熱體
倦脉細小濡數與補中升提佐以淡滲腿足腫退脉較有神繼
與潞參生朮赤苓丹皮黑山梔茵陳牡蠣升麻大便爽熱較輕
中脘偶痛去丹梔升朮加木香陳皮白芍痛除改用腎氣湯去
山萸澤泄附子加炮薑腹漸軟後因不慎於口竟以服終
耿 久疸神疲頭眩面浮不時熱渴脉虛大陽浮不斂宜攝陰和
陽牡蠣白芍五味洋參熟地麥冬石斛檀豆皮數服效

錢 黃疸傷食腹脹溺黃用健脾分消之品加入茵陳湯腹脹如
故擬陽明胃腑熱鬱蒸用禹餘糧醋煨七次生地松蘿茶各四錢
礬煨一棗肉煨研搗為丸服愈
唐 童年面黃能食目眩發熱不時由溼甚生熱熱蒸變黃胃熱
穀消此為穀疸宜猪肚丸入秋食後脹眩便溼脉虛小熱與溼
搏由太陰不運少陽化風主理脾陽佐以熄風生白朮潞參陳
皮薏仁雞內金半夏麴俱炒茵陳赤苓甘菊炒天麻煨服愈

類證治裁

卷之四

黃疸

嬰

瘧症論治

瘧疾四時皆有而多發於夏秋。以夏傷於暑汗出腠開當風浴水受淒冷之水寒及秋遇涼風束之裏邪不能外越則隨經絡以內薄舍於臟腑募原之間。居半表與日行之衛氣相值而瘧作焉。當其邪正交爭併於陰則中外皆寒。經所謂起於毫毛伸欠併於陽則外內皆熱。經所謂頭痛如極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休。衛氣集則復作。經云衛氣日行於陽夜行於陰。瘧邪得陽而外出薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出故問日作。邪氣內薄五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱出故問日乃作。其間二日者邪氣與衛氣客淺者邪發三陽隨衛氣以出於六腑有時相失必休數日乃作也。淺者邪發三陽隨衛氣以出則日一作深者邪舍三陰不能隨衛氣並出或間日間二三日而

類證治裁

卷之四

瘧

瘧

作病深者作愈遲以瘧邪有在經在腑在臟之別也。已任編云臟虛界之募原而虛界中復有剛柔筋脈其為某臟腑之筋即為某臟腑之病究之臟腑瘧病皆募原伏邪之氣所遷移間日間二三日募原有故邪傳陽分則作日早邪陷陰分則作日晏。經曰邪客遠近耳。故邪傳陽分則作日早邪陷陰分則作日晏。風府循督而下與衛氣一日夜會於風府日下一節故其作晏其出風府日下一節二十五日下至髀骨二十六日入於脊骨注於伏膂其氣上行九日出缺盆其氣益高故作日乃益早。風府在項後髮際一寸項骨三節脊骨二十一節其廿四節下為尾骶骨邪自風府日下一節故發晚廿五日至髀骨廿六日邪復自後而前入脊內注伏膂循脊上行無關節之阻故九日出缺盆其氣益高自陰就陽邪日退治者須從陰分提出陽分作日早則易瘳無汗欲使有汗散邪為主而兼補汗多欲令汗少者正為主而兼散尤必分經以論治足太陽瘧腰痛頭重寒從背起先寒後熱熱止汗出難已羌活黃芩足少陽瘧身體解休見人心惕然熱多汗出甚小柴胡湯加減

足陽明瘧頭痛渴飲酒漸寒甚久乃熱熱去汗出竹葉石膏足太陽瘧不嗜食寒多善嘔熱甚則渴桂枝湯加減足少陰瘧腰痛脊強口渴嘔吐寒從下起熱多寒少病難已桂枝人參白虎湯足厥陰瘧腰痛少腹滿小便不利數便先用三黃石膏湯後用蠶甲牛膝湯加減此論六經瘧也若邪深伏則為五臟瘧如肺瘧令人心寒寒甚熱善驚加芍藥心瘧令人煩心欲得清水反寒多不甚熱桂枝黃芩瘧令人色蒼面色太息狀若死湯四逆脾瘧令人寒腹中痛熱則腸鳴已汗出小建中湯腎瘧令人洒洒然腰脊痛大便難手足寒歸芍桂枝橋皮散腎瘧令人洒洒然腰脊痛大便難手足寒歸芍桂枝橋皮散在腑則胃瘧令人善飢而不能食食而支滿腹大二陳湯加枳殼草果既辨六經臟腑更審六淫所傷輕重如風瘧脈浮大春感風而得惡風瘧症為多

類證治裁

卷之四

瘧

瘧

自汗頭痛風為陽邪故先熱後寒宜紫蘇川芎寒瘧脈緊盛秋乘涼浴水感寒而成惡寒無汗寒為陰邪故先寒後熱厚樸草果等暑瘧脈虛受暑熱熾煩冤邪傷上焦肺氣發必寒輕熱重唇燥舌絳渴喜涼飲盛暑發者白虎湯虛加人參麥冬秋涼伏暑瘧脈濡緩面浮身痛腕悶不飢嘔惡邪阻中焦脾絡發必寒重肢冷舌白胎膩喜熱飲大便不爽忽秘忽瀉為溼結氣痺宜半夏厚樸白石茯苓通草或胃苓湯去桂枝其溼熱交蒸阻氣洩熱滲溼審其重輕切忌柴葛根津宜香檳麥冬栝實枳殼瘧瘧但熱不寒由陰氣先傷陽氣獨發壯熱少氣煩冤手足熱欲嘔邪內藏於心外舍肌肉令人消燥肌肉宜甘寒生津生地麥冬知母竹葉丹皮杏仁貝母溫瘧脈如

平人但熱不寒。骨節煩疼。時嘔。金匱用桂枝白虎湯。若溫邪兼濕。宜半夏杏仁薏仁滑石。俱忌柴葛。升。吐。瘧。多。寒。金匱用蜀漆散。宜酌用二陳湯。加薑桂枝。若。但。舉。邪。伏。於。腎。經。氣。分。寒。瘧。邪。伏。於。膽。經。營。分。若。但。寒。不。熱。柴。胡。薑。湯。瘧。瘧。素。脾。虛。多。痰。瘧。熱。又。能。蒸。痰。胸。悶。欲。嘔。熱。痰。母。佐。以。竹。茹。橘。紅。枯。薑。霜。茯。苓。皮。寒。食。瘧。飲。食。生。冷。不。節。致。寒。熱。痰。君。白。朮。佐。以。半。夏。陳。皮。薑。汁。蘇。子。食。瘧。飲。食。生。冷。不。節。致。寒。熱。較。重。飢。不。思。食。滿。悶。腹。疼。養。胃。湯。瘧。瘧。嶺。南。氣。炎。感。受。山。嵐。澗。溪。之。毒。乍。寒。乍。熱。迷。悶。發。狂。須。祛。瘴。滌。痰。平。胃。散。疫。瘧。因。染。時。邪。寒。熱。成。瘧。其。症。沿。門。合。境。達。原。飲。五。瘟。丹。鬼。瘧。夜。發。為。邪。入。血。分。宜。升。散。營。中。之。邪。內。補。建。中。湯。加。升。柴。生。首。勞。瘧。病。久。延。虛。旺。羸。氣。怯。因。勞。輒。發。寒。熱。糶。糊。最。難。調。治。補。中。益。氣。湯。加。牛。瘧。母。久。病。失。調。邪。入。肝。經。挾。痰。血。痰。涎。脇。下。結。塊。宜。疏。通。血。絡。用。鱈。甲。桃。仁。蓬。朮。牡。蠣。加。金。鈴。子。歸。鬚。延。胡。桂。枝。甲。片。或。鱈。甲。煎。瘧。疾。變。痢。因。暑。溼。迫。注。失。於。解。散。由。經。入。腑。宜。表。裏。分。消。用。柴。胡。半。夏。黃。芩。枳。殼。陳。連。進。大。劑。以。痢。愈。為。度。瘧。亦。止。此。治。諸。瘧。之。大。概。也。此。外。又。有。似。瘧。非。瘧。同。一。惡。寒。發。熱。或。寒。熱。往。來。最。宜。詳。辨。脈。症。虛。實。勿。以。陰。陽。內。損。之。初。症。悞。認。瘧。邪。輕。用。表。散。如。小。柴。胡。湯。若。脈。症。皆。虛。即。宜。黃。耆。建。中。升。柴。血。虛。發。熱。者。道。遙。益。陽。虛。則。惡。寒。陰。虛。則。發。熱。凡。傷。寒。後。及。少。川。血。虛。發。熱。者。散。蓋。陽。虛。則。惡。寒。陰。虛。則。發。熱。凡。傷。寒。後。及。大。病。後。產。後。勞。怯。等。症。俱。有。寒。熱。往。來。或。一。日。一。二。發。俱。宜。作。虛。治。以。瘧。之。寒。熱。有。定。時。雜。症。之。寒。熱。無。定。時。為。辨。論。中。治。法。有。未。備。者。參。觀。後。論。

瘧疾脈候

瘧脈自弦。弦數多熱。弦遲多寒。弦而浮大可吐。弦短傷食。弦滑多痰。微則為虛。代散者死。遲緩者愈。入門曰衛。虛則先寒。營虛則先熱。表邪多則寒多。裏邪多則熱多。表裏相半則寒熱相等。

附方

羌活黃芩湯 羌 芩 陳 草 前胡 猪苓 知母 口 湯加 麥冬 石膏
 小柴胡湯 見一卷溫 口渴去半夏加 麥冬 石膏
 竹葉石膏湯 見一卷傷風 痰多加 橘紅 貝母
 桂枝湯 桂 芍 草 薑 棗
 建中湯 見二卷動血
 白虎湯 見一卷中風 加入參名人參白虎湯 加桂枝名 桂枝白虎湯
 三黃石膏湯 見一卷疫
 鱈甲牛膝湯 鱈甲 牛膝 當歸 陳皮 柴胡 熱甚加 參冬 知母 口渴加花粉
 桂枝加芍藥湯 桂 芍 草 薑 棗 倍芍藥用
 桂枝黃芩湯 即桂枝湯加 黃芩
 四逆湯 附子 薑 草
 橘皮散 橘紅薑汁浸煮焙乾研末 棗湯下三錢
 桂枝加歸芍湯 即桂枝湯加 歸 芍
 二陳湯 見一卷中風
 芎蘇飲 見二卷咳嗽
 露薑煎 生薑四兩搗汁露一宿 凡治瘧湯劑露一宿者取 白露降則暑熱除之意

白虎湯 見上

柴平煎 小柴胡湯合平胃散

胃苓湯 見一卷中風

白虎蒼朮湯 見一卷中風

蜀漆散 蜀漆 雲母燒二晝夜 龍骨煨 研末水調

柴胡薑桂湯 柴 薑 桂 苓 草 花粉 牡蠣

養胃湯 參 朮 陳 夏 苓 檉 砂 麴 丁香 木

平胃散 見一卷中風

達原飲 見一卷疫

五氣丹 芩 連 葉 草 香附 紫蘇 用大黃熬符為

類證治裁 卷之四 瘧

不換金正氣散 本胃散加半夏 薑香

內補建中湯 黃耆建中湯加 當歸

補中益氣湯 見一卷中風

鼈甲煎丸 鼈甲 灰酒浸煮汁一兩二錢 柴胡 白芍 月

阿膠各三錢 黃芩 烏扇 風婦 蜈蚣各四錢 桂枝

厚樸 蜂房 石葦 桃仁 乾薑 大黃 半夏 人參

五分 赤附一兩 以鼈甲汁為丸 祛瘧飲 柴 蘇 檉 陳 查 枳 草 二母 水煎

逍遙散 見一卷火

瘧

甲申予館新洲長夏風暑熱溼瀉開日發寒熱俱重涎沫甚多用

平胃散加柴胡製半夏神麴赤苓二服愈。又乙酉感風成瘧

經日風淫於內治以辛涼用芎蘇飲去乾葛木香加薄荷薑皮

一服愈

胡 伏暑發寒熱如瘧頭暈脘痞此暑邪挾溼阻遏氣分故汗止

在胸前宜辛涼解散用梔殼湯加杏仁枳殼黃芩半夏栝樓滑

石數服而平

族婦暑症轉寒微熱汗多頭眩便難用竹葉石膏湯去參加

知母服愈

類證治裁 卷之四 瘧

毛 熱症未愈復因邪清濕熱傷風濕瀉腹脹午前寒熱如瘧至

夜乃汗右關尺浮滑泄瀉寒裏治宜經腑疏解用柴胡半夏薄

荷蘇梗陳皮厚樸赤芍神麴生薑二服諸症退去薄荷加黃芩

砂仁壳雞內金 數服全愈

姪 寒瘧吐瀉脈遲虛用理中湯加半夏茯苓砂仁神麴薑汁一

服吐瀉止瘧輕診脈虛而少力此中氣不足也令與希廉用補

中益氣湯神麴思食瘧止又服四君子湯加黃耆 砂仁愈

李 秋瘧背寒肢厥從卯時冷至酉方熱夜半無汗自退不飢不

食倦臥做陳遠公解寒湯湯於朮川附 川芎柴胡桂枝草

果 煨薑棗煎服得汗而寒減去川附加半夏 陳皮當歸思

食瘡止 此症與丹溪所治少年足冷瘡相似但彼由接內此係陽虛

王 欬嗽痰多右胸痛瘡間日發脈浮緩此為肺瘡得之浴後當

風經所謂真傷於暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒

藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成也肺主皮毛故為肺瘡

用柴胡湯合二陳去黃芩加防風蘇葉桑皮杏仁薑棗煎數服

愈

姪 間日瘡寒熱俱重頭痛背寒肢麻肋悶嘔惡痰多由溼熱阻

遏氣分白蔻仁厚樸各五分廣皮枳殼各一分半夏茯苓各二分青蒿

分杏仁錢半栝藹竹茹各錢二分煨薑錢二一服腕悶已展嘔惡亦除痰

降便通溼熱去瘡自止杏仁半夏各錢半赤苓錢二栝藹枳殼橘紅

類證治裁

卷之四

瘡

五

甘菊各八分薏仁三分竹茹錢一嫩桑葉錢三刺瘡止 前用溫膽湯

愈瘡尚不嗜食大便難腕中欠爽病在左關不和因之腸腑失

降用兩和厥陰陽明白芍旋覆花陳皮半夏栝藹仁牡蠣粉杏

仁竹茹枳實汁再服悉平

族孫胎瘡停滯用寸金丹三錢薑湯服二次愈

木 問日瘡偏頭痛連齒夜煩不寐症由膽火升越震動心主致

神憤語錯必熄膽絡風火瘡邪自己鈎藤鼈甲各二錢山梔丹皮

麥冬各一錢黃芩連翹各七分半夏青鹽炒夜交藤錢五日二服兼下

牛黃清心丸瘡輕改用烏梅二枚赤苓生首烏各三錢鼈甲二錢牛膝

當歸丹皮各八分一啜而止

梁氏粵產地暖氣泄客居黃河以北風土迥殊今夏秋暑雨蒸淫

感症成瘡寒熱煩滿微汗以溼瘡治做古柴平湯用柴胡黃芩

半夏茯苓枳殼山梔茅朮生厚樸陳皮薑棗二服汗透寒熱減

改用清暑退邪前方去茅朮樸枳加青蒿香薷薄荷再劑而愈

某 瘡間日發寒重熱輕汗多神倦發時頭不痛口不渴但凜寒

拘急肢冷脾瘦老人氣虛有痰此非暑非風乃虛邪入絡名曰

勞瘡先時勿食汗後服保元湯扶正以逐絡邪參耆朮草歸陳

鼈甲炙柴胡半夏成靈仙薑煎一啜遂止

類證治裁

卷之四

瘡

素

陰瘡論治

前論瘡邪伏於募原。淺者客三陽經。深者入三陰經。夫臟腑之經。各有界絡。即某經瘡。因邪有淺深。含有遠近。行有遲速。故衛氣相值。有日發。間一日。二日。而發之殊。間一日。發與日發者。治法同。病亦易愈。惟間二日。為難治。以伏邪深入三陰。故名陰瘡也。脾足少陰。腎足厥陰。三陽瘡多發在夏至後。處暑前。三陰瘡多發在處暑後。冬至前。發愈晚者。去亦遲。以氣令收肅故也。其發時亦不定。有前間一日。忽間二日。發者。有前間二日。忽一日。夜兩發者。有連發二日。中間一日者。有間三日。發不爽者。或不忘口。不節勞。伏邪旁溢界絡。皆能致之。否則發期錯亂。乃將愈之兆矣。陰瘡主治之法。

類證治裁

卷之四

陰瘡

吾

惟和營調衛兼疏邪。勿期速效。用規劑。如常山飲。每見用常山。巴霜。規痰得效者。面色熏黑。留邪在裏。後多變成癆。熱鼓脹不治。良可恨。悼因前論治法未盡。而申之。凡通治諸瘡。初起宜散邪。露茸。往來寒熱。胡湯。寒多者。加桂枝。寒少熱多。清脾。溼盛。平胃。痰多。二陳湯。溼盛。嘔瀉。平胃散。谷四苓。溼熱俱盛。清中驅。暑熱兼溼。香。飲。加黃芩。牛。伏暑秋瘧。括蕪。枳殼。竹茹。熱瘧。心下痞結。半夏。瀉心。湯。赤茯苓。石。伏暑秋瘧。括蕪。枳殼。竹茹。熱瘧。心下痞結。半夏。瀉心。湯。湯。加此諸瘡。通治法。若陰瘡。邪深。本不在表。三五發後。乘元氣未。衰。用陳香。檳。大者。全。挖。小。蓋。入。水。飛。明。雄。五。錢。納。蓋。銅。絲。紫。好。炭。火。煨。燬。時。烟。出。勿。令。雄。黃。走。出。存。性。研。末。病。者。隔。夜。勿。食。明。晨。開。水。下。以。箸。探。喉。吐。盡。膠。痰。頑。痰。既。去。隨。服。補。劑。歸。脾。湯。如。未。再。服。再。坐。半。日。飲。粥。湯。吐。止。頑。痰。既。去。隨。服。補。劑。歸。脾。湯。如。未。止。寒。熱。必。經。截。瘧。飲。立。效。延。久。必。虛。尚。義。正。却。邪。湯。加。半。夏。知。母。未。

止熱重於寒。用丹皮。龍甲。白。寒熱夜甚。何首烏。散。發時。漸。大。劑。湯。丙。升。麻。寒。從。背。起。陽。虛。汗。洩。人。參。黃。耆。桂。枝。炙。草。熱。甚。傷。陰。遺。柴。胡。少。用。寒。從。背。起。陽。虛。汗。洩。人。參。黃。耆。桂。枝。炙。草。熱。甚。傷。陰。遺。精。便。血。固。本。加。白。營。衛。兩。虛。或。何。人。參。黃。耆。桂。枝。炙。草。熱。甚。傷。陰。遺。獸。飲。俱。加。砂。仁。神。麴。脾。陰。陽。俱。虛。歸。芍。六。君。胃。陰。虛。不。飢。不。食。人。穀。甚。者。理。中。湯。脾。陰。陽。俱。虛。歸。芍。六。君。胃。陰。虛。不。飢。不。食。人。玉。竹。麥。冬。白。芍。石。脾。胃。兩。虛。肢。寒。泄。瀉。附。子。理。中。湯。邪。入。厥。陰。嘔。解。蕪。苳。烏。梅。半。夏。脾。胃。兩。虛。肢。寒。泄。瀉。附。子。理。中。湯。邪。入。厥。陰。嘔。沫。腹。痛。虻。動。肢。厥。加。牡。蠣。白。芍。厚。樸。烏。梅。久。瘧。腎。陰。虛。面。赤。口。渴。六。味。湯。加。五。腎。水。火。俱。虛。瘧。久。成。癆。養。營。湯。吞。虛。人。瘧。母。不。治。成。脹。四。散。飲。加。龍。甲。元。氣。猶。壯。癖。積。左。脇。下。飲。子。不。應。何。膝。邪。結。血。絡。左。脇。脹。痞。連。及。少。腹。治。宜。通。絡。守。補。無。效。桃。仁。丹。皮。蟄。甲。片。通。其。血。絡。痞。脹。乃。除。再。用。補。劑。自。獲。全。愈。

類證治裁

卷之四

陰瘡

美

已任編曰。凡瘡將發時。與正發之際。勿施治。治亦無效。必待陰陽升極而退。此邪留所客之地。乃可服藥治之。且當未發前二三日。迎而奪之。凡小兒胎瘡。不能服藥。用黃丹。五。生。明。礬。三。胡。椒。二。錢。麝。香。少。共。研。末。以。好。醋。調。敷。手。心。男。左。女。右。以。絹。包。手。掌。藥。發。自。汗。而。愈。凡小兒未進穀食者。患瘡久不止。用冰糖。濃煎湯。喂之。最驗。出。徐。註。附。方。常。山。飲。常。山。酒。浸。炒。二。錢。草。果。檳。榔。知。母。各。一。錢。貝。母。錢。半。甲。片。一。錢。烏。梅。二。個。草。水。酒。煎。露。七。寶。飲。常。山。草。果。檳。榔。青。陳。草。水。酒。煎。露。

虛陽衛營營傷陰熱夜正養 邪截脾補熱結 類證治裁 熱痞暑熱溼溼疹痰消多痰盛溼多熱熱寒寒散

露薑煎 見本卷瘧

小柴胡湯 見一卷溫

清脾飲 木 芥 夏 青 草 柴胡 草果 黃芩

平胃散 見一卷中風

二陳湯 見一卷中風

二妙丸 橘紅 半夏 神麴和丸

四苓散 五苓去桂見一卷溫

清中驅瘧飲 柴 芩 枳 樸 青 陳 木 夏 查

香薷飲 見一卷中風

半夏瀉心湯 見一卷溫

類證治裁

卷之四

陰瘧

小陷胸湯 黃連 半夏 薤仁

歸脾湯 見二卷勞瘵

截瘧飲 黃耆二錢 參 木 芥各錢半 砂仁 草果 橘紅各一錢 五味三分 甘草六分 烏梅三個

棗二枚

補中益氣湯 見一卷中風

何首烏散 生何首烏五錢 青 陳 草各一錢 薑七片 大棗三枚 露一宿

固本丸 見一卷中風

養營湯 見二卷勞瘵

何人飲 首烏 人參各三錢 當歸 陳皮各二錢 薑三片

六君子湯 見一卷中風

虛陽虛陰吐胃脾脾補虛陽截補

四獸飲 六君子湯加 烏梅 草果 薑 棗

理中湯 見一卷中風

歸芍六君子湯 六君子湯加 歸 芍

參苓白朮散 見三卷脾胃

烏梅丸 見三卷嘔吐

六味湯 見一卷中風

八味湯 見一卷中風

龍甲飲子 龍甲 者 木 積 樸 芩 芍 陳 草 烏梅 草果 薑 棗

何膝煎 首烏製二兩 牛膝 龍甲醋炙各一兩 當歸五錢 橘紅三錢 虛加人參 發日空心服

類證治裁

卷之四

陰瘧

六

陰瘧

房弟陰瘧寒熱俱重汗多不寐氣促腹痛大便頻左脈微軟右關尺弦長此脾虛肝乘而心陽不攝也用法宜以溫通甘緩兼佐酸泄理中湯加茯苓神龍眼肉草薹肉蔻白芍三服而神爽痛瀉止寒熱亦減繼用歸脾湯九加山藥蓮子何首烏等漸瘳

七 三瘧早用截劑寒熱無定頭汗冷呃逆沫吐青色而慘黑手足厥脈沈數小乃邪入厥陰在裏瘀濁上犯清道治先通陽洩濁用吳茱萸湯加丁香乾薑製半夏青皮茯苓濁逆已止嗣用四逆湯肢和瘧二日發用四獸飲寒熱漸輕接服八珍丸料加首烏牛膝砂仁半夏薑汁煮棗肉為丸病除

類證治裁

卷之四

陰瘧

三

朱 深秋瘧發三陰頭眩熱甚不渴渴痛右脈較大必係暑溼伏邪內蘊昔人治瘧無汗須令有汗乃邪從外泄今值霜降氣令收肅雖用辛解邪不得越尙難穩許愈期紫蘇半夏青蒿石斛生薤仁當歸鮮何首烏知母數服微汗寒熱減右脈平兩關稍虛治宜扶正兼去邪六君湯加鮮何首烏炙鼈甲當歸知母以清透營分加薑棗煎服得痊

錢氏懷妊六月餘客歲陰瘧未止因食牛脯腹滿不飢穀食亦脹致寒熱沈綿盛暑怯寒衣絮無汗此衛陽大衰腑失通降正虛邪錮須防胎損治宜溫衛通腑忌用耆朮守補潞參鹿膠當歸茯苓草果煨薑炒查肉半夏陳皮六服瘧止

族某三日瘧經年未止處暑後燥氣加臨日發寒熱食頃煩餓乾嘔色悴甚渴眩痔痛此燥熱傷陰胃液虛而陰火上乘下迫也

做甘露飲意用生地黃炒知母酒炒麥冬石斛花粉生白芍阿膠水數服症退用何人飲瘧止

朱 三陰瘧發日晏脫痞嘔酸乃半夏瀉心湯症耳猶服知母烏梅穿山甲等苦酸透絡截劑遂令寒熱無汗三日兩發舌有蠟爪紋是脾臟寒水旁溢支絡別成窠臼一增為兩求輕反重矣宜六君湯溫脾以通溼水溼去則寒熱輕不致邪傷肝腎延成羸怯潞參於水雲苓陳皮半夏薑製砂仁草果煨薑數服已去其一仍二日一發又數服發益蚤自寒熱亦微以原方藥製末加

類證治裁

卷之四

陰瘧

三

牛膝炒去草果用薑汁和棗肉為丸服愈

房弟三瘧初發寒痰甚多先令將陳香檫去蒂納明雄黃五錢水飛研

炭火煨勿令烟洩存性共研細空心開水下臥片時以箸探吐痰涎再服再吐能吐出膠痰更好吐半日飲粥湯吐止病愈後調補元氣以杜復發

李 思前症夜發用何首烏散後以勞力鼻衄寒止熱甚治宜和

陰透邪烏梅肉二錢白芍三錢知母酒炒鼈甲炙三錢生首烏四錢生地

黃二錢牛膝酒蒸數服而止此酸味可以透邪

秦 陰瘧誤藥寒熱纏綿無汗而浮腹腫眼色如金肉黃便瀉脈左沈緩右虛濡水溼漬裏溢膚勢成痞脹用分消法大腹皮茵

蘇製半夏生薏仁茯苓各二錢 蘇梗陳皮穀芽各一錢 枳壳砂仁各八分 厚樸五分 薑三錢 車前子五分 瀉爽汗出諸症俱退去蘇梗枳樸加雞內金錢三 於水錢一 做利水實脾法得愈

類證治裁 卷之四 陰素

蘇製半夏生薏仁茯苓各二錢 蘇梗陳皮穀芽各一錢 枳壳砂仁各八分 厚樸五分 薑三錢 車前子五分 瀉爽汗出諸症俱退去蘇梗枳樸加雞內金錢三 於水錢一 做利水實脾法得愈

霍亂論治

霍亂多發於夏秋之交。其症煩滿腹痛。上吐下利。頭痛身熱。揮霍撩亂。甚則轉筋入腹。四肢逆冷。良由起居冷熱不調。飲食生冷失節。清濁相干。水穀不化。邪在上焦則吐。在下焦則利。在中焦則吐利交作。謂之溼霍亂。若胸腹絞痛。欲吐不吐。欲瀉不瀉。煩燥悶亂。俗名攪腸痧。即為乾霍亂也。故經曰。清氣在陰。濁氣在陽。營氣順行。衛氣逆行。清濁相干。亂於腸胃。則為霍亂。又曰。厥氣上逆。則為霍亂。古今論治不一。大約因溼土為風木所克。又為炎暑蒸鬱。故嘔吐者。暑熱之變。泄瀉者。溼土之變。轉筋者。風木之變。其間更多飲食停滯。氣不升降而成。經曰。太陰所至。為中滿。霍亂吐下。土鬱之發。民病嘔吐。霍亂注下。此言受溼霍亂。

類證治裁 卷之四 霍亂

亂又曰。歲土不及。風乃大行。民病霍亂。此言風木克土。為霍亂。亂又曰。熱至則身熱。霍亂吐下。此言受熱霍亂。論治霍亂者。劉河間主火熱。孫真人主食積。丹溪以為外感。內積。陽不升。陰不降。張子和主風溼。陽三氣合。而為邪。張景岳主寒邪傷臟。李士材兼主溼熱。風暑虛實。分別治。羅謙甫專主氣不和。用地漿治。古復庵隨病之緣。感人之虛實。而大旨重痰。故用蘇合香丸。通病。次用藿香正氣散。吞來。初起陰陽攪亂。先服燒鹽湯。以吐中。即寓發散復丹。以控痰涎。若脹痛嘔瀉。察其邪甚於上。宜平胃散。神香散。通用。回生散。若脹痛嘔瀉。察其邪甚於上。宜平胃散。神香散。於下。宜五苓散。無脹痛。但嘔瀉者。二陳湯。各丁香。暑月。感涼霍亂。吐利。藿香半夏。食後感寒。腹痛吐利。藿香正氣散。傷生。冷腹痛吐利。六和。傷暑身熱。煩渴吐利。黃連香茹飲。暑溼相搏。煩渴滿悶。香散。傷溼。肢重。骨節煩痛。二水。二茶。厚樸。陳若吐利。轉筋。為風木刑脾。平胃散。加木瓜。轉筋。腹痛。木瓜。建食。滯。腹痛。加神。藿散。藿散。七。情。鬱。

結七氣湯加烏藥吐利不止元氣耗散或口渴喜冷或惡寒肢厥或發熱煩燥欲去衣被此並非熱乃陰盛格陽不可誤用寒涼宜

中湯甚則附子理中湯四逆湯加食鹽少許並冷服暴瀉如水汗冷脈微急用藥水散冷服

利夏月泄瀉或嘔吐生薑汁調冒暑腹痛嘔瀉轉筋鹽各半兩同炒煎湯吐利頭痛身熱而渴五苓散吐利口乾煩渴引飲冬湯吐

利虛煩不眠參胡三異鄉初到不伏水土吐利加減正氣散乾霍亂上不得吐下不得瀉胸腹攪痛乃土鬱不能發泄或宿食與

寒氣交搏而成蓋邪淺易得吐利邪深則陰陽格拒氣道不通不速治多致暴死急於委中穴刺出血先用鹽湯探吐或熱童

飲三宜提其氣但清氣得升則濁氣可降而出治宜溫中破氣散滯之劑內用排氣散加油或神香散七氣湯外以吳茱萸青鹽各兩許如小便

不通冬紫二便不通湯厚樸或已得吐瀉症勢畧定宜二陳湯凡霍亂初定不可急與粥湯恐邪滯未盡復聚且胃氣逆不能和

降也千金方曰陽明屬胃大腸以養宗筋吐瀉津液暴亡宗筋失養筋轉

輕者兩脚轉筋而已重者遍體轉筋入腹手足逆冷危甚風燭矣倉猝間急以鹽填臍中炮艾不計壯數雖已死胸有煖氣者

立醒急用木黃散木瓜食鹽吳茱萸各五錢同炒再入腹亦效

霍亂脈候

類證治裁

卷之四

霍亂

霍亂

脈伏或微瀉者霍亂通脈代者霍亂代而亂者亦霍亂整氣口脈滑乃腸間有宿食雖吐當更以鹽湯探吐吐盡川和中藥脈浮洪可救微遲不語氣少難治得脈微瀉或代散或伏或結促不可便斷為死脈亂故也傳轉筋入腹四肢逆冷氣欲絕脈洪大可治脈微而舌卷囊縮不治目乾霍亂吐瀉不得胸腹脹硬而唇青黑手足冷過腕脈六脈伏絕氣喘急舌短囊縮者死春

附方

霍香散 霍香 蒼朮 陳 樸 苓 夏

回生散 霍香 廣皮各五錢

平胃散 木 樸 陳 草

類證治裁

卷之四

霍亂

霍亂

神香散 丁香 白芷

和胃飲 薑 樸 陳 草

五苓散 見一卷溫

胃苓湯 見一卷中風

二陳湯 陳 夏 苓 草

丁香散 丁香五分 藿香 枇杷葉各二錢 薑一片

藿香正氣散 見一卷中風

六和湯 見一卷暑

黃連香薷飲 見一卷中風

五物香薷飲 見一卷中風

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑傷

暑濕傷筋轉筋腹痛食滯情鬱陰盛厥冷脈微池瀝

二香散 見一卷中風

除溼湯 見一卷中風

木瓜湯 木瓜二錢 薑五片 茴香六分 茱萸錢半 甘草二分

木瓜建中湯 桂枝 芍各錢半 草一錢 饴糖二匙 薑

香砂枳水丸 木香 砂仁 枳殼 白朮

七氣湯 見二卷芍藥

理中湯 見一卷中風

四逆湯 見一卷暑

漿水散 見二卷暑

天水散 見一卷溫

類證治裁 卷之四 霍亂

麥門冬湯 麥冬二錢 陳夏 木 芍各一錢 小麥半

參胡三白湯 人參五分 苓 木 歸 芍 陳 麥 柴

排氣飲 見三卷積聚 滑石 香薷各二兩 木瓜一枚 每

冬葵子湯 冬葵子 枳殼 厚樸 枳實 枳實 枳實 枳實

厚樸湯 厚樸 枳殼 枳實 枳實 枳實 枳實

藿香安胃散 藿香 枳殼 枳實 枳實 枳實 枳實

霍亂

胡氏秋間吐瀉欲死診脈知為積寒感暑而發用藿香砂仁半夏
焦神麴茯苓小茴香陳皮炙草煨薑煎服一劑愈。此症多由
溫涼不調生冷失節以致陰陽乖格清濁相干夏秋間為多也
門人某於道光辛巳暑夜吐瀉是年時癘大行凡吐瀉霍亂見腳
麻轉筋囊縮者立斃城鄉日以數千計大率口鼻吸入穢邪頭
暈胸悶心腹疼痛傾吐注瀉腸脫肢冷目陷筋掣身溫汗油頃
刻昏厥矣沿門闔境病勢一轍用六和湯去扁豆白朮杏仁加
薄荷梗木香煨薑半日服二劑遂定後加意調攝得安

類證治裁 卷之四 霍亂

王 腹痛吐瀉煩躁不安腿足筋掣症由長夏服農水田烈日中
多受溼陽脾陽不司運化吐瀉驟作煩渴無寐又下多傷陰筋
失榮養故拘急而抽搐也若厥逆躁擾者死診其脈虛而促用
生脈散加霍梗茯苓砂仁陳皮木瓜當歸白芍數服而平

王 暑夜停食腹痛霍亂用大和中飲乾薑改煨薑一服止

李 暑月霍亂瀉利稀水嘔出宿腐右脈微小左更模糊不但脾
失轉輸清濁相干且察其神氣索然理防痙厥急須主以溫中

佐以分利參六和四苓合方半夏砂仁茯苓猪苓藿梗潞參炙
草煨薑穀芽一服吐瀉止再服小便利隨去猪苓加白朮用鍋

巴湯煎二服霍然以起後誤以冷飲卒致不救

泄瀉論治

泄瀉者胃中水穀不分併入大腸。多因脾溼不運。內經所謂溼多成五泄也。一曰飧泄。完穀不化。脉弦腸鳴。溼兼風也。平胃散。加羌夏生。煨泄。二曰溇泄。腸垢汚積。脉數溺瀉。溼兼熱也。清六丸。大胃。芥湯。加黃連。經云。三曰鷄泄。大便澄清如鴨屎。脉遲瀉白。溼兼寒也。治中湯。附子。理中湯。加肉豆蔻。經云。四曰濡泄。身重腸鳴。所下多水。脉緩腹不痛。溼自甚也。四苓散。加蒼朮。胃芥湯。加消泄。洞下不禁。脉微氣脫。溼兼虛也。四柱。六桂。飲或四君湯。加升難經所云五泄。一曰胃泄。飲食不化。即風乘溼也。胃氣。二曰脾泄。嘔逆腹脹。即暑乘溼也。香薷湯。參桂。芥。三曰大腸泄。腸鳴切痛。

類證治裁

卷之四

即燥乘溼也。五苓散。四曰小腸泄。便膿血。小腹痛。即火乘溼也。承氣治之。再以黃連解毒湯。加歸芍。五曰大瘕泄。暴急後重。數至圊而不能便。莖中痛。即寒溼變為熱泄也。八正散。加木香。檳榔。此外有痰泄。痰泄。脉積溼成疾。留於肺中。故大腸不固。二陳湯。加滑石。黃芩。神湯。溫服。探吐。有食泄。食泄。脉腹痛。則泄泄後痛減。治中湯。加香砂。痰涎。泄自愈。有食泄。弦緊。腹痛。則泄泄後痛減。枳木。查肉。陳皮。穀芽。傷酒泄。嗜酒傷溼。便青綠色。葛花解。有暑泄。暑泄。自汗面垢。暴瀉如水。藜藜湯。桂。伏暑。久瀉。玉龍。有盛暑傷其外。陰冷傷其中。為內外交迫。連理。有腎泄。即五更泄。一名晨泄。由命火衰。腎虛不攝。宜補骨脂。五味子。山萸肉。桂。有脾泄。由二經並虛。朝泄暮已。久而神憊肉削。四神。有飯後即便。亦由脾腎交虛。真火不能腐熟。

水穀故食下即泄。二神。有滑泄久而不止。固腸。由氣虛下陷者。補湯。或大便滑泄。小便精出者。萬全。若老人諸泄。不宜多用滲洩。分利。以人生五十後。升氣少。降氣多。滲利太過。是降而益降。未免重竭其陽。瀉多則亡陰。謂宜升提陽氣。如升柴。獨防。佐。士材。治泄九法。淡滲。升提。清涼。疏利。甘緩。酸收。燥脾。溫腎。固瀉。治泄者。當權其輕重。緩急。而用之。

凡泄皆兼溼。初宜分理中焦。滲利下焦。久則升舉。必脫滑不禁。然後以瀉藥固之。凡泄水腹不痛者。溼也。宜燥滲。完穀不化者。氣虛也。宜溫補。腹痛腸鳴。水泄。一陣痛。一陣者。火也。宜清利。時瀉時止。痰也。宜豁之。瀉後痛減。食積也。宜消之。脾瀉久宜瀉。下陷宜升提。

類證治裁

卷之四

泄瀉

論腎泄
腎中真陽虛而泄瀉者。每於五更時。或天將明。即洞瀉數次。此由丹田不煖。所以昆閏不固。或先腸鳴。或臍下痛。或經月不止。或暫愈。復作。此為腎泄。蓋腎為胃關。二便開閉。皆腎臟所主。今腎陽衰。則陰寒盛。故於五更後。陽氣未復。即洞泄難忍。古方治腎泄。用附子。散。若欲陽生於陰。腎氣充固。宜入味丸。去丹皮。加補骨脂。菟子。散。若欲陽生於陰。腎氣充固。宜入味丸。去丹皮。加補骨脂。菟子。散。瀉與痢不同。及先後傳變。瀉由水穀不分。病在中焦。痢以脂血傷。敗病在下焦。在中焦者。分利脾胃之溼。在下焦者。調理肝腎之傷。若水瀉久。則傳變而痢。膿

血是脾傳腎謂之賊邪。故難愈。若先痢後瀉。是腎傳脾。謂之微邪。故易瘳。

泄瀉脈候

胃脈虛則泄。脈滑按之虛必下利。腎脈微小則洞泄。肺脈微甚則泄。泄瀉脈洪大者逆泄。而脫血脈實者難治。泄瀉脈緩時小結者。生浮大數者死。瀉脈多沈。沈遲寒促。沈數火熱。沈虛滑脫。暑溼緩弱多在夏月。

附方

平胃散 見一卷中風
升陽除溼湯 見一卷溼

類證治裁

卷之四

泄瀉

三

清六九 滑石 甘草 紅麴

大分清飲 茯苓 猪苓 澤瀉 木通 山梔 枳壳

胃苓湯 見一卷中風

治中湯 見三卷飲食

附子理中湯 見一卷中風

四苓散 見一卷中風

四柱六柱飲 參 附 苓 木 各名四柱飲 加肉果 訶

四君子湯 見一卷中風

胃風湯 參 朮 苓 歸 芎 肉桂 粟米

香薷飲 見一卷中風

桂苓甘露飲 見一卷暑

大承氣湯 見一卷温

黃連解毒湯 見一卷温

芍藥藥皮湯 芍 藥 連 歸

八正散 見一卷火

天水散 見一卷温

二陳湯 見一卷中風

吳茱萸湯 見三卷嘔吐

葛花解酲湯 見一卷溼

香薷飲 合四苓散

類證治裁

卷之四

泄瀉

三

玉龍丸 硫黃 硝石 滑石 明礬

連理湯 見一卷暑

四神二神丸 見三卷飲食

固腸丸 龍骨 附子 丁香 訶子 良薑 蔻仁 砂仁

補中益氣湯 見一卷中風

萬全丸 赤石脂 炮薑各一兩 胡椒五錢 醋糊丸

椒附丸 川椒 附子各五錢 山萸二兩 螺蛳炙 鹿茸

五味子丸 杜仲 五味 肉蔻 故紙各一兩 吳萸三錢

八味丸 見一卷中風

泄瀉方 白朮 茯苓 陳皮 甘草 澤瀉 砂仁 神

麥芽 寒加木香 煨薑 熱加黃芩 白芍 神

加香薷 扁豆 溼加蒼朮 半夏 猪苓 滑石 食加
 山查 枳實 久加人參 黃耆 升麻 滑泄不禁加肉
 子 薤 訶

久瀉方 白麩炒黃二兩 冬水一兩 故紙五錢 滑加粟
 壳三錢 臨服加白糖

久瀉方 糯米一升 水浸一宿 慢火炒熟 研細 懷山藥炒一
 兩 研細 和勻 加白糖 川椒 調服

類證治裁

卷之四

泄瀉

三

泄瀉

湯氏初秋寒熱吐瀉或以為感暑用香薷飲或以為霍亂用藿香
 正氣散其家兩置之診其脈濡而弱煩熱無汗自利嘔湯子謂
 溼甚則濡瀉今溼鬱生熱熱蒸更為溼故煩而嘔瀉也宜猪苓
 湯去阿膠主之猪苓二錢 茯苓三錢 澤瀉八分 滑石六分 加半夏半錢 薄荷
 梗八分 薏仁煨薑各三錢 燈心六分 一服嘔止泄稀去滑石煨薑半夏
 再加麥冬山梔車前二劑而安

湯氏冒暑重感新涼寒熱頭暈口乾舌燥嘔瀉不已頭汗劑頸而
 還醫用消導轉益煩渴脈不數而滑大此邪鬱蒸痰先挑薑汁
 止嘔用正氣散加減藿香薄荷以辟惡丹皮梔苓以解熱夏麴

類證治裁

卷之四

泄瀉

三

煨薑以除痰赤茯苓薏仁以利溼花粉麥冬以生津一服汗
 涼脈和舌潤矣因有年體弱明晨怯寒手足微涼此脾陽虛也
 用理中湯炮薑改煨薑加砂仁茯苓炙草一劑嘔瀉止手足和
 但氣微墜背分少寐原方去煨薑加扶神炙耆棗仁白芍升麻
 一服而安

予館新洲 江水泛潮 地最卑溼 長夏晨泄 每陰雨前尤驗 痰多不渴或吐白
 沫清晨左脇氣響必陣瀉稀水此溼多成五泄也胃苓湯加神
 麴 炒半夏 製乾薑 少一則劫陽明之停飲以燥溼 一則閉太陽
 之裏氣以導溼故一啜輒止良由長夏溼淫水穀停滯脾陽少
 運故也嗣後去桂加砂仁小茴二水生用或蒼朮薑麴煎服亦

止

潘 色蒼嗜飲助溼釀熱瀉瀉經年脈寸關實大豈溫補升提所得效細詢平昔吞酸去秋連發腿瘍明係溼邪蘊熱流注經絡所致治者不察當夏令主火仍以四神丸加炮薑烏梅補中湯加吳黃肉果愈服愈劇致頭暈口燥氣墜裏迫溺瀉肛痛皆火性急速徵據必清理溼熱之邪乃為按脈切理仍當戒飲母謂六旬外久瀉延虛也四苓散加薏仁車前子麥冬山梔燈心二服已效加神麴砂仁壳枳椇子以理酒傷而瀉稀加黃芩白芍而脈斂後用參苓白朮散加減而痊

曹 脈左濡右關尺弦大腹鳴則痛墜泄瀉前因佛悒木制脾土

類證治裁 卷之四 泄瀉 三

為中焦痞痛服破氣燥劑再傷中氣每日嘔少腹痛泄下焦陰氣又傷急須甘緩和中佐以溫攝潞參炙草白芍茯苓小茴橘核俱酒益智木香俱餡糖紅棗十數劑痛瀉止

於 五泄無不由溼寓居斥鹵水味鹹濁便瀉三年不止凡運脾利溼溫腎補土及升提疏利固瀉諸法毫不一效今夏診右脈寸微關滑乃溼中伏熱大小腑清瀉不分火性急速水穀傾注無餘脾失輸精肺苦燥渴氣不化液腎不司關所下汚液自覺熱甚或痛泄或不痛亦泄日夕數行口乾溺少時想涼潤略用守補即嫌脹滿可知氣墜全是腑症若清濁分則泄瀉漸已方茯苓猪苓車前山梔神麴薏仁大腹皮烏梅黃連午前服方益

智仁煨補骨脂南燭子訶子茴香茯苓山藥廣皮砂仁半夏麴杜仲首烏蓮子蒸餅為丸晚服至秋漸愈

類證治裁 卷之四 泄瀉 三

痢症論治

痢多發於秋。即內經之腸澼也。症由胃腑溼蒸熱壅致氣血凝結。挾糟粕積滯。進入大小腑。傾刮脂液。化膿血下注。或痢白。痢紅。痢瘀紫。痢五色。腹痛嘔吐。口乾溺澀。裏急後重。氣陷肛墜。因其閉滯不利。故亦名滯下也。俗以白屬寒。赤屬熱。不知白傷氣分。赤傷血分。赤白相間。氣血俱傷。傷氣分則調氣。四七湯。木香化滯湯。傷血分則和血。四物地榆湯。或易老所謂調氣則後重除。和血則便膿愈也。然論致痢之由。其暑溼傷胃者。鬱熱居多。生冷傷脾者。寒滯為甚。入手宜分氣陷則倉廩不藏。陰亡則門戶不閉。由脾傷腎。勢所必然。故鬱熱者清之。本蓮芍藥湯。寒滯者溫之。香砂枳朮丸。溼勝者洩之。四苓散。

類證治裁

卷之四

痢

三

水改宿食者消之。保和積滯者導之。小承氣湯。腹痛者和之。芍藥散。香氣陷下者舉之。補中益氣湯。虛滑者攝之。赤石脂禹餘糧丸。脂液涸者潤之。猪臟湯。久不愈者補而固之。八珍湯。加炮薑肉桂。痢止後調之。阿膠丸。木香肉果烏梅牡蠣。初起外受暑熱。內因停滯。繞臍痛脹。煩渴逆迫。下痢鮮紅。脈洪滑者。宜清火導滯。導氣湯。芍藥湯。去桂。如挾虛感寒。生冷不節。脾失轉輸。因而嘔逆。下痢白膿。脈弦弱者。宜溫理脾胃。兼佐行氣。香砂溫胃飲。蓋因寒傷臟。忌用苦寒下奪也。况所痢膿垢。皆大小腸脂液所化。已非胃腑宿食。不得誤認積滯。肆行攻下。剝削殆盡。但見下利血水。或如屋漏水。即須溫攝。黑豆散。加芥。木茴。香。肉果。如痢純血。鮮紅成塊者。多心脾伏

熱。用黃連白芍丹皮。若未止。地榆。其血紫黯稀淡。乃陽虛不能攝。陰宜溫調。其氣非炮。不治。加木香。痢色黑。有二焦黑者。熱極反兼勝已之化。芍藥湯。光如黑漆者。為瘀血。桃仁承氣湯。純下清血者。為腸胃風襲。枳荆防。五色痢。乃五臟氣化。并傷。昔人以爲腎損。蓋五液不守。精室受傷。治必益火消陰。實脾防水。兼理其氣。眞人養赤。白痢由冷熱不調。連理湯。痢純白。乃臟寒氣滑。與暴注屬熱不同。或如凍膠。如魚腦。由氣分致病。爲臟寒滯下。先用沈香白蔻木香。湯。加白痢初起。裏急後重。爲溼鬱化熱。平胃散。痢稀白。肢冷腹痛。不已。附子理中湯。痢清穀裏寒外熱。汗出而厥。通脈四逆湯。先白痢後下膿血者。戊己先白痢後下鮮血者。阿膠四逆湯。先痢膿血後變青黑雜色。

類證治裁

卷之四

痢

宗

腹痛倍常者。先膿血後變白沫白膿者。補中益氣湯。加下痢發熱者。疏其邪。倉廩散。腹痛身微熱者。和其營。小建一種陰虛下血。發熱煩渴。至夜轉劇者。急宜救液存陰。阿膠丸。阿膠梅連。下痢漸減。津液枯燥。肛門滯滯者。猪臟。痢後便秘。後重。由氣虛下陷者。升其陽。則陰自降。補中益氣湯。膿血稠粘。挾熱後重。煩渴脈洪者。白頭溼熱。下利後重者。升陽除風。風邪傷衛。後重不除者。三奇。虛滑而後重者。痢後不減。眞人養赤。虛滑而腑陽向衰者。桃花湯。裏急仍不得便。屬氣滯。蘇子降氣湯。裏急頻見。汚衣者。爲氣脫。補中益氣湯。去洞瀉不止。眞人養赤。下利大孔。痛火因瀉。陷升其氣。則痛自定。補中益氣湯。禁口。乃熱氣自下。衝上而犯胃口。腸中傳導。皆逆阻似閉。宜人參

萬蒲竹茹炭丹溪用人參石蓮黃連濃
茶麥冬梗米煎加薑汁沖服。但得下咽便開。如胃虛
嘔逆。治中湯。肝邪乘脾嘔逆。芍藥黃連加丁香白
食非大補胃氣兼行津液不能開。香砂四君湯加扁豆薏
氣一醒思食宜。獨參湯少。加橘皮。

痲因飲食失節者。香連丸加。因中氣下陷者。補中益
滑者。大斷。因兜瀆太早。積滯未清者。香連丸
痲因飲食失節者。香連丸加。因中氣下陷者。補中益

痲因飲食失節者。香連丸加。因中氣下陷者。補中益
滑者。大斷。因兜瀆太早。積滯未清者。香連丸

類證治裁

卷之四

痲

人參敗毒。蠱毒痲血如雞冠。蠱毒痲形極細從穀道
散加減。以雄黃銳散納下。瘡後痲痲後瘡。瘡痲齊發。補中
湯加。洞瀉不止厥逆。胎前赤白痲。胎前痲產後
未止最危。肝湯加減。伏龍
協熱由上受溫暑溼熱之邪循募原下陷腸胃或血水或結脈皆
下利。溼熱傳化宜用分消清熱利溼。如厚樸黃芩茯苓滑石猪苓
凡治痲與治瀉異水瀉由清濁不分。可利小便。痲則邪毒膠滯津
液枯澀。大忌分利。且痲久必傷腎。腎陰虧宜滋液。黑地黃丸六
陽虛宜益火。如四神丸及沈。以腎為胃關。開竅於二陰也。故痲久
先溫脾。不應即溫腎。丹溪以先瀉後痲為脾傳腎為賊。難治。先

痲後瀉為胃傳脾為微邪。易愈。故治痲以脾腎為要。
噤口痲由熱氣自下上衝。而犯胃口。腸中傳導皆逆阻。似閉。宜清
解熱毒。如黃連酒炒黃芩白芍石蓮肉廣皮銀花查肉木香
痲症初起有兼外感者。身必發熱。表裏俱病。其症最重。宜表裏並
治。

痲疾初起必兼溼熱宿滯。宜用治痲散。葛根苦參松蘿茶葉麥芽
四錢加黃連尤效。此方出醫學心悟。不論赤芍陳皮研末。每服
胃氣上行也。茶葉苦參清溼熱也。麥芽山查消宿食也。赤芍陳皮
行血調。腹痛裏虛者。用橘餅半筒。紅棗十枚。
醫通曰。痲後風者。因痲後不善調攝。或不行。或房勞。或受風寒。或
感溼氣。致兩脚痠軟腫痛。宜大防。又痲後變成痛風。皆調攝失宜

類證治裁

卷之四

痲

所致。宜補中益氣湯加。羌活續斷虎骨。
病機。沙篆曰。痲起夏秋。溼熱鬱蒸。因乎夫。生冷停滯。由乎人。當炎
暑令行。不能保攝脾胃。多食瓜果肥甘。土氣受傷。無以制溼。蒸
熱壅氣。機阻逆。不得宜通。因而腸胃反窒。裏急後重。小水赤澀。宜
苦寒之藥。燥溼殺熱。佐以辛溫。便能開鬱。運氣。故行血則便膿自
愈。調氣則後重自除。然虛寒實熱。淺深新久之不同。難一例治。
沈則仲曰。痲症初起。形氣尙強。脹實壅痛者。可速去積。積去痲止。
此通因通用。症隨痲減之法。若煩熱喜冷。脈實腹滿。或下純紅鮮
血者。此溼熱內盛。法宜清利。若經久正傷。有傷陰傷陽兩途。傷陰
者。精血脂液。悉從痲去。多煩躁熱渴之候。宜以清潤養其陰。傷陽

者脾腎元陽。悉從痢散。多滑脫厥逆之候。宜行溫補。回其陽。總之暴病多實。久病多虛。滑脫者多寒。瀉滯者多熱。參之脈症。合之新久。百無一失矣。

附倪涵初痢疾三方

初起煎方 黃連去蘆黃芩白芍查肉各一錢枳殼去穢厚樸薑汁炒檳榔青皮去穢當歸地榆甘草各五分紅花酒炒木香二分桃仁研

如法炮製。煎一碗。空心服。此方治紅白痢。裏急後重。身熱腹痛者。皆宜。如痢純白。紅四分。木香三分。如滯瀉甚者。加酒炒大服一二劑。仍除之。若服過一劑。滯瀉已去。不必再服。黃只用一錢。右方用之。三五日神效。旬日亦效。半月後則當加減。

類證治裁

卷之四

痢

全

加減煎方 黃連酒炒六分 黃芩酒炒六分 白芍酒炒六分 查肉生用四分 橘紅青皮檳榔各四分 炙草三分 當歸五分 地榆四分 桃仁研粉 六分

紅花三分 木香二分 如法製服。延至月餘。脾胃虛弱而滑泄。當補理。補理煎方 黃連酒炒五分 黃芩酒炒六分 白芍酒炒四分 橘紅六分 當歸五分 人參五分 鹽炒五分 炙草五分 如法製服。以上三方。如婦人有胎。去桃仁。紅花。檳榔。服。

一忌溫補。早痢起於溼熱蘊積。膠滯腸胃。宜清熱邪。導滯氣。行瘀血。其病即去。若用參朮等溫補藥。則熱愈盛。氣愈滯。血亦凝。邪何由去。

一忌大下。痢因邪熱膠滯。用疏通則愈。若用大承氣下之。膠滯未

去。徒傷胃氣。損元氣耳。正氣傷損。邪氣不可除。壯者猶可。弱者危矣。

一忌發汗。痢發寒熱。頭目痛眩。由內毒薰蒸。自內達外。非表邪也。若發汗。則風劑燥熱。愈助熱邪。正虛於外。邪熾於內。鮮不斃矣。

一忌分利。痢因熱邪膠滯。津液枯澀。若用五苓等分利。其水則津液愈枯。滯滯愈甚。纏綿不止。第清熱導滯。則痢自愈。而小便自清。安用分利為法。利小便為治水瀉之良。

痢症脈候

下痢沈小微細者吉。洪大滑數者死。沈弦者重。脈大者為未止。微弱者為欲愈。雖發熱不死。下利脈數。有微熱汗出者。即愈。下利

類證治裁

卷之四

痢

全

發熱而渴。脈弱者自愈。醫通曰。痢白沫。初起脈小。滑能食者。易治。洪大急疾。四肢厥冷者。難治。久痢脈微弱。小細者。愈數實。或虛

大無根者危。下痢膿血。初起脈小滑。或弦軟。身不熱者。易治。數實滑大。而身熱者。勢雖甚。猶或可治。若先不熱。五六日後。反發熱

脈大者。必死。久則脈宜。扎遲虛。不宜數盛。滑實。身熱不止。口噤不食。或久痢脈結代。反驟能食。為除中。皆死。下痢脈六七日後。最忌

強盛。凡下痢脈浮。身熱。作風治。脈沈。身重。作溼治。下痢為腸胃

病。雖頻逆。而能食。則吉。若噤口痢。初起。脈數實。可治。久痢。反不能食。脈見有餘者。死。惟小弱流利者。當作胃虛治之。

附方

類證治裁 卷之四 痢

四七湯 見二卷欬嗽

木香化滯湯 香 柴 陳 夏 歸 草 草 蔻 香 附

四物地榆湯 地 芍 歸 芎 加地榆 或加阿膠

理陰煎 見二卷欬嗽

芩連芍藥湯 白芍二錢 黃芩 黃連 木香 枳壳各錢

香砂枳朮丸 香 砂 枳 朮

香砂異功散 木香 砂仁 參 朮 苓 草 陳

四苓散 苓 朮 澤 猪苓

保和丸 見二卷痰飲

小承氣湯 見一卷温

類證治裁 卷之四 痢

熟大黃丸 大黃一味

芍藥湯 歸 芍 芩 連 桂 草 檳 木香 大黃

補中益氣湯 見一卷中風

赤石脂禹餘糧丸 赤石脂 禹餘糧

猪臟湯 取不落水猪大腸煮汁吹去油而飲之 以臟補臟

阿膠丸 阿膠 黃連各一兩 茯苓二兩

八珍湯 見一卷中風

參苓白朮散 見三卷脾胃

導氣湯 芩 連 歸 芍 檳 枳 木香 大黃

香砂温胃飲 温胃飲見一卷中風 此加木香 砂仁

類證治裁 卷之四 痢

黑豆飲 黑豆一兩半 罌粟壳炙八錢 地榆 炙草各

地榆丸 地榆 當歸 阿膠 黃連 訶子肉 木香 烏

理中湯 參 朮 薑 草

芩芍湯 芩 芍 草

香連丸 黃連吳萸拌炒 木香 醋糊丸

桃仁承氣湯 見一卷疫

胃風湯 見本卷泄瀉

真人養藏湯 歸 芍 朮 草 參 桂 訶子肉 木香

駐車丸 黃連 阿膠 當歸各一兩 乾薑五錢 醋糊丸

連理湯 見一卷暑

平胃散 朮 檳 陳 草

附子理中湯 見一卷中風

通脈四逆湯 生附子一枚 乾薑一兩 炙草二兩 冷服

戊己丸 黃連 萊菔 白芍

阿膠四物湯 四物湯加阿膠

倉廩湯 參 苓 羌 獨 柴 枳 芎 草 前胡 桂

小建中湯 見二卷欬嗽

阿膠丸 阿膠 黃連各二兩 當歸 乾薑各一兩 木香

阿膠梅連丸 阿膠 赤石脂 龍骨各一兩 厚樸五錢 烏

黃連阿膠丸 即阿膠丸

熱痢	白頭翁湯	白頭翁 秦皮 黃連 黃蘗
後痢	升陽除溼湯	見一卷溼
重痢	三奇散	黃耆 防風 枳殼
風痢	桃花湯	赤石脂 乾薑 粳米
邪痢	蘇子降氣湯	見二卷失音
滑痢	治中湯	見三卷飲食
急痢	吳茱萸湯	見三卷嘔吐
虛痢	訶黎勒丸	檉白皮二兩 訶子肉五錢 母丁香三十枚 陳米湯下三錢
嘔痢	大斷下丸	良薑 炮薑 細辛各一兩半 龍骨 枯礬 附子各一兩 石榴皮 五錢
息痢	石榴皮	
久痢	類證治裁	卷之四
痢	蒼朮防風湯	蒼朮 防風 麻黃 薑
痢	訶子肉湯	訶子炮 厚樸 炮薑 草薹 陳皮 良薑 茯苓 神麴 麥芽 炙草
痢	薤苳湯	見本卷泄瀉
痢	除溼湯	夏 樸 蒼朮各錢二分 藿香 陳 芥各七分 木香 肉桂 甘草各五分 薑三片 棗二枚
痢	蒼朮地榆湯	蒼朮 地榆
痢	氣痢丸	訶子肉 陳皮 厚樸各五錢 蜜丸 米飲下
痢	人參敗毒散	見一卷傷風
痢	烏梅丸	見三卷嘔吐
痢	雄黃鏡散	雄黃 苦參 青葙子 黃連 桃仁 研細搗 生艾汁為丸如棗核大綿裏納下部
痢	燕莢丸	燕莢炒 黃連各二兩 蚺蛇膽五錢 蜜丸 每服二錢 杏仁湯下

痢	東坡薑茶飲	生薑 陳細茶各三錢
痢	伏龍肝湯	伏龍肝 赤石脂各一兩 生薑 生地各兩半 甘草 艾葉 當歸 肉桂各六錢 防 桂 附
痢	大防風湯	川芎 青 牛膝 杜仲 羌 防 桂 附
痢	治痢散	葛根 苦參 松蘿茶葉 麥芽 陳皮 研服四錢 加黃連九效
痢	黑地黃丸	蒼朮 五味 熟地 乾薑
痢	六味丸	見一卷中風
痢	四神丸	見三卷飲食
痢	類證治裁	卷之四

痢

某 感暑致痢熱渴煩冤裏迫後重紅白稠粘此溼熱蘊結也用

六一散加花粉薏仁薄荷梗枳壳赤芍赤芍丹皮熱退後重亦

減去花粉薄荷丹皮加黃芩白芍俱酒炒煨木香陳皮數服愈

幼子噤口秋痢身熱小腹墜痛初痢稠紅次下血水日夜無度此

熱邪阻脘氣滯下焦迫傷營分初用枳壳枳實仁俱炒黑山梔赤

芍蘇梗木香以導熱而通逆繼用白芍甘草炙茴香炮薑黑查

肉以緩中而溫下後用石蓮路參茯神砂仁薏仁熟地炭山藥

紅棗粳米以扶陽而和陰漸次調理獲痊

包氏春兩連旬感溼成痢脘悶食減其治在脾用平陳湯去甘草

類證治裁 卷之四 痢

加神麴穀芽炒兼米煎湯一服便減再加炮薑砂仁服愈

室弟初秋患痢因熱渴多服梨藕菜服上吐下痢口噤不食奄臥

昏沈脈細欲絕肢厥目眩前藥湯藥難下急用附子理中湯去

參草製川附二錢炮薑二錢製半夏三錢白蔻仁八分煎湯用箸啓齒以

匙挑與之盡劑手足漸溫與粥湯不吐矣前方加陳皮茯苓炙

草穀芽再劑痢漸止嗣用香砂六君湯而安

孫 數年久痢必傷腎陰但知健脾不節腥膩恐脾陽不復腎陰

益虧用繆仲淳脾胃雙補丸人參茯苓山藥山萸免絲餅砂仁

肉蔻補骨脂炮薑南燭子蓮實糊丸一服而效

王 痢久鮮紅裏急肛墜兼患三陰瘡發皆暑溼熱之邪而經

腑但久痢傷腎久瘡傷脾痢瘡合邪足三陰交損勢必支離因

頓依經旨熱淫於內以酸收以苦發用製厚樸酒黃連各五分

梅二錢甘草一錢白芍赤芍陳皮黑荆芥各錢鮮夜交藤錢五分一服

痢瘡俱止

李氏滯下自秋入冬脈緩能食前用升提止瀉兩不效者以症非

氣滑脫陷也今小腹痛輒下稠垢非溫通不愈勿以休息痢混

行補攝治小茴香炒八分乾薑八分煨木香五分廣皮炙草各六分砂仁

一錢地榆酒炒數服止

張氏女冬初胸脘熱痛食後脹痢血脈小數左關尺為甚陰陽兩

傷天癸將至之年得此懼延損怯枳實仁炒錢二分枳壳黃芩白芍

類證治裁 卷之四 痢

俱炒厚樸製五分地榆酒炒八分生地炭錢半諸症漸減去枳實黃芩厚

樸加當歸醋炒香附便製各錢半紅麴一錢血痢亦稀後服六味丸而安

朱 少年血痢由初春迄冬未瘳陰絡久損中間秋涼感瘡經邪

或爽食滯治者不分經絡妄投大黃枳實延胡等通降理瘀元

氣益削脈沈弱少神今冬怯寒食少日夜利血十數行腹不痛

而滑泄治取溫瀘以攝真元潞參茯苓黑甘草炮薑肉蔻牡蠣

醋山藥炒訶子肉一服已減十數服全止

族某初春痛痢後鮮血點滴腹痛後重脈大口燥怯冷動則氣

急六旬以上痢久陰傷及陽大忌發熱做駐車丸去黃連川烏

梅阿膠煨當歸白芍熟地俱炒五味木香煨炙草粳米湯煎三服

痢稀血止去烏梅木香加參耆陳苓蓮薑十數服而平

譚氏六旬外下痢旬餘猶然腹痛後重溺瀉脈洪目赤顏紅寤煩口乾忽而香連丸忽而粟壳湯忽而大黃忽而肉桂用藥前後不倫失於疏理先以葶薺粉山梔石斛丹皮赤苓麥冬白芍木香汁枳壳地榆燈心一啜諸症減納粥糜矣轉方用煨木香陳皮白芍當歸茯苓地榆車前子甘草梢痢大減惟腹痛不足一處則虛氣滯也用葱薑末炒麥麩絹包熱熨痛已服調理藥而安



類證治裁

卷之四

痢

全

類證治裁卷之四終

類證治裁卷之五

丹陽林珮琴義桐甫者

男



頭風 雷頭風附

風邪上干新感為頭痛。深久則為頭風。其症頭巔重暈或頭皮麻痺或耳鳴目眩肩稜緊掣由素有痰火復因當風取涼邪從風府入腦鬱而為熱為痛甚則目病昏眩。頭風不治。當分偏正左右寒熱氣血治之。痛在正頂多太陽經風鬱。宜川芎羌活。蔓荆蘇葉等散之。從額至巔絡腦。痛在左右多少陽經火鬱。宜甘菊花丹皮山發之。少陽經後也。及耳痛偏左為風虛。宜川芎當歸。痛偏右為痰熱。宜蒼朮牛下耳及耳痛偏左為風虛。宜川芎當歸。痛偏右為痰熱。宜蒼朮牛之前後也。防風薄荷。

類證治裁

卷之五

頭風

一

膏。氣虛者因勞。補中益氣湯。血虛者善驚。四物湯。加。熱痛者惡熱。消風。冷痺者畏寒。追風。寒熱久鬱發時悶痛欲寐者多痰。湯加。酒茶荆芥川芎。風兼熱者。茶調散。寒挾溼者。導痰湯。加。痛連齒。薄荷石膏細辛。菊散。寒挾溼者。蒼朮白芷。痛連齒。者。鉤藤散。加。痛掣眉稜者。選奇。鼻流臭涕者。散。擗鼻出涎。腦後。筋掣者。鉤藤荷葉連。氣上攻痛者。全蝎。年久不愈者。烏頭南星。塗太婦女血分受風者。養血祛。其有因膽火上逆為暈痛治宜泄。陽定。用羚羊角生地丹皮。因肝陽乘胃為嘔吐。治宜熄風者。用扶。熱者。甘菊苦丁茶嫩桑葉。因肝陽乘胃為嘔吐。治宜熄風者。用扶。菊炭鉤藤半夏。因肝陰虛內風動治宜滋液者。川復脈湯去參薑。麴荷葉山梔。因肝陰虛內風動治宜滋液者。川復脈湯去參薑。因暑熱上蒙清竅治宜清滲者。用石膏荷梗薄荷。加。雞子黃白芍。痛筋惕治宜鎮攝者。用阿膠牡蠣生地。因內風頭痛淚冷目昏治。

宜潤養者。用杞子首烏茯苓神白頭腦鳴響狀如蟲蛀名天白蟻者。茶子末頭多白屑作癢者。零陵香白芷煎汁雷頭風腫痛起塊。憎寒壯熱腦震如雷鳴者。清震湯解雷湯。雷頭風病在三陽不可。腦風項背怯寒腦戶穴冷者。神聖首風因於新沐汗多惡風者。川九白餘參頭痛門治。

頭風脈候。浮為風緊為寒。浮滑為風痰。洪數為風熱。陽弦為頭痛細而堅為。淫弦而濇為氣虛。芤為血虛。滑為痰厥。頭痛脈急短濇者死。凡診寸脈短者頭痛寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛。

附方

類證治裁

頭風

補中益氣湯 見一卷中風

四物湯 見一卷中風

消風散 見二卷失音

追風散 炮川烏 煨石膏 炒僵蠶 荆 防 芎 草各五錢 天麻 製南星 白附子 羌活 地龍 全蠶 白芷各二錢半 乳香 沒藥各一錢二分 為末每服五分 茶調下

二陳湯 見一卷中風

茶調散 見一卷傷風

菊花散 甘菊花 旋覆花 防風 枳殼 羌活 石膏 蔓荊子 甘草各一錢五分 薑三片 見一卷中風

導痰湯 見一卷中風

鉤藤散 鉤藤 陳夏 防 芎 參 草 麥冬 石膏 甘菊 或加生地 荆芥

選奇湯 防風 羌活各三錢 黃芩一錢 甘草八分 芎 犀散 川芎 硃砂 石膏 片腦 人參 茯苓 炙草 透頂散 細辛 犀角 山梔 杏仁 阿膠 糯米七粒 鼻出涎 冰片 麝香各一分半 研勻用豆許隨病左右搗

全蠶散 全蠶廿一个 地龍六条 土狗三个 五倍子五錢 為末酒調攤貼太陽穴

養血祛風湯 芎 歸 荆 防 羌 辛 地 夏 草 復脈湯 見一卷中風 石膏 旋覆 蔓荊各五分 薑 煎

清震湯 升麻 蒼朮 荷葉各四錢 落蒂子三錢 升麻 川芎 蒼朮各一錢 鮮荷葉水 加薑 再入藥煎七分服 神聖散 葛根半生半炒 麻黃 細辛 藜香 等分為末 薄荷荆芥湯下

類證治裁

卷之五

頭風

川芎丸 川芎四兩 天麻一兩 蜜和每兩作十丸 以

白芷丸 新白芷不拘多少 挫細以蘿蔔汁浸晒乾研蜜丸 子大每一丸 細嚼 荆芥湯下 一名都梁丸

雷頭風

昔寒發熱頭痛腦如雷鳴一夕頂發塊礪甚多延及項後都
成疙瘩俗醫以為外症用數藥罔效診其脈浮大審知為雷頭
風按東垣先生論此症狀類傷寒病在三陽不可通用寒涼重
劑誅伐無過故劉河間立清震湯治之用升麻錢蒼朮米泔浸
炒四錢青荷葉一薄荷三錢如法二服立消。此痰火上升故成結核腫
痛用蒼朮除溼痰薄荷散風火升麻荷葉引入顛頂升發陽氣
自得汗而腫消

類註行表 卷之五 雷頭風

癘風論治 腎臟風 繡毯風 雁來風 蛇皮風 鴉掌風
赤白遊風 紫白癜風 紫雲風 癩疥癩斑附
癘風惡疾也。俗名大麻風。其症皮肉麻頑。身面疙瘩。搔之則癢痛
腐潰。漸至目紅鼻赤。四體攣搐。頭面突腫。蓋中天地間一種風毒
厲氣。淫於腑臟骨髓。注於經絡肢節。久而後發。亦有骨肉傳染而
得者。立齋分別五臟受病。謂眉先落者毒在肺。面發紫泡者毒在
肝。足底痛或穿者毒在腎。遍身如癩者毒在脾。目先損者毒在心。
一皮死麻木二肉死鍼刺三血死潰爛四筋死指脫五骨死鼻柱
不仁至於聲啞目盲皆為難治。內經治法以銳鍼刺其腫上。出惡血。重
洩毒也。其惡血滯在肌表經絡者宜汗宜刺。汗用紫萍散。毒蘊腑
臟非蕩滌不除。如涼隔雙
解之類。毒在外非砭鍼不散。足指縫出血。表裏

毒盛非外。內洩不退。上體患多以神取毒血。從齒縫中出。并
刺臂腕指縫下體患多以散取毒積。從穀道中出。仍鍼腿脛趾
縫。上下相等。用必勝兼取治法。內通腑臟。外達經絡。養營益衛。補
正逐邪。若妄投燥熱。膿水淋漓。肝血益涸。風熱益熾。腎水益傷矣。
初起頭面搔癢。發出紅紫疹塊者。用防風通聖散。加苦參天麻蠶
外用白玉蟾浴湯加羌活浴後白玉蟾按藥按凡遍體腫塊。以生薑蘸其燥
起白屑。繫血不榮。膚白芒地。骨皮四物湯加荊防。搽如隔帛。繫氣不充。表養營
面部麻木。繫氣血不能上榮。加川芎補中益氣湯癢疹赤暈。繫風熱入營。
實者胡麻散。疙瘡破癢。繫風毒傷血。歸飲羌活當歸散或當指節攣拳
虛者祛風丸。疙瘡破癢。繫風毒傷血。歸飲羌活當歸散或當指節攣拳
緊陰火燥筋。加味逍遙散。加鉤鼻赤眉。落屬肺經風熱。散加天麻

而發紫泡屬肝經風毒。梔子清肝湯加鈎藤、筋骨變痛屬肝腎陰虛。六味地口眼喎斜屬風動經厥。用全蠍酒洗鹽焙研。每服白黃湯。附子末各七錢。每服錢半。

寒熱往來。小柴陽虛怯冷。補中益氣湯。久潰爛。參紅玉散。足心穿破。服六味湯。氣血虧敗。丹。通治風癩。胡麻丸。一切毒癩危症。五龍丸。千年藥。東華玉。若夫癩瘍類症。則有兩廉如癩。蝨蝕成瘡。者為腎臟風。用四生散以去風邪。腎囊溼癢者為繡毬風。蛇床子。香葱皮頑肌燥。至秋癢發者為雁來風。宜羌活白芷散。膚裂癢痛。形似蛇紋者為蛇皮風。初用火龍散。繼服補劑。外用雄黃硫磺。掌心頑厚。白皮鱗屑者為驚掌風。煎湯熏洗。再用桐油調。鴉糞搽之。臂腿痞癩。遊走不定者為赤遊風。赤用加味逍遙散。其肌肉斑駁。類證治裁 卷之五 癩風

紫為白癩風。通用川附硫磺研末。薑汁調勻。茄蒂身發紫斑。延量白為白癩風。擦之。或用水銀輕粉調薑汁擦之。

如霞者為紫雲風。何首烏散。加稀莩蛇。牛皮頑癬。用火酒浸土。川椒羌活。斑蝥朝腦紅。研末。新久疥癩。一掃。夏月汗斑。用蜜陀。明礬以穿山甲刮破筆搽之。

糖醋調黃雀斑。酒刺白屑風癢。散搽。此因癩風類及之。他如脫跟。瓜蒂擦之。雀斑。雞爪等風。不過多立名色。前明沈氏。前明沈。魚鱗。戴蚝。蛇蚤。雞爪等風。不過多立名色。前明沈氏。前明沈。解圍元。蘇四卷。以祛風。瀉火。殺蟲。排毒。為先。補血。壯元。導滯。堅筋。皆論風癩治法。

相濟。忌用。熏刺。鋒鏃。粉戒。房室。禁炙。博鹽。醬。大楓子。及一切辛。輩動風。食品。方可。延生。否則。愈而。再發。必死。昔孫。真。人。治。此。症。百。餘。人。得。免。於。死。者。二。朱。丹。溪。治。五。人。得。免。者。僅。一。婦。人。然。則。癩。豈。易。治。哉。

癩風脈候
 癩風陽脈浮弦。前陰脈實大。後兩寸浮而緊。或浮而洪。浮緩者少。治洪大而數。或沈實者。難治。脈若沈而病反在上。浮而病反在下。皆不治。

附方

紫萍散 紫背浮萍一味。酒洗。研末。每服三錢。以黑豆淋酒。涼膈散 見一卷中風。
 雙解散 見一卷癩。
 樺皮散 樺皮四兩。炒灰。荆芥穗二兩。炙草五錢。枳壳。醉仙散 四兩。杏仁二兩。每服四五錢。白。花。粉。各。五。錢。為。末。每。用。一。兩。五。錢。煎。湯。洗。之。

入輕粉二錢。拌勻。每服一錢。茶清調。晨午各一服。服至五。七日。齒。中。出。臭。與。人。如。醉。下。盡。惡。物。病。根。乃。去。一。方。

下體下 再造散 未半生半。炒六錢。為末。酒下五錢。白牽牛取頭。必勝散 檳榔。角刺。各五錢。甘草生熟。各半。二錢。輕粉二。錢。為末。分七服。糖五匙。

防風通聖散 荆。防。歸。芍。芎。藁。木。蒼。梔。桔。高。滑。石。連。翹。麻。黃。薄。荷。大。黃。芒。硝。石。

八珍湯 見一卷中風。
 聖愈湯 見二卷癩癬。
 白玉膏 浴湯 參。耳。子。馬。鞭。草。防。風。荆。芥。紫。蘇。苦。銀。花。白。芷。遍。地。香。澤。蘭。

爛瘡	虛陽	熱寒	虛腎	火肝	類證治裁	類證治裁	燥血	熱血	毒風	熱風	熱風	熱風	氣陷	虛血	燥血	治外
紅玉散	十全大補湯	小柴胡湯	六味丸	梔子清肝湯	消風散	換肌散	羌活當歸散	當歸飲	加味道遙散	祛風丸	羌活當歸散	當歸飲	補中益氣湯	胡麻散	四物湯	白玉蟾擦藥
文蛤 白芷 當歸 大黃 白芨 草烏各一兩	見一卷中風	見一卷溫	見一卷中風	柴胡 芍藥 各七分 甘草五分 水煎	見二卷失音	白花蛇 黑花蛇 酒浸各三兩 地龍 當歸 細辛 白芷 天麻 蔓荊 威靈仙 不灰木 胡麻 草烏 紫參 沙參 木賊草 白茯苓 胡麻 草烏 赤芍 九節菖蒲 定風草 首烏	黃連 芎藭 羌活 防風 升麻 各一錢 水煎	首烏 各一錢 水煎	見一卷火	枳實 防風 芍藥 杞子 地骨皮 生地 熟地 蜜丸	歸身 芎藭 羌活 防風 升麻 各一錢 水煎	首烏 各一錢 水煎	見一卷中風	胡麻 兩半 苦參 荆芥 首烏 各八錢 威靈仙 蔓荊子 白蒺藜 炒	芍藥 歸身 芎藭 羌活 防風 升麻 各一錢 水煎	白芷 草烏 南星 杏仁 半夏 大楓子 蛇床子 等分 爲末 薑片擦之

風驅	痛癢	溼除	逐逐	毒追	類證治裁	類證治裁	治通	治通	虛風	心足	敷外
千年藥	赤龍丸	花龍丸	白龍丸	烏龍丸	黃龍丸	香三兩	胡麻丸	二錢以酒下	固命丹	綿紙	坎離膏
蒼術 獨活 羌活 烏藥 桔梗 草烏 柴胡 黃芩	麝香 二錢 乳香 沒藥 各一兩 木香 五錢 川烏 草烏 地龍 南星 酒糊	防己 黃連 龜殼 酥炙 酒糊 當歸 各七錢 五錢 地龍	乳香 沒藥 川烏 草烏 地龍 南星 酒糊	肥皂角 刮去皮 筋子 水浸 槌爛 絞去渣 取汁 入瓦器 用黑牽牛末 共搗爲丸 桐子大 每服五十九	筒上 硫黃 打碎 鎔化 傾入 醋內 取淨 硫一 筋入 竹筒內 以蠟 封口 浸 黃缸 中 一 年 取 起 放 長 流 水 中 四 日 取出 焙 乾 入 酒 煮 七 沸 傾 入 冷 水 內 但 取 淨 松 香 米 泔 浸 刮 一 筋 檀 香 白 膠 香 川 烏 炮 炙 每 服 五 十 九	茅香 米泔 浸 刮 一 筋 檀 香 白 膠 香 川 烏 炮 炙 每 服 五 十 九	胡麻 一 筋 苦 參 皮 五 筋 酒 浸 荆 芥 穗 四 筋 研 末 每 服 百 丸 硃 砂 爲 衣	人參 熟地 各 四 兩 杞子 麥冬 各 六 兩 扶 苓 當 歸 各 十 六 兩 仙 靈 脾 取 葉 一 筋 去 毛 酒 拌 蒸 爲 末 蜜 丸 每 服	紫好 研細 先以 茶葉 川椒 煎湯 洗淨 再 搽 藥 外 用	楓子 一兩 白蠟 五錢 研極細 加熬熱 香油 調入 以甘草 湯洗 搽 赤石脂 東丹 車前子 各等分	血竭 三錢 冰片 一錢 輕粉 水銀 各 二 錢 大 坎離膏 楓子 一兩 白蠟 五錢 研極細 加熬熱 香油 調入

斑雀癩疥	雲紫	掌驚	皮蛇	來雁	毬繡	下湯	類證治裁	藏腎	頭麻	方傳	仙尹	種六十三								
玉肌散	一掃光	水煎	何首烏散	五兩	大消風散	火龍散	羌活白芷散	羌活白芷散	歸地	冰片	馮夷	東華玉	近前	以前	牛膝	二兩	麻各	白芍	天麻	
錢末	末每服	何首烏	當歸	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散
錢末	末每服	何首烏	當歸	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散
錢末	末每服	何首烏	當歸	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散	散

類證治裁 卷五 癩風 十一

藥癩
 肥皂丸
 荆芥穗
 山柰
 藥本
 白芷
 羌活
 防風
 薄荷
 子絃
 晒乾晨擦

癘風

服叔傳染毒癘由足趾麻木漸至肌肉不仁身發紅暈常服京口
嵩門治風丸散大率瀉毒品味如苦參丸必勝散等類初服大
便日三四行紅暈雖退而精神日削纏綿數載眉脫眼斜予謂
驅毒宜兼補元否則正氣陷下邪毒留滯非治法矣用八珍丸
料加製首烏生杜仲炙黃耆蒸牛膝玉竹天麻獨活秦艽威靈
仙乳香沒藥蜜丸兼服酒藥用白花蛇穿山甲松節金毛狗脊
威靈仙桑寄生苦參丹參當歸玉竹木瓜桂枝浸煮溫服一料
精神稍復痺痛亦定後仍服京口丸散便瀉食減筋攣肉腐卒
成不救

癘毒治裁

卷之五

癘風

三

某 癘風初起左足跟出水左手麻痺不隨脈虛濡按之不起此
陰血虛而受風溼癘毒也用熟地當歸川芎杞子首烏白朮黃
耆牛膝生杜仲五加皮獨活桂枝鉤藤薑黃熬膏沖酒服手足
運掉得舒然此症乃癘毒邪乘虛襲入經絡經謂邪之所奏
其氣必虛若不遠帷幙慎調攝久之筋骨刺痛眉落眼斜鼻塌
肉腐十不一生矣

周 壯歲感前症初由臂臑腫硬手腕痺痛延至遍體上下骨節
攣痛面發紅斑淫毒淋漓多在支節診之脈沈數此癘毒從經
絡竄入骨髓須用鍼砭去惡血以洩毒非藥力所及辭不治

痺症論治

諸痺風寒溼三氣雜合而犯其經絡之陰也風多則引注寒多則
掣痛溼多則重著良由營衛先虛腠理不密風寒溼乘虛內襲正
氣為邪所阻不能宣行因而留滯氣血凝滯久而成痺或肌肉麻
頑或肢節攣急或半體偏枯或偏身走注疼痛其不痛者病久入
深也故在骨則重而不舉在血則凝而不流在筋則屈而不伸在
肉則麻木不仁在皮則皺揭不榮皆痺而不痛蓋痺者閉而不通
邪在陰分也故經以病在陽為風在陰為痺陰陽俱病為風痺言
三氣雜合尚言痺病所因也在陰為痺分言經痺論曰風寒溼三
表裏有殊也陰陽俱病表裏兼寒症也風行而不定寒勝者
氣雜至合而為痺受一氣其風勝者為行痺如走注之類寒勝者

癘毒治裁

卷之五

痺

主

為痛痺寒凝則陽氣不行溼勝者為著痺重著不移或腫痛或不
即麻以冬遇此為骨痺在骨以春遇此為筋痺在筋以夏遇此為
木也夏氣以至陰遇此為肌痺在肌肉以秋遇此為皮痺在皮行
脈痺在脈以冬遇此為骨痺在骨以春遇此為筋痺在筋以夏遇此為
痺痛痺著痺痺症大綱又以所遇之時五臟皆有合病久而不去
而命名非此外別有骨筋脈等痺也五臟皆有合病久而不去
者內舍於其合經云諸痺不已亦溢內也風勝者易已留皮膚者
逢熱故骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已復感於邪內舍
於肝脈痺不已復感於邪內舍於心肌痺不已復感於邪內舍於
脾皮痺不已復感於邪內舍於肺此經病入臟也經論五痺之入
脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘益乾善噦厥氣上則恐肝痺夜
臥則驚多飲數小便上為引如懷腎痺善脹尻以代踵脊以代頭
脾痺四肢懈惰發欬嘔汁上為大塞此五臟之痺各以其時重感
其入腑者別有腸痺胞痺另詳本門

於風寒溼之氣也。風勝脈必浮，寒勝脈必澹，濕勝脈必緩。三痺各有所勝，用藥以勝者為主，而兼者佐之。治行痺，散風為主，兼去寒利溼；參以補血，血行風自滅也。治痛痺，溫寒為主，兼疏風溼；溼參以益火，辛溫解凝寒也。積散五治者，痺利溼為主，兼去風逐寒。參以補脾補氣，土強可勝溼也。川芎、茯苓、其症有風溼、羌活、勝公、有寒溼、三痺湯、痺而身寒如從水中出者，屬寒溼。附子、有溼熱、酒、有味二妙、肩背沈重、肢節疼痛、下注足脛、屬濕熱。當歸、有風熱、散、有營熱、加鈎藤、丹皮、有營虛、中湯、有衛虛、防己、黃、有氣痺、痺在氣分、有血痺、痺在血分、因勞汗出、臥被風吹、血有瘀血、入絡、獨痺湯、有血痺、疑於膏黃、者桂枝、五物湯、加當歸。

類證治裁 卷之五

桃紅飲煎。有停痰。遍身走痛。二陳湯加羌活。有支飲。胃痛不舉。眩成入。麝香。有白芥子。風化。硝薑汁。泛丸。有支飲。胃痛不舉。眩丸。有在經。木防己。有入絡。仙術。藤。牛膝。或活絡丹。治法總以補助真元。宣通脈絡。如活血丹。合續斷。使氣血流通。暢則痺自己。

風寒溼。氣血凝滯。身重而痛。手足攣急。石頭。改定三痺合痺。真氣不能周於身。渾身痺痛。風寒溼氣。客於肉。分不在臟。外白朮。狗脊。薏米。

行。偏身走注不定。上半身甚者。烏藥。順氣散。下半身甚者。虎骨。散痺。歷節。攣痛。血湯。痛甚者。五靈散。

痺。著定處。身重痠疼。天陰。即發。除溼。調痛湯。加不應。補中益氣。羌活。黃蘗。

痺。即寒痺。痛痺也。苦痛切骨。安腎丸。

筋。即風痺也。風熱攻注。筋弛脈緩。角散。若溼邪入筋。續斷。

痺。即熱痺也。金匱云。經溼則痺。風溼鬱熱。經隧為壅。升麻湯。去桂。麻。秦。九。回。物。湯。痺。後。用。人。參。丸。

肌。即溼痺者。痺也。渾身上下左右麻木。屬衛氣不行。神效黃皮膚。麻木。屬肺氣不行。本方去蔓荊。倍。肌肉麻木。屬營氣不行。本方。荆。加。桂。枝。羌。活。防。風。丹。溪。日。麻。為。氣。虛。木。為。溼。痰。敗。血。

皮。邪在皮毛。搔如隔帛。或癢。疹。風。捨。宜。疏。風。養。血。秦。芫。地。五。臟。經。病。入。臟。邪。勝。正。虛。五。痺。腎。痺。本。方。加。獨。活。肉。桂。杜。肝。痺。木。加。棗。仁。心。痺。本。方。加。遠。志。茯。脾。痺。本。方。加。厚。樸。枳。肺。痺。本。方。加。紫。菀。

類證治裁 卷之五

入門曰。痺初起。驟用參耆歸地。則氣鬱滯。邪不散。只以行溼流氣。藥主之。久而不愈。宜峻補真陰。使氣血流行。則病邪隨去。參。景。痺與痿相似。但痿屬虛。痺屬實。痿因血虛火盛。肺葉焦而成。痺因風寒溼邪。侵入而成也。痺又為中風之一。然受病各異。痺兼三氣。邪為陰。受中風。邪為陽。受也。上陰者。裏與下也。痺與風痿。形症。雖相似。醫治之法。可相混乎。沈氏。治痺而用風門通套之劑。弊之過也。痺症非不有風。然風入陰分。與寒溼互結。擾亂其血脈。致身中之陽不通於陰。故致痺也。古方。多有。用。白。芷。者。以。黃。能。通。陽。氣。白。能。行。營。衛。然。已。入。四。君。四。物。等。

湯中非尚發表也。至於攻裏則從無用之者。以攻裏藥皆苦寒。用之則陽愈結。其痺轉入諸腑而成死症矣。通醫

戴人口痺。病以溼熱為主。風寒為兼。其脈沈瀯。乃治此者不分經絡。表裏臟腑。便作脚氣寒溼治。而用烏附。乳沒燥熱。以致便尿瀯滯。前後俱閉。虛躁日甚。肌肉日削。飲食不下。雖華扁亦難措手矣。

痺症脈候

脈瀯而緊。為痺痛。脈大而瀯。為痺。脈急亦為痺。玉浮瀯而緊。風寒溼三氣皆備。脈肺微為肺痺。心脈微為心痺。右寸沈而瀯。瀯為皮痺。左寸結而不流利。為血痺。右關脈舉按皆無力而瀯。為肉痺。左關脈弦緊浮沈有力。為筋痺。通醫

類證治裁

卷之五

痺

六

附方

防風湯 見一卷溼

加減五積散 見一卷溼

川芎 茯苓 赤芍 桑皮各錢半 川芎 防風 麻黃
 赤芍 當歸各一錢 陳皮 炙草各五分

羌活勝溼湯 見一卷溼

史國公酒 羌活 防風 白朮 當歸 牛膝 黃蘗 杜
 羌 菴耳子 杞子 虎骨 酥炙 桑寄生 獨活 秦
 此方去菴耳子 杞子 加茄根 各味相研 絹袋盛浸
 附子丸 附 菴耳子 芍 參 草 木 桂
 苡仁湯 苡仁 歸 芎 薑 桂 羌 獨 防 木 草
 川烏 麻黃

類證治裁

卷之五

痺

七

三痺湯 杜仲 牛膝 續斷 桂心 細辛 秦朮 獨
 煎 水

加味二妙散 黃蘗 酒炒 羌朮 米泔浸炒 名二妙丸 此
 蒼朮散 蒼朮 黃蘗 各四兩 虎骨酥炙二兩 防風一兩
 常歸拈痛散 見一卷溼

消風散 見二卷失音

清暑益氣湯 見一卷暑

巴戟天湯 巴戟二錢 附子 五加皮 石斛 炙草 茯
 防風 防己各五分 牛膝 車前各錢半 肉桂
 生薑 水煎

千金犀角散 犀角 鎊二兩 羚羊角 鎊一兩 前胡 黃芩
 大黃 升麻 各用薑汁拌炒五錢 射

干酒炒黑四錢 豆豉
 一升 研末

四物湯 地 芍 歸 芎

當歸建中湯 見三卷脾胃

防己黃耆湯 見一卷溼

獨痺湯 者 歸 芍 羌 防 薑黃各一錢半 甘草五
 黃耆五物湯 者 薑五片 棗二枚 薑六片 棗二枚
 桃紅飲 桃仁 紅花 川芎 當歸尾 滅靈仙 煎好加
 二陳湯 見一卷中風

指迷茯苓丸 見二卷痰飲

木防己湯 木防己 石膏 桂枝 薑黃 杏仁 桑枝

活絡飲	木歸芎羌獨各一錢甘草五分薑
活絡丹	川烏草烏各炮去皮臍南星膽套九次地龍焙乾各一兩乳香沒藥各二錢二分酒丸
活血丹	熟地三兩參朮歸芍續斷各一兩酒
續斷丹	續斷草薤牛膝木瓜杜仲各二兩蜜丸
人參散	人參二兩杜仲黃耆棗仁茯神各一兩五味子川芎熟地秦艽羌活各五錢細辛二錢研服
改定三痺湯	防己蒼朮草歸芍芎青桂心烏頭細辛煎棗
通痺散	天麻三兩獨活藥本歸芍木各二兩研服三錢酒下日二服
烏藥順氣散	見一卷中風
虎骨散	虎骨二兩白花蛇天麻防風牛膝獨活麝香一錢乳香肉桂各一兩炙草全蠍各五錢每末服二錢
疏風活血湯	芎威靈仙白芷防己黃蘗南星羌活桂枝各一錢紅花三分薑五片
五靈散	五靈脂二兩川烏兩半沒藥一兩乳香五錢
除溼蠲痺湯	蒼朮二錢白朮茯苓羌活澤瀉各一錢陳皮一錢甘草五分薑汁竹瀝各三匙
補中益氣湯	見一卷中風
安腎丸	肉桂川烏各兩半白茯苓巴戟山藥茯苓石斛萆薢補骨脂各四兩八錢丸

類證治裁 卷之五 痺

類證治裁 卷五

羚羊角散	羚羊角歸芎防獨棗仁茯神杏
升麻湯	升麻三錢茯苓神人參防風犀角羚羊角羌活各一錢桂心三分加竹瀝半杯和服
秦艽四物湯	四物湯加秦艽薤芎薑沙甘草
人參丸	人參麥冬茯苓龍齒石菖蒲遠志肉
神效黃耆湯	黃耆身熱加丹皮陳草蔓荊子尿瀉加澤
秦艽地黃丸	四物湯加秦艽大力子各一錢
五痺湯	參苓歸芍芎木五味子細辛或加引經之藥

類證治裁 卷之五 痺

一一〇一

痺

李 左臂自肩以下骨節大痛經所謂寒勝則痛也來勢甚暴若
遊走上下骨節即俗謂白虎歷節風痛如虎咬刻不可忍此非
厲劑不除投以川烏頭炮去草烏頭炮去薑汁製油松節一劑服後
飲酒以助藥效遂病所夜半身麻汗出平旦而病若失矣此做
活絡丹法

張 五旬外左臂素患腫痛因涉江受風一夜全身麻痺脈虛濡
此真氣虛而風溼為病乃非中根萌也經曰營虛則不仁衛虛
則不用營衛失調邪氣乘虛襲入經絡蠲痺湯主之數服而效
○準繩云凡風痺偏枯未有不因真氣不周而病者治不用黃

類證治裁

卷之五

痺

五

者為君人參歸芍為臣桂枝鉤藤荆瀝竹瀝薑汁為佐徒雜烏
附羌活以潤營而耗衛未之能愈也嚴氏蠲痺湯用黃耆炙草
以實衛當歸白芍活血以調營羌防除溼疏風薑黃理血中滯
氣入手足而驅寒溼用酒和服藉以行藥力也

王 傷酒涉水溼襲陰絡右腿痺痛由髀骨直至委中穴參用三
痺湯內服桂心茯苓牛膝杜仲白朮蒼朮當歸獨活桑枝煎湯
外用防風桂枝木瓜當歸豨薟蒼朮白煎湯熏洗汗出為度夫溼
痺重著今腿痛已定通移膝脛仍以逐溼通痺法治川烏桂心
獨活牛膝虎脛骨歸尾沒藥以湯少加茯苓車前子二服兼用
洗藥痛止能行數十日內戒酒肉風冷勞動

王氏女風寒溼合而成痺蘊邪化熱蒸於經絡四肢痺痛筋骨不
舒蓋邪中於經為痺中於絡為痿金匱云經熱則痺絡熱則痿
倘經腑治失宜通延為痿痺杏仁滑石膏赤苓威靈仙蠶沙
薏仁數服痛減乃川白朮薏仁茯苓桂枝片薑黃釵斛歸身玉
竹五加皮桑枝煎湯數十服肢體活動又服丸劑平補肝腎步
履如常

族婦右臂痛手不能舉此為肢痺用舒筋湯片薑黃當歸羌活炙
草薑渣海桐皮加桂枝四五服漸瘳。凡筋得寒則急得熱則
縱纏短為拘弛長為痿風寒溼三氣雜至合而成痺風勝為行
痺寒勝為痛痺溼勝為著痺宜宣風逐寒燥溼兼通絡如臂通

類證治裁

卷之五

痺

五

服舒筋湯必腋下熱汗出則邪不滯於筋節而拘急舒矣如
氣虛加參耆血虛加地芍肩背加羌活狗脊鹿膠腰脊加杜仲
獨活沙苑子臂指加薑黃桂枝骨節加油松節虎膝下部加牛
膝薏苡五加皮虎脛骨經絡加桑寄生威靈仙鉤藤久而不痊
必有溼痰敗血瘀滯經絡加桂心膽星川烏地龍紅花桃仁以
搜逐之

王 有年盛暑脈沈緩身半以下痠痛脛膝無汗手足不溫便艱
夢泄皆溼熱壅阻致痺先通其壅用蒸牛膝當歸秦艽川芎玉
竹杏仁陳皮淡菴蓉二服便潤去菴蓉杏仁耑理經絡溼邪加
桂枝桑寄生獨活薏苡杜仲熟地炒十數服全瘳

痿症論治

痿者肢弱無力筋弛而不收為熱傷血脈之症經曰五臟因肺熱葉焦發為痿躄夫五臟皆有痿如肺熱為皮毛痿宜犀角心熱為脈痿宜鐵粉丸肝熱為筋痿宜紫葳湯脾熱為肉痿宜二陳湯腎熱為骨痿宜金剛丸而經論痿躄必原肺熱者以肺為臟之長體燥居上主氣而畏火若金受火燥則氣傷而不能管攝一身乃發為痿躄矣其治痿獨取陽明何也經曰陽明者臟腑之海主潤宗筋宗筋主束筋骨而利機關也陽明虛則宗筋縱帶脈不引故足痿不用此治痿必使胃納水穀化精微五臟得所稟以行血氣濡筋骨利關節也河間論痿主血衰不能榮養百骸子和謂痿必火乘金病多作

類證治裁

卷之五

痿

痿

於五六月午為少陰君火之位未者溼土庚故病痿者脈浮大戴人主腎水衰則骨髓枯竭直言痿病無寒丹溪云瀉南方則肺金清而東方有制土不受戕補北方則心火降而西方有養金不苦燥凡痿症不可作風治而用風藥東垣治痿以黃為君黃為佐士材論胃虛食減成痿宜藿香治脾虛下陷足痿用補中石頑主陽明溼熱各具確見今參而酌之通治溼熱成痿脈洪滑者主清燥二妙丸加味二溼熱傷肺成痿者主清上加沙參麥冬玉竹杏草山溼熱壅胃成痿者主通腑大豆黃卷茵陳滑石石溼熱著筋梔骨成痿者主理金毛狗脊地骨皮知母防己陽明脈虛宗筋不約者主潤肺人參茯苓杞子當歸桑葚肝胃陰虛風動肢顫者主

類證治裁

卷之五

痿

痿

通攝熱地牛膝遠志肝腎陰虛足熱枯痿者填精髓牛骨鱉板肉膠熟地杞子牛膝腎督陽虛脊軟腿痿者壯筋骨鹿角膠太青鹽或滋陰大補丸陽督脈虛形俯痿廢者理腰脊香茸衰年足軟肌麻躄維不用者以溫行流暢奇絡橘絡木瓜杞子杜仲狗脊病後陰傷骨痿六味丹澤加虎脛骨久病筋骨痿不起於牀金剛丸牛膝丸陰虛挾龜甲牛膝當歸久病筋骨痿不起於牀腎丸五獸三價丹溼熱脈滯而數為痿厥虎潛丸加減不長夏暑溼成痿清暑益氣腎傷暑暈痿厥清燥湯膏梁溼熱傷精脛膝痿弱神龜滋陰丸衰筋緩不收補血榮氣虛舉動無力四君湯加半身偏痿須分左右審氣血陰陽十全大補屈伸不利行步艱難安腎肢軟脈滑腰膝麻木或腫屬溼痰二朮二陳湯食滯脾氣不得運於四肢成痿

脈必氣口弦滑而惡食木香檳榔丸加山脈血留於腰脛成痿脈必沈澇而兼痛四物湯加桃仁心熱亢兼實積者為脈痿大承人病痿脈澇或大多血虛有火物湯肥人病痿脈滑或沈多氣虛有痰二妙丸子和云四末之疾動而或動為風不仁或痛為痺弱而不用為痿逆而寒熱為厥風必兼熱痺必風寒溼合邪痿必火乘金厥則或寒或熱皆從下起奈何不察其源概謂風溼末疾以風藥樹治耶

痿症脈候

脾脈緩甚為痿厥內診痿躄脈虛者生緊急疾者死經尺脈虛弱緩澇而緊病為足痛或為痿病脈痿脈多浮而大和

附方

犀角枯梗湯 犀角 黃耆 石斛 天冬 麥冬 百合 山藥
鐵粉丸 鐵粉 銀箔 黃連 苦參 石蜜 龍膽 龍齒
角 犀角 秦九 丹皮 白芍 地骨皮 雷丸

紫葳湯 紫葳 天冬 百合 杜仲 黃芩 黃連 葛藤
二陳湯 陳 苓 夏 草 兔絲子 白蒺藜

金剛丸 見二卷虛損

養香養胃湯 參 朮 苓 草 苡仁 藿香 半夏 麩
補中益氣湯 見一卷中風 砂仁 藜蘆 加 鹽 棗

類證治裁 卷之五 瘧

加味二妙丸 見本卷痺 酒蒸牛膝二兩
三妙丸 二妙丸加 山藥 黃肉 茯苓 牛膝 杜仲

滋陰大補丸 熟地 巴戟 小茴香 肉蓯蓉 遠志 石
葛蒲 杞子 紅棗 蜜丸

鹿角膠丸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 人參 當歸 牛膝
四斤丸 虎脛骨一兩 木瓜一筋 爲末以茯苓搗膏酒糊丸

香茸丸 鹿茸三兩 生當歸二兩 麝香一錢 生川烏五
六味湯 見一卷中風 錢 雄羊腎 三對酒煮搗爛爲丸

牛膝丸 見二卷虛損

煨腎丸 見二卷虛損

五獸三匱丹 鹿茸 酥炙 血竭 虎脛骨 酥炙 牛膝 酒浸
附子 一個 去皮 臍去 中心 入 辰砂末 一兩 填滿 木瓜
不去 皮 去 中心 入 附子 於 內 以 附子 末 蓋 口 此 三 匱 也
却 以 三 匱 正 坐 於 磁 缸 內 重 湯 蒸 爛
和 五 獸 末 搗 丸 木 瓜 酒 下

虎潛丸 見一卷中風

清暑益氣湯 見一卷暑 薤白 一錢 陳 朮 澤泄 各五分 五
清燥湯 青錢半 蒼朮 一錢 陳 朮 澤泄 各五分 五
地 草 神 麩 黃 柏 猪 苓 各 二 分 歸

神龜滋陰丸 龜版 酥炙 四兩 黃蘗 知母 各鹽酒炒二兩
爲末以猪脊髓和丸 五味 鹽湯下

類證治裁 卷之五 瘧

大補地黃丸 見一卷燥 茯苓酒製 兔絲子酒煮焙 天麻 煨 各二兩
補血榮筋丸 牛膝酒煮四兩 鹿茸酥炙一對 熟地六兩
木瓜 薑汁炒 五味子 焙 各一兩

爲末 蜜丸 溫酒下
四君子湯 見一卷中風

十全大補湯 見一卷中風
安腎丸 見本卷痺

二水二陳湯 見二卷痰飲 木 檳 朮 枳 陳 香附 神麩糊丸
本香檳榔丸 木 檳 朮 枳 陳 香附 神麩糊丸

四物湯 見一卷中風
大承氣湯 見一卷温

血虛

一妙四物湯

一妙合四物

一妙六君湯

一妙合六君

類證治裁

卷之五

痿

痿

中年後腎虧火動足膝痠軟脈虛駛而促初用六味湯加懷牛膝繼用虎潛丸去錮陽服後甚適但坐久腰腑熱騰小腹收引氣升腕膈不舒症因衝督經虛龍骸不伏非理臟真所得效擬龜鹿二仙膏加猪脊髓同熬酒和服得效

李 瘧邪失汗誤藥淫邪入絡四肢痠廢用除淫理絡手足能運然值冬寒氣血斂滯少腹偏窄背脊拘急脛膝麻頑步履歪倒知其陰陽維不司約束浸及任督俱病也用杜仲狗脊強筋骨而利俯仰五加皮牛膝益肝腎而治拘攣當歸白芍以和營荻苓草蘇以逐淫秦艽獨活以治痺玉竹桑枝以潤風燥理肢節

類證治裁

卷之五

痿

三

加桑寄生通經絡煎服十數劑諸症漸減又將前方參入鹿膠沙苑子小茴香以通治奇脈丸服酒下獲痊

族兒脊骨手足痿縱此督脈及宗筋病內經治痿獨取陽明以陽明為宗筋之會陽明虛則宗筋失養無以束筋骨利機關也童年坐臥風溼虛邪襲入遂致筋脈失司欲除風溼須理督脈兼養宗筋乃效方用歸芩參朮牛膝鹿膠荻苓木瓜寄生桑枝薑黃威靈仙十服肢體運動已活去鹿膠薑黃川芎木瓜威靈仙加杜仲玉竹杞子虎脛骨數十服行立復常

張氏四肢痿弱動履艱難脈濡且弱為營虛之候經言天癸將絕係太衝脈衰乃陰吹帶濁宿恙頻興因知衝為血海隸於陽明

陽明虛則衝脈不榮而宗筋弛縱無以束筋骨利機關法當調
補營血以實奇經人參杞子茯苓牛膝酒蒸熟地當歸杜仲
藥炒木瓜薑棗水煎十數服漸愈

類證治裁

卷之三

痿

天

痛風歷節風論治

痛風痛痺之一症也其痛有常處掣者為寒腫者為溼汗者為風
三氣入於經絡營衛不行正邪交戰故痛不止靈樞謂之賊風素問謂之痛痺金匱
謂之歷節後世更名白虎初因寒溼風鬱痺陰分久則化熱攻痛
歷節風近世俗名箭風至夜更劇治以辛溫疏散寒溼風邪開發腠理宜十若痛處赤腫
燉熱將成風毒宜散如風溼攻注肢節疼痛大羌活湯其歷節風痛無
定所徧歷骨節痛如虎嘯又名白虎歷節蓋痛風之甚者也或飲
酒當風汗出浴水因醉犯房皆能致之其手指攣曲身多痲瘋其
腫如脫漸至摧落其痛如掣不可屈伸須大作湯丸不可例以常
劑治烏頭湯因於寒宜從溫散防風天麻湯因於火宜從清涼犀角散

類證治裁

卷之五

痛風

五

若筋脈攣痛伸縮不利繫血虛燥四物湯加木瓜肢節痠痛脈沈
短氣繫有留飲半夏芥木湯或肢節注痛得捶摩而緩者繫風溼
在經靈仙除痛飲肢節腫痛遇陰雨而甚者繫風溼入絡虎骨丸沒藥散
肢節煩痛肩背沈重者繫溼熱相搏當歸拈痛散肢節刺痛停著不移
者繫瘀血阻隧趁痛散肢節熱痛者繫陰火灼筋加味二妙散或潛
服周身麻痛者繫氣血凝滯五靈丸歷節久痛者繫邪毒停留乳香
丸活肥人肢節痛多風溼痰飲流注宜導瘦人肢節痛是血枯
絡丹肥人肢節痛多風溼痰飲流注痰湯瘦人肢節痛是血枯
物湯加羌老人性急作勞患腿痛宜四物湯加桃仁牛膝陳皮
活防風痰積者加熱酒服風氣遊行痛無常處如蟲行遍體日靜夜劇者
并刺委中穴出血風氣遊行痛無常處如蟲行遍體日靜夜劇者
麝香丸痛風歷節二症宜參酌治之

東垣以痛風多屬血虛。主用芎歸。佐以桃仁紅花。薄桂。威靈仙。或趁痛散。丹溪以痛風先由血熱。主用四物。黃芩。在上加羌活。桂枝。威靈仙。桔梗。在下加防己。黃蘗。石頑以溼熱挾痰。挾血入絡。痺痛症重日久。必加烏附。驅逐痰溼。壯氣行經。便阻必用大黃。或畏峻攻。不知邪毒流注經絡。非烏附不能散結。燥熱結滯腸胃。非硝黃豈能潤燥乎。

痛風脈候

金匱云。寸口脈沈而弱。沈即主骨。弱即主節。沈即為腎。弱即為肝。汗出入水。歷節黃汗出。故名歷節。

附方

痛風 十生丹 歸身 芎 羌 防 獨 天 麻 川 烏 草 烏 何 痛風 海桐皮 等分 蜜丸 茶下一錢

類證治裁 卷之五 痛風 三

敗毒散 見一卷傷風

大羌活湯 羌活 升麻 各錢半 獨活 一錢 威靈仙 蒼 烏頭湯 麻黃 六錢 黃芩 白芍 各三錢 炙草 一錢 川 防風 天麻 湯 歸身 芎 羌 防 獨 天 麻 草 烏 犀角散 犀角 羚羊角 前胡 黃芩 梔子 大黃 升 四物湯 地 芍 歸 芎 半夏 芎 朮 湯 蒼朮 二錢 白朮 一錢半 半夏 南星 威靈仙 甘草 香附 各一錢 陳皮 赤芍 各五分

去痰 靈仙 除痛 飲 歸 芎 赤芍 各一錢 荆 防 羌 獨 芎 各三分 見一卷中風

風 痰 去 靈仙 除痛 飲 歸 芎 赤芍 各一錢 荆 防 羌 獨 芎 各三分 見一卷中風

風 溼 風 溼 風 溼 風 溼 虎骨丸 虎骨 五靈脂 白膠 蠶蠶 威靈仙 各一兩 沒藥散 沒藥 虎骨 等分為末 酒下二錢

虎骨散 虎脛骨 龜版 血竭 沒藥 自然銅 赤芍 白芷 骨碎補 防風 牛膝 五加皮 白附子 持心 天麻 研末服

當歸拈痛散 見一卷溼 趁痛散 桃仁 紅花 當歸 地龍 五靈脂 牛膝 羌 酒下 二錢

加味二妙散 見本卷痺 潛行散 黃蘗 酒浸焙研 每一錢 薑汁和酒調服

五靈丸 見本卷痺 痛風 三

類證治裁 卷之五 痛風 三

久痛 乳香定痛丸 蒼朮 二兩 川烏 歸 芎 各一兩 丁香 五 活絡丹 見本卷痺

行絡 麝香丸 川烏 二個 全蠍 廿一個 生地龍 五錢 生黑豆 氣 風 絡 行 痛 久 麝香 九 二錢半 麝香 一字 糯米 糊 九 菜 豆 大 酒 下 七 九

風 溼 風 溼 風 溼 風 溼 虎骨丸 虎骨 五靈脂 白膠 蠶蠶 威靈仙 各一兩 沒藥散 沒藥 虎骨 等分為末 酒下二錢

虎骨散 虎脛骨 龜版 血竭 沒藥 自然銅 赤芍 白芷 骨碎補 防風 牛膝 五加皮 白附子 持心 天麻 研末服

當歸拈痛散 見一卷溼 趁痛散 桃仁 紅花 當歸 地龍 五靈脂 牛膝 羌 酒下 二錢

加味二妙散 見本卷痺 潛行散 黃蘗 酒浸焙研 每一錢 薑汁和酒調服

五靈丸 見本卷痺 痛風 三

類證治裁 卷之五 痛風 三

久痛 乳香定痛丸 蒼朮 二兩 川烏 歸 芎 各一兩 丁香 五 活絡丹 見本卷痺

行絡 麝香丸 川烏 二個 全蠍 廿一個 生地龍 五錢 生黑豆 氣 風 絡 行 痛 久 麝香 九 二錢半 麝香 一字 糯米 糊 九 菜 豆 大 酒 下 七 九

痛風

房弟膠膝痛腫流走不定筋惕足痠風溼久痺都從熱化矣古謂

風從陽受痺從陰受始山絡痺失宣十數年忽止忽發今秋痛

自右移左行立煩難陰絡受病診脈下元先虛搜理絡邪宜兼

滋化源為有年陰虛痺症治法熟地水煮杞子當歸牛膝茯苓木

瓜威靈仙桑寄生玉竹獨活杜仲生薏苡地骨皮同熬膏以虎

脛骨膠收開水化服痛止

族某水溼與氣互搏走注上下表裏經絡不定其走注處必畧腫

膚熱如芒刺前自耳項直下胸鄉汨汨走腸別注莖囊後自背

脊走腰注臂行髀膝至右脗腫重手按不即起口燥咽痛溺少

類證治裁

卷之五

痛風

三

便艱此溼飲為風氣鼓動溢於支絡游走升降腸腑鬱痺鍼刺

罔效治用表裏宣泄杏仁石膏山梔赤苓木通秦朮黑豆皮大

腹皮黃蘗酒炒二服痺痛減二便爽再用宣理行痺鈎藤薏苡錢

山梔杏仁車前一錢茯苓腹皮川棟子桑寄生二錢牛膝狗脊防己

半錢四服諸症平再去牛膝狗脊川棟子等加神麴半夏椒目以暹

水溼而應退

張 長夏歷節通痺身重肢輓風溼注注血脈失於宣通治用驅

風逐溼通調血脈獨活川烏製當歸牛膝蒸薑黃威靈仙防己

松節乳香桑枝尋骨風水酒各半煎外用風藥煎湯熏洗而康

族女風溼走注骨節痛痺四肢筋掣脈沈由產後血虛留邪當歸

木瓜秦朮杞子鈎藤茯苓牛膝薏苡以蘇沙薑黃桑枝外用防風
蒲葶蒼耳子菖蒲根葱薑煎湯浴取汗六七次痛止如常

類證治裁

卷之五

痛風

三

麻木論治

麻木營衛滯而不行之症。靈樞云。衛氣不行則為麻木。素問云。營氣虛則不仁。衛氣虛則不用。營衛俱虛。則不仁。如人坐久。壓著一邊。亦為麻木。東垣以為氣不行。當補肺氣。丹溪以麻為氣虛。木為溼痰。敗血於不仁中。確分為二。蓋麻雖不開痛癢。只氣虛而風痰。奏之如風翔浪沸。木則肌肉頑痺。溼痰挾敗血阻滯陽氣。不能徧運。為病較甚。俱分久暫治之。治麻以氣虛為本。風痰為標。用生為嚮導。枳開氣。半逐痰。羌活散風。木通威。獨行經絡。手臂用桑。足股用牛膝。病減用重加參耆。以固本。治木以桂為嚮導。烏藥行氣。當歸杞子和血。穿山甲通經絡。病減用附。以培虛。此外如通身麻木。衛氣不行者。神效黃。皮腐麻木。肺氣

類證治裁

卷之五

麻木

請

不行者。芍藥補氣。肌肉麻木。營氣不行者。八仙。暑月麻木。熱傷元氣者。人參益。冷風麻痺。足屈不伸者。獨活寄。腿足麻木。忽如火灼。屬溼熱下注。二妙丸。加牛膝。手臂麻。為氣虛。補中益氣湯。加桑枝。春臂麻。目淚。為氣虛。有痰。用補。十指麻。木。中溼痰。敗血。二。中益氣湯。兼服六味丸。而愈。少加附子。行經。指。尖麻。屬經氣虛。沈氏桑。而麻。木。陽氣虛。膠。化。和肉桂。口舌麻木。吐痰涎。止麻。消痰湯。氣虛。加。合日。則。身麻。未厚塗之。口舌麻木。吐痰涎。人參。血虛。加。當歸。身。腹。皮。麻。痺。木。開。眼。則。止。東。垣。以。為。陽。衰。溼。伏。陰。分。頭。加。黃。蘗。黃。連。多。煮。葱。白。一。塊。不。知。痛。癢。遇。陰。寒。益。甚。屬。痰。挾。死。血。宜。活。血。行。氣。食。之。即。愈。一。塊。不。知。痛。癢。遇。陰。寒。益。甚。屬。痰。挾。死。血。宜。活。血。行。氣。二。陳。湯。加。川。芎。當。歸。懷。牛。膝。非。因。血。瘀。四。物。湯。加。非。因。氣。滯。開。結。舒。筋。有。自。頭。麻。至。心。窩。而。死。或。自。足。心。麻。至。膝。蓋。而。死。方。麻。骨。婦

類證治裁 卷五

人因悒鬱氣結。致發麻痺者。當舒鬱。逍遙散。加沈氏尊生書曰。治麻木。須補助氣血。不可專用消散。方書有謂大指次指。忽然麻木。不仁者。三年內須防中風。宜服地黃飲子。或十全大。若古法服風。湯。天。開。其。元。腑。漏。其。真。液。適。以。招。風。取。中。預。防。云。乎。哉。

麻木脈候

脈浮而濡。屬氣虛。關前得之。麻在上體。關後得之。麻在下體。浮而緩。屬溼。為麻痺。緊。屬寒。為痛痺。澀。而芤。屬死血。為木。不知痛癢。

附方

補中益氣湯 見一卷中風
八珍湯 見一卷中風

類證治裁

卷之五

麻木

請

神效黃耆湯 耆 陳 芍 芎 蔓荊子
芍藥補氣湯 耆 陳 草
八仙湯 八珍湯加 陳 夏 羌 防 柴胡 桂枝 秦
人參益氣湯 耆 二錢 參 草 各錢半 白芍 七分 柴胡
第二日 耆 四錢 升麻 五分 五味子 三十粒 日二服
第三日 耆 三錢 紅花 三分 陳皮 五分 澤瀉 三分 亦
一錢 澤瀉 錢二分 白芍 二錢半 炙草 五分 五味子
三十五粒 亦日二服
獨活寄生湯 見一卷溼
二妙丸 見一卷溼
六味丸 見一卷中風
二水二陳湯 見二卷痰飲

尖指 桑尖湯 嫩桑尖五錢 漢防己三錢 當歸二錢 黃耆

升麻各五分 加入參亦可

止麻消痰湯 芩 連 芩 夏 薑 桔 陳 枳 草

三痺湯 見本卷痺

二陳湯 見一卷中風

四物湯 見一卷中風

開結舒筋湯 紫蘇 陳皮 香附 烏藥 歸 芎 羌

麻骨湯 人糞燒灰 豆 腐 漿 調 服 卽 止 又 方 川 棟 子 燒 灰

道遙散 見一卷火

地黃飲子 見一卷中風

類證治裁 卷之五 麻木 藥

十全大補湯 見一卷中風

愈風湯 見一卷中風

天麻丸 天麻 牛膝 萆薢 元參各六兩 當歸 羌活

蜜為 各十兩 杜仲七兩 熟地一觔 附子三兩 煉

麻木

陸氏年近六旬肢麻頭暈屢發今春頭右畔麻至舌尖言蹇目紅
眼浮齒痛厥陽升逆鼓颯痰火入竅入絡輕為麻脊甚則口眼
喎僻手足不隨偏枯類中由來者漸矣用滋陰鎮陽以熄風緩
效為宜熟地四錢 鈎藤三錢 石斛 杞子 茯神 白芍 牡蠣 磁石 各二錢
羊角 七分 山梔 甘菊 一錢 俱炒各 十數服症減去磁石加冬桑葉黑芝
麻茸去鈎藤梔菊羚羊等加潞參以桑甚熬膏及阿膠和丸漸
安

類證治裁 卷之五 麻木 藥

瘧症論治

瘧症。體勁直而背反張。病在筋也。筋者血之所榮。傷於邪則成瘧。經曰。諸瘧項強。皆屬於溼。亦有因寒因風。而分剛瘧柔瘧者。有誤汗誤下。而致瘧者。有瘡家發汗。而瘧者。有中風暴仆。而瘧者。有產後亡血。而瘧者。有小兒急慢驚。而瘧者。有破傷風。溼變瘧者。有暴病。忽見口噤。頭搖。戴眼。反折者。皆瘧病也。其症身熱足寒。項強齒噤。手足抽掣。角弓反張。脈皆沈伏。弦緊。其因多由血液虛燥。筋脈失榮。風寒溼熱之邪。得以襲入。經絡而為病。此陳無擇。薛立齋。張介賓。諸賢。所以切指瘧為亡血陰虛也。故宜滋營液。以治本。疏風溼。以治標。症屬表者。如金匱云。太陽病發熱無汗。反惡寒。為剛瘧。

類證治裁

卷之五

瘧

美

葛根湯。太陽病發熱汗出不惡寒。為柔瘧。括葉桂。屬裏者。瘧病胸滿口噤。臥不著席。腳攣急。必齟齬。屬陽明。若便鞭。承氣湯。屬半表半裏者。如醫通云。一邊牽搐。一眼喎斜。屬少陽。若往來寒熱。小柴胡加桂枝。此三陽瘧也。若三陰瘧。俱手足厥冷。筋脈拘急。汗出項強。脈沈太陰。則四肢不收。水附湯。加甘草生薑。少陰。則閉目合面。參附湯。加厥陰。則頭搖口噤。當歸肉桂。此三陰瘧也。其血虛發瘧。宜大血虛。挾火必脈洪煩熱。主一陰煎。火盛則陰血燥涸。保陰煎。液虛汗多。宜三汗多兼火。當歸六。痰火發瘧。括葉桂。風熱痰壅發瘧。祛風導。嘔瀉發瘧。胃關煎。或身冷瘧厥。脈沈細。參附湯。十暑風搖。搦成瘧。三物湯。加羌活防。溫邪劫液成瘧。復脈湯。產後血虛汗多成瘧。十全大風黃耆白芍。去薑桂。

類證治裁

卷之五

瘧

美

應急加附子。三因用。小續命湯。宜去麻黃。陳無擇曰。寒瀋血。故無汗而惡寒。為剛瘧。風散氣。故有汗而不惡寒。為柔瘧。原其所因。多由亡血。筋失所榮。故邪得襲之。徐忠可曰。發熱惡寒。無汗。本傷寒症。若成瘧。是太陽寒溼相搏。而侵少陰。故惡寒。寒性勁。故曰剛。發熱有汗。不惡寒。本傷風。而併陽明症。若成瘧。是太陽陽明傷。溼兼風。風性溫。故曰柔。仲景以葛根湯治剛瘧。杜太陽項強。漸成陽明。胸滿之勢也。以括葉桂枝湯治柔瘧。潤太陽既耗之液。使經氣通。散風行溼也。以大承氣湯治裏症。以熱邪入內。故直攻其胃。而邪散也。薛立齋曰。瘧以有汗無汗辨。剛柔。又以脈逆不厥。逆辨陰陽。仲景雖曰瘧皆身熱足寒。然陽瘧不厥。逆其厥逆者。皆陰瘧也。張介賓曰。筋脈拘急。故反張。血液枯燥。故筋攣。觀仲景云。太陽病發汗太多。則致瘧。風病下之。則成瘧。瘡家不可發汗。汗之則瘧。可知。誤汗傷液。誤下傷陰。陰液傷而筋失所滋也。如中風之瘧。必年力衰殘。陰之敗也。產婦之瘧。必去血過多。衝任竭也。潰瘍之瘧。必血隨膿化。營氣涸也。小兒之瘧。或風熱傷陰。為急驚。或吐瀉亡陰。為慢驚。此雖不因誤治。而總屬陰虛之症。治此者。先以氣血為主。邪甚者。或兼治邪。若邪微。則急培元氣。元氣復。血脈自行。微邪自去。若從風治。難乎免矣。丹溪曰。瘧與癩相似。而不同。癩病身軟。時甦。瘧病身強。直。不時甦。

甚有昏冒而遂亡者。

瘧症脈候

太陽病發熱。脈沈而細。名曰瘧。為難治。瘧脈按之緊如弦。直上下行。瘧病發其汗已。其脈如蛇。腹暴脹大者為欲解。脈如故。反伏弦者瘧。瘧脈皆沈伏弦緊。但陽緩陰急。則久久拘攣。陰緩陽急。則反張強直。二症各異。不可不別。因

附方

葛根湯 見二卷汗

栝蒌桂枝湯 見一卷濕 加栝蒌

大承氣湯 見一卷濕

類證治裁 卷之五

瘧 四

小柴胡湯 見一卷濕

朮附湯 木 附 草 薑

參附湯 參 附 薑

耆附湯 耆 附 薑

大營煎 見三卷關格

一陰煎 見二卷欬嗽

保陰煎 二地 白芍各二錢 山藥 續斷 黃芩 黃蘗 各錢半 生甘草一錢

玉女煎 見一卷濕

三陰煎 見二卷汗

當歸六黃湯 見二卷衄血

火兼

多汗 盛火 盛火 兼虛 血陰 厥陰 少陰 太陰 和直

痰 火 風 痰 嘔 嘔 吐 瀉 產 後 暑 風 溫 邪 祛 風

栝蒌枳實湯

祛風導痰湯

胃關煎

溫胃飲

十全大補湯

三物香薷飲

復脈湯

小續命湯

歸 麥冬 枳 貝 桔 參 陳 杏

導痰湯 見一卷中風 此再加 羌 防 朮

熟地 山藥 各三錢 扁豆 白朮 各二錢 薑

見一卷中風

見一卷中風

見一卷中風

見一卷中風

見一卷中風

類證治裁 卷之五

瘧 四

痙

服姪少陰伏邪夏至後發協熱下利口乾脈數舌絳目紅譫煩躁擾服蔗梨西瓜等汁轉益狂躁神昏不寐症由心營受燥勢必液涸成痙先用鮮菖蒲根湯下至寶丹開竅滌痰二服神識畧清但指臂動掣脛膝不溫痙厥已露宵分齒際口喎搖頭直視此火風入筋劫燥血液熱深厥深之象急救普液以熄火風用阿膠化水生地犀角汁麥冬鈎藤木瓜山梔石斛生藕汁煎日再服症定脈數減去犀角加生薑甲龍膽草尚退肝膽風熱漸平同時一姪孫症同脈更沈數飲以臘雪湯西瓜汁暫定逾時輒復躁擾譫妄服至寶丹稍靜予一見其舌乾薄齒如灰糕決其

類證治裁

卷之五

痙

望

腎水枯竭勉用方諸水煎生地犀角生龍甲元參石斛等熱勢輒定然卒不救可知溫熱症由伏邪內發者多死於陰虛水涸之體也

眩暈論治

頭為諸陽之會煩勞傷陽陽升風動上擾巔頂耳目乃清空之竅風陽旋沸斯眩暈作焉良由肝膽乃風木之臟相火內寄其性主動主升或由身心過動或由情志鬱勃或由地氣上騰或由冬藏不密或由山高年腎液已衰水不涵木或由病後精神未復陰不吸陽以至目昏耳鳴震眩不定甚則心悸舌辣肢麻筋惕瘧不成寐動即自汗起則嘔痰無痰不作眩此經所謂諸風眩掉皆屬於肝也顧內風肆橫虛陽上升非發散可解非沈寒可清與治六氣風火大異法宜辛甘化風或甘酸化陰葉氏所謂緩肝之急以熄風滋腎之液以驅熱肝風既平眩暈斯止條其治法如上焦竅絡火鬱用

類證治裁

卷之五

眩暈

望

羚羊角山梔連翹天花粉以泄熱從膽治也如中虛風陽擾胃用丹皮生地桑葉鈎藤天麻以清肝內擾陽明正如下元水人參山藥黃耆小以填補從胃治也當其衝故須補中如元水麥冬草龍眼肉以填補從胃治也當其衝故須補中如元水洞火升用阿膠熟地石斛何首烏杞子以攝納從肝腎治也其陽目不潛用牡蠣淡痰多作眩用茯苓川貝橘冬茯苓神龍厥陽不斂用黃肉白芍土被木克嘔吐不食宜泄肝安胃用白木瓜半夏動怒鬱勃痰火風交熾用二陳湯下至於熄風之品如甘菊炭燥之屬皆可隨症加入者也

附方

除二陳湯 見一卷中風

火瀉龍薈丸 見一卷火

眩暈

褚氏高年頭暈冬初因怒猝發先怔忡而眩仆汗多如洗夜不能寐左寸關脈浮大無倫此膽氣鬱勃煽動君火虛陽化風上冒巔頂所致用丹皮山梔各錢半甘菊白芍俱炒各三錢鉤藤茯神各三錢柏子仁棗仁生研各八分桑葉二錢浮小麥二兩南棗四枚二服悸眩平汗止熟寐矣隨用熟地潞參五味茯神麥冬蓮子白芍數服全愈。凡營液虛膽火上升蒙竅須丹梔鉤藤桑葉以泄熱炒菊芍以熄風和陽再加茯神棗仁柏子仁小麥以安神涼心風靜汗止必收效營液為宜。

豐氏眩暈痞嘔多酸苦渴沫肝木乘土胃虛食減痰濁不降得虛

類證治裁

卷之五

眩暈

醫

風翔則傾溢而出厥陽上冒清竅為蒙故眩暈時作診脈滑小數兩寸尤甚先用降濁熄風栝實霜蘇子半夏茯苓杏仁天麻甘菊炭鉤藤橘皮諸症平思納食矣又照原方去蘇子杏仁鉤藤加茯神蓮子鉞石斛荷葉煎湯十數服而安。

室人煩勞傷陽無寐耳鳴頭暈欲嘔伏枕稍定虛陽上顛風動痰升眩嘔乃作宜潛陽熄風牡蠣煨白芍五味甘菊炭天麻煨半青鹽夏炒生地炒茯神棗仁桑葉二服隨愈。

蕭 勞力先曾失血數次近日頭眩耳鳴目昏心悸腕關兩尺浮大弦勁相火易炎龍雷失制痰隨火乘上干清竅所謂無痰不作眩悸也養陰潛湯以藥牡蠣熟地炭石斛甘菊白芍貝母茯

許氏 中數服得效後宜服六味丸

許氏 中年經行太多目眩頭暈用攝陰和陽熟地白芍各錢半當歸醋炒丹皮牡蠣粉各錢半甘草炙嫩桑葉錢三紅棗三錢二服愈。

王 伏暑病後失調脈虛疾頭暈熱渴而煩虛風上巔譏苦辛泄熱佐以甘潤山梔甘菊丹皮麥冬鉞斛天麻煨黨參花粉甘草嫩桑葉二服而愈。

堂兄寤後舌辣津不上朝頭眩肢麻陽升風動主和陽熄風佐酸味以生津鮮生地玉竹石斛白芍五味花粉烏梅甘菊炭牡蠣粉桑枝黑芝麻常服効。

類證治裁

卷之五

眩暈

醫

姜 弱冠勞力傷陽神疲頭眩發熱口苦食減嘔濁兩寸脈數厥氣上冒有風翔浪湧之勢治以鎮陽泄濁牡蠣白芍茯神橘紅製半夏吳茱萸甘菊炭金器同煎二服渴降嘔止脈仍小數頭目不清緣春溫膽火上升做葉氏泄膽熱法丹皮嫩桑葉荷葉邊鉤藤白芍生山梔生地炭數服眩除熱減去桑葉生地炭加玉竹茯神杞子焙山藥熟地俱炒路參蓮棗脈平。

蕭 冒雨後溼鬱成熱蒸而為黃宿恙又經操勞屢次失血當春虛陽升動欬而頭眩口乾目黃怔忡失寐治先清泄火風生地石斛山梔心茯神丹皮羚羊角杏仁鉤藤甘菊炒四服頭目清怔忡息食進寐穩矣但神疲力倦去生地加參芍蓮棗以扶脾

元數服更通後去羚羊角杏仁鈎藤甘菊加茵陳松蘿茶葉黃
漸退

厥症論治

氣自下逆上手足冷為厥。厥者盡也。危候也。經曰：下虛則厥。故陽
衰於下則為寒厥。陰衰於下則為熱厥。陰陽之氣不相順接則病
厥逆。手之三陰三陽相接於手十指足之三陰三陽相接於
足十指。陽氣內陷陽不與陰相順接故手足厥冷也。寒厥
者身寒而青四肢逆冷指甲冷。踰臥不渴便利脈微遲。即陰厥也。
熱厥者身熱面赤四肢厥逆指甲煖煩渴昏冒便短濇脈滑數。即
陽厥也。按內經論十二經陰陽之厥詳矣。而仲景以厥緣厥。陰活
人亦謂諸手足逆冷皆屬厥。陰以肝臟風火為厥逆之主。故厥症
種種類由肝風痰火衝激閉塞以至昏瘖為多。今標舉其目有寒
熱氣血食痰尸虻煎薄痿痺風癩瘡骨痛腎色暴瘡諸厥施治

最所宜審。寒厥初病即肢冷腹痛脈微。附子理中湯或表熱裏寒下利
清穀厥逆乾嘔咽痛脈沈細而微。四逆獨指尖冷名清厥。理中熱湯
厥初病身熱煩躁脈滑數日後忽肢冷乍溫乃熱深發厥。火鬱便
秘。大柴胡湯煩渴躁妄失下而手足冷乃陽極似陰熱極似寒不可疑
作陰症。輕用熱藥熱微厥亦微。四逆散熱深厥亦深。承氣湯如陰衰於
下足下熱而厥者。六味湯凡傷寒之厥辨邪氣寒厥宜溫熱厥可散
可攻。若由陰陽之衰則元氣為重寒厥宜補陽熱厥宜補陰氣厥
症有二。氣虛氣實皆能致厥。氣虛而厥者必形色消索身微冷脈
微弱為氣脫。參耆歸朮地黃湯甚者回陽飲。黃耆湯氣實而厥者形色鬱勃脈
沈弦而滑胸膈喘滿為氣逆。先理其氣。四七湯再隨症調之。血厥

症有二血脫血逆皆能致厥吐衄暴崩及產後血大脫則氣隨之
 故猝仆宜先掐人中或燒醋炭以收其氣急煎人參湯但氣不盡
 脫必漸甦血逆者暴怒傷陰血逆於上先理其氣則血自行通痰
 煎化肝俟血行氣舒隨症調之食厥由醉飽過度偶感風寒惱怒食氣
 填中脾陽不運忽仆不省誤作中風中氣治則死煎薑鹽食出則
 愈煎薑鹽愈加感風寒薑香正傷氣滯八味順縱飲痰升猝仆者名酒厥陳
 湯加青皮葛根砂仁痰厥由痰熱阻蔽心胞肢冷猝仆先探吐其痰瓜蒂痰
 開再治本病火痰宜清降寒宜溫散溼痰宜燥利因脾虛者健
 脾因腎虛者補腎尸厥即中惡之候因犯不正之氣忽手足厥冷
 牙緊口噤昏不知人或出登塚弔死飛尸鬼擊語妄面青蘇合香
 湯灌之

類證治裁 卷之五 厥

候甦服調氣神景云尸厥脈動無氣氣閉不通者還魂丹 虻厥多因
 胃寒虻蟲攻胃心腹痛不可忍或吐涎沫或吐蛔蟲發有休止不
 宜用寒藥理中湯加炒川椒檳榔水煎下烏梅丸或安虻散散蕪蕪
 症口瘡咽疼吐虻竟以冷劑取效者不可尚以胃冷概也煎厥者諸動屬陽煩勞則陽氣暴張
 勞火亢炎而精絕遷延至夏內外皆熱孤陽厥逆如煎如熬宜清
 心益腎或鹹寒降逆人參固本丸加淡薄厥者肝本藏血怒則火
 起於肝迫血上行而厥蒲黃酒痿厥亦熱厥症厥從肝起致四末
 不用因水虧則陽風燥筋絡熱沸騰須血肉鹹潤之品熬膏服以
 填其隙髓甲龜板阿膠淡痺厥脚氣頑麻初發必身痛肢節腫苗
 拈痛菜生地猪羊脊髓其自踝以下痛極者五獸三厘風厥手足搐搦身體強直名
 散丸滋腎丸

瘧厥小續瘧厥肝風發瘧肢掣液涸固本丸加阿膠瘧厥乃類中
 風症暴瘧不語經所謂內奪而厥則為瘧瘵雞子黃龍骨瘧亦血厥
 症平居無疾忽默默無知目閉口噤惡聞人聲移時方寤由熱升
 風動鬱胃而厥婦人多有之羚羊虛則填補奇經杞子常歸鹿角
 骨厥骨枯爪痛六味痛厥由胃陽久衰肝木來乘濁氣攻胃吳萸
 茯苓薑汁腎厥火山背脊上升肢逆吐沫椒附其有腎厥氣逆至
 巔頭腦大痛玉真色厥乃縱慾竭情精脫於下氣脫於上獨參
 厥脈至如喘氣閉肢冷若鼻及心腹微溫目中神采不變口無涎
 卵不縮皆可救備急瘧厥由瘧邪陷陰發厥不省當和正以托邪
 人參半夏知母草果烏梅生薑之屬凡諸厥脈大浮洪有力易醒脈細沈伏數急不

類證治裁 卷之五 厥

連貫凶厥小大指指拳內凶指拳外輕面青環口青唇白鼻青孔
 黑人中弔危也

諸厥脈候
 寸脈沈大而滑沈為實滑為氣實氣相搏猝厥血氣入腦即死入
 腑即愈唇青身冷為入藏猝厥脈大而緩者生緊大而浮者死尸
 厥脈伏者死凡厥脈沈微為寒沈數為熱細為氣虛乳大血虛浮
 數滑為痰脈至如喘為氣沈滑緊疾為食積大而滑為虻脾脈緩
 為痿浮滑而緊為痺

附方
 寒理中湯見一卷中風

寒厥 四逆湯 見一卷暑
 熱厥 火鬱湯 見一卷火
 便厥 大柴胡湯 見一卷溫
 秘散 四逆散 見三卷肝火
 熱蕩 小承氣湯 見一卷溫
 滋陰 六味湯 見一卷中風
 補陽 補中益氣湯 見一卷中風
 脫氣 四味回陽飲 參附 蓮草
 逆氣 四七湯 一名七氣湯見二卷欬嗽
 逆氣 排氣飲 見三卷積聚
 類證治裁 卷之五 厥
 血逆 通瘀煎 歸尾 山查 香附 紅花 烏藥 青皮 木香
 怒傷 化肝煎 見二卷血
 霍亂 正氣散 見一卷中風
 氣滯 八味順氣散 見一卷中風
 酒厥 二陳湯 見一卷中風
 吐厥 瓜蒂散 見一卷中風
 尸厥 蘇合香丸 見一卷中風
 尸厥 調氣平胃散 見一卷中風
 氣閉 還魂丹 辰砂 雄黃 玳瑁 麝香 白芥子 安息香 簞
 化爲丸黍米大 每服五分
 烏梅丸 見三卷嘔吐

止虻 安虻散 見三卷嘔吐
 殺虻 燕薺散 見三卷積聚
 魚厥 固本丸 見一卷中風
 薄厥 蒲黃酒 蒲黃一兩炒褐色 清酒十五盃沃之溫服
 痺厥 當歸拈痛湯 見一卷淫
 痺厥 五獸三價丸 見本卷痿
 熱瀉 滋腎丸 見一卷火
 風厥 小續命湯 見一卷中風
 瘡厥 地黃飲子 見一卷中風
 瘡厥 拾羊角散 見本卷痺
 類證治裁 卷之五 厥
 腎厥 椒附湯 見四卷泄瀉
 頭痛 玉真丸 硫黃 硝石 石膏 半夏 薑汁糊丸
 痛暴 備急丸 大黃 乾薑 巴霜各二兩 蜜九豆大 痒厥者
 酒下三丸即活

厥

房叔秋感時癘煩悶吐瀉筋掣囊縮手足厥逆脈微邪陷厥陰與六和湯去扁豆白朮杏仁加吳茱萸熨重吐瀉止手足溫忽發瘕項背強直時或反張頭面冷至胸背腰攬欲冷飲目閉心了口不能語由吐瀉後真陰大傷厥氣上逆陰陽失交虛風入絡故現瘕厥重症雖神明未昏而腎水欲枯微陽垂絕勉用參二附三回陽歸二芍三救陰麥冬錢五分生津木瓜鈎藤各錢分舒筋茯神遠志各二錢斂神服後陽回躁定再劑諸症悉退

類證治裁

卷之五

厥

聖

腳氣論治

腳氣。壅疾也。多由蘊溼而成。經所謂緩風溼痺也。頑弱為緩風。然有風溼寒溼溼熱厥逆攻注等因。東垣謂南方多感寒溼。北方多傷溼熱。千金方直謂風毒所中。由坐立溼地。風溼襲人。經絡皮肉遂成腳氣。初起甚微。人多不覺。惟猝起。腳屈弱不能動。或腫不腫。或頑痺。或緩縱。或變急。其發也。身痛壯熱。大類傷寒。或小腹不仁。或腹痛下利。或二便秘瀉。或忡悸昏憤。嘔逆轉筋。但病起自腳。或腫滿。或枯細。便作腳氣。治勿用傷寒等藥。其小腹頑痺不仁者。腳多不腫。頑後三日。令人嘔吐。為腳氣入心。死在旦夕。腎乘心。水克入味。丸去。後人又以浮腫為溼。腳氣當利溼。疏風不腫。為乾。脚氣當潤血。清燥。乾節。治法。大要。疏通其壅。氣滯者。槐蘇散。食滯者。枳湯。風勝者。自汗走注。脈浮弦。越婢加寒。勝者。無汗。掣急。掣痛。脈沈。瀉。酒下。牛。暑勝者。身熱渴煩。脈洪數。清暑益。溼勝者。腫痛重者。脈濡細。除溼。寒溼勝者。頑弱無力。脈細緩。胡蘆。熱甚者。加味。蒼。腫甚者。桑白皮散。腳氣初發。渾身痛。肢節腫。二便秘。先用。羌活。導。滯。後。苗。歸。拈。痛。風。毒。甚。頭。痛。身。熱。肢。節。痛。或。一。腳。偏。軟。小。續。命。湯。三。散。除。之。陽。經。熱。毒。注。腳。踝。焮。赤。腫。痛。寒。熱。如。瘧。敗。毒。散。三。陰。經。寒。溼。著。歷。膝。枯。瘦。色。淡。少。腹。不。仁。或。腹。急。痛。上。氣。喘。急。入。味。丸。腳。氣。入。腹。衝。胸。欲。絕。千。金。半。入。脇。作。痞。杉。木。節。湯。腳。氣。衝。心。為。火。氣。逆。上。金。鈴。子。散。以。附。子。末。津。衝。心。滿。痛。二。便。俱。阻。沈。香。導。腹。脹。喘。急。蘇。子。降。氣。湯。調。敷。湧。泉。穴。衝。心。滿。痛。二。便。俱。阻。氣。湯。腹。脹。喘。急。佐。以。養。正。丹。

類證治裁

卷之五

腳氣

聖

嘔逆惡心。加木香。腰肚轉筋。以蒜擦足心。令熱。即其厥氣升。溼濁不降。木黃。腎氣虛。小溲不利。金匱腎氣丸。氣血虛。屈伸不利。湯。斷脚氣走注痛不可忍。提虎骨節腫痛。皮丸。五加筋。不舒。湯。上攻便秘。三將。腹脹喘急。威靈仙末。足腫成疾。沈氏。溼瘡蟲癢。甘蔗渣。燒灰。生。猪。注。踝。成。漏。研。人。中。白。殿。此。症。最。忌。房。室。及。一。切。牛。脂。搗。敷。油。紙。扎。效。羊。雞。鳴。魚。肉。葱。蒜。酒。麪。犯。之。則。成。痼。疾。

東垣云。脚氣實由水溼。然有二焉。南方卑溼。清溼襲虛。則病起於下。此為外感。北方常食糟乳。飲酒太過。脾胃不能運化。水溼下注。此因內至外者也。脚氣腫脹。是為壅疾。治當疏下。然太過則損脾。不及則病不去。南方多見。兩足粗大。與疾偕老。初起治宜。積。脚。

類證治裁

卷之五

脚氣

毒

通加。橫。以。宜。通。其。氣。不。使。其。壅。壅。既。成。疔。去。惡。血。然。後。服。藥。千金論云。脚氣有冷有熱。不同者。足有三陰三陽。寒中三陽。所患必冷。暑中三陰。所患必熱。脾受陽毒。必熱。頑。腎受陰溼。即寒。痺。活人書云。凡脚氣服補藥。及用湯藥。潔洗。通邪入於經絡者。皆醫之大戒也。

通云。脚氣服補藥太過。小便不通者。用。薑。汁。炒。山。梔。木。通。赤。芍。不。時。煎。脚。氣。遍。身。腫。滿。喘。促。煩。悶。者。木。通。脚。氣。上。入。少。腹。不。仁。者。八。味。丸。

凡脚氣多從暑溼得之。故腫痛多屬溼熱。其兼寒兼風。當詳春夏病因。六淫治之。至於枯細而熱者。屬陰虛。瘦弱而寒者。屬陽虛。當

別以本症治之

脚氣脈候

脚氣之脈。浮弦為風。濡弱為溼。遲滑則寒。洪數熱鬱。沈伏毒在筋。骨。滿。滿。不。調。毒。在。血。分。夏。暑。脚。膝。冷。其。脈。陽。滿。陰。弱。為。溼。溫。浮。大。緊。駛。及。沈。細。而。駛。皆。惡。脈。心。下。急。氣。喘。自。汗。脈。促。短。數。嘔。吐。不。止。者。死。

附方

八味丸 見一卷中風

檳蘇散 香附 蘇葉 陳皮 木瓜 檳榔 羌活 牛膝 各一錢 甘草三分 葱白二莖 薑

片三

類證治裁

卷之五

脚氣

毒

四七湯 見一卷欬嗽 枳實五分 酒浸大黃三錢 羌活錢半 當歸一

越婢加木湯 麻黃 石膏 白朮 甘草 棗 牛膝丸 牛膝二兩 川椒五錢 附子一錢 虎脛骨六錢

清暑益氣湯 見一卷暑 除溼湯 見一卷溼 葫蘆巴丸 葫蘆巴酒浸一宿焙 故紙炒各四兩 共研以

加味蒼朮散 蒼朮一錢 白朮八分 知母 黃蘗 黃芩 牛膝 木通 羌 獨 防 草 各三分

勝溼餅子 白朮 黑芷 各二兩 取頭末五錢 甘草五錢 蕎麥麵 一兩半 水調作餅如錢大 飯上蒸熟 空

甚腫

心服以 利為度 甚腫 疏下 溼熱 中風 熱毒 胸膈 脇痛 火逆 阻滯 喘脹 急嘔 惡氣 肝氣 虛弱 虛弱 偏痿 走注

心服以

利為度

桑白皮散 赤苓二錢 木香 防己 檳榔各一錢二分 大腹子

青皮各七分

薑三片 羌活導滯湯 大黃酒煨二錢四分 羌活 獨活各一錢二分

當歸拈痛散

見一卷 歸尾各七分 枳實五分

小續命湯

見一卷 中風

敗毒散

見一卷 傷風

半夏湯

半夏 人參 桂心各三錢 乾薑二錢 附子

杉木節湯

杉木節一升 細辛 蜀椒各一錢 分三服

金鈴子散

見三卷 鬱

沈香導氣湯

沈香 枳殼 枳實 蘇葉 蘇子 木瓜 各六分 炙草

蘇子降氣湯

見二卷 失音

養正丹

見三卷 嘔吐

平胃散

木 樸 陳 草 薑 棗

木萸湯

木瓜 檳榔各二錢半 吳茱萸錢半

腎氣丸

見二卷 虛損

獨活寄生湯

見一卷 溼

羌活續斷湯

羌活 續斷 芍藥 桂 牛膝 杜仲 參 地 歸

捉虎丹

五靈脂 龍各兩半 乳 沒 歸各七錢半 麝 京墨各

注走

痿偏

弱虛

腫痛 筋急 厥氣 痞爛 冲心 初起 腫痛

三錢半 糯米糊丸

五加皮丸 五加皮四兩酒浸 遠志四兩酒浸 晒研酒糊

芋根湯 杜仲三錢 當歸 川斷 胡桃肉 杞子 白芍

一錢 煎服將藥渣 桑枝炒四錢 紅花 秦艽 桃仁各

乘熱喫之 三將軍丸 茱萸 木瓜 大黃 等分糊丸 治脚氣攻

脚氣湯 草薢五錢 茯苓 桑枝各三錢 蒼朮 薏仁

檳榔湯 檳榔 木香 茴香 等分加童便 薑汁 溫服

香蘇散 香附三兩 蘇梗二兩 陳皮一兩 甘草五錢

木通散 木通 紫蘇 猪苓各一兩 桑白皮薑汁炒 檳

赤苓各二兩 每服五錢 葱 薑 水煎

類證治法

卷之五

脚氣

五

腳氣

湯氏脚氣宿恙不離溼熱恰逢梅夏陰雨溼熱百痕灰黃食少不
飢藥忌濁膩脾惡淫也再以其年肝腎虛弱足腫帶下腰
痠季脇自左注右不能動臥乃陽維脈虛寒治從絡脈佐理
牛膝酒炒歸身酒洗各一錢砂仁壳八分茯苓薏苡生杜仲桑寄生續
斷各二錢糯稻根鬚半一劑痛止再劑食進多服並脚氣不數發

類證治裁 卷之五 脚氣

鶴膝風論治

膝者筋之府。風痺不利。兩膝墜腫。內外皆痛。腿細膝粗。如鶴之膝。
是名鶴膝風。多由足三陰經虧損。風邪乘之使然。治在活血榮筋。
兼理風溼。十全大補湯。加杜、初起漫腫不紅。屈伸不利。用消之
或隔蒜灸內。切忌針刺。或用陳芥子研細。葱一伏時。患上起泡。泡
服大防風湯。乾皮脫自愈。若寒熱齊作。加烏藥、五積散。若皮色不變。大屈通腫。神
散。若無根虛火。條忽發熱。十全大補湯。血虛發熱面赤。脈大而湯。當歸
湯。陰虛形瘦發熱。六味地黃湯。若扶溼熱。若龜丸。或若係風溼。骨節
若侵水溼。蒸膝。食少面黃。六君子湯。中氣不足。補中益氣湯。屈伸不利。活絡
成膿潰爛。大防風湯。清肌肉不生。或頭暈吐痰。八味地黃丸。山腳軟
漸成鶴膝。獨活寄生湯。但一膝引痛。上下不甚腫。而微紅者。名膝遊風。
防風通聖散。加木瓜。牛膝。或換骨丹。或膝兩旁腫痛。憎寒壯熱。腫處手不可近者。名
膝眼毒。命飲加牛膝。或膝蓋上腫痛。亦發寒熱。名膝癰。治同。
醫通曰。婦人鶴膝風。因鬱怒致損肝脾。而為風邪所襲。或先肢體
筋攣。膝漸大。腿漸細。如鶴膝狀。其腫高赤痛者。易治。漫腫不紅痛
者。難治。二三月潰而膿稠者。易治。半載後潰而膿清者。難治。誤用
攻伐。復傷元氣。尤為難治。宜固元氣為主。其食少體倦。六君子湯。熱
內熱寒熱往來。逍遙散。發熱惡寒。十全大補湯。驚悸少寐。歸脾湯。月經過期。
補中益氣湯。月經先期。加味逍遙散。腎陰虛弱。六味地黃丸。凡潰後宜大補脾胃。
若膿出反痛。或寒熱煩渴。皆屬氣血虧損。治以培補為宜。八珍湯。

小兒鶴膝風。多因先天腎氣衰弱。陰寒凝滯於腰膝。古方以六味補腎水。以鹿茸補命火。以膝引至骨節而壯裏。此治本良法也。喻嘉言曰。鶴膝風。即風寒溼之痺於膝者也。如膝骨日大。上下肌肉日枯。且未可先治其膝。宜養氣血使肌肉漸榮。再治其膝可也。此與治偏枯之症大同小異。急澆其未枯者。使氣血流行而復榮。倘不知此。但用麻黃等散風之藥。鮮有不全枯者。故治鶴膝而急攻其痺。必非其足痿而不用矣。

附方

十全大補湯 見一卷中風

大防風湯 川芎各七分半 羌活 人參 牛膝 各一錢 附子

類證治裁 卷之五

五分 白朮錢半

加減五積散 見一卷溼

神效散 人參二錢 歸 芍 芩 各一錢 薑 三片 附 羌 防

當歸補血湯 當歸 黃耆

六味丸 見一卷中風

蒼龜丸 二朮 龜板各二兩半 黃蘗五錢 粥丸 每五

二妙散 見一卷溼

換骨丹 當歸一兩 虎脛骨酥炙一具 羌 防 獨 活 各五兩 蘇 各二兩 秦 芩 牛 膝 蘇 沙 杞 子 油 松 節 各五兩 白 茄 根 八 兩 蒼 朮 四 兩 龜 板 一 兩 用 無 灰 酒 一 罇 浸 服 盡 將 藥 兩 乾 研 末 糊 丸 酒 下 散 膝 湯 黃 耆 五 兩 防 風 三 錢 肉 桂 五 錢 茯 苓 一 兩 水 煎 服 取 汗

風

溼

熱

溼

陽

陰

血

補

腫

退

散

溫

溫

溫

蒸膝湯 生首入兩 石斛 薏苡各二兩 肉桂二錢 水煎服 再服汗透二劑全愈
六君子湯 見一卷中風
補中益氣湯 見一卷中風
活絡丹 見本卷痺
獨活寄生湯 見一卷溼
防風通聖散 見本卷癩風
勝金丹 白朮製 麝香各五分 全蠍 一錢 雄黃 辰砂 錢 糖 調 葱 白 酒 送 下
錢 砂 糖 調 葱 白 酒 送 下
仙方活命飲 貝母 角刺各一錢 赤芍 歸尾 花粉 乳 沒 各 一 錢 陳 皮 銀 花 各 三 分 水 酒 各 半 煎

類證治裁 卷之五

道遙散 見一卷火

歸脾丸 見二卷勞瘵

八珍湯 見一卷中風

補培神安蒸除

各五兩 白茄根八兩 蒼朮四兩 龜板一兩 用無灰酒一罇 浸服盡 將藥兩乾 研末 糊丸 酒下 散膝湯 黃耆五兩 防風三錢 肉桂五錢 茯苓一兩 水煎服取汗

破傷風論治 破傷溼 破傷火附

凡金瘡跌撲損破皮肉及瘡瘍潰後切忌當風用扇若為風邪所乘皆能傳入經絡名破傷風其症寒熱間作牙關微緊即宜威靈頭蒜一枚同爛搗甚則發瘧口噤項強體直殺人急用獨聖散蘇熱酒沖服汁出愈二兩半切剝如泥入花椒一兩木為末三錢酒服立效或用生蠶二兩半切剝如泥入花椒一兩其破傷重亡血同酒炒熟再入酒二盞熱服少頃通身汗出神效其破傷重亡血多筋絡失榮賊風易襲經所謂風邪乘虛入之也此為風虛邪宜枝湯合當若因營熱煽風瘡勢焮腫河間所謂熱甚風搏併於經絡也此為風火邪當歸地夫傷風法當疏表然不宜峻用汗劑者仲景謂瘡家不可發汗汗之則變瘵故破傷症輕者但用葱白香白芷當歸鱉鯉疔重者亦用本方加防風遠志甚則用萬靈丹煎單麻香蠶尾疔重者黃耆肉桂犀角鱉鯉用甚則葱鼓湯下

類證治裁 卷之五 破傷風

若嘔逆不食係風引邪毒攻心內用護心散外用葱熨法大便不通但用蜜症勢稍退即宜保元湯仍加遠志解散餘毒如久不合口瘡毒內蘊熱甚生風周圍起白痂不甚腫身發寒熱牙關微緊急服玉真散散散散瘡口倘瘡勢紅腫水調敷腫處即消如身冷牙噤腰脊反張四肢強直急服全蠍散或大蜈蚣散用小蜈蚣如服後不解邪漸入裏發搐日直視二便秘用左其背後搖者太陽也為在表太陽身後背後搖無汗急汗之防風湯丸味羌活湯小續命湯汗過多止之散白木防風身角弓反張如頭低視下手足牽引急下之先小黃湯二服後用兩旁搖者少陽也為半表半裏少陽經行身側兩視或左右一宜和之風通聖散加減此河間法也其但言三陽不手一足搖

類證治裁 卷五

及三陰者謂風邪傳入三陰其症必危惟天靈蓋散末一錢鯉魚湯送下若少腹滿白利口燥咽乾舌捲囊縮額上珠汗不流皮膚痛極不在傷處終為死候

凡痛治破傷風宜曹氏秘方荊芥黃蠟魚鱉各五錢艾葉三錢宜獨病久衰弱宜主調營風白芷細辛瘡瘍風邪攻注身痛急地骨皮制芥穗如破傷焮腫膿不透出用玉真散煎汁調敷外又或用湯淋洗溼氣侵入瘡口流膿其人昏迷沈重者名破傷溼先用除溼湯若艾炙火烘火氣通入瘡口腫赤其人煩躁發熱者名破傷火小芎黃湯加薄荷醫鑑曰諸瘡欲變瘵宜急風發汗多成瘵宜防風常亡血多成瘵

類證治裁 卷之五 破傷風

破傷風脈候

破傷風脈浮而無力太陽也長而有力陽明也浮而弦者少陽也正洪數者傷火乳細者傷溼虛細而瀉皆不治

附方

桂枝湯 見四卷瘧

當歸補血湯 黃耆 當歸

當歸地黃湯 地 芎 歸 芍 防 芷 棗木各一錢 細辛五分 見一卷溫

葱白香鼓湯 見一卷溫

萬靈丹 歸 芎 荊 防 辛 草 麻黃 天麻 川烏 草烏 首烏 芽木 石斛 雄黃 蜜丸

護心散 菜豆粉一兩 乳香三錢 辰砂 甘草各一錢
 研細 早暮各服三錢開水
 葱熨法 大蔥一握隔湯蒸熟以線紫切平其底乘熱熨背冷
 即更換得微汗為度明日再熨
 蜜煎導 用蜜熬捏成如棗核納肛內
 保元湯 見一卷火
 玉真散 防風 南星 等分為末每服一錢 荷汁和酒調
 服 名定風散以此蜜調敷瘡效 再加白芷 天
 麻 羌活 白附子 等分并末調敷瘡口名玉真散 凡
 打傷欲死唯是心頭溫者用藥末二錢熱酒童便下二服效
 全蠍散 蠍尾七個為末熱酒調服日三次 凡破傷風非此
 不除
 大蜈蚣散 蜈蚣二條魚鱉炒 左蟠龍即鴿糞炒烟盡各五
 錢 為末每服二錢 防風湯下
 小蜈蚣散 蜈蚣一條 全蠍二條炒研 擦牙出涎 治口
 瘡身反張不省人事
 左龍丸 左蟠龍即鴿糞炒 鱸鱉炒 魚鱉蛤粉炒各五錢
 雄黃一錢 天麻二錢 飯糊九桐子大 每服十
 破傷風
 類證治裁 卷之五
 五加酒 酒下日三服 如症重每藥末三錢飯糊中 加入
 巴豆霜五厘 每服中加一九漸加至十九以利為度痛愈
 即止 一方有
 大蜈蚣二條
 防風湯 防 芎 羌 獨各一錢二分半 水煎調蜈蚣散
 溫服之大效
 九味羌活湯 羌活錢半 防風 茅朮各一錢 細辛五分
 芎 芷 苓 地各八分 炙草六分 葱白
 二莖 薑三片
 兼一枚
 小續命湯 見一卷中風
 防風當歸散 防 歸 芎 地各一錢半
 白朮防風湯 朮 者各二錢 防風四錢
 小芎黃湯 川芎 黃芩各一錢半 炙草一錢 葱白四莖
 香豉四合 水煎
 大芎黃湯 小芎黃去甘草 加酒炒大黃三錢 羌活錢
 水煎

少陽風熱通治 小柴胡湯 見一卷溫
 陽風熱通治 防風通聖散 見本卷癘風
 熱通治 曹氏秘方 荆芥 黃蠟 魚鱉各五錢 艾葉三片 無灰
 酒一碗 重湯煮一炷香熱飲汗出愈
 獨瘕湯 羌 獨 防 杏 地榆
 四物湯 地 芍 歸 芎
 羌活防風湯 羌 防 芎 歸 芍 草 藁本各一錢
 地榆 細辛各五分
 透疹 硃砂指甲散 硃砂 南星 薑製 獨活各二錢 人手指甲
 六錢燒存性 為末分三服酒下
 除溼湯 見一卷溼
 傷溼 白朮膏 一味生白朮熬
 傷溼 急風散 麝香一字 辰砂一兩 生黑丑二錢半 醋
 兩半生半焙醋淬 每末五分酒下
 破傷風
 類證治裁 卷之五終

類證治裁卷之六

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝蔴校

頭痛論治 大頭痛 發頤 眉稜骨痛 眼眶痛附

頭為天象。諸陽經會焉。若六氣外侵。精華內燼。鬱於空竅。清陽不運。其痛乃作。經曰。風氣循風府而上。為腦風。新沐中風。為首風。犯大寒。內至骨髓。為腦逆頭痛。以上風寒痛。下虛上實。為腎厥頭痛。頭痛耳鳴。九竅不利。為腸胃所生。頭痛甚。腦盡痛。手足青至節。死不治。以上虛痛。條而列之。有因風。因寒。因溼。因痰。因火。因鬱。熱。因伏暑。因傷食。傷酒。傷怒。與氣虛。血虛。及真頭痛。偏頭痛。內風。擾頭。腎虛。

類證治裁

卷之六

頭痛

水泛腎虛。氣逆諸症。因風者。惡風。川芎茶調散。因寒者。惡寒。桂枝羌活湯。因溼者。頭重。羌活勝濕湯。因痰者。嘔眩肢冷。為大陰痰厥頭痛。半夏天麻湯。因火者。齒痛。連翹丹皮桑葉。羚羊角。因鬱熱者。心煩。清室音。加麥。花。因伏暑者。口乾。荷葉石膏。山梔。因傷食者。胸滿。香砂枳。因傷酒。者。氣逆。葛花解。因傷怒者。血逆。沈香降。氣虛者。脈大。補中湯。加血。虛者。脈芤。或魚尾上攻。眉尖後。近髮際。為魚。真頭痛。客邪犯腦。手足青至節。黑錫丹。灸。偏頭痛。屢發。日久不痊。菊花茶。調散。內風。擾頭者。筋惕。肝陽上冒。震動髓海。三才湯。加杜。蟬。阿膠。腎虛。水泛。者。頭痛如破。昏重不安。六味湯。去丹皮。加沈香。因腎虛。氣逆。為腎。厥。玉真丸。外如雷。頭風。頭痛起塊。或鳴如雷。震。清震。大頭痛。頭面。

類證治裁 卷六

盡腫由天行時疫。甚則潰膿。普濟消。輕者發頤。腫耳前後。甘桔湯。荆芥。鼠粘子。眉稜骨痛。山風熱外干。痰溼內鬱。選奇。眼眶痛。俱屬。連翹黃芩。肝經肝虛。見光則痛。生熟地。肝經停飲。痛不可開。晝靜夜劇。導痰。東垣曰。頭痛每以風藥治者。高嶺之上。惟風可到。味之薄者。陰中之陽。自地升天者也。太陽頭痛。惡風寒。脈浮緊。川芎羌活。獨為主。少陽頭痛。脈弦細。往來寒熱。柴胡。為主。陽明頭痛。自汗寒熱。脈浮。緩長實。升麻葛根。為主。太陰頭痛。必有痰。體重腹痛。脈沈緩。蒼朮。南。為主。少陰頭痛。足寒氣逆。為寒厥。脈沈細。麻黃附子。主之。厥陰。頭痛。或吐涎沫。厥冷。脈浮緩。吳茱萸。主之。太陰少陰。二經。雖不上。頭上氣不得。此六經頭痛之治也。

類證治裁

卷之六

頭痛

寸脈緊急。或浮弦。或短。皆頭痛。浮滑為風痰。易治。短濇為虛難。治浮弦為風。浮洪為火。細或緩為溼。

附方

川芎茶調散 見一卷傷風

桂枝羌活湯 桂 羌 防 草

羌活勝溼湯 見一卷溼

半夏天麻白朮湯 夏 麻 朮 參 青 陳 苓 薑

清室音 苓 連 羌 防 柴 芎 草 茶 調 三 錢

菊花散 見五卷頭風

積食	香砂枳朮丸	<small>木香 砂仁 枳朮</small>	陳夏	荷葉包陳
傷酒	葛花解醒湯	<small>見一卷</small>	沈香降氣散	<small>見三卷</small>
傷怒	補中益氣湯	<small>見一卷</small>	四物湯	<small>地 芍 歸 芎</small>
虛氣	黑錫丹	<small>硫黃 黑鉛 加沈香 附子 肉桂 茴香 故</small>	菊花茶調散	<small>即川芎茶調散加 菊 花 殭 蠶</small>
溫腎	芎犀丸	<small>川芎 犀角 參 苓 辛 枳 麥 草 石膏</small>	透頂散	<small>見五卷</small>
偏痛	三才湯	<small>天冬 熟地 人參</small>	玉貞丸	<small>見五卷</small>
偏痛	六味丸	<small>見一卷</small>	來復丹	<small>見三卷</small>
偏痛	七味丸	<small>見一卷</small>	普濟消毒飲	<small>見一卷</small>
類證治裁	卷之六	頭痛	甘桔湯	<small>甘草 桔梗 荆 防 杏 葛 石膏 鼠粘子</small>
類證治裁	卷之六	頭痛	選奇湯	<small>見五卷</small>
類證治裁	卷之六	頭痛	生熟地黃丸	<small>生地 熟地 羌活 杏 仁 石 斛 枳 殼 防 風</small>
類證治裁	卷之六	頭痛	導痰湯	<small>見一卷</small>
類證治裁	卷之六	頭痛	麻黃附子細辛湯	<small>麻 附 辛</small>
類證治裁	卷之六	頭痛	吳茱萸湯	<small>見三卷</small>

頭痛

張氏女患頭痛每發須吐盡痰沫痛乃止診其脈沈緩知為太陰痰厥頭痛做東垣半夏天麻白朮湯加減愈○按太陰頭痛必有痰也蒼朮半夏湯主之少陰頭痛脈沈細足寒而氣逆麻黃附子細辛湯主之太陰少陰二經雖不上頭然痰與氣逆壅於膈間則氣不暢而頭為痛也

頭右偏痛右上牙齦迄耳根緊掣右鼻亦窒一醫用大黃滑石失之沈降一醫用柴胡升麻失之升提予謂火鬱生風宜清涼發散用辛以散風苦以降火參氣味主治 內用羚羊角山梔甘菊 炒 連翹天麻 煨 桔梗丹皮薄荷鉤藤青荷蒂 外用細

類證治裁

卷之六

頭痛

辛白芷羌活川芎當歸蘇葉煎湯熏洗日數次汗泄鼻通緊痛頓減後於內服原方去連翹加知母為其便燥數服而平○此症多由少陽風火鬱遏所致其脈或左弦右沈至陽升巔頂兩寸必較浮大此其驗也

耳症論治

足少陰腎竅於耳。腎氣充則耳聰。故經言精脫者耳聾也。又言肝病氣逆則頭痛耳聾。以膽附於肝而膽脈上貫耳中也。精脫失聰治在腎氣逆閉竅治在膽。凡耳聾以及耳鳴治法悉準乎此。第就中條析之。有因勞力傷氣者。補中湯加鹽水炒黃。有因房勞傷腎者。滋陰地黃湯益腎。有因陰虛火動者。磁石六味。有因病後虛鳴者。四物湯加鹽炒知藥。有因心腎虧肝陽逆虛風上旋蒙竅者。川填陰鎮逆佐以酸味入陰。鹹以和陽。如山黃。有臟氣逆為厥龍地黃磁石龜版天冬麥冬白芍五味牛膝秋石。有因怒氣壅者。流氣散。有風入絡為風聾者。必兼頭痛。防風通。有因怒氣壅者。流氣散。有因驚火鬱者。清膽。有氣閉猝聾者。芎芷。有年久耳聾者。清神散。有因驚火鬱者。清膽。有氣閉猝聾者。芎芷。有年久耳聾者。清神散。

有勝金透。有小兒耳聾者。通。有腎經熱右耳重聾兼苦鳴者。黃。有肝膽火升常聞蟬鳴者。龍膽瀉肝。有因痰火升而鳴者。加減。丸。總之由痰火者其鳴甚。由腎虛者其鳴微。又有耳中津液結塊名耳聾。梔子清。有風溫上鬱耳聾右脹者。馬勃。有左耳聾痛挾暑風上鬱者。須辛涼輕劑。菊葉苦丁茶山梔。有因暑邪閉竅者。鮮荷。有耳聾脹少陽火鬱。羚羊耳聾流膿。黃蘗麩。或甲小兒胎風耳聾。魚牙耳忽大痛如蟲蠕動。蛇蛻燒存。寒熱耳大痛者。疔也。以疔內散吹。耳忽大痛如蟲蠕動。性管吹。寒熱耳大痛者。疔也。以疔內外紅腫痛者。耳癰也。活命飲加耳聾耳疔。不寒熱不作膿。黃連消。命皆足少陰。手少陽。三焦。風熱上壅致之。此耳症大概也。

尺脈浮而盛為風。洪而實為熱。細而澹為虛。兩尺數為陰火上衝。

附方

補中湯 見一卷中風
 滋陰地黃湯 六味地黃加 歸 芍 芎 菖蒲 遠志
 益腎散 磁石 巴戟 沈香 菖蒲 川椒各研末二錢 用猪腰子一個切開和葱白食鹽紙包煨空心酒下
 磁石六味丸 六味地黃加 磁石
 四物湯 地 芍 歸 芎
 腎氣丸 見二卷虛損
 流氣散 參 苓 朮 草 青 陳 芷 枳 檳 樸
 木通 腹皮 蘇葉 蘇葉
 當歸龍薈丸 見一卷火
 防風通聖散 見一卷瀉風
 清神散 羌 防 荆 芎 菊 草 殭蠶 木通 木香
 清膽湯 青蒿 菊葉 薄荷 連翹 苦丁茶 荷葉
 芎芷散 川芎 錢半 芷 辛 樸 夏 陳 蘇 桂 草
 蒼朮 木通各七分 薑三片 葱白二莖
 勝金透關散 鼠膽 川烏 細辛 膽礬 麝香
 通鳴散 菖蒲 遠志 防風 柴胡 麥冬 細辛 杏仁
 磁石 苧慮 葱白湯下
 六味湯 見一卷中風
 龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣
 加減龍薈丸 梔 歸 柴 龍膽 大黃 青皮 青
 蘆薈 膽星 木香 麝香 神效糊丸

梔子清肝湯 見五卷癩風

馬勃散 馬勃 薄荷 桔梗 杏仁 連翹 通草

鮮荷葉湯 鮮荷葉 青荷葉 夏枯草 芩 梔 苦丁茶 蔓荊子 連翹

羚羊角湯 羚羊角 薄荷 丹皮 連翹 牛蒡 桑葉

魚牙散 黃魚齒煨研 和冰片 麝香末吹之

仙方活命飲 見五卷鶴膝風

黃連消毒飲 即普濟消毒飲見一卷疫

耳中出膿方 枯礬 乾胭脂 各存性各一錢 黃丹 龍骨 蜈蚣 各錢半 乳 沒各錢二分 蛇退炙六

分 明雄七分 麝香少許 研細以綿蘸藥引入耳中

耳 疔 風 溫 邪 少 陽 耳 膿 耳 癩 耳 疔 通 治

類書治裁

卷之六

耳

七

耳

腎開竅於耳膽脈亦絡於耳夜讀神勞素有遺泄弱冠內真

陰未充虛陽易於升動故氣閉清竅若聞鳴響宜用輕劑清少

陽膽火之鬱鮮桑葉丹皮梔皮連翹甘菊炒食後泡湯服久之

一日耳中忽清亮如涼風捲霧豁朗徹矣

王 七旬耳猝刺痛伏枕不減右尺沈按有力凡來鸚鵡者莫如

火老人真陰涸故相火易炎權用鎮攝法靈慈石錢黃蘗酒炒

山梔錢熟地錢三劑效

類書治裁

卷之六

耳

目症論治

經云五藏六府之精氣上注於目而為之睛睛之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為白眼肉之精為約束裏翳故肝屬木為黑睛曰風輪心屬火為二背曰血輪脾屬土為上下胞曰肉輪肺屬金為白仁曰氣輪腎屬水為瞳神曰水輪此五輪也膽之府為山廓大腸之府為天廓膀胱之府為澤廓肝之府為風廓腎之府為水廓命門之府為火廓脾胃之府為地廓小腸之府為雷廓此八廓也入廓有或蘊積風熱或鬱結七情之氣各隨五臟所屬而見風則散之熱則清之氣結則調之瞳胞自癢清淚赤痛是謂風眼洗肝烏輪突起胞硬紅腫是謂熱眼黃連湯眼昏而淚

類證治裁

卷之六

目

胞腫而軟酸澀微赤怒則目疼是謂氣眼宜石決明草決明楮實草子種云目不因火則不病氣輪赤肺火也肉輪赤脾火也水風輪腎虛肝腎火也赤脈貫目火自甚也治目者專主治火一句可了東垣云目得血而能視五臟六腑之精皆稟受於脾治目者宜理脾胃養血安神為主二說皆有見地不可執一也目痛有二一日皆白眼痛一目珠黑眼痛皆白屬陽晝痛點苦寒藥則效珠黑屬陰夜痛點苦寒藥反劇治目珠夜痛夏枯草散熱痛瀉青丸天行赤熱怕熱羞明涕淚交流酒煎散暴風客熱白仁壅起包小烏睛疼痛難開瀉肺湯赤腫痛甚加黃連目赤痛而頭目浮腫普濟消毒散怕熱羞明頭目脹痛選奇珠疼如鍼刺

類證治裁 卷六

目

心經實火散洗心熱結膀胱小便不通五苓散雷頭風目痛便秘清湯陽邪風症眉稜骨痛兼火者選奇湯陰邪風症腦後枕骨疼辛湯顛頂風症頂骨內痛連及目珠脹急赤外症之惡候也若昏眇則內症成矣外症用羌活勝風湯內症用中和養赤戴復庵云眼赤皆血壅肝經所致屬表者羌活勝風湯屬裏者瀉肝赤久生醫膜者春雪膏養仁膏非凡赤而腫痛當散溼熱赤而乾痛當散火毒赤而多淚當散風邪赤而不痛當利小便其或血滯瞳神大黃當歸散赤脈貫睛凡外障有此頗為難治洗心散赤絲亂脈點以石燕丹服用大黃當歸散酒煎散

類證治裁

卷之六

目

腫有胞腫珠腫不同胞腫多溼珠腫多火暴風客邪胞腫如杯洗肝散五輪壅起目服不能轉若鶻之睛酒煎散風毒溼熱瘀血龍膽散胞與珠脹出如拳石青散加羌辛芍芍薄荷若珠爛則無及矣至於氣輪平水輪亦明惟風輪泛起或半邊泛起服以涼膈散若水輪高而綻起如螺為肝熱甚點以石燕丹春雪膏內服神珠白膜麻木淚痛因五臟毒風所蘊大黃當歸散風熱四生血虛四物湯加羌大凡有病之日宜重一番而病源非一微瘻則屬虛火治宜微瘻則屬虛火大時將一丸納或川珍珠音點之外屬風熱上壅上下胞努肉枯雷磨蕩其睛久之生醫宜消風散熱外川點藥退之或如雲霧如絲縷如秤星在睛外遮睛皆瘻

藥過多脾胃受傷生氣不能上升所致。自內背而出者。羌活勝
 劑。自銳背而入者。上湯加勝。自上而下者。連倍柴胡。自下而上
 者。木通。搗鼻。以碧散點藥。皆用春雪膏。雞仁膏。或如去老醫。則
 以石燕丹。春雪膏。張石頑曰。外障內治之藥。雖多咸以皂角散
 為主。外治之藥不一。莫如丹。石燕。為最。血醫包睛。破血藥。兼
 之。或紅醫。如輕霞映日之狀。治宜去風散血。若黃膜上衝。服以
 散。煎以黃膜下垂。遮滿瞳神。蟬花散。加石青。騰草。赤膜下垂。神
 石燕丹。黃膜下垂。遮滿瞳神。大黃煎。以石燕丹。赤膜下垂。神
 散。去二蛇。加皂莢。凝脂。醫在風輪上。急用神消。花醫。白陷。龍膽
 石。洪明。照絲。雪膏。凝脂。醫在風輪上。急用神消。花醫。白陷。龍膽
 破壞風輪。神膏。旋出。凸如蟹睛。肝散。斑脂。醫色白而帶青黑
 內服神消散。有醫從上而下。貫及瞳神。狀如懸膽。服以石青散。
 外照石燕丹。有醫從上而下。貫及瞳神。狀如懸膽。服以石燕丹。

類證治裁

卷之六

目

七

烏珠。上白。顆如星。蟬花散。去蒼朮。加茯苓。烏珠。上細。顆。或白。或
 黃。或聚。或散。或頓起。或漸生。多由痰火。服羚羊角散。努肉起於
 大背。漸侵風輪。掩過瞳神。宜和血清火。點以石。大背起紅肉。如
 雞冠。一塊。害及氣輪。宜三黃丸。加老。此治外障法也。
 障。內。屬虛。挾氣。鬱。外似好眼。而不能照物。不痛不癢。惟瞳神裏面有
 隱隱青白者。皆臆腑中邪。乘虛入而為醫也。青風障。障內有氣色
 如晴山籠淡煙之狀。急宜治之。免變綠色。羚羊。綠風障。瞳神濁
 而不清。久則變為黃風。上方。黑風障。與綠風相似。但時時黑花
 起。先與去風。後用補腎磁。黃風。銀風。障不治。絲風。障。瞳神內隱
 隱。有一絲橫經。宜六味丸。加。偃月障。如新月覆垂。先與三因。因
 細辛。茯苓。

腎。仰月障。瞳神下半邊。有白氣一灣。如新月。仰從下而上。補腎
 丸。仰月障。瞳神下半邊。有白氣一灣。如新月。仰從下而上。補腎
 銀障。瞳神白色如銀。初服羚羊補肝。金障。上。治同。綠映瞳神。瞳神
 內隱隱綠色。先服黃連羊肝丸。其自視如蠅。飛花。墜。旌。旆。飄。揚
 或黃或白。或青或黑。黃白者。痰火傷肺。皂莢。青黑者。宜補腎。補
 磁石。瞳神散大。六味丸。加五味子。石。瞳神緊小。先服黃連羊肝
 丸。加二冬。或瞳神欲側。六味丸。加。暴盲。經云。氣脫者。目不明。大劑
 用滋腎丸。蛤粉丸。至於膏傷珠陷。神水將枯。並宜大補腎精。不
 獨參。雀。音。養肝散。至於膏傷珠陷。神水將枯。並宜大補腎精。不
 可寒涼。又有目珠上下轉運如輪。甚則瞳神反背。補中益氣
 此治內障法也。

類證治裁

卷之六

目

七

不能遠視。陽氣不足也。治在膽。加味定志丸。倒睫。拳毛。由目
 緊皮縮所致。久則赤爛。神水不清。以三稜。刺目。眶瀉。其溼熱。後
 防風。搗鼻。以碧雲散。更以木。鷲。子。一枚。為。脾。翻。粘。險。血。壅。於。內。
 飲子。搗鼻。未。左。塞。右。右。塞。左。一。夜。即。直。脾。翻。粘。險。血。壅。於。內。
 皮。急。弔。於。外。宜。刺。別。風。沿。爛。眼。年。久。不。愈。而。多。癢。者。服。柴。胡。飲
 齊。若。迎。風。赤。爛。川。芎。茶。調。因。風。流。淚。散。菊。花。其。實。熱。生。瘡。宜。瀉。心
 火。祛。風。熱。椒。瘡。生。於。脾。內。紅。粒。如。椒。而。堅。硬。者。是。也。宜。祛。風。熱。
 粟。瘡。亦。生。脾。內。色。黃。而。軟。如。粟。宜。退。溼。熱。五。疳。症。木。疳。生。於。風
 輪。青。碧。色。實。者。瀉。青。虛。者。補。腎。火。疳。生。於。脾。背。及。氣。輪。初。起。如
 椒。瘡。三。黃。湯。上。疳。俗。呼。偷。錢。眼。散。黃。金。疳。生。於。脾。內。與。玉。粒。相
 似。失。治。則。變。漏。湯。水。疳。生。脾。背。及。氣。輪。狀。如。黑。豆。若。在。風。輪。

一第 1026 丹 黃 參 日 年 25 第 6 頁 25

目必破損頭風人多有此。清空。至於瘡久成大背漏。金花大加。小背漏。導赤散。加透。正漏生風輪上流膿如痰。急宜瀉肝。偏漏。生氣輪上流出白水。急宜瀉肺。更有精神亂而妄見。視定反動。視正反邪。生暈變色。皆陰精虧也。湯或煎百草膏。又或目為物傷。積血青紫。撞破白仁。黃仁煎散。漸生翳障。犀角地黃湯。飛絲入目。宜頭垢。上論根掘石頑醫通舉其大畧如此。

用藥例

表藥。連翹。薄荷。黃蘗。膽草。蔓荊。以上各味為君。紅加赤芍。散血。加紅花。桃仁。血熱。頭痛。加鬱金。黃連。有風。加防風。羌。有。毒。加升麻。有。腫。加元參。熱。腫。加朴硝。有。淚。加木賊。膽。有。癢。加。黃。凡。虛。弱。年。老。腫。加。秦。皮。熱。腫。加。大。黃。有。淚。加。草。蒼。非。有。癢。加。黃。凡。虛。弱。年。老。

類證治裁

卷之六

目

人宜裏不宜表

裏藥。熟地。防風。茯苓。以上各味為君。虛紅加歸尾。烏梅。風加防已。腫加荆芥。車前。淚加青蘗。夏枯。心經。黃連。山梔。知母。黃芩。柴胡。連翹。肝經。白芍。黃蘗。膽草。款冬。青。辛。石。斛。脾。經。石。膏。元。參。林。檉。厚。樸。黃。蘗。肺。經。粉。羊。角。桑。皮。桔。梗。五。母。天。冬。百。部。麻。黃。腎。經。枸。杞。巴。戟。牛。膝。地。黃。兔。絲。子。當。歸。磁。石。白。山。梔。檳。榔。寧。應。腎。經。芍。青。鹽。知。母。覆。盆。子。菴。菴。黃。耆。川。椒。茯。苓。元。參。去。腎。青。葫。子。木。賊。蒺。藜。蜜。蒙。花。夜。明。砂。石。決。明。止。淚。夏。枯。草。蔓。荊。草。白。附。子。穀。精。草。草。決。明。犀。角。人。參。林。檉。厚。樸。麥。蠅。蠅。止。淚。香。附。甘。菊。鹿。皮。硝。青。鹽。去。風。防。風。羌。活。薄。荷。獨。活。升。麻。甘。菊。退。腫。大。黃。樸。附。白。磁。金。元。明。粉。秦。皮。散。血。歸。尾。蘇。木。赤。芍。紫。草。菴。蔚。子。生。地。青。皮。治。桑。皮。枳。殼。甘。菊。散。血。烏。梅。苦。參。牛。膝。延。胡。蒺。藜。熟。地。當。歸。治。

盲。夜。明。砂。石。決。明。蜜。蒙。花。藤。去。膜。蒺。藜。明。目。青。葫。子。木。賊。絲。子。石。草。地。黃。蠅。蠅。石。石。斛。去。膜。蒺。藜。明。目。決。明。草。決。明。夜。明。砂。望。月。砂。甘。菊。羌。蔚。子。退。熱。黃。連。黃。芩。黃。蘗。梔。子。連。翹。赤。芍。柴。胡。元。參。羊。角。元。明。粉。槐。角。退。熱。參。石。膏。甘。草。犀。角。硃。砂。礬。草。大。黃。朴。硝。磁。金。元。止。痛。沒。藥。明。粉。

附方

洗肝散 薄荷 當歸 羌活 防風 山梔 甘草各一兩
黃連湯 黃連 甘草
瀉青丸 膽草 山梔 大黃 川芎 當歸 羌活 防風
夏枯草散 夏枯草 製香附 甘草 茶調服 或痛久血
酒煎散 漢防己 防風 炙草 荆芥 當歸 赤芍
大黃當歸散 酒製大黃 酒炒黃芩各一錢 紅花二錢
瀉肺湯 羌活 元參 黃芩各一錢 地骨 桑皮 大黃
普濟消毒飲 見一卷癩
選奇湯 見五卷頭風
洗心散 麻黃 當歸 大黃 白朮 芍藥 荆芥 甘草
五苓散 見一卷溫
清震湯 見五卷頭風
還睛丸 生白朮 兔絲子 蒺藜 木賊 羌活 青葫子
三因芍藥湯 附子 川芎 南星 乾薑 細辛 川芎各
羌活勝風湯 羌活 生白朮各一錢 川芎 桔梗 枳殼
分 防風五分 細辛二分 薄荷 甘草各四分
水煎食後服

類證治裁

卷之六

目

症外風陰疼風頭雷閉便熱積痛脹頭大障外
瀉肺湯 羌活 元參 黃芩各一錢 地骨 桑皮 大黃
普濟消毒飲 見一卷癩
選奇湯 見五卷頭風
洗心散 麻黃 當歸 大黃 白朮 芍藥 荆芥 甘草
五苓散 見一卷溫
清震湯 見五卷頭風
還睛丸 生白朮 兔絲子 蒺藜 木賊 羌活 青葫子
三因芍藥湯 附子 川芎 南星 乾薑 細辛 川芎各
羌活勝風湯 羌活 生白朮各一錢 川芎 桔梗 枳殼
分 防風五分 細辛二分 薄荷 甘草各四分
水煎食後服

內症赤腫

沖和養胃湯 補中益氣湯去陳皮 加羌活 防風 黃連
瀉肝散 梔子 荆芥 大黃 甘草

春雪膏 一名絲雪膏 爐法石四兩銀罐內固脂煨水飛預
將爐法石九如彈子多刺以孔般赤滓藥汁內以汁盡為度
置地上一宿去火氣收貯待用 研砂研細水調蓋內炭火
緩緩煨乾取淨一錢半 麝香 黃粉 各五分 煉白蜜四兩先下
丁香各一錢半 麝香 輕粉 各五分 煉白蜜四兩先下
製淨爐法石末一兩不住手攪次下後七味攪至紫色金不
粘手為度捻作挺子每用少許新水磨化點之

又方 用人乳白蜜等分相和洋之再煨再淬汁盡為度入冰片
麝香青鹽礪砂各二分研勻每用少許井花水調點
大小皆

麝仁膏 麝仁去皮研極細紙包壓去油再研再壓數次取淨
麝仁膏 麝仁霜五錢 濃煎秦皮汁調和隔紙瓦上焙熟有
焦者去之塗淨碗內 以艾一錢分作三團每團置對椒一
粒燒烟起時將碗覆烟上三角墊起熏之烟盡晒乾再研入

珠砂 麝香各五分磁罐收貯 如點老醫加礪砂少許日
點大昔二次
又方 一錢五分再研勻收貯點之 入龍腦五分 煉白蜜
又麝仁膏 麝仁如上壓去油五錢 入麝香 礪砂水飛各
五分

碧雲散 驚不食草嗅之即噀者真 青黛 川芎各半兩研
先喻水滿口每用茶豆許搗鼻內以嚏為度
導赤散 見一卷溫

石燕丹 爐法石四兩 用黃連一兩歸身木賊羌活麻黃各
五錢河水二升煮便一升同煮去滓 將爐法石煨
淬製法如春雪膏取淨一兩 研砂銅勺內同水煮乾 石
燕 琥珀 礪砂水飛各取淨錢半 麝香各分半 右為極細末每用少
白丁香代之 冰片 麝香各分半 右為極細末每用少
許點大昔 如枯瀉無淚加熊膽一分白蜜少許 血寶加
阿魏 黃醫加雞內金 風熱醫加麝仁 熱醫加真珠牛
黃 老醫倍礪砂加猪脬子 冷醫加附子 尖雄黃
龍膽飲 梔子 大黃 芒硝各錢半 膽草 淡竹葉各八

風熱生醫吹鼻赤脈諸醫外障

龍膽飲 梔子 大黃 芒硝各錢半 膽草 淡竹葉各八

頭風火瀉

分黃藥炒五分
水煎分二次服
石膏散 生石膏三兩 藥本 生白朮 炙草各兩半 白
涼膈散 見一卷中風 茶調服四五錢
雙解散 涼膈散去竹葉 加麻黃 石膏 滑石 生白朮
防風 荆芥 桔梗 川芎 當歸 芍藥 黃
六味丸 見一卷中風

四生散 批開入藥 瀝紙 煨熟 附入 鹽溫酒下
珍珠膏 羊脂一筒洗淨刺一孔出汁 白蜜對勻和攪名百
熊膽膏 爐法石煨過水飛丸如彈子大每淨一兩分作十九
錢 琥珀五分 瑪瑙水飛三分 珊瑚水飛三分 珍珠
煨飛三分 礪砂水飛五分 冰片 麝香各二分和勻點
神消散 油炒 製精各二兩 蛇蛻四條

皂角丸 蛇蛻炙七條 蜈蚣 元精石 甲片地 當歸
皮蛤粉炒 膽草 赤芍 薄荷各一兩半 獐猪爪三十
枚蛤粉炒 人參一兩 川芎五錢 其為細末一半入牙
皂十二挺煨存性和勻煉白蜜為丸每服一錢半空心杏仁
湯送下 一半入淫羊藿一兩每服三錢用猪肝三片掛開
夾藥煮熱臨臥原汁送下

蟬花散 蟬蛻五錢 蛇蛻二錢 川芎 防風 羌活
若朮麻油拌炒各一兩半 茶調下 赤芍 石決明煑研
二三錢

防風瀉肝散 防風 羌活 桔梗 羚羊 赤芍 元參
羚羊角散 羚羊角各一兩 細辛 甘草各五錢 川芎
辛二錢 為散每服二錢 薑湯調 薄荷湯送下
陷腎丸 巴戟 山藥 補骨脂 丹皮各二兩 茴香一百
補腎丸 菴蓉 枸杞各四兩 青鹽五錢 蜜丸

黃膜一切障外障

補腎丸 菴蓉 枸杞各四兩 青鹽五錢 蜜丸

卷之六

實熱青風黑風腎虛肝風赤脉腎火雀育雀育雀動目能近視遠盲暗睡風痛因風流淚偷鉞

三黃丸 黃連 黃芩 大黃 蜜丸 一名三黃湯

羚羊角湯 羚羊角 人參 各一錢半 元參 地骨皮

補腎慈石丸 慈石醋煅 苳蓉酒浸各二兩 爲末 雄雀十

五隻去皮嘴留腸以青鹽二兩水三升煮雀至爛爲度持如

膏和藥爲丸每服三十丸溫酒下

羚羊補肝散 羚羊角 人參 茯苓 防風 細辛 元參

黃連羊肝丸 黃連一兩 羯羊肝一具去筋膜和搗爲丸

滋腎丸 見一卷火

蛤粉丸 蛤粉 黃蠟 等分 蛤粉投蛤粉捏作餅每餅重三

錢 以豬肝二兩竹刀批開裏藥一餅麻線纏入砂

鍋內泔水煮乘熱熏目至溫喫肝并汁以愈爲度

楊氏方有烏賊骨六兩黃蠟三兩

養肝散 夜明砂 蛤粉 穀精草各一兩 爲散每服三錢

以豬肝竹刀批開納藥在內線紫米泔煮熏服喫肝

補中益氣湯 見一卷中風

加減地芝丸 生熟地黃各四兩 天冬 枸杞各三兩 甘

味子一兩 蜜丸 當歸各二兩 麥冬 黃肉各三兩 五

加味定志丸 遠志 石菖蒲各二兩 人參 炙黃耆各四

兩 茯苓三兩 肉桂一兩 蜜丸

防風飲子 藜蘆 黃耆 黃連 炙草 防風 葛根各一

錢 細辛三分 虛加人參一錢 當歸七分

柴胡飲子 柴胡 羌活 防風 赤芍 桔梗 荆芥 生

川芎茶調散 見一卷傷風

菊花散 蒼朮半觔同皂莢三挺砂鍋內煮一日去皂莢將蒼

荆芥 旋覆花 甘草 菊花各半兩 木賊 草決明

或加蛇 瀉黃散 見一卷火

類證治裁

卷之六

類證治裁

卷之六

頭風熱毒腎虛陰虧血

清空膏 見本卷頭病

金花丸 黃連 黃芩 黃蘗

駐景丸 熟地六兩 當歸 枸杞各四兩 車前 五味各

益氣聰明湯 保元湯加 升麻 葛根 蔓荊 黃蘗

犀角地黃湯 見一卷溫

目

李氏有年血衰腎之精華不能上注於目常時似有黑物擁蔽銳
皆低頭則如黑灰紛撲左脉短濇此肝腎陰虧瞳神失斂也做
東垣明目地黃丸用熟地杞子山藥茯神當歸五味柴胡白芍
蜜丸遂愈

一 小兒夜熱渴數面腫目瞶羞明白睛微黃此脾虛不能約制而
為肝經風熱所乘用薏仁丹皮茵陳山梔鉤藤甘菊甘草茯神
二服汗津津熱退渴縮加潞參白芍又數服諸症悉平

族婦久患目赤產後鬱怒赤腫難開服散火解鬱之劑未效診其
脉脾弱肝強議扶土制木目疾可瘳砂仁陳皮白茯苓白朮天

類證治裁

卷之六

目

元

麻炙草甘菊川芎山梔草決明加棗外用洗藥蠶沙夏枯草冬

桑葉菊葉煎湯熏洗數次而病若失

馬氏左目久昏右目復眵服眼科苦寒之劑畏冷減食脉弱如無
此有年陽衰神水欲竭惟補養神膏右目可復用黨參杞子鹿
角膠沙苑子當歸玉竹桑葉龍眼先服補中湯二劑後再服前
藥加故紙核桃數十服右目復初

張氏目大眇脉赤浮膜漸入風輪按大眇屬心為君火風輪屬肝
為風木子能令母實火動風生宜抑火以退風用木賊殼精消
膜赤芍連翹瀉火枳壳當歸通元府甘菊散風龍眼歸目四服
全消

王 春初兩目腫痛難開旬日後白睛通赤入上眇中裏白膜視
物無親服散風火退浮醫之藥不應更用挑鍼點藥益劇診之
脉虛疾予謂前法俱非也此肝腎受損陰火上乘耳用杞菊地
黃湯大劑煎服數日而明復膜漸消

李 精散則視歧精虛則目暗今病後未復再傷腎陰脉虛大頭
震眩目赤紋內障視眵心煩不眠治宜補坎鎮離切忌寒涼清
降做東垣先生法熟地苤子枸杞子五味子茯神龍齒棗仁
當歸龍眼肉數劑而明復障消

類證治裁

卷之六

目

三

鼻口症論治

肺竅於鼻。脾竅於口。鼻別香臭。不聞香臭者。病在肺。經云。肺和則

口別五味。不知味者。病在脾。鼻之呼吸。通腦肺。肺感風寒。則鼻塞

聲重。參蘇飲。若風熱壅肺。亦致噎涕聲重。宜疏散。菊花茶。肺火盛

鼻塞。宜清解。肺飲。鼻塞甚者。往往不聞香臭。華澄。有腦漏成鼻

淵者。由風寒入腦。鬱久化熱。經云。腦移熱於。宜辛涼開上。宣鬱。辛

消風散。加羚羊角。有流涕成鼻。鼻者。肺受寒而成。宜溫散。蒼耳散

苦丁茶。葉黑山梔。有精氣不足。腦髓不固。淋下。並不腥穢。天暖稍止。遇冷更甚者。宜

溫補。天真。有瘰肉如棗核。生鼻中。為鼻痔。由胃有食積。熱痰流注

瓜。鼻散。有肺熱極。而生瘰肉。如橘子下垂。閉塞鼻竅。氣不得通。由

風熱鬱滯。辛夷消風散。有瘰肉痛甚。由膏梁積熱。溼蒸肺門。如雨

霽。泥地。突產菌芝。加礪砂。吹其上。即化水而消。有鼻端紅腫赤胞。

名酒。鼓鼻。由飲酒不節。致風熱上攻。血熱不散。疏風散。荆防。薄白

兩研細。人。有不飲酒。而鼻色赤。名肺風。由血熱鬱於肺。清肺。有鼻

生粉刺。枇杷。此三症。忌火酒辛熱諸品。鼻症之概也。靈樞經曰。鼻

黑為勞。色赤為風。色黃。口之津液。通臟腑。肝熱則口酸。湯。加龍

為便難。色鮮明。為留飲。口之津液。通臟腑。肝熱則口酸。湯。加龍

青皮。膽熱則口苦。肝湯。心熱亦口苦。黃連瀉。脾熱則口甜。湯。加

胃熱則口臭。清胃。虛則口淡。食湯。肺熱則口辣。瀉白。甚則口

腥。加減瀉。腎熱則口鹹。滋腎。胸胃熱鬱則口臭。加減甘。口糜者。涼

散。口瘡者。赴筵散。通治俱用。龍腦。犀。唇病因火居。多涼藥必乘發

散。上唇屬腎。下唇屬心。脾熱。唇口燥裂者。瀉黃。有唇口緊小。不

鼻口症脈候

正傳曰。左寸浮緩為傷風。鼻塞流涕。右寸浮洪為鼻欬。回春曰。口

舌生瘡。脈洪疾速。若見脈虛。中氣不足。脈訣曰。左寸洪數。心熱口

苦。右寸浮數。肺熱口辛。左關弦數。膽虛口苦。倘若洪實。肝熱口酸。

附方

參蘇飲。參。蘇。芩。夏。陳。葛。枳。桔。草。前胡。

羌活湯。羌。防。辛。芎。芷。地。芩。草。蒼朮。葱。

菊花茶調散。見本卷頭痛。

黃連清肺飲。黃連。山梔。豆豉。

華澄加丸。薄荷二錢。荆芥穗一錢。華澄加二分。蜜丸。

辛夷消風散。辛夷。細辛。藁木。芎。芷。防。草。升。

蒼耳子散。蒼耳子。辛夷。薄荷。白芷。等分為末。服二

川椒散。川椒。細辛。芎。葛。桂。附。吳。萸。皂。角。

天真丸。人參。精羊肉。茯苓。山藥。當歸。黃耆。白。

星夏散。星。夏。辛。芷。芩。連。草。蒼朮。神。麩。

瓜礬散。瓜。礬。甘。遂。枯。礬。草。烏。灰。螺。壳。灰。麻。油。調。

瀉白散。見一卷火。

熱溼	勝溼湯 見一卷溼	熱	黃連
破酒	疏風散 荆 防 歸 芍 芩 草 薄荷 茯苓 燈草	熱心	黃連
赤	荆防瀉白散 瀉白散加 荆 防	熱脾	黃連
肺	清肺飲 見一卷欬	熱	黃連
粉	枇杷葉丸 枇杷葉八錢 黃芩四錢 花柳	熱	黃連
肝	小柴胡湯 見一卷溫	熱	黃連
熱	龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣	熱	黃連
熱	黃連瀉心湯 大黃 黃連	熱	黃連
熱	瀉黃散 見一卷火	熱	黃連
熱	清胃湯 生地四錢 升麻錢半 丹皮五錢 當歸 黃連	熱	黃連
痰	養胃進食湯 參 苓 朮 橘 陳 麩 草 麥芽 蒼	熱	黃連
腥口	加減瀉白散 桑皮二錢 桔梗錢半 地骨皮 炙草各一	熱	黃連
熱	母七分 日二服	熱	黃連
熱	滋腎丸 見一卷火	熱	黃連
熱	加減甘露飲 參 葛 薤 朮 苓 草 澤 木香 滑	熱	黃連
熱	涼膈散 見一卷中風	熱	黃連
熱	赴筵散 芩 連 梔 葉 薑 辛 等分 又方 銅錄	熱	黃連
熱	龍腦雞蘇丸 薄荷一兩六錢 生地六錢 麥冬四錢 蒲	熱	黃連
熱	人參 黃耆各一錢	熱	黃連
熱	瀉黃飲子 芩 芷 防 夏 升 枳 石斛各一錢 甘	熱	黃連

唇 苡仁湯 見五卷痺

類證治裁

卷之六

鼻口

詩

治通

附方

齒症主方 元參 丹皮 知母 白芍 甘草 地骨皮
炒黑升麻為佐 有風加荆芥 虛加杞子熟地 去山梔
穿腮毒 用消腫解毒之品 加紫花地丁甘菊 小便不
利 煎劑內加六一散 甚效

犀角升麻湯 犀角三錢 升麻錢半 羌 防各二錢二分
白芷 黃芩 白附子各六分 炙草四分

溫風散 歸 芎 辛 芷 華撥 葉本 蜂房各一錢
煎服

開笑散 白芷 細辛 良薑 草撥 川椒 香附 蜂房
等分 為末 水煎 含嗽 或擦之

涼膈散 見一卷中風

羌活附子湯 羌 防 升 芷 蒼 草 麻黃 蒼朮
生附子 僵蠶 黃蘗 有嗽加佛耳草

細辛散 荆芥 細辛 白芷 川椒 華撥 草烏 皂角
為末 擦之

玉女煎 見一卷溫

二陳湯 見一卷中風

加減甘露飲 見本卷口鼻

一笑散 川椒末 巴豆一粒 研成膏 飯丸 棉裹 安蛀孔

定痛散 辛 芷 椒 薑 歸 地 翹 連 桔 草
烏梅 苦參 嗽口 後咽下

升麻石膏湯 荆 防 歸 芍 翹 桔 芩 草 升麻
石膏 薄荷 燈心 熟甚加大黃

滋陰抑火湯 歸 地 荆 防 丹 草 知 藥 蒺藜
燈心

安腎丸 見五卷痺

清胃散 或作湯 見本卷口鼻

犀角地黃湯 見一卷溫

爛腐火胃虛腎火虛火實痛蟲痛蟲血瘀火痰邪溫

人中白散 人中白 兒茶 黃蘗 薄荷 青黛 冰片
吹走馬疳出涎口外

黃連解毒湯 見一卷溫

仙方活命飲 見五卷鶴膝風

六味丸 見一卷中風

還少丹 見一卷中風

補中湯 見一卷中風

腎氣丸 見二卷虛損

黃連湯 連 梔 歸 芍 地 麥 草 犀角 薄荷
水煎

清熱如聖散 翹 連 芩 莖 梔 柴 荆 枳 草 花粉
薄荷 燈心

琥珀犀角膏 人參 棗仁 茯神各二錢 犀角 琥珀
辰砂各一錢 冰片一分 蜜丸 麥冬湯下

龍腦破毒散 盆硝四錢 蒲黃五錢 馬勃三錢 僵蠶
甘草 青黛各八錢 麝香 龍腦各一錢

青黛散 連 梔 研 參 芍 丹 麥 朝 草 犀角
冰片 研 燈心 兼口唇加石膏 鬱痰加貝母

舌症主方 木通 燈心 兼口唇加石膏 鬱痰加貝母
便秘加元

明粉

舌墊方 荆 防 辛 芷 羌 獨 陳 香附 燈心

蒲黃散 螺蛳 炒蒲黃 研 參

涼血清脾飲 歸 地 芩 芍 防 翹 草 薄荷 石
菖蒲

炙甘草湯 見一卷中風

傷津血流血出墊舌

木舌重舌

類證治裁 卷之六

類證治裁 卷之六

齒舌

王氏風熱牙痛用辛涼解散荆芥薄荷梔梗山梔防風赤芍甘草

二服愈

房兒胃火牙痛用石膏煨研開水冲服隨手而效

瘡疔牙癰山情志抑鬱致患左下牙齦腫癢日久擗出多骨外科

用推車散不效腐孔血水淋漓近又寒熱食減神疲宜扶正為

要用潞參茯神白朮當歸熟地山梔白芍俱炒六七服效

劉 舌根腫自用黃連瀉心兩句後寸脉猶浮大舌邊紫泡咽腫

妨食耳痛乃上隤火風阻絡宜辛涼輕劑薄荷連翹桔梗山梔

鉤藤燈心苦丁茶葉菊葉竹葉心服愈

類證治裁

卷之六

齒舌

完

喉症論治

爛喉痧附

喉以納氣而通於天。咽以納食而通於地。會厭筦乎其上。以司開合。惟其為心肺肝腎呼吸之門。飲食聲音吐納之道。關係死生。為害速矣。經云：一陰一陽。三焦。結謂之喉痺。以君相二火。經脈並係咽喉。熱結則腫痺。痺者閉也。閉則痰塞以死。將發先三日。胸必不利。一二日腫痛。三四日勢定有形。第三日必發寒熱。或頭痛兼風寒者。須疏散。禁二便。其秘結係實火者。以重劑潤下。去其積熱。壯實者用硝黃。弱者但滋。大便行。乃可清利。上焦痰熱。清上若虛火便瀉。心脉數。腎脉微。宜滋陰降火。養金。其症喉痺為總名。有纏喉風。乳蛾。喉癰。喉疔。喉閉。蟻舌。喉杆等症。而纏喉風及

類證治裁

卷之六

喉

三

傷寒喉閉。症為尤險。

喉腫痛閉塞。為風痰鬱火熱毒。上攻之症。去風痰解熱毒。自愈。咽喉總絡。係肺胃。急清此二經之熱。牛蒡湯外如惡寒寸脉小。一時患者皆同。為天行邪氣。宜先表散。其病之由來有二。一者少陽司天。三陽之氣。民病喉痺。仲景用桔梗湯。一者太陰溼勝。火氣內鬱。民病喉痺。又太陰在泉。溼淫所勝。病喉腫喉痺。仲景用

其輕者可緩治。喉痺不可驟用寒涼。以痰實結胸。遇寒不運。

漸至喘塞不治也。其氣急閉塞欲死者。緩則立愈。或馬齒根煎湯下。

為壯。和急則用吹法。研砂騰華末。吹患處。或搗皂角水灌

醋含漱。急則用吹法。皂角末吹鼻噴嚏。亦開吐法。火或新汲水

湯。其輕者可緩治。喉痺不可驟用寒涼。以痰實結胸。遇寒不運。

漸至喘塞不治也。其氣急閉塞欲死者。緩則立愈。或馬齒根煎湯下。

為壯。和急則用吹法。研砂騰華末。吹患處。或搗皂角水灌

醋含漱。急則用吹法。皂角末吹鼻噴嚏。亦開吐法。火或新汲水

唐雄黃灌入即吐或鍼法用磁鍼於腫處刺血出若口紫鍼不
能入刺少商穴左右皆刺二分出血
或或掉頂心頭髮一扎力拔之其喉自寬又有陰虛陽浮痰結
於上脉浮大重取或瀉者作實症治必死加減八味丸喉痺連項腫
毒連消

喉腫大連項痛喉有紅絲纏緊且麻且癢指甲青痰壅肢厥
由平時多怒兩日前胸不利痰寒氣促症最急過一日夜目直
視齒噤喉響燈火近口卽滅此氣已離根不治治法如喉痺用
碧二丹頻吹內針法手足冷以水溫之鍼照海然谷四穴使血
加牛黃效更速針法出如珠若刺少商穴血出散而不收者不
治照海穴在內踝下四分轉骨陷中然
谷穴在內踝前大骨下陷中皆腎經穴也
乳有單雙有連珠單輕雙重多因酒色鬱熱而生單蛾生會厭一
類證治裁

卷之六

邊一日痛二日紅腫三日有形如細白星發熱者凶吹藥先
五金丹一後用金丹二俟大便秘如至三日喉中但紅腫
碧丹三內服喉症主方俟大便秘如至三日喉中但紅腫
無細白星卽是喉癰宜辨雙乳蛾生會厭左右兩邊俱有細白
星藥照前用左屬心右屬肝煎藥於主方內左加犀角右加赤
柴雙蛾則兼用之大便秘加枳殼元連珠蛾二白星上下相連
用藥照前或外用成吹藥加冰片
吹之內服三黃桔梗湯
爲虛火上炎肺受燥熱致咽喉生紅絲如哥窰紋如秋海棠葉
背紋乾燥而癢阻礙飲食雖不喪命不能速愈吹用碧丹時化
症主方加須戒憂怒酒色忌鹽醬及一切動風助火之物一月
可愈

喉紅腫而痛別無形狀因過食辛辣炙博厚味而發症屬胃大腸
二經重則寒熱頭痛犀角地黃湯吹用四五日可愈若鼻中出
攻膈
不治
因憂鬱氣滯血熱婦人多患之狀如浮萍畧高而厚色紫生喉
旁初起吹碧丹九金丹一後用金丹輕則半月重或經月亦須
守戒忌口

喉腫舌肥人感熱性躁者多患此犀角地黃湯加但須吹至舌根下
兩旁時刻勿間喉內吹用碧丹亦須勤吹凡舌下小舌爲蠶舌
連喉腫痛卽爲喉癰不痛者非癰大約蠶舌兼喉癰而發十有
六七其勢凶煎藥多加黃
連山梔犀角

卷之六

喉傷寒後發爲氣閉不通無形無聲難治喉項強硬目睛
喉極痛腫甘桔射干湯
此外又有咽隘痛由陰虛火炎者喉痺飲倍有喉中結塊飲食不
通者百靈丸重者有懸癰喉痛生上膈有紫泡如豆大川管腳
熱上搏者啓關有懸癰垂長咽中煩悶者枯礬鹽花研細有喉中
生肉者棉裏著頭蘸鹽有梅核梗塞咽中咯不出嚥不下因於七
情鬱結者四七湯有喉痛因於相火用涼藥不愈者六味丸加桔
黃有風火上鬱咽痛頭脹項腫當用辛涼者滑石連翹杏仁近世
喉病最重初起憎寒壯熱咽痛渴煩先宜解表務令透達或兼
清散若驟服寒涼外邪益閉內火益焰咽痛愈劇潰腐日甚矣至

丹痧透發已無惡寒等症則宜寒涼泄熱不宜雜進辛散煽動風火致增腫腐必至滴水下咽痛如刀割蓋此症由感風火溼熱時邪而發治法因風熱者主清透普濟消毒飲因溼熱者主清滲甘露消毒丹因痰火凝結者主消降清氣化痰丸去半邪透則痧透利膈湯清咽邪透則痧透然症有可治不可治其口氣作臭喉色淡黃或深黃者係痰火所致皆可治若爛至小舌及鼻塞目閉元氣日虛毒氣深伏色白如粉皮者皆不可治其愈後四肢痠痛難於屈伸者由火灼陰傷絡失所養宜進滋陰勿與痺症同治

尤氏曰凡喉痺屬痰喉風屬火總因火鬱而兼熱毒致生乳蛾等

類證治裁 卷之六

症治法去風豁痰解熱開鬱其症自詮若喉症初起寒戰發後身涼口不破碎又無重舌二便俱利不可悞認熱症皆由陰氣虛寒而發其痰即精神所化不宜去盡先以藥吹之使咽喉通即便服藥首劑發散和解第二宜溫補若三四日後再發寒戰或心痛骨脇肋痛半屬難治發時牙關緊急喉舌俱痛腫口碎而臭或有重舌或舌上起黃屑發後下午再發寒熱二便閉者即是熱症用石膏排毒散治之如起三四日後而寒熱者其症雖凶無害惟症未減牙關反不緊急不腫脹如無病人不治或舌腫滿口如胡桃如茄子並不治如以箸按舌則起白色去箸則生紅紫此其身內之血已死又或口有臭氣口渴氣急而多稠痰如桃膠者一頸俱紅

腫者紅帶紫而青帶白神氣短少者不語者面色少神愛坐低處者喉症無痰者傷寒患連珠蛾及喉閉者小兒口疳臭爛而黑者舌下紫筋下通於腎色白而腫者皆不治

附方

清上丸 熊膽 雄黃 薄荷 青鹽 硼砂 膽礬 蜜丸
 養金湯 見二卷失音
 牛蒡湯 升麻 牛蒡 黃藥子 元參 紫背浮萍 花粉
 通隘散 硼砂二分 兒茶 青黛 滑石 寒水石各一分
 桔梗湯 桔梗 甘草各三錢
 半夏甘桔湯 夏 桔 草

類證治裁 卷之六

喉痺散 荆 芫 桔 貝 草 元參 薄荷 僵蠶 前
 加減八味丸 八味丸見一卷中風 此加五味 減附子
 芩連消毒飲 即普濟消毒飲見一卷痰
 喉痺急方 火硝五錢 硼砂錢半 蒲黃一錢 冰片
 管即愈并治口疳 珍珠一分 馬末吹喉大吐痰涎數
 牙疳牙關緊閉者 十寶丹 海藥 薄荷 兒茶各一兩 甘草五錢 乳石三
 梅攀取大青梅切下圓蓋去核將攀研細入梅覆用圓蓋以
 竹釘釘好炭火煨之去梅取攀輕白如膩粉味極平酸收貯
 聽用 此方凡
 喉口疳疔可效
 金鎖匙 火硝錢半 硼砂五錢 僵蠶一錢 冰片一分
 雄黃二錢 研吹再刺少商穴

吹藥

碧丹煉藥 牙硝各三分 百草霜 硼砂各五分 薄荷末三分 燈草灰 冰片各一分 甘草二分 煉藥法 明礬研細傾入銀罐內 水半罐 入爐用浮炭火烘 以銅箸入擾無響塊為度 即將研細鎗砂投入 罐內十分之三 次將細研白礬砂投入 亦十分之三 少頃再投生薑末 逐漸投下 候響聲盡 照前投砂 少許 逐漸投完 待響聲出 罐口 高如 慢頭 而止 加炭燒至 藥乾 乃用瓦片 覆罐上 一 時取起 將 牛黃 少許 為末 以水五六匙 調滴 罐內 將罐 仍入火烘 乾 取 罐 淨 淨 地 上 七 日 收 貯 煉 藥 須 輕 鬆 無 聲 紋 者 作 此 即 名 玉 丹 最 貴 多 製 時 候 愈 久 愈 妙

煨燈草灰法 陳肥白燈草 鋪桌上 噴溼 將筆套用水溼管 以溼紙塞緊 一頭 將溼燈草 插入管內 以竹箸築實 再以溼 紙塞口 入炭火煨之 烟盡為度 取出管內 碗蓋之 去管口 紙 取 灰 黑 成 團 者 作 煨 時 勿 令 筆 套 炮 碎 則 不 堪 用 不 可 太 過 過 則 灰 白 無 用 不 可 不 及 及 則 不 成 灰 而 不 可 用 此 丹 最 輕 煨 時 又 難 得 法 須 平 日 多 製 得 用 可 也 此 即 名 元 丹 取 百 草 霜 燒 茅 柴 者 佳 須 近 鍋 底 者 用 若 錫 心 及 鍋 口 邊 者 不 用 須 刮 去 面 上 一 層 取 中 間 用 之 著 獨 者 亦 無 用

配藥法 印碧丹 每煉藥三分 加百草霜半匙 研細 次入燈 草灰一厘 研勻 如 五 灰 色 再 入 甘 草 末 三 匙 薄 荷 末 三 分 研 勻

卷之六

喉

三

再入冰片半分 研勻 入磁鉢 塞口 勿令出氣 此丹須當時配 合 如 過 五 日 即 不 堪 用 若 遇 陰 雨 一 日 即 無 效 如 欲 出 痰 加 牙 皂 末 少 許 吹 之

喉癢及單乳蛾輕症 單用碧丹 又名即效 若遇重症 須兼黃 藥 卽 金 凡 初 起 令 病 者 低 頭 開 口 溜 出 痰 涎 初 起 用 青 藥 九 分 配 黃 藥 一 分 吹 過 五 管 次 用 青 八 黃 二 再 次 用 青 七 黃 三 如 症 重 青 黃 藥 兌 半 用 至 吹 五 次 痰 涎 必 不 壅 然 後 用 青 四 黃 六 若 症 重 甚 用 黃 八 青 二 九 效 青 藥 消 風 痰 解 熱 毒 性 尚 緩 不 及 黃 藥 消 腫 除 熱 開 喉 痺 出 痰 涎 為 效 然 初 起 黃 藥 不 可 多 用 因 其 直 走 入 內 與 病 不 八 也

金丹 卽黃藥 蒲黃二分 硼九分 硼砂 冰片 薄荷 葉末各一分

吹藥

製硝法 馬牙硝長白厚大者 溫湯 煎過 搗細 抱乾 仍用紙 包好 放 灶 上 明 管 洞 內 自 乾 白 如 霜 配藥法 卽金丹 每牙硝一分 錢蒲一分 生用四分 研細 次下 薑 末 一 分 牙 皂 末 一 分 半 共 研 極 細 如 淡 黃 色 加 冰 片 一 分 研 勻 此 藥 可 留 久 惟 冰 片 時 時 加 用 可 耳

金丹能消腫出痰 若遇牙又蟻舌穿牙疔 皆用此治之 如咽 喉症 則兼用青藥 看症輕重用之 症重者 再加牛黃 如喉痺 及纏喉風 加僵蠶牙皂 餘只用牙硝 硼砂 薄荷 蒲黃 冰片 卽 可

喉症卽重 三日前未成膿 藥能消散 五日膿成 穿破 必爛成 窠 爛 處 須 用 口 疔 藥 多 龍 骨 珍 珠

口疔藥 薄荷葉研細三分 兒茶末二分半 製黃藥末一 厘 龍 骨 末 二 厘 白 芷 末 如 腫 痛 用 三 四 厘 如 不 腫 痛 用 二 厘 半 生 甘 草 末 用 五 厘 珍 珠 末 五 厘 冰 片 三 厘 研 勻 裝 餅 封 固 凡 遇 口 疔 及 各 種 口 疔 皆 效 若 初 起 腫 而 熱 甚 者 多 加 薄 荷 冰 片 取 其 辛 涼 發 散 也 若 患 不 腫 熱 甚 而 痛 則 以 長 肉 藥 為 主

長肉藥 卽前口疔藥 多用 兒茶末 龍骨末 配成紫色 毒小兒胎毒口疔 則本方加 牛黃 倍珍 珠 如 黑 爛 者 不 治 至 疔 疔 後 口 疔 非 此 不 除 則 去 黃 藥 龍 骨 加 牛 黃 五 厘 倍 珍 珠 末 六 厘

卷之六

喉

三

喉症煎藥主方 牛蒡子炒研 前胡 銀花 連翹 山梔 薄荷 燈心 甘草 枯苳炒黑 元參 桔梗 花粉 胸間加枳殼 泉水煎 如發寒熱 加柴胡 頭痛加石 菖 密調藥 薄荷葉末 為君 煉藥為臣 燈草末 為使 川貝母 為 草霜研和入 燈草末 再研後入 薄荷 貝母 先將煉藥百 勻成青灰色 用白蜜調 此方專治喉癢 喉疔 時 刻 噴 咽 內

連珠 服喉症前藥主方 此方一名青靈膏 成吹藥 水藥三分 兒茶二分 龍骨五分 青黛一分 再煎 麝香 附追風散方 牛膝 川烏 草烏 冰片 麝香 青黛 以上諸方皆尤氏秘傳方法名爲尤氏喉科世少傳 本識者 珍之

連珠 三黃桔梗湯 元參 連 水煎食後服 犀角地黃湯 見一卷溫 甘桔射干湯 桔梗二錢 射干 山莖根 荆 防 十四 元參各一錢二分 甘草五分 加竹葉

喉 燒鹽散 取橡斗大者實鹽滿壳燒存性以碗覆地入 麝香 少許研細點之 百靈丸 百草霜 蜜丸艾實大水化服

類證治裁 卷之六 喉

風熱 啓關散 牛蒡子 生甘草 水煎 梅核 四七湯 陳 苓 夏 樸 檳 蘇 青 枳 薤 麴 砂仁 益智 薑 噙化丸 冰片 射干 鍾乳粉 升麻 牙硝 黃耆 大 黃 甘草 生地 蜜丸 六味丸 見一卷中風 普濟消毒飲 見一卷痰 甘桔湯 見本卷頭痛 清氣化痰丸 星 夏 陳 枳 杏 蕪 苓 茶 薑 汁 利膈湯 銀花 荆 防 芩 桔 連 梔 麴 芩 薄 荷 元參 防 桔 草 薄荷 犀角 柿霜 蜜 清咽太平丸 芩 防 桔 草 薄荷 犀角 柿霜 蜜 玉液上清丸 薄荷十四兩 柿霜五兩 桔梗四兩五錢 甘草三兩五錢 川芎二兩八錢 百藥煎五

類證治裁 卷六

牙疳 犀角丸 犀角 粉草 撲硝各二錢 桔梗一兩 赤花 蜜丸龍眼大每一丸薄荷湯下 喘治小兒走馬牙疳 三仙散 膽礬六分 牛生半炒 廣木香三分 熊膽三分 喉風口噤死在須臾以箸 開口吹入即愈 牙疳方 婦人溺桶中白垢火煨一錢 銅絲三分 麝香一 分五厘 各研和勻敷上立愈

藥敷 喉吹 牙疳

錢 防風一兩六錢 砂仁四錢五分 青黛三錢 冰片 元明粉 白礬砂各二錢 研細蜜丸艾實大 每服一丸 噙化不拘時候治風痰上壅頭目不清咽喉腫痛口舌生 疳服之生津液化痰涎 昔宋神宗患喉痺服此藥一丸立 愈

類證治裁 卷之六 喉

喉

房姪舌下地丁左畔畧腫誦讀勞倦則發渴煩紅腕悶痰稠呼吸不利脉沈少力或進寒涼藥腹痛食減此素稟陰氣不足神勞則五志火動脾氣困倦故痰氣壅而成痺也經言一陰一陽結謂之喉痺一陰少陰君火也一陽少陽相火也二經之脉夾咽循喉火動痰升結而不散其源總由腎陰素虛水不制火使然用六味丸熟地砂仁末丹皮炒酒加參麥貝膝藕粉蜜丸服而平尹氏久患梅核氣塞如梗妨咽不利非火非痰乃氣鬱為患用鬱金木香貝母桔梗陳皮栝葉皮甘草數服效

類證治裁

卷之六

喉

三

胸痺論治

胸痺胸中陽微不運久則陰乘陽位而為痺結也其症胸滿喘息短氣不利痛引心背由胸中陽氣不舒濁陰得以上逆而阻其升降甚則氣結欬唾胸痛微背夫諸陽受氣於胸中必胸次空曠而後清氣轉運布息展舒胸痺之脉陽微陰弦陽微知在上焦陰弦則為心痛此金匱千金均以通陽主治也金匱云胸痺喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉沈遲關上小緊數栝葉薤白胸痺不得卧心痛微背栝葉薤白胸痺氣結胸滿脇下逆搶心枳實薤白胸痺氣塞短氣栝葉薤白胸痺緩急者薤白附子心中痞諸逆心懸痛桂枝湯胸痺心背微背背微心烏頭赤石脂丸千金治胸痺達背痛細辛胸中

類證治裁

卷之六

胸痺

三

逆氣心痛微背少氣不食前胡胸中滿噎塞喉燥唾沫橘枳生應治中胸背閉滿上氣喘急下氣胸背疼痛散大約陽微者用甘溫栝葉薤白陰凝者用溫通理中飲逆者用辛泄吳茱萸辛滑栝葉薤白喘逆者用苦降枳實痺久者兼通絡旋覆旋轉上焦清陽疏利膈間痰氣不與胸痞結胸等症混治則得之矣
喻嘉言曰胸中陽氣如離照當空曠然無外設地氣一上則窒塞有加故知胸痺者陽氣不用陰氣上逆之候也然有微甚不同微者但通其不足之陽於上焦甚者必驅其厥逆之陰於下焦仲景通胸中之陽以薤白酒或栝葉半夏桂枝枳實厚樸選用對症

三四味即成一方。本但苦寒盡屏，即清涼不入，蓋以陽通陽，陰藥不得預也。甚者，用附子、烏頭、川椒、大辛熱以驅下焦之陰，而復上焦之陽。補天浴日，獨出手眼。世醫不知胸痺為何病，習用豆蔻、木香、訶子等藥，坐耗其胸中之陽，其議見亦相懸哉。

胸痺脈候

脈陽微陰弦，即胸痺痛。寸口脈沈遲，關上小緊，數陽衰，胃以上陰寒結聚。

附方

栝蒌薤白白酒湯 栝蒌 薤白 白酒
栝蒌薤白半夏湯 栝蒌 薤白 半夏

類證治裁 卷之六 胸痺 聖

飲邪 枳實薤白桂枝湯 枳實 薤白 桂枝 枳殼 枳實
寒虛 人參湯 參 朮 薑 草
利肺 茯苓杏仁湯 茯苓 杏仁 薤白
疏胃 橘枳生薑湯 橘枳 生薑
復陽 薏苡附子散 薏苡 附子
逆氣 桂枝薤白湯 桂枝 薤白 枳實
溫填 烏頭赤石脂丸 烏頭 赤石脂 附子 乾薑 川椒
散下 細辛散 細辛 甘草 各六錢 枳實 薤白 各二錢 酒服
氣下 前胡湯 前胡 枳實 芍藥 各二錢 參 歸 芍 各一錢
理氣 治中湯 見三卷飲食

下氣湯 杏仁 檳榔 童便煎
熨背散 烏頭 桂 附 羌 辛 芍 椒 為末綿裹熨
栝蒌白朮甘草湯 栝蒌 白朮 甘草
理中湯 見一卷中風
吳茱萸湯 見三卷嘔吐
桂枝加枳芍湯 桂枝 芍藥 枳實 芍藥
旋覆花湯 旋覆花 葱管 新絲

類證治裁 卷之六 胸痺 聖

胸痺

趙 有年胸痺食阻由舉重傷氣所致脈小弱是陽結欲閉之候
述數月前胸痛飲糜粥輒阻自謂膈噎已成今作胸痺治通其
腕中欲閉之陽參金匱法括蕪薤白桔梗杏仁橘白丁香用辛
滑溫通胸腕俱爽食入不拒竟進粥飯然病初愈恣意粉團乾
飯非高年祝噎所宜

馬 病後脈弦胸痛金不制木當節勞戒怒括蕪橘白白芍茯神
杏仁炙草煨薑二服愈

康氏中年腕痞食減不飢吐沫漸成胸痺乃上焦氣阻腑失通降
治者以為噎膈附用朮附菘樸燥脾破氣劫津漸致陰傷液涸

類證治裁

卷之六

胸痺

聖

大便不通下焦壅則上焦益加脹滿恐延關格重症矣宜辛通
苦降法蕪仁杏仁郁李仁貝母枳殼蘇梗鬱金汁薤白汁五七
服胸膈舒大便潤而食進

金氏諸陽受氣於胸中喻氏謂胸中陽氣所經如離照當空曠然
無外設地氣一上則晦塞有加今腕閉食脹清陽不旋濁氣失
降午後足腫陽益下陷矣用升清降濁桔梗半夏橘白升麻砂
仁枳殼茯苓加薑棗煎服愈

補 脈緩胸痺陽氣不舒用苓桂朮甘湯加砂仁殼數服效

蔣 胸右偏痛呼號欲絕日夕不能臥醫初疑胃氣疏香燥破氣
方不應改用乳香當歸延胡靈脂山氣分兼入血分乃益痛更

謂心痛徹背于問曾嘔吐否曰未也予謂痛不在心胃乃胸痺
耳症出胸中陽微濁陰上干仲景治胸痺喘息短氣用括蕪薤
白白酒湯通陽豁痰復加半夏正合斯症仍加橘紅一啜遂定

類證治裁

卷之六

胸痺

聖

心痛論治

心痛論治 心痛 心經附
心當歧骨陷處居胸膈下胃脘上心痛與胸膈痛自別也心為君
主義不受邪故心痛多屬心包絡病若真心痛經言旦發夕死夕
發旦死由寒邪攻觸猝大痛無聲面青氣冷手足青至節急用麻
附乾薑溫散其寒亦死中求活也若子臟之邪干心包致痛必應
散之屬云邪在心則心痛喜悲時咳休此包絡受邪在腑不在臟也
經云手少陰之脈動則病益乾心痛渴而欲飲此言支脈受邪在
絡不在經也經云厥心痛與背相控如從後觸其心僂僂者腎心
痛也九神保腹脹胸滿胃脘當心痛上支兩脇胃心痛也草豆蔻丸
湯如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也詞于散復色蒼蒼如死

類證治裁

卷之六

心痛

聖

狀終日不得太息肝心痛也金鈴子散臥若徒居心痛間動作痛
益甚色不變肺心痛也七氣湯加枳殼鬱金腎厥心痛由陰火
中焦寒逆肝厥心痛由火鬱血分肺厥心痛由上焦氣分不調經之論厥心痛以諸痛皆肝腎氣
逆上攻致之但分寒熱二種寒厥心痛者身冷汗出手足逆便利
不渴心痛脈沈細木附熱厥心痛者身熱足厥煩躁心痛脈洪大
全鈴子散凡暴痛非熱久痛非寒宜審經又云陽明有餘上歸於
清鬱湯心滑則病心痛生非汁和五苓散小茴香煎湯心痛引少腹滿上
下無定處洩便難者取足厥陰肝心痛腹脹蓄然大便秘不利取足
太陰脾心痛短氣不足以息取手太陰肺心痛引背不得息取足
少陰腎以上皆他腑臟之邪干心而致痛須加各腑臟藥治之金

類證治裁 卷六

區云九痛治九種心痛醫通曰九種心痛乃久客之劇症即腎水
乘心肺氣攻心等別名也痛久血瘀陰邪團結故用乾薑溫氣散
邪加吳茱萸驅之使從陰竅出藥雖峻利而改湯為丸取緩攻
不取急瀉也後人因分九種心痛曰飲惡心煩悶嘔水山停飲著
注也則小胃性日食飽悶噎敗卵氣由生冷食物過多也青皮丸
日寒外受寒宜溫散桂枝七內受寒宜溫利木附湯加寒久鬱則
成熱川山梔為熱藥導滯佐虛寒宜溫補歸脾湯加乾薑脾寒乘心
痛則心懸如飢泄痢下重五積寒客背俞則脈血滯注於心相引
痛桂枝七氣曰火痛不時發黃汁炒山梔少若熱鬱痛脈數口渴
便秘清中曰氣脈沈結或弦胸中氣壅攻刺服痛沈香降中氣虛
按之則痛定不應理中湯久服破氣藥太過脈大無力六君湯
曰血好飲熱酒血留胃口脈必滯或乳飲作呃手拈散加桔虛人
血瘀四物湯加桃仁穿山甲桂心降香曰悸心痛而煩發熱動悸此為虛傷長砂
散加味曰蟲面有白斑唇紅口沫能食九因蠅動則嘔痛有休
七氣湯曰疰鬼疰心痛皆憤妄言或猝倒口噤由感惡也蘇合
止烏梅丸曰疰鬼疰心痛皆憤妄言或猝倒口噤由感惡也蘇合
此為九種心痛若心痛脈微欲絕手足逆冷者桂心三錢煎服猝心痛脈
洪數者黃連三錢煎服若脈弦數木克土也小建中湯取芍藥
水侮土也幸於土中洩水大寒客心胸嘔逆不食氣上衝痛不
可觸近建中湯寒痛綿綿不絕草果厚樸凡按之痛減者氣虛也
按之痛甚者氣實也梔黃又有心癰發胸乳間一名井疽狀

類證治裁

卷之六

心痛

聖

按之則痛定不應理中湯久服破氣藥太過脈大無力六君湯
曰血好飲熱酒血留胃口脈必滯或乳飲作呃手拈散加桔虛人
血瘀四物湯加桃仁穿山甲桂心降香曰悸心痛而煩發熱動悸此為虛傷長砂
散加味曰蟲面有白斑唇紅口沫能食九因蠅動則嘔痛有休
七氣湯曰疰鬼疰心痛皆憤妄言或猝倒口噤由感惡也蘇合
止烏梅丸曰疰鬼疰心痛皆憤妄言或猝倒口噤由感惡也蘇合
此為九種心痛若心痛脈微欲絕手足逆冷者桂心三錢煎服猝心痛脈
洪數者黃連三錢煎服若脈弦數木克土也小建中湯取芍藥
水侮土也幸於土中洩水大寒客心胸嘔逆不食氣上衝痛不
可觸近建中湯寒痛綿綿不絕草果厚樸凡按之痛減者氣虛也
按之痛甚者氣實也梔黃又有心癰發胸乳間一名井疽狀

有痰中虛補虛血痛血痛血痛血痛血痛血痛血痛血痛血痛血痛

二陳湯 見一卷中風

理中湯 見一卷中風

六君湯 見一卷中風

手拈散 延胡醋炙 五靈脂醋炒 草薹 沒藥 每服三錢 酒下

四物湯 見一卷中風

辰砂妙香散 見四卷健忘

加味七氣湯 七氣湯加遠志 炙草各五分 茯神 菖蒲 各錢半

剪紅丸 莪朮 三稜 雄黃 木香 檳榔 乾漆 陳皮 大黃 貫仲 糊丸米湯下

烏梅丸 見三卷嘔吐

妙應丸 見三卷積聚

蘇合香丸 見一卷中風

小建中湯 見二卷嘔血去黃耆

大建中湯 見三卷積聚

參朮湯 朮 薑 陳草 荳蔻 砂仁 丁香各二錢 薑三片

梔莢丸 山梔 一兩半 吳萸 香附各二錢五分 生薑湯下

涼血飲 荆 薄荷 地 麥 芍 梔 翹 草 木通 瞿 薄 荷 花 粉 車 前 子 各 八 分 燈 心 十 條

竹葉二 十片

清心散 地 芍 麥 草 遠志 赤苓 知母各一錢 薑三片 棗二枚 加黃連尤妙

涼膈散 見一卷中風

內固清心散 白蔻 人參 硃砂 赤苓 雄黃 菴豆 枳 硝 甘 草 皂 角 各 一 錢 冰 片 麝 香 各

類證治裁

心痛

卷之六

類證治裁

卷之六

心痛

至

心痛 胃心 通胃心 痛胃心

一錢 每服

倉猝散 山梔連皮炒四十九枚 大附子一個炮去皮臍 為末 每三錢水一盞酒半盞煎七分入鹽少許服

愈痛散 五靈脂 延胡 蓬朮 良薑 當歸 等分為末 每二錢醋湯調下

心頭痛方 烏梅三個 元棗三個 杏仁七個 麝香一字 搗如泥 黃酒一杯煎 溫服

胃脘痛論治 胃脘痛附

胃脘當心下。主受飲食。若煩勞冷熱。致氣血痰食停滯。作痛。或肝氣犯胃。及腎寒厥逆。皆能致之。症與心痛相似。但胃脘痛必見胃經本病。如脹滿嘔逆。不食便難。面浮肢倦。與心痛專在包絡者。自別。治法須分新久。初痛在經。久痛入絡。經主氣。絡主血也。初痛宜溫。故以行氣久痛。則血絡亦痺。必辛通以和營。未可概以香燥例治也。其因胃陽衰而脘痛者。食入不運。當辛甘理陽。香砂六君湯。良因肝乘胃而脘痛者。氣衝腸脹。當辛酸制木。吳茱白芍青皮木瓜厚樸延胡金橘因腎寒厥逆而脘痛者。吐沫嘔涎。當辛溫泄濁。吳茱黃因煩勞傷氣而脘痛者。得食稍緩。當甘溫和中。小建因客寒犯膈而猝痛者。嘔

類證治裁

卷之六

胃脘痛

辛

逆不食。當溫中散寒。大建中湯。積寒致痛。脘脰不絕。無增無減。當辛熱通陽。木附湯。加火鬱致痛。發則連日。脈必弦數。當苦辛泄熱。薑汁炒黃連。山梔瀉火為君。香附川芎。陳皮枳殼。開鬱為臣。反佐炮薑。從治為使。痰積脘痛。必嘔惡。清中皮枳壳。開鬱為臣。反佐炮薑。從治為使。海石南。停飲脘痛。必吞酸。胃苓湯。食滯脘痛。必嘔腐。香砂枳木丸。氣鬱脘痛。必攻刺脹滿。沈香降。傷力脘痛。必瘀血停滯。鬱金歸尾。或手怒氣。脘痛必呃逆。胸痞。半夏瀉。或動脘痛。必有休止。安。或久不愈。必入血絡。歸。或失笑散。效。若痛而肢冷。脈微欲絕。桂心。甚。凡痛有虛實。按之痛止者。為虛。按之痛反甚者。為實。虛者。參木。實者。梔黃。痛甚者。脈或伏。用藥不宜守補。參。地。以痛則不通。通則不痛。故也。若膈間腫痛。不能進食。但喜水飲。或咽腫。人迎盛而

氣口緊者。當作胃脘痛治。

胃脘由熱毒攻聚胃口。而發。靈樞經曰。中脘穴屬胃。隱隱痛者。胃脘也。聖濟總錄曰。胃脘痛。不比肺癰之可認。苟不嘔膿血。未免他誤矣。其症氣逆於胃。脈必沈細。或陽氣為風寒所遏。不得上升。人迎必盛。人迎者。胃脈也。盛則熱矣。診得此脈。即胃脘痛之候。其人必寒熱如瘧。身皮甲錯。欬嘔膿血。若脈洪數。則膿已成。急宜排膿。如脈遲緊。乃屬血瘀。急當議下。否則毒氣內攻。腸胃并腐。如初起寒熱如瘧。欬吐膿血。射干。若風熱因結。唇口。動。積熱不散。清胃散。毒成未潰。內消。未潰毒盛。東垣。胸乳間疼。吐膿腥臭。牡丹。若在膈下。膿出大便。排膿。膿稀。太乙。

類證治裁

卷之六

胃脘痛

虛

虛者。八珍湯。加黃。青。忍冬。連翹。胃經穴人迎。在結喉兩旁。動脈應手。其脈見於左手。人迎盛則熱。聚胃口為癰。肺癰。效膿如米粥。胃癰。但嘔膿。以其結聚胃脘。從溼化也。凡舌胎經久不退。色黑垢膩。口甜氣穢。即胃脘發癰之候。用解毒散。加石。下盡宿垢。再以保元湯。調理可安。

胃脘痛脈候

弦為痛。滑為痛。胃脈微滑。為痰飲。滑實為宿食。沈緊為冷積。沈瀯為氣滯。數大為火。乳弦為血。忽大忽小。為蟲。沈小者。生。實大浮長。皆死。

附方

陽衰 肝乘 厥腎 煩勞 客寒 積寒 火痰 飲痛 火痛 川痛 類證治裁

香砂六君湯 六君加 木香 砂仁

枳壳煎 枳壳汁五匙 烏藥汁七匙 白芍汁二十匙 木香汁五匙 炒心土一錢 砂仁五分 二味煎

服之

吳茱萸湯 見三卷嘔吐

小建中湯 桂 芍 草 薑 飴 棗

大建中湯 見二卷汗

水附湯 見五卷痙

清中湯 見本卷心痛

胃苓湯 見一卷中風

左金丸 見一卷火

類證治裁

卷之六

胃脘痛

一

香砂枳朮丸 見本卷頭痛

沈香降氣散 見三卷鬱

手拈散 見本卷心痛

半夏瀉心湯 見一卷溫

安蛔湯 見三卷嘔吐

失笑散 靈脂 蒲黃俱炒 等分水酒煎

參朮散 參 朮 草

梔萸丸 山梔 吳萸

射干湯 射干去毛 山梔 赤茯苓 升麻各一錢 赤芍錢五分 白朮五分 煎去渣入地黃汁一合煎服

薏仁湯 薏仁 防己 赤小豆 炙草 等分

類證治裁 卷之六 胃脘痛 一

清胃散 見三卷衄血

芍藥湯 赤芍 石膏 犀角 麥冬 木通 枳殼 薤白 升麻 元參 甘草 薤白 芒 貝 陳 乳 沒

內消沃雪湯 甘草節 角刺 花粉 甲片 銀花各五分

水酒

東垣托裏散 銀花 當歸各二錢 大黃 牡蠣 花粉 四分 水酒 連翹 枳殼各六分 赤芍 黃芩各

煎 牡丹散 丹皮 地榆 薤仁 黃芩各錢半 赤芍 桔梗 升麻 甘草 敗醬各一錢

排膿湯 湯或作散見二卷肺癰

太乙膏 地 芍 歸 正 桂 元參 大黃各二兩 麻 油二助熬去渣再熬下黃丹

八珍湯 見一卷中風

類證治裁

卷之六

胃脘痛

一

涼膈散 見一卷中風

保元湯 見一卷火

胃脘痛

房叔胃脘痛脈細瀆服香砂六君湯去白朮加煨薑益智痛定後
遇勞復發食鹽炒蠶豆時止痛予謂昔人以諸豆皆閉氣而
蠶豆之香能開脾鹽之鹹能走血痛或時止知必血分氣滯乃
用失笑散一服痛除

巢氏素有胃氣或用溫胃之劑不效延至痛引背膈脈短滿予謂
短為宿食滯為氣中血滯宜疔痛無已也用延胡五靈脂酒當
歸紅麴降真香末痛止

史 脘痛日久血絡亦痺理用辛通當歸散延胡索橘絡香附枳
壳降香鬱金汁服效

類證治裁

卷之六

胃脘痛

五

張 操勞傷陽脈遲小胃口隱痛絲絲不已治用辛溫理氣製半
夏良薑金橘皮茯苓檀香歸鬚韭子炒一嘔痛止

薛 痛久熱鬱口乾內煩不宜香燥劫液詢得食痛緩知病在脾
之大絡受傷由忍飢得之甘可緩痛做當歸建中湯法炒白芍
二錢 當歸錢半 炙草一錢 豆豉半 橘白八分 糯稻根鬚五錢 飴糖熬三
數劑痛定常時食炒粳米粥嗣後更與調養胃陰杏仁麥冬白
芍當歸黃仁半夏青鹽南棗數服痛除

脇痛論治

肝脈布脇膈脈循脇。肩下曰臑腋。下曰臑。臑對腋。腋下曰臑。法下
下為。故脇痛皆肝膈為病。而膈附於肝。凡氣血食痰風寒之滯於
肝者。皆足致痛。氣鬱者。大怒氣逆。或謀慮不遂。皆令肝火動甚。清
湯。小龍。血瘀者。跌撲閃挫。惡血停留。按之痛甚。復元活。痰痛者。痰
飲流注。其經嗽則氣急。控涎丹。以二陳湯。食積者。食滯脇下。有一
條扛起。消食。風寒者。外感之邪。留著脇下。小柴胡湯。加左痛多留
血。右痛為肝邪入肺。為氣痰食。亦在右。風寒則不論左右。脇痛多
實。不可輕用補肝。致令肝脹。亦有虛痛者。補肝。怒傷者。香附。鬱傷
者。逍遙。初痛在經久。必入絡。經主氣。絡主血。有營絡虛寒。得食痛
者。散。

類證治裁

卷之六

脇痛

五

緩者。辛溫通絡。甘緩補虛。當歸桂。有肝陰虛者。熱痛盜乾。宜涼潤
滋液。三才湯加栝。有液虛風動者。脇氣動。宜滋液熄風。復脈湯
有鬱熱脹痛者。宜苦辛泄降。川棟子黃連。山。有因怒勞致氣血皆
傷。肝絡瘵痺者。宜辛溫通絡。芫花湯。加歸鬚。小。有痞積攻痛者。
宜辛散通瘀。桃仁鯁鯉。用乳香沒藥。有氣逆嘔涎。山脇攻胃者。用
酸泄和肝。木瓜白芍。金橘皮。按內經治肝不外甘緩辛散酸瀉。三
法。凡脇痛藥忌剛燥。以肝為剛。剛必以柔濟之。乃安也。
丹溪曰。肝苦急。是木氣有餘。急食辛以散之。用川芎。青。又曰。肝火
盛。兩脇痛。不得伸舒。先以膏。貼患處。以煎湯下。當歸。款引脇痛。
宜疏肝氣。用青皮。枳殼。香。兩脇走疔。控涎。

正傳曰凡脇痛皆肝木有余小柴胡湯加川芎青皮芍藥凡性急多怒之人常患腹脇痛小柴胡湯加川芎青皮

入門曰肝熱鬱則脇必痛發寒熱脇痛似有積塊必是飲食太飽勞力所致當歸龍肝氣實脇痛者煩燥不安臥

脇痛脈候肝脈搏堅而長當病墮若搏因血在脇下令人喘逆寸口脈弦脇痛拘急雙弦者兩脇痛肝脈沈之而急浮之亦然脇痛支滿引小

類證治裁 卷之六 脇痛

腹痛小便難得之有所墮墜脈沈滿氣鬱胸脇痛宜作鬱治

附方 清肝湯 白芍錢半 當歸 川芎各一錢 山梔 丹皮各四分 柴胡八分 蘆薈 歸 芍 梔 連 大黃 木

小龍薈丸 龍膽草 蘆薈 歸 芍 梔 連 大黃 木 復元活血湯 見二卷血

控涎丹 見二卷痰飲 二陳湯 夏 陳 苔 草

白芥子湯 白芥子 木鱉子 沒藥 桂心 木香 等分 消食丸 直 麩 青 陳 麥芽 萊菔子 香附 阿魏

小柴胡湯 見一卷溫

邪肝 積食 痛痰 飲痰 痲肝 鬱肝 肝

補肝散 地 芎 歸 芍 羌 防 香附湯 香附 歸 芍 柴胡 青皮

道遠散 見一卷火 當歸桂枝湯 歸 芍 草 薑 棗

三才湯 天冬 熟地 人參 復脈湯 見一卷中風

旋覆花湯 旋覆 枳 葱 琥珀膏 見三卷積聚

當歸龍薈丸 見一卷火 四物湯 地 芍 歸 芎

類證治裁 卷之六 脇痛

右脇 推氣散 片薑黃 枳殼 桂心各五錢 炙草二錢 每服

左脇 芎 枳 散 湯 調下 枳實各五錢 炙草二錢 每服三錢 宜

邪肝 積食 痛痰 飲痰 痲肝 鬱肝 肝

脇痛

某氏左脇痛臥必偏右欬則氣急痰帶血絲症由五志拂抑損傷

營絡做內經肝苦急急食甘以緩之潞參茯苓甜杏仁白芍杞

子棗仁川貝母俱炒桑皮蜜炙金橘皮炙草紅棗煎服效

沈氏氣攻肋脇左右上入乳際痛引胸背子夜特甚思人身氣血

於子丑時注肝膽子時注膽今肝陽上升諸氣皆逆勢必營衛

失度痰濁不降嘔逆便艱有自來矣用微苦微辛以泄降杏仁

當歸鬚青皮醋炒延胡鬱金枳壳炒栝藋廣木香汁二服隨定

室弟右脇久痛牽引背膊呼吸不利欬則痛甚坐必體偃食入稍

安右脈浮弦此操勞所傷損動肺絡當春木旺痛難遽止夫諸

類證治裁

卷之六

脇痛

考

氣膈鬱皆屬於肺然痛久則入絡姑用苦辛宜通老韭根當歸

鬚鬱金杏仁川貝母陳皮佛手柑二服痛減按其脇仍覺痞鞭

做鹹以軟堅用旋覆花牡蠣粉白芍金橘皮延胡當歸降香二

服轉用甘緩理虛以參苓歸芍陳貝甘草痛緩其親戚一醫以

為肝腎陰虛用熟地滋膩竟成單脹矣

郭 去秋肋痛痰血見症於肝不足於腎入春醫用通攝奇經未

效改用桂心蒺藜等藥平肝不知肝為剛臟藥忌剛燥痛宜益

加矣延至夏初木火相乘體虛食減日晡寒熱欬嗽氣促口乾

舌膩坐則脇背牽引刺痛脈來弦數無神症由情志不遂肝膽

寄居之相火上海肺金以至痰紅氣急日就羸怯此以承酒木

之法急宜進商也阿膠麥冬白芍貝母各二錢五味子五分斛黑

豆皮各三錢丹皮半錢二服寒熱止嗽痛減食加餐矣又令晨服燕

窩湯晚服生脈散症有起色

韓 右脇有塊梗起攻胸氣痺食少背脹引背此肝強胃弱升降

失和泄肝通胃可效厚樸枳壳杏仁蕤仁青皮旋覆花降香末

木瓜三服而不

類證治裁

卷之六

脇痛

考

腹痛論治 腹中窄狹附

人身背為陽。腹為陰。中脘屬太陰。小腹左右屬厥陰。臍腹正中。少陰。衝任經論。寒痛十一條。熱痛一條。寒熱痛二條。血虛痛一條。此泛言猝痛而腹痛。該之矣。其症有暴痛久痛。實痛虛痛。有痛在氣分。血分。在腑在臟。在經絡之辨。凡暴痛非熱久痛非寒。虛痛喜按。實痛拒按。痛在氣分者。攻注不定。在血分者。刺痛不移。痛在腑者。脈多弦滑。在臟者。脈多沈微。初痛邪在經久痛必入絡。經主氣。絡主血也。感寒腹痛者。氣滯陽衰。喜熱手按。脈沈遲。治在溫中。理中湯。感寒嘔痛者。氣虛兼痰。脈弦滑。治在健運。香砂六君湯。兼食者。腹中有一條扛起。利後痛減。脈沈滑。治在消導。香砂枳木湯。加神藥。

類證治裁

卷之六

腹痛

五

麥芽或寒氣滯痛兼脹滿者。治在溫通。排氣飲。加砂。胃虛肝乘吐。酸濁者。治在辛泄。吳茱萸湯。傷寒腹痛陽脈沉陰脈弦。治在甘緩。建中。太陰寒痛自利。脈沈細。厥陰寒痛肢厥脈細。當歸四逆湯。少陰寒痛四肢沉重。欬嘔下利。脈沈細。真武湯。外感兼宿食。或中暑霍亂吐瀉。藿香正氣散。胸腹絞痛上不得吐下不得瀉。名乾霍亂。脈沈伏。以燒鹽湯探吐。再服藿香正氣散。火鬱痛時作時止。熱手按而不減。脈洪疾。清中湯。服加梔芩。熱厥痛時作時止。金鈴七情氣鬱攻衝作痛。三因七氣湯。連芎鬱金。熱厥痛時作時止。子散。七情氣鬱攻衝作痛。湯五磨散。理氣不應。脈沈瀉痛如芒刺。為血鬱。散。血虛腹痛飢勞必甚。藥甘草湯。加氣血虛寒腹痛脈微。按之溫之。必稍緩。大營煎。萬應疔。桂枝當歸。氣血虛寒腹痛脈微。按之溫之。必稍緩。理陰煎。萬應疔。病皆係肝脾絡血瘀結。失笑散。加歸。鬚桃仁。韭汁。若腎虛任脈為病。加龜版。凡

類證治裁 卷六

痛久必入血絡。非香燥可劫。治宜宣絡。旋覆花湯。加歸。死血痛。由血絡阻痺。桃仁承氣湯。積聚痛。由宿有癥瘕。木香檳榔丸。去大黃。跌傷痛。由血瘀脇腹。復元酒。積痛。由溼熱阻滯。藜蘆小腹痛。痛由經閉血滯。玉燭散。去硝黃。思傷脾氣。疝結悸痛。歸脾湯。怒傷肝火。痞結刺痛。柴胡疏肝散。蟲痛時作時止。有塊梗起。口吐清水。唇有紅點。脈乍大乍小。烏梅丸。加減。疝氣痛。必引翠丸。香橘散。腸疝痛。身皮甲錯。小便如淋。腹皮急。按之濡。左足屈者。小腸疝。皮散。十味排。中惡腹痛。霍亂吐利。蘇合。大抵腹痛寒淫為多。熱淫為少。以陰寒尤易阻滯陽氣也。腹痛氣滯者多。血滯者少。理氣滯不宜動。血理血滯則必兼行氣也。古謂痛則不通。通則不痛。故治病大。法不外溫散辛通。而其要則初用通腑。久必通絡。尤宜審虛實而。施治者矣。

類證治裁

卷之六

腹痛

五

腹中窄狹。醫通云。肥人乃是溼痰留滯。氣不升降。當行氣燥溼。越鞠丸。瘦人乃是陰虛火旺。熏蒸臟腑。當降火開鬱。逍遙散。左肥人。腹中輾轉有聲。須作痰治。二水。二氣虛者。加參。腹痛脈候。陰弦腹痛細小緊急。皆腹痛。濡滑為痰飲。短滑為宿食。沈瀉為死。血沈伏為氣滯。尺脈緊。臍下痛。弦急。小腹痛。痛甚者。脈必伏。大為病久。細小而遲者。易治。實大堅疾。緊數浮長者。難治。大病而喘。入中黑者。死。陰弦或緊。宜溫。沈弦滑實。可下。

附方

香砂理中湯 理中加 木香 砂仁

香砂六君湯 六君加 木香 砂仁

香砂枳朮丸 見本卷頭痛

保和丸 見二卷痰飲

排氣飲 見三卷積聚

吳茱萸湯 見三卷嘔吐

小建中湯 桂 芍 蕪 草 棗 飴

當歸四逆湯 歸 桂 芍 辛 草 通 草 薑

真武湯 見二卷喘

證治表

卷之六

腹痛

三

藿香正氣散 見一卷中風

六和湯 見一卷暑

清中湯 見本卷心痛

二陳湯 夏 陳 苓 草

金鈴子散 見三卷鬱

七氣湯 見二卷欬嗽

五磨飲 四磨飲見二卷喘 白磨磨名五磨飲

手拈散 見本卷心痛

芍藥甘草湯 芍 草 脈緩傷水加桂枝 生薑 脈洪傷

大營煎 見三卷關格

理陰煎 見二卷欬嗽

失笑散 見本卷胃脘痛

六味湯 見一卷沖風

旋覆花湯 旋覆 新絳 葱

桃仁承氣湯 見一卷疫

木香檳榔丸 見三卷積聚

阿魏丸 連翹 黃連各五錢 山查 阿魏各一兩 醋煮

復元活血湯 見二卷血

翹蘗丸 神翹 麥芽 枳實 白朮

玉燭散 四物湯加 大黃 芒硝 甘草

類證治表

卷之六

腹痛

三

歸脾湯 見二卷勞瘵

柴胡疏肝散 見二卷勞瘵

左金丸 黃連 吳茱萸

理中安蛔散 見三卷嘔吐

烏梅丸 見三卷嘔吐

香橘散 茴香 炒 錢 橘核 查肉 藿香 鹽水 炒 各一兩

立效散 查肉 一兩 川棟子 茴香 鹽水 炒 枳實 芫朮 錢 為末 山梔 薑汁 炒 青皮 醋炒 各五錢 吳茱萸 三

大黃湯 丹皮 栝蘗各三錢 桃仁 大黃 芒硝各二錢

牡丹散 見本卷胃脘痛

腸中惡六鬱利溼降火除痰

排膿散 見一卷肺癰

蘇合香丸 見一卷中風

越鞠丸 見三卷鬱

平胃散 木 樸 陳 草

逍遙散 見一卷火

二木二陳湯 見二卷痰飲

類證治裁

卷之六

腹痛

查

腹痛

夏氏當臍疝痛癩寒屢發痛來飲食都廢神色清減脈虛芤據述
服和肝調氣不應數年前曾以鴉片烟膠為丸服下痛止夫鴉
片能行下身經絡此症因藥阻絡滯為患况痛久人絡宜辛
溫以通之若但如回七湯因磨飲僅開氣分背賢謂經主氣絡
主血不分經絡安能應手用當歸續酒延胡小荷酒新絳桃仁
研旋覆花包服效
薛 寒熱欬嗽數日後小腹墜痛疑為腸瀉診脈浮弦全不沈數
乃絡虛氣聚非腸癰也用杏仁栝蒌茴香橘核當歸延胡 俱酒
木瓜二服全瘳

類證治裁

卷之六

腹痛

查

沈氏冬寒小腹痠聚左脇撐痛上攻胸背大小便不通脹悶欲絕
湯飲不下兼發寒熱脈短滑宜先導其瘀滯古云痛則不通則
枳壳桃仁 各二錢 厚樸 薑皮 延胡 酒歸尾 酒潤各 蘇桂
郁李仁 各二錢 沈香 酒汁 二服痛定二便通調惟左脇偶一隱痛
原方去桃仁歸尾蘇梗延胡加鬱金香附沈香改木香仍磨汁
沖服又將煎劑挂為細末服愈

肩背手臂痛論治

經曰背者胸中之腑。背曲肩隨。腑將壞矣。又曰肺病者喘欬逆氣。肩背痛汗出。又曰肺盛有餘。則肩背痛。風寒汗出。中風小便數。而欠氣。虛則肩背寒。少氣不足以息。溺色變。又曰邪在腎。則肩背痛。是腎氣上逆也。蓋肩背為太陽經所循。又為肺臟分域。凡太陽經及肺俞為病。固足致痛。而腎氣逆攻。亦足致痛焉。故肩背痛不可回顧。此手太陽經氣鬱不行。宜風藥散之。防風通肩背痛。脊強腰似折。項似拔。此足太陽經氣鬱不行。淫湯。如肺受風熱而肩背痛。痛。羌活。肺氣虛而肩背寒。補中益氣。腎氣逆衝。挾脊而上。攻背痛者。係督脈主病。治在少陰。

肩背手臂痛

類證治裁 卷之六

從腹而上攻背痛者。係衝任主病。治在厥陰。宜乾薑。川椒。桂枝。烏棟。傷溼。而肩背重痛者。當歸拈。寒飲伏結。肩背冷痛者。白朮附。素有痰飲。流注肩背。手臂作痛者。導痰。因於氣滯者。烏藥順。因於血虛者。秦艽薤。因營虛絡脈失養。風動筋急者。舒筋。陽明脈衰。肩胛筋緩。不舉而痛。宜調補絡脈。生青於朮。當歸。防風根。督脈。虛背痛脊高突。鹿角霜。杞子。歸身。薑黃。桑枝。甘杞子。橋絡。腎脈。虛背入珍湯。凡背痛。通用散。更須加防風。引經。肥人喜捶而痛減者。屬痰。宜除溼。運痰。兼補脾氣。六君湯。瘦人多山營弱。衛衰。宜調氣養血。聖愈湯加手。臂為手六經交會。或為風寒溼所搏。或因飲液流入。或因提挈重物。皆能致病。因風溼者。除溼。獨病湯加。因風

熱者。秦九地。因寒溼者。五價散。溼痺。經絡者。獨痺。肢節痛。臂不能舉者。舒筋湯。加油。骨痛筋攣。血脈凝滯者。透經解。痰飲。流入四肢。肩背手臂。痠痛。痲痺者。導痰湯。加薑。炒。中腕停痰。伏飲。脾不能運。臂不舉。脈來沈細者。指迷。茯苓。挈。重傷筋。臂痛。宜和氣。調血。十全。湯。血不榮筋者。四物。秦。手屈而不能伸者。病在筋。薏苡。伸而不。能屈者。病在骨。白朮。附。手。腫。痛。連臂。加桑枝。凡用。薄。片。子。能。引。至。手。臂。節。能。透。入。骨。節。丹。溪。治。臂。痛。以。二。陳。湯。加。酒。薑。黃。能。引。至。手。臂。節。能。透。入。骨。節。丹。溪。治。臂。痛。以。炒。黃。芩。蒼。朮。是。風。痰。溼。熱。兼。治。也。

附方

防風通氣散 羌 防 術 枳 芍 芎 翹
薄荷各五錢 桔 梗 黃 芩 石膏各一兩

類證治裁

卷之六

肩背手臂痛

突

除 溼 風 熱 升 提 傷 溼 寒 飲 痰 候 氣 滯 血 虛 營 衛

甘草 滑石各二兩 每服
羌活散 羌 防 辛 芎 枳 薊 芩 芩 草 蔓 荆
前胡 石膏 加薑煎

補中益氣湯 見一卷中風

當歸拈痛湯 見一卷溼

朮附湯 見五卷瘧

導痰湯 見一卷中風

烏藥順氣散 見一卷中風

四物湯 地 芍 歸 芎

舒筋湯 薑黃四兩 草 羌各一兩 歸 朮 赤芍 海

固皮各二兩 每服五錢 煎 水煎

勞力通用補脾氣血風溼熱寒溼痺痛類證治裁

八珍湯 見一卷中風

蒼黃散 薑黃四兩 炙草 羌活 白朮各一兩 每服一

六君湯 見一卷中風

聖愈湯 見一卷勞瘵

除溼蠲痛湯 一名除溼蠲痺湯見五卷痺

秦朮地黃湯 見五卷痺

加減五積散 見一卷溼

觸痺湯 見五卷痺

透經解壅湯 地甲片三錢 羌防歸 荆草紅花 蘇木 蟬蛻 天麻各七分 白芷一錢 連

翹 川芎各五分 水煎

類證治裁 卷之六 肩背手臂痛

指迷茯苓丸 見一卷痰飲

十全大補湯 見一卷中風

秦朮四物湯 見五卷痺

薏仁湯 薏苡 歸芍 麻黃 官桂 蒼朮 甘草 薑

二陳湯 見一卷中風

腰脊腿足痛論治 腰痠 腰僵 尻 膝 跟附

經云腰者腎之腑又云太陽所至為腰痛惟腎與膀胱相表裏故

腰在經則屬太陽在臟則屬腎經言腎經腰痛者因傷房勞也而

又為衝任督帶之要會其所由致痛者以腎氣本虛而風寒溼熱

之邪皆可乘虛而入即諸奇經亦多統繫焉凡腰脊痠痿縣縣作

痛并腿足痠軟者腎虛也遇陰雨則隱痛或久坐覺重者溼也得

寒則痛喜近溫暖者寒也得熱則痛喜近清涼者熱也閃挫痛或

跌扑損傷者血瘀也肝脾傷山憂思鬱怒者氣滯也負重致痛者

勞力也凡此皆屬標而腎虛為本詳其治法腎虛痛者多由房終

但察其既無表邪又非溼熱或年力衰頹或情志怫鬱或行立不

支而坐卧少可或疲倦無力而動勢益甚或面色慘晦脈候虛微

皆腎經不足也但腎陽虛者脈微無力小便清利神疲氣短宜益

火之源腎氣丸腎陰虛者脈洪而數虛火時炎小便黃赤宜壯水

之主地黃湯腎陰陽俱虛者脈虛而大宜水火平調藥丸其六

氣乘虛侵犯太陽如傷風腰痛症必寒熱脈必浮痛連背脊牽引

兩足湯加城傷寒腰冷如冰脈必緊得熱則減蓋附湯加肉桂性

傷溼由坐卧溼地或傷雨露身重脈緩天陰更甚腰溶溶如坐水

中宜茯苓皮木防己晚蠶沙滑石溼兼風一身盡痛羌活勝濕湯

厚樸草薢薏苡附子湯溼兼熱鬱久化火當歸拈風寒溼痺痛烏

瀝兼寒腹痛自利湯附瀝兼熱鬱久化火痛湯甘豆湯加如

頭三箇生搗為末少加鹽熱痛脈必洪數口渴便秘續斷天麻如

陰虛火盛。當滋陰降火。滋陰八閃。挫跌。扑諸痛。肝脈搏堅而長。兩尺實不可俯仰。復元通氣。若血瘀痛轉動如刺。大便黑。或秘結。湯。加紅花。桃仁。穿山甲。酒燻葱白。生薑。氣滯腰痛。脈沈弦。或結伏。山甲。延胡。素。大黃。外用。搗爛。罨之。尤效。柴胡疏。烏藥。順氣散。不肝氣失暢。臥覺腰痛。頻欲轉側。曉起則止。應入味。順氣散。肝氣失暢。臥覺腰痛。頻欲轉側。曉起則止。痰注。痛脈滑。或沈痛在一塊。導痰湯。加香。傷力。腰痛。大補湯。下。腰。朋如帶。束引痛。此帶脈為病。宜辛散其結。甘緩其急。用延胡。歸。小荷。沙苑子。痛久絡虛。宜調補奇脈。用核桃。當歸。杜仲。羊腰。或調肝散。鹿角。杞子。牛膝。補骨脂。老人。虛人。腎虧腰痛。不能轉側。宜二至丸。腰痠。屬房勞腎虛。宜峻補。若走精。六味丸。去澤泄。加魚。婦女。腰痠。六味丸。加。腰。乃熱。邪深入。血脈久閉。桂。少用。熱。附子。行。痛者。可治。不痛。久。廢者。不。

類證治裁 卷之六 腰脊腿足痛 主

可治。腰軟。溼。襲。經絡者。腎者。風襲。腰背者。牛膝。斷。喪。太過者。八。髓。脊者。督脈及太陽經所過。項脊常熱而痛者。陰虛也。六。常寒而痛者。陽虛也。八。太陽經脊痛。項強。腰似折。項似拔。活。勝。脈浮。緊。為。傷。寒。湯。沈。緩。為。風。溼。加。胡。湯。尻。乃。足。少。陰。及。督脈所經。兼屬厥陰。尻痛。屬腎虛者。七。味。丸。不。肥。人。屬。溼。痰。二。陳。散。二。妙。腿。足。為。足。六。經。所。至。痛。有。陰。虛。陽。虛。血。虛。血。寒。腎。虛。風。襲。寒。溼。風。溼。溼。熱。之。症。陰。虛。者。體。羸。足。心。及。股。脛。熱。痛。左。尺。細。數。或。兩。尺。數。盛。皮。加。肉。桂。陽。虛。者。足。浮。腫。無。力。大。便。瀉。左。尺。虛。大。或。兩。尺。浮。遲。脾。與。命。火。俱。衰。先。用。補。中。益。氣。湯。加。血。虛。者。足。不。任。地。行。則。振。掉。脈。細。弱。六。味。湯。加。續。命。湯。血。寒。者。筋。急。脈。沈。喜。近。湯。火。三。聖。

散。腎虛。風襲。則下體痿弱。骨節疼痛。尺中浮大而數。安胃。寒。溼。者。兩腿隱痛。或麻。頑。作。腫。身。重。肢。節。痛。脈。沈。者。白。朮。附。脈。浮。滑。者。除。活。湯。風。溼。者。腫。痛。走。注。獨。活。寄。溼。熱。者。或。上。或。下。或。紅。或。腫。溺。赤。脈。滿。數。當。歸。拈。更。有。腿。轉。筋。上。衝。入。腹。宜。瓜。詳。腳。氣。門。膝。者。筋。之。屈。伸。不。利。行。則。僂。俯。筋。將。憊。矣。其。膝。痛。在。筋。則。屈。不。能。伸。而。腫。多。扶。風。熱。二。妙。散。加。兼。陰。虛。則。熱。而。不。腫。丸。若。膝。脛。痺。弱。重。病。多。扶。風。溼。獨。活。寄。夏。月。溼。熱。腫。痛。當。歸。拈。屈。伸。不。利。丹。活。絡。虛。寒。兼。挾。風。溼。作。痛。虎。骨。四。虛。熱。筋。痠。顛。掉。作。痛。助。丸。足。跟。痛。屬。腎。陰。虛。者。腔。熱。跟。痛。六。味。丸。加。腎。陽。虛。者。不。能。久。立。丸。八。味。扶。溼。者。必。重。者。而。腫。換。骨。足。心。為。少。陰。腎。經。湧。泉。穴。所。注。足。心。及。踝。骨。熱。

類證治裁 卷之六 腰脊腿足痛 主

附方 腎氣丸 見二卷虛損 鹿茸丸 鹿茸焙去毛 兔絲子各一兩 硫黃五錢 為末 以羊腎兩對酒煮爛去膜研如泥和丸 鹽酒湯下 六味地黃湯 見一卷中風 滋陰大補丸 見五卷痿 無比山藥丸 熟地 黃肉 牛膝 茯神 巴戟 澤瀉 兩 肉苁蓉四兩 杜仲 兔絲子 山藥各三 蜜丸 酒下三錢 小續命湯 見一卷中風 葛附湯 炮附子 苓 朮 草 樸 蒼朮 杜仲 牛膝 乾薑 淡薤 棗

外用

鹿腰膏 川附尖 川烏尖 南星各二錢半 朱砂 麝香五分 雄黃 為末密丸龍眼大以薑汁化開擦 腰間 醫通有礙 俟無味 砂云以膏醮手掌每日飽後用 九烘熱摩腰痛處即以前 東定少頃 熱如火

滲溼湯 見一卷中風

腎著湯 見一卷溼

羌活勝溼湯 見一卷溼

獨活寄生湯 見一卷溼

當歸拈痛湯 見一卷溼

甘豆湯 黑豆二合 甘草二錢 續斷二錢 天麻一錢 加薑 水煎

滋陰八味丸 六味丸加 知 藥各酒炒

類證治裁

卷之六

腰脊腿足痛

復元通氣散 見本卷心痛

四物湯 地 芍 歸 芎

烏藥順氣散 見一卷中風

八味順氣散 見一卷中風

柴胡疏肝散 見二卷勞瘵

導痰湯 見一卷中風

十全大補湯 見一卷中風

青娥丸 骨脂 杜仲 等分為末以核桃肉研膏加煉蜜為 丸 每酒下四錢

調肝散 半夏一兩 官桂 木瓜 歸 芎 牛膝各五錢 細辛 石菖蒲 棗仁 炙草各三錢 每服四錢

加薑五片 棗二枚 水煎

腎虛

二至丸 桂 附 杜仲 骨脂 鹿茸 鹿角膠 麋茸 立安丸 牛膝 杜仲 故紙各四兩 黃藥 茴香各二兩 蜜丸 每服五錢 空心鹽酒湯下 桃仁承氣湯 見一卷瘵

牛膝酒 羌 苧 草 地骨 五加 薏仁 牛膝各一兩 海桐皮二兩 生地十兩 酒二斗浸

八味丸 見一卷中風

補髓丹 卽上青娥丸加 鹿茸

麻黃湯 麻 桂 杏 草

柴胡湯 羌活錢半 蒼朮 柴 桂 歸 芎 草各一錢 獨活 紅翅各五分 防風 防己各三分

七味丸 見一卷中風

二陳湯 見一卷中風

類證治裁

卷之六

腰脊腿足痛

一妙丸 見一卷溼

虎潛丸 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

舒筋三聖散 當歸 肉桂 延胡 為末每服五錢

安腎湯 骨碎補 草薢俱炒 牛膝 桃仁 海桐皮 當 歸 桂心 檳榔各五分 赤芍 附子 川芎 枳壳各三分

薑 棗 煎

水附湯 見一卷瘵

除溼羌活湯 見一卷中風

瓜蒌散 見一卷腳氣

活絡丹 見一卷痺

虎骨四助丸 見五卷痿

鹿茸四助丸 虎骨四助丸去附子虎骨 加鹿茸二具 見

換骨丹 見五卷鶴膝風

風 溼 熱 痰 滯

類證治表

卷之八

腰脊腿足痛

三

腰腿痛

孫 中年胃陽虛腰痛溶溶如坐水中形色萎不勝剛燥用溫養

少陰兼理奇脈杞子補骨脂核桃肉當歸牛膝酒續斷杜仲炒

沙苑子炒酒浸服效

歌 腹痛舊恙行走勞倦輒發今由少腹痛引腰臥則少緩服來

虛懷少神乃衝督經病用小茴香沙苑子補骨脂降香末杜仲

得汁核桃肉鹿角霜二服痛除

巢氏中年經斷兩尺扎弱下元先虧腰膝痠痛宜溫補下焦必月

事來乃望體安杞子熟地俱牛膝酒蒸當歸沙苑子兔絲餅茯苓

核桃肉十數服而如常

類證治表

卷之六

腰足痛

五

魏氏秋間崩漏數次腰膝骨熱曾用攝補而安今經止數月腰痛

由季脇控引少腹疑熱動將崩診脈左寸動胎也非瘵也痛

引季脇必帶脈虛為病按衝任二脈循腹脇夾臍旁皆絡於帶

而帶脈之病實太陰所主故素問言邪客太陰之絡令人腰痛

引小腹控眇不可以養息而王叔和謂帶脈為病左右繞臍腰

脊痛也宜治帶脈以固胎元如所服參耆地朮呆補不能入奇

經安望有效沙苑子杞子小茴香歸續斷杜仲桑寄生補骨

脂精稍根鬚數服痛止又用膏方而胎固

吉氏有年久嗽痰紅頭眩院悶欬則腰痛苦折少腹筋掣痛注右

腿艱於起坐臥必偏左脈左沈弦右沈弱症屬肝腎虧損但先

從氣分調補勿用血藥。滯膩沙苑子、橘核、當歸俱酒炒、杜仲鹽水拌、茯苓、砂仁、川貝、母、萸、霜、甜、杏仁炒、白芍炒、核桃肉、三服、痛止、嗽、稀、更、訂、膏、方、用、血、燕、根、猪、脊、髓、桑、寄、生、杞、子、核、桃、肉、製、首、烏、玉、竹、潞、參、當、歸、茯、神、洲、蓮、子、鹿、角、膠、收、膏、每、用、膏、六、錢、開、水、和、服、全、愈。

族兒小腹右偏痛直注大股正面側面而下至膝蓋止因行走勞頓寒熱痛發必是小腹先受寒襲於腿經故痛而發寒熱也宜溫通勿使成痺但在高年不宜過劑橋核酒炒、木香、木瓜、歸、鬚、牛、膝、小、茴、香、桑、寄、生、生、薑、葱、白、再、服、微、汗、而、痛、如、失。

類證治裁 卷之六 腰足痛 七

身痛論治

一身盡痛。凡傷寒、傷暑、傷濕、霍亂、陰毒、及一切寒淫、風溼、溼熱、內傷、寒熱、氣血、經脈、不和、諸症、皆有之。如傷寒、發熱、身痛、拘急、脈浮、緊、麻、黃、湯、或、九、汗、後、身、仍、痛、脈、沈、遲、桂、枝、加、中、暑、傷、氣、自、汗、身、痛、味、羌、活、湯、清、暑、益、中、溼、身、痛、身、重、不、能、轉、側、脈、細、緩、在、裏、五、苓、散、神、倦、脈、虛、氣、湯、霍、亂、吐、瀉、身、痛、口、渴、溺、少、脈、伏、五、苓、散、陰、毒、身、痛、如、被、杖、而、青、咽、痛、霍、亂、吐、瀉、身、痛、口、渴、溺、少、脈、伏、五、苓、散、陰、毒、身、痛、如、被、杖、而、青、咽、痛、脈、沈、細、而、疾、升、麻、散、寒、溼、相、搏、但、頭、汗、出、背、強、身、痛、脈、沈、澹、甘、草、湯、風、溼、相、搏、一、身、盡、痛、脈、虛、浮、而、滿、除、溼、湯、溼、熱、相、搏、遍、身、煩、痛、脈、滑、而、疾、當、歸、拈、內、傷、勞、倦、兼、風、溼、身、痛、神、中、益、氣、湯、寒、熱、身、痛、胸、脇、不、舒、肝、血、虛、而、火、鬱、加、味、道、瀉、身、走、注、作、痛、或、經、脈、牽、引、但、

行氣活血。三、癩、凡、肢、節、痺、痛、屬、火、身、體、沈、重、屬、溼、拘、急、屬、寒、腫、屬、溼、遊、走、不、定、屬、風、痛、在、一、處、如、冰、冷、屬、痰、下、體、痛、而、溺、少、宜、分、利、五、苓、散、下、體、腫、痛、脈、浮、自、汗、惡、風、宜、泄、溼、兼、實、表、防、風、黃、尤、宜、察、其、兼、症、而、審、治、之、

身痛脈候

傷寒六脈俱緊為太陽表症。身如被杖。脈沈緊為陰毒。發汗後。脈弦遲身痛為氣血不和。一身關節盡痛而脈沈弦為中溼。肢體重痛微腫汗出惡風關節不利不可轉側。脈緩為風溼。遍身痛。脈弦小或滑大為氣血虛損。

傷寒 傷風 寒濕 中風 中氣 霍亂 陰虛 寒濕 風寒 濕熱 熱瀉 瀉注 走火 肝傷 內傷

麻黃湯 見五卷破傷風 桂枝加人參湯 見一卷傷風

羌活湯 見一卷傷風 去當歸

清暑益氣湯 見一卷暑 五苓散 見一卷中風

升麻龍甲湯 升麻 龍甲 當歸 甘草 川椒 雄黃

甘草附子湯 附 芍藥 除溼獨痺湯 見五卷痺

當歸拈痛湯 見一卷溼 補中益氣湯 見一卷中風

加味逍遙散 見一卷火 三痺湯 見五卷痺

防己黃耆湯 見一卷溼 類證治裁卷之六 身痛

類證治裁卷之六 身痛 羌 去

類證治裁卷之六終



類證治裁卷之七

丹陽林珮琴 蕤桐甫 著 男 芝林校

腸鳴論治

腸虛則鳴。寒氣相搏。或火激其水。腸亦鳴。經曰。中氣不足。腸為之。苦鳴。直六君子湯。加炙。又曰。脾虛則腹滿。腸鳴。飧泄。食不化。六君。子湯。加。又曰。腸中雷鳴。上衝。胸。邪在大腸。心湯。又曰。土鬱之發。腸鳴。而為數後。平胃散。加。又曰。熱淫所勝。病腹中腸鳴。氣上衝。胸。香。散。如。臟。寒。有。水。桂。茶。車。前。胃。寒。洩。瀉。湯。智。牛。益。中。火。激。動。其。水。二。陳。湯。加。湯。中。火。激。動。其。水。二。陳。湯。加。

附方

類證治裁卷之七

六君子湯 見一卷中風
 補中益氣湯 見一卷中風
 香砂六君子湯 六君子湯加 木香 砂仁
 半夏瀉心湯 見一卷溫
 平胃散 丸 陳 草
 亭蓀木香散 二苓 丸 澤 桂 為五苓散再加 蓀
 理中湯 參 丸 薑 草
 智半湯 益智仁 半夏各五分 蒼朮四錢 防風二錢
 益中湯 參 丸 芩 連 薑 枳 草

痰動 二陳湯 陳夏 芥草

類證治裁

卷之七

腸鳴

小大腸癰論治

小腸在臍之左關元穴患癰則左腿不能伸。大腸在臍之右天樞穴患癰則右腿不能伸。部位雖分為病相似治亦畧同。故金匱千金概名腸癰也。其症小腹痞腫按之痛小便數似淋發熱時自汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脈遲緊者膿未成可下之桃承氣湯。脈洪數者膿已成大黃牡丹湯。膿從瘡出或有出臍者惟大便下膿血者自愈。按小便數似淋或小便出膿血者為小腸癰大便出膿血者為大腸癰。從臍中出者為盤腸癰多不治。此症總因濕毒瘀血結滯腸內而成。其始發熱惡寒小腹滿痛反側不便或腿縮難伸即腸癰確候。其腹皮急按之濡不煩渴者屬陰寒牡丹散。

類證治裁

卷之七

腸癰

三

宜其小腹痞堅按之痛而煩熱者屬結熱大黃牡丹湯。或脈遲緊則膿尚未成急解毒大黃煎。若脈滑數則膿已成宜排膿太乙膏。如脈洪數小腹脹痛不食瀉瀉為膿壅滯宜疏通薏苡仁湯。有瘀血小腹硬痛四物延胡湯。若腹濡痛時下膿由元氣虛宜排膿藥中兼補益丹皮。或潰後痛甚淋膿不止由氣血大虧須峻補參耆地黃湯。凡患腸癰者不可驚驚則腸斷而死坐臥轉側宜徐緩飲食不宜過飽庶可保生。

腸癰脈候

腸癰之脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為營數則為衛衛數下降營滑上升營衛相干血為敗濁脈經。關內逢扎腸裏癰脈訣。

附方

桃仁承氣湯 見一卷痰

大黃牡丹湯 大黃 芒硝各一錢半 枳實 丹皮 桃仁 各二錢半 一方有冬瓜仁 服下有膿即出

無即下血

牡丹皮散 參 耆 苓 丹 薤 芷 歸 芎 天麻 官桂 甘草各五分 木香三分 防 芷 桔 樸 桂

內托十宣散 草 為末調以酒下三錢

通腸飲 忍冬藤 歸尾 角刺 花粉 乳 沒 芷 薤 草 或用黃占礬為丸

大黃煎 大黃 樸硝各一錢 丹皮 白芥子 桃仁各二錢 下後以參耆補托

太乙膏 見六卷胃脘痛

排膿散 耆 歸 防 芷 薤 草 銀花 甲片各一錢

類證治裁

卷之七

腸瘻

四

類證方表

卷之七

腸瘻

五

補峻痰血滯膿 薤苳仁湯 薤仁 薤仁各三錢 丹皮 桃仁各三錢
四物延胡湯 當歸 延胡各一錢 芎 芍 生地各五分 桃仁 紅花 牛膝各七分 水煎
參耆地黃湯 參 耆 苓 地 丹 黃肉 山藥 薑

腸瘻

李氏寒熱脈數少腹左偏痛引內癰數日一更衣左足不伸此小腸瘻也蓋小腸火腑由氣血壅滯經隧發為瘻毒宜先徹其在裏瘻熱則痛勢緩而瘻內消用大黃三錢 硝石一錢 歸尾半錢 赤芍二錢 桃仁一錢 數服痛減次用乳香甘草節金銀花連翹當歸木瓜薤米牛膝數服而消

疝氣論治

疝氣者。小腹墜痛。控引畢丸。見症於肝。而原於任脉。故經謂任脉為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。任起中極之下。上毛際。循腹即婦人經言七疝。衝、狐、厥、癩、癘、癧、癧也。經云。從小腹上衝心而痛。不得前後為衝疝。言氣上衝心。二便不通。能上而不能下。散。又云。肝所生病為狐疝。言昏則入腹。立則入囊。仲景用蜘蛛散。又云。黃脉土之至也。大而虛。積氣在腹中。有厥氣名曰厥疝。言脾受肝克。氣逆上升。實鑑當歸四逆湯苦棟散。又云。三陽為病。發寒熱。其傳為癩疝。言小腸膀胱之邪。傳為癩疝。囊丸腫大如栲栳。頑痺不仁。三層茴香。又云。脾傳之腎。病名疝。痕少腹寬熱而痛。出白言脾失運化。而傳

類證治裁

卷之七

疝氣

於所勝。則瘕聚成形。痛出白淫。烏頭梔子湯加橘核桃仁吳萸。又云。足陽明之筋。病癢疝。腹筋急。又云。肝脉滑甚為癢疝。言肝木乘胃。或至潰膿下血。荔枝核散。又云。腎脉滑甚為癢疝。又云。厥陰之陰盛。脉脹不通。為癢疝。言內裏膿血。外小便閉。加味通心散。此內經所謂七疝也。金匱論疝皆主寒。至巢氏分厥。厥逆。氣積。食冷。乍滿。盤。疝旁。疝下。腹痛引陰。七疝。張子和非之。別列寒水筋。血氣。狐癩。七疝。謂諸疝不離乎肝。以肝脉絡陰器故也。其曰寒疝。囊冷如石。陰莖不舉。實鑑當歸四逆湯。水疝。囊如水晶。濕癢出水。加味五苓散。去筋。疝莖痛筋急。或挺縱不收。龍膽瀉肝湯。血疝。狀如黃瓜。在小腹兩旁。通氣散。氣疝。止連腎下。及囊因怒氣脹。氣疝。狐疝。癩疝。治同丹溪云。自

素問而下。皆以疝為經絡有寒。收引則痛。不知始由濕熱。壅遏在經。又感外寒。濕熱被鬱。不得疏散。故痛。蓋醉飽則火起於胃。房勞則火起於腎。大怒則火起於肝。大勞則火起於筋。火鬱濕生。濁液疑聚。進入血隧。流於厥陰。肝性急速。為寒所束。宜其痛矣。宜枳實梔吳莫山。若濕勝成癩疝。加荔枝核。痛甚。加鹽炒。痛處可按。加士材論查生薑。寒則多痛。熱則多癢。濕則腫墜。虛亦腫墜。在血分者。不移在氣分者。多動。皆足補前。人所未備。今按疝症初起。必由虛寒。勞力致之。積久。腑絡阻痺。遂聚濕熱。川藥不離辛泄。苦降。以肝司疏洩也。其觸寒。驟痛。兼犯生冷。用荔枝散。若火注陰分。而為熱痛。必有熱症。熱脉或便閉。渴煩。宜大分清飲。若食積疝痛。近膈。必有塊梗起。立效。瘀血疝

類證治裁

卷之七

疝氣

痛在腹。必有形不移。金鈴子散。因怒動肝。腸脹。必墜入腹。宜木皮山梔香附。舉重傷力。氣虛。必下穿囊。舉元煎。火腑留邪。內行苦歸。鬚青葱管。腎囊流濕。外用湯熏。洗再用。灶心土炒熱。加川椒。小茴未拌勻。稍袋盛。氣聚絡虛。理須疏導。宜延胡。山甲。木香。歸安腎囊下。冷則易之。虛濁逆。法在溫通。宜乾薑。吳萸。茯苓。房勞疝發。溫攝下元。宜杞子。沙。子。茯苓。鹿角。筋結疝癩。治同木腎。宜穿山甲。全蠍。木瓜。草薢。茯苓。屢菴。蒼朮。當歸。筋結疝癩。治同木腎。歸尾。乳香。白芷。酒糊。丸鹽湯下。少腹偏墜。散結為先。山甲。茴香。研末。酒調下。陰丸。腫大。逐濕可效。荔枝核十枚。煨研。別有小腸氣。名曰氣疝。痛引腰膈。天台烏。火酒調如糊。服。效。氣名曰水疝。不得小便。加味五。又如奔豚。響疝。是氣水衝。突下。焦。丹溪用理中湯。去尤。加桂。心。茯苓。或一捏金散。或木通。川棟。各一錢。茴香五分。飛鹽酒調服。丹溪云。桂能泄奔豚。茯苓能伐腎邪。

若白朮則助土克水。丸癩兒疝。偏腫。由啼哭動傷陰器。用全蠍一錢。核桃肉一兩。蜜。大約疝氣上攻者。宜吳黃桂心。枳。下墜者。宜川。香附。木。按之大痛者為實。宜查肉。延胡。青。皮。不痛者為虛。宜。香。葫。蘆。巴。等。疝。處。寒。者。必。寒。積。宜。川。烏。胡。椒。官。桂。痛。處。熱。者。必。濕。熱。宜。山。梔。川。棟。木。通。夜。茶。莖。縮。者。宗。筋。受。寒。宜。沙。苑。子。菴。菴。補。骨。脂。等。疝。者。客。邪。在。腎。酒。黃。當。卵。大。小。上。下。不。常。者。屬。氣。分。飲。香。桂。囊。腫。脹。堅。頑。不。移。者。屬。血。分。硬。者。加。撲。粉。蓋。疝。之。上。攻。者。衝。病。下。注。者。任。病。偏。墜。者。小。腸。病。閉。癢。者。勝。脫。病。卵。癢。出。白。者。腎。病。餘。則。筋。急。囊。腫。痕。聚。濁。逆。肝。胃。病。為。多。日。久。沈。痼。虛。滑。正。氣。陷。邪。氣。留。行。立。穿。囊。頑。不。知。痛。下。焦。路。遠。藥。力。難。到。遂。成。宿。疝。迄。乎。無。子。

疝氣脈候

丹溪云。不痛斷房事及厚味。不可治信夫。

心脈搏滑急為心疝。肺脈沈搏為肺疝。腎脈肝脈大急沈皆為疝。肝脈滑甚為癩疝。心脈微滑為心疝。腎脈滑甚為癩疝。脈急者曰疝。痕小腹痛。經內疝痕積聚。脈弦急者生虛。弦小者死。經脈弦而緊。弦緊相搏。則為寒疝。正脈弦急搏皆疝。弦數宜清熱。弦緊宜溫經。兼浮宜汗。兼實宜下。弦細為寒濕。弦濡為濕熱。醫通。

附方

木香散 木香 陳皮 良薑 訶子 乾薑 枳實 各一錢
 蜘蛛散 蜘蛛 十四枚 微炒 桂心 五分 為末 每服一錢 白湯

疝

二香丸 木香 香附 各三兩 查肉 二兩 三稜 蓬莪朮 各一兩 黃連 炒 吳萸 橘 核 桃 仁 山 梔 各 五 錢

疝

寶鑑當歸四逆湯 歸尾 七分 附子 官桂 茴香 柴胡 茯苓 各三分 澤瀉 二分

疝

苦棟散 木香 川棟子 巴豆 炒 去 巴豆 茴香 鹽 炒 等 分 為 末 每 服 二 錢 酒 調 下

疝

蟠葱散 蒼朮 甘草 各一錢 三稜 莪朮 茯苓 青皮 桂 乾薑 各三分 其為末

疝

三層茴香丸 大茴香 鹽 炒 川棟子 去 核 炒 沙參 木 錢 空 心 鹽 湯 下 日 三 服 服 完 接 服 第 二 層 此 名 第 一 層 第 二 層 前 方 加 華撥 一兩 橫 榔 五 錢 九 法 如 前 再 不 愈 接 服 第 三 層 第 三 層 即 前 二 方 加 入 茯苓 四兩 川 附 一兩 九 法 如 前 此 方 雖 數 十 年 之 久 陰 囊 腫 人 如 升 如 斗

類證治裁

卷之七

疝

甚者大如枋枵 服之皆可除根

疝

荔枝散 荔枝 核 十四枚 燒 灰 食鹽 各一兩 川棟子 大茴香 炒 木香 為末 每服三錢

疝

酒調下 獨痛丸 延胡 一兩 川棟肉 茴香 各五錢 白頭末 燒 七 个 薑 汁 糊 九 青皮 木香 烏藥 各二錢 半 全 燒 棉 灰 調 酒 送 下

疝

烏頭梔子湯 川烏 頭 炮 梔子 炒 各三錢 水 二 鍾 煎 服

疝

荔枝核湯 荔枝 核 桃 仁 山 查 延 胡 苓 朮 橘 核 枳 草 見 三 卷 肝 火

疝

加味通心散 瞿麥 木通 芩 梔 枳 草 川 棟 加 味 五 苓 散 猪 苓 桃 仁 山 查 等 分 為 末 澤 瀉 八 錢 加 鹽 香 四 錢 肉 桂 錢 半 為 末 每 服 四 錢

八分 水煎

日三服

腎氣丸 見二卷虛損

龍膽瀉肝湯 見三卷請氣

復元通氣散 見六卷心痛

氣疝飲 黃連二錢用吳茱萸煎水浸炒 人參 白朮各一錢 白芍 陳皮各七分 甘草三分 薑三片

大分清飲 見四卷泄瀉

立效散 見六卷腹痛

金鈴子散 見三卷鬱

舉元煎 見三卷飲食

胃苓湯 見一卷中風

類證治裁

卷之七

疝氣

香橘散 見六卷腹痛

天台烏藥散 川棟子十個巴豆同炒 烏藥 木香 茴香 良薑 青皮各五錢 檳榔三錢 爲末每服

一錢 酒下

理中湯 見一卷中風

一捏金 延胡 川棟肉 全蠍 茴香 等分研末每服二錢 酒下

導氣湯 見三卷積聚

虎潛丸 見一卷中風

酒煮當歸丸 當歸 附子炮 茴香各一兩 川棟子酒煮 去皮核五錢 上四味以酒三升煮酒盡焙乾

入丁香 木香各三錢 延胡一兩 全蠍十四個 爲末 酒糊丸 酒下

聚香飲 乳香 沈香 檀香 藿香 木香 丁香各八分 薑黃 烏藥 桔梗 肉桂 甘草 延胡各四分

疝久

薑三片 棗二枚 香棟散 石菖蒲 青木香 荔枝核 川棟肉 草薺 未二錢 入麝香少許 茴香鹽炒研末 同熱酒 沖調 服

類證治裁

卷之七

疝氣

七

疝氣

李 疝病不離乎肝然經謂任脉為病男子內結七疝女子帶下
瘕聚皆奇經主之宿病不理奇脉病結不解合觸寒輒發動氣
有聲痛引辜丸宜導滯通絡做茴香丸小茴香核胡蘆巴延胡
俱酒 當歸鹿角膠和丸酒下效

王 由吞酸傳為少腹偏墜囊腫丸痛夫酸為肝鬱氣注下為疝
皆濕熱之邪經云邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛以肝脉
絡陰器也子和治疝用金鈴子散泄肝導逆與此頗符用吳茱
萸川棟子橘核茯苓青皮延胡青葱管木通數服而安

趙 疝發自下衝上猝痛下引辜丸此七疝中衝疝也經言督脉

疝證治教 卷之七

生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝用山梔川棟子
炒荔枝核橘核延胡俱酒 當歸赤芍降香夫暴疝多寒久疝多
熱導熱疏滯腫痛自已

王 腹左偏墜舉丸腫痛履息畧定乃舉重勞力所致蓋肝脉絡
陰器絡虛努掙氣穿入囊延久則成筋疝古人治疝必用辛香
流動之品以肝得疏泄其痛乃緩服藥兼宜節勞香附鹽升麻
小茴香橘核延胡酒焙絲瓜筋薏米長流水煎二服愈

呂 因勞偏墜脉軟弱少年宿疝補以升之潞參三錢鹿角霜炙黃
耆當歸杜仲熟地杞子焙各二錢升麻六分橘核酒續斷各錢薑棗煎
十服效

淋濁論治

腎有兩竅一溺竅一精竅。淋出溺竅病在肝脾。濁出精竅病在心
腎。同門異路。分別宜詳。內經論淋由於脾濕鬱熱。病源謂腎虛則
小便數。膀胱熱則水下瀉。數而且瀉則淋。瀉引痛。凡小腸有氣則
血則小便清。小腸有熱則小便痛。症有五石淋、勞淋、血淋、氣淋、膏淋也。石淋係膀
胱蓄熱。濁則莖中急痛。頻下沙石。如湯瓶久受煎熬。底結白碱也。
宜清其積熱。滌去沙石。水道自利。神效琥珀石淋初起。宜石琥珀
木通。或加蓋重則為石。輕則為沙。二神。勞淋有二。因思慮煩擾。負
重遠行。勞於脾者。補中湯加車前澤瀉。專因思慮者。歸脾。因強力入房。勞於
腎者。生地黃丸加麥冬五味子。老人精衰入房。濁瀉腹脹。牽引穀道者。腎氣血

淋濁 卷之七

淋熱甚搏血。失其常道。以心主血。與小腸為表裏。血滲胞中。與溲
俱下。須辨血瘀血虛。血熱血冷。如小腹墜。莖痛。脉沈弦而數者。為
血瘀。雞蘇散。或四物湯。脉虛弱者。為血虛。六味丸。加側柏葉。車前
散。如血色鮮紅。脉數有力。心與小腸實熱也。大分清飲。加生
色黯淡。面枯白。尺脉沈遲者。腎與膀胱虛冷。腎氣。血淋小腸熱甚
者。牛膝。山梔。生地。犀。血虛熱者。生地。三兩。黃芩。阿膠。血淋莖中痛
者。角。藕。節。車前子。淡秋石。宜之。或服薏苡根。氣淋。氣化不及。州都胞中。氣脹。少腹滿
痛。或日用黃。兩。絲。黃。湯。服。氣。淋。化。不。及。州。都。胞。中。氣。脹。少。腹。滿
痛。溺。有。餘。瀝。沈。香。散。如。氣。虛。加。杜。仲。牛。膝。氣。虛。下。陷。補。中。膏。淋
便有脂膩。如膏。浮於凝。而此腎虛不能約制脂液而下流也。沙散。海金
鹿角霜。丸。兔。絲。膏。淋。濁。不。痛。者。須。固。精。六。味。合。有。熱。淋。莖。中。痛。者。
子。丸。犬。沈。香。丸。

導赤散。加薑不痛而癢者。入味丸。湯艱澆如淋。不作痛為虛。加鹿
滑石。燈心。又有人氣虛成淋。補中益氣湯。又有寒客下焦。水道不快。先寒戰而
後溲便。由冷氣與正氣爭。則寒戰成淋。正氣勝。則戰解得便。是為
冷淋。腎氣丸。肉有過服金石。入房太甚。敗精疲髓。而成淋者。海金
有濕痰滲注而成淋者。湯。有淋而小腹脹甚。者滑利通陽。甚白
苗桂枝。歸尾。婦人產後成諸淋者。白茅湯。不論
兩頭尖。牛膝。婦人產後成諸淋者。石青淋。皆治。以上淋症治法。此
外有風寒濕客於胞中。氣不能化。胞滿而水道不通。按之內痛。而
溇者。為胞痺。腎著湯。亦溺竅病也。至赤白濁。山心動於慾。腎傷於
色。強忍不洩。敗精流溢。竅端時有穢物如瘡之膿。如眼之眵。淋瀝
不斷。山精敗而腐居多。亦有濕熱流注而成者。須分便濁精濁。濁

類證治裁

卷之七

淋濁

在便者。色白如泔。乃濕熱內蘊。山過食肥甘辛熱炙烤所致。苓朮
煎。或徒黃蘗。遠志。加當分精瘀精滑。精瘀者
煎。或在精者。相火妄動。或逆精使然。至精濁並出。牛膝。赤芍。
煎。或徒黃蘗。遠志。加當分精瘀精滑。精瘀者
細生。或血不及變精。乃為赤濁。遠志。加當分精瘀精滑。精瘀者
甘草。或血不及變精。乃為赤濁。遠志。加當分精瘀精滑。精瘀者
先理其離宮腐濁。古方用。繼與補腎丸。六味。精滑者。乃用固攝。
煎。濁久而滑。則任督脈必傷。須升固奇經。青囊。斑龍丸。或鹿茸。龜
脂沙苑。大法挾寒者。脈遲。草薢。分清飲。挾熱者。脈數。清心蓮子飲。
子茯苓。濕痰流注者。蒼朮。二心經伏暑者。四苓散。加香薷。麥冬。小便如常。
濕痰流注者。蒼朮。二心經伏暑者。四苓散。加香薷。麥冬。小便如常。
少頃澄濁在底。或如米泔色者。草薢。分清飲。稠粘如膠。莖中澇痛者。
湯。去積想心動。煩擾傷精者。加味清心。腎虛氣下陷者。補中。
桂附。積想心動。煩擾傷精者。加味清心。腎虛氣下陷者。補中。
濁症治法。此外有溺血症。其原因由於腎虛。無比山藥。去巴戟。從

非如血淋。因乎濕熱。但以痛不痛為辨。痛為血淋。不痛為溺血。
也。有白淫症。經言思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。發為
筋痿。及為白淫。宜降心火。牛膝丸。清
筋痿及為白淫。宜降心火。牛膝丸。清
痛不可忍者。乃山房事失節。宜便出。蓮子散。又精傷白濁。小便推出髓條。
淋諸。皆腎虛勝。肌生熱。故小水澇而不利也。治法初起。宜清解結熱。
疏利水道。通川五淋。不用補澇。淋而渴。屬上焦氣分。宜淡滲輕
藥。如茯苓。通草。燈心。瞿麥。清肺氣。以滋水之上源。淋而不渴。屬
下焦血分。宜味厚陰品。如知藥。滋腎。以泄水之下流。如肺燥
不能生水者。生脈散。心火及小腸熱者。導赤。肺脾積熱。移於膀
胱者。黃芩清。腎水虧小便赤澇者。加減。一沙淋。膀胱澇痛者。牛

類證治裁

卷之七

淋濁

湯加。勞淋。脾腎不足者。朝用。補中益氣。血淋。莖中熱痛者。夜秋
湯。秋石。勞淋。脾腎不足者。朝用。補中益氣。血淋。莖中熱痛者。夜秋
湯。溺澇不痛者。一味。琥珀末。薄。氣淋。臍下妨悶。木香。沈香。枳殼。
通。膏淋。乃精濁並出。精寒溺澇。故小便澇痛。初用。海金沙。散。若
不痛。須攝固其精。勿與通利。宜鹿角。霜。免。絲。子。蓮。黃。山。藥。芡。冷
淋寒。客胞中。欲溺。先發寒慄。腎氣丸。加。熱。淋。溺。赤。如。血。而。少。時
煩渴者。導赤。散。伏。暑。成。淋。六。一。虛。者。散。生。脈。因。怒。致。淋。沈。香。木。通。等。
因思慮成淋。歸脾。湯。暑。月。汗。多。津。液。不。降。湯。參。澤。妊。婦。病。淋。葵。子。
赤。莖中熱痛。如火灼刀割。溺濁。或赤或白。赤傷血分。白傷氣分。
也。赤濁。有溺。赤有血。赤其純見鮮血。當從溺血條治。法。見。若。溺
色黃赤。固多火症。然必赤而痛澇。兼見火脈。方可清利。若勞倦

傷中氣酒色傷腎陰。溺短久而無痛瀉等症。則係水虧液涸。不可清利。經所謂中氣不足。溲溺為之變。但滋補下元。氣化則水自清。加減六味丸。白濁有濁在溺者。白如泔漿。此濕熱內生。有濁在精者。由相火妄動。精離其位。不能閉藏。與溺並出。或移熱膀胱。溺孔瀉痛。皆白濁之因於熱也。久之則有脾氣下陷。土不制濕。而水道不清者。有相火已殺。心腎不交。精滑不固。而遺濁不止者。皆白濁之因於虛也。熱者當辨心腎而清之。虛者當求脾腎而固之舉之。

溺如泔為胃中濕熱下流。二陳湯加草薢。精濁如膏。乃精濁並出。瀉痛甚者。先清火。抽薪。久則瀉痛去。精濁未止。宜固攝。固陰煎。

類證治裁

卷之七

淋濁

胃中濕熱。濁痰下流。膀胱為濁。與腎無干。若奉。肥人多白。風如膏。心動即遺。或濁後遺。出皆精病。與濁無干。龍胆瀉心虛遺濁者。金。濁係濕痰。二尤二。瘦人多赤濁。保肝火。肝湯。心虛遺濁者。鎖。玉關。脾虛下陷者。補中益。心脾兩虛者。煎。虛寒帶濁者。五味。淋瀝濕濁者。威喜。濁久足膝痠弱。旋脚澄下如糊者。六味丸。加。莖中大痛。溺赤脈滑數。宜清熱利水。生地。麥冬。山梔。腎虛淫火。易動精滑粘膩如膏。丸龍丹。若忍精不洩。而成白濁者。四苓。丹。方治白濁。杞子。錢半。兔絲子。車前子。韭子。各一錢。蓮子。廿粒。共。三次。赤濁者。猪苓。並加。麝香。杜。以通瘀腐之在。隧竅者。有溺時。結塊。阻竅。作痛。塊中蓄水泡者。必醉酒。使內酒濕。乘虛襲入。精。竅也。治同。

淋症脈候

少陰脈數。婦人則陰中生瘡。男子則氣淋。盛大而實者。生虛小而。瀉者死。

濁症脈候

赤白濁。脈大而瀉。按之無力。或微細。或沈緊。而瀉為虛。動滑為實。尺脈虛浮。急疾者。皆難治。遲者易痊。

附方

神聖琥珀散。琥珀。桂心。滑石。大黃。膩粉。磁石。如聖散。馬蘭花。木通。冬葵子。燈心。湯下。加味葵子散。葵子。三兩。茯苓。滑石。各一兩。芒硝。半兩。肉桂。各二錢。半。為散。服方寸匕。

類證治裁

卷之七

淋濁

二神散。海金沙。七錢五分。滑石。五錢。為末。每二錢。入蜜。補中益氣湯。見一卷中風。歸脾丸。見二卷勞瘵。生地黄丸。生。地。黃。者。各一兩。半。防。風。鹿。茸。扶。神。五分。當歸。五錢。赤。芍。黃。芩。各一兩。人。參。一兩。二。錢。甘草。七錢。車。前。子。滑。石。各二兩。蜜。丸。腎氣丸。見二卷虛損。雞蘇散。雞。蘇。木。通。各二兩。生。地。滑。石。各三兩。每。服。四。物。湯。地。芍。歸。芍。六味丸。見一卷中風。八珍湯。見一卷中風。

血淋 血淋 血淋 血淋 氣淋 氣淋 精固 精固 火熱 火熱 濕熱 濕熱 產熱 產熱

益元散 六一散加辰砂

大分清飲 見四卷泄瀉

琥珀散 琥珀末二錢 車前根葉 燈心 薄荷 等分爲

柿蒂湯 黃蘗 黃連 生地 丹皮 白芍 側柏葉 木

沈香散 沈香 石葦去毛 滑石 當歸 瞿麥各五錢

王不留行五錢 爲末每服二錢

瞿麥湯 瞿麥 木通 大黃 黃連 桔梗 當歸 延

海金沙散 金砂 滑石各一兩 甘草二錢半 每服二錢

鹿角霜丸 鹿角霜 茯苓 秋石 等分糊丸每服二錢

兔絲子丸 兔絲子酒蒸 桑螵蛸炙各五錢 澤瀉二錢半

類證治裁

卷之七

六

大沈香散 沈香 陳皮 黃耆各七錢半 瞿麥三兩 榆

五錢 爲末每服

聚精丸 黃魚鱗膠一觔切碎蛤粉炒 沙苑藜熬八兩 馬

肉從蓉丸 從蓉酒蒸焙 熟地 山藥 石斛 牛膝 官

七錢半 細辛 檳榔各五錢 附子 黃耆各一兩 黃連

蜜丸 鹽酒下二錢

八味丸 見一卷中風

滲濕湯 見一卷中風

白茅湯 白茅根五錢 瞿麥 茯苓各一錢半 冬葵子

甘草五分 人參各一錢二分半 蒲黃 桃膠 滑石各七分

胞癰 胞癰 癰疽 癰疽 熱赤 熱赤 赤濁 赤濁 滑精 滑精 精病 精病 心脾 心脾

腎著湯 見一卷濕

腎瀝湯 麥冬 五加皮 犀角各錢半 赤芍 桔梗 桑

苓朮二陳煎 猪苓 茯苓 澤瀉各一錢半 白朮 半夏

徒薪飲 陳皮八分 黃芩二錢 麥冬 白芍 黃蘗 茯

遠志丸 遠志八兩 桑湯下

加味清心飲 茯苓 石蓮各錢半 益智 麥冬 人參

子各一錢 燈心二十莖煎服

虎杖散 虎杖三兩 古方用虎杖草汁今世不識代以杜牛

秘元煎 見四卷三消

兔絲煎 人參 山藥各二錢 當歸 棗仁 茯苓各錢半

類證治裁

卷之七

六

青囊斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 兔絲子 柏子仁

草解分清飲 益智仁 草薢 石菖蒲 烏藥各一錢 加

內補鹿茸丸 鹿茸 刺蒺藜 沙苑藜 肉從蓉 兔絲

黃耆 製附子 紫苑 蜜丸

清心蓮子飲 見一卷火

二苓清利飲 二苓 二冬 地 草 芩 蘗 牡蠣 澤

蒼朮二陳煎 二陳湯加 蒼朮

四苓散 見一卷濕

瑞蓮丸 茯苓 石蓮炒 生龍骨 天冬 麥冬 柏子仁

紫石英煨研 遠志 當歸 棗仁 龍齒各一兩

瀉白濁 淫白濁 髓條熱 淋熱 血分 肺燥 肺熱 腎虧 沙淋 類證治裁

乳香半兩 爲末蜜丸

無比山藥丸 見六卷腰痛

半苓丸 半夏 茯苓

便出髓條方 棗仁 參 苓 朮 茵香 補骨脂 益智

五淋散 茵陳 竹葉各一錢 木通 滑石 甘草各一錢

知藥滋腎丸 見一卷火

生脈散 見一卷暑

黃苓清肺飲 見一卷火

一陰煎 見二卷咳嗽

牛膝湯 杜牛膝 水煎加麝香

類證治裁 卷之七 淋濁

參澤湯 四苓散加人參 或再加甘草

葵子湯 冬葵子 桑白皮 木通 赤苓 瞿麥各一錢

加減六味丸 地 芍 枳實 車前子各五分 菟絲子各二兩 龍骨 牡蠣 澤泄各一兩

蜜丸

鹿茸地黃丸 熟地五兩 山萸酒炒 山藥炒各三兩 鹿茸一具酥炙 龍骨煨一兩半 蜜丸

二陳湯 苓 夏 陳 草

抽薪飲 見四卷痢

固陰煎 見二卷脫

元兔丹 兔絲子十兩酒炒 五味七兩酒浸 茯苓 蓮肉 各三兩 爲末 另研山藥末六兩酒煮糊丸

米飲

濕痰 肝火 虛心 虛寒 渴 濕 熱 攝 腎 赤 濁 瀉 瀉 瀉 瀉

二朮二陳湯 見二卷痰飲

龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

金鎖玉關丸 芡實 蓮子 蓮鬚 藕節 茯苓 茯神 山藥 等分爲末 金櫻子熬膏杵丸

五子丸 兔絲子 韭萊子 益智子 茵香炒 蛇床子去

威喜丸 茯苓 猪苓 黃蠟

六一散 見一卷溫

九龍丹 見二卷虛損

猪苓湯 猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉

丹方 杞子錢半 兔絲子 韭萊子各一錢 車前子五分 蓮子二十粒 入猪尿脬內煮加葱酒吸汁并食猪脬

二三次効

類證治裁 卷之七 淋濁

淋濁

三

淋濁

丁 血淋溺痛左寸脉洪數此心移熱於小腸搏於血脉入於胞中與溲俱下因熱熱迫注溺竅并莖中亦痛也當先清利火腑用導赤散加赤苓丹皮麥冬歸尾燈心木通一劑淋痛減後用生地茯苓歸身丹參遠志丹皮側柏葉鮮藕數服尋愈

周 遊幕縣署淋症失調哺後寒熱如瘧醫誤以為陰虛雜進補瀉病益劇又進散劑疑不敢服涕泣求診脉虛軟而浮用補中湯數服寒熱止淋亦漸廖後用六味丸加減而愈

王 二給役書館夜私出初便濁秘不言後乃不便自遺瘦怯不任起立常如欲溺狀或前欲溺而後亦不禁此濁久氣虛下陷也

或以瀉熱之劑與服病益劇子用升舉法佐以利濕升麻茯苓猪苓白朮半夏草蓮鬚蓮子做治濁固本丸意滑泄自止

貢 淋症愈而忽發色蒼形瘦食減便溏咽乾膝痛脉沈濡左寸稍大是心熱移於小腸而與濕相搏參茸藜分清飲赤苓生薏米錢各三 生白朮澤泄各八 石斛麥冬各二 防己甘草各一 草薢通草各錢半 滑石飛三 數服淋愈但脉來沈小食少足酸乃脾陽腎陰素虧宜兼調為治熟地杞子益智仁 煨 茯神甘草 薏米山藥蓮子俱歸身同研末加粳米屑調服日二次食進而足亦健步

岳 勞淋是膀胱氣分病近日大便秘結食頃必脹足脛冷診脉

弦而遲乃陰結胃氣不主下行而膀胱之轉輸不利乃為淋也治宜溫通勿進止瀉川附生朮縮砂壳陳皮白韭子萸仁蘇子俱炒 茯苓海金沙四服逆氣平脹秘良已脉亦和去川附萸仁加牛膝 蒸 蓮子服愈

江 溺前瀉痛莖端宿有瘀腐向服瞿麥湯痛減導火下行故也然脉來洪實搏指不特膀胱熱未盡抑且心腎根源未清故痛減淋不滅也宜收心節慾勿擾腎臟戒酒薄味靜養可安茯苓生地石斛草薢蓮鬚甘草梢燈心澤泄數服而效

王 便濁而數且痛午後寒熱不時頭眩神倦脉弱自秋延春兼溺血點乃勞力傷陰陰火迫注膀胱先用分利法導赤散加赤

或以瀉熱之劑與服病益劇子用升舉法佐以利濕升麻茯苓猪苓白朮半夏草蓮鬚蓮子做治濁固本丸意滑泄自止

族某勞淋初用分清飲瀉痛已減後服單方通利太過反致溺後精懸腰足痠輒畏冷左脉虛瀉少神腎氣不攝乃成虛滑攝固為宜沙苑子兔絲子杞子蓮子破故紙熟地 砂仁 杜仲數服而效後加鹿膠潞參歸身茯苓山藥乃固

睡 勞力傷陰脉右弦左大腹痛溺瀉出粉此為沙淋海金沙分六 杜牛膝一 當歸尾八 薏仁三 燈心八 赤苓二 小茴香 鹽水炒 數服甚適此溫通之劑能節勞則淋可不發

服瀉痛止去前三味加杞子沙苑子益智子 俱 炒 釵斛懷牛膝 蒸 數服甚適此溫通之劑能節勞則淋可不發

族某膏淋溺面浮油有時便中推出髓條此積勞損傷腎陰所致
宿恙經年近又兼病陰瘧真元日憊飲食無味益腎必先補脾
潞參茯神山藥生白朮薏仁杜仲芡實蓮子俱何首烏沙苑子
十數服全愈

陳 色蒼體長木火之質陰分易虧五旬外納寵急圓似續月前
因濁成淋溺數而欠著枕仍然遺泄延至血水滴瀝而痛是為
血淋精室既傷心火猶熾診兩尺左弦右數宜腰膝痠軟足心
如烙也夫不痛為溺血痛為血淋雖腎虛換火然導赤分清如
方鑿同柄五苓人正亦抱薪救焚急用生料六味作湯可濟然
眉熟地六錢生地三錢懷山藥炒二錢茯苓三錢丹皮澤泄各一錢生蓮子

類證治裁 卷之七 淋濁

不去心 蓮鬚麥冬各二錢 五味子五分 數服痛止淋滅湯丸兼進而
安

遺泄論治

凡臟腑之精悉輸於腎而恒擾於火火動則腎之封藏不固心為
君火肝腎為相火君火一動相火隨之而夢泄焉其交則心之神
肝之魂所幻而接也經曰恐懼不解則傷精時自下然有有夢而
泄者有無夢而自遺者昔人謂夢而後泄者相火之強為害不夢
自遺者心腎之傷為多且謂五臟有見症宜兼治終不如夢治
心無夢治腎為簡要也乃詳求所因則有心陽暗熾腎陰內燥者
宜涼心攝腎補心丹 有腎精素虧相火易動者宜厚味填精熟地
杞子羊腎猪香髓加減 介類潛陽龜甲牡蠣 山藥蓮子
青鹽五味子之類淡菜之類 佐以養陰固攝大實免絲
子桑螵蛇之類 有龍相交熾陰精走泄者宜峻補真陰承制相火三才封

類證治裁 卷之七 遺泄

腎丸大有用心過度心不攝腎者宜交心腎遠志丸佐 有思慮積
補陰丸靈砂丹 勞鬱損脾氣者宜舒養脾胃歸脾湯 亦有脾虛下陷者宜補中
虛不固者五倍子二兩 有積想不遂者宜安神固氣解鬱疏肝
妙香散吞 有精關久滑不夢而泄者宜固攝止脫桑螵散金
玉華白丹有 房勞過度下元虛憊寐則陽陷而精遺不禁者宜升固八脈之氣
固精丸或六味湯加鹿 茸免絲五味龍齒菴菴 有壯年久嘔精滿而溢者宜清火安神地
知母黃蘗首蒲 有陰虛不攝濕熱下注而遺者宜泄熱導濕黃蘗
遠志夜神蓮子有 黃蘗茯苓澤泄有 因醇酒厚味釀成脾胃濕熱留伏陰中而為夢
泄者宜清痰火二陳湯加 有因經絡熱注夜則脊心熱而遺者猪
心飲亦有鬼魅相感者其狀不欲見人獨言笑時悲泣脉乍大乍

小或脈線不知度數顏色不變。乃其候也。宜蘇合香丸。此其所因。不同為遺為泄亦異。皆當分別施治。大約陽虛者急補氣。鹿茸大。陰虛者急益精。大補陰丸。陽強者急瀉火而已。宜補陰瀉火湯。

遺泄脈候

遺精白濁當驗於尺結扎動緊。二症之的訣。

附方

天王補心丹 見一卷火

三才封髓丹 天冬 熟地各二兩 人參一兩 黃蘗三兩 炙甘草七錢半 麩糊丸 茯苓

酒煎

送下 滋腎丸 見一卷火

類證治裁

卷之七

大補陰丸 見一卷火

遠志丸 見四卷癰

靈砂丹 見二卷喘

歸脾湯 見二卷勞瘵

補中益氣湯 見一卷中風

妙香散 見二卷顛

玉華白丹 鍾乳粉一兩 陽起石煨 白石脂煨各五錢 左牡蠣煨七錢 糯米粉糊丸

桑螵蛸散 人參 茯神 遠志 菖蒲 桑螵蛸 龍骨 龜版 當歸 見本卷淋濁

金鎖玉關丸 見本卷淋濁

固精丸 牡蠣 兔絲子 韭子 龍骨 五味 桑螵蛸 白石脂 茯苓

六味丸 見一卷中風 秘精丸 白朮 山藥 茯苓 茯神 蓮子各二兩 茨實 前子三兩 共研末 金櫻膏丸 氣虛者加人參一兩

十補丸 者 朮各二兩 茯苓 山藥各一兩半 參 續斷 黃仁各二兩 五味 龍骨 杜蠟各七錢五分

二陳湯 苓 夏 陳 草 薑 猪苓丸 半夏 猪苓

清心飲 子 參 歸 地 草 連 茯神 棗仁 遠志 蓮 蘇合香丸 見一卷中風

鹿茸大補湯 菴蓉 杜仲各一錢 參 朮 桂 附 芍 鹿茸 五味各七分 歸 地 青 茶 鹿茸

各五分 甘草 大造丸 紫河車蒸搗一具 生地四兩 龜版 天冬 錢 五味五錢 牛膝 麥冬 歸身各一兩二

米糊丸 補陰瀉火湯 地 芍 歸 芎 朮 草 知母 天冬 滋陰降火湯 四物湯加 知母 黃蘗 元參

類證治裁 卷之七

濕導腎補

化痰

痰

迷

精

滑

鬼

魁

陽

強

瀉

火

遺泄

某 無夢而遺勞心輒泄乃心腎失交症用茯神丸參六味人參熟地茯神遠志當歸山藥蓮鬚棗仁五味龍骨蓮實糊丸服數料全愈

吉 已巳同會試前數日同寓約觀梨園座中遺泄如注歸寓後寒熱欬嗽吐痰此陰虛兼外感也合服補中湯寒熱退但脈虛而沈細欲絕斷為腎損難治粗畢場事神愈疲乏勞熱喘促痰嗽食減乃脾肺虛而氣不歸源也必用人參乃定彼吝費一友贈高麗參二錢子謂代用效誠自須全投書人參養榮湯去熟地與桂加茯神山藥蓮實彼又將高麗參二錢分作四服子哂

類證治裁

卷之七

遺泄

之服後喘熱減飲食頗加又兩服改用潞參而效更減矣

族某夢泄宿疴腰痛新兼腕痛脈弦細此傷精候也妙香散去黃耆麝辰砂加砂仁馬料豆服效

呂 少年未室每十日一夢泄積久疲乏面少神采素服滋陰飲滯等藥不效改服鎮心安神等劑亦不效予謂肝腎脈虛非相火為害但精關久滑氣少固攝耳詢之果有時無夢亦泄遂重用參耆佐以五味茯神山藥蓮子兔絲芡實杞子俱滑泄竟止更用丸劑加魚鱉炒研而固

幼姪背讀神勞即夢泄夜熱易飢左關脈搏按丹溪云主閉藏者腎司疏泄者肝二臟皆有相火而其系上屬於心心君火也

物而動君火動則相火隨之雖不交會精亦暗流矣又認府謂腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固故夢而精脫也先用六味湯加減熟地山藥茯神丹皮遠志潞參麥冬芡實蓮心石斛數服而效後加龍骨白芍五味煉蜜為丸服愈。此補肝腎參養心之劑君火安則神魂斂而龍雷不擾矣

劉 試場受驚心惕精走於下延為怔忡悸恐心君虛不主令相代其權乃至有夢無夢皆遺腰膝痠軟乏力診左寸沈數左關尺沈細如絲右尺微弦此心營損極神不攝精宜補養心神固納腎真經言恍惚思慮則傷神神傷則恐懼流淫不止又云恐傷心恐懼傷腎心腎失交精關不固必精生神神攝精乃能却病且情志之病尤在靜養善調

類證治裁

卷之七

遺泄

勿希速效潞參熟地茯神各三錢 龍骨山藥各二錢 棗仁遠志當歸各錢 金櫻子一錢 五味子柏子仁各六分 蓮子十二服甚適診左寸綿綿不絕惟尺澤空精腑少藏耳若滋填精室旬日內漏卮勿洩尺脈可起又夜半易飢便滑前方去當歸柏子仁熟地山藥焙用加魚鱉三錢兔絲餅二錢十服神安精固惟骨節時酸腸肉時悶坐臥恍惚如在波浪中此病後神未復元虛陽浮越也宜招集散亡封固管鑰更用潛陽填髓丸熟地八兩湖蓮芡實俱線膠淡萊茯神山藥各四兩五味一兩龜板遠志麥冬各二兩猪脊髓熟為丸又經云精不足補之以味午用猪心腎海參煨食晨用牛乳同糯米煮食調理數月漸安

陽痿論治 丸冷 莖縮 莖縱 強中 下疳附

男子二八而精通八八而精絕陽密則固精旺則強傷於內則不起故陽之痿多由色慾竭精或思慮勞神或恐懼傷腎或先天稟弱或後天食少亦有濕熱下注宗筋弛縱而致陽痿者蓋前陰為肝脈督脈之所經經云足厥陰之脈入毛際過陰器抵小腹又督脈起少腹以下骨中央入繫女子廷孔循陰器男子循莖又為宗筋之所會而陽明為之長此宗筋為氣血之孔道而陽明實氣血之化故見症多肝腎主病云傷色慾者須辨水衰火衰水衰真陰虧乏歸腎丸遺少火衰精氣虛寒右歸丸八味參鹿茸或加肉蓯蓉杞子若火衰不甚斷喪太過補骨傷思慮者心脾鬱結陽事不舉妙香散鬱傷少陽生氣日索加味逍傷恐懼者膽虛精却

類證治裁

卷之七

陽痿

大補元煎加先天精弱者房後神疲固陰煎胃虛食少者水穀不乘仁鹿角膠脾腎雙補丸七其濕熱傷及肝腎致宗筋弛縱為陽充精髓失旺福飲王母桃宜滋陰八味丸經謂腎欲堅急痿者如筋角近火則軟得寒則堅或龍膽瀉肝湯經謂腎欲堅急食苦以堅之也然必脈症果係濕熱方用苦堅淡滲若肝腎虛熱仍宜養肝滋腎他黃湯加龜板元又有心腎失交夢泄致痿遠志熟地棗仁白芍勞傷筋骨陽道痿弱無比山藥丸腎虛無子精冷精滑實美髯通治陽事不起如贊化血餘丹鹿茸地此治法大概也若夫元陽既傷真精必損必兼血肉溫潤之品緩調之如斑龍丸聚精之純用剛熱燥滯之劑恐有偏勝之害其審而裁之可耳冷陰痿弱而兩丸冷陰汗如水溺有餘瀝此肝經有溼柴胡勝腎

類證治裁 卷七

脈強大右尺尤盛此相火盛而反痿滋腎丸有陰莖內縮乃肝之筋受寒加參桂陰縱不收肝之筋傷熱酒炒黃蘗又強中症莖舉不衰精流不止或由肝火太强或由金石性發宜瀉火解毒用知母石膏元參夏子益奇疾方治玉莖長硬不痿精自出捏之脆癢如針刺未補骨脂家韭子各一兩研玉莖潰爛謂之下疳先用米泔水溫洗用爐甘石乳香血竭黃連各一錢輕粉五分米片一分研末搽立效

附方

歸腎丸 熟地八兩 山藥炒 黃肉 茯苓 當歸 杞子 杜仲鹽水炒 兔絲子酒浸炒各四兩 蜜丸 遺少丹 見一卷中風 六味丸 見一卷中風

類證治裁

卷之七

陽痿

右歸丸 見二卷虛損 八味丸 見一卷中風 補骨脂丸 補骨脂炒香 兔絲子酒蒸各四兩 蜜丸鹽湯下 兩 沈香錢半 蜜丸鹽湯下 歸脾丸 見二卷勞瘵 妙香散 見二卷飢 加味逍遙散 見一卷火 大補元煎 見一卷中風 固陰煎 見二卷脫 秘元煎 見四卷三消 脾腎雙補丸 人參 蓮子 山藥 肉蓯 五味 補骨脂 巴戟 砂仁 橘紅 肉蓯 車前 兔絲子

雙補丸 見三卷雙

七福飲 見三卷雙

玉母桃 冬白朮酒浸炒 熟地酒蒸杵 何首烏九蒸 杞子 戟肉 甘草汁浸炒 六味丸加 知 藥俱鹽水炒各三兩

滋陰八味丸 龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

遠志丸 見四卷癩

無比山藥丸 見六卷腰痛

大造固真丹 補骨脂 杞子各六兩 山藥 兔絲子各四兩 核桃肉 黃肉各三兩 巴戟 茯苓

人參 鹿茸各二兩 五味子 小茴香各一兩半 熟地 十二兩 於朮六兩 紫河車一具 蜜丸酒下

七寶美毒丹 赤白何首烏各一 觔黑豆拌蒸 茯苓乳蒸 牛膝酒蒸 當歸 杞子酒浸 兔絲子酒浸

類證治裁

卷之七

陽痿

三

各半觔 故紙芝蔴拌炒四兩 蜜丸 鹽湯下

贊化血餘丹 血餘燉八兩 熟地八兩 杞子 當歸 鹿 角膠 兔絲子 杜仲 巴戟 小茴香 茯苓 人參 茯苓 核桃肉 何首烏各四兩

鹿茸地黃丸 見本卷淋濁

三子丸 蛇床 五味 兔絲 蜜丸

青娥丸 見六卷腰痛

斑龍丸 見本卷淋濁

聚精丸 見本卷淋濁

斑龍二至百補丸 鹿角膠 黃精 杞子 熟地 兔絲 餅 龍眼肉 以上熬成膏加煉蜜調入後藥末 牛膝 楮實 參 膏 芥 地 黃 味 芡 實 山 藥 知 母 共 十 味 爲

類證治裁

卷之七

陽痿

三

驅濕 熱 陰 縮 和 解

末和前置 柴胡勝溼湯 升 柴 羌 茶 澤 草 黃 蘗 龍 膽 草 歸 尾 麻 黃 根 防 己 五 味 子 水 煎

滋腎丸 見一卷火 四逆湯 見一卷暑 小柴胡湯 見一卷溫

類證治裁

卷之七

陽痿

三

畜血論治

凡跌撲傷損及努力負重。忿怒氣逆。皆使瘀血停蓄。其症寒熱發黃。胸脇小腹滿痛。手不可近。宜分上中下治之。如吐衄停瘀。屬上部。必嗽水不欲嚥。犀角地黃湯。血結胸膈。屬中部。必燥渴譫語。桃仁承氣湯。少腹硬滿。大便黑。屬下部。必發狂善忘。抵當湯。代三焦畜血。必狂。便實。生地黃湯。蓄血初起。胸腹痛。香薷散。從高墜下。惡血留停。腹脇痛。不可忍。復元活。怒傷血滯。沈香降。胸前血瘀。童便服。挾血如見。崇狀。當歸活。身寒熱發黃。脈弦細而伏。千金用大黃芒硝歸尾桃仁。畜血下黑如漆。最危。必神脈不變。方可治。瘀血燥結。玉燭頭。而身體發黃。以絹包生薑。香擦之自退。

類證治裁

卷之七

畜血

附方

犀角地黃湯 見一卷溫 或加當歸 桔梗 陳皮 甘草 藕汁 紅花

桃仁承氣湯 見一卷疫 直蠱三十個炒 桃仁二十個

抵當湯 水蛭三十個熬 大黃酒浸三兩 見二卷血

代抵當湯 見二卷血 乾漆炒五錢 生藕汁半升 藍

生地黃湯 生地汁一升 葉一握 蜜蠱二十個 水蛭十個 大黃一兩

桃仁五錢 水煎 枳殼炒二錢 青皮 陳皮 烏藥

香壳散 香附炒三錢 蓬朮醋炒各一錢 歸尾三錢 紅花五分

炙草二分 生草三分 研末每服四錢

復元活血湯 見二卷血

沈香降氣散 見三卷鬱 當歸活血湯 歸尾 芍地 薑 桂 芥 枳 柴 草 玉燭散 見六卷腹痛 紅花

類證治裁

卷之七

畜血

溺血論治

溺血與血淋異。痛為血淋。山精竅不痛為溺血。出溺竅痛屬火盛。不痛屬虛。然經云胞移熱於膀胱則癰溺血。膀胱者惟房慾損腎。熱注膀胱。腎與膀胱相表裏。故血隨溺山亦火所迫也。其脈洪數法當滋化源。六味飲加如肺腎陰虛口乾腰痠。六味丸合小腸火盛血滲膀胱。導赤散。肝火脈洪不能藏血。龍膽草湯加法。膽火溺血頭痛眩暈。當歸。溺血日久腎液虛涸。六味阿膠飲。陰虛火炎一切溺血血淋。保陰。自利後瀝血點痛如血淋。小水不利赤濁淋閉。大分通治。湯。益母草搗汁一升。服效。槐花炒鬱金。治血淋。琥珀研細以燈。各一兩。研每用三錢。豉煎湯下效。治血淋。心薄荷煎湯下。二。脾虛不能攝血。久而滑脫。妙香散。去桔梗。煎。加煨龍骨。益智仁。

類證治裁

卷之七

溺血

美

附方

六味湯 見一卷中風

生脈散 見一卷暑

導赤散 見一卷溫

龍膽草湯 一味龍膽草煎服

當歸飲 當歸 羚羊角 赤芍各二錢 生地 刺薊葉各

六味阿膠飲 六味湯 加阿膠 童便

保陰煎 見五卷瘧

小蘇飲子 薊 梔 歸各一錢 地 藕節各錢半 滑石

大分清飲 見四卷泄瀉

化源 陰虛 小腸 肝火 膽火 液涸 虛火 血淋 閉

脾虛 妙香散 見一卷瘧

類證治裁

卷之六

溺血

便血論治 腸風 臟毒附

便血與痢血異。便血宿疾，痢血新邪，兼有膿血。與腸風臟毒尤別。便血火淫，腸風積毒。便血由腸胃火傷陰絡，血與便下，治分血之遠近。虛實新久，不可概行涼血。瀉血金匱以先便後血為遠血。黃土先血後便為近血。赤小豆當歸湯。其血色鮮稠為實熱，迫注多醇酒厚味釀成。約營煎色稀淡為脾胃虛寒。歸芍異功散。加炮薑。色瘀晦為陽衰不攝，因中寒食冷氣滯血凝，必腹痛嘔瀉。附子理中湯。倍炮薑。思傷心脾，氣不統血，或年衰病久。歸脾。惟初起血中伏火。用桂圓肉包鴨子肉。若未止，用劉寄松蘿茶一錢，烏梅肉一枚煎服。久而氣陷血脫。補中益氣湯。血滑不止。玉關丸。若面色萎黃，下元虛損。加味六君湯。下斷紅丸。或十全大補湯。去茯苓加防風。其結陰便血脈。

類證治裁 卷之七 便血

必虛瀉係厥陰肝血內結，腸失統運，滲入腸間。諸家謂陰寒內結非也。遵醫通補中益氣。宿有血症，因感濕熱，血下紫黑，乃濕毒腸。升陽益。凡便血及腸風服藥不效。山查散。大便燥結，肛頭血出。熟一兩。蒸食。腸風。血清色鮮，遠射四散如篩。風性疏也。經言久風入中則為腸風。飧泄。加減四物湯。加秦艽。腸風挾濕，下如豆汁，或瘀紫。升陽除濕。有熱加黃。若濕熱內蘊，下血腹滿。槐花散。初起血熱。槐花。久則連當歸。甘草。厚樸。血滑不止。前。脾脈浮緩，土虛風溼交乘。加味。兼挾寒濕。丸。血滑不止。前。脾脈浮緩，土虛風溼交乘。加味。湯。十全。腸風兼瀉。散。米豆。大補湯。腸風兼瀉。散。米豆。血濁而色暗，係溼熱蘊毒。輕者猪臟丸。酒毒醱溼熱下血。聚金。

類證治裁 卷七

若肛門血射如線，或點滴不止，為痔血。秦艽白朮丸。去皂角。積。實。澤。泄。加。槐。花。生。地。黃。丸。痔。與。痢。血。另。詳。本。門。

附方

遠血。黃土湯。附。地。芩。草。阿膠各錢半。灶心土如。近血。赤小豆當歸湯。赤小豆二升。浸出芽。晒乾。當歸三兩。研。約營煎。生地。赤芍。黃芩。地榆。續斷。甘草。槐花。地榆丸。見四卷痢。歸芍異功散。參。苓。朮。澤。陳。歸。芍。歸脾湯。見二卷勞瘵。補中益氣湯。見一卷中風。

類證治裁 卷之七 便血

氣陷。舉元煎。見三卷飲食。如兼消脫加。烏梅。文蛤。血滑。玉關丸。白麩四兩炒。枯礬。文蛤各二兩醋炒。五味炒。加味六君湯。六君見一卷中風。再加黃耆。柴胡。斷紅丸。側柏葉。續斷各三錢。鹿茸一具。阿膠為丸。虛下。十全大補湯。見一卷中風。虛。升陽益胃湯。炙者錢半。參。草各一錢。朮。歸。陳。煎。黃芩。神麩炒各五分。升麻。柴胡各三分。去。山查子散。查肉炒研。艾湯調下。血鮮者加山梔。槐花。風。加減四物湯。地。歸。芍。側柏葉各八分。枳。刺。草。烏梅二個。薑三片。

胃風湯 見四卷泄瀉

升陽除溼防風湯 防風二錢 蒼朮泔浸蒸 白朮飯蒸

槐花散 槐花二錢 蒼朮 厚樸 陳皮 當歸 枳壳各

槐花飲 生地三錢 當歸二錢 側柏葉炒 荆芥炒 槐

止加升麻 川芎 枳壳各一錢 炙草五分 如血不

厚樸丸 厚樸 生薑各四兩同炒 朮 麩 麥芽各炒一

惜紅煎丸 草 荆 芍 味 山藥 地榆 續斷 烏

米豆散 馬料豆炒 袖米 陳倉米 粟米 鍋焦俱炒研

猪藏丸 用猪藏二尺洗淨入 槐花二兩 紫緊蒸搗焙乾

藏連丸 黃連一兩酒炒研 槐花二兩炒研 陳倉米三合

聚金丸 黃芩 防風各二兩 黃連四兩半生半酒炒

秦茺白朮丸 秦茺 白朮 歸尾 桃仁各一兩 枳實

麩糊 皂角子燒存性 澤泄各五錢 地榆二錢

風 濕 熱 血 熱 寒 濕 血 滑 止 泄 毒 藏 毒 酒 毒 血

類證治表 卷之七 便血

便血

夏 便紅遇勞厥甚初服苦參子 俗名雅 以龍眼肉裏開水送下

十粒效後屢試不驗子按東垣論脾為生化之源心統諸經之

血思慮煩勞致心脾不司統攝宜用歸脾丸或暫服加味歸脾

湯其血自止如言而瘥 湯丸內俱 去焦白朮

幼姪鼻衄便紅寒熱無汗食減神疲脉大而數此脾肺氣虛陰火

乘絡致血從清濁道橫溢而出用補中益氣湯去升麻加山梔

白芍一服五更大熱比曉微汗身凉次日寒熱除脉頓斂三服

而病已 服姪壯歲便後瀝血色鮮乃腸胃遠血症屬腸風用升降法荆芥

類證治表 卷之七 便血

當歸俱醋 白芍槐米 俱酒 黑山梔生地甘草 炙 側柏葉三服愈

張 辛苦備作日夜便血數次山冬入夏未止陰絡已傷漸至食

減無味神色慘悴脉來沈細而數勢必寒熱延成損怯勉用攝

血佐以益脾以脾統血也做駐車丸 去黃 阿膠 水 炮薑當歸 土

白芍熟地甘草 俱炒 蓮子 炒 紅棗南燭子茯苓神三服紅痢減寒

熱亦止口中和據述腹不痛但裏急必連便二次此屬氣虛不

攝指出潞參系者茯苓山藥地榆 炒 赤石脂便血遂止

何 童年便血面黃瘦能食此脾氣鬱而生火也用清理溼熱山

梔赤苓生白芍生薏仁石斛當歸補骨 炭 陳皮地榆數服效

朱 春正痢血一載未痊陰絡大傷秋間三瘧歷冬曾用常山奴

1. 5. 1726 ...

劑未效面浮足腫食減神疲慄寒宵熱尿虛近數陰傷及陽延
成損怯矣今劑純紅日夜十數次即培陽攝陰尙恐不及乃閱
所服方仍用製軍輩屢次通裏是欲竭其漏卮乎毋怪愈治愈
劇也川潞參茯苓山藥白朮炒白芍甘草炙黑荆芥醋炒烏梅阿
膠煨一服血減明日不甚怯寒矣又加減十數劑瘧痢漸瘳

類證治裁

卷之七

便血

四

二便不通論治

腎主五液開竅於二陰。至前後不通。氣機閉塞。脹滿不食。氣逆喘
急。危候也。揆病所出。有因三焦熱結者。宜黃連黃芩山梔鬱。有因
三焦溼滯者。宜薏苡通草厚樸茯苓。有因溼熱阻氣者。宜石菖蒲石
郁李仁車。有痰隔中脘。氣痺上焦者。二陳湯加木通。有肺氣不降者。冬
前子木通。有胃實燥結者。小承氣湯分。有小腸氣痺者。小溫
杏仁通草。有胃實燥結者。清飲或涼膈散。有腑陽不行者。玉
亮知母赤茯苓。有厥陰熱秘者。厥陰用龍薈丸。有腑陽不行者。玉
丹半硫丸。熱藥多秘。惟硫黃性緩。有血液枯燥者。通幽。有氣虛
而通。玉壺丹半硫丸。皆取通陽之義。有血虛者。湯。有氣虛
血熱者。人參固。有陰囊腫脹。熱蘊便閉者。三白。按經云。女子督脉
入繫廷孔。男子循莖下。至纂。所生病不得前後。据此則二便不通。

類證治裁

卷之七

二便不通

四

又宜通奇絡。如桂心川棟子小茴香附。熱蘊腹脹。或用田螺加鹽
帛繫臍下一寸。當歸五靈脂桃仁麻仁等。熱蘊腹脹。或用田螺加鹽
三分。前後皆通。有因膀胱溺滿。支撐迴腸阻大便者。五苓散加溺
行便自出。亦有先通大便。水道自利者。圓機活法在乎審症而施
治焉。

大便有實秘。虛秘。熱秘。冷秘。風秘。氣秘。有陽結。陰結。仲景云。脈浮
不通。有實秘。虛秘。熱秘。冷秘。風秘。氣秘。有陽結。陰結。仲景云。脈浮
數。能食。不大便。為陽結。脈沈。遲。不能食。身重。大便反鞭。為陰結。
東垣云。實秘。熱秘。即陽結也。宜散。虛秘。冷秘。即陰結也。宜溫。氣
燥。以杏仁行之。血燥。以桃仁通之。風燥。以麻仁利之。氣滯。不通。
以郁李仁潤之。氣壅。便秘。以仁歸麻。開之。葉氏治腸痺。必開降
肺胃。如杏仁。栝蒌。冬葵子。枇杷葉。鬱金。汁。紫菀。以降。
肺胃。肺。半。夏。花。粉。竹。茹。橘。紅。枳。實。汁。薑。汁。以和胃。即丹溪開

上竅以通下竅之微旨也。今即其症分別言之。由胃實者善飲食小水赤七宣。由胃虛者不能食小便清利厚樸。由熱秘者面赤脈實數脹悶欲得冷四順清涼。由冷秘者面白脈沈遲欲得熱正氣散。加官桂枳殼香。由風秘者風搏肺臟傳入大腸潤腸。防風皂角或去。婦人風秘大風。由氣秘者氣不升降穀氣不行善噫蘇子降氣。由肺氣不通降失於傳送者杏葉枳椇。由三焦不和胸膈痞滿者搜風順氣。由大腸實者腹滿便難麻仁。由腎虛液少便燥者六味湯。去茯苓。由血熱便難者當歸潤。由風熱鬱滯者疏風潤。由血燥兼氣秘者潤麻。由血虛秘結者益。潤腸由津液枯涸者。五仁由幽門不通者。通幽由素有風病。

類證治裁

卷之七

二便不通

而便秘者皂角。由病後氣血未復及老人津液衰少產後去血多者入珍湯。倍當歸加菟蓉。由久病氣虛下陷致便難者補中。湯加杏蘇子杏仁阿膠黑芝麻。老人氣秘橘杏。老人血秘蘇。仁蘇梗老人陽虛風秘者。半硫老人氣秘。二仁老人血秘。麻仁粥又有脾約症傷寒陽明症自汗出小便數津液內竭其脾。為約用脾。攻蕩為治然亦滋其陰血為穩宜當歸潤。如陰寒秘結當用溫藥須暑加清潤以去結秘若病本虛寒標現躁熱亦宜於通陽藥中稍佐苦寒以去躁熱躁止勿加如陰躁刻欲就冷兩尺虛或沈細遲勿用寒劑理中湯。或不效用外導法蜜煎。五分皂角燒灰研五冷秘者。蜜煎中加草烏熱秘者。導之。又分和捻尖熱納肛中。冷秘者頭末和捻如上。熱秘者導之。又有求通努力虛氣迫注肛門裏急後重氣逆嘔惡不堪通利不

堪升提宜入參枳殼。或用川芎當歸煎湯。入穢風秘發寒熱何。首烏兩許當歸陳香櫟。或用桶乘熱坐熏之亦效。風秘發寒熱何煎加蜜服或用固本丸。失血後煩渴便結一味生地。血液燥結熟地蒸熱每。若輕用硝黃利藥則秘愈甚服五錢效。若經用硝黃利藥則秘愈甚不通經云。膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣三焦者決瀆之官水道出焉是知膀胱主藏溺必待三焦氣化乃能出水也詳列所出有肺燥不能生水者用清潤法生脈散加沙參。有氣閉不能通調水道以下輪者用探吐法以沈香木香陳皮枳。吐有氣虛下陷升降不利者。用升舉法補中益。孕婦胎重壓胞小水閉者用補中。氣升則水降如滴水之器開其上則下自通矣有火鬱小腸溺短而痛者。用清降法導赤散。有溼蘊三焦致

類證治裁

卷之七

二便不通

閉癢者用分消法通草滑石蘆根。有暑溼泄瀉氣不化水者用化氣法五苓。有溼勝而渴小水不利者用分利法四苓。有溼熱閉阻經府氣分致便不通者用宣通法。石膏杏仁厚樸防己大由腎水燥熱致不利者用滋清法。知母黃蘗黃有陽亢陰衰孤。陽不化者用補陰抑陽法。化陰若火不甚亢但由水虧者。用補水法大劑。經言無陽則陰無以生無陰則陽無以化熱在下焦而不渴服淡滲藥腹脹不通益甚者滋腎。其陰陽大虧氣不化者腎氣。溺閉轉筋喘急欲死者入味丸料。大劑其血結而致。閉者牛膝。痰盛而致閉者導痰。火閉者七正。氣虛溺不利者獨。湯少加。通治小水不通法用獨囊蒜頭數枚梔子三枚鹽少。或廣皮煎。通治小水不通法許爛搗攤紙貼臍上良久即通。或

川食鹽半斤炒諸藥不效者用白菊花根搗爛以生白又法用
川熱布包製之速壳搗如泥入麝香細研末
川螺一個速壳搗如泥入麝香細研末
少許置臍上以蛤蚧合之以息禁定效

大便不通脈候
脾脈沈數下連於尺為陽火脈沈細虛遲為陰右尺脈浮為風

附方

二陳湯 見一卷中風

小承氣湯 見一卷溫

大分清飲 見四卷泄瀉

涼膈散 見一卷中風

小溫中丸 見三卷腫脹

類證治裁 卷之七

更衣丸 分 硃砂五錢 蘆薈七錢 各研酒和丸每服一錢二

龍薈丸 見一卷火

玉壺丹 硫黃八兩 配麻油八兩微火熬以桑条攪候鎔盡
即傾入水去油面再鎔傾入豆腐內煮糯米粉為丸

半硫丸 製半夏 硫黃 等分蒸餅 薑汁和丸 治老人
虛秘冷秘

通幽湯 見一卷燥

人參固木丸 見一卷中風

三白散 白牽牛頭末一兩 桑白皮 白朮 木通 陳皮
各二錢半 研末薑湯下一錢

五苓散 見一卷溫

七宣丸 大黃 木香 檳榔 訶子皮 桃仁 研末蜜丸

厚樸湯 樸 陳 朮 草 枳實 半夏麴 薑 棗

四順清涼飲 見一卷火

潤腸丸 麻仁 羌活 大黃 歸尾 桃仁 蜜丸加 防

正氣散 見一卷中風

木香順氣散 木香 草薳 益智 蒼朮各三分 厚樸四
分 陳皮 青皮 半夏 吳萸 升麻 柴

蘇子降氣湯 見二卷失音

搜風順氣丸 大黃 麻仁 郁李仁 山藥 山黃 車前
牛膝 兔絲 防風 獨活 檳榔 枳壳

麻仁丸 見一卷燥

六味丸 見一卷中風

潤燥湯 見一卷燥

潤麻丸 麻仁 桃仁 生地 當歸 枳壳各一兩 蜜丸

益血潤腸丸 歸地 荆 枳 麻仁 杏仁 茯苓 蘇
子 蜜丸

菴蓉丸 菴蓉二兩 沈香一兩 麻仁汁糊丸 米飲下

五仁丸 桃仁 杏仁各一兩 柏子仁五錢 郁李仁 松
子仁各三錢三分 橘紅四錢 蜜丸

皂角丸 羌 防 杏 枳 陳 芷 桑皮 檳榔 麻仁
牙皂 蜜丸

八珍丸 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

橘杏丸 橘皮 杏仁 等分蜜丸

二仁丸 杏仁 麻仁 枳壳 訶子肉 等分蜜丸

蘇麻粥 蘇子 麻仁水浸研汁 和粳米煮粥

三仁粥 桃仁 松子仁 郁李仁 搗汁和粳米煮粥

脾約丸 酒蒸大黃 枳實 厚樸 赤芍 麻仁 杏仁

理中丸 見一卷中風

生脈散 見一卷暑

導赤散 見一卷溫

四苓散 見一卷暑

六一散 見一卷溫

化陰煎 二地 牛膝 猪苓 澤泄 黃蘗 知母 葦豆

滋腎丸 見一卷火

腎氣丸 見二卷虛損

八味丸 見一卷中風

牛膝湯 牛膝 桃仁 當歸 黃芩 水煎

導痰湯 見一卷中風

七正散 車前 赤苓 山梔 木通 曠草 升草 楸 蘆

閉火 盛痰 結血 急喘 化氣 陽陰 類證

大便不通

朱 八旬公車抵都途次委頓浹旬苦不得便脈洪大右尺虛子

謂大腸主液此陽明液乾熱秘象也宜潤腸丸因高年血液燥

熱做東垣潤燥湯用生熟地黃麻仁桃仁當歸紅花蜜冲服效

房兄病後便秘脈虛於潤補劑中參升降法潞參熟地黃當歸升

麻杏仁服愈熟地可加 倍兩許用

石氏老年風秘兼痔血腫痛脈洪而虛用滋燥養營湯加荆芥醋

地榆酒炒胡麻升麻菴蓉蒸煉蜜為丸服效滋燥養營 湯見燥症

李氏腑失傳送脇痛腕脹便艱皆氣機阻窒為患宜先導其腑氣

用杏仁蘇梗厚樸鬱金橘白郁李仁當歸四服痛脹止兼令服

牛乳便亦通潤後左脇鑽痛得湯浴則止乃肝氣滯由臟及腑

用麩皮炒熨兼用延胡酒炒白芍炒當歸金橘皮煎湯降香木香

俱磨而平

族婦大便旬餘一行或勸服大黃艱秘益甚兩尺沈大此清氣陷

下也用補中益氣湯去柴胡白朮加桃杏二仁數服而復常

類證治裁 卷之二 大便不通 見

小便不通

鄧氏陰虛陽搏謂之崩崩久成漏衝任經虛可知據述五月間因悲思血下成塊以後紅白相間至仲冬後淋瀝未止服藥不效近又少腹重墜兩拘掣痛如束小便至夜點滴不通或以爲氣阻窒痛用茜草歸鬚桃仁等通絡不應又以爲血虛滑脫用蒲黃石脂石英等鎮攝淋痛更劇脉沈弦子謂此症乃漏久而膀胱氣陷也通絡則漏卮益滲鎮攝則胞門益墜法宜溫而升之固以攝之於理爲近用升麻六分兔絲餅赤苓各三錢延胡當歸醋俱炒各錢阿膠棕灰各一錢茴香補骨脂俱酒炒沙苑子二錢一服得溺而掣痛止數服淋漏俱除

類證治裁

卷之七

小便不通

五

閉癰遺溺論治

閉者小便不通癰者小便不利遺溺者小便不禁雖膀胱見症實肝與督脉三焦主病也經云膀胱之胞薄以濡得酸則蹙縮約而不通水道不行又云膀胱不利爲癰不約爲遺溺此但主膀胱言之也夫膀胱僅主藏溺主出溺者三焦之氣化耳故經云三焦下膈並太陽正脉入絡膀胱約下焦實則閉癰虛則遺溺又云肝脉過陰器其病閉癰又云女子督脉入繫廷孔男子循莖下至纂病不得前後此閉癰遺溺所由兼責諸經也分言之閉癰爲實遺溺爲虛閉爲暴病癰爲久病閉則點滴難通全資氣化或疏通利竅或用丹溪吐法以升提其氣諸病閉治法已見小便不通論中此特詳癰癰治法癰爲滴瀝

類證治裁

卷之七

閉癰遺溺

五

不爽惟滋養真陰清熱化氣升提非所宜矣仲景云陰虛則小便難經曰陽入陰分則膀胱熱而小便難東垣云小便不通皆邪熱爲病治分在氣在血以渴與不渴辨之渴而不利或黃或瀉熱在上焦氣分也宜清肺氣而滋水源黃芩清肺飲閉而不渴熱在下焦血分也宜潤腎燥以導其流滋腎丸若服淡滲之味則陽無以化而陰愈閉窒矣其陰虛血熱渴而瀉痛淋瀝者導赤散或大便水瀉小便瀉少五苓散若溼熱傳於下焦水道不利益元散若氣機閉塞升降不通二陳湯去半夏加木通滑石柴胡升麻以提之若右寸數大肺燥不能生水是氣化不及州都生脉散去五味加左寸數大心火盛移熱於小腸天冬麥冬犀角或腎火衰水不能化金匱腎氣丸或元氣下陷宜升黃連赤茯苓

清降濁。補中益氣湯。或血瘀下焦。小便閉澀。當湯此治閉癰大概也。若遺溺一症。有睡中自遺者。有氣不攝而頻數不禁者。有氣脫於上。則下焦不約而遺失不知者。睡中自遺。幼稚多有。俟其氣壯乃固。或調補心腎自愈。冠氏桑螵蛸散。惟水泉不止。膀胱不藏。多是年衰氣弱。以氣為水。母水不能蓄。由氣不固攝也。宜參耆歸朮益智甚。至氣脫而遺失不知。惟類中風症。及大病後有之。宜獨大抵遺溺。失禁。由肺腎膀胱氣虛。肺虛。補中益氣湯。腎虛。免絲。膀胱虛。固脬。挾寒。家非。挾熱。白薇。滑脫。秘元丹。命火衰。右歸丸。治水。必先治氣。治腎。必先治肺。惟。一方。凡心肺腎之屬。皆宜有因恐懼。輒遺者。此心氣不足。下及肝腎而然。宜歸脾湯。或。下元虧損。固精。睡。

類證治裁

卷之七

閉癰遺溺

五

中自遺。多屬下元虛冷。宜蠅。然遺失不知。必交通心腎。冠氏桑。兒自遺。多屬熱。沈氏。間或因寒。關泉。去山。老人不禁。多虛寒。大免。子。間亦有熱。草。節。謂老人溺頻數者。由膀胱血少。陽火偏旺。宜滋腎中真陰。補膀胱津液。六味。加。戴氏云。老人溺多者。由下元虛寒。腎不攝水。以致滲泄。宜八味。生。其滴瀝不禁者。為真陽不固。宜固脬散。若不效。書。甚為陽虛。補中益。夜甚為陰虛。八味。脬氣不足。溺頻甚者。縮。夜間溺多者。八味。溺頻而少。為熱。宜滲之。四。散。頻數久而益甚者。屬脾虛氣弱。補中益。湯。加。若溺澀得補益甚者。為膀胱熱結。宜。茯苓。木。通。滑。澀而莖中痛者。屬肝腎溼熱。龍。湯。後。餘。屬腎氣虛。扶。益。

子。欲而遺溺。屬膀胱急。茯苓。甘草。湯。不。妊。婦。溺出不知。或由脬熱。加。味。道。或由脾肺氣虛。補中益。或。由。肝。腎。陰。虛。六。味。產。後。小。便。不禁。或由脬損。固。脬。丸。八。珍。湯。補。脬。飲。俟。飢。時。大。劑。飲。之。合。氣。血。驟。長。遲。則。難。效。產。育。不。順。致。傷。脬。或。收。生。不。謹。或。由。膀。胱。氣。虛。加。味。補。此。治。遺。溺。大。概。也。

胞。居。膀。胱。之。中。受。氣。化。以。藏。溺。出。溺。者。也。蓋。膀。胱。內。別。有。胞。得。氣。化。而。為。若。氣。痺。不。通。必。由。膏。梁。積。熱。於。上。作。強。傷。精。於。下。溼。熱。乘。虛。結。於。胞。中。故。痺。也。經。曰。胞。痺。者。小。腹。膀。胱。按。之。內。痛。若。沃。以。湯。澆。於。小。便。上。為。清。涕。蓋。以。膀。胱。既。虛。不。能。上。吸。肺。氣。肺。氣。不。清。不。能。下。通。水。道。所。以。痺。塞。不。利。得。熱。湯。之。助。則。小。便。澆。

類證治裁

卷之七

閉癰遺溺

五

澆。微。通。其。氣。循。經。蒸。發。肺。乃。暫。開。清。涕。亦。得。上。洩。矣。條。其。治。法。由。膀。胱。傷。溼。致。痺。而。溺。澆。者。腎。著。湯。由。實。熱。致。痺。而。溺。澆。者。子。丸。由。溼。熱。致。痺。而。溺。澆。者。腎。著。湯。由。虛。寒。致。痺。而。溺。澆。者。巴。戟。其。艱。澆。如。淋。不。痛。者。非。胞。病。屬。腎。陰。虛。六。味。丸。加。肉。其。老。人。精。氣。已。衰。猶。不。絕。慾。小。便。澆。痛。少。腹。脹。閉。牽。引。穀。道。者。腎。氣。書。苦。溺。澆。夜。則。遺。溺。者。屬。腎。氣。大。虧。飲。其。膀。胱。氣。墜。溺。道。不。爽。者。補。中。益。石。頑。有。治。胞。痺。案。數。則。醫。者。忽。之。今。特。標。為。論。焉。

附方

黃芩清肺飲 見一卷火

滋腎丸 見一卷火

脾心	衰火	衰火	脫滑	脫滑	熱扶	寒扶	勝	類證治裁	虛腎	遺溺	閉瘕	清升	虛腎	燥肺	氣痰	熱溼	氣化	痛淋
歸脾丸	加人參丸	兩丸	秘元丹	壯螭丸	右歸飲	秘元丹	家韭子丸	固脬丸	兔絲子散	冠氏桑螵蛸散	代抵當湯	補中益氣湯	腎氣丸	生脉散	二陳湯	益元散	五苓散	導赤散
見二卷勞瘵	見二卷勞瘵	見二卷勞瘵	龍骨煨三兩 爲末糯米粥丸 益智仁煨研 赤石脂煨研各二	壯螭丸 酒糊丸 鹽湯下五十九丸	見二卷虛損	龍骨煨三兩 爲末糯米粥丸 益智仁煨研 赤石脂煨研各二	家韭子丸 熟地 當歸各二兩 兔絲子 巴戟肉各兩半	固脬丸 茵香三兩 附子五錢 戎鹽一錢 桑螵蛸炙五	兔絲子散 兔絲子 五味 茯苓 杜仲 牡蠣 雞脆皮	冠氏桑螵蛸散 見本卷遺泄	代抵當湯 見二卷血	補中益氣湯 見一卷中風	腎氣丸 見二卷虛損	生脉散 見一卷暑	二陳湯 見一卷中風	益元散 見一卷溫	五苓散 見一卷溫	導赤散 見一卷溫
類證治裁 卷之七									類證治裁 卷之七									
閉瘕遺溺									閉瘕遺溺									

類證治裁 卷七

遺	痰	餘	痛	熱	滲	類	遺	禁	失	多	類證治裁	火水	熱	溼	人老	遺兒	冷	虛	精	腎肝								
扶苓甘草湯	扶兔丸	龍膽瀉肝湯	四苓散	縮泉丸	鹿茸丸	酒糊丸	固脬湯	生白芍	此沈	別丸	縮泉丸	四苓散	龍膽瀉肝湯	扶兔丸	扶苓甘草湯	大兔絲子丸	茵香	五味子	革薛分清飲	六味丸	八味丸	沈氏閱泉丸	下	鹽湯	螵蛸丸	固精丸	五君子煎	
扶苓 桂枝各二兩 甘草一兩 生薑二兩	製兔絲子五兩 茯苓三兩 石蓮肉二兩 爲末	見三卷諸氣	見一卷暑	烏藥 益智仁煨 等分爲末 酒煮山藥糊丸	鹿茸 鹿茸 酥炙 椒紅炒 桂心 附子 牡蠣 補骨	爲末	桑螵蛸酒炒二錢 黃耆酒炒五錢 沙苑子 黃	升麻五分 羊脬一個煎湯代水 再煎	此沈 羊綠先生尊生全書自製產後胞損失禁方 與固脬	別丸	烏藥 益智仁煨 等分爲末 酒煮山藥糊丸	見一卷暑	見三卷諸氣	製兔絲子五兩 茯苓三兩 石蓮肉二兩 爲末	扶苓 桂枝各二兩 甘草一兩 生薑二兩	附 兔絲子 鹿茸 石龍芮各一兩	續斷 故紙各三兩 桑螵蛸 覆盆子	蜜丸	見本卷淋濁	見一卷中風	益智仁 茯苓 白朮 白斂 黑山梔 白	此沈 羊綠先生自製方自云用之	下	桑螵蛸炙三十個 鹿茸酥炙 炙黃耆各三兩	煨牡蠣 赤石脂 人參各二兩 爲末山藥糊丸	見本卷遺泄	參 苓 朮 草 炮薑	五君子煎
類證治裁 卷之七											類證治裁 卷之七																	
閉瘕遺溺											閉瘕遺溺																	

加味道遙散 見一卷火

八珍湯 見一卷中風

補脾飲 生黃絲絹一尺剪碎 白牡丹根皮 白芨各一兩 為末水煮必絹爛如湯空 心服不得作聲作聲即不效

腎著湯 見一卷溼

葵子丸 冬葵子 赤茯苓 猪苓 枳實 瞿麥 滑石 木通 黃芩 甘草 車前子各一錢 薑五片

腎瀝湯 見本卷淋濁

巴戟丸 巴戟一兩半 桑螵蛸 遠志 生地 山藥 附子 川斷 菴蓉各一兩 杜仲 石斛 鹿茸 龍骨 兔絲子 五味子

山萸 官桂各三錢 蜜丸

地黃飲子 見一卷中風

類證治裁

卷之七

閉癱遺溺

藥

癱遺

族女產後嗽熱小水失禁脉虛數無力由真元不固臨產艱難損傷胞脉所致宜攝固真元佐以甘溫退熱用潞麥茯苓神杷子黃耆白芍五味子川貝石斛牡蠣般桑螵蛸炙炙草五服嗽熱減加遠志熟地兔絲餅十服前症漸瘥

族姑衰年病後失調遺溺不禁兩尺濡弱症由膀胱血虛溺孔不能約制水液用歸身白芍杷子沙苑子覆盆子杜仲炒核桃肉紅棗熟地炒煎服效後用補中益氣湯而固

類證治裁

卷之七

癱遺

五

轉胞交腸論治

水液自小腸沁入膀胱胞受氣化變溺以出胞蓋居膀胱中主藏
 溺洩溺者也。東垣曰膀胱雖為津液之腑至受盛津液則若忍溺
 入房或溺急疾走水逆氣迫則胞系屈戾名曰轉胞其症臍下急
 痛小便不通與尋常溺閉自異直指曰此症孕婦多有或忍溺入
 房使小腸氣逆而不通大腸氣與之俱滯外水不得入膀胱內水
 不得出膀胱淋瀝急數大便亦裏急頻併因而腹脹治用涼藥疏
 利小腸仍與通泄大腸胞即歸正小便自流丹溪曰妊婦轉胞疏
 通無效因思胞為胎壓展在一邊胞系了戾不通兩胎若舉起懸
 在中央胞系得舒小便自行宜升舉其氣補中益氣湯或再以渣煎服

類證治裁

卷之七

轉胞交腸

五

探吐或令孕婦卧榻上將榻側豎起則胎不壓而溺自通若臨盆
 之際胎壓膀胱小便不通者以手指托起其胎小便自出丹溪治
 一婦患此診之兩手似濇重取則弦此得之憂患濇為血少氣多
 弦為有飲以參朮飲以指探吐少頃又與一服凡與八服而安後
 歷試皆驗或用參朮湯強忍房事致胞轉而閉者非沈不治老人轉胞
 困篤欲死六味湯少年溺濇蒲黃散驚憂暴怒氣乘膀胱致胞轉
 溺閉葱白交腸症由大小腸失於傳送致清濁混淆也或因病
 後因嗜酒大便前出小便後出丹溪治一婦嗜酒常痛飲忽糟粕
 出前竅溲尿出後竅六脉沈瀟用四物湯加海金沙木香檳榔桃仁木通服愈回春曰一
 婦病愈後前陰出尿先服五苓散二劑又用補中益氣湯而愈則此症惟婦人有之耳

類證治裁 卷七

附方

氣虛 補中益氣湯 見一卷中風
 妊婦 參朮飲 參朮 陳草 夏地 芍歸 芍薑
 參朮湯 參朮 陳草 夏芍 歸 服後探吐
 老婦 六味地黃湯 見一卷中風
 通人 蒲黃散 蒲黃 滑石 等分為末服三錢 雞蛋清調下
 治清 滑石散 寒水石二兩 滑石 血餘灰 車前子 木通各
 利驚 葱白湯 陳皮三兩 冬葵子一合 葱白三莖 水五升煎
 補血 四物湯 地芍歸芍
 通利 五苓散 見一卷溫

類證治裁

卷之七

轉胞交腸

五

脫肛論治 肛頭癢痛附

脫肛元氣陷下症也。惟氣虛不能禁固。故凡產後及久痢。用力多。老人病衰。幼兒氣血不足。多有之。大劑補中益氣。八門曰。肺主魄。門肺熱則肛門閉。肺寒則肛門脫。必溫補肺氣。前湯加訶。以肺與大腸相表裏也。如脾胃虛寒。瀉痢而滑脫者。胃關煎。加脾虛下陷。而脫者。補中益氣湯。肝腎陰虛而下陷者。補陰益氣。虛中挾火。或熱赤腫。痛。補中益氣湯。加產後脫肛。六物煎。加升麻。或仍用溫湯洗而收。之。有溼熱下墜。疼痛脫肛者。抽薪飲。或腸風下血脫肛者。人參胃。便秘努掙致脫者。人參固本。兼痔而痛者。四物湯。加槐。外煎洗法。寒者。以荆芥。胡荽。煎洗。以伏龍肝。熟者。以撲硝。白礬。湯洗。以揪赤。龍頭。百藥煎。研末。油調敷。熱者。黃蘗。麩。牡蠣。粉。搽。搽。赤。

類證治裁

卷之七

脫肛

本

腫痛。以田螺去膜。人。小兒脫肛。肛頭癢。湯。薰。洗。水片化水。搽之。灰塗之。肛頭癢。湯。薰。洗。

內經曰。下者舉之。徐之才曰。瀉可去脫。治脫肛之法也。古人多用參耆。歸朮。川芎。甘草。升麻。之類。以升之。補之。或兼用烏梅。五味。之。屬以固之。瀉之外。仍用熏洗。收瀉之藥。則無不愈矣。

肛頭風溼。火兼病也。大腸受溼。流注肛頭。則作癢。秦艽。羌。得風與。溼熱。則生蟲。而癢。外以苦楝。根。煎湯。洗。若蟲蝕其肛。則上唇有。瘡。化。蠶。大腸有火。則肛門作痛。七聖丸。秦。甚。或便燥。腸頭努出。

下血。當歸。郁。李仁湯。丹溪曰。凡醉飽入房。忍泄。前陰之氣。歸於大腸。木乘火熱。而侮燥。金。故火就燥也。大便便秘。其疾甚者。必以苦寒瀉火。以辛溫和血。

丹溪曰。凡醉飽入房。忍泄。前陰之氣。歸於大腸。木乘火熱。而侮燥。金。故火就燥也。大便便秘。其疾甚者。必以苦寒瀉火。以辛溫和血。

潤燥疏風止痛。是其治也。宜秦艽。白朮。大黃。腸。丸。當歸。郁。李仁。湯。

附方

補中益氣湯 見一卷中風

舉元煎 見三卷飲食

參朮芎歸湯 參 朮 芎 歸 耆 草 芍 苓 山藥

胃關煎 熟地 三錢 山藥 扁豆 白朮 各二錢 黑薑

補陰益氣煎 參 草 陳 柴 各一錢 熟地 三錢 山藥

六物煎 熟地 錢半 白芍 當歸 人參 各一錢 川芎

殿胞煎 當歸 五錢 芍 桂 苓 草 各一錢

抽薪飲 見四卷痢

類證治裁

卷之七

脫肛

本

大分清飲 見四卷泄瀉

胃風湯 見四卷泄瀉

人參固本丸 見一卷中風

四物湯 地 芍 歸 芎

涼血清腸散 地 歸 芍 各錢半 苓 連 荆 防 芍

秦艽四物湯 四物湯加 秦艽 丹 防 柴 藥

秦艽羌活湯 羌活 錢半 秦艽 黃耆 各一錢 防風 七分

細辛各 三分

神應黑玉丹 獨皮 四兩 猪懸蹄 廿五个 牛角 膠 三兩

根皮 一兩 二錢 雷丸 脂麻 各一兩 乳香 麝香 各一

下蟲蝕火痛肛痛下血熱秘

篇蓄湯 扁蓄一握水煎

化歸丸 桃仁 槐子 陳艾各三錢 紅棗肉枳丸

七聖散 郁李仁一兩半 羌活一兩 大黃製八錢 桂心 檳榔 木香 川芎各五錢 蜜丸 白湯下

奏元白朮丸 見本卷便血

當歸郁李仁湯 郁李仁 皂角仁各一錢 槐花米七分 秦艽 麻仁 當歸尾 生地 蒼朮各五

分 大黃製

寬腸丸 黃連 枳壳 等分糊丸 米飲下五十九

類證治裁

卷之七

脫肛

空

痔漏 耳痔 鼻痔 腦漏 衄糞鼠瘻 跨馬瘻附

凡澤旁突起高阜為峙。巖中突出瘻肉為痔。故有眼痔、鼻痔、牙痔等名。至肛邊腫痛發瘡。經謂醉飽入房。筋脈橫解。腸澀為痔。又督脈生病癢痔。言精氣脫泄。陰火流注篡間。兩陰之交。多患痔疾。然陰虛生熱。或服餌辛毒。用熱藥固精不泄。毒氣流注勢必至穿漏矣。大腸燥秘及憂恐氣結。奔走勞動致瘡孔生。管流膿。斯成漏矣。痔有七。肛外發露肉珠狀如鼠奶曰牡痔。即外痔。肛內腫突膿潰即散曰牝痔。肛邊痛癢顆發癰更衣輒出清血曰脉痔。腸內結核痛而登廁肛脫曰腸痔。因便血注不止曰血痔。憂思恐怒立見腫痛大便艱難曰氣痔。皆內痔。飲酒發動瘡痛流血曰酒痔。其形有雞冠

類證治裁

卷之七

痔漏

空

蓮花櫻桃胡桃雞心鼠奶之狀。久而生蟲。便前血射一縷為痔瘻。瘻即漏也。經云。陷脈為瘻。近旁穿穴中生脆管。流膿不止。即為漏。有串臂者。有串腸者。有串陰者。有穢從瘡口出者。漏厄不塞。精血日枯。漸成損怯。難治。宜戒酒色。節勞茹淡。滋填精血。如魚鱉熟地龜膠。立齋論治痔。焮痛便秘宜清熱涼血。潤燥疏風。治漏宜養元氣。補陰精。大便宜潤燥養血。肛墜作痛宜瀉火除溼。作癢宜祛風勝溼。腫痛溺滯宜瀉肝導溼。若疝與痔兼患。六味地黃丸補中益氣湯並服。按痔初起。腸頭腫成塊者。大腸溼熱也。滲而清之。如生地槐米黃芩甲片。作痛者。肺大腸風熱也。宣而散之。如荆芥元參當歸杏仁。大便秘結者。脾腎燥火也。清以潤之。滋燥養營湯去防風。加麻仁白蜜等。潰膿者熱勝血也。涼以和

之秦其白朮湯去朮痛兼血者陰虛有火也滋而養之四物湯加
 烏梅地 痔血漏膿久不止者元氣不固也升而攝之補中益氣湯
 柴胡或暫血痔諸藥不應黑以止之烏梅湯下神效氣痔內因七
 情者調其鬱歸脾湯者尤用酒痔多因溼熱釀火者解其毒四物
 湯鹿角丸加不拘痔漏腸紅通連丸以止其血不論痔瘻蟲痔通
 金銀花甘草以絕其蟲腫痛用洗痔法齒莧枳殼煎湯熏洗洗翻花痔
 子芥防風朴硝煎洗次以木髓點痔法以蠟牛膠熊膽縮痔法
 子鬱金等分加冰片研細水調敷點痔法膠或田螺水等縮痔法
 用大鹽頭火枯痔法以蠟膠一味炒研為末日用敷痔法用蠶繭
 指甲填滿外川童髮纏二經云陷脈為癭漏留連肉腠言寒氣陷入
 裏燒存性蜜水調敷二經云陷脈為癭漏留連肉腠言寒氣陷入
 漏因瘡穿膿潰不已初則淡紅微腫或小核久則上面槁白內已

類證治裁 卷之七 痔漏

黑腐淫蟲惡臭生焉故治漏先須透膿用道毒丸再如漏之四邊
 有硬肉突起閉管丸中加蠶繭二此方治遍身諸漏皆效治穿腸
 漏用水安息香搽之十日全消水安息香出波斯國以椰子
 殼香形似膏藥稀粘黃黑色著手其香透爪甲者為真治漏
 退管丸去管兼能生肌用聖祖御賜方及倘管退漏眼未平宜
 肌大抵漏瘡孔中必有惡穢之物先用洗藥以露蜂房白芷苦參
 嗣用透管管退嗣用生肌近日專門治漏用韭菜彎刀披開其孔
 量漏之淺深撚入線藥爛管續用散敷平瘡口待愈後仍須
 滋填精血兼戒房勞奔走及辛熱動風諸發物每見不守禁忌創
 愈復潰或轉成怯症者有之亟當慎也
 耳耳中生如羊奶內服梔子清肝湯外點硫砂一錢輕粉
 痔黃各三錢冰片五厘水調和點之效

鼻中生山瘰肉用甜瓜蒂甘遂炒各四錢枯礬五分共研細淨
 點痔日一次即化臭水而愈
 腦中時流臭涕用辛夷二錢羌活獨活防風藁本細辛各五分
 愈或用黃荆樹葉搽塞鼻中效
 鼠瘻生近肛門潰膿後極易穿漏腫痛時用屋上乾貓屎金魚同
 同酒服亦效
 跨馬一名懸癰生肛門前陰根後交界處初起如松子大漸如蓮
 子後如桃李用甘草梢四兩外用水煎服即愈用金錠一塊同搗碎水調敷立
 止痛若肝經溼熱用龍膽瀉肝湯已成膿者用生黃耆人參川芎當歸各
 五分服痛止再服內消干服肉便生

類證治裁 卷之七 痔漏

痔漏脈候 脈弦絕澹者難治滑大柔和者易治
 附方
 六味丸 見一卷中風
 補中益氣湯 見一卷中風
 滋燥養營湯 見一卷燥
 秦其白朮湯 見本卷便血
 四物湯 見一卷中風 再加 黃芩 黃連 名苓連四物
 梔皮散 梔皮微炒 石榴皮 黃連 地榆 阿膠各一
 歸脾湯 見二卷濟痲

紅止

梅連丸 川連一兩酒浸研末 百草霜一兩 烏梅即川連
四五十九丸 三日服效 共搗為丸桐子大 每空心服
十日即愈

水銀聚子膏 水銀一兩 紅棗肉二兩 共研不見星為度
拾如棗核薄綿裹納肛中 明日蟲出

蝸牛膏 蝸牛一個 冰片 麝香各少許 同研爛以磁器
盛次早以汁敷患處

熊膽膏 熊膽五分 梅片一分 二味研細以井花水調
雞翅掃痔上

田螺水 以大田螺將針挑開磨入 冰片 白蜜少許在
內少頃螺即化水 雞翎蘸水拂之定痛而愈

追毒丸 胡黃連淨末一兩 刺桐皮炙切炒黃為末二兩
麝香二分 為細末以梗飯為丸如麻子大 每空
心服一錢

閉管丸 胡黃連淨末一兩 甲片麻油內養黃 石決明煨
槐花炒各五錢 為末煉蜜丸麻子大每服一錢空
心米飲下 早晚日服二次

漏深者服四十日愈

類證治裁

卷之七

痔漏

亥

管退

猬皮丸 刺猬皮大者一張新瓦上炙脆為末 象牙一兩研
末 青黛三錢 槐米一兩五錢 陳細茶五錢
菘豆粉一兩 飯丸每服
三錢 金銀花湯下

御賜方 夏枯草八兩 甘草節 連翹各四兩 為末 金
銀花一筋煎濃汁泛丸 如龍眼大 每早晨鹽湯
初起者半料愈年久者一料愈 此

下三錢 御賜方 犀角 象牙 乳香 沒藥各一兩 明
聖祖 御賜方 犀角 象牙 乳香 沒藥各一兩 明
太祖親驗方 犀角 象牙 乳香 沒藥各一兩 明

為丸 此明太祖驗方也 金銀花浸酒煮半日服丸 每服二十一
丸 以連翹 黃蠟 各五錢 銅器銼化黃蠟 入藥末

生肌膏 雞旦黃去白熬出油三錢 輕粉研細一錢 乳香
血竭 龍骨研細各五分 入油內和勻 日以雞
翎塗患孔內外 蓋膏藥

半月可以完口

透管方 麻油四兩安鍋內 以雞子四個女髮一握 蓋上
面慢火煎至油乾 其髮亦化 空心陳酒下 雞旦
以醉為度 管自出

管退

管退

通治

槐角丸 槐角炒 黃芩 地榆 當歸 防風 枳殼炒
各等分為末 酒糊丸桐子大 每服六十九空
米飲下極效 或加烏梅亦妙

類證治裁

卷之七

痔漏

亥

痔漏

某 痔血延久不痊便後血色鮮紫雖似腸胃遠血然恐腸盡肛

頭舊損所滲沿便之一縷而來尾閭不禁滄海易枯無怪面色

萎悴也治用涼以潤之黑以止之固以攝之槐米炒柿餅煨烏

梅蒸側柏葉搗地榆炒百草霜熟地杵加煉蜜丸服效

王 氣虛下陷痔墜腫痛兼脫肛膿血用補中益氣湯加槐米茯

苓外用牡蠣粉黃蘗麩安紙上承以布托肛入數次效

某 便燥出血痔核腫痛參東垣潤燥通幽二湯用熟地生地桃

仁麻仁紅花當歸酒杏仁甘草枳壳蜜丸此入血分潤燥結服

效

類證治裁

卷之七

痔漏

天

諸蟲

氣化之生蟲也木朽為蠹草腐為螢日氣蒸雨變生螟螣臟腑之

生蟲也肥甘不節生冷失宜中脘氣虛溼熱不運諸瘕乃生如髮

癩瘰癧疔蟲尸疰狐惑應聲之類其候心膈腹痛面色萎黃沈默

嗜眠食減羸瘦唇有紅白點嘔多青綠涎或附唇生米茶葉泥此

在小兒為多其痛時作時止其脉忽大忽小其腹有氣梗起往來

痛定便能食者是古分五臟蟲形如心之蟲曰蛔脾之蟲曰寸白

網查肺之如肺之蟲曰蠅諸蟲皆能殺人惟肺蟲蝕肺令人癯瘵至咯血聲嘶最

為難治又有三蟲長蟲赤蟲蠅蟲惟燒蟲最能病人治之必於月初蟲頭

向上空腹先飲肉汁令其聞香聚而求食以遇下之蟲下淨乃啜

類證治裁

卷之七

諸蟲

空

粥止之蟲性喜甜得甘則動得苦則止得酸則輟得辛則伏如烏

連藥之苦梅醋古法治傷寒虵厥五粒檳榔五分臟寒吐虵及胃

之酸椒薑之辣胃虛虵上入局諸蟲攻胸急痛掃蟲

腑欬嘔長蟲出烏梅胃虛虵上入局理中安諸蟲攻胸急痛掃蟲

蟲嚙心痛貫心則死蘇黃蟲痛口流清涎以烏梅川腹有蟲積萬

九去蟲痛腹熱化蟲蟲痛肢冷集效蟲積堅久脹痛黃瘦猴蟲

乾漆追蟲元氣實者木香檳虛寒蟲動嘔瀉成疔溫臟脾疔蟲

切蟲積追蟲元氣實者木香檳虛寒蟲動嘔瀉成疔溫臟脾疔蟲

積肚大肌消膿腐生瘡六味肥蟲積嗜生米泥為蟲疔以史君子

南星研細沙蟲血積久成膈嘔涎秦川肺嗽有蟲骨蒸成瘵百

糖水調服蟲血積久成膈嘔涎秦川肺嗽有蟲骨蒸成瘵百

尸疰傳染鱧魚消渴蟲耗陰液苦棟根白皮一握切焙加麩

殺寸白蟲梔子四十九枚沙糖水煮每上旬腹生鼈瘕之化水

嘔吐蝦蟇。銅綠煎湯。口發言。腹應聲。搗薑汁飲。或狐惑症。狀類傷寒。起臥不安。四肢沉重。湯或甘草湯。心湯。蟲食其臟。上唇生瘡。為或必聲啞。宜桃仁。狐。必咽乾。宜苦參湯。洗。穀道微癢。糞後蛆蟲。宜調補脾胃。脾溫。臟。以雄黃。銳散。納穀道中。穀道微癢。糞後蛆蟲。宜調補脾胃。脾溫。臟。等湯。或化蠶丸。外用。大腸蟲。出行坐不得。用鶴虱。灰。五。錢。小腸溼。棟根。白。皮。煎湯。洗之。熱。溺。瘻。蟲。出。子。草。蘇。黃。葉。婦人。陰。蝕。蟲。癢。用。蛇。床。子。煎。湯。洗。拭。熱。溺。瘻。蟲。出。子。草。蘇。黃。葉。婦人。陰。蝕。蟲。癢。用。蛇。床。子。煎。湯。洗。拭。細。渾。身。發。出。血。內。俱。壞。飲。鹽。醋。湯。陰。毛。生。蝨。內。中。出。毛。孔。生。肝。腎。陰。末。內。服。六。味。地。黃。丸。筋。肉。化。蟲。如。蠶。走。皮。膚。內。作。聲。急。用。雄。黃。雷。末。外。以。白。果。肉。擦。之。凡。治。蠱。勢。驟。急。者。行。攻。逐。如。大。黃。黑。丑。乾。漆。去。熱。食。盡。自。愈。凡。治。蠱。勢。驟。急。者。行。攻。逐。如。大。黃。黑。丑。乾。漆。去。則。調。其。脾。胃。勢。緩。者。用。制。伏。如。川。連。胡。連。烏。梅。苦。參。三。稜。莪。朮。去。脾。胃。滯。者。兼。消。滯。脾。胃。氣。強。蟲。乃。不。生。尤。宜。審。臟。氣。之。虛。實。而。治。之。母。尚。恃。攻。下。為。也。

諸蟲脈候
乍大乍小者。蠱脈。巢氏曰。腹痛脈當沈弱。若反洪大者。蛇蟲也。凡蟲痛時作時止。或大瘕不可忍。面色或青或黃或白。而唇則紅。

攻 下
遇仙丹 牽牛 檳榔 大黃 三稜 蓬莪朮 木香 共研末 用皂角子研碎煎濃湯 法渣煮 麩糊為丸 以茶清下
烏梅丸 見三卷嘔吐
理中湯 見一卷中風
安虻散 見三卷嘔吐

類證治裁 卷七

攻胸 掃蠱煎 青皮 小茴 檳榔 梔子肉 烏藥 吳茱萸 雄黃 硃砂 煎七味煎好去渣入後二味再煎 攪勻 徐徐服之 見三卷積聚

貫心 萬應丸 三稜 莪朮 陳皮 麥芽 史君子 神麩 雷砂仁 為末米醋糊丸 檳榔 木香 蕪荑 鶴龜 胡黃連 藜豆大 薑湯下 苦棟根不出土者炒 檳榔各一兩 化蠶丸 蕪荑 史君子 各五錢 枯礬一錢 為末水丸

腹熱 集效丸 大黃炒一兩五錢 鶴龜 檳榔 訶子皮 木香 下 婦人 煎黃 乾菴 製附子各七錢五分 蜜丸烏梅湯醋湯下 燕荑 雷丸 桃仁 乾漆炒 雄黃 錫灰 獾蠶丸 角燒 檳榔 樞粉 史君子 梔子肉 為末湯下

積蟲 積蟲餅 枳實 菜豆大 每服六七分 追蟲丸 黑丑取頭末 檳榔各八錢 雷丸醋炒 南木香 皮各一兩 共煎濃汁為丸如菴豆大 壯人服四錢 弱人小兒服錢半 於五更時以沙糖水吞下去 惡毒蟲積二三 次以粥 補之

下攻 木香檳榔丸 檳榔 木香 鶴龜炒 貫仲 錫灰 乾漆 炒 史君子 輕粉 雷丸 巴仁 為末麩糊丸麻子大 每服二十九

虛寒 溫藏丸 鹿 歸 芍 苓 荅 川椒炒 梔子肉 更君 下 或加 積榔 炮薑 吳黃泡 為末神麩糊丸白湯

脾疝 六味肥兒丸 蕪荑 陳皮 川棟子炒 神麩 麥芽炒 為末糊丸麻子大 每服二十九 米下飲

類證治裁 卷之七

二九九

肺蟲 膈蟲 尸傳 應尸 狐惑 狐惑 治外 類證治裁

秦川剪紅丸 雄黃另研 木香各五分 檳榔 三稜煨 莪朮煨 買仲去毛 乾漆炒烟盡 陳皮各

一兩 大黃一兩五錢 為末麩糊丸每服五十九

百部膏 取百部肥實者酒浸竹刀刮去心皮同款冬 百合 等熬膏 殺蟲治嗽 麥冬 五味 紫菀 貝母 杏仁 白蜜

殺蟲治嗽

懶肝丸 懶肝一具陰乾為末水服上錢日三次治鬼疰傳尸

鰻魚湯 鰻魚淡食治虛損骨蒸勞瘵尸蟲

雷丸湯 雷丸一味煎

桃仁湯 桃仁去皮尖炒 槐花米各三錢 生艾五錢 大

甘草瀉心湯 見三卷痞滿

雄黃銳散 見四卷痢

類證治裁

卷之七 諸蟲

三

歸脾丸 見二卷勞瘵

化膿丸 見本卷脫肛

導赤散 見一卷溫

六味丸 見一卷中風

蟲

周 自幼糞後下小白蟲如蛆肛內微癢中年時發時止此得之

腸虛受風宿病再為溼熱迫注遂至化膿延久未愈憶友人亦

於童年患此服攻逐殺蟲之劑罔效後有人令服人乳數月蟲

絕知徒商逐蟲無濟也因疏溫臟丸用四君子湯加歸芍薏蓮

川椒樞實史君子俱炮薑檳榔為末神麩糊丸空心白湯下輒

效



類證治裁

卷之七

諸蟲

三

類證治裁卷之七終

類證治裁卷之八

丹陽林珮琴著

男 芝林校

調經論治

婦科首重孕育。孕育先在調經。素問曰：女子二七天癸至，任脈通，大衝脈盛，月事以時下，言天一之真精至，月信亦通，乃能孕。子謂之月事者，女子屬陰，其血如潮，應月之盈虧，有常期者也。故謂之經。儻一愆期，則失其常度，而諸病生焉。夫任主胞胎，衝為血海，二脈流通，臟腑之血皆灑注於此，衝任皆奇經，而血之生化由脾胃。若七情內損，六淫外侵，兼之飲食勞倦，致脾胃日虧，化源日薄，衝

類證治裁

卷之八

調經

任日衰，神色日奪，所重尤在調肝。蓋婦女善鬱，木失條暢，枝葉萎悴，肝不藏血，經之所由不調也。然不調之中，有先期有後期，有錯亂，有痛經，有倒經，有居經，有淋瀝，不斷有枯閉不通，經不準必不受孕。然參前數日受孕者，有之。當經行，食禁生冷，藥忌寒涼，以血得寒則凝，滯不行，不慎禁忌，則腹痛，疲泄亦致不調。且血隨氣行，經不調多由於氣。丹溪謂經來成塊者，氣之凝也。將行作痛者，氣之滯也。行後作痛者，氣血虛也。先期而來者，血熱，後期乃至者，血虛亦無不由氣也。錯經妄行者，氣之亂也。色淡者，虛而挾水也。紫者，氣之熱，黑者，熱甚也。乍少乍多，淋瀝不斷者，氣不攝血也。故調經必兼氣藥。更若臟損經閉，則由悲傷肺，憂傷心，思傷脾，怒傷肝。

房勞傷腎，肺傷則氣陷血脫，心傷則驚悸盜汗，脾傷則食減肌瘦，肝傷則髮焦筋癢，腎傷則淋帶骨蒸，甚至嗽熱泄瀉，衝任虧敗，源

涸流竭。如素問云：二陽之病發心脾，有不得隱曲，其在女子為不月。夫心主血，脾統血，因思慮過度，所願不遂，鬱而成損，則先經閉而後乾嗽，累月經年，遂成乾血勞瘵，治難措手矣。古謂經前勿補，經後勿瀉，此為經期腹痛者言之。其實調經之要務，令血氣和平，自然經準受孕。如陽太過，則先期，原因有火，然虛而生火，仍當養營攝血，亦有無火而先期，或補中氣，或固腎關，不宜過用寒涼也。陰不及，則後期，本屬血虛，然有血熱而燥熱者，宜清補，亦有血逆而留滯者，宜疏利，毋庸預執溫補也。其陰陽乖亂，錯經妄行，或由

類證治裁

卷之八

調經

火邪搏營，遲早互見，或由經氣外逆，口鼻上衝，務審其虛實寒熱而調之。至於經期前後腹痛，虛實懸殊，經未行而先痛者，血為氣滯，經通則痛自除，經已行而猶痛者，衝脈本虛，血去則痛益甚，滯者理其氣，溫而行之，虛者培其營，峻以填之，設淋瀝不止，必因以攝之，亦有腹愈痛，經愈多，至痛欲死者，係火搏於血，治宜行血，如歸斂血，芍等理脾，如芍等以益母破氣中之血，以延胡破血中之氣，以香附開其鬱，虛者加入參理脾，則血有統，破結則火痛悉除，故調經莫如八珍湯，如其經閉不行，肥人多痰，寒導痰湯，加瘦人多鬱，火四物湯，加丹，因脾胃虧而食少者，旺其運納之權，因肝腎虧而骨蒸者，壯其營陰之本，地黃湯，去黃澤，因思慮鬱損心

脾者。歸脾丸。因勞嗽。傷肺氣者。劫勞散。或溫養下焦。熟地。沙苑。鹿角膠。或宣通奇脈。杞子。牛膝。當歸。若枯閉日久。輕用破血通經。則愈枯其枯矣。又有經後發熱倦怠。兩目如帛蔽不明。此脾腎精華不能上注於目也。朝用補中益氣湯。夕用地黃丸。至於七七數盡。當斷不斷。或因氣血有餘。若已斷復來者。即為崩漏。宜固攝衝脈。補元前。加續斷。阿膠。海螵蛸。兔絲。年高經或大行。腹痛不止者危。

經閉論治

潔古曰。經言月事不來者。胞脈閉也。胞脈屬於心。絡於胞中。今氣上迫。肺心氣不得下通。故月事不來。先服降心火之劑。加苓連四湯。去後服局方五補丸。後以衛生治脾養血也。李氏論經閉有二。曰

血滯血枯。如經行時餘血一點未淨。或外感風寒。內傷生冷。七情

結為痰。為痰。凝窒經絡。為血滯。或經盡後。勞傷衝任。欬嗽骨蒸。火通水涸。為血枯。血滯經閉。如當歸散。以破瘀。加味導滯。去則經通。若血枯經閉。多主傷肝。素問云。有病胸脇支滿。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四支清。目眩。時時前後血病。名血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入房。中氣竭。肝傷。故月事衰少不來也。治以四烏鯁骨。一蔥茹。二物并合。以五丸為後飯。飲以鮑魚汁。利腸中及傷肝也。蓋胸脇支滿。肝病也。妨食。肝病傳脾也。也。鮑魚汁。利腸中。和肝傷。取臭穢。以佐烏鯁骨。辟瘴也。有因飲食勞倦。損傷脾胃者。節齋云。只宜補養脾胃。白朮為君。茯苓芍藥。

陳皮。麥芽。川芎。脾能生血。經自行矣。有因思鬱致損心血者。寇宗奭云。童男室女。積想在心。思慮過度。男則神色消散。女則月水先閉。蓋憂愁思慮。多傷心脾。故神衰食減。火炎燦金。肺金燥。腎水絕。木氣失榮。四肢乾痿。五臟傳遍。死矣。能改易心志。用藥扶持。宜柏子。蘭。益陰制火。忌青蒿。等涼血行血。凡經閉因血滯者。多凝瘀積痰。牛膝散。若胃熱消渴。津液燥竭。玉燭散。若思鬱成損。歸脾湯。加味逍遙散。室女經行復閉。羸熱成勞。肝脈弦出寸口。上魚際者。急與婚配。宜加味小若乾嗽。地黃湯。去丹澤。加甜。婦人經少漸閉。五心煩熱。肌削脈數。乃陰虛陽乘。當養血益陰。人參固。斷者。利止經自來。若脈微瀼。雖經止二三月不行。亦非胎。養血經

類證治裁

卷之八

調經

四

自行也。經先期至者。主血熱。加味四物湯。立齋分肝經血燥者。加味道。脾經鬱滯者。歸脾。肝經怒火者。加味小。血分有熱者。加味四。勞役動火者。補中益。景岳分血赤濃紫。脈洪多火而經早者。清化。微火陰虛內熱動血者。保陰。脈症無火。心脾不攝。經亦早者。小營。福飲。加杜。若一月二三至者。乃氣血敗亂。當調其寒熱虛實。不仲五味子。若一月二三至者。乃氣血敗亂。當調其寒熱虛實。不。得以前經早血熱概之。大約血熱者。腹多不痛。其來必多。固經丸。黃芩。藥。經後期至者。主血虛。加味八。立齋分脾經血虛者。人參養。少者。地黃。氣血俱弱者。八珍。景岳分血淡不鮮。脈微遲無火而

後期者大常亦有陰火內燦血本熱而仍後期者乃水虧血少
 加味四物湯過期作痛者氣血兩虛八珍湯肥人過期色淡為痰
 湯地黃丸加木香二陳湯加木香大約血虛者腹多空痛脈大無力或濡細八物湯
 芎歸貝母加香附遲早無定乍前乍後多因心肺虛損滋血或因受驚氣亂經亦
 亂者茯神或氣盛於血不受孕者抑氣景岳分三
 陰虧兼陽虛者大營煎憂思損心脾者歸脾湯食少脾不健運
 宜溫燥者理中湯脾虛不攝為淋漏者保元湯肝虛不藏
 多驚惕者補肝散去獨活情志不遂肝脾氣結經期亂者逍遙
 痛有經前身痛拘急者散其風越痛散有經前腹痛畏冷者溫其
 寒調經散氣滯者行其滯加味烏血瘀者逐其瘀通瘀氣血
 類證治裁 卷之八 調經

疝結者理其絡失笑癥瘕痞脹者調其氣血交加地虛寒急痛
 者溫其裏五物痛在經後者補其虛八珍湯一切心腹攻築脇
 肋刺痛月水失調者和其肝元胡索經滯臍腹痛不可忍者
 導其壅琥珀散從本事方改訂并治產後惡露金匱云婦人腹
 中痛當歸芍藥此補中瀉木又云婦人腹痛小建中此亦補脾
 伐肝之意

色經 凡經以色紅為正其紫者風也四物湯黑者熱甚也四物湯
 紫黑兼腹痛者氣血併也四烏湯不痛者但加淡白者虛而
 兼帶也芎歸湯赤白兼臍腹冷痛者虛寒也伏龍如米泔水
 如屋漏水或帶黃混濁模糊者溼痰也六君湯如豆汁者熱

世四物湯成塊成片者血隨氣凝或風冷乘之也通瘀煎
 入胞門忽崩鮮血一味防風丸旋覆花湯
 倒經期氣逆直犯清道而為吐衄宜折其逆勢而調之用山梔丹
 參白芍蘇子鬱金童便或因怒火傷肝致逆者龍膽皮青皮
 用四物湯和韭汁童便服因心氣不足衄血面黃者茯苓補
 居三月一行為居經俗名或由脈微氣血俱虛或由寸口脈微而
 瀋少陰脈微而遲或由陽脈浮大陰脈反弱又一歲一行者為
 避年此因稟受不齊勿與經閉同治
 淋瀝不止症多氣不攝血止經湯子宮虛寒淋瀝物湯血分有熱不
 斷蒲黃

類證治裁 卷之八 調經

乍多經水過多當歸過多淋瀝膠艾四物湯經水瀋少四物加
 乍少或保元湯調經脈候

尺脈滑血氣實婦人經脈不利少陰脈弱而微則少血寸
 口脈浮而弱浮則為虛弱則無血脈來狀如琴絃苦少腹痛主
 月水不利孔竅生瘡肝脈沈主月水不利腰腹痛尺脈來而
 斷續者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆腎脈微瀋
 為不月

附方
 八珍湯 見一卷中風
 導痰湯 見一卷中風

補血補脾補腎心脾心勞嗽傷升補固攝降火 須記治裁

四物湯 見一卷中風

歸芍異功散 異功散見中風 此加 歸 芍各二錢

六味地黃湯 見一卷中風

歸脾湯 見二卷勞瘵

小營煎 歸地各二錢半 白芍 杞子 山藥各二錢

劫勞散 見二卷勞瘵

紫莖湯 見二卷肺癆

補中益氣湯 見一卷中風

大補元煎 見一卷中風

芩連四物湯 四物湯加 芩 連

須記治裁

卷之八

調經

二

須記治裁

調經

八

三和湯 地 芍 歸 芎 芩 梔 翹 草 大黃 朴

五補丸 參 地 苓 牛膝 地骨皮 等分蜜丸 酒下

衛生湯 歸 芍 各二兩 黃耆三兩 炙草一兩 每服半

當歸散 歸 芍 劉寄奴 枳壳 延胡 沒藥 等分爲

元歸散 元胡索 當歸 每服三錢 加薑煎

柏子仁丸 柏子仁 牛膝 卷柏各五錢 澤蘭葉 續斷

澤蘭湯 澤蘭葉三兩 歸地 芍 各一兩 甘草五錢 每服

牛膝散 牛膝一兩 歸地 芍 桂 丹 桃仁 延胡 木

玉燭散 見六卷腹痛

加味道遙散 見一卷火

肝怒益陰血熱火熱內熱心脾心經多 須記治裁

加味小柴胡湯 小柴胡湯見一卷溫 此加 麥冬 生地

固本丸 見一卷中風

加味四物湯 四物湯加 丹 梔 柴

清化飲 歸 芍 丹 芩 苓 麥各二錢 石斛一錢

仔陰煎 見五卷瘵

七福飲 見三卷瘵

固經丸 黃蘗 白芍各三兩 黃芩二兩 炙龜版四兩

服五七十九

加味八珍湯 八珍湯加 柴胡 黃耆各五分 香附 丹

養營湯 見二卷勞瘵

大營煎 見三卷關格

二陳湯 見一卷中風

八物湯 地 芍 歸 芎 芩 延胡 苦棟各一錢 木香

滋血湯 參 耆 苓 山藥各一錢 芍 芎 地各八分

歸附丸 當歸四兩 香附八兩 童便浸透晒乾再加酒醋鹽

虛加熟地 爲末醋糊丸 空心砂仁湯下三錢 血

抑氣散 香附四兩 陳皮一兩 茯苓 甘草各五錢 爲

理中湯 見一卷中風

六君子湯 見一卷中風

係元湯 見一卷火

虛脾

補脾

虛脾

盛氣

亂氣

亂氣

痛經

虛阻

痰

遲經

虛血

血氣

血氣

虛肝	補肝散 地味 木各一兩 山藥 山黃 獨活各四兩 木瓜各五錢 歸芎 為末每服	情志	逍遙飲 熟地三錢 當歸 棗仁各二錢 茯神 白芎各 錢半 陳皮八分 遠志五分 炙草一錢 氣虛 加人	風痛	越痛散 虎骨 歸芎 木 荅 草 防 芷 續斷 葉本各三錢 附子八分 每服五錢 水煎 調經飲 當歸 牛膝各三錢 製香附二錢 茯苓 青皮 各錢半 山查炒二錢 水煎 脹悶加厚樸 砂	寒痛	仁氣滯 加烏藥 烏藥 砂仁 木香 元胡索各一兩 香附 加味烏藥湯 二兩 炙草一兩半 為末每服七錢 薑三	滯行	水煎 通痰煎 見五卷厥 調經	逐痰	失笑散 見六卷胃腕疼 調經	理絡氣血	交加地黃丸 生地一兩 搗汁浸生薑渣 生薑一兩 搗汁浸 二兩 延胡索 當歸 香附八兩 人參一兩五錢 桃仁 沒藥 木香各一兩五錢 川芎 白芎	溫裏和肝導壅	五物煎 熟地 當歸各二錢 白芎錢半 川芎 肉桂各 延胡索散 延胡索 歸芎 乳 沒 蒲黃 桂心各一 錢 為末 每服三錢 溫酒下	腹痛	琥珀散 三稜 莪朮 延胡索 烏藥 前五味用烏豆一升 歸 官桂 赤芎 劉寄奴 丹皮 熟地 當 舊半筋切醋焙乾入後藥研 每服二錢 溫酒下 一方有琥珀	腹痛	當歸芍藥湯 當歸 白芎 川芎 茯苓 澤世各一錢	紫痛	小建中湯 見一卷傷風	黑紫	四烏湯 四物湯加 烏藥 香附 甘草
----	--	----	---	----	--	----	---	----	-------------------	----	---------------	------	---	--------	--	----	--	----	----------------------------	----	------------	----	-------------------

類證治裁 卷八

經淡	芎歸湯 川芎 當歸 伏龍肝湯 見四卷痢 一味防風湯 防風 研醋丸 每服二錢半 葱白湯下 旋覆花湯 見二卷痰飲	風痛	茯苓補心湯 茯苓六錢 桂枝三錢 甘草二錢 紫石英 小豆一合 水煎 麥冬 人參各五錢 大棗四枚 赤 日三服	絡通	止經湯 四物湯各一錢 白朮 黃芩 阿膠 蒲黃 柏 分 蕪三片 葉鹽水炒各七分 香附一錢 砂仁 甘草各五 水煎	淋瀝	膠艾四物湯 熟地 白芎各一錢 當歸 艾葉各七分半 蒲黃散 黃芩五分 當歸 川芎 甘草各五分 水煎 艾葉各一分 生地二錢四分 伏龍肝一錢二分	熱血	類證治裁 卷之八 調經	多經	研末 水 當歸飲 崩者加 歸芎 黃芩 白朮 如久不止成血 服 阿膠 山梔 地榆 荆芥 甘草 水	少經	四物加葵花湯 地 芍 歸 芎 紅葵花各二錢 一方 加紅花 血見愁
----	---	----	--	----	--	----	---	----	-------------	----	---	----	-------------------------------------

調經

李氏月事兼旬再至小腹脹面黃食減手足心熱口微渴脈虛促此脾肝腎陰液虧損症也延成勞熱則難治暫用河膠四物

湯潞參熟地砂仁末炒各三錢當歸白芍酒炒各二錢川芎八分阿膠二錢麥

冬山梔續斷俱炒各錢半香附二錢童便炒四服諸症俱減改用八珍湯

去白朮仍加阿膠麥冬脈較和食較進後尚用潞參五錢龍眼肉

二煎服味甘生液又用歸脾丸加白芍香附常服經始調

殷氏年少脈勻主無病尺中虛必月信後期溺後白淫非不孕之

體據述經前不痛但遲後色淡平時白帶耳治宜補氣以培營

之源隔下以固腎之滑用秘元煎人參茯苓白朮炙草棗仁山

類證治裁

卷之八

調經

七

藥芩實加當歸白芍杜仲何首烏服之可孕

沈氏按月倒經血出鼻口此由肝火上迫不循常道宜抑肝火導

歸衝任可使下行此即搏躍過額之理擬四物湯去川芎其當

歸用醋製加生熟山梔各二錢丹皮二錢黃芩枳壳各錢降香甘草

各一錢鬱金五分每月經前服四劑後得轉逆為順

蕭氏經前腹痛經後淋瀝脹滿食減脈虛小係衝任血滯而主治

宜在脾用香附製砂仁茯苓白朮炙草當歸白芍桂木炒木香延

胡酒炒杜仲薑汁續斷神麴糊丸薑湯下一料宿疴愈而獲孕

徐氏積年痛經屬血中氣滯用調經飲當歸牛膝製香附茯苓山

查肉加烏藥小茴香痛止後因挾虛遲早不調用芎歸六君湯

加益母膏白芍香附紅棗而經調

李氏妾年二十以來天癸未通其夫懼不能孕育子謂此稟受陰

氣不足也但多服六味地黃丸陰氣充經脈自行後生數子

陳氏性褊不育脈沈滯氣急痰悶經閉三載當先調暢肝鬱三因

七氣湯半樸苓蘇加當歸香附鬱金合歡玫瑰二花煎隨用平

調肝腎廿杞子沙苑子補骨脂牛膝當歸製首烏益母霜意取

溫行不十服經行矣

吳氏結禱數載經閉年餘入夏氣泄脈微弦少力肌削神疲平昔

胃納不多而衝脈隸於陽明謂之血海因陽明生化不足故月

類證治裁

卷之八

調經

七

以生液潞參三錢山藥炒茯神棗仁白芍當歸杞子俱炒各二錢五味

分焙五錢麥冬一錢湘蓮南棗各十枚十服食味頗甘精神較爽前劑去

麥味參入澤蘭湯用潞參山藥茯神各三錢熟地炒一錢白芍當歸

各二錢澤蘭甘草各一錢牛膝酒蒸六分益母膏三錢沖服甚適所慮節交

夏至症必變重耳

崩漏論治

崩者血暴下成塊如山家舉崩漏者經絲延不止如漏厄難塞素問曰陰虛陽搏謂之崩又曰陰絡傷則血內溢蓋血行絡中滙於衝脈衝脈非陽盛搏陰致損內絡則不至橫決而下且心主血脾統血肝藏血凡憂思怒勞激動五志之火皆能損絡使衝任胞胎失守致經血暴注久而不止謂之崩中良方亦謂婦人崩中由臟腑虛衝任亦虛不能約制其經血或陽搏陰熱傷衝任血得熱則流溢甚至昏仆其脈疾小為順洪大為逆大法當調補脾胃濟陰綱目曰崩漏屬氣虛不能約制則宜補氣其為熱所乘者則宜涼血不當混言調補脾胃嘗析而言之有臟腑及衝任陽虛者有臟

類證治表

卷之八

崩漏

腑及衝任陰虛者有陰虛兼陽亢者有初損臟腑久崩久漏屢傷衝任以致絡虛不能攝血者概言調脾胃尚未切中竅要昔東垣治崩亦言大補脾胃升降氣血以氣血為脾胃所生且衝脈隸在陽明耳經既明言絡傷血溢得不隄防約束為之彌縫其隙乎如膠雞血藤膏赤石脂紫石英等惟血中有滯氣臍腹隱痛者不宜驟用固滿變成腫脹須參經旨通用延胡索海螵蛸歸尾芎和其氣而血白調按產寶分陰崩陽崩受熱而赤謂之陽崩受冷而白謂之陰崩赤屬血熱白屬氣虛然崩中日久則為白帶如此直須補攝用杜斷芩實牡蠣沙苑子免絲子等勿令延至髓枯精竭宜人參熟地黃杞子茯苓藥川大劑填塞下元

東垣論氣陷血脫法當升舉

立齋論崩之為患或因脾虛不能攝血或因肝火迫血妄行或暴怒傷肝血熱沸騰或脾經鬱火血不歸經或悲傷心包血乃下脫治法脾經虧損者六君湯加芎歸柴胡脾氣虛陷者補中益氣湯肝經有火者四物湯加柴怒火傷肝者小柴胡湯加肝經風熱者加味逍思鬱傷脾者歸脾湯悲傷心包者柴梔升麻故先哲論下血須用四湯收功所謂血脫益氣也凡大脫血後急用獨參其發熱欬嗽脈數乃元氣虛弱假熱之象尤當加用人參調補脾元以無形之氣所謂陰從若脈虛大察其有胃氣受補則可救不可誤投寒涼復傷生氣其治因怒血崩而青黃或赤為肝木制脾土以小柴胡湯

類證治表

卷之八

崩漏

治肝脾鬱火血崩乳腫脇痛道遙散加酒炒龍膽山梔治崩症身熱頭暈食少吐痰用八味後因勞役復發脈洪大按之微弱此無根之火內虛寒外假熱用十全大補丸愈其崩久脾胃虛寒肢冷腹痛先用附子理中湯再用過服寒涼腹悶煩躁脈洪而虛急用八珍以溫補之緩則不救元禮論崩中或清或濁或純下瘀血甚則頭目昏暈四肢厥冷宜膠艾湯明震靈丹佐以三灰散或以童便煎理中湯血崩腹痛人疑惡血未淨及見血色瘀晦愈信惡血不敢止截豈知經血出絡一停即成黯色未必盡為瘀熱又焉知瘀之不為虛冷乎且瘀而腹痛血行則痛止崩而腹痛血住則痛止宜芎歸湯加熟止其血而痛自止武叔卿以此非

崩久氣脫者不可用。

千金治崩淋帶下。用小牛角散。若積冷崩中。去血不止。腰背痛。四肢重。

虛極者。大牛角膠散。本經云。牛角膠。下瘀血。閉血。女人帶下。血崩。崩中之酒。服。宗。爽。疏。云。燒。灰。主。婦。人。血。崩。使。血。利。虛。人。以。獨。參。湯。崩。中。去。血。不。斷。鹿。茸。散。崩。中。赤。白。或。如。豆。汁。伏。龍。係。元。湯。送。下。

醫通治崩漏過多補瀉不應者。用牛角膠散。存。虛寒血色稀淡者。性。酒。服。二。三。錢。

牛角膠同鹿茸。崩漏經年不止者。用蓮房五枚。燒存性。香附二兩。風茸。煨。服。尤。妙。崩。漏。經。年。不。止。者。炒。黑。為。細。末。空。心。陳。酒。下。二。錢。風

入胞門。忽下鮮血者。一味防風丸。崩漏初起。不問虛實。荆芥四。肝

經虛熱。奇效四。因怒動血。肝散。勞心過度。拍子。漏。血。傷。胎。膠。艾。湯。脾。虛。惡。食。常。歸。芍。血。脫。氣。陷。益。胃。升。赤。白。崩。帶。艾。附。虛。寒。崩。漏。不。止。艾。湯。崩。漏。漸。成。虛。羸。散。崩。中。諸。藥。不。愈。丸。年。高。而。崩。

者。法在不治。凡崩症。多用醋炒。荆芥。醋能收斂。故也。五灰十藥用。煨。者。紅。見。黑。則。止。也。紅。為。火。象。黑。為。水。色。血。症。或。用。鹿。茸。炒。者。紅。見。黑。則。止。也。多。兼。黑。藥。水。能。遏。火。之。毒。或。用。鹿。茸。

景岳治血熱妄行。係陰前。或加。火。盛。迫。血。徒。薪。飲。加。脾。腎。虛。寒。兼。嘔。兼。瀉。瀉。而。畏。寒。理。陰。煎。或。脾。腎。陰。氣。不。固。固。陰。煎。或。陽。虛。脫。陷。四。維。血。脫。氣。竭。獨。參。湯。或。當。歸。補。血。湯。血。滑。不。禁。龍。骨。散。秘。元。煎。血。臭。脈。滑。者。多。火。散。宜。從。清。涼。若。血。腥。清。寒。脈。細。者。多。虛。必。須。溫。補。

景岳又云。血崩來如潮湧。明是熱勢妄行。然又不可用寒治。蓋寒則血凝。而熱鬱於內。治宜清補。兼為升提。血自循經。經自攝血。而又不不可驟止也。宜地黃阿膠白芍。麥冬。久則多虛寒。又宜溫補。脾。耳。灰。木。耳。灰。之。屬。

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

女科纂要云。崩宜理氣降火升提。漏宜養氣補火。或兼制火。凡崩漏不可多用寒涼。致傷脾胃。不能攝血。歸源。是速其危也。

崩漏脈候

漏下赤白不止。脈小虛滑者生。數盛者死。漏下赤白。日下血數升。許脈急疾者死。遲者生。尺脈急而弦大。風邪入少陰。經女子漏下。赤白脈浮者死。凡五臟俱虛。五色雜下。謂之五崩。肺虛色白如涕。心虛色赤如絳。脾虛色黃如爛瓜。肝虛色青如藍。腎虛色黑如肝。

附方

六君子湯 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

四物湯 見一卷中風

小柴胡湯 見一卷溫

加味道遙散 見一卷火

歸脾湯 見二卷勞瘵

四君湯 見一卷中風

八味丸 見一卷中風

十全大補湯 見一卷中風

附子理中湯 見一卷中風

八珍湯 見一卷中風

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩漏

崩中厥

膠艾四物湯 見本卷調經

震靈丹 禹餘糧 赤石脂 紫石英 代赭石 各四兩 入

一兩 五靈脂二兩

米糊丸 三灰散 棕灰 絹灰 血餘灰

理中湯 見一卷中風

芎歸散 川芎 當歸

小牛角腮散 牛角腮一枚燒赤 鹿茸 禹餘糧 當歸

龍骨各一兩 赤小豆六合

為末 溫酒調服方寸匕 乾薑 當歸 續斷 龍骨 禹餘

大牛角腮散 牛角腮 生地 桑耳 白朮 赤石脂 礬石

積冷

人參 附子 蒲黃 防風 崩漏 卷之二

角腮鹿茸散 牛角腮 鹿茸 當歸 續斷 阿膠 甘草

地榆 丹參 地黃 川芎 赤石脂 龜甲

柏子仁 伏龍肝湯 見四卷痢

旋覆花湯 見二卷痰飲 荆芥四物湯 卽四物加 荆芥 條芩 香附各一錢

奇效四物湯 四物湯加 阿膠 名婦寶丹 此再加 艾葉

養血平肝湯 歸黃芩炒各一錢 香附各二錢 青 柴 芎 地各

柏子仁湯 柏子仁 香附 續斷二錢 鹿茸酒蒸焙 茯神

炙草五分 當歸芍藥湯 黃耆 錢半 白朮 蒼朮 當歸 白芍各一

脾虛

錢 陳皮 熱地各五分 生地 炙草各三

脫血崩

分 柴胡二分

升陽益胃湯 見七卷便血

艾附湯 艾葉 製香附

丁香膠艾湯 當歸錢二分 芍 地各三分 川芎 丁香

鹿茸散 鹿茸 酥炙一兩 龍骨 龜甲 麻炙 熟地 白芍

鹿茸丸 鹿茸 燎去毛 酥炙 赤石脂 續斷各二兩 附子 艾葉 柏葉各

五錢 為末 酒糊丸 牡蠣丸 牡蠣火煨研細醋調丸再煨紅研細 用醋調艾末

五灰散 連蓬壳 黃絹 血餘 百草霜 棕皮俱燒灰 為細末調服或

煉蜜為丸 米 飲下五十九 崩漏 卷之二

固瀉

類證治裁

十灰散 黃絹 馬尾 藕節 艾葉 赤松皮 蒲黃 蓮

米汁 為丸 保陰煎 見五卷瘧

加減一陰煎 見四卷怔忡

徒薪飲 見七卷淋濁

理陰煎 見二卷咳嗽

固陰煎 見二卷脫

秘元煎 見四卷三消

四維散 見三卷飲食

獨參湯 人參一味煎

虛氣 虛陽 固瀉 不瀉 滑瀉 腎脾 盛火 熱血 熱血

氣血

當歸補血湯 黃耆炙一兩 當歸酒洗二錢 木煎服
龍骨散 龍骨煨 當歸 製香附各一兩 枳毛灰五錢
為細末 每服四錢 空心米湯下

類書治裁

卷之八

崩漏

七九

崩漏

杭氏崩漏日久近添腹痛醫疑婦居氣悒失調用失笑散破血中
氣滯加阿膠歸芍熄風和營究竟腹痛未止淋瀝益加血如豆
汁哺時神倦火升陰絡既傷奇脈不固虛陽易炎左部虛不受
按右部浮大少力治宜固攝衝任兼鎮虛陽赤石脂錢二五味分五
龍骨煨丹皮錢二杜仲鹽水炒熱地砂仁蒸白芍山藥俱炒各 釵石
斛茯神各三錢蓮子十五粒雞血藤膏錢二四服淋痛已止去石脂龍
骨加杞子焙鐵龜甲心炙三錢虛火亦除衝任為奇經崩久不止
必固奇經之藥雞血藤膏用以引入陰絡也

鄒氏五旬外暴崩成塊暈絕而甦脈虛此虛風擾動陰絡也用

類書治裁

卷之八

崩漏

三

阿膠三錢水煨服血止仍用熟地茯神白芍荆芥醋炒續斷杞子
甘草炙烏梅取甘酸化陰熄風之旨尋愈

賈氏小水閉澀服導赤散加歸尾赤芍赤苓牛膝得利尺脈猶堅
搏知必經閉血瘀為患諭旬寒熱腹痛暴崩紫黑成塊繼而鮮
紅如注後則淡紅如水或紅白相間淋漓匝月不止頭暈腕痞
粥飲不入神憊肢冷脈細欲絕此陽衰不能攝陰滑而將脫也
急用四維散加半夏砂仁茯神脈症乃定後用大補湯而安

吳氏胎漏半產已匝月崩帶未止用補氣攝血之劑猶淋漓不斷
延至怔忡不安腰腿痠痛脈訣所謂崩中日久為白帶漏下多
時骨髓枯也急須攝固奇經彼徐之才濟以止脫意用金鎖匙

丹龍骨研牡蠣研 茯神遠志炒 赤石脂研 杞子酒 加杜仲棗仁俱 烏梅一服漏止怔忡亦減又加減前方而安

王氏七七之期經斷半載忽又崩淋不已雖血海虧虛但宜續杜攝血兼艾附調氣足矣醫輒以棕灰黑蒲黃止瀉乃至小腹脹滿硬痛拒按頭疼脘痞熱渴心煩小水短瀉脈左弦右數此絡瘀阻痺攻痛宜主理瘀佐通絡乃奇經治法非失笑散決津煎之比五靈脂鬱金汁各八分 牛膝栝蔞橘絡各錢半 延胡桃仁赤芍木通各一錢 當歸鬚降香末各二錢 三服瘀行腹輟但口乾微渴頭仍不清必由液虛風動改用阿膠甘菊炒 麥冬石斛荆芥炒 棗仁茯神白芍蓮子龍眼肉血止諸症亦退又下白帶為氣虛陷

類證治裁

卷之八

崩漏

三

用黨參玉竹茯苓續斷杜仲鹽水 生地炭芡實杞子俱 三服全愈

許氏中年血脫延為帶濁必衝任脈虛夫衝為血海任主擔受而衝脈隸於陽明陽明先衰胃納不旺致血海不固擔任失司此淋漏根由也近則食後脘腹不爽或噯腐背脹必由脾腎陽虛治法攝陰先在益陽以崇生氣以納穀味且脈來左右緩弱溫通為宜製附子三分 益智仁煨八分 沙苑子白芍歸身製半夏各二錢 破故紙杞子俱 烏鰂骨醋 續斷酒 炒各一錢半 胡桃肉二枚 煨薑三錢 三服漏止食進去附子故紙半夏加芡實杜仲兔絲子俱 又數服乃固

包氏經閉疑胎血下每謂胎漏忽然崩注難下脂膜甚多身熱頭暈面赤心煩欬嘔綠沫上欬則下漏嘔作則暈頻湯飲不納急用煨薑汁止嘔欬逆定神漸甦脈虛小而數沈候如無兩尺空虛顯非胎象良由起居不時生冷失節氣血阻滯一時暴下陰虛陽失依附變化內風眩冒嘔逆如風翔浪翻當知陰虛陽搏崩漏乃成血海空乏虛陽升逆乃氣不攝血之咎况陰從陽長宜宗立齋景岳兩先生治法斂陽以攝陰用洋參煨 茯神白芍炒 各一錢 炮薑一錢 五味五分 製半夏焦白木甘草炙 續斷杜仲鹽水 炒各三錢 炮薑一錢 五味五分 製半夏焦白木甘草炙 續斷杜仲鹽水 炒各三錢 二服漏止熱退稍惡寒陽氣尚虛前劑加製川附五分 遂愈

類證治裁

卷之八

崩漏

三

赤症由任帶兩虧火升風煽致心神浮越怔忡不安治以鎮陽攝陰務使陽下交陰陰上戀陽震麻暫已再血海存貯陰絡不傷下元重振尚在靜攝勿以操持擾動厥陽則宵寤汗泄漸安矣熟地山藥五味煨 杞子煨 龜板龍骨阿膠牡蠣煨 杜仲鹽水 龍眼肉數服甚適去龍骨牡蠣杜仲加羚羊角丹皮白芍茯神蓮子芡實續斷等熬膏即用阿膠收小麥煎湯和服漸愈

王氏崩漏成帶至小溲如泔如涕脾骨痛腰膝痠從未餌藥勢必瀝枯髓液延成不治近又春溫氣泄身熱食少口渴頰紅液涸陽升脈右弦左弱急攝陰固下熟地炒 阿膠煨 石斛各二錢 洋參三錢 麥冬茯神赤石脂各錢半 白芍杜仲青鹽 炒 甘杞子續斷各三錢 加

蓮棗煎數服症漸減去石脂再服又去阿膠加芩實山藥俱炒又數十服得效

魏氏經阻暴崩疑為胎漏按脈無孕象乃聚瘀日久致患曾經調治得安今暑溼令行頭暈嘔惡哺後骨蒸寤不成寐忽又暴崩脈虛疾症屬內因必由陽明脈虧木火乘侮是以貫膈犯巔震及血海血海一空則骨節生熱治宜和陽安胃佐以鎮絡嫩桑葉甘菊炒天麻白芍釵斛棗仁茯神牡蠣煨研海螵蛸醋炙橘紅半夏炒續斷數服諸症悉平惟左關尺孔弱乃肝腎陰傷用熟地黃肉山藥白芍俱炒茯苓杜仲鹽水炒海螵蛸鹽水炒阿膠烱數十服得痊又接服雞血藤膏而經固

類證治裁

卷之八

崩漏

三

胎前論治

婦人受孕則月事不行診其脈足少陰腎脈動甚者妊子也經云陰搏陽別謂之有子王註陰謂尺中搏謂關搏於指與寸脈俱別則為孕故胎脈微滑若經候三月不行欲驗之胎飲腹中微動者胎也否則經滯金匱云娠下血腹中痛為胞阻膠艾湯腹中疝痛此木邪克土當嘔吐不止此為惡阻參茸常服易產當歸散徐之才曰受孕一月名胎胎足厥陰肝脈養之二月名始育足少陽膽脈養之三月名始胞手少陰心脈養之四月形體成手少陽三焦脈養之五月男女分足太陰脾脈養之六月筋骨具足陽明胃脈養之七月毛髮生手太陰肺脈養之八月臟腑具手陽明大腸脈養之九月穀氣入胃足少陰腎脈養之十月

類證治裁

卷之八

胎前

三

足太陽膀胱脈養之臟腑齊通納天地氣於丹田俟時而生亦有未及期而產或過期而產者凡懷孕則血留氣聚脈多滑數其殞胎多在三月是血熱故胎前症治率以清熱涼血為主蓋胎得涼則安其有外邪則邪去胎自安若妊婦稟弱脈微症屬虛寒法當溫補者又當別論也

女科纂要云產前當補脾清熱養血如金匱當歸散之類蓋補脾則中氣固而無半產胎動之虞清熱則火不妄動而無胎漏煩淋之患養血則胎有所資而無坐草艱難之苦至八九月仍加順氣之劑俾氣順而骨自開血足而胎自滑阻受孕二三月間衝任上壅氣不下行嘔吐痰水頭重目眩懶動

嗜臥惡食喜酸或偏嗜一物問作寒熱為阻病千金用半夏茯苓
九。今人以半動胎鮮用。通用白朮湯。二香散。竹茹。然。實未動
胎也。脾虛食少者。湯。六。胃虛多痰者。湯。飲食停滯者。加神
腹脹滿不安者。或香壳散。肝氣致逆者。煎。氣滯兼痰者。七。氣
中寒吐逆者。溫胃。

胎。妊娠血下衝任經虛不能約制也。通治。安胎當。絡虛者。膠艾四
氣虛者。加人參。去茯苓。漏血腹痛者。鈎藤。漏血發熱者。加味。道
入房致損者。加膠艾。亦有妊娠後按月經至而胎不損者。係陰血
有餘不必強止。但與涼血。胎漏黃漿。或如豆汁。炙者。六。兩。糯
分。四。服。或。芎。根。二。兩。若。肝。脾。溼。熱。升。陽。除。肝。脾。鬱。結。脾。湯。加。味。歸。脾。
銀。五。兩。水。酒。煎。服。

類證治裁 卷之八 胎前

經風熱。防風黃。妊娠溺血。胎漏血自人門出。熱乘血分。滲入
胎中。積斷。兼痛。導赤。怒動肝火。小柴胡湯。膀胱血熱。山梔。髮。加
因暑湯煩。益元。稍虛者。物。湯。症久。末。五。錢。酒。調。服。黃。
此胎氣熱動而不安也。通治。加。安。胎。散。風熱傷絡失安者。鈎藤。胎
氣逆上喘急者。紫蘇飲。加。飲。酒。房。室。損。動。者。四。君。湯。觸。損。胞。宮
者。血。下。腰。痛。膠。艾。湯。立。安。有。微。若。負。重。跌。墜。凝。瘀。作。痛。煎。膏。人
紅。酒。童。便。調。服。加。續。斷。葱。白。若。負。重。跌。墜。凝。瘀。作。痛。煎。膏。人
嚼。連。皮。胡。桃。肉。痛。即。止。如。未。止。必。血。下。胎。傷。益。母。地。黃。湯。若。因
母病致胎不安。但治母病胎自安。暴下水。胎必墮。急用補氣安
凡胎漏胎動皆下血。而胎動有腹痛。胎漏無腹痛。故胎動宜行
氣。胎。漏。宜。清。熱。

胎不胎之長養。全賴母氣。其精血雖由肝腎。輸運。而恃乎脾。脾衰
食減者。加砂仁。心脾不足者。歸脾湯。元氣不足者。大劑。係。增。助
母氣。則兒受蔭。自無乾萎之患。若氣虛兼衰者。八。珍。湯。
胎。大。孕。至。七。八。月。胎。大。宜。布。束。之。則。腰。健。內。服。健。生。如。膏。梁。安。遠。身
肥。胎。大。須。防。難。產。或。枳。壳。散。
胎動不安。勢必下墮。多由妊母衰病。或觸損頭。休所致。然墮在
三。五。七。單。月。居。多。且。前。次。三。月。墮。後。次。至。期。必。墮。乘。其。虛。也。須
早。服。養。氣。血。護。胎。元。之。劑。加。減。八。珍。湯。添。續。蓋。氣。虛。則。提。攝。不
固。血。虛。則。灌。溉。不。周。胎。元。欲。加。減。或。孕。後。最。忌。腰。痛。胞。繫。於。腎
而。腰。為。腎。府。腰。痛。則。防。墮。胎。前。必。察。所。傷。之。由。預。培。其。損。若

待臨期。則無及矣。
產。俗。名。小。產。由。衝。任。氣。虛。不。能。攝。養。或。因。閃。動。及。熱。病。溫。瘧。之。類。
其。險。甚。於。大。產。凡。孕。未。足。月。痛。而。欲。產。八。珍。湯。去。茯苓。熟。地。加
若。胎。下。血。不。止。用。參。耆。朮。草。虛。熱。加。炮。薑。寒。熱。腹。痛。手。按。益。痛
者。宜。散。瘀。丹。皮。澤。蘭。童。便。選。用。按。之。痛。緩。為。血。虛。宜。溫。補。八。珍。
芍。加。痛。而。嘔。瀉。為。胃。虛。加。炮。薑。去。血。多。發。熱。湯。聖。愈。汗。不。止。湯。係。元
發。熱。煩。躁。筋。惕。肉。瞤。十。全。大。大。湯。面。赤。脈。洪。而。虛。當。歸。補。身。熱
而。赤。脈。沈。而。微。加。黃。附。東。垣。曰。正。產。及。半。產。補。下。昏。冒。不。省。眼
目。無。知。由。心。血。暴。亡。心。神。失。養。包。絡。火。升。故。令。昏。冒。火。勝。其。肺
故。令。目。暝。不。可。用。寒。涼。瀉。火。之。藥。蓋。暝。目。之。病。悉。屬。陰。即。如。傷

類證治裁 卷之八 胎前

類證治裁 卷之八 胎前

寒鬱胃得汗乃解必補而升舉之。如補中益氣湯加麥冬、五助其陽則目張而神甦矣。

煩出於肺。躁出於腎。妊娠心驚膽怯。終日煩悶。係心肺虛熱。葉

湯。夏令心火乘肺。胎動心煩。宜生脈散。心脾聖熱散。犀角。肝火致

煩。加味逍。肺胃燥熱。湯。竹茹。腎虧火躁。黃湯。煩躁口乾。丸。知母。

胎氣。胎氣上胸膈滿悶。必素多鬱悶。痰氣壅塞。致胎氣乘鬱。火升

自心下急。以童便灌之。次以紫蘇飲四五服。若胎上逼心煩悶。脈浮滑者。葱白

飲。胎立安。胎上衝心。悶痛欲死者。常歸湯。痛立止。

因土不制水。小便閉澀。致面目肢體浮腫。然有水氣。有胎氣。其

胎中挾水。水血相搏。浸漬肌肉。令腫者。為水氣立齋云。胸腹急

脹。脇肋不分。溺閉者。千金鯉魚湯。脾虛者。佐以四水溢肢體。面目虛

浮者。全生白朮。脾虛溼熱。下部腫者。補中益氣湯。飲食失節。嘔

瀉者。六君湯加神。若胎至七八月。脛膝漸腫。足趾出黃水者。為

胎氣非水也。至分娩方消。宜天仙。鄭虛庵云。身半以上腫者。發

汗。身以下腫者。利小便。上下俱腫者。汗利分消其溼。

子。妊娠咳嗽。胸膈不利者。百合。風邪傷肺者。香蘇。寒邪傷肺者。小

嗽。大邪傷肺者。紫菀。肺胃氣虛者。異功。脾肺氣虛者。六君湯。建

子。岐伯曰。人有重身。九月而瘖。此胞絡脈絕也。胞絡脈繫於腎。少

陰脈貫腎繫舌本。當十月復石。頑曰不語者。多痰蔽心竅。濃煎

散。服地。助肺腎之氣。以養胎。若與通聲開發之藥。則誤矣。

類證治裁 卷之八 胎前

類證治裁 卷之八 胎前

利。妊娠受風。痰湧發搐。口噤身強。冒昧不醒。須與自甦。此陰火鼓

動其痰。宜清熱化痰理氣。仍以安胎為主。勿過用風藥。血虛膽

火。加味道遙散。加羌活、羚羊、肝膽風熱。鈎藤。氣逆痰滯。飲。紫蘇。脾

鬱痰滯。竹瀝薑汁。中風口噤。目弔。角弓反張。角散。

此症屬氣與痰。虛陽上升。則痰動。古謂無痰不作眩暈也。目昏

發厥。用紫蘇飲。去蔥薑。若口噤不能言。錄黑豆三合炒。淋酒煎

服得汗。即愈。

此小腸膀胱虛熱。虛則不能制水。熱則不能通利。故溺頻澇而

成淋。本非安。然胞繫於腎。若腎經虛。移熱於膀胱。溺數而痛。宜

料六味丸。加麥冬。膀胱陽虛。陰無以化。腎氣肺氣虛。而頻數短

五味子。桂心。車前。膀胱陽虛。陰無以化。腎氣肺氣虛。而頻數短

少。生脈散。加小腸熱而赤澇。導赤。肺虛膀胱熱而氣化不行。脈

合導。肺經蘊熱。肺飲。肝經溼熱。加味道。頭眩溺不利。芥子。茯

赤散。肺經蘊熱。肺飲。肝經溼熱。加味道。頭眩溺不利。芥子。茯

道。妊娠遺溺。不知胎滿故也。微散。千金白。立齋以胞中有熱。遙散。脾

肺氣虛。補中益氣湯。肝腎虛熱。六味。胎過及脬。壓在一邊。脬繫轉捩。臍下急痛。溺數或閉也。若舉起

其胎。如補中服後探吐。以提其氣。溺自出矣。丹溪用參。服後探

吐。八次而效。傷風頭重鼻塞。發熱惡風。香蘇散。去香。熱服。取微汗。若欬嗽多痰。加

梗。或紫蘇飲。加葱豉。本草。能通陽安胎。豆豉。能解肌取汗。熱服。取汗。或葱。汗出即

類證治裁 卷之八 胎前

安。或加薄。若妊婦熱病。亦用葱豉。加忌用發表諸藥。若溫熱時行。邪氣內犯。熱毒迫胎。宜千金石。膏大青湯。

寒熱有時。感六淫食滯之邪。而發熱。邪甚則損胎。故以安胎為主。初起頭痛喜嘔。胸滿脇痛而寒熱者。湯主之。寒多熱少者。人

者。六君湯不應。久瘧正氣衰。或間二日發者。必扶正。加常歸砂。仁。髓。甲。首。烏。山。嘗見胎前陰瘧不愈。產後延成。尋損者多矣。

張氏醫通曰。孕痢有三禁五審。一禁蕩滌腸胃。使胎氣下墜。二禁滲利膀胱。使陰液脫亡。三禁兜瀉滯氣。使後重轉加。故治先

調氣。以陳皮。煨木。香厚。樸之屬。開通壅滯。則後重除矣。一審飲食之進不進。

清理積滯。如提連砂。則飲食進矣。二審溲之通不通。升清降濁。補中加扶。則水道通矣。三審腹之痛不痛。紅痢急痛者為火。宜

連。梔。白。痢。虛。痛。者。為。寒。宜。丁。香。肉。果。煨。薑。等。四。審。後。之。重。不。重。初。痢。後。重。宜。開。通。其。滯。陳。枳。等。久。痢。後。重。宜。升。舉。其。陽。舉。元。五。審。身。之。熱

不熱。如人迎浮數。先用和營透表。宜當歸。紫蘇。薄荷。疏解後。再行

清理。若初起未發熱。痢久衛虛。因感冒而發熱者。左三部必浮。須理中湯。表裏合治。若痢久身熱。脈來漸小。或虛大少力。此

沫如水。色晦如塵。急須溫理其氣。故凡沫之清稀不稠。色之痰晦不鮮者。皆係虛寒。急投參。艾。或可保全。嘗治妊娠腹脹後重。白痢粘稠。用厚樸湯。妊娠腹痛食少。白沫清稀。用甘草乾薑腹後重痢。兼赤白。半夏湯。能食後重。血痢粘稠。送香連丸。少腹重痛。痢血。或鮮或瘀。金三物膠艾湯。發熱後重。陰虛血痢。用車熱毒內攻。噤口不食。腹脹後重。膿血稠粘。用白頭翁湯。清稀久痢。胎動。用千金膠。瘧痢氣虛。胎墜溺數。用補中。以上皆孕痢方內。竝加。以調氣。梅。以調血。未嘗不隨手輒效也。

傷。妊。感。暑。煩。渴。亂。黃。連。香。薷。飲。熱。甚。而。渴。香。薷。飲。加。麥。冬。五。母。花。粉。之。屬。

諸胎前頭痛。調散。宿有偏正頭風。前散。如心氣痛。散。火龍。心痛。悶絕。產。胃。脘。痛。養。胃。脇。痛。解。肝。煎。背。痛。氣。滯。飲。紫。蘇。腹。痛。因。寒。因

食。並。正。腰。痛。通。氣。腎。虛。腰。痛。大。補。小。腹。痛。絡。虛。為。風。寒。所。襲。紫。飲。加。寒。氣。滯。痛。香。附。小。溫。而。散。之。腰。腹。痛。胎。不。安。當。歸。阿。膠。甘。葛。胎。動。血。下。腰。腹。急。痛。等。湯。

小腹痛近下。腫痛皮薄光亮者。瘕也。千金托。若急痛煩悶。胎氣上衝。面青汗冷。血下不止者。不治。

乳泣。未產。乳汁先下。名乳泣。生子多不育。兒在腹中啼哭者。因

改帝音。濃煎黃連汁。又妊婦腹內鐘鳴。用空房下鼠穴中土一。鬼胎脈多沈細弦澹。大小不調。或由經行飲冷。血蓄衝任而成。者或由停痰著水。與絡中瘀積互結而成。皆內因之病。實非外感之邪。其腹雖漸大。亦且微動。究與真胎各別。治以理氣行血為主。加莪朮。蘇木。牛膝。南。用十全。緩圖收效。不可峻用。烏。巴。厲。劑。急。迫。取。管。見。孕。過。期。產。出。水。胎。異。形。其。後。必。費。調。理。死。胎。產。母。舌。青。腹。中。冷。而。重。墜。是。胎。死。矣。宜。速。用。後。察。虛。實。調。補。若。舌。與。爪。甲。俱。青。腹。脹。氣。喘。口。中。臭。穢。者。危。速。令。穩。婆。以。古。法。用。便。調。補。五。錢。或。不。虛。寒。用。理。中。湯。倍。人。冬。月。胎。死。腹。覺。冷。用。胃。散。水。酒。煎。調。補。虛。寒。參。煎。調。補。用。童。便。乘。唇。青。吐。沫。不。治。桂。散。加。烏。頭。或。惡。血。上。逆。嘔。搗。昏。暈。熱。灌。之。唇。青。吐。沫。不。治。黑。神。散。龍。丹。

類證治裁 卷之八 胎前

凡面赤舌青。母活子死。而青舌赤。母死子存。而舌俱青。母子兩亡。過期。因氣虛者。補氣。因血漏者。培血。氣血不足者。益其氣血。若過期。脈沈細者。非胎也。亦有胎已萎。而在腹不腐。服補劑以和其氣血。而自下者。胎前脈候。婦人經停二三月。脈微滑而數。尺中按之不絕者。妊娠。凡妊娠宜滑利數實。不滑不弦不伏。大忌遲滯浮緩。辨男女脈法。左大為男。右大為女。然多素稟偏大者。惟寸口滑實為男。尺中滑實為女。又如兩尺俱滑實為雙男。兩尺俱滑實為二女。左寸右尺俱滑。

實為一男一女。此最驗者。通妊娠初時寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。脈滑澹。重以手按之散者。胎三月脈重。手按之不散。但疾不滑者。五月也。脈若脈沈細。按之冰冷。或兩尺乍大乍小。乍有乍無。鬼胎也。脈來急如風雨。少停復來。如初者。夜又胎也。寸微關滑。尺帶數。流利往來。并雀啄。小兒之脈已見形。數月懷胎。猶未覺。脈欲產之脈。必離經。其來大小不勻。停或如雀啄。屋漏。應。膈。痛。腹痛。眼生花。產在須臾。非病。

附方

探胎飲 川芎為末。空心煎艾湯調下。腹動者胎也。臍下動者胎也。不動者血凝也。膠艾四物湯 見本卷調經。

類證治裁 卷之八 胎前

當歸芍藥湯 見本卷調經。參茸半夏湯 參 茸 半夏 當歸飲 見本卷調經。半夏茯苓湯 半夏 茯苓 陳皮 砂仁 各一錢 烏梅 二個 薑 棗 水煎 經謂無陰則嘔。用烏梅。以飲陰也。茯苓丸 赤苓五錢 人參 桂心 乾薑各一錢 半夏 茯苓 陳皮 各一兩 白朮 炙草 枳殼 葛根 各五錢 為丸。白朮湯 炒白朮一兩 人參五錢 丁香二錢半 甘草一兩 水煎。每服二錢。加生薑水煎。治胃虛吐水。十餘日水漿不。得下者。二香散 香附一兩 藿香葉 甘草各二錢 為末。每服二錢。開水調下。

嘔脹 寒胃 逆氣 脾虛 胃虛 停滯 食滯 脹滿 肝氣 類證治裁 胎前 胎後 胎動 胎熱 胎傷 胎損 胎除 胎溼 胎肝 胎脾 胎風 胎熱

竹茹湯 參 橘 麥 木各一兩 厚樸 赤苓各五錢 竹茹 甘草二錢半 為末每服五錢 加薑五片

五錢 水煎 人參丁香散 人參五錢 丁香 藿香各二錢半 每服五錢

縮砂散 砂仁研二錢 薑汁調米飲下 六君湯 見一卷中風

橘皮湯 橘皮 竹茹 人參 白朮各二錢 厚樸錢半 香砂湯 木香 砂仁

小和中飲 山查 扁豆各二錢 陳皮 茯苓 厚樸各錢半 香附 枳殼俱炒 每服二錢白湯調下

香壳散 香附 枳殼俱炒 每服二錢白湯調下 解肝煎 見三卷諸氣

七氣湯 見二卷欬嗽 溫胃飲 見一卷中風 安胎當歸湯 歸 芎 人參 阿膠各一兩 艾葉一把

四君湯 參 苓 朮 草 鈎藤湯 鈎藤 當歸 茯神 人參 桔梗 桑寄生各一錢

加味道遙散 見一卷火 八珍湯 見一卷中風 升陽除溼湯 見一卷溼

加味歸脾湯 歸脾見二卷勞瘵 此再加 山梔 柴胡 防風黃芩湯 防風 條芩 酒糊丸 酒下二五十九

類證治裁 卷之八 胎前

續斷湯 當歸 生地各一兩 續斷 白芍各五錢 每服二錢 葱白湯調下

導赤散 見一卷溫 小柴胡湯 見一卷溫 四物湯 地 芍 歸 芎

益元散 見一卷溫 安胎散 地 芍 歸 芎 各一錢 加薑 棗 水煎 艾葉 蒼 草

紫蘇飲 蘇 葉 二錢 大腹皮 歸 芍 各一錢 蘇 白 水煎 陳 各一錢

十聖散 地 芍 歸 芎 各五分 加薑 蘇 白 水煎 參 耆 木 砂仁各五分

益母地黃湯 生地 益母各二錢 歸 耆 各一錢 異功散 見一卷中風

保元湯 見一卷火 安胎飲 芎 蘇 木 歸 各一錢 芎 各八分 陳皮 香附 砂仁 大腹皮 參 水 歸 芍 各六分

達生散 砂仁 枳殼 各五分 芎 炙草 二錢 水煎 蘇 各一錢 瘦胎飲 血餘 錢 半 歸 芍 各五分 芎 炙草 二錢 水煎 木香 各一錢

枳壳散 枳壳 麩炒 四兩 芎 炙草 二兩 為末白湯調下 胎元飲 參 歸 芍 杜仲 各二錢 熟地 三錢 白朮 錢 五分 陳 草 各一錢 水煎 氣虛 加黃耆 虛

寒加 炮薑 泰山磐石散 參 耆 歸 芎 續斷 各一錢 芎 地 糯米 芍 各八分 白朮 二錢 炙草 砂仁 各五分

千金保孕丸 杜仲 四兩 糯米 炒斷 續斷 二兩 酒洗 以 山藥 粉 糊 九 桐子 大 每服 八九十九 空心

類證治裁 卷之八 胎前

痛服白痢赤痢熱病後重血痢血痢陰虛熱久痢熱病久痢

厚樸湯 見七卷便秘

甘草乾薑湯 甘草四兩 乾薑二兩

茯苓參甘半夏湯 茯苓 參 草 夏 薑 棗

芩芍湯 芩 芍 草

香連丸 見四卷痢

連理湯 見一卷暑

三物膠艾湯 阿膠 艾葉 石榴皮 等分水煎

駐車丸 見四卷痢

白頭翁湯 見四卷痢

千金膠艾榴皮湯 卽三物膠艾湯

黃連香薷飲 見一卷中風

十味香薷飲 五物香薷飲加 木瓜 參 耆 陳 朮

五物香薷飲 見一卷中風

川芎茶調散 見一卷傷風 川棟子 茴香各炒三錢 艾葉鹽炒錢半 水煎

火龍散 芍 歸 苓 樸各一兩 分二服

產寶丸 見一卷中風

正氣散 故紙瓦上炒香研末 先嚼核桃肉一个 溫酒調

通氣散 故紙末三錢

大補元煎 見一卷中風 芋根湯 生地 芋根各二兩 歸 芍 草 阿膠各一兩 分三服 水煎

死胎癩孕 難產冷腹冷腹死胎

千金托裏散 參 耆 草 芍 歸 桂 防 芷 枯

脫花煎 當歸七錢 川芎 牛膝各二錢 車前子錢半 水煎 如胎死不下加樸硝

平胃散 見一卷中風

香桂散 麝香五分 桂心二錢 酒下

黑神散 見二卷血

黑龍丹 五靈脂 當歸 生地 川芎 良薑各二兩 以

乳香 硫黃 琥珀 花蕊石 煅各研三錢 共和糊丸 彈

子大 臨服煨紅入薑浸服酒下

類證治裁 卷之八 胎前

胎前

石氏瀝浙惡寒嘔吐絕穀湯飲不下者四旬餘奄奄沈困身冷而陽垂絕診之脈伏沈候似無予斷為胎其家疑未信予謂此藥阻之重者胎無疑也夫胞宮血聚氣不下行必至濁陰上犯阻塞陽和嘔逆厥冷非薑附無以通陽洩濁其翁懼熱藥胎墮予曰經云有故無殞係無憂也先與熱薑汁繼和以米汁嘔吐止進附子理中湯加製半夏三劑身溫嗣用異功散加砂仁煨薑五服而安至期產一女

鄭氏寒熱咳嗽食減經阻醫謂損怯進補劑中滿嘔噦惡聞食氣煩暈善驚更醫以為肝風用和營鎮驚延及神色困憊時或暈

類證治裁

卷之八

胎前

完

絕舉家惶惑請臨診一決予曰此胎脈右尺已動滑勿藥可也經云陰搏陽別謂之有子言陰搏於下陽別於上氣血調和即胎脈也脈訣云尺內不止真胎婦言尺脈綿綿不絕為胎結也無已姑用益陰和陽白芍柏子仁茯神甘菊炒棗仁炙草小麥桑葉南棗四服漸安後生一子

某氏經閉成塊疑為瘀腹痛猝崩醫云瘀滯未淨用攻消藥淋瀝日甚予謂瘀血既行理無作脹診脈陽虛而陰搏知妊娠血漏用七味阿膠散加白芍木香杜仲續斷血止脈消後果孕產○此安胎止漏兼暢脾攝血脹痛自除蓋妊娠下血名曰胎漏多由閃挫損傷胞絡致之若轉用攻伐再動新血益加虛痛作脹直至墮胎方悔耳

魏氏經止兩月腹痛脹食減夜熱醫謂經閉用通利藥血下不止更醫見亦同用牛膝紅花炮薑枳殼漏益甚腹加痛脹頭暈腰疼煩熱不寐予診之覺尺脈搏指兩寸獨別胎脈也但熱久攻伐藥多恐損動胎元且致胞系不固耳用香附童便白芍炒行氣和血以除痛脹蒲黃炒黑荆芥醋止血而除暈杜仲酒炒阿膠化熱地固腎以攝下茯神麥冬棗仁炒安神以止煩一服症減而思食胎如指墮前方去白芍阿膠蒲黃麥冬加查肉當歸醋炒炙草蓮子數服乃安

類證治裁

卷之八

胎前

完

謝氏孕踰三月男女分形病者漫謂血癥治者誤行攻伐致血下注胎墮身熱汗煩眩暈不寐索方乃桃仁牛膝莖朮紅花等劑明晨更加生查肉子見駭甚詢之則曰胎墮未便告知婉云瘀血已行耳醫尚未知所下男胎也因歎庸手殺人殊堪髮指急以參耆茯神固攝元氣佐以炙草荆芥醋炒阿膠炸麥冬五味牡蠣醋龍眼肉紅棗數服汗收血止

湯氏孕四月胎漏鮮紅係傷胞絡輒用芩芍苓根湯轉致腹痛泄瀉據脈候虛緩本非火迫絡傷致漏宜溫補瀾隙自安做膠艾湯海螵蛸阿膠杜仲茯苓杞子艾絨續斷炙草砂仁數服而安
陸氏孕五月屢墮翁商之子謂孕逢五月足太陰脈養胎想脾胃血素虧耳若獲孕先二三月預服固攝之劑用胎元飲參苓朮草地芍歸陳杜仲續斷砂仁兔絲艾實薑棗水煎每月服五七劑

胎遂固生一子僅綿一綫後竟不孕

薛氏孕六月因勞便紅頭微眩此腸風宿恙因熱傷陰分而成用

白芍地榆俱酒炒當歸荆芥俱醋炒山梔炒扶神炙草阿膠酒化側柏

葉搗水煎三服而瘳

姪女孕七月久泄瀉肛墜足腫吐欬腹微痛喘寒熱如瘡脈弦右

尺滑大此中氣下陷土衰木乘以補中益氣湯減歸耆加砂仁

製半夏茯苓煨薑數服痛墜寒熱俱減因其腸胃久滑不戒葷

茹世瀉仍作加穀芽炒茴香炮薑等味而安

鄧氏孕七月餘與夫口角為麪杖所傷左脇大痛下部如裂胎氣

上逼撐拒欲死服婦科藥入咽格格不下喘吼待斃而已診之

類證治裁 卷之八 胎前

脈洪數無倫體如烙面如赭察其唇舌未變青紫知胎未損慰

之曰幸母子俱無恙也用牛膝蘇梗栝藹紅花各二錢歸尾枳壳

各錢降香錢三丹皮錢一煎服喘止痛定熱退進粥盃許隨用順

氣安胎之劑而平

族女孕八月因勞吐紅鮮紫成盆火升則哈欬類赤少寐口不知

味服童便阿膠不止診脈左寸關大兩尺俱伏此君相之火逼

傷陽絡必得火降哈欬平紅自止用生地山梔連翹白芍杏仁

貝母百合茯神甘草蓮子燈心阿膠樣三服欬稀血止安寐矣

後用熟地當歸白芍杜仲鹽水炒杞子焙以實下元尺脈亦起

呂氏將產腹痛血下脈短滑左虛芤子謂脈未離經決非正產右

關短滑係食滯腹痛見紅由觸損但須行氣補血用紅米麴陳

皮查肉利氣消滯以當歸白芍和血定痛逾兩旬乃產

某氏過期不產按月經行事所或有今述孕已兩載兼見乳汁腹

大不產計欲攻墮然細診卻非產脈須知漏厄不塞孕何由成

且萬無攻墮之理雖屬怪症應以常法主治惟明理者知之方

用熟地潞參當歸白芍白朮炙草杜仲杞子續斷砂仁廣皮蓮

棗此以氣攝血之劑多服則漏止胎長接服二十劑又逾八九

月而產

類證治裁 卷之八 胎前

臨產治要

臨產將護良方條列備已。陳自明編婦人良方。茲並考綱目醫通

諸家。張石頑老人著醫通。武之望編濟陰。擧其要凡孕至八九

月。散劑則易產。至臨月胞漿未破而血先下者。或是傷胎。倘非

正產。宜大劑保元湯。如胎氣上逆。急服熱童便。若正產時氣血動

盪。脈必滑疾異常。如脈尚安和。腹雖痛而未緊。猶試痛也。必腹連

腰陣痛益緊。兒欲轉身順產。自然胞破水下。如瓜熟蒂落。不用催

生太早。只須產前補血降氣。胎煎。繼則活血行氣。無憂散。亦有胎

衣不固。或用力太早。隨觸而破。至胞漿下而仍不產。恐其水涸路

澀。兒難轉身。但服八珍湯。或大劑五助其氣血。則胎滑易產。若持

類證治裁 卷之八 臨產

久力乏。用獨參湯。補接元氣。雖逾數日。旬日而產者。有之。男胎向內。女

胎居上。足居下。臨產時必倒轉。順出。須再三緩。丹溪云。催生只用佛

手散。最穩而效。或三合濟。更有兒頭正抵產戶。而交骨不開。此陰

氣虛。用加味芎藭湯。不若坐產艱難。用免腦丸。如其兒手先出。為

積生。足先出。為倒產。由產母用力太早。當令仰臥。以鹽少許。擦兒

其肩。候其身正。方可用力。更有兒頭偏注。左腿者為偏產。由產

母力逼致之。以手推上扶正。用力送下。若兒頭已正。不能即產。因

臍帶絆其肩者。為礙產。以指按兒肩。去其絆。若兒未出。產母腸先

出者。為盤腸生。待兒并胎衣下後。用香油抹手。徐徐送入。或用醋

老薑收其草麻子。研塗頂心。然後半坐。以軟布抵之。內服舉。若胎死

腹中須驗產母舌青黑。爪青紫。口沫。腹陰寒而氣穢。急用平胃

胎死久乾者。背者。膠滑之。胎衣不下。臍帶勿令血入衣中。脹而難

下。內服回生。可下。如久不下。血入衣中。上衝心胸。喘急。痛脹。急宜

升。或牛膝湯。或失笑散。溫酒調服。胎衣立下。景岳云。胞在腹中

速。形如荷葉。上仰則聚血。而脹難出。當令穩婆。以指攀其上

口。令惡露傾瀉。則如氣虛。腹不脹痛。透燒紅鐵秤。鍾洋酒。將豆淋

酒。化益母。既產陰氣虛。產門不閉。或陰火下流。陰挺。突出。其氣血

虛而不閉者。十全大補湯。補而斂之。其憂思傷脾。熱痛者。加味歸

腫而焮痛者。道遙散。加丹。暴怒傷肝。動火者。肝湯。元氣虛。子宮

不收。桂心醋炒。白芍。補而舉之。產時氣隨血去。忽頭眩。眼黑。神昏

口噤。其症有二。一為氣脫。一為血暈。氣脫者。面白。眼閉。口闔。手冷

類證治裁 卷之八 臨產

脈細欲絕。速用人參一二。但得下咽。即甦。稍遲則無救矣。血暈者

臨產元氣已損。惡露乘虛上攻。頭暈眼花。心胸悶絕。灌服清魂散

如下。血多而暈。神昏煩亂者。芎藭湯。加人參三五錢。澤蘭。補而兼

散之。下血少。而上搶心者。童便煎。失笑。痰壅氣粗者。二陳湯。并用

燒紅秤。以醋沃之。使若狂亂。失志。為敗血衝心。多死。或奪命散

產母嗅其氣。則暈可止。若狂亂。失志。為敗血衝心。多死。或奪命散

嘔惡。腹滿。為惡露衝胃。平胃散。面赤。嘔逆。為氣血衝肺。人參蘇

惡露不行。腹痛拒按。用桃仁。歸尾。延。惡露不止。淋瀝太多。係陰煎

絡傷者。固陰煎。肝脾氣虛者。補中湯。氣血虛色。兒枕作痛。用生熟

沙糖煎服。或腹痛連腰。按之痛緩。為虛。宜當歸。香附。炙草。杜仲。小

用延胡散。此皆臨產成法。擧舉之。為因心化裁者。鑒焉。

論血暈

產後血暈。因陰血暴虛。孤陽上冒。忽然頭旋眼黑。昏悶不醒。急用散或以童便熱服。然有血下過多而暈者。有血下少而暈者。暈雖同。治法則異。如血下多而暈。神昏煩亂而已。治宜補血清心。如生地白芍。冬阿膠人參。湯煩汗熱。加烏梅山梔丹。煩熱。去當歸。血下少而暈。龍齒棗仁等。乃惡露不下。上捨心。心下滿急。神昏口噤。治宜行血破瘀。如生查。牛膝桂心歸尾。或四味散。黑神散。若痰火上壅。用導痰湯。加清。蘇木。合失笑散。或鹿角散。鬱金散。若痰火上壅。用導痰湯。加清。降治之。有一產婦暴死。但胸微熱。陸嚴診之曰。血悶也。以花紅。煮沸入木桶。寢婦於上。熏之。湯冷加之。遂指動而甦。

論產後諸禁

類證治裁 卷之八 臨產 一禁臥。恐血氣未定。遽臥則惡血上升也。二禁酒。恐助火升。助其陽。致眩暈也。三禁浴。恐水溼心竅。致喘滿腫重也。四禁寒。恐血氣凝滯。腹痛吐瀉。諸變叢生也。五禁汗。恐風藥性升。開泄傷陽也。六禁下。恐腸腑津液傷也。七禁利。小便恐傷腎氣。蟄藏也。八禁寒涼。藥恐傷胃。或滋痰痛也。白芍地黃黃。九禁交合。早恐百脈開張。頭眩少腹急滿也。十禁起。早作勞。不避風寒。不謹食忌。致滋疾也。

臨產脈候

胎前脈宜實。胎後脈宜虛。產後寸口脈洪疾不調者死。沈微附骨不絕者生。沈微而滑者生。實大弦急者死。胎前脈當洪數。產後仍洪數者死。胎前脈細小。產後脈洪大者多死。

類證治裁 卷八

附方

胎順 達生散 大腹皮三錢 人參 陳皮 紫蘇各五分 歸身 黃楊葉梢七個 白芍錢半 炙草二錢 慈五條 水煎 仔元湯 見一卷火 紫蘇飲 見本卷胎前 滑胎煎 歸地各三錢 山藥 杜仲各二錢 川芎 枳 仔產無憂散 芎 芍 枳 草 木香各一錢半 水 和勻 再入乳香研 血餘燒存性研各五分 八珍湯 見一卷中風 五物湯 四物湯加 肉桂

類證治裁 卷之八 臨產

難產 三合濟生湯 當歸三錢 川芎 枳壳各二錢 製香附 煎 待腰痛腹痛時 服之立產 加味芎歸湯 當歸一兩 川芎五錢 收龜板一個 酥炙 兔腦丸 兔腦研如膏一個 乳香二錢半 母丁香一錢 每丸 麝香一字 共研細 以免腦髓和丸 芩實大 陰乾 溫水下 如聖散 紫蘇 當歸 等分 每服三五錢 如意散 人參 乳香各一錢 辰砂五分 為末 臨產時用 佛手散 當歸三兩 川芎四錢 研末分四服 加酒半盃 如神散 百草霜 白芷 各等分 每服二錢 以童便半盃 調也 血免血 和 加沸湯調服 治橫生逆產 血得黑則止 能固

立應散 當歸 車前子 冬葵子 白芷各三錢 牛膝 大腹皮 枳壳 川芎各二錢 白芍一錢 水煎

治橫生 逆產

舉元煎 見三卷飲食

平胃散 見一卷中風

葵子阿膠湯 葵子一升 阿膠二兩 水煎

回生丹 蘇木三兩 黃去渣 紅花三兩 酒煮去渣 黑豆三 升水煮去豆 大黃一兩 為末煮 熬成膏次下

上三汁 再熬 人參 白朮 青皮 木瓜各三錢 當歸 川芎 延胡 香附 蒼朮 五靈脂 赤茯苓 地榆 甘草 各一兩 牛膝 三稜 山黃 烏藥二兩 半

查肉 陳皮 白芍各五錢 良薑四錢 烏藥二兩 半 木香 沒藥 乳香各一錢 其為細末用前膏并丸彈子

大金丹 為衣隨症酌用 每一丸白湯下

牛膝湯 牛膝 瞿麥各四兩 歸尾 通草各六兩 滑石 八兩 葵子五兩 分五六服水煎 一方有桂心

類證治裁 卷之八 臨產

牛膝散 牛膝 川芎 朴硝 蒲黃各七錢 五分 當歸一 兩半 桂心五錢 為末每服五錢 加薑三片

生地五錢 水煎服

失笑散 見六卷胃脘痛

十全大補湯 見一卷中風

加味歸脾湯 見本卷胎前

逍遙散 見一卷火

龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

補中益氣湯 見一卷中風

清魂散 澤蘭 人參各二錢 半 川芎八分 荆芥穗醋炒 二錢 甘草一錢 童便一杯和服

二陳湯 見一卷中風

花蕊石散 見二卷血 血竭 沒藥 等分研細 每服二錢白湯下

奪命散

參蘇煎 人參 蘇木各一兩

保陰煎 見五卷瘧

固陰煎 見二卷脫

加味四物湯 四物湯 香附炒 五靈脂炒另研各一錢 水煎 痛甚 加桃仁四分

延胡索散 見本卷調經

建中湯 見一卷傷風

四味散 當歸 延胡 血竭 沒藥 童便煎

黑神散 見二卷血

類證治裁 卷之八 臨產

鹿角散 鹿角炙灰 童便 酒調下

鬱金丹 鬱金燒研二錢 醋調下

導痰湯 見一卷中風

硃砂安神丸 見二卷汗

火痰 火痰 血行 血行 類證治裁

產後論治

新產營血大損。陰條虧於下。陽易冒於上。其甚者。氣脫血暈。遲則不救。稍輕則頭汗目眩。為鬱胃風入筋。急為發瘧。陰虛陽浮。為發熱。火炎燦金。為喘嗽。氣促為虛煩。不眠為驚悸。盜汗而羸。勞成焉。皆陰虛陽亢之咎徵也。金匱論新產三症。一血虛多汗。出善中風。故病瘵。二亡血復汗。寒多。故病鬱胃。三亡津液。胃燥。故大便難。心典云。血虛汗出。筋脈失養。風入而益其瘵。此筋病也。亡陰血虛。陽氣迷厥。而寒復鬱之。則頭眩而目昏。此神病也。胃藏津液。以滲灌諸陽。亡津液。胃燥。則大腸失潤。而大便難。此液病也。三症不同。其亡血傷津。則一。故用藥忌辛熱。再劫其陰。即有外因。亦忌風藥。升

類證治裁

卷之八

產後

是

舉其陽。致汗脫。血暈而瘵。產後陰傷。下焦必損。而奇經多麗於下。衝任督帶。皆失所司。最多厥逆。上攻。腰脊腹痛。紅白自下等症。香巖先生案中。於衝脈為病。每用紫石。鎮逆任脈。為病。用板靜攝督脈。為病。用鹿角膠。溫煦帶脈。為病。用當宣補陽維。為病。用苦寒。用當歸桂枝湯。和營陰維。為病。用苦寒。用生化湯。溫寒。此產後症所當審而用之者。診新產。先問腹之痛否。以驗惡露有無。如小腹脹痛者。惡露未淨也。鬱金桃仁。牛膝。行之。手摩臍腹。成塊者。兒枕未消也。失笑散。或查藤延胡之屬。行之。虛寒氣滯也。砂仁木香。附肉桂。溫而通之。消導之。腹痛喜熱。手按者。虛寒氣滯也。小茴香。當歸。溫而通之。再詢頭身痛否。及會否寒熱。有汗無汗。以辨外因內因。如外感頭

痛脈必浮

痛脈必浮。甘菊蔓荊。辛散之。血虛頭痛。脈近數。四物湯。主之。產後感胃。不可輕汗。如頭痛發熱。脈浮傷風也。香蘇散。輕解之。身痛拘急。惡寒脈緊。寒邪也。芍藥散。溫散之。初起頭暈發熱。即煩渴。脈右大。溫熱症也。葱豉。微汗之。若脈遲。身痛。營分虛也。當歸建和。之汗。出身痛者。營衛俱虛也。歸者建。兩和之。自汗。屬陽虛。汗多亡陽。輕則參耆地芍五。補而斂之。重則附。固其陽。盜汗。屬陰虛。汗本陰液。六味湯。加麥冬。同其陰。產後頭汗。暈厥。陽上冒也。龍骨牡蠣。補中益氣。神黃芩。小麥。養陰以鎮陽。產後惡寒。陽不足也。寸脈微。湯加麻黃。發越之。產後發熱。陰不足也。尺部弦。加肉桂。收攝之。陰陽相乘。憎寒發熱。八珍湯。調補之。其惡露未淨者。大調。稍補之。若血去多。不

類證治裁

卷之八

產後

五

時發熱。孤陽無所依附也。四物。益其陰。必以地黃。苦溫收其浮越。其肌灼面赤。渴飲脈虛大者。當歸補。以無形之氣。生有形之血也。寒熱欬嗽。肌羸色悴者。羸勞也。母雞湯。豬腰湯。或用參耆。以扶脾。其臟寒腹痛者。下焦虛也。歸薑。溫養之。白帶多。腰脊痛者。督帶空也。鹿角膠。杞子。杜仲。沙。填補之。羸勞寒熱。食減泄瀉者。損及脾陽也。異功散。加砂仁。蓮子。溫攝之。吐逆泄瀉。肢寒者。胃陽虛也。附子理中。急溫之。嘔痞痰多者。脾氣滯也。香砂。健運之外。感寒湯。溫胃飲。急溫之。嘔痞痰多者。脾氣滯也。香砂。健運之外。感寒嗽聲。重鼻塞者。腠理疏也。杏結蘇。先散之。再用異功散。以實之內傷。嗽脾肺氣虛。有痰者。六君湯。加主之。火炎燦金。喘嗽者。六味。加麥冬。主之。乾欬無痰。火鬱於肺也。甘桔湯。加玉竹。開潤之。產後

血脫氣喘為孤陽絕陰危候也。貞元主之吸氣促。自汗肢冷虛陽欲脫也。參附急救之。若風寒外邪入肺而喘急者必氣粗嗽痰與吸促氣短不轉。以金水主之。或去熱地。疏痰利氣。若敗血衝肺致喘者。人參蘇木主之。產後腹滿悶嘔吐。腕間有敗血者。抵聖宜之。傷飲食者。和中消導之。脾氣虛寒者。六君湯加炮薑木香溫補之。胃虛氣逆者。橘紅半夏苦降之。肝木侮土者。六君湯加升柴疏暢之。胃虛呃逆危症也。理中湯古法用丁香不應。急加遲則難救。其因寒者。丁香柿因痰者。橘皮竹產後身面浮腫者。氣虛水濕不行也。須辨表裏。如因浴早水漬入竅。身重肌浮者。濕腫也。羌防芎蘇汗之。因水穀聚濕小便不爽者。水腫也。蒼夏澤蘭利之。如四肢浮。脇腹刺痛者。敗血

類證治裁 卷之八 產後

流入經絡也。小調經散或牛膝山甲消其瘀。如氣不化水。腫脹溺瀉者。腎陽虛也。腎氣湯以化氣而利水。產後因驚發狂者。血虛神不守舍也。加味八珍湯主之。敗血干心。狂言見鬼者。心包受邪也。茯苓琥珀散加鎮理之。驚悸恍惚者。心神不安也。歸脾補之。產後不語者。或因敗血上閉心胞。黃丹參蘇木理之。因痰涎上干心竅。用溫加首豁之。因心腎氣虛。不能上通於舌。珍散補而開之。產後汗多必發瘧。牙關緊急。口噤肢搐者。血虛風勁也。十全大補湯峻補之。若攻風則死。然古法用。小續命湯及大豆紫湯獨活湯最效朱奉議云。無汗惡寒為剛瘧。小續命有汗不惡寒為柔瘧。上湯去麻黃加葛根產後汗出。欲成瘧者。肝陰虛。風陽動也。阿膠生地黃茯苓以生液。產後類中風

目眼喎斜。腰背反折者。血虛兼挾風火痰也。芎藭湯加荆芥穗以行血祛風。或川清理痰火。凡筋脈挾寒則急。挾溼則縱。血虛風火入絡。則狀類中風。產後若作真中風。用小續則誤矣。類中痿廢不起。氣血虧筋緩弛也。宜滋陰以壯養肝腎。瘳癢者。筋脈拘急為瘳弛。縱為瘳。產後脫血。風火熾而筋失榮養也。八珍湯加丹皮鈎藤以生陰而退陽。如不應。用四君芎藭以補脾土。如左脈弦。血虛火灼也。加道遠散。以清肝火。滋陰血。古法。用愈風湯產後麻臂氣血虛而挾痰也。右半身麻而暈。經脈空而痰飲襲入也。六君湯加而暈營血虧而風火襲入也。十全大產後顛振。氣血虛而生風也。急用。十全手足拘攣。動者。風客經絡也。舒筋主之。挾風熱。道遠

類證治裁 卷之八 產後

散如虛寒。十全大產後鼻衄及口鼻黑氣。胃絕肺敗也。如血虛滯用參蘇煎。如虛火上炎舌黑。犀角地瘀血逆升鼻衄。益母丸童加製附子。如虛火上炎舌黑。犀角地瘀血逆升鼻衄。益母丸童驗方。髮二條緊繫中指節。即止。產後泄瀉。脾土虛寒也。六君湯攝之。脾腎虛寒。四神丸升攝之。命門火弱。以八補其母。若傷食瀉。六君湯加查。消運之。完穀不化。陽火虛也。四神丸瀉白沫如腸垢。元氣陷也。桂茶炮薑升舉之。滑泄不止。參香收瀉之。產後痢疾。青白屬寒。紫赤屬熱。桂茶炮薑升舉之。滑泄不止。參香收瀉之。產後痢疾。寒熱相搏。赤白雜下。寒熱生。冷傷腸胃也。虛與腹痛。木香白芍主之。胃虛嘔痢。六君調補之。熱痢後重。白頭翁湯清理之。赤白雜下。腹絞痛。救急散。調之。久痢後重。補中益升舉之。瀉痢脈濡緩。胃溼也。湯藥愈。滋其溼。宜參苓白朮散加肉。久瀉久痢。肉瘳。溫攝

之癰邪由感犯風暑日發間日發者小柴胡湯減黃芩補選用風
加紫蘇香薷若產前陰瘡延及產後歸耆建中湯和其陰陽
寒多加黃熟重加甲產後暑熱傷陰狀如瘡發治法忌表散劫液
以龍甲烏梅棗仁甘酸生津以退熱且產後吸受時邪尤宜審治
麥冬地黃石斛等以川貝母杏仁耐降之燥傷肺津必致渴以
如暑傷肺氣必喘悶通草栝蒌鬱金耐降之燥傷肺津必致渴以
秋天冬杏仁玉潤之熱陷心營必昏譫少寐以竹葉麥冬犀角
竹百合貝母滋潤之熱陷心營必昏譫少寐生地連翹茵陳涼
沁之溼阻三焦必頭脹舌白不渴胸滿身痛溺少便溏以茯苓皮
厚樸栝上下分消之風溫犯上焦必灼熱頭蒙皖痞昏睡以山梔
厚樸栝上下分消之風溫犯上焦必灼熱頭蒙皖痞昏睡以山梔
母芩羊角辛涼以宣通微苦以清降溼溫化熱阻氣必頭重身熱
痛咽痛脛冷以元參銀花杏仁栝甘淡微苦輕解之寒暄失正痰

類證治裁 卷之八 產後

飲上干必腸痛背冷欬逆不得卧或腸中漉漉有聲兼溺短足腫
以桂枝半夏乾薑蔥白辛酸淡滲泄之產後霍亂吐瀉停食者
五味子茯苓茶白芍甘草溫之吐瀉逆冷者附子散溫通之產後虛
散正氣主之虛寒者湯溫之吐瀉逆冷者來復丹溫通之產後虛
煩氣短者湯清補之產後積聚風冷與血氣相搏而成也積為
陰在臟聚為陽在腑痛有常處四神痛無定處芍藥選用血瘀氣
血壅結因氣病而成血病也痛無定處失笑散後必扶正歸脾
大便閉結津液涸也四物加潤之或五疔丸蘇便淋瀝勝虛
熱也六味湯或四物補而分利之遺溺頻數者氣虛不能約制也
補中湯加茯苓甘草補而分利之遺溺頻數者氣虛不能約制也
子黃肉佐以桑螵蛸散升而攝之小水不禁厚損也龍骨散攝之
手傷脬破者絲絹猪羊脬固補之氣虛益智仁腎虛去丹泄小

類證治裁 卷八

便血熱乘血虛滲入脬中也髮灰滑止之大便血鬱結傷脾也
若因思慮傷心者妙香有梁積熱者胃散醇酒溼毒者花
解醒怒動肝火者柴胡湯大腸風熱者側柏槐花大腸血熱者
湯加苓腸胃虛弱者升麻柴胡元氣下陷者補中湯加氣血虛者
連理花產後諸淋虛則頻數肺虛補中益腎虛六味熱則瀉痛石
加升產後諸淋虛則頻數肺虛補中益腎虛六味熱則瀉痛石
散血淋加味產後帶下元虛滑也金鎖匙丹或產後經行太
早者乳必少年壯不自乳脾虛不能攝血補中益心脾不能統血
加味歸肝火迫血妄行加味遺氣血兼虛入珍小便出糞大小腸
交也先用六君湯產後陰脫努力所傷也外用五倍子未固之生
腸不收虛而滑也外用香油調腸網托之或以燈草插鼻產門不

類證治裁 卷之八 產後

閉陰氣失斂也十全大峻補之腫熱熾痛肝經虛熱注也加吐消
若因憂怒肝脾鬱傷也加味因暴怒肝火血傷也龍膽瀉有產
後產尸下一物如手帕丹溪云是肝痿以參耆歸升舉之有產後
水道中出肉線一條長三四尺動之則痛絕先服失笑次以帶皮
助研爛入清油二觔煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲於水道邊
以薑渣蘸冷則熨之乃縮上再服失笑散芍歸湯如肉線斷者不
治諸凡產後症不一端而危莫危於血暈氣喘呃逆風癩難莫難
於羸勞虛嗽泄瀉積聚所尤要者產後下焦陰虛為傷其肝腎也
而衝任督帶多隸肝腎用藥宜溫養固攝切勿重虛其虛致成下
損不能復元前所條列大約根據良方薛按粗舉梗概其治法不
盡於此云

產後脈候
新產之脈緩滑吉實大弦急者死沈小吉堅牢凶寸口瀉疾不調死沈細附骨不絕生

附方

當歸桂枝湯 見一卷傷風

生化湯 當歸三錢 川芎 炮薑 炙草各一錢 桃仁十

失笑散 見六卷胃脘痛

四物湯 見一卷中風

香蘇飲 見本卷胎前

芍蘇飲 見二卷欬嗽

類證治裁 卷之八 產後

葱豉湯 見一卷溫

當歸建中湯 見一卷傷風

歸善建中湯 見二卷欬嗽 再加四物 參 附 桂 莖

青附湯 名參附湯 附五錢 名青附湯 參一兩 附五錢

六味湯 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

八珍湯 見一卷中風

十全大補湯 見一卷中風

大調經散 見三卷腫脹

當歸補血湯 見本卷崩漏

母雞湯 黃雌雞一隻 地 耆 朮 桂心各三錢

藥每服四錢 煎雞汁至三鍾每用汁一鍾煮

日服三次 將腰子一對 歸 芍各酒炒一兩 先將歸芍煮去

豬腰湯 渣 鹽 將腰子切如骰子大同晚米一合 香豉一錢

加葱 椒 鹽 煮食 補虛湯 參 朮各一錢 耆 陳 芎 草各五分 薑三

歸薑羊肉湯 羊肉一斤 當歸五兩 生薑六兩 黃耆四

兩 先以水煮羊肉取汁下後三味分四服

加桂心三兩 異功散 見一卷中風

附子理中湯 見一卷中風

溫胃飲 見一卷中風

類證治裁 卷之八 產後

香砂六君湯 見三卷嘔吐

甘桔湯 甘草二兩 桔梗一兩 失音加訶子 聲不出加

血加紫苑 肺接加阿膠 貝母 嘔加半夏 生薑 吐

少氣加人參 真元飲 熱地八錢 當歸 炙草各三錢 水煎 嘔加薑

金水六君煎 見二卷欬嗽

入參蘇木煎 見本卷臨產

奪命散 見本卷臨產

抵聖湯 參 草 陳 夏 芍 澤瀉 每服四錢 加薑

和中飲 陳 枳各一錢 查肉 麥芽各二錢 厚樸 砂

橘紅半夏湯 橘紅一兩 半夏 炙草各五錢 藿香三兩

脾廢痿 急拘血活風祛虛風風中語不延驚 類證治裁 脾心狂驚悸狂狂發虛陽絡經呢痰呢寒逆呢

丁香散 見三卷呢

丁香柿蒂散 見三卷呢

橘皮竹茹湯 見三卷嘔吐

小調經散 見三卷腫脹

腎氣湯 見二卷虛損

加味八珍湯 八珍湯加 茯苓 遠志各一錢 水煎

茯苓散 參各一錢 青 芍 牛膝 琥珀 龍齒各

琥珀散 辰砂另研 沒藥 琥珀 當歸並研末 等分

歸脾湯 見二卷勞瘵

清魂散 見本卷臨產

類證治裁 卷之八

溫膽湯 見一卷溫

七珍散 參 地 芍 葛蒲各一兩 細辛一錢 防風

小續命湯 見一卷中風

大豆紫湯 獨活一兩半 酒浸煎三沸 另炒大豆半升 合煎

獨活湯 獨活一斤 桂心二兩 秦朮五兩 以酒漬三日

芎歸湯 芎 歸

川芎散 芎 羌 藁仁 白芍 羚羊角各四兩 桑白皮

滋陰大補丸 見五卷痿

四君子湯 參 苓 朮 草

脾廢痿

加味道遙散 見一卷火

愈風丹 荆芥穗焙研三錢 黑豆洋酒服 治風暈

交加散 見本卷調經

當歸散 歸 荆 等分 爲末 每用二錢 水酒各半煎 治產

舒筋湯 羌活 獨活 葛根 桑寄生 海桐皮 歸 芍

犀角地黃湯 見一卷溫

益母丸 參 朮 芍 芎 桂 丹 益母

四神丸 見三卷飲食

參香散 人參 木香各二錢 肉蔻煨 茯苓 扁豆各四

類證治裁 卷之八

七分米

白頭翁加甘草阿膠湯 白頭翁 炙草 阿膠各一錢 黃

救急散 地 芍 歸 草 阿膠 艾葉 炮薑

參苓白朮散 見三卷脾胃

肉蔻理中丸 理中丸加 肉蔻七錢 蜜丸

加味四君湯 四君子加 黃耆 粟壳

必効方 麥冬 烏梅

七味白朮散 四君子加 藿香 木香 乾葛各一錢

小柴胡湯 見一卷溫

藿香正氣散 見一卷中風

瀉吐疾癘渴痲痲痲痲

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

逆冷	附子散	參朮歸桂附陳草吳萸丁香各五錢為末每服二錢米湯下
虛癆	來復丹	見三卷嘔吐
積聚	竹葉湯	竹葉麥冬小麥各二兩甘草一兩生薑二兩大棗十二枚虛悸加參少氣加糯米五合
熱積	四神散	歸芎芍薑每服二錢酒下
血熱	芍藥湯	芍芎苓水煎
便血	血竭散	歸芍桂心血竭蒲黃各兩半延胡一兩為末每服二錢酒下
燥通	五仁丸	見七卷二便不通
閉便	蘇麻粥	見七卷二便不通
類證治裁	通氣散	陳蘇枳木通等分為末服四錢立通
遺溺	蠅蛸丸	見七卷閉癃
弱縮	益智仁散	益智覆盆子扶神遠志龍骨五味等分為末每服四錢米飲下
損脾	桑螵蛸龍骨散	螵蛸五錢龍骨一兩研末每服二錢米飲下
傷脾	歸耆湯	歸耆芍參朮陳草
傷便	固脬散	黃絲絹三尺黃蠟五錢蜜二兩白茅根馬屎勃水煎不可作聲
心傷	補脬飲	見七卷胞痺
積傷	加味歸脾湯	見本卷胎前
熱酒	妙香散	見二卷軀
傷肝	加味清胃散	清胃散見二卷軀此加犀角甘草連翹
火	葛花解醒湯	見一卷溼
	加味小柴胡湯	小柴胡湯見一卷溫此加歸芍山梔

熱淋	滑石散	滑石一兩三錢半通草車前子葵子各一兩為末漿水調服方寸匕
血淋	加味四物湯	各一錢桃仁五個當歸杜牛膝木香五分水煎
帶多	金鎖匙丹	茯苓法神各二兩遠志龍骨各三兩牡蠣粉四兩酒糊丸鹽酒下四十九
精滑	芥朮兔絲丸	芥朮白朮蓮子各四兩五味二兩山藥杜仲各三兩免絲子十兩炙草一兩
刊淫	五苓散	見一卷溫
陰腫	當歸人參湯	參耆歸芍各二錢升麻五分水煎外用五倍子泡湯洗又敷之
火	龍膽瀉肝湯	見三卷諸氣
去	金黃散	蒲黃各一錢桂心二分酒調服治惡血
類證治裁	延胡散	延胡桂心當歸酒調服治惡血上冲

產後

包氏嚴寒坐蓐腸出不收身熱而赤思被冷無溫腸必乾澇難上如草麻子搗塗髮頂法必不驗即冷水噴面亦慮滋病令煎芎歸湯入淨桶著人扶坐桶上以舊絹托腸乘熱熏之腸得熱氣自潤而升且托且送待其將盡趁手托入如法而收再服補劑熱退

陳氏產數日浮腫身重不能轉側不食不語脈虛緩當山產後浴早水溼乘虛襲入子宮下部先腫漸至通體重著殆傷溼之見症也開發腠理逐去溼邪宜羌活滲溼湯加陳皮半夏防已茯苓皮一啜溼從汗解身可轉側浮腫漸退再為健脾利溼飲食

類證治裁

卷之八

產後

本

亦進以婦體素肥氣鬱生涎時或昏冒用溫膽湯調理而痊

某氏露產胃暑煩熱汗出直視不語脈賴數醫謂惡露未行治宜逐瘀予曰直視者足太陽經血虛筋急牽引直上也。不語者暑先入心手少陰脈繫舌本絡舌旁邪入營分舌系縮也煩熱則易鬱胃汗多亦慮液亡失治必變昏瘧危疔用生脈散加生地當歸石斛連翹丹皮木瓜甘草藕汁沖服諸症退能言又加減前方數十服得安

張氏中孕產育旬日外鮮紅下注自汗身熱此陰虛陽無所附也。用十全大補湯去桂加炮薑小麥煎湯二服汗收血止。○是症血去則亡陰汗多則亡陽產後危症也

徐氏產前夜熱煩渴脈促數因決其胎必下當夜遂產惡露甚少逾日鮮血暴注暈絕用潞參茯神熟地炮薑荆芥醋炒山梔甘草俱炒石斛阿膠神麩血止

楊氏產後鮮血足膝熱乳少脈孔宜攝固下元兼升舉中氣桑螵蛸炙熟地杞子杜仲鹽水炒黃耆蜜炙升麻二服血止去桑螵蛸加生黃耆甘草當歸紅棗而乳倍常

李氏產後鬱冒昏睡不語慮其瘧厥用鮮石膏蒲根汁熱服漸次甦醒能言詢所苦但云日暗咽塞心系下引遂悶絕不知人此為風火痰阻竅也因用桔梗荆芥甘草炒連翹貝母茯神山梔茵蒲汁沖二服而安

類證治裁

卷之八

產後

本

張氏官署坐蓐輒動鄉思經旬宵熱如烙脈虛疾插鬢銀簪一夕色黑以紙拭去明晨如漆駭極予云此產後血虛火炎汗澤所蒸耳宜滋陰退熱以熟地白芍丹皮當歸丹參石斛茯神杞子甘草四服熱退嚮色不變矣去丹皮丹參加棗仁山藥蓮子蜜丸服愈。○此前取甘涼除熱後取酸澆安神

吳氏蓐損不復寒熱往來自汗欬嘔吐沫心悸耳鳴脈虛數經言陽維為病苦寒熱陽失維護奇脈已損况中宮少鎮致欬嘔悸眩肝陽升逆而色忽青忽赤延為難治惟大便未澀腎關未撤尙堪借箸擬晨服黃耆建中湯去薑加參苓山藥橘白衛外扶中晚服熟地杞子俱炒牡蠣醋燉棗仁白芍茯神五味蓮子小麥煎

服攝陰斂陽症減背時凜寒晨服方中再加鹿角膠外以白胡椒末摻布膏藥貼背脊第三椎至第七節仍照前分早晚各服五七劑乃安

氏初春小產寒熱頭痛煩嘔汗後復熱血下如豆汁其間糜損脈右洪大左沈數此溫邪化熱乘虛襲入下焦也以豆豉山梔蕪仁鮮生地石斛知母麥冬丹參阿膠血稀熱減去知母阿膠加丹皮竹葉心元參汗透身涼而脈和

鄒氏冬寒當產艱難損動元氣嗣以月內便泄交春寒熱往來痰嗽汗泄肺時火升頰紅唇燥食入嘔滿小腹墜瀉利稀白無度支離委頓所服丸劑一味混補不顧滋膩豈胃弱火衰食已類證治裁 卷之八 產後

不化小腹重墜氣更下陷倘堪滑膩增瀉浸至尊勞莫挽矣急用溫中運脾痛利可減嘔滿可除炮薑小茴益智仁茯苓白朮半夏麩殼芽俱炒橘白數劑利止寒熱減食亦知味去炮薑小茴穀芽半夏麩白朮橘白等加砂仁熟地炭潞參五味丹皮山藥蓮子叙斛虛陽漸退併去益智茯苓加甜杏仁茯苓神白芍百合嗽止調理而康

乳症論治

乳症多主肝胃心脾以乳頭屬肝經乳房屬胃經而心脾鬱結多見乳核乳癰諸症乳癰厥腫色紅屬陽類由熱毒婦女有之膿潰易愈乳癰結核色白屬陰類由凝痰男婦皆有惟孀孤為多一潰難治且患乳有兒吮乳易愈無兒吮乳難痊其癰核等日久轉囊穿破洞見肺膈損極不復難以挽回而乳癰尤為根堅難削有歷數年而後痛歷十數年而後潰者痛已救遲潰即不治須多服藥諸湯切忌攻堅解毒致傷元氣以速其亡

乳汁為氣血所化而源出於胃實水穀精華也惟衝脈隸於胃故升而為乳降而為經新產三日後發寒熱名蒸乳宜消滯散去少婦初

類證治裁 卷之八

產乳脹不得通暢宜清利連翹金貝煎若產多乳少由氣血不足宜滋補異功散加歸芍仍以黃蘗引之產後乳白出屬胃氣虛宜因補北福黃耆五以攝之乳多脹痛而溢者以溫帛熨小兒吮乳鼻風吹入令乳房壅結腫痛名外吹不急治多成乳癰內服括葉散外連翹金孕婦胎熱寒熱乳腫名內吹散治之新產兒未能吮乳餘乳停蓄滋脹發熱內渴腫硬結痛名妬乳宜擠去宿乳或吮通之以貝母括葉甘倘兒或不產產母蒸乳寒熱脹痛宜斷乳法以炒草節木通煎服倘兒或不產產母蒸乳寒熱脹痛宜斷乳法以炒煎服消之有氣血頗壯乳汁不即下者通草猪蹄湯通草氣阻閉經絡乳汁不下肥人為多神效瓜疏降之或以綠瓜絡連三錢蓋被其氣血虛虧乳汁不下玉露散或八珍調補之因肺胃

虛寒乳汁不下。千金鋪溫養之。

婦女臆胃。二經熱毒。連過氣血。乳腫焮痛。名乳癰。初起寒熱腫痛。

肉色焮赤。宜涼血疏邪。四物湯加柴胡山梔。乳房結核。腫痛色赤。

宜疏肝清胃。內服牛蒡子湯。外用活魚鱗。魚鱗頭骨。氣血凝滯。結核。

不散。連翹。肝失條暢。乳癰結核。寒熱腫潰。清肝解。心脾鬱傷。乳癰。

製熱結核。腐潰。歸脾湯者。用大貝母。白芷。乳香。沒藥。乳。

癰潰爛。用兩頭尖。雄鼠糞。土揀子。經霜者。佳。露蜂房。各。痛止。膿乾。

如膿成不潰。或膿水清稀。用托裏散。潰久不斂。用桑根木芝。或茵陳。

乳內結小核。一粒如豆。不紅不痛。內熱體倦。月事不調。名乳巖。急。

類證治裁 卷之八 乳

早調治。若年久漸大。腫堅如石。時作抽痛。數年潰腐。如蟻。巖深洞。

血水淋漓者。不治。潰後大如覆碗。不痛而癢。極者。內生蛆蟲也。症。

因憂思鬱結。虧損肝脾。氣血而成。初起小核。用生蟹壳。爪。數十枚。

再用歸脾。煎服。數劑。勿問。蟹爪。灰。與煎。若未消。內服益氣。

甘草節。煎服。數劑。勿問。蟹爪。灰。與煎。若未消。內服益氣。

以木香。陰虛。補熱。加味。道。遙。散。去。寒。熱。抽。痛。歸。脾。元。氣。弱。人。參。

煎。可。消。若。用。攻。堅。解。毒。必。致。潰。敗。不。救。凡。潰。後。最。忌。

產後兩乳。伸長。細如雞腸。垂過小腹。痛難刻忍。名乳懸。此怪症也。

偶亦有之。急用芎歸。各一兩。切。令產婦伏桌上。下置火爐。將餘片。

歸。八。爐。漫。燒。以。口。鼻。及。乳。吸。煙。台。上。如。藥。盡。未。收。如。前。法。煎。服。煎。片。

附方

歸脾湯 見二卷勞瘵

益氣養榮湯 參 苓 陳 貝 者 地 芍 歸 芍

二錢 煎 香 附 各 一 錢 甘草 桔 梗 各 五 分 生 白 朮

水煎 見一卷火

逍遙散 見一卷火

連翹金貝煎 金銀花 土貝母 蒲公英 夏枯草 各三錢

異功散 見一卷中風

七福飲 見三卷鬱

栝蒌散 栝蒌 乳香 酒煎

橘葉散 栝蒌 二十張 陳 芎 梔 翹 石 膏 各 一 錢

通草猪蹄湯 通草一兩 同猪蹄煮汁服

通草散 栝蒌 瞿麥 花粉 各一錢 通草 七分 青皮

湧泉散 王不留行 白丁香 扁鵲 花粉 麝香 甲片

薛按湧泉散 每服四錢 用猪懸蹄煮汁調下 此方與

神效栝蒌散 栝蒌 一個 研 生甘草 當歸 各五錢 乳香

瀉疔消腫 沒藥 各一錢 酒煎服 夏久再服 治一切

玉露散 參 苓 芍 芷 歸 芍 栝 各 一 錢 甘 草 五

八珍湯 見一卷中風

千金鋪乳湯 石鋪乳 四錢 甘草 二錢 漏蘆 二錢 通草

四物湯 見一卷中風

胃	肝	結	和	肝	腫	痛	補	托
牛蒡子湯	陳皮	牛蒡	山梔	金銀花	甘草	桔葉	青皮	甘
煎和	黃芩	花粉	連翹	角刺	柴胡	青皮	水	
酒服								
連翹飲子	連翹	川芎	桔葉	角刺	橘葉	青皮	甘	
清肝解鬱湯	四物	桃仁	各一錢	水煎	蘇	桔	梔	
托裏消毒散	花	香	茶	尤	苳	歸	芍	各一錢
木香餅子	木香	五錢	生地	一分	苳	五分	煎	銀
托裏散	各八分	水煎	生朮	熟地	歸	芍	茶	陳

類證治裁 卷之八 乳

乳症

某氏孀居右乳潰膿已穿六孔左乳核堅抽痛寒熱食少脉弦數
 審為肝脾鬱結氣血虧損為疏濟生歸脾湯其戚屬云前服歸
 脾反痛奈何因檢前方普朮皆炒用子謂此致痛之由也但生
 用自效彼瘍醫不諳藥性生熟耳三服寒熱止食進前湯加栝
 萎貝母白芍陳皮五服右瘡平左核俱軟以前藥為丸服而消
 許氏產後乳頭紅腫焮痛用鮮天門冬搗汁和酒蒸熱服以渣敷
 患處兩三次愈

何氏乳房結核症屬陰寒用鹿角尖磨水酒冲服效

吳女暑月左乳焮腫成膿寒熱往來脉右小數左弦長症由肝鬱

生火做清肝解鬱湯內用當歸白芍大貝栝萎天冬乳香丹皮

山梔甘草銀花外用內消散加減甲片乳香沒藥歸尾角刺生

大黃黃芩蜜調敷左乳頭潰根盤漫腫右乳又硬急用內托帶

消法生黃耆天冬栝萎香附歸身白芍貝母桔梗陳皮甘草一

服痛定左瘡孔膿稠右腫稍軟又敷服數敷根盤消散瘡口用

生肌散得平

張氏產後妬乳去冬潰未即斂今春近旁腫痛夫乳頭屬厥陰乳

房屬陽明今患在乳頭不致轉囊但潰後藥忌乳沒消腫宜托

消兼用旋覆花香附生大貝黃耆生栝萎廣皮鬱金甘草節當

歸二服痛止腫軟四服潰斂

何氏左乳結核經六七載潰後深洞如盃是名乳巖由脾肝鬱結氣血失暢結核漸大潰則巖深陷可畏一僧猶用乳沒破耗氣血不知年衰茹素日夕抽痛膿水清稀管衛日虧毒奚由化恐三伏難延矣喚補氣血托裏滋液患口雖難癒效尚冀痛勢畧定遷延歲月耳八珍湯去炒朮加生耆五味麥冬大貝數服膿稠痛緩入夏延秋患內作癢者肉腐蛆生以烏梅肉臘雪水浸雄黃末雞羽蘸抹其弟婦張氏並係早孀亦患乳核廿餘年未潰堅大如胡桃榜則抽痛脈來沈緩症屬鬱損心脾用歸脾湯加香附汁炒熟地牡蠣粉大貝忍冬藤數十服而核漸軟

類證治裁

卷之八

乳

完

熱入血室

凡診婦人先問經候。婦人病熱值經水來。邪隨血去。其病自愈。若邪踞半表半裏。經水適來適斷。血舍空虛。熱邪陷入。晝靜夜劇。寒熱如瘧。煩渴耳聾。譫語見鬼。此為熱入血室。小柴胡湯。凡經後似瘧。譫語便蓋血為邪。迫上入肝。經肝受邪。則譫語見鬼。邪入臍是熱入血室。蓋血為邪。迫上入肝。經肝受邪。則譫語見鬼。邪入臍經則血結於胸。手觸之兩腋非藥所及。故當刺期門穴。屈乳頭向間。仲景云。婦人中風惡寒發熱。經水適來。得之七八日。熱除脈遲者。身涼胸滿如結胸狀者。刺期門。若晝則明了。暮則譫語。治無犯胃氣。及上二焦。且譫語屬陽。陽明胃經者居多。故戒犯胃氣。陽明病下血。譫語此為熱入血室。隨其實瀉之。犀角地黃湯。加丹參。汗出愈。如寒熱有時。經來適斷。晝明了。暮譫語。醫用剛劑。遂胸膈不利。涎潮上湧。喘急昏冒。當先化其痰。後除其熱。用柴胡湯加生地黃。如寒熱譫語。胸脇滿。如結胸狀。此邪與血結。用陶氏小柴胡湯。去參。皮山若少。陽本經血結。自甚。必少腹急痛。加延胡當歸尾。桃仁。若查肉。入血室。譫語如狂。血逆心包。胸中滿痛。為血結胸。用桂枝紅花。若寒熱如瘧。經水適來。狂言見鬼。或脇下鞭。脾陽虛者。胡湯。若熱入血室。譫語發狂。不省人事者。牛黃。按此症必寒熱譫語。總宜小柴胡。其結胸少腹滿痛。或小陷胸湯。加丹參。赤芍。陳皮。選而湯加減。其結胸少腹滿痛。積壳或桃仁承氣湯。玉燭散。用之。

類證治裁

卷之八

熱入血室

完

附方

小柴胡湯 見一卷溫

犀角地黄湯 見一卷溫

加味四物湯 四物湯加 丹 梔 柴 龍膽草

一呷散 萸 貝 芩 連 丹 梔 柴 草

陶氏小柴胡湯 柴 芩 夏 草 地 丹 桃仁 查肉

桂枝紅花湯 桂 芍 草 丹 紅花 或加海蛤 桃仁

乾薑柴胡湯 柴胡 四兩 花粉 桂枝 各一兩半 牡蠣粉

牛黃膏 牛黃 二錢半 朱砂 鬱金 丹皮 各三錢 腦子

小陷胸湯 見三卷痞滿

桃仁承氣湯 見一卷疫

類證治裁

卷之八

熱入血室

三

玉燭散 見六卷腹痛

海蛤散 海蛤 滑石 甘草 各五錢 芒硝 一兩 為末每服二錢 用雞蛋白清調下

熱入血室

丁氏秋間寒熱似瘧入暮譫語潮熱少腹滿此為熱入血室用小

柴胡湯去參薑棗加丹皮赤芍生地查肉 歸尾三五劑瘳

危氏夏初時疫恰值經斷血海虧虛壯熱陷裏口燥汗多夜煩不

寐用清化飲加山梔澤蘭藕汁清理血分而愈

胡氏冬溫化熱月信適來邪熱搏血醫用清解外不甚熱而膈腹

脹痛小水赤濁用導赤散加紅花桃仁延胡車前子再劑愈

昨婦傷寒發熱欬嘔右脇刺痛邪在少陽未解忽經行少腹煩懣

醫不知熱陷血海且有無犯胃氣及中上焦之戒猶用杏萸藪

芽等味煩懣益劇做陶氏加減小柴胡湯去參棗加生地丹皮

類證治裁

卷之八

熱入血室

五

赤芍鬱金山梔枳殼數服而病霍然

韋氏溫熱症煩渴昏譫脈虛促不受按此必病中經行也詢之則

初病旬日內再至矣以澤蘭赤芍生地麥冬山梔赤茯苓連翹石

葛蒲汁藕汁沖服先清血分熱邪昏譫已減後去澤蘭赤芍加

白芍當歸炙草紅棗酸甘和血得安

疝瘕癥瘕諸積論治

大全良方分疝瘕癥瘕八瘕瘕瘕食瘕血瘕血瘕凡七門多婦科下部症而名目紛沓症狀相近反遺腸重石瘕今統敘而條分之以類相從不捨亦不眩矣瘕者近臍左右各有一條筋起急痛因氣而成如弦狀名曰疝瘕者僻在兩肋間有時而痛名曰瘕瘕瘕者小腹氣聚成塊或上逆或下墜也八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕蠃瘕皆胎產經行氣血不調之所生也瘕者積堅不可推移瘕者氣壅不得宣暢既有食瘕血瘕不應復傷食成積堅而難移名食瘕瘕血成塊堅而難移名血瘕若腹中血瘕則留滯不行未至成塊者也別有石瘕生胞中腸單生腸外詳載內經

類證治裁

卷之八

疝瘕癥瘕諸積

七

亦瘕瘕之類並為條列症治於後

疝一症皆陰陽不和冷氣搏結經絡血氣作楚疝近臍左右兩條筋起急痛大如臂小如指瘕隱兩肋冷則痛發宜葱白散再

腸腹脹痛肝脾失和木香順氣散去者尤加鬱金延胡

疝小腹有塊或時動移因損傷胞門宜八珍湯加疏氣藥血虛受寒宜寬脹

疝氣虛下墜補中益氣湯血瘀氣逆當歸

疝石生胞中由寒客子門子門閉塞惡血滯瀉不瀉卽以留止日益

大狀如孕堅如石月事不下見現丸加減或

疝皆生於左胞宮右子戶多由經行交合小腹滿急經血瘀阻因

成瘕聚如懷孕甚則溺瀉痛苦如淋令人無子一黃瘕經行不

利左脇氣結陰中刺痛淋瀝黃汁用坐導青瘕新產浴早風

黃瘕聚左右脇筋中不禁下背汁用坐導燥瘕經行胃熱心

煩汗多大便艱瀉瘕聚如孟加味四血瘕經行勞動感寒留

絡不去腰腹急痛宜血瘕方五胎瘕新產交合早胞傷子戶失

禁精血雜下如膏宜生導六狐瘕經行受驚心志恍惚邪入於

陰月閉溺難宜狐瘕方七蛇瘕經後陰未復食飲誤中虺毒成形長

而疝痛瘕方八蠃瘕經行浴水水精與邪氣襲入子戶形如小

梓少腹切痛宜蠃瘕方此照巢氏病

瘕涎沫凝結為痰氣道壅滯為病中脘痰氣不利砂枳痰結胸

滿順氣導心下痞發熱而嘔半夏瀉心湯心下積冷如覆杯按之有

類證治裁

卷之八

疝瘕癥瘕諸積

七

水聲熱手熨之如冰脉沈遲三聖散吐之次服白朮調中湯

瘕脾胃先弱飲食失調生冷不化日漸成塊治先主疏導而佐以

和中大和中飲若氣壅血滯形寒者烏藥脾氣虛血不行者芎

四君脾氣鬱血不行者肝脾血燥不行者加味道

瘕經水不調結而成塊臍下冷痛五物情志鬱損氣血乖違加味

湯悲怒傷肝加味道產後惡露失笑血積脹滿當歸活

損君歸六凡瘕塊有形皆正虛邪實宜扶正除邪毋輕議攻伐

也薛云此症多因七情虧損五臟如脾統血肝藏血故鬱傷脾

怒傷肝者多患腸腹作痛正肝脾經症也宜養正則積自除

瘕經水不行或產後惡露未淨得寒則滯為瘕久而不消則為瘕

腹痛畏手按者。內有血瘀。通瘀煎加桃仁延胡牛膝。怒傷肝者。脇腹脹痛。肝

寒氣客腸外。與衛氣搏。痺而內著。瘧內乃生。大如雞卵。漸如懷

子。按之則堅。推之則移。月事以時下。是氣病血未病也。二陳湯加香附

若堅久作痛。宜歸露丸

統按前症。宜辨新久。有形無形。或痛不痛。動不動。在氣在血。在胸

脇。在少腹。在衝任。在腸外。在胞宮。新者易治。久者難治。痛猶通連

氣血。不痛則另結。窠囊。瘕者假也。無形而聚。亦能散。瘕者徵也。成

形而堅。不可移。成形者。或由食積。為食癥。由血結。為血瘕。無形者

但在氣分。氣滯則聚。而見形。氣行則散。而無迹。瘕瘕與痛俱現。不

痛則隱。瘕氣居多。疝瘕氣結。石瘕血結。八瘕阻於胞宮。腸覃生於

腸外。月不月異。又氣血痰沫所成。瘕痞各分寒熱。且痰有物。而瘕

無形。其狐瘕。蛇瘕。蠶瘕。異氣所感。或飲食誤中。留聚。藏腹。假血而

成。與宿血之自內而凝。為瘕。為瘕者不同。古法。敗梳。治蠶瘕。銅屑

治龍瘕。麩葉治米瘕。石灰治酒瘕。理可類推。矣。血瘕。血瘕。血瘕。血

同而新久分。且血必隨氣。氣行則血行。故治血。先理氣。又必察其

正氣。衰旺。若正氣已虛。必先補正。乃可除邪。或兼外治法。助之。

青琥珀膏。古方治死血。食積痰飲。成塊在脇。積化治氣血。鬱結。食

積脹痛。用開鬱。氣血兼治。寒熱互施。治血積。月水不調。用當歸。血瘕

痛不可忍。用琥珀。散。如牡丹散。俱主熱。三稜煎。並主攻。乃寒則溫之。

結則散之。堅則削之也。其峻厲猛劑。如硝石。火礱砂。或不得已

用之。恐傷元氣。後成不救。宜做立齋。景岳治法。為穩。

準繩。以瘕瘕。並屬血病。綱目謂瘕瘕。積聚。並起於氣。以瘕屬血病

者。氣聚而後血凝也。

立齋治一婦。內熱作渴。腹癢。如雞卵。漸大四寸許。經水三月一至。

凡瘕聚。瘕塊。在子宮則。肢體消瘦。脈洪而虛。左關尤甚。此肝脾鬱

結症也。外貼。阿魏。午前。用補中。午後。用加味。歸脾湯。肝火稍退。脾土稍健。

用六味。歸脾。又日用。蘆薈。九二服。空。日晡。以歸脾。調理年餘而愈。

又治一婦。腹塊。上攻。作痛。吞酸。痞悶。面色青黃。此肝脾氣滯症也。

六君湯。加。芍。歸。連。木。又以下。蘆。薈。丸。三月餘。肝脾和。諸症退。調

類證治法。瘕瘕積聚諸實。

中氣氣滯。加。而。經。調。瘕瘕積聚諸實。

景岳論瘕。血成形。初成形則。痛在臍腹者。五物煎。如病氣形氣俱

實。腹脹痛甚者。通瘀煎。元。稍久而堅者。消痞之。三稜煎。形氣強壯。

瘕滯不行。腹脹痛甚者。下之。或穿山甲散。然須詳慎。其氣。瘕。聚。

為脹。為痛者。排氣飲。木。香。順氣散。如血中之氣滯。為瘕。為痛者。通瘀煎。疝瘕

氣聚者。藜香。肝氣逆而為聚者。解肝。三焦壅滯。氣道不利。中滿。腫

脹者。厥清。

李氏曰。治瘕瘕者。調其氣。破其血。消其食。詳其痰。其大半而止。

不可峻攻。以傷元氣。且扶脾胃。待其自化。愈後。用大小烏雞丸。八

癥瘕脈候

婦人積聚癥瘕脈弦急者生。虛弱者死。少陰脈浮而緊。緊則疝。瘕腹中痛。半產而墮。傷浮則亡血。惡寒絕產。

附方

葱白散 地芍 歸芎 參苓 龍桂 樸枳
棧我朮 等分 為末 每服三錢
加蓮鬚 葱白 食鹽煎

烏雞煎丸 參 附子 川烏 烏藥 蛇床子 各一兩 桂
白芍 莢朮 陳皮 延胡 木香 肉蔻 熟地 琥珀
草果 各五錢 研細 以烏雞一隻 去肚腸 毛翅 將上
藥末 納雞腹中 用磁餅 入好酒 一斗 同煮 去骨 焙乾
為末 煉蜜 和丸 桐子大 每服三十丸 當歸湯下

木香順氣散 木香 香附 檳榔 青陳 砂枳 樸
疝瘕癥瘕諸積

類證治裁

卷之八

八珍湯 見一卷中風

寬脹湯 檳榔 官桂 木香 沈香 大腹皮 青皮 各一錢 香附 小茴 各錢半 水煎 加食鹽七分

補中益氣湯 見一卷中風

當歸散 見本卷調經

見眼丸 見三卷積聚

皂莢散 皂角一兩 炙去皮子 川椒一兩 炒去汗 細辛一兩 以溫湯洗之 搗末 囊盛 大如指長 二寸 納陰中 惡水畢出

我鹽散 戎鹽一升 皂角五錢 炙去皮子 細辛一兩 同

加味四物湯 四物湯加 延胡 桃仁 砂仁 紅花 香

血瘕方 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕血

瘕血 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕燥

瘕燥 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕青

瘕青 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕黃

瘕黃 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕石

瘕石 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕血

瘕血 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

調經散

或作飲 見本卷調經
脂瘕方 皂莢七錢半 川椒 細辛 礬石 五味 乾薑 各五錢 坐導法同煎
狐瘕方 取新死鼠一枚 以新絮裹之 包以黃泥 煨研為末 以桂心末二錢半 調勻 酒服 方寸七

蛇瘕方 大黃 黃芩 芒硝 各五錢 炙甘草三錢 烏賊骨 二枚 皂角炙一兩半 水煎 芒硝後下 服 十日 後再服

瘕即下 大黃 乾薑 附子 桂心 細辛 白朮 廬蟲 龍瘕方 王蠶 側子 研末 酒服 方寸七 日三服

砂枳二陳湯 砂仁 枳殼 加二陳湯

順氣導痰湯 導痰湯見一卷中風 此加 木香 厚樸

半夏瀉心湯 見一卷溫

三聖散 見一卷中風

白朮調中湯 白朮 茯苓 澤瀉 檳榔 各五錢 甘草一兩 為末 白湯

化蜜煎 見三卷飲食

大和中飲 見三卷飲食

消食丸 查肉 神麴 麥芽 蘿蔔子 青皮 陳皮 香附 各二兩 阿魏醋浸 研一兩 為末 以湯泡蒸餅 湯下

烏藥散 烏藥 莢朮 桂心 當歸 木香 桃仁 青皮 等分 為末 每服二錢 熱酒下

芎歸四君湯 芎 歸 加四君湯

歸脾湯 見二卷勞瘵

加味逍遙散 見一卷火

五物煎 四物湯加 桂心

瘕血

瘕血 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕燥

瘕燥 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕虛

瘕虛 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕脾

瘕脾 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

瘕寒

瘕寒 乾薑 烏賊骨 各一兩 桃仁 去皮尖 一兩 研末 酒服 方寸七 日二服

加味歸脾湯 見木卷胎前

失笑散 見六卷胃脘痛

當歸活血湯 赤芍 歸尾 生地各一錢半 桃仁 紅花 川芎 丹皮 延胡 莪朮各

八分 三稜 青皮各七分

芎歸六君湯 六君湯加 芎 歸

通瘀煎 見五卷厥

化肝煎 見三卷血

二陳湯 見一卷中風

喻露丸 莪朮 三稜各酒浸一兩 巴豆三十個切炒上二 味去巴豆 乾漆炒烟盡 川烏各五錢 硃砂四

錢 青皮 雄黃另研 茴香鹽炒 甲片炮各三錢 輕 粉一錢另研 麝香五分 研細 薑汁糊丸 每服二日 疰瘕癥瘕諸積

類證治裁 卷之八 疰瘕癥瘕諸積

阿魏膏 見三卷積聚

琥珀膏 見三卷積聚

三聖膏 見三卷積聚

化積丸 黃連一兩半以吳黃益智各炒一半去黃智 萊菔 子 香附 山查各一兩 川芎 山梔 三稜煨

神麴 桃仁各五錢 研末蒸餅為丸

開鬱正元散 白朮 陳皮 香附 山查 青皮 海粉 枳實 茯苓 砂仁 延胡 神麴 麥芽

甘草 等分為末 每服 一兩 生薑水煎 當歸丸 赤芍 川芎 熟地 三稜 莪朮各五錢

當歸丸 神麴 百草霜各二錢半 為末 酒糊丸 桐子大

每服六七十丸 開水下

類證治裁 卷之八 疰瘕癥瘕諸積

萬病丸 乾漆 牛膝 等分為末 用生地汁并許熬膏和 桃仁承氣湯 見一卷疫

穿山甲散 甲片 龜甲 赤芍 大黃 乾漆 桂心各一 溫酒下 川芎 芫花 歸尾各五錢 麝香一錢

排氣飲 見三卷積聚

荔香散 或作荔枝散見七卷疝

廓清飲 見三卷腫脹

烏雞丸 烏骨雞一隻男雄女雌去毛去穢留內金洗腸留腸 腹內 用陳酒 童便各二碗水數碗 砂鍋中煮 焙乾 骨用酥炙 共為細末 山藥末調糊為丸 桐子大 每服五十丸 百勞水下 此方治婦人倒經 男子欬 嗽吐血 醫通名異順丸

疰瘕癥瘕諸積

類證治裁 卷之八 疰瘕癥瘕諸積

礪砂丸 木香 沈香 巴豆各一兩 青皮三兩 硃砂五 錢 再和藥 先將青皮同巴豆炒紫色去巴豆

蒸餅為丸 巴豆 礪砂 大黃 鹽脂 桃仁 木香 薤白

乾漆散 乾漆 木香 芫花 赤芍 桂心 當歸 琥珀 麝香二錢半 每末 大黃二兩 牛膝七錢 桃仁一兩

一錢 酒下 六味丸 見一卷中風

蘆薈丸 見三卷積聚

調中益氣湯 見三卷脾胃

決津煎 歸 地 澤 桂 牛膝 烏藥

三稜煎 卽三稜丸

類證治裁 卷之八 疰瘕癥瘕諸積

疰瘕癥瘕諸積

疰瘕癥瘕諸積

疰瘕癥瘕諸積

疰瘕癥瘕諸積

琥珀散 琥珀 乳香 沒藥各五錢 每服二錢 水酒各服

血竭散 見本卷產後 延胡 桂心各一兩 赤芍 牛膝 壯丹散 壯丹 當歸 三稜 一兩半 為末 每服三錢 水酒各半

煎 桃仁煎 桃仁一兩 訶子皮 白朮 赤芍 當歸各七錢 甲醋炙一兩半 為末 每服二錢 陳皮去白三兩 龜

水煎 加薑 熱服 三稜各三兩 青皮 麥芽 半夏 三稜丸 各一兩 為末 醋糊丸 桐子大 每服四十九 醋

下 硝石丸 硝石三兩 大黃四兩 人參 甘草各二錢 為末 醋和丸 米飲下 三日一服 疝瘕癰疽諸積

烏雞丸 烏骨雞一隻 男雌女雄 製法同上 北五味一兩 熟地四兩 二味入雞腹 用陳酒 籠便於砂鍋 中煮 又以黃耆 於丸各三兩 茯苓 歸身 白芍各

二兩 預為末 同雞肉 搗爛 焙乾 骨用酥 炙其研入 下項 藥末六兩 桐子大 人參湯下三錢 和煎藥 以山 胡地骨 經閉 加肉桂 崩漏 加阿膠 倒經 加麥冬 柴 或勞勞帶下 帶下 加葶藶 香附 斷艾 此方最善 調經

崩淋等症 崩淋等症 生地一兩 搗汁 炒薑渣 生薑十二兩 搗汁 炒地黃 交加散 渣 白芍 延胡 當歸 清黃 桂心各二兩 沒藥 紅花各五錢 研末 為丸 每服四錢 酒下 交加地黃丸 見本卷調經

血氣 血氣 類證治裁 卷之八

類證治裁 卷之八

類證治裁 卷之八

類證治裁 卷之八

類證治裁 卷之八

帶下論治

帶下。係淫熱濁氣流注於帶脉。連絲而下。故名帶下。婦女多有之。赤帶屬熱。因血虛而多火。白帶屬溼。因氣虛而多痰。亦有五色兼下者。多六淫七情所傷。滑洩不止。則腰痛膝酸。宜調脾腎。或用升提。或用攝固。又當分白帶。白濁。白淫。三項。白帶者。流出稠粘清冷。此出於胞宮精之餘也。白濁者。胃中濁氣。滲自膀胱。水之濁也。白淫者。溺後滑精。流出無多。此房後男精。不能攝也。按景岳云。帶症之因。有六一。心旌搖。心火不靜。而帶下者。當先清火。清心蓮子飲。如無邪火。但心虛帶下者。人參丸。一慾事過度。滑洩不固者。煎固精丸。鎖一人。事不暢。精道逆而為帶濁者。初宜威喜丸。一淫熱下精丸。

類證治裁 卷之八

龍騰湯 一元氣虛而帶下者。壽脾煎七福散。若陽氣虛寒。脉見微瀉。腹痛清冷。帶白者。家非。如脾腎氣虛。下陷者。歸脾湯。其淫濁初起。而見熱瀉者。清飲。初起無火。但見淋漓者。或五苓散。如肝經怒火下流者。加味逍遙散。甚如服寒涼太過。致下焦不固者。菟絲飲。如元氣虛寒。下陷者。湯。如脾濕下流者。六君湯。如久而不愈。虛滑下陷者。秘元煎。凡帶下肥人多溼痰。越鞠丸。加滑石海石。為瘦人多熱痰。敗龜板。倍皮。又產後去血多。白帶淋漓者。衛生其久而不止。脈弱無力者。湯。克應丸。或秘真丹。皆可選用。

帶下脈候

帶下脈候

凡帶下崩中脉多浮動脉虛而遲者輕數而實者重

附方

珠砂安神丸 見二卷汗

清心蓮子飲 見一卷火

秘元煎 見四卷三消

人參丸 人參 茯苓 茯神 遠志 棗仁 益智 牡蠣 粉各五錢 珠砂二錢半 研末以黑棗肉丸

固精丸 見七卷遺泄

練精丸 故紙 青鹽 茯苓 五味 研末酒糊丸 鹽湯

威靈丸 見七卷淋濁

固陰煎 見二卷脫

類證治裁

卷之八

帶下

全

保陰煎 見五卷癰

加味逍遙散 見一卷火

龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

壽脾煎 參 朮 歸 草 山藥 棗仁 炮薑 遠志 蓮子 見三卷鬱

七福飲 見三卷鬱

十全大補湯 見一卷中風

家韭子丸 見七卷閉癢

補中益氣湯 見一卷中風

歸脾湯 見二卷勞瘵

大分清飲 見四卷泄瀉

濕利

脾益

中補

陽補

補大

元扶

脾溫

火瀉

肝和

陰滋

類證

治裁

卷之八

帶下

全

小分清飲 見一卷溼

五苓散 見一卷濕

革解分清飲 見七卷淋濁

六君子湯 見一卷中風

苓朮兔絲煎 朮 蓮子各四兩 兔絲餅十兩 炙甘草五錢 山藥 杜仲 丸 糊

越鞠丸 見三卷諸氣

大補丸 見一卷火

衛生湯 歸 芍各三錢 甘草一錢

固真丸 白石脂 柴胡 黃蘗 白芍 當歸 龍骨 炮

玉關丸 白麩四兩 炒 枯礬 文蛤醋炒 訶子半生半炒 各二兩 五味一兩 研末為丸

參耆湯 熟地錢半 參 苓 歸 芍 芎 藭 鹿角膠各一錢 地骨 車前子 朮 草 芎 各五分 加棗煎

克應丸 骨 杜 蠟 艾 葉 各 一 兩 醋 糊 丸 骨 杜 蠟 俱 般 山 藥 各 七 錢 拍 子 仁 一

秘真丹 兩 兔 絲 子 龍 骨 杜 蠟 俱 般 山 藥 各 七 錢 拍 子 仁 一

遠志 鹿角膠一兩半 黃蘗鹽酒炒七錢半 金櫻子焙二

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

帶下

徐氏血崩後繼以濁血濁血後繼以白帶淋瀝不已衝任虛滑治在固澀下元培養奇脉阿膠牡蠣茯神杞子兔絲子白芍杜仲續斷熟地俱炒密丸數服而固。赤帶屬熱兼火白帶屬溼兼痰帶久不止須補脾腎兼升提此症由崩漏而成淋帶脉訣所謂崩中日久為白帶漏下乾時骨髓枯也夫肝腎內損自必漸及奇經至帶脉不司束固任脉不司擔承非用攝納衝為血海虛滑易止李先知所謂下焦有病入難會須用餘糧赤石脂亦鎮固之旨

姪女中年崩漏久愈近忽身麻心悸自汗膚冷帶多肢顫閱所服

類證治裁

卷之八

帶下

全

方數用阿膠熟地遂致食入嘔滿大便頻滑不知症屬陽虛氣陷膠地滋滑大與病情鑿枘不入擬方用半夏麴炒於朮生牡蠣煨鹿角霜潞參茯苓棗仁砂仁小麥四服諸症悉減去半夏麴加杜仲芡實蓮子白芍山藥俱炒又數服得安

徐氏脉沈小數體羸久嗽損象已成驚蟄後重加喘嗽帶下如注醫用補瀦太過致小溲短少小腹滿悶是病上加病法在通攝兼用潞參茯苓燈心湖蓮薏米杞子杜仲沙苑子俱生山藥炒橘紅五味數服諸症平帶止食加但飢則嗽煩勞則體熱知由中氣餒怯去燈心薏米杜仲沙苑子加黃耆炙甘草飴糖貝母百合數服而起

何氏五旬外寒從背起督脉陽虛帶下經旬腎真失固多奇經主

病脉象兩尺虛瀦右關滑左寸強係操勞擾動心陽中脘停痰時悶時熱煩餓乾嘔恍惚失寐先用溫膽湯去枳實加茯神杞子炒一服能寐子後便瀉怯冷有年陽分素虧急須溫攝鹿角霜杞子炭茯神杜仲炒砂仁潞參龍眼肉蓮子炒一服寒止三劑諸症全瘳

類證治裁

卷之八

帶下

全

前陰諸疾論治

肝脈抵少腹。環陰器。督脈起少腹以下。骨中央。女子入繫廷孔。循陰器。凡婦科前陰諸症。不外肝督二經主病。然有陰腫陰癢。陰冷。陰挺。陰蝕。等類。為條列而分治之。

陰腫。玉門焮腫。並兩拘俱痛。憎寒發熱。小水滯少。肝經溼熱也。龍膽湯。滲而清之。陰腫急痛。寒熱往來。肝火血虛也。加味逍。涼而調。

之風熱客於陰經。焮發腫痛。小水淋瀝。積熱閉結也。元參。荆芥。稍加入大。宜以洩之。陰腫下墜。氣血虛陷也。補中。益。舉而補之。

但腫痛者。加味四。涼而和之。腫痛而玉門不用者。挾虛也。逍。或十全大。和而補之。溼癢出水。兼痛者。憂思過也。歸脾湯。加調暢。

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

之腐潰者。內服逍遙散。外以黃。如因產傷陰戶而腫者。不必治。腫但調氣血。腫自退。產後受風而腫者。芎歸湯。加羌。防。劑。陰腫。

如石痛不可忍。二便不利。用枳實。陳皮。各四兩。炒香研末。乘熱。頻頻熨之。氣行自愈。又陰腫以海。外敷。

陰中癢。多由肝經溼熱。化生蠱蟲。微則癢。甚則痛。或膿水淋漓。治宜清肝火。加味逍遙散。如小腹脹痛。肺發寒熱者。加味小。怒。

傷肝脾。胸悶陰癢者。加味歸。瘦人陰虛燥癢者。六味丸。三錢。各。用蛇床子。川椒。煎。癢甚必有蟲。以甘蔗渣燒灰。入冰片。擦之。或。

湯熏洗。日三次。一婦思此。諸藥不效。因食。黍。糲。米。而愈。

冷婦人陰冷。由風冷客於子臟。宜五。加。其肥盛而陰冷者。多溼痰。

下流。加羌。防。風。立。謂。陰。冷。屬。肝。經。溼。熱。外。乘。風。冷。若。小。便。

瀯滯。小腹痛。痛。宜。龍。膽。湯。內。傷。寒。熱。經。候。不。調。宜。加。味。逍。遙。散。寒。熱。體。倦。

飲食少思。加味四。鬱。怒。發。熱。少。寐。懶。食。加。味。歸。脾。湯。下。元。虛。冷。腹。痛。

便滯。八。味。丸。陰。冷。用。溫。中。坐。藥。蛇。床。子。研。末。白。粉。少。許。和。白。熱。或。

以。蛇。床。子。五。錢。吳。茱。萸。三。錢。加。麝。香。婦。人。陰。中。挺。出。數。寸。如。茵。如。芝。因。損。傷。胞。絡。或。臨。產。用。力。所。致。

以升補元氣為主。補中。益。若肝經溼熱。小水滯滯。龍。膽。湯。陰。虛。滑脫。固。陰。煎。肝。脾。氣。鬱。歸。脾。湯。服。藥。不。效。金。九。婦。人。癢。聚。陰。

中突出如茄子。與男疝同。亦名癩疝。臥則上升。立則下墜。多因氣虛。勞力舉重。宜大。補。元。煎。

前陰諸疾

陰中生瘡。如小蛆。名曰蠹。痛癢如蟲行。膿水淋漓。乃七情鬱火。傷損肝脾。致溼熱下注。其外。症。突。出。蛇。頭。或。如。雞。冠。腫。痛。溼。癢。

潰爛出水。其內。症。口。乾。內。熱。經。候。不。調。飲。食。無。味。體。倦。發。熱。胸。膈。不。利。小。腹。痞。脹。赤。白。帶。下。其。治。法。腫。痛。者。加。味。四。溼。癢。者。加。

歸脾。淋。瀯。者。龍。膽。湯。潰。腐。者。加。味。逍。遙。散。腫。悶。脫。墜。者。補。中。益。氣。湯。

佐以外治法。肘後方。杏。仁。雄。黃。白。礬。各。五。錢。出。血。女。人。交。接。輒。出。血。作。痛。多。由。陰。氣。薄。弱。腎。元。不。固。或。陰。分。有。

火。而。然。如。肝。腎。陰。虛。不。攝。者。固。陰。分。有。火。者。保。陰。心。脾。不。攝。者。歸。脾。千。金。方。用。桂。心。伏。龍。肝。各。

交。接。遠。理。出。血。用。亂。髮。青。布。止。或。以。赤。石。脂。末。搽。之。一。婦。交。接。出。血。輒。而。黃。如。蠟。終。身。不。育。

或。以。五。倍。子。末。搽。之。

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

類證治裁 卷之八 前陰諸疾 六

傷丈夫強弱相陵。四肢沉重。頭痛昏暈。局方來。立齋用。補中益氣。以滋化源。集驗方。用生地八兩。白芍五兩。甘草三兩。香豉一斗。葱白四兩。生薑二兩。水七升。煮取二升。分三服。忌房事。

少陰脈滑而數者。陰中生瘡。少陰脈弦者。白腸必挺核。脈

前方

龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣
加味逍遙散 見一卷火
大分清飲 見四卷泄瀉

類證治裁 卷之八 前陰諸疾

補中益氣湯 見一卷中風
加味四物湯 見本卷調經
十全大補湯 見一卷中風
歸脾湯 見一卷勞瘵
芎歸湯 芎 歸 芷 草 龍膽草 煎湯薰洗
海螵蛸散 海螵蛸 人中白 等分為末 先以百草湯煎 洗再以此藥搽之 如乾以麻油調 或加冰片敷之 治陰腫瘡及 下疳皆效
加味小柴胡湯 見本卷產後
加味歸脾湯 見本卷胎前
六味丸 見一卷中風

類證治裁 卷八

滋腎丸 見一卷火
五加皮酒 五加皮 乾薑 丹參 蛇床子 熟地 杜仲 各三兩 杞子一兩 鍾乳粉四兩 以酒十五

二朮二陳湯 見二卷痰飲
加味四君子湯 蒼朮 草 芩 扁豆各一錢 加

八味丸 見一卷中風
固陰煎 見二卷脫
秘元煎 見四卷三消
一捏金 見七卷疝氣
大補元煎 見一卷中風

類證治裁 卷之八 前陰諸疾

保陰煎 見五卷瘰
來復丹 一名養正丹 見三卷嘔吐

前陰

夏氏暑月孕後小水赤瀉子戶癢甚日肺寒熱此由胞宮虛感受
溼熱也內用龍膽瀉肝湯加赤苓燈心煎服外用蛇床子川椒
白礬煎湯熏洗再用杏仁雄黃朝腦研末摻入戶內愈

姜氏孕六月溼襲子戶小水淋瀝作癢用茅朮生五加皮苦參當
歸蛇床子川椒煎湯熏洗內服導赤散加滑石愈

王氏產後氣虛陰脫兩尺空用補中湯去柴胡加兔絲子杜仲艾
實外用龍骨牡蠣俱研細托之

孔氏陰挺時流膿水脈虛瀉內服補陰益氣煎加白芍外用川芎
當歸白芷熱礬銀花甘草煎湯熏洗拭乾用五倍子研末摻之

類證治裁

卷之八

前陰

全

唐氏數年經閉陰瘡內潰肺熱食減頭眩口乾肢痛便燥身面俱
發丹毒紅暈據述為伊夫疔毒所染內服加味四物湯添金銀
花甘草嫩桑枝外用忍冬藤魚腥草甘草苦參煎湯熏洗拭乾
用海螵蛸人中白米片名螺蛸散摻之數次熱痛減紅暈消改
加味道遙散去朮加生熟地黃麥冬等服又用青黛黃蘗研山
梔薄荷俱研麻油調搽

諸瘡論治

經云諸痛癢瘡皆屬於心瘡者癰疽之總名凡紅腫焮熱稱癰
發六腑為陽白陷硬痛稱疽疽生五臟為陰癰發速而疽起遲疽
根深而癰毒淺總因氣血凝結經絡阻滯而成癰則癰毒之小焉
者也古云陰滯於陽則發癰陽滯於陰則發疽脈浮洪滑數為陽
沈小濇遲為陰亦有似陽不甚焮赤似陰不甚木硬漫腫微痛此
為半陰半陽症凡寒熱腫痛如風邪內作無頭無根時毒漫腫無
頭有根氣血交搏有頭有根血與氣壅則成腫血為毒勝則成膿
毒為寒凝則平陷絡為痰滯則結核腫高而軟者發於血脈陷下
而堅者發於筋骨平漫色黯者發於骨髓宜分氣血虛實毒勢淺

類證治裁

卷之八

諸瘡

全

深輕重為治瘡根大而牢者深盤小而浮者淺初起惡寒壯熱拘
急煩躁者重起居如常飲食知味者輕頭如粟米發如蓮蓬者重
一頭焮赤腫高知痛者輕
凡腫瘍主治初起熱甚焮痛宜清涼消散真人活命飲若見表症
寒熱往來宜疏邪荆防敗毒散無表裏症焮腫有頭宜和解兼消清熱
散去裏實便秘宜疏通內疏黃連若表裏不實內熱口渴宜生津香木
湯患成未消宜化毒從小便出內消若毒氣內攻嘔惡煩躁口
乾宜護膜解毒琥珀散以指按患頂陷而不高起而不熱者膿
未成也作膿而痛托裏消毒散按之半軟半硬者膿未熟也透膿按之
隨指而起頂已軟而熱甚者膿已熟也滅以無膿仍宜消散醒消

有膿勿令久留。代刀敷腫瘍熱毒。用如意金黃散。其散漫未作膿者。敷用真君妙貼散。或清瘍主治膿將成而根盤散漫者。氣虛不能束血緊附也。內服托裏養營。紅活而潤者。氣血化毒外出也。外紅裏黑者。毒滯於內也。毒散。紫黯不明者。氣血未充不能化毒成膿也。托裏散。或托瘡口久不斂者。氣血兩虛也。參耆托裏。口不斂肌不生者。脾氣虛也。四君湯加。潰後反痛者。亦虛也。內補黃耆。香定。如氣虛作痛。加歸耆。血虛作痛。加參耆。腎水虛作痛。六味地黃散。已潰脈虛數。焮痛。營分熱也。宜滋陰。四物湯。生熱地黃。並已潰作。瀉便秘者。胃火熾也。宜滋液。竹葉石膏湯。潰後腐肉不化者。陽虛氣陷也。宜溫托。四君湯加。黃耆肉桂。

類證治裁 卷八 諸瘡

凡毒發陰分。平漫木硬。不甚腫痛者。乃由痰氣陰寒。非陽和通腠不能解。其冰凝營血枯衰。非溫暢滋陰。何由厚其膿汁。如陽和湯。膠和陰陽。以薑桂解寒凝。蓋毒以寒凝。溫散則毒自化。膿由氣血溫托而膿乃成。十全大補湯。若清涼之劑。止可施於紅腫癰癩而已。其有嘔逆者。不可泥於毒氣內攻。概用散。有因寒涼藥傷胃致嘔者。宜托裏。倘誤用攻毒。則內陷者不能外潰矣。其半陰半陽似腫非腫。欲潰不潰。因元氣失於補托。宜沖補而兼散可也。其膿熱不潰。以替鍼九塗。若膿未流利。以鍼於紋中引膿出。仍腫痛。或為筋膜間隔。亦用鍼引。倘刀鍼割傷。瘡口不合。用猪蹄湯洗。服內托黃耆。潰後血自出。四物湯加。潰後真陰虧。虛火炎發。熱作丸。則瘡口斂。山梔丹皮。潰後真陰虧。虛火炎發。熱作

湯急用。加減入味。潰後發熱煩躁不寐。血虛也。聖愈。自汗不止。氣虛也。四君湯加。發熱煩擾。筋惕肉瞤。氣血虛也。八珍。大渴而赤脈浮洪。陰虛發熱也。血湯。當歸補。煩擾面赤。脈沈微。陰盛發躁也。附湯。其潰後便瀉。有因胃傷寒涼不化者。六君湯加。有因脾氣虛弱失運者。六君湯送。有因脾胃兩虛。食少無味。嘔瀉者。八仙。有因氣虛下陷者。補中益氣湯。有因脾腎虛寒者。參附湯送。凡一切潰爛諸瘡。宜貼貝葉膏。瘡爛紅腫熱痛。或輕乳生肌散。蓋腐去則新生。然必毒氣已盡。方用生肌藥。若太早。則患更腐。潰如果毒盡而脾氣壯。則肌肉自生。以脾主肌肉也。如欲腐脫肌生。宜貼生肌通。用。宜搽玉紅膏。外。梅毒。杖瘡。廉瘡。下疳等症。去腐生新。宜貼生肌通。以太乙膏蓋之。梅瘡。杖瘡。廉瘡。下疳等症。去腐生新。宜貼生肌通。

類證治裁 卷八 諸瘡

肉已滿不能生皮。宜月白珍珠散搽之。

附方

真人活命飲	見五卷鶴膝風
金銀花酒	金銀花五兩 甘草一兩 煎好人酒分三服
荆防敗毒散	見一卷瘰
清熱消風散	柴者 翹 陳 角刺 蒼朮 紅花各一
五分	花各 防 芍 芩 花粉 銀
內疏黃連湯	梔 荷 翹 芩 桔 歸 芍 連 木香
一七	水煎 檳榔各一錢 大黃二錢 甘草五分 加蜜
竹葉石膏湯	見一卷傷風

<p>內消散 二母乳 沒銀夏 花粉 白芨 甲片 護心散 蘇豆粉 一兩 水酒煎 辰砂 甘草各一錢 驅毒丸 黃蠟一兩 白礬一兩 白礬一錢 攪勻作丸如桐子大 每服二三九 見本卷乳</p>	<p>透膿散 生者四錢 甲片一錢 芎三錢 歸二錢 角刺 醒消丸 乳沒各一兩 麝香一錢半 雄精五錢 共研 代刀散 角刺 黃青各一兩 草乳各五錢 每酒下三錢 如意金黃散 大黃 礬 芷 星 陳 藥 草 薑黃 五龍膏 五龍草即烏蘇 銀花 稀薹草 車前草 陳小 粉 各等分 上四味用鮮者搗爛 加飛鹽三分貼</p>	<p>真君妙貼散 蕪麵五觔 揉成薄片 曬乾用時再研 水調貼 托裏養營湯 錢參 五香 木 歸 芍 芎 各一錢 熟地二 煎 煎一枚 甘草各五分 薑三片</p>	<p>鐵桶膏 銅綠五錢 明礬四錢 礬礬三錢 五倍子炒一 研細以米醋於杓內漫火熬 鬱金二錢 麝香三厘 調藥末一錢塗瘡根上 托裏消毒散 花 白芷七分 歸 芍 芎 各一錢 銀 托裏散 括糞一個 歸 芍 芎 各一錢 熟地 杯入磁器內厚紙封 銀花各一 每用五兩以酒五 隔水煨香服 托裏黃耆湯 參 耆 歸 麥 味 遠志 參耆托裏散 見本卷乳症</p>
---	--	---	---

<p>八珍湯 見一卷中風 四君湯 參 苓 朮 草 內補黃耆湯 青 麥各一兩 參 地 苓 草各七分 乳香定痛散 乳 沒各二錢 桂 寒水石煨 滑石各四錢 四物湯 地 芍 歸 芎 六味丸 見一卷中風 陽和湯 熟地一兩 白芥子二錢 鹿角膠三錢 桂心 桂 薑 三味為丸 人參養營湯 見二卷勞瘵 十全大補湯 見一卷中風</p>	<p>類證治裁 卷之八 諸瘡 托裏溫中湯 附子 炮薑一錢 益智 丁香 沉香 木 沖和湯 參 陳各二錢 耆 朮 歸 芍 芎 各一錢 加薑 黃 煎 酒各半 乳 沒 角刺 銀花 甘草節各一錢 水 替針丸 乳香 白丁香 巴豆 青礬各五分 水調點瘡 洗溫 豬蹄湯 一雙煮汁去蹄去油 取清湯入藥一兩 煎去渣 神異膏 耆 杏 元參各一兩 麻抽二觔煎至黑入蛇蛻 下黃丹十二兩慢火煎收 男髮一團 再煎至黑去渣 綿用攤貼 內托黃耆丸 即托裏黃耆湯 加減八味丸 見六卷喉症</p>
--	---

生津	五味子湯	參 麥 味 陳 草
血虛	聖愈湯	見二卷勞瘵
陰虛	當歸補血湯	見本卷崩漏
氣虛	六君湯	見一卷中風
脾虛	二神丸	見三卷飲食
胃虛	八仙糕	山藥 人參各六兩 梗米 糯米各七升 白蜜 蓮肉 芡實 茯苓各六兩
中補	補中益氣湯	見一卷中風
虛寒	參附湯	參 附 陳 草 歸 各二錢 柴 各五分
腐寒	貝葉膏	麻油一觔 血餘一團 文火熬化去渣 入白蠟 諸瘡
類證治裁	卷之八	諸瘡
口嫩	生肌散	木香 輕粉各二錢 黃丹 枯礬各五錢 爲末 以猪膽汁拌勻曬乾 再研細搽患處
新生	腐盡生肌散	兒茶 沒各三錢 冰片一錢 麝香二 分 三七各三錢 爲末 搽之 或以 猪脂油半觔 黃蠟一兩 溶化加前七味調膏貼
定痛	生肌定痛散	生石膏一兩 研以甘草湯飛五七次 長砂三 錢 冰片二分 研砂五錢 共研 輕粉各四 錢 石膏煨一兩 血竭五錢 乳香 輕粉各四 錢 冰片一錢 有水加龍骨 白芷一錢 不收口加炙雞內金一錢
肌生	研末摻之	
肌生	絳珠膏	沒 白蠟 血竭 兒茶 珍珠各三錢 冰 片一錢 麝香五分 輕粉 朱砂各二錢 血餘 錢 黃丹二兩 雞子黃十個 大麻子肉八十一粒 麻 油十兩 熬膏攤貼
肌生	玉紅膏	輕粉各四錢 甘草一兩二錢 歸身二兩 血竭 輕粉各四錢 白芷二兩 紫草二錢 麻油一觔

毒諸貼膏	先將上三味及紫草熬枯細布濾清再入血竭 次輕粉 熬 太乙膏	見六卷胃脘痛
毒諸貼膏	加味太乙膏	地 芍 歸 芷 元 參 肉 桂 大 黃 木 油 各二兩 槐枝 柳枝 各十尺 以麻油 五觔 將藥浸油內 煮五日 夏三日 秋七日 入大鍋 內慢火熬至藥枯 浮起爲度 住火片時 用布袋濾淨 渣將 油秤準 用細紗袋將油又濾入鍋熬 血餘一兩 至血餘 浮起 以柳枝挑看 似膏 內先發青烟 後起 白烟 過黃 丹六兩 五錢 軟硬得中 下 阿魏 切片三錢 化盡 起 白烟 膏成 住火 滴 水 中 軟硬得中 下 阿魏 切片三錢 化盡 起 白烟 膏成 住火 滴 四錢 輕粉四錢 一 攪勻 傾入水中 化盡 起 白烟 膏成 住火 滴 此膏治發背癰疽 一切惡瘡 溼痰流注 筋骨痛湯火刀傷 及 遺精白帶 俱貼臍下 藏毒腸癌亦可 丸服 諸瘡 痛血風癩瘻 諸瘡 不止 並皆效驗
貼膏	萬應膏	川烏 草烏 生地 白芷 白芍 白芨 象皮 官桂 山甲 歸 芍 羌 獨 芷 草 苦 參 土 木 龍 穿 山 兩 藥 元 參 大 黃 各 伍 錢 上 十 九 味 用 香 油 五 觔 浸 春 五 日 夏 三 日 秋 七 日 冬 十 日 候 日 數 足 入 大 鍋 內 慢 火 熬 至 藥 枯 浮 起 爲 度 住 火 片 時 布 袋 濾 去 渣 將 油 秤 準 每 油 一 觔 兌 定 粉 半 斤 以 桃 柳 枝 攪 以 黑 如 漆 明 如 鏡 滴 水 成 珠 爲 好 薄 紙 攤 貼 此膏治一切癰疽發背對口諸瘡核流注等毒貼之其效 神如
發汗	萬靈丹	茅朮 八兩 荆 防 麻 羌 辛 芩 藿 香 蘇 合 香 天 麻 烏 各 一 兩 雄 黃 六 錢 上 十 六 味 研 細 煉 蜜 爲 丸 重 三 錢 珠砂爲衣 磁 研 收 貯 此丹治癰疽疔毒對口發腫 風寒溼痺及一切流注 骨節 痛 鶴膝風 破傷風 及 癩 癧 等 症 用 葱 白 九 個 煎 湯 調 服 一 九 蓋 被 出 汗 爲 效
一切	皆效	
類證治裁	卷之八	諸瘡

瘰癧結核癭瘤馬刀論治

瘰癧生於耳前後項腋間與結核相似。初起小塊。漸大如桃核。皮色不變。連綴不一。有單瘰癧。難治。宜小屏。過繞頸項。為蛇蟠。瘰癧。外起一胞。中裏十數核。塊為蓮子。瘰癧。琥珀散。初止單窠。後乃出。為重。瘰癧形似燕窩。為燕窩。瘰癧皆不治。初生項後。流注四肢。為流注。瘰癧。散。症由肝膽三焦風熱。血燥及肝腎陰虛。生熱。憂思。悲。怒。氣結而成。外臺秘要云。肝腎虛熱。則生瘰癧。瘰癧。不調。經脈。自。愈。不。得。妄。汗。妄。下。致。虛。虛。之。禍。初。起。寒。熱。拘。急。腫。痛。邪。在。表。也。宜。用。防。風。餅。安。癭。核。上。艾。灸。六。七。壯。可。消。軟。外。用。敷。瘰。內。服。散。若。患。頂。軟。膿。成。鍼。之。外。貼。膏。內。服。散。若。結。核。癭。腫。肝。經。風。熱。也。肝。湯。加。

類證治裁

卷之八

瘰癧結核癭瘤馬刀論

龍膽。發熱抽痛。肝經血燥也。加味逍。脈弦尺數。肝腎陰虧也。地黃。白芍。癭核堅而不移者。連翹散。怒傷肝火。筋攣者。柴胡。清。五。味。傷。心。脾。掣。痛。者。歸。脾。湯。氣。血。俱。虛。膿。汁。清。稀。者。八。珍。湯。經。久。不。愈。體。羸。自。汗。出。地。白。芍。五。味。婦。女。項。癭。流。注。遍。體。孔。竅。相。穿。膿。水。淋。瀝。者。化。氣。調。潰。久。瘡。口。不。斂。者。先。服。益。氣。養。營。湯。次。服。十。全。氣。血。已。復。癭。核。不。去。者。用。必。效。散。括。蕪。散。間。服。神。效。瘡。口。斂。後。再。服。養。營。湯。男。子。患。此。忌。懶。熱。飲。味。地。婦。人。患。此。忌。潮。熱。經。閉。但。以。加。味。道。遙。散。解。鬱。調。經。立。齋。謂。堅。而。不。潰。潰。而。不。斂。皆。由。於。氣。血。不。足。不。加。調。補。變。為。瘰。症。朝。用。補。中。益。氣。湯。若。發。寒。熱。眼。內。有。赤。脈。貫。瞳。人。者。死。不。治。

結核經年不紅不痛。堅而難移。久而漸腫。疼者為痰核。多生耳項。肘腋等處。宜消。由肝膽經氣鬱痰結。毒根深固。不易消潰。未潰。前忌貼涼膏。外宜山。忌服涼劑。內宜養。全生內消法。丸。王維德。著外科集。若堅久難消。鹹以軟之。海帶。寒凝氣滯。溫以散之。夏枯。治全生集。若堅久難消。鹹以軟之。海帶。寒凝氣滯。溫以散之。夏枯。芥子厚樸半夏。風痰鬱結成核。搜而逐之。消風化。氣火燥筋為痛。清以泄之。丹皮貝母連翹。血結入絡為腫。鹹辛通理之。加當歸尾。延痛潰膿不痊。和之。散。生耳項。加均藤川芎。生肘臂。黃桑。條。生兩腋。皮白芥子。生徧體。多是痰注。竹瀝。達。潰久不愈。照瘰。瘰癧治法。

類證治裁

卷之八

瘰癧結核癭瘤馬刀論

更有癭瘤初生如梅李狀。皮嫩而光。漸如盃卵。癭生肩項。痛隨處。皆有其症。屬五臟。其原由肝火。癭有五筋。癭者筋脈呈露。宜玉。散。血癭者赤脈交絡。宜化癭丹。肉癭者皮色不變。宜人參。氣癭者。隨憂思消長。宜白頭翁丸。消。石癭者堅硬不移。宜破。癭有五筋。癭者自筋腫起。按之如筋。或有赤縷。此怒動肝火。血涸而筋攣也。味。湯。或四物湯。血癭者自肌肉腫起。久而現赤縷。或皮色赤。此勞役。加山梔木瓜。血癭者自肌肉腫起。久而現赤縷。或皮色赤。此勞役。動火。血沸而邪搏也。四物湯。加。肉癭者自肌肉腫起。按之。鬱結傷脾。肌肉傷而邪搏也。中益氣湯。氣癭者自皮膚腫起。按之。浮軟。此勞傷肺氣。腠疏而邪搏也。補中益。骨癭者自骨腫起。按之。堅硬。此房勞腎傷。陰虛不榮骨也。六味。外有膿癭。宜海。神效。散。脂癭。用鍼挑。自愈。凡癭癧。皆忌決破。令膿血崩潰。多致天枉。

正敷桃花。惟脂粉病紅色。全是痰結。可決去脂粉。又有形似垂茄。散。正血藥。用五灰膏。俟茄落。以生脂。自愈。又有手背生癩。如雞距。根甚小。香。照其帶。侯茄落。以生脂。自愈。又有手背生癩。如雞距。如羊角。向明照之。如桃膠。名膠。以排鍼刺立平。生於面。名粉。海。有翻花。用馬齒莧燒灰。立齋云。痛者。隨氣。因臟腑受傷。氣血乖違。當求其屬。而治其本。勿用蛛絲。纏花線。等治。

又有毒堅如石。形長似蛤。瘡名馬刀。亦屬肝膽三焦經部分。浸及太陽陽明。流注胸脇腋。下。不論未潰已潰。用鮮夏枯草。煎。初起氣血未損。用立應散一錢。毒從小便出。如粉片血塊是也。倘小便滴。用益元散煎。宜毒後。接服薄。疏散風熱。若腫猶不消。海。燈心湯調下。宜毒後。接服薄。疏散風熱。若腫猶不消。海。類證治裁 卷之八 潔癩結核癩馬刀宜

血已虧。補中勝。潰久不愈。依前癩癩法治。附方 小犀角丸 犀角 黑牽牛半生半炒 青皮 陳皮各一兩 連翹五錢 皂角二條 棗殼泡 絞汁一椀 鮮薄荷 二助取汁 熬膏 和上藥為丸 龍膽草 薄荷 黃芩 花粉 白芍 消毒化堅湯 元參 牛蒡子 昆布 羌 升 歸 青 柴 桔 陳 翹 生薑 內消丸 牽牛子二兩 青皮 陳皮二兩 皂角去皮 弦子 為丸每服三十九 薄荷五兩 後二味取汁熬 和上藥末 荆芥湯送下 琥珀散 白丑 滑石 蠶 黃芩各一兩 木通 連翹 二錢 研細 分作六股 琥珀 水煎服之

流注 夏枯草散 夏枯草六錢 甘草一錢 研末 每用二錢 煎服 虛人多服妙 荆防敗毒散 見一卷癩 敷癩丹 乳 沒 血竭 麝香 辰砂 兒茶 龍骨 白 敷 外 甲片 百草霜 雄黃 鯉魚膽 各等分 研 用膏貼 立效散 皂角刺八兩 挫細炒 甘草二兩 乳 沒 各一兩 括囊五個 研細 每用一兩好酒煎服 琥珀膏 琥珀 肉桂 辰砂 丁香 木香 當歸 白芷 去渣 下黃丹 防風 松脂 木鼈子 麻油煎至黑色 收膏 貼 托裏散 見本卷乳症 梔子清肝湯 見五卷癩風 加味逍遙散 見一卷火

內托風熱血燥 六味地黃丸 見一卷中風 連翹散 堅湯 柴胡 龍膽草 土瓜根 苳 連 歸 陳 海藻 潰堅湯 神翅四錢 半夏二錢 海藻 昆布 龍膽 三錢 蜜丸 通草 貝母 松蘿茶 枯礬各 白湯下 柴胡清肝散 見二卷癩 歸脾湯 見二卷癩 八珍湯 見一卷中風 保元湯 見一卷火

類證治裁 卷之八 潔癩結核癩馬刀宜 傷怒 傷鬱 傷清 汗自 婦癩 化氣調經湯 廣皮二兩 香附 羌活 白芷各一兩 服二錢 酒和 日二服

傷怒 傷鬱 傷清 汗自 婦癩 化氣調經湯 廣皮二兩 香附 羌活 白芷各一兩 服二錢 酒和 日二服

瘦筋	痰注	裏托絡通	風搜堅軟消內	類證治裁	核結中補熱	核大補溫	不
玉壺散 廣皮各五錢	竹瀝 仍以竹瀝 廣皮各五錢	內托白薇散 歸仁各八分 柴胡各五分 川芎 花粉 芒 白薇 桔梗 甘草各四分 黃芩各八兩 沈香五錢 參 水	消風化痰丸 翹 桔 天麻 溫蠶 天冬 銀花各七分	類證治裁 卷之八 瘰癧結核癭瘤馬刀瘻	補中益氣湯 見一卷中風	十全大補湯 見一卷中風	益氣養營湯 見木卷乳
王壺散 廣皮各五錢	竹瀝 仍以竹瀝 廣皮各五錢	內托白薇散 歸仁各八分 柴胡各五分 川芎 花粉 芒 白薇 桔梗 甘草各四分 黃芩各八兩 沈香五錢 參 水	消風化痰丸 翹 桔 天麻 溫蠶 天冬 銀花各七分	類證治裁 卷之八 瘰癧結核癭瘤馬刀瘻	補中益氣湯 見一卷中風	十全大補湯 見一卷中風	益氣養營湯 見木卷乳

水利	刀馬	痛癢痛走血止	瘰癧	類證治裁	瘰癧	瘦氣瘦肉	瘦血瘦筋
益元散 見一卷溫	立應散 斑蝥糯米炒 川烏尖各七個 土蜂房 白丑各	五灰膏 桑柴 荆芥 蒿荻 桐子壳俱燒灰各	消瘰散 昆布 石燕各一兩 當歸 官桂 白芷 細辛 藿香	類證治裁 卷之八 瘰癧結核癭瘤馬刀瘻	消瘰散 昆布 石燕各一兩 當歸 官桂 白芷 細辛 藿香	入參化瘦丹 即化瘦丹加人參 蜜丸	破結散 即海藻潰堅湯去松蘿茶 加桑寄生三錢 蜜丸
益元散 見一卷溫	立應散 斑蝥糯米炒 川烏尖各七個 土蜂房 白丑各	五灰膏 桑柴 荆芥 蒿荻 桐子壳俱燒灰各	消瘰散 昆布 石燕各一兩 當歸 官桂 白芷 細辛 藿香	類證治裁 卷之八 瘰癧結核癭瘤馬刀瘻	消瘰散 昆布 石燕各一兩 當歸 官桂 白芷 細辛 藿香	入參化瘦丹 即化瘦丹加人參 蜜丸	破結散 即海藻潰堅湯去松蘿茶 加桑寄生三錢 蜜丸

疏風 薄荷丹 首烏 薄荷 皂角 連翹 三稜 荆芥 薄荷 研末 淡豆豉 二兩 五錢 熱醋浸 和搗

散毒 消腫丹 連翹 二錢 黃芩 柴胡 各錢二分 花粉 黃耆 各一錢 歸尾 甘草 各七分 牛蒡 黃連 各五分 紅花 二分

補散 補中勝毒餅 生地 熟地 各二錢 三分 歸 芍 各二分 陳皮 三分 研細 湯泡 蒸餅 晒乾 研末 柴 防 草 各五分 每服 三錢 白湯 下

內消 托裏散 括裏子 一個 忍冬藤 乳香 各一兩 蘇木 五錢 沒藥 三錢 甘草 二錢 用酒 三碗 煎 二碗 服 神效 托裏散 忍冬藤 葉 黃耆 鹽 木炒 當歸 各五錢 廿 草 二錢 酒煎 服 渣敷 患處

類證治裁 卷之八 瘰癧結核癭瘤馬刀

Table with multiple columns and rows, mostly blank or containing faint text, likely a continuation of the medical text or a list of related conditions.

梅瘡結毒論治 楊梅瘡由明正德間起於嶺表故名廣瘡時瘡一名棉花瘡先起紅暈後發斑點名楊梅斑色紅作癢成團大小不一二三相套名楊梅團頂開天窗下疳腐爛窠粒破損肉反外突名翻花楊梅形如赤豆嵌肉堅硬如鐵名楊梅痘其症多屬厥陰陽明而兼及他經以相火寄於肝肌肉屬於胃也毒有氣化有精化氣化傳染者輕精化慾染者重氣化者近生梅毒之人聞其氣食其餘登廁感其毒由脾肺受之故先從上部見皮膚癢筋骨疼其形小而乾精化者由交媾不潔火毒裏襲故先從下部見筋骨疼淋漓潰瘡形大而堅氣化者毒在表未經入裏一有萌動急服透骨元氣寶者搜風散

類證治裁 卷之八 瘰癧結毒 楊梅一劑精化者毒入裏深伏骨髓宜服九龍丹以瀉髓中之毒散汗之。重者二服利下毒物以土深壓之瀉後體實者升麻解毒湯。體虛者歸內托。服至筋骨不痛瘡色淡白內毒已解再用金蟾脫毒散。搽餘毒以絕其源若潰爛膿穢浸淫成片而痛者以鷲黃散。搽之。雄黃末。香油調。待從人恐傳染。服護從丸可免。切忌誤服輕粉水銀白粉霜等燥悍劫劑。劫去痰涎從口。妄希速效。如熏擦。哈。致積久外攻遂成倒發結毒其始筋骨疼痛隨處結腫皮色如常將爛則色紫紅而肉腐腦頂塌陷腮唇鼻柱損壞穿喉蝕目手足拘攣終成痼疾初起筋骨隱痛宜服搜風。若徧身破爛臭穢仍兼筋骨痛氣實毒盛者宜化氣衰者子湯。若結毒腫塊經年不愈諸

法同效者。西聖復若結毒攻口鼻者。五寶年久臭爛鼻柱損塌者。宜服結毒。若入巔頂頭痛如裂者。內服天麻餅子。若鼻塞不通。吹宜通鼻。毒攻咽喉腐爛臭蝕者。宜服硫黃不二散吹結。結毒臭爛不效。外貼解毒紫金膏。壯實者主解毒。虛弱者宜兼補。各隨次第。如法調治。重者一年。輕者半載。可望全瘳。慎勿求速效。以自貽誤也。

治服輕粉毒

五寶湯用紫草、金銀花、山茨姑、各一兩。乳香、沒藥、各五錢。用新汲水。六陳酒。五。六。七。空。心。服。取。汗。忌。風。一。二。服。毒。從。大。小。便。出。後。用。搽。藥。方。輕。粉。一。錢。乳。香。七。分。沒。藥。三。分。血。竭。一。分。兒。茶。一。分。珍。珠。三。分。紅。羯。子。二。分。文。蛤。二。分。燒。官。粉。一。分。廩。一。分。冰。片。一。分。鱗。骨。五。分。胎。髮。二。分。白。螺。啣。壳。存。性。

類證治裁

卷之八

梅毒結毒

三

三分燒。右十四味共研細收貯。先將甘草煎濃湯洗患處。然後搽之。

附方

透骨搜風散 透骨草 白花青 陰乾 生芝 蘇 羌活 獨活
 核桃肉 各一錢 六分 露一宿 服 槐子 白糖 六安茶
 楊梅一劑 散 羌活 白芷 威靈仙 八錢 大黃 七錢
 各五錢 防風 三錢 山羊肉 一兩 河水 煮熟 取清 汁二
 盞 黃酒 一盞 煎藥 先淡食 羊肉 後服藥 蓋被 令
 出汗
 九龍丹 木香 乳香 沒藥 兒茶 血竭 巴豆 不去油
 下四五次 等分 為末 生蜜 調為 丸 豌豆大 每服 九九熱酒
 腫自消 方食 稀粥

升麻解毒湯 升麻 角刺 各四錢 土茯苓 一兩 水八盞
 三茶匙 和勻 煎 四盞 分四次 一日服盡 每次 煎熱 加香油
 在咽 加桔梗 在下 加牛膝

歸靈內托散 人參 白朮 木瓜 銀花 防己 花粉
 錢半 土茯苓 二兩 威靈仙 六分 芍 歸 芍 各

甘草五分 水煎 威靈仙 六分 芍 歸 芍 各

金蟾脫壳酒 酒五兩 大蝦蟇 一個 土茯苓 五兩 浸
 醉為度 蓋被 出汗 次 固重湯 煮二炷 香取出 待次日 飲之 以

日再飲 酒盡 為度 黃藥炒 各等分 研末 搽患處 即可

護從丸 雄黃 川椒 各五錢 杏仁 百粒 炒去皮尖 火酒
 搜風解毒湯 土茯苓 一兩 白鮮皮 金銀花 涼水下 防

煎 氣虛 加人參 木瓜 各五分 皂角子 四分 水
 忌茶 酒 房事 發物 等

化毒散 生大黃 一兩 甲片 炙 歸尾 各五錢 白蘘 薑 炒
 二日 蜈蚣 一條 炙 共研細 每服 二錢 溫酒 調

猪腦子湯 猪腦子 一兩 黃耆 銀花 各三錢 歸 芍 各
 白芷 木瓜 角刺 甘草 節 括藎 仁 防己 胡麻 各

西聖復煎丸 乳花 蛇 各 兒茶 丁香 各一兩 炒焦 黃色 阿魏
 六兩 煎香油 四兩 煎大棗 肉 二十枚 共研末

五寶散 石鐘乳 四錢 珍珠 二錢 加麩 白 八錢 研勻 琥珀 二錢
 一兩 水八碗 煎藥 末 二錢 作 五 次 服 用 土 茯苓

加五寶散 水八碗 煎藥 末 二錢 作 五 次 服 用 土 茯苓
 紫金丹 龜版 一分 研末 二兩 辰砂 六錢 石決明 煨 童便 淬

下湯 六錢 研細 飯 九 麻子 大 每服 一錢 土茯苓 煎

毒結 藥 搽 毒 梅 衰 氣 盛 毒 類 證 治 裁

卷之八 梅毒結毒

頁

頭痛

天麻餅子 天麻 薄荷 甘草 白附子 白芷 蒼朮
錢雄黃 川芎 川烏 草烏 研末 麩糊丸
作餅 每服二三餅 葱白煎湯下
碧雲散 見六卷目

通鼻散 葫蘆壳燒灰 石鐘乳 膽礬 冰片 各等分研
末吹鼻 出黃水 日二三次

硫黃不二散 硫黃一錢 硃花一分 研細用涼水一杯調

結毒靈藥 水銀一兩 辰砂 雄黃 硫黃各三錢 研細
丹之煉法 入湯內泥封固 鐵蓋梁兜固封口 按紅升

治尋常腐爛症 靈藥五錢 輕粉五錢 同研細小罐收以紗封
之用時以甘草湯洗盡患處 將藥粉之油紙蓋之

若喉爛靈藥 一錢 加入 皂礬各一分 研吹
解毒紫金膏 明淨香油調開 先用葱 艾 甘草煎湯洗淨患
處 再搽此藥 三日一換

貼外

類證治裁

卷之八

梅毒結毒

頁

疔毒論治

經云青梁之變足生大疔。疔瘡火毒也。由恣食厚味及感四時疫
病之氣而生。其瘡生頭而四肢為多。初起麻木形如粟米。或黃頭
小胞。或寒熱癢痛。四肢沉重。其毒重其頭堅。其根深。旦發夕死。初
宜服奪命湯。外須拔去疔根。而後可生。用細篦鋒破疔頭。擠去惡血。
用拔疔塗貼瘡上。或鍼挑小孔。用立馬插入孔內。外以膏蓋。追出
疔根。然明疔易治。暗疔難療。如生耳內。遲延失治。毒必走黃。切
忌風燥辛熱等劑。如辛芷椒。蓋諸瘡毒宜散。疔瘡毒宜聚。聚則毒
在原處。拔其根自愈。若見患者怯寒。誤用風燥。豈知疔由火毒熱
極生。冷風燥助火。通毒內攻矣。初覺即宜早治。若前丹一時難覓。

類證治裁

卷之八

疔毒

頁

急用蠟牛搗爛敷之。或用家菊根搗敷之。內用菊花葉五錢。紫花
地丁三錢。生甘草一錢。煎服。或用梅花點舌丹。或用蟾酥丸。一
服。俱用菊根汁。汗出為度。種福堂方云。治疔用家園菊花搗爛取
和熱酒送下。汗出為度。卽一駕服下。卽愈。如無花葉。根搗汁服
亦可。有此方。古云疔瘡先刺血。內毒宜汗泄。禁灸不禁鍼。怕絲不
語方皆廢。古云疔瘡先刺血。內毒宜汗泄。禁灸不禁鍼。怕絲不
怕鐵。初發項以上者。用銀鍼刺入。挑斷疔根。拾盡毒血。用回疔丹
插入孔內。項以下者。亦可灸之不痛。血指紫條。挑法用銀針將
巴膏蓋之。毒頂焦皮刮開。以鍼刺入。疔根堅硬如鐵者。為順。若鍼刺入。懸軟
者。為逆。如此百挑。出紫黑血。再挑至鮮血。以知痛為止。散以高懸
蓋。過三時辰。卽換三四日後。瘡頂乾燥。以琥珀。令疔根托出一丹
搽之。以黃連膏抹之。外若失治。走黃毒氣內攻。嘔惡神昏。瘡必塌
陷。急於走黃處。按經尋有芒刺直豎。卽是疔苗。急用銀鍼。若漫腫

胃急服回。噴刻大痛。痛則許救。毒化黃水。痛止命活。
 人中。鼻下唇上。硬腫麻痛。急用蟾酥丸研敷。內服菊花地丁湯。
 生額骨間發小胞。如粟米。如赤豆。頂凹堅硬。按似釘頭。麻癢木
 痛。宜蟾酥丸。汗之。次服黃連消清。之外治悉按前法。此症屬
 或麥蘆丹。汗之。次服毒飲。清之外治悉按前法。胃火。
 生鼻孔內鼻竅腫塞。痛引腦門。甚則唇腮浮腫。宜蟾酥丸。汗之。再用
 蟾酥丸。研細末。吹入鼻
 孔中。此症屬肺火。
 舌上生核。強硬作痛。用鍼點破。搽水。搽散。內服加味
 生耳竅暗藏。處色黑。根深形如椒目。疼如錐刺。破流血水。以葱
 送蟾酥汗之。再以蟾酥丸水調濃滴耳。
 生上下唇。口鎖。口生口角間。初起如粟米。色紫堅如鐵。腫甚麻癢。

類證治裁 卷之八 疔毒 五

木痛唇疔。則唇皮外翻。鎖口疔。則口不能開。治法照前。忌灸。上
 脾火下唇胃火
 口角心脾火
 疔牙。牙縫腫起一粒。形如粟米。痛連腮項。用銀簪挑破。出血。搽拔疔
 蟾酥丸。徐徐。若煩躁口渴。宜服黃連解毒湯。即愈。此
 疔紅絲。生手臂足脛。胞起紫黑。上發紅絲一縷。急從紅絲起。止兩頭。
 用鍼挑斷。或從疔起處。用蟾酥條插入。萬應膏。不刺斷。毒入腸
 血出而愈。或從疔起處。蓋之。隨服黃連解毒湯。不刺斷。毒入腸
 胃不救。種福堂方云。再。以浮萍根。嚼細敷之。立愈。
 手掌。生手掌。堅硬黃胞。如釘。用葱石。煤炭。荔枝肉。不拘分兩。同
 疔蛇頭。生手指。起胞。色紫。疼痛。初宜蟾酥。外敷。雄黃。簡便方名羅疔。
 以嫩。攪核。醋。生指甲兩旁。名蛇。如豆。色紫。硬痛。生指甲根後。名蛇。

背如棗色。赤胖腫。生指中節。透指俱腫。名蛇。色或黃或紫。生指
 中節前面。如魚肚。名蛇。色赤。疼痛。初服蟾酥丸。
 疔暗。腋下。堅腫。無頭。寒熱。拘急。焮痛。先服麥蘆。
 內。寒熱。腹痛。數日間。忽腫一塊。初起。牙關緊急。用蟾酥丸三五粒。
 俟。再以前丸三粒。蓋。被出汗。無汗。飲熱酒。暗疔。治同。此。不
 挑。法。
 疔冷。生足跟。起紫白胞。疼痛。徹骨。腐爛。深孔。久不斂者。神燈照法。照
 之內。服。十宣散。
 疔刀。形。潤如。韭葉。肉紫黑。如烙。長寸餘。忌行鍼刺。以生薑三錢。葱
 湯。逐塊。葱白煎。蓋。被出汗。忌房事。酒肉。生冷。辛辣。等味。

類證治裁 卷之八 疔毒 五

疔羊毛。寒熱。類傷寒。前後心有紅疹。或成紫黑。斑點。用鍼從前後心
 羊毛。狀。用黑豆。即立時汗出而愈。一法。用明雄末二錢。青布包
 之。毛。奔至。後心。再於。後心。擦之。
 疔爛頭。未潰。頭已腐者。白菊根。一把。白梅。二箇。蟻。蟬。大者。二條。共
 疔紫馬。疔頭。色紫。而發。速。地。丁。車。前。草。煎。服。愈。
 疔金鑑云。疔。多生。唇口。及手掌。指節間。發紅。黃胞。痛癢。麻木。寒熱
 交作。屬心經火毒。紫燕。多生。手足。腰肋。筋骨間。初發。紫胞。次流血
 水。三日。後。串。筋。爛。骨。屬肝經火毒。黃鼓。多生。口角。腮。眼。胞。黃胞
 光亮。四。畔。紅。暈。嘔。噦。麻。痛。屬脾經火毒。白。及。多生。鼻。孔。兩。手。白。胞
 頂。硬。根。突。易。腐。易。陷。屬肺經火毒。黑。磨。多生。耳。竅。牙。縫。胸。腹。腰。腎

陰處黑斑紫胞。頑硬如釘。屬腎經火毒。五疔應五臟而生。初服蟾
 湯。寒熱仍作。宜五味消輕者。宜化疔毒。將走黃。急服疔毒已走
 黃心煩悶。急用七厘散。若肢冷脈絕。毒氣閉遏。先服蟾酥丸。隨
 脈自見。凡疔潰後。不宜補早。雖真虛。只可平補。忌用溫補。即生肌
 膏藥。亦不宜早貼也。

附方

全生通川 奪命湯 銀花 草河車 赤芍 細辛 蟬蛻 黃連 薑
 清涼解毒飲 連翹 澤蘭 青皮 甘草 丹 各等分 水煎
 速 犀角汁 紫花地丁 元參 花粉 赤芍 熟重加黃
 濁瀉加木通
 拔疔至寶丹 礞砂二錢 白礬四錢 硃砂 雄黃各五分
 類證治裁 卷之八 疔毒 綠礬四錢 火硝四錢 七味各

另研極細。合研後入水銀四錢。攪碎茶葉少許。研不
 見星。將藥入五罐。上用皮紙封固。盆中實以淨灰。隔罐頂半
 寸。灰上以瓦片鋪滿。上以白灰圍滿。頂火煨一炷。香去
 炭候。罐冷。用鷄翎掃下。淨白者。為上。磁罐收貯。放地。下出火
 氣一半。作末。子用一半。用厚糊打細。條雄黃。為衣。收貯。研內
 聽用
 凡疔瘡。用盤鋒。破將血。捻淨。用丹。一丸。研細。搽之。若挑破
 有小孔。以藥挑。插於孔內。俱用皮紙。打溼。數層。封好。過一二
 日。揭去。疔頭。自然。緩緩。脫出。即愈。
 立馬回疔丹 乳香六分 雄黃一分 麝香各三分 蜈
 蚣一條 金頂石五分 雄黃一分 麝香各三分 蜈
 蚣一條 如杏子大。每用一粒。插人孔內。
 梅花點舌丹 麝香各六分 冰片 麝香各一錢 珍珠
 沈香 乳香 沒藥 雄黃 各二錢 將人乳。浸蟾酥。能膽
 為丸。每重三四厘。金箔。為衣。曬乾。將人乳。浸蟾酥。能膽
 此丹。治疔瘡。對口。乳癰。疔瘡。疔毒。初起。以
 丸。入葱白。內嚼碎。酒送下。出汗。即愈。惟孕婦。忌服。

類證治裁 卷八

疔消 蟾酥丸 蟾酥二錢 酒化 輕粉 銅綠 枯礬 寒水石 煨
 雄黃一錢 麝香 牛黃 一個 以上各研末。先將蟾酥。研爛。
 同蟾酥。和入。各藥。共搗。勻。丸。如菜豆大。每服三九。令
 患者。用葱白。嚼爛。以熱酒。送下。蓋被。出汗。初起。即消。此九
 一名。飛龍。奪命丹。用巴豆。肉。十二兩。莖。蘇子。十二兩。去壳
 巴膏。香油。三。煎。浸。三日。蝦蟆。五。個。浸。一宿。臨。熬。時。入。活
 魚。香。五。錢。共。熬。焦。去。渣。再。熬。加。官。粉。二。兩。
 乳香。五。錢。攪。勻。攤。貼。
 拔疔散 礞砂 食鹽 放刀上煨之。各等分 以鐵繡刀燒紅。將白
 收之。搽患處。食鹽。放刀上煨之。各等分 以鐵繡刀燒紅。將白
 化硬。搜根。食鹽。放刀上煨之。各等分 以鐵繡刀燒紅。將白
 萬應膏 見前諸瘡
 琥珀膏 血餘八錢 花椒十四粒 麻油十二兩 熬焦。去
 先將定粉 入黃蠟。四兩。鎔化。以夏布。濾淨。入磁瓶內。各研
 極細。合一處。徐徐。入油內。用柳枝。攪勻。以冷。為度。用紙

類證治裁 卷之八 疔毒
 此膏。貼疔瘡。能活。癰。解毒。化腐。生新。
 九一丹 煨石膏九錢 黃蘗藥一錢 共研細。搽患處
 黃連膏 黃連三錢 香油十二兩 將藥。熬枯。去渣。入黃蠟
 四兩 鎔化。以夏布。濾淨
 傾入碗。中。柳枝。攪勻。貼
 四疔散 土蜂窠。有子者。一兩 蛇蛻。一條。泥裏。火煨。存性
 錢。白湯。下。如疔毒。發腫。神昏。謂之。走黃。用此。散。二
 少刻。大痛。可救
 麥靈丹 鮮蟾酥二錢 活蜘蛛。廿一個。取黑色者。兩頭。尖
 燃成。麥子。形。即。尿。飛。羅。蛻。六。兩。共。研。用。菊。花。熬。成。膏
 治一切。惡毒。每服。七粒
 黃連消毒飲 黃連一錢 黃耆二錢 生地 連翹 知母
 人參。各五分 防風 歸尾。各四分 桔梗 防己 黃芩
 水煎。空心。服 甘草三分 陳皮 蘇木 澤瀉。各二分

止痛

冰硼散 冰片五分 硼砂元明粉各五錢 辰砂六分 共研細 用少許搽之即效 如咽喉腫痛吹之立

加味二陳湯 陳夏 苓草 芩連 薄荷 薑三片

簡便方 五雀糞不拘多少 以韭汁浸化 入白礬少許研

簡便方 壁殼七個 用米飯搗爛敷患處即出 一法於

黃連解毒湯 見一卷溫

雄黃散 明雄黃二錢 輕粉五分 蟾酥二分 冰片一分 共研細 水調敷以薄紙蓋之 日換三四次

一法用陳醬茄子 套指上痛即止

敷藥方 紅痛徹骨即以弱壺運帶溼敷之立止

神燈照法 硃砂雄黃 血竭 沒藥各一錢 麝香四分 共研細 每用三分 紅綿紙裹藥燃長七寸以麻

煎藥

油浸透 凡癰疽一切惡毒初起七日前後皆可用此照法 以火點著 離半寸自外而內周圍照之火頭向上藥氣入 內毒隨火解 初用三根 漸加至四五根後用敷藥

鐵粉散 針砂末三錢 黃丹 輕粉 松香各一錢 麝香 油紙蓋之 共研勻 以葱湯洗去血水 以香油調敷 能蝕腐生新

十宣散 草各一兩 鱗各二兩 防 芎 桂 止 五味消毒飲 銀花 菊花 蒲公英 紫花地丁 紫背天 化疔內消散 知母 貝母 甲片 白芨 乳香 花柳 疔毒復生湯 銀花 山梔 地骨皮 牛蒡子 錢 水酒煎 沒藥各八分 通 牡蠣煨 大黃 角刺 花粉 乳香 木 水酒各半煎

七星劍 蒼耳頭 野菊花 稀莨草 紫花地丁 半枝蓮 各三錢 蚤休 麻黃各三分 水酒各半煎

散汗

黃連解毒湯

化疔內消散

疔毒復生湯

沒藥各八分

水酒各半煎

七星劍 蒼耳頭 野菊花 稀莨草 紫花地丁 半枝蓮 各三錢 蚤休 麻黃各三分 水酒各半煎

散宜

木香 流氣飲 歸 芍 芎 蘇 枳 桔 陳 苓 夏 澤 瀉 甘草節 木香各五分 薑三片 棗二枚 水煎

煎藥

油浸透 凡癰疽一切惡毒初起七日前後皆可用此照法 以火點著 離半寸自外而內周圍照之火頭向上藥氣入 內毒隨火解 初用三根 漸加至四五根後用敷藥

鐵粉散

十宣散

五味消毒飲

化疔內消散

疔毒復生湯

沒藥各八分

水酒各半煎

七星劍 蒼耳頭 野菊花 稀莨草 紫花地丁 半枝蓮 各三錢 蚤休 麻黃各三分 水酒各半煎

散汗

黃連解毒湯

發背搭手論治 蓮子發 蜂窩發 竟體疽附

背之正脊分上中下三發。俱屬督脈經上發。背生天柱骨下。是火毒傷肺。其形橫廣如肚。中發。背生背心。正對前心。是火毒傷肝。其形中濶。兩頭有尖如瓜。下發。背生腰中正對前臍。是火毒傷腎。其形平漫如龜。初起皆如粟米。焮痛麻癢。寒熱拘急。宜隔以知痛為度。則毒氣隨火而散。有表症者。寒熱無汗。散汗之。有裏症者。瀉便閉。內疏黃連。兼表裏症者。神授衛生。以減瘡勢。其紅腫痛甚。脈洪數有力。勢毒症也。易治。漫腫赤痛。色黯。脈微細者。氣虛症也。尤難。虛症也。難治。若不腫不痛。或漫腫色黯。脈微細者。氣虛症也。尤難。治瘡頂發一頭。或二頭。紅腫高突者。為癰。屬陽。宜清涼消毒。如焮

類證治裁

卷之八

發背搭手

毒

痛發熱。脈數者。內消散。如腫硬疼痛。脈實者。活命飲。五頭如粟不腫不赤。悶痛煩躁。渴飲便秘。四五日間。瘡頭不計其數。瘡口各含如粟狀。如蓮蕊。積日不潰。數日後。瘡頭迸出。通結一衣。揭去。又結。色紫黯者。為疽。屬陰。宜溫補托裏。如氣血兩虛。往來寒熱者。托裏當不能起發。不能腐潰者。托裏養將潰時。脚根走散不收束者。四圍以鐵。已潰後。腐肉不去者。外貼巴。潰後仍痛。宜兼消托者。內服托裏。如膿稀不稠。或膿成不潰。腐肉化遲者。內服托裏。桂惡寒形寒。或不收斂。係陽氣虛者。十全大。補熱內熱。或不收斂。係陰血虛者。加參朮。如作嘔噦。或不收斂。係胃氣虛者。加炮薑。食少體倦。或不收斂。係脾氣虛者。補中湯。加小便頻數。煩燥作渴。係

腎陰虧者。加減八。餘按諸瘡總論治法。

上搭手。生肩下。肺俞穴。脊骨第三節。屬膀胱經。偏左屬肝。偏右屬肺。由氣鬱痰熱凝結而成。初宜神授衛生。次以道通散。兼以湯調之。中搭手。生脊旁。膏肓穴。脊骨第四節。屬膀胱經。由怒火而生。初宜三香連翹。次以清氣飲。氣血虛。不即潰腐者。散補之。下搭手。生腰傍。盲門穴。脊骨第十四。亦屬膀胱經。由腎經虧熱熾而成。初宜活命飲。次以內托黃者。次服地黃湯。潰後治法同前。又有生脊背及兩肋。形似蓮蓬。名蓮子發。屬膀胱經。火毒生肩後及脊傍。形似蜂房。名蜂窩發。由脾經熱。高腫半背。若頭尖向上。屬心火熱。極防毒火內攻。若形長尺許。根橫滿背。名竟體疽。急服黃連消

類證治裁

卷之八

發背搭手

毒

解毒按前法治之

附方

荆防敗毒散 見一卷疫

內疏黃連湯 見本卷諸瘡

神授衛生湯 角針 防風 羌活 白芷 山甲炙 連翹
甘草節 紅花 大黃酒炒 沈香 銀花 石決明 花粉

水煎加酒服 貝母 花粉 乳香 製半夏 白芨
內消散 知母 角刺 銀花各一錢 水酒各半煎服 留山

渣搗加秋芙蓉葉 研末加蜜調敷 托裏散 見本卷諸瘡

仙方活命飲 見五卷鶴膝風

腫消托

結散

五香連翹飲 乳香 木香 沈香 丁香 香附 黃芪
甘草各 連翹 升麻 木通 獨活 桑寄生

托裏歸脾湯 當歸 川芎 白芍 熟地 人參 黃芪各
一錢 柴胡 甘草各五分煎

托裏養營湯 見本卷諸瘡

東緊

鐵桶膏 銅綠五錢 礬四錢 胆礬四錢 五倍子炒一兩
細以陳米醋熬起金色黃泡待溫調藥末 麝香三厘 研

腐化

巴膏 桑枝熬枯 桃柳 杏枝各五十寸 香油四斤熬上
二錢 熟化再入山椒子八十個 熟枯川椒將藥渣盡
入黃丹六兩攪勻慢火熬至滴水成珠住火入血竭研細一
錢 兒茶研細二錢 兩砂另研細二錢 等末攪融將膏
傾入涼水用手扯膏于餘遍換水數次去火氣磁罐收貯用
時重湯燉化紙
難貼之神效

消托

十全大補湯 見一卷中風
四物湯 地 芍 歸 芩
六君湯 參 苓 朮 草 加陳皮 半夏 薑 棗
補中益氣湯 見一卷中風
加減八味丸 見一卷咽喉
逍遙散 見一卷火
六鬱湯 見一卷瘰

托裏

托裏消毒散 見本卷諸瘡
發背搭手

痛定痛止氣調解和腐陰虛腫虛胃虛血虛陽

三香連翹飲 乳香 木香 香附 當歸 羌活 牛蒡子
地黃 車前子 金銀花 赤芍 羌活 水煎
清氣飲 花 黃芪 連翹 當歸 乳香 白芷 麥冬

補托

扶苓 皂角刺
水煎
參耆托裏散 見本卷乳症
內托黃耆散 當歸 白芍炒 川芎 白朮 陳皮 穿山
肉桂五分 黃耆各一錢 檳榔三分
水煎

陰

六味地黃湯 見一卷中風

體

黃連消毒飲 生地 連翹 知母 防風 獨活 歸尾各
四分 桔梗 黃芩 防已各五分 蘇木

疔

陳皮 澤泄各二分 黃連一錢 黃芪二錢 人參

將

甘草各三分 羌活一分
透膿散 見本卷諸瘡



道光庚寅年刊

玉田王清任著

醫林改錯

京都隆福寺胡同
三槐堂書鋪發兌

醫林改錯叙

余讀勳臣先生醫林改錯一書。而嘆天下事有人力為之者。有天意成之者。先生是書功莫大於圖繪臟腑諸形。其所以能繪諸形者。則由於親見。其所以得親見者。則由於稽地鎮之一遊也。此豈非天假之緣。而使數千載之悞。由先生而正之哉。惟膈膜一事。留心三十年。未能查驗的確。又得恒敬公確示一切。而後臟腑諸形得以昭晰無疑。此非有天意至成其間哉。至先生立方醫疾。大抵皆以約治博上卷著五十

醫林改錯余

上卷

種血瘀之症。以三方治之。下卷論半身不遂。以一方治之。並審出未病以前四十種氣虛之形症。非細心何能至此。論吐瀉轉筋。治分攻補兩途。方由試驗中來。論小兒抽風。非中風。以大補元氣一方治之。以不能言之兒。查出二十種氣虛之形症。平素細心不聞可知。論痘非胎毒。痘漿非血化。以六方治。古人不治之六十種逆痘。頗有效者。先生之書大抵補前人之未及。而在氣虛血瘀之症為多。今特揭諸篇首。

知非子書

醫林改錯目錄

直隸玉田縣鴻橋勳臣王清任著



上卷

醫林改錯叙 古人臟腑圖

親見改正臟腑圖共二十四件

會厭左氣門右氣門衛總管榮總氣府血府記

津門津管遮食總提瓏管出水道記

腦髓說 氣血合脈說

心脾不生血說

醫林改錯

上卷

二

通竅活血湯所治之症目

頭髮脫落 眼疼白珠紅

糟鼻子 耳聾年久

白癩風 紫癩風

紫印臉 青記臉如墨

牙疳 出臭氣

婦女乾勞 男子勞病

交節病作 小兒疳証計十九條

通竅活血湯方

血府逐瘀湯所治之症目

頭疼 胸疼

胸不任物 胸任重物

夜睡夢多 天亮出汗

食自胸右下 心裡熱名曰燈籠病

瞽悶 急躁

呃逆俗名打咯忒 飲水即噎

不眠 小兒夜啼

心跳心忙 夜不安

醫林改錯

上卷

三

俗言肝氣病 乾嘔

晚發一陣燒 血府逐瘀湯方

隔下逐瘀湯所治之症目

積塊 小兒痞塊

痛不移處 臥則腹墜

腎瀉 久瀉

膈下逐瘀湯方

下卷

半身不遂論叙 半身不遂論

半身不遂辨

半身不遂本源

口眼歪斜辨

辨口角流涎非痰飲

辨大便乾燥非風火辨小便頻數遺尿不禁

辨語言蹇澁非痰火辨口噤咬牙

記未病以前之形壯論小兒半身不遂

癱痿論

補陽還五湯

瘟毒吐瀉轉筋說 解毒活血急救回陽二方

論小兒抽風不是風可保立甦湯

論痘非胎毒

論痘漿不是血化

醫林改錯 二卷

四

論出痘飲水即瘡 論七八天痘瘡作癢

通經逐瘀湯

會厭逐瘀湯

止瀉調中湯

保元化滯湯

助陽止癢湯

足衛和榮湯

另有數論數方載于下卷之末以便對症檢用

醫林改錯

余著醫林改錯一書。非治病全書。乃記臟腑之書也。其中當尙有不實不盡之處。後人倘遇機會。親見臟腑。精察增補。抑又幸矣。記臟腑後。兼記數症。不過示人以規矩。令人知外感內傷。傷人何物。有餘不足。是何形狀。至篇中文義多粗淺者。因業醫者學問有淺深也。前後語句多複重者。恐心粗者。前後不互証也。如今身不遂內。有四十種氣虧之症。小兒抽風門。有二十種氣虧之症。如遇雜症。必于六十種內。互考參觀。庶免謬悞。望閱是書者。須詳審焉。玉田王清任書。



醫林改錯臟腑記敘

古人曰。既不能為良相。愿為良醫。以良醫易而良相難。余曰不然。治國良相。世代皆有。著書良醫。無一人。其所以無全人者。因前人創著醫書。臟腑錯悞。後人遵行立論。病本先失。病本既失。總有繡虎雕龍之筆。裁雲補月之能。病情與臟腑。絕不相符。此醫道無全人之由來也。夫業醫診病。當先明臟腑。嘗閱古人臟腑論。及所繪之圖。立言處處自相矛盾。如古人論脾胃。脾屬土。土主靜而不宜動。脾動則不安。既云脾

醫林改錯

上卷

六

動不安。何得下文又言脾聞聲則動。動則磨胃化食。脾不動則食不化。論脾之動靜。其錯悞如是。其論肺虛如蜂窠。下無透竅。吸之則滿。呼之則虛。既云下無透竅。何得又云肺中有二十四孔。行列分佈。以行諸臟之氣。論肺之孔竅。其錯悞又如是。其論腎有兩枚。即腰子。兩腎為腎。中間動氣為命門。既云中間動氣為命門。何得又云左腎為腎。右腎為命門。兩腎一體。如何兩立其名。有何憑據。若以中間動氣為命門。藏動氣者又何物也。其論腎錯悞又如是。其論肝。左右

有兩經。即血管。從兩脇肋起。上貫頭目。下由少腹環繞陰器。至足大指而止。既云肝左右有兩經。何得又云肝居於左。左脇屬肝。論肝分左右。其錯悞又如是。其論心。為君主之官。神明出焉。意藏於心。意是心之機。意之所專曰志。志之動變曰思。以思謀遠曰慮。用慮處物曰智。五者皆藏于心。既藏于心。何得又云脾藏意。智。腎主技巧。肝主謀慮。胆主決斷。據所論處處皆有靈機。究竟未說明生靈機者何物。藏靈機者何所。若用靈機。外有何神情。其論心如此含混。其論胃

醫林改錯

二卷

一

主腐熟水谷。又云脾動磨胃化食。胃之上口。名曰賁門。飲食入胃。精氣從賁門上輪于脾肺。宣播于諸脉。此段議論。無情無理。胃下口名曰幽門。即小腸上口。其論小腸為受盛之官。化物出焉。言飲食入小腸化糞。下至闕門。即小腸下口。分別清濁。糞歸大腸。自肛門出。水歸膀胱為尿。如此論尿從糞中滲出。其氣當臭。嘗用童子小便。並問及自飲小便之人。只言味鹹。其氣不臭。再者食與水合化為糞。糞必滲漉作瀉。在雞鴨無小便則可。在馬牛有小便則不可。何況乎人。

看小腸化食。水自關門出一節。真是千古笑談。其論心包絡。細筋如絲。與心肺相連者。心包絡也。又云。心外黃脂。是心包絡。又云。心下橫膜之上。豎膜之下。黃脂。是心包絡。又云。膈中有名無形者。乃心包絡也。既云有名無形。何得又云。手中指之經。乃是手厥陰心包絡之經也。論心包絡。竟有如許之多。究竟心包絡是何物。何能有如許之多耶。其論三焦。更爲可笑。靈樞曰。手少陰三焦主乎上。足太陽三焦主乎下。已是兩三焦矣。難經三十一難論三焦。上焦在胃之上。主

醫林改錯

上卷

八

內而不出。中焦在胃中脘。主腐熟水穀。下焦在臍下。主分別清濁。又云。三焦者。水穀之道路。此論三焦是有形之物。又云。兩腎中間動氣。是三焦之本。此論三焦。是無形之氣。在難經一有形。一無形。又是兩三焦。王叔和所謂有名無狀之三焦者。蓋由此也。至陳無擇。以臍下脂膜爲三焦。袁淳甫以人身著內一層。形色最赤者爲三焦。虞天民指空控子爲三焦。金一龍有前三焦。後三焦之論。論三焦者。不可以指屈有形無形。諸公尚無定準。何得云。手無名指之經。是手少

陽三焦之經也。其中有自相矛盾者。有後人譏駁而未當者。總之本源一錯。萬慮皆失。余嘗有更正之心。而無臟腑可見。自恨者。書不明臟腑。豈不是癡人說夢。治病不明臟腑。何異于盲子夜行。雖竭思區畫。無如之何。十年之久。念不少忘。至嘉慶二年丁巳。余年三十。四月初旬。遊于灤州之稻地鎮。其時彼處小兒。正染瘟疹痢症。十死八九。無力之家。多半用代席裹埋。代席者。代棺之席也。彼處鄉風。更不深埋。意在犬食。利于下胎不死。故各義塚中。破腹露臟之兒。日有

醫林改錯

上卷

九

百餘。余每日歷馬過其地。初未嘗不掩鼻。後因念及古人所以錯論臟腑。皆由未嘗親見。遂不避污穢。每日清晨。赴其義塚。就羣兒之露臟者。細視之。犬食之餘。大約有腸胃者多。有心肝者少。互相參看。十人之內。看全不過三人。連視十日。大約看全不下三十餘人。始知醫書中所繪臟腑形圖。與人之臟腑。全不相合。卽件數多寡。亦不相符。惟胃中膈膜一片。其薄如紙。最關緊要。及余看時。皆以破壞。未能驗明。在心上。是斜是正。最爲遺憾。至嘉慶四年六月。余在奉

天府有遼陽州一婦年二十六歲因瘋疾打死其夫與翁解省擬剛跟至西關忽然醒悟以彼非男子不忍近前片刻行刑者提其心與肝肺從面前過細看與前次所看相同後余在京時嘉慶庚辰年有打死其母之剛犯行刑于崇文門外吊橋之南却得近前及至其處雖見臟腑膈膜已破仍未得見道光八年五月十四日剛逆犯張格爾及至其處不能近前自思一簣未成不能終止不意道光九年十二月十三日夜間有安定門大街板廠胡同恒宅請余看症因

醫林改錯

上卷

十一

談及膈膜一事留心四十年未能審驗明確內有江寧布政司恒敬公言伊曾鎮守哈密領兵于喀什噶爾所見誅戮逆尸最多于膈膜一事知之最悉余聞言喜出望外即拜叩而問之恒公鑒余苦衷細細說明形狀余于臟腑一事訪驗四十二年方得的確繪成全圖意欲刊行于世惟恐後人未見臟腑議余故叛經文欲不刊行復慮後世業醫受禍相沿又不知幾千百年細思黃帝慮生民疾苦平素以靈樞之言下問岐伯鬼臾區故名素問二公如知之的確可對

君言知之不確須待參考何得不知妄對遺禍後世繼而秦越人著難經張世賢割裂河圖洛書為之圖許謂心肝肺以分兩計之每件重幾許大小腸以尺丈計之每件長若干胃大幾許容谷幾斗幾升其言彷彿似真其實臟腑未見以無憑之談作欺人之事利已不過虛名損人却屬實禍竊財猶謂之盜偷名豈不為賊千百年後豈無知者今余刻此圖並非獨出已見評論古人之短長非欲後人知我亦不避後人罪我惟願醫林中人一見此圖胸中雪亮眼底光

醫林改錯

上卷

十二







明臨症有所遵循不致南轅北輒出言含混病或少失是吾之厚望幸仁人君子鑒而諒之

肯

道光庚寅孟冬直隸玉田縣王清任書於京邸知一堂

古人所繪臟腑形圖如此

肺六葉
丑八葉



膽之形




肝之形



余將親見諸臟腑顯隱之形繪於其後

左氣門右氣門內管肺中一管入心
由心左轉出橫行後接衝總管




心長在氣管之下非在肺管
之下心與肺葉上枝齊

肺膜以上僅止肺心
左氣門餘無他物

其餘皆腸膜以下物
人身腸膜是下界物



肺葉分四枝入
肺內葉直貫到
底皆有節



兩大葉大面向背小
面而胸上有四夫向
胸下一小片亦何胸

肺外皮實無透氣
亦無行氣之二十四孔

肝四葉
胆附于
肝右邊
第二葉




總提長於胃上肝
又長于總提之
上大面向上後
連于肝膽堅
定非腸胃膀胱
可比絕不能藏血

胃府之體質
正口貴門在
胃上中下
口齒門亦在
胃上偏右此
門之左寸許
名津門胃高
津門之左有
竅竅如文是
連食門外津
門左名總提
肝連于其上



胃在腹是
平鋪外長
上口向脊
下口向右
底向腹連
出水道

胃中有管
體像玲瓏
易于出水
故名龍管




脾之長短與胃
相等脾中間
一管即是此
管乃而龍管
者謂有出水道
令人易辨也

氣府俗名錫冠油
下柱抱小腸氣府
內小腸外乃存元
氣之所元氣化
食人身生命
之根全在于此






此係小腸外氣兩氣之象

中是總管
水由龍管
分流而過
出水道而
出水道而
出水道而
出水道而
出水道而



出水道中
有血管
其餘
皆係
水管



古人言經絡是血管由每臟腑向外長兩根惟膀胱長四根余親見百餘臟腑並無向外長血管之形故書於圖後以記之

會厭左氣門右氣門衛總管榮總管氣府血府

欲知臟腑體質先明出氣入氣與進飲食之道路古

人謂舌根後名曰喉喉者候也候氣之出入即肺管

上口是也喉之後名曰咽咽者嚥也嚥飲食入胃即

胃管上口是也謂咽以納食喉以納氣為千古不易

之定論自靈素至今四千年來無人知其錯而改正

者如咽嚥飲食入胃人所共知惟喉候氣之出入一

節殊欠明白不知肺兩葉大面向背上有四尖向背

下一小片亦向背肺管下分為兩枝入肺兩葉每枝

醫林改錯 止

分九中枝每中枝分九小枝每小枝長數小枝枝之

盡頭處並無孔竅其形彷彿麒麟菜肺外皮亦無孔

竅其內所存皆輕浮白沫肺下實無透竅亦無行氣

之二十四孔先賢論吸氣則肺滿呼氣則肺虛此等

錯悞不必細辯人氣向裏吸則肚腹滿大非肺滿大

氣向外呼則肚腹虛小非肺虛小出氣入氣吐痰吐

飲唾津流涎與肺毫無干涉肺管之後胃管之前左

右兩邊凹處有氣管兩根其粗如筋上口在會厭之

下左曰左氣門右曰右氣門痰飲津涎由此氣管而

出。古人誤以咳嗽喘噎哮吼等症爲肺病者。因見其
症自胃中來。再者臨症。查有外感。用發散而愈。有燥
痰。用清涼而愈。有積熱。用攻下而愈。有氣虛。用補中
而愈。有陰虧。用滋陰而愈。有痰血。用逐瘀而愈。揚揚
得意。立言著書。以爲肺病無疑。不知左氣門。右氣門
兩管由肺管兩傍。下行至肺管前面半截處。歸並一
根。如樹兩枝歸一本。形粗如筋。下行入心。由心左轉
出。粗如筆管。從心左後行。由肺管左邊。過肺入脊前。
下行至尾骨。名曰衛總管。俗名腰管。自腰以上。向腹

醫林改錯

上卷

六

長兩管。粗如筋。止一管通氣府。俗名雞冠油。如倒提
雞冠花之壯。氣府乃抱小腸之物。小腸在氣府是橫
長。小腸外氣府內。乃存元氣之所。元氣卽火。火卽元
氣。此火乃人生命之源。食由胃入小腸。全仗元氣蒸
化。元氣足則食易化。元氣虛則食難化。此記向腹之
上一管。下一管。大約是通男子之精道。女子之子宮。
獨此一管。細心查看。未能查驗的確。所以疑似。以俟
後之業醫者。倘遇機會。細心查看再補。衛總管對背
心兩邊有兩管。粗如筋。向兩肩長。對腰有兩管。通連

兩腎。腰下有兩管通兩膝。腰上對脊正中。有十一短
管連脊。此管皆行氣行津液。氣足火旺。將津液煎稠。
稠者名曰痰。氣虛火衰。不能煎熬津液。津液必稀。稀
者名曰飲。痰飲在管。總以管中之氣上攻。上行過心。
由肺管前氣管中。出左右氣門。痰飲津涎本氣管中
物。古人何以誤爲肺中物。因不知肺管前有氣管相
連而長。止知痰飲津涎自胃中來。便疑爲肺中物。總
是未親見臟腑之故。手握足步。頭轉身搖。用行舍藏。
全憑此氣。人氣向裏吸則氣府滿。氣府滿則肚腹大。

醫林改錯

上卷

七

氣向外呼則氣府虛。氣府虛則肚腹小。衛總管行氣
之府。其中無血。若血歸氣府。血必隨氣而出。上行則
吐血。衄血。下行則溺血。便血。衛總管之前。相連而長。
粗如筋。名曰榮總管。卽血管盛血。與衛總管長短相
等。其內之血。由血府灌溉。血府卽人胸下膈膜一片。
其薄如紙。最爲堅實。前長與心口凹處齊。從兩脇至
腰上。順長如坡。前高後低。低處如地。池中存血。卽精
汁所化。名曰血府。精汁詳胃津門條下。前所言會厭。
卽舌後之白片。乃遮蓋左右氣門喉門之物也。

津門津管遮食總提瓏管出水道記

咽下胃之一物。在禽名曰嗉。在獸名曰肚。在人名曰胃。古人畫胃圖。上口在胃上。名曰賁門。下口在胃下。名曰幽門。言胃上下兩門。不知胃是三門。畫胃豎長。不知胃是橫長。不但橫長。在腹是平鋪卧長。上口賁門向脊。下底向腹。下口幽門亦在胃上。偏右脇向脊。幽門之左。寸許。另有一門。名曰津門。津門上有一管。名曰津管。是由胃出精汁水液之道路。津管一物。最難查看。因上有總提遮蓋。總提俗名胰子。其體長于

醫林收錯

上卷

六

賁門之右。幽門之左。正蓋津門。總提下前連氣府。提小腸。後接提大腸。在胃上。後連肝。肝連脊。此是膈膜以下。總提連貫胃肝大小腸之體質。飲食入胃。食留於胃。精汁水液。先由津門流出入津管。津管寸許外。分三杈。精汁清者入髓。府化髓。精汁濁者由上杈。卧則入血府。隨血化血。其水液由下杈。從肝之中間。穿過入脾。脾中間有一管。體相玲瓏。名曰瓏管。水液由瓏管分流兩邊。入出水道。出水道形如魚網。俗名網油。水液由出水道滲出。沁入膀胱。化而為尿。出水道

出水一段。體查最難。自嘉慶二年看臟腑時。出水道有滿水鈴鐺者。有無水鈴鐺者。于理不甚透徹。以後診病。查看久病壽終之人。臨時有多飲水者。有少飲水者。有不飲水者。故後其水仍然在腹。以此與前所看者。參考與出水道出水一節。雖然近理。仍不敢為定準。後以畜較之。遂喂遂殺之畜。網油滿水鈴鐺。三四日不喂之畜。殺之無水鈴鐺。則知出水道出水無疑。前言飲食入胃。食留於胃。精汁水液自津門流出。津門既孔如筋。大能向外流。精汁水液。稀粥豈不能

醫林收錯

上卷

元

流出。津門雖孔如筋。大其處胃體甚厚。四圍靠膈。縮小。所以水能出而食不能出。况胃之內。津門之左。一分遠。有一疙瘩。形如棗。大名曰遮食。乃挽食放水之物。待精汁水液流盡。食方腐熟。漸入小腸。化而為糞。小腸何以化食為糞。小腸外有氣府。氣府抱小腸。小腸外氣府內。乃存元氣之所。元氣化食。此處與前氣府參看。化糞入大腸。自肛門出。此篇記精汁由胃出。津門生精生血。水液由瓏管出水道入膀胱。為尿。食由胃入小腸。元氣蒸化為糞之原委也。

腦髓說

此說古近

靈機記性不在心在腦一段。本不當說。總然能說。必不能行。欲不說有許多病人不知源。思至此又不得不說。不但醫書論病言靈機發於心。即儒家談道德。言性理。亦未有不言靈機在心者。因始創之人。不知心在胃中所辦何事。不知咽喉兩傍有氣管兩根。行至肺管前。歸並一根入心。由心左轉出。過肺入脊。名曰衛總管。前通氣府精道。後通脊。上通兩肩。中通兩臂。下通兩腿。此管乃存元氣與津液之所。氣之出入

醫林改錯

上卷

三

由心所過。心乃出入氣之道路。何能生靈機貯記性。靈機記性在腦者。因飲食生氣血長肌肉。精汁之清者化而為髓。由脊骨上行入腦。名曰腦髓。盛腦髓者。名曰髓海。其上之骨。名曰天靈蓋。兩耳通腦。所聽之聲歸於腦。腦氣虛。腦縮小。腦氣與耳竅之氣不接。故耳虛聾。耳竅通腦之道路中。若有阻滯。故耳實聾。兩目即腦汁所生。兩目系如線長於腦。所見之物歸於腦。瞳人白色是腦汁下注。名曰腦汁入目。鼻通於腦。所聞香臭歸於腦。腦受風熱。腦汁從鼻流出。涕濁氣

臭名曰腦滿。看小兒初生時。腦未全。顙門軟。目不靈。動耳不知聽。鼻不知聞。舌不言。至週歲。腦漸生。顙門漸長。耳稍知聽。目稍有靈動。鼻微知香臭。舌能言一二字。至三四歲。腦髓漸滿。顙門長全。耳能聽。目有靈動。鼻知香臭。言語成句。所以小兒無記性者。腦髓未滿。高年無記性者。腦髓漸空。李時珍曰。腦為元神之府。金正希曰。人之記性皆在腦中。汪訥菴曰。今人每記憶往事。必閉目上瞪而思索之。腦髓中一時無氣。不但無靈機。必死一時。一刻無氣。必死一刻。試看痴

醫林改錯

七卷

三

症。俗名羊羔風。即是元氣一時不能上轉入腦髓。抽時正是活人死。腦袋活人者。腹中有氣。四肢抽搐。死腦袋者。腦髓無氣。耳聾眼天。如死。有先喊一聲而後抽者。因腦先無氣。胸中氣不知出入。暴向外出也。正抽時。胸中有漉漉之聲者。因津液在氣管。腦無靈機之氣。使津液吐嚙。津液逗留在氣管。故有此聲。抽後頭疼昏睡者。氣雖轉入於腦。尚未足也。小兒久病後。元氣虛。抽風。大人暴得氣厥。皆是腦中無氣。故病人毫無知識。以此參考。豈不是靈機在腦之證據乎。

氣血合脈說脈之形余以實情告後人若違心

氣府存氣血府存血衛總管由氣府行周身之氣故

名衛總管榮總管由血府行周身之血故名榮總管

衛總管體厚形粗長在脊骨之前與脊骨相連散佈

頭面四肢近筋骨長即周身氣管榮總管體薄形細

長在衛總管之前與衛總管相連散佈頭面四肢近

皮肉長即周身血管氣在氣府有出有人出入者呼

吸也目視耳聽頭轉身搖掌握足步靈機使氣之動

轉也血自血府入榮總管由榮總管灌入周身血管

醫林改錯

上卷

三

滲於管外其肌肉也氣管近筋骨生內藏難見血管

近皮肉長外露易見氣管行氣氣行則動血管盛血

靜而不動頭面四肢按之跳動者皆是氣管並非血

管如兩眉稜骨後凹處俗名兩太陽是處肉少皮連

骨按之跳動是通頭面之氣管兩足大指次指之端

是處肉少皮連骨按之跳動是通兩足之氣管兩手

腕橫紋高骨之上是處肉少皮連骨按之跳動是通

兩手之氣管其管有粗有細有直有曲各人體質不

同胛膊肘下近手腕肉厚氣管外露者短胛膊肘下

近手腕肉薄氣管外露者長如外感中人風入氣管

其管必粗按之出膚寒久氣管管中津液必凝凝則

阻塞其氣按之跳動必慢火入氣管火氣上炎按之

跳動必急人壯邪氣勝管中氣多按之必實大有力

人弱正氣衰管中氣少按之必虛小無力久病無生

機之人元氣少僅止上行頭面兩手無氣下行故足

面按之不動若兩手腕氣管上按之似有似無或細

小如絲或指下微微亂動或按之不動忽然一跳皆

是氣將絕之時此段言人之氣管生平有粗細曲直

醫林改錯

上卷

三

之不同管有短長者因手腕之內有薄厚也按之大

小者虛實也跳動之急慢者寒火之分也前所言明

明是脈不言脈者因前人不知人有左氣門右氣門

血府氣府衛總管榮總管津門津管總提遮食糞管

出水道在腹是何體質有何用處論臟腑包絡未定

準是何物論經絡三焦未定準是何物並不能指明

經絡是氣管血管論脈理首句便言脈為血府百骸

貫通言脈是血管氣血在內流通周而復始若以流

通而論此處血真能向彼處流彼處當有空隙之地

有空隙之地。則是血虛。無空隙之地。血流歸於何處。古人並不知脈是氣管。竟者出許多脈訣。立言雖多。論部位一人一樣。並無相同者。古人論脈二十七字。余不肯深說者。非謂古人無容足之地。恐後人對症無談脈之言。診脈斷死生易。知病難。治病之要訣。在明白氣血。無論外感內傷。要知初病傷人何物。不能傷臟腑。不能傷筋骨。不能傷皮肉。所傷者無非氣血。氣有虛實。實者邪氣實。虛者正氣虛。正氣虛。當與半身不遂門。四十種氣虛之症。小兒抽風門。二十種氣

醫林改錯

上卷

三

虛之症。互相參考。血有虧瘀。血虧必有虧血之因。或因吐血。衄血。或溺血。便血。或破傷流血過多。或崩漏產後傷血過多。若血瘀有血瘀之症。可查。後有五十種血瘀症。互相參考。惟血府之血。瘀而不活。最難分別。後半日發燒。前半夜更甚。後半夜輕。前半日不燒。此是血府血瘀。血瘀之輕者。不分四段。惟日落前後。燒兩時。再輕者。或燒一時。此內燒兼身熱而言。若午後身涼。發燒片刻。乃氣虛參芪之症。若天明身不熱。發燒止一陣。乃參附之症。不可混含從事。

心無血說

余友薛文煜字明齋通州人。素知醫。道光十年二月。因赴山東。來舍辭行。閑談言及古人論生血之源。有言心生血。脾統血者。有言脾生血。心統血者。不知宗誰。余曰。皆不可宗。血是精汁入血府所化。心乃是出入氣之道路。其中無血。朗齋曰。吾兄所言不實。諸物心皆有血。何獨人心無血。余曰。弟指何物。心有血。曰。古方有遂心丹治癲狂。用甘遂末以豬心血和為丸。豈不是豬心有血之憑據。余曰。此古人之錯。非心內

醫林改錯

上卷

三

之血。因刀刺破其心腔子內。血流入于心。看不刺破之心。內並無血。余見多多。試看殺羊者。割其頸項。不刺心。心內亦無血。又曰。不刺心。何死之速。余曰。滿腔血從刀口流。所以先流者速。繼而周身血退還腔子。所以後流者遲。血盡氣散。故死之速。如人鬪毆。破傷流血過多。氣散血亡。漸至抽風。古人立名曰破傷風。用散風藥。治死受傷者。凶手擬抵。治一個。即是死兩個。若明白氣散氣亡之義。即用黃芪半斤。黨參四兩。大補其氣。救一人。豈不是救兩人。朗齋点首而別。

方叙

余不論三焦者無其事也。在外分頭面四肢周身血管。在內分隔膜上下兩段。隔膜以上心肺咽喉左右氣門。其餘之物皆在隔膜以下。立通竅活血湯。治頭面四肢周身血管血瘀之症。立血府逐瘀湯。治胃中血府血瘀之症。立膈下逐瘀湯。治肚腹血瘀之症。病有千壯萬態。不可以余為全書。查証有王肯堂證治準繩。查方有周定王朱肅普濟方。查藥有李時珍本草綱目。三書可謂醫學之淵源。可讀可記。有國朝之醫林改錯。上卷 三六

通竅活血湯所治之病開列於後

頭髮脫落

傷寒瘟疫病後。頭髮脫落。各醫書皆言傷血。不知皮裡肉外血瘀阻塞血路。新血不能養髮。故髮脫落。無病脫髮。亦是血瘀。用藥三付。髮不脫。十付必長新髮。

眼疼白珠紅

眼疼白珠紅。俗名暴發火眼。血為火燒。凝於目珠。故白珠紅色。無論有雲翳無雲翳。先將此藥吃一付。後吃加味止痛沒藥散。一日二付。三兩日必全愈。

醫林改錯 上卷

三三

糟鼻子

色紅是瘀血。無論三二十年。此方服三付可見效。二十付可全愈。舍此之外。並無驗方。

耳聾年久

耳孔內小管通腦。管外有瘀血。靠擠管閉。故耳聾。晚服此方。早服通氣散。一日兩付。三二十年耳聾可愈。

白癩風

血瘀於皮裡。服三五付。可不散漫再長。三十付可痊。

紫癩風

血瘀於膚裡治法照白癩風無不應手取效

紫印臉

臉如打傷血印色紫成片或滿臉皆紫皆血瘀所致如三五年十付可愈若十餘年三二十付必愈

青記臉如墨

血瘀症長於天庭者多三十付可愈白癩紫癩紫印青記自古無良方者不知病源也

牙疳

牙者骨之餘養牙者血也傷寒瘟疫痘疹痞塊皆能

醫林改錯

上卷

三六

燒血血瘀牙床紫血死牙床黑血死牙脫人豈能活

再用涼藥凝血是促其死也遇此症將此藥晚服一

付早服血府逐瘀湯一付白日煎黃芪八錢徐徐服

之一日服完一日三付三日可見効十日大見効一

月可全愈總然牙脫五七個不穿腮者皆可活

出氣臭

血府血瘀血管血必瘀氣管與血管相連出氣安得

不臭即風從花裡過來香之義晚服此方早服血府

逐瘀湯三五日必效無論何病聞出臭氣照此法治

婦女乾勞

經血三四月不見或五六月不見咳嗽喘喘飲食減少四肢無力午後發燒至晚尤甚將此方吃三付或六付至重者九付未有不全愈者

男子勞病

初病四肢疲軟無力漸漸肌肉消瘦飲食減少面色黃白咳嗽吐沫心煩急躁午後潮熱天亮汗多延醫調治始而滋陰繼而補陽補之不効則云虛不受補無可如何可笑著書者不分別因弱致病因病致弱

醫林改錯

上卷

三九

果係傷寒瘟疫大病後氣血虛弱因虛弱而病自當

補弱而病可痊本不弱而生病因病久致身弱自當

去病病去而元氣自復查外無表症內無裏症所見

之症皆是血瘀之症常治此症輕者九付可愈重者

十八付可愈吃三付後如果氣弱每日煎黃芪八錢

徐徐服之一日服完此攻補兼施之法若氣不甚弱

黃芪不必用以待病去元氣自復

交節病作

無論何病交節病作乃是瘀血何以知其是瘀血每

見因血結吐血者，交節亦發，故知之。服三付不發。

小兒疳証

疳病初起，尿如米泔，午後潮熱，日久青筋暴露，肚大堅硬，面色青黃，肌肉消瘦，皮毛憔悴，眼睛發眵。古人以此症在成人為勞病，在小兒為疳疾。照前症再添某病，則曰某疳。如脾疳、疳瀉、疳腫、疳痢、肝疳、心疳、疳渴、肺疳、腎疳、疳熱、腦疳、眼疳、鼻疳、牙疳、脊疳、蛔疳、無辜疳、丁奚疳、哺露疳、分病十九條。立五十方，方內多有梔子、黃連、羚羊、石膏、大寒之品。因論病源，係乳食

醫林改錯

卷

三

過飽，肥甘無節，停滯中脘，傳化遲滯，腸胃漸傷，則生積熱。熱盛成疳，則消耗氣血，煎灼津液，故用大寒以清積熱。余初時對症用方，無一效者。後細閱其論，因飲食無節，停滯中脘，此論是停食，不宜大寒之品，以傳化遲滯，腸胃漸傷，則生積熱之句而論。當是虛熱，又不宜用大寒之品。後遇此症，細心審查，午後潮熱至晚尤甚，乃瘀血也。青筋暴露非筋也，現於皮膚者，血管也。血管青者，內有瘀血也。至肚大堅硬成塊，皆血瘀凝結而成。用通竅活血湯以通血管，用血府逐

瘀湯去午後潮熱，用隔下逐瘀湯消化積塊。三方輪服，未有不愈者。

通竅活血湯

赤芍 一錢 川芎 一錢 桃仁 三錢 紅花 三錢

老葱 三根 鮮薑 三錢 紅棗 七個 麝香 五錢

用黃酒半斤，將前七味煎一鍾，去渣，將麝香入酒內，再煎二沸。臨臥服。方內黃酒各處分兩不同，寧可多二兩，不可少。煎至一鍾，酒亦無味，雖不能飲酒之人，亦可服。方內麝香，市井易于作假，一錢真可合一兩。

醫林改錯

三

假人又不能辨。此方麝香最要緊，多費數文，必買好的。方妥，若買當門子更佳。大人一連三晚吃三付，隔一日再吃三付。若七入歲小兒，兩晚吃一付，三兩歲小兒，三晚吃一付。麝香可煎三次，再換新的。

赤芍藥表裏通經第一方

方歌：通竅全憑好麝香，桃紅大棗老葱薑。川芎黃酒加味止痛沒藥散，治初起眼疼白珠紅，後起雲翳。

沒藥 三錢 血竭 三錢 大黃 三錢 朴消 三錢

石決明 三錢

爲末分四付早晚清茶調服眼科外症千古一方

通氣散 治耳聾不聞雷聲余三十歲立此方

柴胡 一兩 香附 一兩 川芎 五錢 爲末早晚開水沖

服三錢

血府逐瘀湯所治之病開列於後

頭疼

頭疼有外感必有發熱惡寒之表症發散可愈有積熱必舌乾口渴用承氣可愈有氣虛必似痛不痛用

醫林改錯

卷上

三

參芪可愈查患頭疼者無表症無裏症無氣虛痰飲等症忽犯忽好百方不効用此方一劑而愈

胸疼

胃疼在前面用木金散可愈後通背亦疼用瓜蒌薤白白酒湯可愈在傷寒用瓜蒌陷胃柴胡等皆可愈有忽然胃疼前方皆不應用此方一付疼立止

胃不任物

江西巡撫阿霖公年七十四夜卧露胃可睡蓋一層布歷則不能睡已經七年召余診之此方五付全愈

胃任重物

一女二十二歲夜臥令僕婦坐於胃方睡已經二年余亦用此方三付而愈設一齊問病源何以答之

天亮出汗

醒後出汗名曰自汗因出汗醒名曰盜汗盜散人之氣血此是千古不易之定論竟有用補氣固表滋陰降火服之不効而反加重者不知血瘀亦令人自汗盜汗用血府逐瘀湯一兩付而汗止

食自胃右下

醫林改錯

卷上

三

食自胃管而下宜從正中食入咽有從胃右邊嚙下者胃管在肺管之後仍由肺葉之下轉入肺前由肺下至肺前出膈膜入腹肺管正中血府有瘀血將胃管擠靠於右輕則易治無碍飲食也重則難治擠靠胃管灣而細有碍飲食也此方可効全愈難

心裡熱名曰燈籠病

身外涼心裡熱故名燈籠病內有血瘀認爲虛熱愈補愈熱認爲實火愈涼愈凝三兩付血活熱退

替問

即小事不能開展，即是血瘀，三付可好。

急躁

平素和平，有病急躁，是血瘀，一二付必好。

夜睡夢多

夜睡夢多是血瘀，此方一兩付全愈，外無良方。

呃逆俗名打咯忒

因血府血瘀，將通左氣門右氣門歸並心上一根氣管，從外擠嚴，吸氣不能下行，隨上出故呃氣。若血瘀甚，氣管閉塞，出入之氣不通，悶絕而死。古人不知病

醫林改錯

上卷

三

源以橘皮竹茹湯、承氣湯、都氣湯、丁香柿蒂湯、附子理中湯、生薑瀉心湯、代赭旋覆湯、大小陷胃等湯治之，無一効者。相傳咯忒傷寒、咯忒瘟癘，必死。醫家因古無良法，見此症則棄而不治，無論傷寒、瘟疫雜症，一見呃逆，速用此方，無論輕重，一付即効。此余之心法也。

飲水即噎

飲水即噎，乃會厭有血滯，用此方極効。古人評論全錯，余詳於痘症條。

不眠

夜不能睡，用安神養血藥治之不効者，此方若神。

小兒夜啼

何得白日不啼，夜啼者血瘀也，此方一兩付全愈。

心跳心忙

心跳心忙，用歸脾安神等方不効，用此方百發百中。

夜不安

夜不安者，將卧則起，坐未穩又欲睡，一夜無寧刻，重者滿床亂滾，此血府血瘀，此方服十餘付可除根。

醫林改錯

上卷

三五

俗言肝氣病

無故愛生氣，是血府血瘀，不可以氣治，此方應手効。

乾嘔

無他症惟乾嘔，血瘀之症，用此方化血而嘔立止。

晚發一陣熱

每晚內熱兼皮膚熱一時，此方一付可愈，重者兩付。

血府逐瘀湯

當歸 生地 桃仁 紅花

只壳 赤芍 柴胡 甘草

桔梗一錢 川芎一錢 牛膝三錢 水煎服

方歌血府當歸生地桃紅花甘草壳赤芍柴胡芎枳
牛膝等血化下行不作勞

隔下逐瘀湯所治之症開列於後

積塊

積聚一症不必論古人立五積六聚七癥八瘕之名
亦不議駁其錯駁之未免過煩今請問在肚腹能結
塊者是何物若在胃結者必食也在腸結者燥糞也
積塊日久飲食仍然如故自然不在腸胃之內必在

醫林改錯

卷上

三六

腸胃之外腸胃之外無論何處皆有氣血氣有氣管
血有血管氣無形不能結塊結塊者必有形之血也
血受寒則凝結成塊血受熱則煎熬成塊豎血管凝
結則成豎條橫血管凝結則成橫條橫豎血管皆凝
結必接連成片片凝日久厚而成塊既是血塊當發
燒要知血府血瘀必發燒血府血之根本瘀則殞命
肚腹血瘀不發燒肚腹血之稍末雖瘀不致傷生無
論積聚成塊在左肋右肋臍左臍右臍上臍下或按
之跳動皆以此方治之無不應手取效病輕者少服

病重者多服總是病去藥止不可多服倘病人氣弱
不任尅消原方加党參三五錢皆可不必拘泥

小兒痞塊

小兒痞塊肚大青筋始終總是血瘀為患此方與前
通竅活血湯血府逐瘀湯三方輪轉服之月餘未有
不成功者

痛不移處

凡肚腹疼痛總不移動是血瘀用此方治之極效

臥則腹墜

病人夜臥腹中似有物左卧向左邊墜右卧向右邊
墜此是內有血瘀以此方為主有雜症兼以他藥

腎瀉

五更天泄三兩次古人名曰腎泄言是腎虛用二神
丸四神丸等藥治之不效常有三五年不愈者病不
知源是難事也不知總提上有瘀血卧則將津門攔
嚴水不能由津門出由幽門入小腸與糞合成一處
糞滯滯故清晨瀉三五次用此方逐總提上之瘀血
血活津門無攔水出瀉止三五付可全愈

久瀉

瀉肚日久百方不効。是總提瘀血過多。亦用此方。隔下逐瘀湯

靈脂二錢

當歸三錢

川芎三錢

桃仁三錢

丹皮二錢

赤芍三錢

烏藥三錢

元胡一錢

甘草三錢

香附三錢

紅花三錢

只壳三錢

水煎服

方歌。隔下逐瘀。桃牡丹。赤芍烏藥元胡甘。歸芎靈脂。紅花香附開鬱血亦安。

半身不遂論叙

醫家立言著書。心存濟世者。乃良善之心也。必須親治其症。屢驗方法。萬無一失。方可傳與後人。若一症不明。留與後人再補。斷不可徒取虛名。恃才立論。病未經見。揣度立方。倘病不知源。方不對症。是以活人之心。遺作殺人之事。可不畏歟。如傷寒。瘟疫。雜症。婦科。古人各有所長。對症用方。多半應手取効。其中稍有偏見。不過白玉微瑕。惟半身不遂一症。古之著書者。雖有四百餘家。於半身不遂立論者。僅止數人。數

醫林改錯

卷六

人中。並無一人說明病之本源。病不知源。立方安得無錯。余少時遇此症。始遵靈樞素問仲景之論。治之無功。繼遵河間東垣丹溪之論。投藥罔効。輾轉躊躇。幾至束手。伏思張仲景論傷寒。吳又可著瘟疫。皆獨出心裁。並未引古經一語。余空有活人之心。而無濟世之手。凡遇是症。必細心研究。審氣血之榮枯。辨經絡之通滯。四十年來。頗有所得。欲公之天下。以濟後人。奈不敢以管見之學。駁前人之論。另立方法。自取其罪。友人曰。真曾有確見。屢驗良方。補前人之缺。救

後人之難。不但有功於後世。正是前代之勲臣。又何罪之有。余聞斯議。不揣鄙陋。將男婦小兒半身不遂。癱腿痿症。抽搐筋攣。得病之源。外現之症。屢驗良法。難治易治之形狀。及前人所論脈理臟腑經絡之錯悞。一一繪圖申明其說。詳述前後。以俟高明。再加補助。於醫道豈無小補云爾。

醫林改錯

下卷

二

半身不遂論

半身不遂。病本一體。諸家立論。竟不相同。始而靈樞經曰。虛邪偏客於身半。其入深者。內居榮衛。榮衛衰則真氣去。邪氣獨留。發為偏枯。偏枯者。半身不遂也。素問曰。風中五臟六腑之俞。所中則為偏風。張仲景曰。夫風之為病。當令人半身不遂。三書立論。本源皆專主於風。至劉河間出世。見古人方論無功。另出手眼。云中風者。非肝木之風內動。亦非外中於風。良由將息失宜。內火暴甚。水枯莫制。心神昏昧。卒倒無所

醫林改錯

下卷

三

知。其論專主於火。李東垣見河間方論矛盾。又另立論曰。中風者。氣虛而風邪中之。病在四句以後。壯盛希有。肥白氣虛者。間亦有之。論中有中腑中臟中血脈中經絡之分。立法以本氣虛外受風邪。是其本也。朱丹溪見東垣方症不符。又分途立論。言西北氣寒有中風。東南氣濕非真中風。皆因氣血先虛。濕生痰。痰生熱。熱生風也。其論專主於痰。濕痰是其本也。王安道見丹溪論中有東南氣濕非真中風一句。便云靈樞素問仲景所言是真中風。河間東垣丹溪所言

是類中風。虞天民言王安道分真中風類中風之說亦未全是。四方病此者。盡因氣濕痰火挾風而作。何嘗見有真中類中之分。獨張景岳有高人之見。論半身不遂。大體屬氣虛。易中風之名。著非風之論。惟引用內經厥逆。並辨論寒熱血虛。及十二經之見症。與症不符。其方不效者。可惜先生於此症閱歷無多。其餘名家所論病因。皆是因風因火因氣因痰之論。所立之方。俱係散風清火順氣化痰之方。有云氣血虛弱而中風邪者。於散風清火方中加以補氣養血之

醫林改錯

一卷

四

藥。有云陰虛虧損而中風邪者。於滋陰補腎藥內佐以順氣化痰之品。或補多而攻少。或補少而攻多。自謂攻補兼施於心有得。今人遵用。仍然無效。又不敢議論古人之非。不曰古方不合今病。便云古今元氣不同。既云方不合病。元氣不同。何得傷寒病。麻黃承氣陷胸柴胡應手取效。何得中風門。愈風導痰秦芫三化屢用無功。總不思古人立方之本。効與不効。原有兩途。其方効者。必是親治其症。屢驗之方。其不効者。多半病由議論。方從揣度。以議論揣度定論立方。

如何能明病之本源。因何半身不遂。口眼歪斜。因何語言蹇澁。口角流涎。因何大便乾燥。小便頻數。毫無定見。古今混猜。以一虧損五成元氣之病。反用攻發尅消之方。安得不錯。溯本窮源。非錯於醫。乃錯自著書者之手。嗟呼。此何等事。而竟以意度想當然乎哉。半身不遂辨。

或曰。半身不遂。古人風火濕痰之論。諸家層次議駁。有証據可憑乎。余曰。卽以仲景傷寒論中風篇云。中風則令人頭疼身痛。發熱惡寒。乾嘔自汗。金匱要畧

醫林改錯

下卷

五

論傷風。則令人鼻塞噴嚏。咳嗽聲重。鼻流清涕。中風本門又云。夫風之爲病。當令人半身不遂。今請問何等風。何等中法。令人頭疼身痛。發熱惡寒。乾嘔自汗。何等風。何等中法。則令人鼻塞噴嚏。咳嗽聲重。鼻流清涕。何等風。何等中法。則令人半身不遂。半身不遂。若果是風。風之中人。必由皮膚入經絡。亦必有由表入裏之症。可查。嘗治此症。初得時。並無發熱惡寒。頭疼身痛。日痛鼻乾。寒熱往來之表症。既無表症。則知半身不遂。非風邪所中。再者。衆人風火濕痰之論。立

說更爲含混。如果是風火濕痰。無論由外中。由內發。必歸經絡。經絡所藏者。無非氣血。氣血若爲風火濕痰阻滯。必有疼痛之症。有疼痛之症。乃是身痛之痺症。非是半身不遂。半身不遂無疼痛之症。余平生治之最。多。從未見因身痛痺症而得半身不遂者。由此思之。又非風火濕痰所中。

半身不遂本源

或曰。君言半身不遂。虧損元氣。是其本源。何以虧至五成。方病。願聞其說。余曰。夫元氣藏於氣管之內。分

醫林改錯

下卷

六

佈周身。左右各得其半。人行坐動轉全仗元氣。若元氣足則有力。元氣衰則無力。元氣絕則死矣。若十分元氣虧。二成剩八成。每半身仍有四成。則無病。若虧五成。剩五成。每半身只剩二成半。此時雖未病。半身不遂已有氣虧之症。因不疼不癢。人自不覺。若元氣一虧。經絡自然空虛。有空虛之隙。難免其氣向一邊歸併。如右半身二成半歸併於左。則右半身無氣。左半身二成半歸併於右。則左半身無氣。無氣則不能動。不能動名曰半身不遂。不遂者不遂人用也。如睡

醫林改錯 卷下

時氣之歸併。人不能知覺。不過是醒則不能翻身。惟睡醒時氣之歸併。自覺受病之半身。向不病之半身流動。比水流波浪之聲尤甚。坐時歸併身必歪倒。行走時歸併。半身無氣。所以跌仆。人便云。因跌仆得半身不遂。殊不知非因跌仆得半身不遂。實因氣虧得半身不遂。以致跌仆。

口眼歪斜辨

或曰。半身不遂。既然無風。如何口眼歪斜。余曰。古人立歪斜之名。總是臨症不細心審查之故。口眼歪斜

醫林改錯

下卷

七

並非歪斜。因受病之半臉無氣。無氣則半臉縮小。一眼無氣。力不能圓睜。小眼角下抽。口半邊無氣。力不能開。嘴角上抽。上下相湊。乍看似歪斜。其實並非左右之歪斜。嘗治此症。凡病左半身不遂者。歪斜多半在右。病右半身不遂者。歪斜多半在左。此理令人不解。又無書籍可考。何者。人左半身經絡。上頭面從右行。右半身經絡。上頭面從左行。有左右交互之義。余亦不敢爲定論。以待高明細心審查再補。又曰。口眼歪斜。盡屬半臉無氣乎。余以前論指兼半

三八三

身不遂而言。若壯盛人無半身不遂。忽然口眼歪斜。乃受風邪阻滯經絡之症。經絡為風邪阻滯。氣必不上達。氣不上達頭面。亦能病口眼歪斜。用通經絡散風之劑。一藥而愈。又非治半身不遂方之所能為也。辨口角流涎非痰飲。

或曰。口角所流非痰飲乎。余曰。嘗治此症。見所流盡是清水。並非稠痰。明明氣虛不固津液。不明此理。試看小兒氣不足時。流涎者十有八九。高年人氣衰時。流涎者十有二三。再以他症互相參看。流涎者屬氣

醫林改錯

下卷

八

虛無疑。

辨大便乾燥非風火

或曰。患半身不遂。兼大便乾燥。古人名曰風燥。言其病有風有火。有是理乎。余曰。若是風火。用散風清火。潤燥攻下藥。大便一行。風散火清。自當不燥。嘗見治此症者。誤用下藥。下後乾燥更甚。總不思平素出大恭時。並非大恭順谷道自流。仍用氣力催大恭下行。既得半身不遂之後。無氣力使手足動。無氣力使舌言。如何有氣力到下部催大恭下行。以此推之。非風

火也。乃無氣力催大恭下行。大恭在大腸日久不行。自乾燥也。

辨小便頻數遺尿不禁

或曰。小便頻數遺尿不禁。有火有虛。有分別乎。余曰。有溺尿時。玉莖內疼痛。尿一點一滴而出。兼之色紅。乃是火症。若高年人。或虛弱人。尿長而痛。其色清白。乃屬氣虛。溺孔開張。尿流而不知。名曰遺尿。不禁者。尿欲出而人禁止不溺。尿仍自出。此專指小便自病而言。若半身不遂。兼小便頻數遺尿不禁。絕無玉莖

醫林改錯

下卷

九

疼痛之苦。此是氣虛不固提也。

辨語言蹇澁非痰火

或曰。說話不真。古名語言蹇澁。前人論舌之本有痰有火。此理想來不錯。余曰。非痰火也。舌中原有兩管。內通腦氣。即氣管也。以容氣之往來。使舌動轉能言。今半身無氣。已不能動。舌亦半邊無氣。亦不能全動。故說話不真。試看小兒氣不足不能行走時。高年人氣衰時。說話俱不真。是其証也。

辨口噤咬牙

或曰。既無風火如何口噤。咬牙。余曰。口噤自是口噤。咬牙自是咬牙。古人以口噤咬牙混成一症。何臨症粗心之甚。口噤是虛。咬牙是實。口噤是牙緊不開。咬牙是叩齒有聲。在傷寒瘟疫雜症婦科。有虛症口噤者。有實症咬牙者。獨半身不遂。有口噤絕無咬牙。亦有口噤太甚。下牙裡收。其聲如銼。似咬牙實非咬牙。亦虛症也。如無半身不遂。又無他症相兼。忽然口噤不開。乃風邪阻滯經絡。氣不上達之所致。用疎通經絡之劑而即愈。

醫林改錯

下卷

十

記未病前之形狀

或曰。元氣既虧之後。未得半身不遂以前。有虛症可查乎。余生平治之最。知之最悉。每治此症。愈後問及未病以前之形狀。有云。偶爾一陣頭暈者。有頭無故一陣發沉者。有耳內無故一陣風響者。有耳內無故一陣蟬鳴者。有下眼皮長跳動者。有一支眼漸漸小者。有無故一陣眼睛發直者。有眼前長見旋風者。有長向鼻中攢冷氣者。有上嘴唇一陣跳動者。有上下嘴唇相湊發緊者。有睡臥口流涎沫者。有平素聰

明忽然無記性者。有忽然說話少頭無尾語無倫次者。有無故一陣氣喘者。有一手長戰者。有兩手長戰者。有手無名指每日有一時屈而不伸者。有手大指無故自動者。有胳膊無故發麻者。有腿無故發麻者。有肌肉無故跳動者。有手指甲縫一陣陣出冷氣者。有脚指甲縫一陣陣出冷氣者。有兩腿膝縫出冷氣者。有脚孤拐骨一陣發軟向外稜倒者。有腿無故抽筋者。有脚指無故抽筋者。有行走兩腿如拌蒜者。有心口一陣氣堵者。有心口一陣發空。氣不接者。有心

醫林改錯

下卷

十一

口一陣發忙者。有頭項無故一陣發直者。有睡臥自覺身子沉者。皆是元氣漸虧之症。因不痛不癢。無寒無熱。無碍飲食起居。人最易於疎忽。論小兒半身不遂。

或曰。小兒亦有半身不遂者。余曰。小兒自周歲至童年。皆有。突然患此症者。多半由傷寒瘟疫痘疹吐泄等症。病後元氣漸虧。面色青白。漸漸手足不動。甚至手足筋攣。周身如泥塑。皆是氣不達於四肢。古人以風治。是於此症閱歷無多。

癱瘓論

或曰元氣歸併左右病半身不遂有歸併上下之症乎余曰元氣虧五成下剩五成迴流一身必見氣虧諸態若忽然歸併於上半身不能行於下則病兩腿癱瘓奈古人論癱瘓之源因足陽明胃經濕熱上蒸於肺肺熱葉焦皮毛焦悴發為癱瘓蓋用清涼攻下之方余論以清涼攻下之藥治濕熱腿疼痺症則可治癱瘓則不相宜豈知痺症疼痛日久能令腿癱瘓後仍然腿疼癱瘓是忽然兩腿不動始終無疼痛之

醫林改錯

下卷

三

苦倘標本不清虛實混淆豈不遺禍後人

補陽還五湯

此方治半身不遂口眼歪斜語言蹇澀口角流涎大便乾燥小便頻數遺尿不禁

黃芪^{四兩} 歸尾^{二錢} 赤芍^{一錢} 地龍^{一錢}
川芎^{一錢} 桃仁^{一錢} 紅花^{一錢} 水煎服

初得半身不遂依本方加防風一錢服四五劑後去之如患者先有入耳之言畏懼黃芪只得遷就人情用一二兩以後漸加至四兩至微効時日服兩劑豈不是八兩兩劑服五六日每日仍服一劑如已病三

醫林改錯

下卷

三

兩個月前醫遵古方用寒涼藥過多加附子四五錢如用散風藥過多加黨參四五錢若未服則不必加此法雖良善之方然病久氣太虧肩膀脫落二三指縫胳膊曲而撥不直脚孤拐骨向外倒啞不能言一字皆不能愈之症雖不能愈常服可保病不加重若服此方愈後藥不可斷或隔三五日吃一付或七八日吃一付不吃恐將來得氣厥之症方內黃芪不論何處所產藥力總是一樣皆可用

方歌 補陽還五未芍芎 歸尾通經佐地龍 四兩黃芪為主藥 血中凝滯用桃仁

瘟毒吐瀉轉筋說

上吐下瀉轉筋一症。古人立名曰霍亂。宋朝太醫院立方名曰局方。立藿香正氣散以治之。以邪氣傷正氣之病。反用攻發正氣之藥。豈不愧太醫之名。至我朝道光元年。歲次辛巳。瘟毒流行。病吐瀉轉筋者數省。京都尤甚。傷人過多。貧不能葬埋者。國家發帑施棺。月餘之間。費數十萬金。彼時業醫者。有用參朮薑附見効者。便言陰寒。有用芩連梔柏見効者。則云毒火。余曰非也。不分男婦者。少衆人同病。乃瘟毒也。或

醫林改錯

下卷

古

日。既是瘟毒。薑附熱。芩連涼。皆有見効者何也。余曰。芩連効在初病人壯毒勝時。薑附効在毒敗人弱氣衰時。又日有芩連薑附服之不効。而反有害者何也。余曰。試看針刺而愈者。所流盡是黑紫血。豈不是瘟毒燒煉。瘟毒自口鼻入氣管。由氣管達於血管。將氣血凝結。壅塞津門。水不得出。故上吐下瀉。初得用針刺其胳膊肘裡灣處血管。流紫黑血。毒隨血出而愈。或日所刺是何穴。請明白指示。余曰。余雖善針。不必論是穴名。日尺澤。人氣管周身貫通。血管周身亦貫

通尺澤左右四五根血管。刺之皆出血。皆可愈。尺澤上下刺之亦可愈。總之用針所刺而愈。皆風火氣有餘之症。不足之症愈針愈壞。此針灸家隱諱而不肯言也。倉卒之時用針刺。取其捷便也。一面針刺。一面以解毒活血湯治之。活其血。解其毒。未有一藥而愈者。但此症得之最速。傷元氣最快。一半日可傷生。若吐瀉一兩時後。或半日後。一見腿抽。便是腿上氣少。一見胳膊抽。便是胳膊上氣少。如見眼胞塌陷。汗出如水。肢冷如水。謾言涼藥有害。即余所立解毒活血湯。亦有過無功。此時無論舌乾口燥。大渴飲冷。一時飲水數碗。放心用薑附回陽湯。一付可奪命。此法非淺醫所能知也。

醫林改錯

下卷

古

解毒活血湯

連翹	二錢	葛根	二錢	柴胡	三錢	當歸	二錢
生地	五錢	赤芍	三錢	桃仁	八錢	紅花	五錢
只壳	一錢	甘草	二錢	水煎服			

方歌解毒活血連翹桃。紅花歸壳葛赤芍。柴胡甘草同生地。吐瀉良方用水熬。

此方謂初得吐瀉而言若見汗多肢冷眼塌不可用急救回陽湯

若吐瀉一見轉筋身涼汗多非此方不可莫畏病人大渴飲冷不敢用

党參

八錢

附子

六錢

乾薑

四錢

白朮

四錢

甘草

三錢

桃仁

二錢

紅花

二錢

方歌急救回陽參附薑温中木草桃紅方見真胆雄能奪命雖有桃紅氣無傷

解毒活血湯與急救回陽湯兩方界限分清未有不

應手而愈者慎之慎之

論抽風不是風

夫抽風一症今人治之不效者非今人錯治乃古方悞人古人不止論病立方悞人立病名曰抽風風之一字尤其悞人又因此症多半由傷寒瘟病或痘疹吐泄等症病久而抽則名曰慢驚風慢驚風三字相連立名更為可笑不但文義不通亦未細察病源若真是風風之中人必由皮膚入經絡亦必有由表入裏之症可查既查無外感之表症古人何得著書立方總言是風其所以言風者因見其病發作之時項

醫林改錯

下卷

七

背反張兩目天吊口噤不開口流涎沫咽喉痰聲昏沉不省人事以為中風無疑殊不知項背反張四肢抽搐手足握固乃氣虛不固肢體也兩目天吊口噤不開乃氣虛不止升也口流涎沫乃氣虛不固津液也咽喉往來痰聲非痰也乃氣虛不歸原也如不明此理試看高年人久病壽終時或項強身重或露睛天吊或牙緊流涎或痰聲拽鋸或冷汗淋漓一派氣脫之症明明顯露以抽風之兩目天吊口噤流涎痰聲拽鋸互相參看則抽風之症氣虛無疑元氣既虛

必不能達於血管。血管無氣，必停留而痰以一氣虛血瘀之症，反用散風清火之方，安得不錯。服散風藥，無風服之則散氣，服清火藥，無火服之則血疑。再服攻伐剋消之方，氣散血亡，豈能望生。溯本窮源，非死於醫，乃死於著書者之手。每見業小兒科閱歷多者，絕不悞人，因抽風古方不效，見抽風則棄而不治，亦有高手，看小兒現在之症，知將來必抽風，雖無方調治，亦必告知病家，此病恐將來抽風，何以知其將來必抽風。凡將欲抽風之前，必先見抽風之症，如見頂

下卷

六

門下陷，昏睡露睛，口中搯舌，不能啼哭，哭無眼淚，鼻孔煽動，咽喉痰聲，頭低不抬，口噤無聲，四肢冰冷，口吐白沫，胸高如碗，喘急氣促，面色青白，汗出如水，不能裏乳，大便綠色，腹內空鳴，下洩上嗽，肌肉跳動，俱是抽風之兆。前二十症不必全見，但見一二症，則知將來必抽，其中有可治者，有不可治者。並所用之方，皆開列於後。若露睛天吊，不食不哭，痰鳴氣喘，病雖沉重，乃可治之症。若天蓮灰色，腎子上縮，或脈微細，或脈全無，外形雖輕，乃不治之症。

可保立甦湯

此方治小兒因傷寒瘟疫或痘疹吐瀉等症，病久氣虛，四肢抽搐，項背後反，兩目天吊，口流涎沫，昏沉不醒，人事皆効。

黃芪二兩五錢 党參三錢 白朮二錢 甘草二錢

當歸二錢 白芍二錢 棗仁三錢 山萸二錢

枸杞子二錢 故紙二錢 核桃一個連皮 水煎服

此方分兩指四歲小兒而言，若兩歲分兩可以減半，若一歲分兩可用三分之一，若兩三個月分兩可用

醫林改錯

下卷

九

四分之一，又不必拘于付數，余治此症，一日之間，常有兩三付者，服至不抽，必告知病家，不可因不抽遂不服藥，必多服數付，氣足方妥。

方歌：可保立甦故紙棗木歸芍藥參芪草山萸枸杞水煎服，一個核桃帶壳搗。

論痘非胎毒

夫小兒痘疹自漢至今著書立方者不可勝數。大抵不過分順險逆。辨別輕重。死生並無一人說明痘之本源。所以後人有遵保元湯。用黃芪人參者。有遵歸宗湯。用大黃石膏者。有遵解毒湯。用犀角黃連者。痘本一體。用藥竟不相同。遇順險之痘。查小兒壯弱。分別補泄清涼。用之皆可望生。惟一見逆症。遂無方調治。即云天數當然。此不知痘之本源故也。或曰古人若不知痘之本源。如何見逆痘便知幾天死。余曰此

醫林改錯

下卷

三

非古人知痘之本源也。因看痘多。知某日見苗某日何形。某日何色。某日何症。治之不效。至某日必死。古人知逆痘幾天死者。蓋由此也。如知痘之本源。豈無方調治。或曰如君所言。痘之逆症有救乎。余曰痘之險症。隨手而愈。不足論。至於逆症。皆有本源。辨明本源。豈不可救。如余所治。悶痘不出。周身攢簇。細密如蚕壳。平板如蛇皮。不熱即出。見点紫黑。周身細密無縫。紫白灰色相間。蒙頭銷口。銷項托腮。皮肉不腫。通身水泡。不起脹行漿。不化膿結痂。見点后抽風不止。

九竅流血鮮紅。咳嗽聲啞。飲水即噎。六七天作癢。振破無血。七八日泄肚胃口不開。至危之時。頭不能抬。足歪不正。兩日天吊。項背後反等逆症。初見之時。辨明虛實。皆可望生。明此理者。知余補前人之未及。救

今人之疑難。不明此理者。妄加評論。以余言為狂妄。而不知非狂也。知痘之本源也。不似諸家議論。出痘總是胎毒。諸書又曰。自漢以前無出痘者。既云胎毒。漢以前人獨非父母所生。此論最為可笑。若依古人之論。有謂胎毒藏於臟腑。而何以未出痘以前。臟腑

醫林改錯

下卷

三

安然無病。有謂胎毒藏於肌肉。而何以未出痘以前。皮膚更不生瘡。又有謂胎毒藏於骨髓。或因驚恐跌仆。或因傷食感冒。觸動其毒。發為天花。信如斯言。因驚恐跌仆傷食感冒觸動而發。則是自不小心。伏思出花正盛時。非止一人出花。少則一方。多則數省。莫非數省之人。同時皆不小心。此論更為無理。再見世上種痘之醫。所種之痘。無論多少。無一不順。若是胎毒。毒必有輕重。毒重者痘必險。何以能無一不順。由此思之。如何胎毒二字。牢不可破。殊不知痘非胎毒。

乃胞胎內血中之濁氣也。見在母腹。始因一點真精。凝結成胎。以後生長臟腑肢體。全賴母血而成。胞胎內血中濁氣。降生後仍藏榮血之中。遇天行觸濁氣之瘟疫。由口鼻而入氣管。由氣管達於血管。將血中濁氣。逐之自皮膚而出。色紅似花。故名天花。形圓如豆。故名日痘。總之受瘟疫輕。瘟毒隨花而出。出花必順。受瘟疫重。瘟毒在內逗遛。不能隨花而出。出花必險。受瘟疫至重。瘟毒在內燒煉其血。血受燒煉。其血必凝。血凝色必紫。血死色必黑。痘之紫黑。是其証也。

醫林改錯

下卷

三

死血阻塞道路。瘟疫之毒。外不得由皮膚而出。必內攻臟腑。臟腑受毒。火煎熬。隨變生各臟逆症。正對痘科書中所言某經逆痘。不知非某經逆痘也。乃某經所受之瘟毒也。痘之順逆。在受瘟疫之輕重。治痘之緊要。全在除瘟毒之方法。瘟毒不除。花雖少而必死。瘟毒若除。花雖多不致傷生。痘科書中。但論治胎毒。而不知治瘟毒。縱知治瘟毒。而不知瘟毒巢穴在血。若辨明瘟毒輕重。血之通滯。氣之虛實。立救逆痘於反掌之間。此所謂知其要者。一言而終耳。

論痘漿不是血化

痘出時是紅色。五六天後忽變清漿。次變白漿。次變混漿。次變黃膿。終而結痂。古人謂痘漿總是血化。若是血化。紅血必能變白色。今請以血一盞試之。或以礬清。或以火熬。能使之變清水。白漿混漿黃膿乎。痘本血管內血中濁氣。遇天行逐濁氣之瘟疫。自口鼻而入於氣管。達於血管。將血管中濁氣與血。並氣管中津液。逐之自毛孔而出。所以形圓色紅。五六天後。痘中之血。仍退還血管。痘內止存濁氣津液。津液清

醫林改錯

下卷

三

名曰清漿。清漿為瘟毒燒煉。稠而色白。故名白漿。白漿再煉。更稠而混。故名混漿。混漿再煉。稠如瘡膿。故名黃膿。將黃膿煉乾而結痂。痘不行漿。皆因血不退還血管。血不退還血管。皆因血管內有瘟毒燒煉。血凝。阻塞血之道路。若通血管之痰滯。何患漿之不行。論出痘飲水卽瘡

出痘有四五天七八天飲水卽瘡者。古人論毒火壅於咽喉。列於不治之症。總是不明咽喉左右氣門之體質。舌後為喉。卽肺管。喉後為咽。卽胃管。咽前喉後

兩邊凹處有氣管兩根。名左氣門。右氣門。舌根有一白片。其厚如錢。名曰會厭。正蓋肺管。左右氣門上口。人嚥飲食。必以舌尖砥上腭。使會厭將肺管與左右氣門蓋嚴。飲食方可過肺管。左右氣門入后之胃管。試看人吃飯。飲食將入。嚥至喉。未入咽時。或忽然冷笑。氣暴上衝。會厭一開。或一粒米。一滴水。入左右氣門。立刻由鼻噲出。是其証也。今瘟毒燒煉。會厭血凝。不能蓋嚴氣門。故飲水滲入。即噲。食不噲者。因微微小縫。能滲水而食不能入。故不噲。化開會厭中瘀血。

醫林改錯

下卷

三

其噲立止。

論七八天痘瘡作癢

痘瘡作癢者。當先分明皮膚。皮是皮膚。膚是膚。皮膚不分。如何能明痘瘡作癢之本源。如人湯燙火燒。隨起一泡。其薄如紙。即是膚。膚裏內外厚者是皮。痘至六七天。瘟毒濁氣津液盡歸於皮之外。膚之內。痘窠之中。正氣虛。不能達痘中行。漿化膿結痂。以致瘟毒外不得出。膚內不得入。毒在皮外。膚裏故作癢。醫家遵素問。諸瘡痛癢皆屬於火之句。隨用清涼之品。尅

發生氣。不但作癢不止。胃氣轉傷。有專用補氣者。氣愈補而血愈瘀。血瘀氣更不能外達於皮膚。此時用補氣破血之劑。通開血道。氣直達於皮膚。未有一藥而癢即止者。

通經逐瘀湯

此方無論痘形攢簇。蒙頭覆釜。周身細碎。成片。或夾疹。夾癩。浮衣水泡。其色或紫或暗或黑。其症或乾嘔。煩燥晝夜不眠。逆形逆症。皆是瘀血凝滯於血管。並宜用此方治之。其方中藥性不大寒。大熱。不大攻。大

醫林改錯

下卷

三

下真是良方也。

桃仁

紅花

赤芍

山甲

皂刺

連翹

地龍

柴胡

麝香

水煎服

大便乾燥加大黃

五六日後見清漿白漿。將麝香去之。加黃芪五錢。將

山甲皂刺減半。至七八日後。桃仁紅花亦減半。黃芪

可用八錢。此方指四五歲而言。若一二歲分兩可減

半。若八九歲分兩可加一半。

方歌。通經甲皂麝香龍。逐瘀赤芍桃與紅。連翹柴胡

毒可解。便乾微用大黃攻。

會厭逐痰湯

此方治痘五六天後飲水即噎。

桃仁五錢 紅花五錢 甘草三錢 桔梗三錢

生地四錢 當歸二錢 玄參一錢 柴胡一錢

只壳二錢 赤芍二錢 水煎服

此方指五六天後噎水而言。若痘後抽風兼飲水即噎者，乃氣虛不能使會厭蓋嚴氣管，照抽風方治之。方歌會厭逐痰是病源。桃紅甘桔地歸玄。柴胡只壳。

醫林改錯

下卷

三

赤芍藥水噎血凝立可痊。

止瀉調中湯

治痘六七日後泄瀉不止，或十餘日後泄瀉皆治之。

黃芪八錢 黨參三錢 甘草二錢 白朮二錢

當歸二錢 白芍二錢 川芎一錢 紅花三錢

附子一錢 良姜五分 官桂五分 水煎服

此方指痘六七天後泄瀉而言。痘後抽風兼泄瀉者亦效。不是初出痘泄瀉之方。

方歌止瀉調中參草芪。朮歸芍藥芎紅隨。附子良姜。

桂少用。氣虛泄瀉總相宜。

保元化滯湯

治痘五六日後痢疾，或白或紅，或紅白相雜皆治。

黃芪二兩 滑石二兩 晚服加白沙糖五錢

此方乃余之心法。不獨治小兒痘症痢疾，大人初痢久痢皆有奇效。然大人初痢滑石用一兩五錢，白糖一兩，不必用黃芪。久痢加黃芪。滑石仍用一兩五錢。

五錢

方歌保元化滯補攻方。一兩黃芪煎作湯。為末滑石。

醫林改錯

下卷

三

須一兩沖服痢止氣無傷。

助陽止癢湯

治痘六七日後作癢不止，抓破無血，兼治失音聲啞。

黃芪二兩 桃仁二錢 紅花二錢 皂刺一錢

赤芍一錢 山甲一錢

此方治痘後六七日作癢，甚者抓破無血，不是治初出痘一二日作癢之方。

方歌助陽止癢芪桃紅。皂刺赤芍山甲同。聲啞失音同一治。表虛因裏氣不行。

足衛和榮湯

治痘後抽風、兩眼天吊、項背反張、口噤不開口流涎、
涎昏沉不醒人事、周身潰爛、膿水直流、皆治之。

黃芪 二兩 甘草 二錢 白朮 二錢 芫參 三錢
白芍 二錢 當歸 一錢 棗仁 二錢 桃仁 一錢五分
紅花 一錢五分 水煎服

此方專治痘後抽風、及周身潰爛、若因傷寒痘疫癘
症、疾久氣虛抽風、抽風門另有專方。

方歌：足衛和榮芪草朮參芍歸棗桃紅扶抽風風字

醫林改錯

下卷

三

前人誤服此還陽命可甦。

少腹逐瘀湯

此方治少腹積塊疼痛、或有積塊不疼痛、或疼痛而
無積塊、或少腹脹滿、或經血見時先腰痠少腹脹、或
經血一月見三五次、接連不斷、斷而又來、其色或紫
或黑或塊、或崩漏兼少腹疼痛、或粉紅兼白帶、皆能
治之、効不可盡述。

更出奇者、此方種子如神、每經初見之日吃起、一連
吃五付、不過四月必存胎、必須男女年歲與月合成
陽數方生子、如男女兩人、一單歲、一雙歲、必擇雙月

醫林改錯

下卷

二十九

方生子、如兩單歲、或兩雙歲、必擇單月方生子、擇月
不可以初一為定準、以交節為定準、要知偶有經過
二十日結胎者、切記準日期、倘月分不對生女、莫謂
余方不驗、余用此方効不可以指屈。

道光癸未年、直隸布政司素納公、年六十、因無子甚
憂、商之于余、余曰：此易事耳、至六月令其如君服此
方、每月五付、至九月懷孕、至次年甲申六月二十二
日生少君、今七歲矣、此方更有險而不險之妙、孕婦
體壯氣足、飲食不減、並無傷損、三個月前後無故小

產常有連傷數胎者。醫書頗多。仍然議論滋陰養血。健脾胃。安胎保胎。効方甚少。不知子宮內。先有瘀血。占其地。胎至三月。再長其內無容身之地。胎病靠擠。血不能入胎胞。從傍流而下。故先見血。血既不入胎胞。胎無血養。故小產。如曾經三月前後小產。或連傷三五胎。今又懷胎。至兩個月前。將此方服三五付。或七八付。將子宮內瘀血化淨。小兒身長有容身之地。斷不致再小產。若已經小產。將此方服三五付。以後存胎。可保無事。此方去疾種子安胎。盡善盡美。

醫林改錯

下卷

三

真良善方也。

小茴香炒

乾薑炒

元胡錢

沒藥炒

當歸錢

川芎錢

官桂錢

赤芍錢

蒲黃炒

靈脂炒

水煎服

方歌少腹茴香與炒薑。元胡靈脂沒芍當。蒲黃官桂

赤芍藥種子安胎第一方。

懷胎說兼記難產胎衣不下方。

古人論胎在子宮分經輪養。一月肝經養。二月胆經

養。三月心經養。四月三焦養。五月脾經養。六月胃經

養。七月肺經養。八月大腸養。九月腎經養。若依其論。

胎至兩月。自當肝經交代。胆經接班。此論實在無情。

無理。兒在母腹。全賴母血而成。一言可了。何必圖取

虛名。故作欺人之論。又如子啼門云。兒在母腹。口含

臍帶。痞痞。吮血養生。請問初結胎無口時。又以何物

吮血養生。既不明白。何不歸而謀諸婦。訪問收生婆。

訪問的確。再下筆。斷不致遺笑後人。豈知結胎一月

之內。並無胎衣。一月後兩月內。始生胎衣。胎衣既成。

兒體已定。胎衣分兩段。一段厚是雙層。其內盛血。一

醫林改錯

下卷

三

段薄是單層。其內存胎。厚薄之間。夾縫中長一管。名

曰臍帶。下連兒臍。母血入胎衣內。盛血處轉入臍帶。

長臍帶肢體。周身齊長。並非先長某臟。後長某腑。一

月小產者。並無胎衣。兩月小產者。有胎衣。形如秤錘。

上小下大。不過三指長短。三月小產者。耳目口鼻俱

備。惟手足有拳不分指。至月足臨生時。兒燈破胎衣

頭轉向下而生。胎衣隨胎而下。胎衣上之血。隨胎衣

而下。此其長也。最關緊要。是難產。古人原有開骨散。

服之有効者。有不効者。其方總論活血開骨。不重用

力勞乏。余每用開骨散。重加黃芪。不過一時。胎即下。至胎衣不下。古人原有沒竭散。始而用之。有效。有不效。繼而加倍用之。胎衣立下。藥味要緊。分兩更要緊。

古開骨散 治難產

當歸 一兩 川芎 五錢 龜板 八錢 血餘 一團 燒灰

加黃芪 四兩 水煎服

古沒竭散 治胎衣不下

沒藥 三錢 血竭 三錢 為末滾水調服

黃芪桃紅湯

醫林改錯 下卷

三

治產後抽風。兩日天吊。口角流涎。項背反張。昏沉不省人事。

黃芪 八兩 桃仁 三錢 紅花 二錢 水煎服

婦科以濟陰綱目為最。醫宗金鑑擇其方論纂為歌訣。令人易讀易記。惟抽風一症方不效。余已補之。

古下瘀血湯

治血鼓。何以知是血鼓。腹皮上有青筋。是血鼓腹大。

桃仁 八錢 大黃 五分 蟬虫 三個 甘遂 五分 為末 沖服或八分

水煎服 與前隔下逐瘀湯輪流服之方妥

抽葫芦酒

治腹大周身腫

白抽乾葫芦焙為末。黃酒調服三錢。若葫芦大。以黃酒入內煮一時。服酒頗效。取其自抽之義。

蜜葱猪胆湯

治通身腫。肚腹不大。

猪胆 一個 白蜜 四兩 葱頭 四個 黃酒 半觔 取汁

用酒煎葱兩三沸。將酒沖入蜜胆內服之。立效。

蜎蛸皮散

醫林改錯 下卷

三

治遺精。夢而後遺。不夢而遺。虛實皆效。

蜎蛸皮 一個 瓦上焙干為末。黃酒調服。實難吃。

小茴香酒

治白濁。俗名騙白。又名下淋。精道受風。湯藥全不效。

小茴香 兩 為粗末。黃酒半觔。燒滾。沖停一刻。去渣服酒。

痺症有瘀血說

凡肩痛臂痛。腰疼腿疼。或周身疼痛。總名曰痺症。明知有濕熱。用利濕

知受風寒。用溫熱發散藥不愈。明知有濕熱。用利濕

降火藥無功。久而肌肉消瘦。議論陰虧。隨用滋陰藥

按此酒法
黃芪生用
林不白而
林古方有
林情飲五
林法法

又不效。至此便云。病在皮脈易于為功。病在筋骨實難見效。因不思風寒濕熱入皮膚。何處作痛。入于氣管痛必流走。入于血管痛不移處。如論虛弱。是因病而致虛。非因虛而致病。總滋陰。外受之邪歸于何處。總逐風寒去濕熱。已凝之血。更不能活。如水遇風寒凝結成冰。冰成風寒已散。明此義。治痺症何難。古方頗多。如古方治之不效用。

身痛逐瘀湯

秦芫 一錢 川芎 二錢 桃仁 三錢 紅花 三錢

醫林改錯

下卷

三

甘草 二錢 羌活 一錢 沒藥 二錢 當歸 三錢

靈脂 二錢 香附 一錢 牛膝 三錢 地龍 二錢

若微熱加蒼朮黃柏若虛弱量加黃芪一二兩

方歌身痛逐瘀膝地龍羌秦香附草歸芎黃芪蒼柏

量加減要緊五靈桃沒紅

硝砂丸

治癩瘰鼠瘻滿項滿胸破爛流膿無不應手取效

硝砂 二錢 皂角子 一百 乾醋 一觔 前二味入

入砂鍋內熬之將乾將鍋底硝砂拌于皂子上再煎

自此下

醫林改錯 卷下

以微火焙乾或以炉台上炕之。每晚嚼五粒。或八粒。一日早晚或吃二次。以滾白水送。然乾則皂子過硬。為末服亦可。方內硝砂有紅白二種。余所用是紅色者。未知白色硝砂功效若何。硝砂紅色者出庫車北山洞中。夏令從洞中出火。人不能近前。冬令同民赤身近洞取之。本草言西域鹽滷熬成者快也。

癩狂夢醒湯

癩狂一症。哭笑不休。詈罵歌唱。不避親疎。許多惡態。乃氣血凝滯。腦氣與臟腑氣不接。如同作夢一樣。

醫林改錯

下卷

三

桃仁 八錢 柴胡 三錢 香附 二錢 木通 三錢

赤芍 三錢 半夏 二錢 腹皮 三錢 青皮 二錢

陳皮 三錢 桑皮 三錢 蘇子 四錢 甘草 五錢 水煎服

方歌癩狂夢醒桃仁功香附青柴半木通陳腹赤桑

蘇子炒倍加甘草緩其中

龍馬自來丹

馬前子 八兩 地龍 八條 香油 一觔

將香油入鍋內熬滾。入馬前子燻之。待馬前子微有

響爆之聲。拿一個用刀切兩半。看其內以紫紅色為

三九七

度研為細末，再入前地龍末，和均，麩糊為丸，綠豆大，每付吃三四分，臨臥服，鹽水送，若五六歲小兒服二分，紅糖水送，如不為丸，麩子亦可服，如吃齋人，去地龍亦可。

治癩症俗名羊羔風，每晚先服黃芪赤風湯一付，臨臥服丸藥一付，吃一月後不必服湯藥，淨吃丸藥，久而自愈，愈後將丸藥再吃一二年，可保除根，病源記前腦髓說中。

黃芪赤風湯 黃芪^{三兩} 赤芍^{一錢} 防風^{一錢} 水煎服 小兒減半

醫林改錯 下卷 三

治癱腿多用一分，服後以腿自動為準，不可再多，如治諸瘡諸病，或因病虛弱，服之皆效。

無病服之，不生疾病，總書數篇，不能言盡其妙。此方治諸病皆效者，能使周身之氣通而不滯，血活而不瘀，氣通血活，何患疾病不除。

黃芪防風湯

治脫肛不論十年八年皆有奇効。

黃芪^{四兩} 防風^{一錢} 小兒減半 水煎服

黃芪甘草湯

治老年人溺尿，玉莖痛如刀割，不論年月深久立效。黃芪^{四兩} 甘草^{八錢} 水煎服，病重一日兩付。

木耳散 治潰爛諸瘡，効不可言，不可輕視此方。

木耳^{一兩} 焙 白沙糖^{一兩} 和均 以溫水浸如糊，敷之。

此方與^喇胡芦^皮治^{遺精}義同，明此義方可以學醫。

玉龍膏即勝玉膏 治跌打損傷，貼之頗効。

香油^{一兩} 白蘇 升麻 當歸

川芎 連翹 銀花 甲片

川烏 象皮^{各四錢} 乳香^{一錢半} 沒藥^{一錢半}

醫林改錯 下卷 三

輕粉^{三錢} 冰片^{三分} 麝香^{三分} 白占^{二兩}

將前九味藥入油內，煆枯色，去渣，入官粉三盒，離火，再入乳沒粉片，麝攪均，再將白占投入于內，攤貼之。此膏去官粉即糕子藥，貼破爛諸瘡，其効如神。木耳散玉龍膏潰爛諸瘡，可靠之良方也，不可輕視。

辦方效經錯之源論血化爲汗之誤

胞姪作礪來京見臟腑圖記問曰伯父所繪之圖經絡是氣管皆本於衛總管由衛總管散佈周身是周身經絡通連並非各臟腑長兩經姪思古人若不明經絡何以張仲景著傷寒按足六經之現症立一百一十三方分三百九十七法其方效者頗多姪不解其理余曰爾看其首篇細心研究便知其方效論錯之理如首篇論足太陽膀胱經爲寒邪所傷則令人頭疼身痛項強發熱惡寒乾嘔無汗用麻黃湯治之

醫改錯

卷下

三

若諸症如前而有汗是傷風用桂枝湯治之所論是足太陽經足太陽專通兩足而不通兩手其論傳經傳足六經不傳手六經爾看初得傷寒頭疼身痛項強發熱惡寒未有兩胳膊兩手不疼痛發熱惡寒者用麻黃湯亦未有周身皆愈而獨不愈兩胳膊兩手者豈不是方雖效而論經絡實錯之明証若仲景以前有人親見臟腑著明經絡貫通仲景著傷寒必言外感寒邪入周身之經絡用麻黃湯發散周身之寒邪一言可了論有汗是傷風以桂枝湯治之以桂枝

白芍甘草三味然從未見治愈一人桂枝湯所以不見效者因頭疼身痛發熱有汗非傷風症也乃吳又可所論之瘟疫也又問寒邪在表自當見頭疼身痛發熱惡寒無汗之表症初得傷寒尚未傳裏如何即有作嘔之裏症仲景著論王叔和等數十人註釋並未說明表症作嘔之所以然姪實不能明白求伯父

明白指示余始看爾不過有讀書之志而無業醫之才今據爾此問尙有思路將來不致粗心輕忽人命爾問寒邪在表如何有作嘔之裏症余詳細告汝寒

醫體改錯

卷下

三

邪始入毛孔由毛孔入皮膚由皮膚入孫絡由孫絡入陽絡由陽絡入經由經入衛總管由衛總管橫行入心由心上行入左右氣管由左右氣管上攻左右氣門故作嘔此表症所以作嘔之本源也用麻黃湯服之入胃其藥汁由津門流出入津管過肝入脾中之瓏管從出水道滲出沁入膀胱爲尿其藥之氣卽藥之性由津管達衛總管由衛總管達經由經達絡由絡達孫絡由孫絡達皮膚由皮膚達毛孔將寒邪逐之自毛孔而出故發汗邪隨汗出汗出邪散故嘔

即止。此周身經絡內外貫通，用麻黃湯發散表邪，隨汗而出之次第也。又問仲景論目痛鼻乾不得眠，是足陽明胃經之表症，以葛根湯治之。其方內有葛根，仍有麻黃，此理不甚明白。余曰：寒邪由表入經絡，止氣將寒邪化而為熱，故名曰邪熱。邪熱上攻頭頂，腦為邪熱所擾，故不得眠。目系通于腦，邪熱由腦入目，故目痛。鼻通于腦，邪熱由腦入鼻，故鼻乾。明是邪熱上攻之火症，並非足陽明胃經之表寒。用葛根而愈者，莫謂葛根是溫散之品，葛根乃清散之藥也。其方

醫林改錯

卷下

四

內用麻黃者，發散在表未化之寒邪也。此又是方效經絡錯之明証。又問仲景論胸脇痛、耳聾、口苦、寒熱往來而嘔，其症在半表半裏，是足少陽膽經之症。用小柴胡湯治之，其方神效。姪思此症若不在胆經，其方又神效。若在胆經，胆又居膈膜之下，其痛又在胸脇。此一段姪又不明白。余曰：爾看臟腑圖，膈膜以上之血府便明白。邪熱入於血府，攻擊其血，故胸脇作痛。邪向血內攻，血向外抗拒，一攻一拒，故寒熱往來。熱灼左右氣門，氣上下不通，故嘔而口苦。邪熱上攻

故耳聾目眩。柴胡能解血府之熱，熱解汗自出，邪隨汗解，故效甚速。此亦是方效論經絡之明証。至傳變多端，總不外表裏虛實。爾若明傷寒，須看吳又可之瘟疫。若見書少，必有偏寒偏熱之弊。昨晚爾當客問古人言汗在皮膚是血，發於皮膚外是汗。言汗即血化，此理爾不解。彼時不告汝者，非謂爾當客多言。因客粗知醫，並非名手，故不當客告汝。汗即血化，此丹溪朱震亨之論。張景岳雖議駁其非，究竟不能指實出汗之本源。古人立論之錯，錯在不知人氣血是兩

醫林改錯

卷下

四

管。氣管通皮膚有孔竅，故發汗。血管通皮膚無孔竅，故不發汗。何以知血管通皮膚無孔竅？爾看生瘡破流黃水者，其毒由氣管而來。每日常流黃水，其皮膚不紅。瘡毒若在血管初起，皮膚必紅。必待皮膚潰爛，所流必是膿血。爾在看瘟疫發痧，出疹小兒出痘色雖紅而不流血，豈不是血管通皮膚無孔竅之明証乎？姪作礪來京，因閑談問余，彼時是書業已刻成，故書於卷末以記之。

閩陳修園著

醫酉三字經

南雅堂藏板

目錄

卷一

源流

中風

虛癆

咳嗽

瘧疾

痢疾

心痛

腹痛

胸痺

隔食

反胃

氣喘

血症

水腫

脹滿

卷二

三字經

目錄

蠱脹

暑症

泄瀉

眩暈

嘔吐

癩

狂

癩

五淋

癰閉

濁病

遺精

疝氣

痰飲

消渴

傷寒

瘟疫

婦人

小兒

卷三

藥方	卷四	藥方	附錄	陰陽	識一字便可為醫說	臟腑	十二官	三字經	目錄	心說	肝說	脾說	肺說	腎說	胃說	膽說	大腸小腸說	三焦說	手心主說	膀胱說	命門說	經絡	四診	望色	聞聲	問證	切脉
----	----	----	----	----	----------	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-----	------	-----	-----	----	----	----	----	----	----

運氣	張飛疇運氣不足說							三字經	目錄																		
----	----------	--	--	--	--	--	--	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

醫學三字經小引

童子入學塾師先授以三字經。欲其便誦也。識途也。學醫之始未定先授何書如大海茫茫錯認半字羅經便入牛鬼蛇神之域余所以有三字經之刻也。前會托名葉天士取時俗所推崇者以投時好。然書中之奧旨悉本聖經經明而專家之伎可廢。謝退谷於注韓書室得繕本。惠書千餘言。屬歸本名。幸有同志。今付梓而從其說。而仍名經。而不以為僭者。採集經文。還之先聖。海內諸君子。可因此一字而共知所遵。且可因此一字而不病余之作。嘉慶九年歲次甲子。入日陳念祖自題於南雅堂。

醫學三字經卷一

閩吳航陳念祖修園著

男元豹道彪古愚全枝
元犀道照靈石

醫學源流第一

醫之始

本岐黃

黃黃帝也。岐岐伯也。君臣問答。以明經絡。藏府運氣。治療之原。所以為醫之祖。雖神農本草

三字經

卷一

經在黃帝之前。而神明用藥之理。仍始於內經也。

靈樞作

素問詳

靈樞九卷。素問九卷。通謂之內經。漢書藝文志載黃帝內經十八篇是也。醫門此書。即業儒之五經也。

難經出

更洋洋

洋洋盛大也。難經八十一章。多闡發內經之旨。以補內經所未言。即間有與內經不合者。

其時去古未遠。別有考據也。○秦越人。號扁鵲。國人也。著難經。

越漢季

張機。字仲景。居南陽。官長沙漢人也。著傷寒雜病論。金匱玉函經。

有南陽

六經辨

內經詳於鍼灸。至伊尹有湯液治病之法。扁鵲倉公因之。仲師出而雜病傷寒。始以方藥為治。其方俱原本於神農黃帝相傳之經方。而集其大成。

聖道彰

三字經

卷一

傷寒著

金匱藏

王肯堂謂傷寒論義理。如神龍出沒。首尾相顧。鱗甲森然。○金匱玉函。示寶貴秘藏之意也。其方非南陽所自造。乃上古聖人相傳之方。所謂經方是也。其藥悉本於神農本草。非此方不能治此病。非此藥不能成此方。所按必效。如桴鼓之相應。

垂方法

立津梁

仲師醫中之聖人也。儒者不能舍至聖之書而求道。醫者豈能外仲師之書以治療。

李唐後

有千金

唐孫思邈。華原人。隱居太白山。著千金方。千金翼方。各三十卷。宋仁宗命高保衡林億等正。後列禁經二卷。今本分為九十三卷。較金匱雖有浮泛偏雜之處。而用意之奇。用藥之巧。亦自成一家。

外臺繼

重醫林

唐王焘著外臺秘要四十卷。分一千一百四門。論宗巢氏方多秘傳。為醫門之類書。

三字經

卷一

後作者

漸浸淫

等而下之。不足觀也。

紅紫色

鄭衛音

間色亂正。靡音忘倦。

迨東垣

重脾胃

金李杲。字明之。號東垣老人。生於世宗大定二十年。金亡。入元。十七年乃終。年七十二。積

本亦題元人。作脾胃論。辨惑論。蘭室秘藏。後人附以諸家。合刻有東垣十書傳世。

温燥行

升清氣

如補中益氣。及升陽散火之法。如蒼朮白朮羌活獨活木香陳皮葛根之類。最喜用之。

雖未醇

亦足貴

人謂東垣用藥。如韓信將兵。多多益善。然賦雜之處。不可不知。惟以脾胃為重。故亦可取。

若河間

專主火

三字經

卷一

金劉完素。字守真。河間人。事蹟俱詳。金史方技傳。主火之說。始自河間。

遵之經

斷自我

原病式十九條。俱本內經至真要大論。多以火立論。而不能參透經旨。如火之平氣曰升。明。火之太過曰赫曦。火之不及曰伏明。其虛實之辨。若冰炭之反也。

一二方

奇而妥

如六一散。防風通聖散之類。皆奇而不離於正也。

丹溪出

罕與儔

元朱震亨。字彥修。號丹溪。金華人。其立方視諸家頗高一格。

陰宜補

陽勿浮

丹溪心法。以補陰為主。謂陽常有餘。陰常不足。諸家俱辨其非。以人得天地之氣。以生。有生之氣。即是陽。氣精血皆其化生也。

雜病法

四字求

三字經

卷一

謂氣血痰鬱是也。一切雜病。只以此四字求之。氣用四君子湯。血用四物湯。痰用二陳湯。鬱用越鞠丸。參差互用。各盡其妙。

若子和

主攻破

張子和。戴人書中所主。多大黃芒硝牽牛羌花大戟甘遂之類。意在驅邪。邪去則正安。不可畏攻。而養病。

中病良

勿太過

子和之法。實。症。自。不。可。廢。然。亦。宜。中。病。而。即。止。若。太。過。則。元。氣。隨。邪。氣。而。俱。散。挽。無。及。矣。

四大家 聲名噪

劉河間。張子和。李東垣。朱丹溪。為金元四大家。張氏醫通之。考核不誤。

必讀書 錯名號

李士材醫宗必讀。四大家論。以張為張仲景。誤也。仲景為醫中之聖。三子豈可與之並論。

明以後 須酌量

三字經 卷一 六

言醫書充棟汗牛。可以博覽之。以廣見識。非謂諸家所著皆善本也。

詳而備 王肯堂

金壇王。字泰。諱肯堂。著症治準繩。雖無所採擇。亦醫林之備考也。

薛氏按 說騎牆

明薛己。號立齋。吳縣人。著薛氏醫按十六種。大抵以四君子。六君子。逍遙散。歸脾湯。六八味丸主治。語多騎牆。

士材說 守其常

李中梓。號士材。國朝人也。著醫宗必讀。士材三書。雖曰淺率。却是守常。初學者所不廢也。

景岳出 著新方

明張介賓。字會卿。號景岳。山陰人。著類經。質疑錄。全書所用之方。不外新方八陣。其實不足。以名方。古聖人明造化之機。探陰陽之本。製出一方。非可以思議及者。若僅以熱地補陰。入參補陽。薑附祛寒。苓連除熱。隨拈幾味。皆可名方。何必定為某方乎。

三字經 卷一 七

石頑續 溫補鄉

張璐。字路玉。號石頑。國朝人也。著醫通。立論多本景岳。以溫補為主。

獻可論 合二張

明寧波趙獻可。號養葵。著醫貫。大旨重於命門。與張石頑張景岳之法相同。

診脈法 瀕湖昂

明李時珍。字東璧。號瀕湖。著本草綱目五十二卷。雜收諸說。及亂神農本經之旨。卷末刻脉學頗佳。今醫多宗之。

數子者

各一長

知其所長。擇而從之。

揆諸古

亦荒唐

理不本於內經。法未熟乎仲景。縱有偶中。亦非。易。矩。矱。

三字經

卷一

八

長沙室

尚徬徨

數子雖曰私淑長沙。升堂有人。而入室者少矣。

惟韻伯

能憲章

慈然柯琴。字韻伯。國朝人。著傷寒論註。論翼。大有功。于仲景。而內經之旨。賴之以彰。

徐尤著

本喻昌

徐彬。號忠可。尤怡。號在涇。二公金匱之注。俱本喻嘉言。致嘉言名昌。江西南昌人。崇禎中。

以選舉入都。卒無所就。遂專務於醫。著尚論篇。主張太過。而醫門法律。頗能闡發金匱之旨。

大作者

推錢塘

張志聰。號隱菴。高世拭。號士宗。俱浙江錢塘人也。國朝康熙間。二公同時學醫。與時不合。遂閉門著書。以為傳道之計。所注內經。本草經。傷寒論。金匱等書。各出手眼。以發前人所未發。為漢後第一書。今醫畏其難。而不敢談。及

三字經

卷一

九

取法上

得慈航

取法乎上。僅得其中。切不可。以醫方集解。本草備要。醫宗必讀。萬病回春。本草綱目。東醫寶鑑。馮氏錦囊。景岳全書。薛氏醫按等書。為捷徑也。今之醫輩。於此書並未寓目。止取數十種庸陋之方。冀圖律中。更不足論也。

中風第二

人百病

首中風

內經云風為百病之長也。昔醫云中臟多滯九竅有昏緩失音耳聾自聾鼻塞便難之症中腑多着四肢中經則口眼喎斜中血脉則半身不遂

驟然得

八方通

中風病驟然昏倒不省人事或痰湧掣搦偏枯等症。八方者謂東西南北東北西北東南西南也。

閉與脫

大不同

三字經

卷一

十

風善行而數變其所以變者亦因人之臟腑寒熱為轉移其人臟腑素有鬱熱則風乘火勢火借風威而風為熱風矣其人臟腑本屬虛寒則風水相遭寒水微骨而風為寒風矣。熱風多見閉症宜疏通為先。寒風多見脫症宜溫補為急。

開邪閉

續命雄

小續命湯風症之雄師也。依六經見症加減治之。高主驅邪。○閉者宜開。或開其表如續命湯是也。或開其裏如三化湯是也。或開其壅滯之痰如稀涎散滌痰湯是也。

回氣脫

參附功

脫者宜固。參附湯固守腎氣。木附湯固守脾氣。芪附湯固守衛氣。歸附湯固守營氣。回其氣。必治其風。若三生飲一兩。加入參一兩。則為標本並治之法。正虛邪盛。必遵此法。

顧其名

思其義

名之曰風。明言八方之風也。名之曰中。明言風自外入也。後人議論穿鑿。俱不可從。

若舍風

非其治

三字經

卷一

十一

既名中風。則不可舍風而別治也。

火氣痰

三子備

劉河間舉五志過極動火而卒中。皆因熱甚。故主乎火。大法用防風通聖散之類。亦有引火歸源。如地黃飲子之類。李東垣以元氣不足而邪湊之。令人卒倒。如風狀。故主乎氣虛。大法補中益氣湯加減。朱丹溪以東南氣溫多濕。有病風者。非風也。由濕生痰。痰生熱。熱生風。故主乎濕。大法以二陳湯加蒼朮白朮竹瀝薑汁之類。

不為中

名為類

中者自外而入於內也。此三者既非外來之風。則不可仍名為中。時賢名為類中風。

合而言

小家伎

虞天民云。古人論中風言其症也。三子論中風言其因也。蓋因氣因濕因火。挾風而作。何嘗有真中類中之分。

瘖喎斜

昏仆地

三字經

卷一

瘖者不能言也。喎斜者。口眼不正也。昏仆地者。不省人事。猝倒於地也。○口開目合。或上視撒手遺尿。身熱汗出如油者。不治。

急救先

柔潤次

柔潤熄風。為治中風之秘法。喻嘉言加味六君子湯。資壽解語湯。甚妙。

填竅方

宗金匱

內經云。邪害空竅。金匱中有侯氏黑散。風引湯。驅風之中。兼填竅。竅空竅滿。則內而邪邪

不能容外。而新風不復入矣。喻嘉言曰。仲景取藥積腹中不下。填竅以熄風。後人不知此義。每欲開竅以出其風。究竟竅空而風愈熾。長此安窮哉。三化湯愈風湯大秦羌湯皆出機要。方中云。是通真子所撰。不知其姓名。然則無名下士。煽亂後人見聞。非所謂一盲引一盲。

虛癆第三

虛癆病

從何起

三字經

卷一

咳以嗽吐血。五心煩熱。目花耳鳴。口爛鼻乾。氣多。食不知味。羸瘦驚悸。夢遺往來寒熱。怠惰嗜臥。疲倦骨蒸。不寐。女子不月。等症。皆成癆病。

七情傷

上損是

痛。謂損其陽。自上而下。一損肺。二損心。三損胃。過於胃。則不可治。其說本於內經。二陽之病。發心脾。有不得隱曲。為女子不月。○按心脾上也。至不得隱曲。女子不月。則上極而下矣。

歸脾湯

二陽旨

即內經二陽之病發心脾之旨也。此方為養神法。六味丸為補精法。高鼓峯並用之。

下損由

房幃通

命鴻謂損其陰自下而上。一損腎。二損肝。三損脾。過於脾則不可治。其說本於內經五藏上藏精也。不可傷。傷則失守而無氣。無氣則死矣。○按精生於五藏而統司於腎。如色慾過度則積傷而下損。至於失守無氣則下極而上矣。

三字經

卷一

十四

傷元陽

虧腎水

腎氣即元陽也。元陽傷為困倦。食少便溏。腰痛。陽痿等症。腎水即元陰也。元陰虧為蒸熱。咳嗽吐血。便血遺精。喉痛。口瘡。齒牙浮動等症。

腎水虧

六味擬

六味地黃丸為補腎水之主方。景岳左歸飲左歸丸亦妙。推之三才湯。八仙長壽丸。都氣丸。天王補心丹。皆可因症互服。

元陽傷

八味使

崔氏腎氣丸。後人名八味地黃丸。立方之意原為煖腎逐水。非補養元陽。明薛立齋及趙養葵始用以溫補命火。時醫遂奉為溫補腎命之主方。景岳右歸飲。右歸丸。皆本諸此。如火未大衰者。以還少丹代之。陽虛極者。宜近效白朮湯。

各醫書

伎止此

苦寒敗胃。及辛熱耗陰。固無論已。即六味歸脾。何嘗非流俗之套法耶。

三字經

卷一

十五

甘藥調

回生理

扁鵲云。鍼藥莫治者。調以甘藥。仲景因之。俞嘉言云。壽命之本。積精自剛。然精生於穀。穀入少則不能生血。血少則不能化精。內經云。精不足者。補之以味。味者。五穀之味也。補以味而節其勞。則精貯漸富。大命不傾。

建中湯

金匱軌

小建中湯。及加黃芪。加人參。加當歸。加白朮。等湯。皆急建。其中氣。俾飲食增。而津液旺。以

至充血生精而復其真陰之不足。但用稼穡作甘之本味而酸辛苦鹹在所不用。蓋舍此別無良法也。○按炙甘草湯即此湯化為潤劑。喻氏清燥湯即此湯化為涼劑。

薯蕷丸

風氣弭

金匱薯蕷丸。自註云。治虛勞諸不足。風氣百疾。

鹿蠹丸

乾血以

金匱大黃蠹蟲丸。自注治五勞七傷。內有乾血。肌膚甲錯。

三字經

卷十

六

二神方

能起死

尤在涇云。風氣不去。則足以賊正氣。而生長不榮。以薯蕷丸為要方。乾血不去。則足以留新血。而灌溉不周。以鹿蠹丸為上劑。今之醫輩。能夢見此二方否。

咳救第四

氣上喘

欬嗽生

內經云。五臟六腑皆令人咳。不獨肺也。然肺為氣之市。諸氣上逆於肺。則喘而咳。是咳喘

不止於肺。而亦不離於肺也。

肺最重

胃非輕

內經雖分五臟諸咳。而所尤重者。在聚於胃。關於肺。六字。蓋胃中水穀之氣。不能如霧上蒸於肺。而轉溉諸臟。只是留積於胃中。隨蒸氣而化為痰。隨寒氣而化為飲。胃中既為痰飲所滯。則輸肺之氣。亦必不清。而為諸咳之患矣。

肺如鐘

撞則鳴

肺為臟腑之華。呼吸之則虛。吸之則滿。只受得本然之正氣。受不得外來之客氣。客氣干之。則喘而咳矣。亦只受得臟腑之清氣。受不得臟腑之病氣。病氣干之。亦喘而咳矣。肺體屬金。譬若鐘然。一外一內。皆所以撞之。使鳴也。

風寒入

外撞鳴

經云。微寒微咳。可見咳嗽多。因於風寒也。風從皮毛而入於肺。寒從背俞而入於肺。皆主乎外也。後注雖言熱言濕言燥。令不自行。亦必假風寒以為之師也。

癆損積

癆傷咳嗽。主乎內也。二者不治。至於咳嗽失音。是金破不鳴矣。

內撞鳴

誰治外

六安行

六安煎雖無深義。却亦平穩。然外感諸症。當辨風熱風燥二症。如冬時先傷非節之暖。復加風寒外遇。以致咳嗽痰結。咽腫身重。自汗脈浮者。風熱也。宜葶藶湯辛潤之劑。切勿辛熱發散。而風燥一症。辨治尤難。蓋燥為秋氣。令不獨行。必假風寒之威。而乃振。效乃發。

三字經

卷一

六

也。內經只言秋傷於濕。何也。以長夏受濕。土鬱蒸之氣。隨秋令。伏於脾胃之間。直待秋深燥令大行。與濕不能相容。至冬而為咳嗽也。此症有肺燥胃濕兩難分。解之勢。唯千金麥門湯。五味子湯。獨得其秘。後人以飲散不分。燥潤雜出。棄之。昧之甚也。

誰治內

虛癆程

宜於虛癆門擇其對症之方。審是房勞傷精。則補精。審是思鬱傷脾。則養神。

挾水氣

小龍平

柯韻伯治咳嗽。不論冬夏。不拘淺深。但是寒嗽。俱用小青龍湯。多效。方中誦風散寒解肌。逐水利肺。煖腎除痰。定喘。懷外。安內。各盡其妙。蓋以肺家有沉寒痼冷。非麻黃大將。不能傷其巢穴。群藥安能奏效也。

兼鬱火

小紫清

寒熱往來咳嗽者。宜去人參。大棗生薑。加乾薑五味治之。

薑細味

古法程

三字經

卷一

九

金匱治痰飲咳嗽。不外小青龍湯。加減。方中諸味皆可去取。唯細辛乾薑五味不肯輕去。即而熱如醉。加大黃以清胃熱。及加石膏杏仁之類。終不去。此三味。學者可不深思其故也。徐忠可論。

長沙論

細而精

金匱痰飲咳嗽。治法宜熟讀之。

瘧疾第五

瘧為病

屬少陽

少陽為半表半裏邪居其界。入與陰爭則寒出與陽爭則熱。爭則病作。息則病止。止後其邪仍據於少陽之經。

寒與熱

若迴翔

寒熱必應期而至

日一發

亦無傷

三字經

卷一

二十

邪淺則一日一作。邪深則二日一作。

三日作

勢猖狂

瘧三日一作。時醫名三陰瘧。流連難愈。

治之法

小柴方

以小柴胡湯為主。初起俗忌人參。姑從俗而去之。加青皮二錢。

熱偏盛

加清涼

小柴胡湯加知母花粉。石膏。黃連之類。隨宜擇用。

寒偏重

加桂薑

加乾薑桂枝。甚者加附子肉桂。

邪氣盛

去參良

身熱者。小柴胡湯去人參。加桂枝二錢。服後食熱粥。溫覆取微汗。

常山入

力倍強

三字經

卷一

三十

小柴胡湯加常山二三錢。俗云邪未淨不可用常山。以截之。不知常山非截邪之品。乃驅邪外出之品。仲景用其苗。名曰蜀漆。

大虛者

獨參湯

虛人久瘧不愈。以人參一兩。生薑五錢。水煎五更服。極效。貧者以白朮一兩代之。熱多者以當歸代之。

單寒壯

理中匡

單寒無熱名曰牡瘧。宜附子理中湯加柴胡治之。

單熱瘧

單熱無寒名曰瘧瘧。或先熱後寒名曰熱瘧。俱宜以白虎湯加桂枝治之。時醫以六味湯加柴胡芍藥治之。

白虎詳

法外法

已上皆前醫之成法。更法外有法。不可不辨而治之。

辨微茫

三字經

卷一

三

消陰翳

熱之不熱。是無火也。益火之原。以消陰翳。寒之不寒。是無水也。壯水之主。以制陽光。

制陽光

太僕注

慎勿忘

王大僕消陰制陽等註。千古不刊之論。趙養葵遵之。以八味丸益火之源。六味丸壯水之主。久瘧多以。此法收功。

痢症第六

濕熱傷

赤白痢

王損菴論痢專主濕熱。其症裏急後重腹痛。欲便不便。膿血穢濁。或白或赤。或赤白相半。熱勝濕。赤痢清。胃為多氣多血之海。熱陽邪也。熱勝於濕。則傷胃之血。分而為赤痢。濕勝熱。白痢墜。濕陰邪也。濕勝於熱。則傷胃之氣。分而為白痢。○赤白相半。則為氣血兩傷。

濕勝熱

白痢墜

三字經

卷一

三

調行箴

須切記

行血則膿血自愈。調氣則後重自除。此四句為治初痢之格言。須切記之。

芍藥湯

熱盛餌

芍藥湯調氣行血。雖為初痢之總方。究竟宜於熱症。

平胃加

寒濕試

寒濕瀉痢初起者。以平胃散加乾薑澤瀉。猪苓木香治之。久而不愈。送下香連丸。

熱不休

方書云。痢症發熱不休者不治。

死不治

痢門方

皆所忌

凡痢症初起。即發熱。非肌表有邪。即經絡不和。溫散而調營衛外邪。一解痢亦鬆去。若概以為熱。開手即用痢門套方多有。陷入變劇者。

桂葛投

鼓邪出

三字經

卷一

十四

時醫有發汗之戒。以其無外證而妄汗之也。若頭痛發熱惡寒有汗宜用桂枝湯法。無汗宜用葛根湯法。鼓邪外出。然後治其痢。

外疏通

內暢遂

此二句是解所以發汗之故也。張飛疇云。當歸四逆湯治痢極效。若發熱而嘔者。小柴胡湯葛根黃連黃芩甘草湯。口渴下重者。白頭翁湯如神。

嘉言書

獨得閱

喻嘉言醫門法律中議論甚見透徹。

寓意存

補金匱

喻嘉言寓意草中。如麻黃附子細辛湯及入參敗毒散等案。却能補金匱所未及。

心腹胸膈痺第七

心胃疼

有九種

真心痛不治。今所云心痛者皆心胞絡及胃脘痛也。共有九種宜細辨之。

三字經

卷一

十五

辨虛實

明輕重

虛者喜按。得食則止。脈無力實者拒按。得食愈痛。脈有力。二症各有輕重。

痛不通

氣血壅

痛則不通。氣血壅滯也。

通不痛

調和奉

通則不痛。氣血調和也。○高士宗云。通之之法。各有不同。調氣以和血。調血以和氣。通也。

上逆者使之下行。中結者使之旁達。亦通也。虛者助之使通。寒者溫之使通。無非通之之法也。若必以下洩為通則妄矣。

一蟲痛

烏梅圓

蟲痛時痛時止。唇舌上有白花點。得食愈痛。蕪為厥陰風木之化。宜烏梅丸。

二注痛

蘇合研

入山林古廟。及見非常之物。脉乍大乍小。兩手若出兩人。宜蘇合丸。研而灌之。

三字經

卷下

三六

三氣痛

香蘇專

因大怒及七情之氣作痛。宜香蘇飲。加元胡索二錢。七氣湯亦妙。又方用百合一兩。烏藥三錢。水煎服。

四血痛

失笑先

瘀血作痛。痛如刀割。或有積塊。脉瀉。大便黑。宜桃仁承氣湯。失笑散。

五悸痛

妙香詮

悸痛即虛痛也。痛有作止。喜按。得食稍止。脉虛弱。宜妙香散。或理中湯加肉桂木香主之。

平胃煎

食積而痛。暖腐吞酸。其痛有一條扛起者。宜平胃散。加山查穀芽主之。傷酒再加葛根三錢。砂仁一錢。然新傷吐之。久傷下之。為正法。

七飲痛

二陳咽

停飲作痛。時吐清水。或脇下有水聲。宜二陳湯加白朮澤瀉主之。甚者十棗湯之類。亦可。

三字經

卷一

三六

八冷痛

理中全

冷痛身涼。脉細。口中和。宜理中湯加附子肉桂主之。兼嘔者。吳茱萸湯主之。

九熱痛

金鈴痊

熱痛身熱。脉數。口中熱。宜金鈴子元胡索各二兩。研末。黃酒送下。二錢。名金鈴子散。甚效。如熱甚者。用黃連梔子之類。入生薑汁治之。

腹中痛

照諸篇

臍上屬太陰。中臍屬少陰。臍下屬厥陰。而腸屬少陽厥陰之交界地面。宜分治之。然其大意與上相同。

金匱法

可回天

金匱要畧中諸議論皆死症求生之法。

諸方論

要拳拳

三字經

卷一

天

中庸云。則拳拳服膺而弗失之矣。○腹滿痛而下利者。虛也。吐瀉而痛。太陰症也。宜理中湯。雷鳴切痛。嘔吐者。寒氣也。宜附子梗米湯。此以下利而知其虛也。腹滿痛而大便閉者。實也。閉痛而不發熱者。宜厚朴三物湯。兼攻其裏。閉痛而兼發熱者。宜厚朴七物湯。兼通表裏。閉痛發熱。痛連脇下。脈弦者。宜大黃附子湯。濕下並行。以便利。閉而知其實也。若繞臍疼痛。名寒疝。烏頭煎之峻。不敢遽用。而當歸生薑羊肉湯之妙。更不可不講也。

又胸痺

非偶然

胸膈之上。人身之太空也。宗氣積於此。非偶然也。

薤白酒

妙轉旋

括薤白桂枝湯之類。皆轉旋妙用。

虛寒者

建中填

心胸大寒痛嘔。不能飲食。寒氣上衝。有頭足不可觸近。宜大建中湯主之。上中二焦為寒邪所痺。故以參薑故上焦之陽。合飴糖以建立中氣。而又加椒性之下行。降逆上之氣。復

三字經

卷一

天

下焦之陽。為補藥主方。

隔食反胃第八

隔食病

津液乾

方書名隔者。以病在膈上是也。又名隔者。以食物不下而阻隔也。津液乾枯。為隔食病源。

胃脘閉

穀食難

胃脘乾枯。閉小水。飲可行。食物難下。

時賢法

左歸養

趙養葵用大劑六味湯主之。高鼓峯仿趙養葵之法。以六味加生地當歸主之。楊乘六用左歸飲去茯苓。加當歸生地。以左歸飲中有甘草。引入陽明。開胃。陰去茯苓者。恐其旁流。入坎。不如。崇。碩。陽明之速效也。

胃陰展

賁門寬

如膏如脂。疊積胃底。即胃陰也。久隔之人。則胃陰亡矣。高鼓峯云。治賁。一陽明盡之。陽明三字經

卷一

三十一

者胃也。但使胃陰充拓。在上之賁門寬展。則食物入。在下之幽門闔門滋潤。則二便不閉。而膈症愈矣。

啓膈飲

理一般

故獨飲。亦是和胃養陰之意。但此方。泄肺氣之鬱。彼方。收腎水之枯。一陰一陽。宜擇用之。

推至理

衝脉干

張石頑云。膈咽之間。交通之氣。不得降者。皆衝脉上行。逆氣所作也。

大半夏

加蜜安

衝脉不治。取之。陽明。仲景以半夏降衝脉。逆。即以白蜜潤陽明之燥。加人參以生。既下之。津液。用甘瀾水。以降。逆。上之水。液。古聖之經方。唯仲景知用之。

金匱秘

仔細者

金匱明明用半夏。後世諸書皆以半夏為戒。毀聖之說。倡自何人。君子惡之。

若反胃

實可嘆

三字經

卷一

三十一

食得入。而良久反出。名為反胃。

朝暮吐

分別者

朝食暮吐。暮食朝吐。與隔食症。宜分別而藥之。

乏火化

屬虛寒

王太僕云。食不得入。是有火也。食入反出。是無火也。此症。屬中焦。下焦。火衰。無疑。

吳萸飲

獨附丸

妙在具黃鎮厥陰逆氣配入甘溫令震坤含
德土木不害。生附子以百沸湯俟溫浸去毒
日換湯三次三日外去皮放地上四面以磚
圍外以炭火燒一時則附子盡裂。乘熱投於
薑汁。又如法製之大抵一斤附子配一斤薑
汁以薑汁乾為度。研末蜜丸。以粟米稀粥送
下二錢。

六君類

俱神丹

六君子湯加薑附及
附子理中湯之類。

三字經

卷一

三

氣喘第九

喘促症

治分門

氣急而上奔宜
分別而治之。

鹵莽輩

只貞元

貞元飲是治血虛而氣無所附。以此飲濟之
緩之。方中熱地當歸之潤所以濟之。甘草之
甘所以緩之。常服調養之劑非急救之劑也。
今醫遇无氣欲脫上奔之症。每用此飲以速

其危。良
可浩嘆。

陰霾盛

龍雷奔

喘症多屬飲病。飲為陰邪。非離照當空。群陰
馬能退避。若以地黃之類。附和其陰。則陰霾
冲逆肆空。飲邪滔天。莫救。而
龍雷之火。愈因以奔騰矣。

寔喘者

痰飲援

喘症之實者風寒不解。有痰飲。而
為之。援。則咳嗽甚。而喘症作矣。

三字經

卷一

三

葶塵飲

十棗湯

肺氣實。而氣路閉。塞為喘者。以葶塵大棗湯
肺湯主之。咳嗽氣喘。心下停飲。兩脇滿痛者。
以十棗
湯主之。

青龍輩

撤其藩

此方解表兼能利水。治
內外合邪。以兩撤之。

虛喘者

補而溫

虛喘氣促不能接續脉虛細無力温補二字宜串着有以温為補者有以補為温者切不可走於貞元一路留滯痰涎也。

桂苓類

腎氣論

仲景云氣短有微飲者宜從小便去之桂苓木甘湯主之腎氣丸亦主之。

平衡逆

泄奔豚

衝氣上逆宜小半夏加茯苓湯以降之奔豚症初起臍下動氣久則上逆衝心宜茯苓桂

三字經

卷一

三十四

枝甘草大棗湯以安之。

真武劑

治其源

經云其標在肺其本在腎真武湯為治喘之源也。

金水母

主諸坤

肺屬金而主上腎屬水而主下虛喘為天水不交之危候治病當求其本須知天水一氣而位乎天水中者坤土也况乎土為金母金為水母危篤之症必以脾胃為主。

六君子

妙難言

六君子湯加五味乾薑北細辛為治喘神劑面腫加杏仁面熱如醉加大黃此法時師問之莫不驚駭能讀金匱者始知予言之不謬也。

他標劑

忘本根

唯黑錫丹鎮納元氣為喘症必用之劑此外如蘇子降氣湯定喘湯及沉香黑鉛之類皆

三字經

卷一

三五

血症第十

血之道

化中焦

經曰中焦受氣取汁變化而赤是謂血。

本衝任

中澆澆

血之流溢半隨衝任而行於經絡。

温肌腠

外遺遙

血之流溢。半散於外。而充肌腠。皮膚毛。

六淫逼

經道搖

六淫者。風寒暑濕燥火也。經常也。道。路也。言血所常行之路也。外邪傷之則搖動。

宜表散

麻芍條

外傷宜表散。水垣治一人。內蘊虛熱。外感大寒。而吐血。法仲景麻黃湯加補劑。名麻黃人參芍藥湯。一服而愈。

三字經

卷一

三五

七情病

溢如潮

七情者。喜怒哀懼愛惡欲也。七情之動。出於五志。驚書恒謂五臟各有火。五志。激之。則火動。火動則血隨火而溢。然五志受傷。既久。則火為虛火。宜以甘溫之法治之。

引導法

草薑調

甘草乾薑湯如神。或加五味子二錢。火盛者。再加乾桑皮三錢。小麥一兩。時醫因歸脾湯有引血歸脾之說。謂引血歸脾。即是歸經。試問脾有多大。能容離經之血。成斗成盆。盡返

而歸於內而不裂破乎。市醫固無論矣。而以名醫自負者。亦蹈此弊。實可痛恨。

溫攝法

理中起

理中湯加木香當歸煎服。凡吐血服涼藥及滋潤益甚。外有寒冷之象者。是陽虛陰走也。必用此方。血得煖。則循行。經絡矣。此法出仁齋直指。

涼瀉法

令瘀銷

火勢盛。脈洪有力。寒涼之劑。原不可廢。但今人於血症。每用藕節。黑梔。白芨。舊墨之類。以

三字經

卷一

三五

止瀉之。致留瘀不散。以為咳嗽。虛癆之基。金匱瀉心湯。大黃倍於芩連。為寒以行瘀法。栝葉湯治吐不止。為溫以行瘀法。二方為一溫一寒之對示。

赤豆散

下血標

糞前下血。為近血。金匱用常歸赤小豆散。

若黃土

寔翹翹

糞後下血。為遠血。金匱用黃土湯。

一切血

此方饒

黃土湯不獨糞後下血方也。凡吐血、衄血、大便血、小便血、婦人血崩及血痢、久不止，可以統治之。以此方煖中宮土臟，又以寒熱之品互佐之，步步合法也。

五臟有血，六腑無血。觀則諸跌腹心下夾脊，已絡中多血，肝內多血，心脾肺腎中各有血，六腑無血。近時以吐血多者，謂為吐血，皆耳食昔醫之誤。凡吐血五臟血，必死。若吐血、衄血、下血，皆由是經絡散行之血也。

三字經

卷一

三十九

水腫第十一

水腫病

有陰陽

腫皮膚腫，大初起，目下有形如卧蠶，後漸及於一身。按之即起，為水腫。按之肯而不起，為氣腫。景岳以即起為氣，不起為水。究之氣行水，即行水，滯氣亦滯，可以分，可以不必分也。只以陰水陽水為分別。

便清利

陰水殃

小便自利，口不渴，為寒名為陰水。

便短縮

陽水傷

小便短縮，口渴，屬熱為陽水。

五皮飲

元化方

以皮治皮，不傷中氣。方出華元化中藏經。

陽水盛

加通防

三字經

卷一

三十九

五皮飲加木通防已赤小豆之類。

陰水盛

加桂薑

五皮飲加乾薑肉桂附子之類。

知實腫

薤枳商

知者，真知其病情，而無兩可之見。壯年腫病驟起，脈實者，加薤芎子枳實之類。

知虛腫

參朮良

老弱病久腫漸成脉虛者加人參白朮之類

兼喘促

真武湯

腫甚小便不利氣喘尺脉虛者宜真武湯煨土行水間用桂苓甘木湯化太陽之氣守服十餘劑繼用導水茯苓湯二劑愈今人只重加味腎氣丸而不知其補助陰氣反益水邪不可輕服也

從俗好

別低昂

三字經

卷一

甲

已上諸法皆從俗也然從俗中而不踰先民之矩矱亦可以救火

五水辨

金匱詳

病有從外感而成者名風水病從外感而成其邪已滲入於處不在表而在裏者名皮水病有不因於風由三陰結而成水者名正水病有陰邪多而沉於下者名石水病有因風因水傷心鬱熱名黃汗金匱最詳熟讀全書自得其實否則鹵莽誤事耳○藥方中精義頗詳宜細玩之

補天手

十二方

越婢湯防已扶苓湯越婢加白朮湯甘草麻黃湯麻黃附子湯杏子湯蒲葶散苦芍桂酒湯桂枝加黃耆湯桂甘薑棗麻辛附子湯枳朮湯附方外臺防已黃耆湯

肩斯道

勿炎涼

群言教異衷於聖以斯道為已任勿與世為浮沉余有厚望焉

三字經

卷一

甲

醫學三字經卷二

閩吳航陳念祖修園著



男元豹道彪古忠 女元犀道照靈石 全枝

脹滿盤脹第十二水腫 參看

脹為病

辨寔虛

脹者脹之於內也。虛脹誤攻則壞寔脹誤補則增。

三字經 卷二

氣驟滯

七氣疏

七氣湯能疏通滯氣。

滿拒按

七物祛

腹滿拒按宜金匱厚朴七物湯。即桂枝湯小承氣湯合用。以兩解表裏之實邪也。

脹閉痛

三物鋤

腹滿而痛若大便實者宜金匱厚朴三物湯行氣中兼瀉是法以鋤其病根。以上言寔

脹之治法

若虛脹

且躊躇

子細診視 勿輕下藥

中央健

四旁如

喻嘉言云。執中央以運四旁。千古格言。

參竺典

大地與

三字經

卷二

土木無性則為復佛經以風輪主持大地。余于此悟到治脹之源頭。

單腹脹

實難除

四肢不腫而腹大如鼓。

山風卦

指南車

周易卦象 山風蠱。

易中旨

費居諸

易曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱法卦變卦體。剛上柔下。上情高亢而不下接。下情退縮而不上交。兩情不相通也。卦德下巽上止。在下。遂巡畏縮。而无敢為之心。在上。因循止息。而无必為之志。庶幾曰。以隳也。此言致蠱之由。而醫者參透此理。亦知蠱病之由。○易又曰。蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。注當蠱壞之日。有人以治之。以至於元亨。而天下之治。實始於此也。曰利涉大川者。言治蠱之人。宜涉險阻。以濟之。其止也。當矯之以奮發。其巽也。當矯之以剛果。是往有事也。治之之道。必三字經

先甲三日以更改。後甲三日以圖終。則撥亂反治。亂之終。即治之始。終則有始。人事之挽回。即天運之循環。天行也。此言治蠱之事。醫者參透此理。亦可以治蠱病矣。要知人身中胃屬艮卦。不欲其一。向。苟止。肝屬巽卦。不欲其一。向卑。巽。利涉大川。元亨。前大有經濟。自新丁寧。涉川時大費精神。能具此回天手段。而後無愧為上醫。

暑症第十三

傷暑病

動靜商

夏月傷暑。分動靜者。說本東垣。

動而得

得於長途赤日。身熱如焚。面垢體倦。口渴脉洪而弱。

六一散

白虎湯

六一散治一切暑症。白虎湯加入參者。以大汗不止。暑傷元氣也。加蒼朮者。治身熱足冷。以暑必挾濕也。

三字經

卷二

靜而得

處於高厦涼室。畏熱貪涼。受陰暑之氣。

起貪涼

惡寒象

惡寒與傷寒同。而發熱較傷寒倍感。

熱逾常

心煩辨

雖同傷寒。而心煩以別之。且傷寒脉或傷暑脉虛。

切莫忘

香薷飲

有專長

香薷發汗利水。為暑症之專藥也。有謂夏月不可用香薷。則香薷將用于何時也。

大順散

從症方

此治暑天畏熱貪涼成病。治暑也。此舍時從症之方。

生脉散

久服康

此夏月常服之。劑非治病方也。

三字經

卷二

五

東垣法

防氣傷

暑傷元氣藥宜從補。東垣清暑益氣湯頗起。

雜說起

遵弗彰

已上皆諸家之臆說。而先聖之道。反為之晦。若行道者。不可不熟記之。以資顧問。

若精蘊

祖仲師

仲景傷寒論。金匱要略。濕腸篇。字。字。皆。精。義。真。蘊。

太陽病

旨在此

仲師謂太陽中腸。太陽二字。大眼目也。因人俱認為熱邪。故提出太陽二字。以喝醒之。寒暑皆為外邪。中於陽而陽氣盛。則寒亦為熱。中於陽而陽氣虛。則暑亦為寒。若中於陰。無分寒暑。皆為陰症。如酷暑炎熱。並無寒邪。反多陰症。總之邪之中人。隨人身之六氣。陰陽虛實。而旋轉變化。非必傷寒為陰。中暑為陽也。

經脉辨

標本歧

三字經

卷二

六

師云。太陽中腸發熱者病太陽。而得標。陽之氣也。惡寒者病太陽。而得本。寒之氣也。身重而疼痛者。病太陽。通體之經也。脉弦細者。違若病太陽。通體之脉也。小便已。醜醜然。毛聳手足逆冷者。病太陽。本寒之氣。不得陽熱之化也。小有勞。身即熱。口開。前板齒燥者。病太陽。標陽之化。不得陰液之滋也。此太陽中腸標本經脉皆病。治當助其標本。益其經脉。若妄施汗下。溫鍼。則誤矣。

臨症辨

法外思

愚按借用麻杏石甘湯治中暑頭痛汗出而喘口渴之外症。黃連阿膠鷄子黃湯治心煩不得臥之內症。至柴胡梔子承氣等湯俱可取用。師云渴者與猪苓湯。又云痰熱在裡用麻連軀豆湯。育陰利濕俱從小便而出。此法外之法。神而明之存乎其人焉。

方兩出

大神奇

暑之中人。隨人之陰陽虛實為旋轉變化。如陽臟多火暑。即寓於火之中。為汗出而煩渴。師有白虎加人參之法。如陰臟多濕暑。即伏於濕之內。為身熱重脈微弱。師以夏月傷

三字經

卷二

七

冷水。水行皮膚所致。指暑病以濕為病。治以一物。水滯湯。冷水去而濕無所依。而亦解也。

泄瀉第十四

濕氣勝

五瀉成

書云。濕成五泄。

胃苓散

厥功宏

胃苓散。暖脾胃。平胃利水。為泄瀉之要方。

濕而熱

連苓程

胃苓散。加黃芩黃連。熱甚去桂枝。加乾葛。

濕而冷

黃附行

胃苓散。加吳茱萸附子之類。腹痛加木香。

濕挾積

麴查迎

食積。加山查神麴。酒積。加葛根。

三字經

卷二

八

虛兼濕

參附令

胃苓散。加入參附子之類。

脾腎瀉

近天明

五鼓以後瀉者。脾虛也。瀉有定時者。土。土信。脾虛也。故名脾腎瀉。難治。

四神服

勿紛更

四神丸。加白朮。人參。乾薑。附子。茯苓。罌粟殼之類。為丸。久服方效。

恒法外

照此法治而不愈者宜求之內經。

腸臟說

腸熱腸寒腸寒腸熱內經精義張石頑頗得其解。

瀉心類

諸瀉心湯張石頑俱借來治瀉與內經之旨頗合詳載醫學從衆錄

三字經

卷二

九

眩暈第十五

眩暈症

內經云諸風掉眩皆屬於肝。

肝風木

厥陰為風木之藏厥陰風木為少陽相火所居。

風火動

內經精

得其情

特丁寧

皆屬肝

相火干

兩動搏

風與火皆傷陽而主動。兩動相搏則為旋轉。

頭旋轉

此二句為眩暈之象也。

虛痰火

仲景主痰飲升溪宗河間之說謂無痰不眩無火不暈內經云上虛則眩又云腎虛則頭暈高搖髓海不足則腦轉耳鳴諸說不同如此。

各分觀

眼紛繁

三字經

卷二

十

究其指

究其殊途同歸之旨木動則生風風生而火發故河間以風火立論也風生必扶木勢而尅土土病則聚液而成痰故仲景以痰飲立論升溪以痰火立論也究之腎為肝母腎主藏精精虛則腦空腦空則旋轉而耳鳴故內經以精虛及髓海不足立論也言虛者言其病根言寔者言其病象其寔一以貫之也。

總一狀

痰火亢

大黃安

寸脉滑按之益堅者為上實丹溪用大黃一啖酒炒三遍為末茶調下一二錢。

上虛甚 鹿茸餐

寸脉大按之即散者為上虛宜鹿茸酒鹿茸生於頭取其以類相從且入督脉而通於腦每用半兩酒煎去滓入麝香少許服或用補中益氣湯及芪木膏之類。此症如鈎藤天麻菊花之類俱可為使。

欲下取 求其端

三字經 卷二 十一

端頭也謂尋到源頭也欲榮其上必灌其根古人有上病下取法。

左歸飲 正元丹

左歸飲加肉蓯蓉川芎細辛甚效正元丹亦妙。

嘔噦吐第十六 附

嘔吐噦 皆屬胃

嘔字從溫溫者水也口中出水而無食也吐字從土土者食也口中吐食而無水也嘔吐

者水與食並出也噦者口中有穢味也又謂之乾嘔口中有穢味未有不乾嘔也呃逆者氣衝有聲聲短而頻也其病皆屬於胃。

二陳加 時醫貴

二陳湯倍生薑安胃降逆藥也寒加丁香砂仁熱加黃連鮮竹茹石斛之類。

玉函經 難彷彿

寒熱攻補一定不移。

三字經 卷二 十二

小柴胡 少陽謂

寒熱往來而嘔者屬少陽也。

吳茱萸 平酸味

吳茱萸湯治陽明食穀欲嘔者又治少陰症吐利手足逆冷煩躁欲死者又治乾嘔吐涎沫者。此症嘔吐多有酸味。

食已吐 胃熱沸

食已即吐。其人胃素有熱。食復入。兩熱相衝。不得停留。

黃草湯

下其氣

大黃甘草湯。治食已即吐。金匱云。欲吐者不可下之。又云。食已即吐者。大黃甘草湯下之。何也。曰。病在上而欲吐。宜因而越之。若逆之使下。則必憤亂益甚。若既吐矣。吐而不已。是有升無降。當逆折之。

食不入

火堪畏

王太僕云。食不得入。是有火也。

黃連湯

為經緯

喻嘉言用進退黃連湯。柯韻伯用乾薑黃連黃芩人參湯。推之瀉心湯亦可借用。以此數湯為經緯。

若呃逆

代赭彙

代赭旋覆湯。治噫氣。即治呃逆。若久病呃逆。為胃氣將絕。用人參一兩。乾薑附子各三錢。

三字經

卷二

五

丁香柿蒂各一錢。可救十中之一。

癲狂癩第十七

重陽狂

重陰癩

內經云。重陽者狂。重陰者癩。

靜陰象

動陽宣

癲者。笑哭無時。語言無序。其人常靜。狂者。言語不避親疎。其人常動。

狂多寔

痰宜蠲

蠲除頑痰。滾痰丸加烏梅硃砂治之。生鐵落飲當歸承氣湯亦妙。

癩虛發

石補天

磁珠丸。是煉石補天手法。駱氏內經拾遺。用溫膽湯。

忽搐搦

癩病然

手足抽掣。猝倒無知。忽作忽止。病有間斷。故名曰癩。

三字經

卷二

五

五畜狀

肺如犬吠。肝如羊嘶。心如馬鳴。脾如牛吼。腎如猪叫。每發必口角流涎。

吐痰涎

有生病

歷歲年

由母腹中受驚。積久失調。一觸而發。病起於有生之初。非年來之新病也。內經拾遺用溫膽湯。柯韻伯用磁硃丸。

火氣亢

蘆薈平

三字經

卷二

十五

火氣亢。必以大苦丸寒之。劑以降之。宜當歸蘆薈丸。

痰積錮

丹礬穿

丹礬丸能穿入心胞絡。導其痰涎。從大便而出。然不如磁硃丸之妥當。

三症本

厥陰愆

已上治法。時醫習用而不效者。未知其本在。於厥陰也。厥陰屬風木。與少陽相火同居。厥陰之氣逆。則諸氣皆逆。氣逆則火發。火發則風生。風生則扶木勢而害土。土病則聚液而

成痰。痰成必歸遊人心。為已上諸症體用變。

標本遷

其本陰。其體熱。

伏所主

所因先

伏其所主。先其所因。

收散互

逆從連

三字經

卷二

或收或散。或逆或從。隨所利而行之。

和中氣

妙轉旋

調其中氣使之和平。自伏所主至此。其小註俱內經本文。轉旋言心手靈活也。其要旨。在調其中氣。二句中氣者。土氣也。治肝不應。當取陽明。制其侮也。

悟到此

治立痊

症雖可治。而任之不專。亦無如之何已。

五淋瘡閉赤白濁遺精第十八

五淋病

皆熱結

淋者小便痛澀淋瀝欲去不去欲止不止是也皆熱氣結於膀胱

膏石勞

氣與血

石淋下如沙石膏淋下如膏脂勞淋從勞力而得氣淋氣滯不通臍下悶痛血淋瘀血停

藪莖中割痛

三字經

卷二

十七

五淋湯

是秘訣

石淋以此湯煎送髮灰滑石石首魚頭內石研末膏淋合草薢分清飲氣淋加荊芥香附生麥芽不愈再加升麻或用吐法勞淋合補中益氣湯血淋加牛膝鬱金桃仁入麝香少許溫服

敗精淋

加味

過服金石藥與老人陽已痿思色以降其精以致內敗而為淋宜前湯加草薢石菖蒲兔

絲子以導之

外冷淋

腎氣咽

五淋之外又有冷淋其症外候惡冷喜飲熱湯宜加味腎氣丸以益湯咽下

點滴無

名瘡閉

小便點滴不通與五淋之短縮不同

氣道調

江河決

三字經

卷二

十八

前湯加化氣之藥或吞滋腎丸多效孟子云若決江河沛然莫之能禦也引來喻小便之多也

上竅通

下竅泄

如滴水之器閉其上而倒懸之點滴不能下也去其上閉而水自通宜服補中益氣湯再服以平探吐

外竅開

水源鑿

又法。啟其外竅。即以開其內。竅。麻黃力猛。能通陽氣於至陰之地。下肺氣。主皮毛。配杏仁以降氣。下達州都。導水必自高原之義也。以前飲加此二味。甚效。夏月不敢用麻黃。以蘇葉防風杏仁等分。水煎服。溫覆微汗。水即利矣。虛人。以人參麻黃各一兩。水煎服。神效。

分利多

醫便錯

愈利愈閉矣。

濁又殊

竅道別

三字經

卷二

十九

淋出濁。竅。濁出精竅。

前飲投

精愈酒

水愈利。而腎愈虛矣。

腎套談

理脾恪

治濁。只用腎家套藥不效。蓋以脾主土。土病濕熱下注。則小水渾濁。濕勝於熱。則為白濁。熱勝於濕。則為赤濁。濕熱去。則濁者清矣。

分清飲

佐黃蘗

草薢分清飲。加蒼朮白朮。再加黃蘗。苦以燥濕。寒以除熱。

心腎方

隨補綴

六八味湯丸。加龍牡。腎藥也。四君子湯。加遠志。心藥也。心腎之藥。與前飲間服。

若遺精

另有說

與濁病又殊。

三字經

卷二

二十

有夢遺

龍膽折

有夢而遺。相火旺也。余每以龍膽瀉肝湯送下。五倍子九二錢。多效。張石頑云。肝熱則火淫於內。魂不內守。故多淫夢失精。又云。多是陰虛陽擾。其作必在黎明。陽氣發動之時。可以悟矣。妙香散甚佳。

無夢遺

十全設

無夢而遺。是氣虛不能攝精。宜十全大補湯。加龍骨牡蠣蓮鬚五味子黃蘗為丸。常服。

坎離交

亦不切

時醫遇此症。便云心腎不交。用茯神遠志蓮子棗仁之類。求中病情。皆不切之套方也。

疝氣第十九

疝任病

歸厥陰

經云。任脉為病。外結七疝。女子帶下。痰聚丹溪專治厥陰者。以肝主筋。又主痛也。

寒筋水

氣血尋

三字經

卷二

注

寒疝。水疝。筋疝。氣疝。血疝。

狐出入

癩頑麻

狐疝。臥則入腹。立則出腹。癩疝。犬如升斗。頑麻不痛。

喘治氣

景岳箴

景岳云。疝而曰氣者。病在氣也。寒有寒氣。熱有熱氣。濕有濕氣。逆有逆氣。俱當兼用氣藥也。

五苓散

加減斟

別錄以此方加川練子木通橋核木香。通治諸疝。

茴香料

著醫林

三層茴香丸治久疝。雖三十年之久。大如栲栳。皆可消散。

痛不已

須洗淋

陰腫。核中痛。千金翼用雄黃一兩。礬石二兩。甘草一尺。水一斗。煮二升。洗之。如神。

三字經

卷二

注

痰飲第二十

痰飲源

水氣作

水氣上逆。得陽煎熱。則稠而成痰。得陰凝聚。則稀而成飲。然水歸于腎。而受制于脾。治者必以脾腎為主。

燥濕分

治痰畧

方書支離不可聽。只以燥濕為辨。燥痰宜潤。肺濕痰宜溫脾。握要之法也。宜參之。虛癆咳。

嗽等篇或老痰宜王節齋化痰九寔痰怪症宜滾痰九之類。

四飲名

宜斟酌

金匱云其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲注即今之久咳痰喘是也飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲注即今之停飲脇痛症也飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼痛謂之溢飲注即今之風水腫症也欬逆倚息氣短不得臥其形如腫謂之支飲注即今之停飲喘滿不得臥症也又支飲偏而不中正也

三字經

卷二

三

參五臟

細量度

四飲猶未盡飲邪之為病也凡五臟有偏虛之處而飲留之言臟不及腑者腑屬陽在腑則行矣金匱曰水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫欲飲水在脾少氣身重水在肝脇下支滿噎而痛水在腎心下悸

補和攻

視強弱

宜補宜攻宜和視乎病情亦視乎人之本體強弱而施治也

十六方

各鑿鑿

苓桂木甘湯腎氣丸甘遂半夏湯十棗湯大青龍湯小青龍湯木防已湯木防已加茯苓芒硝湯澤瀉湯厚朴大黃湯葶藶大棗瀉肺湯小半夏湯已椒苈蘆丸小半夏加茯苓湯五苓散附外薑茯苓飲

溫藥和

博返約

金匱云病痰者當以溫藥和之忽揭出溫藥和之四字即金針之度也蓋痰水病也水歸

三字經

卷二

三

於腎而受制於脾欲水由地中行而歸其壑者非用溫藥以化氣不可也欲水不泛溢而築以隄防者非用溫藥以補脾不可也如苓桂木甘湯腎氣丸小半夏湯五苓散之類皆溫藥也即如十棗湯之十枚大棗甘遂半夏湯之半升白蜜木防已湯之參桂葶藶湯之大棗亦寓溫和之意至於攻下之法不過一時之權宜而始終不可離溫和之旨也

陰霾除

陽光灼

飲為陰邪必使離照當空而羣陰方能退散余每用參苓木附加生薑汁之類取效

滋潤流

時醫錯

方中若雜以地黃麥冬五味附和其陰。則陰霧冲逆。肆空飲邪。消天莫救矣。即腎氣丸亦宜慎。

真武湯

水歸壑

方中以茯苓之淡以導之。白朮之燥以制之。生薑之辛以行之。白芍之苦以泄之。得附子本經之藥領之。以歸其壑。

三字經

卷二

三五

白散方

窺秘鑰

三因白散之妙。喻嘉言解之甚詳。見於醫門法律中風門。

消渴第二十一

消渴症

津液乾

口渴不止。為上消。治以人參白虎湯。食入即飢。為中消。治以調胃承氣湯。飲一溲一小便如膏。為下消。治以腎氣丸。其實皆津液乾之病也。稍養葵變其法。

七味飲

一服安

趙養葵云。治消症無分上中下。但見大渴大燥。須六味丸料一斤。肉桂一兩。五味子一兩。水煎六七碗。恣意冷飲之。睡熟而渴如失矣。白虎承氣皆非所治也。

金匱法

別三般

能食而渴者。重在二陽論治。以手太陽主津液。足太陽主血也。飲一溲一者。重在少陰論治。以腎氣虛不能攝水。直下趨腎氣虛不能蒸動。則水不上濟也。不能食而氣衝者。

三字經

卷二

二六

重在厥陰論治。以一身中唯肝火最橫熾。灼無忌耗。傷津液而為消渴也。金匱論消渴。開口即揭此旨。以補內經之未及。不必疑其錯簡也。

二陽病

治多端

勞傷榮衛。漸鬱而為熱者。炙甘草湯可用。喻嘉言清燥湯。即此湯變甘溫為甘寒之用也。熱氣蒸胸者。人參白虎湯可用。金匱麥門冬湯。即此湯變甘寒而為甘平之用也。消穀大堅者。麻仁丸加當歸甘草人參可用。妙在滋液之中。攻其堅也。蓋堅則不能消水。如以水

投石。水去而石自若也。消症屬火。內鬱之火。本足以消水。所飲之水。本足以濟渴。只緣胃中堅燥。全不受水之浸。潤轉從火熱之勢。急走膀胱。故小便數。愈數而愈堅。愈堅而愈消。矣。此論本喻。嘉言最精。

少陰病

腎氣寒

飲水多。小便少。名上消。食穀多。而大便堅。名食消。亦名中消。上中二消。屬熱。唯下消症。飲一澗一中。無火化。可知腎氣之寒也。故用腎氣丸。

三字經

卷二

七注

厥陰病

烏梅丸

方中甘辛苦酸並用。甘以緩之。所以達肝之志也。辛以散之。所以悅肝之神也。苦以降之。則逆上之火順而下。行矣。酸以收之。以還其曲。直作酸之本性。則率性而行。所無事矣。故此丸為厥陰症之總劑。○治此症。除此丸外。皆不用苦藥。恐苦從火化也。

變通妙

燥熱餐

有脾不能為胃行其津液。肺不能通調水道。而為消渴者。人但知以清潤治之。而不知脾

喜燥而肺惡寒。試觀泄瀉者必渴。此因水精不能上輸。而惟下泄。故爾。以燥脾之藥治之。水液上升。即不渴矣。余每用理中丸湯。倍白朮。加枯樓根。神效。

傷寒瘟疫第二十二

傷寒病

極變遷

太陽主一身之表。司寒水之經。凡病自外來者。皆謂傷寒。非寒熱之寒也。變遷者。或三陽或三陰。或寒化。或熱化。及轉屬。合併之異。

三字經

卷二

一注

六經法

有真傳

太陽寒水。其經主表。編中。備發汗。諸法。陽明燥金。其經主裏。編中。備攻裏。諸法。少陽相火。其經居表裏之界。所謂陽樞也。編中。備和解。諸法。太陰濕土。純陰。而主寒。編中。備溫。諸法。少陰君火。標本寒熱不同。所謂陰樞也。編中。寒熱二法。並立。厥陰風木。本中有火。而主熱。編中。備清火。諸法。雖太陽亦有裏症。陽明亦有表症。太陰亦有熱症。厥陰亦有寒症。而提綱却不在此也。

頭項痛

太陽編

三陽俱主表而太陽為表中之表也。論以頭項痛強發熱惡寒為提綱。有汗宜桂枝湯。無汗宜麻黃湯。

胃家實

陽明編

陽明為表中之裏。主裏實症。宜三承氣湯。論以胃家實為提綱。又鼻乾目痛不眠為經病。若惡寒頭痛為未離太陽。審其有汗無汗。用桂枝麻黃法。若無頭痛惡寒但見壯熱自汗。只

三字經

卷二

二十九

渴為已離太陽。宜白虎湯。仲景提綱不以此者。九解表諸法。求之太陽。攻裏諸法。求之陽明。立法。亦嚴也。

眩苦嘔

少陽編

少陽居太陽陽明之界。謂之陽樞。寒熱相雜。若寒熱往來於外。為胸脇滿煩。宜小柴胡湯。若寒熱互搏於中。嘔吐腹痛。宜黃連湯。痞滿嘔逆。宜半夏瀉心湯。拒格食不入。宜乾薑黃連人參湯。若邪全入於膽府。下攻於脾。為自利。宜黃芩湯。上逆於胃。利又兼嘔。宜黃芩

加半夏生薑湯。論以口苦咽乾目眩為提綱。

吐利痛

太陰編

太陰濕土。為純陰之臟。從寒化者多。從熱化者少。此經主寒症。而言宜理中湯。四逆湯為主。第原本為王叔和所亂耳。論以腹中滿。吐食自利不渴。手足自溫。腹時痛為提綱。

但欲寐

少陰編

少陰居太陰厥陰之界。謂之陰樞。有寒有熱。論以脈微細但欲寐為提綱。寒用麻黃附子

三字經

卷二

三十

細辛湯。麻黃附子甘草湯。及白通湯。通脈四逆湯。熱用猪苓湯。黃連雞子黃湯。及大承氣湯諸法。

吐衄渴

厥陰編

厥陰陰之盡也。陰盡陽生。且屬風木。木中有火。主熱症。而論以消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢不欲食。食則吐衄。下之利不止。為提綱。烏梅丸主之。自利下重。飲水者。白頭翁湯主之。○凡一切宜發表法。備之。太陽。一切宜攻裏法。備之。陽明。一切宜和解法。備之。少陽。一

切宜溫補法備之。太陰一切宜寒涼法備之。厥陰一切寒熱兼用法備之。少陰此仲景傷寒論之六經與內經熱病論之六經不同也。

長沙論

嘆高堅

仰之彌高。鑽之彌堅。

存津液

是真詮

存津液是全書宗旨善讀書者讀於無字處。如桂枝湯甘溫以解肌。養液也。即麻黃湯直入

三字經

卷二

十三

皮毛不加薑之辛熱。棗之甘壅。從外治外。不傷營氣。亦養液也。承氣湯急下之。不使邪火灼陰。養液也。即麻黃附子細辛湯。用附子以固少陰之根。令津液內守。不隨汗洩。亦養液也。麻黃附子甘草湯。以甘草易細辛。緩麻黃於中焦。取水穀之津而為汗。毫不傷陰。更養液也。推之理中湯。五苓散。必吸粥飲。小柴胡湯。吳茱萸湯。皆用人參。何一而非養液之法乎。

汗吐下

溫清懸

在表宜汗。在胸膈宜吐。在裏宜下。寒者溫之。熱者清之。

補貴當

方而圓

虛則補之。合上為六法。曰方而圓者。言一部傷寒論。全是法法。

規矩廢

甚於今

自王叔和而後。注家多誤。然亦是非參半。今則不知傷寒論為何物。規矩盡廢矣。

二陳尚

九味尋

人皆曰。二陳湯為發汗平穩之劑。而不知茯苓之滲。半夏之遊。皆能留邪。生熱。變成謗語。

三字經

卷二

十一

不便等症。人皆曰。九味羌活湯。視麻桂二湯較安。而不知太陽病重。溼防侵入。少陰。此方中有苓地之苦寒。服之。不汗。恐苦寒。陷入。少陰。變成。脈沉細。但欲寐之症。服之。得汗。恐苦寒。代。腎陽。陽虛。不能內固。變成。遂漏不止之症。時醫喜用此方。其亦知此方之流弊。害人匪淺也。

香蘇外

平胃臨

香蘇飲。力量太薄。不能驅邪。盡出。餘邪之傳。變多端。平胃散。為燥濕消導之劑。仲景從無。

燥藥發汗之法且外邪未去更無先攻其內法

汗源涸

耗真陰

陰者陽之家也。桂枝湯之芍藥及啜粥俱是滋陰以救汗源。麻黃湯之用甘草與不啜粥亦是保陰以救汗源。景岳誤認其旨。每用歸地。貽害不少。

邪傳變

病日深

治之得法無不即愈。若逆症壞症。過經不愈之症皆誤治所致也。

三字經

卷二

目擊者

實痛心

人之死於病者少。死於藥者多。今行道先學利口。以此藥殺人。即以此藥得名。是可慨也。吾知其殊在子孫。

醫醫法

腦後鍼

蕭前輩云。醫人先當醫醫。以一醫而治千萬人。不過千萬人計耳。救一醫便救千萬人。救千萬醫便救天下。後世無量恒河沙數人耳。余所以於醫者。腦後痛下一鍼。

若瘟疫

治相伴

四時不正之氣及方土異氣病人穢氣感而成病。則為瘟疫。雖有從經絡入。從口鼻入之分。而見證亦以六經為據。與傷寒同。

通聖散

兩解求

仲師於太陽條獨掣出發熱不惡寒而渴為溫病。是導內經人傷於寒。則為熱病。冬傷於寒。春必病溫。先夏至日為病溫。後夏至日為病者之三說也。初時用麻杏甘石湯。在經用

三字經

卷二

三四

白虎加入參湯。入裏用承氣湯。及太陰之茵陳蒿湯。少陰之黃連阿膠湯。皆其要藥。究與瘟疫之病不同。白頭翁湯等皆其要藥。究與瘟疫之病不同。也。瘟疫之病皆新感乘戾之氣而起。初起若兼惡寒者。邪從經絡入。用人參敗毒散為匡正。托邪法。初起若兼胸滿口吐黃涎者。邪從口鼻入。用藿香正氣散為辛香解穢法。唯防風通聖散。而周到。即初起未必內實。而方中之消黃。別有妙用。從無陷邪之害。若讀仲師書。死於句下者。聞之無不咋舌。而不知其有利無弊也。

六法備

汗為尤

汗吐下溫清補為治傷寒之六法。六法中唯取汗為要。以溫疫得汗則生。不得汗則死。汗期以七日為準。如七日無汗。再俟七日。以汗之。又參論中聖法以吐之。下之。溫之。清之。補之。皆所以求其汗也。詳於時方妙用中。

達原飲

昧其由

吳又可謂病在膜原。以達原飲為首方。創異說以欺人。實昧其病由也。

三字經

卷二

三五

司命者

勿逐流

醫為人之司命。熟讀仲聖書。而兼臨症之多者。自有定識。切不可隨波逐流。

婦人經產雜病第二十三

婦人病

四物良

與男子同。唯經前產後異耳。濟陰綱目。以四物湯加香附。炙草為主。凡經前產後俱以此出入加減。

月信準

體自康

經水一月一至。不愆其期。故名月信。經調則體自康。

漸早至

藥宜涼

血海有熱也。宜加味四物湯。加續斷地榆黃芩黃連之類。

漸遲至

重桂薑

血海有寒也。宜加味四物湯。加乾薑肉桂之類。甚加附子。

三字經

卷二

三五

錯雜至

氣血傷

經來或早或遲不一者。氣血虛而經亂也。宜前湯加人參白朮黃芪之類。

歸脾法

主二陽

內經云。二陽之病發心脾。有不得急曲。為女子不月。宜歸脾湯。

兼鬱結

逍遙長

鬱氣傷肝。思慮傷脾。宜加味逍遙散。

種玉者

即此詳

種子必調經。以歸脾湯治其源。以逍遙散治其流。並已上諸法皆妙。不必他求。唯婦人體肥厚者。恐子宮脂滿。另用二陳湯加川芎香附為丸。

經閉塞

禁地黃

閉塞脈寬小腹脹痛。與二陽病為女子。不月者。不同。雖四物湯為婦科所不禁。而經閉及積瘀實症。宜去地黃之濡滯。恐其護黃。無不行也。加醋炒地黃二錢。桂一錢。桃仁二錢。服

三字經

卷二

三七

五六劑

孕三月

六君嘗

得孕三月之內。多有嘔吐不食。名惡阻。宜六君子湯。俗疑半夏碍胎。而不知仲師慣用之。妙品也。高鼓峯云。半夏夏合參木。為安胎止嘔進食之上藥。

安胎法

寒熱商

四物湯去川芎為主。熱加黃芩白朮。續斷寒加艾葉阿膠杜仲白朮。大抵胎氣不安。虛寒

者。多庸醫以胎火二字惑人。誤人無算。

難產者

保生方

橫生倒產。漿水太早。交骨不開等症。宜保生無憂散。

開交骨

歸芎鄉

交骨不開。陰虛故也。宜加味芎歸湯。

血大下

補血湯

胎猶舟也。血猶水也。水滿則舟浮。血下太早。則乾涸而胎阻矣。宜當歸補血湯。加附子三錢。欲氣旺則血可速生。且欲氣旺而推送有力。加附子者。取其性急如酒。所以速茂歸之用也。保生無憂散。治漿水未行。此方治漿水過多。加味歸芎湯。治交骨不開。三方。禹峙。不可不知。

三字經

卷二

三

脚小指

艾火煬

張文仲。治婦人橫產。手先出。諸般符藥不效。以艾火如小麥大。灸產婦右脚小指頭尖。下

火立

胎衣阻

胎衣不下宜以醋湯送失笑散三錢即下

失笑匡

產後病

時醫相傳云生化湯加減治產後百病若非由於併感而誤用之則外邪反入於血室中氣反因以受傷危症蜂起矣慎之慎之

生化將

合諸說

已上相沿之套法輕病可愈治重病則不效

俱平常

資顧問

商治時不與眾醫談到此法反為其所笑

亦勿忘

精而密

金匱要畧第二十卷第二十一卷第二十二卷義精而法密

長沙室

妊娠篇

丸散七

妊娠篇凡十方丸散居七湯居三蓋以湯者蕩也妊娠以安胎為主攻補俱不宜驟故緩以圖之即此是法

桂枝湯

列第一

此湯表症得之為解肌和營衛內症得之為化氣調陰陽今人只知為傷寒首方此於妊娠篇列為第一方以喝醒千百庸醫之夢亦即是法師云婦人得平脉陰脉小弱其人渴

不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之注陰搏陽別為有子今反云陰脉弱小是孕只兩月蝕下焦之氣不能作毓勢也過此則不然○妊娠初得上下本無病因子宮有疑氣溢上下故但以芍藥一味固其陰氣使不得上溢以桂薑甘棗扶上焦之陽而和其胃氣但令上焦之陽氣充能禦相侵之陰氣足矣未嘗治病正所以治病也

附半薑

功超軼

時醫以半夏附子墜胎不用乾薑亦疑其熱而罕用之而不知附子補命門之火以舉胎

半夏和胃氣以安胎乾薑煖
土臟使胎易長俗子不知

內十方

皆法律

桂枝湯治妊娠附子湯治腹痛小腹如扇沃
苓桂枝丸治三月餘漏下動在臍上為癥瘕
當歸芍藥散治懷妊腹中疝痛乾薑人參半
夏丸治妊娠嘔吐不止當歸貝母苦參丸治
妊娠小便難當歸散治妊娠常服白朮散治
養胎方方起妙用之如神惟妊娠有水氣身
重小便不利惡寒起即頭眩
用參子茯苓散不能無疑

三字經

卷二

聖

產後篇

有神術

共九方

小柴胡

首特筆

妊娠以桂枝湯為第一方產後以小柴胡為
第一方即此是法。○新產婦人有三病。一者
病瘕二者病鬱冒三者大便難。○產婦鬱冒
脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出小柴
胡湯主之。

竹葉湯

風痙疾

金匱云產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹
葉湯主之。錢院使注云中風之下當有病痙
者三字。○按庸醫於此症以生化湯
加薑桂荆芥益母草之類殺人無算

陽旦湯

功與匹

即桂枝湯增桂加附子。治人以桂枝湯加黃
芩者誤也。風乘火勢火借風威灼筋而成痙
宜竹葉湯若數日之久惡寒症尚在則為寒
風宜此湯。二湯為一寒一熱之對子。○師云

三字經

卷二

聖

產後風續續數十日不解頭微痛惡寒時時
有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在耳
可與湯
旦湯

腹痛條

須詳悉

此下八句皆言腹
痛不同用方各異

羊肉湯

疔痛謚

疔痛者痛之
緩也為虛症

痛滿煩

滿煩不得臥裏實也宜枳實芍藥散二味無奇妙在以麥粥下之。

求枳實

着臍痛

腹中有瘀血着於臍下而痛宜下瘀血湯。

下瘀吉

痛而煩

小腹痛雖為停痰而不大便日晡煩躁譫語非停痰專症也血因熱裏而不行非血自結

裏熱室

三字經

卷二

四三

於下但攻其痰而可愈也。金匱以大承氣湯攻熱。

攻涼施

毋固必

攻有大承氣湯涼有竹皮大丸白頭翁加甘草阿膠湯金匱云病解能食七八日更發熱者此為胃實大承氣湯主之。又云婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之。又云產後下利虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之。讀此則知丹溪產後以大補氣血為主餘以末治之之說為大謬也。

雜病門

還熟讀

金匱婦人雜病以因虛積冷結氣六字為綱。至末段謂千變萬端總出於陰陽虛實而獨以弦紫為言者以經阻之始大概屬寒氣結則為弦寒甚則為紫以此為主而參之兼脈也。

二十方

效俱速

三字經

卷二

四四

唯溫經

帶下服

十二癥九痛七害五傷三痼共三十六種因經致病統名曰帶下。言病在帶脉非近時赤白帶下之說也。溫經湯治婦人年五十前陰下血暮發熱手掌煩熱腹痛口乾云云其功實不止此也。

甘麥湯

臟燥服

金匱云婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之。

藥到咽

效可卜

閩中諸醫。因余用此。效方奇。每繕錄於讀本之後。亦醫風之將轉也。余日望之。

道中人

須造福

小兒第二十四

小兒病

多傷寒

喻嘉言曰。方書謂小兒八歲以前。無傷寒。此胡言也。小兒不耐傷寒。初傳太陽一經。早已

三字經

卷二

四十五

身強多汗。筋脉牽動。人事昏沉。勢已極。於本經。誤藥即死。無由見其傳經。所以謂其無傷寒也。俗云驚風。皆是。

稚陽體

邪易干

時醫以。釋陽為純陽。生。死。閉。頭。開。手。便。錯。

凡發熱

太陽觀

太陽。主。身。之。表。小兒。腠。理。未。密。最。易。受。邪。其。症。頭。痛。項。強。發。熱。惡。寒。等。小兒。不。能。自。明。唯

發熱一 捫可見。

熱未已

變多端

喻嘉言云。以其頭搖手動也。而立抽掣之名。以其卒口噤脚掣急也。而立目斜心亂搖榻之名。以其脊強背反也。而立角弓反張之名。造出種種不通名目。謂為驚風。而用攻痰鎮驚清熱之藥。投之立死矣。不知太陽之脉。起於目內眦。上額交巔。入腦還出。別下項夾脊。抵腰中。是以見上諸症。當時若以桂枝湯照法服之。則無餘事矣。過此失治。則變為痲症。

三字經

卷二

四十六

無汗用桂枝加葛根湯。有汗用桂枝加栝萎根湯。此太陽而兼陽明之治也。抑或寒熱往來多嘔。以桂枝湯合小柴胡湯。或單用小柴胡湯。此太陽而兼少陽之治也。

太陽外

仔細看

喻嘉言云。三日即愈為貴。若待經盡方解。必不能耐矣。然亦有耐得去而傳他經者。亦有即時見他經之症者。宜細認之。

遵法治

危而安

遵六經提綱之法而求之。詳於傷寒論。

若吐瀉

求太陰

太陰病。以吐食自利。不渴。手足自濕。腹時痛。為提綱。以理中湯主之。

吐瀉甚

變風淫

吐瀉不止。則土虛而木邪乘之。左傳云。風淫末疾。末。四肢之末也。即抽掣擊急之象。

慢脾說

即此尋

三字經

卷二

四七

世謂慢脾風多死。而不知即太陰傷寒也。有初時。即傷於太陰者。有漸次傳入太陰者。有誤用神麴麥芽山查蘿菔子枳殼葶藶大黃瓜萎鴨南星等藥。陷入太陰者。既入太陰。其治同也。如吐瀉後。冷汗不止。手足厥逆。理中湯加入附子。或通脈四逆湯。白通湯佐之。此太陰而兼少陰之治也。如吐瀉。手足厥冷。煩躁欲死。不吐食。而吐涎沫。服理中湯。不應。宜吳茱萸湯佐之。此太陰而兼厥陰之治也。若三陰熱化之証。如太陰腹時痛。時止。用桂枝加芍藥湯。大便實而痛。用桂枝加大黃湯。少陰之証。而嘔渴。心煩不得眠。宜猪苓湯。心中

煩不得卧。宜黃連阿膠湯。厥陰之消渴。氣衝吐衄下利。宜烏梅丸。下利後重。喜飲水。用白頭翁湯等症。亦間有之。熱傷寒論者自知。而提綱不在此也。

陰陽證

二太擒

三陽獨取。太陽。三陰獨取。太陰。擒賊先擒王。起手段也。太陽陽明少陽為三陽。太陰少陰厥陰為三陰。

千古秘

理蘊深

三字經

卷二

四八

喻嘉言通禪理後。得異人所授。獨得千古之秘。胡白臣曰。習幼科者。能虛心領會。便可免平硜咎。若駭為異說。則造孽無極矣。

即痘疹

此傳心

痘為先天之毒。伏於命門。因感外邪。而發。初起時。用桂枝湯。從太陽。以化其氣。氣化。則毒不留。自無一切鬱熱諸症。何用服連翹紫草牛旁生地。犀角石膏。連諸藥。以致寒中。變症。平。及報點已齊。後其漿滿。易於結痂。而愈。當求之太陰。理中湯。補中。宮。土。氣。

以為成漿。脫。筋。之。本。亦。不。須。保。元。湯。及。能。耳。人。乳。糯。米。桂。圓。之。力。也。若。用。毒。藥。取。漿。先。損。中。宮。土。氣。漿。何。由。成。誤。人。不。少。此。古。今。痘。書。所。未。言。唯。張。隱。菴。侶。山。堂。類。辨。微。露。其。機。於。言。外。殆。重。其。道。而。不。敢。輕。洩。歟。疹。症。視。痘。症。稍。輕。亦。須。知。此。法。高。士。宗。醫。學。真。傳。有。桂。枝。湯。加。金。銀。花。紫。草。法。

誰同志

度金鍼

附敷藥拔風害人說

三字經

卷二

四九

金匱云人得風氣以生長。此一語最精。風即氣也。人在風中而不見風。猶魚在水中而不見水。鼻息出入。頃刻離風即死。但風靜即為養人之和風。風動即為殺人之邪風。若大人之中風。小兒之驚風。卒倒搐掣。角弓反張。目上視。口流涎。皆風動之象。即氣之乖也。醫者宜化邪風為和風。即所以除邪氣而匡正氣。聞中市醫。遇小兒諸病。及驚癇危症。以草麻

子巴豆南星萊菔子全蝎大黃急性子皂角為末。加檉皮冰片麝香。以香油或白蜜或薑葱汁調敷於顛門。以及胸中。臍中。足心。為拔風法。秘其方以射利。十數十死。既死而仍不歸。怨之者以為外敷之法不妨姑試。俟未效而即去之。似不為害。而不知一敷之後。元氣為其拔散。即揭去其藥。而既散之氣。永不能使之復聚矣。况顛門為元陽之會。胸中為宗

三字經

卷二

五九

氣之宅。臍中為性命之根。足心為腎脉之本。皆不可輕動。昔人以附子海狗腎補藥敷於臍中。而蒸之名醫。猶且戒其勿用。况大傷人之物乎。凡以保赤為心者。宜共攻此法。而又有感於急驚慢驚食積之說。慣用羌活獨活。防風秦艽前胡赤芍釣藤鉤荊芥天麻厚朴。神麩山查蒼朮膽星葶藶子蘿菔子貝母牛黃硃砂天竺黃枳殼杏仁石菖蒲甘草。或合

為一方。或分為二三方者。亦五十步笑百步耳。

三字經

醫學三字經卷三

閩吳航陳念祖修園著

男元豹道鹿古愚 女元犀道照靈石 全枝

中風方

小續命湯千金 中風總方

麻黃去節 人參 黃芩 川芎 白芍

炙草 杏仁 防己 桂枝 防風各一錢

附子五分

三字經 卷三

加生薑三片水二杯半先煎麻黃至二杯入諸藥煎八分服

古今錄驗續命湯 治中風風痺身體不能自

收持口不言昏冒不知痛處或拘急不能

轉側方出金匱附方

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏

乾薑 甘草各三錢 川芎一錢五分 杏仁三十

粒又一粒 取三分之一

水三杯煎一杯溫服當小汗薄復脊凭几汗出則愈不汗更服無所禁勿當風並治但伏不得臥效逆上氣面目浮腫

三化湯 治熱風中臟大便不通

大黃 羌活 枳殼 各二錢

水二杯煎八分服

稀涎散 治中風口禁並治單蛾雙蛾

巴豆 六枚每枚分兩片 牙皂 三錢 明礬 兩一

三字經 卷三

先將礬化開却入二味攪勻待礬枯為末每用三分吹喉中痰盛者燈心湯下五分在喉即吐在膈即下

參附湯 元氣暴脫以此方急回其陽可救

十中二

人參 兩一 附子 錢五

水二杯半煎八分服○此湯治腎氣脫○

以人參換白朮名朮附湯治脾氣脫○換

黃耆名耆附湯治衛氣脫○換當歸名歸

附湯治營氣脫

三生飲 治寒風中臟四肢厥冷痰涎上湧

生烏頭 二錢 生南星 三錢 生附子 錢一

木香 五分 生薑 片五

水二杯煎七分○薛氏用人參一兩煎湯

半杯調服

防風通聖散 治熱風卒中而經絡手足

三字經 卷三

痰癱內而臟腑二便閉塞用此兩解之較之三化湯較妥亦為類中風實火治法所用表藥火鬱發之之義也所用下藥益下抽薪之義也

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷

川芎 當歸 白芍 白朮 山梔

大黃 芒硝 各五分 黃芩 石膏 桔梗

錢各一 甘草 二錢 滑石 錢三

水二杯加生薑三片煎八分服。○自利去硝黃。○自汗去麻黃加桂枝。○涎嗽加半夏五味。

地黃飲子 治類中風腎虛火不歸源舌強不能言足廢不能行。○類中風虛火治法。

熱地 山茱肉 遠志 巴戟天

石斛 石菖蒲 五味子 肉蓯蓉洗

肉桂 麥冬 附子 茯苓各一錢

三字經 卷三 四

加薄荷葉七葉水二杯煎八分服。○此方法在輕煎。不令諸藥之味盡出。其性厚重以鎮諸逆。其氣味輕清速走清竅也。

補中益氣湯 治勞後飢飽過度致傷元氣氣虛而風中之。○此類中風氣中虛證更

有七氣上逆亦名氣中宜越鞠丸之類。

炙耆二錢 人參 白朮炒 當歸各一錢

炙草 陳皮各五分 升麻 柴胡各三分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

二陳湯 痰飲通劑

陳皮一錢五分 半夏 茯苓各三錢 炙草一錢

加生薑三片水三杯煎七分服。○加白朮

一錢蒼朮二錢竹瀝四湯匙生薑汁二湯

匙名加味二陳湯治類中風痰中證亦名

濕中以濕生痰也。○加枳實膽南星竹茹

名條痰湯

三字經 卷三 五

加味六君子湯 治中風王道之劑

方見隔食

加麥冬三錢為君附子一錢為使再調入

竹瀝五錢生薑汁二錢以行經絡之痰久

服自愈

資壽解語湯喻嘉言 治中風脾緩舌強不語半

身不遂與地黃飲子同意但彼重在腎此

重在脾

防風 附子 天麻 秦仁各一錢 羚羊
 肉桂各八分 羌活 甘草各五分
 水二杯煎八分入竹瀝五錢薑汁二錢五分服
 喻嘉言治腎氣不榮於舌本加枸杞首烏
 生地菊花天冬石菖蒲元參
 侯氏黑散金匱治大風四肢煩重心中惡寒不足者。外臺治風癩。

三字經

卷三

七

菊花兩 白朮 防風各一兩 桔梗八錢
 細辛 茯苓 牡蠣 人參 礬石
 常歸 川芎 乾薑 桂枝各三錢 黃芩
 右十四味杵為散酒服方寸匕約有八分
 錢五 日二服溫酒調服忌一切魚肉大蒜
 宜常冷食六十日止熱即下矣
 風引湯金匱除熱癰癩治大人風引少小驚

癰瘕癰日數十發
 大黃 乾薑 龍骨各二兩 桂枝一兩
 甘草 牡蠣各一兩 寒水石 赤石脂
 滑石 紫英石 白石脂 石膏各三兩
 右十二味研末粗篩以韋布盛之取三指
 約六七錢零 井花水一杯煎七分溫服按乾薑宜減半
 附錄中風俗方殺人以示戒
 俗傳中風方 風症以攻痰為大戒凡人將

三字經

卷三

七

死之頃皆痰聲漉漉不獨中風一症元陽
 無主一身之津血俱化為痰欲攻盡其痰
 是欲攻盡其津血也故錄此以為戒
 膽南星 寒厥火傷胃氣且能引痰入於心
 尚輕若九製 枳殼 耗散元氣痰成得此
 則為害愈酷 石菖蒲 能開心竅心竅開則痰
 涎如湯 石菖蒲 能開心竅心竅開則痰
 半夏 此藥雖能降逆開結但與 秦艽
 羌活 釣釣藤 天麻 羚羊 防風上已

六味雖風證所不忌。但無要藥。以
主。持之。亦徒成糟粕。無用之物。
真者難得。然亦。殭蠶雖祛風之正藥。
治火。痰之標品。雖力薄不足恃。
牛黃雖為風痰之妙藥。然與膽南星石菖
蒲枳殼同用。則反引痰入於心。竅
之弗。竹瀝以薑汁和之。雖能驅經絡之
出矣。而與膽星等同用。不待中
氣之。輸。不反致。寒中。敗胃之患。
長。君子道消。亦無如之何矣。
甘草雖為元老之才。但與諸藥同用。小人道

已上諸品。或作一方。或分作二三方。患者
誤服之。輕者致重。重者即死。即倖免於死。

三字經 卷三 八

亦必變為癡呆及偏枯無用之人矣。戒之
戒之。

虛癆方

歸脾湯 此方為補養後天第一藥。治食
少不眠怔忡吐血下血大便或溏或秘妄
夢健忘七情所傷遺精帶濁及女子不月
等證
炙蒼錢 人參 白朮 蒸 棗仁 炒

當歸身 茯神 龍眼肉 各二錢
炙草一錢 遠志五分 木香五分

水三杯煎八分溫服。高鼓峰去木香加

白芍一錢五分甚妙。咳嗽加麥冬二錢

五味七分。鬱氣加貝母二錢。脾虛痰

熱加丹皮梔子。

六味地黃丸 壯水之主以制陽光凡一切

吐血下血咳嗽不眠骨蒸遺精淋濁屬於

陰虛者無不統治之

熟地八兩 山茱肉 懷山藥 各四兩 丹皮

茯苓 澤瀉 各三兩

研末煉蜜丸如桐子大晒乾每服三錢淡

鹽湯送下一日兩服。加五味子名都氣

丸。加麥冬名八仙長壽丸治咳嗽。本

方改兩為錢水煎服名六味地黃湯

八味地黃丸 益火之源以消陰翳治腰膝

三字經 卷三 九

無力飲食不進腫脹疝瘕陽痿遺精帶濁
屬於元陽虛者無不統治之

即六味丸加附子 肉桂各一兩 ○本方去

附子名七味丸能引火歸源○本方去附

子加五味子名加減八味丸治大渴不止

○本方加牛膝車前子名濟生腎氣丸俗

金匱腎氣丸 治水腫喘促○本方減兩為錢水

煎服名八味湯

三字經 卷三

小建中湯仲景此方為治虛癆第一方今人不

講久矣凡癆證必有蒸熱此方有薑桂以

扶心陽猶太陽一出則熾火無光即退熱

法也凡癆證必飲食日少此方溫脾即進

食法也凡癆證必咳嗽此方補土以生金

即治嗽法也凡癆證多屬腎虛此方補脾

以輸精及腎所謂精生於穀也今人不能

讀仲景書反敢侮謗聖法徒知生脉六味

八味歸脾補中及欵冬貝母玉竹百合蘇

陳醬地黄炭之類互服至死誠可痛恨

生白芍三錢 桂枝一錢五分 炙草一錢

加生薑一錢五分大棗二枚水二杯煎八

分入飴糖三錢五分烱服○加黃耆二錢

名黃耆建中湯治虛癆諸不足飽悶者去

大棗加茯苓二錢氣逆者加半夏一錢五

分○此方人參當歸白朮俱隨宜加之

三字經 卷三 十一

金匱炙甘草湯 肺燥肺痿咽痛脉代等證

生地四錢 桂枝木一錢 阿膠五分 炙草

二錢 人參一錢 麥冬二錢五分 棗仁原方火

錢五分 加生薑一錢大棗二枚水二杯酒半杯煎

八分服

喻嘉言清燥救肺湯 治燥氣鬱而成癆

桑葉經霜者去 人參一錢 石膏二錢三分

三錢

杏仁去皮尖一分 甘草一分 麥冬一分
 枇杷葉去毛蜜炙一分 黑芝麻炒研一分
 水二杯半煎八分熱服。痰多加貝母三錢。或加梨汁半盞。

金匱薯蕷丸 治虛勞諸不足風氣百疾

薯蕷三十分 當歸 桂枝 麴 乾地黄

豆黃卷各十分 甘草二十分 人參 阿膠

各七 芍藥 白朮 麥冬

三字經 卷三

杏仁各五分 防風各六分 柴胡 桔梗 茯苓

乾薑三分 白朮二分 大棗百枚

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空

腹酒服一九一百丸為劑分去聲古以二

金匱大黃蠱虫丸 治五勞虛極羸瘦腹滿

不能飲食食傷憂傷房室傷飢傷勞傷經

絡榮衛傷內有乾血肌肉甲錯目黯黑緩

中補虛

大黃十分 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一分

杏仁升一 芍藥四兩 乾漆一分 乾地黄兩

蟲虫升一 水蛭個百 蟻螬升一 蠱虫升半

右十二味末之煉蜜丸如小豆大酒服五

丸日三服

愚按以菟血之品為補血之用仿於內經

四烏鱗骨一蘆茹丸張路玉以此丸藥料

及鮑魚入絨毛雞腹內黃酒童便煮爛汁

三字經 卷三

乾將雞去骨取肉同諸藥懸火上烘乾為

末加煉蜜為丸每服二錢以黃酒送下日

三服代蠱虫丸甚妥

咳嗽諸方

六安煎治外感咳嗽

半夏二錢 陳皮五分 茯苓二錢 甘草一分

杏仁二錢 白芥子炒研

加生薑七片水煎服。寒甚加細辛七分

○愚每用必去白芥子加五味子乾薑細辛

小青龍湯 治一切咳嗽

方見傷寒○方中隨寒熱虛實加減唯細

辛乾薑五味三藥不去讀金匱者自知

加減小柴胡湯 治發熱咳嗽

柴胡四錢 半夏二錢 黃芩 炙草各一錢

乾薑一錢 五味子八分

三字經 卷三 十四

水二杯半煎一杯半去滓再煎八分溫服一日二服

五味子湯金十 治傷燥欬唾中有血牽引胃腸

痛皮膚乾枯

五味子五分 桔梗 甘草 紫苑茸

續斷 竹茹 桑根皮各一錢 生地黃二錢

赤小豆一撮即赤豆之細者

右九味水煎空心服秘旨加白蜜一匙

愚按赤豆易生偏豆五錢圓圓不研最能退熱補肺但有寒熱往來忌之○去續斷赤豆地黃加歲藥門

冬乾薑細辛亦妙

麥門冬湯金十 治大病後火熱乘肺欬唾有血

胸膈脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而便秘

麥門冬二錢 桔梗 桑根皮 半夏

生地黄 紫苑茸 竹茹各一錢 麻黃七分

甘草五分 五味子十粒 生薑片

右十一味水煎空心服

瘡疾方

小柴胡湯方見 一切瘡病俱治

痢證方

芍藥湯 行血則膿血自愈調氣則後重自

除三日內俱可服

白芍 當歸各一錢 黃連 黃芩各一錢

分 桂 檳榔一錢 木香六分 甘草四分

大黃一錢 厚朴一錢 枳殼一錢

青皮五分

水二杯煎八分温服。小便不利加滑石

澤瀉。滯澁難出虛者倍歸芍實者倍大

黃。紅痢加川芎桃仁

人參敗毒散。喻嘉言最重此方。令微汗。則

陽氣升而陷者舉矣。此法時醫不講。余每

用此方加陳倉米四錢。或加黃芩黃連。必

用屢效。

三字經

卷三

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎

枳殼 茯苓 桔梗 人參已上各一錢

甘草五分

水二杯加生薑三片煎七分服。加倉米

名倉廩湯治噤口痢

心腹痛及胸痺方

烏梅丸方見傷寒治蟲痛

蘇合香丸 治注痛

拙著從衆錄有方論。又鬼注不去。宜虎

骨鹿茸羚羊角龍骨各三錢以羊肉湯煎

入麝香少許服。取腥羶之味引濁陰之氣

從陰而泄。此喻嘉言寓意草法也。

香蘇飲 治氣痛。一切感冒俱佳

香附二錢紫蘇葉三錢陳皮 甘草各一錢

加生薑五片水二杯煎八分服。心痛加

元胡索二錢酒一盞

三字經

卷三

七氣湯亦名四七湯治七情之氣鬱逆

半夏 厚朴 茯苓各三錢 紫蘇葉一錢

加生薑三片水二杯煎八分服

百合湯 治心口痛諸藥不效。亦屬氣痛

百合一兩 烏藥三錢

水三杯煎八分服。此方余自海壇得來

失笑散 治一切血滯作痛如神

五靈脂醋炒 蒲黃各一兩

共研末每服三錢以醋湯送下日二服

桃仁承氣湯 治心腹痛大便不通其人如

狂屬死血

桂枝二錢 桃仁十七枚 去皮尖 大黃四錢 芒硝

分七 甘草分七

水二杯煎八分去滓入硝二沸溫服

丹參飲 治心胸諸痛神驗婦人更宜○亦

屬血痛○亦可通治諸痛

三字經 卷三 大

丹參一兩 白檀香要真者極 砂仁各一

水二杯煎八分服

妙香散方見

平胃散 治一切飲食停滯

蒼朮 厚朴炒 陳皮各二錢 甘草一錢

加生薑五片水二杯煎八分服○肉積加

山查○麩積加麥芽萊服子○穀積加穀

芽○酒積加葛根砂仁

二陳湯方見

十棗湯 治水飲作痛峻劑不可輕用

大戟 芫花炒 甘遂各等分

用大棗十枚水二杯煎七分去滓入藥方

寸匕約有七分服次早當下未下再一服服後

體虛以稀粥調養

理中湯方見 治冷痛

吳茱萸湯方見 治冷痛○通治食穀欲嘔頭痛

三字經 卷三 九

如破煩躁欲死者及大吐不已之證

吳茱萸湯泡二錢 人參一錢 大棗五枚

生薑五錢

水二杯煎八分溫服

金鈴子散 治心口痛及脇痛腹痛如神○

屬熱者

金鈴子去核 元胡索各二兩

每服三錢黃酒送下

厚朴三物湯金匱治心腹實痛大便閉者

厚朴四錢 大黃二錢 枳實一錢五分

水二杯煎八分温服

厚朴七物湯金匱即前方加 桂枝 甘草

一分錢 生薑二錢五分 大棗二枚

水二杯煎八分服○嘔者加半夏一錢○

寒多者加生薑一錢五分

附子粳米湯金匱治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇

三字經 卷三 子

逆滿嘔吐

附子二錢 半夏四錢 炙草一錢 粳米五錢

布製 大棗二枚

水三杯煎八分温服日夜作三服

大黃附子湯金匱脇下偏痛發熱脉緊弦者

大黃 附子各三錢 細辛二錢

水二杯煎八分服

當歸生薑羊肉湯金匱治心腹諸痛虛極諸藥

不效者一服如神及脇痛裏急婦人產後

腹中疝痛

當歸七錢五分 生薑一兩二錢五分 羊肉四兩去筋膜用

藥戔秤方準

水五杯煎取二杯温服一杯一日兩服○

若寒多者加生薑五錢○痛多而嘔者加

橘皮五錢白朮二錢五分

括樓薤白白酒湯金匱治胸痺喘息欬唾胃背

三字經 卷三 子

痛寸沉遲關上小緊

括樓連皮子 薤白如乾者用三錢

白酒三杯煎八分服○加半夏二錢名括

樓薤白半夏湯治胸痺不得卧心痛徹背

大建中湯金匱治胃大寒痛嘔不能飲食腹中

寒上衝皮起出見有頭足上下痛不可觸

近

川椒二錢微炒出汗 乾薑四錢 人參三錢

水二鐘煎一鐘去滓入膠飴四錢煎取八分溫服如一次頃可食熱粥半碗

隔食反胃方

左歸飲景岳即六味湯去丹皮澤瀉加枸杞炙

草

啟隔飲悟心治食入即吐

川貝母錢五分 沙參錢三 丹參錢二

川鬱金錢五分 乾荷蒂錢三 砂仁錢四分

三字經

卷三

三

杵頭糠布包 茯苓錢五分 石菖蒲錢四分

水二杯煎一杯服

大半夏湯金匱治胃反

人參錢二 半夏俗用明礬製者不可用只

清水浸三日一日一換起蒸熱切片晒乾四錢

長流水入蜜揚二百四十遍取二杯半煎

七分服

吳茱萸湯方見心 腹痛

六君子湯 此方為補脾健胃祛痰進食之

通劑百病皆以此方收功

人參 白朮炒 茯苓 半夏各二錢

陳皮 炙草各一錢

加生薑五片大棗二粒水二杯煎八分服

○治反胃宜加附子二錢丁香藿香砂仁各一錢

附子理中湯 治反胃

三字經

卷三

三

即理中湯加附子三錢○治反胃宜加茯

苓四錢甘草減半

附隔食方法

人鏡經曰內經云三陽結謂之隔蓋足太

陽膀胱經水道不行手太陽小腸經津液

枯槁足陽明胃經燥糞結聚所以飲食拒

而不入縱入太倉還出喉嚨夫腸胃一日

一便乃常度也今五七日不便陳物不去

新物不納。宜用三一承氣湯。即次下之後。用脂麻飲。毀之。陳莖去。而腸胃潔。癥瘕盡。而營衛昌。飲食自進矣。

三一承氣湯

大黃 芒硝 甘草 厚朴 枳實各一

水二杯煎八分服。按此方太峻。姑存之。以備參考。

氣喘方

三字經

卷三

五

蘇子降氣湯

治上盛下虛氣喘等證

紫蘘子二錢 前胡 當歸 半夏

陳皮 厚朴各一錢 沉香 炙草各五分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

葶藶大棗瀉肺湯治支飲滿而肺氣閉氣

閉則呼吸不能自如用此苦降以泄實邪

葶藶子隔紙炒研如泥二錢二分

水一杯半大棗十二枚煎七分入葶藶服

之

十棗湯方見心腹痛

小青龙湯方見傷寒

貞元飲景岳陰血為陽氣之依歸血虛則氣無

所依時或微喘婦人血海常虛多有此證

景岳方意在濟之緩之四字濟之以歸地

緩之以甘草頗有意義今人加紫石英黑

鉛之重鎮則失緩之之義加沉香白芥子

三字經

卷三

五

之辛香則失濟之之義矣且此方非為元

氣奔脫而設時醫每遇大喘之證必以此

方大劑與服氣升則火升偶得濡潤之藥

氣亦漸平一响旋而陰柔之性與飲水混

為一家則胸膈間純是陰霾之氣其人頃

刻歸陰矣吾鄉潘市醫倡此法以局人神

智無一人悟及誠可痛恨

熟地黃五七錢或一二兩 當歸身三四錢 炙草

一二
三錢
水三四杯煎八分服

苓桂朮甘湯金匱治氣短。○喻嘉言云此治呼

氣短

茯苓四錢 白朮 桂枝各二錢 炙草一錢五分

水二杯煎八分服

腎氣丸金匱治氣短。○喻嘉言云此治吸氣短

即八味地黄丸但原方係乾生地黄桂枝

三字經

卷三

五

茯苓甘草大棗湯仲景治氣喘臍下動氣欲作

奔豚

茯苓六錢 桂枝 甘草炙各二錢 大棗四枚

用甘瀾水三杯半先煎茯苓至二杯入諸

藥煎七分服。○作甘瀾水法取長流水揚

之數百遍或千遍愈妙

真武湯 鎮水逆定痰喘之神劑

方見傷寒。○宜倍茯苓。○咳嗽甚者去生

薑加乾薑一錢五分五味細辛各一錢

黑錫丹 治脾腎虛冷上實下虛奔豚五種

水氣中風痰潮危急

喻嘉言曰凡遇陰火逆冲真陽暴脫氣喘

痰鳴之急證舍此方再無他法可施予每

用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且

欲吾身元氣溫養其藥藉手效靈厥功歷

歷可紀。即痘症倒瀉逆候服此亦可回生。

三字經

卷三

五

沉香 附子炮 胡蘆巴 肉桂各五錢

小茴香 補骨脂 肉豆蔻 木香

金鈴子去核各一兩 硫黃 黑鉛與硫黃炒成砂子各

三兩

右為末酒煮麪糊丸梧子大陰乾以布袋

擦令先瑩每服四五十丸薑湯送下

血證方

麻黃人參芍藥湯東垣治吐血外感寒邪內虛

蘊熱

桂枝 五分補 表虛

麻黃 去外 寒

黃芪 實表 益衛

炙甘草 補脾

白芍 安太 陰

人參 益元氣 而實表

麥冬 補肺氣 各三分

五味子 肺氣 五粒安

當歸 分五

和血 養血

水煎熱服。○按此方以解表為止血。是東垣之巧思。俾中非有定識也。觀其每味自注藥性。俱悖聖經。便知其陋。

三字經 卷三

甘草乾薑湯 金匱

炙甘草 四錢 乾薑 二錢 炮

水二杯煎八分服

栝葉湯 金匱 治吐血不止

栝葉 生用三錢無生 者用乾者二錢 乾薑 一錢 艾葉 生用

二錢如無用 乾者一錢

水四杯取馬通二杯煎一杯服。○如無馬通以童便二杯煎八分服

醫學三字經 卷三

黃土湯 金匱 治先便後血為遠血。○亦治衄血

吐血不止

灶心黄土 八錢原方四錢 生地 黃芩 甘草

阿膠 白朮 附子 炮各一錢五分

水三杯煎八分服

赤小豆散 金匱 治先血後便為近血

赤小豆 浸令出芽 晒乾一兩 當歸 四錢

共研末每服三錢漿水下 即洗米水三日 後有酸味是也

三字經 卷三

按凡止血標藥可隨宜作引。血餘灰 可用一兩

煎諸血。○梔子 茜草 乾側栝 治上血。槐花

生地 榆 烏梅 續斷 治血崩。○凡下血及血痢

口渴後重 脉洪有力者為火盛。可用苦參

子去殼。仁勿破。外以龍眼肉包之。空腹以

倉米湯送下九粒。一日二三服。漸加至十

四粒。二日效。

水腫方

醫學三字經 卷三

四六三

五皮飲 此方出華元化中藏經以皮治皮。不傷中氣。所以為治腫通用之劑。

大腹皮洗酒 桑白皮生各 雲苓皮錢四

陳皮錢二 生薑皮錢一

水三杯煎八分温服。上腫宜發汗加紫

蘇葉荆芥各二錢防風一錢杏仁一錢五

分。下腫宜利小便加防已二錢木通赤

小豆各一錢五分。喘而腹脹加生菜菹

三字經

卷三

三

子杏仁各二錢。小便不利者為陽水加

赤小豆防已地膚子。小便自利者為陰

水加白朮二錢蒼朮川椒各一錢五分。

熱加海蛤三錢知母一錢五分。寒加附

子乾薑各二錢肉桂一錢。嘔逆加半夏

生薑各二錢。腹痛加白芍二錢桂枝一

錢炙甘草一錢

導水茯苓湯 治水腫頭面手足遍身腫如

爛瓜之狀按而塌陷胸腹喘滿不能轉側。安睡飲食不下小便秘澇溺出如割或如黑豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此即漸利而愈。

澤瀉 赤茯苓 麥門冬去心 白朮各三

桑白皮 紫蘇 檳榔 木瓜各一

大腹皮 陳皮 砂仁 木香各七錢

右咬咀每服一二兩水二杯燈草三十根

三字經

卷三

三

煎八分食遠服。如病重者可用藥五兩

又加麥冬及燈草半兩以水一斗於砂鍋

內熬至一大碗再下小鈔內煎至一鍾五

更空心服

加減金匱腎氣丸 治脾腎兩虛腫勢漸大

喘促不眠等證

熟地兩四 雲白苓兩三 肉桂 牛膝

丹皮 山藥 澤瀉 車前子 山茱肉

各一附子五錢

研末煉蜜丸如桐子大每服三錢燈草湯送下一日兩服○以兩為錢水煎服名加

減金匱腎氣湯○但附子必倍用方效○加

川椒目一錢五分巴戟天二錢治脚面腫

風水因風而病水也

防已黃耆湯金匱治風水脉浮身重汗出惡風

防已三錢 炙草一錢五分 白朮二錢 黃耆三錢

三字經 卷三

生薑四片 大棗一粒

水二杯煎八分服服後如蟲行皮中從腰

下如冰後坐被上又以一被繞腰下温令

微汗瘥○喘者加麻黃○胃中不和者加

芍藥○氣上衝者加桂枝

虛汗自出故不用麻黃以散之只用防已

以驅之服後身如蟲行及腰下如冰云云

皆濕下行之徵也然非耆朮甘草焉能使

衛氣復振而驅濕下行哉

越婢湯金匱治惡風一身悉腫脉浮不渴續自

汗出無大熱者

麻黃六錢 石膏八錢 甘草二錢 生薑三錢

大棗五粒

水四杯先煮麻黃至三杯去沫入諸藥煎

八分服日夜作三服○惡風者加附子一

錢○風水加白朮四錢

三字經 卷三

前云身重為濕多此云一身悉腫為風多

風多氣多熱亦多且偏急風故用此猛劑

杏子湯 脉浮者為風水發其汗即已方關

或云即甘草麻黃湯加杏仁

皮水水行于皮中也其脉浮外證跗腫

曰其腹如鼓者不在內也曰當發其汗者

以水在皮也

防已茯苓湯金匱治四肢腫水在皮中聶聶動

者

防已 桂枝 黃耆各三錢 茯苓六錢

炙草錢一

水三杯煎八分服日夜作三服

藥亦同防已黃耆湯但去朮加桂苓者風水之濕在經絡近內皮水之濕在皮膚近外故但以苓協桂滲周身之濕而不以朮燥其中氣也不用薑棗者濕不在上焦之

三字經

卷三

五

營衛無取乎宣之也

蒲灰散金匱厥而為皮水者此主之屢甚而潰之為言之逆證厥

逆也

蒲灰斤半 滑石斤一

為末飲服方寸匕日三服愚按當是外敷法然利濕熱之劑亦可內服外疹也

越婢加朮湯金匱裏水此主之甘草麻黃湯亦

主之按裏水當是皮水筆誤也或水在

皮裏即皮水之重者亦未可知

方見風水

甘草麻黃湯

麻黃四錢 甘草二錢

水二杯先煮麻黃至一杯半去沫入甘草煮七分服重覆汗出不汗再服慎風寒

二藥上宣肺氣中助土氣外行水氣

正水水之正狀也其脈遲者水屬陰也外證自喘者陰甚于下不復與胸

三字經

卷三

五

中之陽氣相調水氣格陽而喘也其目窠如蠶而脰腫大諸證金匱未言無不見

愚按正水金匱未出方然提綱云脈沉遲

外證自喘則真武湯小青龍湯皆正治之

的方越婢加附子湯麻黃附子湯亦變證

之備方桂甘麻辛附子湯加生桑皮五錢

黑豆一兩為窮極之巧方此正水之擬治

法也

石水 謂下焦水堅如石也其脉自沉外證少腹滿不喘

麻黃附子湯

麻黃 錢三 炙草 錢二 附子 錢一

水二杯先煮麻黃至一杯半去沫入諸藥煎七分湯服日作三服

此即麻黃附子甘草湯分兩畧異即以溫經散寒之法變為溫經利水之妙

黃汗 汗出沾衣而色黃也汗出入水水邪傷心或汗出當風所致汗與水

三字經

卷三

三

皆屬水氣因其入而內結則鬱熱而黃其脉沉而遲外證身發熱四肢頭面腫久不愈必致癰膿

黃耆桂枝芍藥苦酒湯 治身體腫發熱汗

出而渴狀如風水汗出沾衣色正黃如藥

汗脉自沉 風水脉浮以汗出入水中浴水

從毛孔入得之 水氣從毛孔入而傷其心

搏結而脉沉也凡看書宜活看此證亦有從酒後汗出當風所致者雖無外水而所出之汗因風內蒸而成黃皆可以汗出入久生熱濕熱交蒸而成黃皆可以汗出入

水之意

悟之

黃耆 錢五 芍藥 桂枝 各三

苦酒一杯半水一杯煎八分溫服當心煩至六七日乃解 心煩出于心苦酒止之太急邪自退也

桂枝加黃耆湯 治黃汗之病兩脰自冷盜汗出汗已反發熱久久身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久

三字經

卷三

三

必身痠即胸中痛又從腰已上汗出下無汗腰腕弛痛如有物在皮中狀如刺者不

能食身疼重煩躁小便不利 已上皆黃汗

擬之以立治法茲因集此為黃汗言證而

此源總由水氣傷心所致結 桂枝 芍藥 生薑 各三 甘草 炙

黃耆 各二 大棗 四枚

水三杯煮八分溫服須臾啜熱粥一杯餘

以助藥力。溫覆取微汗。若不汗更服。前方止汗。是治黃汗之正病法。此方令微汗。是治黃汗之變證法。

脹滿壅脹方

七氣湯 方見心 治實脹屬七情之氣者

胃苓散 消脹行水

蒼木 一錢五分 白朮 各一錢 厚朴 各五分 桂枝 一錢

陳皮 一分 澤瀉 一分 猪苓 各五分 炙草 一錢

三字經

卷三

天

七分 茯苓 四錢

加生薑五片。水三杯。煎八分。服。去桂草。

以煨半熟。蒜頭搗為丸。陳米湯下。三四錢。

一日兩服。更妙。

三物厚朴湯 七物厚朴湯 二方便

桂甘薑棗麻辛附子湯 治氣分心下堅大

如盤邊如旋盃

桂枝 生薑 各三錢 甘草 麻黃 細辛

各二 附子 一錢 大棗 三枚 水三杯。先煮麻黃至二杯。去沫。入諸藥。煎八分。溫服。日夜作三服。當汗出。如虫行皮中。即愈。

此證是心腎交病。上不能降。下不能升。日積月累。如鐵石難破。方中桂甘薑棗。以和其上。而復用麻黃附子細辛。少陰的劑。以治其下。庶上下交通。而病愈。所謂大氣一

三字經

卷三

天

轉其氣乃散也。

枳朮湯 治心下堅大如盤。如盤而不知。盈

雖堅大而水飲所作。形與氣分。有別也。氣無

形以苦。泄之。枳實 二錢 白朮 四錢

水二杯。煎八分。服。日夜作三服。腹中硬。即

止。

禹餘糧丸 治十腫水氣脚膝腫上氣喘急

禹餘糧丸 治十腫水氣脚膝腫上氣喘急

小便不利但是水氣悉皆主之許學士及丹溪皆云
 此方治臟腑之要藥
 服之要藥
 蛇含石燒大者三兩以新鐵銚盛入炭火中
 黃傾入醋中候黃與銚子一版紅用銚取蛇
 冷取出研極細禹餘糧石三真針砂
 五兩先以研水淘淨炒乾入餘糧一處用米
 醋二升就銚內煮醋乾為度後用銚并藥
 入炭中燒紅銚不研藥
 淨磚地上候不研藥
 以三物為主其次量入虛實入下項妙治水
 轉輸比方三物既非大戟甘遂芫花之比
 又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

三字經 卷三

羌活 木香 茯苓 川芎 牛膝酒浸
 桂心 蓬朮 附子炮 乾薑炮 青皮
 白豆蔻炮 大茴香炒 京三稜炮
 白蒺藜 當歸酒浸一宿
 右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水
 和藥再杵極勻丸如桐子大食前溫酒白
 湯送下三十九至五十九最忌鹽一毫不
 可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小

便內旋去不動臟腑病去日日三服兼以
 溫和調補氣血藥助之真神方也
 此方昔人用之屢效以其大能煖水藏也
 服此丸更以調補氣血藥助之不為峻也

暑證方

六一散河治一切暑病

滑石六兩 甘草一兩

研末每服三錢井花水下或燈草湯下

三字經

卷三

里

白虎湯仲治傷暑大渴大汗之證

方見傷寒○加人參者以暑傷元氣也○

加蒼朮者治身熱足冷以暑必挾濕也

香薷飲 治傷暑發熱身寒口燥舌乾吐瀉

甘草一錢 厚朴五分 扁豆二錢 香薷四錢

水二杯煎八分冷服或溫服○瀉利加茯苓

苓白朮○嘔吐加半夏○暑氣發搐加羌

活秦艽

大順散 治陰暑即畏熱貪涼之病

乾薑一錢 甘草八分 杏仁六分
炒 炒 去皮尖

肉桂六分

共為末每服三錢水一杯煎七分服。如

煩躁并花水調下一錢半

生脉散 却暑良方

人參一錢 麥冬三錢 五味一錢

水一杯半煎七分服

三字經

卷三

聖

清暑益氣湯東垣

炙耆一錢五分 人參 白朮 蒼朮

青皮 陳皮 麥冬 猪苓 黃柏各五分

乾葛 澤瀉各一錢 神麩八分 五味

炙草各三分 升麻三分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎七分服

一物瓜蒂湯金匱

瓜蒂二十個

水二杯煎八分服

泄瀉方

胃苓散 方見脹滿。○加減詳三字經小注

四神丸 治脾腎虛寒五更泄瀉

補骨脂四兩 肉豆蔻去油 吳茱萸泡

五味炒各二兩

用紅棗五兩生薑五兩同煮去薑將棗去

皮核搗爛為丸如桐子大每日五更服三

三字經

卷三

聖

錢臨臥服三錢米湯下。○加白朮附子罌

粟人參更效

生薑瀉心湯 黃連湯 甘草瀉心湯

半夏瀉心湯 乾薑黃芩黃連人參湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯已上六方俱見傷寒論

按已上諸法與內經中熱消癰則便寒寒

中之屬則便熱一節。按脉證而擇用甚驗。

張石頑醫通載之甚詳。但古調不彈久矣。

余新悟出一方。有瀉心之意。上可消痞。下可止瀉。腸熱胃寒。能分走而各盡其長。非有他方。即傷寒厥陰條之烏梅丸也。屢用屢驗。

三字經 卷三

醫學三字經卷四

閩吳航陳念祖修園著

男元豹道彪古愚全校

眩暈方

一味大黃散 鹿茸酒

二方見上三字經小註

加味左歸飲 治腎虛頭痛如神並治眩暈

目痛

三字經 卷四

熟地七八錢 山茱萸 懷山藥 茯苓

枸杞各三錢 肉蓯蓉酒洗切片三四錢 細辛

炙草各一錢 川芎二錢

水三杯煎八分溫服

正元丹秘旨 治命門火衰不能生土吐利厥冷

有時陰火上衝則頭面赤熱眩暈惡心濁

氣逆滿則胸脇刺痛臍肚脹急

人參三兩用附子一兩 黃耆一兩五錢 用川芎一



兩酒煮收 入去川芎 山藥 一兩用乾薑三錢
煎汁收入晒乾 陳皮五錢 茯苓二兩用肉
白木 煎汁收入晒乾 甘草 一兩五錢用烏藥
勿見火去桂 烏藥 一兩五錢用烏藥

右六味除茯苓文武火緩緩焙乾勿炒傷藥性杵為散每服三錢水一盞薑三片紅棗一枚擘煎數沸入盞一捻和滓調服服後飲熱酒一杯以助藥力

三字經

卷四

二

嘔噦吐方

二陳湯

半夏 二錢

陳皮 一錢

茯苓 三錢

炙草 八分

加生薑三片水二杯煎八分服。加減法

詳三字經小註

小柴胡湯

方見傷寒

吳茱萸湯

方見傷寒

大黃甘草湯

治食已即吐

大黃 五錢 甘草 一錢五分
水二杯煎八分服

乾薑黃連黃芩人參湯 景仲凡嘔家夾熱不利於香砂橘半者服此如神

乾薑 不炒 黃芩 黃連 人參 各一錢
水一杯半煎七分服

進退黃連湯

黃連 薑汁 乾薑 炮 人參 一錢五分

三字經

卷四

三

桂枝 一錢 半夏 薑製一錢五分 大棗 二錢

進法用本方七味俱不製水三茶杯煎一杯溫服退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如上逐味製熟煎服法同但空朝服崔氏八味丸三錢半飢服煎劑耳

癲狂癇方

滾痰丸

王隱

治一切實痰異症孕婦忌服

青礞石

三兩研如米大同煅硝三兩入新磁罐內封固以鉄線札之外以盞

泥封固煨過研
末水飛二兩實
沉香一兩
川大黃酒蒸

黃芩八兩
共為末水泛為丸菜豆大每服一錢至二

錢食遠沸湯下

生鐵洛飲 治狂妄不避親疏

鐵洛 一蓋用水六杯煮
取三杯入下項藥 石膏一兩龍齒

茯苓 防風各七分 黑參 秦老各五錢

鐵洛水三杯煎一杯服一日兩服

三字經

卷四

四

當歸承氣湯秘傳 治男婦痰迷心竅踰牆越

壁胡言亂走

歸尾一兩 大黃酒洗 芒硝 枳實 厚朴

各五錢 炙草三錢

水二杯煎八分服

溫膽湯 駱氏內經拾遺云癲狂之由皆是

膽涎沃心故神不守舍理宜溫膽亦治癩

病

即二陳湯加枳實鮮竹茹各二錢或調下
飛礬分半

當歸龍薈丸 治肝經實火大便秘結小便

澀滯或胸膈疼痛陰囊腫脹九屬肝經實

火皆宜用之

葉天士云動怒驚觸致五志陽越莫制狂

亂不避親疎非苦降之藥未能清其神

識也

三字經

卷四

五

當歸 龍膽草 梔子仁 黃柏 黃連

黃芩各一兩 大黃 蘆薈 青黛各五錢

木香五分 麝香五分

共為末神麩糊丸每服二十九薑湯下

丹礬丸醫通 治五癩

黃丹一兩 白礬二兩

二味入銀罐中煨通紅為末入臘茶一兩

不落水猪心血為丸珠砂為衣每服三十

丸茶清下久服其涎自便出半月後更以

安神藥調之按猪心血不粘宜加煉蜜少許合搗

磁硃丸 治癩狂癩如神

磁石二兩 硃砂一兩 六神麩三兩生研

共研為末另以六神麩一兩水和作餅煮浮入煎藥加煉蜜為丸如麻子大沸湯下

二錢○解見時方歌括

五淋癰閉赤白濁遺精方

三字經 卷四 六

五淋湯

赤茯苓錢三 白芍 山柰名二 當歸

細甘草各一錢四分

加燈心十四寸水煎服○解見時方歌括

滋腎丸 又名通關丸治小便點滴不通及

治衝脉上逆喘呃等證

黃栢 知母各一兩 肉桂一錢

共研末水泛丸桐子大陰乾每服三錢淡

益湯下

補中益氣湯方見中風治一切氣虛下陷

單解分清飲 治白濁

川草薺錢四 益智仁 烏藥各一錢五分

石菖蒲錢一

一本加甘草稍一錢五分茯苓二錢

水二杯煎八分入益一捻服一日兩服

四君子湯方見時方歌括歌曰白濁多因心氣虛不

三字經 卷四 七

應只作腎虛醫四君子湯加速志一服之

間見效奇

龍膽瀉肝湯 治脇痛口苦耳聾筋疼陰濕

熱癢陰腫白濁溲血

龍膽草分三 黃芩 梔子 澤瀉各一

木通 車前子各五分 當歸 甘草

生地各三分 柴胡一錢

水一杯半煎八分服

五倍子丸 治遺精固脫之方

五倍子青鹽煮 茯苓各二

為末煉蜜丸桐子大每服二錢鹽湯下日

兩服

妙香散

懷山藥二 茯苓 茯神 龍骨 遠志

人參各一 桔梗五 木香三 甘草一

麝香一 硃砂二

三字經

卷四

八

共為末每服三錢蓮子湯調下

疝氣方

五苓散仲景本方治太陽證身熱口渴小便少

○今變其分兩借用治疝

猪苓 澤瀉 茯苓各二 肉桂一

白朮四

水三杯煎八分服○加木通川練子各一錢五分橘核三錢木香一錢

三層茴香丸 治一切疝氣如神

大茴香五錢同鹽五錢 川練子一

沙參 木香各一

為末米糊丸如桐子大每服三錢空心温

酒下或鹽湯下纔服盡接第二料

又照前方加葶撥一兩檳榔五錢共五兩半

依前丸服法若未愈再服第三料

又照前第二方加茯苓四兩附子炮一兩共

三字經

卷四

九

前八味重十兩九服如前雖三十年之久

大如檗栳皆可消散神效

千金翼洗方 治丈夫陰腫如斗核中痛

雄黃末一 礬石二 甘草七

水五杯煎二杯洗

消渴方

白虎湯 調胃承氣湯 理中丸 烏梅丸

四方俱見湯寒

腎氣丸 六味湯 炙甘草湯三方俱見虛癆

麥門冬湯

麥門冬四錢 半夏一分錢 人參二錢 粳米

炙甘草二錢 大棗二枚

水二杯煎八分溫服

麻仁丸

火麻仁二兩 芍藥 枳實各五錢 大黃

厚朴各一兩

三字經

卷四

十一

研末煉蜜丸如桐子大每服十九米飲下以知為度

痰飲方

王師齋化痰丸 治津液為火薰蒸凝濁鬱

結成痰根深蒂固以此緩治之

香附童便侵炒五錢 橘紅一兩 辰萎仁一兩

黃芩酒炒兩錢 天門冬 海粉各一兩 青黛三錢

芒硝三錢另研 桔梗五錢 連翹五錢

共為研末煉蜜入生薑汁少許為丸如彈子大每用一丸噙化或為小九薑湯送下

二錢

苓桂木甘湯金匱 治胸脇支滿目眩○并治飲

邪阻滯心肺之陽令呼氣短

腎氣丸 治飲邪阻滯肝腎之陰令吸氣短

二方俱見喘證方

甘遂半夏湯金匱 治飲邪流連不去心下堅滿

三字經

卷四

十一

甘遂大者三枚 半夏湯洗七次十二枚以水

芍藥五枚約今 甘草如指一錢三分

水二杯煎六分去滓入蜜半盞再煎至八

分服

程氏曰留者行之用甘遂以決水飲結者

散之用半夏以散痰飲甘遂之性直達恐

其過於行水緩以甘草白蜜之甘堅以芍

藥之苦雖甘草甘遂相反而實以相使此

苦堅甘緩約之之法也。靈樞經曰約方猶約囊。其斯之謂與。尤氏曰甘草與甘遂相反而同用之者。蓋欲其一戰而留飲盡去。因相激而相成也。芍藥白蜜不特安中亦緩毒藥耳。

十棗湯金匱治懸飲內痛。亦治支飲方見腹痛

大青龍湯金匱治溢飲之病。屬經表屬熱者宜此涼發之。

三字經

卷四

十一

小青龍湯金匱治溢飲之病。屬經表屬寒者宜此溫發之。已上一方俱見傷寒

木防已湯金匱人膈中清虛如太空。然支飲之氣乘之。則滿喘而痞堅。面色黧黑。脉亦沉緊。得之數十日。醫者吐之。下之。俱不愈。宜以此湯開三焦之結。通上下之氣。

木防已三錢 石膏六錢 桂枝二錢 人參四錢
水二杯煎八分溫服

木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯金匱前方有人參吐下後水邪因虛而結者服之即愈。若水邪實結者雖愈而三日復發。又與前方不應者。故用此湯去石膏之寒。加茯苓直輸水道。芒硝峻開堅結也。○又此方與小青龍湯治吼喘病甚效。

木防已二錢 桂枝二錢 茯苓四錢 人參四錢 芒硝五分

三字經

卷四

十二

水二杯半煎七分去滓入芒硝微煎溫服。微利自愈。

澤瀉湯金匱支飲雖不中正而迫近於心。飲邪上乘清陽之位。其人苦冒眩。胃者昏冒而神不清。如有物冒蔽之也。眩者目旋轉而乍見眩黑也。宜此湯。

澤瀉五錢 白朮二錢
水二杯煎七分溫服

厚朴大黃湯金治支飲胸滿支飲原不中正

偏故直驅之

從大便出厚朴二錢大黃三錢枳實一分

水二杯煎七分溫服

葶藶大棗瀉肺湯金治支飲不得息

方見氣喘

小半夏湯金治心下支飲嘔而不渴

半夏四錢生薑八錢

一字經 卷四 十四

水二杯煎八分溫服

已椒薑黃九金治腹滿口舌乾燥腸間有水氣

防已一兩椒目一兩葶藶一兩大黃各一兩

共為細末煉蜜丸如梧子大先飲食服一

九日三服稍增之口中有津液渴者加芒

硝半兩

程氏曰防已椒目導飲於前清者從小便

而出大黃葶藶推飲於後濁者從大便而

下此前後分消則腹滿減而水飲行脾氣轉而津液生矣

小半夏加茯苓湯金治卒然嘔吐心下痞

膈間有水氣眩悸者

即小半夏湯加茯苓四錢

五苓散金治臍下悸吐涎沫而顛眩此水也

澤瀉六兩猪苓二兩茯苓四兩白朮各一兩

十黍為一株約今四分一釐七毫桂枝半兩

三字經 卷四 十五

為末白飲和服方寸匕日三服多煖水汗

出愈六錢為一分即今之二錢半也澤瀉

應七錢五分也方寸匕者匕即匙也

是正方一寸六分約八九分也奈用二錢

愚按臍下動氣去木加桂理中丸法也今

因吐涎沫是水氣盛必得苦燥之白朮方

能制水顛眩是土中濕氣化為陰霾上彌

清竅必得溫燥之白朮方能勝濕證有兼

見法須變通

附方外臺茯苓飲 治積飲既去而虛氣塞滿

其中不能進食此證最多此方最妙

茯苓 人參 白朮 各一錢 枳實 一錢

橘皮 一錢二分 生薑 二錢

水二杯煎七分服一日三服

徐忠可曰俗謂陳皮減參力此不唯陳皮

且加枳實之多補瀉並行何其妙也

三因白散

三字經

卷四

六

滑石 五錢 半夏 三錢 附子 二錢

共研末每服五錢加生薑三片蜜三錢水

一杯半煎七分服

傷寒方

太陽

桂枝湯

桂枝 芍藥 各三錢

切 大棗 四枚

甘草 二錢

生薑 三錢

水二杯煎八分溫服服後少頃飲粥一杯

麻黃湯

麻黃 三錢去根節 桂枝 二錢 杏仁 十三枚

甘草 一錢

水三杯先煮麻黃至二杯吹去上沫納諸

藥煎八分溫服不須歌粥餘將息如前法

三字經

卷四

七

大青龍湯

麻黃 六錢去根節 桂枝 二錢 甘草 二錢 杏仁 十枚

去皮尖 生薑 三錢切片 大棗 四枚 石膏 碎

水四杯先煮麻黃至二杯半去上沫納諸

藥再煮八分溫服溫覆取微似汗汗出多

者以溫粉撲之 龍骨 研末 若汗多亡陽

者以真武湯救之

小青龍湯

麻黃去根

白芍

乾薑炒不

甘草

桂枝各二

半夏錢三

五味子錢一

細辛

分八

水三杯半先煮麻黃至二杯半去沫納諸藥煎八分溫服○若渴者去半夏加栝樓根二錢○若噎者去麻黃加附子一分○小便不利小腹滿去麻黃加茯苓四錢○若

三字經

卷四

大

喘者去麻黃加杏仁二十一枚○按論云若微利者去麻黃加薤花今薤花不常用時法用茯苓四錢代之即猪苓澤瀉亦可代也但行道入當於方後註明

桂枝加葛根湯

即桂枝湯加葛根四錢

水三杯半先煮葛根至二杯半吹去沫入諸藥煎至八分溫服不須啜粥

葛根湯

葛根錢四

麻黃錢三

生薑錢二

甘草錢二

桂枝錢二

大棗錢四

白芍錢二

水三鐘半先煮麻黃葛根至二杯去沫入諸藥至八分溫服微似汗不須啜粥

陽明

白虎湯

石膏八錢碎

知母錢三

炙草錢一

粳米

三字經

卷四

九

水三杯煎一杯服錢四

調胃承氣湯

大黃四錢清

炙草錢二

芒硝錢三

水二杯半先煮大黃甘草取一杯去滓入芒硝微煮令沸少少溫服之

小承氣湯

大黃錢四

厚朴

枳實各二錢

水二杯煎八分服初服當更衣不爾者再煮服若更衣勿服

大承氣湯

大黃_{二錢} 厚朴_{四錢} 枳實_{各二錢} 芒硝_{各二錢}

水三杯先煮枳實厚朴至一杯半去滓納大黃煮一杯去滓納芒硝微火煮一二沸服得下勿再服

少陽

三字經

卷四

子

小柴胡湯

柴胡_{四錢} 人參 黃芩 炙草 生薑_{各錢五}

半夏_{二錢} 大棗_{二枚}

水三鐘煎一鐘去滓再煎八分溫服一日

夜作三服

胸中煩而不嘔者去半夏人參加括樓二錢○渴者去半夏加人參七分括樓根二錢○腹中痛者去黃芩加芍藥一錢半○

脇下痞鞭去大棗加牡蠣二錢○心下悸小便不利者去黃芩加茯苓二錢○不渴外有微熱者去人參加桂枝一錢五分溫覆取微似汗愈○欬者去人參大棗生薑加五味子一錢乾薑一錢五分

大柴胡湯

柴胡_{四錢} 半夏_{二錢} 黃芩 芍藥 枳實

各錢半 生薑_{二錢五分} 大棗_{二粒}

三字經

卷四

五

一木有大黃五分

水三鐘煎八分溫服一日夜作三服

太陰

理中丸湯

人參 白朮 乾薑 甘草_{各三兩}

共研末蜜丸如雞子黃大研碎以沸湯服一九日三四服服後吸熱粥以腹熱為度或用各三錢水三鐘煎八分溫服服後吸

熱粥○若臍上築者去朮加桂○吐多者去朮加生薑二錢下多者還用朮○悸者加茯苓渴欲飲水者加朮○腹痛者加人參○寒者加乾薑○腹滿者去朮加附子○服湯後如食頃飲熱粥微自溫勿揭衣被

四逆湯

甘草四錢 乾薑三錢 附子二錢
生用

三字經

卷四

五

水三鐘煎八分溫服

通脈四逆加入尿猪膽湯

乾薑六錢 甘草四錢 附子二錢
生用

水三鐘煎八分加猪膽汁一湯匙入尿半湯匙溫服

桂枝加芍藥湯

桂枝各三錢 生薑各三錢 大棗四枚 芍藥六錢 炙草二錢

水三杯煎一杯服

桂枝加大黃湯

桂枝各三錢 生薑各三錢 芍藥六錢 炙草二錢

大黃七分 大棗四枚

水三杯煎八分服

少陰

麻黃附子細辛湯

麻黃去根 細辛各三錢 附子一錢
五分

三字經

卷四

五

水三鐘先煮麻黃至二鐘去沫入諸藥煎七分溫服

麻黃附子甘草湯

麻黃去根 甘草各三錢 附子一錢
五分

煎法同上

通脈四逆湯

乾薑六錢 炙草四錢 附子二錢
生用 水三杯煎八分溫服

白通湯

乾薑^{三錢} 附子^{三錢} 葱白^{二根}

水三杯煎八分温服

吳茱萸湯

吳茱萸^{三錢} 湯泡 人參^{一分} 大棗^{四枚}

生薑^{六錢}

水煎服

猪苓湯

猪苓 伏苓 澤瀉 滑石 阿膠^{各三錢}

水一杯先煎四味至一杯去滓入膠煎化服

黃連阿膠雞子黃湯

黃連^{四錢} 黃芩^{一錢} 芍藥^{二錢} 阿膠^{五錢}

雞子黃^{一枚}

水二杯半煎一杯半去滓入膠烺盡小冷

入雞子黃攪令相得温服一日三服

大承氣湯

方見陽明厥陰

烏梅丸

烏梅^{九十枚} 細辛^{六錢} 乾薑^{一斤} 當歸^{四錢}

黃連^{一斤} 附子^{六錢} 蜀椒^{四錢}

桂枝 人參 黃柏^{各六錢}

各另研末合篩之以苦酒浸烏梅一宿去核飯上蒸之搗成泥入煉蜜共搗千下丸

如梧子大先飲食白飲服十九日三服漸加至二十九

當歸四逆湯

當歸 桂枝 白芍^{各三錢} 甘草^炙

木通 細辛^{各二錢} 大棗^{八粒} 又^{一粒} 取

水三杯煎八分温服○寒氣盛者加吳茱萸

黃二錢半生薑八錢以水二杯清酒二杯

煮取一杯半温分二服

白頭翁湯

白頭翁錢一 黃連 黃蘗 秦皮各一錢五分

水二杯煎八分溫服

餘詳於時方妙用附錄傷寒門

瘟疫方

人參敗毒散方見痢疾 防風通聖散方見中風

藿香正氣散 治外受四時不正之氣內停

飲食頭痛寒熱或霍亂吐瀉或作瘧疾

三字經

卷四

三

藿香 白芷 大腹皮 紫蘗 茯苓各三

陳皮 白木 厚朴 半夏各二

桔梗各二 甘草一兩

每服五錢加薑棗煎

神聖辟瘟丹留傳在世間正元焚一炷四季

保平安此歌出廣久香案函

羌活 獨活 白芷 香附 大黃

甘松 三奈 赤箭 雄黃各等分 蒼朮

倍用

右為末麴糊為丸彈子大黃丹為衣晒乾
正月初一侵晨焚一炷辟瘟

婦人科方

四物湯 統治婦人百病

當歸身 熟地 白芍酒炒各三錢 川芎一錢五分

水三杯煎八分服○加製香附二錢研碎

炙草一錢○加減詳三字經

三字經

卷四

三

歸脾湯方見虛勞

逍遙散治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之

源血氣日枯漸至經脉不調者

當歸三錢 芍藥一錢五分 熟地五錢 棗仁二錢

炒 茯神一錢五分 遠志五分 陳皮八分

炙草一錢

水三杯煎八分服○氣虛加人參○經滯

痛加香附

按方雖庸陋能滋陽明之原故從俗附錄之地黃生用佳

當歸散金瘦而有火胎不安者宜此

當歸一斤 黃芩一斤 芍藥一斤 苦蕒一斤 白朮一斤

共研末酒服方寸匕今用一錢日再服○

妊娠常服即易產胎無疾苦產後百病悉

主之。

白朮散金肥白有寒胎不安者此能養胎

白朮一斤 川芎一斤 川椒一斤 牡蠣一斤

為末酒服一錢匕今用一錢日三服夜一

三字經 卷四 三

服但苦痛加芍藥心下毒痛加川芎心煩

吐痛不食加細辛半夏服之後更以醋漿

服之復不解者小麥汁服之已後渴者大

麥汁服之病雖愈服勿置

保生無憂散婦人臨產先服一二劑自然易

神效

當歸一斤 酒洗五 川貝母一斤

艾葉一斤 酒芍一斤 冬一錢 日一錢 兔絲子一斤 四分

厚朴薑汁炒 荆芥穗八分 枳殼麩炒

川芎一斤 羌活一斤 甘草一斤 五分

加生薑三片水二杯煎八分空心服

此方全用撐法當歸川芎白芍養血活血

者也厚朴去瘀血者也用之撐開血脈俾

惡露不致填塞羌活荆芥疏通太陽將背

後一撐太陽經脈最長太陽治則諸經皆

治枳殼疏理結氣將面前一撐俾胎氣飲

三字經 卷四 无

抑而無阻滯之虞艾葉溫煖子宮撐動子

宮則胞胎靈動貝母兔絲最能滑胎順氣

將胎氣全體一撐大具天然活潑之趣矣

加黃耆者所以撐扶元氣元氣旺則轉動

有力也生薑通神明去穢惡散寒止嘔所

以撐扶正氣而安胃氣甘草協和諸藥俾

其左宜右而全其撐法之神也此方人多

不得其解程小齡註獨起故全錄之

加味歸芎湯

川芎三錢 當歸身五錢 龜板三錢

婦人生過男女頂門髮燒如雞子大

水三杯煎八分服如人行五里路即生

當歸補血湯

當歸三錢 炙耆一兩

水煎服○加附子三錢神效或加桂一錢

失笑散

方見心腹痛

三字經

三

生化湯

當歸五錢 川芎二錢 乾薑五分 桃仁一錢

五分去 甘草一錢

水二杯煎八分服○產後風口噤角弓反

張者宜加荆芥穗三錢○又方中風口噤

用華陀愈風散即荆芥穗一味焙為末勿

焦黑以童便和酒送下口噤藥不下者用

一兩粳以童便煎好從鼻孔灌下

當歸生薑羊肉湯

竹葉湯金匱 治產後中風病瘕發熱面正赤喘

而頭痛

鮮竹葉四十片 葛根三錢 防風一錢 桔梗

桂枝人參 附子炮 甘草各一錢 大棗

五枝 生薑五錢

水三杯煎八分溫服溫覆使汗出日夜作

三服○頭項強加附子五分前藥揚去沫嘔

三字經

卷四

三

者加半夏二錢

愚按自汗者去葛根加括樓根三錢附子

五分○產後瘕證十中只可救一除此方

外無一善方

甘麥大棗湯

甘草三錢 小麥一兩 大棗十枚

水三杯煎一杯服日作三服

金匱方只錄五首餘見拙著金匱說說金

匱讀內。二書即欲梓行。集隘不能盡登。

小兒科方

小兒無專方。已上諸方。折為小劑。用之。今兒科開口。即曰食。曰驚。曰風。曰疳。所用之藥。大抵以鈎藤。秦艽。防風。羌活。獨活。天麻。前胡。全蝎。僵蠶。為祛風之品。硃砂。牛黃。膽星。石菖蒲。天竺黃。代赭石。青黛。赤芍。金銀煎湯。為定驚之品。以山查。神麴。麥芽。穀芽。萊菔子。枳殼。厚

三字經

卷四

三

朴。檳榔。草果。為消食之品。以蕪荑。榧子。史君子。螟蛉土。五穀蟲。為治疳之品。如杏仁。葶藶。酒岑。桑白皮。半夏。麴。蘓陳皮。貝母。天花粉。之類。謂為通用。調氣化痰之善藥。父傳子。師傳徒。其端方。皆殺人之具也。錢仲陽以金石之藥為倡。猶有一二方。近道處。至鐵鏡。朱微湯。則亂道甚矣。近日兒科。只用已上所列諸藥。任意寫來。造孽無已。實堪痛恨。

附錄

陰陽

識一字便可為醫說

客有問於余曰。醫之為道。乃古聖人洩天地之秘。奪造化之權。起死回生。非讀破萬卷書。參透事物物之理者。不能。今非通儒而業此。亦能療人病。獲盛名。何也。余曰。天地間有理。有數。理可勝數。則有學問之醫。遠近崇之。

三字經

卷四

三

遂得以盡其活人之道。然仲景為醫中之聖。尚未見許於當時。觀傷寒論之序文。可見猶宣聖以素王老其身。天之意。在萬世不在一時也。仲景之後。名賢輩出。類皆不得志於時。開門著書。以為傳道之計。而喻嘉言。柯韻伯二先生書。尤感憤。而為不匹之鳴。此理數之可言。而不可言者矣。今之業醫者。無論不足為通儒。而求其識字者。則為良醫矣。無論其

識多字也。只求其識一字者，亦可以為良醫矣。客曰：此何字也？得毋所謂下字乎？余曰：亦其類耳。不必他求。即人字是也。人乃陰精陽氣合而成之者也。左為陽，左邊一ノ，陽之位也。右為陰，右邊一ノ，陰之位也。作書者遇ノ處，自然輕手揮之。陽主乎氣，輕清之象也。遇ノ處，自然重手頓之。陰主乎精，重濁之象也。兩畫不相離，陰陽互根之道也。兩畫各自位。

三字經

卷四

五

置陰陽對待之道也。ノ在左者不可使之右，ノ在右者不可使之左。陰陽不雜之道也。左ノ由重而輕，萬物生於水，即男女構精萬物化生之義。由陰而陽也。右ノ由輕而重，形生於氣，即大哉乾元，乃統天，至哉坤元，乃順承天之義。陽統乎陰也。二者合之，則成人。合之之義，醫書謂之曰抱。周易名之曰交。交則為泰矣。試以形景淺言之，人之鼻下口上水清

穴一名人中。取人身居乎天地中之義也。天通於鼻，地氣通於口。天食入以五氣，鼻受其地食人以五味，口受之。穴居其中，故曰人中。自人中而上，目鼻耳皆而竅。自人中而下，口與二便皆單竅。上三畫偶而為陰，下三畫奇而為陽。取地天之義，合成泰卦也。形景主外，必合陰陽之象而成人。況人之所以生之理，乎人之為義大矣哉。子若遇醫者問此一字，恐高車駟馬，胡謂以名醫自負者，亦

三字經

卷四

五

一字不識也。客聞予言，亦大笑而去。

脾胃

十二官

靈蘭秘典論云：心者君主之官也，神明出焉。肺者相傳之官，治節出焉。肝者將軍之官，謀慮出焉。膽者中正之官，決斷出焉。膻中者臣使之官，喜樂出焉。脾胃者倉廩之官，五味出焉。大腸者傳道之官，變化出焉。小腸者受盛

之官。化物出焉。腎者作強之官。伎巧出焉。三焦者決瀆之官。水道出焉。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。按此以脾胃合為一官。恐錯簡耳。刺法補遺篇云。脾者諫議之官。知周出焉。胃者倉廩之官。五味出焉。採此補入。方足十二官之數。

心說

心。火臟身之主。神明之舍也。小篆嘗言心字。

三字經

卷四

三

篆文只是一倒火字耳。蓋心火也。不欲炎上。故顛倒之。以見調燮之妙也。祝無功曰。庖氏一畫直豎之則為一。左右倚之則為人。為八。縮之則為、。曲之則為L。、。圓而神。一。、。方以直。世間字變化浩繁。未有能外一。、。人。、。結構之者。獨心字欲動欲流。圓妙不居。出之乎一。、。人。、。之外。更索一字與作對。不得正以心者。新也。神明之官。變化而日新也。

心主血脉。血脉日新。新新不停。則為平人。否則病矣。其合脉也。其榮色也。開竅於舌。

肝說

肝。木臟。魂所藏也。肝者。其也。以其體狀有枝幹也。又位於東方。而主生氣。時醫昧其理。反云。肝無補法。宜涼。宜伐。只泥木尅土之一說。而不知後天八卦。配河圖之象。三八為木。居東。即後天震巽之位。巽上坤下。則為觀。易曰。

三字經

卷四

三

觀。天之神道。而四時不忒。上坤下震。則為復。易曰。復其見天地之心乎。為漢大矣哉。其合其榮也。開竅於目。

脾說

脾為土臟。藏意與智。居心肺之下。故從卑。又脾者。裨也。裨助胃氣。以化穀也。經云。納穀者昌。其在此乎。其合肉也。其榮唇也。開竅於口。

肺說

肺。金。臟。魄。所。藏。也。肺。者。沛。也。中。有。二。十。四。孔。分。布。清。濁。之。氣。以。行。於。諸。臟。使。沛。然。莫。禦。也。內。經。曰。肺。惡。寒。又。曰。形。寒。飲。冷。則。傷。肺。勿。只。守。火。尅。金。之。一。說。也。其。合。皮。也。其。榮。也。開。竅。於。鼻。

腎說

腎。水。臟。藏。精。與。志。華。元。化。謂。為。性。命。之。根。也。又。腎。者。任。也。主。骨。而。任。周。身。之。事。故。強。弱。係。之。甲。乙。經。曰。腎。者。引。也。能。引。氣。通。於。骨。髓。卮。

三字經

卷四

三

言曰腎者神也。妙萬物而言也。其合骨也。其榮髮也。開竅於二陰。

胃說

胃。屬。土。脾。之。腑。也。為。倉。廩。之。官。五。穀。之。府。故。從。田。田。乃。五。穀。所。出。以。為。五。穀。之。市。也。又。胃。者。衛。也。水。穀。入。胃。游。溢。精。氣。上。出。於。肺。暢。達。四。肢。布。護。周。身。足。以。衛。外。而。為。固。也。
膽說 字從詹不從旦胆音檀乃口脂澤也與膽不同今從胆者乃傳襲之

膽。屬。木。肝。之。腑。也。為。中。正。之。官。中。清。之。府。十。一。經。皆。取。決。於。膽。人。之。勇。怯。邪。正。於。此。詹。之。故。字。從。詹。又。膽。者。擔。也。有。膽。量。方。足。以。擔。天。下。之。事。肝。主。仁。仁。者。不。忍。故。以。膽。斷。膽。附。於。肝。之。短。葉。間。仁。者。必。有。勇。也。

大腸小腸說

大腸。傳。道。之。官。變。化。出。焉。屬。金。為。肺。之。腑。小。

三字經

卷四

三

腸。受。盛。之。官。化。物。出。焉。屬。火。為。心。之。腑。人。納。水。穀。脾。氣。化。而。上。升。腸。則。化。而。下。降。蓋。以。腸。者。暢。也。所。以。暢。達。胃。中。之。氣。也。腸。通。暢。則。為。平。人。否。則。病。矣。

三焦說

三焦者。上中下三焦之氣也。焦者。熱也。滿腔中熱氣。布濩能通。調水道也。為心包絡之腑。屬火。上焦不治。則水泛高原。中焦不治。則水。

留中腕。下焦不治。則水亂二便。三焦氣治。則
脉絡通。而水道利。故曰決瀆之官。

手心主說

即心包絡

心乃五臟六腑之大主。其包絡為君主之外
衛。相火代君主而行事也。所以亦有主名。何
以繫之以手。蓋以手厥陰之脉。出屬心包。手
三陽之脉。散絡心包。是手與心主合。故心包
絡稱手心主。五臟加此一臟實六臟也。

三字經

卷四

平

膀胱說

膀胱屬水。為腎之腑。經云。膀胱者州都之官。
津液藏焉。氣化則能出矣。言其能得氣化而
津液外出。滋潤於皮毛也。若水道之專司。則
在三焦之腑。故經云。三焦者決瀆之官。水道
出焉。言其熱氣布濩。使水道下出。而為溺也。
內經兩出字。一為外。出一為下。出。千古罕明
其旨。茲特辨之。又膀胱者。旁也。胱者。光也。言氣

海之元氣足。則津液旁達。不窮而肌。湊皮毛。
皆因以光滑也。

命門說

越人指右腎為命門。諸家非之。余考內經。太
陽根於至陰。結於命門。命門者。目也。靈樞結
根篇。衛氣篇。素問陰陽離合論。三說俱同。後
讀黃庭經。云。上有黃庭下閔元。後有幽門前
命門。方悟其處。凡人受生之初。先天精氣聚

三字經

卷四

四

於臍下。當閔元氣海之間。其在女者。可以手
捫而得。俗名產門。其在男者。於泄精之時。自
有關闌知覺。此北門鎖鑰之司。人之至命處
也。又考越人七衝門之說。謂飛門。唇也。戶門。
齒也。吸門。會厭也。賁門。胃之上口也。幽門。大
倉下口也。闕門。小腸下口也。魄門。肛門也。便
溺由氣化而出。又增溺竅為氣門。凡稱之曰
門。皆指出入之處而言也。况身形未生之初。

父母交會之際。男之施由此門而出。女之受由此門而入。及胎元既足。復由此門而生。故於八門之外。重之曰命門也。若夫督脉十四椎中。有命門之穴。是指外腑而言。如五臟六腑。謂命門即在此也。

經絡

經絡歌訣

汪認菴本草備要後附此。宜熟讀之。無備再

三字

卷四

三

著

四診

望色

春。夏。秋。冬。長。夏。時。
左。肝。右。肺。形。呈。類。
察。位。須。知。生。者。吉。
更。於。黯。澤。分。新。舊。
又。有。辨。舌。之。法。舌。上。無。胎。為。在。表。鮮。紅。為。

青。黃。赤。白。黑。隨。宜。
心。類。腎。類。鼻。主。脾。
審。時。若。遇。尅。堪。悲。
隱。隱。微。黃。是。愈。期。
又。有。辨。舌。之。法。舌。上。無。胎。為。在。表。鮮。紅。為。

火。淡。白。為。寒。胎。主。無。胎。言。非。謂。若有。白。胎。為。半。表。半。裏。黃。胎。為。在。裏。黑。胎。病。入。少。陰。多。死。胎。潤。有。液。為。寒。胎。燥。無。液。者。為。火。舌。上。無。胎。如。去。油。腰。子。為。亡。液。不。治。

聞聲

肝。怒。聲。呼。心。喜。笑。

脾。金。憂。慮。形。為。哭。

又。法。氣。衰。言。微。者。為。虛。氣。盛。言。厲。者。為。實。

三字

卷四

三

語。言。首。尾。不。相。顧。者。神。昏。狂。言。怒。罵。者。實。熱。痰。聲。漉。漉。者。死。久。病。聞。呃。為。胃。絕。大。抵。語。言。聲。音。以。不。異。於。平。時。者。吉。反。者。為。凶。

問症

一。問。寒。熱。二。問。汗。

五。問。飲。食。六。問。胸。

九。問。舊。病。十。問。因。

婦。人。尤。必。問。經。期。

三。問。頭。身。四。問。便。

七。聲。八。渴。但。當。辨。

再。兼。服。藥。恭。機。變。

遲。速。閉。崩。皆。可。見。

再添片語告兒科

天花麻疹度占驗

切脉

微芒指下最難知。條緒尋來悟治然。舊訣以
 實弦紫洪為七表。以沉微遲緩濡伏弱滑為
 八裏。以長短促結代牢動細為九道。李瀾
 湖李士材。加入數。草散三。脈其二十七字。瀾
 難摸。索必得其頭。緒如。治。絲者。始。有。條。不。紊。
 三部分持成定法。左寸外以候心。右寸內以候
 胸中。左關外以候肝。右關外以候脾。內以候
 胃。內以候脾。而尺候腎。內外以候心。內外以候
 大小。二腸。脾。而尺候腎。內外以候心。內外以候
 後。上。竟。上。者。胸。喉。中。事。也。下。竟。下。者。小。腹。腰。
 三字經

三字經

卷四

五

嚴勝。脈中事也。此八綱。易見是良規。浮主表。
 二。脈。於。指。下。輕。重。辨。之。易。見。也。應。主。寒。數。主。熱。
 細。主。虛。短。主。氣。弱。以。形。之。易。見。也。大。主。邪。實。
 主。素。盛。短。主。素。弱。以。形。之。易。見。也。大。主。邪。實。
 也。置。而。辨。辨。亦。可。也。起。四。句。地。提。其。切。脈。之。大。
 法。胃。資。水。救。人。根。本。受。氣。於。胃。而。肺。土。具。冲。和。
 脉。委。蛇。氣。不。堅。直。而。和。緩。也。氣。得。中。土。之。生。臟。
 氣。全。憑。生。剋。驗。審。臟。氣。之。生。剋。為。第。一。要。之。生。臟。
 洪。火。剋。金。也。反。是。脾。病。畏。弦。木。剋。土。也。肺。病。畏。洪。
 則。與。臟。氣。無。害。天。時。且。向。逆。從。窺。之。願。也。

為第。三要。如春氣屬木。脉宜弦。夏氣屬火。脉宜洪。
 浮。數。形。偏。亢。仲。景。以。是。則。與。天。氣。不。應。陽。為
 運。勢。更。卑。仲。景。以。是。則。與。天。氣。不。應。陽。為
 以。起。下。句。無。力。者。皆。病。是。此。又。與。小。陰。陽。二。脉。之
 之。宜。忌。為。第。四。要。外。感。陰。來。非。吉。兆。外。感。之
 脉。宜。浮。洪。而。反。細。要。內。虛。陽。現。實。堪。悲。脫。血。之
 弱。則。正。不。勝。邪。矣。內。虛。陽。現。實。堪。悲。脫。血。之
 則。氣。亦。外。脫。矣。諸。凡。偏。勝。皆。成。病。偏。勝。而。共
 病。脉。也。忽。變。非。常。即。非。醫。舊。法。有。雀。舌。生。漏
 索。金。沸。七。怪。之。說。總。因。陰。只。此。數。言。占。必。應
 陽。離。決。忽。現。出。反。常。之。象。只。此。數。言。占。必。應
 三字經

三字經

卷四

五

脉經鋪敘總支離。病之各有萬。而脉象不過
 之。脉。無。不。可。見。何。能。診。脉。而。一。病。而。數。十。種
 何。病。耶。脉。書。欺。人。之。語。最。不。可。聽。
 運氣

張飛疇運氣不足憑說

諺云不讀五運六氣檢方書何濟。所以稍
 涉醫理者動以司運為務。曷知天元紀等篇
 本非素問原文。王氏取陰陽大論補入經中。
 後世以為古聖格言。孰敢非之。其實無關於

醫道也。况論中明言時有常位而氣無必然。猶諄諄詳論者。不過窮究其理而已。縱使勝復有常。而政分南北。四方有高下之殊。四序有非時之化。百步之內。晴雨不同。千里之外。寒暄各異。豈可以一定之法。而測非常之變耶。若熟之以資顧問。則可。苟奉為治病之法。則執一不通矣。



光緒丙午夏

簡明中西匯參醫學圖說

四明周學鈴題



簡明中西匯參醫學圖說 叙

叙醫學一道大約中外醫理必如法而醫以
 醫學一必依大行理必如法而醫以
 二勝固未嘗不以其貫也雖然管
 太史公傳扁鵲曰視見垣一方人以
 此視病盡見以人五臟亦結一國研精
 剖解諸病加見以扁鵲亦令人盡見五
 臟癥結是答之以扁鵲死令之扁鵲生
 函醫不與駕中醫學歷二此十年同學
 君蓋臣究心醫學歷二此十年同學
 精求西國理化醫學於醫學一門尤
 別有所編中西匯參醫學圖說一書
 出所編中西匯參醫學圖說一書
 究詳致伸以辨論附以於余雖
 簡當亦精博編成厚於余雖
 備不醫家之功用全行見壽人理法
 蓋臣其以是編券之我艸數言還
 不質諸蓋臣其以是編券之我艸數言還
 光緒三十三年二月廿四日
 郭謙益題



自泰西通中國而吾人知研究實學為當今之急務以一製造必先考物質一種植必先辨土宜此俱非向之驚惑者之所為也况醫學者為人性命之所關恐空結撰安知不失之毫釐差以千里故昔人云醫者意也今以知意想之無憑不若目覩之有據嘗觀西醫視疾遇疑難不治必剖解其肢體以得其病之所在由是而繪諸圖著諸論俾後之治是疾者遂百年而有雖鑿之證佐吾友王君蓋臣讀書之暇潛心醫學垂二十寒暑矣脉理之精與藥性之細微無不

中西匯參醫學

序

上海廣益書局印

參詳以玉柱盡近又於西醫實學頗有心得於是舉中國之虛者以兩注實之其難明處悉取圖以顯其形其須辨處亦借論以闡其理願生書曰簡明中西匯參醫學圖說既成以示余余曰方今實學發見之時君此書出而餉諸同好謂為救醫界中之虛弊可也即不僅謂為救醫界中之虛弊亦可也茲當石印告成因不揣謏陋而書數語於簡端

光緒三十二年丙午歲夏月

古董周學銓書於滬寓

中西匯參醫學圖說序

天生萬物人為最靈人之生也必有其所以生即當知其所以病知其所以病即當知其所以治則醫尚焉今世界中人顧多忽焉不察至病既作始知延醫又或付性命於庸醫之手甘心就死何其以最靈之人而為此最愚之事不亦大可痛哉余有鑒於此已二十餘年矣研究中國醫書知病之有虛實寒熱藥之有補瀉溫涼靡不遞加審察是以遇內外諸症輒獲奇效近數年間精求西國格致之學於醫學一道更覺隱合鄙意觀其剖解之法及繪畫之圖悉皆毫

中西匯參醫學

序

上海廣益書局印

髮不爽現聘精於西畫者繪成人體分合各圖計五十餘幅每幅繫以醫藥鍼灸之法令人見之一目了然則人之所以生所以病與夫所以治者病家之原委醫家之理由當不難取資於是書矣余初編是書亦祇為自勉之計非敢問世也今歲春吾友章君佐卿見而題之謂是書大有裨益於世盍付石印以公同好余維章君有濟世之心何敢方命書既成因不揣鄙陋而為之序

光緒三十二年丙午歲仲夏月四明王有忠自序於

海上廣益書局之寓樓

中西匯參醫學圖說

浙江鄞縣

王有忠蓋臣氏編輯
章秉鉞佐卿氏校閱

例言

一是編以陰陽為大綱以十二經為支目綱既舉而目自張蓋病由臟腑而生不外虛實寒熱諸症審知其何臟何病則用鍼用藥各適其當治一病可治百病亦無不可故不多立病名多立方藥也

一是編先列人體及各臟分合之圖次及十二經手足三陰三陽穴圖令人一目了然按圖可索

一用藥如用兵故於補瀉溫涼之中有猛將次將之比俾閱者不至輕用而貴善用江涵暉先生著有醫鏡

中西匯參醫學

例言

四

德益書局印行

一書最為善本茲擇其要而畧增之

一中西論臟腑表裏各有所主惟近時劉鍾衡先生著有中西匯參銅人圖說一書議論簡當中外融通擇論說歌括均入卷內洵為衛生有用之書

一陰陽生炁氣血運行有非西法剖驗所能明者則以中醫論說為定蓋取西人之詳於形迹取中醫之詳於功化也

一鍼灸穴法淺深分寸悉依銅人鍼灸圖為準的其餘概不贅述

一中醫有於五臟外添膈中一說按膈中即包絡也西醫謂心處胸中周圍有膈膜裹之亦言心包絡也膈中之說似屬可省

簡明中西匯參醫學圖說 序 例言

一西醫添甜肉一經但言其形莫詳所用按稼穡作甘定備於脾可無疑義

一是編為衛生家言精究詳致而歸於簡明但見現何病象即用何法治之雖寥寥數語自能盡知底蘊其一切病源方藥亦畧增一二

一是編注重衛生表列圖像惟辭句間有未加修削蓋急就章也閱者諒之

光緒三十二年五月編者識



中西匯參醫學

五

德益書局印行

簡明中西滙參醫學圖說

上編目次

全身血脈筋肉及內臟配布位置圖

神經圖

仰人會脈圖

伏人會脈圖

週身血脈總管圖

血脈管說

腦圖

全身脈管圖

全身腦氣筋論畧

週身血脈管圖

中西滙參醫學

目次

脈論

全身筋肉圖

正面人骨圖

全身骨數考

心肺合圖

心肺合說

脾胃合圖

脾胃合說

肝膽合圖

肝膽合說

腎與膀胱合圖

腎與膀胱合說

大小腸合圖

大小腸合說

仰人經圖

伏人經圖

臟腑合圖

手太陰肺經圖

肺經諸穴歌

手太陰肺經考正穴法

肺臟圖

手太陰肺經主治

肺部藥隊

手陽明大腸經圖

中西滙參醫學

目次

手陽明大腸經考正穴法

大腸諸穴歌

大腸腑圖

手陽明大腸經主治

大腸部藥隊

足陽明胃經圖

足陽明胃經考正穴法

胃經諸穴歌

胃腑圖

足陽明胃經主治

胃部藥隊

足太陰脾經圖

足太陰脾經考正穴法

脾經諸穴歌

脾臟圖

足太陰脾經主治

脾部藥隊

手少陰心經圖

手少陰心經考正穴法

心經諸穴歌

心臟圖

手少陰心經主治

手部藥隊

手太陽小腸經圖

手太陽小腸經考正穴法

小腸諸穴歌

小腸腑圖

手太陽小腸經主治

小腸部藥隊

足太陽膀胱經圖

足太陽膀胱經考正穴法

膀胱諸穴歌

膀胱及生殖器圖

陽精論

陰精論

足太陽膀胱經主治

中西匯參醫學

目次

三

廣益書局印行

膀胱部藥隊

足少陰腎經圖

足少陰腎經考正穴法

腎經諸穴歌

腎臟圖

足少陰腎經主治

腎部藥隊

下編目次

手厥陰心包絡經圖

手厥陰心包絡經考正穴法

心包絡經諸穴歌

心包絡圖

手厥陰心包絡主治

手少陽三焦經圖

手少陽三焦經考正穴法

三焦諸穴歌

三焦腑圖

手少陽三焦經主治

三焦部藥隊

三焦經說

足少陽膽經圖

足少陽膽經考正穴法

膽經諸穴歌

膽腑圖

中西匯參醫學

目次

四

廣益書局印行

足少陽膽經主治

膽部藥隊

足厥陰肝經圖

足厥陰肝經考正穴法

肝經諸穴歌

肝臟圖

足厥陰肝經主治

肝部藥隊

任脈圖

任脈考正穴法

任脈諸穴歌

督脈圖

督脈考正穴法

督脈諸穴歌

奇經八脈圖

奇經八脈歌

回陽九針圖

回陽九針歌

胎圖

胎論

橫生圖

難產說

救難產法

下針八法

中西匯參醫學

目錄

五

醫書局印行

神針八法

十二字分次第手法及歌訣

雷火神灸

仰面尺寸圖

伏面尺寸圖

中指同心寸圖

十四經脈長短尺寸圖

皮膚斷面圖

用艾灸法

艾灸補瀉

艾炷大小先後

灸瘡要法

灸瘡骨法

洗灸瘡法

壯數多少

灸後調攝法

切脈秘旨

治婦人脈四言詩

小兒驗紋按額診脈四言詩

小兒面部五位圖

命門部位歌

附傳小兒初生拔毒奇方

備用諸方

補中益氣湯

中西匯參醫學

目錄

六

醫書局印行

獨參湯
二陳湯
三生飲
四君子湯
五苓散
六味地黃丸
七福飲
八珍湯
九味羌活湯
十全大補丸
一柴胡湯
二冬湯

中西匯參醫學

目次

七

三黃解毒湯
三化湯
四味香薷飲
四苓散
四逆湯
四生丸
五皮飲
五接湯
五味異功散
六君子湯
香砂六君子湯
七珍散

七味安神丸
加味七神丸
八味地黃丸
知柏八味丸
加味八珍湯
生地八物湯
十補丸
百藥煎散
人參燕窩百全湯
左歸飲
右歸飲
大承氣湯

中西匯參醫學

目次

八

小承氣湯
大柴胡湯
小柴胡湯
大陷胸湯
小陷胸湯
搐鼻散
補天大造丸
治痢奇方
通音煎
開喉散
香蘇散
平胃散

手拈散

滾痰丸

小半夏加茯苓湯

越鞠丸

逍遙散

葛根湯

牛黃丸

附子理中湯

益元散

藿香正氣丸

茵陳大黃湯

茵陳薑附湯

中西匯參醫學

日次

九

廣益書局印行

蠲脾湯

桂枝湯

麻黃湯

柴葛解飢湯

白虎湯

白通加豬胆汁湯

止嗽散

團魚丸

月華丸

生地黄湯

人參養榮湯

秘精丸

澤蘭湯

補天大造丸

普濟消毒飲

神朮散

朴黃丸

止瘧丹

和中丸

白朮丸

金匱腎氣丸

秘旨安神丸

歸脾湯

安神定志丸

中西匯參醫學

日次

十

廣益書局印行

洋參麥冬湯

清心丸

清膈煎

沉香降氣散

化蟲丸

薑附湯

導赤散

瀉心丸

生鐵落飲

葶藶分清飲

阿膠散

甘露飲

柴胡疎肝散

瓜蒌散

清空膏

芍藥甘草湯

奔豚丸

橘核丸

橘皮竹茹湯

煖肝煎

蟬花無比散

柴芩煎

消瘰丸

五痿湯

歸芍六君子湯

大和中飲

大無神功散

香砂二陳湯

蒼白二陳湯

保和丸

木香丸

滋腎丸

枳朮丸

和胃飲

玉女煎

抽薪飲

犀角大青湯

安胃飲

加味甘麻湯

溫胆湯

推氣散

桔梗湯

瀉白散

苦根湯

犀角地黄湯

黃芩知母湯

黃芩清肺飲

生地黃煎

玉母桃

香砂理中湯

黃芩芍藥湯

加味枳朮湯

葛花清脾湯

梔子藤皮湯

桔梗前胡湯

加味甘桔湯

貝母瓜蒌散

紫苑散

鴉胆子

清魂散

通關散
 益母勝金散
 獨聖散
 龍膽瀉肝湯
 脫花煎
 歸薑湯
 花燕石散
 生化湯
 神仙大乙膏
 解恨煎
 贊育丹
 毓麟珠

中西匯參醫學

目錄

十三

廣益書局印行

全身血脈筋肉及內臟配布位置圖




中西匯參醫學


全身血脈筋肉及內臟配布位置圖

廣益書局印行

神經圖



仰人會脈圖




中西匯參醫學
仰人會脈圖
二
廣益書局印行

伏人會脈圖



中西匯參醫學
伏人會脈圖
三
廣益書局印行

全體脈管圖



中西匯參醫學
全體脈管圖
三
廣益書局印行

血脈管說

血脈管者。運行赤血之管也。其徑常圓。本體三層。內層薄滑。中層畧厚。色黃質軟。自能舒張。外層紋理交結。總管及入肺管近心處均有三門。形如牛扇門閉之狀。微窩向上。門邊正中。有脆骨一粒。品字相嵌。如芝麻。滿處。故生三柱。以補之。門後管體有小均。血少許。使門不粘於管。以助開閉之機。心血過此。可出而不可入。其總管由心左下房生出。直插上房而上。約二寸許。即迴屈而下。彎作一拱。下至膈膜。分佈小枝。入左右兩脇。透過膈膜。分布大枝。散行臟腑之

間至腰下第四節。即分岐為二。散佈小枝。密纏股足之間。其拱之上。又生三大支。左二右一。右支約寸許。復歧分為二。一由頭右達腦。一由右肩達手。其左二支。一由頭左達腦。一由左肩達手。皆散佈小枝密纏於內。週身骨肉。無處不到。支上生枝。髣髴如樹。較節之旁支。上下互相通連。正○迴血管者。迴導紫血。入支。雖塞。血脈可從旁通也。○迴血管者。迴導紫血。入心之管也。管內有門。門無定位。頭腦臟腑之間。皆無更其體比脈管稍薄。脈管受比。比迴管四股之門。深處血則圓。無血則扁。總管二支。由心右上房而出。一支向下。以接下身臟腑兩足之迴血。一支向上。以接上

中西匯參醫學


血脈管說

四

廣益書局印行

身頭腦兩手之迴血。散佈小支。如血脈管之狀。但脈管深居肉內多。而迴血深淺皆有。藍色無脈者是。亦有一種。名微絲血管。一寸測管約有二。目力不覩。見以鏡顯之。見密結如網。骨肉內外通體皆然。此血與血脈管迴血管兩尾相通。故赤紫兩血。通行無礙。血脈迴血兩管。其頭在心。相通其尾在微絲管相通。

腦圖



中西匯參醫學

腦圖

迴身血脈管圖

五

廣益書局印行



人身血管根生於心。如樹之有枝。有幹。不論百體內外。一氣流通。與迴血管並行。紫血由是以相出入。


全身腦氣筋論畧

凡百體中最要而最靈者。厥惟一腦。一切知覺思慮。皆所從出。而運動施為。亦所必賴。百體功用。相稱相和。不犯不害。各隨其分者。皆賴腦為之主。其主百體者有三。一腦髓。一脊髓。一腦筋。三者皆分列體中。考脊髓分出之腦筋。共有三十一對。即在頭八對。在背十二對。在腰五對。在胸六對。各對由前後二根起。兩合相外。又分前後兩條。前條專司運動。後條專司知覺。愈分愈細。計白腦絲。每寸可列一千五百條。至一萬一千條。每條外有白質鞘。中有軸。曰腦筋軸。或貫

入腦髓。腦珠。腦筋。佈散體內。粗者為筋。由筋分線。由線分絲。有統如網者。名腦網。有聚如珠者。名腦珠。有結成結者。名腦結。結之大者。名腦積質。皆白灰色。以顯微鏡觀之。中有灰白二絲。積絲成線。積線成筋。白線多於灰線。故白質亦多於灰質。推在腦中。則灰質多於白質。

中西匯參醫學 全身腦氣筋論畧 六

週身血脈總管圖



中西匯參醫學 週身血脈總管圖 七

脈論

脈者醫之關鍵。醫不究脈。則無以辨證。內經歷周秦漢魏。鮮有知其旨者。至晉王叔和始以醫鳴世。撰有脈經。可謂詳切。指其大小腸候之兩寸。無非經絡相表裏。於診候部位。似乎至下之腑。診至上之部位。故古今醫統。辨其所誤。惟內經以心配臍中。肺配胸中。肝配臍。脾配胃。兩尺外以候腎。內以候腹中大小腸膀胱三府。理有可據。義亦相通。近代湘鄉周夢覺先生。著有三指禪一書。二十七脈中。提一緩字為平脈。其餘悉從對待辨出脈象。卓見所及。洵為空前絕

後醫門可奉為津梁者也。西人脈形計分十種。曰浮沉遲速壯弱大小柔硬。謂人身血脈發源於心。運行百體而總入於肺。接吸生氣。由肺復返於心。日夜輪流不息。每小時運行四十週。以一日夜二十四小時計之。運行四百八十週。人人皆然。脈至跳動。乃心經發血之力。一發為一至。遍體同時湧應。一脈統驗週身之病則可。某部之脈。獨決某經之病則不可。意以五臟六腑。何偏繫於寸計之管。不知中國古人創立脈法。已先自為困難。經曰。十二經中皆有動脈。獨取寸口以決五臟六腑。以及陰陽死生之法。何謂也。然

中西匯參醫學

脈論

廣益書局印行

寸口者。脈之大會。手太陰之動脈也。人一呼。脈行三寸。一吸。脈行三寸。呼吸定息。脈行六寸。人一日一夜。凡一萬三千五百息。脈行五十度。週身營衛。行陽二十五度。行陰二十五度。為一週。復會於手太陰寸口者。五臟六腑之所終始。故取法於寸口也。從關至尺。是尺內陰之所至也。從關至魚際。是寸口陽之所治也。上部法天。主胸以上至頭之有疾也。中部法人。主膈以下至臍之有疾也。下部法地。主臍以下至足之有疾也。又曰。上竟上者。胸喉中事。下竟下者。少腹腰股膝脛足中事。蓋兩寸心與肺。既統周身脉管。流行

貫通為脉之都會。又分寸為陽。尺為陰。陽外陰內。天地不易之理。凡主表。主上。主氣。屬陽者。皆診於寸。主裏。主血。主下。屬陰者。皆診於尺也。

中西匯參醫學


脈論

九

廣益書局印行



正面人骨圖




全身骨數考

全身之骨計共二百塊。頭骨八。面骨十四。脊骨二十四。鈎骨一。尾骨一。脇骨二十四。胸骨一。舌骨一。鎖柱骨二。肩胛骨二。臂骨二。正肘骨二。轉肘骨二。手腕骨十六。手掌骨十。手指骨二十八。無名骨二。大腿骨二。小腿骨二。輔腿骨二。膝蓋骨二。脚腕骨十四。脚掌骨十。脚指骨二十八。外尚有耳中小骨六。牙齒骨二十二。不在數內。

中西匯參醫學 正面人骨圖 全身骨數考 上海商務印書館

心肺合圖



心肺合說

心者。君主之官。神明出焉。人身知覺運動。無一不本於心。故百體皆臣。而心為君也。位據胸中。左右皆肺。周圍所裹之隔膜。名心包絡。相心布令。故為臣使之官。居於膈膜之中。又名膈中。心色赤而鮮。下尖上潤。外體圓滑。內空如囊。當中有直肉隔之。稱為左房右房。左右半截之間。有橫肉間之。稱為上房下房。四房大小相若。均有血管與肺相通。難經謂心主血。肺主氣。血為榮。氣為衛。相隨上下。榮行於內。氣發於外。所以心肺相關。肺內受病。氣管壅塞。心血亦窒礙不行。

中西匯參醫學 心肺合圖 上海商務印書館

若心房受病肺經即呼吸喘急如哮喘之症是也經曰肺者相傳之官治節出焉因其夾輔心君主行榮衛而存過化之神者也位居諸臟之上體窩向內中央有心管血脈總管隔之質輕而鬆週圍有夾膜裏之狀若懸磬系以氣喉色如緋映紅錯雜相間葉右三左二披離下垂後面豐圓粘附背骨前邊利薄逼近胸堂兩肺頂尖而圓畧出首肋之上底窩而潤貼承膈膜之皮右肺大於左因心尖向左微占其位左肺長於右緣肝體居右稍高於脾故也大概胸堂潤者其肺必大凡呼吸之時胸肋舒張膈膜鼓動諸

中西通泰醫學

心肺合說

十二

臟相隨以應之膜沫濡潤以助之剖剖肺體見有痰沫在內拭去痰沫便見管竅甚多即難經所謂二十四孔也凡人氣喉徑闊五分自吸門以下脆骨共十五節至二十節不等前圓如珠每節有韌膜相連後平而軟因與食喉逼近長四寸許分歧為二在背脊第一節之前名曰氣管左管約三寸許斜入左肺裡窩之上肺頂下二寸右管界潤而短約一寸許橫入右肺之裏由是大管分小管漸分漸多愈多愈微窠行兩肺之內形如氣喉節節有環以微鏡顯之見每管之末皆有一圓薄氣胞大小氣管另有兩枝相附而行一為赤血

緣其中皆生氣也一為紫血支緣其中有炭氣也炭氣者乃身體無用之物雜化為氣與養氣相合其性有毒與炭同類故曰炭氣凡人一呼一吸合為一息呼者吐炭氣也吸者接生氣也生氣入血則赤炭氣入血則紫生氣能養人炭氣能殺人故紫血入肺運至氣胞之上漫炭氣於胞內氣管即通而出之是為一呼炭氣既出復進生氣以入直抵胞內血隨攝之是為一吸呼吸不疾不徐氣始舒暢故屏息少頃即悌鬱不安必長嘆乃定蓋赤血運行必變紫血紫血入肺可吐炭氣炭氣不出眾血受病凡有乳者必有


中西通泰醫學

心肺合說

十三

肺有肺者必與水氣不合如鯨鯢江豚之屬不能久潛潭淵片刻之間須出水面以接生氣蓋地上眾生有血者吸養氣而吐炭氣草木之屬藉日暄而生者則攝炭氣而吐養氣欲考其詳在乎西國博物志內

脾胃合圖



一 脾
二 胃
三 胃門
四 胃大腸
五 胃小腸
六 胃管
七 胃管
八 胃管
九 胃管
十 胃管
十一 胃管
十二 胃管

中西匯參醫學 脾胃合圖 十四 廣東省醫局印行

脾胃合說

脾胃者。倉廩之官。五味出焉。脾形如豎掌。居胃之左。在第九至十一肋骨之內。上半有膈肉蓋之。外邊豐圓向膈。內邊深窩向胃。窩中有稍壯發脈管入之。其內有迴血管。由胃後入肝。此管壅滯。即有血水滲洩於下。發為鼓脹。各臟腑皆以官名。惟脾胃合一官。西人所謂消化器也。蓋胃主納穀。脾主消穀。二者相須成功。故統稱倉廩之官。五味出焉者。五穀備具。五味一入胃中。即化為汁液。從脾之油膜。散走五臟。由脾胃而達諸臟腑營衛也。西醫言脾右胃後。有甜肉一

條長約五寸。形如犬舌。頭大向右。尾小向左。嘗其味甜。故曰甜肉。正中有汁液管。斜入小腸。上口之傍。與膽管入小腸處同路。所生之汁如口津水。莫詳其用。亦不另立條目。胃形紆曲如袋。容水三升許。橫居膈下左方。肋骨護其半。頭大向左。賁門上連食管。尾小

向右。幽門下屬小腸。其體三層。外層上下。有養血管四支。分佈小支。密纏於內。因胃接血比他臟有更多。中層之肉。有經緯兩紋斜交。故能舒縮擁動。以勻轉食物。周圍有小穴。以生津液。與百體相關。應胃本無

化水之功。亦無出水之路。然茶酒入胃。少選即行攝去者。蓋腸胃有微絲血管甚多。按微絲血管。即華人

三焦之屬。能吸攝茶水。由迴血管過肝入心。運行周身。由肺汁出為氣。由皮膚滲出為汗。由內腎便出為

溺。俱賴微絲管迴血管之運化也。

中西匯參醫學 脾胃合說 十五 廣東省醫局印行

中西匯參醫學 脾胃合說 十五 廣東省醫局印行

去者。蓋腸胃有微絲血管甚多。按微絲血管。即華人三焦之屬。能吸攝茶水。由迴血管過肝入心。運行周身。由肺汁出為氣。由皮膚滲出為汗。由內腎便出為溺。俱賴微絲管迴血管之運化也。

圖合膽肝



肝動脈
肝靜脈
膽管

中西匯參醫學 肝膽合說 十六 廣益書局印行

肝膽合說

肝者將軍之官。謀慮出焉。肝居膈肉右方。其色赤。左
右兩葉。前入輪肝在左者七。向上圓滿。貼承膈肉。下
銳披離。外凸內窩。右靠背而左枕胃。窩內橫陳。通不
下部迴血合管以生膽汁。另有膽管二枝。一透小腸
頭。一透腹囊。切肝一臂。以顯微鏡窺之。有紋如密葉。
每葉大如一黍。有迴血合管繞之。散佈小管於葉內。
與本體迴血管相通。又有血脉小膽管環之。以養肝
體而接膽汁。故肝內分行者有四管焉。生膽汁迴血
管小膽管血凡肝有病。最為要害。或肝體發大。或

肝內有熱。以致各管凝滯不通。使下部迴血壅脹。即
有血水溢滲。膜之裏。漸漬漸深。終成盞脹。經曰。膽
者。中正之官。決斷出焉。繫右肝內旁之下。其汁乃下
部迴血入肝所化。色綠味苦。主榨食物之津液。凡人
食後小腸飽滿。腸頭上逼膽囊。使其汁流入小腸之
內。以榨化食物。而利傳渣滓。西醫謂肝之為用無他。
主生膽汁而已。無關謀慮。膽乃肝液之囊。存貯其汁
以待用者。無關決斷。近時唐容川先生辨云。人身之
陰陽。陰主靜。靜則有守。陽主動。動則有為。肝為厥陰
經。乃陰之盡也。故其性堅忍而有守。厥陰中見少陽。

中西匯參醫學 肝膽合說 十七 廣益書局印行

陰盡陽生。膽火居於肝中。陰中含陽。陽氣發動。謀慮
從此而出。所以稱為將軍之官。故肝氣盛者。勇敢有
為。肝氣虛者。每存懼怯。以肝膽二者合論。肝之陽從
於陰。故主謀。膽之陽出於陰。故主斷。經云。五臟者。所
以存精神。血氣。魂魄者也。六腑者。所以化水穀而行
津液者也。西醫專以腦氣筋論人之質性賢愚。未知
五臟皆有靈機。而司知覺運動。經言肝藏魂。魂者陽
之精。氣之靈也。氣為陽。血為陰。肝主血而內含陽氣。
是之謂魂。究魂之根源。生於坎水之一陽。推魂之功
用。發為乾金之元氣。故為將軍之官。肝屬木。如陽春

之發萌故曰謀慮出焉。經曰：膽氣鬱為怒。諸臟之氣皆取決於膽。膽汁滿則氣壯，膽汁薄則氣餒。膽秉剛果之氣，故為中正之官。有膽量則有果斷，故曰決斷出焉。

中西匯參醫學 肝膽合說 十八 廣東醫局印行

腎與膀胱合圖



左腎 右腎 膀胱 輸尿管

腎與膀胱合說

腎者作強之官。伎巧出焉。有左右兩枚。形與豬腰相似。腎位自背骨十二節至腰骨第三節。大小腸夾膜之後。左右相對。右腎畧大。上有肝腸蓋之。左腎畧長。上有脾胃蓋之。週圍有肥網包裹。膀胱者。州都之官。精液藏焉。位居兩膀胱骨盤正中。即前陰交骨之裏。其肉三層。內層牙黃色。軟有絢紋。中層肉理交結。外層即大小腸夾膜。體圓如盤。舒縮自如。無溺則縮。溺至則舒。積溺太多。則漲至臍上。內底有小孔斜接溺管。其上口與前陰相連。溺水出焉。西醫謂腎乃溺管脈

中西匯參醫學 腎與膀胱合說 十九 廣東醫局印行

管迴管及筋膜互相疊裏而成。所謂腎系。即溺水血脉迴血三總管也。溺管直透腎內。成一溺囊。樣如酒漏。囊邊有尖角十二。頗類奶頭。每角有小管數十。直展如摺扇之形。每一小管直長三分許。迴曲分行腎邊。其上有微絲血管駕之。其末畧潤與尿管啣接。凡茶水入血。運行徧體。乃由血管導津液齊入內腎。運行腎裏。由管末滲漉以入。滲有未盡。復由微絲管攝入衆溺管。滙流而達溺囊。即出溺水總管。瀝滴而下。斜入膀胱。故可入而不可返。是也。惟以腎為司溺專經。與精經迥不相涉。深斥華人左為正腎。右為命門。

男子藏精。女子繫胞之非。經言腎開竅於二陰。前陰為膀胱下口。膀胱者腎之府也。腎主水。化氣化水。化氣上行為液。化水下行為溺。故前陰繫於腎竅。又前陰有精竅。與溺竅相附而殊途。溺竅內通於膀胱。精竅內通於胞室。為女子受胎。男子藏精之所。尤為腎之所司。故前陰有病。精竅者為瘡。有病溺竅者為濁。後陰屬大腸下口為肛門。亦為腎所統司。腎液充腠。則肛門不結。腎氣能攝。則不脫肛。惟二陰皆屬腎竅。故經言腎為胃關。以飲食之質。皆從二陰出也。水道由腎。已詳前賢議論。惟西醫以腎司溺。而不司精。則

徒明其體。未究其用。後世以水由小腸。下至關門。清者為溺。入膀胱。濁者為糞。入大腸。則兩失之耳。

中西匯參醫學

腎與膀胱合說

二十

廣華書局印行

大小腸合圖



大小腸合說

大腸者。傳道之官。化物出焉。分上中下三迴。由右膀胱倒行而上。上迴與小腸橫接。名曰關門。中迴在肝下橫過胃底。下迴至脾下。從左軟脇斜落。至肛門為直腸。合較大小兩腸。長於身六倍。上中兩迴。猶有精液管吸其餘液。遞傳渣滓。至下迴則精液竭矣。大腸所以能傳道者。賴肺氣下達。使小腸中物至此。精汁盡化為糟粕。理大腸者。必須調肺氣也。小腸者。受盛之官。化物出焉。週迴疊積。長一身有莖。上口通胃。下口橫接大腸。西醫考小腸百派千支。散佈腸絞夾

中西匯參醫學

大小腸合圖

二十一

廣華書局印行

膜之間與膜同色。細微難見。食後少頃。內有精液始見。如白絲然。夾膜有小核甚多。即吸管迴旋疊積所成者。一切吸管附近脊處。乃合為一名曰精液總管。附脊骨而上。至頸骨第七節。即屈轉而下。左入頸手迴血會管。直達於心。所以小腸食物由胃至小腸頭。即與膽汁甜肉會合。漸落漸榨。榨如糖糖榨出精液。色白如乳。眾管吸之。初甚稀淡。漸入漸濃。運至會管。即混為血。小兒疳積症。乃吸液管受病。液核凝大。積閉不通。故多食猶瘡。按小腸上接於胃。凡胃所納之物。皆受感於小腸。西醫所謂附脊夾膜。即經言中焦

中西匯參醫學

大小腸合說

二十三

廣益書局印行

之物也。小腸通體皆是油膜相連。其油膜中皆有微絲血管。通小腸以化食物。而物所化之精汁。即從膜中出小腸而達各臟。故曰化物出焉。其相通之路。則從油膜中之絲管。上膈連包絡以通於心。心移熱於小腸。則化物不出。為痢。為淋。脾陰不足。則中焦不能受感。病為膈食便結。三焦相火不足。不能薰化水穀。病為溇瀉。蓋飲主化氣。食主化血。小腸所受感者。只是食物而已。若水則從胃已散出。分走連膜。中醫以水入小腸。下至關門。飛渡膀胱。故為西醫所笑。

臟腑合圖



志 肺 肝 胃 脾 脾 肺 脾 脾 脾

直腸 小腸 大腸

中西匯參醫學

臟腑合圖

二十三

廣益書局印行

手太陰肺經穴圖



手太陰肺經穴歌
 肺經諸穴歌
 手太陰肺十一穴。中府雲門天府列。俠白尺澤。孔最見。列缺。經渠。少商。經渠。太淵。下魚。陰郄。少商。如葉葉。

手太陰肺經考正穴法 由胸走手計十一穴

中府 一名膚俞。雲門下一寸六分。乳上三肋間。動脈應手陷中。針三分。主腫脹。氣逆。唾涕等症。

雲門 巨骨下。使氣戶旁二寸陷中。動脈應手。舉臂取之。去胸中行各六寸。針三分。灸五壯。主傷寒。胸脇短氣。上冲心肺等症。

天府 腋下三寸。肘腕上五寸。動脈中。禁灸。針四分。主暴痺。鼻衄。中風。鬼語等症。

俠白 天府下。去肘五寸。動脈中。針三分。灸五壯。主心痛短氣。乾嘔煩滿。

尺澤 肘中約紋上。動脈中。屈肘橫紋。筋骨解陷中。針三分。灸五壯。主寒熱氣喘。心煩腹脹。小兒慢驚。

中西匯參醫學

手太陰肺經考正穴法

二十四

廣益堂印行

孔最 去腕上七寸。刺取之。灸五壯。針三分。主熱病。汗不出。欬逆吐血。失音。

列缺 去腕側上一寸五分。以兩手交叉。食指盡處。兩筋骨解。針二分。主偏風。口面喎斜。中風半身不遂。

經渠 寸口動脈中。針二分。禁灸。主胸脹。上逆。寒熱。太淵 一名大泉。避唐祖諱。掌後內側。橫紋頭動脈中。灸


三壯。針二分。主胸逆煩悶。肺脹上逆。吐血。魚際 大指本節後內側。白肉際陷中。針二分。禁灸。主身熱頭痛。嘔血。

少商 大指內側。去爪甲角如荊葉。宜三稜針刺之。微出血。泄諸臟熱。治喉中閉塞。心煩腹滿。唐刺史成君綽忽

領腫如斗。喉塞。甄權以三稜針刺之。微出血。立愈。

大陰肺臟圖

喉頭。血管。氣支管。
右肺 左肺



中西匯參醫學

肺臟圖

二十五

廣益堂印行

手太陰肺經主治

肺主氣。西方庚中。金也。其色白。形如華蓋。居諸臟之上。呼吸司之。嬌嫩異常。性畏熱燥。遇寒則欬。眼白及右頰。鼻孔皆其分野。肺氣之衰旺。關乎壽元之短長。然亦恃腎水充足。不使虛火鑠金。尚能保重清甯之體。可以永享大年。

肺有裏症。有表症。肺主皮毛。邪在表。則右寸脈浮。症多發熱。肺理閉。以噴嚏鼻塞。肺受邪。則右寸脈浮。症多肺熱。香薷散。主之。以二陳咳。而有枯乾。肺為邪。過也。嗽有聲。有痰。液所化。畏風。邪在皮毛。使前胡。湯。主之。也。止嗽。散。主之。也。火。而。內。喘。加。味。燥。邪。化。火。而。液。乾。也。主。之。也。喉。痛。甘。桔。湯。主。之。也。肺虛。右寸脈細。症為自汗。氣虛。表不固。北。五。湯。加。黃。芪。之。咳。嗽。肺虛。不。甯。散。主。之。氣。急。金。不。生。水。虛。火。上。炎。

中西匯參醫學 肺經主治 肺經藥隊

咳嗽濃痰。火刑金而灼肺液。黃芩知母酒積鼻赤鼻瘡。濕熱內蒸。黃芩清肺飲。龜胸肺熱脹。白虎湯。大燉金。小便不利。黃芩清肺飲。便血肺氣虛弱。大腸下陷。芍藥甘草湯。黃芩丹皮生地主之。

肺經藥隊

補肺猛將	黃芪	人參
補肺次將	黨參	沙參
懷山藥	麥冬	冰糖
瀉肺猛將	葶藶	麻黃
白芥子	杏仁	升麻
瀉肺次將	蘇子	牛蒡
桑白皮	竹茹	貝母
		前胡
		紫苑
		僵蠶
		百部
		阿膠
		訶子
		燕窩
		百合
		桔梗
		膽星
		蘇子

中西匯參醫學 手太陽肺經主治 肺經藥隊

涼肺猛將 石膏 黃芩 竹瀝 馬兜鈴 山慈姑
 涼肺次將 洋參 元參 山梔 花粉 天冬 知母
 地骨皮 麥冬 薄荷 海石
 溫肺猛將 麻黃 天南星 北五味
 溫肺次將 蘇梗 欵冬花 製半夏 生薑

手陽明大腸經穴圖

手陽明太腸經考正穴法 由手走頭二十六

商陽 手大指次指內側。去爪甲角如韭葉。灸三壯。針一分。主胸中氣滿。耳聾。口乾。目盲。

二間 食指本節前內側陷中。針三分。灸三壯。主喉痺。領腫。鼻衄。口乾。

三間 食指本節後內側陷中。針三分。灸三壯。主喉梗。胸滿。腸鳴。口乾唇焦。

合谷 手大指次指歧骨間陷中。針三分。灸三壯。主傷寒。大渴。脈浮在表。偏正頭痛。腰痛。

陽谿 腕中上側兩筋間陷中。針三分。灸三壯。主狂言喜笑。熱病。目病。耳鳴。

偏歷 腕中後三寸。針三分。灸三壯。主肩膊肘腕痛。喉症。

溫溜 腕後大士五寸。小士六寸。針三分。灸三壯。主腸鳴。腹痛。肢腫。吐舌。喉痛。

下廉 輔骨下。去上廉一寸。輔筋內分外。針五分。灸三壯。主腹脹。便血。食積。偏風。

上廉 三里下一寸。斜針五分。灸五壯。主小便赤。胸痛。偏風。偏正頭風。

三里 曲池下二寸。按之肉起。銳肉之端。灸三壯。針二分。主霍亂。遺矢。失音。頰腫。中風。手足不隨。

曲池 肘外輔骨。屈肘橫紋頭。陷中。以手拱胸取之。針五分。灸三壯。主風麻木不仁。臂痛。筋緩不伸。婦人經水不調等症。

肘髻 大骨外廉陷中。灸三壯。針三分。主手臂風痛。不仁。五里 肘上三寸。行向裏大脈中央。灸十壯。禁針。主風勞。四肢痛。不可伸。氣脹。目視昏昏。

肘髻 大骨外廉陷中。灸三壯。針三分。主手臂風痛。不仁。五里 肘上三寸。行向裏大脈中央。灸十壯。禁針。主風勞。四肢痛。不可伸。氣脹。目視昏昏。

臂臑 肘上七寸。臑肉端。肩髃下一寸。兩筋兩骨銜陷中。宛中。舉臂取之。灸三壯。針三分。主寒熱。臂痛。不伸。宛中。舉臂取之。灸三壯。針三分。主寒熱。臂痛。不伸。

肩髃 膊骨頭肩端上。兩骨銜中。陷中。宛中。舉臂取之。有空。灸七壯。針六分。主中風。身體麻木不仁。唐魯州刺史庫狄嶽。風痺不能開弓。既權針此穴。即可射。

巨骨 肩尖端上行。兩骨銜間陷中。灸五壯。針一寸半。主肩臂痛。胸中瘀血。

天鼎 頸缺盆上直扶突後一寸。灸三壯。針三分。主喉痛。氣硬。

扶突 一名水穴。氣舍上一寸五分。在頸當曲頰下一寸。人迎後一寸五分。仰而取之。灸三壯。針三分。喉痛。咳嗽。氣上。


禾髻 鼻孔下。俠水溝旁五分。針三分。禁灸。主尸厥。及口不開。一切鼻病。

迎香 鼻下孔旁五分。針三分。禁灸。主鼻塞不開。不聞香臭。偏風。口喎斜。喘息不利。鼻中息肉。

中西通泰醫學 手陽明太腸經考正穴法 二十九

大腸虛也
大腸者
下燥上津
實木者

大腸
大腸門
小腸
大腸



中西匯參醫學

大腸論

大腸經主治

手陽明大腸經主治

大腸為傳道之官。與太陰肺經相表裏。故肺虛則大腸若
墜。而氣為下陷。腸液少則肺亦焦燥。而鼻竅為之乾。上接
小腸。下通穀道。為諸臟泄氣之門。啟閉失職。諸臟受困。

大腸無表症皆屬於裏

大腸虛氣虛也。右尺脈沉弱。症為氣血不足。脫肛下陷。
補中益氣湯。赤白痢。加芍藥。加黃芩。加葛根。加升麻。加
柴胡。加羌活。加白芷。加細辛。加薄荷。加甘草。加粳米。加
大腸實者。胃移熱也。脈右尺洪實。症如實大便秘閉。小
腸胃不清而生臟毒。下如魚腸。如豆汁者。為濕熱。燥

渴發狂。尿燥不出。如小兒。腸癰。痛。瀉。如淋。
十金。壯。皮。散。主。之。

大腸寒積。右尺脈沉遲。症多久痢。腹痛積寒在臟。子包。

大腸熱。肺臟移熱居多。右尺與右寸脈數。症如便血口
燥。唇焦。舌苔甘燥。如腸風下血。風邪乘之。腹多不痛。
清燥救肺。黃芩。丹皮。生地。地黃。風下血。風邪乘之。腹多不痛。
主之。脫肛。腫痛。如母。黃。解毒。主之。

大腸部藥隊

補大腸猛將 淫羊藿 栗壳

補大腸次將 訂子肉 百合

瀉大腸猛將 大黃 桃仁 雷丸 麻仁 升麻

瀉大腸次將 秦艽 旋覆花 郁李仁 杏仁 白芷

大腹皮 梨汁

涼大腸猛將 黃芩 黃柏

涼大腸次將 地榆 槐實 知母 連翹

溫大腸猛將 胡椒 破故紙 枸杞

溫大腸次將 當歸

中西匯參醫學

大腸部藥隊

三十一

簡明中西匯參醫學



中西匯參醫學

足陽明胃經考正穴法

三十二

廣益書局印行

足陽明胃經考正穴法 由頭走足四十五穴

頭維 額角入髮際。本神旁一寸五分。神庭旁四寸五分。針三分。禁灸。主頭痛。如破。目痛。

下關 客主人下。耳前動脈下廉。合口有空。開口則閉。側卧閉口取之。針四分。禁灸。主耳有膿汁。口目喎邪。牙腫。

以三棱針出血。多含鹽湯。可不畏風。頰車 耳下八分。曲頰端。近前陷中。側卧開口有空。取之。針四分。灸七壯。炷如麥。主中風口噤。失音。牙痛。項強。

承泣 目下七分。直瞳子陷中。禁針灸。四白 目下一寸。直瞳子。令病人正視取之。針三分。灸七壯。

巨髻 主頭痛目眩。俠鼻孔旁八分。直瞳子。平水溝。針三分。灸七壯。主

面腫一切目疾。地倉 俠口吻旁四寸。針三分。灸二七壯。炷莫大。主偏風。口眼喎斜。

大迎 曲頰前一寸二分。骨陷中動脈。又以口下當兩肩。是穴。針三分。灸三壯。主風口頰腫硬。目痛不閉。

人迎 夾結喉兩旁。一寸五分。仰而取之。晉左叔和以左右寸口為人迎。禁針。主吐逆。霍亂。胸滿。咽腫。瘰癧。

水突 頸大筋前。直人迎下。氣舍上。針三分。灸三壯。主氣上咳逆。喉腫。氣短。促難卧。

氣舍 頸直人迎下。俠天突陷中。灸三壯。針三分。主欬逆。項硬。咽腫。不消。癭瘤。

缺盆 肩下橫骨陷中。灸三壯。針三分。不宜深。主息奔。胸

滿。水腫。喉痹。

氣戶 巨骨下。俞府兩旁各二寸陷中。去中行各四寸。仰而取之。針三分。灸三壯。主氣逆。喘咳。喉癰。

庫房 氣戶下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。針三分。灸五壯。主氣逆。咳。喉胸滿。

屋翳 庫房下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。針四分。灸五壯。主咳逆。上氣。

乳根 乳中下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。針三分。灸五壯。主胸滿。氣逆。壅病。乳痛。

不容 幽門旁。相去各一寸五分。去中行各三寸。灸五壯。針五分。主腹滿。吐血。肩脇痛。口乾。

承滿 不容下一寸。去中行各三寸。針三分。灸五壯。主腸

中西匯參醫學

足陽明胃經考正穴法

三十三

廣益書局印行

鳴腹脹上氣喘逆唾血。

肩窗 屋翳下一寸六分陷中。去中行四寸。針四分。灸五

壯。主胸滿短氣。寒熱卧不安。

乳中 當乳中是。微刺三分。禁灸。主竅閉汁不通。乳吹。

梁門 承滿下一寸。去中行各三寸。針三分。灸五壯。主腸

下積氣。食不運化。

關門 梁門下一寸。去中行各三寸。針八分。灸五壯。主腸

鳴。卒痛。泄利。不思飲食。

大乙 關門下一寸。去中行各三寸。針八分。灸壯。主心煩

癩疾。主之。

滑肉門 大乙下一寸。去中行各三寸。針八分。灸五壯。主

癩狂舌強。

中西匯參醫學 足陽明胃經考正穴法 三十四 廣東省印行

夫樞 去脊俞一寸。俠臍中兩旁。各二寸陷中。灸百壯。針

五分。主氣逆水腫。

外陵 天樞下一寸。去中行各二寸。灸五壯。針三分。主腹

痛心懸。

大巨 外陵下一寸。去中行各二寸。灸五壯。針五分。主小

腹痛。心懸。小便閉。

水道 大巨下三寸。去中行各二寸。灸五壯。針三分。主

腰強。小腹脹。便閉。

歸來 水道下二寸。去中行各二寸。灸五壯。針五分。主小

腹痛。七疝。婦人血臍積冷。

氣衝 歸來下一寸。去中行各二寸。灸七壯。炷如麥。禁針。

主氣逆。腹滿。又能於吐血不愈。以三稜針刺出血。立愈。

牌關 伏兔後交文中。針六分。灸三壯。主腰痛足麻木不

仁。

伏兔 膝上六寸起肉。坐而取之。以左右各三指按捺。上

有肉起如兔之狀。因以為名。針五分。禁灸。主風氣。腹脹

風勞。痺逆。

陰市 膝上三寸。伏兔下陷中。拜而取之。針三分。禁灸。主

腰脚寒。腹脹。痿痺不仁。

梁邱 膝上二寸兩筋間。灸三壯。針三分。主冷痺不仁。乳

腫痛。腰膝脚痛。

犢鼻 膝膑下。胫骨上。俠解大筋陷中。形如牛鼻。故名。針

三分。灸三壯。主膝痛不仁。

三里 膝下三寸。胫骨外廉大筋內宛宛中。兩筋內分間。

中西匯參醫學 足陽明胃經考正穴法 三十五 廣東省印行

舉足取之。灸三壯。針五分。主胃寒。腹脹。便閉。氣逆。有人

年少氣弱。常於三里氣海灸之。節次約五七十壯。至老

不生熱厥頭痛。雖大寒不畏。

上廉 三里下三寸兩筋骨罅中。蹲地舉足取之。針八分。

灸三壯。主風痺。喉痺。偏風足痛。

條口 下廉上一寸。舉足取之。針五分。灸三壯。主足麻足

寒。濕痺。疔腫。

下廉 上廉下三寸兩筋骨罅中。蹲地舉足取之。針八分。

灸三壯。得氣即瀉。偏風腿痿。風濕痺。喉痺。傷寒狂言。

豐隆 外踝上八寸。下胫外廉陷中。針三分。灸三壯。主便

閉。風疾。頭風癩狂。

解谿 衝陽後一寸五分。腕上陷中。足大指次指直上。附

渴小便如膏為下消。六味地黃湯。口燥唇焦。疾火為患。二陳湯。加山。胃火迫血妄行。白虎湯。陽明有餘。少陰不足。齒痛者。玉女煎。黃胖而腫。濕熱者。和中丸。熱蒸自汗。抽筋飲胃火熾甚。舌黑燥渴者。白虎湯。發疹疥大鬱而化者。初用葛根湯。加牛蒡子。散之。次用犀角大青湯。加石膏。或三黃解毒湯。甚則白虎湯。調胃承氣湯。加胃火上升。呃逆不止。安胃散。頭痛筋起。胃火上衝者。加味生麻湯。主之。

胃部藥隊

- 補胃猛將 白朮 黃耆 大棗
- 補胃次將 菖豆 山藥 龍圓 紅棗 炙甘草
- 瀉胃猛將 枳實 雷丸 神麩 石菖蒲 白芥子
- 萊菔子

中西匯參醫學

胃部藥隊

三十八

廣濟書局印行

- 瀉胃次將 石骨 犀角
- 瀉胃次將 花粉 葛根 香薷 石斛 華薜 知母
- 蘆根 竹葉
- 溫胃猛將 乾薑 高良薑 益智仁 肉豆蔻 草果
- 丁香 沉香 木香 胡椒 辛夷
- 溫胃次將 藿香 砂仁 白豆蔻 半夏 烏藥 煨薑 厚朴 川椒

瀉胃次將 蘇梗 枳殼 蔓荊子 麥芽



中西匯參醫學

足大陰脾經考正穴法

三十九

廣濟書局印行

足大陰脾經考正穴法 由足走胸二十一穴

隱白 足大指端內側。去爪甲角如韭葉。針三分。灸三壯。主腹脹喘滿。衄血。小兒慢驚。

大都 足大指節後內側陷中。骨縫赤白肉際。針三分。灸三壯。主熱病。腹脹吐逆。心痛。

太白 足大指內側。內踝前核骨下陷中。針三分。灸三壯。主身熱腹脹。嘔吐。食不化。

公孫 足大指本節後一寸。內踝前。足太陰絡脈。針四分。灸三壯。主寒熱。腹脹痛。氣逆。

商邱 足內踝骨下。微前陷中。前是中封。後是照海。居中。即是正穴。灸三壯。針三分。主腹脹。寒瘡。疝氣。黃胆。

三陰交 內踝上三寸。骨下陷中。針三分。灸三壯。主脾胃

虛弱心腹脹滿此穴腎肝脾三脈交會。

漏谷 內踝上六寸。胛骨下陷中。針三分。禁灸。主腸鳴脹滿氣逆。

地機 膝下五寸。膝內側輔骨下陷中。伸足取之。灸三壯。針三分。主腰痛。腹脹。癥瘕。

陰陵泉 膝下內側輔骨下陷中。伸足取之。或屈膝取之。在膝橫紋頭下。與陽陵泉穴相對。稍高一寸。針五分。主陰痛。淋症。腹寒痛。

血海 膝膕上。內廉白肉際二寸半。針五分。灸三壯。主氣逆。腹脹。暴崩。

箕門 魚腹上越筋間。陰股內動脈應手。一云股上起筋處。灸三壯。主淋症。遺溺。

衝門 府舍下一寸。橫骨兩端。約中動脈。去腹中行各四寸半。針七分。灸五壯。主腹寒氣滿。積聚。陰症。

府舍 腹結下二寸。去腹中行各四寸半。灸五壯。針七分。主疝瘕。痺中急疼。

腹結 大橫下一寸三分。去腹中行各四寸半。針七分。灸五壯。主效逆。腹寒痛。

大橫 腹哀下三寸五分。去腹中行各四寸半。針七分。灸五壯。主風逆。四肢強硬。

腹哀 日月下一寸五分。去腹中行各四寸半。針三分。主腸寒。便血。腹痛。

食管 天谿下一寸六分。去胸中行各六寸。舉膚取之。針四分。灸五壯。主胸滿。膈痛。

天谿 天谿下一寸六分。去胸中行各六寸。舉膚取之。針四分。灸五壯。主胸滿。膈痛。

天谿 胸鄉下一寸六分。陷中。去胸中行各六寸。仰而取之。針四分。灸五壯。主胸滿。氣逆。喉中作聲。

胸鄉 周榮下一寸六分。去胸中行各六寸。仰而取之。針四分。灸五壯。主胸滿。背痛。

周榮 中府下一寸六分。去胸中行各六寸。仰而取之。針四分。主胸滿。效逆。氣上。灸三壯。

大包 淵液下三寸。灸三壯。針三分。主胸中痛。氣喘。

中西匯參醫學 足太陰脾經考正穴法 四十

中西匯參醫學 足太陰脾經考正穴法 四十一

脾經諸穴歌
足太陰脾中州。二十一穴。總白。遊。壯。大都。會。腹。太。白。然。公。孫。分。生。商。邱。越。三陰之文。而滿谷地。機。可。按。步。陰。以。之。泉。而。血。海。箕。門。是。其。入。衝。門。分。府。舍。軒。髀。腹。結。分。大。橫。使。滯。腹。哀。食。管。分。天。谿。而。同。脈。胸。鄉。周。榮。分。大包。而。如。何。



足太陰脾經主治
脾屬土。中央戊己其色黃。為後天之本。下受命門火。蒸化穀食。上輸穀食之液。灌溉臟腑。人生存活之原。脾土之功為最大。其性喜燥而惡濕。濕則土力衰而木得以尅之。位列中焦。其分野在眼胞鼻準四肢。與陽明胃經相表裏。

脾無表症。皆屬於裏。

脾虛。右關脈細軟。病為嘔吐。寒濕中空。六君子湯加土。不勝濕泄瀉者。五味異功散。氣虛下痢。補中益氣湯。四肢軟弱。五味異功散。腫脹。補中益氣湯。肌瘦。十全大氣虛鼓脹。六君子湯。陽虛惡寒。附子理中湯。表虛自汗。加黃芪。五味異功散。土不勝金而喘。五味異功散。化穀無力積滯。六君子湯。虛陷脫肛腸紅。補中益氣湯。

中西匯參醫學

足太陰脾經主治

四十二

廣益善局印行

脾寔。右關脈洪寔。其症為氣鬱發悶。沉香。血積作痛。食積堅滿。大便痞積。血滯。九香。蟲積濕熱所化。唇內有白點。化毒。痰飲咳痛。小半。湯。中寔有物。非蟲即血。凡和中滯腹痛。香砂。二陳。湯。脾寒之症。右關脈沉遲。唇舌必白。病如嘔吐。食不消化。反胃。脾胃散泄瀉。六君子。白痢。六君子。腹痛。香砂。身痛濕重。香白。二陳。黃疸。前使。濕腫。五苓。肢冷。附子。厥脫氣衰。附子。理中。湯。脾熱之症。右關脈數。舌胎薄黃。唇赤。症如熱吐。補中。流涎。腫中。出沫。黃芩。芍藥。洞泄。如注。四苓。瀉。如蟹。將變成痢。黃芩。芍藥。赤痢。傷血。治痢。奇方。腹痛。甘草。甘草。目胞腫痛。大上升。酒濕。積滯。瀉。

簡明中西匯參醫學圖說 上編

病。加味。枳。赤。湯。加。酒。濕。生。熱。眩。暈。黃。疸。目。溺。皆。黃。芩。芍。藥。大。黃。湯。如。使。

脾部藥隊

補脾猛將 黃精 白朮
補脾次將 山藥 扁豆 苡仁 大棗 炙甘草
瀉脾猛將 枳實 萊菔子
瀉脾次將 神曲 麥芽 山楂 枳殼 厚朴 白芷
大腹皮 使君子 雞內金 陳皮 檳榔
涼脾猛將 大黃 黃芩 瓜蒌霜
涼脾次將 黃柏 小枳 知母 銀花 武夷茶
溫脾猛將 附子 乾姜 巴豆 肉豆蔻 草果仁
蒼朮 胡椒

中西匯參醫學

脾部藥隊

四十三

廣益善局印行

溫脾次將 木香 煨姜 烏藥 益智仁 焦穀芽
砂仁 白蔻仁 蕪荑 川椒

五二五



中西匯參醫學 手少陰心經考正穴法 四十四

手少陰心經考正穴法 由胸走手九穴

極泉 臂內腋下筋動脈入胸。針三分。灸七壯。主心痛。乾嘔煩渴。

青靈 肘上三寸。伸肘舉臂取之。灸三壯。主頭痛。臂不舉。

少海 肘內廉節後大骨外。去肘端五分。屈肘向頭得之。針三分。灸三壯。主寒熱。半身不遂。項難回顧。

靈道 掌後一寸五分。針三分。灸三壯。主心痛。乾嘔。

通里 掌後一寸陷中。針三分。灸三壯。主鼻衄。心痛。頭痛。

陰郄 掌後脈中。去腕五分。針三分。灸七壯。主鼻衄。心痛。霍亂胸滿。

神門 掌後悅骨端陷中。手少陰心脈所注。針三分。灸七壯。主瘧疾。心煩。喘逆。身熱。吐血等症。

少府 手小指本節後骨縫陷中。針二分。灸七壯。主煩滿。少氣。陰痛及遺尿。偏墜。小便不利。

少衝 手小指內側。去爪甲角如韭葉。針一分。灸三壯。主熱病。煩滿。胸痛。痰氣等症。

中西匯參醫學 手少陰心經考正穴法 四十五

心經諸穴歌

手少陰九穴成極泉青靈
少海行自靈道通里而通
陰郄神門而此極於少府少
衝可尋

心圖

大動脈 上下行大動脈
肺動脈 上下行大動脈
心

手少陰心經主治
心屬火。其色赤。居胸下岐骨陷處。得血養之。能運慧思。用
才智。為君主之官。

心無表症。皆屬於裏。

血不足則虛。左寸脈必弱。其症如驚悸。惕場。惕然。恐神失
所守。七情飲。思慮過。夜不得卧。歸脾湯。安神。心腎不
交。神明不充。健忘者。歸脾湯。十之似。饋似飢。喜手按摩。虛
痛者。洋參。麥氣。自下。逆。怔忡者。歸脾湯。遺精。或夢或不
夢。心腎不固者。清心丸。

邪一入則實。所入之邪。多在包絡。左寸脈必弦大。其症
如氣滯。食脹。或怒冲煩悶而痛。沉香。降。血凝於中。而痛
者。手拈。乾嘔吐。涎。停飲作痛。湯。夏。加。茯苓。疾速。瘳。閉。不

中西匯參醫學

手少陰心經主治

四十六

廣益書局印行

省人事。清。暑。閉。汗。喘。昏。悶。清。暑。丸。灌。之。再。用。蘇。喘
者。飢時作痛。面白唇紅。化。蟲。

心之寒。左寸脈遲。其症為暴痛。肢冷。氣冷。綿綿不休。附
桂。湯。加。酒。

心之熱。左寸脈數。舌尖赤。其症多目痛。赤腫羞明。導。赤
連。翹。菊。花。重。舌。木。舌。者。濁。心。煩。躁。者。濁。心。竹。加。暑。熱。乘

心不得卧者。益。元。散。加。癩。狂。者。法。依。謔。語。邪。熱。攻。心。者。
濁。心。赤。濁。者。加。燈。心。丹。參。飲。便。血。者。阿。膠。

心部藥隊

補心猛將 北五味

補心次將 棗仁 柏子仁 遠志肉 丹參 龍眼肉

麥門冬 當歸 白芍 茯苓 茯神

瀉心猛將 石菖蒲 黃連 木通 硃砂 犀角
瀉心次將 山梔仁 連翹心 通草 車前子 燈心
竹捲心 蓮子心

中西匯參醫學

心部藥隊

四十七

廣益書局印行

手太陽小腸經



手大陽小腸經考正穴法 由手走頭十九穴

少澤 手小指端外側去爪甲角下一分陷中灸一壯針

一分主瘡寒熱喉痹舌強口乾項強目翳頭痛

前谷 手小指外側本節前陷中針一分灸一壯主熱病

耳鳴項腫喉痺鼻塞咳血

後谿 手小指外側本節後陷中握拳取之針一分灸一

壯主寒熱目赤鼻衄耳聾項強

腕骨 手外側腕前起骨下陷中針二分灸三壯主頭痛

耳鳴目翳驚風

陽谷 手外側腕中銳骨下陷中灸三壯針二分主癩疾

頭腫耳聾齒痛舌吐目眩

養老 手踝骨前上一分腕骨後一寸陷中針三分灸三

壯主肩臂痛

支正 腕後五寸針三分灸三壯主風驚恐悲愁癩狂五

勞手臂強硬

小海 肘外大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之針

二分灸三壯主肩臂痛寒熱齒腫耳聾目黃頰腫

肩貞 曲肘下兩骨解間肩髃後陷中針五分灸三壯主

傷寒耳病手足麻木

臑俞 俠骨髃後大骨下脾上廉陷中舉臂取之針八分

灸三壯主肩臂痛氣腫

天宗 束風後大骨下陷中灸三壯針五分主肩痛不能

伸舉肘後痛

臑風 天髃外肩上下兩後舉臂有空灸五壯針五分主

肩痛不能舉

曲垣 肩中央曲胛陷中灸三壯針五分主肩痺熱痛氣

注肩胛拘急痛

肩外俞 肩胛上廉去脊三寸陷中針五分灸三壯主肩

胛痛

肩中俞 肩胛內廉去脊二寸陷中針六分灸三壯主咳

嗽上氣唾血寒熱目昏

天窗 頭大筋間前曲頰下扶突後動脈應手陷中灸三

壯針三分主痔瘻頭痛中風

天容 耳下曲頰後針一寸灸三壯主喉痺咽硬吐逆耳

聾鳴

顴髎 面頰骨下廉銳骨端陷中針二分主口喎斜面赤

眼動齒痛

聽宮 耳中珠子大如赤小豆針三分灸三壯主失音腹

滿耳鳴

中西匯參醫學 手大陽小腸經考正穴法 四十八

中西匯參醫學 手大陽小腸經考正穴法 四十九

小腸諸穴歌
 小腸六十九中諸穴少澤步前谷
 後穀之隆道通腕骨腕陽谷谷老
 之宗付走正於小海遂肩貞以相從
 循膈前分過天宗乘末風兮曲垣
 中府外俞兮肩中俞啟天官兮見
 天宮運由顛懸焉逆轉宮

上接胃口與門
 下入大腸關門

小腸圖



中西匯參醫學

小腸諸穴歌 小腸圖
 手太陽小腸經主治

五十

廣益書局印行

手太陽小腸經主治

小腸者受盛之官。化物出焉。其上口即胃。下口水穀由此而入。下口即大腸上口。此處沁別清濁。俾水液滲膀胱。滓穢流入大腸。是腑中之有鑿別者。與少陰心相表裏。脈附左尺。

小腸無表症。皆屬於裏。

小腸虛。左尺脈細軟。其症為溺赤短。兼地腰痛水不足者。六味地黃丸。

小腸實。左尺脈洪弦。其症為下焦氣滯。臍下轉痛。橘核丸。

陰陽拂逆。大小腸交。散五苓散。
 小腸寒。左尺脈遲。其症為咳嗽失氣。有所謂小腸寒嗽。止咳散加芍藥主之。

小腸熱。左尺脈數。其症為溺滴溺短。濕熱壅滯。導赤散。

小腸奇藥隊

補小腸猛將 生地

瀉小腸猛將 木通

瀉小腸次將 瞿麥 海金沙 川棟子 苡仁 赤芍

赤茯苓 燈草

中西匯參醫學

小腸經藥隊
 足太陽膀胱經穴圖

五十

廣益書局印行

足太陽膀胱經穴圖



足太陽膀胱經考正穴法由頭走足六十七穴

睛明 目內背頭外宛宛中針一分半主頭痛目疾

橫竹 兩肩頭陷中針一分禁灸主頭痛鼻塞一切目疾

眉冲 直眉頭上神庭曲差之間針三分禁灸主五癩頭

痛鼻塞

曲差 神庭旁一寸五分入髮際針二分灸三壯主目疾

心煩頭痛鼻塞煩熱

五處 俠上星旁一寸五分針三分灸三壯主脊強反折

頭熱目不明

承光 五處後一寸五分針三分主風眩頭痛嘔吐心煩

鼻塞目翳

通天 承光後一寸五分針三分灸三壯主頭項難轉頭

痛鼻衄

絡却 通天後一寸五分灸三壯主頭痛目障耳鳴

玉枕 絡却後一寸五分俠臑戶旁一寸三分起肉枕骨

上入髮際二寸灸三壯針三分主目痛如脫頭風痛不

可忍鼻塞不聞

天柱 俠項後髮際大筋外廉陷中針五分灸七壯主足

弱肩背欲折頭脹痛項強

大杼 項後第一椎下兩旁相去脊各一寸五分陷中正

坐取之針五分灸七壯主頭目眩腹痛項強

風門 二椎下兩旁去脊各一寸五分正坐取之針五分

灸五壯主發背氣喘項強目瞑胸熱卧不安

肺俞 第三椎下兩旁相去脊各一寸五分針五分灸三

壯主瘦氣黃疸勞瘵口乾項強嘔吐

厥陰俞 四椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之針

三分灸七壯主欬逆牙痛心痛胸滿嘔吐

心俞 五椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之針三

分灸五壯主偏風中風鼻衄目昏心亂

督俞 六椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之主寒

熱腹痛氣逆灸三壯

高俞 七椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之針三

分灸三壯主心痛翻胃骨蒸腫脹

肝俞 九椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之針三

分灸三壯主氣逆中風目昏欬逆口乾

膽俞 十椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之針五

分灸三壯主腹脹積聚黃疸

脾俞 十一椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之針

三分灸三壯主腹痛多食身瘦痰瘧寒熱黃疸

胃俞 十二椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之針

三分灸三壯主霍亂腹脹翻胃嘔吐

三焦俞 十三椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之

針五分灸三壯主積脹傷寒頭痛

腎俞 十四椎下兩旁相去脊各一寸五分前與臍平正

坐取之針三分灸三壯主發傷寒頭痛五勞七傷瘦弱

面黃

氣海俞 十五椎下兩旁相去脊各一寸五分主腰痛痔

漏針三分灸五壯

中西匯參醫學 足太陽膀胱經考正穴法 五十二 廣東省局印行

中西匯參醫學 足太陽膀胱經考正穴法 五十三 廣東省局印行

大腸俞 十六椎兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。灸三壯。主脊強難俯仰。腰腹脹痛。小腹絞痛。

關元俞 十七椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。主風勞腰痛。泄痢。虛脹。疲聚。

小腸俞 十八椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。灸三壯。主津液少。便赤。腹脹。五痔。頭痛。虛乏。

膀胱俞 十九椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。灸三壯。主急強。便黃。遺溺。拘急。泄利。腹痛。女子疲聚。

中膂俞 二十椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。灸三壯。主腎虛。腰強。腸冷。赤白痢。腹脹。

白環俞 二十一椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。

之針五分。灸三壯。主手足不仁。腰痛。疝氣。

上髎 第一空腰髁下一寸。俠脊陷中。針三分。灸七壯。主便閉。嘔逆。大理。趙卿患偏風。不能起。跪。甄權針上髎。環跳。陽陵泉。巨虛。下廉。即能起。跪。

次髎 第二空俠脊陷中。針三分。灸七壯。主小便赤。腰痛。不仁。疝氣。下墜。偏風。婦人赤白帶下。

中髎 三空俠脊陷中。針二分。灸三壯。主便閉。腹脹。五勞。七傷。婦人絕子。帶下。月信不調。

下髎 四空俠脊陷中。針二分。灸三壯。主大小便不利。大便下血。小腹急痛。

會陽 陰尾尻骨兩旁。針八分。灸五壯。主腹寒。熱。冷。隔氣。腸辟。下血。陽氣虛。久痔。

中西匯參醫學 足太陽膀胱經考正穴法 五十四 傳習書印行

附分 二椎下附項內廉兩旁相去脊各三寸。正坐取之。針三分。灸五壯。主風氣拘急。不仁。頸強。

魄戶 直附分下三椎下兩旁相去脊各三寸。正坐取之。針五分。灸七壯。至百壯。主虛勞背痛。三尸走症。項強。喘急。嘔吐。煩滿。

膏肓俞 四椎下一分。五椎上二分。兩旁相去脊各三寸。四肋三間。正坐取脊。伸兩手以臂着膝間。令端直。手大指與膝頭齊。以物支肘。毋令搖動。取之。灸百壯。至數百壯。主虛弱瘦損。上氣欬逆。晉侯疾。秦緩至。為病在膏下。肓上。不可為也。孫思邈曰。專心求此穴。灸之。疾無不愈。

神堂 五椎下兩旁。去脊各三寸。陷中。正坐取之。針三分。灸五壯。主背脊強急。胸滿氣逆。

噫嘻 肩膊內廉俠六椎下。兩旁相去脊各三寸。正坐取之。病人言噫嘻。噫嘻。應手所按。針六分。灸二七壯。止百壯。主大風勞損。胸腹脹痛。目疾。鼻衄。喘逆。

高關 七椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。正坐取之。略開兩肩。針五分。灸三壯。主嘔噦。噎悶。胸背連痛。便赤。黃魂門。九椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。正坐取之。針五分。灸三壯。尸厥。食飲不下。腹鳴。便赤。

陽綱 十椎下。兩旁相去脊各三寸。正坐關肩取之。針五分。灸三壯。主腸鳴。腹痛。便赤。身熱。怠惰。

意舍 十一椎下。兩旁相去脊各三寸。正坐取之。針五分。灸五十壯。主腹脹。嘔吐。身熱。目黃。惡風寒。

胃倉 十二椎下。兩旁相去脊各三寸。正坐取之。針五分。

中西匯參醫學 足太陽膀胱經考正穴法 五十五 傳習書印行

灸五十壯。主腹脹水腫。惡寒食阻背痛。
 育門 十三椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。正坐取之。灸三十壯。針五分。主心痛。便堅。乳疾。
 志室 十四椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。正坐取之。針九分。灸三壯。主陰腫痛。腰背強痛。脇痛。霍亂。
 胞育 十九椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。伏而取之。針五分。灸五七壯。主腰脊急痛。腹堅。食不消。便閉。
 秩邊 二十椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。伏而取之。針五分。灸三壯。主五痔發腫。便赤腰痛。
 承扶 尻臀下。陰股上紋中。針七分。灸三壯。主腰脊相引如解。久痔。尻臀腫。便難。陰胞有寒。
 殷門 浮郤下三寸。針七分。主腰脊不可俯仰。惡血泄注。

中西匯參醫學 足太陽膀胱經考正穴法 五十六 廣益書局印行

外股腫
 浮郤 委陽上一寸。展膝得之。針五分。灸三壯。主霍亂轉筋。小便熱。大便堅。
 委陽 承扶下六寸。針七分。灸三壯。主腋下腫痛。筋急身熱。痿厥不仁。
 委中 腘中央約紋動脈陷中。針八分。禁灸。主膝痛腰重。挾脊沉沈。然傷寒四肢熱。汗不出。
 合陽 約紋下三寸。針六分。灸五壯。主腰強。腹痛。寒疝。女子崩中帶下。
 承筋 腓腸中央陷中。脛後從脚跟上七寸。灸三壯。禁針。主腰強。脛痺不仁。痔瘡。霍亂。
 承山 銳腓腸下分肉間陷中。灸五壯。針七分。主便閉。痔

中西匯參醫學 足太陽膀胱經考正穴法 五十七 廣益書局印行

腫霍亂傷寒水結
 飛揚 外踝骨上七寸。灸三壯。針三分。主痔痛。脚痠腫。風逆癩疾。足指不得屈伸。
 附陽 外踝上三寸。針五分。灸三壯。主霍亂頭痛。時有寒熱。四肢不舉。風痺。
 崑崙 足外踝後五分。跟骨上陷中。細脈動應手。針三分。灸三壯。主脚氣。踝裂。肩背拘急。喘滿。目痛。
 僕參 足跟骨下陷中。拱足取之。針三分。灸七壯。主霍亂吐逆。狂言。脚膝氣腫。
 申脈 外踝下五分。陷中。容爪甲。白肉際。前後有筋。上有踝骨。下有軟骨。其穴居中。針三分。灸三壯。主風眩。勞極。冷氣上逆。腰脚痛。

中西匯參醫學 足太陽膀胱經考正穴法 五十七 廣益書局印行

金門 外踝下少後。距後申脈前。針一分。灸三壯。主霍亂暴病。身戰。不耐久立。
 京骨 足外側大骨下。赤白肉際陷中。按而得之。小指本節後大骨。名京骨穴。在骨下。針三分。灸七壯。主頭痛如破。腰痛不可屈伸。身後側痛。目赤爛。寒熱發瘧。項極。
 束骨 足小指外側本節後。赤白肉際陷中。灸三壯。針三分。主頭痛。目疾。瘡癰。腰痛。
 通谷 足小指外側。本節前陷中。針二分。灸三壯。主頭痛。目疾。
 至陰 足小指外側。去爪甲角如韭葉。針二分。灸三壯。主目疾。鼻塞。頭痛。寒瘡。

中西匯參醫學 足太陽膀胱經考正穴法 五十七 廣益書局印行

膀胱諸穴歌

足太陽三十六。晴明攢竹。諸曲差五處之鄉。承光通天。見絡却玉枕之行。天柱高兮大杆。低風門開兮肺俞。當厥陰心膈之俞。肝膽脾胃之臟。三焦腎兮。大腸小腸。膀胱俞兮。中脊白環。自從大杆至此。去脊中寸半之旁。又有上次中下四膠。在腰四空以相將。會陽居尻尾之側。始了背脊中。二行仍上肩胛而下。附分二椎之旁。三椎魄戶。四椎膏肓。神堂噫嘻兮高關。魂門兮陽綱。意舍兮胃倉。育門志室。秩邊胞育。承扶浮郄與委陽。殷門委中而合陽。承筋承山到飛揚。輔陽崑崙至僕參。申脈金門。探京骨之場。束骨通谷。抵至陰小指之旁。

中西匯參醫學 膀胱諸穴歌 五十八 廣益書局印行

男女生殖器圖

男陰全部直截圖
膀胱 海綿體
皮膚 尿道球腺
和精囊 攝護腺
尿道 射精管
精囊 陰部
包皮 陰囊
尿道 陰囊



女陰全部直截圖
子宮 文骨 恥骨
尿道 陰門 牛達骨
膀胱 大陰 小陰

陽精論

精者血脈所生。液之精奇者也。以顯微鏡照驗。見精內有活物甚多。狀如蝌蚪而長尾。游行甚疾。一日尚生。禽獸眾類亦然。但形差別耳。男子未成丁之前。血不生精。丁年以後。赤血運行至外腎。即由微絲管攝入。衆精管。漸運而出。至卵蒂。滲入總管。循行至膀胱之底。藏聚於精囊之內。俟交媾時到。乃由精囊洩出。夫精者。化生甚難。耗失極易。少年血氣未定。百體未堅。若縱情恣慾。輕則有虛勞之憂。重則有夭折之患。戒之在色。養身莫善於寡慾也。若手淫自洩。傷身更甚。每有青盲聾情之症。至於擁妓宿娼。花柳之害尤酷。傷殘身體。毒及妻孥。不知自愛者。誰為惜之。

中西匯參醫學 陽精論 五十九 廣益書局印行

陰經論

女子尻骨盤內。前為膀胱。中為子宮。後為直腸。膀胱溺管長約一寸。其下為陰道。口為陰戶。內寬外狹。童女有薄膜捫閉。膜有小缺。通流月水。初與男子交合。膜破微有血出。俗名破身。及生子則有產門也。形如直腸。肉理橫生。可寬可窄。內有摺皮。外有連膜。其底嚙接子宮之口。陰水生焉。子宮者。狀如葫蘆上截。倒掛骨盆之內。長二寸。底濶一寸三分。厚七分。內空為三角房。一角在口。兩角在底。分左右。底角有小孔。可通猪毛。底之外有兩筋帶懸之。一圓一扁。圓筋繫於交骨。扁筋即大小腸夾膜。與膀胱粘連。若筋帶無力。或產後行動。即有子宮下墜之憂。凡未嫁童女。子宮之口。小如目瞳。共重八錢。懷孕之後。積月漸大。妊胎三月。

漸長四寸。妊胎五月。底圓如盤。妊胎七月。脹至臍上。漸長六寸。妊胎九月。直至胸下。長尺有零。重四兩。圓如西瓜。生子之後。腹縮而小。重只二兩而已。子宮之底。左右各出子管一支。與底角之孔通連。長二寸五分。管尾略闊。披展如絲。不即不離。垂於子核之側。子核者。在子宮左右。約離一寸。向內有蒂。與子宮相連。向外有筋帶。與子管相繫。形如雀卵。薄膜覆之。內有精珠十五顆。至十八顆不等。其質甚薄。剖而看之。內貯清水。是為陰精。女子受胎之年。精珠始生。暮年月信止。精珠化為烏有。凡夫婦交媾。男精洩入子宮。透於子管。子管即單護子核。子核感動。精珠迸裂。陰精與陽精交會。自子管之尾而入。在管內漸結薄衣。為胚珠。是為成孕。由是損生新膜。又生膠粒。塞子宮。是謂受胎。

中西匯考醫學 足太陽膀胱經主治

足太陽膀胱經主治 膀胱為州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。亦必待腎氣充足則化。不足則不化。入氣不化。則水歸大腸而為泄瀉。出氣不化。則閉塞下焦為癃腫。故小便之利。全在膀胱。其實在腎氣主之也。凡傷寒有傳於各經之邪。多從膀胱而入。初起太陽頭痛等症。急宜發散。不使邪氣深入。諸經為害。可知膀胱為入邪之第一關津。膀胱為太陽之腑。自有表症。左尺脈浮軟。其症為頭痛。從腦而連項脊。加味香薷散。身痛四肢拘急。風傷衛。寒傷營者。桂枝湯。理開寒發熱者。香薷散。寒無汗。寒乘表。麻黃喘嗽。寒邪客於皮毛。肺氣不得升降。麻黃湯。散之。

膀胱經虛。腎氣不化。左尺脈沉細。其症為小便不禁。氣虛不能統攝。補湯。大勞力辛苦。氣虛不化。為勞淋者。中虛。色慾動心。精不出而內敗。大小便牽痛。而為淋者。其病分清。飲去黃柏。加地黃。內以去其精。再服六味。膀胱實。左尺脈洪大。其症為氣淋。氣滯。水道阻塞。臍下脹痛。假蘇散。血淋。蓄瘀。莖中刺痛。難忍。紅生。地。如物。加石。玉。溺閉。吐逆。蘇。氣結。膀胱。少腹熱。滿於小便。名曰胞痺。補核。膀胱寒。左尺脈沉遲。其症為冷淋。寒氣堅閉。水道四肢寒冷。全服腎氣。膀胱熱。左尺脈數。其症為小便不通。口渴。則熱在上焦。四苓散。加不渴。則熱在下焦。滋腎膏。淋者。滴液如膏也。山。能。黃。芥。

中西匯考醫學 足太陽膀胱經主治

清熱分石淋者。下如沙石也。益元散。便膿血者。心氣道熱於膀胱也。阿膠。發狂者。傷寒熱結膀胱。下焦蓄血。少腹硬滿也。調胃承氣。膀胱部藥隊 補膀胱即補腎之藥。腎氣化則小便自行。瀉膀胱猛將 羌活 麻黃 防己 木通 葶藶 猪苓 瀉膀胱次將 獨活 防風 蒲黃 川棟子 前胡 桑本 澤瀉 蔥 瀉膀胱猛將 廿遂 龍膽草 涼膀胱次將 茵陳 車前子 海金沙 川黃柏 溫膀胱猛將 吳茱萸

溫膀胱次將 烏藥 茴香

中西匯參醫學

膀胱部藥學

六十二

足少陰腎經穴圖



簡明中西匯參醫學圖說 上編

足少陰腎經考正穴法 由足走頭二十七穴

湧泉 足心陷中。屈足捲指宛宛中。白肉際。跪取之。針五分。勿出血。灸三壯。主尸厥。吐血氣逆。心腹痛。咽喉閉痛。舌急。漢濟北王母熱厥。足熱。滑于意刺足心。立愈。

然谷 足內踝前起大骨下陷中。灸三壯。針三分。主咽喉閉痛。心痛。盜汗。泄精。陰痿。口喎。

太谿 足內踝後五分。跟骨上動脈陷中。凡男女病有此脈則生無則死。針三分。灸五壯。主久瘡。心痛。至腹痛。手足冷。

大鍾 足跟後踵中。大骨上。兩筋間。灸三壯。針二分。主嘔吐。腹滿。胸脹。氣逆。口熱。舌乾。

水泉 太谿下一寸。內踝下少陰卻。灸五壯。針四分。主目

不能遠視。月信不來。腹痛。照海 足內踝下四分。前後有筋。上有踝骨。下有軟骨。其穴居中。針三分。灸七壯。主咽乾。久瘡。煩悶。嘔吐。大風。

復溜 足內踝上二寸。筋骨陷中。前傍骨是復溜。後傍骨是交信。二穴止隔一條筋。針三分。灸五壯。主腸癰。腹脹。如鼓。四肢腫。五種水病。血痔。便熱。盜汗。

交信 足內踝骨上二寸。針四分。灸三壯。主氣淋。疝氣。痢疾。便淋。女子漏血不止。

築巔 內踝上臑分中。針三分。灸五壯。主癩疝。胎疝。吐舌。嘔吐。

陰谷 膝內輔骨後大筋下。小筋上。按之應手。屈膝得之。針四分。灸三壯。主膝痛如錐。舌縱涎下。煩逆。陰痛。

中西匯參醫學

足少陰腎經考正穴法

六十三

足少陰腎經穴圖

五三五

橫骨 大赫下一寸。陰上橫骨中宛曲如仰月。中央去腹中行各一寸。灸三壯。禁針。主五淋便閉。目赤痛。大赫 氣穴下一寸。去腹中行各一寸。灸五壯。針三分。主虛勞失精。陰縮。莖痛。目赤。婦人赤帶。氣穴 一名胞門。一名子戶。四滿下一寸。去腹中行各一寸。灸五壯。針三分。主氣上下。腰痛。泄利。四滿 中注下一寸。去腹中行各一寸。針三分。灸三壯。主積聚。疝瘕。目赤。月水不調。惡血攻痛。中注 盲俞下一寸。去腹中行各一寸。針三分。灸三壯。主小腹有熱。大便堅燥。目赤。腰痛。盲俞 商曲下一寸。去腹中行各一寸。針一寸。灸五壯。主腹熱。便閉。腰痛。目赤。女子月事不調。

中西匯纂醫學

足少陰經考正穴法

六十四

廣益書局印

商曲 石關下一寸。去腹中行各一寸。五分。針一寸。灸五壯。主腹痛積聚。目赤。石關 陰都下一寸。去腹中行各一寸。五分。針一分。灸三壯。主身寒熱。瘧病。心煩。氣逆。熱病。目赤。痛。婦人無子。腹有惡血。陰都 通谷下一寸。去腹中行各一寸。五分。針三分。灸三壯。主寒熱瘧疾。氣逆。肺脹。腸鳴。目赤。通谷 幽門下一寸。去腹中行各一寸。五分。針五分。灸五壯。主口鳴斜。胸滿。心恍惚。目赤。幽門 俠巨關兩旁各一寸。五分。陷中。針五分。灸五壯。主腹脹。嘔吐。心煩。泄利。膿血。目赤。步廊 神封下一寸。六分。陷中。去胸中行各二寸。仰而取。

之針三分。灸五壯。主胸膈支滿。咳逆。鼻塞。神封 靈墟下一寸。六分。陷中。去胸中行各二寸。仰而取。之針三分。灸五壯。主胸滿。不得息。咳逆。嘔吐。靈墟 神藏下一寸。六分。陷中。去胸中行各二寸。仰而取。之針三分。灸五壯。主胸滿。嘔吐。欬逆。神藏 或中下一寸。六分。陷中。去胸中行各二寸。仰而取。之針三分。灸五壯。主嘔吐。欬逆。胸滿。或中 俞府下一寸。六分。去胸中行各二寸。仰而取。之針四分。灸五壯。主欬逆。胸膈支滿。涎出多唾。俞府 氣舍下璇璣旁各二寸。陷中。仰而取。之針三分。灸五壯。主欬逆。上氣。嘔吐。腹脹。不下。食飲。胸痛。久喘。

中西匯纂醫學

足少陰經考正穴法


六十五

廣益書局印

腎經諸穴歌

足少陰經者。其流注於然谷。太極。水泉。照海。復溜。分肉。結。從臍。省。分。上。陰。谷。橫。骨。分。大。赫。氣。穴。四。滿。中。注。盲。俞。通。谷。幽。門。商。曲。石。關。陰。都。步。廊。神。封。而。靈。墟。存。神。藏。或。中。俞。府。也。

內腎圖



血脈管
回血管
尿管

足少陰腎經主治
 腎為天一之水。先天之本也。位居壬癸北方。其色黑。體常
 虛。中有為命門相火。腎水充足。自多誕育。勿喪其本。則年
 高康健。腫神。下頰。兩腰。皆其部屬。

腎無表症。皆屬於裏。
 腎水虛。脈左右尺當細軟。其症為頭痛。血不能充髓海。
 六味地。血虛火旺耳鳴。加六味地。黃九。虛閉耳聾。加六味地。
 人參石。虛熱盜汗。加生地黃。煎八。母九。湯。虛火夜熱。加四物。
 清皮地。骨皮。心腎不交健忘者。十歸。補。九。湯。虛火鏗金咳嗽。
 者。六味。九。加。水。虧。火。炎。氣。喘。者。味。知。八。血。虛。吐。血。者。地。
 湯。水。虛。腰。痛。者。六。味。九。加。腿。瘦。足。軟。者。十。全。目。視。無。光。
 者。水。不。足。也。九。味。血。虛。液。枯。大。便。燥。結。六。味。九。加。白。蜜。

中西匯參醫學
 足少陰腎經主治
 六十六
 廣東省印行

腎氣不約。小便不禁。湯。補。久。病。久。瘡。脾。腎。兩。虛。症。
 腎無實症。

腎之寒。腎虛也。脈左右尺必遲沉。其症為命門大衰。虛
 象百出。左歸飲。虛火微。不欲飲食。八味地。腎虛泄瀉。
 加味。七。天。柱。骨。倒。腎。脈。空。也。右。歸。歸。倦。卧。厥。冷。腎。火。衰。也。
 神。凡。理。中。湯。飲。
 腎之熱。水將涸也。脈左右尺必沉數。或浮而空。舌黑無
 液。其症為口燥咽乾。氣。目。不。明。無。血。養。者。知。相。八。小。
 便。不。利。者。水。少。也。九。滋。腎。小。便。濁。者。濕。熱。結。於。下。焦。也。鮮。
 分。清。小。便。出。血。者。腎。水。熱。也。黃。湯。大。便。秘。者。液。涸。也。承。
 氣。湯。主。之。
 腎部藥隊

補腎猛將	熟地	枸杞	淫羊藿	北五味
補腎次將	生地	巴戟天	首烏	杜仲
女貞	稽豆皮	海參		龜板
瀉腎猛將	澤瀉	知母	赤苓	苡仁
瀉腎次將	朴硝	苦參	元明粉	
溫腎猛將	生地	丹皮	知母	滑石
溫腎次將	破故紙	鹿茸	鹿角膠	
	山茱萸	兔絲子	大茴香	艾葉

中西匯參醫學
 腎部藥隊
 六十七
 廣東省印行

手厥陰心包絡圖



手厥陰心包絡經考正穴法 由胸走手九穴

天池 腋下三寸。乳後一寸。灸三壯。針二分。主胸中有聲。煩滿。頭痛。寒熱。

天泉 曲腋下二寸。舉臂取之。針六分。灸三壯。主目不明。惡風寒。心胸悶滿。

曲澤 肘內廉陷中。大筋內側橫紋中。動脈。灸三壯。針三分。主心痛。逆氣。嘔吐。

郄門 掌後去腕五寸。針三分。灸五壯。主嘔血。神氣不足。聞使。掌後三寸。兩筋間陷中。針三分。灸七壯。主心胸驚痛。中風昏危。婦人月水不調。小兒客忤。

內關 掌後去腕二寸。兩筋間。與外關相抵。針五分。灸三壯。主中風。心痛。目赤。

天陵 掌後骨下兩筋間陷中。針五分。灸三壯。主熱病。心熱。目赤。口乾。

勞宮 掌中央動脈。屈無名指取之。或言屈中指取之。今改正。屈兩指之中間。取之為準。針二分。灸三壯。主中風。善怒。熱病。脇痛。不可轉側。大小便出血。衄血不止。氣逆。煩欬。口中腥臭。口瘡。黃胆。目黃。小兒齕爛。

中衝 手中指端。去爪甲如韭葉陷中。心包絡脈所出。為井木。心包絡虛補之。針一分。灸一壯。主熱病。煩悶。汗不出。掌中熱。身如火。心痛。煩滿。舌強。

中西匯編醫學 手厥陰心包絡經考正穴法

心包絡諸穴歌
 手厥陰心包之脈。計有九穴而終。自天池天泉為始。連曲澤郄門。而通關使行於內關。天陵近于勞宮。既由掌後。抵於中衝。

心包絡圖



手厥陰心包絡經主治
 包絡與膈中同一而異名也。包絡隨心君居於膈上代君
 行事。故名臣使之官。喜樂出焉。症如手中熱。心中大熱。面
 黃目赤。怔忡等。其實皆是心部之病。既詳言心經。亦不必
 更言包絡矣。觀者與心經合參可也。

中西匯參醫學
 手厥陰心包絡經主治
 三
 廣東省會行



手少陽三焦腑圖

手少陽三焦經考正穴法由手走頭二十三穴
 關衝 手小指次指外側去爪甲角如韭葉針一分。灸一
 壯。主喉閉。頭痛。口乾。目翳。
 液門 小次指歧骨間陷中。握拳取之。針二分。灸三壯。主
 驚悸。咽腫。臂痛。頭痛。目赤。耳聾。
 中渚 手小指次指本節後陷中。在液門下一寸。針三分。
 灸三壯。主熱病。頭痛。目翳。咽腫。臂痛。
 陽池 手表腕上陷中。從指本節直摸下至腕中心。針二
 分。禁灸。主煩渴。寒熱瘧。肩臂痛。
 外關 腕後二寸兩骨間。與內關相對。針三分。灸三壯。主
 耳聾。肩硬。

中西匯參醫學
 手少陽三焦經考正穴法
 四
 廣東省會行

支溝 腕後臂外三寸兩骨間陷中。針二分。灸二壯。主熱
 病。臂疲。肢痛。霍亂。口噤。產後血暈。
 會宗 腕後三寸空中一寸。灸七壯。禁針。主五癰。肌膚痛。
 耳聾。
 三陽絡 臂上大交脈支溝上一寸。灸七壯。禁針。主瘡癤。
 耳聾。嗜臥。四肢不欲搖動。
 四瀆 在肘前五寸外廉陷中。灸三壯。針六分。主暴氣。耳
 聾。齒痛。
 天井 肘外大骨後肘上一寸。輔骨上兩筋又骨罅中。屈
 肘拱胸取之。灸三壯。針三分。主心痛。欬逆。五癰。風痺。
 耳聾。咽腫。項痛。
 清冷淵 肘上二寸。伸肘舉臂取之。針二分。灸三壯。主肩
 臂痛不能舉。

清瀼 肩下臂外間脈針肘分下。針一分。灸三壯。主風痺。
 項強。寒熱頭痛。
 臑會 肩前廉去肩頭各三寸宛宛中。針七分。灸七壯。主
 臂痛疲無力。肩腫引肘中痛。癭瘤。
 肩髃 肩端臑上陷中。斜舉臂取之。針七分。灸三壯。主臂
 痛不能舉。
 天髃 肩缺盆中。上有空起肉上。是穴。針八分。灸三壯。主
 胸中煩悶。肩臂痠痛。項急寒熱。
 天牖 頸大筋外。缺盆上。天容後。天柱前。完骨下。髮際上。
 針一寸。禁灸。主耳目不明。頭痛而腫。項強。
 翳風 耳後尖角陷中。按之引耳中痛。針七分。灸七壯。主
 耳聾。口眼喎斜。口噤不能言。

中西匯參醫學

手少陽三焦經主治

五

廣益書局印行

瘰癧 耳本後難足青絡脈。刺出血如小豆汁。針一分。灸
 三壯。主頭風耳鳴。小兒嘔吐驚恐。目不明。
 顛息 耳後間。青絡脈中。灸七壯。禁針出血。耳痛。喘息。
 兒嘔吐涎沫。身熱頭痛等症。主之。
 角孫 耳廓中間。開口有空。灸三壯。針八分。主目翳。齒痛。
 頭項強。
 絲竹空 眉後陷中。針三分。禁灸。主頭痛。目眩。風寒吐沫。
 和髎 耳前銳髮下橫動脈中。是穴。針七分。灸三壯。主頭
 痛。頭腫。鼻腫多涕。
 耳門 耳前起肉當耳缺者陷中。針三分。灸三壯。不可多
 灸。主耳鳴。出膿。生瘡。齒痛。唇強。



三焦諸穴歌
 三焦者。水谷之通。上焦如霧。中焦如沤。下焦如渇。此其常也。外關通達。主通會宗。三焦結。四清。天有清。地有濁。此其常也。有邪相擊。天動。地天。此其常也。風。燥。濕。火。各歸其位。此其常也。心。胃。脾。肝。肺。腎。膀胱。大。小。腸。居。之。其。氣。總。和。矣。

中西匯參醫學

三焦諸穴歌

六

廣益書局印行

手少陽三焦經主治
 三焦即人生三元之氣。運行臟腑空處是也。上焦心肺居
 之中。焦脾胃居之下。焦肝腎膀胱及大小腸居之。其氣總
 領臟腑。營衛經絡。內外上下左右各處。三焦通。則竟體調
 和矣。
 三焦之病。業已分各臟腑。無可另立病名。
 三焦部藥隊
 補三焦猛將 淫羊藿 黃芪
 瀉三焦猛將 青皮 木香
 瀉三焦次將 柴胡 香附
 溫三焦次將 白豆蔻 烏藥 胡荽
 涼三焦次將 地骨皮 黃柏 山梔 麥冬 連翹

三焦說

三焦者。決瀆之官。水道出焉。自唐以來議論紛紜。未識三焦果是何物。孰知即是人身之脂膜。所以行水也。西醫所謂胃之四面。皆有微絲血管。散走膜膈。達於連網油膜之中。而下入膀胱。連網者。即俗呼雞冠油。並周身之膜皆是也。網油連著膀胱。水因得從網油中滲入膀胱。故古人以三焦為決瀆之官。水道出焉之義也。三焦之根出於腎。兩腎之間。中有油膜一條。貫於脊骨。名曰命門。為相火所司。西醫名為精液總管之處。是為三焦之原。從是處發生板油。連胸前之膈。上循胸中。入心包絡。連肺系上咽。其外出為手背胸前之腠理。是為上焦。從板油連及雞冠油。著於小腸。其外出為腰腹之腠理。是為中焦。從板油連及網油

中西匯參醫學

三焦說

七

廣益書局印行



中西匯參醫學

足少陽膽經穴圖

八

廣益書局印行

足少陽膽經考正穴法 由頭走足四十四穴
瞳子膠 一名太陽。目外去背五分。太陽少陽三脈之會。
灸三壯。針三分。主一切目疾。頭痛等症。
聽會 耳後前陷中。上關下一寸動脈宛宛中。張口得之。
針三分。灸五壯。十日後依前數灸。主耳鳴。耳聾。齒痛。中風。口喎斜。手足不仁。
客主人 耳前骨上。張口取之。灸七壯。針二分。主口耳兩症。及齒痛等症。
領厭 曲周下。灸三壯。針七分。主頭痛。耳目一切之症。
懸顛 曲周下。灸三壯。針七分。主頭目一切等症。
懸釐 曲周下。灸三壯。針三分。主面目赤腫。頭上諸症。
曲髻 耳上髮際曲陷中。鼓頰有空。針三分。灸七壯。主口

面頰項諸病

率谷 耳上入髮際一寸半陷者宛宛中噤而取之針三分
灸三壯。主頭腦上諸症及煩悶嘔吐。

天衝 耳後髮際二寸。耳上如前三分。灸七壯。針三分。主
牙腫頭痛。

浮白 耳後入髮際一寸。針三分。灸七壯。主足不能行。耳
聾耳鳴。齒痛。胸病。喉痺。

竅陰 完骨下。動搖有空。針三分。灸七壯。主頭面腫痛。口
眼諸症。一名枕骨。後有竅陰。同名異穴。

完骨 耳後入髮際四分。針三分。灸七壯。主一切頭項口
耳諸症。

本神 曲差一寸五分。直耳上入髮際四分。針三分。灸七
壯。主頭目項風氣吐涎。

陽白 眉上一寸。直瞳子針三分。灸三壯。主一切目疾。
臨泣 目上直入髮際五分陷中。令患人正睛取穴。針三
分。主一切目疾。後一臨泣。同名異穴。

目窗 臨泣後寸半。針三分。灸五壯。主一切目疾。頭面浮
腫等症。

正營 目窗後寸半。針三分。灸五壯。主頭面諸症及齒痛。
承靈 正營後一寸五分。主頭腦風氣鼻衄喘息不利。

腦空 承靈後一寸五分。俠玉枕骨下陷中。針五分。得氣
即瀉。魏武帝患頭風心亂目眩。華陀針之立愈。

風池 耳後腦空中按之引於耳中。針七分。灸不及針。主
頭目諸症。

肩井 肩上下陷中。缺盆上大骨前一寸半。以三指按取當
中指下陷中。針五分。灸五壯。主中風氣塞。

淵液 一名泉液。腋下一寸。宛宛中。舉臂得之。針三分。禁
灸。主寒熱。

輓筋 一名神光。腋下一寸。復前一寸。三肋端橫直蔽骨
旁七寸五分。平直兩乳。側卧。屈上足取之。灸三壯。針六
分。主胸滿腹熱。唾吐吞酸。

日月 期門下五分。針七分。灸五壯。主言語不正。四肢不
收。多唾。

京門 監骨下。腰中季肋本俠脊腎之募。灸三壯。針七分。
主腸鳴。腰腹脹痛。

帶脈 季肋下一寸八分陷中。臍上二分。兩旁各七寸半。
針六分。灸五壯。主腰腹婦人腹痛。月事不正。

五樞 帶脈下三寸。水道旁五寸五分。針一分。灸五壯。主
男女陰痛。

維道 章門下五寸三分。針八分。灸三壯。主嘔逆水腫。
居髎 章門下八寸三分。監骨上陷中。針八分。灸三壯。主
腹痛。及肩臂難舉。

環跳 髀樞中。側卧伸下足。屈上足。以右手摸穴。左搖撼
取之。灸五十壯。針一寸。主風氣麻木不仁。

風市 膝上外廉兩筋中。以手着腿。中指盡處是穴。針五
分。灸五壯。主中風麻木。

中膺 髀外膝上五寸。分肉間陷中。灸五壯。針五分。主寒
氣客於分肉間。攻痛。筋痺不仁。

中西瀋泰醫學 凡少陽經考正穴法 凡少陽經考正穴法

中西瀋泰醫學 凡少陽經考正穴法 凡少陽經考正穴法


胆之寒左關脈遲沉其症為精滑肢腫食少心虛煩悶
 坐卧不安湯溫胆邪正相爭嘔吐者小柴胡湯加邪未化
 火舌胎滑者二陳
 胆之熱左關脈弦數其症為口苦小柴胡湯移熱於胃嘔吐
 者小柴胡湯加熱開腠理盜汗者小柴胡湯加丹皮胆為肝之
 腑竅開於目胆熱目眩者小柴胡湯加山茱

胆部藥隊

- 補胆猛將 烏梅
- 補胆次將 棗仁
- 瀉胆猛將 桔梗 青皮
- 瀉胆次將 柴胡 香附 秦艽 川芎
- 涼胆猛將 龍胆草

- 涼胆次將 青蒿 槐實
- 溫胆猛將 肉桂 細辛
- 溫胆次將 山茱萸

中西匯參醫學 胆部藥隊 十三 醫書局印行



中西匯參醫學 足厥陰肝經右穴法 十四 醫書局印行

足厥陰肝經考正穴法 由足走胸十三穴
 大敦 足大指端去爪甲如韭葉及三毛中針三分灸三
 壯主疝氣腹脹陰痛
 行間 足大指縫間動脈應手陷中針三分灸三壯主嘔
 逆腹腫目赤小兒急驚風
 太衝 足大指本節後二寸或云一寸半內間動脈應手
 陷中針三分灸三壯主心痛小腸疝氣女子漏下
 中封 足內踝骨前一寸筋裏宛中針四分灸三壯主身
 體不仁腰痛身熱
 蠡溝 內踝上五寸針二分灸三壯主疝痛小腹脹滿女
 子赤白帶月水不調
 中都 內踝上七寸胛骨中針三分灸五壯主腹痛疝氣

婦人崩中產後惡露不絕

膝關 犢鼻下二寸旁陷中針四分灸五壯主風痺膝內廉痛喉痛

曲泉 膝股上內側輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝橫紋頭取之針六分灸三壯主血症陰痛喉痛

陰包 膝上四寸股內廉兩筋間踵足取之看膝內側必有槽中針六分灸三壯主腰尻引小腹痛小便難遺溺婦人月水不調

五里 氣衝下三寸陰股中動脈應手針六分灸五壯主腸中滿熱閉不得溺風勞嗜臥

陰廉 羊矢下去氣衝二寸動脈中針六分灸五壯主婦人絕產若未經生產者灸之即有子

中西匯參醫學

足厥陰肝經五穴

十五

上海醫學書局印行

章門 大橫外直季脇肋端臑臑上二寸兩旁六寸側臥

屈上足伸下足舉臂取又云肘尖盡處是穴脾之募足少陽厥陰之會針六分灸百壯主煩熱口乾胸膈疼痛腹腫如鼓

期門 直乳二肋端不容旁一寸五分又云乳旁一寸半直下又一寸半肝之募足厥陰太陰陰維之會針四分

灸五壯主煩熱霍亂泄利嘔酸吐水男女熱入血室許學士云小柴胡已瀝針之立愈

肝經諸穴歌
足厥陰一十三穴終
起大敦於行間循
大衝於中封蠡溝
中都之會膝關曲
泉之宮臑陰包
於五里陰廉乃極
尋羊矢於章門期
門可收

肝



足厥陰肝經主治

肝為東方甲乙木。胆為之腑。其色青。賴血以養。名曰血海。自兩脇以下。及小腹陰囊之地。皆肝屬部位。開竅於目。最易動氣作痛。其風能上至於頭頂。婦人尤甚。

肝無表症。皆屬於裏。

肝虛者。腎水不能涵木而血少也。左關脈必柔弱。及空

虛。其症為脇痛。血不營筋。四物頭眩者。血虛風動也。

散主目乾水不養木也。黃六味地眉稜骨眼腫痛者。散

心悸者。血少而虛火煽也。黃六味地血虛液燥口渴者。散

煩躁發熱。虛火亢也。黃六味地脈左關必弦而洪大。症為左

肝實者。氣與內風充之也。散水胡散肝風熱頭痛。清空癥瘕氣聚小

脇痛。肝氣不和。散水胡散肝風熱頭痛。清空癥瘕氣聚小

中西匯參醫學

肝經諸穴歌

上海醫學書局印行

腹疼痛者去附桂加木火刑金咳嗽者上散赤芍藥
 聚於下。木旺尅土泄瀉者。木火凌胃嘔吐者。湯加
 木旺尅土泄瀉者。木火凌胃嘔吐者。湯加
 連炒黃氣鬱火衝呃逆者。木火凌胃嘔吐者。湯加
 肝寒者。左關脈沉遲。其症為小腹脹痛。肝寒者。左關脈沉遲。其症為小腹脹痛。肝寒者。左關脈沉遲。其症為小腹脹痛。
 肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。
 腫痛。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。
 風燥消渴者。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。
 相搏。津液凝聚。癢痛。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。
 大氣上逆。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。肝熱者。左關脈弦數。其症為眩暈。風熱上升。

邪火入厥陰。氣湯小便不禁。通

肝部藥隊

補肝猛將 枸杞 北五味 烏梅
 補肝次將 山茱萸 兔絲子 首烏 當歸 白芍藥
 瀉肝猛將 鬱金 桃仁 青皮 義朮 沉香
 瀉肝次將 香附 木香 延胡索 柴胡 山梔 川
 棟子 赤芍藥 瓜蒌殼 川芎 勾藤 白蒺藜
 涼肝猛將 龍胆草 胡黃連
 涼肝次將 羚羊角 夏枯草 石決明 青蒿 菊花
 溫肝猛將 肉桂 桂枝 細辛 胡椒 吳茱萸
 溫肝次將 兔絲子 艾葉 茴香 山茱萸

任脈圖



任脈考正穴法

由下而上二十四穴
 會陰 兩陰間任督衝三脈所起。督由此穴而行背。任由
 此穴而行腹。衝由此穴而行足。少陰。灸三壯。禁針。主陰
 痛便閉。女人經水不通。卒死者。針一寸。補之。溺水者。倒
 拖出水。尿出則活。餘不可針。
 曲骨 橫骨上。中極下一寸。毛際陷中。動脈應手。灸七壯。
 至七七壯。針二寸。主失精。及小腹痛。女人赤白帶下。
 中極 關元下一寸。臍下四寸。膀胱之募。針八分。得氣即
 瀉。灸百壯。有云。灸不及針。主腫脹。女人產後惡露不行。
 胎衣不下。月事不調。若斷緒不生。四度針。即有子。
 關元 臍下三寸。小腸之募。針八分。灸百壯。主孕婦針落
 胎。倘不落。再針外崑崙。立下。及一切淋瀝。

中西匯參醫學 任脈圖 任脈考正穴法 十八

石門 臍下二寸。灸二七壯。針八分。婦人忌用。主傷寒小
便不利。小腹痛硬。

氣海 臍下寸半。宛宛中。男子生氣之海。針八分。宜瀉。後
宜再補之。

陰交 臍下一寸。針八分。灸百壯。灸不及針。主疝痛氣痛。
一切出血。

神闕 當臍中。禁針。灸百壯。主中風不省人事。腹痛。徐平
仲中風。灸百壯而愈。倘有不起。甚可再灸百壯。

水分 臍上一寸。在小腸下口。此處分別清濁。液入膀胱。
渣入大腸。故曰水分。針一寸。灸七七壯。止百數壯。主一
切水脹鼓腹。

下脘 臍上二寸。穴當胃下口。小腸上口。水穀於是入焉。

建里 臍上三寸。針五分。灸五壯。主腫脹嘔逆。

中脘 臍上四寸。針八分。灸二七壯。止百壯。主五膈。翻胃。
膨脹。食積不化。

上脘 臍上五寸。針八分。灸七壯。主翻胃。嘔吐脹滿。

巨關 鳩尾下一寸。心之募。針六分。灸七壯。主氣逆。及欬
吐霍亂。

鳩尾 在兩歧骨下一寸。其骨垂下如鳩尾。故名。針三分。
灸三壯。主偏頭風。氣悶。唾血。

臍中 玉堂下。寸六分。橫量兩乳間。陷中。仰而取之。氣會
之處。灸五壯。至二七壯。禁針。主氣促。氣滿。嗽病。

玉堂 紫宮下。寸六分。陷中。灸五壯。針三分。主胸滿喘急。

中西匯參醫學 任脈考正穴法 十九 廣益書局印行

紫宮 華蓋下。寸六分。陷中。仰而取之。灸五壯。針三分。主
胸滿氣促。

華蓋 璇璣下。寸六分。陷中。仰而取之。灸五壯。針三分。主
胸滿。氣促。喉症。

璇璣 天突下。寸六分。陷中。仰頭取之。灸五壯。針三分。主
氣逆。噎喉。水漿不下。胃積。

天突 在頭結喉下一寸。宛宛中。針五分。灸不及針。主氣
逆。喉瘡。

廉泉 頸下結喉上中央。仰而取之。針一寸。灸三壯。主喘
息。咳逆。舌縮。口瘡。

承漿 唇稜下。陷中。開口取之。針二分。灸七壯。止七七壯。
主偏風。半身不遂。口眼喎斜。而腫。

任脈諸穴歌
任脈二十四穴。行腹與胸。會陰始兮。曲骨從中。極關元
石門通氣海。陰交會神闕。水分逢下脘。建里兮中脘。上
脘。巨關。鳩尾兮。中庭。臍中。玉堂。上紫宮。華蓋。璇璣。上天
突之宮。飲彼廉泉。承漿味融。

任脈起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至喉
龍。屬陰脈之海。人身之有任督。猶天之有陰陽。地之
有南北。可以分。可以合也。分之以見陰陽之不雜。合
之以見渾淪之無間。一而二。二而一也。

中西匯參醫學 任脈考正穴法 二十 廣益書局印行

脊中 十一椎下 俯而取之 針五分 得氣即瀉 禁灸 至五
筋絡 九椎下 俯而取之 針五分 灸三壯 主癩疾 狂走 目
瞪 癩病 多言 心痛
至陽 七椎下 俯而取之 針五分 灸三壯 主腰痛 胃寒不
食 身瘦 背中心行 腹鳴
靈臺 六椎下 俯而取之 俗用灸一二壯 以治氣喘 難臥
甚效 禁針
神道 五椎下 俯而取之 灸七七壯 禁針 主頭痛 發熱 張
口不合
身柱 三椎下 俯而取之 針五分 灸七七壯 主癩病 狂走
亂打 妄言 見鬼 小兒驚悸



中西匯纂醫學

督脈考正穴法 由下而上二十七穴

二十一

廣華書局印行

長強 脊骶骨端 計三分 伏地取之 足少陰少陽之會 針
三分 灸三十壯 不及針 此痔根本 主腸風下血 久痔五
淋 腰脊痛 房勞
腰俞 二十一椎下 宛宛中 以挺身伏地取之 舒身兩手
相重 支額 縱四體後 乃取其穴 針八分 灸七壯 主腰痛
傷寒 四肢熱 便閉
陽關 十六椎下 坐而取之 針五分 灸三壯 主膝不伸 筋
掣 不行 舒
命門 十四椎下 伏而取之 針五分 灸三壯 主身熱如火
懸樞 十三椎下 伏而取之 針五分 灸三壯 主腰脊強 水
穀不化 下痢

脊中 十一椎下 俯而取之 針五分 得氣即瀉 禁灸 至五
筋絡 九椎下 俯而取之 針五分 灸三壯 主癩疾 狂走 目
瞪 癩病 多言 心痛
至陽 七椎下 俯而取之 針五分 灸三壯 主腰痛 胃寒不
食 身瘦 背中心行 腹鳴
靈臺 六椎下 俯而取之 俗用灸一二壯 以治氣喘 難臥
甚效 禁針
神道 五椎下 俯而取之 灸七七壯 禁針 主頭痛 發熱 張
口不合
身柱 三椎下 俯而取之 針五分 灸七七壯 主癩病 狂走
亂打 妄言 見鬼 小兒驚悸

中西匯纂醫學

督脈考正穴法 由下而上二十七穴

二十一

廣華書局印行

陶道 二椎下 俯而取之 針五分 灸五壯 主瘡病 寒熱 煩
滿 頭重 恍惚 不樂
大椎 一椎下 陷者 宛宛中 針三分 灸以年壯 為可 主肺
脹 嘔吐 五勞七傷 項強 痞硬 當刺大椎 第一間
瘻門 項後入髮際五分 項中央 宛宛中 仰頭取之 入髮
舌本 針二分 可統針八分 禁灸 主舌急 不語 重舌 衄血
風府 項後入髮際一寸 大筋內 宛宛中 疾言 其肉立起
針三分 禁灸 恐失音 舌項強 硬 咽腫 頭上百病 魏武帝
患風傷 項急 華陀治此穴 立效
腦戶 枕骨上 強間後一寸半 禁灸 令人瘖 針三分 至腦
立死 至面赤 目黃 頭痛 此穴 針灸 均不相宜
絕間 後項後一寸半 針二分 灸七壯 主頭目痛 心煩

後頂 百會後寸半枕骨上灸五壯針二分主頭項強急目疾。

百會 前項後寸半頂中央旋毛中可容豆直兩耳尖猶天之極星居北灸七壯針二分主頭風一切中風不語偏風心煩唐高宗頭痛秦鳴鶴欲刺出血武后謂至尊頭上不可後刺出微血立愈。

前項 顛會後寸半骨間陷中針一分灸三壯主頭風目眩面腫頂痛。

顛會 上星後一寸陷中灸二七壯針二分八歲以下不可針因顛門未合恐傷骨也主鼻塞面腫頭風目眩。

上星 神庭後入髮際一寸陷中容豆灸七壯針三分以三稜針瀉諸陽熱主頭痛鼻塞不宜多灸。

神庭 直鼻上入髮際五分灸二七壯至七七壯禁針恐失睛惟張子和針此穴治目腫翳立退。

素髻 鼻柱上端準頭不宜灸針一分主鼻中息肉醉風水溝一各人中鼻柱下溝中央近鼻孔陷中針四分灸三壯至二百壯主水腫口喎中惡黃疸口喎斜艾炷小如雀糞而腫針之即愈。

兌端 唇上端針二分灸五壯主癩病便黃赤舌乾唇強齒痛鼻塞口喎痰涎艾炷小如麥。

斷交 唇內齒上齦縫中針三分灸三壯主鼻中息肉鼻塞項強目淚牙疳內皆赤痒痛目生白翳黃疸寒暑瘧疫等症點烙亦佳。

中西匯參醫學 奇經八脈圖 廣益書局印行

督脈諸穴歌
督脈在背之中行二十七穴始長強舞腰俞兮歌陽關入命門兮懸樞當脊中筋縮造至陽靈臺神道身柱維陶道大椎至短門風府腦戶強間兮後項百會兮前顛顛會上星兮神庭素髻至水溝於鼻下兌端交斷交於內唇。



中西匯參醫學 奇經八脈圖 廣益書局印行

奇經八脈歌


督脈起自下極腋並於脊裏上風府過腦額鼻入新交
 為陽脈海都綱要
 任脈起於中極底上腹循喉承漿裏陰脈之海任所謂
 衝脈出胞循脊中從腹會咽絡口唇女人成經為血室
 脈並少陰之腎經與任督本於陰會三脈並起而異行
 陽蹻起自足跟裏循外踝上入風池
 陰蹻起內踝循喉嗑本足陰陽脈別支
 諸陰交起陰維脈發足少陰築賓却
 諸陽會起陽維脈太陽之却金門穴
 帶脈周迴季脇間會於維道足少陽所謂奇經之八脈
 維繫諸經乃順常

中西匯參醫學 奇經八脈歌 四陽九針歌 四陽九針歌 年五 廣益書局印行

回陽九針歌
 在門旁三陰交湧泉
 大和中院接續三三三
 合谷并山是回陽針
 三三三
 三三三
 三三三



胎論
 凡受孕數日成一胚珠內係清水無物無形至十二日胚
 珠大如白豆重二三釐珠胞之外發生絲毛如水洗飯粒
 狀剖之見雙膜包涵清水始有小物兩粒浮其中一圓一
 長者漸變形為人積日彌大即名曰胚圓者養胚之物
 積日彌小及生胎盤則茫然烏有歷二十日胚珠漸天珠
 內胚形如大蟻重約一分長約三分似有頭身之意至三
 十日珠內胚形長四分大如牛蠅身首顯然可見首上具
 有眼模三十五日臍帶始生萌芽四十二日頭上有口四
 十五日胚重一錢長八分初見四肢臂股六十日足手皆
 全骨點始生上有耳鼻下有肛門是為受形之始長寸許
 六十五日腹內粗有五臟九十日見全形男女可辨長二



中西匯參醫學 胎論 胎圖 胎圖 胎圖 胎圖 胎圖 胎圖 胎圖 年六 廣益書局印行


寸許。重二兩許。胎盤成由是月大一月至四月週身內外皆備。重五兩五錢。長四寸。五月長五寸。孕婦始覺胎動。六月長六寸。重十三兩。髮甲生。七月長八寸。骨節粗成。壯者生出可活。八月長一尺一寸。重五兩。十月胎足。重五六兩。人具百體。心九月眼始開。長尺二寸。十月胎足。重五六兩。人具百體。心最先生。始有跳。一週時。黃內及終世之時。百體先死。心死最後。嬰兒在胎之日。肺小。肝大。不須呼吸。地氣其血色及運行功用皆與出世者不同。妊胎二十日。心已成。模初見一管。漸分兩房。又漸而成四房。上兩房有戶相通。出世之後。即閉塞。否則紫血混行。兒死而身藍矣。胎兒之血來自胎盤。由臍帶透臍而入。一半入肝。即入心。房。一半入脾。血總管內上達心。右。上房。即過左。上房。而落左。下房。由左。下房。入血脈總管。先上兩手頭腦之內。由迴管返心。右。下房。即自入肺管。透血脈總管之拱。入肺管與總管之拱。出世然後。後落下身。兩足之間。胎兒上身大。下身小者。因上身先接好血故也。於是血落下身。行至胯骨盆上。即分一半入足。一半入雙管。繞臍帶而達胎盤。以胎盤為肺之用。改換新血。復由臍帶而回。輪流不息。直待生出。呱呱以啼。肺即開張。以呼吸。淨氣。即入肺。而胸有發。死。兒者。及肺。於水。以驗血。煩更改而運行。造化之工妙如此。

凡男子精力壯健。成孕倍易。若精出無勢。精水稀淡。成孕必難。或陽莖受病。楊梅結毒。皆不成孕。女子陰中受病。子宮受病。子管閉塞。子核有恙。核無精珠。概不受孕。子核之內。裂一珠成一孕。裂雙珠成孿生。如婦人中年

中西匯參醫學 胎論 二五

病死。剖驗子核。可知其生前受胎次數。西國接生之事。皆以醫士主之。取其諳識血脈臟腑部位。非若中國之用穩婆。如狡媪。愚婦所為。故成孕受胎及臨產接生等事。醫士所不深究其理。願此後風氣漸開。俾生命大有裨益。是所厚望。

中西匯參醫學 胎論 二六



橫生圖

子先出不能生。必須拿轉其足。則女子安。

難產說

難產者。多因產母倉皇。臨盆太早。或胞漿已破。兒身未轉。或兒身已轉。尚未順正。被母用力努擗。以致足先來者。謂之逆產。手先來者。謂之橫生。或漏其肩與耳者。謂之側產。或被臍帶纏絆。謂之礙產。倉卒之間。二命所係。不可無端。攘鬧。大驚小怪。以驚動產母。更不可妄行動手。總以鎮靜為主。無論橫產倒產。側產礙產。總言難產。用後佛手散服之。最為穩驗。

救難產法

令產母正身仰臥。務要安定心神。不可驚怖。卻求慣熟穩婆。先剪指甲。以香油潤手。將兒輕輕送入。又再將兒身推上。必須轉直待身轉頭正。服以催生之藥。渴則飲以蜜水。

中西匯參醫學

難產說 救難產法

二十九

備醫書印行

飢則食以薄粥。而後扶掖起身。用力一送。兒即生矣。此在手法純熟。加以小心謹慎。若粗率愚蠢之人。斷不可用。雖又鍼刺足心之法。恐兒痛上緊。母命難保。切不可用。佛手散 治胎氣受傷。或子死腹中。疼痛不已。口噤昏悶。或心腹脹滿。血上衝心。服之生胎即安。死胎即落。又治橫生倒產。須先安臥。將此藥煎服。再行安臥。自然順生。若兒手足在外。未能收入。切不可亂動。惟少以食鹽塗兒掌內。用指甲輕搔之。又以鹽摩母腹。安臥一時。自然收入。藥須早備。以資急用。當歸一兩。川芎六錢。酒三水。同煎七分。服。若治橫生倒產。則加 黑料豆一合。炒焦泔水。加童便一半煎藥。服少頃再服一劑。此方又治產後腹痛。發熱。頭痛。能逐惡血。生新血。除諸疾。

簡明中西醫學圖說

下針八法

揣 揣而循之。凡點穴。以手揣摸其處。在陽部。筋骨之側。陷者為真。在陰部。却腫之間。動脈相應。其肉厚薄。或伸或屈。或平或直。以法取之。按而正之。以大指爪切揣其穴。於中庶得進退方有準也。難經曰。刺榮毋傷衛。乃揣按其穴。令氣散。以針刺之。是不傷其衛氣也。又曰。刺衛毋傷榮。乃撮起其穴。以針卧而刺之。是不傷其榮血也。此陰陽補瀉之大法也。

爪

爪 爪而下之針賦。所謂左手重而切按。欲令氣血宣散。即不傷其榮衛也。右手輕而徐入。欲不痛之因。此乃下針之秘法也。

中西匯參醫學

下針八法

三十

備醫書印行

搓 搓而轉之。如搓線之狀。勿轉太緊。左轉為補。右轉為瀉。以大指次指相合。大指往上進為左補。大指往下退為右瀉。此則迎隨之法。經言迎奪右而瀉。隨濟左而補。援此左右補瀉之大法也。彈 彈而努之。此則彈於針頭待氣至。却進一豆許。先淺而後深。自外推內。補針之法也。搖 搖而伸之。搖動針頭。以待氣至。却退一豆許。乃先深後淺。自內引外。瀉針之法也。謂之針頭補瀉。捫 捫而閉之。經曰。凡補必捫而出之。故補針當出時。就捫閉其穴。不令氣出。如氣血不泄。乃為真補。循 循而通之。凡瀉針。必以手指於穴上。四旁循之。令血氣宣散。方可下針。當出針時。不閉其穴。乃為真瀉。此提

按補瀉之法。男女補瀉。左右反用。

燃者。治上大指向外燃。治下大指向內燃。外燃者。令氣向上而治病。內燃者。令氣向下而治病。如出針內燃者。令氣行至病所。外燃者。令邪氣至針下而出也。此下針八法之要訣也。

按迎隨之法。迎而奪之為瀉。隨而濟之為補。夫行針者。當刺之時。用皮錢擦熱針。再以口溫其針。先以左手大指爪按穴。彈而努之。爪而下之。捫而循之。通而取之。令病人咳嗽一聲。右手持針而刺之。春夏二十四息。先深後淺。秋冬三十六息。先淺後深。徐徐而入。氣來如動脈之狀。針下輕滑。未得氣者。若魚之未吞鈎。既吞得氣。宜用補瀉。補隨其經脈。推而按內之。停

中西匯參醫學

下針八法

三

傷寒論

針一二時起針。左手開針穴。徐出針而疾按之。瀉迎其經脈。提而動伸之。停針稍久。起針。左手開針穴。疾出針而徐按之。補針左轉。大指努出。瀉針右轉。大指收入。補者先呼後吸。瀉者先吸後呼。疼痛即瀉。痺麻即補。

神針八法

心無內慕。如待貴賓。心為神也。醫者之心。病者之心。與針相隨上下。先慮針損。次將針尖含在口內。而令其溫。又以左手按摩受疾之穴。如握虎之狀。右手燃針。如持無力之狀。是用針之一法。左燃九而右燃六。此乃佳痛之二法也。進針之時。令病人咳嗽。而進針。進針之三法也。針沈良久。待內不脹氣不行。照前施之。如氣來。復針不下。宜左燃而

瀉其實。如不散。令病人呼氣三口。醫者用手抓針自散。如針進無滯。無脹。乃氣虛也。令病人吸氣。針宜右燃。而補其虛。此補瀉之四法也。其瀉者。有鳳凰展翅。用右手大指食

燃針頭。如飛騰之象。一燃一放。此瀉之五法也。其補者。有餓馬搖鈴。用右手大食指燃針頭。如餓馬無力之狀。緩緩前進則長。後退則短。此補之六法也。如病人暈針。用袖掩之。熱湯飲之。即醒。補之七法也。如針至深處。而進不能退。不能。其皮上四圍起皺紋。其針如生在內。此氣實之極也。有蒼蠅叢咬之狀。四圍飛延。用右手食指。向皺紋皮處。離針不遠。四圍前進三下。後退其一。乃瀉之八法也。

十二字分次第手法及歌訣

一爪切者。凡下針。用左手大指爪甲。重切其針穴。令氣血

中西匯參醫學

十二字分次第手法及歌訣

三

傷寒論

宣散於下針。不傷榮衛也。

歌訣。取穴先將爪切深。須教毋外慕其心。致令榮衛無

傷礙。醫者方堪入妙針。

二指持者。凡下針。以右手持針於穴上。着力旋插。直至膝

理。吸氣三口。提於天部。依前口氣。徐徐而用。正謂持針

者。手如握虎。勢若擒龍。心無依慕。若待貴人之說也。

歌訣。持針之士要心雄。勢如握虎與擒龍。欲識機關三

部。須將此理細推窮。

三口溫者。凡下針。必須入口溫熱。方可與刺。使血氣調和。

冷熱不相爭也。

歌訣。溫針一理最為良。口內調和納穴場。毋令冷熱相

爭搏。榮衛宣通始得祥。

四進針者。凡下針。要病人神氣定息數勻。醫者亦如之。切不可太忙。又須審穴在何部分。如在陽部。必取筋骨之間。陷下為真。如在陰分。却關之內。動脈相應。以爪重切。經絡少待。方可下手。

歌訣 進針理法取關機。失經失穴不堪施。陽經取陷陰經脈。三思已定再思之。

五指循者。凡下針若氣不至。用指於所屬部分。經絡之路。上下左右循之。使氣血往來。上下均勻。針下者。然氣至沉緊。得氣即瀉之故也。

歌訣 循其部分理何明。只為針頭不紫沉。推則行之引。則止。調和血氣兩來臨。

六爪攝者。凡下針時。氣滯滿不行者。隨經絡上下。用大指爪甲切之。其氣自通行也。

歌曰 攝法應知氣滯經。須令爪切勿交輕。上下通行隨經絡。故教學者要窮精。

七退針者。凡退針必在六陰之數。分明三部之用。斟酌不可不誠。心着意。洞亂差訛。以瀉為補。以補為瀉。欲退之際。三部一部。以針緩緩而退也。

歌曰 退針十法理誰知。三才訣內總玄機。一部六陰三氣吸。須臾疾病愈如飛。

八指搓者。凡轉針如搓線之狀。勿轉太緊。隨其氣而用之。若轉太緊。下入肉纏針。則有大痛之患。若氣滯澁。即以第六攝法切之。方可施也。

歌曰 搓針泄氣最為奇。氣至針纏莫急移。渾如搓線悠

悠轉急轉纏針肉不離。九指撚者。凡下針之際。治上大指向外撚。治下大指向內撚。外撚者。令氣向上而治病。內撚者。令氣至下而治病。如出至人部。內撚者。為之補。轉針頭向病所。如出至人部。外撚者。為之瀉。轉針頭向病所。使邪氣退至針下出也。此乃針中之秘旨也。

歌曰 撚針指法不相同。一般在手兩般窮。內外轉移行上下。邪氣達之疾宜容。

十指留者。如出針。至於天部之際。須在皮膚之間。留一豆許。少時方出針也。

歌曰 留針取氣候沉浮。出容一豆入容停。致令榮衛縱橫。機巧妙玄機在指頭。

十一針搖者。凡出針三部。欲瀉之際。每一部搖一部。計六搖而已。以指捻針。如扶人頭搖之狀。庶使孔穴開大也。

歌曰 搖針三部六搖之。依次推排指上施。孔穴大開無窒礙。致令邪氣出如飛。

十二指拔者。凡持針欲出之時。待針下氣緩不沉緊。便覺經滑。用指捻針。如拔虎尾之狀也。

歌曰 拔針一法最為良。浮沉清滑任推詳。勢猶取虎身中尾。此訣誰知蘊錦囊。

總歌 針法玄機口訣多。手法雖多亦不過。切穴持針溫口內。進針循攝退針搓。指撚瀉氣針留豆。搖令穴大拔。如梭。醫師穴法叮咛說。記此便為十二歌。

中西匯參醫學 十二字訣 針法及歌訣 三十四

中西匯參醫學 十二字訣 針法及歌訣 三十四

伏人經圖



中西匯參醫學

伏人經圖 十四經脈長短尺寸數

三十七

醫書局印行

十四經脈長短尺寸數

手之六陽經脈。從手至頭。長五尺。共計五六合三丈。
 手之六陰經脈。從胸走手。長三尺五寸。共計合二丈一尺。
 足之六陽經脈。從頭走足。長八尺。共計六八合四丈八尺。
 足之六陰經脈。從足走腹。長六尺五寸。共計合三丈九尺。
 督脈任脈。各長四尺五寸。共合九尺。
 兩蹻脈。從足至目。各長七尺五寸。共合一丈五尺。
 十四脈部。統共合十六丈二尺。此氣之大經脈也。

用艾灸法

孟子所謂七年之病。求三年之艾。蓋艾性至熱。用火灸則上行。入藥煎則下達。艾味苦氣溫和。陰中之陽。無毒。主灸百病。三月三日。五月五日。採曝乾。陳久者良。大用清麻油。點燈草。或用火珠。大鏡。耀日以艾承之。得火為上。如用松柏。枳。橋。榆。桑。柞。等火。古來灸病。皆忌之。用蠟燭火。甚佳。灸瘡。至愈不痛。且有滋潤可取。

凡灸法。坐點穴則坐灸。臥點則臥灸。立點則立灸。毋令俯仰。傾側。須四體平直。若任其傾側。俯仰。則穴不正。徒傷人之好肉。不如不灸為妙。

寶鑑云。氣不至而不效。灸亦不發。蓋十二經應十二時。其氣各以時而至。故不知經絡氣血多少。應至之候。而灸之者。則瘡不發。世醫莫之知也。

中西匯參醫學

用艾灸法 艾炷大小先後

三十八

醫書局印行

艾灸補瀉

氣盛則瀉之。虛則補之。

針所不為。灸之所宜。陰陽皆虛。火自當之。經陷下者。火則當之。經絡堅緊。火所治之。陷下。則灸之。

絡滿經虛。灸陰刺陽。經滿絡虛。刺陰灸陽。

以火補者。毋吹其火。須待自滅。即按其穴。以火瀉者。速吹其火。開其穴也。

艾炷大小先後

黃帝曰。灸不三分。是謂徒究。炷務大也。小弱乃小作之。又曰。小兒七以上。周年以還。炷如雀糞。凡灸當先陽後陰。言從頭向左而漸下。次從頭向右而漸下。先上後下。

明堂云先灸上後灸下先灸少後灸多皆宜審之
王節齋云灸須自上而下不可先灸下後灸上

灸瘡要法

資生云凡着艾得瘡發所患即瘡若不發其病不愈可知
甲乙經曰灸瘡不發者故履底灸令熱熨之三日即發今
人用赤皮葱三五莖去青於大灰中煨熱拍破熱熨瘡上
十餘遍其瘡三日遂發又以生麻油漬之而發亦有用皂
角煎湯頻敷而亦有恐血氣衰不發服四物湯滋養血氣
不可一概論也亦有復灸一二壯遂發有食熱灸之物如燒
魚煎豆腐羊肉之類而發在人以意取物不可順其自然
終不發矣

灸瘡膏法

中西匯參醫學 灸瘡膏法 三十九 廣益書局印行
白芷金星草淡竹葉芥連乳香當歸川芎薄荷蔥白等炒
鉛粉香油煎膏貼如用別膏恐瘡口易收而病氣不得出
也如用別物乾燥作瘡亦且不便

古時貼灸瘡不用膏藥要待膿出多而疾除
資生云春用柳絮夏用竹膜秋用新綿冬用兔腹細毛今
多以膏藥貼之日兩三易欲求速愈此非治疾之本意也
苟貼膏藥不壞久久貼之可也若頻易恐病根未盡除也
洗灸瘡法

古人灸艾炷大使用洗法其法以赤皮蔥薄荷煎湯溫洗
瘡之周圍約一時久令驅逐風邪於瘡口出更令經脈往
來不滯自然疾愈若灸火退而後用桃枝青嫩皮煎湯溫
洗能護瘡中諸風若黑爛加胡荽若痛甚加黃連煎洗

壯數多少

凡言壯數者千金言丁壯者病根深篤可倍於方數老少
羸弱可減半扁鵲灸法有至三五百壯十壯此亦太過若
曹氏灸法有百壯五十壯小病諸方亦然惟明堂百經云
針入六分灸至三壯更無餘治後人惟以病之輕重而增
損之凡灸頭項止於七壯積至七七壯止
銅人治風灸上星前項百會至二百壯腹背灸五百壯若
鳩尾巨關亦不宜多灸灸多則四肢細而無力千金方於
足三里穴乃云至三百壯心俞禁灸若中風則急灸至百
壯皆視病之輕重而善用不可泥一說而不通其變也

灸後調攝法

灸後不可就飲茶恐解火氣及食恐滯經氣須少停一二
時即宜入室靜臥遠人事忌色慾平心定氣凡百俱要寬
解尤忌大怒大勞大飢大飽受熱冒寒至於生冷果品亦
宜忌之惟食清淡養胃之物使氣血流通艾火逐出病氣
若過厚毒味醃醉致生痰涎阻滯病氣矣鮮魚雞羊雖能
發火止可施於初灸十數日之內不可加於半月之後今
人多不知調養雖灸何益故因灸而反致害者此也徒責
艾灸不效何耶

切脈秘旨
脈之為道。最為微妙而難知也。方書論脈愈詳而指下愈加忙亂。何苦張大其言。以人命為戲乎。昔張心在先生所著切脈大法。取八脈為綱。皆顯然可見者。以為實據。如浮沉遲速。細大長短。今列於左。而分解之。

浮者。輕手著於皮膚之上。而即見。為表病也。
沉者。重手按於肌肉之下。而始見。為裏病也。
以上二脈。以手之輕重得之。此其顯而易見也。
遲者。一息脈來二三至。或來一至。為寒病也。
數者。一息脈來五六至。或七八至。為熱病也。
以上二脈。以息之至數辨之。又顯而易見也。
細者。脈狀細小。如線。主諸虛之病也。

中西匯考醫學 切脈秘旨 四十一 醫家類

大者。脈狀粗大如指。主諸實之病也。
以上二脈。以形象之潤窄分之。又為顯而易見也。
短者。脈來短縮。上不及於寸。下不及於尺。素稟衰也。
長者。脈來迢長。上至魚際。下至尺澤。為素稟之盛也。
以上二脈。以部位之過與不及驗之。又為顯而易見也。
互見之辨
浮而數為表熱。浮而遲為表寒。沉而數為裏熱。沉而遲為裏寒。又於表裏寒熱四者之中。審其為細。則屬於虛。審其為大。則屬於實。又須於表裏寒熱虛實六者之中。審其為短。知為素稟之衰。療病須兼培其基址。審其為長。知為素稟之盛。攻邪必務絕其根株。此憑脈治病之秘法也。
治婦人脈四言詩

婦人之脈。尺大於寸。尺脈滿微。經愆定論。三部如常。經停莫恨。尺或有神。得胎如願。左尺大為男。右尺大為女。婦人有胎。取於左寸。寸有少陰。或不如神門。左大為男。右大為女。胎所過占之不適。月斷病多。六脈不病。體弱未形。有胎可慶。婦人經停。脈來滑疾。按有散形。三月可必。按之不散。五月是實。和滑而代。二月為率。

婦人有孕。尺內數弦。內崩血下。革脈亦然。將產之脈。名曰離經。離經時。內動胎氣。外變脈形。新產傷陰。出血不止。尺不上關。十有九死。尺弱而瀉。腸小腸冷。惡寒。年少得之。受孕良難。年大得之。絕產血乾。
小兒胎紋按額診脈四言詩
五歲以下。脈無由驗。食指三關。第一節黃位為風。第二節為命。第三節為氣。第四節為神。第五節為魂。第六節為魄。第七節為志。第八節為意。第九節為思。第十節為慮。第十一節為智。第十二節為慧。第十三節為德。第十四節為壽。第十五節為福。第十六節為祿。第十七節為官。第十八節為貴。第十九節為富。第二十節為貴。第二十一節為富。第二十二節為貴。第二十三節為富。第二十四節為貴。第二十五節為富。第二十六節為貴。第二十七節為富。第二十八節為貴。第二十九節為富。第三十節為貴。

中西匯考醫學 切脈秘旨 四十二 醫家類

關以男左脈絡可占。熱見紫紋。傷寒紅像。青紫白疳。直同影。響隱隱淡黃。無病可想。黑色口危。心為怏怏。若在風關。病輕弗忘。若在氣關。病重留意。若在命關。危急須記。脈紋入掌內鈞之始。營裏風寒。營外積致。五歲以上。可診脈位。一指關人。指下推求。大率七至。加則大門。減則寒類。餘脈脈經求之。以意。更有變蒸。脈亂身熱。不食汗多。或吐或瀉。厚有定期。與病分別。疹痘之初。四未寒微。而赤氣粗。涕淚弗輟。牛歲小兒。外候最切。按其額中。前眉端髮際。三指俱熱。內外俱寒。近眉為下。病情可晰。外感於風。三指俱熱。內外俱寒。三指冷冽。上熱下寒。食中指熱。設若夾驚。名中指熱。設若食停。食指獨熱。

小兒面部五位圖歌

面之症類為心脾之病。其真在腮屬肝右屬肺。承漿屬腎居下唇。

今門部位歌


中庭與天庭。可坐及印堂。額方屬心。額廣屬肝。心火。肝火。皆屬。風。燥。濕。和。滯。淨。光。不可。偏。重。偏。虛。最。難。當。青。赤。黃。白。為。虛。皆。時。皆。堪。傷。此。是。命。門。地。氣。所。寄。也。



附傳小兒初生拔毒奇方兼治疹症

初生小兒於三朝日。用雞蛋白調水粉。放在手心。摩擦。小兒腰俞陽關命門等穴。須臾有毛出。如髮而粗。長分許。不必拔動。如法連擦三日。毛自脫落。依此擦過。可除先天胎毒。痘疹輕稀。令兒易養。此法傳自閩中。試之屢效。但毛之疏密稍有不同。初不解其何故。曾經函詢格致。考証西書多種。亦未道其所以然。或謂病症之險者。如羊毛痧。羊毛痘。羊毛疔。及七十二種痧症。本不有毛之處。忽焉見毛。亦能兼治。此法可謂有益無損之舉。故附錄之。

眼珠俯視




眼珠仰視




皮膚斷面

1. 毛神經
2. 血管
3. 表皮
4. 脂腺
5. 真皮



1. 毛皮節
2. 血管
3. 脂肪
4. 汗腺



中西匯參醫學

頭骨 腕骨 齒

四十五

廣益書局印行

備用諸方

補中益氣湯 中氣下陷以此升之

黃芪 錢半 當歸 錢一 土炒白朮 錢一 人參 錢一

柴胡 三分 升麻 四分 陳皮 五分 加生薑一片 大棗二枚

獨參湯 治元氣虛而不支 脈微欲絕及婦人血崩

人參 其功與天地參與天地人並立為三故名

二陳湯 治肺胃寒痰

製半夏 陳皮 茯苓 各錢半 炙草 八分 加生薑片 棗二枚

三生飲 治寒風中臟六脈沉細

生南星 生烏頭 生附子 各錢半 生薑片 生木香 五分

此方用人兩許同投更有益

四君子湯 治氣虛脾胃不足之症

中西匯參醫學

備用諸方

四十七

廣益書局印行

人參 三錢 土炒白朮 錢二 茯苓 錢二 炙草 五分 加生薑片 棗三枚

五苓散 治小便不通

茯苓 三錢 猪苓 澤瀉 各八分 白朮 錢半 桂枝 一錢

六味地黃丸 滋水制火專治血症亦可煎湯

大熟地 四錢 山萸肉 山藥 各二錢 丹皮 茯苓 各一錢 澤瀉 錢半

七福飲 治心血虛而驚悸者

人參 熟地 各三錢 當歸 棗仁 各二錢 炒白朮 錢半 遠志 五分 炙甘草 一錢

八珍湯 氣血兩補

人參 錢三 白朮 錢二 茯苓 錢二 炙草 五分 當歸 熟地 各三錢 川芎 錢一

川芎 錢一

人參 錢三 白朮 錢二 茯苓 錢二 炙草 五分 當歸 熟地 各三錢 川芎 錢一

川芎 錢一

九味羌活湯 四時感冒發散之通劑

羌活 防風 蒼朮 白芷 川芎 黃芩 生地

川芎 黃芩 生地黃 甘草 細辛

加生薑葱白水煎

十全大補湯 治陰陽並虛而畏冷

人參 白朮 茯苓 炙甘草 歸身 川芎 地黃

白芍 黃耆 肉桂 熟地

一柴胡湯 治外邪而內大肝燥胃渴

生地 白芍 黃芩 柴胡 陳皮 甘草

二冬湯 治上消

天冬 麥冬 花粉 黃芩 知母 人參

炙甘草

中西匯參醫學 備用諸方 廣益書局印行

三黃解毒湯 治火毒內盛

黃連 黃柏 黃芩 黑山梔

三化湯 治中風入臟熱極閉結

厚朴 大黃 枳實 羌活 水煎服

四味香薷飲 治風寒閉暑之症

香薷 扁豆 厚朴 炙甘草

若兩足轉筋加木瓜茯苓

四苓散 治小便不通

茯苓 猪苓 澤瀉 白朮

五苓散 加桂枝

四逆湯 治少陰中寒肢冷厥逆

附子 乾薑 炙甘草

四生丸 治血熱妄行而為吐衄

生地黃 生荷葉 生側柏葉 生艾葉

同搗極爛為大丸如龍眼每服四九水煎去渣

五皮飲 治小便不利胃經蓄水發為水腫

大腹皮 茯苓皮 桑白皮 陳皮 生薑皮

五痿湯 治五臟受熱而痿

人參 白朮 茯苓 炙甘草 當歸 砂仁

麥冬 黃柏 知母

五味異功散 治氣虛即四君子湯加陳皮

六君子湯 治氣虛痰厥即四君子湯加製半夏陳皮

香砂六君子湯 治胃寒吐瀉即六君子加藿香

砂仁

中西匯參醫學 備用諸方 廣益書局印行

七珍散 治心虛不安氣血虛損

人參 石菖蒲 大生地 川芎 防風 辰砂

細辛 為末薄荷湯調下

七味安神丸 治虛火上炎心神不安

黃連 當歸 麥冬 茯苓 甘草 硃砂

冰片 共研末為丸燈心湯送下一錢

加味七神丸 治腎虛難鳴泄瀉

肉豆蔻 吳茱萸 廣木香 蒸茯苓 補骨脂

車前子 土炒冬朮 大棗煎湯為丸每服三錢

八味地黃丸 治命門火衰

製附子 肉桂 大熟地 山藥 萸肉

茯苓 丹皮 澤瀉

知柏八味丸 滋水降火

知母 黃柏 各一錢 大熟地 四錢 黃肉 一錢 山藥 一錢 茯苓 一錢

丹皮 澤瀉 各一錢

加味八珍湯 治產母氣血氣損

人參 白朮 各一錢 茯苓 八分 當歸 五錢 炙草 三分 川芎 一錢

酒芍 二錢 熟地 二錢 乳香 五分 酒炒丹參 二錢 益母草 二錢

生地八物湯 治中消

生地 麥冬 各三錢 山藥 知母 丹皮 各一錢 黃連 一錢

黃芩 黃柏 各一錢 荷葉 二錢

十補丸 治氣血大虧

九製地黃 三兩 黃芪 白朮 黃肉 杜仲 續斷 各一兩

棗仁 各一兩 人參 當歸 白芍 遠志 各一兩 茯苓 兩

中西匯參醫學

備用諸方

五十一

廣濟堂印行

山藥 兩半 北五味 龍骨 牡蠣 各七錢

百藥煎散 治咽痛

百藥煎 五錢 硼砂 五錢 甘草 二錢 共為末 米飲下

人參燕窩百合湯 潤肺清金

人參 一錢 如無力用洋參沙參二三錢代之 燕窩 五錢 百合 五分 共搗爛食之

左歸飲 壯水之劑

熟地 五錢 山藥 枸杞 各二錢 茯苓 錢半 山茱萸 一錢

炙甘草 一錢

右歸飲 補命門真火不足

熟地 五錢 山藥 枸杞 各二錢 杜仲 二錢 山茱萸 肉桂

製附子 炙甘草 各一錢

大承氣湯 治邪熱閉結或食積堅硬

大黃 三錢 枳實 錢半 厚朴 一錢 芒硝 三錢

小承氣湯 治症稍緩即大承氣去芒硝

大柴胡湯 治傷寒邪入肺經脾經

柴胡 錢半 半夏 七分 黃芩 芍藥 各二錢 枳實 一錢

大黃 二錢

小柴胡湯 治寒熱往來少陽瘧疾口苦耳聾胸滿脇痛

柴胡 二錢 赤芍 錢半 甘草 半夏 錢各一 黃芩 錢半 人參

生薑 各五錢 大棗 三枚

大陷胸湯 服小陷胸湯不效以此治之

大黃 六錢 芒硝 四錢 甘遂 二錢 研汁

小陷胸湯 治結胸小腹痛滿手不可近

中西匯參醫學

備用諸方

五十二

廣濟堂印行

半夏 二錢 黃連 錢半 瓜蒌仁 大者一

搗鼻散 治一切悶症不省人事吹入鼻中有嚏者生

皂角 一兩 生半夏 五錢 細辛 一兩 為細末 收藏勿泄氣

補天大造丸 補五臟虛損

人參 二兩 炙黃芪 炒白朮 各三錢 炒棗仁 當歸 兩半

山藥 茯苓 兩半 枸杞子 大熟地 各四錢 河車 一具

鹿角 一斤 龜板 八兩 以龜鹿二膠和藥煉蜜為丸

治痢奇方 暑月痢疾

川連 六分 山查 三錢 酒芍 厚朴 歸身 白芍 各一錢

甘草 五分 桃仁 青皮 紅花 各八分 枳殼 地榆 各一錢

檳榔 一錢 白痢加木香 六分

通音煎 治音啞 白蜜 川貝 仁數冬 二胡 苑 肉桂 二

右將川貝款冬花為末四味和勻飯上蒸調服

開喉散 治喉口痢
人參 薑汁炒黃連各五分 石葛蒲七分 丹參三錢 石蓮子

茯苓 陳皮 冬瓜仁各錢半 陳米一撮 荷葉蒂三個

香蘇散 治時邪感冒頭痛發熱
蘇葉 陳皮 香附 荊芥 秦艽 防風 各一錢

芫荽子 各一錢 川芎 甘草 各七 加生薑 三片

平胃散 治脾胃不和 脹滿嘔吐 霍亂等症
藿香 厚朴 蒼朮 陳皮 各一錢

手拈散 治血滯心腹作痛
元胡索 醋炒 五靈脂 醋炒 草果 沒藥 各等分

右共為細末熱酒調服三錢

中西匯參醫學 備用諸方 五十二 廣益書局印行

滾痰丸 治老痰變生怪症

大黃 炒黃芩 礞石 沉香 各二錢 辰砂 二錢

以水為丸辰砂為衣每服一二錢開水送下

小半夏加茯苓湯 治飲停膈間加茯苓更效

半夏 薑炒 白茯苓 各三錢 炙草 一錢 生薑 三片

越鞠丸 治六般之鬱痞滿

製香附 山查 炒神曲 炒麥芽 川芎 蒼朮

炒梔子 等分為末水調丸如桐子大每服三錢

逍遙散 治肝經血虛木鬱

柴胡 炙草 茯苓 白朮 當歸 白芍 丹皮

黑山梔 各一薄荷 五分

右為末水調服三錢

葛根湯 治邪傳陽明以此解肌
葛根 二錢 升麻 秦艽 荊芥 赤芍 各一錢 蘇葉 八分

白芷 八分 甘草 五分 生薑 三片

牛黃丸 治中風痰火閉或喘嗽痰壅不省人事
牛黃 麝香 龍腦 各二錢 羚羊 當歸 防風 黃芩

柴胡 白朮 麥冬 白芍 各七 桔梗 茯苓 杏仁

川芎 大豆黃卷 阿膠 各八 蒲黃 人參 神麩 各一

二錢 雄黃 四錢 甘草 二兩 白銀 肉桂 三錢 犀角 一兩

山藥 五錢 大棗 五錢 金箔 百五十

右為細末煉蜜為丸每兩作十九

附子理中 治臟寒將脫之症用以回陽

人參 白朮 各二錢 附子 乾薑 炙草 各一錢

中西匯參醫學 備用諸方 五十三 廣益書局印行

益元散 利尿清暑
甘草 一兩 茯苓 三錢 滑石 六兩 硃砂 三錢 茯苓 不用亦有

共研極細末冷開水調服

藿香正氣散
藿香 砂仁 厚朴 茯苓 紫蘇 陳皮 各一錢 白朮

製半夏 桔梗 白芷 各七 炙甘草 五分

茵陳大黃湯 治黃疸熱閉
茵陳 三錢 梔子 大黃 各二錢

茵陳薑附湯 治陰黃小便自利
茵陳 一錢 白朮 二錢 附子 乾薑 各五分 炙草 一錢

肉桂 三分

獨瘕湯 治風寒濕三氣成痺

獨瘕湯 治風寒濕三氣成痺

羌活 獨活 桂心 五分 秦艽 一錢 當歸 桑枝 三錢

川芎 七分 海風藤 二錢 炙草 五分 乳香 木香 各八分

桂枝湯 治大陽中風寒 芍藥 生薑 各半 炙草 一錢 大棗 四枚

麻黃湯 治太陽傷寒無汗此方宜於西北 麻黃 三錢 桂枝 一錢 杏仁 五十粒 甘草 二錢

柴葛解肌湯 治溫熱症發熱頭痛不惡寒與傷寒異 柴胡 一錢 葛根 錢半 赤芍 知母 貝母 各一錢 生地 二錢

黃芩 丹皮 各錢 白虎湯 治陽明胃腑大熱 石膏 五錢 知母 三錢 甘草 二錢 粳米 一撮

生石膏 五錢 知母 三錢 甘草 二錢 粳米 一撮 若熱甚者倍之

白通加豬胆汁湯 治陰盛隔熱藥不入 白通加豬胆汁湯 治陰盛隔熱藥不入 製附子 五錢 乾薑 五錢 蔥白 二錢 童便 半杯 豬胆汁 匙

止嗽散 治一切咳嗽 桔梗 荆芥 紫苑 百部 白前 各一錢 炙草 兩 陳皮 一錢

共為末每服三錢初感風寒生薑湯下 團魚丸 治久咳將成勞瘵 川貝 知母 前胡 柴胡 杏仁 各四錢 大團魚 兩 重

右藥與魚同煮熟取肉食 月華丸 滋陰保肺平肝為治癆之聖藥 天冬 麥冬 生地 熟地 山藥 百部 沙參 川貝 真阿膠 各一錢 茯苓 續肝 廣三七 各五錢

菊花 桑葉 各二錢 清阿膠 化入煉蜜為丸每服三錢

中西匯參醫學 備用諸方 五十四 廣東省印行

生地黃湯 治腎大燥金吐血鼻衄 大生地 三錢 牛膝 丹皮 黑山梔 各一錢 元參 麥冬 白芍 各錢 鬱金 廣三七 荷葉 各七

加陳墨汁清重便各半杯沖服 人參養榮湯 治氣虛榮衛不固 人參 白芍 二錢 蜜炙黃芪 當歸 白朮 熟地 各錢

炙草 茯苓 遠志 七分 北五味 桂心 陳皮 四分 加生薑 二片 大棗 二枚

秘精丸 理脾導濕治濁固精 白朮 山藥 茯苓 茯神 蓮子肉 二兩 芡實 四兩

連翹 牡蠣 兩 黃柏 五錢 車前子 三兩 共為末金櫻膏為丸

澤蘭葉湯 治經閉調血脉 澤蘭葉 二錢 柏子仁 當歸 白芍 熟地 牛膝 荒蔚子 各錢

補天大造丸 補五臟虛損 人參 二兩 蜜黃芪 蒸白朮 各三錢 炒棗仁 當歸身 山藥 茯苓 兩 五 枸杞子 大熟地 各四錢 河車 一具 鹿角 一斤 龜板 八兩

以龜鹿二膠和藥煉蜜為丸 普濟清毒飲 治大頭痘症喉風發癰等症 炙草 桔梗 酒芍 酒黃連 各二錢 馬勃 元參 五分 橋紅 柴胡 各五升 麻 二分 連翹 牛蒡子 各八

神虎散 治時行不正之氣滿悶吐瀉發熱傷食

中西匯參醫學 備用諸方 五十五 廣東省印行

蒼朮 陳皮 厚朴 各二錢 炙草 兩二 藿香 八兩 砂仁 兩四
共為末每服二三錢

朴黃丸 治堅積作痢腹痛拒按
陳皮 厚朴 十兩 大黃 兩二 廣木香 四兩 荷葉水為丸

止瘡丹 治瘡二三發後以此止之
大酒炒常山 草果仁 去壳 半夏 麩 香附 酒炒 各四兩

真六神麩 治腹脹食積
和中丸 治腹脹食積
土炒白朮 四兩 炒扁豆 二兩 茯苓 砂仁 各兩 半夏 一兩

麵炒枳實 炒神麩 炒麥芽 炒山查 製香附
丹參 酒蒸 各兩 陳皮 五錢 蟲炒 各三兩

右為末荷葉一葉煎水為丸
中西匯參醫學 備用諸方 五十六 廣東省印行

白朮丸 治氣虛中滿積食
白朮 茯苓 陳皮 砂仁 神麩 各兩 五穀蟲 炒 三兩

用荷葉老米煎水為丸
金匱腎氣丸 治腎經聚水寒濕所致
大熟地 八兩 山藥 四兩 山萸肉 丹皮 澤瀉 各二兩

茯苓 車前子 牛膝 各二兩 查肉 一兩 附子 一兩
如水腫加五加皮 水八兩 煉蜜為丸每服三錢

秘旨安神丸 治驚悸神魂失守者
人參 棗仁 茯苓 製半夏 各二錢 當歸 炒白芍 各二錢

橘紅 各錢 五味子 十粒 炙草 五分 生薑 三片
歸脾湯 養血安神 人參 白芍 白朮 當歸身 各錢

黃芪 錢半 遠志 七分 炙草 五分 龍眼肉 五錢

安神定志丸 治心場不卧
茯苓 人參 遠志 各一兩 石菖蒲 龍齒 各五錢

洋參 麥冬 湯 治心經虛熱而痛者
洋參 麥冬 當歸 各二錢 生地 三錢 白芍 丹參 各錢

釵石斛 錢半 犀角 甘草 五分
清心丸 清心火止夢泄
生地 四兩 丹參 二兩 黃柏 五錢 牡礪 山藥 炒棗仁

茯苓 茯神 麥冬 兩半 北五味 車前子 遠志 各一兩
用金櫻膏為丸每服三錢

清腦煎 治痰壅心膈
製胆星 錢一 白芥子 錢二 海石 錢二 陳皮 木通 川貝 錢一

中西匯參醫學 備用諸方 五十七 廣東省印行

沉香降氣散 治心滯氣痛
沉香 三錢 砂仁 七錢 炙草 五錢 鹽水炒香附 五兩 酒炒

元胡索 一兩 煨淨川棟子 一兩
共為末每服二錢淡薑湯下

化蟲丸 治蟲積心腹諸痛
蕪荑 白雷丸 各五錢 檳榔 半錢 雄黃 錢半 木香 白朮

陳皮 各三錢 炒神麩 四錢 以百部 兩二 熬膏糊丸
每服錢半茶飲下

薑附湯 治寒厥心痛又真心痛手足青色或有可救
人參 乾薑 熟附子 各三錢

導赤散 治熱閉小便不通
麥冬 三錢 木通 錢一 生地 錢三 炙草 四分 竹葉 十片 車前 赤苓 各錢

瀉心丸 治心火

川黃連 五錢 為末蜜丸燈草湯下

生鐵落飲 治心熱

天冬 麥冬 川貝 各二錢 胆星 橘紅 各一錢 遠志 一錢

石菖蒲 連翹 茯苓 茯神 各一錢 元參 鈎藤 各半錢

丹參 錢半 辰砂 三錢

用生鐵落煎熟三炷香取水煎服

草薢分清飲 治心移熱膀胱為赤濁者并治諸淋

川草薢 炒黃柏 石菖蒲 各五錢 茯苓 白朮 各一錢

蓮子心 七分 丹參 車前子 各一錢

阿膠散 治尿血

阿膠 一錢 丹參 生地 各二錢 黑山梔 血餘 丹皮

中西匯參醫學

備用諸方

五十八

廣益書局印行

麥冬 當歸 各一錢

甘露飲 治血虛胃熱

枇杷葉 生地 熟地 天冬 麥冬 黃芩 各一錢

石斛 一錢 甘草 枳殼 五分

柴胡疎肝散 治肝氣燥急脇痛

柴胡 陳皮 各一錢 川芎 赤芍 枳殼 製香附 各一錢

炙草 一錢 水煎服

瓜蒌散 治肝氣燥急脇痛

大瓜蒌 一枚 枳殼 甘草 二錢 紅花 七分

清空膏 治肝經風熱入升為頭痛

羌活 防風 各六分 柴胡 五分 黃芩 一錢 川芎 四分

炙甘草 一錢 薄荷 三分 酒炒黃連 六分

芍藥甘草湯 治木侮土而腹痛

酒炒白芍 三錢 炙甘草 半錢

奔豚丸 治小腹氣結作痛氣偏墜

川棟子 兩錢 茯苓 橘核 各五錢 肉桂 三錢 小茴香 七錢

木香 七錢 附子 吳茱萸 各五錢 荔枝核 八錢

橘核丸 通治七疝

鹽水炒橘核 二錢 小茴香 川棟子 桃仁 製香附

山查 略一木香 紅花 各五錢

以神麩打糊 二兩 丸如桐子每服三錢

橘皮竹茹湯 治氣鬱大衝呃逆

陳皮 二錢 竹茹 一錢 半夏 人參 甘草 各一錢

水煎服

中西匯參醫學

備用諸方

五十九

廣益書局印行

煖肝煎 治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣

沉香 一錢 當歸 枸杞 三錢 茯苓 小茴香 烏藥 各一錢

肉桂 一錢 生薑 三片

蟬花無比散 治日赤腫痛風大所致

蟬脫 二兩 羌活 一兩 川芎 石決明 防風 茯苓 各一兩

赤芍 兩半 白蒺藜 八兩 炙甘草 當歸 各三錢 蒼朮 一兩

為末開水服

柴胡煎 治內火上衝或為痢瘧頭痛之症

柴胡 黃芩 梔子 澤瀉 各錢 木通 枳殼 八分

清瘰丸 治瘰癧初起即散

蒸元參 蒸川貝母 煨牡蠣 米醋煨

蜜丸每服三錢

五痿湯 治五臟受熱而痿

人參 白朮 茯苓 炙甘草 四分 當歸 枳殼 杏仁 三錢

黃柏 知母 各五分

歸芍六君子湯 治脾陰血虛下血

歸身 白芍 各二人參 白朮 茯苓 炙甘草 五分

半夏 陳皮 一錢

大和中飲 治食積脹悶

枳實 一錢 厚朴 一錢 麥芽 查炭 各一錢 陳皮 一錢 砂仁 八分

澤瀉 一錢

大無神功散 治一切痞積

地扁蓄 瞿麥 穗 麥芽 各五分 神曲 二錢 沉香 一錢

木香 錢半 炙甘草 五錢 酒蒸大黃 二兩

中西醫藥學

備用諸方

六

廣生堂印行

為末每服二錢燈心竹葉湯女人紅花當歸湯調服

香砂二陳湯 治脾滯腹滿腹痛

木香 砂仁 各一錢 半夏 陳皮 茯苓 炙甘草 各錢

加生薑 二片 大棗 二枚

蒼白二陳湯 治受濕身痛

即前方去香砂加蒼朮白朮

保和丸 治傷食

麥芽 山查 萊菔子 厚朴 香附 炙甘草 連翹

陳皮 一錢 煎服亦可

木香丸 治寒積腹痛拒按名曰陰結

木香 丁香 各錢 乾薑 一錢 炒麥芽 五錢 陳皮 三錢

巴豆 三十神曲糊丸每服二錢

滋腎丸 治下焦血熱用此滋陰化氣

黃柏 知母 各二肉桂 一錢 蜜小丸服二錢

枳朮丸 除脹消食

炒枳實 炒白朮 二兩

和胃飲 治霍亂

厚朴 陳皮 各二錢 乾薑 一錢 炙甘草 六分

玉女煎 治陽明有餘少陰不足

熟地黃 四錢 石膏 麥冬 各三錢 知母 牛膝 各錢

抽薪飲 治一切火盛

黃芩 石斛 木通 梔子 黃柏 各二錢 枳殼 五錢

澤瀉 錢半 甘草 三分

煎水服

中西醫藥學

備用諸方

六

廣生堂印行

犀角大青湯 治胃火發瘧大瀉太熱或咽痛不利

犀角尖 大青 元參 甘草 升麻 黃芩 各錢

黃柏 各二錢 人中黃 黑山梔 各錢

或加石膏一兩同煎

安胃飲 治胃火呃逆

石斛 麥芽 各三錢 黃芩 澤瀉 山查 陳皮 各一錢

木通 一錢 研末末湯調下

加味升麻湯 治胃火上衝頭痛甚熾

升麻 葛根 赤芍 甘草 各一錢 石膏 三錢 薄荷 五分

溫膽湯 治膽氣虛寒夢遺滑精

製半夏 錢半 枳實 八分 陳皮 茯苓 各錢 人參 一錢

大熟地 炒棗仁 各三錢 遠志 一錢 五味 甘草 五分 生薑 片三

五味子 灸甘草
 推氣散 治右脇氣痛
 枳壳 對金 各一桂心 灸草 各五 桔梗 陳皮 八分
 生薑 二片 大棗 二枚
 桔梗湯 治肺癰
 桔梗 白皮 橘紅 炒甜葶藶 各六 甘草 貝母 各半
 苡仁 金銀花 各五
 瀉白散 治肺熱
 蜜炙桑白皮 二錢 地骨皮 三錢
 葛根湯 治衄血神煩
 荷根 黃芩 阿膠 側柏葉 生地 各二 甘草 一錢
 犀角地黄湯 治血熱妄行及斑疹
 犀角尖 鎊先煎 丹皮 麥冬 白芍 各半 生地 四錢
 黃芩知母湯 治火嗽煩熱
 黃芩 知母 桑白皮 杏仁 天花粉 山梔 各一
 川貝 桔梗 生甘草 各一
 黃芩清肺飲 治肺熱小便不利
 梔子 二錢 黃芩 一錢
 生地黃煎 治陰火盜汗
 生地 當歸 炙黃芪 麻黃根 浮小麥 炙甘草
 黃連 黃芩 黃柏 各一
 王母桃 培補脾腎
 炒冬朮 大熟地 各二 何首烏 炒巴戟 枸杞 各一
 蜜丸龍眼大每三四丸飢時服

香砂理中湯 治脾寒腹痛
 木香 砂仁 各錢 人參 白朮 各二 乾薑 炙草 各一
 黃芩芍藥湯 治脾熱流涎利如蟹溺等症
 黃芩 白芍 各二 生甘草 一錢
 加味枳朮湯 治酒疸濕發黃
 白朮 枳實 陳皮 麥芽 山查 茯苓 神麩
 連翹 茵陳 荷葉 各錢 澤瀉 五分
 如傷酒加葛根 一錢
 葛花清脾湯 治酒濕生熱生疾頭眩頭痛
 葛花 枳實 三錢 赤苓 三錢 澤瀉 茵陳 酒苓 各二
 山梔 車前子 各錢 甘草 五分 橘紅 厚朴 各一
 梔子蘗皮湯 治鬱熱在裡陽黃症
 梔子 三錢 黃柏 二錢 炙草 一錢
 桔梗前胡湯 治肺氣閉塞悶咳
 桔梗 一錢 前胡 蘘子 赤芍 桑白皮 陳皮 各錢
 杏仁 三錢 薑沙竹茹 一錢 生甘草 五分
 加味甘桔湯 治肝鬱哮喘等症
 甘草 五分 桔梗 川貝 百部 白前 橘紅 各半
 旋覆花 茯苓 各錢
 貝母瓜蒌散 治肺熱液乾
 貝母 二錢 瓜蒌仁 錢半 膽星 黑山梔 各五 炒黃連 一錢
 黃芩 橘紅 炒甘草 五分
 紫苑散 潤肺止咳並治肺痿
 紫苑 知母 川貝 桔梗 茯苓 阿膠 各一
 人參

鴉膽子 治久痢寒積在腸

用鴉膽子一個蒸透將米粉包作團子蒸熟以開水吞下空心團團吞

清魂散 治腸風下鮮血而腹不痛者

荊芥三錢炒黑當歸五錢加槐花三錢炒焦史三錢炒焦

通關散 吹鼻取嚏

皂角細辛各二錢生半夏二錢

共研末極細

益母勝金丹 調經行血

砂仁拌熟地酒蒸川芎 酒蒸羌蔚子 土炒冬朮

酒炒香附各四兩酒炒白芍 酒炒當歸各四兩

以益母草八兩酒水各半熬膏蜜丸開水下

中西匯參醫學 備用諸方 六十四 廣益書局印行

獨聖散 去痰積

五靈脂去土炒

為末醋丸酒送下

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱

龍胆草 澤瀉各一錢車前子 木通 生地 山梔

酒炒當歸 黃芩 甘草各五錢

脫胎煎 凡將產先服此方催生最佳胎死腹中加朴硝

當歸八錢肉桂三錢川芎 牛膝各二錢車前子錢半

紅花一錢

歸薑湯 產後去瘀心慌自汗

當歸三錢黑薑七分炒棗仁錢半

煎湯服

花蕊石散 治瘀血服此能化水

花蕊石片一錢土色硫黃四兩和勻為末入瓦罐封固用

炭煨二炷香取出再研童便酒下

生化湯 治產後去瘀要藥

當歸三錢黑薑五分川芎錢半益母草一錢桃仁七粒

神仙太乙膏 治一切癰疽

元參 白芷 當歸 肉桂 生地 赤芍 大黃兩

黃丹炒三兩藤油二觔熬藥去渣成珠滴水中成珠是也入黃丹再熬成膏聽用

解恨煎 治暴怒傷肝氣逆脹滿

陳皮 半夏 厚朴 茯苓各錢蘇葉 芍藥各一錢

砂仁七分如脇肋脹痛加白芥子一錢胸膈氣滯加枳壳

中西匯參醫學 備用諸方 六十五 廣益書局印行

香附藿香各七分

贊育丹 治男子精衰陽痿而艱子息

大熟地 白朮各八錢當歸 枸杞各六錢杜仲 仙茅各一錢

巴戟肉 山茱萸 淫羊藿 肉蓯蓉各四錢蛇床一兩

附子 肉桂各一錢

毓麟珠 治婦人氣血兩虛而經不調不孕者

人參 白朮 茯苓 芍藥 川芎 炙草 杜仲

鹿角霜 川椒各二錢熟地 當歸 羌活各一錢

蜜丸空心服三錢

醫

案

〔明〕孫一奎撰

據上海圖書館藏明萬曆
刻本影印原書版框高一
九五毫米寬二五八毫米

詳續紳名家贈文

贈太醫東宿孫君序

蓋士君子有濟世之心者。必託經世之術以運之。遇不遇無論也。何也。得時而駕。則宇內之休戚利害。隱然共之。視其患若切於身之疾痛疴瘵。不措之安全不止。此士君子之心。得位以行之者也。不幸不獲遇。澤不及物。而心不得施。有志君子。往往懷其道而隱於醫。故是昔人謂濟人利物。無位者不能。惟醫以救死扶生為功。故業之者。可以推不忍之心。及於物。而於道有益有味乎其言之也。然醫豈易言哉。吾聞其宗旨。自內經本草以來。書之藏於有司者。一百七十九家。非博通鉅儒。起悟上哲。穎攻其業。何能探討洞明。其陰陽寒熱。驚燥虛實。消息盈縮之奧。而措之行事。夫人之待命於醫。生死攸係。廼以未諳淺薄者。嘗試之。其不賊人之命者。幾希。醫以濟人。至於賊人。可不畏耶。此醫之所以難言也。余頃多病。謁告山居。嘗嘆濟物之業。未措於

醫案序

用。願思延醫以求濟其身。然而醫之良者。若不一遇也。適壬申秋。仲吳君柳溪。譚新安。海陽。有孫君東宿者。醫可謂稱良矣。余亟請而相印證。蓋其論風濕乎。素難之。旨而表裏。夫張劉孫李丹溪伯仁諸家。其視余疾也。未投藥先譚余之經絡色脉。機能與受病之自。即勿藥而余病爽然若失。及詳察其端方之度。沉著之思。淵淵之閭奧。則杳焉莫竟其涯。非所謂深於道而隱於醫者耶。余因詰之曰。神農嘗百草。先天而命之藥。黃帝岐伯後天而著之經。此天以神授。聖以神符。不可及矣。嗣後若和扁華佗。淳于意。仲景。思邈。河間。東垣。朱滑。莫不簸美化機。制人命於掌上。術亦神也。何今之事。是業者不能踵其芳躅。取抑世代之不同也。孫君勃然曰。古今人非不相及。用心殊爾。宋儒有言。古之仕者為人。今之仕者為己。不佞亦謂古之醫者為人。今之醫者為己。道不同而受病一也。夫士君子之視天下。與吾身血脉相通。天下病若痼瘵之切。

五七一

身。天下安則慙然而無恨。雖以道為藥石者其
 濟家以醫為道術者其濟狹其心一也。故古之
 醫也以救死扶生為心。其業專而用方也慎。專
 則精而造詣入室。慎則審而投藥奏功。此和扁
 諸名家所以悉臻秘妙稱神奇。今之醫則異是
 也。將以市利。非以濟人。黃岐以來諸書非不剽
 竊以資口說。迺其心則寔胡越。一膜視天下。率
 以利之盈詘為心之重輕。人之濟與否。若與吾
 術不相關。此何以比古人而接其芳躅哉。不佞
 奎何能造古賢哲之閭奧。第無愧於此心爾。余
 聞而喟然嘆曰。孫君克是心而行是術。其將大
 有裨於時矣。雖隱而亦顯也。因次其語而歸之。
 爰以訂夫業是術者是為序。

萬曆癸酉中。魏曰。吳江孫質庵從龍敬書於符九
 草堂

醫家三吳治驗一卷目錄

萬曆龍飛二年吳小峰小川目疾一

萬曆甲戌沈中丞案二

張孝廉後渠大頭疫三

吳江孫行人痛風有發明四

都諫公子痘有發明五

張文學子心病虛弱有發明六

大宗伯董潯陽翁脾胃疾有發明七

董龍山夫人便血八

馬厨瘡痢併發有發明九

吳肖峰令政腹痛有發明十

大光祿龐太夫人寒熱頭痛飽悶十一

光祿公痰火脇痛有發明十二

張思軒夫人心痺有發明十三

馬迪庵公內傷腰脹大小便不利有發明十四

高大同馬腸風十五

鳳林內子隱疾有發明十六

田城公氣虛中滿有發明十七

金絡令君減老夫人頭疫有發明

潘見所公半身不遂有發明

見所公白濁有發明

凌夫人孕二十一

金元岩令眷產後痢二十二

沈別駕夫人產後發熱有發明

吳太夫人白帶二十四

吳北海令政經行四肢壘又發塊紅紫二十五

周芻王白濁二十六

竹匠婦妊娠吐血胸腹脹痛有發明

李妓夢遺咳嗽二十八

金妓時疫二十九

雙胸膈不暢三十

李雙痛風三十一

沈別駕門下老僕三陽合病有發明

蔡中林內人陽明少陽合病三十三

吳九宜先生早晨泄瀉三十四

沈大官左膝腫痛不能起止三十五

沈繼庵下痢脫肛內人乾霍亂三十五

沈晴岳先生五更耳鳴三十六

潘景宇內人頭痛作瀉三十七

臧六老上吐血下瀉血三十八

臧氏婦臍邊痛下痢紅白三十九

丁耀川令堂吐血左髀肛門互換作痛四十

丁文學令姊暈厥四十一

金良美咳嗽吐紅潮熱右脇不能卧四十二

倪五娘子口眼歪邪四十三

王祖泉令政頭痛惡寒汗出如兩四十四

溫巽橋子婦滯下四十五

溫一渠內人血虛咳嗽四十六

溫巽橋二令媳產後右脇脹痛白帶如膿四十七

溫天衢病目吐血四十八

張二娘子孕七月嘔吐不止四十九

王巽泉內眷痰嗽腹脹五十

溫南溪內人大便秘結五十一

陳春野公令愛丁美疔症五十二

潘敬全令媳血下筋膜如手大者一二桶五十三

張懷赤公早晨洩瀉下元虛寒五十四

臧七房二老夫人痢五十五

蔡樂川令眷頭痛如破五十六

周蘆汀廻脊胃腕痛五十七

醫案一卷

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人余煌

子 泰來 全閱梓
朋來

三吳治驗

萬曆龍飛二年小春月予始遊苕之東雙林於時

族兄吉泉之友吳小峰與其弟小川俱病目專

科者愈治愈重其目始紅腫次加太陽痛繼則

白星翳疊出予不以目科名而識者稱予大友

因謀於吉泉曰醫以通變為良昔秦越人過邯

鄲聞貴婦人則為帶下醫過雒陽聞周人愛老

人則為耳目痺醫聞東宿君國手也必能隨俗

為變願一言去吾兄弟目疾吉泉邀予余曰嘉

靖間論醫者必首西吳如周仲仁氏凌漢章氏

王實淵氏者皆擅一時名其家世必有傳也何

不於予吉泉曰渠家慕弟久矣且其尊人受博

士易為西吳名醫一往藉與為談易

1026 4 1026 4 1026 4 1026 4 1026 4

地母孫。診其脉。小峰之脉濡而緩大。而目血。直貫瞳人。薄暮則疼。小川之脉皆洪大。鼓指。黑珠有浮翳。瘰。隱澁難開。大小便皆不利。故於小峰用補。先以清肝散與之。夏枯草五錢。香附四錢。甘草一錢五分。細茶五分。以徹其痛。藥西進而痛止。繼用人參。白茯苓。熟地。黃枸杞。子桂心。牛膝。破故紙。白芍。菴荊。牡丹皮。服八日而愈。於小川用瀉。內用瀉肝湯。及當歸龍會丸。外用象牙冰片為末。點之。七日全愈。其尊君我峰翁喜詣。

集十一

予曰。二日均病。年同齒。染同時。諸醫同治而同一不愈。先生一補一瀉。而二病均愈。何哉。余曰。此陰陽虛實之辨也。經云。實者正治。虛者從治。令姪之症。惟厥陰肝火熾盛。肝嘗有餘。有餘者瀉之。正治也。即君下虛。又為怒所激。怒則火起於肝。肝為藏血之地。故血絲貫瞳人。而薄暮作痛。方用夏枯草。香附為君。疏其肝氣。經云。肝苦急。急食甘以緩之。故用甘草為臣。茶能清頭目。用以為使。先為去此痛。經又云。水流濕。火就燥。故

復用甘溫補其下元之虛。俾火得歸原。此從治也。若用苦寒降火之劑。不惟血凝而痛加。抑且激其火而使愈熾矣。我峰聞之。語人曰。孫君本陰陽而治寒熱。是用易為醫也。故補者補效。攻者攻效。語曰。不知易者不可以為太醫。孫君神於易而於醫。平何有。願於吾若懸一壺也。余哂之。謂昔韓伯休且不欲人間知其名。余又何壺之可懸哉。

集十一

萬曆甲戌。其年自仲秋徂冬。瘡子盛行。三月內。予所治男婦嬰孩共七十二人。若之望族沈最者。大中丞親願公。當考功時。幼君瘡喘嗽不寧。聲啞發熱。洩瀉。紫不斂。予以小魚比散愈之。夫入姪。腹痛昏厥者五日。名醫如高陳二公者。沈姻姪。無巨細悉任之。亦不能措手。予至診之。兩手脉皆洪大。法當下。眾魚以姪難之。予曰。經云。有故無殞。亦無殞也。姪已九月。將解。即胎動。奚傷。若當下不下。不獨其痛難忍。而變且不可測。考功是予言而請。承氣湯加蘆。便砂。

仁下之而安。考功偶冒風，頭痛倦怠，發熱如瘧。脈浮絃而數。予曰：此小柴胡湯症也。一劑而瘥。考功請告家居者二十年。篤好方書。予幼之茗。茗人未知予。考功聞予，亟欲識之。謂予治病甚奇，又與予論傷寒痘疹胎產皆中窾，深然之。語人曰：良相良醫等爾。如孫君所詣，即千金不足為其重。特讓醫說書於冊，以不朽。孫君云：二張孝廉後渠，丁年患大頭疫，頭大如斗，不見項，唇垂及乳，色如紫肝，昏憤不知人事。見者駭而走。其年疫甚，痛人畏傳染，至廢吊慶。張與考功公子同受春秋於會稽陶春源，所陶邀予診之。其脈皆浮絃而數，初以柴胡一兩，黃芩、玄參各三錢，薄荷連翹、葛根各二錢，甘草一錢，服三劑，寒熱退，絃脈減。但洪大，予知其傳於陽明也。改以貫衆一兩，葛根、天荅粉各三錢，甘草一錢，黑豆四十九粒，一劑腫消其半。再劑全消。藥粒不入口者二十一日。再與小柴胡湯兩劑服之，始納乾糕如指者兩條。次日進粥而漸平矣。丁酉秋

聞報捷三

吳江孫質庵老先生，行人時患痛癢，兩手自肩顛及曲池，以至手梢，兩足自膝及跟尻，腫痛更甚。痛處熱，飲食少，請告燕還，而伏薦者三年。里有吳君九宜者，沈考功而席也。見予起後渠疾，因語行人逆予，診其脈皆絃細而數，面青肌瘦，大小腿肉皆削。予與言：此病得之稟氣弱，下虛多，內以傷其陰也。在燕地又多寒，經云：氣主煦之，血主濡之。今陰血虛，則筋失養，故營不營於中，氣為寒束，百骸拘攣，故衛不衛於外。營衛不行，故肢節腫而痛，痛而熱，病名周痺是也。治當養血、舒筋、潤燥，使經絡通暢，則腫消熱退而痛止矣。痛止即以大補陰血之劑，實其下元，則腿肉復生，稍愈之後，願加珍重，年餘始可出戶。行人聞而喜曰：果如公言。起白骨而肉之也。吾即未藥，病似半去。惟今春劑予先以五加皮、蒼朮、黃柏、蒼耳子、骨脂、地黃、熟地、仁羌活、防風、秦艽、紫荊皮服之。二十

光更以生油。龜板。牛膝。蒼朮。黃柏。晚蚕沙。蒼耳子。以仁海桐皮當歸。秦艽。三十劑而腫痛全減。行人公益甚。予曰。病加於小愈。公下元虛憊。非歲月不能充實。古語難足而易。者陰也。須痛戒酒色。自培本根。斯飲藥有效。而沉疴可除。據公六脉輕清流利。官必腰金。願葆真以頌之。萬毋自輕。來春氣和。可北上也。乃用僂茅為君。枸杞子。牛膝。鹿角膠。虎骨人參。為臣。熟地。黃黃。栢。晚蚕沙。茯苓。蒼耳子。為佐。桂心。秦艽。澤瀉。為使。蜜丸。服百日。腿肉長完。精神復舊。又喜語。予曰。貧官何以稱報。讓次公濟人。澤物盛德於沈。考功冊後。以彰盛美云。後十年。行人官至江西。副憲四

各一錢。蟬退。甘草各五分。藥成劑。而衆止之。曰。麻要清涼。痘要溫。故博愛心。鑑以保元湯為良。吾儕將劑而進之。乃公獨主寒涼。保元之謂何。予曰。用藥貴對症。保元湯良矣。必血活。熱清而後可用。今血熱毒盛。而用溫劑。是火熾添油也。衆曰。若慮毒未解。吾若醇法甚佳。用桑葉雞冠血酒調服之。痘即立起。而慎氏王氏茅氏皆若上專門名家。亦以為言。予曰。此法亦可用於清解之後。經曰。諸痛瘡瘍。皆屬心火。火未退。而用是以毒攻毒。其勢愈熾。予故欲先清解而後保元也。惟楚銅壁山人黃桂峰者。治痘高手也。獨語鄭公曰。孫公之劑。寔與症對。衆論皆膠固不達變者。第恐清解之劑。用遲一日爾。試煎服之。以觀其後。鄭公命僕速煎。衆猶持議曰。如必服此劑。亦當揀去貝母山查。鄭公聽其減去。至夜子始聞。隨語桂峰曰。減去二味。恐七八日後不能無它症。桂峰曰。何以故。予曰。此痘內傷外感。俱未清楚。今帶熱而出。故其腹胸脹。去貝母

恐搶喉。去山查恐洩瀉。七八日痘毒出盡。腹內
空虛。變從虛出。諸君素以痘專科。何不慮及此。
其夜服藥後。即嗒然而睡。天明痘色明潤。焦頂
盡退。血亦漸活。惟嘔噦搶喉。衆又以昨日之劑
太寒所致。予曰。此火毒未盡徹也。宜進竹茹湯。
而慎雲峰佛然曰。吾家世世業痘。年亦七十有
五。曾未見治痘用竹茹者。春寰公令弟樂津公。
檢痘疹全書用竹茹者以正。慎語塞悻然而去。
藥進而噦止。至八日果洩瀉發痒。予以保元湯

加白朮以治瀉。大加何首烏以止痒。一帖而痒
止。至十四日。天庭兩額皆回漿作靨。惟兩頤漿
未回。洩瀉不止。予因偶出北門半日。歸見其口
開項軟。手足痘氣盡癩。腹又作脹。已成內攻。舉
家啼泣。予亦茫然。不遑為計。嘆息出門。樂津公
托而送之。少間揖別。而聞衣間瘴臭。語樂津曰。
公聞臭乎。曰聞。予曰。似有生意。亟還起之。予思
兩頤乃腎經部位。獨不回漿者。腎元虛也。峻補
腎元。庶可使活。先以紫河車一錢。用酒漿調服。

固其元氣。服後即睡。繼以人參一兩。黃芪克經
子各三錢。作大劑服之。一日夜服人參一兩八
錢。黃桂峰是夜自松江還。時已四鼓。至叩門而
入。鄭語之變。且告之服藥。黃曰。瑛吾看作何狀。
見其結靨之下。復灌一線黃漿。贈痘盡起。桂峰
曰。萬全矣。非孫公不能起此病。桂峰由此益昵
予。而作序以贈。趙清孫憲副公冊後。識不忘也。
五

張文學子心。二尹可泉公長君也。自知醫弱冠病
吳下名醫皆診之。愈曰。察治久不効。子心亦自
分必死。督家人具秘器。已沐浴衣襪。而卧正
寢。斷粒絕藥者二日。可泉聞予治其高第。張星
岳之婦奇。因訪予曰。病心痺而尸。寢浹旬者。能
起之。誰不嘖嘖稱公高手。吾子病且革。幸憐而
診之。予至診其脉。左寸短弱。右關畧絃。餘皆洪
大。其症咳嗽。下午熱。從兩足心起。漸至頭面。夜
半乃退。面色青。形羸氣促。多夢遺。交睫卧床。褥

奄奄一息耳。時則七月初旬也。診畢語可。泉公曰。郎君病可治。不宜豫凶器也。可。泉公曰。諸醫
魚謂火起。九泉者十不救一。大肉盡則者死。咳
嗽加汗者死。脈不為汗衰者死。又當此鏗石流
金之候。又恐肺金將絕。豚子亦自謂無生理。先
生何言可治也。予曰。汗多者。孤陽幾於飛越也。
可。泉公曰。飛越亦死候也。予曰。幾者將成未成
之辭也。症雖危。其色其聲音其脈尚有生意。終
不可以一凶而廢三善。兩額不赤。心火未焚也。
聲音不啞。肺金未痿也。耳輪不焦。腎水未涸也。
相書云。面青者憂。疑不決。左寸短者心神不足。
閨畧絃者。謀為不遂。夫心者萬事萬化之主。內
經曰。主明則下安。主不明則十二官危。又肝主
謀。為胆主決斷。謀為不決。故色青。症與色與脈
皆非察也。蓋郎君志願高而不遂。其欲殆。心病
非腎病也。經曰。色脈相得者生。予故謂郎君之
病可起也。病者聞言。明日語其父曰。吾今猶寐
若初寤矣。從來未有此論。心吾心脾也。吾病由

星士許決科於癸酉。是年子落第。而同窓者
故怏怏至此。先生得吾心於色脈神矣。此言可
當藥石。謹拜命。予為定方。煎方名調肝益神湯。
以人參、酸棗、仁龍骨為君。丹參、石斛、貝母、麥冬、
五味子為臣。山梔、香附為佐。服二十帖。而病起
丸方則大龜板、熟地、黃耆、枸杞子、人參、麥冬、五味
茯苓、蜜丸。服三月。而精神健。肌肉完。次年生女。
可。泉公。茗中名士。奇子治而延譽。聞於大宗伯
董潯陽公。宗伯方驩余者。由可。泉公始也。
大宗伯董潯老。年六十七。有脾胃疾。翁以過啖瓜
菓而胃脹痛。時當處暑也。延予治。診其脈。寸
關絃緊。觀其色。神藏氣固。翁門下蔣虹橋沈樂
間者。多藝人也。素親信二公。詰予曰。症脈何
如。予曰。症脈雖曰腹脹痛。然易瘳也。二公曰。翁
生平不能素食。今輟瀉。今不如輩者。半月。燕居
好奕。好看書。好作詩文。即盛暑。亦手一編。不言
倦。日亦不瞌。今不親筆硯者。月餘。不櫛沐者
七日。宜一切無所事事。倦極矣。諸名家如沈竹

亭沈春字金樞丘有劑脩嘗之無益也而公何
言易子曰諸公不過用二陳平胃加山查麥芽
等消導劑耳與症何涉蓋翁傷於瓜菓而為寒
濕滯腸經云寒濕所勝治以辛溫然瓜菓非射
香肉桂不能消此諸公所以不能愈翁疾也予
以高良姜香附各一兩為君肉桂五錢為臣射
香一錢為佐每服二錢酒調下之藥入腹胃次
便寬再而知餓三服而中膈交接賓客如未病
者翁語沈將曰孫君所見所養度越諸人若是

往聞治張氏子氣絕兩日而能活之今於活吾
病益信誠臨舊語國之遺特書一軸以彰其高
因以紀一時之良遇云七

大宗伯即君董龍山公夫人為憲副茅鹿門公女
年三十五而病便血日二三下腹不疼諸醫診
治者三年不效予診之左脉沉澀右脉漏出關
外診不應病予竊謂血既久下且當益其氣而
升提之以探其症廼用補中益氣湯加阿膠地
榆側柏葉服八劑血不下者半月彼自喜病愈

矣偶因勞而血復下因索前藥予語龍山公因
夫人之病必有瘀血積於經隧前藥因右脉漏
關難憑故以升提兼補兼澀者以探虛實耶全
得病情法當下而除其根也龍山公曰三年間
便血雖一日二三下而月汛之期不爽每行且
五日如此尚有瘀血停蓄耶予曰此子因其日
下月至而知其必有瘀血停蓄也經云不塞不
流不行不止今之瘀實由塞之行也不可再澀
古人治痢必先下之亦此意也公曰明日試卜

之予曰卜以決疑不疑何卜公隨以語夫人夫
人曰孫先生非誤人者識見往又出尋常宜惟
命蓋夫人讀書能文聰明謀斷不啻丈夫故言
下便能了悟即用堯仁承氣湯加丹參五靈脂
荷葉蒂水煎夜服之五更下黑瘀血半桶其日
血竟不來復令人索下藥予曰姑以理脾藥卷
之病根已動矣五日而再下未晚也至期復用
下劑又下黑瘀如前者半繼以補中益氣湯參
苓白朮散調理

大宗伯董潯老門下有馬厨者。七月初旬病。病二十餘日愈劇而勢甚熾。時宗伯對余奕正酣而蔣虹橋沈樂閒報曰。馬厨危在旦夕。宗伯聳之。推枰嘆息曰。吾命。吾命。予叩其故。語曰。能厨者不下二十人。獨此厨適吾意。將恃之以怡晚節。今病不可起。柰何。予詰何病。翁顧蔣與沈曰。第詳道其狀。蔣沈述其症。大發寒熱。寒至不憚入炕。熱至不憚下井。痢兼紅白。日夜八十餘行。腹痛惡心。汗多神氣倦甚。究其脉曰。脉不吉。下痢脉洪大者死。細微者生。今洪大逆也。予曰。痢固忌洪大。寒熱亦非細微所宜。其中必有故。二公曰。幸一往決之。潯翁不可。謂何可以細人而勞長者。予曰。醫寄人生死。何論巨細。矧事翁之人。猶不可坐視不救也。潯翁欣然。握余手偕行至宅後橋。余入門。同居數十家。皆執香拱立以伺診。其脉察其症。果如蔣沈所言。其面色微紅。汗淋下。予究病所由起。渠謂過客衆。厨間燥熱。食瓜果羹藕過多。晚又過飲。御內而寢於樓簷

下。次日即寒熱。脈洪大。予曰。此乃暑熱。治法宜清。予遂置。如前握余手而回。蔣沈謂予可治否。予曰。先生寤靈。偶有一得。通背水瀉也。人參。白朮。各五錢。知母。地黃。各三錢。大附子。各二錢。作一大劑煎之。蔣沈稱問予。潯翁命近侍煎於其側。不復蔣沈問也。熱則付飲之。飲訖即睡。老先生曰。服後何狀。為佳。予曰。倘得

一睡。則陰陽始和。和則汗可欬。而寒熱嘔惡可止也。蔣沈曰。聞已睡矣。明日已刻。二公鼓掌來言。夜來痢減半。汗吐全無。脉亦欬矣。再用人參。石膏。白朮。白芍。藥滑石。各三錢。炮姜。肉桂。知母。各二錢。炙甘草。附子。各一錢。服後瘥止。痢又減半。飲食漸進。神氣漸轉。改用白芍。藥酒炒。五錢。人參。白朮。滑石。各二錢。甘草。陳皮。炮姜。肉桂。各一錢。三劑而痢全止。飲食加。漸就安矣。蔣沈問曰。公寒熱均投。此為何症。而劑何名也。予笑曰。

張仲景附子甘草瀉心湯既用大黃黃連又用
 乾姜附子此何說哉蓋假對假真對真也溥翁
 躍然喜曰先生惟是故能起垂危之人而生之
 也故以理中湯應之若以寒熱均用為疑而
 邪氣實也故以白虎湯益元散應之虛者正氣
 子理中湯正所以溫中補下者內經又云實者
 宜下之故以白虎湯益元散應之虛者正氣
 宜下之故以白虎湯益元散應之虛者正氣

余詩冊中臨菑號國之談非虛語矣九

吳江吳太僕長君肖峰令政太宗伯董溥老次女
 也患咳嗽體倦多汗腹痛呻吟不絕口者半月
 吳江之醫不効訪遠近名最著者如姑蘓盛氏
 後湖王氏后山震澤沈氏竹亭先後遍治之而
 痛愈加予適寓苕城龍山公邀予乘快舡魚程
 而進至則診其脉左手三五不調右手沉絃面
 色青而息甚微腹中漉漉有聲予因問上年夏
 月曾病否肖峰曰曾頭痛體倦多汗動止無力

不能親事但不咳嗽不腹痛今五月病如上
 年而市醫謂傷風所致用參藜飲未之始咳嗽
 沈為其清嗽則加腹痛王與盛謂通則不痛以
 沉香滾痰丸下之則勢憊而不可支予方彈思
 謂此迺溼夏病仲景謂春夏劇秋冬瘥者是也
 而龍山公詰問注夏何為咳嗽予曰原不咳嗽
 由參藜飲而咳嗽也汗多又重發汗痛受傷
 故燥而嗽何為腹痛予曰原不腹痛因治嗽而
 寒其中氣腹故痛也後事者又不究其因寒而
 痛乃謂通則不痛而用寒涼滾痰之劑重傷其
 中氣不思五月六陽之氣皆散於外汗而又汗
 汗多則亡陽夏至一陰將萌腹中尚虛虛而復下
 下多則亡陰陰陽俱亡不憊何待予欲酌一方
 以起之恐從事者又將議其後龍山促之乃用
 酒炒白芍藥五錢甘草黃芪各三錢桂枝二錢
 大棗二枚水煎而服加粘糖一合吳下諸公果
 群然又辨龍山公曰不必辨病者望此以甦其
 生速煎飲之飲訖而睡自已至申不醒先事者

皆搖首命僕急携藥囊將去且語龍山公曰。全
令妹之速者孫君也。本草云。夏不用桂。伐天和
也。諸痛不補助邪氣也。故一飲而不醒。吾濟行
矣。龍山公以其言語余。因詰病者之熱。賤子曰。
所喜者以其睡也。睡則陰氣生。陰生則汗可收。
痛可止也。假令藥不對症。安得有此。又詰所按
之劑何名。子曰。此仲景小建中湯也。出金匱要
畧。蓋建者立也。中者陽明所主。今腹痛如縛。帶
脉急縮也。東垣治例。腹痛以芍藥為君。惡寒而
痛加桂。甘草緩帶脉之急。縮用以為臣。經曰。急
者緩之。而青脉絃。肝氣盛也。肝屬木。木盛則脾
土受制。而又誤下。因傷之極。故痛之猛也。經云。
木得桂而枯。佐以黃芪。伐肝補脾。又能斂汗止
瘧。此建中之所由名也。語未竟。內報病者醒而
索粥。子曰。與之穀。氣進則有本矣。粥後又睡。至
天明腹全不痛。惟稍咳嗽。加五味子。麥門冬。魚
治注下而全瘳。龍山公述病之始末。劑之藥
味。報大宗伯。宗伯公致言於子曰。足下以四味

之常藥。振不起之危病。名震三吳。聲溢兩浙。首
宋景濂為宋丹溪立傳。吾固不敏。幸先生以所
治節條付之。俾序以傳於後。俾工是術者有所
藉手。予憮然語龍山公曰。何修而得老先生寵
幸之深也。第令妹被尅伐太過。陰陽俱亡。今病
雖愈。而脉絃不退。猶可為慮。幸叮寧戒暴怒。節
飲食。謝去人事。恬澹多補。庶可永年。不然。亥月
陰極陽生。恐不能保無患也。慎之慎之。後至期
與肖峰齟齬。怒而絕藥。果以凶聞。若人多予之

直與先見云。十

大光祿龐公子遠。吳江人也。其大夫人病頭痛。惡
寒。曾兩週且痛。時發寒熱。吳醫王后山者。有曉
者。其人最所篤信。延治五日不瘳。問予。予曰。此
致為治。診其脉。右滑大。左浮絃而數。問服何劑。
光祿公曰。不識。而有藥在。予視之。偶失言曰。左
矣。時有西席項姓者。聞言而厲聲曰。此三吳最
名士也。渠發劑而有議者。輒面唾之。幸不在尔。
予笑曰。渠是而議者非。則當唾人。渠非而議者

是自唾且不暇。何暇唾人。四物湯玄胡索牡丹皮香附子養血調經劑也。太夫人七十餘矣而有經可調哉。按劑之左由生平守常套而不知因人因症隨俗為變也。項子曰。此何症。予曰。仲景有云。頭痛惡寒。外感病也。浮絃而數。胃滿澀痛。少陽脉症。具在右脉滑。飲食滯而為痰。彼用當歸地黃芍藥。皆滯痰閉氣之味。內傷何由得消。外感何由得出。此症只宜用柴胡湯合平胃散。一二帖可瘳也。項猶有言。光祿公曰。勿辨。然

藥而溼滑明矣。一飲而寒熱除。再飲而胃滿瘳。光祿喜曰。奇公名。不虛附矣。予私問項子何極譽王。光祿曰。項初受業於王。未睹大方。而獨是其師說。多見其識之不廣也。十一

光祿公後有事於庄所。值中秋。乘酒步月。失足一跌。扶起便脅痛。不能立。晝夜不寧。行血散血活血之劑。一日三進。閱三月。服二百餘帖。痛不少減。因迎予治。診之。脉左絃。右滑數。予曰。此痰火症也。公曰。否。賤軀雖肥。生平未嘗有痰。徒以遭

跌積痰血於脅間。作痛爾。予曰。據脉實痰火也。痰在經絡間。不在肺。故不咳嗽。而亦不上出。脉必沉伏。或扎或瀉也。面色亦必帶黃。前諸君以痰血治者。皆拘公言。不以色脉為據。且多服峻厲剋伐破堅之劑。無效。此非痰血之積明矣。公欣然請藥。即用大瓜萸帶殼者二枚。重二兩。研碎。枳實甘草前胡各一錢。貝母二錢。與四帖。公以為少。予曰。愚見猶以為多。此症服此一二

劑可瘳。又即報我。為製補藥。藥可也。公得藥一更矣。仍煎服。五更腹中鳴。有聲。天明大瀉。一二次。皆痰血痛減大半。打服又下痰數碗。許。痛全止。隨能挺立。三服。腹中不復有聲。亦不瀉。蓋前由痰積瀉也。今無痰。故不瀉。公曰。望聞問切。四者醫之要務。人人皆著之。口吻。而先生獨見之。行事。即予母子之疾。先有事者。皆吳之名流。微先生。吾殆撞壁矣。何能還轅而生哉。吾嘗是。蓋服先生之高。十二

進賢三尹張思軒公與潘少保印川公皆受室於施氏稱聯襟云。施故富家而張公夫久賢慧治家勤篤為人精潔周致以產多而氣血憊又以婚嫁繁而費用不支積憂年將五十因病心瘁發則暈厥小水短澀胃高痛不可忍煩躁乾噦惡內蒸熱氣膈又上騰肌削骨立月汛不止。茗城時輩有認為氣快者有認為高食者皆束手無措尸寢浹旬漿粒不入口者五日凶具備而待斃舉家計無所之惟神是禱予適在潘府逆予診之脉左絃大右滑大而數於畢予曰可生也病機云諸逆吐酸皆屬於火諸風掉眩皆屬於木法當調肝清熱開鬱安神諸醫群然自攝而背譚白書云骨蒸內脫者死形瘦脉大胃中多氣者死絕穀食者死孫君獨許其生果藥王再世哉予若不聞而檢藥以進竹茹滑石各三錢白豆蔻仁七分半夏麩橘紅姜連茯苓各一錢甘草五分水煎令一口口嚥之服畢噦止量定次日用溫膽湯調辰砂益元散三錢服之

高頰開漸進飲食小水道長煩躁盡滅駸駸然安若無事後用逍遙散六君子湯加黃連香附三越月而肌肉全精神如舊若人駭然曰能起此病信藥王矣子三馬二尹迪庵公年五十五以掃墓而過食鰻肉捲餅心腹脹痛市醫不知用吐而遞用硝黃下之大便不行脹痛愈增繼至者又用木香枳榔丸繼又有下以小承氣湯者有下以大承氣湯者十日多脹痛益甚飲食粒不能進大便並不行小水亦僅點滴後醫又以大黃芒硝多服不行謂非白餅子不可服五日而脹痛尤加又謂非備急丸不可服三日脹痛益不可當又用甘遂芫花大戟牽牛之屬服三日不惟大便不行并小便點滴亦無矣脹不可言眾醫大叫稱惟自三月初二日起至是念二日矣有名士王南野者用灸法灸中脘三十餘壯毫不為動因斷其越三日為念五戌時當乘人間迪老四子皆逢掖聞言涕泗時有張太學懷赤者迪老甥也見

予起張思軒夫人疾。喻亟請予。予至。觀其色蒼黑。神藏不露。聲音亮。惟腹大如覆。其不能反側。診其脉。兩手皆滑大。兩尺尤有力。究其受病之源。查其歷服之藥。予駭然以為未聞且見也。因思一治法。先用六君子湯加木香砂仁。參朮俱用二錢。乃傍有錢小松者。自稱家世受醫。見劑爭之。予曰。非若所知也。彼猶喋喋詰予。謂人言中滿者。瀉之於內。大小便不利者。當先利大小便。然歟。予曰。非人言。素問云云也。又云。諸痛不

得用參朮。蒼黑之人。尤忌。先生既知素問。奈何不用通而用塞也。予愀然不答。顧迪老諸子言曰。錢君拘儒常見。何能起尊君病。尊君非中滿鼓脹症內傷症也。當始瀉。猶在上。兩法當用吐。素問云。在上者因而瀉之是也。不用吐而用下藥以傷其脾。脾氣傷則失運動之職。是以愈下愈傷。愈傷愈脹。不思脾氣傷而神不為用。藥不能行。又以峻厲之味益下之。是遵何說也。予因脾傷。故用六君子湯以醒其脾。木香砂仁助

其運動。再用吐法。吐出前藥。予劑非治尊君之病。治諸君藥也。予初欲為諸君諱。何錢君激予。而使暴其短哉。且予不慮大便不行。獨慮行之不止也。錢又謬言。急則治標。今法用盡。不能使一行。何以不止為慮。予曰。君試思。常人能服硝黃幾何。服芫白餅子幾何。今硝黃服過五斤。芫白餅之屬。服過五六兩。又加甘遂牽牛。芫大戟。至悍至急之劑。幸而大便未行。藥性未動。尚可為計。若一行。而諸藥性動。譬觀水痘瀉

其中能蓄點滴哉。危矣。錢又詰迪老。多服下藥而大便不行何也。予曰。此易知之。始為食傷。繼為藥傷。所傷在上中二焦。下元未損。故兩尺脉尚有神氣。難經曰。人有三尺。如樹之有根也。內經曰。腎者胃之關。蓋腎主大便。觀其色蒼黑。神藏氣固。皆由根本未動。賴此猶可為也。服藥後腹中大痛。予知其藥力已動。改用人參蘆防風。蘆升麻。桔梗各三錢。水煎服之。少頃用鷲翎探口中令吐之。前服藥物。一湧而出。十數碗。病者

以手加額曰。目前光矣。此已時也。予曰。酉時大便必行。可預買人參數斤。以備不虞。至午進至寶丹一帖。以溫中氣。未中間腹中汨汨有聲。瀉氣下滾。頃刻間腹寬數寸。至晚大便行一次。小水畧通。予即用人參白朮各五錢。炮姜三錢。茯苓二錢。木香甘草各五分。陳皮一錢。令急煎服。四鼓又大便一次。小水繼至。脹痛漸減。次日大便瀉十次餘。因以前理中湯劑為丸。與煎劑兼補。腹脹全消。飲食漸進。共瀉七十二日。服人參

二斤餘。若人聞以補收功。群然異之。而錢小松始帖然心服曰。奇哉奇哉。人多用攻。孫君獨用補。人多用下。孫君獨用吐。由見之真。而所投者確也。醫可易言哉。今而後。知孫君之高矣。十四清大司馬公嘗有腸風之疾。八月丁祭。學博饒鹿血。食之而血暴下。致予治。用槐角子五錢。黃連根。葭地榆。貫衆各三錢。一服而止。大司馬善其方。書之粘壁間。遇有便血者。輒依方藥之。無不立愈。喜甚。鼓腹謂諸子曰。往而姨之疾。族醫無

不言必死。孫君獨能生之。神哉。進乎。技矣。予曰。昔扁鵲有言。予非能生死人也。此當自生者。故人使之起耳。予何能。亦張安人當自生也。大司馬公由是益重予。病無巨細。悉任之。而予亦得盡其術云。十五

迨老之子鳳林。見予起。乃翁疾。乘間語曰。內子包有隱疾。每月汛行。子戶傍。輟生一腫毒。脹而不痛。過三五日。以銀簪燒紅針破。出白膿。蓋餘而消。不必貼膏藥。而生肉。無疤痕。初間用針刺。近只以指搗之。膿即出。但汛行即發。或上下左右而無定所。第不離子戶也。于今八年。內外科歷治不效。且致不孕。先生學博而思超。幸為籌之。予沈思兩日。而悟曰。此中焦濕痰。隨經水下流。壅於子戶也。經下而痰凝。故化為膿。以原非毒。故不痛。用白螺螄壳。火煨存性。為君。南星半夏為臣。柴胡甘草為佐。麩糊為丸。令早晚服之。未幾劑而汛行不腫。次年生女。

田城公。吳車駕。湯瀾公岳也。年將六旬。為人多

怒多愁胃高舌脹飲食少時醫治以平胃散根
 木丸香砂丸不効復以檳榔三棧或朮之類日
 消之而大便溏瀉兩足跟踝皆浮腫漸及兩手
 背醫又以其手足浮腫而認為黃胖者以針砂
 丸與之腫益加面色黃且黑自二月醫至八月
 身重不能動止又有以水腫治者車駕公雅善
 予因延診之脉沉而濡弱予曰此氣虛中滿症
 也法當溫補兼升提庶清陽升則大便可實濁
 陰降則胃肅自寬以人參白朮各三錢炮姜回

三吳一卷

二

陽陳皮各一錢茯苓黃芪各二錢澤瀉升麻肉
 桂蒼朮防風各七分三十帖而安客有疑而詰
 予曰此症諸家非消導則淡滲而先生獨以溫
 補收功腹中積而為滿為腫者從何道而去也
 予曰脹滿非腫滿比也故治不同腫滿由脾虛
 不能攝水水滲皮膚遍身光腫今脹滿者先因
 中虛以致皮脹外堅中空腹皮脹緊象鼓故俗
 名鼓脹蓋由氣虛以成中滿若氣不虛何中滿
 之有氣虛為本中滿為標是以治法溫補使脾

氣衝運則清濁始分清濁分而脹斯愈也十七
 令令淨涵減公尊堂夫人以季春眉壽連春
 戲文二十餘本且多食魚腥蝦蟹偶發寒熱三
 日不退第四日左耳前後及頰車皆紅腫第五
 日右邊亦腫第六日腫及滿頭紅大如斗眼合
 無縫昏憤不知人事譫語若有邪祟粒米不進
 者八日舉家驚惶逆予為治診其脉六部皆滿
 長而數予曰此大頭疫也即以貫衆石膏各六
 錢紫胡葛根各三錢赤芍藥天荖粉各二錢耳

三吳一卷

二

草一錢黑豆四十九粒水煎服之日進二帖脉
 始減半第九日方進粥飲半盃前藥除石膏又
 四帖而安是役也人皆為予危之謂八十之尊
 年八日之絕粒頭大如斗體熱如燔炭昏憤譫
 語乃不去而治何冥行不知止如此而其婿閔
 懷海亦言病勢如此吾心亦危疑見先生安閑
 而甘寢食賴以少慰予曰此疾為陽明少陽二
 經熱壅而然夫陽明多氣多血之經也以高年
 故不敢用硝黃惟投以輕清解散之劑使因微

14010226 4 4010226 4 3 2:11 PM

汗而解。症脉相對，雖重可生。假如人言以高年病危而棄不治，豈惟非醫之存心，於病家相托之意亦孤矣。可乎哉！十八

丙申夏，見所滿公。謁予於海陽邑。即時靈液，見市水漲。公至，予驚問曰：公貴倨也者，何堪此。公曰：與君間者濶矣。且先君服闋，秋當北上，不卜補任南北。謁求一診，他何計。予究何疾。公曰：無第年甫踰，微覺陽痿。次早診畢，語其隨行俞金二子曰：公脉上盛下虛，上盛為痰，與火下虛

為精元弱。切宜戒色慎怒，劑宜清上補下。不然三年內恐中風不免。蓋由痰生熱，熱生風也。識之。識之。乃為立方別去。公亦未暇製服。公次年八月，往返武林，不無勞怒。又屆中秋，連宵酒色，平常色後，輟用鹿角膠三錢，人參一錢，酒送下。連宵有犯，乃用鹿角膠五錢，人參三錢，空心服之。十七日薄暮，偶與社友談詩，筵間左手陡然顫動，把捉不住。隨歸房，左手重不能舉。十八日早，左邊半體手足皆不為用矣。亟令人逆予。

予適在前坵吳宅，及至公驚，喜交集曰：君何先見若此也。先少保患在左體不遂者三年而歿，不佞今亦左體。其風水致然，故弟先少保年七十餘，不佞四十有七。先少保不能遇先生，不佞賴有先生，或可企無恙也。予始觀面色赤，口微啞，向右唇麻，手足解拽，已成癱瘓。診其脉左弦大，右滑大。先用烏藥順氣散一帖，服後昏睡半日。醒覺面更加赤，啞亦稍加。知痰盛使然，即以二陳湯加全蝎、姜蚕、天麻、黃芩、石菖蒲、紅芍、

尤水煎，臨服加竹瀝一小酒盃，生姜汁五茶匙。一日兩進，晚更與活絡丹。服至第六日，手指稍頭畧能運動，足可倚棹而立。予喜曰：机動矣。改用歸芍六君子湯，加紅芍、鈎藤、天麻、竹瀝、姜汁。服二十帖，行可二十步矣。手指先麻木，不知痛痒。至是能執物，繼用天麻丸，兼服全鹿丸。調理百日，病去十之九。次年二月北上，補任永清。公以病後能戒色，斷酒，自知培養，故藥功獲奏。此症予歷治歷効者，良由先為疏通經絡，活血調

氣然後以補劑收功。惟經絡疏通，宿痰磨去，新痰不生，何疾不瘳。此治類中風之法也。十九

見所公弱冠隨尊君大司馬印老治河居北，患白濁，精淫淫下，自北地山東淮揚鎮江及江右三吳諸名家醫藥三年不効。癸酉冬，禮子診之，其脉兩寸短弱，兩關滑，兩尺洪滑，觀其人襟期瀟灑，出塵而神色閑雅，真翩翩佳公子也。一接見，便就暱而信余請藥。予曰：公疾易愈，第待來春之仲一劑可瘳。而今時不可公固請曰：先生大

三吳一卷

三二

方而善拯人之急，以大方而治小疾，試可立効。何待來年。予曰：非秘其術不售也。素問有云：升降浮沉必順之。又曰：天時不可伐。公脉為溫痰下流症也。經曰：治痰必先理氣，而脉書亦謂洪大而見於尺部者，陽乘於陰也。法當從陰引陽。今冬令為閉藏之候，冬之閉藏，寔為來春發生根本。天人一理，若不顧天時而強用升提之法，是逆天時而洩元氣，根本既竭，來春何以發生。故素問曰：必先歲氣，毋伐天和，必養必和，待其

來復。公疾本小，而歷治三年不効者，良由諸醫不知脉，不識病，不按時也。公聞言唯唯，乃尊君所遣之醫踵接，治竟無効。至春分而逆予，以白螺獅壳、火煨四兩為君，牡蠣二兩為臣，半夏葛根、柴胡、苦參各一兩為佐，黃柏一兩為使，麵糊為丸，名曰端本丸。令早晚服之，不終劑而全愈。公復書曰：賤疾果如先生言，今勿藥也。向歷治三年不効，竊謂天下無藥，服端本丸而愈。又信天下有藥矣。二十

三吳一卷

三三

少司空凌繹老夫人，將適繹老，無幾，腹脹痛發熱，經過期不行者五日，諸醫皆以經期作痛為調，經不効，而繹老召予診。左寸洪滑，兩尺皆滑數。左尺之外，更有神氣。予喜而語繹老曰：經閉非病，孕也。產必男。繹老雅信予，因究其說。予曰：滑非經閉之脉，左尺尤有神氣，是以知產必男也。繹老謂果孕矣，奈發熱腹痛，何。予曰：何傷氣虛血熱耳。以安胎飲，加減調理，即安也。用人參、白朮、白芍藥為君，川芎當歸為臣，香附、柴胡、蘓梗

條芩甘草為佐四帖腹痛減熱除至期果生子
絳老德予而多推轂云 二十一

金文學元岩之眷產後兩日腹痛下痢純紅腸鳴
三越月時當孟秋而脉皆軟弱用佛手散加減
以治川芎三錢當歸五錢艾葉炮姜各一錢桂
心五分酒炒白芍藥二錢連進三帖而疾減半
後因食新菱新粟又連為怒氣所激日晡暈厥
以生姜湯灌甦腹脅大痛手不可近用二陳湯
加香附砂仁桂皮炮姜與之痛亦不減且胃曷
脹甚自以手探喉中吐出菱粟痛稍定以頃復
痛又用手探吐後瀉三四次而元氣脫矣脉
皆散亂如解索狀神氣憊而恍惚循衣摸床病
勢危急用人參白朮各五錢酒炒白芍藥二錢
砂仁炮姜肉桂甘草各一錢急煎進之痛乃稍
定精神清仍瀉二次次日復進前藥痛減瀉止
加白朮又四帖而飲食進精神勃勃興起矣此
因初痢時醫者不以產後為重徒以治痢苦寒
之劑傷其中氣又為菱粟生冷所損中氣益壞

然也治可不慎哉 二十二

沈三石別駕公夫人嚴產三日而腹不暢南潯女
科陳姓者為下之大瀉五六次遂發熱惡心又
用溫膽湯止吐小柴胡退熱服四日熱吐四日
粒米不進亦四日又進八珍湯加童便服後昏
憤耳聾眼合口渴腸鳴眼胞上下及手足皆
有虛浮因逆予治診其六脉皆數時五月初二
日也予曰脉書云數脉所主其邪為熱其症為
虛法當以十全大補湯加炮姜進之夜半稍清
爽進粥一盂始開目言語次日午時以承值者
倦而藥不相接且言語太多復昏昧不知人事
初四日以人參白朮各三錢炮姜茯苓陳皮各
一錢甘草五分煎服訖體微汗遍身痲痺熱退
而神爽下午又藥不接又動怒昏昧復如前六
脉散亂無倫狀如解索痲痺沒而虛極矣亟以
人參白朮各五錢炙甘草炮姜大附子各一錢
連進二帖是夜熱寤唯呼吸之息尚促初六日
脈又數下午發熱不退環跳穴邊發一毒如碗

六紅腫微痛。夫人父嚴翁與陳女科交譜之曰。向之發熱惡心。皆此所致。由附子乾姜溫補誤也。須急用寒涼解毒之劑。予正色而諭以理曰。此乃胃中虛火遊行無制。大虛之症。非毒也。若作毒治而用寒涼。速其死爾。內經云。壯者氣行則愈。怯者着而成病。惟大補庶可萬全。三石翁然予言急煎附子理中湯進之。日夕兩帖。參朮皆用七錢。服後痲痺復出。毒散無踪。熱亦退。沾沾喜矣。復以參朮白朮散調理而全。安皆由產後誤用下藥致變。百出。噫。唏。彼不達變之專科。其可任哉。三十一

語封吳太夫人者。車駕湧瀾公母也。年餘六十。久患白帶。歷治不効。變為白崩。遂予治之。診得右寸滑。左寸短弱。兩尺皆軟弱。予曰。據脈心腎俱不足。而中焦有濕。脈經云。崩中。日久為白帶。漏下多。時骨木枯。今白物下多。氣血日敗。法常燥脾。兼補心腎。以既濟丹補其心腎。以斷下丸燥中宮之濕。則萬全矣。服果不終劑而愈。

既濟丹方 鹿角霜 當歸 白茯苓各二石
 菖蒲 遠志各一兩 龍骨 白石脂各一益
 智仁五錢 乾山藥打糊為丸。梧桐子大。空心白湯下七八十九。
 斷下丸方 頭二番炒三兩 黃荊子兩 海螵蛸去甲 檉根 白皮各一兩 麵糊為丸。下午白湯送下六十九。二十四

吳北海太學令政。每月經行期之前。四肢壘又發塊。紅紫脹痛。不思飲食。胃脘亦常痛。經水多不及期。診其脈兩手皆駛。以症脈忝之。肝脾二經有鬱火也。蓋肝主怒。脾主思。多思多怒。隱而不發。鬱滯於中。故臨經壘又發。經腫於四肢也。以柴胡 川芎 香附 烏藥 白芍藥 青皮 丹參 玄胡索 鬱金 酒炒黃連 山梔子 治之而愈。二十五

吳之清客周芻玉者。豪放不拘。人言有晉人風。酒後益恣。而好男色。因患白濁。吳醫有以補中益氣湯升提者。有以六味地黃丸補陰者。有以五

苓散六一散滲利者有為降火者有為溫補者
不效又以草頭藥亂進之肌瘦如削膝軟如痿
患有年所矣因紹介吳太學北海而謁余懇為
治之診其脉右寸關皆數予曰皆由酒後不檢
所致也中宮多濕多痰積而為熱流於下部故
濁物淫淫而下久不愈矣與以加味端本丸服
之而瘥白螺獅壳四兩牡蠣苦參葛根黃柏各
二兩陳皮半夏茯苓各一兩甘草五錢麵糊為
丸令早晚白湯下三錢

二十六

丁酉夏予寓雒城顧鄉官宅其門下竹匠婦懷妊
五月而患心痛究其所由起謂由失足墜樓也
始教飲韭菜汁一盞而痛隨止其夫又從它醫
贈藥二帖歸令煎服服既心復痛吐鮮血盈盆
胃間冲又上抵疼不可言危在頃刻竹匠告急
予僕孫安安怡之懇予診治六脉皆洪大汗出
如雨喘息不相續其婦樓居低小予令亟移居
樓下隨與益元散五錢令用紫蘊湯調服又囑
之曰今夜若睡聽其自醒切勿驚動汗止即避

也服後果睡至曉汗欬而胃鬲不痛喘息亦定
再與固胎飲一帖後服而全安矣先是鄰醫診
其脉謂吐血之脉宜沉細今反洪大而汗出喘
息不休危在今夜及病起來詢余曰姪嬪不得
汗不得下不得利小便是謂三禁昨日之劑悉
犯之而反獲效何哉予曰醫貴審症蓋嬪之患
非由病汗以樓居低小當酷暑而熱逼故也汗
血去而胎失養故冲冲上拒喘息不續移樓下
以避暑氣益元散為解暑之聖藥而紫蘊又安

胎下氣之妙品氣下則血歸原而病痊矣此對
症之藥法出王海藏醫壘元戎中四血飲是也
特諸君檢閱不徧即檢閱亦不知為胎產之治
余何能不過融會前人之法用之而不膠焉耳
鄰醫倪首唯唯而退

二十七

壬申秋仲予東遊攜李而王松泉吳小峯偕行小
峰語予中秋至矣此間一妓李姓者行第七殊
可人意須訪之晚令佐酒至則見其態度果澹
雅風致坐少頃運琴兩聲小峰究其病曰偶耳

小峰謂母誑。孫公知人生死。不啻扁鵲。可求一
 診。診之。兩寸短滿。兩尺洪滑。關絃。予未語而小
 峰問脈。予曰。脈甚怪。公可問經行否。曰。行僅一
 日。亦僅點滴。予曰。此脈在良家。主夢遺。若不宜
 有也。妓曰。良然。即御客時。亦或遺。遺則冷汗濕
 淫。體倦而不能支。小峰為請藥。予曰。姑置之。小
 峰問何故。予曰。金木相勝。心神無主。法當不瀆。
 小峰謂人尚無恙。何得便至於此。予曰。絃為春
 令。當金旺之時。猶然猖獗。設在卯月。木旺火相
 肺金枯。痿水之上源已竭。且腎脈洪滑。妓以慾
 勝。陰血既虧。淫火愈熾。書云。陰虛則病。陰絕則
 死。今已咳嗽。其兆見矣。可治乎。次年二月果死。
 二十八

有老妓金姓者。其嫂三月患頭痛。身熱口渴。水瀉
 不止。身重不能反側。日漸昏沉。耳聾眼合。夢多
 亂語。嘉秀醫者。歷試不效。視為必死。予適吳江
 歸。便道過橋李。訪南溪吉泉二兄。吉泉兄以是
 症見詢。且言諸醫有以補中益氣湯進者。有以

附子理中湯進者。二藥已煎成。未服。幸弟至。乞
 為診之。六脈洪大。觀其色。內紅外黑。口唇乾燥。
 舌心黑胎。不知人事。予曰。此瘵也。法當清解。
 急以小白湯進之。猶可生也。若附子理中湯。殺
 之耳。安可用。南溪兄問小白何湯也。予曰。小柴
 胡。白虎湯。合而一之是也。南溪兄謂漢漢齊。况
 如此。恐石膏不可用也。予曰。此挾熱下利。但使
 清陽上升。則瀉止熱退。而神氣自清也。服訖。夜
 半神氣甦醒。惟小水不利。熱渴不退。予思仲景
 法。謂渴而身熱不退。小水不利者。當利其小便。
 乃以辰砂六一散一兩。燈心湯調服之。兩帖而
 瘵。南溪兄曰。死生信乎命也。弟頃刻不至。必服
 理中湯。此婦不為泉下人哉。二十九

有曾姓諱鏗者。九月重陽。以胃滿不舒暢。而謁南
 溪兄為治。診未竟。予至。南溪兄起語。曹曰。舍弟
 高手。說診之。診訖。未有言。而南溪私問曰。曹何
 如脈。予曰。不治。會易貨者。皆至予。亦別去。曹果
 次年二月死。南溪兄問曰。向曹無它病。而弟見

脉即斷不治何也。予曰：其脉兩寸洪滑搏指，兩
關微絃，兩尺微弱，難經所謂溢脉也。九月深秋
木彫零時也，不宜絃大，大則上盛下虛，至二月
木旺，木能生火，火水性皆上升不下，下無真陰
以相濟，是有陽無陰，有升無降。內經曰：出入廢
則神机化滅，升降息則氣力孤危，是以斷曹子
二月當嘔吐而死也。三十

嘉善之妓李雙號素琴，體雖肥而性冲澹，態度閒
雅，端重歌調，倡家推其擅場。與予邑程芹溪屬

三吳一卷

厚，患痛風自二月起，至仲冬，諸治不効，搗母
毒，遂視為痼疾，不為治。而芹溪固懇予診之。六
脉大而無力，手足肢節腫痛，兩跨亦痛，不能起
止。肌肉消其半，日僅進粥二椀，月汛兩月一行，
甚少。予曰：此行痺也。芹溪問病可治否，予笑而
應曰：君能娶，予能治之。芹溪曰：嫁娶乃風月中
套語，公長者，乃亦此言。予曰：觀此子雖望風塵，
寔有良家風度。予遂許之。芹溪曰：君何以
有心於君，或天緣也。

高其價而難與言。予謂求其病而盟之，易與耳。
芹溪以予言為然，乞為治之。以人參、白朮、苡仁
各三錢，當歸、枸杞、杜仲、龜板、蒼耳子各二錢，晚
香、沙、秦、羌、防風各一錢，大附子、甘草、桂枝、黃柏
各五分，十帖而痛止，腫消。改用歸芍六君子加
苡仁、丹參、紅朮、石斛、紫荊皮三十帖而全愈。芹
溪娶之，善持家，舉族稱賢，而亦羨予知人焉。三十一

三吳一卷

沈別駕翁有老僕，頭痛遍身骨節痛，面色黑，發熱
口渴，胃高膨脹，飲食七日不入，復感寒，人皆危
之。予診其脉，左絃數，右洪大，以藿香、蒼朮、防風
葛根、白芷、紫蘊、甘草、陳皮、大腹皮、麦芽、枳實、服
後，胃高稍寬，熱與痛更甚，改以麻黃、葛根、紫胡
各二錢，石膏、滑石各三錢，紫蘊、葉白芷、蒼朮各
一錢，甘草五分，姜三片，服後大汗出而熱痛皆
除，惟口渴，又以白芍、藥、當歸、石膏、知母、柴胡、黃
芩、麥冬、葛根、陳皮煎服，全愈。別駕翁喜，詰予曰：
老僕病甚重，無不謂其必死，先生三日起之。

何症而何湯劑飲之使起也。予曰：此三陽合病，先為飲食所傷，予故先用藿香正氣湯加消導之劑治其本，又以六神通解散加助表之藥治其標。病雖重，年雖高，喜其色，脈相對，故投以對症之藥，易愈也。翁曰：在先生然耳。若它人，輕者且重，况重者乎？吾未見其能起也。三十二

蔡中林文學內人發熱口渴，舌上燥裂，小腹痛，嘔吐，藥食不能入者七日。諸醫之技殫矣，皆視為兩食而不可為。吳我峰翁固邀予診。右寸脈絕

不應，指關沉滑有力。左手絃數。予曰：此陽明少陽合病，邪熱壅於上焦也。非兩食法當解散。數劑可愈，無恐。以軟柴胡石膏各五錢，半夏麩枳實黃芩黃連葛根竹茹人參各二錢，姜三片煎服。藥納而不吐。五更下黑糞數塊，熱痛減半。次日仍與前藥，右寸脈至是亦起，邪始進。改用小柴胡加橘紅竹茹葛根服三帖而全安。三十

吳九宜先生每早晨腹痛洩瀉者半年，糞色青，腹

膨脹人皆認為脾胃洩也。為矣，閱元三十壯服補脾腎之藥皆不效。自亦知醫，謂其尺寸俱無脈，惟兩關沉滑。大以為憂，以人言洩久而六脈將絕也。予為診之曰：君無憂此。中焦食積痰滯也。積膠於中，故尺寸脈隱伏不見。法當下去其積，諸公用補謬矣。渠謂敢下耶？予曰：何傷？素問云：有故無殞，亦無殞也。若不乘時，久則元氣愈弱，再下難矣。以丹溪保和丸二錢加倍急丸三粒，五更服之。已刻下稠積半桶，脹痛隨愈。次日

六脈齊見。再以東垣木香化滯湯調理而安。渠稱謝言曰：人皆謂六脈將絕為虛極，公獨見之真，而下之由公究理深遠，故見之行事著之談論，皆自理學中來。它人何敢望其後塵。三十四
沈大官左膝腫痛不能起止者半年，大便瀉一日三次。診其脈絃緊。予曰：此脾虛有濕熱凝於經絡，流於下部也。古謂腫屬濕，痛屬火。用蒼朮黃柏意以仁為君，澤瀉猪苓五加皮為臣，炙甘草防風桂枝為佐，木通為使，四帖痛減，腫消，洩瀉

亦止改用蒼朮蒼耳子五加皮苡仁當歸枸杞
子杜仲丹參黃柏烏藥葉酒糊為丸調理月餘
步履如故三十五

沈繼庵先生下痢十二日腹痛脫肛後重噯氣不
知飢一友用補中益氣加白芍藥腹痛愈加後
重亦甚予脈之右關滑大搏指曰此積滯固結
腸胃間故後重脫肛也當為推蕩以其素弱多
鬱不敢只為調氣而兼消導木香山查枳榔枳
實川芎白芍藥黃連黃芩秦艽服後稍寬次日

用七傷丸二帖全愈○其內人患發熱頭痛遍
身痛乾嘔口渴胃高脹悶坐卧不安醫與以參
蘓飲乾嘔愈甚又加煩躁予診之右手洪大倍
於左左浮數予曰乾霍亂症也與以藿香正氣
散減去白朮桔梗加白扁豆香薷一帖吐止食
進遍身痛除惟口渴額痛未除小水不利以石
膏香薷滑石各五錢橘紅藿香葛根各二錢枳
榔木瓜各一錢甘草五分三十一而愈三
十六

晴岳先生五更耳鳴腹不舒暢稍勞則烘然熱
自汗脈右關滑大有力左脈和緩原為當風睡
卧而得素來上焦有痰火午後過勞或受餓大
作眩暈冷汗津津再不敢動稍動則嘔吐此皆
痰火所致蓋無痰不作暈也先與藿香正氣散
一帖以去表裏之邪繼與溫膽湯加天麻服後
眩暈嘔吐皆止次日診之右關脈仍滑此中積
食積痰飲惡固已久卒難動搖姑以二陳湯加
枳實黃連滑石天冬粉天麻竹茹調理後以當

歸龍會丸加牛胆南星青礞石凡數帖全愈三
十七
潘景宇內人後半夜不睡面黃肌瘦兩太陽及眉
稜骨痛大便糖稍勞動則體熱四肢無力其脈
左寸洪滑自春至秋皆然此由脾虛肝心二經
火盛然也先用四君子加酒連柴胡白扁豆澤
瀉滑石調理夜與錢仲陽安神丸數粒燈心湯
送下服八日得睡兩太陽亦不痛繼用六君子
加黃芪秦艽柴胡澤瀉當歸白芍藥黃柏全愈

二十一

六老上吐血下瀉血胃滿背心皆脹原從怒觸
又犬肉所傷故發熱而渴醫者皆作陰虛火動
而為滋陰降火胃背愈脹血來更多予診之而
關俱洪滑有力謂曰此肝脾二經有餘症也作
陰虛治左矣內經曰怒傷肝甚則嘔血并下泄
胃背脹痛瘀血使然脾為大肉所傷故不能統
血今誤用地黃麥冬黃柏知母等劑是以脾益
傷而上焦瘀血愈滯也惟調氣健脾兼之消導

則萬全矣六老曰人皆謂勞怯故發熱吐紅血
上吐陽絡傷也血下行陰絡傷也陰陽俱傷法
當不治公獨認非陰虛何也予曰脉書云脉數
無力者陰虛也今脉固非陰虛書又曰凡陰虛
之熱發於申酉戌間夜半而退明日猶是如潮
信然以下午乃陰分主事故曰陰虛潮熱也今
熱不分晝夜而症亦非陰虛故曰作陰虛治者
左也六老聞言大喜曰公誠見垣一方者幸患
一七以生之即與山查香附枳實調氣消導為

君丹參丹皮桃仁滑石茅根化痰血為目黃連
蘆根解犬肉之熱為佐四帖胃背寬血吐止惟
腹中不舒仍以前藥同丹溪保和丸與之四帖
大便下極臭黑糞半桶寢食俱安矣三十九
有城氏之婦原以有痰火服降火之藥過多至秋
痰積因令氣下行而滯於大腸臍邊有硬塊按
之甚痛前下紅白八日下惟點滴日夜二十餘
行腹痛潮熱口渴小水不利大便裏急後重飲
食不進刻重不能轉側予診之喜左脉皆有神

氣即從割守真之法行血則便膿自愈調氣則
後重自除治之用白芍藥滑石桃仁為君當歸
為臣木香枳榔山查酒芍酒連枳壳為佐服下
大便稍流利腹中稍寬舒次日仍與前藥則滯
下大行痢減大半第三日用芍藥當歸滑石桃
仁炙甘草酒連木香與保和丸全服下午大便
行上午所服丸藥隨糞而下乃知積滯已盡諸
症悉減惟臍邊積未全止以仲景小建中湯加
當歸木香服之而愈

丁耀川文學令堂年四十四常患胃脘痛孀居十
五年日茹蔬素其年七月觸於怒吐血梳許不
數日平矣九月又怒而吐血如前加腹痛至次
年二月忽裏急後重肛門大疼小便短澀出惟
點滴痛不可言腰與小腹之熱如滾湯浥者日
惟仰卧不能側一側則左跨并腿作痛兩跨原
有痛小便疼則肛門之痛減肛門疼則小便之
痛亦減肛門以疼之故不能坐遇驚恐則下愈
墜而疼經不行者兩月往常經來時腰腹必痛

下紫黑血塊甚多今又白帶如注口渴通宵不
寐不思飲食多怒面與手足發虛浮喉中梗梗
有痰肌肉半消診之脉僅四至兩寸軟弱右關
滑左關絃兩尺濡據脉上焦氣血不足中焦有
痰下焦氣凝血滯而為火蓋下焦之疾肝腎
所攝腰跨肝之所經而二便乃腎之所主也據
症面與手足虛浮則脾氣甚弱飲食不思則胃
氣不充不寐由過於憂思慮而心血不足總
為七情所傷也

予得之則不月此病近之且值火令當權之候
誠可慮也所幸者脉尚不數聲音清亮尤可措
手因先為開鬱清熱調達肝氣保過夏令後再
為驟補陰血必戒絕怒氣使血得循經而病可
痊不然則倉扁亦難奏功矣初投當歸龍會丸
以徹下部之熱繼以四物湯龍胆草黃柏知母
柴胡澤蘭葉煎吞滋腎丸連服四日腰與小腹
之熱始退後以香薷石膏龍胆草挑仁滑石杜
牛膝甘草梢軟柴胡煎吞滋腎丸大小便痛全
減四十一

丁文學長令姊常患暈厥吐痰梳許乃甦一月三
五發後又口渴五更側飽腸鳴腹疼洩瀉小水
短澀咳嗽余脉之兩寸濡弱兩關滑大此中焦
痰積所致也先與二陳湯加蒼朮山查麥芽以
健脾去濕為臣以白芍藥止痛為君以滑石澤
瀉引濕熱從小便出為佐黃芩為禪佐卜帖二
陰之痛俱止改以六味地黃丸加黃柏知母牛
膝服之全安四十二

金良美者年十八。患咳嗽吐紅。下午潮熱。夢遺。市醫進四物湯。加天麥門冬。黃柏知母之類。治半年。反加左脅脹疼。不能側卧。聲音漸啞。飲食輒惡心。肌肉大削。六脉俱數。醫告枝窮。因就予治。觀其面色白。又隱隱有青氣。夾之。兩足痿弱。無力。予語之曰。此症氣虛血熱。而肝脉甚絃。絃則木氣太旺。脾土受虧。不能統血。殆始怒氣所觸。繼為寒涼之劑所傷。以致飲食惡心。肌肉瘦削。書云。脾胃一虛。肺氣先絕。以肺金不足。則肝

三長一

五二

木愈不能制濁痰。痰血凝於肺。竅故咳嗽聲啞。滯於肝。故左脇不能貼席。而卧病勢危矣。喜在青年。猶可措手。因急用人參二錢。鱉甲五錢。為君。白朮白芍陳皮茯苓通草貝母各一錢。為臣。甘草牡丹皮各七分。為佐。桔梗五分。為使。二十帖。潮熱止。咳嗽減大半。三十帖。聲音開。左脇亦能貼席。而卧。後以大造丸調理全安矣。乃囑之曰。病愈雖可喜。而絃脉未退。須切忌怒氣及勞心勞力之事。庶幾可保。予不守予言而

勞怒相觸。血來必不能禦。戒之防之。此後精神日王。肌體豐肥。六年無事。一日遇事拂意。大怒。而又結算勞心。則血如泉湧。頃刻盈盆。上唇黑腫。汗出淋漓。急請予診。脉亂無倫。診畢。渠語近侍。欲大解。予曰。此死徵也。陰陽乖離矣。辭而出。未離門而氣絕。父母哭謝。予曰。始守翁訓。苟活六年。一旦不戒。遂如翁所料。先生雖命亦不自慎。致之。其為人也。量窄而繁於財。因記此以戒世之重財輕生者。四十三

三長一

五二

倪五娘子。以中風暈厥之後。口眼歪邪。左脚右手不能屈伸。口渴。小便不利。兩頰紫。出語艱澁。問之。則期期而對。不問默然。亦不思飲食。行年五十矣。諸醫不效。予治始與涼膈散。加石菖蒲。遠志。煎湯化錢氏安神丸。二顆服之。其夜大便四行。次日神氣遂清。口眼半正。惟車顛尚重。未能開聲。細察形氣。似弱也。即與六君子湯。加麥門冬。滑石。天荅粉。石菖蒲。遠志。當歸。薄荷。服後神思大清。真能自坐。不須人扶。語言亦稍利。故以

六君子湯加麥冬天荖粉石菖蒲當歸五加皮
薏苡仁紅荖天麻十帖全愈矣四十四

王祖泉令政患頭疼夜熱洒淅惡寒汗淋漓如兩
上身熱下身寒渴不思飲遍身疼腹有一塊大
如拳硬如石腸鳴小水短少飲食俱廢脉則右
關消左絃數究所由起謂大怒後即傷於食市
醫皆以地黃門冬苓連黃柏之劑治之熱愈甚
脾氣大虛予治用平胃散加山查麥芽砂仁香
附木香川芎枳實連進四帖中氣稍能運動而

五十五

五

夜熱如前再與補中益氣湯寒熱俱退矣而腹
痛裏急後重予知其積滯將行也乃與白六神
丸而腹痛後重皆除改進以參苓白朮散加香
附烏梅山查服之病良已四十五

溫巽橋子婦吳車駕湯瀾公長女也發熱惡心小
腹痛原為怒後進食因而成積左腳酸痛已十
日矣南潯有陳女科始作瘟疫療治嘔噦益加
又作瘡治粒米不能進變為滯下裏急後重一
日夜三十餘行陳技窮而辭去且言曰非不盡

五十六

五

心犯逆症也下痢身涼者生身熱者死脉沉細
者生洪大者死今身熱脉大而又噤口何可為
哉因請予治脉之兩手皆滑大尺部尤搏指予
曰症非逆誤認為疫為瘡治者逆也雖多日不
食而尺脉搏指內經云在下者引而竭之法從
下可生也即與當歸龍會丸一錢五分服下去
稠積半盆痛減大半不食者十四日至此始進
粥一甌但胃高仍飽悶不知餓又與紅六神丸
二錢胃高舒而小腹軟惟兩跨痛小腹覺冷用
熱磚熨之予戶中白物綿又下小水短滿改用
五苓散加白芷小茴香白鶴冠荖柴胡服之至
夜滿腹作寒遂以五靈脂醋炒為末酒糊為丸
三錢白湯送下通宵安寢次日精神清健飲食
大進小水通利矣而獨白物仍下再用香附炒
黑存性枯礬各一兩麵糊為丸每空心益母草
煎湯送下二錢不終劑而白物無病全愈矣專
科報然稱奇而服錄其案驗而去四十六

溫一渠內人平素血虛咳嗽近為飲食所傷不知

飢餓專科作陰虛治。而胃馬愈脹。早脉之右關
 滑大。左手軟弱。法當先健脾胃。消去飲食。然後治
 嗽。若為滋陰降火。不惟哮喘無功。恐脾胃轉傷。
 腹脹滿。變將不測何也。脾胃喜溫而惡寒也。
 即以二陳湯加山查。麥芽。枳實。白朮。川芎。香附
 與之。一劑而胃馬寬。再劑而飲食進。繼用桑白
 皮。地骨皮。甘草。陳皮。貝母。瓜蒌仁。馬兜鈴。桔梗。
 紫菀。十帖而咳嗽脫然。表四十七

溫異橋二令。總產後五十餘日。右脇脹痛。手不可
 近。赤白帶多。下如膿。醫者大便秘結。予曰。此惡
 露未盡。血化。胎脹。治宜急也。嘗見數婦有此
 病。而不識治。積而成毒。有或腸瘕者。有內成腫
 毒。潰從腰。命出者。皆以不知治法。則瘀血無從
 出故也。急用澤蘭。葉山查。子丑靈脂。消惡露。為
 君。川芎。當歸。茯苓。白芷。為臣。益母草。為佐。青皮
 青皮為使。外與當歸。龍骨。先潤大便。使熱候大
 便去。服後次日。腹脇皆寬。惡露亦盡止。又因食
 與鷄子。復作疼。但不如前。其腫瘕。係物。結。...

山查煎湯送下三錢而痛愈矣。四十八
 溫天衢氏。冬月病。醫為發散太過。至春間吐血
 枕餘。及夏下午潮熱。咳嗽。胃馬脹疼。早晨冷汗
 淋漓。大便澹。一日兩行。飲食少。肌肉消十之七。
 脉數。據症脉法。在不治里中。諸長老以其素行
 端厚。群然懇予措劑。予以衆懇不能辭。乃用瀉
 白散加五味子。白芍藥。貝母。馬兜鈴。服下。其夜
 帖然而卧。不嗽。惟大便澹。前藥加白扁豆。山藥
 茯苓。汗亦漸止。復與瀉白散加石斛。馬兜鈴。貝
 母。陳皮。薏苡仁。白芍藥。山藥。五味子。桔梗。調理
 三月而全。四十九

張二娘子。妊七月而嘔吐不止。氣壅咳嗽。胃與兩
 脇皆脹。不能伏枕。予先與金苓丸二服。以止吐
 服下。五應。繼與大腹皮。陳皮。枳殼。半夏。甘草。竹
 茹。茯苓。旋覆。卷前。胡椒。死黃。參。生薑。服二帖。氣
 平。軟止。安然睡矣。五十
 金苓丸者。雄黃一錢五分。半夏一兩。枳殼二
 錢。姜汁浸。蒸餅。糊。為丸。是也。

三 崇泉內春患痰嗽腹飽脹洩瀉腸鳴裏急後重
發熱口臭之氣如火塞以六君子湯加山查表
芽柴胡秦艽青蒿白芍藥益智仁與香連元氣
服兩劑氣舒嗽減大便結實鼻仍塞前方加川
芎減白芍藥而安五十一

溫南溪內人居常大便秘結面赤不思飲食頭時
眩暈診其脉右關尺滑大有力此痰火症也用
瓜蒌四錢為君滑石三錢枳實二錢半夏一錢
半為臣蘿蔔子姜黃各一錢為佐兩帖愈矣又

教以或遇大便秘結每服當歸龍會丸加牛胆
南星一錢立應五十二

陳春野孝廉二令愛患丁癸疝痢四肢浮腫以布
袋丸與大安丸同服則大瀉用參苓白朮散加
澤瀉山查麦芽瀉亦不止神氣大弱穀粒不入
口小便不利大便一日仍三五次積滯未除改
以參苓白朮散加肉蓯與服瀉稍止食粥一盞
下午因食紅棗數枚夜分痰忽起其勢甚危急
與藕合丸服之而愈五十三

蒲菴香妃姜向菓調理全安五十三

婦敬坐令媳原因經水不行醫投安胎之劑越七
月經水忽大行內有血塊筋膜如手大者一二
桶昏胃困憊為劇遂手治其脉右關洪滑左寸
洪數兩尺皆洪大病形夜分咬牙亂語手心熱
口噤時手足皆冷心頭脹悶不快面色青始諸
醫皆謂難治予曰無恐此濁痰流滯血海以誤
服安胎之劑益加其滯夫血去多故神魂無依
痰迷心竅故神昏語亂急為調氣開痰安神養

血可生也即以溫膽湯加石菖蒲酒芩天麻酸
棗仁丹參與服其夜子丑時咬牙亂語皆減半
次日仍與前藥每帖加竹茹五錢臨睡又與黑
虎丹數粒諸症悉去而愈敬坐問曰藉高乎病
痊矣而每發於夜半何也予曰此心包絡與膽
經有痰熱故每至其時而發單治此兩經痰既
消而神魂俱安也敬坐曰善五十四
上合藥懷赤每早晨腸鳴瀉一二度晚間瀉一度
年四十二且未有子予診之尺寸短弱右關滑

大子謂此中焦有濕痰。君相二火皆不足。故有此症。以六君子湯加破故紙。桂心。益智仁。肉苁蓉。菟煎服。瀉遂減半。又以前藥加杜仲為丸。服之而愈。次年生子。五十五。

臧七房二老夫人。年六十八。患痢。痢後過食熱羹。與腐湯。以致大便滑洩不固。飲湯水徑直下不停。胃高舌悶。語言無力。舌乾口燥。生瘡。噤津液。則喉疼。元氣大虛而熱。皆虛火所致。且長素二十餘年。又常痢後。益知非有餘之症也。脉又尺寸俱弱。兩關滑大。內經云。清氣在下。必生飧泄。濁氣在上。必生脹。此之謂也。法當提清降濁。補助元氣。用四君子湯加葛根。白芍藥。黃連。清

虛熱。止燥渴為君。桔梗。輔佐。葛根。升提清氣為臣。陳皮。麥芽。降其濁氣。以清胃高。否悶為佐。加烏梅為使。上使生津。下使止濁。連服二劑。尺寸之脉稍起。飲食亦得停腹。駸駸始有生氣。仍以前方加白扁豆。神麩打糊為丸。調理而安。五十六。

茶葉川令者。患頭痛。痛如物破。髮根稍動則痛。延滿頭。暈倒不省人事。踰半時乃甦。遍身亦作疼。胃高飽悶。飲湯水停高間不下。先一日吐清水數次。細虫三條。原山怒起。今或惡風或惡熱。口或渴或不渴。大便秘。脉則六部皆滑大有力。予曰。此痰厥頭痛症也。先以藿香正氣散止其吐。繼以牛黃丸。黑虎丹。清其人事。頭仍疼甚。又以天麻葉本各三錢。半夏二錢。陳皮白芷。薄荷麻黃。生薑葱白煎服。得少汗而頭痛少止。至晚再

服之。五更痛止大半。而人事未全清。予謂此中焦痰盛非下不可。乃用半夏五錢。巴霜一分。麩糊為丸。每服三十丸。生薑湯送下。下午大便秘。三次。皆稠粘痰積也。由此飲食少進。餘症差可。惟遍身仍畧疼。改用二陳湯加前胡石膏。葉本薄荷。枳壳。黃芩。石菖蒲。調理而安。五十七。
同薑汀乃卷。患胃脘痛。手心熱。嘔吐不食者四日。晝夜叫痛不輟聲。脉則兩手皆滑數。予謂當以清熱止痛為先。故先與清熱止痛末藥二錢。令

服之不一飯頃痛遂止而睡家人皆色喜予曰
 幸也此火暫息耳其中痰積甚固不乘時而下
 之勢必再作因與總管丸三錢服下腹中微痛
 再服二錢又睡至天明乃寤而腹痛亦止大便
 下痰積甚多次日以二陳湯加枳實姜黃香附
 山梔黃連與之服後胃脘之痛全止惟小腹畧
 覺膨脹予謂其痰積未盡也再與總管丸三錢
 夜服之天明又行一次痰積之下如前而胃脘
 之痛亦絕不發矣五十八

醫案三吳治驗二卷目錄

王文川令郎內傷發黃一有吐瀉

施涇陽先生內人痰火二

屠侍軒尊眷產昏憤不知人事五

屠學恒廼眷產後作瀉四

周鑑泉令政傷寒譫語五

臧頤耆老先生西耳掀痒六

王南崗咳嗽氣湧七

張桃津廼政小產後臍下痛八

陳光祿五更胸膈飽脹九

溧水令君夫人五更倒飽洩瀉十

李悅三夫人腹痛譫語如狂鼻衄十一

吳仲峰脾洩十二

張後溪令孫瘡疥發腫十三

張五橋夫人喘嗽十四

方東塾脊骨痛牽引胸腹皆痛十五

朱淨宇發熱腹痛洩瀉嘔吐十六

朱近川胃脘痛十七

文川公肛生一毒膿潰不收口 十八

李古愚胸膈飽悶大便溏泄 十九

姚惠全夜多洩瀉 二十

姚老夫人右手疼 二十一

一僕時疫頭痛發熱 二十二

一僕時疫頭痛如破 二十三

一僕時疫嘔吐煩躁口渴 二十四

馬鳳陽咳嗽內熱 二十五

倪二南內人小水不禁 二十六

嚴柱史令媳腹中有塊疼痛 二十七

陳鹿塘脹風臟毒大便燥結 二十八

張道南內人腹痛 二十九

張道南尊堂高上痰飲痞而惡 三十

馬迪庵內人奇痰症 三十一

董老夫人眩暈 三十二

張裕全惡寒發呃 三十三

嚴老夫人胸膈痞悶 三十四

王谷泉頭眩洩瀉汗出不止 三十五

方東莖兩脇痛 三十六

一婦懷孕內熱咳嗽 三十七

一婦心痛唇紅血症 三十八

倪二南內人小產小腹疼痛暈厥 三十九

倪少南右頰車浮腫疼痛 四十

倪少南內人經行如崩頭暈 四十一

高仰山內痔血裏急後重 四十二

姚娘子小腹疼 四十三

張五橋先生令政痰喘咳嗽 四十四

徐文學三泉令郎右脇脹痛 四十五

王祖泉乃眷遍身痛 四十六

費少垣乃眷孕痰喘胎逆 四十七

費一吾令政孕子淋 四十八

六娘子遍身痛汗大出昏昏如醉 四十九

八娘子頭痛咳嗽痰多有血 五十

姚娘子內人胸脇痛 五十一

三娘葉令子室咳嗽心痛腰疼 五十二

姚娘子咯血痰火作痞 五十三

張分守腰膝痠痛 五十三

鄭春元頭痛內熱 五十四

徐老夫人胸膈痞悶 五十五

張麗川咳嗽多痰糞門發癢 五十六

陳仰山內人小產二月而血大下 五十七

張溪亭乃春喉中梗梗有肉如炙燻 五十八

張溪亭令媳憂亡過祖母打其背 五十九

陳茂之勞倦色慾傷寒 六十

陳五山胃脘痛 六十一

吳小峰酒積作痛 六十二

沈大叅痰飲痞滿 六十三

王敬泉胸膈飽悶頭暈作吐 六十四

張二官傷寒 六十五

大司馬令媳產後暈厥發狂 六十六

李廉減茗泉瘡後作痢 六十七

包繼可先生令眷孕而發瘡 六十八

吳比郵公子病眼 六十九

太守令侄筋痿 七十

一書辦下泄 七十一

韓金憲令媳怒後夜卧不安 七十二

歸老夫人夜采臍腹痛甚 七十三

丁春元令即瘡母 七十四

孫令君令媳產後謔語發熱洩瀉 七十五

吳來星先生楊梅風毒 七十六

潘見所老先生小盛介疳積 七十七

凌絳翁瘵火吐紅喘嗽 七十八

周鳳亭濕熱壅滯發熱煩躁 七十九

周采石濕熱生痰痞悶 八十

又令孫女龜背 八十一

閔蜃樓虛損咳嗽令眷痛風奇疾 八十二

金寄間令堂痢而胸膈膨脹 八十三

徐中宇之婦汗出如兩昏又憤又胸膈要人足端

金達泉令政孕三月而痢赤白 八十五

金元岩赤白痢 八十六

金達泉瘡痢交作 八十七

金寄間少陽陽明合病為瘡 八十八

淮陰胡少身令即憂遺令愛發熱咳嗽又友人奇

疾八十九

吳氏婦隱疾九十有發明

染匠之婦腸瘕九十一

王祖泉臟毒下血九十二

醫案二卷

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人余煌

子

泰來

朋來

全閔梓

三吳治驗

王文川令郎原傷飲食又傷於冷羹等物遍身發黃眼如金色夜發熱天明則退腹痛手不可近號叫通寶市醫因其黃而曰胡首真矣衆議以

草頭藥進予至急止之曰何以草藥幾誤其母後欲誤其子乎蓋脾胃喜溫惡寒且此症乃食積釀成而黃為濕熱所致法當健脾胃用溫暖之劑下之濕熱去而黃自退草頭藥性多寒用之是損脾胃而益其疾也可用哉即以保和丸一錢入備急丸五分作一次服之少頃瀉一次又少頃瀉下三次積物所下甚多腹痛盡止再與調中丸服一月不但一身之黃盡退而步履輕捷如飛其父喜曰神不誤我問曰始議進

草頭藥者十九而孫君獨叱其非余不能決而
決於神神允孫君服果有效而吳我峰小樓等
曰亦孫君之藥神爾設無孫君神雖靈何所顯
哉衆拊掌而嘖

施涇陽先生內人年五十八左脇有痞癥必升全
咽間即脹悶不知人事遍身皆脹不能卧小水
赤診其脈兩寸關洪滑六部皆數予謂此痰火
症也痰生熱熱生風故每發人事不知爾乃與
牛黃清心涼血丸同黑虎丹服之夜遂得睡人

事亦安靜再以二陳湯加滑石竹茹鬱金薄荷

黃芩前胡加燈心生姜煎服全安矣

屠侍軒尊眷產一日而觸於怒大便溲瀉昏憤不
省人事大熱氣促汗多衆醫謂產後淋不宜太
令脈大而左手且散亂又汗出喘促法在不治
予曰固然書云醫而不起者有矣未有不藥而
起者也且不藥而視其死與藥而或可圖生者
熱優予試之亟與人參五錢白朮三錢炙甘草
一錢五分炮姜二錢肉蓯六分五味子七分煎

服其夜遂稍睡予竊喜補而得睡其陰陽和表
次早脈果稍收飲喘促亦緩大便前半夜瀉三
次五更嘔粥半盂小便通利大有生意也再以
人參阿膠固元氣定喘為君白朮炮姜補脾為
臣澤蘭葉退產後之熱五味子欽神止汗肉蓯
止瀉為佐甘草和中為使五帖而安

屠學恒先生乃眷以產後欠補養而精神疲困脾
胃亦弱腹中間作痛作瀉脈兩手皆濡軟無力
以六君子湯加藿香砂仁香附蒼朮澤瀉調理
而安

周鑑泉令政病傷寒發熱譫語口渴咳嗽胃高痛
瀉瀉嘔吐遍身發斑診之六脈洪滑予曰此必
陽陽明合病之症勢亦重矣急以升麻葛根湯
加滑石五味子進之服後汗大出下午即退涼
而譫語止晚進紫苓湯加五味子滑石其夜瀉
止神思始清次日左脈已和右脈亦有收欽予
喜曰可無恙也改用白芍藥為君陳皮紫胡酒
苓五味子牡蠣滑石茯苓澤瀉白朮

痊可。五

大國博臧顧渚先生病兩耳掀痒唇燥舌乾咳嗽吐濃痰脉左稍浮弦右洪滑此胃中痰火流入肺經鬱積久而生熱生風也先以總管丸導其痰又與黑虎丹祛其風熱繼以天荖粉薄荷鬱金葛根白桑子甘草黃連連翹蟬退煎服而安

王南崗咳嗽氣湧不能伏枕吐痰不已下午微熱胃高膨脹不知飽餓口乾舌上白胎厚小水短

三其七卷

必大便裏急後重間有紫黑血脉右關洪滑左手瀉據脉症胃中有瘀血痰積而肺氣亦虛也法當先補而後瀉以人參白朮白芍藥柴胡黃連陳皮半夏五味子桔梗與三帖後察其肺脉已旺乃與總管丸下之去黑血屑極多諸症悉減再與紅六神丸調理而痊七

張兆津乃政原有小便癃閉之症又小產後三日臍下作疼夜分發熱口渴大便溏日三四度先與補中益氣湯加六神丸澤蘭葉牡丹皮服之

連進三帖大便實矣惟小便頻數滴瀝不斷一日夜二十餘次夜分尤多精神甚憊脉雖五至不甚充指此血虛有熱而氣亦滯也濕熱在氣分故口中渴血虛故臍下痛法當峻補其陰而淡滲其陽以熟地黃三錢黃柏一錢補陰為君草薢去濕熱為臣薤麥穗澤瀉淡滲為佐烏藥調氣甘草為使服下臍痛全止小便其夜亦不起連進三帖病脫然矣八

三其七卷

陳光祿松栞翁長厚君子也而存心博愛常五更胃高脹疼三吳名家遍延而治寒熱溫涼藥味備嘗竟無一効禮子診之右寸軟弱左平兩尺亦弱予曰此肺腎二經之不足也補而飲之可無恙矣以補骨脂山茱萸人參各三兩鹿角膠鹿角霜各五兩杜仲巴戟白茯苓車前子各一兩五錢乾山藥二兩鹿角膠酒化為丸空心淡鹽湯送下又以御米壳去筋膜蜜水炒三兩訶子麵煨去核一兩陳皮一兩半煉蜜為丸五更枕上白湯送下一錢服一月病不再發翁由是

交予極驩也。及見予玄珠稿，大稱快，語曰：醫家
凡得一方，輒自秘，以為高。君獨欲公諸人，是有
意於壽蒼生者。亟付剞劂，予當助梓。因手錄予
百餘方，製丸散以施，而亦無人德我之望。九
溧水令君吳湧瀾公尊夫人，每五更倒飽，必瀉一
次。腹常作脹，間亦痛，脈兩手寸關洪滑，兩尺沉
伏。予曰：此腸胃中有食積痰飲也。乃與總管丸
三錢，生姜湯送下。大便雖行，不甚順利。又以神
校香連丸和之。外用滑石甘草木香枳壳山查

陳皮白芍藥酒連調理而安。

李悅齋先生夫人，胃腸大腹作疼，謔語如狂。寅卯
辰三時稍輕。午後及夜痛甚，晝夜不睡，飲食不
進。者十八日。究其故，原有痰火與頭疼牙疼之
疾。又因經行三日後，頭疼發寒熱，醫以瘡治，因
大惡熱。三四人交扇之，而兩手浸冷水中，口噙
水而不嚥，鼻有微血。又常自悲自哭，日以多哭
而腫，痛時即壁上亦欲飛去，劇則咬人。小水直
下不固，喉梗梗吞藥不下。脈則左弦數，右關洪

滑。予曰：此熱入血室症也。誤服治瘡剛燥之劑
而動痰火，以致標本交作。諸人猶謂熱入血室
當夜間譫語如狂，如見鬼，何至胸脇疼劇咬人
也。予曰：仲景云：經水適來，適止得疾，皆作熱入
血室治之。治全少陽，而以小柴胡湯為主。加涼
血活血之藥。此古人成法可守也。痛極咬人者
乃胃虛，亟行求食而不得，故喉中梗梗然也。即
以小柴湯加桃仁丹皮而譫語減。次日以安眠
湯與服而疼隨止。飲食進，遂駸駸有生意。

吳仲峰先生邀予診時，為仲秋初二日也。六部皆
沉微，而左尤甚。隱隱如珠絲之細。症則原以腸
風去血，過服寒涼，致傷脾胃。自春至秋，脾洩不
愈。日夜十二三行，而色黃白帶青，兩頰浮腫，四
肢亦浮。小水不能獨利，利必與大便並行。腸鳴
四肢冷，口不渴，飲食大減。口唇齟肉皆白。其為
人也，多憂思。夫四肢者，脾之所主，清冷為陽氣
不充，兩頰乃腎經部位，浮腫益見腎氣之不足
也。脈沉微，與面色黃腫，皆屬於濕。書云：諸濕腫

滿皆屬脾土合脉症視之由脾虛不運積濕而然虛寒明矣病至此勢亦甚危第形症相符色脉相應又能受補庶幾可生也法當大溫補升提以東垣益胃升陽滲濕湯加減調理人參三錢白朮五錢黃耆二錢茯苓益智仁蒼朮澤瀉各一錢大附子五分炮姜炙甘草升麻防風各五分連服八帖諸症悉減乃囑之曰病雖暫愈宜戒生冷憂思庶服藥有效切勿輕犯犯之非藥石可回也翁曰諾敢不唯命十二

三真二卷

張後溪先生令孫遍身瘡疥浮腫腫自足背起漸腫上大腿今且至腹大便洩瀉發熱不得安寢此風濕之症當令與時遠之候治從開鬼門潔淨麻二法使清陽升則瀉可止小水利則浮腫可消上下分去其濕之意也蒼朮一錢薏苡仁桑白皮各三錢青蒿防風升麻柴胡各五錢大腹皮五加皮赤茯苓澤瀉各六分八帖全安十三

府佐張五橋先生夫八寒喘嗽夜分氣壅不能仰

向體素弱脉右滑大左細弱每咳嗽必連連數十聲痰不易出甚至作吐以東垣人參平肺散加減治之四日而愈人參桑白皮地骨皮青皮茯苓五味子知母滑石麦芽天麻粳米甘草水煎服夜與白丸子十四

方東楚患脊骨痛牽引胃腹皆疼舌上黃胎甚厚脉沉滑而數先與川芎羌活炙甘草蒼朮姜黃防風藁本枳殼枳椇胡服之服後背脊痛減腹仍痛與木香檳榔姜黃香附青皮酒連大瓜

三真二卷

薑紫胡川芎服之腹痛稍減腰疼甚知其痰積下行欲去而不能也即以木香檳榔丸下之連行三四次舌上黃胎始退腹痛全止脉亦軟弱改以人參當歸白芍甘草茯苓陳皮白芥子香附柴胡青皮白朮調理而安十五

張淨字文學發熱腹疼瀉瀉口渴嘔吐不止時師有認寒者有認熱者有認傷食者予至診之曰此時疫瀉也以二陳湯倍白朮加青蒿葛根酒苓白芍藥猪苓澤瀉滑石一劑而安十六

張一尹近川翁始以內傷外感過服發散消導之劑致胃脘當心而痛六脉皆絀而弱此法當補而斂之也白芍藥酒炒五錢炙甘草三錢桂枝一錢半香附一錢大棗三枚糖一合煎服一帖而瘳十七

閔文川先生肚上生一腫毒月餘膿潰矣但稍動則出鮮血不止大便結燥胃高飽脹飲食不思脉兩寸短弱關絀尺洪滑此氣虛血熱陷於下部法宜補而升提也者不然痔漏將作可慮也

黃耆二錢歸身地榆槐花枳壳各一錢升麻秦尤各七分荆芥穗五分甘草三分服後胃高寬惟口苦甚前方加酒連連翹各五分而愈十八
予古愚先生每食後即大便腹皮稍脹急胸膈飽悶醫與參朮則痞悶愈甚小水清而長予脉之左寸滑右寸滑按之如黃豆大且鼓指關尺之脉皆絀小左尺脉遲遲有神氣極脉乃積痰鬱於肺莫能出以致大便之氣不固也法當効丹溪治乃取用吐吐去上焦痰積而大便自實

矣先用苦梗蘿蔔子各三錢白芷仁橘紅山梔仁各一錢川芎五分生薑三片葱三根水煎服之取吐服後半時許惡心吐出清痰心惡之勢雖有乃痰積膠固猶不易出又以蘿蔔子一合搗漿水加蜂蜜與半碗飲之始吐出膠痰二枚餘平日每小水則大便並行吐後小水始能獨利連行三四次而胸膈寬舒初亦以吐為懼至是豁然稱快大便五日不行始以予言為不謬也再以二陳湯加白朮旋覆苓麥芽調理而全可矣十九

婚東齋先生夜多溲瀉瀉必三五次甚且十數次小腹時作疼按亦疼口不渴小便長醫半年不愈予診之左寸滑餘五一部皆濡弱此陽氣大虛虛中極寒也治當溫補下元煎之升舉人參一錢半黃耆白朮各二錢白芍藥酒炒三錢大附子五分肉桂一錢杜仲補骨脂各一錢半升麻防風各七分姜枣煎服其夜大便減半次早雖瀉俱是白積如...伏小腹痛止再診之右

脉稍起連服四帖而瘳翁喜言曰把病半年藥無虛日今收功於四劑何速哉認病真而投劑確也敢不銘心。二十

大京兆姚畫老夫人年幾七十右手疾不能上頭醫者皆以痛風治不效益加口渴煩躁請予診之右手脉浮滑左平予謂此濕痰生熱熱生風也治宜化痰清熱兼流動經絡可瘳也二陳湯仕加葳靈仙酒苧白薑蚕秦芩四劑而病去如脫。二十一

一僕發熱頭疼口渴腹疼小便赤大便瀉日夜不睡者六日予診之曰據脉汗後浮數熱尚不減乃痰症也以滑石三錢青蒿葛根白芷片苓各一錢半炙甘草升麻各五分一帖即得睡熱減大半頭痛全除惟小水赤頭暈脚膝無力此病後血虛之故以四物湯加青蒿酒苧薑苴仁服之而安。二十二

一僕病與前類而身如火燥頭痛如破大便不瀉小水赤口渴鼻乾不得眠胸膈膨脹腹飢不能

食六脉絃而數用竹葉石膏湯加知母枳壳白芷葛根大加青蒿一帖而熱痛減半胸膈亦寬惟口渴小水短濇睡卧不安又與化瘟丹三錢并水化下渴止稍得睡頭暈脚軟喘急與四物湯加青蒿酒苧薑苴仁木瓜服之全安。二十三
一僕之病亦與前相俱以服立一齋藥而大吐大瀉熱益增頭痛莫能當煩躁口渴鼻乾嘔吐小水短濇寢食廢者十四日勢甚危急詢前所服藥乃藿香正氣散加砂仁厚朴山查大耗元氣之味且五月火令當權之疫當以甘寒之劑治之何可以辛熱香竄者益其火而枯其津也其勢危矣此皆不知因時達變惟習常膠故以誤人者用急投人參白虎湯加竹茹葛根青蒿升麻一帖而熱除再帖而頭痛止諸症盡去後連治數人多如此類何也此天行之疫故一方見之治多先以甘寒清解之劑投之熱退即以四物湯以補陰血稍加清熱之劑而青蒿之功居多此固一時自得之愚用錄之以告同志者使

知治法當隨時俗為變而常套不可不脫也。
十四

馬鳳陽文學。五月患咳嗽。內熱。額上多汗。惡風。脉
左絃數。右滑數。予曰。據絃數為陰虛滑為有痰。
不亟調治。恐成虛怯。以白芍藥川歸茯苓五味
子白朮甘草陳皮貝母天冬粉酒麥冬知母
桑白皮十帖。諸症皆瘳。七月復瘳。間日一發。寒
熱相半。寒熱亦俱極。渴甚。上身汗多。以石膏五
錢。人參黃耆白芍藥麥冬知母各二錢。柴胡三

錢。桂枝甘草陳皮貝母各一錢。竹葉三十片。一
帖而愈。二十五

倪二南先生內人小水不禁。一日二十餘起。脉右
寸洪而有力。左寸虛。右尺沉微。此心腎不交之
症也。以當歸遠志丹參牡丹皮桑螵蛸人參山
茱萸益智仁黃柏知母為丸。服之五日而安。後
凡遇辛苦則發。以此服之立効。二十六

杜史嚴印老長媳。少司空沈鏡老女也。患腹痛。有
小塊。滿又寒。腹寒甚。兩寸關皆滑數。兩尺皆

沉微。此脾氣弱而飲食不消。又當秋令。濕淫之
候。不利亦瀉。宜預防。與白朮蒼朮茯苓甘草白
朮仁木香半夏陳皮澤瀉煎服。其夜果瀉一度。
次早又瀉一度。小腹仍疼。不少減。且裏急後重。
蓋其稟賦素虛。當補中兼消。兼利。白芍藥三錢。
桂心一錢。甘草人參茯苓澤瀉陳皮白朮各八
分。升麻葛根各六分。服後脉皆軟弱。不滑。滿塊
亦消。改以人參黃芪白朮白芍藥各二錢。炙甘
草陳皮澤瀉葛根柴胡茯苓各一錢。調理而全。

二十七

新市陳鹿塘先生原有腸風臟毒之症。大便燥結。
數日不能一行。痛苦殊甚。此胃寒腸熱之症。其
脉兩寸皆數。兩關皆絃而無力。兩尺洪滑。而左
尤甚。診畢。渠告予曰。病數年。百醫不効。望生難
矣。聞公治多奇。中真一奇而生之。實再造之恩
也。予憐其苦。而倪想久之。因思李東垣有云。大
腸喜清而惡熱。脾胃喜溫而惡寒。以胃屬土。而
大腸屬金也。今治腸胃相兼之疾。必寒非瀉。

子下月
藥用
法人所
知也

熱非灼灼始可乃詳酌一方專以腸風臟毒之藥為君。主外以養血之劑。製之使不傷胃氣。蓋藥先入胃。而後傳入大腸。入胃時。藥未化。及入大腸。則藥化。而君藥始見。庶幾兩不相妨。亦假道賊誘之策也。因以^三大黃酒浸九蒸九晒者二兩。槐花三兩。木耳二兩。郁李仁皂角子象牙屑條芩各一兩。血餘灰升麻荆芥穗各五錢。為末。煉蜜為丸。赤豆大。以四物湯加蒲黃各一兩。為和米湯送下。空心及下午各服二錢。服此果然血止。而大便不燥。飲食日加。鹿塘大喜。曰。古稱用藥如用兵。奇止相生。鮮有不克敵者。其公之謂乎。二十八

張道南先生內人。以飲食忤。外氣因脹痛。不飲食。五日矣。逆予診之。兩寸關然。尺滑。予曰。此上焦氣虛。下有鬱滯也。以姜黃青皮為君。山查枳榔當歸杏仁烏藥枳殼為臣。柴胡木香為佐。吳茱萸為使。服後氣稍順。然後用葱二斤。煎湯浴洗腰腹。即將熟葱擦摩腰腹。使氣通透。洗畢即安。

目少頃。其夜大便通。先下皆黑硬結塊。後皆水。此積滯行而正氣虛也。以建中湯加山查茯苓。澤瀉柴胡香附姜連調攝之。而痊。二十九

張道南先生尊堂老夫人。以勞倦致早晨鬲上有痰痞而惡心。每食熱物。目中即出泪。脉右寸關皆滑。左寸短弱。此心血不足。而肺胃有痰也。以六子湯加麥芽白豆仁旋覆花治之而愈。三十

馬迪庵先生內人。原以飲食過傷。又為風寒外襲。醫以內傷外感治之。後復至五更發熱唇燥胸中衝跳不已。手足皆冷。脉兩寸俱滑。款予謂此奇痰症也。以小陷胃湯加白芍藥蘿蔔子前胡酒茶二帖。不日大便行。下統重八條。胸中即不衝跳。但覺力怯。再診之。兩寸減半。尺脉稍起。以二陳湯加白朮白芍藥酒茶調理。後四帖加當歸而全愈。三十一

大宗伯董潯老夫。人常眩暈。手指及肢節作脹。脉右寸軟弱。關滑。左脉絃長。直上魚際。兩尺皆弱。此亢而不下之脉。難經所謂木行乘金之候也。

上見承
以天
印

總由未生育而肝經之血未破。內經云。肝
掉眩皆屬肝木。兼有痰火。治當養金平木。培土
化痰。以白朮半夏天麻湯。正與此對服。兩帖而
眩暈平。再與六君子湯。加天麻白姜。蠶以治其
顛。加白芍藥以瀉肝。麥門冬人參以補肺。金麥
芽枳實神麩蒼朮以健脾。使宿痰去而新痰不
生。少用黃柏二分。為使引熱下行。令不再發。三

張裕齋惡寒痰多作嘔胃高不寬兩寸俱短弱關

洪大尺濇。此上焦氣虛中焦有痰下元不實也。
法當清中補下。不然後將有中風之患。二陳湯
加白苴仁香附藿香以開胃氣。白芥子蘿蔔子
杏仁以降痰而潤大便。兩帖諸症悉去。乃錄八
味腎氣丸方與之。令自調理。三十三

大柱史嚴印堃夫人年近六十。已孀居十年餘。以
孀居而食長素。其婿張懷赤善子。語曰。外母近
鼻塞大便瀉胸膈不暢。醫者下之。蓋其平日王
海藏有云。雜病酒積下之早。必成痞滿。所當慎

也。用拉子診之。兩可沉弱。關絃大。兩尺亦弱。予
曰。此陽氣甚弱。脾氣大虛。不當下而誤下之。故
鼻作塞而胸痞悶也。用蒼朮川芎桂枝白芷防
風桔梗以疎風而升陽氣。白苴仁蘿蔔子寬胸
利膈。麦芽以助脾氣。服後鼻不塞而胸猶痞。復
用東垣木香化滯湯。加吳茱萸乾姜而安。乃囑
之曰。病雖漸愈。第陽氣虛脾氣弱。不宜久食素。
恐中氣不充。防作中瀉。謹識之。三十四

王谷泉大便作瀉。上身熱耳中壅塞頭眩暈胸膈

不寬口渴痰多咳嗽。六脉俱濡弱。汗大出。此正
氣大虛。或由尅伐太過所致。當以補養為先。人
參白朮白芍藥酒炒各四錢。柴胡石菖蒲陳皮
各一錢。炙甘草五分。降瀉茯苓各一錢。兩服而
神清。再寬脾健。惟汗不斂。眩暈未除。再與人參
白朮黃耆酒炒白芍藥各二錢。炙甘草五分。大
附子五分。桂枝三分。澤瀉一錢。而愈。三十五
方東塾兩脇痛。上壅至胸。發熱飲食不進。脉左手
沉而絃數。乃積氣也。石手濡。痰飲也。關脉濡弱

脾氣不充也。據症或怒故痛之暴耳。治當先去積熱消痰氣熱。瓜萸仁六錢。枳殼姜連半夏各一錢半。白芥子一錢。牡蠣二錢。炙甘草五分。柴胡一錢五分。二帖諸症盡去。飲食進矣。然恐其復發也。當歸龍會丸使行之。以刈其根服下。果行二六三六。

一婦人懷妊七月內。熱咳胸高飽悶。以條苓二錢。瓜萸仁白芍藥紫貝母桑白皮各一錢。甘草三分。枳殼紫蘇梗。母陳皮各七分。二帖而愈。三十七。

一婦人心痛唇紅。痛則大發熱。頭疼少頃出汗。脈大小不一。予曰。此血熱之症。痛吐白沫。可徵也。枳榔川椒各二錢。杏仁一錢五分。石菖蒲一錢。烏梅七個。炮姜草豆仁。陳皮各五分。山梔仁一錢。一進而痛減。半再進而痛全除。三十八。

倪二南內人。小產後小腹痛。夜分作熱。作暈。予曰。此氣血虛而惡露未盡也。川芎一錢半。當歸三錢。澤蘭益母草香附升參各一錢。人參七分。

升糖五分。山查桂皮各一錢。一帖而小腹痛止。再帖而熱暈悉除。三十九。

倪少南右頰車浮腫而疼。直衝太陽。大發寒熱。兩手寸關俱洪。大有力。此陽明經風熱。文蔚所致。以軟石膏三錢。白芷升麻各一錢。葛根二錢。生熟甘草一錢。薄荷山梔子牡丹皮連翹各七分。

天荅粉貫衆各一錢半。兩帖腫痛全消。四十。倪少南內人。經行如崩。勢不可遏。頭暈眼花。脈右寸極軟弱。左近駛。此氣虛血熱之候。由氣虛而血不固也。仲景云。血脫益氣。特用人參黃耆各三錢。白朮二錢。粉草五分。荆芥穗蒲黃側柏葉姜炭各一錢。三帖全瘳。四十一。

高仰山內人。痔血。裏急後重。飲食入腹。大便即行。晝夜行五六度。五更咳嗽。喉中痰响。肌肉脫口。作渴。由服痔科涼血藥過多。致脾虛不能統血也。脈六部皆軟弱無力。以四君子湯加荆芥穗。秦艽陳皮炮姜。而飲食進。血全止。嗽定。而睡寧。後減炮姜。又四帖而愈。四十二。

不發矣 四十二

姚娘子小腹疼飲食及藥入腹皆疼疼來遍身無力此由血崩而致宜急治之。人參黃耆各二錢白朮一錢茯苓陳皮各八分白芍藥貫衆各一錢姜炭荆芥穗蓮蓬壳各三分煎服而安。四十三

張五橋先生令政鄭都諫春霖公今姊也。痰喘不能伏枕且咳嗽甚則吐痰涎枕餘乃止。以旋覆花湯為主治之。旋覆花紫菀子各一錢半夏一

錢五分厚朴桂皮粉草各三分茯苓陳皮桑白皮葶藶子各八分姜三片水煎服臨臥以養正丹二十粒白湯送下。兩帖痰嗽喘各減十之七。乃去葶藶子加白芥子蘿蔔子二帖而痊。四十四

徐文學三泉先生令郎每下午發熱直至天明夜熱更甚右脇脹痛咳嗽吊疼坐卧俱疼醫以瘧治罔效。延及二十餘日熱不能退後醫謂為虛熱投以參朮為主。子診之左絛大右

滑大搏指子曰內經云左右者陰陽之道路據

脈肝胆之火為痰所凝必勉強作文過思不決木火之性不得通達鬱而為痰夜甚者肝邪實也。初治只當通調肝氣一劑可瘳誤以為瘡燥動其火補以參朮閉塞其氣書云體若燔炭汗出而散今汗不出舌上之胎已沉香色熱之極矣。設不急治立見凶危乃以仲景小陷胸湯為

主。大瓜蒌一兩黃連三錢半夏二錢前胡青皮各一錢水煎飲之。夜服當歸龍會丸微下之

諸公猶爭之曰病久而食不進精神狼狽若此寧可下乎予曰經云肝常有餘且脈亦為有餘故有餘者瀉之前時誤認為虛投補左矣豈容再誤哉。服後夜半痛止熱退兩帖全安。四十五

王祖泉乃眷朝飯後稍寒惡風發熱遍身疼痛汗大出不止口中熱腹中不知餓小水短。六脈皆瀯以白芍藥五錢白朮二錢桂皮黃芩各一錢甘草八分二帖而汗止寒熱除減去白朮加當歸而遍身痛止。四十六

費少垣乃眷姪已九月痰多喘嗽胎氣上逆眼撐不起兩太陽微疼予曰此子懸痲蕪痰火也以大紫蘊飲為主總服一帖逆即不逆胸高頓寬惟喘嗽不止與七製化痰丸而安四十七日費一吾先生令政姪已四月夜不能睡小便淋瀝痰嗽內熱脉右關滑左寸微弱兩手皆數與橘紅貝母片苓黃連茯苓澤瀉枳壳蘊梗前胡水煎服之其夜即能安寢次日再以四君子湯加當歸香附貝母陳皮條苓紫蘊梗前胡調理足

月而產一子四十八

二四

今弟媳六娘子遍身痛發熱汗大出昏昏如醉卧不能起兩寸脉短弱兩手皆數而無力此勞倦之餘故汗大走也黃耆三錢白芍四錢粉草一錢五分桂皮八分當歸一錢石斛二錢一帖熱除痛汗皆止惟倦而不能起仍以前方加人參陳皮兩帖而痊四十九

八娘子頭痛咳嗽痰多有血夜分發熱喉中常作血腥每經水行必腹中先痛二日用香附壯

丹皮滑石甘草桃仁川芎當歸紫胡白芍山梔子茅根八帖而愈五十一

姚弁山老先生內人自上年十月左足不能履地至十二月產後忽好三日復不能動時常胸脇作痛素多痰火而治者率以四物湯天麥門冬為主間服獨參湯服將弥年而病如故予診之兩寸脉俱洪滑而數夜分發熱此係溫痰凝滯補塞太重故遷延不脫乃以二陳湯加蒼朮黃柏歲靈仙五加皮生地黃白芥子白芍葉當歸兩帖胸脇痛止熱除再加薏以仁八帖而足能舉步矣五十一

李坦渠老先生令子室十月發寒熱起一日一發咳嗽心痛腰亦痛至次年正月十七日始間日一發肌肉大瘦喉疼汗出如雨白帶如注飲食減少百試而汗不止延予為診其脉右手軟弱左手散亂此汗多而脉不斂病勢至此危之甚矣書云火熱侶瘡此病之謂歟以黃耆三錢白芍一錢五分粉草阿膠各一錢鱉甲三錢桂枝

五分烏梅一箇水煎服其夜汗止次早診之左
脉已歛神氣亦回前方加何首烏石斛牡蠣其
日寒熱亦不發飲食稍加駸然有幽谷回春
之象五十二

太學周衡宇先生吳江瀾溪人犬豕宰白川公之
令孫也近來咯血色紫胃中痰火素盛壅於胸
膈作痞作疼痰與瘀血挾而為熱脉左寸洪大
右寸關皆滑兩手盡數此有餘之候總管九四
錢再以滑石桃仁各三錢山查二錢枳壳梔子

貝母紅卷丹皮各一錢茅根五錢水煎服之次
日大便行三次痰積極多內帶瘀血改以山查
子紫苑丹皮各一錢滑石三錢桃仁一錢五分
小蘆三錢茅根五錢水煎加童便一酒盃三帖
全安五十三

大叅張公分守杭嘉湖道因喪夫人衙中亡者八
口心中惶又因凌絳翁交厚而禮予為診左寸
脉短關絃右關滑兩尺亦絃據脉心血不足中
焦有痰流於下部凝於經絡以故腰膝痠疼居

常背心作脹頭多眩暈夜睡多汗先時諸醫悉
投風劑非所宜也予以陳皮白芍藥木瓜十膝
五加皮以仁黃栢酒苓甘草生地當歸藏靈仙
調理十劑諸症悉愈五十四

夫都諫鄭春寰老先生為春元時頭痛內熱八夜
尤甚汗出如流通宵不止小水短赤舌上黃胎
右脇脹疼先與桂枝白虎湯一帖解其內熱飲
去浮汗再與白芥子一錢瓜蒌仁四錢枳實姜
黃又連各八分水煎服外與當歸龍會丸一錢

五分下之而脇痛安五十五
大叅徐天目老夫入胸膈痞悶不思飲食咳嗽多
痰或時惡心上焦頭目俱不清利向來長素兩
寸關滑大如莖兩尺沉微痰火症也二陳湯加
酒苓薄荷前胡枳壳蒼朮香附鬱金川芎調理
而安五十六

張鹿川咳嗽多痰面青潮熱肌瘦性躁而多自用
以數考不利思又成疾又新婚之後飲食不節
脉之右關滑大餘部皆無神氣且冀門已發痰

流瀆流膿血予曰此陽病極而下也法在不治
果不逾月而亡五十七

陳仰山先生內人小產後二月而血大下白沫如
注五更洩瀉至虛浮下午身熱口渴面色青黃
脉右手豁大近乳左濡弱據此大虛之候血海
尚有瘀血不盡以致新血不得歸源稍動氣即
下如崩蓋脾乃統血之經虛則不能約束且面
浮食少脾虛劇矣急宜溫補勞或可為人參白
朮各二錢姜炭粉草各五分茯苓六分香附八

分丹參炒過一錢水煎服四帖而瀉止再以人
參白朮各二錢茯苓丹參黃耆蒲黃各一錢姜
炭澤蘭葉粉草各五分調理全愈五十八
張溪亭乃春喉中梗梗有肉如炙嚮吞之不下吐
之不出鼻塞頭暈耳常啾不安汗出如雨心
驚胆怯不敢出門稍見風即遍身疼小腹時疼
小水淋瀝而疼脉兩寸皆短兩關滑大右關尤
搏指此梅核氣症也以半夏四錢厚朴一錢紫
蘆葉一錢伍分茯苓一錢三分姜三片水煎食

後服每用此湯調理多效五十九

張亭子室姪已七月產見亡過祖母揮拳背打一
下驚醒即覺胎動不安血已下大小便皆急腰
與小腹脹疼者五日此亦事之奇也遂予為治
兩寸脉俱短弱此上焦元氣大虛當驟補之人
參阿膠黃耆白朮各二錢當歸白芍條芩杜仲
各一錢砂仁香附各五分苧根嫩皮三錢葱白
六錢一劑而血止兩劑諸症悉除而神漸安四
帖後減去苧根葱白調理旬日足月而產一女

六十

陳茂之勞倦之後勉強色慾精竭而血繼至續感
風寒發熱頭痛胸膈飽悶始從太陽而傳至少
陽胸脇痛而耳聾嘔逆口苦咳嗽六脉俱絃數
此少陽症也以小柴胡湯加枳殼桔梗竹茹而
嘔逆止熱退因進粥早復熱口渴小水不利大
便一日夜六七次所行皆清水日晡熱甚舌上
苔胎昏沉振顛此食復之候書云渴而小便不
利者當先利其小便以猪苓湯為主猪苓澤瀉

各二錢滑石三錢赤茯苓一錢柴胡八分升麻
水通各五分連進二帖小便利而大便實但熱
不退以六神通解散一帖其夜熱仍不退次早
診之左脉不絃數矣兩寸脉虛以故服藥無汗
口渴漱水而不欲嚥咽熱此邪傳陽明經不急
涼血必作鼻衄病勢至此可謂極惡矣投黃芩
芍藥湯合生脉散以止嗽渴用葛根湯以解肌
熱白芍藥三錢葛根升麻黃芩各一錢人參一
錢五分麥冬滑石各三錢甘草五味子各五分

烏梅一枚急煎二帖飲之日中大便下燥糞十
數枚始得微汗就得睡矣晚進粥一盂夜卧向
安六十一

陳五山胃脘疼醫作勞倦治不効又醫作寒氣治
而用剛燥痛轉極又醫以巴豆丸下之大瀉皆
水亦無積滯之物痛雖稍減然面有虛浮胸痞
足腫又張醫以人參白朮各二錢大補脾胃則
痰嗽氣逆上高熱甚喉乾燥右脇不能貼席
大便一日二三行因向被巴豆丸瀉起迨今七

日猶瀉不止飲食大減延予為治診兩寸濡弱
兩關滑兩尺洪大予曰振症原起於鬱大氣投
湯劑大推大撤以致加重若平平治之自當尋
愈二陳湯加藜蘆枳實姜黃枳梗蘿蔔子前胡
一帖而熱嗽除右脇亦可貼席再劑而飲食進
大便實其晚又為怒氣所加痰嗽脇痛如舊且
多煩躁改用橘紅貝母瓜萸茯苓山梔子前胡
青皮甘草桑白皮蘿蔔子水煎飲之而平六十一

吳小峰年五十未有子素有酒積作癆晌午即瀉
所下多稠粘之物腹痛之疾年已久矣治當清
潔中焦分濕熱兼養脾法用白滑石三兩粉草
肉蓯各五錢白芍藥酒炒一兩五錢木香三錢
紅麴四錢神麴糊為丸每早晚白湯送下二錢
服未竟而疾除始舉一子六十三

沈大參玉陽老先生中焦有食積痰飲而作痞滯
以故大便了而不了間或作脹予脈之兩寸短
弱關滑兩尺沉滑有力予曰脾胃虛弱痰飲

而為熱但清其中宮使清陽升濁陰降而氣血自旺此不補之補也以二陳湯加枳實酒連酒芩滑石姜黃木香乾葛山查兩劑而愈六十四王敬泉頭暈且痛起則倒仆胸膈脹悶如繩束縛嘔吐而食飲皆不得入六脉俱瀉此痰飲挾木火之勢而作暈也先以濟生竹茹湯而吐不止且煩躁發餽發熱再與蘆根湯連進二椀氣餽稍定再以吳茱萸一兩為末以鷄子清調塗兩足心引火下行外用二陳湯加姜汁炒黃芩黃連旋覆卷杞杷葉丁香白芷仁核柳葉胡水煎服之服後熱退大便亦行頭暈嘔吐皆止惟胃脘有一塊作疼仍與前藥兩劑而塊亦消六十五

張二官發熱頭痛口渴大便秘結三日未行脉洪大此陽明少陽二經之症用大柴胡湯行三五次所下者皆黑糞夜出臭汗次日清爽惟額上仍熱用白虎湯加葛根天荅粉因食粥太早復發熱咳嗽口渴殊甚且惡心用小柴胡加枳實

山梔子麥芽次日渴不可當改以白虎湯加麥門冬天荅粉外與辰砂益元散以井水調下五錢熱始退渴始定不虞夜睡失蓋復受寒邪天明又大發熱不知人事急用小柴胡湯加升麻葛根前胡薄荷進之而汗出熱退神思大瘳四肢皆冷語言懶倦且咳嗽以生脉散加石斛百合大棗白芍藥服後咳嗽尋止精神日加飲食進而向安矣六十六

大司馬滿印川第三令子室尚書蔣公孫女也年二十五體素弱語言端謹因難產傷力繼以生女拂意後又女死悲戚即時暈厥醒而神思昧手足瘳瘳目作上視予更後始至因瘳瘳不能診脉細詢之自女落地惡露絕無比有女醫在旁乃昔所親信者時與人參大嚼及獨參湯并粥亂進參與粥皆壅塞高上不下以故神昏瘳瘳不已也予教以手於喉中探而吐之喜其隨手吐出痰飲粥藥盈盆瘳瘳方定乃與川芎山查澤蘭葉陳皮半夏茯苓等藥之稍得睡

予亦出中堂就寢不虞女醫又私與補藥二帖
予丑時陡然狂亂如降神之狀口中亂語云我
是觀音大士降壇所言皆儒雅官話問答如流
聲甚壯厲殊無產後不足之態生平不諳漢聲
至是出語如生成者人皆異之目為神附禳禱
百般予獨諍之語諸左右曰此惡露不盡乃蓄
血如見鬼之症非真有神佛相附也徐以正言
叱之即緘默繼以清魂散加滑石重便與之至
天明小水乃行狂亂皆定迨予出房少頃詎知
女醫意欲要功又不知與何藥服之少刻狂亂
如前再與川芎一錢五分當歸四錢澤蘭葉益
母草各一錢臨服加童便連飲二帖不効予逆
思之胸中必有餘痰作滯前劑中無佐使之品
故藥力不行也即用前劑大加山查與之惡露
稍行神思即靜嗣後稍睡少時手足微動或自
以手掌其面或自以手搥其胸昏亂不息診其
脉近虛早間面紅而光申酉時面色白此血行
火退故脉虛而當補矣與人參川芎澤蘭葉各

一錢當歸山查各二錢茯苓陳皮各八分捲荷
葉一片煎熟調琥珀末子五分服下半時許嘔
氣二聲予喜曰此清陽升而濁陰降矣自茲女
靜夜中惡露微行大便亦利乃索粥飲問其昨
日漢聲何來荅曰不知也諸君始信蓄血如見
鬼之言為不謬昔秦越人有言曰病有六不治
信巫不信醫一不治也古稱用藥如用兵以郭
子儀之英明而以魚朝恩監之便不成功予固
非郭令公之儔彼女醫之誤則又有過於魚朝

恩矣噫寧不慎哉六十七

孝廉減茗泉老先生脉左弦數右寸弱關大重則
滑右尺微原以瘡後復傷飲食大便瀉而變痢
一日夜雖只五六行皆積滯無異腹疼後重難
安午未後發熱至天明始退此夏傷於暑而秋
為瘧癘也其熱仍瘧之餘邪當先解散然後以
補劑投之則大便自愈矣與神授香連丸一服
服訖腹中腸鳴須臾大便行且較前更多方有
冀下改以白芍藥四錢澤瀉黃連各一錢滑石

二錢粉草桂皮木香各四分。山查七分。兩日後乃與補中益氣湯加木香黃連白芍藥調理半月。潮熱大便皆愈。

已繼可先生令眷。孕三月而瘧疾發。先寒後熱。胸膈大脹疼。口渴。湯水入即吐。譫語無汗。胎氣上衝。而成子懸。脉皆絃大。以川芎紫胡黃芩知母甘草橘紅紫蘊枳壳砂仁。水煎服之。吐止痛除。六十九

張氏婦。年經二十一。其夫延予診之。左寸關短

弱。尺滑。右寸亦滑。關濡弱。尺沉微。診畢問予曰。脉何如。予曰。心神脾志皆大不足。肺經有痰。夫曰。不然。乃有身也。予曰。左寸短弱如此。安得有孕。夫曰。已七十日矣。予俛思久之。問渠曰。曾經孕育否。夫曰。已經二次。今乃三也。予問二產皆足月否。男耶。女也。夫曰。實不敢諱。始產僅九個月。手足面目完全。而水火不分。變肉一片。生下亦無啼聲。抱起已身冷矣。細檢之。乃知其無水火也。次亦九個月。產下又無啼聲。看時口中無

舌。二胎之異。不知何故。聞先生能細心察人。特祈審之。予方悟前二胎之不完者。由心脾二經不足所致也。今左寸右關之脉可見矣。迺為

籌思一方。專以補心血為主。令其多服。以百餘為率。酸棗仁。遠志。茯神。各一錢。白朮二錢。白芍藥當歸。枸杞子各一錢。五苓。甘草五分。生地黃八分。艾絮二分。龍眼肉五枚。水煎服。足月而產一子。次年又有身。不以前事為音。至九個月。產下形體俱具。外有脂膜一片。包其面耳。目口鼻

皆見。但不能去此脂膜。產下即殞。因思上年之子。為藥之力也。因予久不至。其家以予方粘於壁間。一覺有身。即照方服之。後生二子。一女里中以此方為補天手云。六十九

癸巳仲夏。吳比部鳳麓父母。以次君絃臺先生。眼目紅痛。恐學道按臨。速於取效。乃聽眼科醫寒涼而治。兩越月。無驗。又眼科視之曰。目疾不宜多用寒涼。恐冰其血。以人參五錢。枸杞子一兩。悉溫補之。劑凡用人參枸杞子五六斤矣。目腫

如堯絕不能開。又專科語之曰：紅腫而痛，明是熱症。誤服溫補，反助其熱，寧不益腫。顧其勢即百寒涼亦不易瘳。捷徑無如用下。此釜底抽薪法也。絃臺惟求速效，一聽下之，用大黃、芒硝、枳殼作大劑下五六次，而飲食日減，惡心畏風，則不能出房門矣。又專門謂前劑欠當，大瀉之後，正合補也。又聽補之一補，而目腫如舊。又有眼科云：目疾熱症多，寒症少，只當滋補腎水。水升則火自降，火降而目疾斯愈矣。用是以滋陰降火之劑為恃，終數服而精滑不禁，一夜夢遺二次，神氣大脫。後補則目腫痛用降，則精元滑脫。屢試屢如是。諸醫無策，悉謝而退。乃修書命使自淮陰之海陽，懇祝令君紹介，徵予為治。予始以遠為懼，祝再四為渠言。予亦素為渠重，義不得以遠為辭。乃介行李嚮往，至即診之。左寸脈甚短，右寸大而無力，左關絃弱，右滑兩尺亦滑。予見其坐在幔中，畧不敢見風，問其日食幾何。荅曰：三次計二椀許，葷醒絕不能用。予曰：夜

卧安否。荅曰：近來甚苦於睡，總合目即夢魘，或畏或被虎蛇交咬，或有鬼來勾攝，或落橋墜井，或與人爭鬪而負，猛然驚悟，冷汗淋漓，四肢癱軟，不能動轉。少頃乃定，今幸公不遠千里而臨足，徵素雅。予曰：足下始無大恙，只緣大推大搬，以致狼狽若是。彼專科者不足恃也。經謂五臟精華皆上注於目，今專科局局然守其死法，安知五臟盈虛，陰陽消長，隨時出入哉。以愚管見，但平平治之，易與耳。據足下之脈，心神脾志虛相不足，肝膽之火鬱而不散，致生目痺。今為補養心脾，壯其神志，則飲食日加，寢卧安穩，而精元有守，神水盈溢，何目痺之不愈哉。絃臺曰：善。惟先生命劑，乃以歸脾湯，減去黃耆、木香，加丹參而補心脾，以大安丸專助脾胃，而磨穀食，俾新痰不生，則氣血可繼日而旺矣。後五日而飲食加，十日而夢魘必尋能出戶，不畏風日。半月而肌肉生，目可觀矣。津津然而有萬全之兆。不虞專門張氏子復至，以白眼藥日頻點之。一日

凡七八次。從此復不能開。臉肉風粟生滿。適予有南都之往。幸為所誤。後幸有李少塘。打去風粟。眼始能開。李雖手法精熟。然於軒岐間奧。尚亦未窺藩籬。予後自南都至。見左目雖愈。右目終成內障。予故曰。彼專科者。不足恃也。豈虛語哉。七十

丘太守鎮山翁令姪。淮陰人也。丁年患兩手筋攣。指掉不能屈伸。臂肉瘦削。體瘠面白。寢食大減。市中諸友。調治無驗。乃任京口諸名家療之。半

年。肉更消色更瘁。聞予在吳比部衙中。敢予為治。診其脉六部俱絃。重按稍駛。診竟扣其受病之源。太守公曰。自上年冬。疫偶發寒熱。筋骨疼痛。迨於仲春。寒熱雖退。而筋骨之疼不減。服藥無虛日。甚之日三四進。肉漸消去。指掉不隨。倍有加於往昔。醫之來者。一曰風。二曰風。三四五六皆曰風。即十數輩。又莫不皆曰風者。竭技盡方。卒無一應。奄奄床第。絕不知為何病。予對公曰。此筋痿症也。乃少年不謹。然而受風濕邪氣。

若汗大出。則風去而濕存。由是血氣俱虛。經云。陽氣者。精則養神。柔則養筋。虛則筋無所養。漸成痿弱。乃不足之疾。故陳無擇朱丹溪劉宗厚皆謂。謹痿切不可作風治。誤則成痼疾。公聞言愕然曰。服風藥幾二百劑矣。願今已瘳。柰之何。予對曰。令姪青年。猶可圖也。公曰。用何法。予曰。法當大補氣血。經云。氣主煦之。血主濡之。氣血

旺。則筋柔而軟。由是乃可以束骨而利機關也。抑何掉之有哉。病者聞言大喜曰。聆先生詳病之源。治法之畧。雖未服藥。已覺沉疴去體矣。即請劑。予以五加皮。黃以仁。紅苓。人參。鹿角膠。龜板。虎骨。當歸。丹參。地黃。骨碎補。蒼耳子之類。服兩月。肌肉漸生。飲食大進。兩手指掉亦平復。七

十一
書辨。年過五十。糟酒縱慾。無憚。忽患下消之症。一日夜小便二十餘度。清白而長。味甘且甜。少頃

疑結如脂。色有油光。治半年不驗。腰膝已下皆軟弱。載身不起。飲食減半。神色大瘁。脈之六部大而無力。書云。脈至而從。按之不鼓。諸陽皆然。法當溫補下焦。以熟地黃六兩。為君。鹿角霜山茱萸各四兩。桑螵蛸鹿角膠人參白茯苓枸杞子。遠志。鬼絲子。懷山藥。各三兩。為臣。益智仁一兩。為佐。大附子。桂心。各七錢。為使。煉蜜為丸。梧桐子大。每早晚淡鹽湯送下。七八十九。不終劑而愈。或曰。凡云消者。皆熱症也。始公具方。人多議之。今果以溫補成功。此何故哉。予曰。病由下元不足。無氣升騰於上。故渴而多飲。以飲多小便亦多也。今大補下元。使陽氣充盛。薰蒸於上。口自不乾。譬之釜蓋。釜雖有水。若底下無火。則水蒸不得上升。釜蓋乾而不潤。必釜底有火。則釜中水氣升騰。薰蒸於上。蓋經溫潤不乾也。予已詳著醫旨緒餘中。茲不多贅。七十二

腰跨脹墜如生產狀。坐卧不安。因痛而脈多不應指。此肝經鬱火所致。法當通利。以杏仁。飛仁各三錢。柏樹根皮。山梔仁。青皮。各一錢。枳榔五分。枳壳八分。水煎服之。以頃大便通。痛脹隨減。七十三

愈憲韓約。先生夫人。向來夜分。臍腹疼極。其必用炒鹽慰之。兩時久乃止。次日必頭痛。兩太陽如箍。遍身亦疼。此上盛下虛症也。先用紫胡。川芎。粉草。酒連。薄荷。天麻。橘紅。茯苓。半夏。蔓荊子。水煎服數帖。頭痛全止。惟咳嗽。胸前畧痛。兩寸脈浮滑。兩尺弱。再用鹿角霜。鹿角膠。補骨脂。遠志。枸杞子。金鈴子。香附子。煉蜜為丸。梧桐子大。每空心及下午食前。淡鹽湯送下。七八十九。而愈。七十四

孝廉丁震瀾。夫令郎。總二歲。瘡母上。嘔。咳嗽。每午後發熱。至子丑時乃退。終日啼哭不止。驚口白。唇神氣大弱。痘後。通身皆瘡。未愈。多方治之。不効。有灸之者。有刺之者。皆無效。後遇韓約。先生。治之。皆瘡。

施之全然不應予曰乳下嬰孩臟腑薄脆不可
亂攻亂補參着足以增其嗽矣刺適以驚其神
安能取效予教以白朮驚甲各一錢五分青蒿
麩芽陳皮各八分烏梅一枚見母知母各六分
甘草三分八帖全愈七十五

武進令君孫康字公子室臧位字夫女也年十六
初產女艱苦二日偶感風邪繼食麵餅時師不
察竟以參朮投之即大熱譫語口渴汗出如洗
氣喘洩瀉瀉皆黃水無糞一日夜不計遍數小

水短少飲食不進症甚危惡時當六月初旬女
科見熱不除乃投黃芩芍藥黃連寒涼之劑諸
症更甚又以參朮大劑向果乾姜等止瀉一日
計用人參二兩四錢瀉益頻熱益劇喘汗轉加
譫語不徹醫各縛手辭謝曰書云汗出如油
喘而不休死症也又汗出而熱不退瀉而熱不
止且譫語神昏產後而脈洪大法皆犯逆無生
路矣惟附子理中湯煎微俸於萬一適予為顧
太守肖溪公延至即過為一診六脈亂而無緒

七八至獨右關堅硬綿綿久之因思暑月汗出
乃常事但風邪麩食瘀血皆未消熔補劑太驟
書云蓄血如見鬼治當消瘀血麩食解其暑氣
猶可圖生勿遽棄也有臧玉字者位字堂兄也
醫有雅致深以予言為然而速予措劑予曰劑
憑症發難拘常套不常之症須用不常之藥乃
用益元散六錢解暑氣清熱為君仲景云渴而
小便不利者當先利其小便况水瀉尤當用之
為君也以糖毬子三錢為臣紅麩澤蘭葉各一

錢五分消瘀血安魂為佐香附一錢五分為禪
佐補紅半夏麩茯苓乃統理脾氣為使京三稜
五分消前參朮決其壅滯為先鋒水煎飲之飲
下即稍睡譫語竟止連進二劑其晚大便減半
次日仍用前劑飲之其夜熱大減大便只二次
有黃糞矣惡露畧行黑血數枚又次日診之脈
始有緒神亦收飲進粥一盞大有生意前方減
去京三稜紅麩加白扁豆其夜大便一次所下
皆黑糞從此熱盡退大便亦實改用四君子湯

加益元散青蒿香附白扁豆酒炒白芍藥炮姜
調理而平七十六

吳東星上舍辰州太守公長君也。冒暑赴南都試
落第歸而怏怏。因成瘡。自八月中旬。延至十月。
瘡雖止。而腰痛白濁。日夜咳嗽。肌肉大消。藥劑
亂投。認為風者。以羌活防風續斷等發散。認為
虛者。以六味地黃丸為補。認為火者。以芩連梔
子黃柏知母天荖粉生地黃瀉其火。認為半虛
半實者。投以獨活寄生湯。認為寒者。以大附子

肉桂鹿角膠參朮溫補之。痛劇欲死。叫喊四鄰。
予脉之。左絃細。右滑大。俱六至。口渴眼赤。予知
其昔患楊梅瘡。餘毒尚伏。經絡適因瘡後。氣血
不足。舊毒感動。故痛而暴也。以當歸芍藥甘草
牛膝鈎藤以仁木通白蘇皮用土茯苓四兩煎
湯代水煎。前藥服下而痛止。咳嗽亦除。脉緩其
半。連服數劑。大効。精神漸復。乃起而督工視事。
冬至日。為酒興鼓舞。縱慾無忌。次日腰如束縛。
足面亦疼。左眼赤。小水短。足底有火。從兩膝直

冲其上。痛不可言。予以當歸鈎藤甘草白芍藥
牛膝以仁石斛紅荖生地黃柏調理三日。症已
守定。畧無進退。適大雪寒凍。殊甚。有女醫為渠
宅所親信者。因其大便燥結。一日夜服玄明粉
一兩五錢。大便且不行。而腰痛愈猛。兩足攣縮。
氣息奄奄。一語而三換氣。面青慘。渠自覺危急。
迺喚內人及弟叔。囑其後事。天明予至。診之。六
脉俱伏。痛使然也。扣其由。乃知服玄明粉所致。
予曰。症雖熱。便雖燥。但公病不在腸胃。而在經
絡。筋骨間。徒瀉腸胃。無益也。且冬月陽氣閉藏。
誤瀉。則陽氣虧。走來春無發生根本矣。今四肢
拘縮。腰膝痛劇者。由日來天令寒極。經絡凝滯
也。寒主收斂。法當溫散。寒邪之標。使痛定。然後
復治其本。庶可保全。乃用桂心杜仲炙甘草蒼
朮破故紙五加皮連與二劑。痛定而四肢柔。和
飲食始進。予知渠宅素喜速効。予適有荆溪之
佳。迺宣言曰。月下之疾。在經絡。願今天令嚴寒。
幸寧耐。以俟春和。為足下拔去病根。渠宅不以

予言為然。迺用張雲溪調理。予亦讚張之可守。蓋張氏藥用養血清熱。雖不去病。亦不害事。迨二月。太守公歸。迺改用沈春宇沈揣渠。必以酒色而致陰虛。迺純用滋陰降火之劑。以為旬日可奏功也。及調治月餘。畧無影响。予從荆溪歸。而謁渠。為三月初旬也。渠聞予至。即以沈藥呈予。且語予。公許春和。拔除病根。此其時也。予知太守公方篤信沈。隨以溫語慰渠。曰。沈公名士也。可使彼展盡底蘊。沈又調理半月。以無功而

行。沈去。予再以煨腎散進。大瀉五六度。四肢冰冷。舉家大恐。以予瀉之為非也。予曰。病從此日減矣。夫奚憂。後進理脾藥。服數帖。神氣始轉。腰膝柔和。可下床。舉數步矣。方始信。而問予曰。人皆以補為治。公何得病源之真。於三月之前。先已預定。節節如公語也。予曰。此楊梅瘡餘毒。伏於經絡。豈補劑所能去哉。予故先為疎通濕熱。然後以補劑收功。則無反覆之虞。後仍以葳靈湯末子二錢。入猪腰子內。以酒煮之。又瀉一二

疔瘡

度。病根盡拔。改用以仁當歸生熟地黃白芍藥牛膝黃柏丹參龜板。調理全安。七十七。潘見所老先生有一小盛。年可十六七。發熱於午後。城中周友以為陰虛。而為滋陰降火。服三十餘劑。熱益加。且腹中漸脹。面色清白。仍以六味地黃丸加黃柏。知母。麥冬。五味子之類。又三十劑。而腹大如斗。堅如石。飲食大減。髮黃成穗。額顛光亮。口渴不可言。兩腿大肉消盡。眼大。面肉皆消。肌膚枯燥。如松樹皮。奄奄一骷髏耳。予

觀其目之神。尚五分存。欲為治劑。潘公曰。下諸人語。予曰。形症如是。死在目下。尚可服藥。予曰。症非死候。為用藥者誤耳。譬之樹木。若根本壞。而枝葉枯焦。非力可生。今焦枯乃斧斤傷其枝葉。而根本仍在也。設灌溉有方。猶可異生。安可遽棄。予以神授丹。日用一丸。煮猪肉四兩。飼之。十日。腹軟。其半。熱亦消。其半。神色漸好。潘見老語。予曰。此何症。公能肉枯骨如此之神。予曰。此瘡積症也。彼誤認為腎虛。而用補陰之藥。是

滯益滯。腹為得不大不堅。公曰。彼純用寒而熱愈熾。君用非寒而熱反退。此何說焉。予曰。此熱。迺濕熱。由脾虛所致。補陰之劑。皆溫類。蓋脾屬土。惡濕喜燥。今以大薑會丸肥兒丸調理一月。可全瘳矣。公曰。善。微先生。此僕已為泉下物矣。七十八

少司空凌絳泉翁。年已古稀。原有痰火之疾。因正月上旬。為令孫大婚過勞。偶占風寒。內熱咳嗽。痰中有血。血多而痰少。痰堅不易出。鼻流清水。

舌生芒刺。色焦黃。語言強硬不清。大小便不利。喘急不能睡。亦不能仰。惟坐高椅。椅前安棹。棹上安枕。日惟額伏枕上而已。市醫環治半月不瘳。敦予診之。兩手脈浮而洪。兩關滑大。有力。知其內有積熱痰火。為風邪所悶。且為怒氣所加。故血上逆。議者以高年見紅。脈大發熱。為懼。予曰。此有餘症。諸公認為陰虛。而為滋陰降火。故不瘳。法當先驅中焦痰火。積熱。然後以地黃補血等劑收功。斯不失先後着也。翁以予言為然。

用瓜蒌石膏各三錢。橘紅半夏麩桑白皮煎。杏仁酒苓紫蘊子水煎。臨服加入蘿蔔汁一小酒盞。一劑而血止。次日診之。脈仍浮而洪大。尚惡寒。予曰。古云。傷風必惡風。傷寒必惡寒。此其常也。只因先時失於清散。表中之熱未徹。竟用滋陰之劑。又加重便收斂。降下太速。以致風寒鬱而不散。故熱愈甚也。改以定喘湯一劑。而喘急減半。再劑熱退而不惡寒。復為診之。兩手浮體已無。惟兩關之脈甚鼓。指此中焦痰積膠固已矣。不可不因其時而疎導之。以清中九全當歸龍會丸共二錢進之。其夜大便所下稠粘穢積甚多。予憶朱丹溪有云。凡哮喘火盛者。以白虎湯加黃連枳實有功。此法正絳翁對腔劑也。與十劑外。以清中九全雙玉丸夜服。調理而安。七十九

周鳳亭公。年五十有八。正月腸風下血。又飲食過傷。大便而朱友以枸杞地黃膏一斤進之。不知此公肝氣素盛。中焦原有痰積。且多思傷脾。又

位卯木正旺之月。投以地黃枸杞。適以滋其濕。而益滯其痰。耳由是飲食減少。肌肉消。腹中痞滯。又吳友以歸脾湯進之。詎知濕熱未除。先用溫補。是以油撲火勢成燎原。以致大便秘結。口乾舌燥。據巳午未三時。中焦蒸蒸發熱。煩悶。酉時而退。此皆濕熱壅滯於脾。無疑矣。且面色黃中帶黑。下午足面有浮氣。皆是濕熱傷脾之徵。法宜清肅中焦。微去濕熱。則飲食自加。而新痰不生。宿痰磨去。庶五穀精華。不生痰而生血矣。血充則精神長。而肌肉可復。且秋來無瘡痢之患。公曰。清肅中焦。當用何劑。予曰。二陳湯加薏以仁。酒炒白芍藥。麥芽。以養脾而消痰。以枳實黃連。洩痞而去熱。以青蒿。分利陰陽。而消其黃。葛根。升引清陽之氣。使肌熱清。而口渴可止矣。當服十劑。公曰。先生之方善。但枳實黃連。恐體虛者不足以當之。予曰。惟此二味。適可以去公之病根。舍是則不效。遂中焦有餘之疾。非此不能去。亦非他藥可代也。服至十劑。病已全愈。

而諸疾皆愈。公遽中止。不復服。定至七月。盡果發痢疾。而以木香檳榔丸下去。稠積甚多。廼追悔予言。而延之診。予教以前方。仍服十劑。夜以丹溪保和丸調理。則永無瘡痢之患矣。八十令郎采石先生。中焦濕熱。生痰否悶。五更倒飽。且下午兩服。或膝下筋脉。抽掣疼痛。時常噉氣。面色帶黃。間常憂遺。予以清氣大安化痰丸。及猪肚丸。二方調治而安。猪肚丸用白朮五兩。苦參酒炒二兩。杜蠟煨過三兩。為末。將雄猪肚子一具。摘去油。甘草湯洗過。將藥裝入肚中。縫其口。飯中蒸極爛。為度。搗極勻。為丸。此方極健脾。去濕熱。固精丸也。清氣大安化痰丸。用白朮四兩。橘紅半。夏山查各三兩。黃芩黃連俱生。姜汁炒各一兩。五錢。枳實瓜萋仁各二兩。白芥子蘿蔔子各炒一兩。姜黃碱水煮乾一兩。青黛五錢。麥芽取麩打糊。為丸。菜豆大。每食後及夜。茶送下。二錢。八十一

令孫女纔六歲。忽發寒熱。一日過後。腰脊中命門

穴間骨節腫一塊如大鰻頭之狀高三四寸。自
此不能平身而立。絕不能下地走動。如此者半
年。人皆以為龜背癩疾。莫能措一法。即如幼科
治龜背古方治之亦不効。予曰。此非龜背。蓋龜
背在上。今在下部。必初年乳母放在地上坐。早
之過。比時筋骨未堅。坐久而背曲。因受風邪。初
不覺其漸。入骨節間而生癢。涎致令骨節脹滿
而大。不急治之。必成痼疾。今起未久。可用萬靈
黑虎比天膏貼之外。再以晚蚕沙醋洗炒熱。絹
片包定於膏上帶熱熨之。一夜熨一次。再以歲
靈僊為君。五加皮烏藥紅荅防風獨活。水煎服
之。一月而消其半。骨節柔軟。不復腫硬。便能下
地行走如初矣。人皆以為神奇。此後三箇月。暮
不能行。問之足膝痠軟。載身不起。故不能行。予
知其病去而下元虛也。用杜仲晚蚕沙五加皮
蒼以仁當歸人參牛膝獨活蒼耳子僊茅水煎
服二十劑。行動如故。八十二

內文學屢樓患虛損咳嗽。書經。丁氏。長

富翁女也。軀甚肥。性甚躁。患痛風。手不能沐
梳。足不能履地。凡痛處畧腫。呻吟喊叫。比有朱
遠。參氏為時推重。夫婦倚朱治者七越月。纖毫
不減。吳九宜翁廼舉予治。至其家。屢樓大兄岳
樓。旦暮與偕。診畢。語岳樓曰。令弟之症。雖易見
功。然非百日不能斷根。丁氏症。十日便可刈其
根。但恐不能盡吾劑。奈何。岳樓曰。何謂也。予曰。
令弟咳嗽。由肺火未清。誤服參朮太過。而然。但
為清肺。神肺咳可立止。止後以補心安神之劑。

養之。則萬全矣。藥用麥門冬桑白皮白藥子貝
母桔梗甘草黃芩枳壳十帖。咳嗽全止。惟心血
不足。神不固精。以酸棗仁遠志麥冬蓮心丹
參調養百日。果能出戶。肄業。丁症。廼濕痰凝滯。
經絡作痛。朱公作血虛。而投以地黃芍藥當歸
人參牛膝之類。宜其痛愈加。而病愈久也。今必
須燥濕流動之劑。踈決一番。庶經絡通暢。雖不
服補劑。而五穀精華。足以自充。但踈決之劑。不
能止痛。恐其不予信而中止也。岳樓曰。先生既

已言明。惟命是聽。用二陳湯加烏藥葉蒼朮。便
 驚海桐皮南星服至五帖。果不憚而欲止藥。兵
 樓曰。孫君已先言十帖見功。今過半。何不勉強
 而使功虧一篑哉。又服一帖而止。百般強之不
 從。迺揚言曰。請醫療痛而反加痛。吾何藥為。後
 四劑斷斷乎不敢奉命矣。時已申刻。予知其富
 家嬌態。亦不強服。隨以羌荊醋炒過三分。海金
 沙一分為末。白湯調下。至晚瀉一次。下稠痰半
 盆。足痛減大半。稍能動止。初更後吾輩酒猶未
 散。忽報云。腹中大痛。促予進看。行至後堂。內中
 人出而止曰。病者卒矣。不勞進看。予曰。此必痛
 厥非長逝也。烏可不進一看。至即冷汗淋漓。死
 坐溺器。面青息斷。執而診之。手冷如冰。但六脈
 俱在。惟沉伏耳。知其為痛極使然。用生姜湯灌
 之。而甦。徐語近侍女使曰。適來腹中痛甚耳。後
 火光熾出。肛門如焚。大响一聲。不知瀉下何物。
 衆看之。迺血餅一條。長六寸。闊半寸。鱗片俱
 在。盆中尚能遊動。

可好否。予應之曰。此充物也。得下豈不好。但丁
 症實由痰作。予特為行痰。初不知其有虫。如是
 第藥中有羌荊。迺殺虫之物。故偶中。亦令弟之
 福也。次日手足皆能動。仍以二陳湯加以仁紅
 荊五加皮四帖。脫然如故。閱宅以予不矜功而
 益重予。八十四

金寄間令堂。暑月患痢。小腹窘迫。胸膈膨脹。口舌
 焦渴。右寸關脈洪滑。左脈絃。迺氣鬱食積。癖也。
 先與木香檳榔丸開而下之。微利一二度。因口
 渴食西瓜一片。即惡心而吐。昨日大便利後。胸
 膈寬快。就進飯一椀。致腹飽悶。兀兀欲吐。所吐
 皆痰涎。迺以溫膽湯加減治之。半夏四錢。枳實
 一錢五分。竹茹二錢。橘紅茯苓各一錢。甘草五
 分。姜連八分。生姜五片。水煎服之。一飲而胸膈
 舒暢。便能就枕而睡。惡心頓息。痢亦尋止。八十
 五

中宇之婦。汗出如雨。昏昏憤憤。兩手無所着落。
 婦人足端之氣。即昏憤益甚。氣促

不能以息。稍近風則嘔惡暈厥。與九龍鎮心丹
一九服下即稍定。必間則又發。始知胸喉中有
物作梗而痛。湯水難入。即藥僅能吞一口。多則
弗能嚥下。迺以蘓合香丸與之。暈厥尋止。心痛
始萌。昨日六脉俱伏。今早六部俱見。惟左寸短
濇。知其痛為瘀血也。用玄胡索桃仁丹皮丹參
青皮當歸香附。其夜仍暈厥一次。由其痛極而
然。再與玄胡丹皮桃仁丹參香附青皮烏梅人
參貝母桂枝赤芍藥服此痛減大半。迺自云心

虛有熱頭眩。加山梔仁。居常多夢交之症。近更
甚。以其心虛故也。人參石斛丹參貝母當歸白
芍藥酸棗仁酒連香附調理全安。八十六

金文學達泉先生令政。暑月患痢赤白。一日夜三
十餘度。後重腿急。口渴。小腹痛。孕已二月。幸而
腰不痛。右手脉絃。左脉滑。與白芍藥三錢。黃連
黃芩當歸陳皮香附各一錢。桂皮木香各五分。
水煎服。外與香連丸服下。後重稍輕。因進飯太
早。其夜仍十數度。次早診之。右絃減半。前藥前

或吞女金丹一帖。痢減大半。六脉已和。但軟弱
此氣血不足。宜從補養。用八珍湯加陳皮香附
阿膠條芩一帖全安。凡孕婦痢疾。後重稍輕
腹痛稍減。獨痢不止。必須補養血氣為主。加調
養之劑為佐。庶可保胎。斯亦丹溪虛而痢自
止之意也。八十七

金元岩文學。下午發熱。痢下紅多白少。一日夜七
十餘度。後重下墜。飲食不思。左脉細數。右脉滑。
此陰虛之候。詢知二日前曾夢遺。續得痢疾。陰

虛明矣。但滑脉。主食積法。當先補後攻。迺與小
建中湯一帖。白芍藥三錢。桂枝七分。粉草酒連
酒苓各八分。當歸一錢。枳殼五分。水煎飲之。夜
半復診。脉稍克。指改與枳殼三錢。桃仁一錢。當
歸四錢。煎熟。吞木香枳殼丸一錢五分。至天明
大便瀉三次。則見糞矣。次日午進飯。又食火肉。
隨即大便頻。併後重如前。與山查枳木丸一服。
不效。再為診之。六部皆虛軟無力。獨右關滑。此
進肉飯太早。脾胃弱。不能消磨。宜健脾胃氣。兼為升

舉人參黃耆各二錢白朮一錢升麻三錢防風
藿香炮姜粉草各五分白芍藥一錢半茯苓八
分連進二帖痢減而後重寬因食狗肉過多復
傷脾氣前方加砂仁山查調理全愈六十八

金文學達泉先生因食肝白朮為傷續又冒風就
成瘧痢日夜四十餘度小腹痛甚每登廁汗出
如雨下迫後重小便澀痛頭疼口渴下午發熱
天明始退左脉浮絃而數右軟弱中部稍滑此
內傷飲食外感風邪瘧痢併作法當速治否則

深秋陽氣潛藏邪因陷下未易瘳也迺先與柴
苓湯一劑小便即清不痛瘧發時寒多熱少晚
與人參敗毒散加減人參乾葛防風桂枝粉草
茯苓枳殼各五分柴胡白芍藥各一錢水煎飲
之次日頭痛痢疾俱減夜纔起三次改與補中
益氣湯加酒芍桂枝白芍藥其夜瘧止但微熱
再改胃風湯人參白朮桂皮各二錢白芍藥四
錢當歸一錢五分芍藥川芎各八分酒芍酒連
各一錢炮姜二錢地榆五分服後寒熱珍迹夜

起一次已是真真前方減去桂枝再三劑而
櫛出戶矣八十九

金寄間先生七月既望患頭痛口渴汗大洩不飲
嘔惡發寒熱間日一發而發於陽日迺為疹之
兩寸洪大有力左浮絃而數右脉稍軟亦絃長
此少陽與陽明合併為瘧以柴葛解肌湯主之
柴胡葛根各二錢白芍藥石膏各三錢粉草桂
枝各五分知母一錢姜三片水煎飲之次早左
脉稍退迺與補陰鱉血何首烏丸截之又與黃

耆芍藥湯一帖以防作痢白芍藥石膏黃耆各
三錢桂枝五分知母粉草各一錢柴胡七分姜
三片煎服後加人參七分瘧竟全止而向安矣
九十

淮陰胡少泉翁麗水縣三尹也令郎年弱冠患夢
遺百治不應體倦而氣弱食少而汗多四肢痠
軟頭眩肌熱將成瘵疾知予在理刑吳比部衙
中教予為治其脉兩寸短左寸尤甚餘部滑數
予曰即君之脉也氣大弱蓋心者神之舍神者

精之主。神旺始能固精。今遺不禁。由神弱不能固攝其精。致多妄洩。時近端陽。諸症叢集。迺無注夏病也。法當養心安神。庶不成瘵。翁曰。然。前此諸公。每為滋陰降火。多不見功。徒見損脾減食。今先生主以養神。願以先生是聽。迺與人參黃耆石蓮子酸棗仁蓮花心石菖蒲遠志當歸補心安神為君。俾精固汗斂。經曰。汗者心之液。汗多則心血愈虛。故佐以甘草白朮黃柏麥門冬五味子。魚治注夏。使飲食加而四肢壯。緩而圖之。可萬全矣。藥進甚妥。竟以此方調理。果精固神全。肌熱盡退。又令愛及笄。頭痛微熱。經水愆期。日多咳嗽。食漸減。肌漸消。口渴。睡卧不寧。喉中血腥。四肢不勞而疲。體不動而汗。六脉絃而且數。左關長出寸口。予以逍遙散加石斛丹參牡丹皮酸棗仁山梔子麥門冬調理而瘳。又一文學。曾士也。忘其姓氏。與胡少泉翁為碩交。有奇疾。兩足不痿不痛。每行動。絕不聽其所用。或扭於左而又墜於右。或扭於右而又墜於左。

玄而行。不能一步步止。走此亦目之稀覯。莫不識為何疾。書無所考。予臆度之。由筋軟不能束骨所致。故行動則傾斜。扭墜也。夫筋者肝之所主。肝屬木。木縱不收。宜益金以制之。用人參黃耆白芍藥以補肺。金意以仁虎骨龜板杜仲以壯筋骨。以鉄華粉專制肝木。煉蜜為丸。早晚服之。別後三載。族姪埋問公敬亭南還。道出淮陰。胡少泉寄語云。向者鉄粉所愈之疾。准人極以為奇。遠邇敦錄。其方布傳。以頌自恨貧儒。弗能致一片為謝。且募額手南斗。以識不忘云。九十一

一吳氏嬪有隱疾。其夫訪於予。三造門而三不言。恹恹而去。後又至。亦言而面先。請予因詰之曰。諸來詣予者。皆謂予能為人決疑。瘳急也。今子來者四。必有疑于中。疑而不露。一語雖百來而疑終不可決。疾終不可去矣。且盈天地間。怪事甚多。非聖智所能盡識。然亦非聖智不能通瘳也。彼折肱錄醫醫醫鑿等集。怪症瑣毛。假非明

醫決而治之何以續後人之聞見也其夫迺倪
首徐應曰言之無任主臣先生長者即言之諒
無哂山婦子戶中先生一物初長可三寸今則
五寸許矣狀如堅筋色赤大可拱把脹而且痛
不便起止憎寒壯熱寢食俱減羞澁于言每求
自盡聞先生能為人決疑療恠不啻扁鵲特相
訪而祈一決予曰疾成幾年對曰將百日子曰
蓋凡所謂恠者耳目無所聞觀書籍無所註載
今所言者迺陰挺症也書有所徵奚足言恠夫

卷二

十一

曰陰挺自而生何法而治幾何月日而可愈
也可無子生育否予曰子戶屬厥陰肝經肝
屬木肝有濕熱故生陰挺猶木有濕熱而生蘆
然法當以龍胆瀉肝湯及蠟皮散當歸黃芩牡
蠣蛻皮赤芍藥為末每用一錢空心米飲調下
即而治之大計月餘可消釋也奚生育之有妨
哉其夫合手頂禮於地曰願如藥王言敢微一
料隨按法措劑界之而去甫三月來報云前疾
果如所言消釋無痕茲汛期一月不至敢問

曰非力弱不能行。迺左腳不可動。動即痛。應於心。是以一步不能舉也。予倪思若色若脉皆非死候。胡治而益劇也。此必腸癰。左腳莫能舉。是其徵也。與營衛返魂湯加金銀苓為君。與四帖酒水各一碗煎服。一帖痛稍減。二帖下臭膿半桶。痛全減。腹上膏藥不須手揭。自脫而下。由熱去而膏脫也。四帖完。其婦同匠詣吳宅拜謝。予并未善後之方。吳宅見之。一族皆驚。九十一王祖泉大便裏急後重。腹痛日夜下紫黑稠粘。三四十度。市中凡有名者。雷同痢治。自秋歷冬。三越月不瘳。形色瘦瘵。是箇厭舉。即勉強。僅一盞而止。眼闔懶開。悉以為不治。棄去。訪予脉之。六部濡弱。觀其所下之色甚晦。如茅苗汁之狀。予曰。觀此色非痢。迺臟毒下血。症醫說中。人參樗皮散。正此對腔劑也。即製與之。其夜果減半。終劑全愈。方以人參樗根白皮各二兩為末。每空心米飲調服二錢。忌肉汁生菜魚腥。九十四癸巳秋仲。南都大司馬袁洪溪老先生以兼署工

部都察院操江印。日衝暑往來各衙門。而經累其政事。致發熱燥渴。因解燥渴而過食冰浸瓜梨新藕。遂成洩瀉。小水短少。醫以胃苓湯加滑石木通車前子利之。而瀉止。大便又因之結燥。艱澀不堪。迺用潤腸丸。復瀉不止。又進以前通利之劑。瀉雖止。而小水竟不得流通。直遂臍下脹急。立起解之。則點滴不出。則則流之不竭。以頻取夜壺。致通宵不得寐也。治半月餘。而精神削。寢食廢。聞予寓崔勳部衙。而徵予治。初見即告以受病之源。又謂都城諸醫俱不識為何症。將認為瘧。則立解時。點滴不出。認為秘。則則涓涓而流。謂為脾約。大便又不結燥。謂氣虛下陷。心血不足。而補中益氣湯與安神丸服過十晝。夜無益。雅聞先生高手。願一診以決之。探其脈。兩寸短弱。關緩大而尺洪大。語之曰。此餘暑未鮮。而司馬素善飲。濕熱流於下部也。今已下午。恐診之未準。俟明早細察。而再定方。公曰。延頸。吾子久矣。適所言近。願亟求一劑飲之。徹夜

問一睡予不得已以益元散三錢煎香薷湯進之。畧無進退。次早復診。六脉如昨。予思之而恍然。悟又語之曰。此症尿竅不對也。司馬曰。各出何書。予曰。內經云。膀胱者。脬之室也。脬中濕熱。下墜。故立解而竅不對。小便因不得出。則則不下。墜而尿滲出。膀胱亦以竅不對。小便雖流。滑而流亦不能通達。直遂。故了而不了也。治惟提補上中二焦。元氣兼清。下焦濕熱。斯得矣。又有一法。今氣虛下陷已久。一兩劑未能取效。安得伏枕而睡。且此不寐。非心血不足之故。因着心防閑。小便之了而不了。而不敢寐也。暫將舊衣。或布襯於席上。不必防而任其流出。又免取夜器而勞動其神。自然熟睡矣。以補中益氣湯提補上中二焦之元氣。加黃柏。知母。祛下焦之濕熱。夫清陽升。則濁陰自降。脬無濕熱。則不下墜。竅可對。而病可瘳矣。司馬忻然。請藥。夜如法視之。果嗒然一睡。相忘其尿之出不出也。次早視視布。雖濕而不甚。以久不闔目。得此一睡。神

氣頓回。胸臆爽快。如未病者。調理四日。而病全安。司馬大喜。而欲留久住。緣漕運李公相延之。丞弗克也。差大馬。舡鼓吹。送予阡關而還。九十五
崔百原公者。河南人也。年餘四十矣。而為南數部。郎。患右脇痛。右手足筋骨俱痛。艱於舉動者三月。諸醫作偏風治之。不效。馳書邑大夫。祝公徵予治。予至。視其色蒼。其神固。性多躁急。診其脉左絃數。右滑數。時當仲秋。予曰。此濕痰風熱為痺也。脉之滑為痰。絃為風。數為熱。蓋濕生痰。痰生熱。熱壅經絡。傷其營衛。變為風也。公曰。君何以治。予曰。痰在經絡。雖不害事。然非假歲月不能愈也。隨與二陳湯。加鈎藤。蒼耳子。薏以仁。紅朮。五加皮。秦艽。威靈。佛手。竹瀝。姜汁。飲之數日。手足之痛稍減。而脇痛如舊。再加鬱金。川芎。白芥子。痛俱稍安。予以赴漕運李公召而行。速勸公請假。緩治。因囑其慎怒。內觀。以需藥力。公曰。內觀何為主。予曰。正心。公曰。儒以正心為修

與先務。每苦工夫無下手處。予曰。正之為義一止而已。止於一。則靜定而妄念不生。宋儒所謂主靜。又曰。看喜怒哀樂未發以前。作何氣象。釋氏之止觀。老子之了得。一萬事畢。皆此義也。孟子所謂有事勿正。勿忘勿助長。是其工夫節度也。公曰。吾知止矣。遂上疏請告。予錄前方畀之。北歸。如法調養。半年而病根盡除。九十六

其年正月四日

卷二

六四三

醫案新都治驗三卷目錄

瓊兄內傷飲食外感風邪

程龍坵翁每行動即作熱發渴嘔惡腰與環跳穴

常痛

汪松崗原傷於酒夜分發熱咳嗽咯血

族妹經不行者八十日每飲食入腹即疼痛吐出

通止

孫萃野喉痛類車腫

顯兄每辛苦及酒多則咯血數口

吳遂兄濕熱發黃

族侄明之痰火上逆大吐痰沫因而嘔血一涌數

族有發明

族嫂程氏肺癆

侄媳葉氏身面四肢浮腫

族侄孫伍仲善飲好內小便血淋疼痛今春吐

紅發熱

亮卿令愛右目紅腫

大學必竹眼紅腫

一 婦產後惡露不盡腹中作痛 十四

程好吾令孫右耳後生毒腫痛 十五

華岳令堂右手臂肢節脹痛 十六

程西峰令眷血痢 十七

程七護兄臍腹右邊疼痛小水不利嘔吐不進食

程社貴兄醉後御色次早胃脘痛極 十九

汪松崗令眷左脇痛咳嗽內熱 二十

贊皇令堂產後左脇痛甚 二十一

許少峰中風先兆 二十二

朱宅女眷熱入血室 二十三

孫熙宇肢節腫痛痰多嘔惡病多夢鬼 二十四

愛泉傷風咳嗽聲啞右邊不能貼席 二十五

汪婦戴氏有妊五月忽血大下午後發熱 二十七

華岳迺眷胃脘疼痛頭暈舌麻 二十七

吳人峰先生內人兩脇脹急痛拒胃脘 二十八

陳鉄兄內人產後腹痛發熱下痢膿血 二十九

石洲迺眷因產難子死憂悶小腹有塊作痛復

因多食圓眼脹益大脹堅如石大如斗氣促不

安有發明 三十

程姬年八旬頭暈脚軟大便溏洩小水淋瀝 三十一

程道吾先生令政夜覺而驚時常暈厥 三十二

一僕婦瘟疫以勞食復作 三十三

程方塘年六十四風癱不能步者三載腿肉盡消

汪省吾瘡三日一發發於夜 三十五

汪東之夫七月初旬虛陽口瘡有發明 令眷姓

中咳嗽 三十六

吳東渠瘡後虛憊 三十八

吳西源令眷以艱子多鬱多思肌肉盡削皮膚燥

揭遍身生瘡體如火燎 三十九

族嫂程氏環跳穴邊腫痛寒熱并發不能動止 四十

恒宇瘡後遭跌環跳脫出不能復收 四十一

任孫女周歲發慢驚 四十二

程必湖以飲生酒而浮胸脹 四十三

吳斗一原有腸風又感風邪發熱多痰腹痛下痢

任孫二水體甚肥胖患溫瘧症 四十五

吳興張錫泉先生左脇皮裏膜外疼痛 四十六

族任雲岳患偏墜臍腹腰俞脹痛四十七

一婦妙齡感風寒致成鼻淵四十八

程丙峰瘀血發黃吐出穢惡如爛猪肺狀大便色

如墨有發明 四十九

予表嫂小產後腹痛暈厥五十

陳士美傷寒熱症瀉底有發明 五十一

程松逸兄酒疸五十二

仲諫患跨馬癘有發明 五十三

一婦咳嗽痰中有紅五十四

周佃任春溫鼻衄寒戰有發明 五十五

汪氏婦腹脹如斗五十六

仲登陽症侶陰有發明 五十七

汪希明性躁痰火咳嗽吐紅五十八

祝弘吾潮熱咳嗽汗流不止五十九

汪宥翁老年勞倦感冒胸膈大熱而痞六十

汪鍊兄內人經水紫黑血塊不止六十一

祝相如令政姪發寒熱六十二

文台壯年咳嗽吐紅六十三

邵伯成女經行而浴感冒大發寒熱嘔吐煩躁六十四

金氏婦血崩後四肢浮腫六十五

張雲門令郎囊癰六十六

朱宅內眷懷妊受驚而成子懸有發明 六十七

胡鄰泉女吐血潮熱六十八

汪思石令堂怒後暈厥六十九

侄孫君實遍身筋骨疼如虎噬七十

葉子黑內人疫後虛憊七十一

孫如亭令政右眼骨突生白泡二寸餘嘔吐眩暈七十二

吳勉全腹痛欲死有發明 七十三

黃頤全內子產未弥月醉犯房事血來如崩七十四

程心童兄類腮紅腫七十五

程六十喘後發腫七十六

程七護夫發熱背痛伏梁積塊下痢紅白七十七

程孺人黃氏春溫過時熱病七十八

程有望孺人月汛常止不止七十九

程舍近洲胸脇脹痛有發明 八十

源金先生內人吐血洩瀉發喘有大發明

孫合溪翁八旬而發寒熱咳嗽汗出不止能速

聲八十二

孝廉方叔度令嫂汪氏脹滿八十三

兵天威大便癰八十四

文貴者時疫漏底發熱譫語有發明

鍾澤程夢奎孺人哭子過傷因發寒熱有發明

歛涪口汪召南夫令郎盛脹有發明

岩鎮鄭景南夫痰飲積塊躁動不止有發明

醫案三卷

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人 余煌

徐景寄

子 泰來 全閱梓

朋來

新都治驗

瓊兄內傷飲食外感風邪洒淅惡寒發熱煩躁不

寧已經表汗瀉吐之後小水短赤口渴腹中疼

夜不能睡耳聾氣塞神魂不安懊懷不已予脉

之兩寸滑大左關絃右關滑兩尺皆絃皆七至

據此迺少陽陽明兩經合病仲景云渴而小便

不利者當利其小便先與紫苓湯加竹茹進之

耳稍聰稍得睡熱仍不退聞食氣即嘔以濟生

竹茹湯加人參麥冬黃連外與辰砂六一散三

錢服後神稍清手足心仍熱用竹葉石膏湯而

熱亦不退且懊懷殊甚合目即譫語按仲景謂

傷寒汗吐下後懊懷不得眠者熱在胸之間

宜輕湯之。以梔子豉豉湯主之。服後晚間仍不
得眠。兩耳氣塞難當。改以小柴胡湯合白虎湯
進之。即得睡。睡中汗出二次。耳頓通利。因進食
早。又發熱口渴。舌上黃胎。此陽明餘熱復萌。乃
用石膏七錢。甘草一錢。知母三錢。黃連一錢五
分。百合竹茹各一錢。竹葉三十片。急進而熱全
退。始得獲安。

程龍坵翁。每行動即作熱。發渴嘔惡。腰與環跳常
痛。脉左沉細。右寸滑。關尺濡弱。此上焦有痰火。

新都手卷

下焦有濕熱。治當流濕舒筋。然後施補。先用以

仁三錢。蒼朮。葳靈仙。牛膝。黃栢。烏藥。葉紫。荆皮
各一錢。紅荅。桂皮。防己。各五分。水煎。服外。以鹿
茸。虎骨。晚蚕。沙仙。茅黃。栢龜板。蒼朮。牛膝。杜仲
蜜丸。服之而安。

注。松齋翁。原傷於酒。夜分有熱。咳嗽咯血。不思飲
食。或嘔氣不調。左寸脉孔關澁。尺弱。右寸短。關
滑。此胃中痰火正旺。氣血俱虛。宜先清胃保肺。
然後大補。姜冬知母。寒水三十片。黃芩。人參。牡

丹皮白芍藥當歸貝母桑白皮煎服一帖。紅
未止。加側柏葉茅根四帖而紅止。過後四月。又
為怒氣所傷。血又動。左不能睡。莖仁滑石紅荅
當歸人參貝母山梔仁甘草香附青皮牡丹皮
煎服而安。予囑渠令子曰。寄語令堂。諸凡得意
事。可與尊翁知之。如不得意者。切不可使之聞
也。蓋肝為藏血之腑。况血去多。肝火剝燥。心主
不足。內經云。主不明則十二官危。不可不謹防
之。且左不得睡。肝脈可知。予甚為尊翁慮。後三
年。果為怒復。乃命使迎予。予固辭謝曰。向曾訂
囑。今病之來。非不佞所堪任也。不逾旬而歿。三
族妹經不行者。十日。每飲食入腹。即疼痛。必盡
吐出。乃止。居市中。亦吐酸水。上焦熱。下焦寒。大便
半月始一行。其飲不進者。四十日。六脉皆數。左
滑。右軟弱。妹能事者。以其夫多病。且不諳世故。
由是怏怏病從思慮而得。恐成膈症。今大便燥
結。吐酸。乃膈之徵。急宜拂慮。庶藥有功。先與丁
靈丸一粒而吐止。繼用溫膽湯加大腹皮姜連

痛吐全安改以二陳湯加香附條芩山梔仁丹
參砂仁調理兩月經行大便始潤而膈症斯不
作矣四

孫華野脉沉而數喉痛頰車腫兩太陽作脹疼
遍身皆脹增寒發熱乃痰火上壅而變風熱
將欲作毒也宜急治之薄荷甘草升麻白芷石
膏枳壳天竺粉栲梗大力子連翹玄參一帖而
愈五

顯兄每辛苦及酒多則咯血數口脉兩寸皆短弱
關尺洪數以耳中有痰火而下焦有陰火由壯
年酒色所傷以耳以丹參滑石各三錢白芍藥
二錢麥冬貝母菴仁紫苑牡丹皮各一錢當歸
七分甘草五分煎服而安六

歙邑吳遂兄木商也在吳興年七十因冒雨勞力
汗出又以冷水濯浴因而發熱口渴心與背互
相脹疼小便長而赤舌上黃膩夜不得卧眼目
如金皮膚盡黃其與之遠走不敢苦劑
謂其年高不宜此藥請歸家乃致請予治診

得左脉浮數右濡弱兩手皆有七至予曰此
熱發黃症也病雖重年雖高有是症宜有是藥
毋用倉惶乃以紫河三錢酒芍葛根三錢黃芩
天荖粉各一錢人參七分粉草五分連進二帖
晚得微汗即能睡次早熱退其半舌苔稍淡潤
不焦燥矣胸膈餘熱作煩身黃如舊以竹茹青
蒿葛根各一錢人參麥門冬天荖粉知母各八
分白芍藥六分二帖熱退食進精神陡長後與
補中益氣湯加青蒿麥門冬天荖粉十帖而眼

目肌膚之黃盡釋然矣吳興諸公悉服其精當
各錄方而傳七

族姪文學現之以作文過勞痰火上逆大吐痰沫
因而嘔血一滿數椀昏暈汗出奄奄而卧畧不
敢動稍動即嘔吐而血隨出色鮮紅飲食湯水
皆不敢入入即吐而眩暈血即隨之里有發君
程聞野氏為之診駭而走曰血如涌泉體熱脉
大眩暈而藥食難進此無佳兆乃速予治予診
謂其語其乃足

此勉之以程言告予予曰看症要圖活勿拘泥
 據經云心主血肝藏血又曰怒則氣上又曰脈
 虛身熱得之傷暑今左脈絃大右脈虛大明之
 不獨作文勞心動火且亦被怒傷肝抑又為暑
 所逼以致木火上冲眩暈作吐經曰諸風掉眩
 皆屬肝木諸嘔吐逆皆屬於火又諸動屬火內
 為木火上衝外為暑氣所迫故吐而汗多血隨
 吐出也醫貴識病有是病則有是藥予持以白
 丸子三錢解其暑氣清其痰飲抑其衝逆則吐
 可止吐止氣平則血自能歸經服後果啞然而
 睡醒則吐止食進眩暈尋已繼用滑石香薷各
 三錢甘草五分黃連白扁豆各一錢五分竹茹
 一錢四帖全安

從嫂程氏年近五十患咳嗽吐臭膿血一日夜一
 概餘發熱晝輕夜重肌肉大瘦六脈浮而洪滑
 且數人皆謂吐血身熱脈大法在不治也予
 非吐血比也此係燥熱傷肺又為怒氣所激
 濁痰滯於肺之氣逆而為膿血也

成肺癆也治宜開肺竅活血化痰使膿盡
 自愈也諸人治之二年不效予教以白芨薏以
 仁各三錢牡丹皮枯梗薤白根歸尾山慈子貝母
 白芍藥各一錢甘草厚朴各五分三十帖全
 愈後壽七十二以它病而終此疾再不復發九
 族姪媳葉氏年三十身面四肢浮腫漸而入腹腹
 大不可言眼泡腫而無縫飲食大減小水不利
 此氣滯水脹也以大腹皮茯苓皮姜黃蒼朮厚
 朴澤瀉木香烏藥陳皮服四劑而眼目能開飲
 食稍進即為食傷而復腫予改用七傷丸調理
 全安

族侄孫伍仲立年善飲好內小便淋疼痛予以
 滑石甘草梢海金沙琥珀山梔青蒿葉草根
 煎膏為丸梧桐子大每空心及食前燈心湯送
 下三錢不終劑而愈後五年因子遷服補下元
 藥過多血淋又發小便中痛極立而不能解必
 蹲下如婦女小解樣始能解出皆大血塊每行
 一二碗餘如是者半月諸藥不效予教以

遍嘗不應脉俱洪數予以五靈脂蒲黃甘草抽
 各二錢小蘗龍牙草各三錢水煎空心服二帖
 而痛減半血仍舊改用蘗麥山梔子甘草各二
 錢茅根杜牛膝蓮葉車前草各三錢生地黃紫
 胡黃栢木通各一錢四帖痛全減血全止惟小
 便了而不了六脉亦和緩不似前矣後以人參
 葛根青蒿白朮茯苓甘草白芍藥片麻黃栢知
 母調理萬全十一

今春辰州太守石峰公女也吐紅發熱經水二十

日一行或一月行二次白帶且多胸膈飽脹膠

洪數以丹參生地山梔子白芍藥小蘗鹿角膠

水煎服加入童便一酒盃二十劑而瘳十二

亮御令愛右目紅腫如腹中飽眼乃能開飢則眼

不能開此疴積虛寒症也以夏枯草二錢甘草

穀精草各一錢香附一錢伍分煎服四帖而安

十三

侄孫少竹大學生也眼紅腫脹余嘗谷以苦寒治

時疾之劑與之眼愈腫且增兩太陽痛前藥中

加石膏不惟眼腫不消頭痛不止且令
 脹悶寢食俱廢予為脉之絃大而無力乃用蘗
 荆子桑白皮紫胡香附夏枯草甘草茅茶一帖
 而痛定兩帖腫消四帖全瘳十四
 僕娘產後惡露不盡腹中作痛且胃風咳嗽嘔
 吐頭暈脚麻木不知痛痒亦不能轉側與糖棗
 子紫蘇旋覆花烏藥五靈脂茯苓川芎當歸澤
 蘭葉玄胡索加砂糖煎服而痛止再送惡露行
 咳嗽嘔吐皆愈十五

上舍程好吾公令孫右耳後生一毒腫痛遍身生

大泡瘡增寒發熱與金銀花當歸尾甘草赤芍

連翹姜蚕大力子玄參兩劑而消十六

華岳令堂年五十餘向來小水短少今則右背盪

匙骨邊一點痛夜尤痛已經半月醫治不効展

轉加劇即於右邊手臂肢節皆脹痛筋皆起

肌肉上生紅點子脉兩手皆滑數右尺軟弱乃

濕熱傷筋而成痛痺以東垣舒經湯為主羌活

川芎羌活仁麻黃紅苓當歸防風甘草獨活椿苓

黃栢防已知毋黃連兩帖痛減腫消再亦不發
十七

由溪程兩峰丈內人患血痢裏急後重嘔吐不納
穀兩寸脉洪大以竹茹温膽湯加姜連滑石橘
紅酒苓水煎服二帖大便結實膿血皆止惟後
重與枳壳當歸芍藥生地桃仁條苓甘草滑石
酒連四帖全安十八

由溪程七護兄臍腹右邊疼痛小水短少大便四
日未行嘔吐不能進食舌上白胎面青手冷勢

甚危急脉之左沉伏右滑大有力予曰此痰格
中焦氣閉下焦故大小便秘而不利氣逆嘔吐
也不急治即無救矣與栢樹東行根皮二錢滑
石三錢菴仁青皮枳實枳即各一錢水煎服之
夜半吐出膠痰碗餘大便未行痛亦不減次日
改用玄胡索五錢水煎服調下玄明粉三錢
辰刻服下午刻痛減大半未刻大便始行右脉
平而左脉起矣覺體倦無力以生脉散加甘草
山梔仁黃栢芍藥以仁陳皮調理如故十九

曰溪程社貴兄先醉酒後御色次早四肢冷胃脘
痛極脉僅四至先醫以鬱火為治投以寒涼痛

更增極三日前所食西瓜仍吐出不化乃翁以
為陰症傷寒欲用附子理中湯不決遂予治之
予觀其面色青慘叫痛而聲不揚坐卧煩亂予
曰此霍亂兼絞厥症也先當止痛安厥後理霍
亂可免死也遲則誤事矣急用五靈脂醋炒三
錢蒼朮一錢五分烏梅三枚川椒炮姜桂心各
五分水煎飲下痛減大半下午以大腹皮藿香

半夏陳皮山查五靈脂茯苓兩帖全安二十
汪松崗令眷左脇疼咳嗽內熱每咳則脇下吊痛
寢食大減與青皮香附甘草芍藥訶子山梔子
貝母茯苓柴胡菴仁滑石人參水煎飲之熱除
痛減二十一

文學贊皇令堂產後左脇痛甚咳嗽痰不易出內
熱氣壅不能伏枕予以瓜萋仁六錢桑白皮紫
蘇子杏仁半夏桔梗枳壳各一錢水煎服之而
氣壅定嗽漸減除外與保和丸及七製化痰丸

治法二十二

許山等胃中有痰肝胆經有鬱火心血不足面色黑而枯燥肢節疼痛健忘精神恍惚內熱將有中風之兆左寸細數關絃數右關重按滑而尺弱治宜清肝胆之鬱火而養心神清胃中之痰涎而生氣血使神帥氣氣帥血氣血周流經絡無壅則諸疾不期愈而自愈矣何中風之有哉用石菖蒲黃連白茯苓半夏酸枣仁天麻橘紅各一兩牛胆南星二兩白姜蚕青黛木香各五

錢柴胡七錢五分竹瀝生姜汁打神麴糊為丸兼薑大每食後及夜茶湯任下二錢一日二三次服完神氣大健肢節皆舒面色開而手足輕健種又皆瘳少峰曰吾生平服藥少効不期此方之神若是不惟自服有功即諸親友有痰火者服之莫不響應二十三

朱宅女春經水行一月不止每黃昏先寒後熱遍身疼痛胸前脹悶不通欲飲大減叫嘶用手於喉中幹而吐出痰涎乃實今止渴甚此痰飲症

疾今飲食不進夜如見鬼者乃熱入血室也用小柴胡湯加生地黃丹皮陳皮菴仁兩帖後以白朮三錢何首烏二錢陳皮麥芽各一錢烏梅一枚生姜三片水煎服之而寒熱止諸症皆安二十四

孫熙宇肢節腫痛痰多嘔惡胸中氣不暢達語言亦不清利夜夢皆亡人野鬼追陪精神慘惡驚恐不安且汗多不止飲食減三之二遠近名家醫治逾月不應教予為治診其脉左手甚弱汗

多故也右手滑大痰飲濕熱而然法當補飲前醫皆作風治而用疎散洩其元神將成柔瘥予以人參麥門冬五味子白芍藥當歸以仁陳皮石斛木瓜甘草白朮桂枝服此汗大斂而神思稍清吐亦止矣惟飲食不思夜夢與亡人同遊為惡耳改用人參黃耆枸杞子以仁白朮各一錢五分當歸遠志茯苓木瓜陳皮各一錢甘草五分水二鍾入雄猪心血一枚煎作八分飲之四帖乃能睡始知亡人不復夢亡人矣二十五

一第... 研... 2 反... 內

泉上年十月因傷風咳嗽即時發喘經醫父喪
過憂右邊不能貼席而睡醫以滋陰降火之劑
治之半年肌肉大削大便溏瀉飲食減少咳嗽
聲啞有加喉且疼痛迎予為治診得六脉俱絃
數此憂傷肺思傷脾症也危急甚矣以白朮茯苓
陳皮粉草以仁桔梗柴胡桑白皮酒炒白芍
藥澤瀉麥芽以查煎服一日再以荆芥桔梗玄
參甘草茯苓白芍酒連扁豆山藥山查木通服
此而右邊可睡矣改用參苓白朮散加白芍藥

新解三卷

烏梅訶子酒連山查調理而愈二十六

任婦戴氏有孕已五月矣忽血大下午後發戰六
脉俱數左寸滑大右關搏指左關軟弱予以白
芍藥二錢生地阿膠人參蒲黃各一錢柴胡香
附地榆荆芥穗各七分甘草五分煎服午後發
寒熱每夜凡三次頭痛惡心腹中塊硬所下血
塊甚多心下怯力此虛無疑也以補中益氣湯
加阿膠炮姜白芍煎服煎服下午右眼白珠
一白泡光腫下注

則之症其夜大發寒熱指爪皆黑唇白汗大出
腹中作痛牽引兩乳皆痛仍以補中益氣湯加
阿膠白芍藥桂枝五味子麥冬服後熱退汗止
渴除神氣稍定乃有生意次日咳嗽而胎墮即
以獨參湯繼服其夜腸鳴瀉二次以人參白朮
各三錢炙甘草一錢五分炮姜一錢桂心茯苓
各五分陳皮七分蓮子大棗煎服後因咳嗽以
四君子加炮姜五味子紫苑調理而愈二十七

新解三卷

十五

靈岳乃眷胃脘疼痛手心熱頭暈舌麻兩太陽痛
背心亦脹內熱而外惡寒必厚被蓋覆得微汗
迺解二陳湯加桔梗杏仁桑白皮枳殼青皮白
芥子蘿蔔子酒蒸煎服兩帖舌竟不麻晚因食
過多隔上氣滯二陳湯加蘿蔔子枳實山查
用芍香附酒連調理全愈二十八
飲酒後其人喉先生內人兩脇脹急抵於胃脘作
痛之一陣則汗出一番兩額紅唇口亦紅飲食
滯水飲之立吐不受者三日夜矣予為診之兩
寸脉洪大兩尺沉微予以井水半碗白滾湯半

碗和之。名曰陰陽湯。用此調玄明粉一錢五分。服之。不惟不吐。痛減半矣。少頃大便行二次。因食豆腐及粥太早。而痛復萌。唇臉皆紅。此必有虫。故如是也。與白芍藥桂枝粉草烏梅荊椒五靈脂杏仁。水煎。痛迺定。其大半。再與蒼朮厚朴。山查枳實茯苓玄胡索香附一帖全止。但心背皮膚外疼。不能着蓆而睡。以川芎當歸白朮厚朴大腹皮粉草茯苓香附陳皮半夏調養全愈。二十九

陳鉄兄內人產後腹痛發熱。下痢膿血。裏急後重。川芎二錢。當歸三錢。茯苓乾姜肉桂山查陳皮。酒炒白芍藥白朮各一錢。粉草五分。一帖而腹痛止。痢輕。後重亦除。惟發寒熱多汗。改用人參白芍藥桂枝粉草川芎當歸白朮茯苓香附陳皮山查再劑而諸症如釋。三十

程石洲乃眷。因產難子。死。憂悶。小腹有塊作痛。下午發熱。不思飲食。次早診之。脉右大於左者三倍。且數。與芎歸湯加糖。磁子澤蘭葉。一帖。次日

下午腹脹痛。詰之。晌午食。面紅。一食。從此小腹漸脹。大便三日未行。早晨身熱。極熱。口渴。脉大。無緒。勢甚危急。用川芎當歸紅荊桃仁青皮枳。即荻木山查。水煎。調玄明粉二錢。服後。大便稍行。結糞二枚。安而就寢。醒後。進粥稍多。又復脹痛。腹大如斗。堅如石。氣促不安。勢危至此。亦已極矣。迺與五靈脂糖磁子各四錢。凌霄花二錢。赤芍藥一錢。服後。大便通。腹軟。氣定。始可進粥。漸有生氣。但脉仍鼓指。此腹中積滯

尚多。不可不因其時而驅去也。用糖磁子大黃各三錢。飛仁二錢。桂心紅荊各五分。炙甘草七分。水煎。臨服。調玄明粉一錢五分。其夜下黑糞四次。熱始退。上腹雖消。臍下仍大。仍以桃仁承氣加山查滑石紅荊煎飲之。五更大便行。臍腹脹又漸減。後與積塊丸。調理全消。是役也。女流只知女科。專門為仗。故前發熱腹痛之時。彼專門不察虛實。即以常套十全大補湯投之。詎知國眼肉初入腹之時。不覺。少頃漸又脹開。故腹

亦因之而脹也。且其味甘。尤能作滿。復加地黃
參朮寧不塞其塞哉。由是而成大滿。大堅之症。
內經謂中滿者。瀉之於內。良以此。夫彼亦泥乎
丹溪產後須當大補氣血之誤也。三十一
程宅一老嫗。年八十餘。常頭暈脚軟。撐載上。身不
起。行須人扶。否則眩暈。跌仆。大便溏洩。小便淋
瀝。此下元虛憊所致。以人參黃芪白朮。意以仁
各二錢。山茱萸杜仲茯苓各一錢。陳皮山藥粉
草各八分。八帖而愈。三十二

文學程道吾先生。令眷。夜為驚。時常暈厥。
精神恍惚。一日三五發。咳嗽。面色青。不思穀食。
日惟啖牛肉脯數塊而已。時師屢治無功。吳渤
海視為寒痰作厥。投以附子。肉桂。而厥尤加。逆
予為治。診左脉絃。右脉滑。兩寸稍短。道吾先令
眷二皆卒於瘵。知其為傳屍瘵症也。不易治之。
迺權以壯神補養之劑。消息調理。俟飲食進。胃
氣轉始。可用正治之法。姑用人參茯苓栢子仁
石菖蒲遠志丹參各三錢。以補養神氣。以除

皮貝母甘草紫苑化痰治嗽。服半月而無進退。
迺為製太。上。渾元丹。藥用紫河車一具。辰砂
甲犀角各一兩。鹿角膠紫石英斛各八錢。沉
香乳香安息香茯苓紫苑牛膝人參各五錢。射
香五分。煉蜜為丸。赤豆大。每早晚鹽湯或酒送
下三十六丸。又製靈應出獵丹。藥用牛黃狗寶
阿魏安息各一錢。虎頭骨五錢。啄木鳥一隻。獺
爪一枚。敗鼓心破皮三錢。射香五分。天靈蓋一
箇。煉蜜為丸。雄黃三錢為衣。每五更空心葱白

湯送下五分。三五日服一次。與太。上。渾元丹相
兼服。總服半月。精神頓異。不似前時恍惚矣。但
小腹左邊一點疼。前煎藥中加白芍藥一錢。服
之一月。精神大好。暈厥再不發矣。次年生一女。
其宅瘵疾從此再亦不傳。三十三
僕婦年三十。患瘵疾一月餘矣。非勞。復即食。復
今則發熱咳嗽。胸脇疼。耳聾口渴。大便七八日
不行。不知人事。迺與太。上。渾元丹。藥用紫河車一具。辰砂
甲犀角各一兩。鹿角膠紫石英斛各八錢。沉
香乳香安息香茯苓紫苑牛膝人參各五錢。射
香五分。煉蜜為丸。赤豆大。每早晚鹽湯或酒送
下三十六丸。又製靈應出獵丹。藥用牛黃狗寶
阿魏安息各一錢。虎頭骨五錢。啄木鳥一隻。獺
爪一枚。敗鼓心破皮三錢。射香五分。天靈蓋一
箇。煉蜜為丸。雄黃三錢為衣。每五更空心葱白

八分甘草五分黃連八分急煎服之。人事稍清因大便不行次日以大柴胡湯下之。又次日大便雖行熱仍不退改以柴胡二錢白芍藥黃芩麥門冬各一錢天荖粉茯苓甘草各六分四帖而愈三十四

以朱水 香軍程方塘翁年六十四向以強徂服溫補下元藥太多冬月下身著單袴立溪邊督工受寒致筋骨疼痛肩井缺盆脚膝跟踝手肘掌後及骨節動處皆紅腫而痛卧床褥三年吳中溪視為

虛而用虎潛丸吳勸海視為寒而用大附子肉桂鹿茸徐東舉視為濕周曉認為血虛張甲認為風李乙認為原節自治不瘳腿間大肉盡消惟各骨節處腫大而疼予適在程道吾宅適遇予診之其脉絃滑有力知其為溫熱痰火被寒氣滯固瀆經絡也即為藥劑不對故病日加所取者目中睛翳在胃氣仍未全損但小水解下以瓦釜煎藥色紅而濁兩膝下及

平昔服溫補春方所致病雖久年雖高猶為有餘之疾不可因高年疾痼棄不治也迺特為先驅逐經絡中滯然後健脾胃消痰俾新痰不生氣血日長最後以補劑收功斯得矣翁生平好補畏攻故進門者皆務迎合予獨反之以新取歲靈仙一斤裝新竹筒中入燒酒二斤塞筒口刮去筒外青皮重湯煮三炷官香為度取出葢靈仙曬乾為末用竹瀝打糊為丸梧桐子大每早晚酒送下一錢一日服二次五日後大便溏

出稠粘痰積半桶腫痛消去大半改以人參石斛蒼朮黃柏以仁蒼耳子牛膝烏藥葉龜板紅朮犀角屑木通煎服二十帖又用前末藥服三日又下痰積如前之半仍以前煎藥服半月又將末藥服三日腹中痰漸少乃為製丸藥以虎骨晚蚕沙蒼朮黃柏丹參杜牛膝薑葉以仁紅朮五加皮蒼耳子龜板酒打麵糊為丸梧桐子大每空心白湯送下七八十丸外以丹溪保和丸食後服半年全愈腿肉復完步履如故三十

五

汪省吾暮秋患瘡三日一次發於夜。迨次年仲春猶不能止。遍身疼頭疼。背脊疼。百治不應。即灸亦僅止得一日。次日仍發。面色青。肌肉瘦。以症叅之。邪在足太陽經。用麻黃一錢五分。人參桂枝白芍藥粉草知母各一錢。陳皮貝母各七分。姜朮煎服。諸疼減半。而瘡未止。以何首烏白朮各五錢。青蒿一錢。烏梅一箇。陳皮二錢。生姜三片。水煎。臨發日五更服。尋常以六君子湯加

黃耆熟地五味子烏梅草果調理而愈三十六

汪東之夫七月初旬。自浙歸。連日與客手譚。過勞口中生瘡。醫以香薷飲。清胃湯。瀉黃湯。三黃丸。黃連解毒湯。白虎湯。涼馬散。凡治上焦熱症之劑。竭寒涼而進之者。十一日矣。口瘡日甚。一日不但飲食不進。即藥亦難下咽。因瘡延及於喉也。逆予為診。其脉六部俱大無力。診罷。有外科陳氏者。自稱喉舌專門。銜其口。瘡敷藥之妙。予曰。汝試為口中一洗。看是何狀。纔開口。見涎

沫迷漫。不能得見肉色。陳以荊芥湯洗。而引之。搨出稠涎一二碗。餘傾於地上。倘有二錢。爭啄之。二雞立斃。其毒何如此。亦疾之奇者。予囑陳曰。汝用藥。只可吹入喉中。切不可敷其舌。必俟喉中全好。然後敷舌。待舌好。再敷口唇。甚母得藥敷。恐毒無出路。反攻入喉。極為悞事。陳曰。諾。予對乃翁曰。令郎之疾。迺虛陽口瘡也。翁曰。當用何劑。予曰。附子理中湯煎熟。待冷。飲之。可救。如它藥不能立功。翁曰。瘡乃熱症。况上身已熱。

又天時酷暑。大熱之劑。其敢進乎。予曰。此陰盛格陽之症。初未嘗如此。因服寒涼。過劑。激之。使然。爾翁不省其兩足膝下皆冷乎。翁用手探足下果冷。乃欣然聽用。人參白朮各三錢。大附子炮姜炙甘草各一錢。水煎。冷與之。服後即甦。睡達旦。次早便能食粥。半盞。足膝下漸暖。藥仍如前。早飯後。予與二三友散步山溪。午刻歸。翁乃見。舉家大慟於地。見予至。哭語予曰。不可為矣。本是熱病。誤服熱藥。今舌腫大塞滿口中。不能

言語死在頃刻奈何奈何予駭然應曰安得有
是不祥語也今晨脈與昨不二適往返不遲
二時許何倏爾有此大變乎待予再診決之及
診六脈漸欬較昨大有神氣面色亦和獨舌脹
大予心知為陳寒涼敷藥所致也迺詰陳曰我
別後可用敷藥否陳點首曰已二次矣予撫翁
及諸人曰無慟立看予為翁消之急取官桂研
末五錢用生姜自然汁調塗舌上縛塗上但見
眼淚雙流鼻中涕出口內涎垂舌頓消去語近

新和

五

侍曰我無事矣諸環侍者男婦不下二十皆面
面相覷以為神奇予曰可即取粥與食使壓之
庶虛火不再升適舌脹滿者乃敷藥寒涼閉其
毒氣毒無從出故作脹耳桂皮乃辛熱之物又
以姜汁調塗取辛散之義也諸人皆服其論三
十七

庚之夫令眷姬已六月為傷風咳嗽腹中弔痰痰
壅喉音不清頭且眩運脈左滑數右寸弱關滑
五尺有力右尺弱予以人參白朮陳皮貝母茯苓

苓桔梗桑白皮紫蘇粉草黃芩前胡四帖而病
全愈三十八

吳東渠年五十有七因上年患瘧胸痞作脹肌肉
大削因連服攻剋太重脾胃敗壞膝及跟踝皆
浮腫遍身發熱口渴小水短赤舌上黃胎舌心
焦燥乾燥誤服寒涼大便連瀉五六次日不能
開手足無力倦於言語予診之六部俱浮大按
之豁然空虛飲食不進此中氣大虛元神俱耗
可畏之甚即以人參白朮茯苓粉草木香葛根

新和

十五

酒炒白芍藥水煎服之連進二帖始能開目漸
出聲言語後以六君子湯去半夏加葛根白扁
豆山藥養香以仁白芍藥石斛調理而愈三十
九

吳而源令眷因未有子多鬱多思肌肉漸瘦皮膚
燥揭遍身生瘡體如火燎胸膈脹痛而應於背
咳嗽不住口醫治十越月愈以為瘵疾不可治
知予在程方塘宅中迺透予治診得右寸關俱
滑大有力左絃數予以瓜蒌仁四錢蘿蔔子貝

母枳壳調氣化痰開鬱為君。桑白皮葶藶子黃芩瀉肺火為臣。甘草前胡為使。三十帖全愈。仍以千金化痰丸調理。向來年又至冬月則咳嗽痰喘不能睡。自此後遇冬月痰喘再不復發。四

十
族嫂程氏環跳穴邊腫痛增寒發熱不能動止。寢食俱廢。頭重惡心。上身熱下身冷。天明乃退口乾。舌上白胎甚厚。以紫胡防風桂枝解其寒熱。以蒼朮黃柏五加皮菴仁赤芍藥治其痛。木通

利其濕熱。且引火下行。甘草調和諸藥。使各得職。一帖而痛止大半。再進寒熱除。三帖痛全減去。改以小柴胡湯加牡丹枳壳桔梗二帖而舌胎脫然。四十一

上舍恒宇先生原因生楊梅瘡後。偶遭一跌。環跳脫出。不能復入。窠臼疼痛殊甚。兩足因長短不齊。予思不能復入。窠臼者。以瘀血流入窠臼。占滯故竅。致骨不得復入也。今但消去瘀血。必以行氣活血之劑為主。以下行嚮導之劑佐之。庶

可復原。用陳年窖中磚瓦洗淨。煨過四動。生地杜牛膝骨碎補丹參赤芍各一兩五錢。自然銅三兩。蒲黃車前子蘓木各一兩。鹿角二兩。玄明粉五錢。各為末。以茅草根一斤。紅荅四兩煎膏。拌晒前藥。再以煉蜜為丸。梧桐子大。每空心及食前酒送下。八九十九。未服此藥之先。病足長二十餘服。此丸藥後。只差半寸。設再製。久服必能萬全。惜渠素畏藥中道而止。故功虧一篑也。豈嗚呼哉。四十二

族姪孫女。一週歲時發慢驚。眼開手拳。目不動。移脚指微動。先自顛門後遍身如少。喉中痰聲。口中痰沫。腹脹放屁。大便亦行。先以牛黃丸蘓合香丸進之。不效。及各治驚治痰等藥。與之皆不效。即從痰沫流出。用通關散吹入鼻中。亦不作。噫。自中時至戌時。猶不能醒。而色素青而白。氣稟其弱。因婢者抱而偶失。跌受驚。發熱。此驚為氣乘虛而入。在法已無生路。但不忍坐視。姑以人參三錢。生薑自然汁拌炒。煎湯。頻又用匙挑入

口中初一三四匙皆不受後又與五六匙偶能
入一二匙下喉便覺痰聲稍緩因此煩與之
十匙之中有二三匙入腹矣喉中氣轉且能
動始有生意再以六君子湯加天麻石菖蒲
五澤瀉薄荷煎服至鷄鳴時乃畧啼一二聲方
識吮乳次日咳嗽語聲不出小水短少以辰砂
益元散一錢用灯心湯調下熱退聲出惟嗽不
盡止改以四君子湯加陳皮五味子麥門冬桑
白皮桔梗杏仁薄荷一帖全愈四十三

程必湖因飲生酒食硬乾豆腐以致次日面上浮
腫胸中作脹今經半年腹中腸鳴四肢浮腫兩
腿及陰囊皆腫口乾大小便俱不利年四十六
矣夜卧氣喘膝下冷先以人參蒼朮陳皮蘿蔔
子半夏麩葛根厚朴枳實破故紙大附子茯苓
煎服二帖氣喘稍定腹中仍鳴加白芷仁白芥
子桑白皮小水頗利浮腫漸消四十四
六十一夫歛溪南人也八月初旬自新都往湖州
途次偶感風邪發熱多痰且又腹痛下痢裏急

後重原有腸風下血之疾又以舊年乃翁痢疾
發熱卒於湖州心甚恐怖予脉之兩關滑大有
力尺寸俱不足乃以白芍藥一半生一半酒炒
五錢止痛為君當歸活血酒連酒芩柴胡枳梗
清熱升提陽氣為臣枳殼槐花兼治腸風為佐
益元散木香以實大腸山查以消瘀血調肝安
脾為裨佐一帖熱減半痢稍輕次日仍用前藥
外與丹溪保和丸調理五日而出戶四十五
侄孫二水年三十體甚肥胖夏月常浸在溪中升

於松陰之下至八月大發寒熱於巳午間至天
明乃退不能起床飲食亦不進嘔吐黃苦胆汁
胸膈脹悶舌上乾燥生范刺沉香色強硬不能
言語必含冷水漱之始能說一句若再語三語
必三噙水而後可惟西瓜新藕是啖先發寒熱
之日吐血一口今則大便下血症甚危惡且咳
嗽此溫瘧症也由醫失解散遽用黃耆以閉邪
氣致成大禍今法當清解止吐俾飲食進然後
庶可保其生也柴胡知母各三錢石膏十錢葛

二錢橘紅竹茹各一錢伍分酒苓枳實各二錢甘草貝母各五分水煎服之三帖而吐止改用二陳湯加柴胡枳實黃芩黃連天荅粉薑甲白木何首烏調理而愈迺囑其不可食葷食葷

年恐復發也四十六

堪輿張錫泉先生患左脇皮裏膜外疼痛有惡寒發熱之狀以白芥子一錢五分川芎柴胡桔梗各一錢桂枝甘草各五分水煎飲之當愈其半次日以八珍湯加青皮為君木香為佐柴胡為

折如三卷

使一帖全愈四十七

族侄雲岳患偏墜臍腹腰俞俱脹而痛左關脉絃大鼓指用小茴香甘草蒼朮益智仁防風各五分荔枝核橘核糖棗子柴胡各一錢山梔子青皮各七分服後其痛如舊脉且轉數恐作囊癰急為解毒瓜婁五錢當歸甘草節金銀荅各一錢連翹柴胡青皮各七分水煎服之痛定腫消因食雞魚太早次日臍腹又作脹痛發熱不能

眠昨日囊消後絃脉盡退今發熱矣改以山

二錢金銀荅柴胡連翹各八分甘草節當歸各五分青皮七分兩帖而愈四十八

時方妙齡表虛易感風寒致成鼻淵流涕涕止便覺頭暈兩太陽常作疼且多噴嚏脉之寸洪大用秦艽酒苓桑白皮馬兜鈴各八分芍一錢滑石石膏各二錢枳殼蔓荊子各五

甘草三分四帖涕止病愈四十九

峰夫偶與尸 稍有介蒂其晚飲於侄家歸元腹中脹悶嘔噦不寧次日眼珠面色皆黃惡

三卷

三

冬發熱時當仲秋正瘡痢為癘之候醫作瘡治心加熱下午潮熱煩躁但嘔不嘔且鼻衄腹痛大便黑如墨吐出黑血如爛猪肺者然約枕餌有謂所吐之物如此大便之黑又如彼似有下蠱之象心疑乃侄毒之也正欲與乃侄爭辯予仲子泰來適在渠宅徐語渠諸郎君曰尊翁尚可起顧不為救症而務與人聞何舍重而耶渠家素不急予仍逐所親信者率相視目珠如金面若熏楠腹大如斗其中有塊

如楮堅如石。兩足下皆浮腫。四肢且冷。小便
飲食不思。莫不面面相覷。辭而不藥。舉家聞
通宵號泣。惟欲攘臂爭鬪。仲子來。來之語之
家君固不敏。其知識豈不出諸公下。昨自華
歸。迺而胗之。當必有說。舉家忻然。敦予求脈。
脈左澁右滑。予曰。據滑脈主痰飲。澁主有瘀
也。今所吐所下皆瘀之徵。斷非壅也。使得早
事。曷有此猜忌。此號泣哉。兩峰曰。吾生平頗
疾。瘀自何致。予曰。內經云。怒則傷肝。甚則嘔

一不嘔則積積而瘀於經隧。滿而溢也。兩峰曰。
口謂從怒而致。則此言恰當。吾病源矣。敢請劑。
一用當歸尾三錢。赤芍藥牡丹皮川芎各一錢。
分。玄胡索五靈脂杏仁各一錢。滑石茜根各
二錢。水煎飲之。所下黑物甚多。腹中仍痛。塊猶
未軟。前方再加青皮山查酒蒸大黃服之。大便
行三次。黑痰及痰不計其數。從此腹漸寬。塊漸
消。面色稍轉。而黃日退。飲食津液有加。四肢微
血。有生氣矣。惟功。不消。改用六君子湯。

加炮姜茜根滑石青蒿調理而黑糞全無。一月
精神復舊。里中謂予此役匪獨認病投劑為足
稱。且俾二宅釋猜疑。排忿爭。其雅誼尤足重也。
五十

予有表嫂。小產後腹痛暈厥。冷汗淋漓。遍身麻木。
心怔怔動。左脈絕不應。指虛極。故也。以當歸三
錢川芎一錢五分。人參荊芥穗燈火燒存性各
一錢。益母草澤蘭葉各八分。甘草五分。水煎飲
之。腹痛減。惟怔怔不寧。以四君子湯倍加黃芪

新都三卷

為君。當歸香附益母草為臣。川芎為佐。炮姜為
使。兩劑而安。五十一

陳士美孤子也。年弱冠。由夢遺後患頭疼發熱。時
值仲夏。醫治不瘳。凡市中有名者率延致轉治。
轉熱反加水瀉。口渴日夜不得眠者旬日。衆視
為危。時有俞氏者。用參耆白朮為其飲。汗止瀉
而汗瀉愈劇。呻吟不間。晝夜勺粒不入口。咳嗽
喘喘。躁悶不寧。又四日矣。渠親邵瓊林交予。因
堯邵逆予為治。胗其脈。左絃長。右洪大。俱七至。

舌胎焦黃體若火燄神昏氣促予曰此仲景傷寒熱症也邪在陽明少陽二經其危不啻風中癘胡師不認症察脉徒以藥遺受病率投補劑無怪乎轉治轉劇也幸予至診遲一日大事去矣用石膏五錢柴胡知母各三錢炙甘草白芍藥枳殼桔梗黃芩天冬粉各一錢粳米一撮急煎飲之夜半熱稍退神稍靜脉之仍數甚繼以前劑進天明乃得睡覺而熱退神清瀉止兩寬惟口尚渴再用柴胡一錢五分白芍藥麥門

冬知母各一錢石膏三錢甘草五味子各五分人參七分服之舌潤渴止餘熱盡退粥飲始入漸向安矣次日忽兩足指前一截痛如犬噬不能耐以野藜握入明礬四兩煎湯薰洗痛勢稍緩又以薏以仁三錢木瓜二錢黃栢牛膝各一錢漢防已三分一帖而愈後又乾咳嗽晝夜不住口喉且疼胸脹而體畧熱此為誤服參木太早之過用馬兜鈴百部御米壳各用蜜水製過一錢五味子一錢一錢合二錢四帖而

愈五十二

程松逸兄患酒疸遍身皆黃尿如藥汁眼若金裝汗出沾衣如染胸膈痞滿口不知味四肢疲軟脉濡而數以四苓散加厚朴陳皮糖棗子麦芽葛根倍加青蒿水煎臨服加萱草根自然汁一小酒杯四帖其黃煥然脫去五十三

太學岐原門下幹人名仲謙者患跨馬瘡大發寒熱紅腫疼痛嘔惡不納飲食外科醫月餘腫痛日加飲食日減肌肉日消精神大憊不能起止

新補三卷

岐原邀予脉之六部數而無力形氣殊不勝息時有專科唐氏為渠調劑將進予詰何劑唐曰真人活命飲也曾服四劑今始加大黃予復詰曰前此何劑唐曰敗毒散黃連解毒湯予曉之曰此皆治初起有餘之疾據今症乃氣血大不足者法當大補托而出之庶保終吉唐曰凡痛為實瘁為虛今痛正盛脉正數飲食且不進大補必加飽悶飲食何由進熱毒何由出也予正色語之曰素問云數脉所主其邪為熱其症為虛

今痛極者皆由寒涼敗毒之劑傷脾胃損氣血故飲食減而痛增也又以敗毒之劑進是鴆之爾安望膿出而全其生乎唐曰補劑迨膿潰之後或因膿清而後用之今膿未出安可謂虛而補之吾為專門不敢任其責予顧岐原曰生死在此一劑不可不慎彼謂膿未出無補理彼排膿內托散十全大補湯非外科急劑乎大抵凡病寧使有餘後欲剝之適為易易今狼狽若此再株守成法剝削後何以措手岐原曰井蛙之

見豈知有天惟叔命劑予用黃耆三錢人參二錢芍藥當歸各一錢白芷官桂甘草防風各五分急煎飲之一帖痛止而精神回飲食進再劑而膿潰十帖肉生能動止矣唐迺拊膺嘖又語同列曰今而後知補劑能出膿而加食也吾儕外科當永識此以為法則五十四

婦咳嗽痰中有紅大便一日五六度惡心飲食極難下兩脛下兩腹中不安立時欲瀉必盡瀉出乃止肌肉消瘦

先麻兩足膝皆戰搖兩寸關脈滑數兩尺沉細此虛中有食積痰飲之候也脈雖數午後雖發熱不敢輕用寒涼特為溫補下元庶關門有守瀉可止也山茱萸兔絲子人參破故紙杜仲山藥茯苓澤瀉桂心砂仁服下甚安四劑後下體不戰搖矣但飲食腹中微疼即欲登廁前方減去山茱萸加白朮肉果木香八帖愈五十五

目珠極紅六脉伏而不見舉室惶又予曰此作汗之兆由熱極使然也因先時汗未透徹陽明餘熱在經迫血上行越出鼻竅故有此症以石膏滑石生地黃升麻赤芍藥牡丹皮麥門冬天花粉甘草煎而服之汗出如雨直至兩踝舌潤而胎盡退亦止目珠色淡脈乃漸出改用人參麥門冬五味子白芍藥二錢知母黃芩紫胡

神效石薑厚下大...

半載腹大如斗。堅如石。治月餘弗瘳。乃舉飲六。急小水涓滴不通。乃倣補下元之劑。則脹急欲憐之。薦予診其脉。兩關有餘之候也。症雖重。机一乃姑治家嚴而過儉。其母袖熟鷄牛古之類私授之。因成鼓脹。前任事者並不察病源。

氣虛中滿治之。脹而欲裂。宜九三下之。而脹消積去。後以一月而愈。積塊丸列赤水方五十七。

族侄孫仲登因與堂兄構訟。未旬醉後房事二起而小瀉腸鳴。一日十數度發熱。一帖反加嘔逆煩躁口渴。右洪大。俱七至。飲食不化。

唇燥舌上。胎深厚。診畢語予曰。我房失後陰症傷寒也。小腹痛且漏底。幸叔祖救之。予嘆而應曰。以子所言。決為陰症。以予指下辨之。當是春溫陽症也。且外症亦陽。烏得為有房事而遽以理中進之乎。族中相知者。交為予言。渠病的屬陰症。故嘔吐水瀉。不可因其面赤。便認為陽。顧戴陽症。與此近。但幸加察之。吾輩正擬於理中湯內再加附子肉桂。庶可保全。予極言不可。仲景有云。桂枝下咽。陽盛則斃。况附子理

中者乎。陰陽寒熱之間。辨之不直。生死反掌耳。茲當舍症而從脉也。以溫胆湯加姜汁炒黃連柴胡乾葛。與二帖。囑令當夜飲盡。俾明日不它傳也。予別後。渠一服而嘔逆止。餘症悉在。詰朝予診竟。和渠曰。夜來二藥必未服完。不然何兩手之脉洪大搏指如。是。余曰。因有竹茹黃連。恐非房失後所宜。故僅服一。予曰。不服黃連致熱。轉劇。今日非石膏不能已。乃與白虎湯加竹茹兩劑。臨別囑渠曰。今之症非昨日可比。用石膏者。

豈得已哉。設當用不用。使經中之熱傳入於腑。非大黃不能療。切勿失時。誤事。詎知別後又有惑之者。仍只服一帖。溲即隨止。餘小腹之痛。且在。次日予診畢。語渠曰。昨臨行時。噤之再三。何乃又不服完。今脉洪長堅硬。邪已入腑。柰何。柰何。對曰。衆謂石膏太寒。恐小腹加痛。實只服一帖而已。予曰。懼服石膏。今且服大黃矣。皆失時。誤事之過。周金人銘云。寒又不減。炎柰何。其斯之謂歟。思非桃仁承氣湯不可。乃覲而煎服。連飲二劑。下極黑。燥糞五六枚。痛熱俱減。再為診之。六脉皆緩弱。這是病方盡去。改以四君子湯加白芍藥黃連香附。調養數日而愈。五十八

汗希明。竹山大長君也。年弱冠。性多躁。素有痰火。舊曾吐紅。張醫田收滋之劑太早。以致痰與瘀血。滯滯經絡。釀成病根。恬不知覺。且為灸肺俞膏。言撼動前疾。止溢無功。滋陰作壅。咳不能睡。又誤作風邪。而發散風劑。不思火盛得風。其勢愈熾。血從口鼻噴出。勢如泉湧。延予為治。六

部洪數。自熱而煩。又時當三伏。內外之火夾攻。縱體質剛勁。寧能堪此銷鑠哉。予思非釜底抽薪之法。難奪其上湧之勢。乃以三製大黃三錢。石膏五錢。黃連苗根滑石各二錢。牡丹皮一錢。急煎飲之。大便微行二次。血來少緩。即用石膏滑石冬青子各三錢。早蓮草苗根各二錢。黃連山梔子貝母各一錢。甘草五分。茅草根五錢。煎服。血乃全止。三日後大便結燥。火又上逆。咳嗽連聲。左關脉絃勁。右關洪滑。與當歸龍會丸下之。而咳始緩。改以瓜蒌仁苗根各一錢。五分貝母早蓮草麥門冬知母各一錢。白芍藥二錢。黃連黃芩各七分。青皮甘草各三分。仍加茅根。後每遇大便燥結。即進龍會丸。以此調理。三月大定。半載全瘳。書云。病有六不灸。火盛者不灸。此由誤灸。幾於不保。故特識之。以為好灸者龜鑒。

五十九

興文學祝弘吾公。祝令君叔祖也。在休衙。偶有陰陽之患。子午潮熱。咳嗽痰多。汗流不止。胸膈

不暢大便燥結動作喘乏口渴以貝母知母瓜
萸仁桑白皮各一錢枳殼黃連麥門冬各八分
桔梗柴胡前胡各五分甘草三分五味子十一
粒服下五更微汗熱退十之七惟痰嗽喘之改
用瓜萸仁二錢餘如前外以七製化痰丸夜服
熱盡退渠甚喜以為自是以往可勿藥矣予曰
未也據脈絃數不減恐防作瘧公未為然予適
東行半月書報瘧作咳嗽轉加所出皆黃粘老
痰予曰書云無痰不作瘧仍用前方倍加柴胡

貝母為石加烏梅一介四劑霍然良已公曰翁
之視疾應若桴鼓古云智者不治已病治未病
五於翁言徵之迺以是備言祝令公祝令公喜
曰孫君匪獨得岐黃正脈其雅誼足稱叔祖尚
未前聞予當賦詩以贈於是欣然手書若干律
以授余其詩附後第六卷

素封汪甯翁年八十有一因勞倦感冒胸膈大熱
而痞口渴舌上胎白如敷粉咳嗽夜不能睡此
陽症也柴胡一錢桔梗枳殼竹茹知母各八

分酒連酒苓朮苓粉各七分甘草四分姜三片
服下乃得睡口仍渴痰仍嗽前方加半夏麩夜
與二母丸治其熱嗽而愈

汪鍊兄內人經水久不止內有紫黑血塊今則胃
脘胸腹皆痛玉戶且腫手足皆冷絕不知餓臍
腹之下有一塊堅如鉄脉左數右沉澁此血瘕
症也用糖棗子五錢玄胡索五靈脂香附麦芽
青皮各一錢水煎服夜即痛減其半手足漸溫
後加丹參川芎蒲黃益母草當歸四帖而痛全

正玉戶亦消再四帖而經調

程相如夫人令政孕四月頭疼遍身皆痛腰痛更甚
惡寒發熱咳嗽口渴六脉浮數且小柴胡湯加
防風羌活葛根姜東煎服夜忽大發寒戰繼而
發熱五更又發戰告急於予予曰此作汗之兆
俄而汗出口渴頭疼身熱皆減惟胸膈脹悶此
胎氣上逼而為子懸以大紫蘊飲與之紫蘊人
參白朮茯苓甘草當歸陳皮大腹皮川芎白芍
藥服後身冷而汗出不止胸膈脹痛急且奪命

丹道服下嗒然而睡覺則痛止服消始能進食
身温汗止駸駸向安奪命丹用白茯苓牡丹皮
桃仁白芍藥桂枝醋水煎服止痛如神六十三

余文台壯年咳嗽吐紅腹中常痛夜多口渴夢遺
背心作脹兩手脉短弱兩關絃大左尺弱右尺
滑大心血不足中焦有痰積兩間有瘀血陰分
有滯火乃先為清肅上焦用山梔仁牡丹皮丹
參茯苓甘草貝母橘紅益元散服十帖背脹漸
消惟咳不止改用黃芩杏仁半夏麴益元散黃

連瓜蒌仁甘草十帖而嗽止惟腹疼不除再自
遇德丹全丹溪保和丸進之大便下稠積痰多

甚後呂人參白茯苓白芍藥紫苑知母麥門冬
甘草當歸五味子調理而愈六十四

邵伯成丈夫令愛經水適行洗浴後感冒風邪誤
服人參補劑大發寒熱嘔吐煩躁隨即口噤心
煩不安循衣摸床時當仲夏之晦予謂上焦有
痰因誤補故阻滯其氣道而然與加味温膽湯
半夏四錢橘紅二錢白茯苓枳實竹茹麥門冬

名一錢益元散三錢生姜三片水煎飲之一帖
而安後稍勞復頭疼痰火上衝背脹腰痛以紫
胡薄荷甘草枳壳桔梗酒芍桑皮半夏麥門冬
山梔仁茯苓生薑調養全愈六十五

金氏婦蕪湖泉之親媽也舊秋患崩中愈後方百
日時值上巳因洗浴受風邪外寒而束內熱前
後心脹四肢腫痛面有浮氣惡寒發熱呵欠不
時大小便欲行不行口內常甜六脉浮大而數
以紫胡紫蘊麻黃桔梗枳壳大腹皮厚朴酒芍

姜黃服下夜得微汗胸腹稍安四肢仍脹再加
雞葛子進之覺煩燥且醋心改用二陳湯加香
附大腹皮桑白皮姜連枳壳山梔子各八分益
元散二錢意以仁三錢吳茱萸三分服下四肢
消半面氣全消覺腰疼暖氣胸膈噎噎用六君
子湯加薏以仁姜連厚朴知母澤瀉鬱金砂仁
枳實調養半月四肢悉平嗜睡尋愈六十六
文學張雲門三令郎丁年偶發瘧疾有一塊
降起痰痛不可近下午至夜九時瘧疾愈

皆熱脈右關洪滑兩尺尤有力日夜不得睡通
微推氣散例。姜黃桔梗川芎各一錢伍分。枳實
二錢白芍藥一錢粉草五分。姜蔥煎服。外與當
歸龍會丸。其夜大便秘行一次。頗得睡。三更後先
發寒戰。徐熱。至五鼓微汗。而脇疼寒熱悉減。再
診之。左脈畧絃。舌有黃白厚胎。兩脇重按微疼。
大便燥結不行。以小柴胡湯減半夏倍加瓜蒌
蠶甲牡蠣。脇疼全瘳。舉丸畧硬痛。彼自以為無
恙矣。予語渠姐夫徐仲子。偉曰。病先起脇下。顧

脇下為肝之經。後及舉丸硬疼。其舉丸亦肝之
地。此餘熱未盡徹故也。而彼已厭藥。以小愈為
全安。不出決旬。必有奇疾。徐仲子曰。奇者若何。
予曰。此君性急好勝。倘勉強作文。遇勞而發。增
寒壯熱。非瘡即囊癰也。予尚東行。子宜識之。別
後半月。果因作文。夜發寒熱。囊漸腫大。其熱如
火。及予至。診之。六部皆數。兩尺且近於洪。知其
膿已成。必潰而後已。彼心甚恐。予曰。無傷。易與
牛急。以營衛返魂湯加金銀苓為君。兩帖而膿

潰。再加入參。又兩帖而肌生。十日全愈。方用何
首烏赤芍藥當歸小茴香甘草節木通金銀苓
貝母枳壳白芷。水與酒共煎服之。此方加獨活
治流注尤神。六十七

朱宅內眷。孕已八月。因送殯受驚。胸膈脹悶。嘔逆
不入食。城中時師認為外感。為之發散。嘔惡愈
劇。舉家恐胎有動。延予診視。兩寸脈皆洪滑。兩
尺弱。此亢上不下之候。胸膈脹者。蓋由子懸而
然。此一劑可瘳也。夫曰。胎婦難任。峻劑覷其嘔

惡之狀。脹悶之候。時刻不秣。一劑曷愈。予曰。請
試之。與溫胆湯加姜汁炒黃連。大腹皮。水煎。或
送下姜汁益元丸。果一帖而嘔止。再寬。即能進
食。午後酣寢。昭然若未始有病者。其夫訝曰。溫
胆湯何神。若此。幸詳其義。予曰。胎孕之症。重在
足少陽。足少陽者。膽也。病起於驚。驚氣逆。痰隨胎
氣上。逆故脈亢上不下。在難經為溢候。由木火
之性。上而不下。經曰。上部有脈。下部無脈。其人
當吐。不吐者死。予故云。一劑可愈也。方名溫膽

者此温字非温暖之温。温存之温。黃連竹茹清其肝膽之火。全白茯苓而安心神。益元丸壓其痰火下行。火下行而胎因之亦安矣。筠臯公曰先生認症真。故投劑確。非神乎。藥神乎。用也。六十八

胡鄰泉令愛及笄後患吐血。每吐碗餘。下午倦怠。夜分潮熱。嘔吐不食。大便秘結。時師視為陰虛。火動投以滋陰之劑。反加飽悶。背心脹痛。予診其脉。兩寸洪大。兩尺弱。知其有瘀血凝滯。以致

新血不得歸經。故滿而溢也。法當消瘀為主。用白芍藥。枳殼。前胡。益元散。桃仁。紅荅。牡丹皮。山梔子。貝母。水煎。臨服入蘿蔔汁一小酒杯。服後嘔。如舊。大便仍秘。乃以龍會丸通之。更以右膏三錢。橘紅。半夏。麴。姜。連。茜。根。竹。茹。黃。連。枳。殼。各一錢。白茯苓八分。甘草三分。服後大便得三次。吐止。食進。後用二陳湯加滑石。丹參。丹皮。茜根。白芍藥。香附。二十劑。後經行熱退。背脹悉愈。此經調血不上逆。六十九

思石令堂年可五旬。大怒後小解。驀然暈厥。口禁牙關。不省人事。以蘇合香丸灌之。而甦。左手右足疼痛。不能舉動。用二陳湯加酒。芍五加皮。秦艽。石菖蒲。防風。蒼朮。以仁紫荊皮四帖而愈。七十

族姪孫君實。壯年患遍身筋骨疼痛。肢節腫痛。其痛極狀如虎噬。大小便起止。非三五人不能扶。諸痛處熱如火燎。食飲不入。呻吟床褥。已經二候。有以疎風之劑投者。不應。又以乳香沒藥活

血止痛之劑投者。亦不應。延予診治。六脉浮緊。而數。予曰。此周痺也。勢甚惡。俗名白虎。歷節風。迺濕熱所致。丹溪云。腫傷濕。痛屬火。火性速。故痛甚。猛若此。以生地黄。紅荅。酒。芍。酒。連。酒。栝。秦。芫。防。風。羌。活。獨。活。海。桐。皮。威。靈。仙。甘。草。四。劑。而痛減大半。再加赤芍藥。當歸。蒼耳子。薏苡仁。減去獨活。秦芫。又八劑全愈。七十一
葉子黑。內人患瘰。醫為其汗。為其下。醫技不能起。屍寢者已決。旬家事窶乏。亦不能復。即醫。

觀其狀。以生死在須臾間。群然發善愿。科歛。其殯歛之需。予聞為之。矜六部俱微弱。不充指。右關稍滑。精神昏憊。僅一息奄奄。四肢冷厥。口渴。予矜畢。語諸鄰曰。據症甚危。據脉邪已盡。退。惟虛憊而神氣弱。非大補不能也。諸君苟能以助殯者。其市人參。庶幾可起死而還之生也。諸君既。其死。寧不以冀其生乎。予非毫無希。覬顧渠力不贖。願與諸君共圓滿好生善果耳。諸鄰固有善心。激於余言。益忻然相語曰。惟先生命。即以六君子湯加歸芍補氣血。而化痰滲。以麥門冬五味子復脉通心。而生津液。以桂枝溫其四體。午刻進藥。晡刻四肢漸暖。精神煥發。尚無力開聲。改以生脉湯加遠志歸芍以仁山藥調理。巧愈。諸鄰人大快。七十二。

孫如亭令政年過四十。眼偶赤腫。兩太陽疼痛。大便不行者三日。平時汛期一月僅二日。今行四日。猶且未止。里有開化余雲谷者。自謂眼科捷手。醫治踰候。腫赤不消。而右眼內眦突生一白。

之已五日大便雖瀉痛則尤甚飲食不進手足
 清冷形神俱倦脉僅四至重按則伏而有方此
 由攻剋太過寒涼傷脾脾虛則中氣不運積反
 凝滯以故大便雖瀉而積不行痛終不減也治
 當建立中氣為主中氣一四痛當立止志與王
 海藏五神丸二錢滾水送下以止其痛此丸補
 接元氣安和五臟升降陰陽極有神應故名五
 神丸方出醫壘元再用小建中湯調肝養脾蓋
 臍下通肝經部位推此湯迺對症劑也白芍酒

炒三錢炙甘草一錢五分桂心一錢加香附一
 錢生薑三片水煎服午牌進藥未牌已報痛止
 因其夜進粥太頻且食鴨汁撼動餘積腹又作
 痛且加脹悶面有浮氣裏急後重與四平丸而
 漸定外以二陳湯加香附砂仁蒼朮厚朴山查
 腹中始覺寬快三日無恙又縱恣口腹大啖肥
 甘糕粽肉鷄之類不飽不止腹中大痛時刻難
 存欲吐則食已下欲瀉則食尚未入腸自噦
 叫云可取木香枳即丸大承氣湯急與我下之

死無憾予諭之曰據痛雖甚腹則不堅顧全
 日適屆冬節禮曰先王於至日閉關安靜以養
 微陽曷敢以大寒峻劑而涸天和乎設不得已
 只須柏樹東行根上白皮一錢長流水煎飲之
 一服可愈也夜已二鼓竟而煎服天明瀉三五
 行痛減大半仍與小建中湯和之痛又旋減惟
 臍下尚不脫然常又以熱手重慰之大便欲行
 及至廁則又不解知其血少而氣不調用熟地
 三錢白芍一錢杏仁二錢烏藥一錢木香五分

水煎飲既下黑糞甚多十年腹痛沉疴從此再
 不復萌此後勉坐常語人曰吾得孫公五神丸
 柏根皮小建中湯三法不啻脫胎換骨數年來
 豈惟飲食增加即步履輕便捷若少壯皆孫君
 賜也親友有求其三法者昇而服之捷若桴鼓
 波家謂子殆三生夙緣云七十五
 黃願坐內子產未滿月醉犯房事血來如崩執不
 可遏發熱頭暈大小便俱熱六脉洪大以竹茹
 蒲黃白芍藥各一錢

七分甘草炮姜艾葉各三分血止大半腰猶脹
痛下午胸膈飽悶改以川芎五分當歸茯苓破
故紙蒲黃香附各八分姜炭甘草各一分陳皮
七分人參一錢服此血全止腰痛亦愈七十六
程心童兒頰腮紅腫嘔惡發熱不能進食下午煩
躁口苦夜不能睡六脉洪大此俗名鷓鴣瘟是
也。迺少陽陽明二經之症法當清解以柴胡黃
梔各二錢乾葛竹茹半夏麩各一錢黃連枳殼
各七分甘草四分一帖而瘳其半再服腫消食

進而安睡矣七十七

程六十者原有喘嗽今腫發於面四肢俱浮大
溲小水少時多怔忡此痰飲症也以旋覆花
加桑白皮葶以仁主之旋覆花桑白皮各一錢
半夏人參橘紅茯苓各七分厚朴五分桂心其
草各三分薏以仁一錢五分生姜三片水煎服
一劑而怔忡除四劑喘腫俱消七十八
程七護夫發熱背痛起於傷酒醫治三月反加裏
後重瀉下紅白稠粘中脘有塊自鳩尾骨直

至臍如橫梁狀小水少且澁一日僅進粥二
劑不能起緣起即後重一墜腹中隱隱痛
與積塊九消之連與二日所下血屑甚多外與
滑石三錢當歸二錢桃仁川芎白芍藥枳實山
查各一錢酒苓酒連各八分木香六分升麻五
分連進四帖塊軟腹寬再以丹溪保和丸兼服
一月而消其六飲食大加紅白俱無塊痛硬瘳
雖云稍可然其根尚未易刈素多縱性飲啖無
忌每每為飲食所復病久而中氣虛弱難任峻

藥連與六君子湯加香附山查滑石紅麩木香
酒連調理而全迺囑之曰足下兩構危疾皆縱
恣所致不佞彈力盡技為足下拯之非易易也
固三生之緣有在幸無為再悞邵子謂爽口物
作疾快心事為殃足下其鑒諸七十九
程孺人黃氏予之內親也發熱頭痛遍身如燬口
渴譫語飲食不進先已迎程文峰氏瘳之認為
痛風止授以蠶丸及辛溫之劑進之予適至為
之診六部絃而洪數視其舌皆沉滑其脈洪刺

深厚神漸昏沉。廼語之曰：此春溫過時熱病也。法宜清解，彼視為痛風，而用辛溫，是謂如火益熱，適足以戕生，非衛生也。六和宇氏亦以予言為是，廼用石膏五錢，知母、麥冬各三錢，竹茹、甘草、黃連各一錢，生姜三片，一帖而神清，再帖汗津津出，始能言。熱解食進，又兩帖，一身輕快，自能坐立，再用薏仁、麥門冬、白扁豆、甘草、黃連、白芍藥、香薷、白茯苓調養而愈。八十

通身皆疼，手足牽扯而痛，牙疼經年不愈，此氣虛血熱症也。白芍藥二錢，當歸八分，人參七分，蒲黃五靈脂炒黑，側柏葉各一錢五分，甘草姜炭各二分，四帖，諸症悉減，惟牙痛尚存，改用石膏一錢五分，人參、石斛、當歸各八分，地黃、白芍藥各一錢，黃連、升麻各七分，白芷、甘草各三分，再四帖，牙疼亦愈。八十一

合近洲予族中至厚姪孫也。性拓落豪放，不羈，仲在茗與諸友泛舟遊於六浪之間，與至，即

百觥不辭，亦以是終為酒困也。嘔惡體熱，胸膈脹悶，腹中疼痛，大便秘結，飲食大減，茗之名醫如楊調元者，橋樑悉方治之，已三月，或愈或不，延至深秋，肌瘦神瘁，日進未僅二合，胸膈脹腹中痛，漠然畧所減，憊然而不可支，兩足皆有浮氣，歸謀於予。左脉沉絃而數，右關結實，大如碧豆，因詰其在茗所服之劑，荅曰：彼謂姪孫稟薄肌脆，宜當理脾，向服多理脾之劑，予曰：否，予所苦者胸膈脹悶，腹中疼痛，大便燥結，其累大

矣。理脾胃可以去此哉，適足以益病耳。經曰：塞者通之。又曰：通則不痛。其治此病之謂歟。廼取當歸龍會丸三下之，大便秘行五六度，又與酒連、酒苓、青蒿、姜黃、檳榔、青皮、半夏、葛根飲之，豁然焦兩通達，呼吸開利，惟頭畧暈，足上浮，未去前方，再加滑石、茯苓、薏仁、山查，與調中丸，魚服半月全愈。近洲喜曰：人皆謂我症係中滿，今不滿者，叔公力也。敢不德歟。予警之曰：吾聞君子之於身也，兢兢焉不敢懈，父母之遺體，無任天

和則疾疾不作無反天常則裁害不逢。遽伯玉嘗言行年五十而知四十九年之非况新愈後尤當痛懲庶保遐齡。區區母足恃也。別未五年予在宜興聞訃果以傷酒而卒。噫惜哉。八十二年秋仲下旬黃源金先生以中饋病急謁予於市。貌甚慘步立慄然語其症怔怔言溢於吻。不勝其憂執族醫尺一白予云病自仲夏吐血二梳餘粉以苓連枝葉生地芍藥大寒之劑投之一帖而止未幾則咳嗽徹晝夜後師謂咳自吐

後當從滋陰降火之治逾兩月盡其法而罔效。反加喘促洩瀉辰巳二時發熱煩躁師告技窮謂喘咳迺火刑肺金洩瀉迺脾胃已傷保脾則火愈熾而喘咳增加滋陰則洩瀉綿綿而元氣下脫經書所記咳而下洩上喘者死此症之謂也。但無可奈何矣語竟泪潛潛下予觀其怵忡之狀心不覺惕然動也。市去渠宅五里許即步去一視觀其面青喘促擡肩擷項息愈連身而倒脇背俱疼日夜不得伏枕脉之左溢右寸

陰降火藥法亦未爽。然而病轉增劇。其故何也。予荅曰。醫不難於用藥。而難於認病。余明甫查仲脩曰。市人議先生治疾多不循方。每每師心。金之役人。皆市為火症。而用寒涼。先生獨用溫。熱雖成功。小子竊為先生恐。予曰。病原於火。其勢之劇。以治之太峻。致然。夫血之初來。勢如湧泉。安能一吐遂盡。必有餘血。伏於經絡。思不及此。而以大寒之劑一帖而止。夫大寒之劑。豈能止血。適以凝其血耳。血凝經絡。滯於氣道。氣滯凝日甚。一日氣滯。又復生痰。痰與瘀血兩滯。經絡則肺氣不利。故咳嗽聲啞。不加察而為消痰。化痰導血歸經。又以滋陰苦寒之劑施之。則痰瘀愈凝。而氣道愈不利也。久則胃寒脾弱。反增洩瀉。晝夜喘促。不能卧矣。書云。上熱未除。中寒復生。而為陰盛格陽之症。故咳而嘔吐。予故始以桂枝乾姜之類。溫其胃。以桃仁葶汁丹皮。茜根之類。活其血。而消其瘀。故喘止而瀉除。東垣曰。脾胃喜溫而惡寒。信不欺也。古謂藥不貴

難方。而貴合宜。方即兵家之陣圖。匠氏之規矩也。圖可授人。而不能授人。闔匠可授人。規矩而不能授人。巧此岳武穆對宗留守云。運用之妙。存乎一心也。予遊方之外。亦不失方之內。惟不矢方。竊謂知方。知方合法。豈區區能哉。觀古人治虛怯之疾。即不治之症。亦能延之三五載。迺今治虛怯者。不半載而竟殞逝。猶駕言曰。殆今之天元運氣使然。故人多不壽。愚謂天元運氣。則人人皆如是。夫何予母八十有六。予父踰八望九。予伯母今九十有五。予表伯汪春元。東台之父。年九十餘。疆健不啻少壯。不思速天之由。皆為滋陰降火之法。起於丹溪。繼而玉節齋何大英之流。倡而和之。以成其風。此當今之大弊。而人未之警也。我師祖汪石山先生。揭而指之。惜乎未有繼其言者。一齊衆楚。故滋陰之禍。流而迄今。救以繼救。無已時也。二三子其識之。徐仲子其聞之乎。仲脩又問。先生何以認是症為主。

寒而非陰虛之火而又認其喘為瘀血也予曰
脈與症皆可考脈經云溢為氣滯氣滯則血凝
盛吐之後大寒之藥一帖而止其未盡之餘血
為寒涼所凝滯于氣道為喘書云從前來者為
本從後來者為標茲用活血消痰之劑其本
以溫熱暖胃之劑治其標故瀉止而喘定也若
夫陰虛火動之脈迥細數之候今脈滑大非陰
虛之脈陰虛喘嗽之症潮熱於夜而頰皆紅今
熱在辰巳陽分而面色帶青由是以知其非陰
虛之火迥誤用寒涼激其火而上行也經曰水
流濕火就燥中氣既寒火愈不能下矣正如兩
驟雷烈則電光之火愈熾日出而電光自息也
且陰虛火動火起九泉皆自足下湧泉穴起以
漸上升今膝下冷而上身熱兩尺脈又弱蓋由
咳而氣升經曰形寒飲冷則傷肺肺氣為寒藥
壅遏不得下降故咳而吐酸丹溪纂要云陰氣
在下陽氣在上喘咳嘔吐瀉白散加人參茯苓
五味子青皮故不從河間而用諸嘔吐酸皆屬

於火之治况今歲次甲午為濕土司運八月建
酉水土衰敗之時內經曰母遠時母代化且脾
惡濕濕多則瀉濕則生痰前後之師不考運氣
月令一槩而用滋陰降火之劑助濕生痰安望
其疾之愈也丹溪纂要云實脾土燥脾濕是治
痰之本也遵而用之如鼓應桴予故曰醫不難
於用藥而難於認病有以也八十三
族姪合溪年當八旬春初偶為寒襲發熱咳嗽醫
與芎藭散即汗出不止既連聲勺粒不入昏
情經旬汗日加既日甚延予診之六部浮大無
力重按三五不調六七至一止右關近滑診畢
語嗣君敬所曰尊翁由勞倦表虛感邪脈故浮
大無力法當從東垣補中益氣湯一二劑可瘳
也醫迺安為表散致汗滿神疲昏漉 此高年
值此寧不殆乎即可微倖圖安亦不過十日養
耳敬所勃然俛而對曰上巳後為家君壽期不
虞構疾竊憊若此苟保百日俾救水之心庶幾
必盡叔祖之賜多矣若十日又出於望外也三

即以太君子湯加山茹柿蒂以止嘔。丹加酸寒
 仁石斛以斂汗。一進熱退。既定。再進汗止。食入。
 三進需需然精神長矣。迺減去竹茹柿蒂。加當
 歸。半月全安。先是祝令君謂渠有耆德。請為介
 賓。以疾辭不及赴。迨季春。令君聞渠壽。即援例
 賜一級寵。以冠帶扁額。片彰。恩典光於鄉閭。
 後果三年而卒。八十四。

孝廉方叔度。令嫂汪氏。年甫三旬。患脹滿。諸名家
 或補或消。或分利。或溫或寒。悉為整理一番。東
 手而亡。本家惶惶無所適從。叔度曰。聞孫仲閣
 昔患此。與亦束手。比得孫生生者。治而起之。衆
 皆歛衽。欽服。仲閣伯仲適在館中。聞諮訪之。即
 發書介予。隨紹嚮往。診得左脉絃大。右滑大。予
 曰。此李東垣木香化滯湯症也。病從憂思而起。
 合如法按治。可保終吉。叔度喜曰。曩從事諸公。
 悉云不治。先生謂可保終吉。此故倉公有言。拙
 者疑殆。良工取焉。是也。幸先生早為措劑。予即
 照本方發四帖。服訖。渠果寬其半。繼以人參消

原缺

錢連進三帖。嘔惡止。胸膈寬熱。仍未退。汗瀉未止也。時有問予者。謂胡不用柴苓湯而退熱止瀉也。服石膏散。蓋瀉耳。予戲之曰。子適二脚。脚能認此為何。而用柴苓湯也。仍以胡一錢。名一錢。為佐。生薑五片。遠進二帖。汗黃。各一錢。為佐。生薑五片。遠進二帖。汗則津津然出。熱退瀉止。口不渴而眠矣。予因它往。晉藥三劑。而囑之曰。胃氣初回。勢必思食。宜謹慎不可多進。若多則餘熱復作。必成食復。治

新印

六七

將費手也。慎之慎之。後五日。果以食不慎而復病。予又至。熱較前為重。且加懊懣。夜語語。如見鬼狀。口大渴。甚燥。舌甚黑。有芒刺。熱危甚急。以前方加加。各三錢。遠進二錢。煎飲之。二帖。復止。餘症猶然。夜更甚。前方減去豆豉。黃連。麥冬。生地。白芍。一日二帖。舌以井水。生薑。碎去黑胎。用蜜調玄明粉塗之。而胎去矣。服三日。始得微汗。諸症盡減。再四叮嚀。慎飲食。調。三月。始得微汗。諸症盡減。再四叮嚀。慎飲食。調。三月。始得微汗。諸症盡減。再四叮嚀。慎飲食。調。

傷寒謂叔不用柴苓湯。退熱止瀉。而用石膏。非。迺竟以石膏收功。何也。予曰。此問甚善。蓋醫者。認症。此症。迺少陽陽明合病也。柴胡白虎湯。膏根為二經對症之藥。服之。可解肌熱。止口渴。若柴苓湯為太陽少陽合病之劑。內有五苓散。迺太陽經之裏藥。症非太陽。冒敢用之。且其內有人參。白朮。肉桂。皆助熱發燥之味。誤投則必發。其齒燥。舌乾。而焦黑。又何敢用。扶苓澤瀉。諸本利之使。益亡其津液耶。古人謂以傷寒為

大病。不察症而誤投。則生死立見。傷寒論有言。不得汗。不得下。不得利。小便是謂三禁。故曰少陽陽明。不從標本。從乎中治。小柴胡白虎湯中。治劑也。人徒見其大便作瀉。為瀉底。不察瀉皆清水。無糟粕者。為熱極所致。症迺春溫時疫也。但為發散。使清氣上升。而微有汗。瀉當自止。此瀉。豈五苓散所能止哉。止則誤事。岐原曰。夜重。如見鬼者。何以故。予曰。熱入血室故也。岐原曰。男子亦有血室乎。予曰。血室男婦同之。衛任二

脈為血之海。二脈附於陽明。今病廼陽明之熱。遺入血海也。故加生地白芍而効。余治傷寒用柴葛解肌湯及柴胡白虎湯而熱不解者。加此二味。則熱無不退。汗無不出矣。且下午與夜又陰分主事。欲解血海之熱。必投此二味以收其功。此亦予一得之愚也。岐原曰。善願記之以詔後來。八十七

鍾澤有程慶奎孺人者。年將五十。僅一子。念一歲而歿於痘。且夕哭之。哀且彌月。攬鏡自鑑曰。何

子死而形色不瘁如此。因持鉄如意錘其胸。絕粒斷漿。肌容日瘁。時為初秋。寒熱交作。嘔噦懊懣。遍身疼。夫為過延。診視却藥不飲。諸醫百笑。關譬拒而不聽。媳與孫跪而懇。姻族就而諭。其不納者。一也。惟合睫以待死。已而作色語。其夫曰。疔之。以。不延名醫。一決生死乎。夫曰。所延皆名士。病者曰。昔常聞程方塘參軍患瘋三年而起者。誰曰孫君。又問吳西源孺人病燥揭痰喘三年。與程道吾內眷。勞瘵暈厥。誰為

起之。夫答如前。病者曰。何不請孫君決我生死。夫聞言。物色微予。五日而後至。則薄暮矣。病者猶疑為誕也。私至三家訪予狀。皆曰。魁然長髯者也。朝覲面。診之。畢則問曰。何日死。予應曰。病勢危。死不遠。病者喟然嘆曰。死不足惜。第九華山香愿未了為恨耳。予曰。孺人大愿不思。何須以此小愿為孜孜也。孺人曰。無大愿。予曰。人之脩短有數。今年之痘死者不可勝計。令嗣之死亦數也。然有二孫可承宗祧。孺人能忍哀

撫孫使其成立。娶婦以蕃後胤。令嗣雖死猶不死也。而孺人亦有令名。若不此之思。憂傷以殞。夫君必娶。娶必少年。繼室生子。則必厚其子而薄孺人。孫晚娘晚爺之誑。獨不聞之耶。孺人萬金之家。使令孫不得其所。令嗣九泉之下。恐不能無憾。孺人憂死何益也。愿孰大於此者。予故謂未之思耳。孺人試思之。誰輕誰重。當自辨也。語畢。慨然曰。先生言至此。吾如寐者得醒矣。願病勢去死不遠。何能得如吾愿。予曰。所謂近

病也。非脉也。脉左絃細。右關滑。故發熱體虛。噦。延秋來瘡。症非死脉也。若如前執拗不服藥。不進飲食。書謂絕穀者亡。殆非虛語。孺人誠聽予言。以二孫為念。以大體為重。予以活血養血之劑。而治其傷損。以小柴胡加竹茹滑石。以和陰陽而止其嘔噦。不一月而可無恙矣。奚憂哉。果從予言而進食服藥。調理五日。寒熱嘔噦皆止。後以丹參劉寄奴各三錢為臣。五加皮五錢為君。香附一錢為佐。入四物煎服。果一月而

全可矣。程孺人病起而聞者皆曰。七發起太子之病。觀於孫君益信。八十八

歎。潛口汪召南令郎。年十四。患盡脹。大如覆箕。經醫三十餘人。見症皆駭而走。獨市之幼科汪養直者。調身。見効。第此子溺於養卷。縱口腹不。忘病多反復。一日語召南曰。即君之症。非。孫生生者不能成功。召南曰。聞此公多游。浙縉紳間。何可以月日致也。養直曰。歸矣。吾子妹適羅田。為方與石丘嫂也。舊歲患症如

盡。治經彌歲無功。生生子立全之。吾推較孫君者。豈有他腸。為即君也。召南即宛羅田。延予。予至日已。晡矣。觀病者腹脹大極。青筋縷縷如蚯蚓。大上自胸脯至手腕而止。惟喜其不下現也。臍平。四肢面目皆浮大。兩足胫骨上各裂開。大出清水。一日間數為更衣。易被陰囊光腫如泡。淫淫滲濕。發寒熱。脉以手腫不能取。必推開其腫。下指重按浮而六至。予曰。症可謂重之極矣。僅可恃者目瞳子有神。餘皆陰惡。將何以治。

新柳三卷

養直知予至。亟過相陪。宣言曰。病重不必言。引領先生久矣。幸為投劑。生死無憾。予曰。且先為理表。若表徹。稍得微汗。使肺氣少利。則小水可通。召南喜而亟請藥。廼用紫蘇葉。蘊子。陳皮。麻黃各一錢。桑白皮八分。防風杏仁各七分。炙甘草桂枝各三分。生姜三片。水煎服之。五更廼有微汗。次早面上氣稍消。胸脯青筋皆退。餘症雖仍舊。枳栝則可生矣。仍投前藥。次日腹與四肢皆有縐紋。惟小水未利。廼改用破故紙。蒼朮。赤

澤瀉桑白皮赤小豆桂心木香二帖而小
水利駸駸已有生意迺以飲食過度大便作瀉
又以四君子湯加以仁破故紙澤瀉山查砂仁
調理而全安此症予閱歷者不下數十然青筋
未有如此之粗足胛出水有之未有出水處如
鮎魚口之大而取効亦未有如此之速蓋此子
體未破而真全故症雖重而收功速也數十人
間有五六不能以功者由其縱慾恣情不守禁
忌非藥之罪也召南昆仲見人談醫輒以不佞

為稱首予笑曰君得無到處逢人說項斯者耶
迺汪養直亦醫道中白眉迺不收功於後病者
不忌口過耳於養直何尤養直不矜己之功亦
不佞人之功所謂忠厚長者非耶

石鎮鄭景南夫病卧年餘百治不効昔體豐腴今
瘦骨立飲食少進新都名士皆辭不治其家聞
昔年方士榮孺人盡症時師亦皆辭去予為起
之因徵予治時則六月望也診其脉左絃大右
關滑大兩尺俱盈

如雷晝夜不住小水不利肌膚及眼珠色若黃
金腹中有塊如椽動跳不止足膝以下皆冷飲
食不入予詳思其病機昔肥而今瘦者痰也形
雖瘦而目炯炯有神先以五飲湯姑試之以觀
其勢再為加減因用旋覆苓八分破故紙一錢
肉桂三分白朮茯苓澤瀉陳皮半夏各八分生
姜三片水煎服之二帖惡心腸鳴皆止次早飲
食稍進舉家欣喜色喜令岳程鍾山公於予為
石交聞病有却意心殊異之不知為予因而過

訪見子拊掌大叫稱快曰吾固知是公也指其
甥而語之此即所嘗與尔曹言者聞久為西吳
縉紳返番不意今歸誠吾婿之幸也相與談對
兩日而別別之時景南飲食稍加小水利肌膚
面目黃氣退漸有生機不虞逾半月為拂意事
所激而怒復吐痰不思飲食家人驚惶無措亟
請予診兩寸滑大左關絃勁搏指右關亦滑大
有力兩尺沉微予語之曰病甚重脉非前比且
不敢以萬全許第盡吾心爾病以藥力而回君

之福也時為七月之朔子因視七日日進
劑劑以人參陳皮半夏茯苓附白芷仁黃連
旋覆花麥芽甘草與服服三日惡心止大便有
稠痰下其中間有痰血此皆怒所致故經云
怒則傷肝甚則嘔血并下洩上吐亦或有紅點
子在痰中吐出是其徵也後改用六君子湯加
牙黃連枇杷葉白扁豆調理勢駸駸向安
腹中如櫟之塊亦漸消去大如指耳肌肉亦
生能下榻舉足以步市上之人稱奇九後閏
正月

脈發瘰癧外科以而送

醫案新都治驗四卷目錄

- 孫子元瘡後沐浴鼻出紅涕面足浮腫一
- 一婦食積痰飲瘀血流於下部左跨臍腹脹痛
- 恒宇令堂右肩筋攣腫痛三
- 孫君錫頭痛胸背脹飲食作吐咳嗽四
- 孫爾嘉內人三姪而三小產五
- 孫薇垣內人咳嗽紅痰六
- 戴萬奇夫中痰後兩手足不能動七
- 族學人內眷頭痛玉戶撮急肛門逼迫遍身皆疼大四十
- 梓林兄內眷右手痛風小水頻迫九
- 一婦經閉三月洩瀉嘈雜吐酸十
- 程氏婦下午喉痛痰多暈厥十一
- 汪銀兄時疫熱病汗出不止十二
- 何明吾時疫食復不省人事循衣摸床十三
- 孫元素春溫食復發斑十四
- 孫安飢勞感疫食復發斑十五
- 一人喉痛夜卧氣壅面足浮腫十六
- 何洗心虛寒腎洩十七

程淵孫人鼻衄後眩暈嘔雜嘔吐清水
 孫君孝春溫誤作陰虛治
 一僕婦頭疼喉痛咳嗽嘔惡胸膈作脹
 族侄婦范氏乳癰
 表侄女黃氏姪七月患血痢
 程氏婦小產後患赤痢
 孫竹堃受暑作吐又傷酒麪身黃成疸
 程菊泉暑月喘嗽
 程應禎兄咳吐紅痰胸背脹痛眩暈
 虛山內人胸脇脹痛五更嘔雜
 一婦暑月小便不利玉戶腫大便血
 弟婦戴氏臍腹痛白帶如注裏急後重下痢赤白
 族弟應童胃腕當心而痛
 弟淑南三陽合病暑症
 一富婦轉脘
 文約孺人八十三胃腕痠痛
 息童弟三陽瘡
 程好吾春溫

程氏婦屍從子尸出
 孫子應童之弟十月發三陽瘡
 吳中岳孺人疫後壞症
 鮑子五保時疫耳聾瀉瀉
 僕子孫守中麻後咳嗽無痰唇厚聲啞
 僕子得貴春溫頭痛
 元素侄令政春溫後經水適止
 朱氏子天送時疾頭疼身若燔炭
 朱桃源內人胃腕痛常苦夢遺經水一月兩至
 桂澤火兒痰積痰血作痛
 熊二官疫後食復
 室弟東里內子咳嗽吐紅
 程竹坡內人年六十瘟疫昏憤
 程內春新寡七日染疫適值夢洩神昏譫語
 太學從明滯下純血
 查少川喘後腫脹
 夏益吾肢節腫痛手足冷痛腫尤甚
 陽侄內人肺癰

一第... 冊... 頁...

木內人氣喘作脹 五十四

侄孫女十歲大便脫肛鼻中出血 五十五

唐岩祈患痢赤白腹脹氣喘四肢冷陰囊腫 五十六

侄婿程東山患休息痢下皆紫血 五十七

陳氏婦腸鳴腹痛合目汗出下午潮熱 五十八

九德侄耳鳴 五十九

陳覺宇上盛下虛合目亂語疾火吼喘 六十

程紹溪中年患鶴膝風 六十一

堂嫂程氏喉間有物如嚙咬之不出嚙之不下 六十二

一婦產後咳嗽發熱咳出之痰色黑而臭 六十三

表嫂孀居二十年右癱不能舉動神情恍惚乳言 六十四

多悲泣 六十五

桂亭大兄墜橋後腰脇脹痛 六十六

堂嫂王氏吐紫黑血塊足跟痠腫痒痛 六十七

堂婦程氏姙五月痢下膿血 六十八

嫂汪氏頭痛遍身痛痢下赤白 六十九

仲閣氣虛中滿 七十

朱懷竹楊梅毒氣內攻上迫於肺將成肺癰下流 七十一

陰囊囊潰見子 七十二

查良本令春每飲食悉從背後而下 七十三

後溪大兄孺人戴氏患血痢 七十四

邵敬圃迺暮胃脘痛 七十五

蘊望臺患瘧 七十六

汪氏姐寒痰壅滯 七十七

徐客兄子筋痿 七十八

邵老封君手足麻而無力 七十九

程巢父迺即痢後風 八十

葉潤色心曠嘈雜好啖肉尤好雞腹太痛虫症也 八十一

程相如令政孕七月患痢 八十二

程曉山中風先兆 迺即麻後痺症 八十三

一婦疫後虛寒 八十四

從獻長郎七歲患痢痢後成痺 八十五

侄孫子忠痢下紅膿如爛魚腸腹大痛日夜百次 八十六

元素內人雙胎難產 八十七

邵馬兄患嘔吐所出皆如爛猪肺 八十八

許卓峰上吐血下瀉血咳聲啞 八十九

大嫂江氏患痢者旬有餘日 痰涎粒粒 月 一

仰來儀夫令春咳 桃木 一

程玄祖兄春 一

汪即兄 一

查昇川 一

程王吾內 一

一黃氏婦 一

吳見朝 一

侄女 一

從月 一

小童 一

族侄 一

一婦 一

從弟 一

中有血 一

黃懷 一

一族 一

婦戴氏心痛徹背背痛徹心一發必七日 百五

元僕來興痰火上壅胸脇背心脹痛 百六

一婦生女不生子多思多鬱小便秘而不通轉膠 百七

症也 百七

昆池太學內人牙痛一晚暈厥三次 百八

一僕婦產難子宮墜出戶外半月不收 百九

侄孫媳程氏體肥經閉者八年 百十

熊成八官早起行路眼見邪火二團滾來大被驚 百十一

駭 百十一

明新女生子孫一奎文垣甫輯

門人 余煌

徐景奇

子 恭來

朋來

全閱梓

新神治驗

孫文子元素多瘡疥近因沐浴鼻涕出紅面足浮腫汗多左脉大而有力右寸亦大腰脉多思

而氣不暢以葛根大腹皮厚朴赤茯苓黃連

酒煎不絕食藥後大便通可百斤冷水宜飲之導

一服後大便通可百斤冷水宜飲之導

一服後大便通可百斤冷水宜飲之導

一服後大便通可百斤冷水宜飲之導

一服後大便通可百斤冷水宜飲之導

一服後大便通可百斤冷水宜飲之導

一服後大便通可百斤冷水宜飲之導

一服後大便通可百斤冷水宜飲之導

深之經挾鬱而痛恐成腸鳴

一帖半夜後痛即減半汗亦尋止次日

脉稍退小腹堅如石按之且痛日與前無異

環跳穴亦作痛直至於膝小腹痛飲小更

大便亦未通利仍與前藥每帖用大

加牡丹皮莪朮五靈脂金銀朮服下大便利

熱退痛止小水亦長諸症悉平

大學恒宇姪令堂仲有右肩筋搐腫痛夜尤甚次

日痛連胛下出膈入曲池且洒淅寒熱以二陳

湯加南星酒茶白姜蚕羌活秦艽歲靈瀝服後

至子丑時痛乃減半而筋不搐矣紅腫畧消次

日減去南星加當歸川芎其夜肩痛又遞減但

一夜不睡口乾舌硬用川芎當歸防風秦艽甘

草歲靈仙白姜蚕酒茶白芍藥服此熱全退痛

全減飲食始進以人參川芎白芍當歸甘草秦

艽姜蚕防風陳皮調理良

姪孫君錫頭痛胸膈脹食下高便試咳飲不

住口痰濁如膿大便結燥脉之微右寸洪六

二時湯加竹茹滑石石膏酒連麥冬連進四劑
夜與益元丸兼服而嗽吐俱止惟痰濁如膿色
且腥氣觸人此將欲作肺癰改用牡丹皮麥門
冬山梔子甘草貝母枳殼桑白皮紫苑知母當
歸生地黃桔梗四帖全安四

姪孫爾嘉內人三孕而三小產六脉滑數迺氣虛
血熱也由其熱故多滑下因其血頻下心甚恐
怖終日偃卧畧不敢起身稍起血即大下與生
地黃白芍藥白朮地榆桑寄生續斷甘草升麻

椿根白皮黃栢條芩服之而血三日不來惟白
帶綿又下過五日後因有不得已事起身稍勞
血又大下予謂血滑已久如水行舊路若不澁
之必不能止又思血海甚熱亦肝風所致防風
子芩丸正與病對宜製與之又製白芍藥六兩
側栢葉條芩各三兩防風椿根白皮各二兩蜜
丸服之從此血止胎安足月而產一子此後連
產三子並無胎漏之患後遇胎漏通用此法莫
不良已附告同志以便取用五

瀉膿穢垣姪內人喉中掀痒咳唾紅痰兩寸閉甚
大內熱生瘡山梔子小蘗生地牡丹皮滑石青
皮麥門冬甘草黃連瓜蒌水煎飲之而血止嗽
除後遇勞心即咳嗽喉中血腥總由上焦熱
而然以枇杷葉山梔子生地白芍藥甘草牡丹
皮地動蜂天荅粉滑石紫苑常服三五劑兩月
而安六

戴萬奇夫中痰後而右手不能伸動與之牛胆南
星陳皮茯苓甘草天麻姜蚕黃連木通石菖蒲

防已服後手稍能動惟左邊頭痛喉舌俱痛大
便秘結三日一行又與川芎荆芥玄參桔梗柴
胡酒茶蔓荊子甘草杏仁枳殼水煎飲之諸症
悉減但下午體倦右邊頭微痛後又為怒氣所
觸舌掉不言頭復大痛與連翹甘草山梔子薄
荷石菖蒲遠志木通麥門冬五味子白芍藥黃
栢調理而愈十
亮卿文學內人頭痛遍身痛前後心兩乳皆脹玉
戶撮急肛門逼迫大便三日未行口乾因大辨

事而起。下午發熱。似癘。惡心煩躁不寧。而時
當盛暑。迺怒氣傷肝。挾暑熱而然。以石膏三錢。
青皮。柴胡。枳殼。各一錢。半夏。麩黃。各八分。甘
草。桔梗。各五分。夜與當歸。龍會。丸下之。大小便
皆利。熱退。而諸症悉減。惟畧惡心。與青脾飲。兩
帖全安。^八

梓林兄令眷。右手痛風。小水頻迫。起身稍遲。即出
不禁。足有浮氣。年過六十。右寸關脈濡弱。左手
和。此脾虛停濕之症。近且咳嗽。用六君子湯加

蒼朮。石菖蒲。遠志。大附子。晚蚕沙。倍加。薏以仁
緩治而平。^九

一婦經不行者三月。大便瀉。腹脹嘈雜。吐酸水。時
下白帶。常惡心。自以為有孕。予脈之候。非有孕
迺脾經有濕熱。心經有瘀血症也。與二陳湯加
白朮。澤瀉。猪苓。酒連。木通。吳茱萸。滑石。麦芽。山
查。瀉止。腹寬。經行。腰腹作痛。以川芎三錢。當歸
五錢。香附。丹參。菝葜。仁各一錢。水煎服之。經雖行。
口中吐出黑血。水甚。且。有。如。膿。者。改用四

物湯加牡丹皮。丹參。桃仁。紅苓。山梔。滑石。調理
西月而痊。^十

姪婦程氏。下午喉痛。近來痰多。暈厥。一日二三發。
頭痛面赤。素未生育。左脈絃大。右寸關滑大。有
力。以荊芥。薄荷。甘草。桔梗。玄參。姜蚕。柴胡。枳殼。
竹茹。貝母。水煎飲之。連進二帖。其夜得睡。惟背
脹。怔忡。痰猶不清。面多熱。用黃芩。枳殼。甘草。桑
白皮。地骨皮。天荅。粉玄參。前胡。半夏。麩。橘。紅。山
梔。仁。調養而平。^{十一}

江銀兄時疫熱病。被發汗。過度。熱留胸中。煩燥不
止。嘔惡不安。汗竟不斂。口且渴。脈之獨西。關洪
大。此陽明之熱尚在。當以白虎生脈湯為主。石
膏五錢。知母三錢。人參。白芍。藥。甘草。石斛。各一
錢。麥門冬二錢。五味子十五粒。急煎飲之。而熱
退。繼以益元丸服之。而吐亦安。^{十二}

何明吾時疫食復。大便不通。嘔惡內熱。昏憤不省
人事。或作夢語。循衣摸床。此熱在心包絡經。以
竹茹。麥冬。知母。心。一。錢。陳皮。半夏。麩。酸。東。

枳實各八分。甘草三分。服之。至夜半人事稍
清。餘熱未散。用石膏三錢。知母二錢。竹茹。麥門
冬。生酸。寒仁各一錢。天。荅。粉。陳。皮。各七分。枳實
麥芽。半夏。麩。各六分。水煎飲之。下午大便行而
熱退。諸症悉愈。十三

蘇。元。素。春。溫。頭。痛。發。熱。左。脉。絃。大。右。洪。大。以。小
柴。胡。合。白。虎。湯。二。帖。而。愈。迺。為。食。復。發。斑。色。紫
神。昏。人。事。不。省。身。重。不。能。轉。動。即。水。火。皆。不。自
知。合。目。釘。睡。形。如。醉。人。面。赤。發。熱。舌。胎。外。黃。內

黑。皆。有。芒。刺。三。日。後。予。至。脉。之。六。部。俱。浮。洪。以
三。黃。石。膏。湯。加。枳。實。煎。甲。進。之。稍。得。微。汗。大。便
如。有。真。糞。次。日。絕。開。目。言。語。乃。進。粥。一。盞。改。以
小。柴。胡。湯。加。山。梔。枳。實。煎。甲。白。芍。藥。調。理。而。愈
十四

僕。子。孫。安。室。晨。出。門。途。次。食。麵。三。椀。飢。勞。感。疾。因
麵。內。傷。表。裏。皆。熱。及。至。績。溪。街。中。昏。悶。謔。語。頭
痛。身。疼。腹。痛。醫。不。奏。效。勞。倦。感。疾。遽。以。遇。仙。丹
下。之。六。便。瀉。三。四。十。行。身。下。而。為。挾。熱。下

利。之。候。急。歸。視。之。舌。沉。香。色。額。疼。口。乾。燥。鼻。頰
悶。昏。又。惜。又。脉。左。絃。數。右。洪。數。但。不。克。指。知。為
誤。下。壞。症。以。柴。胡。石。膏。各。三。錢。白。芍。藥。黃。芩。竹
茹。葛。根。各。一。錢。天。荅。粉。甘。草。各。五。分。山。梔。子。枳
實。各。七。分。葱。白。五。莖。水。煎。服。之。後。半。夜。吐。蛇。一
條。乃。稍。得。睡。次。早。大。便。瀉。二。次。嘔。吐。酸。水。腹
仍。痛。改。用。小。柴。胡。加。滑。石。竹。茹。夜。熱。甚。與。絲。瓜
汁。一。碗。飲。既。神。頓。清。爽。少。頃。藥。力。過。時。煩。熱。如
前。再。以。絲。瓜。汁。一。大。椀。進。之。即。大。發。戰。予。謂。此

非。寒。戰。乃。作。汗。之。徵。耳。不。移。時。汗。果。出。而。熱
猶。然。憶。活。人。書。云。再。三。汗。下。熱。不。退。以。人。參。白
虎。湯。加。蒼。朮。一。錢。如。神。迹。此。再。加。玄。參。升。麻。柴
胡。白。芍。藥。黃。連。飲。後。身。上。之。斑。先。發。者。紫。後。發
者。紅。中。夜。後。乃。得。睡。而。熱。散。斑。尋。退。去。腹。中。微
疼。腸。鳴。口。渴。右。脉。尚。滑。左。脉。已。和。再。與。竹。葉。石
膏。湯。加。白。芍。藥。蒼。朮。服。後。睡。安。腹。仍。微。痛。用。柴
胡。芍。藥。各。一。錢。人。參。酒。荅。陳。皮。半。夏。各。六。分。甘
草。三。分。烏。梅。一。枚。服。此。腹。痛。漸。減。精。神。駁。又。長

惟兩膝痛不能轉動。此大病後汗多而筋失
養之故。宜當補益。人參黃芪白芍藥桑寄生枸
杞子。薏以仁桂心牛膝。熟地黃水煎服。後加木
瓜黃柏當歸。減去桂心。調養而痊。十五

一人喉疼。夜卧氣壅不能伏枕。痰嗽不出。遍身生
瘡。面足皆浮。夜間發熱。睡醒多出冷汗。此由脾
經有濕。熱水氣不利而然。薏以仁款冬。老陳皮
貝母。前胡。蘿蔔子。桔梗。桑白皮。茯苓。甘草。服此
喘嗽大定。乃得伏枕。惟下體腫脹不消。且膚皮

紫硬。小水黃。動作則頭眩。用大腹皮。茯苓皮。陳
皮。桑白皮。五加皮。生姜皮。木瓜。姜黃。四劑而消。
十六

善易數者。何洗心。每飲食稍冷。饘粥或稀。必作脹
瀉。理脾之劑。歷試不瘳。就予診之。左三部皆濡
弱。右寸亦然。關滑尺沉微。此下元虛寒所致。法
當溫補。以補骨脂杜仲。兔絲子。各二錢。山茱萸
肉。人參。山藥。各一錢。白茯苓。澤瀉。各八分。肉果
五分。數劑而愈。十七

相孺人孫氏。真。後眩運。嘈。嘔。吐。清水。夜卧
不安。腹中飢而食不下。由脾屬肝。胆有鬱火
也。以人參黃連。白朮。扁豆。甘草。陳皮。半夏。竹茹
茯苓。石膏。水煎。調養而平。十八

妊君。孝。後。溪。兄。次。子。也。三月患頭項痛。腰脊強。遍
身如被杖。臍腹亦痛。口渴。渴不寐。飲食不進。六脉
浮數。吳醫以為陰虛。為滋陰降火。三投而三劇
反加。嘔惡。又與疎通。熱尤不退。下午煩亂。延方
和。字。丈。視之。以為外感。擬進人參敗毒散。吳爭

之。謂陰虛體弱。難再汗。仍用四物湯。加柴胡。葛
根。薄荷。黃芩。知母。而熱如焚。神且昏冒矣。予時
遠出。促歸診之。六脉浮絃而數。鼓指。語之曰。此
春溫症也。方診良是。因復加內傷。以故病劇。滋
陰之劑。壅而作滯。且引邪入於陰分。宜乎熱加
而躁悶也。法當清解。兼消可愈。無傷。以一陳湯
加羌活。柴胡。防風。麥芽。山查。服下得微汗。熱退
其半。惟下午作潮。大便未行。腰臍之痛不止。用
小柴胡湯。加葛根。白芍藥。青皮。黃連。山查。飲下

熱又少退大便已行腰臍之痛亦隨減去但不
知餓再以柴胡甘草青皮枳實麥芽知母黃芩
白芍藥諸症悉平惟覺體倦乏力加人參白扁
豆薏以仁減去柴胡青皮調養而痊十九

一僕婦頭疼喉嚨痛咳嗽嘔惡吐痰胸膈作脹經
水適來身熱口乾此少陽經痰火症也用柴胡
為君半夏白芍藥竹茹為臣葛根天竺粉橘紅
桑白皮黃芩知母為佐甘草桔梗為使一帖微
汗而熱散痛除惟痰嗽不轉小水短濇柴胡知

母竹茹麥冬各八分白芍藥一錢滑石三錢黃
芩貝母桔梗各七分五味子十二粒甘草三分
一帖而瘳二十

族侄婦范氏大叅晞老女也素有痰涎胸腹痞脹
近因乳腫大發寒熱欲成癰毒以加味神效瓜
萸散二帖寒熱雖退而腫不消用貝母白芷為
臣瓜萸為君赤芍藥當歸連翹為佐青皮甘草
柴胡為使痛雖減而腫仍不消脉之近數知已
成膿乃與內托十宣散加金銀卷蒲公英兩帖

而膿潰因脚上生瘡而有浮氣前方去蒲公英
金銀卷加薏以仁蒼耳子調理全安二十一

表姪女黃氏孕已七月患赤痢腹痛後重體素弱
舉家甚憂以白芍藥三錢條芩一錢伍分白朮
地榆各八分甘草三分二帖而愈後五日報云
因稍勞痢又復來服以當歸三錢川芎一錢半
真阿膠二錢艾葉三分一帖全瘳二十二

一程氏婦吾孫門女也小產後二十日矣患赤痢
一日十餘次怯寒惡食小腹脹痛脘之右寸滑
大知其虛中有熱憶其惡露未盡故小腹脹痛
專科泥丹溪產後大補氣血之語槩施之因而
作痢乃翁曰病尚怯寒何云有熱予曰書云惡
寒非寒明是熱症由熱極而似水也飲藥後當
自知之以白芍藥當歸滑石為君桃仁酒芩酒

連為臣木香桂皮檳榔為佐青皮為使服下果
去臭黑瘀血甚多小腹頓寬惟口乾小水必惡
心怕飲食體倦仍重急後重人參川芎白芍藥
各一錢當歸一錢五分酒連陳皮各六分木香

二分。外與清六丸服下。熱除痢減十之八矣。但大便不實。惡心虛弱。以四君子湯加酒炒白芍藥。陳皮木香肉果酒連當歸養之。而平。二十三
孫竹塹。浙歸途次受暑。又為酒麪所傷。因而作吐。胸膈痞悶。時師以消導之劑。燥動脾胃。口渴嘈雜。躁亂不寧。目珠如金。一身盡黃。已成疸症。診獨右寸脈滑大有力。先以溫胆湯倍加香薷滑石葛根解暑止吐。為君。黃連麥門冬清熱止渴。為臣。使濕熱散而黃自瘳也。連與三帖。吐止食進。黃亦定矣。再與五苓散加青蒿葛根滑石黃連枳實八劑。而黃釋然。十四

仁一錢五分。栝梗知母各五分。五味子十一粒。桑白皮一錢。陳皮六分。服下痰減大半。胸膈仍不舒。口仍乾。脚仍熱。前方減去款冬。苓五味子。加枳壳葶藶子。兩帖全安。二十五
程應禎。兄胸膈背心時常脹疼。頭眩暈。脚軟弱。手指痛。咳吐紅痰。診其脈左關絃大。右寸關滑大。予謂此食飽後感於怒。老痰瘀血積在上焦。宜其胸背脹疼。而熱壅也。治當清化上焦。使新痰不生。宿痰磨去。則萬全矣。如落時套。用地黃山茱萸等滋陰降火之劑。是以滯益滯。則熱無由去。痰無由消。而痰益增不去也。病者聞言。謬然曰。未見公時。業已服過一月久矣。疑其飲食。而熱尋加。胸背痛脹。迺長哉。予曰。今反轍。幸早耳。再遲。則敗事。亟以青皮枳壳陳皮快其氣。而疎其壅滯。蓋痰隨氣行也。貝母桑白皮以消餘痰。而清其熱。牡丹皮滑石桃仁消其瘀血。山梔仁開鬱清熱。白芍藥伐肝補脾。甘草調和諸性。緩而理之。當見其去。去甚也。別後半月。復書

報云胸背之脹減三之二血已十日止矣痰如
舊改以山梔仁牡丹皮丹參赤芍藥桃仁各八
分滑石三錢五靈脂當歸尾各一錢半夏麩青
皮各六分諸症悉去獨足心熱再以黃柏知母
以仁牛膝甘草白芍藥茯苓陳皮貝母石斛杜
丹皮調之如初二十六

虛山內人胸脇脹痛五更嘈雜每一嘈雜則痛發
更甚左寸關脈洪滑右關亦然此肝胆有鬱火
胃中有膠痰廼有餘之疾內經云木鬱則達之

蓋木火之性貴乎疎通當以龍會丸條而達之
顧痛則不通通之則不痛也服龍會丸一錢五
分大便行一次痛隨殄迹惟穀不開以陳皮紫
胡貝母茯苓甘草白芍藥酒苓香附杏仁桔梗
調之而安二十七

婦當暑月小便不利而痛玉戶腫且又便血發
熱左脉絃數右寸短弱此肺氣不足肝火太熾
蓋肝為血海肝又主小便玉戶為肝經所絡之
地治當疎決肝經壅塞俾氣暢則血得以歸

經熱解則小水可不痛而腫亦可消矣以滑石
三錢桃仁當歸白芍藥各一錢紫胡黃連人參
各八分川芎六分甘草桂皮白芷各三分四劑
而病如失二十八

族弟婦戴氏腹中痛在臍腹白帶如注四肢痠
疼大便裏急後重已成赤白痢矣脉之兩寸關
俱滑數尺亦數以白芍藥當歸黃連黃芩木香
枳即桂皮甘草滑石桃仁桔梗一劑而紅止惟
小水短澀下午發熱大便一日夜仍四行改用

白芍藥當歸白朮陳皮滑石甘草茯苓厚朴酒
連酒苓桔梗紫胡木香飲下諸症悉愈惟頭痛
腰疼再以桂心當歸白芍藥白朮茯苓甘草酒
苓酒連破故紙木通黃柏煎服全安二十九

族弟應童胃脘當心而痛手不可近疑有瘀血使
然玄胡五靈脂牡丹皮滑石川芎當歸甘草桃
仁桔梗香附水煎臨服加韭菜汁一小酒杯其
夜痛止得睡飲食亦進惟大便下墜逼迫不安
此瘀血已動欲下行也前劑減去韭菜汁一帖

全安 三十

子弟淑南額痛遍身疼口乾舌胎黃左脉浮大
六部俱數時當仲秋初旬以小柴胡合白虎湯
加羌活熱仍不退下午用六神通解散以葱湯
調服三錢熱稍退至半夜後又復熱額疼頂巔
尤甚舌根黃且焦黑小便赤痛煩躁不睡遍身
又痛此三陽合病暑症也次日以小柴胡大加
石膏為君葉本白芷竹葉粳米生姜大棗少頃
汗大出至足熱始盡退猶煩躁不睡仍以小柴

胡湯加桂枝山梔子竹茹竹葉飲下煩躁寧而
得睡餘熱悉平精神爽而向安矣 三十一

一富家婦當仲秋大小便秘者三日市師以芭豆
丸二帖大便瀉而小便愈秘脹悶臍突二寸餘
前陰脹裂不能坐卧啼泣呻吟欲求自盡此轉
疔病也相樹東行根皮一寸滑石二錢玄胡索
桃仁當歸蘆麥各一錢水煎服入韭菜汁半
杯服後食頃而小便稍行玉戶痛甚小便赤澀
用力努之則不能出改用升麻桔梗枳殼玄胡

索煎成調玄明粉二錢乃提清降濁之意服後

大小便俱行始不脹急次日報云每大小便來
時腹中先痛有淡血水小便短再以丹參升皮
當歸白芍藥甘草青皮香附玄胡茯苓山梔子
山查兩帖各症良安 三十一

孫文約孺人年八十有三胃脘疼痛手不可近腹
中飢而飲食不能下兩寸關脉滑大兩尺沉弱
此血虛氣滯症也先與積氣丸一服而痛減半
再用生白芍藥山梔子五靈脂各一錢酒炒白

芍藥二錢粉草山查香附各八分一帖全安 三
十三

應章族弟三陰瘡發於子午卯酉日已四越月每
每發於夜熱多寒少左脉微絃右關滑大以二
陳湯加柴胡黃柏川芎當歸黃連兩帖而熱稍
輕飲食不進四肢懶倦脾氣大虛白朮何首烏
各三錢鱉甲二錢青皮七分烏梅一個一帖而
截 三十四

大學程好吾個儻博洽士也季春患西太陽痛胸

脇稍疼。口渴大便水瀉。左脉浮絃而數。中脘有力。右關滑大。予曰春溫症也。柴胡前胡葛根粉草青皮黃芩知母桔梗半夏麴石膏半夜後得微汗因起大便感風續又發熱依然口渴更覺煩躁。石膏三錢知母柴胡各二錢葛根黃芩各一錢粉草桔梗各五分竹葉二十片兩進而出熱解諸症悉平。四肢尚倦口微乾語言乏力。以生脉湯加薏以仁石斛甘草白芍藥黃芩調養如初。三十一

令總長卿之婦腹中微疼。經行不流利。喉痛四肢麻木作戰。不知飢餓。右脉洪大如菀豆。以川芎香附麦芽山查烏梅粉草桔梗酒苓防風荆芥白木茯苓四劑而安。次月經水大行。以黃耆阿膠蒲黃各一錢白芍藥二錢粉草三分一帖而止。此後但覺濁氣下墜。屢從子戶中出。以補中益氣湯加酒炒黃連調養而平。三十六

子應章之弟。...

每發於辰戌丑未日。午後寒多熱少。夜有盜汗。左脉軟弱。右關尺絃數有力。用白芍藥當歸各一錢白朮二錢柴胡川芎粉草砂仁桂枝酒苓各三分。生姜三片。水煎服。再以前首烏白朮鱉甲各三錢柴胡一錢青皮酒苓甘草各五分。烏梅一個。生姜三片。水煎。臨發日五更服之。兩帖而止。後半月下身大生瘡癩。以東坡四神丹調理而痊。三十七

腹中作脹。醫與苳豆丸瀉之。而熱不減。後醫又以大黃重瀉之。而熱亦如初。再後醫謂瀉而熱不退者為虛。大用參耆白朮補之。補經四日。神氣昏沉。不知人事。乃取予診。左脉絃數。右關尺沉數有力。舌尖沉香色。舌根焦黑。芒刺。語言含舌不清。扣前服藥始知妄下妄補。不思飢饉之餘。痰氣為厲。誤成壞症。危而且殆。姑以知母柴胡各五錢石膏六錢枳實天荅粉各五分。粉草黃芩麥冬各一錢。山梔子生地黃各七分。人參

六分竹葉三十片生薑三片水煎飲之。中夜後
人事稍清。微有汗。舌稍柔和。語言已不啞。舌
駸然有生氣矣。次日前方減去地黃。加白芍藥
舌心焦黑盡退。諸症十減其七。但大便五日未
行。遍身尚痛。咳嗽與七製化痰丸二帖。再以石
膏二錢。麥冬貝母各一錢。前胡枳實黃芩梔子
各六分。甘草三分。桑白皮八分。煎服而安。三十

八
鮑子五保時疫耳聾。體有熱口乾。大便五日不行。

人事不清。竹葉黃芩柴胡半夏麩甘草枳壳天
芩粉知母煎服而熱渴更甚。大便秘行而瀉。手攣
縮不能伸。且發呃。或又咳嗽。改以柴胡石膏竹
葉參甘草麥冬半夏麩橘紅黃芩黃連一帖
而呃止瀉除。諸症悉罷而安睡矣。三十九

洪子孫守以中麻咳嗽無痰。上唇厚腫體熱。大便
燥聲啞。以麥門冬知母瓜蒌仁甘草白芍藥桑
白皮地骨皮石斛枳壳五味子服後嗽減其七。
迺減去瓜蒌枳壳。以其大便已溏。加生地黃當

歸薏以仁調理而安。四十

僕子得貴。春溫頭痛。體熱面赤。舌心焦燥。以石膏
柴胡葛根甘草黃芩知母天芩粉白芍藥服之
而舌不焦黑矣。進粥太早。半夜後又復發熱。中
腕硬痛。與大柴胡湯一帖。汗出津津。大便秘行二
次。腹痛不止。乃以小承氣湯調下。玄明粉一錢
大便又行二次。熱不退。而痛全減。旋作真氣。改
以石膏牡丹皮生地黃山梔子甘草升麻黃芩
桑芍藥一帖而熱散。嘔止。四十一

元素姪令政。春溫後。經水適止。餘熱不退。口中甚
渴。胸膈痛而耳重。脈左絃數。右滑大而數。小柴
胡加石膏知母桔梗枳壳葛根瓜蒌半夏麩服
下而熱渴如舊。改用柴胡二錢。人參甘草天芩
粉黃芩各七分。白芍藥紅芍當歸牡丹皮知母
各八分。調理而瘳。四十二

朱氏子天送。時疾頭疼。身若燔炭。口渴氣促。申酉
刻熱潮更甚。舌心焦黑。遍體紫斑。語言啞。舌不
清。時多發呃耳聾。先治以...四十三

加嘔逆水瀉。又醫以柴胡湯。嘔益甚。熱轉增。劇。迎予為診。六脉俱洪數。以少陽陽明合病之疾。以石膏五錢。知母柴胡各三錢。黃芩一錢五分。半夏麩麥門冬。竹茹橘紅。葛根各一錢。粉草枳實各五分。服下。熱退其七。舌不燥矣。再以柴胡。半夏麩。白芍藥。竹茹各一錢。石膏三錢。麥門冬。知母一錢五分。黃連甘草。人參各五分。水煎飲之。而斑退。諸症悉平。四十一

朱桃源內人。胃脘疼。年五十有二。經水尚行不止。一月且二至。每至十餘日不淨。白帶淫淫下。常苦憂遺。近又眩暈。先與積氣丸一帖。以止胃脘之痛。再以逍遙散。加石蓮子。蓮心。五倍子。煉蜜為丸。每早晚白湯送下二錢。憂遺竟絕。四十四

桂亭兄。壯年原有濕熱痰積。年逾艾。偶墜轎。跌傷背脇。專科以草藥敷貼於外。內以藥酒攻之。而愈。越十五年。左脇痛。手不可近。左脉絃數。堅勁。抖指。小腹亦痛。知為積痰及痰積作祟。以青皮

赤芍藥。黃連。當歸尾。又二錢。桃仁一錢五分。大黃二錢。滑石三錢。水煎。時服。玄明粉一錢。服下。吐出痰涎。大便極。一服。主。及。赤。痛。夜。睡。不。安。每。一。服。痛。甚。之。廢。世。廢。物。狀。行。而。未。能。也。再。與。大。黃。當。歸。尾。紅。芍。壯。丹。皮。赤。芍。藥。各。一。錢。桃。仁。二。錢。滑。石。三。錢。青。皮。八。分。玄。明。粉。一。錢。再。下。之。大。便。行。三。次。皆。沉。香。已。粘。痰。物。腹。痛。雖。除。跨。痛。仍。在。用。乳。香。沒。藥。歸。尾。紅。芍。各。一。錢。桃。仁。滑。石。各。三。錢。大。黃。二。錢。川。山

甲丹參各一錢五分。服後大便行四次。所下皆紫黑如筋膜者。不可勝計。諸病悉減。因食鷄湯牛肉。臍腹又痛。裏急後重。此餘積未盡。欲再下之。舉家驚怖。謂六旬以外之年。已下數次。恐脾弱不能再下。予曰。醫貴認病。何以年齒數下。拘哉。今藥力到。而積已動。天破竹之勢。可迎刃而解。若失時姑息。恐它日必憂欲下難動也。行後而積庶無反顧之憂。大光然之。以紅芍桃仁當歸尾赤芍藥山梔仁玄明索壯丹皮川山甲滑

石煎調玄明粉下二次。紫黑痰物如前之半。腿
跨小腹痛則俱釋。次日用人參茯苓白芍藥粉
草陳皮山查桂心當歸半夏調養半月。精神步
履飲食一如舊矣。四十五

江右熊二官。疫後食復額痛口渴。謔語神昏面青
舌黑。鼻中傳灰。不省人事。小水短少。勢已危急。
以小散胡湯減去半夏。加石膏。知母。當歸。山梔
子。豆豉。枳實。急與服之。一飲便得微汗。熱退大
半。次日以紫胡滑石甘草。知母石膏人參桔梗。

黃芩天荅粉與之。舌黑始退。人事乃清。飲食繼
進。霍然生矣。四十六

堂弟東里內子咳嗽吐紅。發熱頭眩脚膝乏力。先
已服滋陰降火十數劑不愈。飲食漸少。精神漸
羸。懇予治之。兩寸脈蕤。又如貫珠。兩尺俱軟弱。
此上盛下虛之候。上盛者痰與瘀血也。下虛者
腎陰弱也。且生平好飲。不無助熱。法當先清上
焦。化去瘀血宿痰。然後以養陰藥收功。則病根
可刈。癆瘵可免也。用貝母枳殼桑白皮清肺化

痰滑石桃仁牡丹皮小蘇。消除瘀血。山梔子其
草白芍藥養血以祛餘熱。三帖後紅漸稀。以前
後心始不脹痛。惟痰嗽不止。大便結燥。減去滑
石桃仁加瓜蒌黃芩紫苑調養而平。四十七

由溪程竹坡孺人。年過六十。為疫所染。頭疼口渴
舌胎前黃燥。後紫黑。身熱沉重。人事昏憤。語言
錯亂。小水短澀。嘔逆煩躁。合目不開。謔語不輒
口。耳聾。胸脇痛。時五月初旬也。迎予為診。左浮
而絛數。右洪長而數。胛畢仲君清夷問曰。何症。

予曰。此熱病類也。清夷曰。因體熱。便名熱病乎。
予曰。否。否。仲景謂春溫過時。為熱病。矧茲又為
熱癘也。邪在陽明。少陽。二經。又問曰。可生乎。予
曰。脈症對。可生也。此症遠邇染延甚夥。不足怪。
清夷曰。適方和字亦云。少陽陽明二經之病。二
公所見既同。乞確確一方為幸。予與和字。胛多
符合。即以紫胡石膏為君。知母枳殼。冬天花粉
竹茹為臣。黃連為佐。甘草枳殼。桔梗為使。連進
三帖。丑刻微汗。熱退神清。不虞即進葷粥。下午

又復大熱。譫語昏沉。舉家驚怖。子以此為候也。即以小柴胡湯加山梔子枳實芍藥散。發甲四劑。復得汗。熱從散去。神頓清爽。仍口渴煩躁。以生脉湯加黃連香薷竹茹竹葉而安。四十八

程家內眷。歲溪汪氏女也。乃夫歿於疫癘。新寡七日。疫即及之。大熱頭疼口渴。胸脇併痛。醫與小柴胡湯。夜忽夢夫交淺而覺。冷汗淫淫。四肢如解。暑不能動。神昏譫語。面如土色。舌若焦煤。強硬。遂予診之。六脉沉絃而數。大小便俱秘。此亦

陰陽易類也。復後有是危已極矣。予以生脉湯加柴胡黃芩桂枝甘草水煎成。將乃夫昔穿舊袴襦。燒灰調下。兩劑而神醒。體溫汗斂。舌始柔。和焦亦漸退。次日仍以前方加酸棗仁竹茹。四肢始能運動。乃飲粥湯。僅一子甫十歲。一女甫十四。繼被疫困。均以六神通解散汗之而安。妯娌及婢輩六人。皆六神通解散瘳之。舉家德予以為再造。再造。四十九

姪太學從明。夏初由客邸患滯下。調半痊而歸。

因食隔宿猪首而復。裏急後重。晝夜三四十度。日漸沉困。口渴胸膈焦辣。手心熱。腹微痛。小水少。每解時先乾噦。嘔惡汗出。飛飛下。皆稠粘。紫黑血無糞。彼素知醫。且慎重。不輕服人藥。較予診之。脉左沉絃。右滑數。面色外黑內黃。飲食不入。肛門辣疼。予以渠原稟薄弱。今遠歸途。次不能無勞。不敢疎下。姑以胃風湯加黃連與二帖。不効。腹稍加脹。渠叮予曰。古云無積不成痢。願積勢膠固。切勿用補。無以體素弱為疑。予曰。諾。

改用黃芩芍藥湯三劑。無進退。迺私語渠姪元亮曰。令伯之症。實實虛虛。熱熱寒寒。寔不易治。且穀食禁口不入。乾噦可慮。須得明哲參治。元亮從容言之。欲得方古。堪為翼。諸相契及內眷。迺相讚言。太學不從曰。吾豈不重命。而春費哉。願新都之醫。無如叔最明。吾之交。無如叔最厚。舍叔安所倚。元亮曰。叔祖善矣。能用人之長。得一雋商確。可無後慮。太學怫然曰。知莫貴於知心。吾知其心久矣。專任勿疑也。予知渠信任堅。

若金石益加研究。圖欲先開胃口。使新穀食將宿穢壓出。或補或攻。視緩急以為方畧。迺背屨元亮曰。令伯非人參不可。幸且勿靈。俾子得以盡技。元亮曰。諾。迺倣朱丹溪法。用人參黃連各二錢煎濃。細細呷之。但得一呷。下咽。胃口便開。噦惡便止。蓋胃口虛熱衝上為噦也。其日用之。噦惡即止大半。連與兩日。覺胸腹脹。即以保和丸應之。覺小水不利。又以清六九應之。裏急後重。以參朮加芩連木香枳。即滑石桃仁應之。人

參皆背加。太學不知也。渠每診必叮予曰。日來疾稍平。叔之力也。幸勿遽補。恐廢前功。予曰。如教。詎知人參已服過十日。計二兩許矣。此後脉僅四至。軟而無力。憶丹溪云。虛臥而痢自止。又云。氣虛甚者。非附子不能行。參者。迺以胃風湯加黃耆附子姜炭四劑。而血全無。後重亦止。惟大便瀉而不實。所下俱黃糞。渠知積滯已盡。始欲理脾。用參苓白朮散服十日。便仍不實。地問予曰。補脾而瀉不止。李曰。予曰。據脉迺下元虛

寒。殆腎洩非脾洩也。溫補下元。則固矣。蓋腎者胃之關。初不敢用下劑者。慮有今日也。教以鬼絲子破故紙杜仲山茱萸人參大附子白茯苓澤瀉四帖。全瘳。里中稱太學能知人。而予不負所任也。五十

查少川公。年四十三。夙有哮喘疾。每發則遍身如焚。氣責責上騰。息息短促。喉中痰聲。响若湯沸。經七晝夜。汗而漸平。居常嗜飲。通宵不輟。醉後縱慾。不避風寒。族中有教以石膏麻黃杏仁枳

壳細茶各一兩。作大劑飲之。名曰五虎湯。喘至即以此禦之。隨飲而止。屢發屢進。應若桴鼓。公喜甚。持為保命丹。寓大通一月。邑中麻黃石膏為之缺市。詎知情慾無窮。胃中冲和有限。三年之間。飲五虎者。殆不可以數計。而胃中之冲和者。亦不知損之何若也。因而腹大若覆箕。兩腿光腫如柱。內外癩疥。瘡中清水。涓涓流之。不竭。晝夜腥氣逼人。不能伏枕。而臥者。三五越月。自儀楊醫起。聞京口之醫。如何如。獲者最良。遠延治

之彌月。幸無一驗。又令景口。抵姑蘓。歷嘉杭。凡有名者悉迎療之。而勢益劇。昇回至岩鎮。鎮醫擅名者吳與方也。先詣吳。吳駭。辭不治。就方。方診視。久之曰。公疾非常。必得非常人。廼可已。公曰。先生世家大方。昔在兩淮。且人人引領。願得先生一診。為快。何我棄而使需非常人也。今世非常人。舍先生其誰。方曰。嘻。公貴邑孫生生者。名動三吳。今歸不出。亟迎治之。或可無恙。公扣孫生生居何里。狀何若。方書予姓氏里居與之。歸即懇程公山氏紹介。迺子時長。至後一日也。至則見公坐高椅之上。氣高而喘。身熱而煩。覆以綿被。足納火箱。前後左右環火。五盆首戴絨帽。帽外籠以貂套。套外仍束一帕。鼻用絨套籠之。明設重幔。猶凜凜怯寒。診其脉。浮大無力。睇其色。白中隱青。徐問公曰。惡寒身熱。從何時起。公曰。十日。予曰。據色。推脉。予已得其概矣。公歷數府名家。認為何症。推何湯劑。請詳述之。公曰。衆論落落不一。先生處予博見真願。惟命。予曰。公

疾。迺氣虛中。滿法。必溫補下元。人徒知利小便。不知小便不利者。由下焦之氣不充。不能滲。從膀胱故道而行。若利之急。則汎溢而橫流。肌膚下於陰囊。甚則脹裂崩漏而出。若使下焦壯盛。則小便自通。譬之甑。炊釜底水火交旺。甑中之氣自然蒸騰。若霧若露。內經曰。上焦開發。宣五穀味。薰身充膚澤毛。若霧露之灌溉。是謂氣。故曰。上焦如霧也。清陽升。則濁陰降。降下則為小便。故曰。下焦如瀆也。瀆者水也。言下焦為決水之官。水道出焉者是也。人之汗。即此霧露之氣。小水即降下之氣。蓋氣者水之母。由氣化而為水。故又曰。氣化則能出矣。融衆理而觀之。總由下焦元氣壯盛。斯能降。變化清。陽升。濁陰降。即地天交之泰。陽不升。陰不降。即天地不交之否。否者塞也。此脹滿之所由生也。公之疾。起於五虎湯致臟寒。生滿病也。公曰。善。吾廼今始知致病之源。第近來身熱手熱。高內焦辣。而外惡寒。竟不解。孰為熱。孰為寒也。予曰。仲景云。傷寒

必惡寒。由寒邪在表而然。合先散之。胸膈焦辣者。迺陰盛格陽。虛陽之火。被寒氣驅逼上行。非真熱也。經云。水沅濕。火就燥。但得下元一溫。熱自下行。公曰。然。惟先生命劑。予以紫蘊馬蹄草炙甘草防風白豆仁蒼朮陳皮人參羌活生薑一帖而得微汗。悉撤去。環列之火。僅存足底一盆。首上兩覆之。帖亦去。獨鼻寒如初。迺用防風黃耆二兩煎湯。置器中。令薰其鼻。飯頃而止。一日凡三薰。次日自寒亦除。嘔惡不止。用人參溫

折部四卷

三五

膽湯加丁香進之。一帖而止。又謂鯉魚能利水。一日盡二斤。米飯脹極。迺告急於予。予曰。病執如是。因迺繼進石此等開之劑。曷能消釋。沉思久之。以平胃散一兩入椒攪肉一兩。水煎飲之。兩劑而定。獨腹脹小水不利。不能伏枕。為苦。迺以附子理中湯加砂仁補骨脂赤小豆桂心連進四帖。小水畧長。繼以尊重丸。日三服之。每服五丸。五日後小水通利。可貼席而睡。守此調理。腹脹漸消。兩月大平。三月而公出市。市中人信

予寔從公始。五十一

夏益吾肢節腫痛。手足灣痛腫尤甚。不能動止。凡腫處皆紅熱。先起於左手右足。五日後又傳於左足右手。此行痺症也。且喘咳氣湧不能睡。左脉浮數。中按絃。右滑數。兩溫熱。風痰壅遏經絡。而然。以茅山蒼朮姜黃以仁。歲靈僊秦朮知母桑白皮黃柏酒苓麻黃水煎服下。而右手腫消痛減。夜服七製化痰丸而嗽止。迺得睡。再劑兩足灣消其半。左手經渠列缺穴邊腫痛殊甚。用

折部四卷

三五

以仁。蒼朮秦朮甘草天荅粉五加皮石斛前胡枳壳歲靈僊當歸旋服旋愈。五十二
初陽姪迺政。先時咳嗽。諸治無功。且嗽急則吐。用碧玉散二錢。白芍調下立止。後半年復咳嗽。胸背隱隱疼痛。身常內熱。咳出桃杏膿。不可勝計。腥穢之氣甚惡。右脇并乳脹痛。脉洪數。大便燥肌瘦骨立。此肺癰症也。用貝母苦根白芍藥各一錢。知母麥門冬山梔子紫菀各八分。桑白皮當歸牡丹皮杏仁各七分。煮以仁一錢五分。其

草葶各五分。水煎服之。服此甚安。但要常服。若一缺藥。其疾便發。據此肺竅中痰積。痰血尚多。未能即去。宜緩圖之。書云。俟膿去盡。當自愈也。愚謂丹溪雖有此言。亦不可固執。設不以藥消化之。必俟其膿自盡。恐歲月深而有他變。且中年之人。何能當此。莫若清熱潤肺。消痰化痰。久而服之。或早愈也。方黃吳諸公。謂久咳傷肺。每每投補。屢被紊之。每補必增熱。加痛加咳。而膿轉多。予曉之曰。諸公之意誠良。其如病加何。

折經四卷

三五

是姑息之謂也。古人不務姑息。惟以去病為安。夫姑息可以養病。非所以去病也。獨汪無懷然予言。守予法。二年良愈。肌長如初。五十三族姪仲木。內人。賢淑婦也。不育多鬱。腹脹。左脇不能側臥。亦不能仰臥。仰則即氣湧。每午夜背心作脹。氣喘吐痰發熱。必起坐。令人揩摩。久之始定。而有浮氣。右寸關脈滑大有力。此氣鬱食積痰飲症也。蓋憂思傷脾。思則脾氣結。氣結不行。則五穀之津液皆凝聚為痰。故喘急作脹。先

與定喘湯二帖。而無進退。繼用核桃肉五錢。杏仁三錢。人參桑白皮各七分。水煎服之。氣喘迺定。惟腹中脹急。改用橘紅半夏麩木香白芷仁。鬱金蘿蔔子姜連香附茯苓四劑。大便痰積隨下。腹脹尋消而愈。五十四

族姪孫女年甫十歲。大便脫肛。鼻中時常出血。夜多咬牙。肚熱面黃。將成疳症。以山查青蒿枳實升麻酒連滑石各一兩。其草蘆會乾蟾各五錢。俱為末。神麩糊為丸。一料全愈。五十五

折經中卷

三六

唐岩祈首秋患痢赤白。延至次年春分不愈。腹中作脹。不知餓。每行動則氣喘。四陽之末皆冷。陰囊腫大。便日夜十數行。而肌肉甚瘦。小水短少。飲食減半。面黃兩跗腫大及踝。與平胃散加酒連猪苓澤瀉升麻防風酒炒白芍藥薏以仁。外與香連九合益元丸相兼服。四日而痢止。迺知餓而加食。精神爽快。再四劑。兩跗陰囊之腫皆消。惟咳嗽。用薏以仁酒炒白芍藥粉草澤瀉杏仁桑白皮陳皮姜連茯苓姜黃葛根蘿蔔子二

帖而嗽除。但體乏力。與六君子湯加補骨脂。以仁滑石紅麴酒炒白芍藥桔梗麥芽調養。半

月而愈。程東山仲夏患休息痢。所下皆紫血。腹痛。迄

清明猶不愈。醫藥倍嘗。體倦肌瘦。或三五日一

發。或七八日一發。發必三日。迺止。予為診之。左

濡而右滑。據脈有痰血痰積。近來小水不利。姑

用四君子湯加滑石紅麴陳皮山查澤瀉升麻。服

後微覺有熱。改以四君子湯加滑石桃仁紅

麴酒連神氣稍旺。脾氣始回。迺用番鴨胆三錢

下之。果去紫黑血塊。及如敗魚腸者半桶。從此

痛除痢止。次日以六君子湯去半夏加酒炒白

芍藥山查紅麴滑石桃仁升麻調之。報云胸膈

作脹。恐積滯未盡。而服參朮。欲再下之。予為再

診。兩寸短弱。兩尺洪大。前日滑濡。二脈俱無。此

陽虛下陷之候。宜當大升大補。以六君子湯大

加黃耆為君。酒炒芍藥為臣。升麻桔梗為使。服

此胸膈寬快。精神亦好。雖肛門熱。前方加酒炒

減半夏。脫然平安。五十七

陳氏婦。腸鳴腹痛。大便溏瀉。合目即汗出。下午潮

熱。醫謂潮熱盜汗。迺虛怯之症。加之洩瀉。脾氣

壞矣。視為不治。迺予診之。右脈濡數。左脈洪數。

予曰。此鬱火痰積症也。蓋憂傷肺。思傷脾。飲食

因而不化。積而生痰。故腹痛溏瀉。但理中焦消

去痰積可瘳也。以四君子湯加半夏麴滑石紅

麴麥芽以仁酒炒白芍藥酒炒黃連牡蠣桔梗

八帖而病去如釋。五十八

九德姪耳鳴。氣築築然閉而不通。鼻塞不利。口不

知味。痰多而面熱不清。脈左浮而絃大。右滑大

俱數。內經云。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生

也。此由胃中痰火上壅。熱極生風。迺以蔓荊子

升麻木通赤茯苓桑白皮麥門冬生地黃前胡

甘菊蒼朮芍藥甘草石膏生薑三片。梔子一枚。

水煎飲之。四帖左絃雖減半。而症尚如前。再用

甘菊蒼朮紅半夏麴茯苓甘草知母白芍藥酒

炒麻黃石膏桑白皮桔梗加黃耆。又四帖而諸

子鄰家偶言及渠病之異家道之窘予惻然鄰素知予不以窘異為憚懇為一肴予携仲子

以覺字夫常山縣人也年四十有三體肥患痰火

十年多矣每月必一發或勞心過度則二發吐

痰身熱吼喘飲食不進不能倒頭而睡合目則

乳語面赤頭痛遍身痰氣走動牽扯作痛必俟

吐出痰後則耳始不鳴目始不泪素服風痰藥

南星半夏之類不効後服參耆則亦僅止四五

個月胗其脉兩寸洪滑兩尺沉微殆上盛下虛

之候法當清上補下以橘紅貝母茯苓甘草桔

梗杏仁前胡鈎藤天麻酒苧枳壳水煎服之夜

進七製化痰丸再以八味丸加人參麥門冬五

味子空心服之半年而瘳

程紹溪中羊患鶴膝風症兩腿及脚肚內外臃肉

盡削獨兩膝腫大迺酒後縱欲所致經治蘇松

嘉湖杭嚴六府視為痼疾且四肢膿疥連片滋

爛臃腫臭惡難近自分必死家人以渠病

藥破家今則衣食不計無門求矣

奇悉錄其方以布

予鄰家偶言及渠病之異家道之窘予惻然

鄰素知予不以窘異為憚懇為一肴予携仲子

泰來同往今渠沐手胗之左寸關浮數右寸短

弱兩尺沉微此氣虛血熱之候法當大補氣血

壯其筋骨猶可冀生病者聞言命家人子媳羅

拜於地請藥予曰病執已痼非百日不見功蓋

補血無速効日浸月潤漸而濡之關節通利骨

正筋柔腿肉自生初以龜板以仁各三錢蒼耳

子五加皮頭二蠶沙節節香各一錢當歸人參

黃耆蒼朮杜仲黃柏各八分紅苓五分水煎服

之十劑而瘳疥漸稀精神稍長再以意以仁五

加皮龜板各二錢節節香蒼耳子地黃丹參蒼

朮黃柏何首烏各一錢人參當歸各八分紅苓

木通各五分三十帖足可倚杖而行腿肉漸生

瘳疥盡愈膝腫消去其六後以虎潛丸加鹿角

膠何首烏金毛狗脊節節香牛膝用龜板膠為

丸服三越月腿肉復完出之若上茗人嘖嘖稱

奇悉錄其方以布

予堂嫂程氏喉間有物如嚙之不出嚙之不可
梗梗不安腹中痛且瀉年五十有八矣迺梅核
氣症也服痛通新疾以二陳湯加旋覆白木
香附熟蘓桂皮厚朴澤瀉四劑腹痛仍在瀉亦
不止迺用胃苓湯加麥芽砂仁香附二帖痛止
瀉瘳仍用二陳湯加厚朴桂皮熟蘓旋覆蒼細
辛人參煎服四帖而喉中病去如失六十二
一婦先傷風發熱咳嗽二日迺分婉熱尚未退又
食鷄汁肉等大蚤咳嗽發熱愈盛已八日矣胸

高脹痛頭痛口渴大便秘咳出之痰色黑而臭
小水短少脇下扯痛氣逆而喘不得卧左脇不
能着席汗出不止症甚危急予以瓜萋五錢紫
蘓子一錢枳壳酒岑各六分前胡桔梗各五分
粉草三分生薑三片水煎飲之胸高之痛減半
氣喘稍定次日再進前藥大便秘導之熱
盡退痛盡減諸症尋愈六十三
表嫂孀居二十年矣右癱不能舉動不出門者三
年今則神情恍惚口亂言常悲泣詰其故答曰

自亦不知為何故也診之兩寸脉短瀉以石菖
蒲遠志當歸茯苓人參黃耆白朮大附子晚蠶
沙陳皮粉草服四帖精神較好於前但悲泣如
舊夜更泣予思仲景大棗小麦湯正與此對即
與服之兩帖而瘳方用大棗十二枚小麦合
大甘草炙過三十水煎飲之此憂傷肺臟寒
故多泣也六十四

桂亭大兄原因墜轎跌傷腰脇脹痛不能轉側咳
嗽弔痛用三製大黃二錢桃仁一錢五分杏仁

紅蒼天荅粉各一錢穿山甲八分甘草五分水
煎服之兩帖而大便行繼以五力皮紅蒼川芎
當歸生地黃白芍藥丹參甘草桃仁穿山甲紫
胡煎四劑飲之而痛大定後因過食葷腥喘嗽
腰痛右肩背墜痛素有濕熱痰積以歲靈儂紫
蘓子枳實酒岑半夏麴瓜萋仁甘草陳皮姜黃
防風羌活服後腸鳴坐則重墜此痰積已動欲
行而不可得也與穿山甲當歸尾紅蒼杏仁枳
壳大黃蘿蔔子川芎莪朮青皮服後大便所下

綱積穢瘀甚多痛隨減去以保和丸調理而愈
六十五

堂嫂王氏兩寸脉洪大右關滑大五六月間必吐
紫黑血塊足跟痠腫痺痛時流黃水與牡丹皮
山梔子玄參甘草白芍藥當歸陳皮滑石桃仁
四劑而愈六十六

族弟婦程氏姓已五月痢下膿血裏急後重腰
墜難當以白芍當歸木香砂仁條芩酒連艾
陳皮煎服夜仍痛痢三次次日大便所下如

魚腸者甚多夜半忽兩足脚底前半節紅腫痛
痛難安此厥陰肝經虛胎氣下墜也當補氣血
以川芎當歸人參白朮紫蘇茯苓甘草煎即愈

下夜半痛止即得睡矣左脚也

張氏言當歸白芍三錢

張氏言脚痛

江氏言

前此作也以柴胡葛根甘草青蒿枳壳酒芍酒
連當歸白芍桂枝防風羌活川芎水煎服之外
與神授香連丸其夜痢減十之九但遍身尚疼
略惡寒不發熱頭暈而已改以川芎川歸白
芍木香桂皮陳皮酒連酒芍調理三日全安六
十八

叶閣姪孫赴府考試過食牛麵且勞苦因而發瘡
城中醫瘡半月形神俱瘦瘡愈而腹大如箕矣
健所黃夫人仲閣岳母也凡名家逆為延至率

認瘡後腹脹其中必有瘡母為祟也諸消痞藥
嘗之不効又以五皮飲利之不應將議攻下而
予適至觀其色黃口渴小便短濇腹脹不可言
足膝之下腫大不能行兩腿腫連陰囊氣壅工
能卧飲食絕少脉緩四至大而不飲予曰此其
氣虛中滿症也法當溫補下元而兼理脾病
可愈若攻下是殺之也渠父與予厚今官河東
予安得不為渠任其壘哉顧歎友所用之劑
早角楸即三稜莪朮姜黃葶藶子木通枳實

厚朴山梔大黃牽牛黃連等皆破敵有餘之
品見之且駭然但黃夫人薦來之醫又不能拒
止躋躡間幸渠迺伯溪亭公知予心卒謝歛醫
而一任予治予即以人參白朮各三錢炙甘草
五分大附子炮乾姜桂心各一錢破故紙二錢
桑白皮砂仁茯苓澤瀉各八分水煎飲之其夜
小水稍利喘急稍緩連飲五日腹稍寬皮作縷
因食猪肚子太蚤依舊作脹前方人參白朮加
作五錢再加陳皮八分又二十劑而腹消其大

新和甲卷

甲五

半迺能伏枕而卧始能移步行動改以參苓白
朮散加破故紙由桂調養而安溪亭公問曰腹
脹如此口渴如此小水短濇如此諸人悉認為
熱為有餘迺今以溫補收功何也予曰公不觀
古人以氣虛中滿名鼓脹耶由氣虛所以成中
滿謾氣不虛何中滿之有哉且鼓者外皮堅緊
而內空其物若復瀉之真元脫矣安能復生故
惟有補而已口渴小水少者皆元氣虛弱不能
行運清氣不上升故口渴滯氣不下降故無小

便迺天地不交之否。竊特補其下元俾水火充
實陽氣上騰濁氣下降中氣運動而諸疾皆瘳
也二十九

半懷仁壯年客外不謹而生楊梅瘡恐人知之又
欲回家迺求速愈每日用藥外燻燻而不効用
藥水頻洗洗而不瘳迺以末藥點之一日凡服
煎藥三帖如斯兩月不惟瘡不能瘳毒且趕入
內在下則肛脫二寸餘周匝瘡滿如葦弗克收
入因而不能行坐在上則毒入於肺喘咳氣湧

新和甲卷

甲六

胸膈脹悶不能仰卧內熱而外惡寒寢食俱廢
合目即譫語陰囊疔瘡紅腫脹痛兩足瘡延腫
大精神恍惚軟床昇歸迺兄少竹逆予為診六
脉俱洪大而數語少竹曰病至重幸壯年猶可
治也今予尚未可付藥俟彼胸中瘀血毒物出
後迺可服否則彼以予藥動血而反致毀壞城
中諸灰鮮有識此病者一誤則大事去矣慎之
慎之少竹素信予固請予藥而不與其服懷竹
見予不發藥迺與張程二公為治晦午服藥補

刻大發喘咳。吐出紫黑血塊如膿之類。梳餘瀝。房腥穢不可近。懷竹心慌。少竹樹之曰。毋恐孫君先已預言。汝胸中脹悶者。由燻藥逼毒入內。上迫於肺。痰與瘀血壅遏肺竅。將欲成膿。故喘咳不能伏枕。願脉洪大而數。從可知也。必俟吐後。乘而消之。極易為力。今果如孫君言。孫君藥具在。急煎飲之。藥用牡丹皮。桑白皮。白蘇皮。木通。前胡。枳殼。桔梗。甘草。杏仁。以仁。葶藶子。服後大便裏急後重者二十餘次。所下黑紫膿血甚

新和回春

甲

多。喘咳稍定。痰紅稍淡。二三劑。迺能伏枕而睡。改用白芍。當歸。白蘇皮。甘草。貝母。黃連。金銀花。阜角子。以仁。麥冬。木通。連飲二帖。足上跟踝瘡腫漸消。其夜陰囊出臭膿血二碗許。次早診之。兩尺脉不洪大矣。仍用前劑加丹參。又二帖。陰囊結靨甚厚。橫裂一縫。三日後。隨縫連皮落下。約重五六兩。厚可半寸。色如猪肝。洞見兩陰子。系一光薄白胞。令人駭然。此亦亘千古稀見者。舉家謂陰囊。迺致命之所。且未有子。今爛去。即

使復好。亦不能育子矣。環哭甚悲。予諭之曰。此毒去也。而真元不傷。吾能使其生肉如故。亦不妨於生育。毋過慮焉。舉家將信將疑。予即用紅粉霜。加生肌末藥敷上。一日三次。並不作痛。膿水立乾。外以人參。當歸。酒炒白芍。白芷。甘草。白蘇皮。阜角子。以仁。何首烏。調理一月。囊肌全生。諸症悉愈。迺令日用土茯苓。猪肉各半。飭同煮極爛。將肉入醬盞。如常灑食之。湯當茶飲。脫然全瘳。次年生女。七十

新和回春

甲

查良本兄令眷。怒後偶食魚頭。骨梗於喉中。即以饅頭。粽肉等壓之。骨雖下。便覺胸膈不快。又服消骨藥兩日。迨今迺七日矣。胸膈脹痛殊甚。飲食悉從背後而下。惡寒發熱。六脉絃數。予思骨梗之後。用硬物壓之。傷其胃腕。必有瘀血停蓄。兩間。將食管逼在背後。故飲食覺從背後下也。今但消去瘀血。使食管復原。胸膈之痛可瘳矣。藥以五靈脂為君。山查。玄胡。索桃仁。枳殼為臣。亦芍藥。牡丹皮。香附。山慈。為佐。紫胡。石菖蒲。

為使水煎。臨服入韭菜汁一酒杯飲之。其夜胸
高寬快。大便瀉一次。痛減大半。飲食迺從右邊
而下。右邊胸喉稍痛。吞物甚艱。苦吐出痰。皆血
腥氣。改以山梔赤芍藥歸尾桃仁劉寄奴五靈
脂牡丹皮穿山甲煎入韭菜汁服之。兩帖全瘳。
七十一

後溪大兄孺人戴氏。勤篤嚴謹人也。秋患痢。所下
皆血。及屋漏水。內有血子如赤小豆者。不可計
數。晝夜五六十行。裏急後重。噦惡不住。穀者五

新都回春

四九

日。予以劉守真芍藥湯與三劑。而病無進退。適
後溪兄在浙。姪女輩素信醫博黃氏為女科專
門。延而治之。授以芩連枳壳。即山梔地榆黃
栢滑石之類。服已五日。始雖噦惡。一日尚有枕
粥。今則粒米不能進。腹痛轉加。必用重物壓之。
迺稍定。神思昏弱。卧不能起。下午發熱。女科仍
以前劑加青皮枳實。姪孫爾嘉持藥見予曰。家
姑酷信黃醫為專門。今已任事五日。較前精神
大瘳。叔翁為祖父至交。寧無一語啟愚乎。予曰。

吾非不言。欲詆黃。恐為妬婦之口。今子來。予可
胥之。六脉滑大無力。胥畢。慌語爾嘉曰。事急。可
速令人促迺祖歸。否則令姑女流。不諳醫藥。吾
安能施其巧。比有西席汪帶川聞之。決爾嘉曰。
此事極要調停。留黃醫以安女流心。黃發之劑。
關而不進。以東宿之劑作黃劑進之。內外無猜。
則安矣。予然其言。以人參白朮酒炒白芍各三
錢。炙甘草一錢。半炮姜肉桂各一錢。白茯苓陳
皮各八分。砂仁五分。大棗二枚。水煎飲之。噦惡

新都回春

五十一

減半。其夜痢減十之五。惟腹痛不甚。減次早胥
之。脉稍軟。黃醫以為渠功。大言自矜。藥仍以芩
連之類。予仍以前劑再加黃耆。其日下午始納
粥。一茶盞。腹痛漸減。又次晨。黃醫胥視。見夜來
痢減其七。益揚揚得志。語左右曰。寒家業醫五
代。但此大病。亦不多見。自以為非彼。亦無能治
也。爾嘉詰曰。瘡痢亦尋常耳。何以為大。黃曰。丹
溪云。下痢身涼者生。身熱者死。下痢純血者死。
肝洪大者死。如屋漏水者半死。半生。今皆犯之。

故云云也。爾嘉曰：然則今日當用何劑？黃曰：劑已投病，仍當確守前方，何敢輕改？爾嘉嘆而點首，復向子求劑。予以理中湯倍加酒炒白芍藥，以肉桂佐之。腹痛身熱悉愈。痛十去九矣。後溪兄亦浙回，爾嘉述病源以黃方予。方呈看後，溪喘噓嘆息，迺辭謝黃，而詰予曰：人言下赤痢者熱，噫惡者熱，又身熱脈大，吾弟何獨認為寒？而用此大熱之劑成功，曷故哉？予曰：此虛虛實實之處，極能誤人。尊嫂之熱，非真有餘之熱，迺內有虛寒，逼其虛火上行，故噫惡潮熱耳。脈大而無力，仍作虛看。且向服寒涼不効，當自知警也。後溪兄曰：微弟與敗迺事矣。七十二

邵敬園令春常胃脘痛，由氣鬱而起，近以產後下痢紅白，而胃脘之疼不止，汗多，六脈滑大無力，法當收斂，以小建中湯為主。白芍藥酒炒四錢，炙甘草一錢半，桂皮五靈脂醋炒各一錢，香附糖卷子各八分，水煎飲之，痛減，汗未全斂。次日前方加御米壳醋炒過一錢，兩帖全止。七十二

蘇文學望臺患瘧，一日一發，先寒後熱，熱多寒少，胸膈痞悶，口渴，小便溷濁，腥臊不可近，醫五越月不効。面黃肌瘦，飲食減少，喘息呻吟，精神疲憊，起須人扶。迺敦子治，脈得沉絃，而數公問曰：是瘧否？予曰：是公曰：吾聞之真病不治，治之無功，蓋真者死候也。瘧殆常病，不過寒熱虛實表裏諸名家曾認為表症者，麻黃羌活柴胡等汗之矣，有認為裏症者，大柴胡湯輩下之矣，有認為痰飲者，常山訊石吐之矣，有認虛寒者，附子理中湯，人參服過三觔矣，有認為實熱，用白虎湯枳實青皮枳即草菓消之矣。盡法備嘗，絕無一應。瘧豈亦有真而卒至於死耶？言訖，淚潛潛下。予曰：觀公色，脈瘧將發矣，不暇辯，第飲予藥不死也。以柴胡滑石各五錢為君，鱉甲三錢為臣，黃連知母各一錢為佐，枳實甘草各五分，黑豆四十九粒為使，水煎送下，昆布鱉甲丸中刻，瘧至戌初便止。公喜曰：向者瘧發未申，夜半尚不能止，即止猶倦，怠懶言，適飲先生藥，不兩時

而止。止便能言。先生之功也。予曰。偶耳。今日服藥已晏。明日五更。早服之。服訖。竟日不發。又次日。前方加人參白朮。小水腥臊之氣已無。精神陡長。公又喜曰。兩日無苦。先生之功也。予曰。偶然耳。公曰。嘻。吾瘡幾半載。休歎之名。公莫不歷試。卒無影响。先生一舉奏奇。有而不居。益見所養不審。湯名何劑。乞指示之。以詔將來。予曰。公何以名為哉。老子曰。無名天地之始。矧醫亦道也。即道亦是強名。醫貴識病。苟識病一二三

新加卷

五三

品。便能成劑立功。經云。約方如約囊。又曰。方以類聚。方憑病立。苟不識病。即盡本草一千六百五十六品。併而服之。未見其益也。瘡固常疾。治亦不易。仲景有言曰。治瘡當分六經。予謂即六經之中。又各有寒熱虛實陰陽在焉。是六六而三十六也。即三十六之中。又有挾痰挾食挾氣者。稟弱者。曷能枚舉。人與天地陰陽一致。天地變化無窮。人身災患不一。豈拘拘一百一十三方。三百九十七瀉所能槩哉。王節齋曰。古人因

病以立方。非立方以待病也。斯言深得新岐。方大意思。然予今日所用之劑。和劑也。仲景謂汗吐下後而邪熱不減者。是為壞症。以小柴胡湯加鱉甲治之。予特倣仲景小柴胡例。加益元散。微邪熱從小便中出。鱉甲雖治壞症。又能截瘡。公曰。噫。嘻。前此諸公看病。不過曰寒曰熱曰虛實而已。未嘗有此眇論。誠空谷足音也。吾聞先生從祝令君潘去華。葦六邑會中。討究理致。又曾覽先生序大易。毅序翼飛。通知先生融三教

新加卷

五四

而萃於醫。先生之醫。得之於性命竅中。故能全人性命也。有如此。七十四
一汪氏姬。寒痰壅滯於背。胸脇腹皆脹痛。小水頻數。先與女金丹以治胸脇之痛。以二陳湯加益智仁香附白芥子青皮柴胡蒼朮桂枝一帖而小水減半。次日以白豆仁易益智仁。以枳壳易青皮。再加川芎桔梗開提清氣。諸脹痛悉減。七十五
大塘徐公諱客者。其子弱冠。肌肉瘦削。尻膝腫大。

手肘有顛皆腫腫處皆痛而發熱時醫有作風治者有作濕痰治者有作鶴膝鼓槌風治者愈治愈重伏床蓐奄奄一息耳舉家倉皇而決之著。操者釋策曰。易象可不死。天醫上卦。第遠在東方。相去百里而遙。迎而治之。無恙也。因訪予而迎之治。予診其脉。六部皆絃。觀其色青而白。飲食少。時當長至。予曰。此筋痿症也。書云。諸痿皆不可作風治。病勢幾危者。以前藥皆風劑耳。風能傷血。血枯則筋愈失養。况絃脉迺肝木所

新和四卷

五五

主。攬前而至。是肝有餘而脾土受敵。脾為所侮。宜飲食少。肌肉削而熱將危也。內經曰。諸痿獨取於陽明為治。陽明者。腸與胃也。法當滋補腸胃。俾飲食日加。五臟六腑有所稟受。營衛流行。氣煦血濡。調養至春。淑氣司令。君火主事之時。宗筋潤而機關可利也。病者年雖少。而能聞言相信。懇予為治。予立方。五加皮以仁茸草蒼耳子枸杞子。回陽人參杜仲黃柏。白芪防風。服二十劑。而精神壯。腰背健。飲食加。惟間或夢遺。則

為減去杜仲而加遠志當歸。二十帖而全安矣。此余初發之治也。七十六

御和訪者。君思翁。年過古稀。右手足麻而無力。不為運用。足不良於行。以六君子湯加川芎當歸。以仁大附子鹿角膠黃耆桂枝。兩劑便能步履。四劑手足強健。每隆冬必服十數劑。則精神加。飲食美。睡卧亦安。翁喜語曰。吾得君方。服之可不杖。君劑當我几杖乎。嘻。七十七

新和四卷

五五

太塘程巢父文學廼郎。諱萬里者。年十五。夏月患痢。族醫為治。彌月。痢止而筋骨腫痛。痛處發熱。晝輕夜重。肌肉消。飲食少。煩躁。醫者以白虎歷節風治之。病劇而形削骨立矣。又有作鶴膝鼓槌風治者。法愈更。而病愈甚。其家有程松心者。博洽嘉聞。君子也。為巢父族大父。以余為醫。治多奇中。命巢父迎予。予至診之。脉皆無。謂曰。此痢後風也。蓋由治痢不善。以致寒濕凝滯。經絡日久。氣血為痛。所傷此症。虛虛實實。經脈認而措藥不易。欲補虛。則腫愈劇。欲疎通。則

痛愈甚惟局方大防風湯可愈此疾也防風熟地黃著人參白芍當歸杜仲各一錢白朮一錢五分羌活牛膝甘草回陽各五分川芎七分加姜三片水煎服三十帖而愈

按局方云痢後脚緩痛不良於行者名曰痢風或兩脚腫痛足脛枯腊者名曰鶴膝風併一切麻痺痿軟風濕挾虛之候服之其效如神余故用之亦謂治氣血兩虛挾風氣而成痿廢者爾非謂可併治初起有餘之疾也

新和... 十八

葉潤至年近四十心曠嘈雜好啖肉尤好鷄一日不能缺缺即身浮力倦神魂無措必急得肉迺已見則大嚼及入腹腹又大痛痛極則吐酸水稠涎然後定稍定又思肉啖也其痛苦之態喊叫之厲難狀見者酸鼻而潤至則其心為事人或以為崇或有諭之者曰古云與其受病而受痛孰若絕肉以無病也病解而肉入難化故以作痛此病入心且其法夫獨不慎何

哉潤至曰吾豈不知絕肉之為愈也蓋痛難治尚能噉若嘈雜則通身活潑蘊蘊左右其可奈何手足無所把握頃刻不能自存有近於死不能熬急需肉少甦吾豈欲口求痛哉不得已也迺翁延予為診六脉大小不等觀其色唇紅臉黃予曰據色脉迺虫症非崇也予能極之先與雄黃丸一服不瘳改以賦粉五分史君子未一錢用鷄子打餅五更空心飼之辰刻下長繞十條內有二大者長尺有咫自首貫尾皆紅下午

又下小虫百餘自此再不喜肉而嘈雜良愈

程相如夫令政鄭氏孕踰七月因食冷患痢下皆白膿腹痛後重小水不利兩關脉滑數以艾葉砂仁白芍藥白朮厚朴澤瀉滑石甘草與之痢如舊小水仍不通利夜更痛頻改用當歸白芍藥各二錢益母草酒浸酒各一錢滑石三錢枳壳七分木香甘草各三分艾葉二分兩帖而安

太塘程晚山程松谷從弟也客湖州年四十懸弧之日湖中親友舉賀徵妓行酒宴樂月餘一日忽言曰近覺兩手小指及無名指掉硬不舒亦不為用口角一邊常牽扯引動幸為診之六脉皆滑大而數浮而不斂其體肥其面色蒼紫予曰據脉滑大為痰數為熱浮為風蓋濕生痰痰生熱熱生風也君善飲故多濕近又荒於色故真陰竭而脉浮此手指不舒口角牽扯中風之症已兆也所喜面色蒼紫其神巖雖病猶可治

切宜戒酒色以自保愛為立一方以二陳湯加滑石為君苓連為臣健脾胃消痰徹濕熱從小便出加胆星天麻以定其風用竹瀝姜汁三拌三曬仍以竹瀝打糊為丸取竹瀝引諸藥入經絡化痰外又以天麻丸滋補其筋骨標本兩治服二料幾半年不惟病痊且至十年無恙迨行年五十湖之賀者如舊召妓宴樂者亦如舊其酒嗜音荒淫而忘其舊之致疾也手指口角牽引掉硬尤甚月餘中風右體癱瘓矣癱瘓俗所謂半身不遂也

歸而逆予診之脉皆洪大不斂汗多不收呼吸氣促予曰此下虛上竭之候蓋腎虛不能納氣歸原故汗出如油喘而不休雖和緩無能為矣閱二十日而卒八十一

程晚山中風歸而逆予診時其子僅七歲中麻呼為瘡子姑一月餘矣發熱如故咳嗽聲啞肌削骨立頭髮盡禿衆醫束手舉家亦墮泪而已余以診晚山見之曰舉家驚惶謂此兒不保耶此痺症痺因麻後虛熱而發以大薑會丸治之

可獲萬全君家初不問予者謂予非幼科專門也不知此特大方家餘事爾為製藥服之藥未盡而病瘳松谷君語其鄉人曰東宿公見病而決死生治病而隨俗為變一秦越人也孫真人後身非耶予聞之而三謝不敏八十二
去予舍二里許地名曰前坑口一婦人清明前十日發熱頭痛醫者以九味羌活湯十神湯進之不効而又加口渴舌黑如煤更一醫以如神白虎湯竹葉石膏湯進之亦不効而加瀉瀉不止

151026 冊 續修四庫全書 第 6 卷 子部

事昏沉四肢厥冷呼吸氣微米粒不進者十
四日其家為具含歛而待斃適予掃祖墓而近
其家其子聞之即告急於予懇為一診其脉細
如珠絲予曰此疫症也合理中生脉二湯飲之
連進二服夜半神氣稍甦飲粥湯半盞次早六
脉漸見予喜語其子曰可保無事書云脉絕微
續者生仍以前藥與之至晚瀉止口不渴舌心
焦燥退精神清爽駸駸向安矣再用人參白朮
各五錢炮姜炙甘草各二錢半麥門冬三錢五
味子十五粒水煎不拘時服不數日而全愈八
十二

族太學從獻長郎七歲時患痢紅白稠粘而紅更
多飲食少形氣弱于時太學應南都試其兄從
明雅知予因逆予視視畢予曰此不可以尋常
治治也法當補從明曰語云無積不成痢故法
先推今不下而遽用補積何從去予曰足下論
者常也治病貴先察症古人有先攻後補有先
補後攻者因症投劑不膠於常也今形瘦體弱

面色青稟受大不足者飲食又少予故用補欲
使寧有餘即不如意猶可措手若拘常法下之
倘有變將柰之何從明是予而索藥即以四君
子湯加歸芍黃連山查與服三帖而病無進退
婦道間有議予非幼科專門令更請夏氏夏至
即語予先不下而用補以致遷延如是夏曰幸
不下若下今不可為叩其故曰丹溪云大孔如
竹筒者不治今肛門有竹筒狀豈可下然亦不
必補香連丸六一散可愈耳三服而痢愈頗其

痛愈甚又加惡心而神氣憊又更請汪恒春汪
至亦以香連丸黃芩芍藥湯與之痢下日夜不
可以數計飲食不入口婦道信耳謂二氏有時
名故逆迎之獨從明持議復逆予予性觀其形
神大非昔比知中氣虛極非理中湯不可用人
參白朮各二錢五分酒炒白芍藥白茯苓各一
錢炙甘草炮姜各八分肉桂三分四帖痢即減
半前方減其半料又六帖而飲食進痢亦止稠
粘雖無而血水日夜仍三五行肌肉亦未生子

忘其故必痺疾從虛而動用如聖丸以治痺病則全瘳矣八十四

族姪孫子忠患痢於湖之東雙林腹大疼日夜行百餘次下皆紅膿狀若腐爛魚腸絕無糞痰而喊叫聲震中外由孟穉飢飽後倡家縱慾而得也一病即伏枕已十日餘矣予時寓雒城相去百里外渠叔少唯邀予往視診其脉皆緩大無力始用芎歸各五錢加人參白芍藥桂心木香黃連服四日不效改用膠艾湯亦不效大孔狀

封書四卷

六二

如竹筒物食而下不變色猶原物予思之此脾經為寒濕所傷脾不裹血故也非附子理中湯加肉桂南菓不可進五六帖痢始減半飲食稍進但所下穢惡仍若前狀亦無糞渠父仲珪家居閬中即徧訪徽之名家愈囑以切勿用補魚程而抵茗城微虞番款因詢近用何劑微虞曰聞用附子理中湯人參每帖三錢仲珪驚而墮篋亟馳見予潸然泪下言曰姪五旬僅進一子症危如此

後何憂亦以任尺此子故殫心力相扶也仲珪曰離家而徽之各公俱囑以勿輕用補臣故魚程而來竟以補收功非叔幾於誤事吾見自今以往之年皆叔之賜臣父子何以報効予曰治疾如救焚醫家分內事矧屬在宗鄰且無德我之望又何望報第雒城之約不可失若况李鍾泉邀兵軍齋代視數日俾予得踐雒城之約庶兩盡矣而吳子疑而辭曰病者危在旦夕何孫公欲自脫手而愚我被惡聲也予聞而哂之曰

封書四卷

六四

見何鄙哉丹溪有言虛而痢自止病者再五日可脫然矣予亦暫留即以東垣和中勝濕湯與之服七日即衣冠出市報謝四鄰吳見之而悔李鍾泉斬之曰孫公欲成爾名爾欲自沒沒也悔之何補吳繇是改容相敬令其弟遊予門彼亦納交予而稱莫逆子忠之始病也其友李鍾泉重交誼日夕省候督其僕事湯藥毋許離蛙步所下穢物腥臭不可聞皆用漆布拭之晝夜用數十觔悉其滿浣了無難色兩月如一日

此友亦今時所希觀者因併記之以著其高
八十五

余侄元素內人季直難產夜過半亟叩手門起而
問之為產者急矣曰然作何狀曰產已及戶不
能下用力則胸膈間有物上衝痛不可忍予思
少頃曰此必雙胎胎已分而一上一下也及戶
者在下欲產在上者以用力而上衝惟上衝胸
膈故痛也執亦險矣迺諸書如產寶良方胎產
須知與各大方家俱未論及將何以處因詳思

其治法偶悟必安上而下始用力產也即取益
元散一兩與之令以紫蘓湯送下囑必如法飲
藥入腹而胸膈痛止不逾時產二女毋亦無恙
予仲子泰來問曰益元散非產科急劑何能取
效如是予曰紫蘓安胎下氣滑石滑以利竅亦
催生之良品蓋醫者意也予亦以意裁處之耳
此法方書無載故記之以備專女科者采而用
焉八十六

有邵尤而諱馬者年五十患嘔吐吐物如爛猪肺

狀胸背脹市上諸醫皆以翻胃治之不效而反
加潮熱煩躁飲食不入口歛醫謂肺壞辭去不
治延予治之診其脉兩寸滑數左關尺澁予曰
此痰血痰飲症也非肺壞果若肺壞聲音當啞
今聲啞而獨胸背作脹痰血痰飲明矣此症殆
絲酒後怒發所致蓋肝藏血脾統血酒傷脾怒
傷肝以故不能藏不能統血隨氣上積於胸膈
必吐出而脹斯寬也法當消痰血調氣化痰氣
調痰消則新血始得歸經大本端而病根可除

矣迺為立方滑石三錢甘草五分茜根二錢小
蘗一錢五分桃仁貝母歸尾香附各一錢山梔
仁枳殼桑白皮各八分服十帖而全安八十七
許卓峰者多酒多怒人也上吐血下溲血咳嗽聲
啞族醫皆以為痰辭去不治迎予診之其脉左
關絃大右寸下半指壅鬱如薏以予狀予曰此
有餘症也作痰治者非客有辨之者謂此症人
皆認為痰而先生獨謂非痰然何以失血而聲
啞也予曰其為人也好酒酒屬濕熱而助火生

痰火性炎上迫肺不降積而生痰壅瘀肺竅肺
屬金主聲書云金空則鳴金壅塞而不通故啞
此痰壅之啞非肺痿之啞也其性又多怒內經
曰怒則傷肝甚則嘔血并下洩蓋血隨氣行氣
妄動血隨之亦妄動而不歸原故上吐而下洩
法宜清熱開鬱化痰導血歸原不半月而病可
瘳也若認為瘵而以地黃天麥門冬牛膝山茱
萸之類將其其塞而益其熱聲音何由而開血
隨氣行氣不清血又何得歸原哉諸君試觀之

予用滑石青蒿解酒熱為君貝母鬱金山梔仁
香附開鬱為臣杏仁桔梗同貝母化痰為佐丹
皮丹參小蘗甘草導血歸原為使服十帖血果
歸原又以貝母一兩童便浸一日為末柿霜等
分時時抄舌上化下五日而聲音開曉矣計期
不出半月

嫂鈞孺人年六旬孀居已十餘年患痢赤白俱
下腹微痛晝夜二十餘次嘔吐痰涎粒米不入
口者兩月日惟用薄白酒打鷄蛋吞飲之肌肉

盡削諸藥不効予歸診之六脉滑數知濕熱痰
火所致以二陳湯加益元散姜汁炒黃連黃芩
服幾四十帖而嘔止痢瘳其病亦幾危矣予為
治者恃其神存惟神存雖形氣不足不食猶可
不死此亦醫者當察也

八十九
邵秉儀夫令眷咳吐紅痰或如桃杏膿色前後心
稍脹疼而寸脉洪滑此痰血痰火鬱滯肺之氣
道而欲成肺癆也治當調氣化痰兼消痰血清
利肺金以山梔子牡丹皮貝母桑白皮赤芍藥

麥門冬各一錢白滑石三錢茅草根五錢小蘗
二錢甘草五分枳殼八分四帖而瘳

九十
程玄祖兄春瘟食復人事昏沉內熱口渴舌如焦
燥脇痛耳聾身熱如火僵硬不能轉動屍寢者
十日口中喃喃蓋夢語也城中時疫正盛親友
咸不弔慶予為脉之左絛數右洪大而數以紫
胡石膏各五錢黃芩知母葛根各二錢山梔子
枳實各三錢甘草五分連飲三劑額上微汗腹
中雷鳴其夜大便瀉三次皆清水熱仍不退次

早脉之。右寸稍軟。前方加人參七分。又二帖而汗出熱退。身仍僵。口仍渴。耳仍聾。瀉亦不止。汗亦不收。四肢如冰。勺粒不進者已十三日。人皆以為死矣。予獨不忍棄。以人參、麥門冬、白芍藥、石斛各一錢、五味子十一粒、當歸八分、桂枝三分、黃柏、甘草各五分。後再診之。左脉已弱。咳嗽人事漸爽。粥飲稍進。迺能開目發聲。瀉已止。頗可轉身。終有生氣。後以四物湯加以仁、甘草、陳皮、白朮、石斛、百合、貝母。調理一月全瘳。九十一

新加四卷

七十一

汪郎兄腹痛嘔吐不止。城中諸友畢力醫治不痊。予為脉之。早晚大小緩急不一。知其為虫痛也。以乾姜、楨、即蒼朮各一錢、五靈脂三錢、烏梅三個、川椒三分。水煎飲之。痛吐立止。九十二

查景川兄遍身癩瘡。紅而微痒。諸君以白芷、藜蘆、芥升、麻葛根、玄參、甘草、石斛、酒苓、甘草與之。不愈。又謂為風熱。以玄參、蟬退、赤芍藥、羌活、防風、甘草、生地、當歸、升麻、蒼耳子、連翹。服之。飲食頓減。遍身發瘡。痛痒不可言。予脉之。兩手俱緩弱。

以六君子湯減去半夏。加白扁豆、砂仁、以仁山藥、蒼朮、黃耆。一飲而飲食進。四帖而痛痒除。十帖瘳。疥如蛇。九十三

程王吾內人。姓已。七月乳忽紅腫而痛。酒浙惡寒。發熱而成內吹。以大瓜、蔓、四錢為君。當歸尾二錢為臣。甘草、節、蒲公英、貝母、連翹各一錢二分。為佐。青皮、紫胡各八分。橘葉五片為使。水煎飲之。兩劑而瘳。此方治驗不可勝數。緣婦女恐驚肝經為多。故瓜、蔓、甘草為緩肝之劑。貝母開鬱。

諸部四卷

七十二

連翹、蒲公英、解毒、紫胡、青皮、調氣、橘葉。紐當歸活血。血活氣調。毒解熱散。而腫痛消釋也。若將成膿。可加白芷。九十四

一黃氏婦。青年初姓已。及彌月。忽午夜口中啾啾。目作上視。角弓反張。裸裡不暇羞恥。口眼偏邪。昏憤不知人事。問之不能言對。舉家悚駭。予曰。此風痰為怒。肝動而成子癇。當從雲箕子、葛根湯。加大腹皮。一兩劑可愈也。方以葛根、貝母、丹皮、防風、川芎、當歸、茯苓、桂心、澤瀉、甘草各二錢。

獨活石膏人參各四錢水煎飲之而甦
按貝母令人易產未臨月者用升麻代之九

十五

吳見南令即心脾痛因勞倦而致每痛必得可口
之物壓之立止兩腿生瘡右脉滑左脉弱以白
芍藥三錢甘草一錢五分白芍藥碧胡麻各一
錢當歸黃柏各八分石菖蒲白茯苓各六分四
劑而痛止仍用小建中湯減去桂枝加黃柏蒼
耳子白芍藥何首烏煉蜜為丸服之瘡亦尋愈

九十六

又令即八歲原有疳積疔痛因幼科攻剋太過脾
氣不足面色青以啟脾丸為主藥用人參白朮
茯苓甘草白芍藥山查澤瀉薏以仁白扁豆史
君子薑會雞脫皮以神麴糊為丸一料而瘳九

十七

族侄女年甫八歲腹高於胸發熱面紅咳嗽嘔吐
甚則連血噴出右關脉滑大有力此風熱羈絆
於脾肺之間而然以滑石二錢枳實一錢表

芽天麻半夏麴各八分枳實枳殼防風青皮各
五分水煎服之熱退嗽定吐亦良瘳九十八

從兄鎔年近五十左脇痛手足抽搐不能步履兩
手脉俱軟弱用當歸白芍藥木瓜石斛蒼耳子
枸杞子各一錢薏以仁二錢人參牛膝各七分
陳皮白芥子各六分紅苓三分水煎飲之其夜
大便下黑血二升迺得睡痛搐俱緩改用人參
當歸白芍藥各一錢二分薏以仁四錢牛膝木
瓜石斛各八分紅苓酒苓各五分其夜大便仍

九十七

有黑物從此精神和好寢食俱安後五日因為
怒忤且加食傷右手左足大搐左足大腿疼痛
縮而難伸伸則痛甚左脇極痛小水短用山查
青皮防已人參半夏麴陳皮以仁川芎蒼耳子
杜仲石斛以瓜萸為君服下左脇痛止右手亦
不搐矣惟左大腿內股筋痛一搐則膝抵於口
此亦事之異者因改以人參當歸薏以仁甘草
黃柏白芍藥鈎藤牛膝木通山梔子諸痛搐悉
愈口亦不渴後只以此法調理五日隨能縱步

出戶九十九

一小童上達年十六忽面大腫足亦微腫喘息不安此脾虛濕氣壅盛所致酒苓桑白皮防風葶藶子陳皮羌活升麻甘草澤瀉白朮此上下分消法也服後腫熱稍退但正氣甚虛以六君子湯加麦芽澤瀉調理而安一日因多飲食且感風寒痰涌吐逆見鬼面掉手足角弓反張唇口色黑熱極危急此癰症也以胆星半夏天麻僵蚕橘紅炙甘草枳實麦芽白木紫蘊子杏仁煎

胡白茯苓姜三片水煎飲之一劑而愈此後再不復發一百

族侄良詮患血痢腹痛裏急後重時師治以香連丸黃芩芍藥湯不愈腹反增痛面赤唇紅有侶塗殊喊叫之聲四舍悚駭比有太學寧字者仁心為質人也憐其家貧莫抵拉予為診六脉洪大伏於床間而眼泪而不能言太學會其意語予曰症誠急彼以後事無措而難於言予曰諾吾能起之以生熟白芍藥六錢生熟甘草二錢

乾姜肉桂各一錢木香五分棗二枚水煎飲之飲竟啞焉而卧太學心疑歸囑家奴曰倘有急扣門可即報我及明見無動靜迺令人覘病者何若復曰夜來痢減十之五痛減十之七早間已啜粥半盞矣太學喜而叩予曰渠面赤唇紅脉大所下皆血症皆屬熱叔迺復投熱劑吾甚恐一夜不能寐迺今疾已減半生有望焉不上今日用何劑予曰此昨劑差小耳方仍昨也太學曰吾惑矣何視熱為寒耶予曰君知脉大為

熱不知大而無力迺虛寒也面赤唇紅由中寒而火不能下陰盛格陽之症設是真熱腹痛其人體仰而舒寒則引而伏所下血色帶晦均是假熱寒症明矣前劑果再進而全瘳太學復書報予曰昨聞虛實真假之論非飲上池水者不能道也幸註之以詔後世一百一

婦年三十二大發寒熱胸膈有痰大便洩瀉以二陳湯加白朮桂枝白芍藥紫胡酒苓一帖而止後因怒早晨又復發熱吐血一盞口渴汗多

脉甚數。陳皮知母紫胡杏仁丹皮酒苓白朮人參烏梅青皮枳。即水煎服之。用此調理數脉漸退。惟左脉尚絃寒熱已止。喉中痰聲已定。後又因將息失宜。而脇疼痰多。嗽不易出。脉較前不甚數。以瓜蒌仁一錢半。貝母白芥子各一錢。蘿蔔子菴仁滑石牡丹皮青附山梔子各七分。青皮赤芍藥甘草各四分。煎服。血絕不來。嗽熱寢息而安。一百一

從弟婦程氏。右脇痛不能睡。背心疼。下午潮熱。胸

新

七

七

高作梗。痰中有血。大便秘。用大黃以葶菜汁蘿蔔汁芡根汁。和勻。將大黃拌濕。炒乾。再拌再炒。如此三次。黑為度。三錢。瓜蒌仁二錢。貝母當歸山梔子。丹皮各一錢。青皮前胡川山甲各六分。甘草一分。水煎飲之。凡三帖而瘳。丹亦不發。一百三

黃懷虛咳嗽嘔。不知飢餓。氣逆不調。不得仰臥。左脇亦不能。有席。唇曾吐紅。近又傷食。先以丹溪保和丸進。繼以穀芽橘紅白朮枳實半夏

薤其草。子茯苓杏仁桑白皮將養而安。一百四

一族姊年近六十。咳嗽口渴常吐涎。用前胡知母天竺粉白朮。藥當歸甘草陳皮桔梗烏梅桑白皮煎服。諸症悉止。後半年。膝灣紅腫作痛。大便秘。黃柏當歸生地紅芍葶靈僂羌活蒼耳子五加皮防風以仁。四劑全瘳。一百五

族侄婦戴氏。兩寸脉滑大。兩尺沉微。心痛徹背。背痛徹心。甚則必探吐其食。迺已。近來每一痛必

新

七

七日。僅進白水。粒食不能進。進則吐而痛更加。在日後痛漸已。如此者十七年所矣。始則一年兩發。又一年六七發。今則一月一發。以積氣丸治之。不終劑而斷根。一百六

老僕來興。咳嗽胸脇背心脹痛如刀。及所刺。發熱口渴。諸治不瘳。脉浮而數。此風寒鼓激痰火上湧而然。以前胡麻黃紫蘊子散風邪為臣。以瓜蒌仁治痰。久為君。橘紅半夏旋覆杏仁為佐。枳壳桔梗甘草。使兩劑而平。百七

一婦生女不生子多思多鬱小便澀而不通脹悶不安者二日飲醫汪氏以備急丸進之謂大便行小水自利也詎意大便行後而小水點滴不通脹悶益急時刻不能存將欲自盡家人急予為治予詢之曰近來經水行否答曰行過十日矣小腹腫大如一大西瓜之硬自大便瀉後疲困不克以息執若熨眉予曰此轉膠病也不急治則危矣以補中益氣湯酌服入韭菜汁一小酒杯服訖選有力婦人進房令患者橫卧床間

力婦以患者兩脚膝灣架於肩上将患者下身虛空提起搖擺數四俾尿尿倒上徐徐放下患者去衣不及小便箭射而出熱如湯黑如墨頃刻盈盆小腹立消而愈後遇數人不拘男婦皆以此法治之而安

崑池太學內人患牙痛一晚暈厥三次次日兩腮紅腫痛不可支且洒浙惡寒寢食廢以清胃湯加石膏為君白芷為臣連翹為佐北細辛為使飲下痛頓解然如風滅燈之遠外以明慧為本

大五倍子一枚將礬裝入以滿為率炭火上炙焦以礬紅枯為未不時擦牙痛處牙痛立止此方多効

一僕婦因產難而子宮墜出戶外半月不收艱於坐卧家貧不能求藥憂恐成癩鄰姬為訪之專門黃醫博氏教之曰此易事也只須補中益氣湯一百帖每帖要人參三錢計二劑可收也迺夫聞言即大伸舌謝之曰僕家朝傭暮食無隔宿之儲既生蛛網者半越月矣安有人參二劑

可服也惟命是俟耳姬復向予言之且告以醫博氏之治予咲語姬曰審如彼言貧家則盡俟命矣又奚醫為此必產時受寒血凝滯不能飲而收入症雖名陰脫未必盡由氣虛下脫也觀其善食而大小便如常可知矣予有一法價廉而功捷三五日可瘳也用未經水石灰幹一塊重二三觔者又以韭菜二三觔煎湯置盆中將灰投入灰開湯沸看沸聲盡灑濾去灰帶熱於盆上先薰後洗即以熱韭菜於患處揉挪

孟石灰能散寒消血。韭菜亦行氣消血。一日洗一次。如法洗之。初極爽快。洗三日。果消軟。收入此子臆度之方。初不期捷效。如是里中聞之。咸謂此方合命。名曰賽百帖人參湯云。一百十

族侄孫媳程氏。雙桂翁女也。年甫三旬。產曾五胎。今則經閉不行者八年。肌肉則豐肥於昔。飲食又倍加於昔。精采則艷羨於昔。腹柔不堅。略無所謂病者。獨經閉不行。不生育耳。專科率用四物湯。玄胡索。牡丹皮。諸通調之劑。計服千餘帖。

矣。又如三稜。蓬朮。乾漆。桃仁。蘇木之類。莫不藥嘗。罔有一應。訪予為診。六脉緩大有力。予曰。此脾濕生痰。脂滿子宮。徒行血活血破血無益也。法宜調氣消痰。燥濕熔脂。俾使清瘦。庶新飲食不復生痰。不助肥脂。復為經水。經不則行而自行矣。若彼專科者。流局局然。養血活血破血。而欲望其經行。不亦難乎。蓋前劑皆滋濕生痰之味。非有濕痰者所宜。而肥人尤不宜用也。迺為訂一方。以平胃散加滑石。桃仁。黃連。姜。黃。丹。參。

南星半夏作丸劑服之。半年而經行。次年生一子。後又連生一子一女。一百一十一

熊成八官。江右南昌人也。早起行路。忽見和火。五團滾滾而來。犬驚駭。次日腹中膨滿。漸成脹滿。面白皮薄。兩手瘦削。兩足皆有浮氣。按之實軟。不起行動。氣促。形神俱弱。醫謂神弱氣促。而面肌瘦。胸腹青筋。縷縷如貫索。小水清長。形症如此。脾虛所致。以參朮白朮散投之。十日。堵然如鼓中有一塊。巍巍突出。堅若鉄石。臍已平滿。勺

粒不入。醫者復診。與渠決曰。若疾法在。不治。真早圖歸。母作異鄉鬼也。病者聞言。泪簌簌下。東溪憐而懇予為診。脉沉絃有力。診竟。語渠曰。審脉驗症。非氣虛中滿候也。前補太驟。適有助長。願今要兩途。速即歸。恐未能時刻可到。即到又未必遇良手。治稍異。則大事去矣。予有一藥。尚可冀生。東溪力為之請。以琥珀調中丸。日二進之。一進甚其。再進稍快。十日腹漸寬。塊漸熔。半月塊盡消去。青筋俱軟。改以平胃散加蘇

于姜黃以仁砂仁木香調養一月。飲食大加。帖然安寢。兩足之浮亦并消釋。二百一

從侄中叔大學。以暑月赴南雍。一日轉班出。索茶飲。飲輒逆流。左鼻出。茶入腹者十之三。當訝白下。名家調理者盡其人。幾一月。不惟飲茶水為然。食粥與飯亦多從鼻出。太學生平喜精潔。日與交游。皆縉紳達掖。遂以疾自慚。因告假圖治。聞京口多名醫。買舟訪之。如何。如張如團。無不謂治。然愈服藥愈病。漸加惡心頭暈。肌肉削。四肢無力。心益惴惴。亟歸就子治。子診畢。因叩所見。諸名公認何症。投何劑。中叔曰。諸君皆謂此症。被籍無載。治法無稽。徒揣度為胃火。謂諸逆上衝。皆屬於火。故投劑非黃連解毒。即三黃石膏。梔子黃柏。知母天荅粉葛根之屬。侄亦以初到白下。苦酒因酒動火。理或為然。聽其治。而不違它計也。予曰。治病貴辨明經絡。與經絡之出納。虛實明。藏象察。經度究竟。夫病機病能。此扁鵲所以隨俗為變也。何常拘拘守方書哉。內經

有云。咽喉者。水穀之道路也。喉嚨者。氣之所以上下者也。頰頰者。分氣之所洩也。人之鼻淵涕。出不收者。頰頰不開也。子之症亦頰頰不開之類。頰頰不開。故氣上而不下。會厭弱而不能揜其氣。喉夫鼻與氣喉相通。惟不揜。故飲食通從鼻竅而出。不見常人偶氣逆而飲食自噴。噴出乎。即其例也。且右脉緩弱無力。氣虛明矣。內經云。形寒飲冷則傷肺。又曰。脾胃喜溫而惡寒。又云。視聰明而清涼。香臭辨而溫暖。子多服寒涼。此所以惡心頭暈肌消也。子但為溫補。蓋肺屬金。而主氣。金氣旺則收斂。下降。氣下降則飲食從氣下矣。以六君子湯加葶藶桑白皮。以仁沉香。一進而執緩。三進而止大半。七劑而全安。以此症舊無載。故筆之以俟後人采焉。二百一

程達庵四媳戴氏。產半月而腿疼。迎專科診視。曰。虛。投以八珍湯。服十日。疼益甚。予赴邑侯之召。道經其廬。達庵趨問。產後半月而腿疼。何症也。予曰。兩腿皆疼。獨一疼也。達庵曰。右腿疼。予問

痰厥熱否。曰熱予謂切不可認虛認風此產後
 敗血凝滯血海流於經絡不急治則血無從出
 必化膿成毒或為腸癰今腿痛是其徵也達
 庵然而別復迎專科又曰風也但丹溪有云
 產後須當大補氣血雖有它症以未治之投以
 十全大補湯痛轉劇大發寒熱小腹近髀果紅
 腫出膿外科又為生肌收口太蚤致腰俞復發
 一毒腫痛寒熱如初十日後大潰膿而不收口
 精神委頓肌肉陡削飲食不進惡心怯寒昏昏
 一息爾外科曰不可為也專科曰余但治胎前
 產後今為腫毒所壞皆辭去而不下藥達庵始
 悔不聽予言以致悞事因急予予往視六脈
 無力澆口流清水而無膿予曰孰棘矣予
 治疾遠燕保脾益五臟六腑皆籍脾土以治
 然非大劑人參附子不可藥以人參白朮各
 錢甘草乾姜大附子各一錢黃耆三錢白朮
 心各五分以其能排膿止疼也外科猶然
 白朮作膿恐不可服予曰膿不死人飲食

則死人也急進之四帖而神氣回飲食進
 症悉減瘡口成膿予語之曰生矣改用參苓
 朮散調理一月而安達庵叩予曰公何預知
 為腫毒當急治也予曰內經所謂臟象又云
 症腿疼而熱症已現矣生於產後非敗血所
 而何於時急為疎通不晉經絡何毒之有專
 不察而補是益其毒而助之潰也外科不審虛
 實強弱禁以毒治之奈何不使患者幾危哉達
 庵曰專科之不足恃也如此夫雖然不如是無
 以見公之高矣十四

案宜興治驗五卷目錄

徐學士檢老患腸風下血數桶後委頓而有腸極痛有發明

吳儀制主政尚卿先生患肺經痰火症更兼鼻衄

宜興令君宋太夫人病胸膈脹痛予診左部俱散

乳無緒兩尺無神預斷不治三

吳官詹少溪先生以酒積致胃脘疼又加腰眼足

跟肢節皆疼四

宜興令君胡太夫人七十二脾洩十五年不愈又

加吐紅咳嗽多痰痰不易出有發明

曹同府東崗先生患右脇痛予以脉知其傷風

食所致六

宜興令君胡鏡陽公上焦浮熱胃中食積痰飲又

因勞心動火頭面瘡癩作疼七

六鵝源先生咳嗽口乾腹中如火滾動不思飲食

右脇痛八

鶴洲先生太夫人八十六原有痰火大便日三

四行夜兩起腸鳴臍腹膨脹脉三四至一止七

八至一止八皆不治予獨起之七

吳鶴洲如夫人胃脘痛百治不効司為惟痰予作

肝脾相勝之症治而愈十

曹宜崗常憂遺予語以神志不足又疝氣嗜雜食

硬喉中作梗十一

吳荆樵文學疝氣半年兩跨結核硬痛十二

吳鶴洲先生中焦有痰肺氣不足發瘡熱多寒少

口渴小水不利體倦頭痛十三

吳雪舫先生左脇下紅塊大如鷄子傍有小莖管

作疼予作肝膽二經有熱毒治而愈十四

吳孝廉球泉先生心血不足胃中有痰下元陽氣

不充十五

吳思椿胸膈脹痛痰有紫色痰血十六

吳雙泉公病陽亢陰微之候上盛下虛十七

李寅齋先生患血淋小水艱澀難出竅痛不可言

二年不愈十八

熙宇文學內眷前後心痛耳鳴眩暈嘔逆吐酸

四肢痠軟十九

湯簡庵封君素善飲致發腸風且心腎不交二十一

吳仰玄先生患胃脘痛痛徹於背痛時冷汗如雨

杭芝崗文學酒後近內行抹較之法致成血淋二十二

吳中翰漢源先生腸風下血腹中微痛二十三

吳大柱史安節公脾肺二經有痰火中焦有濕熱

流於膀胱為淋濁二十四

吳宮詹少溪翁有酒積而頻傷怒致右脇之火衝

上作痛耳鳴眩暈大便艱滯二十五

吳孝廉球泉公內人痢疾後感寒而經至發熱口

渴遍身疼等症二十六

吳西雲先生庶母筋骨無力不能起止將成痿症

蔣近思令即脇痛氣促胸滿喉疼痰有血屑下

潮熱二十七

徐學士檢老正月食新蒜炒肉而又胃風寒咳嗽

喉疼聲啞有發明二十九

萬肅庵先生令即發熱旬日口渴舌乾色如沉香

六宗伯萬履老夫人右脇痛咳嗽喉乾間吐紅腸

鳴洩三十一

吳雲先生令春融怒暈厥手足冷汗如雨氣急

微閉門台自靜坐一時始甦三十二

吳心逸先生之使患勞倦傷寒三十三

吳文學霽陽先生以積學勞心而心肺之神不足

宜與令君胡鏡陽公夫人患陰虛陽搏之候三十四

太史徐檢老向苦癩疔而妨生育有發明三十六

吳宮詹少溪翁以長君秋捷受賀過勞而傷飲食

吳別駕勉齋翁體豐腴連跌而口眼歪邪左手足

不能動三十七

吳家宰徐檢老以賀壽而腎生痔瘡有發明三十九

宮詹吳少翁患痢赤白兼下裏急後重四十有發明

臧少庚年五十飲食不順利喉管中梗而難下

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人 余煌

徐景奇

子 泰來

朋來

全閱梓

宜興治驗

學士徐檢老體豐厚善飲致有腸風計下血不下數桶因而委頓已卯仲冬右脇極疼痛上至耳

後夜分尤甚左右不能轉動轉動則痛甚飲食減面色青閉目汗出如雨濕透衣被故不敢合睫而睡族醫皆投以香附青皮及辛散之劑痛愈甚汗愈多面愈青逆予診之兩寸短弱左關絃而搏指右關沉滑六脉皆近七至予曰痛在此陽經分野始必動於怒木火之性上而不下故上衝耳後而皆痛也夜痛甚者蓋夜屬肝氣用事內經云司疎洩者肝也邪在肝膈故關目汗即大出中焦原有濕痰法當調肝清熱解

毒誇主魚利小便不可遽止汗而使邪無出路今脉大數如邁歛汗是逆其木火之性不惟痛加且將發疔毒而害非淺矣內經云膏梁之變足生大疔當預防之公曰何為斂劑而謂不宜予曰當歸六黃湯內有地黃當歸黃芪皆滯痰閉氣之味桔梗亦非所宜書曰下虛者及怒氣上升者皆不可用故當慎也因以柴胡黃連為君白芍甘草天荅粉為臣紅荅連翹為佐龍膽草為使服後汗雖仍懣痛即減三之一不妨睡

矣次日仍用前藥痛又減半第三日又服左右轉動如常飲食亦加予未至公已先迎姑蘓盛氏盛公幼時窓友也家世受醫公初不急予曰引領期盛到可刈枯劑朽也盛至診鼻遂詰曾用何劑公出予發劑示盛盛大叫稱謬謂當隆冬之候汗多如此陽氣大洩何敢以柴胡為君喉中痰既未清又何不用桔梗當歸六黃湯前賢已試之藥置而不用是舍紀律而務野戰也即取六黃湯加柴胡以進公雅信盛迺傾心以

從速煎服之。未逾時而舊病隨作。色色加惡。左
右復不能轉動。自戌而至于丑。苦不能支。有內
侍語之曰。服孫君藥。雖未全可。亦已去泰去甚。
彼曾言二藥不可用。何為輕犯而受此苦。宜急
取孫君藥煎飲。飲下。即伏枕。軒軒達旦。始寤。命
使速予至。而扣予曰。人言隆冬汗出。不當用柴
胡。而公用為君。何旨。予曰。膽與肝為表裏。肝膽
之火鬱而不發。故痛極而汗。汗出而痛減者。
是火從汗出。蓋汗廼邪出之門也。予故曰汗不

可飲。本草云。柴胡瀉肝膽火。而以黃連佐之。內
經云。木鬱則達。火鬱則發。言當順其性而利導
之。執則易克。古人治火之法。輕則止治。重則從
其性而升之者。以此蓋醫貴通變。如陰虛火動
而汗出者。內無有餘邪。故以六黃湯飲。而隆
之。常治法也。今內有有餘邪未出。遽飲降之邪
無從出。執必成毒。故變常而從治。柴胡亦出
路。木火之性不逆。則毒不成。而痛可減也。公曰
善哉。孫君之劑。可正相生。不下孫武子兵法。何

輕以無紀律議之。顯投劑而奏凱也。予曰。公數
日後。瘡瘍大發。兩跨且有興塊。作痛。此毒出之
徵。公于時無恐。改用柴胡白芍甘草丹參苦參
茯苓藿麥車前子黃柏金銀花連翹。服三日而
痛全減。汗全收。左右不難轉動矣。踰日。公謂肌
膚痒甚。藹藹然。似癩疹。豈瘡出與。欲以藥浴之
可乎。予曰。可。再三日。兩跨果發興塊。如棋子大
者數枚。且痛。予業已製蠟燭丸。以待至是。授服
之。瘡果遍身大發。兩腿為甚。一月餘而瘡。公始

信予防毒之言。不謬。披懷交驩。且作序識勝期。
與終身不替云。一不傳。吳儀制主政尚卿先生柱史安節公公子也。弱冠
時病鼻塞不能噴者四年。且血寒月更甚。口渴
咽喉邊有痰核。脉之右寸關洪滑。予曰。此肺經
痰火症也。與前胡秦艽葛根薄荷石膏天荅粉
玄參貝母山梔子甘草白藥子桔梗丹皮四帖
而血止。夜與牛黃三清丸數粒。噲之。臭氣即通。
利能嗅。噲未旬日全愈。先生初年績學。心專志

一。不知寒暑致有寒衄疾。又萬曆己卯庚辰罷
邑試皆首選。如此者再而皆不得籍名。學宮益
鬱然不適。予時把臂語之曰。先生何以一儒冠
為汲汲。據脉科甲當不在尊君下。即館中二友
亦金馬客也。依愚見。史先登。公次之。吳又次之。
日後當以斯言為左券。毋相忘。後三公先後登
第一。如予言。萬曆戊戌春。余應吳宮詹召。公暨
史王老不與前言。皆為予讓玄珠序。而紀其事。
以見一時良遇云。二

宜興宋令君。山東人也。太夫人年五十餘。病胸膈
脹痛。予時寓吳宮詹家。而繩庵安節二公皆宋
公年友。因二公而逆予。診太夫人脉。右寸關洪
滑彈指。如黃豆大。左三部散亂無緒。如解索狀。
兩尺絕無神氣。予不得其受病之源。而宋公亦
不以病源告。卒然問曰。脉為何症。予曰。據左脉
為虛弱久病。右脉侶又為飲食所傷。必病小愈。
而又傷反覆之疾也。其勢亦危。宋公聞言。危廼
拂其意。貌似不恭。予見其貌。即辭出。至後堂。有

名醫及學博。余公在焉。余公。予鄉人也。素亦
知醫。問曰。症候何如。予曰。不治。渠謂前診者皆
無難色。公何去然。予曰。兩尺無神。如樹無根。此
難經所云也。左脉散亂。右脉如豆。大彈指。不旬
日當見果。後七日而卒。邑中鄉先生士民相傳。
謂予能預決死生云。三

宮詹吳少溪先生。有酒積。常患胃脘疼。近又腰眼
足跟肢節皆痛。予謂此皆由濕熱傷筋。脾肺痰
火所致。法宜清肅中宮。滯痰去濕。俾經絡流通。
筋骨自不疼矣。切不可作風癘。而用風劑。公極
然之。用二陳湯加葶靈。礞。蒼朮。黃柏。五加皮。枳
實。葛根。山梔子。進之。肢節痛減。改用清氣化痰
丸。加羌活。獨活。蒼朮。枳實。姜黃。用竹瀝。神麴。打糊
為丸。調理而安。四

宜興令君胡鏡陽公。尊堂太夫人年七十二。脾泄
十五年不愈。近加吐紅。咳嗽痰多。痰亦不易出。
申酉時潮熱。胸膈壅塞。不能就枕。飲食大減。且
惡風。終日坐帳中。諸醫謂發熱吐紅。法當寒涼。

脾洩多年。氣虛老耆。法當溫補。二病矛盾。難於
 投劑。又謂身熱。脉大。血家所忌。益束手無能。為
 計。皆辭去。且歸咎于長橋上拆屋。致止堂不利。
 以是前丁宋二公。接跡憂去。邑中洶洶。因延予
 治。診得兩手脉皆浮而洪數。亦皆帶滑。予曰。據
 脉洪數為熱。滑為痰。浮為風邪在表。以傷風故
 惡風。仲景曰。當汗不汗。必作衄症。法當清解。可
 無恙也。公以諸醫二病矛盾之說為問。予曰。此
 暗於先後者也。夫脾洩已久。未嘗為害。新病熱
 熾。宜當速去。所謂急則治其標也。俟邪去之後。
 補脾未晚。且潮熱為風邪所致之熱。而非陰虛
 火動之熱。血運當汗不汗之血。亦非陰虛火動
 之血。內經云。奪血者無汗。奪汗者無血。當汗不
 汗。邪鼓血動。但得表解。熱退血自止耳。公憮然
 曰。意者。曠昔老母過錢塘。遇風濤受驚。因發熱
 咳嗽。血出痰多。今以公言質之。誠由風邪起病
 也。願以藥進。予用紫蘊子。前胡。麻黃。薄荷。鮮表
 為君。枳殼。枳椇。桑白皮。瓜蒌。紫苑。貝母。消痰治

嗽為臣。酒苓。甘草為佐。連服二帖。五更微汗。而
 熱退。胸膈不壅。嗽亦稍減。血止大半。始進粥。次
 日減麻黃。加白茯苓。夜服七製化痰丸。其夜痰
 嗽又減半。從是不惡風。而去慢矣。前方再減枳
 壳。加薏以仁。調理而安。五
 曹同府東崗先生。右脇痛。脉之左絃大。右滑大。此
 由外傷風內傷食所致也。又加咳嗽。夜更痛。體
 肥面青。寢食俱廢。予以紫蘊紫胡解其表。白芥
 子。桂皮。香附治其脇痛。山查。蘿蔔子消其食。杏
 仁。陳皮。半夏。瓜蒌。仁治其嗽。四帖。飲食進。嗽亦
 除。脇痛減十之七。再與保和丸服之而安。六
 宜興令君鏡陽先生。上焦有浮熱。胃中有食積痰
 飲。平常好食熱物。稍涼即腹痛洩瀉。大便後間
 有紅。又因勞心動火。頭面生瘡癩。作疼。脉左數
 右滑數。以玄參。石斛。白芍。各二錢。甘草一錢。天
 花粉。連翹。貝母。各一錢。茯苓。八分。薄荷。五分。四
 帖。瘡癩皆愈。再以保和丸。加姜。連。滑。石。紅。麩。白
 朮。丸。與服。半日。全安。七

吳鶴洲先生咳嗽口乾腹中如火滾動不知節候亦不思飲食右脇痛脉右滑數左絃數此中焦有痰積也先以總管丸去其痰而後養脾服後大便下稠粘黃糜甚多小水如血此熱下行也繼以保和丸理脾消餘痰又使新飲食不生痰也外呂橘紅貝母天荅粉桔梗酒苓知母蘇根甘草滑石服之其咳嗽亦除

六鶴洲先生太夫人年八十六素有痰火大便一日三四行一夜兩起腸鳴臍腹膨脹脉三四至

一止或七八至一止諸醫不知溫補妄以平胃散加黃連山查白芍一切苦寒之劑投之越疾去過因致腹寒積滯其誤但謂年高而脉至是為凶兆辭去不治逆予診之予曰據脉云脉緩而止曰結數而止曰促今結脉非凶脉也由寒濕之痰凝滯所致法當溫補下元俾火得以生土所謂虛則補其母者當無恙矣鶴洲公曰壽筭何如予曰兩尺迢迢有神壽徵也即百年猶未艾以補骨脂白朮各三錢為君杜仲

二錢為臣白茯苓澤瀉陳皮甘草各一錢為佐肉豆蔻益智仁各五分為使四帖大便實惟腸鳴未止減肉豆蔻加炮姜五分而安壽果至九十有八九

吳鶴洲如夫人病胃脘痛醫有認為虫者有認為火者又有認為痰為氣為食為虛為血為寒者諸說紛紛百治不效群然指為怪疾請予診之手大而無力皆六至予曰豈惟耶肝脾相勝之症耳東垣治例腹痛以芍藥為君惡熱而痛加

黃柏效此法則治當萬全矣白芍四錢一半生一半酒炒伐肝補脾為君大甘草二錢一半炙一半生緩肝養脾為臣山查為佐炒黑山梔仁五靈脂各一錢止痛為使三帖而病愈鶴洲公喜曰君真能用藥神而降病恠者也噫曾宜崗常多夢遺予曰此神志不足也又有疝氣近加嘈雜食硬物喉中梗作疼予謂病有緩急則治有先後咽喉之症非急先而何初為清肅上焦次為補養神志俾神旺而精有主可不妄

或酒送下三錢不終劑而瘳十一
 吳荆樵文學。惺惺君子也。左關尺脉甚絃。疝氣平
 年兩跨結核硬痛。予以平疝丸消之。海藻昆布
 橘核各酒醋炒四兩。玄胡索山梔子仁山查核
 小茴香紫胡各一兩。龍胆草酒炒五錢。醋打麵
 糊為丸。梧桐子大。空心酒下三錢。服一月而消
 十二

吳鶴洲先生。中焦有痰。肺氣不足。瘧一日一發。熱
 多寒少。口渴。小水不利。倦怠頭疼。脉左絃大右

寸短弱。關尺滑大。以石膏知母黃耆同柴苓湯
 煎服。服後腹作瀉。前方去石膏知母邪熱減大
 半。惟僅潮熱而口渴甚。改以人參葛根知母麥
 門冬柴胡陳皮甘草白朮鱉甲五更服之而愈
 十三

吳雪舫先生。左脇下紅塊大如鷄子。傍有小苦蕒
 作痰。左脉絃大而數。右滑大而數。蓋由生平嗜
 博炙。以致肝胆二經有熱毒也。用大瓜蒌一枚
 白芍三錢。當歸甘草貝母各一錢。連進三帖。疼

減其半。脇下紅成一小癩。以解毒早故硬塊潛
 消。大毒不成也。仍當為活血清熱。再用白芍三
 錢。當歸一錢。半金銀花甘草各一錢。大瓜蒌一
 枚。連翹山梔仁各八分。紅花紫胡各五分。四帖
 而愈十四

吳孝廉球泉先生。心血不足。胃中有痰。下元陽氣
 不充。脉六部皆弱。惟右關滑。以遠志枸杞子各
 四兩。巴戟兔絲子破故紙山茱萸各二兩。五味
 子白茯苓人參各一兩。煨薑為丸。空心淡鹽湯

送下三錢外以固陽鎖真丹照之龍齒益智仁
各一兩黃柏二兩辰砂甘草蓮心各五錢笑
實粉打糊為丸梧桐子大每夜灯心湯送下一
錢五分極能固精十五

李思椿患胸膈脹痛痰中有紫色瘀血其原有酒
積鬱火也脉兩寸短關滑兩手皆數先與紅六
神丸服之繼與山梔酒連鬱金香附橘紅茯苓
半夏麩甘草滑石紫蘘子服後胸膈稍寬仍以
山梔仁貝母益元散各二兩牡丹皮黃連橘紅

各一兩半白茯苓一兩紫蘘子鬱金紅麩各五
錢蒲根三兩神麩打糊為丸每早晚白湯送下
二錢調理而愈十六

吳雙泉公兩寸脉洪大兩關滑兩尺沉微此陽亢
陰微之候上盛而下虛也上盛者痰與火下虛
者腎經真陰不足也法當清上補下上清則頭
目清利耳鳴眩暈之症可除下實則腰膝不痠
筋骨強健清上用清中丸貝母橘紅枳實海石
心香茯苓白芥子黃連黃芩滑石青黛神麩各

光食後茶送下二錢補下用既濟丹辰砂磁石
各一兩熟生地四兩黃柏知母兔絲子栝子仁
各二兩牛膝枸杞子白茯苓各一兩半煉蜜為
丸梧桐子大空心淡鹽湯送下八九十九十七

李寅齋先生患血淋幾二年不愈每發十餘日小
水艱澀難出竅痛不可言將發必先面熱牙痛
後則血淋前數日飲湯水欲溫和再二日欲熱
又二日非冷如水者不可燥渴之甚令速及并
以連飲二三碗猶以為未足未發時大便燥結

四五日一行發則瀉而不實脉左寸短弱關絃
大右寸下半指與關皆滑大兩尺俱洪大據此
中焦有痰肝經有瘀血也向服滋陰降火及淡
滲利竅之劑皆無效且年六十有三病已久血
去多何可不兼補治當去瘀生新提清降濁用
四物湯加杜牛膝補新血滑石桃仁海其瘀血
枳實貝母以化痰山梔仁以降火紫胡升提清
氣二十帖而諸症漸減再以滑石黃柏知母各
一兩琥珀小茴香桂心各一錢半玄明粉三錢

每金沙洗藥各五錢。茅根湯送下而愈。^{十八}

徐熙字文學內。嘗患前後心痛。每痛必面赤。手
心熱。耳鳴眩暈。即飲白湯。亦停兩間不下。且作
酸嘔逆。吐出皆酸水。五七日方止。四肢痠軟。氣
力。氣逆上噴。迺其常也。兩手脉皆沉數。左絛。此
上焦有痰飲故也。先以二陳湯加瓦楞子滑石
吳茱萸。連前胡。只壳竹茹。香附。大腹皮。服後
以精紅半夏。滑石各二兩為臣。白螺蛸壳煨過

四兩為君。茯苓。姜連各一兩半為佐。旋覆。卷一
兩。吳茱萸三錢為使。麩糊為丸。每服三錢。調理
而愈。^{十九}

湯簡菴封君血分熱甚。以善飲致腸風。且心腎不
交。予以四物湯加酸。棗仁。側柏葉。槐。蒼。連。翹。煉
蜜為丸服之。頓愈。^{二十}

吳仰玄先生患胃脘痛。痛則徹於背。以手重按之
少止。痛時冷汗如雨。脉瀼。此氣虛而痛也。以小
建中湯加御米壳服之。而愈。^{二十一}

杭芝崗文學。酒後近內。每行三峰。採戟對景忘情

之法。致成血淋。自仲夏至歲杪未愈。便下或紅
或紫。中有塊如筋膜狀。或如蕪木汁。色間有小
黑子。三五日一發。或勞心。或勞力。或久立坐亦
發。訪醫問道。百治不效。以吳中書漢源公交善。
遂請治之。見其色白而青。肌肉削甚。診其脉左
寸沉弱。關尺絛細。右寸畧滑。據此必肺經有痰
痰。肝經有瘀血。總由酒後竭力。縱慾淫火交煽。
精離故道。不識澄心調氣攝精歸源之法。以致

凝滯。經絡流於溺道。故新血行至被阻。塞而成
淋濁也。三五日一至者。科盈滿溢故耳。先與丹
參加茅根。濃煎服。小便解後。以瓦器盛之。少頃
即成金色。黃砂。迺用腎氣丸加琥珀。海金沙。黃
柏。以杜牛膝。連葉。搗汁。熬膏為丸。調理外。以川
芎三錢。當歸七錢。杜牛膝。草。根。煎服。臨發時用
滑石。甘草。梢。桃仁。海金沙。麝香。為末。以韭菜汁
藕汁調服。去其凝精。敗血。則新血始得歸源。而
病根可除矣。三月全愈。^{二十二}

吳山翰漢源先生腸風下血腹中微痛脉左寸短
右關滑兩尺絃大以地榆槐花枳壳各三錢荆
芥穗秦艽青蒿葛根各一錢半黃連二錢兩劑
而愈二十三

大柱史吳安節公脾肺二經有痰火中焦有濕熱
流於膀胱為淋濁澀之前作痛小便了而不了
脉左寸短弱關絃大右寸關滑兩尺洪大六部
皆數法當先清上中二焦痰火然後提清降濁
庶日後筋骨無疼痛之患先與草薢分清飲加

山梔黃柏滑石服之淋濁減半改以二陳湯加
山梔黃柏滑石螺蛸壳木通以去濕熱而消中
焦之痰再加紫胡升麻桔梗以提清氣四帖而
愈二十四

吳宮詹少溪翁原有酒積且頻傷於怒致右脇之
火衝上作疼耳鳴眩暈大便艱澀脉右寸關滑
數左絃數以當歸龍會九加牛胆南星治之而
愈二十五

吳孝廉球泉公內人痢疾後感寒文月水適至大

發熱口渴遍身疼胸膈飽悶煩躁頭微疼耳中
聾大便溏舌上白胎脉七八至亂而無序此三
陽合病春溫症也時師誤以為瀉底傷寒不治
予曰病已危醫而不起者有矣未有不醫而起
者也且投三陽藥服之挑察微應尋相時而動
以紫胡三錢葛根白芍藥各二錢枳實桔梗瀉
苓竹茹各一錢天荅粉八分炙甘草桂枝各五
分服後但覺遍身冷如水面與四肢尤甚六脉
俱無舉家及醫者皆嘆為物故矣予獨曰非死

宜興五卷

候也蓋夜半陰極陽生執欲作汗譬之天將雨
而六合皆陰球泉疑信相半而諸醫聞之皆嘆
去四鼓後果戰而汗出不被皆溫四肢體面漸
溫神思清爽且索粥舉家欣欣以為再生次日
惟耳尚聾腹中大响脉近六至改以紫荅湯加
烏梅兩帖而愈二十六

吳西雲先生庶母筋骨無力不能起止將成痿症
上熱下寒易為驚恐小腹左邊疼以玄胡索五
靈脂陳皮半夏青附青皮白芍藥茯苓山梔子

服小腹痛減惟小水頻數改用青蒿山梔子以仁白芍藥甘草藿藜服後熱退小水不頻數獨胸膈微痛夜不欲寐再以當歸白芍藥山梔子香附柴胡陳皮甘草茯苓青蒿調理全愈二十七

將近思令即脇痛氣促胸滿喉痰痰中有血骨下干潮熱口渴頭重指稍冷服滋陰降火之劑不効且紅愈多痰咳不出請予診之右寸閉滑大左尺亦大予謂此肺經有瘀血濁痰壅而為熱

也治當先清化不當先滋補以瓜蒌仁三錢紅花紫苑丹皮枳殼各一錢滑石二錢甘草五分前胡青蒿水煎臨服加重便一小酒杯兩帖而熱退血止惟咳嗽未除胸膈不寬再以瓜蒌陳皮貝母蘿藦子馬兜鈴白茯苓甘草紫苑滑石杏仁調理而愈二十八

徐學士檢老以正月食新蒜炒肉又冒風寒因咳嗽喉疼聲啞翁原有痰火又為外邪所束不得發越以致此治當潤肺清熱化痰調氣以祛其

本無散邪解表以治其標庶乎喉痛可除聲音可開亮矣先與瓜蒌仁橘紅桔梗薄荷貝母桑白皮地骨皮葛根桔梗前胡甘草四帖復以滾痰丸同七製化痰丸兩帖夜服諸症除而聲且亮矣此釜底抽薪法也二十九

萬肅庵先生令即發熱十一日口渴舌心色若沉香且甚乾燥額上熱極兩脇亦熱耳微聾曾未有汗亦已下二次熱不少除小水絕少神昏足冷飲食不思市醫技窮迺告急於予予診之左

脈中按數而有加右脈軟弱據症為陽明少陽并病也當以柴葛湯清徹其熱看汗有無再當機而處柴胡五錢葛根三錢白芍藥石膏各二錢人參升麻天荖粉各一錢粉草七分水煎服之次早診數脈稍緩熱稍退舌苔仍乾小水不利神思尚昏沉改用柴胡粉草天荖粉黃芩人參白朮茯苓滑石木通澤瀉下午又覺微熱面赤額上痛且重即以益元散三錢服之大便行一次澹而色黃熱仍甚

原缺

以已卯決科許者其星士前許歷歷有驗至
臨瘡發不能終場遂心憂而成顛狂日間或悲
或歌或鼓掌或頓足甚則罵詈不避親疎貴賤
冠叔邀予視之面白而青脉兩寸短弱關絃右
關滑兩尺平予謂兩寸脉短弱此心肺之神
不足志願高而不遂其欲鬱結不舒津液生痰
而不生血又攻痰尅伐太過心神愈不得養故
昏亂而無所攝持內經云主不明則十二官危

按此則治宜補養液缺心補而兼之清痰可萬
全也用酸棗仁人參茯神小草丹參當歸以補
心安神黃連竹茹以清肝胆之火玄參佐之外
以龍齒珍珠鈴半角牛黃胆星天麻青黛辰砂
全蝎冰片黃連甘草膏為丸金箔為衣調理而
愈三十四

直隸令君胡鏡陽老先生夫人夜間熱口滑絳行
過十日復行小腹痛兩寸關短弱兩尺洪滑予
診畢語曰此內經所謂陰虛陽搏之候也可預

防之以川芎當歸條芩蒲黃白芍側柏葉生地
荆芥進之。下午熱甚口中氣如火噴血下如傾
內有紫塊小腹仍痛。用川芎二錢當歸四錢
地榆香附各一錢半黃芩一錢蓮蓬壳一枚燒
灰煎服兩帖而止。三十五

太史徐檢老向為癩瘋所苦而妨生育幸已孟秋
有江右陳嶺泉者以是症為專科寓蕪錫翁延
而治謂將爛藥煮竹片夾陰囊俾囊爛見子。又
以爛藥點開腎子使其蓄積臭水潰出然後

用生肌藥長肉收功。翁以此治與道中諸友商
之。無有勸者而謀於予。予曰翁疾非常疾則治
當非常治也。陳能為翁治於外予當佐陳補於
內。內外兼治必可成功。翁因予言而決用陳。是
時予有湖州之役而陳用其術治一月囊爛子
開洞見水泡。第不能使泡破水出也。由是胸中
氣滿汗出如流。終夜不寐。飲食減三之二。面青
肌肉瘦其半。形氣弱而大便艱澀。腰腎俱痛。苦
不可殫述。將令人急。予適自湖州至荆溪王

吳少溪公家翁時杜門謝客。聞予至大喜。而促
予診脉。兩寸軟弱。右尺大。右關滑。予診畢曰。向
翁佐陳治內。今其時也。比陳技已竭而水不得
出。翁又難於痛。業已用收口藥矣。予曰無傷。痛
由元氣虛憊而汗亦因痛來。汗去多則心血不
足。心血不足則神失養。故不寐。脾胃為痛所傷
故飲食減。今只大補血氣。不惟痛止。疾除。即水
泡亦可出也。陳謂用補收口生肌。或可使泡出
水。或未必然。予曰三日後當自見。翁曰補甚善。

素生平不能服參。何予曰翁體非昔比也。脉症
皆可服。又何憂。迺用人參黃耆各三錢。當歸白
芍石斛各一錢五分。陳皮貝母紅苓粉草各八
分。飲下即睡。次早汗乾。且索粥。胸膈頓寬。連服
兩日。痛減大半。飲食頓加。精神亦爽。迺陳恐予
奪功。私譖之曰。孫君之藥難善。但非外科所急
服之。恐生肌。收口後而水終不得出也。翁謂必
如何而後可。陳曰當於前藥加羌活防風白芷
遠志。減去石斛。則外內兩得矣。翁然其說。且服

其藥飲未半而痛立至汗立出頭熱如火氣逆
上升夜竟不寐種種病復矣亟索子劑子知陳
之忌而行諧也迺宣言曰予實佐尔成功耳尔
何自敗尔知翁之痛乎元氣虛而毒藥凝滯故
補而助之活動其血則毒藥自行藥行則泡可
濟水方可出翁之謝尔已有成議予雅善翁未
者為義非為利也鄙見與尋常較不牟矣陳聞
言而語塞亦以投劑無功遂乘机而聽子治仍
用前方加酸枣仁枸杞子皂角刺各一錢兩帖

而泡潰出臭水五六椀囊隨消癰陳拊掌曰今
而後知用補之神其老先生之福也太史受補
自此始三十六

丁酉冬宮詹少溪吳公年七十二以長君秋闈之
捷應酬賀者過勞過飲又傷於大肉市醫藥用
消導之劑投之漠如也反加內熱常州張氏荆
溪縉紳大家特為鎖鑰者至則謂公高年過勞
消劑峻而致內熱用補可愈也因授人參則右
脇脹痛晝夜不寧張又謂補法不差惟少行氣

之味故無功耳於前藥加木香砂仁辛熱止痛
之劑益嘔吐不止脹痛轉劇而大便燥結張不
自咎不認病而誤投迺遍語縉紳相知曰吳公
翁老手焉食非其所宜丹溪復生無能為也必
翁聞予在茗而急于治予兼程而往至則錯之
念一日也診其脉左絃右滑兩手皆數且搏指
滑視其色神藏氣固惟肌肉略瘦手心甚熱予
曰此內傷症非焉食症也公曰諸君言吐而大
便燥結食不得下非焉而何存曰否公原不熱

不痛又不吐由誤飲藥而使然耳書云通則不
痛痛則不通大便既燥而用補非也經曰食不
得入是有火也尤用辛熱非之非也以是而治
譬之以油救火益令其熾爾予見與諸醫不
也即與琥珀調中丸一帖其夜脇痛稍緩次早
診之脉仍如前予決謂非通不可即以龍會丸
與調中丸兼服之五日內下黑糞十五六次諸
症悉減飲食大進改以保和丸調中丸調理念
七日公即能中禱元且命危人治酒榜人臆舟

拉于泛於南門持觴為予壽曰與兄別者六
年不憚勞涉險而赴吾意自今以後之齒皆兄
之賜也敢不銘心為驩竟日至殺日予廼別而
復之茗三十七

別駕吳勉齋翁體豐腴嗜炮炙任性縱慾年六十
七極躁急一日跌傷其齒恬不為意閱三日復
跌亦不為意復跌之次日晚左手足忽不能動
口眼歪邪陸懷南先生公通家友也即往診之
語公諸郎曰此中風也治不可緩急取牛黃丸

進之諸郎皆有名博士弟子延予為治診其脉
左洪大右緩大觀其色蒼黑神昏軀呼長而
吸短呼至口氣嘔嘔出不能回終日偃卧如醉
人不能動陸曰此非半身不遂乎予曰症候甚
惡不特半身不遂也半身不遂者中風已過之
疾其勢仍緩亦有十餘年無恙者今終病執便
若此過中風之漸方來且不可測陸重厚長者
所語亦精聞予言當下了然即與予商確用藥
始以六君子湯加全蠍姜蚕天麻與之西月神

氣仍未清猶昏睡猶呼吸口邊嘔然悶作
或粒米尚不進前藥再加竹茹又西日神始甦
欲言而舌難掉嚼不能出諸以前藥又加石
菖蒲遠志紅苓始能進粥數口日計亦可茶醃
許夜與正舌散同前藥飲之又三日能坐粥亦
頗加惟言尚寒澁欲言以筆代口寫我左手其
痛大小便艱少又用四君子加陳皮竹茹當歸
芍藥紅苓鈎藤天麻服三日神思大好飲食日
加以是方調理弥月手痛減稍能動足稍能伸

扶起能坐且能自按譜鋪牌語言十分清至八
九駸有萬全之望惟大便有七八日或十餘
日始一行予曰此血少之故補養久當自全幸
無它用而速害公常自言吾疾痼痰在鬲間何
能得一吐為快此醫家有授之言也予曰公脉
大虛非餘痰為害况今以補養而漸安此其明
驗何敢輕試一吐願寧耐靜俟毋涉險為也此
戊戌九月念五予以是日別往茗城別不及旬
公復傾心而任張甲張大言曰公病可吐蚕吐

15528 續修四庫全書 第 8 卷正內

必成痼疾公欲速効決意吐之諸郎君不能阻
一吐而煩躁猶曰吐不快耳須大吐始可再吐
而神昏氣促汗出如雨立時就甦可嘆可嘆三
十八

少家宰徐檢老以萬曆丁酉三月初旬往賀長興
減老夫人眉壽而發寒熱臂近肛硬處生一毒
紅腫而痛坐卧為艱因歸荆溪訪治外科即以

銀針點開插藥線於內塗以爛藥使膿血急流
又於膏口上以生肌藥敷之使易收口可受謝
而去未一月其傍之硬處又紅腫痛寒熱交作
幾於成膿以前醫有功遂復延之至則又以向
者之法治之受謝而去適醫通患通針而通插
藥計其患者凡八遍計其醫之更者如張如魯
如馮凡八人有陳外科者則總其中而受謝獨
多其時則丁酉三月至戊戌八月幾年半矣於
時予赴吳少溪翁召因知翁在蓐亟往謁於卧

探聞翁見予至悲喜交集備陳其歷病之由針
刀之苦伏枕歲月之深輒為痛心予聞之亦為
酸鼻諦觀其色則青慘脗其脉皆濡弱把其手
足則冷如冰問其飲食減平日之六究其所服
之藥則視角黃栢生地涼血解毒之類予駭然
而語翁曰此痔瘡非痔漏也痔漏常用掛線以
五灰膏點之可愈今腫硬無定處離肛門且遠
况其初原無硬塊硬塊由插藥凝滯中來諺云
刺肉做瘡者非耶假令非翁稟氣厚胃氣壯安

能六十以外之年而當此剝削哉初只可大補
氣血即有毒只宜托出一膿而愈未成者使活
動消散不復生毒此王道之治不勝於針刀萬
萬諸君之治如避影者不知息陰而急趨以求
避則影益速而氣促救矣自殆之道也翁初不
逆予者以非外科至聽予之論幡然有悟又見
玄珠集有外科二卷益信予之善外科而聽予
治予即以十全大補湯進之四帖而飲食加手
足暖大便艱澀百方潤而不能行者今亦通利

而肛門如不知也。諸外科猶嘔嘔補非是。極言排之。翁惟予為聽。予以何首烏四兩。人參枸杞子黃耆當歸熟地各二兩。梔角秦艽各一兩。蜜丸服之。不終劑其腫處少出膿而全瘳。亦不生硬。現益信向之硬塊為排藥之毒所致也。翁喜為謹曰。予病非孫君諸外科視我疾為金穴。其取寧有已耶。呵呵。三十九

宮唇吳少翁患痢赤白兼下。裏急後重。市醫治半月。後重不除。飲食漸減。最苦者下午發熱嘔吐。

遺使往者招予。予聞狀心怖。即涉險而過太湖。一晝夜而至荆溪。翁卧榻已二十日。觀其色唇紅面瘳。聽其聲微弱。不揚。但一兩語氣即不接續。下午潮熱。至丑方退。形神俱弱。診其脉兩手俱大而無力。右關略滑。予曰。據此迺虛虛實實之候。不足中之有餘也。治當補養兼清。兼消緩以治之。庶可無恙。公深然之。以四君子湯加白芍藥黃連山查滑石陳皮柴胡西帖而潮熱除。嘔吐止。去柴胡。因口渴不止。加葛根。六劑而

飲食漸進。血亦止。惟白膿不除。改用人參白朮各二錢。白茯苓白芍藥當歸神麩各一錢。酒連陳皮澤瀉各七分。滑石山查各一錢半。外以九劑消息。盈虛調養。半月。則神氣回而飲食大進。肌肉漸生矣。少宰檢翁問曰。諸醫先謂老寒痢非所宜。又嘔吐飲食不進者。謂之噤口。且身熱脉大。為痢所忌。公不旬日而收功。豈諸醫稱書之忌。皆幻妄哉。予曰。諸君所言。皆至言也。第非因時制宜耳。愚見以脾胃迺五臟六腑之君。廉故曰。納穀者昌。又曰。人身之內。穀氣為寶。予姑舍痢不治。而先開胃口。俾進飲食。使新糟粕將宿穢墜下。若見糞則後重除。而痢易愈也。然又相其机宜。若食入而腹脹作痛。又量執畧與疎通通後。或氣虛下墜。又因執而畧與升提。大抵以理脾胃。胃進飲食為先。此亦遠交近攻之策。可難多功。可萬全矣。斯僕一得之愚。屢試而屢驗也者。設不先開胃口。不審老弱不揣緩急。一藥治痢。雖有得。未必無失。豈勝笑哉。公曰。善。

減少庚年五十。每飲食胸膈不順利。覺喉管中梗
 梗。宛轉難下。大便燥結。內熱肌肉漸瘦。醫與五
 香連翹湯。五隔丁香散。諸治隔之劑。嘗試之不
 效。時予方有事於先塚。久未遠出。減則不遠千
 里。而就予治。觀其色蒼黑。目中神炯炯不眩。惟
 氣促骨立。予知其有執心人也。其脉左絃大。右
 滑大。予謂之曰。據脉廼謀而不決。氣鬱成火。脾
 志不舒。致成痰涎。因而血少便燥。內熱肌肉消。張

上與五香

子

鷄峰有言。隔廼神思間病。即是推之。子當減思
 慮。斷色欲。薄滋味。絕妄想。俾神思清淨。然後服
 藥。有功。不然。世無大丹。而草根木石。何足恃哉。
 子既遠來。予敢不以肝膈相照。茲酌一方。頗妥
 歸。即製服。但毋輕示人。恐見未精者。妄為加減
 敗廼事矣。慎之慎之。減曰。謹如教。其方用桂府
 滑石六兩。炙甘草一兩。真北白芥子。蘆薈子。射
 干。連翹子。各一兩半。辰砂五錢。以竹茹四兩。煎
 湯打饅頭糊為丸。菜豆大。每食後及夜用燈心