

De la

gangrène

Par M. Boyer

A decorative flourish consisting of several overlapping, curved lines that sweep across the page, ending in a small hook.



Lecours de Pathologie de Not Royer. —

Cour le corps contondant qui ont une action extrêmement grande qui peuvent produire une désorganisation subite de nos parties peut produire la gangrène spontanée ainsi non seulement les projectiles l'ouant la poudre à canon, mais une pièce très lourde tombant de haut, broye, écrase un doigt, une main, un pied, un membre, même tout entier la roue d'une voiture & en désorganisant nos solides produit instantanément la gangrène & non consécutivement quand au membre est ainsi désorganisé, il ne faut pas attendre que la gangrène se manifeste et que la nature separe le mort du vif, parce que le Malade pourrait succomber et s'il échappait à ce désordre de la maladie, serait très longue ainsi avant que les accidents se développent il faut les prévenir — par l'amputation c'est un cas particulier qui diffère en cela de la gangrène consécutive. Dans la dernière leçon nous avons dit que la paralysie prédise posait à la gangrène, mais il est des cas où elle est tout à fait inévitable à la suite et c'est ordinairement la compression qui hâte son développement. — Supposons qu'un individu fasse une chute sur ce bassin que le nez tomberait comprimé par le développement des vertèbres ne puisent

Gangrène

plus transmettre la vie aux organes
contenus dans le bas ventre, aux quels
ils se rendent tels que la vessie le cecum
et qu'il y ait paralysie des membres inférieurs
il y aura rétention ou incontinence d'urine
les excréments s'accumulent dans les intestins
ou seront rendus involontairement mais ce
sont les accidens les moins dangereux pour
ce que l'on peut y remédier, il en est d'autres
qu'on ne peut prévenir c'est la formation
des escars gangreneux qui surviennent
à différents points des parties paralysées
et ce sont presque toujours des escars qui
entraînent la mort du sujet qui arrive
au bout de deux ou trois mois quelques
fois + tôt ou + tard, ces escars sont
produites par la compression qui s'exerce
d'une manière continue sur un point
de la peau pressée entre des saillies
saillies de os et le lit du malade la
compression est continue par la situation
du malade qui ne peut changer de position,
on voit bientôt à la peau que recouvre le
frottement la rougeur se manifeste d'abord
peu considérable et peu étendue s'élève
augmente d'intensité.

Pour éviter la gangrene on change la
position du malade qu'on le place d'un
côté un rougeur semblable se manifeste
bientôt vis-à-vis le grand trochanter à la

malheur externe & enfin 9. 9. précaution ³ que
jeune on voit tot-ou-tard la gangrene se
manifeste mais elle a un caractère
particulier les écarrs sont long-temps avant
de tomber. les plaies qui succèdent au
point de saignée mais elles ont un mauvais
caractère elles sont lentes et rendent un
pu de mauvaise qualité et la mort survient
bientôt au milieu de l'état le + déplorable la
compression peut donc produire des
gangrenes d'un caractère bien différent
suivant les circonstances on committant
elle peut produire les papiers ou les escars
selon qu'elle se crece sur un point du
membre ou qu'elle s'étend à tout le
membre elle peut produire + ou -
promptement la gangrene est d'un
caractère différent dans le 1^{er} cas le
sueu est aguer de la partie il arrivera
la gangrene humide dans le 2^e cas il
surviendra une gangrene sèche -
comme si on avait par expression
procure l'aplusion du sueu.
Il y a différence de degré de contusion
d'organisation de la partie est une action
de la partie jusqua simple echimose
il faut alors veiller leur action empêché -
l'abond de humeurs avec autre cause de
la gangrene c'est la brûlure où le calorique
concentré appliqué sur nos parties, pour un
état opposé un froid excessif ou tout

Diminution très grande pour ne pas dire
absolue du calorique une 3^e cause qui se
rapproche de la 1^{re} est l'action du caustique
sur nos parties qu'on emploie souvent en
Médecine comme moyen de thérapeutique
ainsi on peut à volonté produire la mort de
l'été ou l'été partie desorganiser. On l'usage
produit une dérivation pour cela on se sert
en chirurgie de calorique concentré et de
caustique. Dans le 1^{er} cas ce sont des
corps en combustion ou fortement échauffés
tels que le fer bouillant &c. Dans le 2^e cas
des onguents chimiques qui peuvent être ou
solides ou liquides de la plus caustique
par leurs propriétés chimiques et leur
tendance à d'autres combinaisons. Tous
les acides minéraux les sels à base
métallique quelques alkalis comme le
potasse caustique ont la propriété de
desorganiser les parties vivantes
est réactifs. Doivent leur propriété à l'acidité
qu'ils montrent pour l'eau et agissent
par tout avec la même activité les
acides minéraux agissent que superficiellement
leur action ne peut s'étendre à travers
l'escarre qu'ils forment il y a cependant une
exception à cela les acides minéraux appliqués
appliqués sur les os les pénètrent à

a raison du peu de contractilité de
fibres osseuses qui ne peuvent servir par
pour opposer a leur introduction on ne doit
donc point employer de substances dans le
traitement des caries et de microbes comme on
le fait de sel a base alcoolique a la
potasse caustique agissent profondément
on doit les employer avec précaution pour
détruire les chairs fongueuses et les
ulcères.

Il est rare que l'homme soit exposé par
accident à l'action des agents chimiques
de manière à ce qu'ils puissent produire une
gangrene étendue ordinairement est par
une action volontaire qu'il y est soumis
quelque fois nous pouvons dans q. q.
circonstances y être exposé accidentel-
le. On peut avoir lieu par l'introduction
de q. q. poison dans les voies digestives, le
plus part des poisons agissent sur l'estomac
en opérant une désorganisation de son
tissu les uns agissent immédiatement et au
moment même de leur application détrui-
sent les parties sur lesquelles ils sont
appliqués sur la bouche l'oesophage
en désorganisant le tissu de ces organes
tel sont acides concentrés leau forte de
la gangrene alors arrive instantanément

6) d'autre agissent + s'antement. La gangrene
alors est précédé de l'auflancation - est
à qu'on désigne en médecine légale
pour en faire la distinction les noms de
poisons coarsifs & poisons irritans.

Il n'y a guère que les caustiques liquides
qui appliqués à la peau puissent produire
accidntellement la gangrene étant appliqués
à la peau car les caustiques solides
n'agissent que par un long séjour après
un certain temps car cela ne peut arriver
indolontairement comme on le voit dans
la pierre à cauter pour produire un
escar

mais il est en de caustiques liquides comme
de liquides Brouillans jamais (ou du moins
rarement) la brûlure n'est très étendue a-
moins que la partie ne soit plongée dans
le liquide mais cela arrive rarement
la brûlure de même que par les liquides
Brouillans est superficielle & borne presque
toujours à la peau - comme la aruse
accidnt pendant long-temps pour les
liquides les effets en sont - intenses la

7
Douceur a aussi un caractere particuliere dans les
brulures par un corps incendiescent la douleur
est portee subitement au + haut degre -
au contraire dans celle produite par le
liquide il semble que la partie ressent de
longs engourdissement mais pour le caustique
solide la brulure pourrait etre + etendue
la potasse est un de caustiques dont on
se sert le + souvent elle a la propriete
d'absorber l'humidite de l'air et de
se dissoudre avec elle, aussi quand on la
laisse a l'air libre elle se fond, quand on
l'applique sur la peau elle absorbe la trans-
piration cutanee se convertit en l'espece
de pate molle qui devient ensuite tout a
fait liquide, est pour cela qu'il faut avoir
soin de la cerner par un emplatre fenetre
sans quoi elle collerait et agirait sur des
parties qui n'ont point ete enflamees en faisant
une plaie tres etendue elle commence a agir
sur la peau environ au bout de 2 heures
la douleur se fait sentir et va alors en
augmentant jusqua 4 heures apres son
application environ quand la partie est
saine la douleur est supportable et peu
considerable mais quand on l'applique sur
le centre d'une partie enflamee la douleur est
enfin atroce on la laisse ordinairement de

8
12. a 24 heures, quand on l'ôte l'appareil
lescau a une couleur noire tachée mêlée
de points blancs de toubent ordinairement
autout de 17 à 20 jours chez les sujets
vigoureux et + tard chez ceux qui sont +
faibles elle est douce au toucher polie les
chimistes ont trouvé que c'est un savon
à base ammoniacale + de la patate neu
douce. idée de la formation de la patate
gangrene soit produite volontairement soit
accidentellement et de la marche quelle
fait dans son développement.

+
Il nous reste à considérer la gangrene produite
par la brûlure, par le froid ou par la congella-
tion en feu par l'interception du cours du
sang dans 1 partie.

La brûlure considérée comme cause de gangrene
doit nous occuper en particulier nous reviendrons
ailleurs la brûlure en général nous dirons
seulement ici que la brûlure est considérée sous
3 états selon les différents degrés d'intensité quelle
présente On compte ainsi 3 causes de brûlure
1^o le liquide bouillant. 2^e corps en combustion
3^o corps imprégné de chaleur (fer rouge) le 1^{er}
degré est cet état où le calorique ou le calorique
agissant sur la peau produit irritation
l'inflammation lui donne une espèce semblable

a celui qu'on dans le 2^e degré la brûlure est portée + l'ou elle
attaque l'épiderme il est soulé, boursoufflé & se lève
de dessus la partie qu'elle recouvre le 3^e degré
est la désorganisation + ou - profonde de la
partie non seulement la peau mais encore
les muscles & sont attaqués le 2^e degré
de la brûlure ne peut exister sans le 1^{er}
et le 3^e sans les deux autres.

La brûlure ou 3^e degré produit la gangrène
ou immédiatement en détruisant spontanément
les parties sur lesquelles elle agit ou
immédiatement en causant l'inflammation
demeurée a la suite de laquelle arrive
la gangrène mais lorsqu'il n'y a pas une
désorganisation spontanée il est rare que
l'inflammation produite par la brûlure
produise la gangrène a - qu'il n'y ait
une disposition particulière du sujet qui
favorise cette terminaison dans la
gangrène par torrefaction elle est celle
il y a une évaporation de sueur dans ces
brûlures très intenses les malades
meurent en 2 ou 3 jours a n'est par ni par
la gangrène mais par l'excès de la douleur
qui porte un caractère particulier. M^r Noüy
dit avoir observé que dans l'ouverture de

0
cerveau d'enfant mort de brûlure &
avait trouvé une grande quantité de sérosité
épanchée sur le cerveau.

L'action est toujours en proportion à
l'étendue du corps brûlant à son degré de
concentration du calorique à la sensibilité
de la partie. Les mélanges en fusion portent
+ de calorique que les bouillantes
celles-ci + que l'eau en ébullition la
plais résultant d'une brûlure est toujours
ni = p. c. q. la chaleur n'est pas la même
partout il faut bien distinguer pour le
traitement la gangrène produite spontanément
de celle qui est la suite d'une inflammation
excessive dans le dernier cas on doit
combattre la gangrène par les
antiphlogistiques les plus puissans dans
le 1^{er} cas en débilitant le sujet dans
il faut au contraire soutenir & renforcer
dans les brûlures par les liquides il n'est
pas rare de voir la peau désorganisée
tantôt dans la moelle seulement de son
épaisseur tantôt dans la totalité selon le
degré d'énergie du liquide qui la produit
Ce n'est qu'au bout de 10 jours que la
nature met au développement de
l'inflammation que la peau se détache
de la vient l'opinion vulgaire que la

brulure augmente d'intensité jus qu'au bout
de 10 jours non serron en parlant de la
brulure combien cette opinion est fautive.
L'action du calorique sur nos parties ne se
boute par toujours à la peau quand son
intensité est très grande et prolongée pendant
quelque temps comme dans les incendies
quand le feu prend aux vêtements des femmes
surtout car les hommes étant vêtus de
drap le feu ne peut y prendre ou bien
quand les membres est plongé dans le feu
les accidens sont très graves le malade
meurt q. q. fois 24 ou 36 heures après
l'accident quand le membre reste long-temps
exposé à un calorique intense il est recuit
réduit en charbon tonifié comme la viande
qu'on ferait rotir le membre resté et d'osar
- gainé, alors il faut pratiquer de suite
l'amputation.

Le chirurgien suivant les circonstances le
degré de brulure doit s'attacher à prévenir
les accidens à les combattre quand ils sont
arrivés il doit abandonner la fusc de la
maladie à la nature ou bien venir à
son secours il doit employer la saignée
les antiphlogistiques les baissans de sang
- autes pour empêcher les accidens ou les
combattre ou couvrir la plaie de cataplas-
- mes cooliens pour dissiper la douleur

Inflammation et favoriser la chute de
 l'escarce est à la tête du 1^{er} appareil d'opé-
 ration l'inflammation a été combattue que
 les accidens ont diminué qu'il conviend-
 de décider si l'on peut conserver le membre ou
 s'il faut l'amputer est à la sagacité
 du chirurgien et s'aisir du 1^{er} coup d'oeil
 prognostic de la maladie de détails plus
 circonstanciés appartiendrait à l'histoire
 de la brûlure en général.

D'Especk. Si l'axe ne peut subsister dans
 le calorique il est nécessaire à l'existence
 de la fonction il faut qu'il soit dans de
 conditions convenables quand il est
 excessif il rompt la force de résistance
 vitale altère le système de nos liquides
 et produit des accidens qui répondent à
 son intensité.

Sur la compression comme
 cause de la gangrene (inter de Boyer)

Nous avons vu que la compression
 lente et graduelle sur nos parties amène
 l'escarce cela arrive ordinairement sur les
 parties saillantes les os très prononcés
 ainsi dans les maladies longues toutes
 les parties saillantes du corps peuvent

être la suite de gangrène elle est encore 13
hâtée quand la maladie a par elle même
tendance à la gangrène. Il faut bien
distinguer celle qui vient seulement par
compression de celle qui est déterminée par
l'écoulement putride nous parlerons de la
gangrène produite par cause intérieure
on peut dire que la gangrène est produite
par la seule compression quand elle arrive
chez des sujets qui ne sont point affectés
de maladie interne mais qui ont souffert
pression très-long-temps prolongée. comme
on en a beaucoup d'exemples soit à la suite
d'un bandage porté pendant très-long-temps
dans les points ou portent les atèles ac-
tation après des fractures pour les quelles
le malade a resté très-long-temps la
jambe étendue et dans la même position
au point qu'on a vu quelque fois
après chute de les caries le coléramum de même
les gangrènes du cerveau ne sont point
mortelles. Lambert chirurgien de marseille
en rapporte un exemple. Commentaire sur
les ulcérations un malade étant ivre
arracha son bandage et une partie du
cerveau gangrené se plaça sur une

14) bon bon caractère il s'y devo de bourgeois
charmer et il guérit.

M^r Boyer a vu un jeune homme qui
qu'un charlatan avait voulu redresser, il
lui avait mis des atèles qui pressaient
fortement la partie interne de l'articula-
tion du genou, quand on leva l'appareil
on trouva un large escarce gangreneux -
1 jeune femme pour la paralysie du
mouvement des muscles postérieurs du
cou, laissa tomber la tête sur son
poitrine son menton portait sur le
sternum la rougeur survint et malgré
tout les soins de M^r Boyer la gangrène
se déclara la malade mourut.

un perruquier étant à l'hospita de
Bicetre pour une affection de la vessie
comme il était resté long-temps couché
sur le dos il survint 1 rougeur -
considérable à la région du sacrum
il fut obligé de coucher de l'autre sur
un côté 1 pareille rougeur se manifesta
vers le grand trochanter il se tourna de
l'autre côté la même chose survint enfin
il était obligé de se tenir sur son sein

en s'appuyant sur ses coudes et déjà il commençait à se mouvoir, point inflammatoire lorsque ce malheureux mourut. Un étudiant en médecine forcé de rester couché sur le côté pour une maladie de cause externe eut à la partie antérieure de l'oreille ou antélix une rougeur considérable, à la suite de laquelle il serait infailliblement survenu un escarce si la mort ne l'eût eulésé, il est probable que la gangrene aurait détruite toute l'oreille.

18

gangrene
par le froid

Notes de Despecher Le calorique est un des puissans excitans qui nous entourent quoique notre température soit toujours à peu près la même le calorique n'est pas immoviblement fixé à nos organes après avoir fait partie de notre existence il devient excrément sextrale et ne peut plus servir à l'entretien de la vie. Si nous vivons dans un milieu trop froid la perte de calorique peut être réparée assez promptement les propriétés vitales manquent d'excitant diminuent et cessent.

La gangrene produite par le froid ou la privation de la chaleur vient le plus souvent

(16)
de l'état de l'atmosphère à 1 température
extrêmement basse beaucoup au dessous de
zéro à la quelle notre corps ou 1 partie de
notre corps est exposée n'étant pas suffisam-
ment garantie la neige, la glace & sub-
ne produisent guère d'effets dangereux d'es-
sai que nous ne nous occuperons que
de la mort d'une partie par congélation
la gangrène peut venir de 2 manières
1^o le froid étant excessif la congélation
peut se faire d'une manière subite et
profonde alors la gangrène est spontanée
d'autre fois la gangrène est lente à
se former le froid - n'est - porté - loin
son action il est à remarquer que la 1^o
part des individus qui ont été atteints
de gangrène par 1 froid prolongé y étaient
déjà disposés par une mauvaise nourri-
ture, 1 faiblesse générale provenant d'un
âge avancé ou d'une longue maladie
(Lancette dans son ouvrage) extrêmement
curieux sur la gangrène rapporte 1
grand nombre de faits qui viennent à
l'appui de ce que nous disons et autorisent
cette distinction de gangrène spontanée à

La suite du froid et de gangrène — (19
cause citée.)

Il parle d'une femme dont l'ovarice et la
parcinome) était poussée au point que dans
l'hiver très rigoureux elle obstina à ne
point de faire de feu et pour cela elle
restait au lit le froid fut poussé si loin
que la gangrène se manifesta à 1 pied et
qu'elle le perdit l'année suivante n'étant pas
guérie de sa lèpre elle fut prise de gan-
grène à l'autre pied qu'elle perdit = leuven
L'annote attribue avec raison ces deux
gangrènes à la débilité de cette femme
par la mauvaise nourriture qu'elle prendait
il en est certains états qui paraissent
favoriser la gangrène, tels sont le Sommeil
l'ivresse ou remarque que les individus
dans ces 2 états sont plus exposés aux
effets du froid que ceux qui sont dans
l'état d'activité et n'ont pas pris de boissons
spiritueuses outre même car on sait que si
1 liqueur spiritueuse prise en petite quantité
échauffe active la circulation tandis qu'on
contraire l'ivresse débilité et porte au Sommeil
en agissant sur les ptimes nerfs dans le

Sommeil de circulation est - vive l'activité est ralentie le froid agit bien plus facilement il a d'autant + de prise que les propriétés vitales sont moins énergiques ainsi dans l'histoire des voyageurs est exprimé dans les pays froids on voit que tous ceux qui ont cédé au sommeil ont été saisis par le froid et gelés tandis que ceux qui se sont dormis du mouvement ont résisté à l'invasion du sommeil ont supporté très bien le froid il est probable que beaucoup de personnes pris par le froid n'auraient pas succombé si ne étaient laissés aller au sommeil.

Lors que la congélation s'empare d'une partie du corps seulement est toujours des extrémités des membres les + éloignés du centre chez les quelle la circulation est - abondante - active c'est toujours par elle quelle commence à se faire sentir les 1^{ers} effets du froid sont de diminuer la circulation.

La structure castagnieuse des lèvres du nez et des oreilles contribue pour q. q. chose à la manifestation de la gangrene le froid agit d'abord sur les solides les vaisseaux et les nerfs vont d'abord sur les

liquides en les congelant ce n'est que (19)
quand la gangrène est manifeste que les
fluides peuvent se geler.

on reconnaît qu'une partie va se geler lors-
qu'elle devient pâle blanche.

les partisans de Braune prétendent que le
froid est toujours débilitant qu'il agit toujours
en diminuant l'activité des organes ils expli-
quent les effets de la loivette augmentés
par un froid léger par la réaction qui se
fait dans la partie primitivement débilitée
mais il est probable (selon Mr Roy) que le
froid léger est réellement tonique par lui-même
mais quand il est porté trop loin la
circulation s'arrête de + en + le système
nerveux s'engourdit la base du sang arrive
dans les veines et dans les artères tout le
fluide s'arrêtent, ils ont du mal à circuler est très
lentement quand le froid est porté + loin les
fluides sont réellement arrêtés et bientôt
condensés alors la gangrène spontanée
existe il est impossible à la 1^{re} inspection
d'une partie engourdie de prononcer si elle
est morte ou si elle est dans 1 espèce d'asphyxie
locale il est possible de la rappeler à la vie
q. q. fois on trouve des personnes couchées

20
Dans la neige le corps roide dans l'état de mort apparente ou réelle on ne peut souvent savoir s'il s'agit de long-temps et est possible de les rappeler à la vie dans l'incertitude il faut dans tous les cas prodigieusement tous les secours de l'art.

On croit qu'on doit s'occuper à réchauffer les membres en les exposant à la chaleur ici l'expérience et la pratique qui paraissent en opposition avec la physiologie apprennent le contraire. Supposons que les fluides ont éprouvé un certain degré de congélation à qui est vrai le + souvent si on les expose à une chaleur modérée pour qu'ils repassent à l'état fluide ont éprouvé la circulation n'ayant pas encore repris son cours ne peut reprendre les fluides sont stagnans et se décomposent spontanément et leurs parties se dissolvent il ne peuvent plus jouir de propriétés de la vie le membre est spontanément frappé de gangrène. Les vaisseaux n'ayant pas repris leur activité si on applique la chaleur les

les liquides se dilatent & remplissent les (21)
vaisseaux & les extravaient la gangrene
à lieu - c'est ainsi que des vaisseaux se rompent
en les approchant du feu - quand l'eau est
gelée.

Il est des règles de se représenter aux impressions
de la chaleur les membres congelés
qu'avec la \times grande précaution. et par des
gradations insensibles on met la partie
non dans un bain chaud mais dans
un très froid est toujours + chaud que la
température de la neige et de la glace il
passe donc d'une température très basse
dans 1 millier + élève au bout d'un
quart d'heure on augmente insensiblement
la température du bain en ajoutant 1 certaine
quantité d'eau chaude enfin il faut
mettre 2 ou 3 heures à échauffer le
bain à la température qu'on leur donne
ordinairement. Si la vie n'est pas totalement
étendue il est possible par ce moyen de
se rappeler au lieu que si on exposait
les parties à l'action de la chaleur la
mort arrive infailliblement
On frotte aussi le membre trempé dans
l'eau froide, la neige ou la glace pilée ou

fait ensuite de factione Secher Spiritueuse
enfin on peut les poser à 1 chaleur legere
Mr Delpeche dit que la gangrene par
congelation est toujours humide a cause
de la condensation de la partie.

Mais soit que la gangrene soit due a
1 froid tres intense ou long-temps continue
soit quelle soit due à 1 traitement inconnu
-derée elle rentre toujours dans la classe
des autres gangrenes mais il faut remar-
-quer quelle est le + souvent bornée à des
parties dont on peut abandonner le soin
de la separation à la nature tels que
des doigts des oreilles le nez, les oreilles
quoique cette espèce de gangrenes soit
essentiellement humide elle ne cause
par alors d'accidents assez graves pour
exiger d'amputation il est assez rare de
voir des membres entiers pris de gangrene
mais lorsque cela arrive il faut le
supporter comme pour la gangrene ordinaire
des symptomes qui annoncent le danger
s'assoupissent. le vice de dormir, l'engourdisse-
-ment de la partie la flettrissure et son desse-
-chement la chaleur et la blancheur extreme
Les hommes n'abordant 1 son volume diminuee

Histoire D'un Dragon

Etant en Sloaque on apporte a un Boyer 1
Dragon qu'on avoit trouvé gelé dans la
neige tout son corps étoit roide & la vie
parraissait tout a fait éteinte chez lui il le
fit mettre dans esprit il employa 8 de ses
camarades qui l'avaient amené a le frotter
avec de la neige de toutes leurs forces de
la tête aux pieds ceux ci qui ne comprenaient
rien a tout ce manège voulaient a toute
force le rechauffer et juraient que c'étoient
le moyen de guérir il ne l'étoit pas au bout
d'un 1/4 d'heure les membres devinrent flexibles
les articulations se devinrent il prit
peu de couleur. il fit faire des cataplasmes de sa
froide puis augmenta insensiblement la
chaleur de la main ensuite des frictions de cer
de qu'il put ouvrir la bouche il lui fit avaler
1 verre de vin chaud avec du sucre de fin
au bout de 2 heures 1/2 il étoit revenu à
lui sans éprouver aucun accident il eut
1 transpiration abondante et se porta très
bien par la suite
il nous reste a examiner la gangre par suite
de l'interruption du cours de l'Esprit & de
l'Humid & dans nos parties

24)

Toutes les parties de notre corps reçoivent
 la nourriture et la vie des artères et
 des veines mais principalement des artères
 les veines leur donnent le sentiment et
 le mouvement et aux vaisseaux qu'il s'y
 rendent l'action organique nécessaire
 pour qu'ils acquittent de leurs fonctions
 mais ils ne sont pas indispensables
 à l'entretien de la vie c.à.d. à la réparation
 des organes car dans une partie les
 veines sont coupées ou le principe nerveux
 exercé + son influence ne continue par
 de vive elle conserve sa grandeur la forme
 naturelle il n'en est pas de même de
~~cousses~~ même de l'interruption de
 cour du sang car est lui qui porte la vie
 et la nourriture à toutes les parties du
 corps lorsqu'il n'y abonde + dans une
 quantité suffisante pour l'entretien de la
 vie la gangrène (empare) de la partie mais
 la nature s'agrandit et redoyante n'a pas
 confié le transport de ce fluide exclusivement
 à une artère principale elle a établi un
 ordre de petits vaisseaux qui par leurs
 nombreuses distributions et leurs fréquentes
 anastomoses forment une route nouvelle

et collaterale par la quelle si le cours du sang est interrompu dans les trous principaux il trouve un libre cours et passe en assez grande quantité par cette voie pour entretenir la vie dans les parties ou ces artères principales oblitérées se rendaient ce n'est donc que par la compression ou la ligature du trou principale de l'artere d'un membre à la suite d'une blessure ou d'une opération comme celle de l'aîne visue que la gangrene peut survenir par l'interruption du fluide nourricier qui abreuvent les parties.

Pour que l'interruption du cours du sang dans les artères principales d'un membre donne lieu à la gangrene il faut que cette interruption soit brusque soudaine que la cause qui la produit agit d'une manière instantanée car lorsque la compression est lente graduelle le sang en se dilatant insensiblement peu à peu il prend un autre cours que celui qui l'avait et passe dans celle-ci en si grande quantité il y a compensation et le membre se ressent peu de ce changement il en sera de même si l'interruption est subite les artères collaterales anatomiques nombreuses le sang malgré l'oblitération

Des artères principales grossero en assez grande
 quantité dans la partie pour prévenir la
 gangrène qu'ils ont donc le phénomène
 qui se passent dans un membre dont l'artère
 principale ne donne + passage au sang la
 chaleur diminue au point qu'on y eut
 retenue une température artificielle par
 l'application de sachets de cendres chaudes
 ou de sable or cette chaleur ainsi excité
 peut se imposer au chirurgien mais si le
 membre est abandonné à lui même la
 température diminue sensiblement le froid
 survient le malade éprouve un engourdisse-
 -ment une pesanteur remarquable la
 sensibilité s'éteint insensiblement soit que
 les nerfs soient comprimés par la stase
 du liquide au quelle ne le côté le pouls
 n'est + sensible ou il est très faible ce-
 pendant la gangrène ne survient par
 ce que en effet on ne peut par ce lieu
 de refroidissement du membre la diminu-
 -tion de la sensibilité et de la cessation sa
 pouls dans les battements que la
 gangrène surviendra car on a vu des
 membres dont les artères principales

étaient liés restes pendant 8 jours
dans cet état et à pied le sang finit par
aborder peu à peu dans la partie y ^{ramené} ~~revenu~~ ^{quel}
l'action vitale l'angissante y rappelle la sensibilité
le battement des artères répétées et le membre
est rappelé à la vie.

27
Mais si cet état de privation du sang continue
le membre reste froid la sensibilité n'y est
point revenue il n'y plus de circulation la
gangrene alors est revenue elle survient
bientôt l'épiderme se détache la partie prend
une couleur verdâtre bleuâtre trant sur celle du
cadavre en putrefaction la putrefaction se
compare de la gangrene se développe la partie
exhale une odeur infecte enfin elle se sépare
des parties vivantes cette gangrene qui est le
résultat de la ligation des artères principales
n'est pas toujours la même si l'interruption
du sang n'a lieu que dans une partie
superficielle d'un membre la gangrene sera
sans forme d'escar, mais si c'est l'artère
principale ou principale qui est obliérée la gangrene
l'escar peut occuper qu'une seule partie
elle s'étend par exemple de la partie
supérieure du pied à quel ne faut pas confon-
dre avec elle qui est le résultat de la compression

28) d'un fongus 9.9. l. ou autre a la malade
externe ou bien a ou + vers artère s'op
gangrène ou enfin le pied tout entier s'op
pis de gangrène la gambe même peut être
attaquée toute entière et la gangrène peut
aller + ou - loin de l'endroit ou est posé
la ligature rarement ou la doit se propager
jusqu'à l'endroit oblitéré + rarement enco
de p. assés la ligature, quand on n'a fait
la ligature de l'artere fémorale on doit
avoir de grandes inquiétudes pour la gan
grène elle arrive très souvent lorsque la
circulation est interrompée dans les artères
principales d'un membre on doit employer
tous les moyens capables de prévenir
la gangrène user de toutes les précautions
convenables car on sait qu'on doit la
craindre dans ce cas.

On évitera donc toute compression des
artères collatérales dans l'application de
appareils consécutifs et des bandages
car on a vu que trop souvent des suites
funestes de la méthode irrégulière de

de beaucoup de chirurgiens: qui dans la 29
blesure d'une artère principale d'un membre
ou après un anévrisme touppouaient le plaie
de bourdonnets durs elevaient une pyramide
de L'ampour qu'ils contenaient par des
compresses serrées parce qu'ils craignaient
une hémorragie ayant negligé d'appliquer
4 ou 5 ligatures en vain on leur prédit
que la gangrene en doit être ^{la suite} inévitable ils
poussent la gangrene survient au bout de 3
jours au 4^e lepidurus se détache la tumeur
verte livide annonce la pourriture survient
et le malade succombe.

On remplira donc au contraire le plaie de
charpie molle après avoir appliqué 4 ou 5
ligatures sur les trous anévrismatiques
et tie les artères collaterales qui pourraient
donner lieu à une hémorragie on placera
pousser des bourdonnets de ouillets que l'on
contendra par des compresses cir cutaires
et des bougies plus et dans l'intention
de contenir l'appareil que d'arrêter ^{un} hémorragie
qui surviendrait ensuite on donnera au malade
une position favorable pour prévenir la stase
du sang veineux et de la lymphe c. a. d. qu'on
le tiendra élevé au dessus le membre restera
patent a divers état qui prédit plus à la gangrene

ou entiendo dans le membre une chaleur
= qui raréfie les liquides a dent + paranta
-ge d'augmenter l'action des solides favorise
aussi la circulation et prévient la gangrene
autrefois on employoit a cet usage des com-
presses trempées dans q. q. liquides résolutifs
comme l'eau de vie camphrée ou ammoniacale
mais elles avoient l'inconvénient de se refroidir
-dir promptement et d'opérer une sorte
d'attribution sur les parties ou leur substituer
aujourd'hui les sachets de cendres ou de
sable fin que l'on expose sur une plaque
chaude de métal et que l'on applique sur
le membre, ils y entretiennent une chaleur
même supérieure a celle du reste du corps
et favorisent la circulation mais il ne faut
pas non + les échauffer par trop parce que
les propriétés vitales étant renfermées dans
cette partie ne pourroient par opposé
a l'introduction d'une trop grande quantité
de Calorique comme les parties saines
qui exposées l. g. température résistent a
l'action de Calorique mais malgré ce
moyen la gangrene survient souvent si
elle s'est bornée a la peau et au tissu cellulaire
certaine gangrene ne se voit bientôt bornée par
un cercle inflammatoire et sa nature

en operera la réparation que l'on favorise 31
par l'application d'emplâtre. D'ougarit de la
mes ou tout autre analogue pour entretenir une
legere supuration qui en favorise la chute.
Si la gangrene s'est emparée d'un orteil ou
d'un doigt on peut abandonner la réparation
à la nature mais si comme après la
ligature de l'artere fémorale ou propriolet la
jambe est gangrenée & jus qu'au genou il
faudra attendre que la nature ait posé
la réparation entre le vif et le mort alors
suivant l'état du malade le chirurgien se
decide à faire l'amputation ou il abandonne
la malade à la nature l'experience a appris
que l'opération n'est jamais suivie de succès
quand on la pratique de trop bonne heure
le malade qui qu'on veut - il est vrai perit aussi bien
mais il vaut mieux pratiquer l'opération
attendre avant de
l'opération que la démonstration soit
bien réussie
C'est une chose bien remarquable que les
amputations pratiquées dans ces circoistances
ne réussissent presque jamais jusqu'à toujours
les malades succumbent soit qu'on opere
avant ou après que la gangrene est bornée
gangrene par cause interne

La gangrène n'est jamais toujours produite
par cause externe le plus souvent elle est
due à une cause interne or on doit
envisager comme telle la gangrène qui
depend de la malignité de la cause qui a
produit l'inflammation celle qui survient
dans le cours d'une fièvre maligne ou
autre celle enfin que l'on appelle gangrène
fèche qui reconait ordinairement pour
cause: l'usage du pain de segle ou des ergots
ou d'autres alimens mal sucs ou comme
inflammation gangreneuse elle dont la
gangrène est une suite inévitable une
erysipelle couvre d'abord la partie qui
d'abord rouge vif passe bientôt au rouge
foncé ou au violet puis au noir bles être
quelques fois enfin la partie est charbonnée
dans le même tems les parties environnantes
passent au violet puis au noir et la mortifi-
cation continue ainsi à faire des progrès
jusqu'à ce que le principe se soit accablé
et consumé dans la partie.

9. 9. fois l'inflammation gangreneuse
présente sous 1 autre aspect les parties
sont gonflées tuméfies extraordinairement
comme dans les fractures comminatives
mais au lieu de conserver son élasticité
la partie infiltrée est livide pateuse
en gorgée le malade ressent dans les membres

un sentiment de pesanteur & d'engour- 33

-dissement il se plaint de grandes dou-
-leurs la chaleur y est diuette et bientôt la
partie prend l'aspect & ou-voit l'épide-
me se détache une odeur infecte. Singulier
qu'on reconnoit facilement l'empare de
la partie gangrenée?

On croit de ces exemples soit que la gangre-
ne se ~~forme~~ dépendit d'une cause de l'exter-
repan due dans l'économie soit qu'un vice
extérieur lui ait donné lieu comme une
piqûre avec un instrument imprégné d'un
poison subtil la gangrene ne met guère
à lora que 24 heures ou 2 ou 3 jours au-
t. se manifeste.

Dans cette inflammation gangreneuse tandis
que ces changements se passent ainsi dans
la partie affectée le pouls est petit misérable
La prostration des forces musculaires est
extrême le malade est pris de frissons froids
le tréquet survient le délire, la mort enfin
termine cette maladie ces Symptômes généraux
sont bien différents de ceux qui annoncent
la gangrene par cause externe le pouls est
fort & fréquent comme dans la fièvre
inflammatoire ici au contraire la débilité est

34

extrême et fait le Symptome et frapper
 les forces sont perdues tout annonce que
 le principe morbifique gangreneux se
 dépose sur la partie qu'il frappe de mort
 et y étend tout a fait le principe de la
 vie mais si la nature victorieuse porte
 ce principe au dehors les forces le
 ramènent l'activité est rendue a toute
 l'économie les artères reprennent leur
 action le pouls devient sensible les
 chœurs froids sont placés à la chaleur
 naturelle la nature pose les limites entre
 le vif et le mort et suscite un inflammation
 utile la séparation des parties mortes
 se fait par les seuls efforts de la nature
 ou l'est lui-même des secours en prati-
 quant l'amputation dans la ligne
 de démarcation cette gangrène est très
 fâcheuse puisqu'elle fait périr la plupart
 des malades ou quelle les prive d'un mem-
 bre entier ou d'une partie d'un membre
 dans le traitement de cette gangrène
 on doit avoir en vue de réunir le

principe vitale languissant presque éteint
et de mettre la machine en état de
séparer les parties mortes de parties encore
vives afin de la purger d'un principe de létargie
aussi dangereux or ces anti-phlogistiques qui ont
tant de succès dans les cas d'inflammation
excessive. Sont pernicieux ici les saignés que
l'on emploie si sagement seraient ici mortelles
parce qu'ils affaibliraient encore les forces
vitales abattues et on a des exemples fréquents
de leur emploi les malades succombent.
on ravivra donc les forces par l'usage
intérieur de toniques de cordons d'un vin
quercus et le kina p. le malade peut en
supporter l'administration à l'extérieur au lieu
de topique circolien relâchant on usera
de ceux qui ont une action tonique stimulante
comme les spiritueux les decoctions de sassafras
ou romatiques qui conservent l'activité
de l'olide mais en général on doit l'abstenir de
tout topique qui fournirait opposer au développement
de la gangrène car on doit au contraire
appliquer à la faveur et quand on a quelques
espoir de sauver le malade dans la gangrène
charbonneuse la pustule maligne on doit
par la déterminer appliquer à la peau quelques
bouteaux de feu le cicatriser pour le

36
causèe actuel ou potentiel par l'application
de l'acide nitrique ou tout autre caustique
Détermines appliqués à le développement
d'une inflammation très intense si vous êtes
assez heureux pour voir le développement
inflammatoire bien conditionné vous pouvez
espérer de sauver la vie au malade l'inflam-
mation accèdera à la formation du cercle
inflammatoire qui doit berner la gangrene
lorsque la gangrene a fiace se berner que
les forces viennent il faut examiner et
convenir d'abandonner la separation de la
partie a la nature ou il faut se
decider a l'amputation si la gangrene
est que superficielle on en abandonnera
le soin a la nature ou applique sur le
cercle inflammatoire du digestif simple on
ne separe lescaes qu'autant quelle se
detache ou pourroit autrement interesser
le vivant mais a chaque fausement
on coupe avec des ciseaux les lambeaux
qui se separent on fend l'escare dans son
milieu pour donner issue a l'humeur qui
est retenue sous cette croûte mais on ne
doit jamais lâcher que la suppuration
ne favorise la chute p. c. q. l'on exposerait

à l'air. On partira dans les quelle l'action 37
organique est bien faible si le membre est tout
entier gangrené ou si on se décide à l'amputation
mais si la faiblesse du malade s'y oppose
on amputera dans les parties mortes le
plus possible la réparation de l'escarre
ou enveloppe ce qu'il en reste de substances
aromatiques ou l'arrose de ambesume pour
ainsi dire la partie morte qui se dessèche
ou débarrasse aussi le malade d'un odor
infecte ou évite les douleurs qui pourroient
arriver on a soin de lever les parties les plus
superficielles qui se détachent l'escarre tombe en
sans la plaie comme une plaie simple d'est
une portion d'os découverte quoi qu'il soit nécrosé
ou a beau donner la chute à la nature la
réparation s'opère au bout de 8 à 10 jours
qq. fois un an ou peu d'opère par la
resection p. c. q. ou risquerait de léses les parties
voisines et de rompre la cicatrice d'ailleurs
on ne s'ait par jusqu'où s'étend la mortification
au lieu qu'après que la nature en aura opéré
la solution toute la cicatrice se forme et la
maladie est guérie

Nous avons vu la gangrène sèche par suite d'une cause maligne ou délétère & comparée d'une partie. Ses symptômes son traitement mais nous ne comprenons par où la gangrène ni le charbon ni la pustule maligne ni la pourriture d'hôpital ces objets seroient traités à part.

nous avons vu qu'au la gangrène produite par la malignité de la cause de l'inflammation la nature bûtant contre la maladie fait des efforts pour pousser au dehors le principe délétère introduit dans l'économie triomphante quelque fois le dépose sur une partie et sacrifie un membre pour la conservation de tout autre fois la nature impuissante faisant des efforts superflus et le principe délétère se déposant en partie sur un membre en partie à l'intérieur faisant succomber le malade nous avons vu la gangrène pour cause de malignité se manifester q. q. fois par un erysipelle & d'autres fois par un gonflement général lempatement l'infaturation et dans l'un et l'autre cas le symptôme le + frappant consiste dans une faiblesse très grande qu'on doit s'efforcer de combattre en soutenant les forces du malade.

La gangrène par cause interne peut (39)
arriver d'une autre manière, sans être
due proprement à une cause morbifique et
d'être le principe d'une maladie pressant
de cause interne peut se déposer sur une partie
et la gangrène, c'est donc une gangrène
par cause interne. Si la gangrène qui
survient alors juge les maladies et les
symptômes disparaissent après son appa-
rition c'est à lors l'termination critique
de la maladie c'est une crise heureuse.
Suscitée par la nature ou a vu en
effet des maladies très graves se
terminer au moment où la gangrène se
déposait sur un membre dans des fièvres
putrides inflammatoires par ex. La gangrène
alors est critique et d'un heureux augure.
mais quand le cours de la maladie
n'est pas changé que les symptômes ne
disparaissent pas qu'il ne survient pas un
nouveaux dans l'état du malade la gangrène
n'est que symptomatique alors elle est nuisible

et ajoute une maladie nouvelle a un
autre

en gñeral les terminaisons critiques de
maladies ont une grand tendance a se
manifester a la tete il semble que ce soit
vers cette partie que se dirige de preference
le principe des maladies externes
les glandes du cou, & s'engorgent les
hemorragies nasales & mais il est rare
de voir la gangrene survenir aux
parties superieures mais si existe d
dans l'organe me etait de faiblesse et
une disposition a quelque maladie ou
une affection deja etablie cest la que
se depose ordinairement le principe de
la maladie.

on a remarque que chez les personnes qui
avaient ete attaquies de fièvre malique
et qui avaient eu en meme temps ou un
gonorrhoe ou des chancres, etait toujours
vers cette partie que la maladie etait
deposee que la gangrene etait survenue
de la verge un sieur avocat avait gagne

en venant a Paris une gonorrhée 31

Comme elle étoit prête a se terminer il fut
pris d'une fièvre putride (entre a la charité)
Dans le cours de la maladie le proscut
et le gland furent pris d'une inflammation
gangreneuse qui détruisit une partie de
la verge la nature bonne a elle même la
ganguent et se para le mort du vil comme
la plaie étoit bien régulière on n'eut besoin
pour la cicatrisation que de secondes la
nature

un deuxième malade se trouva dans le
même cas il avoit des chancres a la verge
lorsqu'une fièvre putride se manifesta au
bout de qq. jours la gangrène s'empara
de la verge fit des progrès rapides et bientôt
trois lois une grande partie de la verge fut
rongée le canal de l'urètre restoit au centre
1 peu + saillant la plaie étoit très irrégulière
d'une teinte blanche extrême toutes ces raisons dé-
terminerent a en faire l'amputation la plaie
fut alors simple et guérit a 3^e malade
qu'a vu M^r Boyer fut + heureux que
les 2 autres il avoit une gonorrhée fut pris

(12)
de même de fièvre putride mais il en fut
quitté pour le prépuce et la surface du gland
On fit dans un mémoire de la Société de
-diouboarg qu'on vit chez une particulière le gland
détruit par la gangrène lorsque les chairs furent
tombées et que le prépuce se détacha petit à
petit il sortit du milieu de la plaie un
petit point saillant qui augmenta peu
à peu de volume et quand le prépuce fut
tout à fait tombé on trouva le gland tout
à fait rigide.

Mais il est prouvé aujourd'hui que ces
régénérations sont impossibles sans
doute la tuméfaction énorme de glandes
du prépuce qui aura pu en imposer et
faire croire que la gangrène avait détruit
tout le gland tandis qu'elle n'avait attaqué
que le pourtour.

Il existait deux ans entre parties de corps
un point d'irritation quelconque la gangrène
se porterait de même une personne avait
un cautère au bras il fut atteint d'une fièvre
putride la gangrène se porta elle-même -

manifeste d'abord tout au tour de 43
bords du Caetero puis s'étendit en disant

geant. Dans une grande étendue la desorga-
nisation fut incurable la maladie fut difficile
à guérir quand la nature ne trouve point
d'endroit pour déposer le principe de la maladie
la gangrène survient dans les endroits où
il se exerce une grande compression ou une compres-
sion lente et prolongée. On air il ne faut pas
confondre avec les escarres qui surviennent
par la compression seule et ne sont dus
qu'à une cause externe.

La rapidité avec laquelle elle se manifeste
la marche de ses symptômes et la grandeur
de l'escarre annoncent assez le principe de la
maladie qui s'est portée sur la partie.
L'escarre observe que quand la gangrène
survient par malpropreté l'escarre est large
superficielle et forme seulement et survient
tard.

Chez un Malade qui reste long-temps au
lit les escarres gangr. se manifeste dans les parties
qui soutiennent le poids du corps ou la

(44)
Compressives en est la cause déterminante
de la gang^e elle survient lentement le peu
s'est étendue que dans une petite étendue ou
bien que dans celle qui tend à la mali-
ginité de cause elle se développe promptement
et envahit une grande surface autrefois
on l'attribuait à la malpropreté l'annote
pensait ainsi comme je veux de dire + ha
haut.) Mais cela est évidemment faux car
on voit tous les jours des malades tomber
aussi proprement qu'il soit possible être
frappés des causes les étendues.

Dans cette gangrène on doit seconder
l'effort que fait la nature p^r transporter
la cause de la maladie sur les parties
externes elle a besoin d'un degré de force
considérable ainsi il faut employer le
camphre et kinoe tous les abscesses
capables de rendre au malade les forces
tous les topiques sont à peu près
indifférents car lorsque les propriétés
vitales sont assez énergiques chez un
malade ou que les médicaments

intérieure & conduit bien les efforts (49)
de que la nature la gangrene survenue
constamment

Quand c'est la gangrene qui fait perdre
à la partie necrosée met quelque fois un
an à se separer c'est une operation très longue
Néanmoins quand le cercle inflammatoire est bien
tracé on coupe les lambeaux qui se détachent
pour éviter de grands inconveniens il en
faut cependant pas trop se presser et dis-
quer les escars avant qu'ils tombent
ou pourroit attaquer les chairs vives à
qui auroit des suites facheuses d'ailleurs
on exposerait au contact de l'air des parties
semblables irritables quelque fois l'escar
est détaché au milieu et tient à la circon-
ference on pratique une incision dans son
centre pour donner issue au plus retenu
mais il faut se garder de la separer
entièrement on attend que la nature vienne
au secours du malade on prévient la chute
de l'escar si la gangrene occupe un mem-
bre entier il faut couper dans les parties mortes

prendre les précautions que nous avons
délés pour éviter aux malades les
desagréments d'une odeur infecte &c
arroser le membre desséché de théobrutine d'une
dissolution très saturée de curiote par
oxygène de mercure qui a la propriété de
conservet la partie et d'empêcher la
putréfaction ou la course de l'humidité
chargé de styrag.

Gangrène sèche.

gangrène
sèche
cette gangrène
est à l'usage
de la gangrène
sèche par un
membre

à gangrène sèche nommée aussi gangrène
sèche p. q. la partie diminue de volume
se dessèche elle a reçu le nom de sèche
par laquelle survient le plus souvent aux
vieillards elle est rarement l'effet d'une cause
interne qui intercepte le cours du sang
dans une partie comme nous avons vu
quelle arrivait q. fois même avec un
gonflement un ambrat. & cependant
il pourrait arriver qu'une compression trop
forte exercée sur le membre par un bandage
très serré appliqué p. ex. p. l'os Contain &
fracture occasionnant la gangrène accompagnée

217

D'une diminution notable de la partie et
de dessèchement.

Un jeune homme à la Campagne recut d. la jambe
le coup de fusil, vous arrêtez le saignement & le chirurgien
qu'on de l'endroit applique 1 bande q. énormément
fermé la gang. survint à la jambe, elle prit 1 couleur
noire devant Cordace se réduisit à très petit
volume. on pouvait couper les chairs par
tranche avec le bistouri, elle exhala 1
odeur infecte comme ^{la gang.} ~~gang.~~ et ait très faible ou
de l'artère la le jour ou fit la réssection de
Fibia très près de l'articulation on attend
que la gang. soit guérie, la gang. étoit
fort loin de ruyage en fin elle se borna et on
fit l'amputation de la Cuisse et tout le bouillon
se guérit.

Quoique la gang. s'est de l'ancienne prinçip^l aux
vieillard. ce seroit tenant de croire quelle est
le suite de la déréjité et que les sueurs
vieier ne sont pas assez abondant pour nourrir
les parties les + éloignées comme les os et
quelle attaque le + souvent mais cette gang.
survient à des vieillards qui ne sont rien

18
que d'érection qui sont auent vaine forte et
bien portand. Doit le pouer est plein et vigou
reux tandis qu'elle n'arrive par ad' autre
epi' soit tout a fait d'érection scible et
lauguisant, elle est évidemment due à
Cause morbifique inconnue dans son
essence qu'on la connait comme on
voudra principe acide, acide, acide
Corrosif. & qu'on porte de voir qu'on
lui donne dans les différents auteurs
qu'on elle s'échappe a nos sens et qu'il
est par conséquent impossible de la détruire, mais
il ne s'en suit pas de ce que l'analyse peut
l'analyser, quelle n'existe pas d'elle tout
d'autre matière telle que le Calorique
Électrique & dont l'existence est inco
testable et n'est cependant prouvé
que par les effets qu'elle produit
Le principe d'électricité est le trans-
~~mission~~ par toutes les parties du corps
mais il se fixe principalement sur le cerveau
que la vieillesse favorise le développement
de cette espèce de ganglions. C'est ce qui a été

prouvé par l'expérience, mais elle n'est
seule ne pourrait la produire et faut
qu'il s'y joigne la Cause interne.
Elle arrive principalement aux personnes qui ont
même une vie crapuleuse qui se sont abandonnés
à la débauche, aux excès du vin et des femmes,
quoiqu'on la voie arriver aux personnes qui
ont même la vie la plus sage et la plus exemplaire
et quelle n'attaque pas toujours ceux qui ont
été la plus débauchés, quand le pouls se
soutient qu'il Course vers la fosse et se fréquente
Le progrès de la gangrène tout extrêmement
lent. la maladie dure 9.9. fois l'au. mais
le plus souvent elle est accompagnée d'une grande
faiblesse d'un état de langueur et de prostration
générale du force très considérable le
pouls est petit et misérable cela vient du
Principe d'ictère qui se fixe en partie dans
l'osnoine animale. La nature n'estant
pas assez forte pour le repousser énergi-
quement au dehors et jusque toujours le
malade succombe.
On ne connaît pas encore de remède.

50) Spécifique qui guise & termine la
Nostre de ce principe morbifique le Rhum
qu'on regardait comme le spécifique de
cette affection comme il est de
fièvre intermittente à savoir être donné
infructueusement à de grands doses sans
effet. L'expérience a prouvé qu'il n'agissait
que comme les autres bouques & en abouir
les forces du malade et admettre de cette
maladie on en a tiré de grands avanta-
ges

Le régime doit être ana leptique et nour-
-sant malgré et moyennant la gangrene
continue les progrès et la mort arrive
au bout de q. q. jours ou à q. q. semaines
de l'avantage d'une diète particulière et de
régime propre à changer la disposition de
force

La pyrexie est un malade qui depuis
long-temps portait une gangrene sèche
menaçait son jour & on ne parvenait
à arrêter le progrès de la maladie voyant
que tout les remèdes qu'on avait employés

jusqu'alar avaiant été en fruit tuncy l'ayrny
 le suit pour tout regimé ala seule diète lacté
 et il en tira si q. avantage que la maladie
 prit sensiblement une face nouvelle il
 fut de mieux en mieux tout le jour et
 enfin il guérit par ce seul Secours mais
 il est très probable que ce traitement seroit
 nuisible de bien nuisible de ce cas plus
 quil ne seroit utile et il est sans doute que
 très peu de circonstances on ou puisse
 esperer de ce tres q. q. avantage,
 quelque fois le principe de la maladie est
 dans les aliments dont on se nourrit ou la
 feu de virus et epidemique dans certaines
 provinces ou l'on se nourrisoit de segle
 ergote dans de années plusieurs quand
 il y a disette et que les habitants des
 Campagnes sont obligés de manger leur
 bled immédiatement apres la récolte telle se sont
 les causes qui ont donné lieu a la
 gangrene de logue dans le pays d'Orléans
 dans une année plusieurs ou les pauvres
 habitants se sont nourris de bled nouveau

(2)
elle a fait de grands ravages attaquant
exclusivement les orteils tantôt avec ^{peu} de
douleurs intolérables d'autres fois sans la
moindre douleur on cite plusieurs ex. pl.
Des personnes qui ont vu tomber leurs
orteils sans s'en douter sans avoir
éprouvé le + léger sentiment de douleur
q. q. fois en se faisant leurs bar elles
étaient bien étourties d'en voir un se
détacher d'autres éprouvaient de douleurs
+ ou - graves dans la région de
l'estomac lorsqu'on soupçonne cette
cause on doit d'abord faire cesser l'usage
de ce pain y subsistent une nourriture
saine et fortifiante de cette on doit suivre
le traitement des gangrènes p. cause
interne dans le principe de cette maladie
à tous les caractères de l'erysipèle
moins p. la + g. partie du car il
y a double chaleur tuméfaction et
rougeur la partie affectée l'aspect de
l'erysipèle mais à voir par un rouge
vif sur celle cause de l'erysipèle la
couleur est moins vive un peu brumée.

(La 1^{re} description bien faite se trouve dans
les ~~memoires~~ memoires de l'academie de celle
maladie est d'un chirurgien de Rouen
ou la trouve dans les memoires de
l'academie royale de chirurgie).
C'est une maladie extrêmement facheuse &
a moins que le sujet ne soit tres
vigoureux la cause detetere qui a produit
reste en partie dans l'economie animale
detruit et mine les forces du malade
et extreme bientot la mort pour passer
de la pourriture d'hospital a l'articulation de
phais et des ulceres p.c. q. c'est le
plus souvent a leur suite quelle survient
Symptome. elle se manifeste par une douleur
très vive dans la partie qui doit en
être le siege elle devient froide q. q. f. le
malade eprouve de grandes douleurs
d'autres fois il ne se manifeste aucune
douleur elle se manifeste principalement
aux articulations par une rougeur un peu ternie
qui passe ensuite au violet enfin au noir
forcé la gangrene est établie. la douleur
vive cessant de se faire sentir elle s'borne
à se former au dessus de la gangrene un cercle
inflammatoire d'un rouge terne sur le bras

914

elle a
 quand l'inflammation n'est pas d'un rouge
 vermeille elle est de mauvaise qualité on doit
 craindre les progrès de la maladie la gangrène
 ordinaire n'est pas rare de ces parties dans
 laquelle alors l'inflammation n'est qu'un signe
 de la gangrène imminente q. q. fois l'inflam-
 mation passe du brun terne à une couleur pale
 c'est ce qu'on a désigné sous le nom de gangrène
 blanche mais elle est très rare la gangrène
 que Boss a décrit comme une maladie par-
 ticulière n'est que la gangrène de ce vieillard
 y remarque les mêmes symptômes elle
 attaque les orteils gagne de l'un à l'autre
 s'étend à tout le pied a q. q. différences par
 de la description de la même maladie Boss
 croit qu'on peut tirer le plus grand avantage
 de l'opium non seule^{ment} les douleurs et
 procurer du repos au malade mais pour
 obtenir la cure de la maladie il a beau-
 sants et immédiatement mais peut être so-
 lonanger sont elle exagérées de moi-
 idont par répondre à l'attente de praticiens
 qui l'ont employé et les essais qu'on a fait
 depuis M^r Boyer l'ont employé et sans suc-
 sans succès na ici ce que dit Boss chez un
 malade qui éprouvait des douleurs très vives

Il administre l'opium de la seule intention
 de prouver le repos comme il fut sans effet
 et en administre une plus forte dose puis
 1 + forte en core il mit non scab + la
 douleur se calmer mais la gangrene se
 allongea au mieux ce qu'il n'avait pu
 obtenir par la 1 + g. dose de Kina sur d'autre
 essaya également sur eux. (Soit administrait us-
 lopine à la dose d'un grain chaque 4 a
 6 heures.)

~~Sur la gangrene~~
 suite de la gangrene

On vient maintenant parler de gangrene
 d'observation pour dire que il faut le
 considérer par Coumbe au Cap et laugre qui se
 separe de l'artere sainte de la maladie souvent
 elle se forme et cette separation s'opere par le
 moyen de l'air qui se termine par suppuration
 laquelle entraîne la chute de l'artere
 lorsque la gangrene est très étendue si le
 malade est faible elle fait des progrès
 et le malade succombe le 1 + souvent
 nairement, dans 4 q. Car elle est très étendue
 et sèche quoique le malade soit faible et
 reste stationnaire. N'est rapporté avoir vu
 des individus porter l'osse entièrement gan-
 grée comme une main mais ce
 est très rare.

16) Quelle est la Roue de géneral de la gangrene
ne, dit ayez difficile Car il varie de l'exten-
sion de l'air etendue a son siege et
aux forces de l'individu et de la nature de
la Cause qui en produit; une gangrene charnue
si elle est une gangrene complete tend a se
produire par Cause externe et s'attacheant au
sujet fort et une affection peu grave, une gan-
grene superficielle de la peau, chez un
Weilher et par Cause interne, peut avec un
v. Devenir mortelle. telle est celle qu'on appelle scier

la gangrene de l'intestin et qui
meurt. mortelle, si l'intestin est blessé d'un coup
d'abdomen. Je dis d'un coup Car si par rapport
de ces exemples d'invagination et que la partie gangre-
née a été rendue s'abreétant si l'intestin est
trouvé l'abdomen la gangrene se termine avec
au sans fatalité enfin la gangrene de l'organe
de l'abdomen, est Constantement mortelle.

La gangrene Causee en géneral se
divise en deux ~~deux~~ ~~deux~~ Carotives
soit en petit nombre, il faut s'en
et d'abord le développement de la gangrene, 2^e
Longue et stable suspecter de la gangrene, 2^e
aux parties saines de se débarrasser de la partie
gangrenée on peut enlever par une opération
si le malade est très faible ou si on craint que
l'écoulement très étendu et déformé.
Les rayons de la gangrene remplissent le conduit
sont différents dans les différents gangrenés

Il ne faut pas le même produit
produit par le froid que elle produite
par l'étrangerement de l'histoire une fois et oblie
par moyen d'autre généraux à ces que ce sera
employés. Sans la séparation de ces parties.
La gangrene considérée en tant qu'elle présente
de différents lieux à l'égard de sa nature
produite par excès d'action au d'inf.

Cette espèce de gangrene affecte ordinairement
le tibia cellulaire sous l'entaille le plus
de elle affecte elle souvent par l'écoulement
mugueux et par l'organe paranchymateux elle est
constamment humide puisqu'elle est produite par l'inf.
considérable qui le ordinairement est produite
par l'excès interne elle survient tout d'un coup
suivant la vitalité du tibia affecté. ainsi elle
peut survenir au bout de deux ou trois jours au lieu
de suite d'un accès aigu ou d'un rhéguon
produit par une cause irritante comme par la
contusion de l'urine.

L'inf. de l'écoulement du mugueux et de
l'organe paranchymateux se termine en deux
et elle s'accompagne par gangrene d'inf. et coagulation
de tibia musculaire ne peut se terminer par gangrene
ou n'a point de remède que d'expectation. l'écoulement
humide, et peut être terminée au lieu que la
gangrene n'y soit survenue après avoir attaqué le
tibia cellulaire environnant.

Voici les signes qui sont nécessaires que la gangrene
survient, si une lésion est survenue que la partie
enflammée soit tendue d'un rouge foncé, signe
d'une chaleur considérable, que le patient et
de fièvre inflammatoire bien développée jusqu'à
le cas doit être bien attendu. La suppuration
que la gangrene. Car ce sont les signes
de l'écoulement de l'autre, mais il vient la.

58 / Douleur de l'urine. ou est le la partie de l'urine
mole sans douleur de volume si elle prend une
Economie d'urine, l'urine, si elle attaque l'urine et l'urine
vient de l'obstruction, ou de la trousse et la sur-
vient souvent le malade s'effraye et toute
dans une advenue s'agit tout à fait et toute
de soulagement et que l'urine - il survient de l'urine
de rejection et fétide, si la gangrene s'étend
ce qui arrive le plus ordinairement le malade
meurt. On la prévient (supponant une urine d'urine
gluante) par des saignées copieuses qui varient
selon l'état de l'urine et la force de l'urine
et l'urine de l'urine. On la prévient par
diète rigoureuse. On la prévient par
et la Cataplasme d'urine et l'urine
moyen prophylactique qu'on peut employer
si l'urine s'est formée et si l'urine
sont convenables que lorsque l'urine est
interne et externe et l'urine de l'urine
externe est extrêmement facile à abaisser en
moyen.

Lorsque la gangrene est survenue on facilite
la chute de l'urine en Cataplasme
médicamenteux la partie qui l'avoisine et
l'urine sont mêlés, l'urine est l'urine
un liquide épais au quel on donne
un peu de sucre qui se l'étend et joint
aux parties molles vivantes qui cessent
une douleur aiguë, une urine et qui fait une
hémorragie très dérivative et qui fait une
Car si la partie gangrenée reprend une odeur
fétide on doit la corriger par Cataplasme
de l'urine abstrait et aromatisé

titée qu'on la poudre de H. H., d'amarres (49)
comme c'est pour des fesses l'espace d'une fontaine
à appliquer au partie saignée qui est souvent
d'interie
à l'interieur il faut, c'est ou modifier, te traite-
ment antiphlogistique employé sur le dos pour ac-
-tuler d'un y'une inf. de l'air et cela contre
médique on peut aussi employer les acides miné-
raux surtout lorsqu'on a le malade avec l'evoye-
ment ou emplice - ment peau vaineuse l'ur
Nigotons l'oreille, forme liquide, tel que la
Crème, d'orge, d'off. dans le grain, et ordinairement
ou le lait d'au Peau aromatisée, ou le
lait au gras. lorsque le malade est âgé, fort, il
est faible on doit employer le H. H., la Supercatane
de virgine, mais cela suppose l'absence de
une inflammation, jusque l'état de la
la veine ne doit être employé que pour
facilité ~~la veine~~ l'excrétion en matière fécale
Nogour maintenant ce qu'il convient de faire lors
qu'elle est arrêtée par ce moyen. Si la gangrène
par excès d'inf. affecte la peau le tissu cellulaire
sous cutané et paraît incurable, de l'abandon-
ner à la nature il y a cependant exception à cette
règle si la gangrène quoique superficielle
affecte la partie d'au toute la Contourne
de la peau. si une supposon aussi la gan-
grène affecte le tissu cellulaire qui correspond à cette
partie il y auroit de l'inconvénient à la laisser se parer
d'elle-même la partie affectée, l'ampulation peut q.
9. sous le bras ou à l'épaule, on obtient la sup-
-pression de la escarre, par la Cataplasme émochien.

20) Si la chair est flasque ou le laudera
du vin mielle ou du vin aromatique lors-
que la suppuration commence à se
il faut que les poussement soient en forme
pour que le pus se crève par et se soit
par absorbe q. q. fois il faut faire q. fois par
fois d'interposer q. fois une fois peut suffire
dans certains cas cela varie relativement à
la quantité de pus et à l'état de l'at-
mosphère, lorsque le pus est séparé à la
circonférence si elle traîne dans le poussement
ou la sépare avec un instrument, il faut se qui
est décollé et avec qui est adhérent. Car il y a
survenir de la douleur de l'inflammation et de
une hémorragie, lorsque le pus est séparé
si la chair est en un état de l'écoulement
soignent si ne sont voulu aucun objet le couvrir
avec de la charpie sèche ou mettre autour de la
plaie du bandage de Cerat. On peut encore le
circonférence de plumeaux de Crat et de
pour le faire guérir le progrès de la Crat
trier si la chair est un rouge infla-
mé au milieu le plumeaux de plume
soit avec l'huile de cerat. la theriacale
et le jaune d'œuf

Si la chair est flasque, le bourgeon moult
flaque, le bourgeon affaibli, et qui
s'étend tel que le pus est flaque
sera et mal lié on emploiera le

Le sujet if au me fait avec le deau (81)
sur. D'arsen. le cerat et le paine deau
ou peut ajouter de l'eau d'asticuse tout
que l'on en est entièrement separée et fait
la tresse comme un ulcere simple pourvu
soit cicatrise par la position simple pourvu
une irritabilite madrice a l'interieur et. Dou
villes de l'air pour accier. Dans le dernier
temps on doit être obligé d'employer de
l'eau de l'et d'aglomerat de paine de l'et de
de l'union et de l'union la diffinition et le
genre de la l'union de la partie.

Il y a eu cet que l'etraglement s'avoit
prodire la gangrene, mais cette espee de
gangrene est rare, que celle qui s'entoune
par une inflammation symptomatique.
La gangrene par etraglement est ordinairement
accompagnee d'inf. etraglement fricee
d'inf. presque toutjour.

Il peut arriver que l'etraglement soit couru
et mais cela est rare cette espee de gangrene
peut avoir lieu dans le differente partie de
quelque affecte le + communement sont le
un de l'epaule enveloppe d'une apocroon
c'est le vesicere de douze ans ayant par
chi. leur d'arrière par de ouverture ulce-
reux ou accidentel, la gangrene par etra-
glements survient rapidement. chez le sujet
jeune robuste et est en vain sans traitem-
ent de beaucoup de liquide, et est bien +

62) lentes chez les vieillards faibles et Deuies
de peu de fluides, dans tout le Car
ele est. D'autant + prompt que l'etrange-
-ment est + Considerable et que la partie
est + importante ala vie les especes de gangre-
-ne doivent toutes se rapporter au genre de
celle appelée humide.

Ces etranglements qui produisent ces gangres
sont tous et detruis un jour les d'air produi-
tes par le corps. L'air par la poudre de saava
s'insinue et s'ajou, le y adou rose d'eus d'ay
c'ajou et de saou, les y gure propades
de la le Containuient peuvent auy le produire q. q.
pour une inf. Le Caer interne le produit
ainsi que l'infiltation de sang dans la partie
dant les vaisseaux auroit ete le l'etrel l'etran-
-gement piece de luy. Dans le hernie intestinale
gangrenée, d'autre fait l'etranglement sans
du piece de la l'inf. de la l'etrel l'etran-
-gement. Dans le hernie d'ottie de qui l'ongueur et
qui se gangrenent lors quelle sont irritée par q. q.
Cause, mais cela est peu important à l'avis
Car dans l'un et l'autre Cas on s'ent employe
le même traitement et le Phenomene est le
même.

Les circonstances qui seuent annoncer que
l'etranglement aura lieu, D'abord la
nature de la lesion du membre, la quelle
doit faire presumer quelle cause une
violente telle sont les y gure
les contusion et q. q. fois les Causes
ne produisent pas l'etranglement.

63
suffoqué alors on s'assure qu'il y a
étranglement lorsque les parties sont
enflammées d'une façon grosse & épaisse
qu'il y a tension & considérable engourdis-
sement impossibilité de mouvement lorsque
cette partie & A l'un usage obscur que le
veine superficielle & ont gonflés & que
la peau est + au - interne. Voilà le
suffoqué aux ligues. de ce étranglement
qui q. q. fois se voient par leur tala gon-
-grève, mais alors il survient une
suppuration abondante & ont le suite sont
à craindre la gangrène peut en faire
diminuer. d'incertitude, lorsque par exemple
que le sujet est fort et que la fièvre diminue
lorsque la gangrène survient elle est au point
c'est par les mêmes signes que ceux que vous
avez déjà mentionnés, & est adieu, & l'alté-
ration de l'organe affecté, par un traitement de
corps par le refroidissement de la partie &
affaiblissement qui répand une adense gangrène
par la diminution de la douleur tension
la diminution de la fièvre, Car le pouls
qui que fréquente est faible & durable. Car
il y a gangrène de la peau. Si la peau se couvre
de pustules c'est un signe que la disorgani-
sation intérieure est portée à un haut degré
Car gangrène est étranglement & survient
avec difficulté. La fièvre elle s'empare de
tout le membre & la porte même jus que vers
le bras elle sont alors recouvertes la fièvre

64) + ou - aigue le cétie un adque-
mie générale se déclarent et déterminent
la mort de l'individu qui s'est formée
avant ce accident;

Lorsque la gangrène par étranglement précède
l'inflammation: on observe avant l'ac-
tuel développement des symptômes généraux
qui annoncent une irritation violente dans
le lieu de la Coarctation dans la
Cavité de l'abdomen et dans le Sottion
d'intestin. Situé au d'hors de cette Cavité
la gangrène est d'autant + rapide que
la Coarctation est + forte le sujet + robu-
te et qui. l'intestin est exposé à une
irritation + violente suivant que le contenu
contient de l'ijiploode ou non ou
suivant en fin que l'étranglement est plus
ou moins d'engouement. Les signes
généraux de la gangrène par étrangle-
ment. sont le vomissement que deux jours nous
avons indiqué pour la gangrène produite
par excès d'action. Elle sont la
Diminution de la Douleur, l'affaiblissement
de la partie gangrénée le Sueur ecchi-
matose, Devincement de matière fécale,
rigor de soupire et affaiblissement.
Le Diagnostic de cette maladie ne sera
Soudain difficile en Praxité et en
général très facile et il est d'autant +
facile que la partie gangrénée est
+ volumineuse. et + importante à la Vie

Si on affecte une abondance et de
affectation elle même rarement les parties
ganguénales se separent. de parties d'ailleurs
et souvent elle est mortelle. tout le soin
que l'on doit se donner est de prévenir le
sueurs profuses que l'on doit mettre en usage
soit par des antiphlogistiques si l'inf. a été produi-
te par cause externe et quelle soit à son
Début on emploie les antiphlogistiques
répétés, le bain froid, la saignée, l'onguent
la glace pilée et l'acétate de plomb dissous
dans l'eau on pourrait également employer le souf-
fret de soufre composé d'eau de muriate de
chaux de muriate d'ammoniaque et de muriate
de soude mais si l'inf. est arrivée à un
degré plus considérable les Trépérentifs seraient
utiles. on fera dans ce cas. de saignée Copieu-
se et faut aussi observer que la saignée est
en général inutile dans les cas où l'on a vu
cebrae affectant des individus faibles mal
nouris habitant en pays chaud et humide
frôles et humides, dans ce dernier cas il
paraîtrait convenable d'employer de
moyens propres à débarrasser le premier
voies afin de prévenir l'inf. de fièvre bilieuse
soit de fièvre putride ou le souffret et
le lavement aboulié seront également mis en
usage, les saignées et les Cataplasmes émollients
seront aussi indiqués ainsi que la saignée pour
diminuer la fluxion inflammatoire qui se fait
d'elle-même. On mettra le malade à une Diète
rigoureuse à l'intérieur on pourra donner les bouffes
de lait légèrement acidulés, si un embarras

66) gastrique de descente. ou sournale
Leur effet par l'émétique en lavage
On doit craindre de l'emploi de ce
moyen lorsque l'étranglement d'origine
d'intensité car si il fait des progrès il
faut détruire la cause par ce moyen &
actifs & fait inciser. & l'on largement le
tint qui l'occasionne et tout ordinairement les
apouevrose soit celle d'enveloppe, soit
celle qui donnent passage à certain
partie il faut que le débriement soit
fait trop tôt. que trop. soit dans le
plan d'anneau ou si il convient de chan-
ger la forme de la plaie et de ne pas
attendre l'apparition de l'étranglement pour
opérer le débriement et fait débriement aussi
tôt que la plaie a été produite, lorsqu'on
incise la apouevrose d'enveloppe l'incision
doit être cruciale ou en T. une simple incision
transversale ne suffirait pas. mais si l'apouev-
rose présente une ouverture circulaire comme
à l'anneau, à quel que soit simple incision
soit suffire et en est devenue pour la guérison
de l'anneau. Cruciale et de l'oblitération après
avoir opéré ce débriement et est très utile dans
q. q. cas de la tumeur ou de certaine quantité
de sang a été obtenu & d'égorgement & souvent
si le sujet se trouvait affecté d'adynamie, il
faudrait prévenir cet écoulement de sang par
le débriement pratiqué au point incisé.

insolent jusqu'à ce que l'inf. soit calmée ou pourra alors relâcher la rigueur
durcissime. Sans toute fois l'abandonner
il survient q'q' fois une effusion épanchée ou
aura egard à la nature. Traitement. Sans q'q' cas. il y a pour insidieuses les
grands qui entraînent l'inf. et consiste en corps étan-
glements ceci arrive dans les plaies
d'écuyer à peu. au d'instrument d'aut la suite
Casse avec cette agagerie de même que
dans les plaies faites par des fracturés
Coccinini cativés. alors. est de briser au
pour l'extraction de ce Corps. elle n'est
ni trop dangereuse ni trop difficile Cas il est
de Caron et vaudrait mieux le laisser
que de le extraire.

pour savoirs le degré de l'inf. de l'inf. qui
grève à la suite d'étranglement. on
emploiera le sinus hien et on abandonnera
à la nature. le reste de l'inf. de l'inf. de l'inf.
peu étendue et superficielle et quelle ne seroit
point suivie d'inf. de l'inf. de l'inf. de l'inf.
Suppuration trop abondante
si toute en condition existent, on fera
l'amputation si le malade est âgé fort et si
le siège de la maladie le permet. on fera
amputer qui lorsque la mortification est
complètement formée et en en est certain.
lorsqu'on aperçoit au dessus de l'inf. de l'inf.
moleur une arête de l'inf. de l'inf. de l'inf.
qui en se jure. de l'inf. de l'inf. de l'inf.
à deux jours + les forces et que le malade
est si bien si l'on amputait avant a tenu la
il seroit à craindre que la gangrène ne

Q 8) L'ampoulette de moignon, le fait de l'écoulement
et est en contact avec l'air.

On peut pratiquer l'amputation dans l'aine
en droit, ou dans la partie d'aine la partie
gangrénée, ou dans la partie d'aine la partie
de la gangrène au sein ou dans aussi la partie
qui sont les parties saines, l'amputation dans
la partie gangrénée employée par les anciens et
maintenant lorsqu'elle est très grande ou
il se fait pourtant sur quoique ce soit au
niveau moyen. Le résultat complètement car
le membre est faible et qu'il ne pourrait tout suppor-
ter la douleur de l'amputation sans
Car on accute le + possible. sur la partie
saine et on abandonne en q. q. toute la
partie gangrénée sous bonne le degré de la
gangrène et faciliter une chute heureuse de
l'os.

On accute dans les limites qui se jurent la
partie saine de la partie gangrénée lorsque
la mortification s'accomplit d'une manière
irrégulière il faut alors faire l'amputation
de manière que le muscle coupé for-
ment au côté dont l'os est en défaut
- devient alors il faut que la partie des membres
que l'on agère puisse fournir assez de sang
devenir la plaie, mais dans ce cas on ne
fait la partie mise qu'on a respectée une escar-
superficielle qui doit nécessiter une 2^e opération

La par ordinairement on a un jet de sang qui
se fait par la veine même d'entre le cou et le
doit crever au commencement d'une de ces veines
de la partie saine on peut laisser autant de
qu'on juge à propos pour recourir la plaie et
former la tumeur par le secours d'un véritable
Cône on peut dans ce cas espérer une bonne
suppuration et une cicatrice facile.

Nous allons aujourd'hui parler de la gangrène
résultante d'une compression locale et d'une
circulaire et de l'espèce de gangrène est causée par
une compression qui peut avoir lieu dans l'air
circulaire, par les parties du membre qui sont
causées par le serrage d'une espèce de tumeur
ou d'une tumeur appuyée sur une surface résistante
et lorsque le malade est obligé de supporter un
bandage à extension continue et est ce qui arrive
ordinairement aux membres inférieurs alors elle
se manifeste au talon ou sur le coude pied
q. q. fois elle survient au grand trochanter au genou
sur le bras elle survient à la partie antérieure de
l'épaule ou aux environs de la crotte de la tête
lorsque le malade est obligé de rester long-
temps couché sur ces parties cette espèce de gan-
grène à ordinairement peu d'étendue en profon-
deur on l'observe encore q. q. fois aux oreilles
cette gangrène par compression locale est ordinaire-
ment résécible d'un coup de rasoir à la suite de
laquelle il se fait une excoaration légère, alors
la partie excoarée se gangrène et q. q. fois la gan-
grène survient avant que la partie soit excoarée
ce qui indique d'une tumeur de nature avancée et ag-
ricole ou d'un acte de nature agressive d'abord
sont évidemment. + espèce de cette gangrène

70) que ceux qui sont jeunes robustes et qui jouissent
d'une bonne constitution les escars qui resul-
tent de cette gangrene sont + de plus en plus larges
qu'ils s'approfondissent cependant q. q. fois la necrotisation
est assez profonde pour mettre au decouvert le
legament ou le lig. tendineux elle est alors + dangereuse
On peut prevenir cette gangrene par differents moyens
Si l'on est prodigue d'acides extensibles continuels
fait que les lacs agissent sur une grande surface
pour qu'ils compriment ainsi il faut aussi
que les lacs que l'on emploie soient bien mat-
lacs et qu'ils exercent une traction parallele a la
longueur de l'incubation et est = ment utile de placer
les tetes et les parties laterales du membre de
remples gazeux egal qu'on changera lors qu'ils seront
humides et durs si malgre ces precautions les lacs
ou les tetes produisent de la rougeur il sera utile
d'appliquer des Esquisse toujours froids que le vin
aromatique le vin de Rh. ou mettra aussi de
recevoir le jour + l'air qui font on est obligé de
suspendre l'effort de traction d'autre fois il s'agit
de le diminuer, si on ne prend pas ces precautions
on aura des individus atteints de escars au
tenduel pour couper les muscles en travers et
même de rendre les articulations de qui pouvait
engendrer la Carie ou la necrose de la qui se
trouvaient a decouvert on aura même jus qu'à la
paralysie du membre survenir par la lésion du
nerf
pour prevenir la formation d'escars au
sacrum & la crete de la l. de l'ila et aux
trochanters on a conseillé de couvrir ces

Partie d'un corps emplastique tel que les
Diachyles ou stende ou une emplâtre de
l'ougeant de Sarsenber, le mélange de deux est aussi
très employé ou a encore l'ougeant de Sarsenber
Le gubon Mit le malade de l'ougeant de Sarsenber
ou de bois vermoleu-bad plus la croute plus est employé
Mord s'il y a ulcération de la peau. Mais avec l'ougeant
abortif Prodruant de ce poison vénéreux,
de filoub.

Il faut aussi que les alaises ou les draps
du malade soient trempés et changés
qu'ils sont sales ou froids et la partie
de soulevation doit être. lorsqu'elle
commencera à se filtrer de sang ou de bien de
changer souvent le malade de position.

On facit la séparation de escarres gau-
grieuses. en les couvrant de sucracane
sèche de thera ou de l'ougeant fait avec l'ou-
geant de thera, la tete est de la bonne
d'ougeant, s'il faut et le paine d'ougeant, si l'on
surt and on se de l'escale au foyer d'ougeant
Donnera issue. ougeant avec la même precau-
tion que celle que nous avons indiquée plus
s'il y a soit de contre indication ou d'ougeant
à l'intérieur ou d'ougeant bonique et au feu
suis au malade un régime analytique ou
en vient rarement à l'amputation d'une en
espèce de gangrene.

La gangrene par contusion résulte des mêmes
heures et la même indication que la
gangrene par étranglement. la contusion peut être
extrêmement violente de manière à égarer
dans l'instant ou elle est produite elle le

79 / trouvant accompagnée de la destruction des gros
vaisseaux et du gros uers de l'attrition des
parties solides. In membris? Dans ce cas
le gang. survient à l'instant et ce qui arrive
longtemps de la voiture. par un des membres
ayant un point d'appuy sur le sol cette
gang. immédiate peut être causée par la
placée d'arriver de son longu' à l'est. car
De ce que nous voyons d'échouer la pro
indication et d'eulers d'romptement le
membre d'un malade. l'amputation s'est
été faite d'un ~~la~~ des parties bien
l'autre. et est à craindre. Pour ce gangr.
par cautérisation la désorganisation de
ar. Car s'il étoient fendu très haut il
faudrait pratiquer l'amputation. l'ou de la
partie désorganisée l'accident s'est
d'instant - a craindre que les vaisseaux
et le uers sont - viciés et que la
est fracturée avec ou sans esquilles longu'
s'ignou sont. De quelle on peut essayer la
guérison. il faut alors employer le anti-
phlogistique généraux q. q. fait malgré
cela la gangrène survient dans ce cas le
traitement est le même que celui de la gangrène
par excès d'action on emploie un régime
analeptique, on s'efforce de la gangrène, de sur-
monter, ou la boue, et on facilite la séparation
tion lorsque la gangrène est profonde et que
l'escare est irrégulière il faut aussi d'un
ce cas amputer d'un peu partie saine.
l'ou de la gangrène remette de la désorg.
de la partie principale de membre

La ligature de certaines artères ou de la veine
principale. Les fortes de ces vaisseaux ou une
obstruction hémorrhagique interrompable
dans le sang dans l'extrémité distale de
la gangrène.
La ligature. Provoque la gangrène d'autant plus promptement
que le vaisseau a moins de collatérales,
et que ces collatérales sont moins développées,
que le sujet est plus avancé en âge et est donc
d'une constitution plus faible ou est étioyée par
qq. maladie elle survient d'autant plus promptement.
Si on comprend dans la ligature la
veine aussi, pendant et le corps. Néanmoins si on
a pu faire avant la ligature. Le vice au
de faciliter le cours du sang dans les
collatérales et la partie superficielle de
l'artère qui produisent le plus souvent la gangrène
par leur ligature soit la Crurale, ou toute
son étendue, particulièrement avant de
donner la profonde. Chaque méthode
antérieure de la ligature a été plusieurs
fois pratiquée et que de nos jours elle a été
aussi suivie à l'hôpital de Lyon la ligature
de la poplitée paraît - favorable la ligature
de la fémorale antérieure est rarement suivie
de gangrène, la ligature de l'artère des membres
supérieurs est aussi rarement suivie de
gangrène cependant on a vu le bras gangréné
après la ligature de l'axillaire, cela
est dû au sang qui se rend par la radiale et la Cubitale.
La ligature de la veine principale de la jambe
est constamment suivie de gangrène il en est
de même par la veine axillaire liée avant

71) Je recevois le cephalique et le Basilique
ligature. de l'artere comme bien +. Soient
bien de la gangrene pratiquée à la suite de
plaie que si elle étoit pratiquée à la suite
de l'artere, le raiser, de cela est bien simple
Car dans le membre l'artere Collaterale
est + accoutumée à recevoir le sang, et les
arteres ne sont point destinées de sang comme
dans les plaies, c'est ainsi des parties
anatomiques de vaisseaux peuvent faciliter
le développement de la gangrene et de
individus, chez lesquels les collaterales, sont
+ nombreuses, en demeurant y est accou-
tumé.

La gangrene résultante de la lésion de
vaisseau est accompagnée de plusieurs
autres. La partie inférieure du mem-
bre gangrené, elle perd elle est + froide que dans
l'état naturel, elle perd de pulsation
l'artere d'au dessous de la partie q. q. fois elle s'infir-
mité est éloignée du centre de la circulation
q. q. fois la gangrene est superficielle et autres
fois elle attaque le centre du membre dans les
différentes cas, il paraît qu'il y a q. q. fois
l'infirmité locale, mais est certain qu'il y a q. q. fois
l'infirmité générale, et que les parties qui sont
sujettes de gangrene quoique résultent de la lésion
de l'artere dans le sang dans les parties artérielles
encore de genre de gangrene humide et de
telle à la fois du sang venant et de la lymphe,
cette gangrene abandonnée à elle-même si
l'artere est superficielle elle peut se séparer

et le malade guerir s'est ce qui est arrivé
dans la ligation de Douhet le fort de
son malade ~~est~~ se sont gangrenés.
L'effort, elle s'étend et elle est alors symptôme
d'une fièvre putride et de laquelle le malade
succombe souvent

Pour prévenir cette gangrène il faut. Supposer
deux cas celui où il faut ouvrir la ligation
sur le champ et celui où on doit la différer
longuement et appelle pour les une artère il faut
découvrir largement le vaisseau afin d'éviter avec
certitude les veines les artères collatérales et les
autres artères soit elle liée seule, le sur faire par
un fil ou faire deux ligatures une l'autre sur
l'autre au dessus et de la place en la place sur
une 3^e d'attente, si le sujet est fort robuste qu'il
ait peu ou beaucoup ou pratiquer une saignée
dans le cas contraire et faut seu attirer
la ligation faite on peut le + mollement possible
on met de la charpie entre les deux bouts de la
plaie. il faut que cette charpie soit fine, on
couvre la plaie avec des compresses qui se tiennent
par un bandage peu serré on met la
partie dans une position telle que les artères
et la Lymphe circulent librement, pour cela on
élevera la partie inférieure du membre plus
que la supérieure et on le mettra en flexion
on environnera le membre de sachet de cendres
chaudes ou de sable chaud, on mettra
malade au lit ditte on lui fera prendre de
grain

70) La ligueure de ^{venant} et de la poifou acced
l'avec en creialtion au vent Prevenir la
gangrene.

Si on veut de faire la ligation on veut Com
prendre l'artere par une compresse en même temps la
veine, et la gangrene est à craindre il faut
de même. Si l'on employe le caustique on plonge
la gangrene surmont. Si elle est superficielle
on s'oppose l'incision par le couteau, à l'artere
ou veine en la poifou au vint et doucement
et elle est profonde on a l'habitude d'amputer le
membre au dessus du lieu où l'artere a été liée
Si la gangrene n'est pas si loind on acced
l'amputation est presque toujours sans suc
ces. On vint je n'en ai point d'exemple.
D'autre de Cal est adire lorsqu'il faut
point pratiquer l'amputation la ligation se fait
Dela on la Comédie n'est pas la même on
habitue le collateral adouci remplacé l'artere
Principale, on une compresse mediate exercée
sur cette artere. au dessus du lieu où on veut la
lier. on Comédie l'incision. On vint de
cette manière. l'operation est presque toujours
heureuse à moins que le malade ne soit vieux
faible ou scorbutique qui fait on est appelle
trop tard pour operer la ligation et est l'age
de pratiquer l'amputation.
La ligation de l'artere peut elle donner lieu
la gangrene en fait la ligation Comédie. cette
ligature n'est jamais faite adouci. Il est bien
de car on on est force de couper un
vein ce nerf est si elle affecte. et seint adouci. Dans
toute operation éviter de lier de vent adouci.
ne d'elles le cordon nerveux. la gangrene

par hazard survient ou se compose de 77
La même manière que dans ces deux produits
par la ligature de vaisseau.

L'anguine peut être produite par la brûlure
et l'art de phénomènes qui accompa-
gnent ~~les~~ ~~de~~ la brûlure tout et à
ceux qui accompagnent l'insolation en diffé-
rentes régions.

La brûlure peut être produite par une infusion
de corps et elle peut aussi exister à différents
degrés.

La brûlure peut être produite par le rayon
solaire. Mais qu'il soit émis en abondance alors
la brûlure est ordinairement superficielle et par-
tielle de l'exposée, elle peut être produite par
le rayon solaire concentré mais cela n'a
lieu que dans les expériences ou dans certaines
opérations chimiques. Elle est produite au contact
avec par un corps solaire direct, tel que
le fer, le charbon, les métaux, peuvent
aussi la produire et elle sera d'autant
plus profonde qu'ils sont plus denses, les corps
solides brûlent aussi. D'autant plus qu'ils sont meil-
leurs conducteurs du Calorique.

Un corps peut brûler sans être appliqué
sur les parties et suffit qu'il soit approché
et méritent être approchés de la partie de la brûlure
dans le cas présente le caractère de l'infon-
meur est sans escar.

La brûlure peut être produite par des agents
inflammatoires à l'état mou, tel que le
phosphore enflammé qui produit une douleur
et une brûlure très superficielle et non profonde
et une escar instantanée. Le sulfure de carbone

18/ Produit avec Brulure aussi vicié lente main
laout suspendu. le métal au état de
ferme et le liquide très blanc. etc.
Puisent aussi une injure prompte et profonde
le liquide qui agissent avec de force
soutiens qui adhèrent le + à la peau
ainsi le miel et le graisse bruleront
avec + d'énergie que l'eau simple le
liquide brûleront aussi en raison de leur
Densité ^{qui} est ~~ce~~ une infinité d'agents
qu'ils peuvent brûler tels sont l'alcool
l'ether enflammé différentes préparations
résineuses mais ordinairement les brûlures
qu'ils produisent sont peu profondes et sont
rarement au delà de la peau et du tégument
certain sous cutané. La composition chimique
telle que les alkalis purs, la potasse
Caustique + leur oxide métallique
avec excès d'oxygène ou oxide mercuriaux
oxide de Cuivre et d'arsenic peuvent aussi
brûler nos parties mais il faut pour cela qu'ils
soient appliqués pendant 4 ou 5 jours par qui
ils brûleraient par seulement sur la peau
L'expirer de la boue peut aussi brûler prompte-
ment le et flagrant de la peau avec la peau
peut aussi brûler le même effet. les brûlures
sont donc de deux en l'étendue et de deux
qu'en profondeur ainsi d'après ce que nous avons
dit. les brûlures peuvent être instantanées ou courantes.
La brûlure présente trois degrés suivant son
étendue et les parties qu'elle affecte. Certain
auteur en ont fait trois degrés et d'autres ont en
dix le brûlure sans le degré d'acuité pour
d'autres en font fait 7 il est évident que l'on
ferait de degrés dans la brûlure + l'indiquée de

Subaragant.

Non alloué le d'ivir en autat de degré que pour Crograds envenable de le faire.

1. On doit mettre au 1.° Degré l'inf. la superficie de la peau sous pulcritude, ou adonné le nom d'erythème ou cette inflammation. elle ne se fait que sur une surface. (the targe) alors elle est sans accident. sans fièvre et l'inflammation se termine promptement, d'autre fait toute l'étendue d'un membre est affecté quoiqu'il le Corps comme le degré de sont acc. sont sans avoir sorte qui succombent promptement à une fièvre intense.

2. On mettra au deuxième Degré une nuit + forte + ou - étendue en largeur. après un temps peut déterminer une fluxion vive prompt de la rupture ou sphalaw épaucement de la robe et formation de phlégetine la couleur et sans + vive et la chaleur + forte. que dans le 1.° Degré Ordinairement il y a fièvre.

3. Dans le 3.° Degré le Corps va au desent a agi, et le surface de la peau, au d'au tacte sans y aiehes l'exten cellulaire par est aué qu'il est aussi, enflammé, il y a formation de phlégetine cette or ulun. différé de autre en ce que le Degré est affecté dans toute son étendue il se répandait de Car dans lequel cette différé et différé et différé à reconnaître.

4. Dans le 4.° Degré le Degré le Degré de l'exten cellulaire par est aué et même le Degré de peut être affecté il y a phlégetine et l'inf est de le nature de l'inf erysipelato.

Phlegmoneux. 5.° Dans le 5.° Degré l'inf + ou - grande douleur de partie sont affectés mais elle se gang et de la forme une enant spontaneement, dans le 6.° Degré l'inf. la cellule est tout.

50 / Suppuration simple dans le h. il se forme ord.
une escarre galee. au sein dans le p. de la
1^{re} cav. existe et est le sepand ord. de la
Suppuration. qui fait. cette separation donne
lieu a une gangrene consécutive s'agisse
vol. pour d'extenuer le degre de la douleur
il faut avoir egard au sympt. qui l'a produit
au tant que le Corp. affecte s'applique a l'etat
de la peau lors de son application il faut
aussi avoir egard a la sensibilité de l'individu
et enfin. il faut avoir egard. au tant que les
vêtements. fut jumeu de ce Corp. d'exciter son
action.

Le pronostic de la douleur simple est très
modification l'erytheme simple est au gen.
vol. très peu dangereux a quel le 2^e degre de
Le pronostic est aussi peu dangereux a
partie affectée ne soit très sensible la douleur
au 2^e degre devient + facheux en fin de danger
augmente en raison du degre au quel elle est
portée et suivant que l'inf. est + ou - intense
le traitement de la douleur simple est aussi
modification fondee sur les differens
degrés.

Dans l'erytheme simple l'indication est de pre-
venir la fluxion inf. au del' arreter si elle
est deja et abbe au remède a temple et
condition en appliquant le refrigerant siper-
Corysif, le tout fait l'eau froide, la urine; le
gale sili, l'eau de vie l'alcool. l'heres au
solution froide. Des oxides de cuivre les
dissolution de sulfate de zinc l'eau de goutte
Lorsque l'erytheme est venant et d'art

Par nécessité de changer le régime du mal 81
de si aueuttrau il occupait une large
surface, le dicte lu saignée Générale et le
Pousson. auty phlogistique seraient indiqués
4. 4. Personne ont Couru de d'appliquer avec
huile un Copraie au des cent. ce qui produit une
inf. vive. je ne sai comment agi ce moyen
est tnd de coulo. ureux et n'est pas fait
officace il doit être employé avec réserve
Sous le régime de la Pralun d'ya d'Altiatime
et fait alors. Souvent issue de la Prostate meins sans
éprouver l'epidemie. Car l'Action de l'air, et les
topiques y produiraient une irritation d'avantage
genre il faut ouvrir la Phlétaie avec un launcette
aigue. La Prostate s'écoulera une fois écoulée
On emploiera le Repereurif de l'aput 10 à 12.
heures et renouvelant toutes les 4 heures
le Rév de l'appareil si au doat de l'etere et n'ont
soit produit l'eff. avantageux au cas le temps
On Couru de d'appliquer de l'huile d'ay
ont obtenu ce fait. qu'il est possible le jour
durei on le s'écoulera et il s'écoulera une suite mille
à du milieu de l'etere de la charpie qu'on
applique sur la partie Pralun tout adoucement.
On a couru de un top. qui fait avec de l'huile
et de la charpie mouillée et tnd au tnd de
La partie Pralun et au Couru de d'aput
qui on emploie au tnd souvent le Cerat
Campbré au le Cerat de l'urine de l'ay
on met une certaine quantité de ^{Campbré} ~~l'ay~~
Cerat de l'urine Campbré de l'ay grand
L'acétate de l'ay de l'ay une suite de l'ay

est aussi employé l'autre fort usage. De la
- pulpe de femme cuite qui recuit. q. q. fois.
- l'emploi de Corp gras la de cette fleur
- certaine d'ulcer ou a'ubleria par haut
- la c'est le régime le Docteur emolient et
- en general tout le anti-phlogistique sont
- employé dans le Cas et leur emploi sera
- modifié par l'etendue de l'ulcer q. q. fois
- par le traitement. le Dilatation sabaisent. et
- le régime de recuite. D'autre fois. et se
- recuite par pain et se separe avec du lait
- q. q. fois. Mais alors le régime de lait accou-
- tumer ou il s'en force avec un vase con-
- che. De j'ic avec ce qui fait qu'il ne but,
- sont douloureux, s'il survient. dans cette
- d'ulcer de symptomes. d'une esp. phlegmo-
- neux ou le Combat par le Cas phlegmo-
- neux de Corp gras. Dans le d'ulcer
- au 3. degré. le traitement differe peu de
- précédent si ce n'est qu'il faut qu'il soit actif
- renouveler + souvent le piece de l'appareil et
- insister + longtemps sur le traitement anti-phlo-
- gistique, si une esp. phlegmo-neux survient au
- employera le Cas phlegmo-neux d'ulcer
- au Corp gras. Si la gang. survient on fera
- ~~l'emploi de Corp gras~~ favoriser la
- separation de l'escar.
- Dans d'ulcer au 1. degré sont + fréquents
- et entraînent sup souvent une longue suppura-
- tion ou une gangrene difficile à soigner et
- ne d'eat voir dans le régime de lait absolu et
- le même que dans le Cas de l'ulcer absolument
- qu'il faut insister + longtemps sur le traitement

anti-phlogistique générale. q. q. fait la gangrène
nécessité l'amputation et cela n'est que trop com-
mun dans le cas il ne faut amputer que lorsque
la gangrène est parfaitement formée il faut amputer
avant que la partie saine. cette gangrène présente
deux modifications d'abord qu'elle est produite
par des liquides à une haute température ce peut
être dans le cas de la brûlure et de + sang.
Il n'y a que q. q. muscles d'attaque si aucun
travail le vaisseau et le nerf sont sains
sans être affectés il est très difficile de s'en par-
tir impossible de l'enlever. le membre ou la
craindre. aussi une inf. très intense qui donne
deux ordinairement à face gangrène consécutive
dans le cas de l'escar. est superficielle ou
l'occupe des parties qui l'environnent ou devient
la flexion inf. de la ~~partie~~ partie saine
que la suppuration qui devrait être d'abord
si elle s'établissait on emploie à cet égard
la répercussion du corps gras et le traitement
anti-phlogistique pendant 4 ou 5 jours
~~lorsque~~ que l'escar. est profonde et est appliquée
sur le nerf et le artère d'amputation n'est pas
encore indiquée il faut avant l'occulsion de la partie
voisine et lorsque les symptômes inflammatoires
sont formés dans le tumeur et que les signes
sont marqués entre la partie saine et la
partie malade et est alors le temps de l'amputation
Le traitement de l'ulcère qui survient à la
suite de la brûlure est assez embarrassant et
ulcère. sont difficiles à cicatriser. Cas n° 1
Partie de l'ulcère accompagnée d'un

Il est aussi très rare que la d'ulcère soit au niveau
degré d'un côté ou étendu. La Cicatrisation
est aussi difficile lorsque l'ulcération est d'un genre
très étendu et étendue dans des artères sujettes à
changer de forme telle que la peau des mains
le Périoste d'articulation. La Cicatrisation
est aussi difficile lorsque les parties sont recouverts
par un membrane muqueuse et comme la
surface du cerveau, les foyers de cicatrisation sont
ordinairement suivis de l'effort de changements
de couleur. elle sont inégales et sont souvent
accompagnés de rides et ulcères soit très
faibles lorsqu'ils sont très étendus. que la
Suppuration est abondante et que la fièvre
continue survient et lorsqu'ils sont accompagnés
de furies furulantes qui s'écoulent les parties des
ouffres ou s'écoulent de donner les parties
Cohérence de parties et au avec le sang ancien
adhésif l'une et l'autre des parties de la glotte.
Les lèvres se sont collées en fin ou avec la suite de
ce ulcère le bras adhésif et avant d'arriver
à l'ulcère produit par la d'ulcère, se présentent
très différentes tantôt ils sont superficiels,
ressemblant à ceux que produirait un vésicatoire
s'ils sont très étendus en largeur accompagnés
d'une douleur vive et assez intense soit douce.
La fièvre ou même comme il peut arriver même
le malade dans un état spasmodique ou
sans dans lequel on a vu de l'opium aux yeux
gras.
Lorsqu'ils sont superficiels et que les parties
sont seulement de couleur ils ne sentent

ben de diffinité mais ils peuvent produire (85)
une agglutination entre les parties libres ou presées
et découvrent en Couvrant les parties avec du linge
cru et de Cerat. et on les fixe sur le Corps solide
pour s'opposer à la force qui tend à leur faire perdre
une position vicieuse si ce ulcère attaque le
doigt par exemple on enveloppe chaque doigt
malade d'une emplâtre et ensuite on les fixera
à une palette. Le moyen a été conseillé par Fabricius
de Hellen d'au le ulcère superficiel il peut arriver
que la Cicatrice au lieu de se former de la Cicatrice
devenue au Centre se forme d'au l'un espace quelque
de la surface de l'ulcère habituel d'au ce Cas on
environne de petites Paquettes de linge cru et de
Cerat. la partie qui a Commencé à se cicatrifier.
Lorsque le ulcère superficelle ont lieu à l'endroit d'un
narrive sous ce prétexte les rails du nez de contracter
de l'adhérence on forte d'au le narrive une
sonde de Gomme elastique enroulée de Cerat, ou
peut aussi se servir d'un Caupon de charpie et même
de tuyaux de plume qu'on induiraient aussi de Cerat
on soutient le tout avec un double T ou triangulaire
ou autrement appelé le suspenseur d'une
si il ont leur siège à la surface de la gaine on a
la surface interne du jouet on passe entre ces par
ties au pinceau enroulé de Eau mielle ou de cerat rosé
et on continue que le malade se gargarise la bouche
ce qui a le double avantage de diminuer l'usage d'atropine
le pur et de s'opposer aux adhérences
Lorsque le ulcère affectent toute l'étendue de la
beau le membre se fléchit si l'ulcère est du côté de

16) La flexion ainsi: si l'ulcère par Brulure à la
siège au Colla tête peuchera du côté qui aura été
brulé et faut l'opposer a cette situation de l'écaille par.
la Cicatrisation serait tuy, raide et tray, étroite ainsi
d'au ce ulcère Profonde ou Douvère à la partie
la position la + favorable pour qu'il en résulte de
difformité et de gêne pour cela on emploiera des
Bandages appelés divisifs.

Lorsque les Brûles commencent à se former si elles
sont superficielles on doit les faire disparaître avec
allouageant et avec Coupain fait de l'une plaque de
plomb ou pas de Cataplasme ou de l'huile d'olive
emollient, lorsque malgré ces précautions les
Brûles existent, si elles existent au Col pas exemple
quelque soient peu sallantes, sans atherence, ni
aux vains, ni aux muscles, on peut les faire
ciser avec de l'urine ou de l'eau, et on maintient
cette division jusqu'à ce que la Cicatrisation soit faite
parfaite.

Lorsque les Brûles sont profondes, large et
adhérentes aux parties subjacentes il faut exciser
avec le ramolir on y recourt pas les cataplasmes, les
Baumes et les Douche emollientes et les exutoires fai-
tes avec les huiles recentes, au visage avec
fréquemment, les brûles affectent toute les parties
de la peau, tantôt il faut les abandonner à l'air pur
il faut les exciser, mais pour cela il faut que la
Cicatrisation qui en résulterait ne fût ni lauzigeante
ni auzi, difforme que au Brûle, si elle strail-
lance le levier ou le saupier il faudroit le
diviser ou le exciser il n'est pas rare après ces
opérations que l'incornation se fait auzi grande
l'ayant.

Sans q. q. Car le saupier est affecté de

Brulure il arrive alors qu'elle se recouvre natuellement
 la conjonctive forme un cygne de doublet rouge et
 univers il est en rapport de la perte de substance
 ce qu'on y trouve la conjonctive. Quand il y a
 seulement de l'ordre on peut en faire exprès
 un uésaut mais s'il y a perte de substance
 d'incision est inutile il faut comme le dit un célèbre
 praticien que l'on mette la plaie à l'air et à l'air
 d'habit il faut enlever même quantité de la conjonctive
 que la conjonctive a perdu de l'eau qu'on la
 brûle, attaque les ouvertures naturelles servant à
 l'évacuation de l'urine ou de la matière fécale
 ou agit à l'égard de ces ouvertures, comme nous
 avons dit qu'il fallait agir pour la brûlure de
 l'urine et cela jusqu'à la cicatrisation parfaite.

Lorsque la brûlure affecte le gland l'orifice de
 l'urètre on introduit une sonde de gomme élastique
 si elle affecte l'orifice du vagin on appliquera sur la
 partie un tampon de charpie.

Les plaies fréquemment et survient de l'ordre aux membres
 à la suite de brûlures soit au bras à l'avant bras
 à la surface palmaire de la main soit à l'arrière
 avec l'abdomen et les articulations peuvent aussi adhi-
 rer entre eux par des brides.

Le sang peut être fourni par
 leur longueur, à leur profondeur, aussi différemment
 lorsque les brûlures ont peu de hauteur.

ou parvient facilement à leur hauteur d'air, et de longueur
 les parties à leur état naturel comprimées et à l'urine
 si ces brûlures sont profondes et longues cela devient
 difficile car il ne faut pas que les coupes différentes parties
 aient toutes qui se trouvent en leur intérieur. g. g.

88.) soit par moyen mécanique arbor forts sont
nécessaires pour ramener en partie à leur état
naturel mais c'est nécessaire & le remède
graduellement. Crainte que l'extension & dringue qu'ils
pourraient causer ne donnaient lieu à de graves accidents.
L'opération existe l'on b. dringue & dringue sont com-
munes et peu étendue ou peut le réduire par une
seule aspiration mais si elles sont nombreuses
et d'une grande étendue & est convenable de les
opérer en plusieurs fois car il pourrait survenir une
convulsion et on a vu cette opération produire
le tétanos chez certains individus.

lorsque le tétanos est un peu étendu & qu'il est dans le
dringue il faut mieux abandonner la main &
malade & telle quelle est que de l'opérer ces tétanos
et si elle l'incrimine & il vaudrait mieux se faire
d'amputation mais dans tout cela il faut avoir
égard à l'état du malade à ses occupations & à
son âge.

9.9. soit tout le doigt & le trouvant agglutiné le
un au autre si le dringue est long et haut
la dissection n'en est pas très difficile & faut faire en
collatéraux lorsqu'il est agglutiné par les muscles
surface, la dissection est dans ce cas peu haute, et la
dissection est difficile car - la dissection aura
de la dissection de ce dringue qui y sont agglutiné &
L'opération est difficile. Les doigts sont rétractés en arrière, on a
peu à les distinguer tellement qu'ils sont en poche
dans la peau de la main dans ce cas la dissection
de détruire le dringue est très difficile & est très difficile
opération & d'incriminer que d'avantage il faut
mieux si le malade ne peut supporter cette incrimination
envenimé à l'amputation.

Quand aux grandes brûles & adhésions 89
de la Cuiffe avec l'abdomen, celui qui se fondent
au creux du jarret et le reste de l'ectat
especie il faut saboie le ramolir par le Cataplas
mer eskubien de devant emolient et par le bouctoy
Simple apres avoir employe ce moyen il
faut allonger ce docteur en appliquant ale
partie opposée de report qui contre balance
l'atraction de viselle fléttis pour qq. fois ce
moyen employe pendant 3 ou 4 jours suffisent
pour remplir le but qu'on se propose. Si non on coupe
le docteur en travers et on en fait fait la
resection.

Lorsqu'avec le tendon il s'ouvre des vaisseaux et des
nerfs assez considérables couvrir avec le bled
ou le baume d'entièrement ou si y a des raisons
pour cela, on pratique l'amputation d'un membre
les ulcères ou brûlures sont de sang tout jours
accompagnés d'une abondante suppuration est
pour cela qu'il faut que les bords soient fréquents
et qu'il ne faut pas découvrir la partie d'rules, tout d'une
même main bien par ay de découvrir une partie
lorsqu'on a deussi celle primitivement découverte
Si l'on apperoit des portions de tist cellulaires qq. q.
ou les calciers pour porter la resection jusqu'au
vis si c'est en est ou amoserable partie de vis tée
Je vis de Rk.

A l'intérieur on administère le amer et enguie
al le bois de tougner si le malade de trouve
affecté de diarrhée on peut lui faire prendre du
Cachou assouie à une petite quantité d'opium.

90) On soutiendra les forces du malade par un régime
analectique. Il ne faut pas craindre que le
corps se refroidisse par la perte du sang. Et tout le corps
se trouve brûlé et paraît que le malade change d'ou-
vert de position. 1.° qu'il ou est obligé de se lever pour
pas de sangler à l'aide de saignée et faut que
les saignées soient larges et mal placées et s'efforcent à la
suite de ces grandes saignées que le malade se
coube à une emaciation extrême à l'ouverture
de la Dame ou ne trouve aucune lésion dans les
organes intérieurs.

Après avoir parlé de la brûlure, de la gangrène par
brûlure nous allons examiner le effet que produit
le froid ou autrement ce que est que la congélation.
On peut le gangrène produite par le froid.
1.° que le froid occasionne la gangrène il faut 1.° que
le froid soit très intense, 2.° que son action soit
assez longtemps prolongée, 3.° il faut aussi que la partie
affectée se trouve éloignée de centre de la circu-
lation, toutes choses égales, le effet sera d'autant
+ fâcheux que le sujet sera + faible et dans de condi-
tion favorable à la réaction intérieure et que
cette partie sera + exposée à son contact et qu'elle
y sera + accoutumée, lorsque le froid n'est que modéré
et a été à 1 degré pour la congélation est rare, si
il agit par un sujet très faible, si son action
n'est pas très longtemps prolongée il y a seulement
l'épaississement de la peau ressemblant de la cap-
sule, ou sensation de liquides dans les vaisseaux
situés à la superficie du corps, ressemblant des
liquides de la circonférence au centre, ralentissement
de la circulation et diminution de sensibilité et
de la contractilité.
Bientôt après le cœur est vivement excité par

La grande quantité de sang qui s'y porte, &c. (91)
Contracte fortement et le sang est peuplé avec
+ ou - d'énergie du centre à la Circulation
la peau en reçoit en même temps une grande
quantité de chaleur que le sang certain il se
gonfle rougit et fait éprouver une chaleur et
un pincement + ou - fort. la possibilité et la
contractilité se raniment et les fonctions inté-
rieures s'exécutent avec + d'activité on peut inférer
de là que chez un sujet fort le froid agit + et
comme tonique que l'opium débilite
Lorsque le froid est + intense et agit + longtemps et
sur un sujet faible ou débilité par q'q' maladie
par des écarts de régime par de longues privations ou
des chagrins ou de la même d'un froid au
premier degré il y a d'abord refroidissement de la peau
d'écoloration inerte d'arrêt de condensation des liquides
refroidissement des Capillaires refoulement de l'humour
de la Circulation vers le centre ralentissement
de la circulation et diminution de la sensibilité et
la contractilité ensuite le tegument prend une
couleur violacée et si le froid continue à agir la con-
tractilité s'affaiblit + et l'action du cerveau et du
système nerveux s'affaiblit le malade éprouve une
propension insurmontable à l'inertie et au som-
nolus qui paraît dépendre de la base du sang dans le
cerveau et dans les poumons toutes les forces vitales, soit
de la vie organique, soit de la vie de relation, après
avoir été affaiblies s'éteignent peu à peu et
l'acte de la division aléatoire de la périphérie vers le
centre et enfin l'extinction complète peut se
faire à l'extinction successive de la vie dans
les divers organes.

2. q'q' l'action du froid ne se fait sentir que dans la
partie éloignée du centre de + grandes toues

92) du Commande Couret & de plusieurs lettres de
main les pieds sur le visage, q. q. fois
une partie de la langue le froid agit de part
-trez vivie de la vie et un par l'été ainsi
dit on prouver que lors que le froid agit
gaugne et que de l'hémorrhée éliminer
très compatible avec le force vitales de l'individu
l'opent. et l'hémorrhée l'aut pour que produit
de satisfaction, tant que en l'hémorrhée
à tout point par on ne peut point espérer de
Conserver la vie de l'individu et la vie de la
partie éloignée de ce centre. Des grande fonctions
de l'opposition que je veur d'enlever sont
général et peuvent exposer q. q. exception.
J'ai dit que le froid pour produire la
gaugne soit en fort et long temps du long
et qu'il porte son action sur un individu
faible. il peut arriver. qu'un individu fort
succombe et qu'un sujet faible résiste au
froid intense
Si un individu met du mercure dans la main
à une température très basse il survient une dou-
leur profonde excessive brûlante = celle que
pro duirait un fer rouge si on ne s'en de-
barrait promptement une gaugne pourra se
Développer jusque spontanément un individu
faible. et que + ce même individu se prend
en hiver au bain de glace et en sortant se
Promener en air libre sans inconvénient il en
est qui n'en souffrent pas même pendant leur
Sommeil Comme il en est ainsi qui sont très
semblable au froid
Le degré de la congélation se déduit
de circonstances antécédentes ou

Commemoratives, l'inspection de la
partie gelée en quelque tantôt froide & bleu
lors tantôt froide & d'un rouge livide à sen-
sible et sans mouvement + tard au phéno-
mène de la satisfaction se déclarent le
prognostic que l'on peut porter sont encore
variés suivant le degré de froid le temps qu'il
a exercé son action et suivant l'importance
de la partie gelée et l'état de l'organe
de la circulation, de la respiration de la
sensibilité et enfin suivant le degré de force
de l'individu, le pronostic n'est ni difficile
dans certains cas on peut presumer que
l'action du froid a été superficielle tandis
qu'elle a été portée bien + loin il est en gé-
néral très difficile de porter un pronostic juste
au moment on l'a et appelle Cas il peut
varier suivant l'état du malade et le traite-
ment qu'on lui fait subir il est vrai aussi sui-
vant que l'individu est tout entier gelé ou qu'il
est sujet à une congestion du cerveau ou affec-
té de q. q' anévrysme Car j'ai dit très-bien
ment d'usage se faisant de la circulation
au centre il pourrait dans ce Cas qu'il résul-
ter de fortes gravés inconvénients.

Le traitement de la congélation a été va-
rié pour occuper après son diagnostic et son pronostic
On a comparé un membre gelé à un joint ou
tout autre joint gelé dans un deux corps les
vaisseaux sont resserrés le fluide condensé
ou peut être à l'état de glace le joint comme
le membre est exposé à 2 ou 3 degrés au-dessous
de zéro les vaisseaux se dilatent reprennent

94) leur fluidité et peut être leur état naturel, mais
si duevotraire les exposer brusquement
à une température vive les liquides se
résifient rapidement. Prennent un volume
considérable déchirent les vaisseaux, s'épan-
chent et le fruit ou le membre se trouve déso-
rganisé.

Si le froid agit sur une partie de l'étendue
telle que le pied ou la main et que les autres
parties continuent à exercer leurs fonctions
il faut le donner à un traitement d'abord
local plonger la partie gelée dans un
bain d'eau froide, la frotter avec de la
neige ou de la glace pilée on peut aussi
employer le vin froid l'eau de vie mêlée
avec l'eau, la neige ou la glace lorsque
la partie commence à rougir et que la sensi-
bilité se réveille. il faut employer les mêmes
topiques mais faire le friction avec
de vivacité lorsque par le docteur la rou-
geur de la partie on reconnoît que le
liquide se rarefient et que les vaisseaux
reprennent leur effort alors on emploie
de l'eau froide et lorsque la circulation
est entièrement rétablie on couvre la partie
de camphre imbibé de vin aromatique
ou d'eau de vie Camphrée ce topique qu'on
l'employé doit et avoir pour but de rendre
le ressort aux vaisseaux et de faire dis-
soudre l'echimon qui existe ordinairement
sur la partie gelée
Lorsqu'une personne gelée est plongée

(95)

dans un engourdissement général et
quelques jours encore. il est très important de
la tenir d'un bouillott qui la conduirait à
la mort. mais souvent elle résiste avec effort
Cel fut Solander qui recommandait aux
matelots de ne point s'arrêter en disant cela
celui qui s'arrête s'en dort. et celui qui s'en dort
périt, il fut puni le premier. et il demandait
seulement 5 minutes ou velez lui accorder pas
Car il aurait succombé le principal d'utile
atteindre dans ce cas est de faciliter la
respiration et de rendre la circulation
libre lorsque l'engourdissement existe. une
pluie au lieu de la chaleur dans un
lieu à une température de zéro ou le garde de
Dessous le lit. dans lequel on le couche et d'ap-
procher q. q. corps échauffés on Commencera
à frotter sur les membres de spiritueux avec
de l'eau ou de la neige et ensuite on en
fera sur la région épigastrique et précor-
diale l'abandon sera d'une flanelle
simple ensuite on s'imbibera de vin ou
d'eau de vie aromatique lorsque le cœur
Commencera à battre. on fera prendre au
malade q. q. cuillerées de vin généreux
ensuite on fera usage de cataplasmes toutques
et froids on les emploiera tiéd. lorsque
la circulation sera entièrement établie on
soutiendra le foyer du malade par un régime
analeptique ou a - ment conseillé lorsque
l'individu s'éveille de la douleur de

26) Ployer la partie dans l'eau froide et la
pendant une $\frac{1}{2}$ heure ou une heure & une
fois dans la journée les personnes gelées qui
risent ou qui piquement de cet état ben-
gnoisement de la peau. on observe cet état &
souvent chez les sujets qui ont eu avec eux
de la liqueur spiritueuse. ou qui ont l'estomac
chargé d'aliments solides et s'en suivent
succombent. Presque constamment
à l'ouverture de leur cadavre on trouve
souvent une infiltration sanguine au pectoral
ou au Cerveau. q. q. fois on trouve dans
l'épiderme dans le ventricule du cerveau
lors que le froid par son intensité a été
traitement peu méthodique. qu'on aura mis
en usage. donnera lieu à la gangrène, l'écarré
en sera sec & blanc. ou jaunâtre & au
elle deviendra humide. noircie à mesure que
la partie s'enflamme et se déquiescent que
l'épiderme sera détaché et se soulève par
la bristite qui sera émanée ou jaillie
fuite du sang adieu.

Lors que mal y a l'emploi de Bojique froid
et rigoureux si les gangrènes survient et est
Couverable en faveur de la dévotion de la
Circulation par le Bojique doux que
que le vin généreux le vin de H. K., et le
gentiane l'eau de vin N. si l'usage tran-
-voit trop intense ou qui est rare au dysen-
-voit le simple ou excite et au traite-
-voit comme simple tumeur qui résulterait de

La chute de l'escarce que q. q. com. 17
ulcères ne se présentent. & d'ailleurs en
ulcères sont de nature atonique; alors on
recourt aux topiques excitans, tels que
le vin mêlé, ou le vin aromatique; ou
en vin avec en général
Lorsqu'une grande partie d'un membre est gangrénée
on attend que la partie marquée de la chute
en partie saine et celle qui est gangrénée
de nature ne soit l'amputation et de la levée.
à - que le malade ne soit trop faible. Pour supprimer
l'oppression alors on coupe d'au - les parties mortes
et on applique sur celle qui doit être de topique
abstrus, aromatique et antiphlogistique. ou d'une
tertière à l'intérieur ou fait de bis au malade sur
régime analéptique. Dans les derniers cas on a à crain-
dre une hémorrhagie après la chute de l'escarce, c'est
pourquoi il est utile de placer à demeure un tourmiquet
ou un garot. Pour s'en servir on se sert de la corde lorsque
l'escarce est tombée et la plaie est régulière on cherche
le moyen de la cicatriser. le + simplement possible
si le car contraire existait et que le malade fut + fort
ou pourrait pratiquer l'amputation qui serait d'une cer-
taine danger.

Les engelures ont en général une tendance à se terminer
par gangrène c'est pourquoi nous ne parlerons en faisant
l'histoire de la gangrène.
Les engelures présentent le caractère d'un ulcère hémorrhagique
une infirmité de caractère chronique. cette infirmité est
superficielle puriforme + on régulièrement vicieuse
c'est elle est produite et entretenue par le froid et le contact
ordinairement. le doigt de la main ou le talon
le reste q. q. fois de nez et les oreilles cette infirmité se
termine par résolution avec inflammation, d'autre
fois par ulcérations précédées de suppuration et de

99) le gonflement qui les accompagne est en général considérable, mais la douleur n'est pas en rapport avec le gonflement de la partie affectée d'engelure c'est-à-dire partie est d'un rouge obscur, violacé, qui s'irradie par la pression. La douleur peut varier relativement à son intensité en général elle est prurigineuse et augmente par le froid très vif ou par l'application de neige et du sel. On se rapproche de la partie d'un réchauffement très modéré. De chaleur dans la partie affectée d'engelure, vient par un moyen approprié à l'usage général de la partie.

Le rhume récidivant est d'engelure de la face le sexe féminin, le tempérament lymphatique, l'épaisseur et la sensibilité de la peau, la perspirabilité et la transpiration cachectique et copieuse, et l'eczéma les engelures se manifestent ordinairement à la fin de l'hiver ou au commencement de l'hiver, rarement elle se conservent en été lorsqu'un individu a été affecté d'engelure et qu'il présente les mêmes causes récidivantes, rarement les engelures sont de nature récidive.

On reconnaît pour cause immédiate de l'engelure l'action vive du froid une atonie locale ou une faiblesse de la circulation de la peau et de liquifier l'eau les capillaires et le défaut de réaction de la peau, on résulte que pour les prévenir il faut éviter d'exposer la partie qui y sont. Sujettes à l'action du froid et aux différentes causes d'insensibilité des solides éviter de se laver les mains dans de l'eau chaude, ensuite il faut fortifier la partie faible, ou recourir à cela par des frictions de beurre d'aromatique. qu'un cataplasme sur la partie ou peut aussi les laver avec de la glace pilée, de la neige, de l'eau vinaigrée ou alcoolisée. Certains personnes conseillent de les laver avec de l'urine mais le moyen est dégoûtant et inefficace que ceux d'autre nous avons

Parti on peut encore employer avec avantage (99)
le sulfate de zinc. tel que le sulfate de soufre
le sulfate de zinc. le sulfate de pot. & est résolu en eau
quelque fois les angélus sont au 1^{er} degré il faut
employer. Pour moyen curatif. le moyen préservatif que
nous avons eue, avec la différence que lorsqu'on le
employe sont une fois prononcée il faut le employer
+ souvent. et a forte dose au 1^{er} degré de angélus on
a conseillé. de l'acétion après souvent. répétée avec
de l'essence de résineux. d'alais de d'essence de d'essence
on ne l'ot employer en moyen que lorsque la douleur
est tout violente Car si la douleur est vive on a conseillé
l'opium aux topiques. touchez ou sent de même employe
une solution d'acétate de plomb ou d'autre préparations
de plomb. on a encore. conseillé de couvrir. la partie de
Cataplasmes faits avec la pulpe de rane. ou de navet puez
sur la cendre.
Si une ulcération se développe il faut la cicatrifier
Promptement si un membre est affecté on lui fera lieu
de repos. et on lui donnera une position hoisbon-
tate et on exercera d'au tout son étendue. une
Compression méthodique. Pour favoriser l'action de
Capitaines. on peut appliquer sur l'ulcère de la boucane
oxigénie étendue sur de la charpie on peut faire la même
emploi. de l'essence de safran. on a aussi avec l'essence de
roses on a encore conseillé d'interposer le cautère oblique
et une vive inf. dans la partie et la cautérisation
objective peut différer suivant qu'on expose la par-
tie à un feu clair. ou qu'on le produit par un charbon
rouge ou un fer rouge. et ne faut souvent pas
Cauteriser assez fortement pour donner lieu à une escar-
On a aussi employé l'essence de styracé le de l'essence de safran
le de l'essence de fievreventi et celui de coumace de
le d'essence de safran et celui de safran mélangé avec de
le d'essence de safran et d'huile récente a été utilisé en 1750.

100) et craint auart uou a beau s'aper alogangrene
Par maladie organique. du cœur ou d'un gros vaisseau
C'est gang. survient en général chez les sujets avancés en âge
et pendant ou la mort d'un individu assez jeune, si l'on veut
elle survient à 33 ans. avois une gang. au pied causée par l'aneurisme
Du Cœur il est assez facile de reconnaître cette gang. par l'aneurisme
et l'écoulement de sang qui s'en suit. La maladie
du cœur. ou de l'aorte cependant ont la vie est terminée par
l'aneurisme a une artère d'un membre. mais cela est rare. sou-
ventement cette gangrene attaque les parties éloignées du centre
de la circulation mais cela est rare. couramment cette gangrene
attaque les parties éloignées du centre de la circulation
mais elle affecte + souvent. les extrémités des membres infé-
rieurs que celles du supérieur elle est de la nature des gang.
secher. q. q. f. elle est. humide. d'au ce caractère dépend de la teneur
des liquides. d'au la partie trop affaiblie. q. q. f. cette gang.
est dresqu'indolente d'autre fois elle produit une douleur
intense. elle est couramment accompagnée d'écoulement et d'ir-
régularité du pouls q. q. f. surtout de progrès rapides. d'autres
fois elle est stasionnaire elle est toujours suivie de la mort qui
est l'effet de la maladie qui l'a produite en empêchant au sang de
Circuler dans la partie affectée.

Dans cette gangrene l'indication est facile à concevoir mais elle
est difficile à remplir. Il est clair qu'il faudrait avant tout rendre au
Cœur ou au vaisseau son état naturel. et l'on ne peut remplir ce
indication d'ailleurs et le sujet est fort et qu'on lui fait l'indication
de l'écoulement de sang qui s'en suit. La maladie
du cœur. ou de l'aorte cependant ont la vie est terminée par
l'aneurisme a une artère d'un membre. mais cela est rare. sou-
ventement cette gangrene attaque les parties éloignées du centre
de la circulation mais cela est rare. couramment cette gangrene
attaque les parties éloignées du centre de la circulation
mais elle affecte + souvent. les extrémités des membres infé-
rieurs que celles du supérieur elle est de la nature des gang.
secher. q. q. f. elle est. humide. d'au ce caractère dépend de la teneur
des liquides. d'au la partie trop affaiblie. q. q. f. cette gang.
est dresqu'indolente d'autre fois elle produit une douleur
intense. elle est couramment accompagnée d'écoulement et d'ir-
régularité du pouls q. q. f. surtout de progrès rapides. d'autres
fois elle est stasionnaire elle est toujours suivie de la mort qui
est l'effet de la maladie qui l'a produite en empêchant au sang de
Circuler dans la partie affectée.

Voyez de la gangrene p. 116 et 117 de la page 116.
qui dit. L'ajouté de la page 116.

qui s'avisoient tout infiltrés de sang pur flâne
 102 / q'q' fois coagulé et c'est cette coagulation que
 l'on dit Courcier comme l'on dit l'écume de la
 cette gang. le vers sont les parties qui restent
 + l'ongle est de qui explique le docteur n'est le
 respect le malade pour les parties affectées et le docteur
 générale q' il ignore n'est pour toute l'étendue du
 membre.

On n'a point de moyen spécifique pour l'apoplexie
 cette gang. mais tout traitement est factice et les
 facile d'abord une ou rigueur en l'opération de la
 Région précordiale le miel d'abeille avec le K. K.
 le vin quereux et la Camphre.

Lorsque cette gangrène est survenue on cherche à l'arrêter
 les progrès par les directions de K. K. à haute dose. les respectueux
 de l'ingratitude. le miel le camphre et d'opium qui agit
 comme tonique et dissimule le Douleur. qui tendent à
 affaiblir le malade on se sert d'employés à l'extérieur et
 comme tonique on emploiera aussi comme tonique de
 Cataplasmes faits avec le jus de K. K. et le vin aromatisé
 q'd le vin aromatisé lui-même le vin de miel. les
 résineux.

Lorsque l'écume de sang ou recouvre l'alcère doucement
 tirant étendu sur du linge charpie rarement on se contente
 l'amputation Car on est obligé de l'arrêter avant qu'il
 il y aurait eu l'écoulement et l'amputer avant qu'il y
 Car il faudrait amputer très haut et le malade n'est d'usage
 à l'usage est très faible pour supporter l'amputation il est un
 autre espèce de gang. appelée gang. de l'écume
 elle est abaisse ordinairement les gang. de l'écume
 ne fait que de l'exercice qui le corrige de l'écume
 saleuse cette affection est assez rare elle a été observée par
 Jean Brog par son mari elle s'écoule au lieu de l'écume
 par le gang. de l'écume de l'écume de l'écume de l'écume
 diffèrent sont ont relativement à leur Cause.

La gang. de l'écume affecte le membre inférieur
 elle peut commencer soit le pied ou par la jambe les malades
 de qui en sont affectés éprouvent un loignement dans
 l'écume de l'écume de l'écume de l'écume de l'écume de l'écume
 q'q' fois il y a coagulation de l'écume de l'écume de l'écume de l'écume
 Corps en suite on aperçoit sur la jambe ou sur le pied des
 taches d'un rouge obscur. certaines sont douloureuses ou
 insupportables elles peuvent rester stationnaires, d'autres
 finir elles paraissent comme d'écume de l'écume de l'écume de l'écume
 qui ont été de l'écume de l'écume de l'écume de l'écume de l'écume

Certaines idées de l'abus d'étendant en longueur et d'indigestion
les parties latérales tombent en mort, et l'air et le sang se
sont coulés par le trou de l'oreille, et le malade qui suit
à cette fois avec un trait de sa main voit. Je n'
augmente point. De la largeur et de la profondeur, la fièvre sur
vient de douleurs violentes de plus de deux jours de l'écoulement
qui est affecté le malade s'affaiblit et s'accroît
et d'une fièvre putride le pronostic est de cette gang.
est ager, plus le sang que celui de la gang. Seule
la gang. guérit par le saignée si elle est
grand nombre.

On a Coes siles comme moyen de réserve de cette
gangrène, l'exercice, l'habitation de la Campagne, l'usage
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.

Lorsque la gang. est devenue au commencement de
développer une fièvre rigoureuse et indigestion de sa
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.

de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.

de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.

de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.

de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.

de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.

de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.
de l'herbe de sainte marie ou de la plante de la gang.

et la évacuation d'un aspect de l'écoulement de la
 malade.
 On emploiera le topique d'indan ou fongez regardant les
 malades avec du suc de brouet de citron de levins
 nielle ou emploiera fréquemment la distillation de Cochlearia
 de rapport de grande de montare. dans certains cas on
 emploie aussi le Camphre et la résédaire et le N. A. un gerga-
 risme et a été et celui formé avec l'acide sulfurique.
 originaire les vin nielle. et d'eau, la quantité de l'acide sera
 relative au degré de la gangrène on peut l'employer jus-
 qu'à la dose d'un tiers et même d'un quart. Si le malade
 le boyaux se courag, trempes d'eau et Gargarisme, un suc de
 de chair et le proceur. Soit le gergisme. et du jus de
 il faut aussi couler le malade et soit le côté pour qu'il se saive
 couler nielle on d'ent. culver. le sear ou le lamb eau gangri-
 teux avec des éiseaux courbes par le flat. au u. et d'ama-
 paise le vis de dent. d'hemorrhagie si elle s'avouait on emploie-
 rait les abstruseur. et les autres estiques qui peuvent
 aussi servir. à retarder. la chute de l'escar rarement on
 emploie la feu il faut que le moyen qui nous venons
 d'indiquer aient été inutiles auparavant. dans le gargarisme.
 l'acide sulfurique et celui que l'on servoit servir en cas de besoin
 lorsqu'on employe méthodiquement ce moyen et qu'on a le
 courage d'approcher les malades on doit s'en servir un grand nom-
 bre.

La gang. scorbutique des gencives, on jouse, de les enfans
 affecte ordinairement ceux qui sont encore à la mammelle
 et jusqu'à l'âge qui s'y parait. et la d'entite on elle
 attaque fréquente dans les autours et les hies. hémides
 q. q. f. elle survient au début, mais presque jamais en été.
 Les causes qui peuvent la produire sont faciles à trouver
 d'abord la venue de l'enfant de sa mère le même
 mais on le mauvais nourriture le jeu de sa vie de
 l'oprot de.

Cette gangrène peut affecter un individu d'un âge avancé
 elle est déterminée par le même Cause, l'auvies et à
 observe à vieilles.
 Voici les phénomènes qu'elle présente, le enfant est d'abord triste
 pendant q. q. jour le sang se desolore le chair de sa-
 rent flasque leur denture se dyslise. le gerg de viennent hor-
 reux charniers q. q. fois lauroyans, l'haleine est fetide, ainsi
 que les évacuations alvines et urinaires il y a un affaiblissement
 point de daches e scorbutique.

106) Au d'aut d' 27 a 8 jour paroit la force de la gencive les
 vers ou vers pour du tactu d' une rouge obscur qui s'unit
 Deviennent d' la chair en une de a petites elle s'enviroument
 Et d' une oreole enflammée de un rouge tache qui amouvent
 un uiff. Dilatée flauet superfielle tantot s'élève, elle peut
 attaquer le voile du palais et aller jusqu'à la barrière de la
 jusque tout ou le levier se gonflent. Le usage de vin
 Tomateux d' haleine est fatal. On s'ent s'élève de vient
 q. q. sujets ou avec ce tactu d' un d' la maxillaire inférieure
 qui a été attaquée de Carie ou de necrose q. q. fois. Le p. ut malade
 et d' long d' avec une atonie excèsive une diarrhée colliqua-
 tose survient, les matières sont fortées en suite malade
 succumbent cette affection n' est guérissable par ce traitement mortelle
 On peut guérir le malade lors qu' on recouvrait et qu' on traite
 de 12 ou 15 heures. Cette affection, les magne prophylactique, ne sont
 par nombreux sont. cette gang. scorbutique il faut d' abord.
 bien nourrir l'ind vidu et le venir dans la grande dose de
 Lorsque cette gangrene est survenue il faut se servir de la malade
 d' la veine au d' la transporter dans un sac de l'air aéré chaud
 et se ou le feru couvrir. Les arom. stantes aromatiques, ou la lavure
 Lavore son Corps avec de l' eau vinaigrée ou de ounera
 d' intérieur de l' air par amener la déviation de H. Agri.
 et la meilleur bouillie. La limonade d' orange de l' air par
 avec de l' alcool ou avec adition de vinaigre ou
 fra gargariser. fréquemment le malade avec le gargaris
 me sont visés. On s'ent d' la ou se servir d' un
 l' un maypau de charpie qu' on se ounera d' chaque
 l' ansement et on se ounera d' sur le partu malade
 s' il y en a q. q. d' ambre ou gargaris ou les coupera avec
 de l' cirage mou ou vitre le vis point d' morhe-
 gie. Si elle survient On emploiera le d' abstringens
 les styptiques ou en fait le far rouge ou s'ent de
 de l' pièce au cou pour qu' d' en fait n' avale de
 La partie ou le couvrera sur le côté et feraient
 d' tenir sur le gougou s' il était possible, la tête
 fêchée la caduque et rarement employé q. q. fois
 ou d' employé en lavement le H. et d' ou s'ent
 ceux affectés de fièvre subite.
 qui ont sajo...

et sans aucun examen de la gang. par le sieur ergote
et avant avoir dit sous le quel est que l'ergote
lui même. L'ergote est une altération
d'où vient par les sieges ont observé rarement dans les
autres grains et les grains qui présentent cette alté-
ration et est adieu les grains ergotes sont d'abord
un violacé qui se voit sur le côté d'un il existe
enfin le volume et les dimensions des tumeurs saines
les grains sont long et à q. ligne ils sont ridés et
recourbés en forme d'ergote leur surface est in-
égale et toujours ils présentent 2 ou 3 ou 4 rainures
la partie du siege ergote qui sort de la saule est arrondie
et se voit fendue on y voit souvent une petite racine
la partie opposée du grain est saine les grains ergotes
se brisent facilement leur substance est molle et que
celle de saine saine en un court instant peut se guérir
cette affection n'est point contagieuse. q. q. grains sont
ergotes d'autres sont sains

Le grand nombre des auteurs ont attribué l'ergote à
l'action longue et prolongée de l'humidité d'ailleurs à
provis qu'elle a été produite par une petite achenille que
de chaleur jointe à l'humidité de valloffe? Gradpan. Douv
La nouvelle secale du quignon ou appelle cette affection
du grain au fauce d'hercorum, d'ble foveille, siege
hyvre, d'ble thapre, le teneur léger et d'ble uenp d'as
et humidité froide et chaude, humidité. sont ceux qui
présentent le 4 d'exemplar de cette affection.

Le sieur de la gang. par siege ergote ont été observés
à la rage. en 1697. en France en 1690 en Allemagne et en
France en 1709. et en 1716 en Saxe en 1684 en a encore
été observé dans d'autres contrées de l'Europe.

L'ergote a donné une description exacte de cette
gangrène voici le phénomène qu'elle présente une
L'ergote générale au commencement de froid dans
les extrémités qui sont saines et redoublent leur
belle et engourdie le malade éprouve une douleur
vive et notament dans la partie affectée la chaleur
augmente cette douleur elle diminue par le froid
et se fait sentir dans les pieds
dans les mains, et même dans les membres

108 / Spracelle s'en empant les parties de desfectant et
sont le sejourant par du corps, elle sont l'au
hemostasyie le malade s'acroit de bascu et de
ostite. Dans les os et de la doigts dans le grand
dans ceretous de la langue. le reste du corps ne s'en
resert pas, seulement il survient dans la partie malade
un chaleur febrile le malade fait un sommeil

trouble par desiev & inquietant les secours sont
coppes, et, les medecins qui ont mangé l'end
dans fait avec le siegle ergote s'provoient seule-
ment un sentiment de je ne s'aitent dans la tête
comme une espee d'ivresse, asy font au remplie dans
ce cas avec asy de sucie (le vomitif), les
decompression les cordiaux, le sudorifique, les
Cognique spiritueux.

lorsque cette gangrene est d'ieu et allie on con-
vra la partie malade de digestif ainsi de l'acides
abstruigentes & autres syngues, le mercurie de mala-
de. Constant est la même autens. dans la diva tite
de du vin. et des alimens indigestes. et a l'liqueur le malade
de l'humidite, cette marche est de second main s'provoit
qu'on a comin une erreu en courillant les decompresions
et se referant le vin lorsqu'on ordonne les cordiaux

En 1786. Dans la mede et dans le sacre le siegle ergote
a produit de malade un tres grave agin la mesison
l'equieme, a remarque que les habitans de son village
et de ses environs marcegeus en étaient affectes, que
les habitans de la ville ceux qui en sont affectes, que
vent une de raton vint, et s'unique de froid et de quelle
succed, un chaleur acre, un malade, ils s'provoient au
de palpitation violente, & s'en sont attaqes d'ivresse
de delire, d'autre sont plongé dans une sommeil

Continuelle la tête est pesante le malade a un
air hebeté la langue est jaune et la langtude est
generale.

Les pieds et la main les Cuir et le d'ne
s'engorgent, s'infent un tout le siegle d'au d'ou-
de qu'isales primable chez q'q. Individus il survient de
de Coasulnon violentes, les axes est semblables

attaque d'inspiration sinon que le malade (109)
averse la connaissance, le malade respire des
sûlement atroce. Dans les articulations ce mou-
vement n'est point continu et se termine au
terminale de l'ouïe pendant lequel le
malade se peut rappeler aux affaires. Les mem-
bres respectent dans la peau et dans les muscles des
mouvements d'ondulation et se développent sur le dos
et sur les Côtés des tubercules recouverts d'une humeur
visqueuse. On remarque sur les doigts des vaisseaux la
peau est sèche et se peut au toucher après le para-
oxisme le malade se trouve l'appetit d'évanouie
qui ne fait que rendre et intense le paroxisme
suivant qui q. q. fois est mortelle, d'autre fois le
malade tombe dans une léthargie tout vit ~~entièrement~~
laquiescent et comme ivre. Lorsque l'absorbant est
entièrement dissipé chez le malade, se trouve des vertiges
des éblouissements d'ouïe, des éblouissements
et une douleur dans les membres et est assez souvent
plongé dans une grande faiblesse et surtout lorsque
le malade a été saigné lorsque le malade
a duré longtemps et survient une diarrhée q. q. fois
solitaire (q. q. fois mortelle) elle doit être combattue par
les styptiques.

Couleur rouge Ou Emploie le Spiritum de
Castoreum l'huile d'Hypericum, le dernier moyen
est bon lorsque le malade est attaqué de convul-
sion. On emploiera le pediluve de l'eau chaude
dans les membres et l'asténie ou emploiera de bon
Rajicaganda et tard le dilay au sang qu'on
joindra les cordons le tartre arsenical, les sai-
gner le sang est coulé dans le Car et de l'huile
Neritator le Castment souvent à l'ouverture des cadavres
on trouve souvent du sang dans les poumons qui
sont enflammés on en trouve dans la doctrine le
Cœur est flasque vuide de sang, le sang qui est dans

110 Les vaisseaux et artères qui se trouvent dans
les boies de l'œsophage au foie et à la rate cette affection
qui vient souvent de derrière a beaucoup d'analogie
avec la fièvre atonique qui peut régner en même
temps qu'elle. Un vilageois du maine mangea du pain
fait de seigle ergoté et d'auant l'espace d'un mois lui
et sa femme et deux de ses voisins moururent. Ce fils en avoit
tout mangé un seul qui étoit à la nouvelle sur-
vie mais tomba muet, et brisé d'une jambe dans
à huit denies qui régna à rebout orgie la gangrène
plète des mains des jambes, le fut souvent prise
de d'engourdissement de doalcafé ils s'applacé-
ment légèrement sans danger. Le professeur
et d'avis de chez d'autres rivières étoit affectée de
Certains individus, chez d'autres la gangrène comme dit
par l'intérieur des membres on a vu de individus
affectés de cette maladie, de cette gangrène on en a vu
d'autres succomber

à Guérison curative vous dicté de ord de débarrasser
les premières voies, de les évacuer par le jeûne, la saignée
qui est le vomitif le - affaiblissant et est tel que il
seroit que le masade l'abstinence de la saignée de seigle ergoté
est ensuite on emploie le même traitement que si la
gangrène seules, toniques et l'intérieur et extérieur d'ap-
plications de l'escaudé par digestif animé si l'escaudé est
profonde on attend quelque soit curie pour recourir
à l'amputation lorsque le malade est trop faible
ou veuse que seulement la partie gangrénée on abandonne
celles qui restent.

Le raphanus, raphanistrum peut aussi comme nous l'avons
dit donner lieu à la gangrène elle est parfaitement semblable
à celle que nous venons d'examiner.

La tumeur maligne
La tumeur maligne est une affection essentielle

agriculteurs on l'observe fréquemment dans les plaines, où on
a vu un grand nombre de bestiaux et dans les ~~landes~~
où qu'on amène en grande quantité pour la consom-
mation journalière, on l'a considérée comme épidémi-
que dans la Bourgogne, dans la Franche-Comté.
La pustule maligne a un caractère qui la distingue essen-
tiellement de toutes les autres affections gangréneuses, c'est que dans
la 1^{re} et 2^e période elle est une affection locale au lieu
que les autres sont presque tous générales.

Ces causes de la pustule maligne, sont les suivantes et elles
ont toujours été produites par le contact ou l'inoculation d'un
infecté. Elle se développe dans un animal extrêmement
fatigué ou affecté de pustule maligne ou de
maladie charbonneuse ainsi elle survient souvent
lorsqu'une goutte de sang chaud de bœuf ou de vache
ou de mouton fatigué, par une longue marche, tombe
sur une partie du corps, on la voit il y a 9. 9. années
attaquer les brouettes des invalides après avoir tué des
bœufs qui ne présentaient aucune trace de pustule
maligne, mais qui avaient marché pendant long temps,
la viande de ces bœufs mangée par les invalides n'a
produit aucun accident chez ceux qui l'ont mangée
de la viande de ces animaux, la produit par le contact
de la pustule maligne, quels effets résulteraient donc de
son inoculation? le contact ^{immédiat} du sang de ces animaux
peut donc produire la pustule maligne, les mouches
peuvent aussi la produire si elles nous piquent aussitôt après
avoir sué à même sang; il paraît que l'haleine des
animaux affectés de pustule maligne y agit immédiatement
sur la peau peut aussi lui donner lieu ainsi que le contact
de leur déjections ou de leur chair après leur mort ou
9. 9. jours après leur mort, il n'est pas démontré que cette
affection survienne si promptement chez les hommes.
La pustule maligne se différencie relativement aux
causes qui la produisent, mais elle se différencie relative-
ment à son siège les parties qu'elle affecte et souvent
sur la main les avants bras, le pied.

112/ Les jambes, le col, le visage elle affecte même de
 préférence cette dernière partie il n'y a ordinairement
 partie affectée qu'une seule. q. q. fois il y en a 2 ou
 un + grand. nombre lorsque affecte le visage elle
 peut intéresser différentes parties tantôt elle affecte les
 deux lèvres tantôt les saupières alors il est rare dans
 ce cas que le globe de l'œil ne soit affecté de gangrène
 La pustule maligne diffère encore relativement aux
 érysipèles de l'année ordinaire de se développer en automne
 surtout lorsqu'il est humide. on l'observe fréquem-
 ment pendant les été humides. lorsque l'humidité
 est très grande les progrès sont rapides et elle
 se complique de symptômes généraux + fâcheux
 elle peut encore différer relativement à la constitution
 de l'individu suivant qu'il est fort ou faible dans
 le 1^{er} cas il est assez facile d'appréhender son progrès
 ailleurs que dans le 2^o. Car elle prend un accroisse-
 ment rapide et parvenue à sa 3^e. ou 4^e. période
 elle est ordinairement fréquemment mortelle
 si un individu affecté est d'un tempérament sanguin
 et d'une force de l'âge elle est en fâcheux
 d'ord. d'un tempérament bilieux très souvent elle
 se complique d'une large éruption de plaques et de bubo-
 nes des premières voies, d'ord. d'un tempérament
 sympathique et mélancolique les progrès sont
 rapides et les symptômes généraux soit d'ataxie,
 soit d'adynamie, se développent + promptement. Adont
 + Intérieur enaigé et chauffé ont traité de cette affection
 ils ont le 1^{er}. développé la nature d'après ces deux
 auteurs elle présente 4 périodes.
 Dans la 1^{re} période le virus qui donne lieu
 à la pustule maligne a porté son action sur le corps
 réticulaire de la peau 1^o. on voit une tache rouge
 semblable à une piquure d'épingle paraître
 Co usin est à cause de cette ressemblance

119
ou l'on l'a appelle puce maligne sur certain pays.
elle l'ait fait lez yeux & un sentiment de
démangeaison au point insupportable il survient
sur cette tache une Phlicaine de la forme qu'on
peut voir est soulevée par une sérosité transparente
lymphatique ou vitreuse que le tout après elle devient
douce et se détache presque toujours par
le frottement qu'on exerce le malade du côté, lorsque
la Phlicaine est ouverte on remarque à sa base
une petite tache jaune peu étendue et au
commencement de guérison cette tache est de plus
rarement élevée et l'instant où elle se
développe une couleur + foncée cependant elle peut
être sans certain car obscure et même noire.

Dans le 2^e période l'aspect est encore plus
local mais se prolongeant + antérieur cellulaire
et elle affecte toute la peau la petite tache est
+ foncée et + dure elle paraît + profonde de
circonférence et entourée d'un cercle d'inflammation
tantôt élevée et rouge tendu au fond de la
ce qui se manifeste ord^{re} chez les sujets robustes dans
les taches areoles inflammatoires et moins tendues
+ moins colorées alors l'effet est comme d'habitude
et est ce qui arrive aux sujets faibles aux
summes et à ceux d'ouïe d'un tempérament
lymphatique dans cette 2^e période il se forme
qu'il fait une 2^e tache sur l'areole qui finit
alors la base mutante par à être affectée.

D'après
Dans le 3^e période la guérison ne se prolonge pas
à la peau le cercle tendu antérieur cellulaire se
casse au commencement alors on observe des
phénomènes généraux l'escarre gang^{ue} est + large
+ noire elle est aussi + fixe et + profonde à l'areole.

114. Injest très large q. q. fois l'inf. Parait de
 nature nat. D'autre fois elle est ée
 teur et emphisimatus tout le membre de
 1. gonfle si elle attaque le visage. et se forme
 par fluxion: et est q. q. fois ée ée ée ée
 ou emphisimatus. Si on prof. de la partie
 malade ou ne sent point de réaction
 de Phlegmons ni la existence de hémème ou
 de hémiphisime il parait que c'est au état rétor-
 métrane. De ces différentes affectious q. q. fois il y a en-
 gourdissment difficile d'ouvrir les membres inférieurs
 si la pustule affecte le Col les fonctions du Cerveau
 sont gênées si elle affecte la poitrine ou d'abdomen
 c'est sur la respiration que porte son action le
 pouls est fréquent et faible. l'haleine est fétide la langue
 est épaisse elle se couvre d'un enduit blanchâtre q. q. fois
 fuligineux les forces s'affaiblissent par la partie
 malade et dans tout le corps.
 2. Dans la 2^e période les symptômes locaux sont
 bien + fréquents l'écaille est extrêmement large elle affecte
 la peau le tisse cellulaire sous cutané et le
 3. nante profondes rarement les parties environ-
 nantes sont enflées. 4. présentent par une bonne inf. elle
 5. grèvent molles et tendues d'un rouge torréfié et logan-
 6. 7. fœtid. 8. de la partie malade locale une odore
 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Symptomes est la mort.
 La ouverture du Cadavre se voit que la gangrene
 est d'agave des gangrènes. Spécialement l'escarpe est
 développée la portion du Dorsum gangrénée d'au
 de l'arrière Car les parties de l'air, les muscles superfé
 cilles sont noirâtres faciles à déhiser remplis de sang
 3 fois on trouve les poumons infiltrés de sang ou
 on trouve des épanchemens sanguinolens dans les ven
 eules du Cerveau q. q. fois mais cela est rare on voit des
 charbon affecter le foie, la rate ou d'autres viscer
 enfin le Cadavre se pout d'une odeur infecte et de suite
 promptement cette histoire générale de la peste
 maligne présente des modifications suivant le saison
 et l'année le tempérament la force et le courage de l'indi
 vidu nous voyons que dans la première et la seconde
 période si cette affection est traitée convenablement
 elle est peu dangereuse dans la troisième
 période si elle commence à causer un trouble léger
 elle peut devenir fâcheuse si le sujet est faible parvenue
 à sa 4^{me} période elle est presque toujours mortelle.

Mais que la peste maligne ne présente pas les mêmes
 phénomènes dans ses différentes périodes et est évident
 que son traitement doit aussi varier.

au début de cette maladie il est très rare qu'il y ait
 appelle par la petite tache qui existe alors et l'anguine
 l'indication est principalement dans cette période qu'il
 serait facile d'arrêter le progrès, au début de la peste
 maligne il suffit de couvrir le cadavre la petite tache tout
 le vers et on y réussit en la touchant légèrement
 avec un fer rouge, ou la dotasse Caustique, la soude
 caustique peut aussi produire le même effet le muriate
 de potasse d'antimoine, l'acide nitrique et sulfur
 concentré q. q. fois l'acide muriatique ou le bap
 mou aqueux dilués suffisent pour opérer cette coaction.

at'utériens, aucun moyen n'est indiqué cependant
 si on manquait absolument de Caustiques il faudrait
 en venir à l'extirpation de la prostate par incision
 si une hémorrhée ou des écoulements aigres l'avoient
 calée ou devrait détruire le virus par la suppura-
 tion qu'on obtiendrait avec l'ail pilé ou autre
 moyen analogue.

Dans la deuxième période le noyau gangreneux
 est ordinairement + prononcé le traitement est le même
 sinon que la Caustérisation doit être + profonde
 il convient alors de fendre le noyau avec le point
 d'une lancette ou d'un bistouri il ne faut pas s'arrêter
 jusqu'aux parties saines Crainte d'hémorrhage si long ou
 incisé on introduit dans l'ouverture un morceau de charbon
 de soude Caustique on peut se servir du fer rouge ou du marais
 d'antimoine, le Fer est préférable pour les individus faibles
 Sympthiques, chez les autres le charbon Caustique vaut mieux après
 Caustérisé on recouvre les parties saines de Cataplasme émollient
 si le sujet est sanguin Biliieux si au contraire le sujet est faible on
 emploiera un Cataplasme Tonique fait avec de la poudre de R. R.
 Cuite dans du vin, on peut aussi employer comme Bojique
 le Camphre. lorsque l'écoulement commence à se séparer on
 favorisera la chute par les Cataplasmes émollients si les
 chairs sont rouges tendues et irritées il vaudrait beaucoup
 mieux employer les Bojiques Toniques et antiseptiques si les
 parties étaient molles blafardes et qu'il en découle un pur
 écoulement si les lambeaux restaient trop longtemps à tomber
 et s'ils étaient trop adhérens on peut en faire la réssection
 mais toujours en prenant la plus grande précaution pour éviter
 l'hémorrhage qui dans ce cas serait considérable
 si malgré ces moyens le gangrène continue à faire des
 progrès il faudra recourir à une autre fois et faire
 agile Caustère + profondément et faire en sorte qu'elle

de la partie de la tumeur existant et on en
le membre de Comprime trempée dans de
aromatique est. Le proferse et haufier a Couril-
longue la gangrene et bristeneuse et s'il survient
supuration abondante. de faire disoudre dans une
de vin blanc deux gros de borjen préparé au gros de
de gris deux scrupules d'alber recuit en deux restes
et de couvrir le membre de cette préparation il est a crain-
que son usage trop long tem prolongé Cause la dia-
de au défaut de ce topique on Couvrira la partie
de la Comprime trempée d'imbibe d'eau salée ou d'eau
de Camphre.

la 3^e période vers son début on continuera le même traitement
que celui que nous avons indiqué pour la seconde, mais lorsque
la tumeur se rapprochera de sa fin le traitement exigera de
modification d'indication première ne change pas, la tumeur
et toujours l'objet essentiel on doit toujours l'attaquer par les
carifications qui précéderont l'application du Caustique
cette époque il existe un engorgement et une tension considé-
ble. quoique ces phénomènes ne soient que symptomatiques
ne font pas le moindre des remède en augmentant, et à
seraient nuisible dans ce cas il faudrait favoriser au
dilatation de la gangrene et produire une suppuration
abondante et de mauvaise nature dans le cas où
mieux et chauffés ont conseillé de fomentation aromati-
que acquies avec l'alcool Camphre le murate de
de ou le tartrate de fer peuvent aussi dissiper cet engorgement
on en imbebe les Comprime qui couvrent la plaie ou
aussy faire un embrocatoir avec le liniment suivant sur
la partie tumescée, Camphre. une once deux jaunes d'œuf
de deux onces.

Lorsque la fistule malade est arrivée à sa 3^e période
le traitement interne est aussi urgent que le traitement topi-
cette affection peut se compliquer de différents vices soit
de la caecémie ou le vice scorbutique alors la gangrene
et de progrès et se borne avec peine à se recouvrir.

1187 facilement. q. q. fois la mortification change de Casse
le centre de la tumeur se change en une escarre
seche et compacte. Les environs tombent dans une gaugre
humide et dans une dissolution putride il faut alors cautere
très profondément après avoir scarifié les escarres et éviter
d'embouler très dangereusement dans le feu ou la malice
dans une atonie complète ou à l'estate que lors que la
gaugre est très étendue. le muriate d'antimoine couven-
tuellement part d'une substance blanche. les Causti-
ques mercuriaux donnent aux parties une teneur de la
dissolution putride et escarissent le salivation d'acides
muriatiques et sulfuriques très couvent ils peuvent être
fiers et sont employez avec + d'avantage que les autres
Caustiques on peut toucher les parties subjacentes à celles
qui sont mortifiées avec le nitrate d'argent fondu ensuite
on les couvre de plumaceaux trempés dans un acide ou
mettra sur la tumeur et sur les parties adjacentes un Cataplasme
tonique par dessus lequel on doit placer avec avantage une Compresse
antiseptique et spiritueux. le Cataplasme sera fait avec
de la dissolution de H. H. une livre d'alesol Camphré et
ou avec des muriates soades une demi once, on renouvelera
le Cataplasme de 6 en 6 heures ou continuera son emploi
jusqu'à ce que les escarres soient détachées alors on couvrira
les parties blanches de argent d'anne ou de plumaceaux
imbibés du Colire de sangsue lorsque les chairs seront
molles il faudra faire le Cataplasme dans eau de vie Cam-
phrée.

Si malgré ces soins et un traitement interne convenable la gau-
gre fait de progrès ou se renouvelle il faut en venir
à la cautérisation aux scarifications et à l'usage de
antiseptiques lorsque le gonflement est dissipé la gau-
gre drainée et que l'escarre est complète sans d'ulcère
on peut l'ulcère avec de la charpie sèche ou
de Copraque + excitant suivant l'état des cha-

organs gras sont visible dans ces viscus. (119)
de traitement. ut orue Cous iste lors que le
est terre, qu'il y a fièvre tremblement d'oubrs aut
tendon tension et resistance de la partie, apres voir
Coyt at d'auant H. K. une Once Camphre un grain
de Sédion quantité suffisante, approuvé en 8
dans la journée.

si d'engorgement. est très étendu douloureux seruep
que d'essare soit humide et le poul sèche il
meux employer la dévotion de H. K. acidulée
de H. K. une. once. eau trois Livre réduite
par l'ébullition on aiguisera le tout avec
2, 11. ou 20 gouttes d'acide sulfurique ou d'oume
9. 9. Cuillères de vin de H. K. ordinaire, ou de
9. 9. Satiacens employent l'alkali volatil Eau

Chaussier L'Employent chez le vieillards
lorsque le poul est grand. mou et la gang. humide
l'administre à la dose de 12 à 15 gouttes dans un ver
de veronique, de verveine de scabieus,
de bureau et d'acatate d'ammoniague de ca
d'ammoniague est meux irritant et bon
dorifique on se le preserve jusqu'à la dose
une dose et deux jours mais étendu d'au me
picule aromatique ce moyen seroit inutile et
meux nuisible chez un sujet irritable, qui auroit les soies
de la langue sèche de l'urine rouge et striquée, et
isposé au hémorragie.

Si dans le principe de la maladie le malade éprouve
nausée et de vomissement on lui Prescrira l'émé
en lavage au tépécaquanha mais il faut d'istia
cher effeta d'embarras gastrique. De ceux que pourroit
de l'urine les enxiété et le sens de vomir occasion
par l'irritation qui seroit alors augmentée par
un genre indiguel
lors que la gang. est d'ornée ou continue à l'intérieur
de l'anus et de l'ouiquer cette continence est
telle soit augmentée la force vitale et d'écouler

120 / La récidive de la maladie et le fait de la ré-
sorption du pus, il y a diarrhée et h. h. rouge et du
sabbé lorsque les fonctions du système nerveux sont
troubées le h. h. jaune et vert

Le résultat est que pour venir de dire quelle h. h.
dans la première et la deuxième période de la pes-
tule maligne il ne faut pas changer à jeun de chose
pour le régime du malade dans la 3. et la 4.
période on le met à une diète sévère ou peut
permettre une crème de gruau, d'orge aboumation
L'usage moderne d'un sudgère en petite quan-
tité étendu d'eau ou peut aussi employer la
osière ou étendu d'eau ou coupée avec des
infusions aromatiques la gougère donnée
ou argente les aliments

Ceci a trois différentes méthodes curatives
contre la peste maligne est. Car. de Dijon
a employé le Caustère actuel au lieu de l'usage
Caustique le mode de Caustérisation agit prompt-
ement produit une escarce dure et vulgère nouvelle
instantanément l'irritabilité et ne pénètre qu'au-
tant qu'on le désire, il a été par Douloineux que
le autre Caustique il peut couvrir dans tous
le Car, il mérite la préférence sur le Caustère
Potentiel, lorsque les accidents ont une marche
sur le chair et le escarce sont molles et tendent
à une dissolution d'entre le Caustère doit être
chauffé de blanc au application doit être
précédée de l'incision et de l'excision des escar-
ces sont volumineuses?

2. qui doit être après avoir incisé les escarces
contenant de pauses la place avec du digestif
au miel C'est un mauvais moyen Car il ne

et a peine suffit dans la première période 121
on leur employoit d'abord le Sulfate de
de Sulfate de cuivre pour enlever
qui se courent le thorax et l'utérus et a
de Sulfate de cuivre aussi comme topique
pour les hémorragies de la matrice qui recouvrent la partie
avec des Cataplasmes subifs, soit de graine
montane ou de quinquina moulu
suffisant.

On a aussi conseillé de couvrir la partie affectée avec
de la compresse imbibée de vinaigre très fort
ou de l'alcool Camphré ou ammoniacé pour
la première qualité ce moyen est à se fier et
régulier comme le précédent.
Le Sulfate de cuivre et le H. N. l'utérus et comme topique
à très haute dose est une utile comme moyen
cependant mais ce n'est pas comme méthode on est sûr de la
première période au danger de la femme les praticiens
de la Suisse avec un mélange des deux et le crève
de ce moyen réussit q. q. fois dans l'usage.
L'extirper dans le vilain l'utérus affecté
est un malin Cette méthode est très douloureuse
et dangereuse dans une période avancée en ce qu'on
enlève beaucoup de parties et qu'on n'est pas sûr d'enlever
toutes les parties malades L'emploi du saignée
est inutile, et purgatif est presque toujours fu-
est

M. Noye a observé une variété de la parturition
maligne cette variété requiert également dans
la ville de Verce et a Courmayeur cette variété
attaque indifféremment les deux sexes et a tou-
jours ceux qui jouissent de la meilleure santé regardé
d'autre côté les faits sur de Lannée

1 128) certainement dans les grandes chaleurs
elle est par contagion, ou de commun qui
peut par le contact d'un autre affecté de la
même maladie ou par q. q. fois par ay. si l'on a
soigné ni précédé d'aucun dérangement notable
dans les fonctions d'autre fonction est affecté
de q. q. fois ou de suite sans motif
tousjours elle attaque la face, la fait traîner
ment par côté gauche q. q. fois une seule par
telle d'autre fois + c'est à la fois les sympto-
mes locaux sont le visage enflé de couleur de
bleu élastique sans changement de couleur. au
deux en caractère le distinguant essentiellement de
la pustule maligne ordinairement au milieu de l'oreille
enflée s'apparent un bubon éreux ou éreux de
Lathyrus de la Corue, d'après sa nature mobile, ou im-
mobile profonde et peu douloureuse. le con-
vertissent en escar au milieu ou voit paraître
de petites vésicules de la grosseur d'un grain de millet
ou de cheuveuil. Lors que ces vésicules sont ouvertes
il en sort une liqueur lymphatique épaississable
ou sans odeur ou fœide il y a soit d'arête au-
tour du bubon ou de la vésicule ou de l'oreille
ou voit chez q. q. fois de petites pustules
colorées il y a de la chaleur ou de la douleur de l'oreille
ou de la gangrène tout fait de nouveau d'après
le bubon d'attaque de l'oreille au milieu des
téguments la peau est aride la gangrène s'étend
ou au dessous d'après arrêt de la progression, le symp-
tome qu'on a vu soit le cheuveuil
risque nausée lymphatique q. q. fois il y a soit de
fièvre dans les fonctions locales, l'appétit et
sommeil la sécrétion de l'urine est dans
l'état naturel q. q. fois le cheuveuil

123
suble par ces réves fatigant, & autre sympt^{es}
de gaieté & d'un motif de folie, di-
sant d'assoupissement le sang qu'on tire des
veines est rose vermeil. Sans aucun état varié
de pustule maligne de terminée dans l'hydre
à la fin ou de 10 jours lorsque la suppu-
ration établit les extrémités deviennent froides & jaunes
fréquent & continuant. Le malade brant le
fréquent affecté à la terminée ordinairement
à la chute de la tige & à l'époque de la
chute il y a douleur & tension & engorgement
algie état convulsif & à l'ouverture des cadavres
la gangrène s'étend à la peau & à la cellulairie la
gangrène est sans changement de couleur
elle est coriace, son traitement ordinaire la
vésicatoire & l'actif. La peau s'ily engorge-
ment au point de la incision dans les parties voisines
on guérira avec de l'igotif très acide de la
paraffine est facile à la prise avec un emplâtre
purgatif dans cette variété le saignée est
de peu d'utilité chez le malade fort et vigoureux
à employer - vient le soir de la nuit le petit
et, les saignées, le lavement simple est
si l'on a un avantage cette variété de la pustule maligne
à faire un traitement distinct de tout traitement est
méthodique et peut causer des accidents graves
M^r Lechevalier a encore observé une autre variété
de la pustule maligne elle se présente au Pharynx
suivant, son développement est accompagné par
fièvre mesurée le 22^e jour arrivé on aperçoit
la tache d'une morsure de gué il y a tout
vésicule dans l'hydre de la cavité la tache devant

12 / l'aine et est parvenue d'une vésicule remplie
 d'un liquide ichoreux la base se change en une
 escarce sèche, l'artère environnante se gonfle et
 s'empourpre généralement tardant par l'aire, puis et
 finissant le même marche que ceux de la pustule ma-
 ligne ou il appert par la tubercule elle se couman-
 tique - ment par la contagion et se bristement et
 la vésicule que celui de la pustule maligne de St.
 Charles

De l'anthrax et balin.

L'anthrax malin a été appelé aussi Carbo, Carbon-
 culus et autre tout appelé igni persium.
 L'anthrax malin est une affection essentielle, gang-
 reneuse produite par cause interne ou externe la cause
 dans aucune période comme affecte la vésicule
 à l'origine de l'espèce d'anthrax l'anthrax
 lui est essentiel et d'anthrax malin non pestilente
 d'anthrax malin non pestilente se présente d'abord
 sous la forme d'une tumeur inf^{flotte} d'un rouge foncé
 avec tubercule et très douloureux très chaude et très tendue
 et de forme à sa base un escarce noir et sèche cette
 escarce survient q. q fois toute la tumeur d'affection doit
 être non d'ailleurs affrécisée et souvent accompa-
 gnée de fièvre et on l'on d'ailleurs pour la
 gangre s'empare de la partie au plus que la tumeur
 paraît avec la partie est alors entièrement désorganisée
 et réduite en escarce noire sèche profonde sans y
 y ait eu probablement de véritable inflammation dans
 le cas la fièvre est accompagnée des prostration de
 force, d'une altération profonde de la sensibilité et de
 contractilité et de l'altération putride des humeurs
 et est qu'on voit souvent et lorsqu'on a rétabli ce force
 qu'il se développe une véritable inf^{flotte} que la nature

explaire sans la separation des parties organiques
le 1^{er} cas est celui de la gangrene
primitive la cause est - detritée - active et
accidente au point de voir la gangrene
sur le 2^o cas dans lequel la gangrene est passive et
developpee en même temps que la gangrene
alors + active + passive + gangrene
malades succumbent.

Le charbon se declare frequemment au visage
la partie anterieure du col et de la partie
de ce membre qui se joint à l'attache de l'organe
Anterieur lors de son debut il a saur qu'il dans
toute l'etendue sans certain de profondeur dans
un garasent y a + exposé qu'il se adatte à
charbon et ord' id' y a que qu'il se y a + exposé
critique.

Les differens accidens du charbon sont les memes
dans de l'autre simple et de l'etendue de la
malade dans leger de la nombre et de la respiration
particulier de chaque individu.

Observation recente que dans certains cas il
est impossible d'expliquer la cause du charbon mais
on a conjecture qu'il peut être produit par le contact
de l'air dans les hottes contenant un grand
nombre de malades et pendant une saison
chaude et humide au j'ent - ment exposé qu'il
est été produit par la respiration de chimie
de l'etere qui se degagent de vuide pulma
aire ou digestive de animaux affectes de char.
au et par le gas putride qui s'en exhalent
peut aussi être produit par le contact de l'air
de sang de de auis mar. et de M. Charbon
dans Vie dans le et. anterieur de et qu'il
est été produit par l'usage de l'air de l'air
commence a l'etere si la gangrene est affecte par

116) La partie des l'apparition de la tumeur
 cette affection est rarement purement locale
 elle est presque toujours précédée de symptômes
 + ou - intenses d'affection douloureuse
 gravative de membre, céphalalgie, anorexie
 prostration de forces, nausée, envie de
 vomir, la face devient livide et le fait sentir
 du frisson irrégulier et la fièvre survient
 4. 9 jours après les symptômes et se prolonge
 en peu de temps une tumeur + ou - sallan-
 te + ou - volumineuse adhérente aux parties
 sous-jacentes comme si elle y était collée elle est
 dure d'une rougeur fonce persistant sous
 la pression elle n'est d'abord d'abord elle est le
 siège d'une douleur douloureuse et d'effrayante de
 sensation de chaleur que le malade s'aperçoit
 et très vite relativement à l'augmentation de
 de température de la peau, les symptômes
 deurent + ou - longtemps.
 En augmentant d'intensité, la tumeur accroît en
 largeur et en profondeur. les parties voisines
 s'engorgent, à cette douleur et cette chaleur suc-
 cède un état de pesant et d'angoisse ordi-
 naire. le centre de la tumeur s'ouvre et se des-
 che, se couvrit en une escarre, cette escarre est
 de si rouge, seules pour être quelle est presque
 crue par une boue inflammation d'autre
 partie de la tumeur par progrès jusqu'à ce que la mort
 vienne terminer la maladie, la formation de cette
 escarre est 9. 9 fois précédée de l'apparition de
 thicket avec puriformes dont la rupture laisse
 couler un liquide brunâtre et solide la morsure
 du charbon est + ou - rapide suivant l'inten-
 sité de la cause, la coagulation est à l'indivis-

9. 9. fois il continue de sécher pendant
 un jour. D'autre fois il est bien
 à donner lieu à la mortification des
 tumeurs du charbon, varicelle suivies de
 cicatrices. De période dans son principe il est
 robuste leuc. est intense la douleur
 le jour fréquent du serri le visage
 coloré la langue est sèche rouge, ou d'ordinaire
 vis. noir il y a cephalalgie anxieté
 fébrile épigasth. algie avec envie
 vomir occid. due pas une irritation d'appa-
 rat de l'estomac il est important de rap-
 porter en diff. les symptômes de leur cause. V. 1. 1.
 et de pas se confondre avec ceux d'un eubari-
 gnostique, lorsque le charbon affecte le visage
 tout le corps du sang est gène dans les vaisseaux
 v. 1. 1. de la. survient une douleur intense de la
 t. et le délire + ou - violent 9. 9. fois le malade est
 de. 1. 1. la tumeur peut aussi comprimer
 l'œsophage. et la trachée artère ou resuler
 une gêne dans la déglutition la respiration et la
 circulation du visage prend une couleur livide le
 mal devient ^{plus} et concentre lorsque le sujet
 est extraord. faible cachectique Cachectique
 orbatique. lorsque le sang est + déléter et
 complètement fixée. Sur le fort malade la t. n.
 aente un autre caractère le jour est - fréquent
 9. 9. fois d'est nous grand, d'autre fois petit et
 aplottant. le malade se couche sudoriparation
 la face. décolorée pale et livide 9. 9. fois elle
 d'un rouge terre produit par l'at. du sang,
 sur le capillaire affaiblis, les yeux sont
 avec sans expression le lèvre et la langue
 est sèche et fulgurante l'haléine est fétide

128) la respiration lustrieuse l'urine rare rouge -
brûlée et fétide la peau est sèche aride et humectée
par une sueur visqueuse le malade a le ventre réserré
ou il est pris de diarrhée et rend des matières liquides
noires brunes ou vertes d'autres fois elle sont fétides
les sensations sont obscuries le subdelirium change
du malade qui peut être pris de stupeur ou
de couragement quand la maladie est très grave
et doit avoir une issue funeste les yeux sont fulgurants
la langue est tremblante la voix étouffée le pharynx
ou paralysé on entend les frissons tomber dans cette
activité il se développe des petechies a la surface du
corps il survient des hémorragies passives difficile
à arrêter le ventre s'enlève enfin le malade
succombe dans un état de gangrene et répand
une odeur insupportable
lorsque les effets de la nature seuls ou secondés
par l'art surmontent les effets de la maladie
il se forme autour de la partie gangrenée un
cercle inférieur d'un rouge vif animé le sentiment
douloureux diminue et de pesanteur diminue le malade
rensent aux environs de la partie malade une
chaleur douce une odeur modérée expulsive
la respiration se rétablit d'abord elle est -

129
sanicuse) abondante foetide, peu à peu elle prend
le caractère de bon phlegme le jour et les forces
reviennent le malade ne se couche & sur le dor
visage sanique la langue humectée de ses bords
la circonférence de la delarante ainsi que
le vers de leurs fuligineux la peau devient soye
laine le urine et les selles perdent foetide en
tation reviennent en fin leur état naturel malgré
le malade éprouve une convalescence assez longue
durant la quelle il faut il faut continuer l'usage
médicamenteux interne propre à soutenir les forces
sans toute écart de régime crainte de recidive
mais maintenant la seconde variété ¹¹¹ de charbon
pestilentiels elle diffère de la précédente d'abord
que la gangrene s'établit aussitôt que l'inflammation
est profondément elle diffère encore en ce
que les symptômes qui l'accompagnent annoncent
le lenor & l'oside d'origine vital &
tumeur charbonneuse est moins saillante elle
est d'avantage en largeur qu'en profondeur q. q.
est très large peu profonde la gangrene se
propage avec rapidité les parties voisines sont
tandis qu'il se forme dans ces phlegmes
qui lorsqu'ils se rompent ont leur

130, base déjà gangréné la mortification de
l'appareil de la peau de tissu cellulaire et
même des muscles qui deviennent brunâtre noir
duschés comme du charbon ou avec cette affectio
s'empare de tout un membre dans q. q. heures
je lui supprime l'artère et pendant lespace
de 24 heures la partie voisine comme dans
la variété précédente dans le cours de cette
maladie précédente des symptômes d'adynamie
et d'ataxie à un haut degré cette affection est
presque toujours mortelle soit que la cause soit
trop sévère trop abondante ou parce qu'elle n'est
pas rigoureusement fixée dans la partie affectée
parfois elle se présente à son pronostic d'une manière
abrégée l'anthrax malin est toujours une
affection grave et d'autant plus dangereuse qu'elle
gangrène se développe plus promptement et
que ses progrès sont plus rapides que la partie
affectée soit plus importante à la vie son
danger est toujours imminent lorsque quand
le malade est faible encoché et corbuté que
lorsque les symptômes généraux annoncent une
prostration extrême et une tendance des
humeurs à la putrefaction les anthrax
malins les dangereux sont toujours une

une longue durée
 de l'anthrax consiste lorsque la première
 est présente des symptômes inf. très intenses que
 tumeur est dure très douloureuse et consistante de
 l'infl. - favoriser la flux des humeurs faciliter
 le mouvement du tissu cellulaire ou employé pour cela
 cataplasmes emollients relaxans et maturatifs
 est le ser qui a été conseillé ce moyen si le malade
 une douleur excessive et qu'on craignoit de
 de lui ou peut détruire de bonne heure la gangrène
 par le caustique ser tel que le beurre de
 l'encens le fer rouge &c.

si la gangrène a commencé ou parvient à
 un des progrès on scarifie les escars en le
 débrasant ou avec une lancette avec un digestif animé
 recouvre la partie de compresses imbibées d'aroma
 lorsque le gangrènement est à peu près les escars
 sont très fétides on a recours à l'antiseptique
 sur la suite des escars on pane avec de la
 apie ou du digestif animé suivant l'état
 de la chair est seulement alors qu'on peut juger
 de l'étendue de la gangr. q. q. le de l'étendue ou
 de l'artere principale de l'artere
 de l'artere de l'escar ou il faut

134 Seulemeut deinde à ainsi le accidens
consequents se suivent suivant la nature
du partiel lesesé lorsque la gangrène
survient spontanelement et chez un sujet faible
ou scorbutique la mortification s'etendra
rapidement. il faudroit recourir de bonne
heure à la Caustérisation employe le
Cautere actuel. après avoir fait l'incision
l'ausage avec du digestif ou pro de
fomentations antiseptiques ou employe
aussi le liniment camphré et le cataplasme
mercuriel ou renouveler souvent le
pansement.

à l'interieur au danger au debut de la
maladie si le 1^{er} void s'ant laborale
l'évacuation la saignée seroit nuisible à
qu'il n'y ait coagulation au cerveau alors
l'application de Neutroie à la nuque
seroit préférable si il y a siir vésicale
irritation forte on mettra le malade
à une diète rigoureuse. l'usage de
Dois pour temperance acide les fraises
le camphre associé au nitre s'ont
avantages. si il y a prostration de
force tendre à la satisfaction on
emploira le mercurique associé aux
coniques lorsque le charbon attaque
le organe interieur il a ya tout le
traitement notable Seulemeut on emploie
le antiseptique et seindant la

l'usage de l'eau ou au moins le malade 133
une Diète végétale auale p^{te} que tout que
est auj. médic^{ne} & éviter toute source
contagieuse ou adropsi & s'efforcer
de se traiter par le froid
propos d'écarter profondément l'écarter
à l'écart sursent forçer, Chereibo a
possibilité de faire un moyen d'écarter a
possibilité d'écarter le charbon, Else
quelques sursent l'huile d'olive l'écarter
leur méthode n'est préférable à celle que
l'on avoit établie elle est le + methodi-
que et elle que l'écarter le malade
écarter maintenant a l'anthrax s'écarter
l'on avoit examiné l'anthrax non s'écarter
l'on deux variétés qu'il présente relativement
à sa forme ou la gangrène l'écarter
l'anthrax s'écarter peut se développer sur toute
la partie externe du corps q^{ue} l'écarter
dit qu'il sursent se développer dans le
gangrène interne la partie q^{ue} l'écarter de
l'écarter tout le jour, le est le d^{ans} l'écarter
de ceux qui ont le mieux traité de cette
écarter tout ambroise Paré Liv. 25. ch. 8.
Dexter, Carey, Dordenave &
écarter sursent de variétés relativement à
la forme et à sa forme au l'a vu écarter.
écarter le est une grande partie du d^{ans} écarter
l'ambroise Paré est à l'abdomen l'écarter une
écarter de l'écarter de la p^{te} de la
écarter 9. 9. f. il n'y en a qu'un seul d'écarter
écarter de ceux comme écarter et avriva
écarter le date écrite par le docteur l'écarter

154) 2. q. 300. elle paraît comme pustule
comme un grain de millet la boue
est petite remplie. D'un liquide ~~saige~~
saige d'insulte au rougeâtre, même bile
la partie est le siège d'une chaleur. Malade
d'une douleur géante qui augmente la nuit
lorsque la pustule est rompue on voit
à sa base un peu de sang noir de fétide
la gangrène ne se forme par autogène
même. Elle s'étend jusqu'aux jointures de
parties voisines de celles qui sont gangrénées
sont engorgés tumescents dans q. q. jours
le malade s'éprouve. Dans le membre gangréné
un état d'entêtement de pesanteur fatiguant cette
affection est presque toujours accompagnée de
symptômes généraux qui annoncent une
lésion de la propriété vitales et elle est dange-
reuse lorsque le membre indolent est mort
perte de l'écoulement avec une fièvre générale
et délétère. L'autrage pestilentiel ne
s'observe qu'au commencement ou à la fin de
l'épidémie mais bien lorsque est dans sa
vigueur. q. q. fois il existe en même temps que
des tubercles pestilentiels q. q. fois il n'est
point suivi de symptômes généraux alors
il prend ordinairement un caractère favorable les autrages
pestilentiels très larges très fonges profonds
sont presque toujours funestes. Ils se terminent
toujours par des suites seules ils sont presque
volontiers suivis de la mort. Les autrages
doux d'ailleurs très légers se dissipent
partiellement. Les autrages couverts
sont très dangereux. La suppuration
La suppuration se supprime brusquement.

136 / De quest et le docteur Franck. sont du même
avis Larey et d'autre et d'autre second
herbaborne pestilentielle se développent au
commencement de la fièvre pestilentielle
très peu dans la terminaison
dans le premier cas il faut symptôme
qui dans le 2^e cas il faut être que le signe
de l'affectation d'autour parole sont le
suis sur souvent elle est annoncée par une
douleur profonde par une légère tumeur
il y a peu de chaleur et de rougeur de la
peau les symptômes est d'autre intense. chez
Certains individus. et d'autre ala même man
che que le d'autre Epileptique. tantôt
et a une marche insidieuse d'autre fois
est accompagnée d'une fièvre très aiguë de
travaux de douleur et d'irritation et d'autre
peut se terminer de diverses manières q
il se. Venise d'ordinaire. la maladie est
généralement + grande d'autre fois il se ter
me par résolution ou par suppuration ord
la maladie guérissent si le pus est de bonne
nature la gangrène peut s'en suivre. après d'autre
à car et alors le + facheux lors qu'il reste
l'atroune la fièvre pestilentielle a une issue
funeste. la terminaison de la maladie est
très facheuse lorsque sur le même individu
il y a d'autre charbon et pitechie ou
une ou d'autre seule chez deux individus
affectés de fièvre pestilentielle sont il était
le symptôme dans ce cas la venise de la
maladie est ord' heureuse
quand a été traitement. l'air recommandé
d'appliquer successivement leur ventouses
de voir ensuite le partie de cataplasme
matorate et d'appliquer au d'usage de

l'intermittence du flux qui la précède
9.9 fois de suite. ~~presque~~ tout de suite
du sang dans ce cas la tumeur partie
malade est visiblement enflammée
elle est attaquée de stupéur. et de bouger
seulement qui peuvent empêcher la circulation
artérielle.

Dans le gangne produites par l'usage
de l'urine de matière fécale au
du sang, il faut romprement de l'urine
au lieu de irritant qui cause l'inf
et par suite le gangne. ou le virus
infectieux large et profonde, ou de la
l'urine par une compression méthodique
vient la putréfaction par le bouillon
et le anti septique par une régime au
leptique et le bouillon à l'intérieur
du gangne par infiltration de sérosité
+ fréquente. soit elle affecte le membre
supérieur le thorax et la partie géni
l'extérieur de la femme. et lorsqu'elle
accompagne d'une inf. ~~infectieuse~~ erysipelat
très large la peau est d'un rouge per
rouge. 9.9 fois la peau est tendue, la
chaleur est considérable le docteur
9.9 fois assez forte. la mortification
s'empare de parties le + distendues
elle se détache qu'on au delà du tige
cutané sans restant.
Les circonstances qui la favorisent sont une
grande quantité de sang épais dans le tige cutané

