

T 7903/1383 (21)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

卷世三ノ廿一

景岳全書

四十八

本州正上



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, appearing as ghostly characters within a grid.

景岳

景岳全書本草正目錄上大集
卷四十八

山草部

人參 一

黃芪 二

白朮 三

蒼朮 四

甘草 五

黃精 六

肉蓯蓉 七

丹參 八

遠志 九

巴戟天 十

仙茅 十一

天麻 十二

沙參 十三

玄參 十四

茅根 十五

淫羊藿 十六

苦參 十七

貝母 十八

土貝母 十九

山慈菇 二十

柴胡 二十一

桔梗 二十二

防風 二十三

細辛 二十四

景岳全書

本草正

景岳全書

全書卷四十八

本草正目錄上

一

羌活 二五

獨活 二六

升麻 二七

前胡 二八

延胡索 二九

柴草 三十

白朮 三一

三七 三二

白蘚皮 三三

秦艽 三四

地榆 三五

黃芩 三六

黃連 三七

胡黃連 三八

知母 三九

龍胆草 四十

隰草部

地黃 四一

牛漆 四二

麥門冬 四三

續斷 四四

蜀葵子 四五

車前子 四六

白蒺藜 四七

紅花 四八

紫苑 四九

甘菊花 五十

野菊花 五一

菥蓂 五二

益母草 五三

瞿麥 五四

茵陳 五五

青蒿 五六

款冬花 五七

麻黃 五八

萱草 五九

連翹 六十

旋覆花 六一

鼠粘子 六二

決明 六三

葶藶 六四

夏枯草 六五

蒼耳子 六六

漏蘆 六七

劉寄奴 六八

蕭薺 六九

青箱子 七十

艾 七一

佛耳草 七二

藍靛 七三
附青黛

木賊 七四

王不留行 七五

海金沙 七六

燈心草 七七

烟 又七七

芳草部

當歸 七八

川芎 七九

芍藥 八十

丹皮 八一

白荳蔻 八一

肉荳蔻 八三

草菓 八四

破故紙 八五

本草

目上

四

木香 八六

藿香 八七

香附 八八

砂仁 八九

紫蘇 九十

薄荷 九一

荆芥 九二

白芷 九三

香薷 九四

益智 九五

鬱金 九六

薑黃 九七

澤蘭 九八

藁本 九九

葶藶 一百

良薑 百一

三稜 百二

蓬朮 百三

蛇床子 百四

蔓草部

天門冬 百五

兔絲子 百六

五味子 百七

何首烏 百八

瓜蒌仁 百九

天花粉 百十

金銀花 百十

葛根 百十

蒺藜 百十三

土茯苓 百十四

使君子 百十五

牽牛 百十六

防己 百十七

草薺 百十八

釣藤 百十九

山豆根 百二十

威靈仙 一二

馬兜鈴 一二

青木香 一二

白蔞 一二四

木通 一二五

毒草部

附子 一二六

白附子 一二七

大黃 一二八

常山 一二九

半夏 百三十

南星 百三十一

胆星 百三十二

射干 百三十三

大戟 百三十四

甘遂 百三十五

芫花 百三十六

玉簪 百三十七

鳳仙花 百三十八

蓖麻子 百三十九

續隨子 百四十

木鱉子 百四十一

水石草部

石斛 一四一

菖蒲 一四二

蒲黃 一四三

澤瀉 一四四

海藻 一四五

骨碎補 一四六

竹木部

竹瀝 一四七

淡竹葉 一四八

淡竹茹 一四九

天竺黃 一五〇

宮桂 一五一

丁香 一五二

白檀香 一五三

沉香 一五四

烏藥 一五五

枸杞 一五六

地骨皮 一五七

厚朴 一五八

棗仁 一五九

杜仲 一六〇

山茱萸 一六一

蘇木 一六二

川椒 一六三

胡椒 一六四

金櫻子 一六五

槐蕊 一六六

栢仁子 一六七

枳殼 一六八

枳實 一六九

蔓荊子 一七〇

五加皮 一七一

川棟子 一七二

女貞子 一七三

桑白皮 一七四

黃檗 一七五

梔子 一七六

郁李仁 一七七

訶子 一七八

側栢 一七九

辛夷 一八〇

皂角 一八一

巴豆 一八二

密蒙花 一八三

雷丸 一八四

大楓子 一八五

蕪荑 一八六

茯苓 一八七

茯神 一八八

猪苓 一八九

桑寄生 一九〇

琥珀 一九一

松香 一九二

乳香 一九三

沒藥 一九四

阿魏 一九五

樟腦 一九六

龍腦 一九七

血竭 一九八

蘆薈 一九九

乾漆 二〇〇

蘇合油 二〇一

孩兒茶 二〇二

穀部

麥芽 二百三

神麩 二百四

白扁豆 二百五

薏仁 二百六

綠豆 二百七

粟殼 二百八

麻仁 二百九

果部

芡實 二百十

杏仁 二百十一

桃仁 二百十二

木瓜 二百十三

陳皮 二百十四

青皮 二百十五

檳榔 二百十六

烏梅 二百十七

山查 二百十八

甜瓜蒂 二百十九

大腹皮 二百二十

吳茱萸 二百二十一

菜部

山藥 二百二十二

乾薑 二百二十三

大茴香 二百二十四

小茴香 二百二十五

白芥子 二百二十六

蘿藦子 二百二十七

葱 二百二十八

蒜 二百二十九

韭菜 二百三十

韭子 二百三十一

百合 二百三十二

蒲公英 二百三十三

金石部

金箔 二百三十四

水銀 二百三十五

輕粉 二百三十六

銅青 二百三十七

朱砂 二百三十八

銀朱 二百三十九

靈砂 二百四十

硫黃 二百四十一

雄黃 二百四十二

自然銅 二百四十三

黃丹 二百四十四

白礬 二百四十五

石脂 二百四十六

爐甘石 二百四十七

蓬砂 二百四十八

水粉 二百四十九

密陀僧 二百五十

石膏 二百五十一

滑石 二百五十二

青礬石 二百五十三

朴硝 二百五十四

玄明粉 二百五十五

海石 二百五十六

花蕊石 二百五十七

代赭石 二五八

礞砂 二五九

青鹽 二百六

石灰 二六一

禽獸部

雞血 二六二

鴨血 二六三

虎骨 二六四

象牙 二六五

鹿角膠 二六六

鹿茸 二六七

犀角 二六八

羚羊角 二六九

牛黃 二百七

阿膠 二七一

熊胆 二七二

麝香 二七三

蟲魚部

龍骨 二七四

海螵蛸 二七五

牡蠣 二七六

穿山甲 二七七

青魚胆 二七八

白花蛇 二七九

真珠 二百八

龜板 二八一

蠟蚕 二八二

蟾蜍 二八三

水蛭 二八四

鱉甲 二八五

蜈蚣 二八六

蟾脫 二八七

斑蝥 二八八

蜂房 二八九

五靈脂 二百九十

全蝎 二九一

文蛤 二九二

百藥煎 二九三

蝸牛 二九四

蚯蚓 二九五

桑螵蛸 二九六

人部

童便 二九七

紫河車 二九八

血餘 二九九

人中白 三百

全書本草正目錄終 厚陽中微陰氣虛血虛俱能補陽氣

虛竭者此能回之於無何有之鄉陰血崩潰行此能障之於

草木而純

本草綱目 目下

景岳全書卷之四十八大集

本草正

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

山草部

人參

一 反藜蘆

味甘微苦微溫氣味頗厚陽中微陰氣虛血虛俱能補陽氣
虛竭者此能回之於無何有之鄉陰血崩潰者此能障之於
已決裂之後惟其氣壯而不辛所以能固氣惟其味甘而純

正所以能補血故凡虛而發熱虛而自汗虛而眩運虛而困
倦虛而驚懼虛而短氣虛而遺泄虛而瀉利虛而頭疼虛而
腹痛虛而飲食不運虛而痰涎壅滯虛而嗽血吐血虛而淋
瀝便閉虛而嘔逆躁煩虛而下血失氣等證是皆必不可缺
者第欲以氣血相較則人參氣味頗輕而屬陽者多所以得
氣分者六得血分者四總之不失爲氣分之藥而血分之所
不可缺者爲未有氣不至而血能自至者也故扁鵲曰損其
肺者益其氣須用人參以益之肺氣既王餘藏之氣皆王矣
所以人參之性多主於氣而凡藏府之有氣者皆能補之然
其性溫故積溫亦能成熱若云人參不熱則可云人參之性
涼恐未必然雖東垣云人參黃芪爲退火之聖藥丹溪云虛
火可補參朮之類是也此亦皆言虛火也而虛火二字最有
關係若內真寒而外假熱者是爲真正虛火非放膽用之必
不可也然有一等元陰虧乏而邪火爍於表裏神竟躁動內
外枯熱真正陰虛一證誰謂其非虛火若過用人參果能助
熱若王節齋云陽旺則陰愈消及節要云陰虛火動者勿用
又曰肺熱還傷肺等說固有此理亦不可謂其盡非而近之
明哲如李月池輩皆極不然之恐亦未必然也夫虛火二字

最當分其實中有虛虛中有實陽中有陰陰中有陽惟勿以
成心而執已見斯可矣如必欲彼此是非是所謂面東方不
見西牆皆未得其中也予請剖之曰如龍雷之火原屬虛火
得水則燔得日則散是即假熱之火故補陽即消矣至若亢
旱塵飛赤地千里得非陽亢陰虛而亦可以補陽生陰乎或
必曰此正實火也得寒則已予曰不然夫炎暑酷烈熱令大
行此爲實火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷流是謂陰虛非
水莫濟此實火之與陰虛亦自判然可別是以陰虛而火不
盛者自當用參爲君若陰虛而火稍盛者但可用參爲佐若
陰虛而火大盛者則誠有暫忌人參而惟用純甘壯水之劑
庶可收功一證不可不知也予非不善用人參者亦非畏用
而不知人參之能補陰者蓋以天下之理原有對待謂之曰
陰虛必當忌參固不可謂之曰陰虛必當用參亦不可要亦
得其中和用其當而已矣觀者詳之

黃芪二

味甘氣平氣味俱輕升多降少陽中微陰生者微涼可治癰
疽蜜炙性溫能補虛損因其味輕故專於氣分而達表所以
能補元陽充腠理治勞傷長肌肉氣虛而難汗者可發表疎

而多汗者可止其所以止血崩血淋者以氣固而血自止也故曰血脫益氣其所以除瀉痢帶濁者以氣固而陷自除也故曰陷者舉之然其性味俱浮純於氣分故中滿氣滯者當酌用之

白木 三

味甘辛氣溫氣味俱厚可升可降陽中有陰氣中有血其性溫燥故能益氣和中補陽生血煖胃消穀益津液長肌肉助精神實脾胃止嘔逆補勞倦進飲食利小便陰濕運痰消浮去脹治心腹冷痛胃虛下痢疝癰癥瘕制以人乳欲潤其燥

陰疑除之誤

炒以壁土欲助其固佐以黃芩清熱安胎以其性澁壯氣故能止汗實表而癰疽得之必反多膿奔豚遇之恐反增氣及上焦燥熱而氣多壅滯者皆宜酌用之然冬木甘而柔潤夏木苦而燥烈此其功用大有不同不可不為深辨也若於飢時擇肥而甘者嚼而服之服之久久誠為延壽之物是實人所未知

蒼木 四

味苦甘辛性溫而燥氣味俱厚可升可降陽也用此者用其溫散燥濕其性溫散故能發汗寬中調胃進食去心腹脹疼

霍亂嘔吐解諸鬱結逐山嵐寒疫散風眩頭疼消痰癖氣塊
水腫脹滿其性燥濕故治冷痢冷洩滑瀉腸風寒濕諸瘡與
黃栢同煎最逐下焦濕熱痿痺若內熱陰虛表疎汗出者忌
服然惟茅山者其質堅小其味甘醇補益功多大勝他木

甘草 五

味甘氣平生涼炙溫可升可降善於解毒反甘遂海藻大戟
芫花其味至甘得中和之性有調補之功故毒藥得之解其
毒剛藥得之和其性表藥得之助其升下藥得之緩其速助
參芪成氣虛之功人所知也助熟地療陰虛之危誰其曉焉

祛邪熱堅筋骨健脾胃長肌肉隨氣藥入氣隨血藥入血無
往不可故稱國老惟中滿者勿加恐其作脹速下者勿入恐
其緩功不可不知也

黃精 六

一名救窮草

味甘微辛性溫能補中益氣安五臟療五勞七傷助筋骨益
脾胃潤心肺填精髓耐寒暑下三蟲久服延年不飢髮白更
黑齒落更生張華博物志言天老曰太陽之草名黃精食之
可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死此但以黃
精鉤吻對言善惡原非謂其相似也而陶弘景謂黃精之葉

與鉤吻相似誤服之害人蘇恭曰黃精葉似柳鉤吻蔓生葉如柿葉殊非比類陳藏器曰鉤吻乃野葛之別名二物全不相似不知陶公憑何說此是可見黃精之內本無鉤吻不必疑也

肉蓯蓉 七

味甘鹹微辛酸氣微溫味重陰也降也其性滑以其味重而甘溫故助相火補精興陽益子嗣治女人血虛不孕煖腰膝堅筋骨除下焦寒痛以其補陰助陽故禁虛寒遺瀝洩精止血崩尿血以其性滑故可除莖中寒熱澀痛但驟服反動大便若虛不可攻而大便閉結不通者洗淡暫用三四錢一劑卽通神效

丹參 八

味微苦微甘微澁性微涼無毒反藜蘆能養血活血生新血行宿血故能安生胎落死胎血崩帶下可止經脈不勻可調此心脾肝腎血分之藥所以亦能養陰定志益氣解煩療眼疼脚痺通利關節及惡瘡疥癬赤眼丹毒排膿止痛長肉生肌

遠志 九

味微苦微辛氣溫陽也升也製以甘草湯浸一宿晒乾炒用
功專心腎故可鎮心止驚辟邪安夢壯陽益精強志助力以
其氣升故同人參甘草棗仁極能舉陷攝精交接水火但可
爲佐用不宜多神氣上虛者所宜痰火上實者當避

巴戟天 十

味甘微溫陰中陽也雖曰足少陰腎經之藥然亦能養心神
安五臟補五勞益志氣助精強陰治陰痿不起腰膝疼痛及
夜夢鬼交遺精溺濁小腹陰中相引疼痛等證制宜酒浸去
心微炒或滾水浸剝亦可

仙茅 十一

十一

味辛溫有小毒陽也能助神明強筋骨益肌膚培精血明耳
目填骨髓開胃消食助益房事溫利五臟補煖腰脚此西域
婆羅門僧獻方於唐明皇服之有效久秘而後得傳按許真
君書云仙茅久服可以長生其味甘能養肉辛能養節苦能
養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也
然仙茅性熱惟陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾
盛者服之大能動火不可不察凡制用之法於八九月采得
用竹刀刮去黑皮切如豆粒糯米泔浸兩宿去赤汁用酒拌

蒸之從巳至亥制之極熟自無毒矣然後曝乾搗篩熟蜜丸
桐子大每空心酒飲任下二三十九忌食牛乳及黑牛肉恐
減藥力也若隨羣補藥中爲丸服之無所不可

天麻 十二 一名赤箭 一名定風草

味辛平陰中有陽治風虛眩暈頭旋眼黑頭痛諸風濕痺四
肢拘攣利腰膝強筋骨安神志通血脉止驚恐恍惚殺鬼精
蟲毒及小兒風癇驚氣然性懦力緩用須加倍或以別藥相
佐然後見功

沙參 十三 一名鈴兒草
反藜蘆

味微甘苦氣味俱輕性微寒能養肝氣治多眠除邪熱益五
臟陰氣清肺涼肝滋養血脉散風熱癢痒頭面腫痛排膿消
腫長肌肉止驚煩除疝痛然性緩力微非堪大用易老云人
參補五臟之陽沙參補五臟之陰特以其甘涼而和補中清
火反而言之故有是論若云對待人參則相去遠矣

玄參 十四
反藜蘆

味苦甘微鹹氣寒此物味苦而甘苦能清火甘能滋陰以其
味甘故降性亦緩本草言其惟入腎經而不知其尤走肺臟
故能退無根浮游之火散周身痰結熱癰逐頸項咽喉痺毒

癰癧結核。毆男女傳尸。煩燥骨蒸。解溫瘧寒熱往來。治傷寒熱。斑支滿。亦療女人產乳餘疾。或腸中血痕熱癥。并療勞傷痰嗽。熱煩補腎滋陰。明目解渴。

茅根 十五 卽白茅

味甘涼。性純美。能補中益氣。此良藥也。善理血病。凡吐血衄血。瘀血血閉。及婦人經水不調。崩中漏下。且通五淋。除客熱。止煩渴。堅筋骨。療肺熱。噦逆。喘急。解酒毒。及黃疸水腫。久服大是益人。若治癰疽癩毒。及諸毒瘡。諸血。或用根搗傅。或用此煮汁。調傅毒等藥。或以酒煮服。無不可也。茅有數種。處處有之。惟白者爲勝。春生芽布地如鍼。故曰茅鍼。可以生噉。甚益小兒。功用亦同。

淫羊藿 十六

味甘氣辛。性溫。乃手足陽明少陰三焦命門藥也。主陽虛陽痿。莖中作痛。化小水。益精氣。強志意。堅筋骨。煖下部。一切冷風勞氣。筋骨拘攣。補腰膝。壯真陰。及年老昏耄。中年健忘。凡男子陽衰。女子陰衰。艱於子嗣者。皆宜服之。服此之法。或單用浸酒。或兼佐丸散。無不可者。制法。每擇淨一斤。以羊脂四兩。同炒。油盡用之。

味苦性寒反藜蘆沉也陰也乃足少陰腎經之藥能祛積熱黃疸止夢遺帶濁清小便利水除癰腫明目止淚平胃氣能令人嗜食利九竅除伏熱狂邪止渴醒酒療惡瘡斑疹疥癩殺疳虫及毒風煩躁眦眉炒黃為末米飲調服治腸風下血熱痢

貝母

十八
反烏頭

味苦氣平微寒氣味俱輕功力頗緩用須加倍善解肝藏鬱愁亦散心中逆氣祛肺痿肺癰痰膿喘嗽研末沙糖為丸含

嚔最佳降胸中因熱結胸及乳癰流痰結核若足生人面諸瘡燒灰油調頻敷產難胞衣不出研末用酒和吞亦除痰疝喉痺金瘡并止消渴煩熱赤眼翳膜堪點時疾黃疸能毆○又如半夏貝母俱治痰嗽但半夏兼治脾肺貝母獨善清金半夏用其辛貝母用其苦半夏用其溫貝母用其涼半夏性速貝母性緩半夏散寒貝母清熱性味陰陽大有不同俗有代用者其謬孰甚

土貝母

十九
反烏頭

味大苦性寒陰也降也乃手太陰少陽足陽明厥陰之藥大

全書卷四十六 本草
治肺癰肺痿欬喘吐血衄血最降痰氣善開鬱結止疼痛消
脹滿清肝火明目除時氣煩熱黃疸淋閉便血溺血解熱
毒殺諸虫及療喉痺癰癤乳癰發背一切癰瘍腫毒濕熱惡
瘡痔漏金瘡出血火瘡疼痛爲末可敷煎湯可服性味俱厚
較之川貝母清降之功不啻數倍

山慈姑 二十 一名金燈籠

味甘微辛有小毒治癰瘍疔腫瘡癩癰結核破皮攻毒俱
宜醋磨傅之除黥斑剝人面皮宜搗汁塗之并治諸毒蠱毒
蛇虫狂犬等傷或用酒調服或乾摻之亦治風痰癩疾以茶
清研服取吐可愈

柴胡 二一

味苦微辛氣平微寒氣味俱輕升也陽中之陰用此者用其
涼散平肝之熱入肝胆三焦心胞四經其性涼故解寒熱往
來肌表潮熱肝胆火炎胸脇痛結兼治瘡瘍血室受熱其性
散故主傷寒邪熱未解溫瘧熱盛少陽頭痛肝經鬱證總之
邪實者可用真虛者當酌其宜雖引清氣上升然升中有散
中虛者不可散虛熱者不可寒豈容誤哉兼之性滑善通大
便凡溏泄脾薄者當慎用之熱結不通者用佐當歸黃芩正

所宜也。○愚謂柴胡之性善泄善散，所以大能走汗，大能泄氣，斷非滋補之物。凡病陰虛水虧而孤陽勞熱者，不可再損營氣。蓋未有用散而不泄營氣者，未有動汗而不傷營血者。營卽陰也。陰旣虛矣，尚堪再損其陰否？然則用柴胡以治虛勞之熱者，果亦何所取義耶？觀寇宗奭衍義曰：柴胡本經並無一字治勞。今人治勞方中鮮有不用者。嗚呼！凡此誤世甚多。嘗原病勞之人，有一種藏本虛損，復受邪熱者，當須斟酌用之。如經驗方中治勞青蒿煎之用柴胡，正合宜耳。若或無邪得此愈，甚雖至死人亦不怨目擊甚多。目擊甚多，又謂補五勞七傷，藥性論亦謂治勞之羸瘵。若此等病，苟無實熱，醫者執而用之，不死何待？注釋本草一字不可忽。蓋萬世之後，所誤無窮，可不謹哉！觀此寇氏之說，其意專在邪熱二字。謂但察有邪無邪，以決可用不可用。此誠得理之見，而復有非之者，抑又何也？卽在王海藏亦曰：苟無實熱而用柴胡，不死何待？凡此所見畧同。用者不可不察。

桔梗 二二

一名薺芑

味苦微辛，氣微涼，氣輕於味。陽中有陰，有小毒。其性浮，用此者用其載藥上升，故有舟楫之號。入肺胆胸膈上焦，載散藥。

本草 十一
表散寒邪載涼藥清咽疼喉痺亦治赤目腫痛載肺藥解肺
熱肺癰鼻塞唾膿欬嗽載痰藥能消痰止嘔亦可寬胸下氣
引大黃可使上升引青皮平肝止痛能解中惡蠱毒亦治驚
癇怔忡若欲專用降劑此物不宜同用

防風 二二

味甘辛氣溫升也陽也用此者用其氣平散風雖膀胱脾胃
經藥然隨諸經之藥各經皆至氣味俱輕故散風邪治一身
之痛療風眼止冷淚風能勝濕故亦去濕除遍體濕瘡若隨
實表補氣諸藥亦能收汗升舉陽氣止腸風下血崩漏然此

風藥中之潤劑亦能走散上焦元氣誤服久服反能傷人

細辛 二四

反藜蘆
忌生菜

味大辛氣溫氣味俱厚升也陽也有小毒用此者用其溫散
善祛陰分之寒邪除陰經之頭痛益肝溫胆利竅逐諸風濕
痺風癰疥癩鼻齩不聞香臭開關通竅散風淚目疼口臭牙
虫煎湯含漱過服亦散真氣不可不知此味辛甚故能逐陰
分之邪陰分且然陽分可知舊云少陰厥陰之藥然豈有辛
甚而不入陽分者但陽證忌熱用當審之

羌活 二五

味微苦氣辛微溫升也陽也用此者用其散寒定痛能入諸經太陽爲最散肌表之寒邪利周身項脊之疼痛排太陽之癰疽除新舊之風濕緣非柔懦之物故能撥亂反正惟其氣雄大能散逐若正氣虛者忌用之

獨活 二六

味苦氣香性微涼升中有降善行滯氣故入腎與膀胱兩經專理下焦風濕兩足痛痺濕癢拘攣或因風濕而齒痛頭眩喘逆奔豚疝瘕腰腹疼痛等證皆宜用之

升麻 二七

味微苦氣平氣味俱輕浮而升陽也用此者用其升散提氣乃脾胃肺與大腸四經之藥善散陽明經風寒肌表邪熱提元氣之下陷舉大腸之脫泄除陽明溫疫表邪解膚腠風熱斑疹引石膏除齒牙臭爛腫痛引芩頭去陽明表證頭疼佐當歸肉蓯蓉可通大便結燥凡癰疽痘疹陽虛不能起發及瀉痢崩淋夢遺脫肛陽虛下陷之類用佐補劑皆所宜也若上實氣壅諸火炎上及太陽表證皆不宜用且其味苦氣散若血氣太虛及水火無根者並不可用

前胡 二八

味苦氣寒降也陰中微陽去火痰實熱開氣逆結滯轉筋霍亂除胸中痞滿氣喘嘔逆欬嗽煩悶治傷寒寒熱風熱頭疼解嬰兒疳熱

延胡索 二九

味苦微辛氣微溫入肝脾二經善行滯氣破滯血血中氣藥故能止腹痛通經調月水淋滯心氣疼痛破癥癖跌撲凝瘀亦善落胎利小便及產後逆血上衝俱宜以酒煮服或用酒磨服亦可然性惟破氣逐血必真有血逆氣滯者方可用若產後血虛或經血枯少不利氣虛作痛者皆大非所宜

紫草 三十

味苦性寒此手厥陰足厥陰血分之藥性寒而利能涼血滑血通利二便故痘疹家宜用之凡治痘疹無論未出已出但血熱毒盛或紫或黑而大便秘結者宜用之若已出紅活不紫不黑而大便如常通利者即不可用故曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作瀉又若古方惟用其茸亦取其氣輕味薄而有清涼升發之功也此外可用以解黃疸消腫脹及一切斑疹惡瘡亦以其能利九竅通水道法濕涼血而然也

白芨 三一

味苦澁性收斂微寒反烏頭能入肺止血療肺癰肺痿治癰疽敗爛惡瘡刀箭湯火損傷生肌止痛俱可爲末傅之凡吐血不能止者用白芨爲末米飲調服卽效

三七 三二

味甘氣溫及陽明厥陰血分之藥故善止血散血定痛凡金刃刀箭所傷及跌撲杖瘡血出不止嚼爛塗之或爲末摻之其血卽止亦治吐血衄血下血血痢崩漏經水不止產後惡血不下俱宜自嚼或爲末米飲送下二三錢若治虎咬蛇傷等

證俱可服可傅

葉之性用與根大同凡折傷跌撲出血傅之卽止青腫亦散

白蘚皮 三三

味苦寒性燥而降乃手足太陰陽明之藥解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃通關節九竅利血脉小水治時行大熱飲水狂躁叫呼及婦人陰中腫痛小兒風熱驚癇尤治一切毒風風瘡疥癬赤爛楊梅瘡毒肩髮脫落此雖善理瘡瘍而實爲諸黃

風痺要藥

秦艽 三四

味苦性沉寒沉中有浮手足陽明清火藥也治風寒濕痺利
小水療通身風濕拘攣手足不遂清黃疸解溫疫熱毒除口
噤牙疼口瘡腸風下血及虛勞骨蒸發熱潮熱煩渴及婦人
胎熱小兒疳熱瘦弱等證

地榆 三五

味苦微瀋性寒而降既清且澁故能止吐血衄血清火明目
治腸風血痢及婦人崩漏下血月經不止帶濁痔漏產後陰
氣散失亦斂盜汗療熱痞除惡肉止瘡毒疼痛凡血熱者當
用虛寒者不相宜也作膏可貼金瘡搗汁可塗虎犬蛇虫傷

毒飲之亦可

黃芩 三六

味苦氣寒氣輕於味可升可降陰中微陽枯者善於入肺實
者善入大腸欲其上者酒炒欲其下者生用枯者清上焦之
火消痰利氣定喘嗽止失血退往來寒熱風熱濕熱頭痛解
瘟疫清咽療肺痿肺癰乳癰發背尤祛肌表之熱故治斑疹
鼠瘻瘡瘍赤眼實者涼下焦之熱能除赤痢熱畜膀胱五淋
澀痛大腸閉結便血漏血胎因火盛不安酌佐砂仁白朮腹
因火滯爲痛可加黃連厚朴大腸無火滑泄者最當慎用

黃連 三七

味大苦氣大寒味厚氣薄沉也降也降中微升陰中微陽專治諸火火在上炒以酒火在下炒以童便火而嘔者炒以薑汁火而伏者炒以鹽湯同吳茱萸炒可以止火痛同陳壁土炒可止熱瀉同枳實用可消火脹同天花粉用能解煩渴同木香丸和火滯下痢腹痛同吳茱萸丸治胃熱吐吞酸水總之其性大寒故惟平肝涼血肅胃清腸涼胆止驚癇瀉心除痞滿上可治吐血衄血下可治腸澼便紅療婦人陰戶腫痛除小兒食積熱疳殺虻虫消惡瘡癰腫除濕熱鬱熱善治火

眼亦消痔漏解烏附之熱殺巴豆之毒然其善瀉心脾實火虛熱妄用必致格陽故寇宗奭曰虛而冷者慎勿輕用王海藏曰夏月久血痢不用黃連陰在內也○景岳曰人之脾胃

軒岐再出

所以盛載萬物發生萬物本象地而屬土土煖則氣行而燥土寒則氣凝而濕土燥則實土濕則滑此天地間不易之至理黃連之苦寒若此所以過服苓連者無不敗脾此其濕滑亦自明顯易見獨因陶弘景別錄中有調胃厚腸之一言而劉河間復證之曰諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥因致後世視爲奇見無不謂黃連性燥而厚腸胃凡治瀉痢者

開手便是黃連不知黃連黃柏之燥於何見之呼嗚一言之
謬流染若此難洗若此諄理惑人莫此爲甚雖曰黃連治痢
亦有效者然必其素稟陽臟或多縱口腹濕熱爲痢者乃其
所宜且凡以縱肆不節而血氣正強者卽或誤用未必殺人
久之邪去亦必漸愈而歸功黃連何不可也此外則凡以元
氣素弱傷脾患痢或本無火邪而寒濕動脾者其病極多若
妄用黃連則脾腎日敗百無一生凡患痢而死者率由此類
可不寒心余爲此言而人有未必信者多以苦燥二字有未
明耳故余於傳忠錄辨河間條中復詳言苦味之理以俟衛
生仁者再爲贊正庶是非得明而民生有攸賴矣○道書言
服黃連犯猪肉令人泄瀉

胡黃連 三八

味大苦大寒其性味功用大似黃連能涼肝明目治骨蒸勞
熱三消吐血衄血五心煩熱療婦人胎熱虛驚熱痢及小兒疳
熱驚癇浸人乳點目甚良

知母 三九

味苦寒陰也其性沉中有浮浮則入手太陰手少陰沉則入
足陽明足厥陰足少陰也故其在上則能清肺止渴却頭痛

潤心肺解虛煩喘嗽吐血衄血去喉中腥臭在中則能退胃
火平消瘴在下則能利小水潤大便去膀胱肝腎濕熱腰脚
腫痛并治勞瘵內熱退陰火解熱淋崩濁古書言知母佐黃
柏滋陰降火有金水相生之義蓋謂黃柏能制膀胱命門陰
中之火知母能消肺金制腎水化源之火去火可以保陰是
卽所謂滋陰也故潔古東垣皆以爲滋陰降火之要藥繼自
丹溪而後則皆用以爲補陰誠大謬矣夫知母以沉寒之性
本無生氣用以清火則可用以補陰則何補之有第其陰柔
異順似乎有德倘元氣旣虧猶欲藉此以望補益是亦猶小
人在朝而國家元氣日受其削有陰移焉而莫之覺者是不
可不見之真而辨之早也

龍胆草 四十

味大苦大寒陰也沉也乃足厥陰少陽之正藥大能瀉火但
引以佐使則諸火皆治故能退骨蒸疔熱除心火驚癇狂躁
胃火煩熱黃疸咽喉腫痛肝腎膀胱伏火小水淋閉血熱瀉
痢下焦濕熱癰腫瘡毒疼痛婦人血熱崩淋小兒熱疔客忤
去目黃睛赤腫痛殺蠱毒腸胃諸虫及風熱盜汗凡肝腎有
餘之火皆其所宜

隰草部

地黃 四一

生地黃味甘苦氣涼氣薄味厚沉也陰也鮮者更涼乾者微涼能生血補血涼心火退血熱去煩躁骨蒸熱痢下血止嘔血衄血脾中濕熱或婦人血熱而經枯或上下三消而熱渴總之其性頗涼若脾胃有寒者用宜斟酌

熟地黃味甘微苦味厚氣薄沉也陰中有陽本草言其入手足厥少陰經大補血衰滋培腎水填骨髓益真陰專補腎中

元氣兼療藏血之經此雖泛得其概亦豈足以盡是之妙夫地黃產於中州沃土之鄉得土氣之最厚者也其色黃土之色也其味甘土之味也得土之氣而曰非太陰陽明之藥吾弗信也惟是生者性涼脾胃喜煖故脾陽不足者所當慎用至若熟則性平稟至陰之德氣味純靜故能補五藏之真陰而又於多血之藏爲最要得非脾胃經藥耶且夫人之所以有生者氣與血耳氣主陽而動血主陰而靜補氣以人參爲主而芪朮但可爲之佐補血以熟地爲主而芎歸但可爲之佐然在芪朮芎歸則又有所當避而人參熟地則氣血之必

不可無故。凡諸經之陽氣虛者，非人參不可。諸經之陰血虛者，非熟地不可。人參有健運之功，熟地稟靜順之德。此熟地之與人參，一陰一陽相為表裏，一形一氣互主生成性味中正。無踰於此，誠有不可假借而更代者矣。凡諸真陰虧損者，有為發熱為頭疼為焦渴為喉痺為嗽痰為喘氣，或脾腎寒逆為嘔吐，或虛火載血於口鼻，或水泛於皮膚，或陰虛而泄利，或陽浮而狂躁，或陰脫而仆地，陰虛而神散者，非熟地之守不足以聚之。陰虛而火升者，非熟地之重不足以降之。陰虛而躁動者，非熟地之靜不足以鎮之。陰虛而陽急者，非熟地之甘不足以緩之。陰虛而水邪泛濫者，舍熟地何以自制。陰虛而真氣散失者，舍熟地何以歸源。陰虛而精血俱損，脂膏殘薄者，舍熟地何以厚腸胃。且猶有最玄最妙者，則熟地兼散劑方能發汗，何也？以汗化於血而無陰不作汗也。熟地兼溫劑始能回陽，何也？以陽生於下而無復不成乾也。然而陽性速，故人參少用亦可成功。陰性緩，熟地非多難以奏效。而今人有畏其滯膩者，則崔氏何以用腎氣丸而治痰浮有畏其滑澤者，則仲景何以用八味丸而醫腎泄。有謂陽能生陰，陰不能生陽者，則陰陽之理原自互根，彼此相須，缺一不

而今人有畏其滯膩者，則崔氏何以用腎氣丸而治痰浮有畏其滑澤者，則仲景何以用八味丸而醫腎泄。有謂陽能生陰，陰不能生陽者，則陰陽之理原自互根，彼此相須，缺一不

可無陽則陰無以生無陰則陽無以化故內經曰精化爲氣
得非陰亦生陽乎孰謂陽之能生而陰之不能長也又若制
用之法有用薑汁拌炒者則必有中寒兼嘔而後可有用砂
仁制者則必有脹滿不行而後可有用酒拌炒者則必有經
絡壅滯而後可使無此數者而必欲強用制法是不知用熟
地者正欲用其靜重之妙而反爲散動以亂其性何異畫蛇
而添足今之人卽欲用之補陰而必兼以滲痢則焉知補陰
不利水利水不補陰而補陰之法不宜滲卽有用之補血而
復疑其滯膩則焉知血虛如燥土旱極望雲霓而枯渴之腸

極喜滋設不明此則少用之尚欲兼之以利又孰敢單用之
而在之以多單用而多且不敢又孰敢再助以甘而盡其所
長是又何異因咽而廢食也嗟嗟熟地之功其不申於時用
者久矣其有不可以筆楮盡者尚多也予今特表而出之尚
祈明者之自悟焉

牛膝 四二

味苦甘氣微涼性降而滑陰也忌牛肉酒漬收咀走十二經
絡助一身元氣主手足血熱痿痺血燥拘攣通膀胱瀉秘大
腸乾結補髓填精益陰活血治腰膝痠疼滋鬚髮枯白其性

下走如奔故能通經閉破血癥引諸藥下降同麝香用墮胎尤速凡藏寒便滑下元不固者當忌用之

麥門冬

四三

味甘微苦性微寒降也陽中陰也去心用恐令人煩其味甘多苦少故上行心肺補上焦之津液清胸膈之渴煩解火炎之嘔吐退血燥之虛熱益精滋陰澤肌潤結肺痿肺癰欬唾衄血經枯乳汁不行肺乾欬嗽不絕降火清心消痰補怯復脈須仗人參便滑中寒者勿設

續斷

四四

川者色灰黑尖瘦多蘆形如雞脚皮斷而皺者是味苦而澁苦重澁輕氣微涼他產者味甘微辛澁少用川者良凡用此者用其苦澁其味苦而重故能入血分調血脈消腫毒乳癰瘰癧痔瘻治金損跌傷續筋骨血脈其味澁故能止吐血衄血崩淋胎漏便血尿血調血痢縮小便止遺精帶濁佐之以甘如甘草地黃人參山藥之類其效尤捷

蜀葵子

四五

味甘性寒能利小水通淋閉消水腫潤大腸催生落胎通乳汁亦治一切瘡疥并癩疵赤靨苗葉可作菜茹古以葵爲五

菜之主今不復用之矣

黃葵花 性滑利與蜀葵大同若治諸惡瘡膿水久不瘥者

用花為末傅之即愈為瘡家要藥浸油可塗湯火瘡

車前子 四六 即芡苳

味甘微鹹氣寒入膀胱肝經通尿管熱淋澀痛毆風熱目赤翳膜利水能除濕痺性滑極善催生兼治濕熱瀉痢亦去心胸煩熱

根葉 生搗汁飲治一切尿血衄血熱痢尤逐氣瘰利水

白蒺藜 四七

味苦微辛微甘微涼能破癥瘕結聚止遺溺泄精療肺痿肺癰翳膜目赤除喉痺癬疥痔瘰癧風通身濕爛惡瘡乳巖帶下俱宜催生止煩亦用涼血養血亦善補陰用補宜炒熟去刺用涼宜連刺生搗去風解毒白者最良
沙苑蒺藜性亦大同若用固精補腎止遺瀝尿血縮小便止煩渴去燥熱則亦可用此

紅花 四八

味甘微苦微辛氣微涼陰中微陽惟入血脉多用女科少用可活血引經多用能破血通瘀可下死胎亦療血暈達痘瘡

血熱難出散斑疹血滯不消潤燥活血止痛通經亦消腫毒

紫苑 四九

味苦平微辛辛能入肺苦能降氣故治欬嗽土氣痰喘惟肺實氣壅或火邪刑金而致欬唾膿血者乃可用之若以勞傷肺腎水虧金燥而致喘失血者則非所宜觀陶氏別錄謂其補不足治五勞體虛其亦言之過也

甘菊花 五十

白菊花根善利水搗汁和酒服之大治癰閉

味甘色黃者能養血散風去頭目風熱眩暈疼痛目中翳膜及遍身遊風風疹作枕明目葉亦可用

味苦者性涼能解血中鬱熱清頭目去風熱眼目腫痛流淚根葉辛香能消癰毒止疼痛

野菊花 五一

一名苦蕒

根葉莖花皆可同用味苦辛大能散火散氣消癰毒疔腫癩癧眼目熱痛亦破婦人瘀血孫氏治癰毒方用野菊連根葉搗爛酒煎熱服取汗以渣敷之或同蒼耳搗汁以熱酒衝服冬月用乾者煎服或為末酒服亦可

菴蓀 五二

味苦氣微寒有小毒此物氣味頗峻善逐風濕諸毒用蜜酒

層層和灑九蒸九曝蜜丸空心酒吞多寡隨宜善治中風口
眼歪邪除濕痺腰脚痠痛麻木生者酒煎逐破傷風危急如
神散撒麻疔惡毒惡瘡浮腫虎傷狗咬蜘蛛虫毒或搗爛封
之或煎湯或散敷並良其掃蕩功力若此似於元氣虛者非
利

益母草 五三

子名芫蔚

味微苦微辛微寒性滑而利善調女人胎產諸證故有益母
之號能去死胎滑生胎活血涼血行血故能治產難胎衣不
下子死腹中及經脈不調崩中漏下尿血瀉血瘀血等證然

惟血熱血滯及胎產艱澁者宜之若血氣素虛兼寒及滑陷
不固者皆非所宜不得以其益母之名謂婦人所必用也蓋
用其滑利之性則可求其補益之功則未也本草言其久服
益精輕身誠不足信此外如退浮腫下水氣及打撲瘀血通
大小便之類皆以其能利也若治疔腫乳癰丹毒惡毒則可
搗汁飲之其渣亦可敷貼

子名芫蔚功用略同但子味微甘稍溫故能涼血補血亦益
陰氣明目

瞿麥 五四

味苦微寒降也性滑利能通小便降陰火除五淋利血脉兼涼藥亦消眼日腫痛兼血藥則能通經破血下胎凡下焦濕熱疼痛諸病皆可用之

茵陳 五五

味苦微辛氣微寒陰中微陽入足太陽經用此者用其利濕逐熱故能通關節解熱滯療天行時疾熱狂頭痛利小水專治黃疸宜佐梔子黃而濕者多腫再加滲利黃而燥者乾澀再加涼潤只有陰黃一證因以中寒不運此非所宜又解傷寒瘴瘧火熱散熱痰風熱疼痛濕熱為痢尤其所宜

青蒿 五六

味苦微辛性寒陰中有陽降中有散主肝腎三焦血分之病療陰火伏留骨節故善治骨蒸勞熱尸疰鬼氣降火滋陰潤顏色長毛髮治瘧疾寒熱殺虫毒及惡瘡濕疥生搗可傅金瘡止血止痛

欬冬花 五七

味微甘微辛而溫其氣浮陽也入手太陰經能溫肺氣故療欬嗽及肺癰肺痿欬唾膿血寇宗奭曰有人病嗽多日或教以燃欬冬花三兩於無風處以筆管吸其烟滿口則燕之數

日果效

麻黃 五八

味微苦微瀼氣溫而辛升也陽也此以輕揚之味而兼辛溫之性故善達肌表走經絡大能表散風邪祛除寒毒一應瘟疫瘧疾瘴氣山嵐凡足三陽表實之證必宜用之若寒邪深入少陰厥陰筋骨之間非用麻黃官桂不能逐也但用此之法自有微妙則在佐使之間或兼氣藥以助力可得衛中之汗或兼血藥以助液可得營中之汗或兼溫藥以助陽可逐陰凝之寒毒或兼寒藥以助陰可解炎熱之瘟邪此實傷寒

陰瘧家第一要藥故仲景諸方以此爲首實千古之獨得者也今見後人多有畏之爲毒藥而不敢用又有謂夏月不宜用麻黃者皆不達可哂也雖在李氏有云若過發則汗多亡陽若自汗表虛之人用之則脫人元氣是皆過用及誤用而然若陰邪深入則無論冬夏皆所最宜又何過之有此外如手太陰之風寒欬嗽手少陰之風熱斑疹足少陰之風水腫脹足厥陰之風痛目痛凡宜用散者惟斯爲最然柴胡麻黃俱爲散邪要藥但陽邪宜柴胡陰邪宜麻黃不可不察也○制用之法須折去粗根入滾湯中煮三五沸以竹片掠去浮

沫晒乾用之不爾令人動煩

麻黃根 味甘平微苦微瀼同甘斂藥煎服可以止汗同牡蠣粉米粉或用舊蕉扇杵末等分以生絹袋盛貯用撲盜汗或夏月多汗用之俱佳

萱草 五九

一名忘憂 一名宜男 一名鹿葱

萱草者詩作諼草凡樹此者可解憂思故名忘憂烹食其苗氣味如葱而鹿喜食之故名鹿葱婦人佩其花則生男故名宜男花葉氣味甘而微涼故能去濕熱利小便赤澁除煩渴酒濕黃疸安五臟利胸膈令人和悅亦能明目

根治沙淋帶濁利水氣解酒疸宜搗汁服之治吐血衄血研汁一大盞和薑汁細細呷之治吹乳乳癰腫痛須搗酒服以渣封之

連翹 六十

味苦微辛氣微寒氣味俱薄輕清而浮升也陽中有陰入手少陰手足少陽陽明瀉心經客熱降脾胃濕熱去寸白蛇虫通月水五淋以其味苦而輕故善達肌表散鼠痿癩癭癭瘤結熱蠱毒癰毒斑疹治瘡癤止痛消腫排膿瘡家號為聖丹以其辛而能散故又走經絡通血凝氣滯結聚所不可無

旋覆花 六一

味苦甘微辛陰也降也乃手太陰肺經手陽明大腸經藥開結氣降痰涎通水道消腫滿凡氣壅濕熱者宜之但其性在走散故凡見大腸不實及氣虛陽衰之人皆所忌用

鼠粘子 六二 一名牛旁子 一名大力子

味苦辛降中有升治風毒斑疹諸癩散瘡瘍腫毒喉痺及腰膝凝寒痺滯之氣以其善走十二經而解中有散也

決明 六三

味微苦微甘性平微涼力薄治肝熱風眼赤而多淚及肝火

目昏可為佐使惟多服久服方可得效或枕用治頭風明目其功勝于黑豆

葶藶 六四

味苦大寒沉也陰也氣味俱厚有毒善逐水氣不減大黃但大黃能泄血閉葶藶能泄氣閉氣行而水自行也若肺中水氣臏滿脹急者非此不能除然性急利甚凡涉氣虛者不可輕用淮南子曰大戟去水葶藶愈脹用之不慎乃反成病即此謂也第此有甜苦二種雖曰為甜然亦非真甜但稍淡耳稍淡者其性亦稍緩

夏枯草 六五

味微苦微辛氣浮而升陰中陽也善解肝氣養肝血故能散結開鬱大治瘰癧鼠疫乳癰瘻氣并治頭瘡目疾樓全善云夏枯草治目珠痛至夜則甚者神效或用苦藥點眼反甚者亦神效一男子目珠痛至夜則重用黃連點之更甚諸藥不效乃用夏枯草二兩香附二兩甘草四錢為末每服一錢半清茶調服下咽即疼減至四五服良愈也

蒼耳子 六六 一名羊負來

味苦微甘治頭風寒痛風濕周痺四肢拘攣去風明目養血煖腰膝及瘰癧瘡疥亦治鼻淵宜炒熟為末白湯點眼一二錢久之乃效忌猪肉馬肉

漏蘆 六七

味微鹹性寒有小毒主熱毒惡瘡瘰癧乳癰痔漏排膿長肉止金瘡血出亦下乳汁通經脈消赤眼利小便止尿血腸風淋瀝遺溺及小兒壯熱療跌撲損傷可續筋骨

劉寄奴 六八

味苦性溫能破瘀血活新血通婦人經脈產後餘血損傷瘀血下氣止心腹痛及小便去血俱可為散或茶或酒調服搗

全書卷四
本草
敷金瘡出血不止其效尤捷用治湯火傷大效但為未摻之

篇蓄 六九

味苦瀉利小便除黃疸殺三虫去下部濕熱浸淫陰蝕瘡疥
痔漏煮汁飲之療小兒虻虫上攻心腹作痛大效有海上歌
云心頭急痛不能當我有仙人海上方篇蓄醋煎通口噤管
教時刻即安康

青箱子 七十 野雞冠子也

味微苦微寒能清肝火血熱故治赤眼退赤障消翳腫鎮肝
明耳目亦去風濕惡瘡疥癩

艾 七一

味微苦氣辛生用微溫熟用微熱能通十二經而尤為肝脾
腎之藥善於溫中逐冷除濕行血中之氣氣中之滯凡婦人
血氣寒滯者最宜用之故能安胎止心腹痛治帶下血崩煖
腰膝止吐血下痢辟風寒寒濕瘴癘霍亂轉筋及一切冷氣
鬼氣殺虻虫并下部蠱瘡或生用搗汁或熟用煎湯或用炙
百病或炒熱敷熨可通經絡或袋盛包裹可溫臍膝表裏生
熟俱有所宜

佛耳草 七二 一名鼠麴草

味微酸性温大温肺氣止寒嗽散痰氣解風寒寒熱亦止泄瀉鋪艾捲作烟筒用薰久嗽尤效

藍靛 七三

藍葉氣味苦寒微甘善解百虫百藥毒及治天行瘟疫熱毒發狂風熱斑疹癰瘍腫痛除煩渴止鼻衄吐血殺疔蝕金瘡箭毒凡以熱兼毒者皆宜搗汁用之

○靛青乃藍與石灰所成性與藍葉稍異其殺虫止血傳諸熱毒熱瘡之功似有勝於藍葉者

○青黛味微鹹而寒性與靛青大同解諸熱毒虫毒金瘡熱瘡或乾糝或以水調敷若治諸熱瘡毒或用馬齒莧加青黛同搗傳之若治天行頭痛瘟疫熱毒及小兒諸熱驚癇發熱並宜水研服之

木賊 七四

味微苦微甘性温而升陽也性亞麻黃故能發汗解肌治傷寒瘧疾去風濕散火邪療日疾退翳障止腸風下血下痢及婦人崩中帶漏月水不調亦治風濕疝痛大腸膀胱

王不留行 七五 一名金盞銀臺

味苦平性滑利乃陽明衝任血海藥也治風毒通血脉療婦

人難產及經滯不調下乳汁利小便除風濕痺痛止心煩鼻
衄發背癰疽瘡癩遊風風疹出竹木刺及金瘡止血亦能定
痛

海金沙 七六

此草出黔中七月收其全科晒乾以杖擊之則細沙自莖葉
中落味甘性寒乃小腸膀胱血分藥也善通利水道解鬱熱
濕熱及傷寒熱狂小便癰閉腫滿熱淋膏濁血淋石淋莖中
疼痛解諸熱毒或丸或散皆可用

燈心草 七七

味淡性平能通水道澁結癰閉治五淋瀉肺熱降心火除水
腫止血通陰氣散腫止渴但用敗蓆煮服更良若治喉痺宜
燒燈草灰吹之若治下疳瘡亦用燒灰加輕粉麝香為末摻
之

烟 又七七

味辛氣溫性微熱升也陽也燒烟吸之大能醉人用時惟吸
一口或二口若多吸之令人醉倒久而後甦甚者以冷水一
口解之即醒若見煩悶但用白糖解之即安亦奇物也吸時
須開喉長吸嚙下令其直達下焦其氣上行則能溫心肺下

行則能溫肝脾腎服後能使通身溫暖微汗元陽陡壯用以
治表善逐一切陰邪寒毒山嵐瘴氣風濕邪閉腠理筋骨疼
痛誠頃刻取效之神劑也用以治裏善壯胃氣進飲食祛陰
濁寒滯消膨脹宿食止嘔噦霍亂除積聚諸蟲解鬱結止疼
痛行氣停血瘀舉下陷後墜通達三焦立刻見效此物自古
未聞也近自我明萬曆時始出於閩廣之間自後吳楚間皆
種植之矣然總不若閩中者色微黃質細名爲金絲烟者力
強氣勝爲優也求其習服之始則向以征滇之役師旅深入
瘴地無不染病獨一營安然無恙問其所以則衆皆服烟由

是徧傳而今則西南一方無分老幼朝夕不能間矣予初得
此物亦甚疑貳及習服數次乃悉其功用之捷有如是者因
著性於此然此物性屬純陽善行善散惟陰滯者用之如神
若陽盛氣越而多躁多火及氣虛氣短而多汗者皆不宜用
或疑其能頃刻醉人性必有毒今彼處習服既久初未聞其
妨人者抑又何耶蓋其陽氣強猛人不能勝故下咽卽醉既
能散邪亦必耗氣理固然也然烟氣易散而人氣隨復陽性
留中旋亦生氣此其耗中有補故人多喜服而未見其損者
以此○後檳榔條中有說當與此參閱

芳草部

當歸 七八

味甘辛氣溫氣輕味重可升可降陰中有陽其味甘而重故專能補血其氣輕而辛故又能行血補中有動行中有補誠血中之氣藥亦血中之聖藥也頭止血上行身養血中守尾破血下流全活血不走大約佐之以補則補故能養營養血補氣生精安五臟強形體益神志凡有形虛損之病無所不宜佐之以攻則通故能祛痛通便利筋骨治拘攣癱瘓燥澀

等證營虛而表不解者佐以柴葛麻桂等劑大能散表衛熱而表不斂者佐以六黃之類又能固表惟其氣辛而動故欲其靜者當避之性滑善行大便不固者當避之凡陰中火盛者當歸能動血亦非所宜陰中陽虛者當歸能養血乃不可少若血滯而爲痢者正所當用其要在動滑兩字若婦人經期血滯臨產催生及產後兒枕作痛俱當以此爲君小兒痘疹驚癇凡屬營虛者必不可少

川芎 七九

味辛微甘氣溫升也陽也其性善散又走肝經氣中之血藥

也反藜蘆畏硝石滑石黃連者以其沉寒而制其升散之性也芎歸俱屬血藥而芎之散動尤甚於歸故能散風寒治頭痛破瘀蓄通血脉解結氣逐疼痛排膿消腫逐血通經同細辛煎服治金瘡作痛同陳艾煎服驗胎孕有無三四月後服此微動者胎以其氣升故兼理崩漏眩運以其甘少故散則有餘補則不足惟風寒之頭痛極宜用之若三陽火壅於上而痛者得升反甚今人不明升降而但知用芎治頭痛謬亦甚矣多服久服令人走散真氣能致暴亡用者識之

芎藥

八十

反藜蘆

味微苦微甘畧酸性頗寒氣薄於味歛降多而升散少陰也
有小毒白者味甘補性多赤者味苦瀉性多生者更涼酒炒
微平其性沈陰故入血分補血熱之虛瀉肝火之實固勝理
止熱瀉消癰腫利小便除眼疼退虛熱緩三消諸證於因熱
而致者爲宜若脾氣寒而痞滿難化者忌用止血虛之腹痛
歛血虛之發熱白者安胎熱不寧赤者能通經破血此物乃
補藥中之稍寒者非若極苦大寒之比若謂其白色屬金恐
傷肝木寒伐生氣產後非宜則凡白過芎藥寒過芎藥者又
將何如如仲景無神散芎藥湯之類非皆產後要藥耶用者

還當詳審若產後血熱而陰氣散失者正當用之不必疑也

丹皮 八一

味辛苦氣微涼氣味俱輕陰中陽也赤者行性多白者行性緩入足少陰及手厥陰經忌葫蒜涼骨蒸無汗散吐衄瘀血除產後血滯寒熱祛腸胃蓄血癥堅仍定神志通月水治驚搐風癩療癰腫住痛總之性味和緩原無補性但其微涼而辛能和血涼血生血除煩熱善行血滯滯去而鬱熱自解故亦退熱用此者用其行血滯而不峻

白豆蔻 八二

味辛氣溫味薄氣厚陽也入脾肺兩經別有清爽之氣散胸中冷滯溫胃口止疼除嘔逆翻胃消宿食膨脹治噎膈除瘧疾解酒毒祛穢惡能退翳膜亦消痰氣欲其速效嚼燕甚豆或為散亦妙

肉豆蔻 八三

味苦辛而澁性溫理脾胃虛冷穀食不消治大腸虛冷滑泄不止以其氣香而辛故能行滯止痛和腹脹治霍亂調中下氣開胃進食解酒毒化痰飲溫胃逐蟲辟諸惡氣療小兒胃寒傷乳吐瀉以其能固大腸腸既固則元氣不走脾氣自健

故曰理脾胃虛冷而實非能補虛也。麩包煨熟用，或剉如豆大，以乾麩拌炒熟，去麩用之，尤妙。蓋但欲去其油而用其熟耳。

草果 八四

亦名草豆蔻

味辛性溫熱，陽也。浮也。入足太陰陽明，能破滯氣，除寒氣，消食，療心腹疼痛，解酒毒，治瘴癘寒瘧，傷暑嘔吐瀉痢，脹滿及胃吐酸，開痰飲積聚，噎膈殺魚肉毒，開鬱燥濕，辟除口臭，及婦人惡阻，氣逆帶濁，此有二種，惟建寧所產辛香氣和者佳。宜以麩裹微火煨熟用之，或麩拌炒熟亦可。滇廣者氣辛而

臭大，能損人元氣。

破故紙 八五

味苦辛，氣大溫，性燥而降，能固下元，煖水藏，治下焦無火，精滑帶濁，諸冷頑痺，脾腎虛寒，而為溏泄下痢，以其煖腎固精，所以能療腰膝疼，疼陰冷，囊濕縮小便，煖命門小腹，止腹中疼痛，腎泄，以其性降，所以能納氣定喘，惟其氣辛而降，所以氣虛氣短，及有煩渴眩暈者，當少避之，即不得已用於丸中，可也。忌羊肉芸薹。

木香 八六

味苦辛性溫氣味俱厚能升能降陽中有陰行肝脾肺氣滯
如神止心腹脇氣痛甚捷和胃氣止吐瀉霍亂散冷氣除脹
疼呃逆治熱痢可佐芩連固大腸火煨方用順其氣癥積惡
逆自除調其氣安胎月經亦用亦治疫癘溫瘧亦殺蠱毒鬼
精若下焦氣逆諸病亦可縮小便亦能通秘結亦能止氣逆
之動血亦能消氣逆之癰腫

藿香 八七

味辛微甘氣溫氣味俱薄陽也可升可降此物香甜不峻善
快脾順氣開胃口寬胸膈進飲食止霍亂嘔吐理肺化滯加

烏藥等劑亦能健脾入四君同前能除口臭亦療水腫亦解
酒穢

香附 八八

味苦辛微甘氣溫氣味俱厚陽中有陰血中氣藥也專入肝
胆二經兼行諸經之氣用此者用其行氣血之滯童便炒欲
其下行醋炒則理氣痛開六鬱散寒邪利三焦行結滯消飲
食痰涎痞滿腹脹肘腫脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛療
霍亂吐逆氣滯泄瀉及吐血下血尿血婦人崩中帶下經脈
不調胎前產後氣逆諸病因能解鬱故曰婦人之要藥然其

味辛而動若陰虛躁熱而汗出血失者槩謂其要則大誤矣
此外凡癰疽瘰癧瘡瘍但氣滯不行者皆宜用之爲要藥

砂仁 八九

味辛微苦氣溫和脾行氣消食逐寒除霍亂止惡心消脹滿
安氣滯之胎卻腹痛治藏寒之瀉止小便洩痢快胸膈開痰
平氣逆欬嗽口齒浮熱止女子崩中鬼氣奔豚欲其溫煖須
用炒研入肺腎膀胱各隨使引亦善消化銅鐵骨哽

紫蘇 九十

味辛氣溫氣味香竄者佳用此者用其溫散解肌發汗祛風

寒甚捷開胃下食治脹滿亦佳順氣宜用口臭亦辟除霍亂
轉筋祛脚氣通大小腸消痰利肺止痛溫中安胎定喘解魚
蟹毒治蛇犬傷或作羹或生食俱可

梗 能順氣其性緩體虛者可用

子 性潤而降能潤大便消痰喘除五疝定霍亂順氣滯

薄荷 九一

味辛微苦氣微涼氣味俱輕升也陽也其性涼散通關節利
九竅乃手厥陰太陰經藥清六陽會首散一切毒風治傷寒
頭痛寒熱發毒汗療頭風腦痛清頭目咽喉口齒風熱諸病

除心腹惡氣脹滿霍亂下氣消食消痰辟邪氣穢惡引諸藥入營衛開小兒之風涎亦治瘰癧癰腫瘡疥風瘙癢疹作菜食之除口氣擣汁含嗽去舌胎語澁揉葉塞鼻止衄血亦治蜂螫蛇傷病新痊者忌用恐其泄汗亡陽

荊芥 九二

味辛苦氣溫氣厚味薄浮而升陽也用此者用其辛散調血能解肌發表退寒熱清頭目利咽喉破結氣消飲食通血脈行瘀滯助脾胃辟諸邪毒氣醒酒逐濕療頭痛頭旋脊背疼痛手足筋急痛痺脚氣筋骨煩疼風濕疝氣止下血血痢崩淋帶濁若產後中風強直宜研末酒服甚妙擣爛醋調傳疔瘡腫毒最佳亦鼠瘦瘰癧血風瘡疥必用之要藥

白芷 九三

味辛氣溫氣厚味輕升也陽也其性溫散敗毒逐陽明經風寒邪熱止頭痛頭風頭眩目痛目癢淚出散肺經風寒皮膚斑疹燥癢治鼻鼽鼻淵齒痛眉稜骨痛大腸風秘腸風尿血其氣辛香達表故治瘡瘍排膿止痒定痛托癰疽肺癰癩癧痔瘻長肉生肌炒黑用之提女人血崩漏下赤白血閉陰腫欲去黥斑宜以生用可作面脂亦治蛇傷砒毒金瘡傷損

香薷 九四

味苦辛氣寒氣輕能升能降散暑熱霍亂中脘絞痛小便澀
難清肺熱降胃火除躁煩解鬱滯爲末水服可止鼻衄煮汁
頓飲可除風熱轉筋去口臭濕熱水腫者可消中寒陰臟者
須避之

益智 九五

氣味辛溫能調諸氣辟寒氣治客寒犯胃煖胃和中去心腹
氣滯疼痛理下焦虛寒溫腎氣治遺精餘瀝夢泄赤白帶濁
及夜多小便者取二十餘枚研碎入鹽少許同煎服之有奇

驗此行陽退陰之藥凡脾寒不能進食及三焦命門陽氣衰
弱者皆宜之然其行性多補性少必兼補劑用之斯善若單
服多服未免過於散氣

鬱金 九六

味苦辛氣溫善下氣破惡血去血積止吐血衄血血淋尿血
及失心癲狂蠱毒單用治婦人冷氣血積結聚氣滯心腹疼
痛及產後敗血衝心欲死或散或丸或以韭汁薑汁童便并
花水俱可隨宜調服若治痔漏腫痛宜水調敷之耳內腫痛
宜水調灌入少頃傾出卽可愈

薑黃 九七

味苦辛性熱善下氣破血除心腹氣結氣脹冷氣食積疼痛亦治癥瘕血塊通月經產後敗血攻心及撲損瘀血祛邪辟惡散風熱消癰腫功與鬱金稍同而氣味則尤烈

澤蘭 九八

味微苦微辛善清血和血治吐血衄血療婦人產前產後諸血不調破宿血除腹痛清新血利關節通水道除癥瘕消撲損瘀血并治金瘡癰腫瘡膿用在清和故為婦人要藥

藁本 九九

味甘辛性溫氣厚味薄升也湯也療諸惡風鬼注除太陽頂巔頭痛大寒犯腦痛連齒頰及鼻面皮膚酒皸野刺風濕泄瀉冷氣腰疼婦人陰中風邪腫痛此足太陽經風痼霧露瘴疫之要藥

葦芩 一百

味辛大熱陽也浮也入手足陽明亦入肝腎善溫中下氣除胃冷辟陰寒療霍亂心腹疼痛冷痰嘔逆吞酸及虛寒瀉痢腸鳴其味大辛須同參朮歸地諸甘溫補劑用之尤效為末搗鼻可解偏風頭痛指齒可殺牙痛牙虫又牛乳煎治唐太

宗氣痢方詳列痢疾門

良薑 百一 子名紅豆蔻

味辛熱純陽浮也入足太陰陽明治胃中逆冷嘔吐清水惡心霍亂氣寒腹痛解酒毒消宿食健脾胃寬噎膈除反胃破冷癖解瘴瘧療轉筋瀉痢同草豆蔻煎飲亦治口臭子名紅豆蔻治用畧同

三稜 百二

氣味苦平能行血中之氣善破積氣逐瘀血消飲食脹滿氣滯腹痛除疝癖癥瘕積聚結塊通月水亦墮胎及產後惡血撲損瘀血并治瘡腫堅硬制宜醋浸炒熟入藥此與蓬朮稍同但蓬朮峻而此則差緩耳

蓬朮 百三 一名蓬莪茂

味苦辛氣溫有小毒走肝經善破氣中之血通月經消瘀血療跌撲損傷血滯作痛在中焦攻飲食氣滯不消胃寒吐酸膨脹在下焦攻奔豚疝癖冷氣積聚氣腫水腫制宜或酒或醋炒用或入灰火中煨熟搗切亦可但其性剛氣峻非有堅頑之積不宜用

蛇床子 百四

味微苦氣辛性溫乃少陽三焦命門之藥辛能去風煖能溫腎故可溫中下氣和關節除疼痛開鬱滯療陰濕惡瘡疥癬縮小便去陰汗止帶濁逐寒疝漱齒痛治男子陽痿腰疼大益陽事女人陰中腫痛善煖子宮男婦陽衰無子小兒驚癇撲傷俱可服去皮殼微炒用之凡治外證瘙癢腫痛風瘡俱宜煎湯薰洗亦可爲末摻敷俱宜生用

蔓草部

天門冬 百五

味苦微甘氣大寒味厚氣薄沉也陰也入肺腎兩經除虛勞內熱其味苦寒故上定熱喘下去熱淋苦殺三虫潤滋骨髓解渴除煩消痰止嗽降火保肺退熱滋陰大潤血熱燥結虛寒假熱脾腎溇泄最忌使宜貝母地黃去皮去心方用

兔絲子 百六

味甘辛氣微溫其性能固入肝脾腎三經先用甜水淘洗淨浸脹次用酒漬者熟晒乾炒之更妙補髓添精助陽斷泄續絕傷滋消渴縮小便止夢遺帶濁餘瀝煖腰膝寒疼難氣力筋骨明日開胃進食肥肌禁止鬼交尤安夢寐湯液丸散任

意何用古人不入煎劑亦一失也欲止消渴煎湯任意飲之

五味子 百七

皮甘肉酸性平而斂核仁味辛苦性溫而煖俱兼鹹味故名
五味入肺腎一經南者治風寒欬嗽北者療虛損勞傷整用
者用其酸生津解渴止瀉除煩療耗散之肺金滋不足之腎
水能收斂虛火亦解除酒毒敲碎者用其辛溫補元陽壯筋
骨助命門止霍亂但感寒初嗽當忌恐其斂束不散肝旺吞
酸當忌恐其助木傷土

何首烏 百八

味甘潛微苦陰中有陽性溫此其甘能補澁能固溫能養陽
雖曰肝腎之藥然白者入氣分赤者入血分凡血氣所在則
五陰之臟何所不至故能養血養神助氣壯筋骨強精髓黑
鬚髮亦治婦人帶濁失血產後諸虛等疾第其性效稍緩暫
服若不甚顯必久服之誠乃延年益壽滋生助嗣之良劑至
如斷瘧疾安久痢活血治風療癰腫癩癧風濕瘡瘍及一切
冷氣腸風宿疾總由其溫固收斂之功血氣固則真元復真
元復則邪自散也故唐之李翱著有何首烏傳即李時珍亦
曰此物不寒不燥功在地黃門冬之上誠非誣也若其制用

之法則有用黑豆層鋪九蒸九晒者有單用米泔浸三宿切
焙爲末而用者有用壯健人乳拌晒二次生杵爲末而用者
總之生不如熟卽單用米泔浸透蒸之極熟則善矣或不
人乳與豆也服此之後須忌生蘿蔔并諸血敗血等物

瓜蒌仁 百九

味甘氣寒氣味俱厚性降而潤能降實熱痰涎開鬱結氣閉
解消渴定脹喘潤肺止咳但其氣味悍劣善動惡心嘔吐中
氣虛者不宜用本草言其補虛勞殊爲大謬

天花粉 百十 卽瓜蒌根

味苦性寒氣味頗輕有升有降陰中有陽最涼心肺善解熱
渴大降膈上熱痰消乳癰腫毒痔瘻瘡癩排膿生肌長肉除
跌撲瘀血通月水除狂熱去黃疸潤枯燥善解酒毒亦通小
腸治肝火疝痛

金銀花 百十一 一名忍冬

味甘氣平其性微寒善於化毒故治癰疽腫毒瘡癤楊梅風
濕諸毒誠爲要藥毒未成者能散毒已成者能潰但其性緩
用須倍加或用酒煮服或搗汁攪酒頓飲或研爛拌酒厚敷
若治癰癤上部氣分諸毒用一兩許時常煎服極效

葛根 百十二

味甘氣平寒氣輕於味浮而微降陽中微陰用此者用其涼散雖善達諸陽經而陽明爲最以其氣輕故善解表發汗凡解散之藥多辛熱此獨涼而甘故解溫熱時行疫疾凡熱而兼渴者此爲最良當以爲君而佐以柴防甘桔極妙尤散鬱火療頭痛治溫瘧往來瘡疹未透解酒除煩生津止渴除胃中熱狂殺野葛巴豆毒箭金瘡等傷但其性涼易於動嘔胃寒者所當慎用

茜草

百十五

亦名過山龍

味苦甘氣微寒陰中微陽血中要藥其味苦故能行滯血其性涼故能止動血治勞傷吐衄時來除虛熱漏崩不止亦通經滯又療乳癰散跌撲血凝瘀聚解蠱毒敗血爛肝凡諸血熱血瘀並建奇功若女人經血不通以一兩酒煎服之一日卽通甚效若氣虛不攝血及脾寒者勿用

土茯苓

百十四

一名仙遺糧

味甘淡性平能健脾胃強筋骨去風濕利關節分水道止瀉痢治拘攣骨痛療癰腫喉痺除周身寒濕惡瘡尤解楊梅瘡毒及輕粉留毒潰爛疼痛諸證凡治此者須忌茶酒牛羊鷄

鷺及一應發風動氣等物

使君子 百十五

味甘氣溫有小毒性善殺虫治小兒疳積小便白濁凡大人小兒有虫病者但於每月上旬侵晨空腹食數枚或卽以殼煎湯嚥下次日出皆死而出也或云七生七煨食亦良或云一歲食一枚食後忌飲熱茶犯之卽作瀉凡小兒食此亦不宜頻而多大約性滑多則能傷脾也李時珍曰凡殺虫藥多是苦辛惟使君子槿子甘而殺虫亦異也但使君子專殺虻蟲槿子專殺寸白虫耳

牽牛 百十六 一名黑丑

味苦辛熱氣雄烈性急疾有毒下氣逐水通大小便善走氣分通水道消氣實氣滯水腫攻癥積落胎殺蟲瀉中毒去濕熱痰飲開氣秘氣結古方多爲散丸若用救急亦可佐羣藥煎服然大泄元氣凡虛弱之人須忌之

防已 百十七

味苦性寒陰也降也去濕熱水腫利大小便解諸經熱壅腫痛濕熱脚氣通九竅熱閉逐膀胱肝腎濕熱及熱毒諸瘡濕熱生虫等證

草薺 百十八

味微甘而淡氣溫能溫腎去濕理陰痿陰寒失溺白濁莖中作痛及四肢癱瘓不隨周身風濕惡瘡性味純緩用宜大劑

釣藤 百十九

味微甘微苦性微寒能清手厥陰之火足厥陰足少陽之風熱故專理肝風相火之病凡大人小兒驚癇眩暈斑疹天釣頭旋煩熱等證用之而風靜火息則諸證自除矣

山豆根 百二十

味大苦大寒解諸藥熱毒消癰腫瘡毒殺寸白諸虫含而嚥

汁解咽喉痺痛研末湯服五七分解內熱喘滿腹脹磨汁服解熱厥心痛研汁塗諸熱毒熱瘡腫痛及諸虫熱毒所傷

威靈仙 百二十一

味微辛微鹹性溫可升可降陰中陽也善逐諸風行氣血走經絡宣通五藏去腹內冷滯心膈痰水癥瘕痞氣塊積聚膀胱宿水腰膝肢體冷痛亦療折傷此藥性利善走乃治痛風之要藥故崔元亮言其去衆風通十二經脈朝服暮效其法采得根陰乾月餘搗末溫酒調服一錢七空腹服之如人本性殺藥可加及六錢微利兩行則減之病除乃停藥其性

甚善不觸諸藥但惡茗及麪湯李時珍曰威靈仙辛能泄氣
鹹能泄水故於風濕痰飲之病氣壯者服之有捷效其性大
抵峻利久服恐損真氣氣弱者亦不可服之

馬兜鈴 百二二

味微苦微辛性寒氣薄陰中微陽入手太陰肺經降肺火清
肺氣除熱痰欬嗽喘急不得臥多用則作吐凡蠱毒蛇毒於
飲食中得之咽中如有物噉不下吐不出者以此一兩煎湯
服之卽毒從吐出若治痔瘻腫痛用馬兜鈴於甕中燒烟薰
病處良

青木香 百二三

卽馬兜鈴根亦名土木香

味苦微辛性寒有毒能吐能利不可多服煮汁服可吐蠱毒
鬼疰諸毒搗末水調塗疔腫熱毒蛇毒日三四次立瘥亦可
傳瘡癢禿瘡

白藪 百二四

味苦微寒性斂取根搗傳癰毒及面上瘡疱刀箭傷湯火毒
諸瘡不斂生肌止痛俱宜爲末傅之若爲丸散亦治眼目赤
痛小兒驚癇婦人陰中腫痛赤白帶下

木通 百二五

亦名通草

味苦氣寒沉也降也能利九竅通關節消浮腫清火退熱除煩渴黃疸治耳聾目痛天行時疾頭痛鼻塞目眩瀉小腸火鬱利膀胱熱淋導痰濕嘔噦消癰腫壅滯熱毒惡瘡排膿止痛通婦人血熱經閉下乳汁消乳癰血塊催生下胎若治小水急數疼痛小腹虛滿宜加葱煎飲若治喉痺咽痛宜濃煎含嚥

毒母草部

附子 百二十六

氣味辛甘醜者大鹹性大熱陽中之陽也有毒畏人參黃芪甘草黑豆綠豆犀角童便烏韭防風其性浮中有沉走而不守因其善走諸經故曰與酒同功能除表裏沉寒厥逆寒噤溫中強陰煖五藏回陽氣除嘔噦霍亂反胃噎膈心腹疼痛脹滿瀉痢肢體拘攣寒邪濕氣胃寒虻虫寒痰寒疝風濕麻痺陰疽癰毒久漏冷瘡格陽喉痺陽虛二便不通及婦人經寒不調小兒慢驚等證大能引火歸源制伏虛熱善助參芪成功尤贊木地建效無論表證裏證但脈細無神氣虛無熱者所當急用故虞搏曰附子稟雄壯之質有斬關奪將之氣

能引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕吳綬曰附子乃陰證要藥凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脈沉者必用之或厥冷脈沉細者尤急須用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰證傷寒往往疑似而不敢用直待陰極陽竭而用已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰合此不用將何以救之此二公之言皆至言也不可不察惟孕婦忌服下胎甚速合葱涎塞耳亦可治聾

辨製法 附子製法稽之古者則有單用童便煮者有用薑汁鹽水者有用甘草黃連者有數味皆兼而用者其中宜否最當詳辨夫附子之性熱而剛急走而不守土人醜以重鹽故其味鹹而性則降今之所以用之者正欲用其熱性以回元陽以補脾腎以行參芪熟地等功若制以黃連則何以藉其回陽若制以鹽水則反以助其降性若制以童便則必不免於尿氣非惟更助其降而凡脾氣大虛者極易嘔噦一聞其臭便動惡心是藥未入口而先受其害且其沉降尤速何以達脾惟是薑汁一制頗通第其以辛助辛似欠和平若果

直中陰寒等證欲用其熱此法爲良至若常用而欲得其補性者不必用此又若煮法若不浸脹而煮則其心必不能熟卽浸脹而煮及其心熟則邊皮已太熟而失其性矣雖破而爲四煮亦不勻且煮者必有汁而汁中所去之性亦已多矣皆非制之得法者

製法 用甘草不拘大約酌附子之多寡而用甘草煎極濃甜湯先浸數日剝去皮臍切爲四塊又添濃甘草湯再浸二三日捻之軟透乃咀爲片入鍋文火炒至將乾庶得生熟勻等嚼尚有辣味是其度也若炒太乾則太熟而全無辣味

并其熱性全失矣故制之太過則但用附子之名耳效與不效無從驗也其所以必用甘草者蓋以附子之性急得甘草而後緩附子之性毒得甘草而後解附子之性走得甘草而後益心脾附子之性散得甘草而後調營衛此無他亦不過濟之以仁而後成其勇耳若欲急用以厚紙包裹沃甘草湯或煨或炙待其柔軟切開再用紙包頻沃又炙以熟爲度亦有用麵裹而煨者亦通若果真中陰寒厥逆將危者緩不及制則單用炮附不必更用他製也

辨毒 附子之性剛急而熱制用失宜難云無毒故欲制之

得法夫天下之制毒者無妙於火火之所以能制毒者以能
 革物之性故以氣而遇火則失其氣味而遇火則失其味剛
 者革其剛柔者失其柔故制附之法但用白水煮之極熟則
 亦全失辣味并其熱性俱失形如蘿蔔可食矣尚何毒之足
 慮哉今制之必用甘草者蓋欲存留其性而柔和其剛耳今
 人但知附子之可畏而不知太熟之無用也故凡食物之有
 毒者但製造極熟便當無害即河豚生蟹之屬諸有病於人
 者皆其欠熟而生性之未盡也故凡食物之有毒者皆可因
 此以類推矣至若藥劑之中有當煨煉而用者又何以然大

物之經火煨者其味皆鹹澁而所以用煨者非欲去其生剛
 之性則欲用其鹹澁之味而留性與不留性則其中各有宜
 否故凡當煨煉而用者皆可因此以類推矣又如藥之性毒
 者何可不避即如本草所云某有毒某無毒余則甚不然之
 而不知無藥無毒也故熱者有熱毒寒者有寒毒若用之不
 當凡能病人者無非毒也即如家常茶飯本皆養人之正味
 其或過用誤用亦能毒人而况以偏味偏性之藥乎但毒有
 大小用有權宜此不可不察耳矧附子之性雖云有毒而實
 無大毒但制得其法用得其宜何毒之有今之人不知其妙

且并人參熟地而俱畏之。夫人參熟地附子大黃實乃藥中之四維病而至於可畏勢非庸庸所濟者非此四物不可設。若逡巡必誤乃事。今人直至必不得已而後用附子事已無濟矣。事無濟則反罪之。將附子誠廢物乎。嗟夫人之所以生者陽氣耳。正氣耳。人之所以死者陰氣耳。邪氣耳。人參熟地者治世之良相也。附子大黃者亂世之良將也。兵不可久用。故良將用於暫亂不可忘治。故良相不可缺矧夫附子雖烈而其性扶陽有非硝黃之北。硝黃似緩而其性陰泄。又非桂附可例。華元化曰得其陽者生。得其陰者死。內經曰門戶不要是倉廩不藏也。得守者生。失守者死。今之人履芒硝大黃若坦途視參附熟地為蛇蝎愚耶知耶。

白附子

百二十七

味甘辛大温有小毒其性升能引藥勢上行辟頭風諸風冷氣心疼風痰眩暈帶濁瘰癧小兒驚風痰搐及面鼻遊風野斑風刺去面痕可作面脂亦治疥癬風瘡陰下濕癢風濕諸病凡欲入藥炮而用之。

大黃

百二十八

味苦氣大寒氣味俱厚陰中之陰降也有毒其性推陳致新

直走不守，奪土鬱壅，滯破積聚，堅癥療瘟疫，陽狂除斑黃，譫語滌實痰，導瘀血，通水道，退濕熱，開燥結，消癰腫，因有峻烈威風，積垢蕩之頃刻，欲速者生用湯泡，便吞欲緩者熟用和藥煎服，氣虛同以人參，名黃龍湯，血虛同以當歸，名玉燭散，佐以甘草，桔梗可緩其行，佐以芒硝厚朴，益助其銳，用之多寡，酌人實虛假實，誤用與鴆相類。

常山 百二十九

味大苦，性寒有毒，攻溫瘧痰瘧，及傷寒寒熱痰結氣逆，狂癰癩厥，惟胸腹多滯，邪實氣壯而病瘧者宜之。若老人弱人俱

當忌用，蓋此物性悍，善逐痰飲，得甘草則上行發吐，得大黃則下行發瀉也。亦治鬼毒蠱毒及頭項瘰癧鼠瘻。

半夏 百三十

味大辛微苦，氣溫可升可降，陽中陰也。有毒，其質滑潤，其性燥濕降痰，入脾胃胆經，生嚼戟喉，制用生薑下肺氣，開胃健脾，消痰飲痞滿，止咳嗽上氣，心痛脇痛，除嘔吐反胃，霍亂轉筋，頭眩腹脹不眠，氣結痰核，腫突去痰厥，頭痛散風閉喉疔。治脾濕泄瀉，遺精帶濁，消癰疽腫毒，殺蜈蚣蜂蠱虫毒，性能墮胎，孕婦雖忌，然胃不和而嘔吐不止，加薑汁微炒，但用無

妨若消渴煩熱及陰虛血證最忌勿加○李時珍曰半夏能主痰飲及腹脹者爲其體滑味辛而性溫也滑則能潤辛溫能散亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂辛走氣能化液辛以潤之是矣丹溪曰二陳湯能使大便潤而小便長成聊攝云半夏辛而散行水而潤腎燥又局方用半硫丸治老人虛秘皆取其滑潤也世俗皆以半夏南星爲性燥誤矣濕去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痺吐血下血多用二物非禁劑也二物亦能散血故破傷打撲皆主之

南星

百三十一

味苦辛氣溫可升可降陽中陰也性烈有毒薑汁制用善行脾肺墜中風實痰利胃膈下氣攻堅積治驚癇散血墮胎水磨蝮蛇虫咬毒醋調散腫破傷風金瘡折傷瘀血宜搗傅之
功同半夏酌用可也

膽星

百三十二

七製九製者方佳降痰因火動如神治小兒急驚必用總之實痰實火壅閉上焦而氣喘煩躁焦渴脹滿者所當必用較之南星味苦性涼故善解風痰熱滯

射干

百三十三

味苦性寒有毒陰也降也治欬逆上氣喉痺咽疼散結氣不
得息除胃腹邪熱脹滿清肝明目消積痰結核疔癰熱疔降
實火利大腸消瘀血通女人經閉苦酒磨塗可消腫毒

大戟 百三四

味苦大寒有毒反甘草性峻利善逐水邪痰涎瀉濕熱脹滿
消急痛破癥結下惡血攻積聚通二便殺蟲毒藥毒療天行
瘟瘧黃病及頸腋癰腫然大能瀉肺損真氣非有大實堅者不
宜輕用若中其毒惟苴蒲可以解之

甘遂 百三五

味苦性寒有毒反甘草專於行水能直達水結之處如水結
胸者非此不除若留痰留飲宿食癥堅積聚無不能逐故善
腫腹脚陰囊腫脹去面目浮腫通二便瀉膀胱濕熱及痰逆
癰癩噎膈痞塞然性烈傷陰不宜妄用

芫花 百三六
反甘草

味苦微溫有毒專逐五藏之水去水飲寒痰痰癖脇下痛欬
逆上氣心腹肢體脹滿瘴瘧鬼瘧濕毒寒毒蠱毒肉毒蟲魚
毒除疔癩癰腫逐惡血消咽腫根療瘡疥亦可毒魚若搗汁
浸線亦能繫落痔瘡惟其多毒虛者不可輕用

味甘辛性寒有小毒用根搗汁解一切諸毒下一切骨哽塗消癰瘍婦人乳癰初起但取根插酒服之仍以渣傅腫處即消然性能損齒故亦可落齒取牙

味微苦性微溫有小毒子名急性子治產難下胎消積塊開噎膈下骨哽亦善透骨通竅故又名透骨草若欲取牙但用子研末入砒少許點疼牙根即可取之然此不生虫蠹即蜂蝶亦不近似非無毒者也

味甘辛性熱有毒能逐風散毒療口眼喎斜失音口噤腫毒丹瘤鍼刺入肉止痛消腫追膿拔毒俱可研貼若治舌腫喉痺宜研爛紙捲燒烟薰咬立通催生下胎可同麝香巴豆研貼臍中李時珍曰一人病偏風手足不舉用此油同羊脂麝香穿山甲煎膏日摩數次兼服搜風養血之藥而愈一人病手臂一塊腫痛用此搗膏貼之一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗貼太陽一夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用屢奏奇效但內服不

可輕率爾或云搗膏以筋點於鵝鴨六畜舌根下卽不能食
點於肛門內卽下血死其毒可知凡服蓖麻者一生不得食
炒豆犯之必脹死

續隨子

百四十

一名千金子

味辛性溫有毒能逐瘀血消痰飲食積癥瘕疔瘰除蠱毒鬼
疰水氣冷氣心腹脹滿疼痛腹內諸疾利大小腸祛惡滯及
婦人血結血閉瘀血等證研碎酒服不過三顆當下惡物甚
者十粒若瀉多以酸漿水或薄醋粥食之卽止亦可研塗疥
癬惡瘡此物之功長於逐水殺虫是亦甘遂大戟之流也

木鱉子

又百四十

味苦微甘微辛氣雄劣性大寒有大毒本草言其甘溫無毒
謬也今見毒狗者能斃之於頃刻使非大毒而有如是乎人
若食之則中寒發噤不可解救按劉續霏雪錄云木鱉子有
毒不可食昔一薊門人有兩子患疔食之相繼皆死此不可
不慎也若其功用則惟以醋磨用敷腫毒乳癰痔漏腫痛及
喉痺腫痛用此醋漱於喉間引痰吐出以解熱毒不可嚙下
或同硃砂艾葉捲筒薰疥殺蟲最效或用熬麻油擦癬亦佳
番木鱉 味極苦性大寒大毒功用與木鱉大同而寒烈之

性尤甚



卷之四 雜錄

蘇州府志卷之四 雜錄

蘇州府志

蘇州府志

蘇州府志

蘇州府志

蘇州府志

蘇州府志

蘇州府志

德明新刊

卷之三

德明新刊

德明新刊

德明新刊

德明新刊

德明新刊

德明新刊

德明新刊

德明新刊

