

叢書  
總目

診脈入門 內經入門 女科入門 外科入門〔附疔科〕  
 辨舌入門 金匱入門 產科入門 傷科入門  
 藥性入門 傷寒入門 痘科入門 喉科入門  
 湯頭入門 溫病入門 幼科入門 眼科入門

中國醫藥  
入門叢書  
(疔) (科) (入) (門)

上海中西醫藥書局印行

中國醫藥入門叢書 疔科入門目錄

金匱過玉書治疔法

總論

治法

辨證

忌用升藥說

疔不可用藥線說

藥忌酒說

頭面後項手指生疔便捷治法附治火眼

疔與癰疽治法異同

外科須明脈理

釘腦疔

印堂疔

鼻疔

迎香疔附迎香毒

耳疔

顴疔附黃樂亭方案

腮疔附黃樂亭方案

龍泉疔

虎鬚疔

反唇疔

鎖口疔

承漿疔

牙疔

穿牙疔附穿牙毒走馬牙疔

舌疔

喉疔 附喉證  
治法

螞蝗疔

開花疔

松子疔

正對口疔 附癰疽治法

偏對口疔

十指疔

蛇頭疔

天蛇毒

水蛇頭疔

蛇眼疔

蛇背疔

蛇腹疔

蛇節疔

鰓肚疔

斷指疔

僵節蛙疔

手丫疔

虎口疔 附虎口毒

托盤疔 附手心毒  
穿掌毒

手背疔

手槽疔

肉龜疔 俗名脚發背  
附烏茄疔

冷疔 附黃樂亭足  
趾疔方案

脫骨疔

火焰疔

紫靨疔

黃鼓疔

白刃疔 附黃樂  
亭方案

黑靨疔

羊毛疔 一名羊  
毛痧

羊毛疔瘤

心經疔

火疔 附一切痧證治法

血疔

黑疔

魚眼疔

魚臍疔

七星趕月疔

護場疔

三十六疔

刀賺疔

紅絲疔

對疔

水疔

葡萄疔

暗疔

內疔

痘疔治法

看疔秘法

捲簾疔 以下俱痘方

火珠疔

忘汲疔

參虎疔

燕窩疔

注命疔

透腸疔

驢龍疔

赤斑疔

痘證回毒方 兼治疔腫

拔毒膏

痘疔潰爛方

牛糞散

蒜灸方

中國醫藥  
入門叢書

# 疔科入門

## 金匱過玉書治疔法

### 總論 治法

疔者。堅硬有腳。其狀若釘。故名曰疔。若散腫無腳。則曰毒。有如瘡生指尖。按之其痛在骨。有硬塊如腳者。謂蛇頭疔。若散腫無腳。則謂天蛇毒。此卽疔與毒之分也。其證皆由五臟蘊毒而發。疔生於骨。根深毒重。每見失治之疔。日久膠結。致成硬腳。骨已爛出。貼於骨上。搖之不動。久不收斂。骨節脫落。若毒則自肌肉發出。其證較輕。治法則一。緩治亦防走黃。人受四時不正之氣。或恣食煎炙厚味。或誤食中瘟禽畜。及湯罐中霉爛米糝。則生疔。若早治則十證十全。稍遲已不過五六。失治則十壞八九矣。唇面之疔及紅絲

疔最易走黃。治能合法。一晝夜即可消散。他處亦然。蓋來甚速者。去亦捷也。初發時先令患者將頂上紅髮拔去。以洩毒。最好用蜘蛛拔毒法。若蜘蛛一時難覓。可用小尖刀刺患處。擠出惡血。見新血爲止。上蓋消疔毒膏。或稍加黑虎丹。背上有紅點。將鍼挑破。擠去紫血。疔發於五臟。上身之疔。背上俱有紅點。挑破以洩其毒。若脈浮數而寒熱拘急者。宜散。先服蟾酥丸。五丸。再服紺珠丹。俱以葱湯送下。灌至出汗爲度。若脈沉實而便閉口渴者。先服蟾酥丸。繼服貴金丸。重者服拔疔毒丸以下之。毒卽散矣。生於手足骨節間者稍輕。生於頭項胸背者較重。方書云。手指患疔。皮肉太薄。不宜早開。恐贅肉翻出。增痛。此說太拘。初發時不妨用刀輕刺。慢慢擠盡惡血。刺法。擠法。俱在乎手法。上蓋消疔毒膏。內有松香。內肉不致突出。凡疔如四圍腫痛。用鮮地丁草或菊花梗根葉搗汁塗之。或用溏鷄糞。或用烏龍膏解。

毒散外敷俱可。潰後硬而有腳。須用蟾酥丸。或拔疔散放孔內。外蓋膏藥。

拔去疔腳。拔去後如痛。恐有蟾酥毒。須用葱湯洗。不但容易收口。亦不致再發。無腳者不必用。

蟾酥丸。即用八將丹提毒。毒盡肌生。斷不可早用生肌散。恐毒未盡。反覆

故也。陳實功云。疔瘡先刺血。內毒宜汗泄。禁灸不禁鍼。怕綿不怕鐵。綿者

也。鐵者入鍼肉堅硬也。又相傳口訣云。治疔須明白。見證先一畫。除去刀疔。刀疔忌用刀

鍼。餘此法不可易。言雖俚俗。實治療之良訣也。若疔腫而不刺其毒。最易

入腹。刺後能將膿血擠清。有轉重就經。回生起死之效。倘刺之如瓜瓢。輒

而不知痛。流淡血水者。百無一生。或謂疔證屬火。不可灸。其說亦不盡然。

若紅絲疔。不灸疔頭而灸其所至之處。不可灸者。惟頭項之疔。與指疔。火

疔及火日耳。紅絲疔走毒甚速。不可拘火日不灸之說。蓋頭項係肝膽腎三經部位。且頭為衆陽

之首。疔乃火毒結成。再加艾灸。逼毒內攻。勢必走黃。手指之皮薄。灸則增

痛。永樂大典濟生方載疔腫則灸掌後橫紋五枚七壯男左女右其腫卽消。有失治而致走黃者。刺患所擠盡惡血。卽隨走黃處按經細尋。有芒刺直豎。卽是疔苗。急用鍼刺出惡血。卽於刺處用艾灸三壯以洩毒。疔之於灸。未可盡廢也。神而明之。存乎其人。

一論形色。若初起瘡頂泡色小白。二日大白。三四日轉紫色。疔頭潰膿。形若蜂窩。飲食如常。疔外生小瘡。四圍赤腫。手足溫者順。若初起似疔非疔。漸卽色灰頂陷。如魚臍。如蠶斑。先青後黑。輒陷無膿。神昏嚙語。心煩舌乾。睛凝邪視。驚悸喘急。膿清臭穢。形瘦慘黑。腹痛囊縮。嘔呃氣籠。無脈。飲食不進。時流血水。四肢俱冷。此惡險之證也。

一論禁忌。若月內不犯房事。則瘡口平坦無贅肉。最忌飲酒食肉。房勞夢遺。犯必走黃。又忌雞魚海味。生冷異香諸品。及怒氣勞碌。犯必加重。



凡疔由火毒而成。服藥最忌辛熱助火。則毒更甚。且始終忌用升藥。用之毒與藥結成硬塊。固結不散。潰後斷不可早用生肌散。恐毒未除。反延爛耳。

一論用藥次序。初起服蟾酥丸。或狗寶丸。紺珠丹。以發其汗。倘毒勢不盡。仍憎寒惡熱。服五味消毒飲。如發熱口渴。便閉脈沉實者。邪在裏也。服加味解毒湯。加生大黃五錢。葱頭五箇。輕者服化疔內消散。若將走黃。急服疔毒復生湯。已走黃。心煩昏憤者。服七星劍。若手足厥冷。六脈暴絕者。係毒氣閉塞。元氣不通。先服蟾酥丸。隨服木香流氣飲。若誤灸疔頭。煩躁譫語者。乃逼毒內攻也。宜服解毒大青湯。若潰後餘毒未盡。五心煩躁者。宜服人參清神湯。若鍼後出膿時。氣虛驚悸者。宜服內托安神散。若攻利太過。而致發渴。六脈虛大者。宜服補中益氣湯。若發汗

後汗不止。熱不退。瘡不疼。便不利者。此屬裏虛。宜服八珍湯加黃芪麥冬。凡疔收功後。不宜早補。卽見虛象。亦只可平補而不可溫補。

一論用藥輕重。上焦風熱之證。用藥宜輕。重則恐其犯及中下。二焦惟

疔則不然。頭面之疔。最易走黃。

古諺云。面無好疔。其毒極猛。

藥非重用不可。若菊花地

丁二飲。爲治疔要方。各用四兩。另加生甘草四錢。如二飲合用。至多減半。金銀花亦要藥。味清力薄。重用方效。菊花地丁。俱和平之品。金銀花雖散熱解毒。而能滋陰補虛。仲景立方。重用甘草者甚多。且有以甘草爲君者。時手用甘草。不過三四分。不知始於何人。外證用藥。本重於內證。而疔則其來甚速。非濃煎大劑。日夜當茶飲之。不能解其毒也。至若黃連黃蘗等大苦寒之藥。疔雖火證。不宜重用也。

辨證

疔之發也甚速。而其毒尤烈。有朝發夕死。隨發隨死者。有三日五日至一月半月而死者。初起如疥如粉刺。或發小泡。或起疙瘩。不可認作風熱疙瘩。始則或癢或麻木。毒盛者如是。後則漸痛。亦有起即痛者。由癢而起之證。其毒必四散遊走。最為利害。一二日後發寒熱如瘧。甚則嘔吐煩躁。頭暈眼花。舌硬口乾。手足青黑。心腹脹悶。精神萎頓。語言顛倒。其形大小長圓。其色黃白紅紫。或有紅絲。無一定形。更有生於內者。亦有寒熱頭痛等證。而瘡形不現。過數日或有一處腫起。即內疔所發之地。又有生於暗處者。初起不可誤為傷寒時疫。當於鬚髮眼耳口鼻肩下兩腋手足甲縫糞門陰戶等處。遍尋細看數次。有則照後方治之。若前心後背有紅點。即照後羊毛疔治之。要在虛心辨認。隨其證之輕重。用藥合宜。方可無慮。書云。見其小。則當大驚。倘或緩治。或治不得法。必致走黃。變端不測。俗云。走馬看疔。極言治之

不可緩。蓋疔證由五臟之毒火蘊結而發。故分五色。其部位亦有一定。發於心者。生唇口。手掌指節間。其泡色紅黃。發於肝者。生手足肋脇間。其色初紫後青。甚則指甲青色。發於脾者。生口角顙顴。眼胞間起有黃泡。發於肺者。生鼻竅。手指胸臆間起有白泡。發於腎者。生耳竅。腰腹軟處起有黑斑。卽證之形色部位參之。而五臟之所屬可辨矣。

茲將各疔之名開列於後。

有以象形名者曰氣疔 石疔 松子疔 爛疔 鬼疔 菜萸疔 麻子疔 芝麻疔 鹽膚疔 浮漚疔 瓜藤疔 楊梅疔 魚尾疔 豬疔 狗疔 羊疔 牛疔 驢馬疔 牛皮疔 蜈蚣疔 雄疔 雌疔 豆腐疔 火疔 水洗疔 刀斮疔 肉龜疔 蛇頭疔 蛇腹疔 蛇眼疔 蛇節疔 蛇背疔 鰍肚疔 托盤疔 葡萄疔

冷疔 對疔 羊毛疔 羊毛疔瘤 開花疔 螞蝗疔 水蛇頭疔  
脫骨疔 斷指疔 血疔 護腸疔 火珠疔 水疔 魚眼疔  
魚臍疔。

有以會意名者。曰捲簾疔 忘汲疔 燕窩疔 注命疔 透腸疔 驪  
龍疔 參虎疔 釘腦疔。

有以顏色名者。曰赤面疔 黑疔 火焰疔 紫靨疔 黃鼓疔 白刃  
疔 黑靨疔 紅絲疔

有以數目名者。曰十指疔 三十六疔 七星趕月疔。

有以經穴名者。曰迎香疔 印堂疔 合谷疔 承漿疔 人中疔。

有以部位名者。曰手丫疔 頰疔 鼻疔 髭疔 虎鬚疔 反唇疔

腮疔 牙疔 穿牙疔 暗疔 內疔 心經疔 手背疔 偏正對口

疔之類是也。以上諸疔。刺治法一切俱詳下。諸疔或見於方書。或得之口授。若偏正對口。手背等疔。則載於刺疔捷法。證極重險。

### 忌用升藥說

升藥者。卽周禮瘍醫之五毒藥。見鄭康成注。其方以石膽丹砂雄黃礬石。慈石五味。合置黃瓦瓶中。燒三日夜。其煙上着。以雞羽埽取之。以注瘡口。能使惡肉破骨盡出。然諸瘡痛癢。皆屬於心。心爲火臟。又積溼熱。更以剛猛煉合之品加之。不將使弱者傷正氣。强者增熱毒乎。此說得之桐鄉張夢廬。張氏於嘉道間。以通儒爲名醫。其治外證。不用升藥。皆得奏效。況今之升藥。又與古方不同。多用水銀硝礬合煉。非埋土中七八年。浪盡火氣。不可用。蓋水銀之性。善走經絡。能令瘡口變黑。筋骨拘攣。用之不當。有外證愈而成浮腫癰瘻之疾者。疔爲火毒之證。尤不可近。徐靈胎云。世人以

升藥爲收口聖藥。其害無窮。又云。水銀之毒未退盡。好肉遇之。皆爲死肌。王洪緒全生集升降之藥亦禁忌。徐王二氏爲當代名醫。其說非無所見。而云然也。

### 疔不可用藥線說

疔不用藥線。載於外科大成。余以爲外證皆不可用。不獨疔爲然也。時醫於外證潰後。慮其孔塞。輒以綿紙捲藥作線形。插入患孔。以致氣血阻隔。脈絡不能貫通。久則膿水清稀。不能收斂。後來將藥線扯去。外實中空。內已釀成一管。黃水時流。幼者背脊漸凸。不久天亡。壯者形神日羸。久成怯損。貽害匪淺。藥中用冰麝等品。卽無經不達。何必定用藥線哉。且藥線中用升藥者居多。在臂膊等硬肉處。卽不成管。亦有筋骨拘攣等弊。外科動用升藥。不肯用貴重之品者。無非爲惜資起見。余故嘗曰外科合藥。惜資

誠造孽也。

### 藥忌酒說

疔忌酒肉。犯必走黃。人人知之。然前人治疔之方。用酒者多。王洪緒全生集云。疔藥不宜用酒。凡藥俱不忌酒。外證之藥。有用酒煎而益效者。而疔獨忌之。以其善於走黃也。比論實前人所未發。余用古方。凡有酒者一概刪去。近時名醫黃樂亭。以葱礬散治疔。則用酒。古方亦然。取其無經不達也。是方載於白刃疔下。余用葱礬散。則以葱湯送下。間有用酒者。似較效。要視其證之何如耳。然於煎藥。則以不用為是。

### 頭面後項手指生疔便捷治法

附治火眼

疔之須刺。已於上詳言之矣。茲將督脈處及手指生疔。另有便捷刺法。再行聲明。俾治者更易也。按督脈起於長強穴。尾骶骨端。終於斷交穴。上唇門牙正中齒根。



百勞穴爲脊盡上行要路。又名大椎脊骨第一椎上陷中。與肩齊。如證生於督脈經行之地若

後項之正對口頭項下之天庭。從鼻直上入髮際五分。眉心中之印堂。鼻柱下之人中。

一名水溝。等處最好刺百勞穴以洩毒。生頭面者俱可刺。如患對口。項強不能轉側。刺後

片時。即能活動。再刺委中穴。毒必解而轉輕。刺法用三稜鍼輕刺。擠出紫

血。來經之穴。其色故紫。隨以麻油食鹽擦穴上。俾毒可透洩。刺不可深。內經所謂刺

皮無傷肉也。若指疔則無論何指須刺第三節指根近掌處。俾毒不致竄

入旁指及手心手背。即本指之毒亦可洩。此一定理也。朱子云。凡物莫不

有理。醫能明理。方可言醫。余以此法治疔。亦於理中求之。故無不效。若頭

面之證。火毒盛而腫者。可用生大黃生南星片。稍煎搗爛。作餅貼兩足心。

一週時。患處四圍塗牛膝湯。或煎藥中用牛膝。使火毒下行。治火眼亦極效。古人

所謂病在上而求諸下也。

委中穴 刺之不獨疔瘡有效。卽如癰疽發背紅腫疼痛及脚膝風溼。卽拄杖跛足者。鍼之亦效。若中風痰厥。牙關緊閉。不省人事者。鍼之立醒。其穴在臍中央約紋動脈陷中。令患者雙手著壁土。雙脚挺直。用三稜鍼將紙紫尖頭露半粒米許。鍼時以中指抵住鍼頭。看委中穴有細青紫脈。皆是溼毒惡血。照準青紫脈上刺之。任出黑血。至淡黃色爲止。將紙輕按片時。用膏藥貼之。三四日不可洗浴。外證可照此治。若風溼跛足等證。於放血後。令人將圓棍於手足腰背腿上推之。病卽漸愈。鍼穴不宜出血。惟委中少商兩穴。必須出血。且挑疔來經之穴。與平常鍼灸不同。總宜擠出惡血爲是。方書云。冬月閉藏。宜少鍼刺。如唇疔紅絲疔等證。轉瞬卽變。不能避冬月也。最好用細磁器碎片。取其鋒尖一塊。用筋一根。將頭劈開。夾縛磁鋒。以二指輕捺筋梢。將磁鋒對患處懸寸許。再用細鐵條一根。頻擊筋

根。令毒遇刺皆出。如不消。再行砭之。

### 疔與癰疽治法異同

疔與癰。雖同屬陽證。而癰之初起。卽痛。繼則吹腫無頭。膿熟方可開刀。異

於疔之初發。宜刺也。疽初起。有一粒椒。亦可輕刺。擠去惡血。或癢或痛。初發時。另有

刮毒一法。最爲捷效。詳鼻與疔之有用刮法者相同。疔之用藥。與癰近。與

疽稍異。且疽則屬陰者居多。其用藥與疔則更異。若論刺法。則尤大不同。

癰之腫高而患在肌內者。刺二三分。疽之平腫附骨者。須深刺。若疔則宜

淺而不宜深。疔與疽俱發於五臟難治。癰則起於六腑故。易治也。

### 外科須明脈理

林屋山人全生集云。外證之虛實。發現患處。不諳脈息。儘可救人。此說非

是。蓋其所主。全以色之紅白分陰陽。不知陽中有陰。陰中有陽。未可一概

論也。脈之有餘不足不可不辨。有餘之脈為浮。如木滑往來實有力。弦勁而

洪。浮而長。過於本位。緊急而數。六至。半沉而重。按之伏。著骨促。有止。不足之脈為細。如絲

遲。一息緩。四至。中旁實。瀦滯。不利。濡。浮而弱。細沉短。兩頭虛。無力。革。沉少結。渾中動。如豆

散。去來無定。微似有代。遲中有止。未潰而見有餘。毒氣盛也。攻不宜緩。已潰而見

不足。元氣虛也。補不宜遲。倘未潰而見不足之脈。則毒陷而氣虛。須補陽

以發毒。已潰而見有餘之脈。則毒盛而氣滯。必補陰以化毒。夫脈之道本

不易精。因其不易而竟曰治病不必診脈。誤人甚矣。總之外證未潰屬實。

脈宜洪大。已潰則虛。不宜洪大矣。若疔之初足。寒熱拘急。脈緊而數者。則

在表。宜汗以散之。如發熱口渴。便閉脈沉而實者。則在裏。宜下以解之。緊

數沉實。簡而易明。此為臨證診脈之要訣也。

釘腦疔

生於太陽穴及眼角邊。此疔極重。九死一生。太陽穴忌刺。如欲洩毒。又非刺不可。可用兩指將患處之肉提起。以三稜鍼輕輕橫刺。擠出膿血。再挑百勞穴。自一節挑五七節。百勞詳上。便捷治法。揩面獲髮。須留心。不可見水。如水流入。必致面目俱腫。證益加重。外敷消疔毒膏。內服蟾酥或狗寶丸。寒熱則用紺珠丹散之。便閉則用貴金丸下之。再服清火解毒大劑。或可轉重爲輕。

### 印堂疔

生於兩眉中心印堂穴。起有小泡頭。黑不痛。麻癢難忍。根脚堅硬。寒熱交作。一名眉心疔。又有初起色赤。浮痛痛腫。甚至高突如龍眼。煩躁口渴。坐臥不安者。宜急下之。俱係心肺二經火毒。若色黯根平。硬腫疼痛者。此名印堂疽。須按陰陽虛實治之。是處乃督脈經行之路。無一輕證。宜刺人中。

百勞以洩毒。穴詳便捷治法。

鼻疔 紅腫者曰鼻疔。若起白泡曰白刃疔。

生於鼻孔中腫塞脹痛引及腦門甚則唇腮俱腫此由肺經火毒宜服蟾酥丸汗之再用蟾酥丸研末放入鼻竅若鼻外腫硬即用離宮錠子塗之或荔枝肉及爛黃雞糞同搗塗之初起即當速治遲則毒氣內攻神昏嘔噦鼻腫如瓶者逆另有刮法用刀挑去瘡蓋將刀尖於患處輕刮微癢則毒水惡血漸來須耐心細刮數十次毒水清後用前藥外治更效。

迎香疔 附迎香毒。

生於鼻觀下迎香穴。鼻孔旁開五分 係手陽明風熱初生小泡麻癢微痛一二日

後結核板硬腫連腮唇惡寒身熱最易走黃急用鍼刺先擠出如膿之毒水一滴再將紫血擠盡遲則毒水散開則大腫而毒散矣照治唇疔之法

治之內服加減升葛湯。若迎香毒。則係陽明痰火蘊結。宜服蘇梗花粉橘紅川貝母連翹銀花薄荷甘草鮮蘆根之類。

耳疔

疔頭黑色。又名黑疔。

證生耳竅暗藏處。有由腎經火毒而成者。亦有飲丹石熱藥積毒而成者。色黑根深。形如椒目。發時痛如錐刺。牽引腮腦。破流血水。人多作耳痛治之。不知乃耳疔也。速服蟾酥丸發汗。再化蟾酥丸膿汁滴耳。內服敗毒散。火盛者用黃連解毒湯疏解。不久即瘥。耳中如流膿水。將新棉攪乾。用枯礬一錢。頭髮炙灰一錢。胭脂棉用溼布潮透。瓦上炙存性一錢。共爲末。以新棉捲稻柴心。上醮藥末。捲入加冰麝各三釐。更妙。再用荔枝煨爲末。麻油調敷耳外。內外並治。取效更速。

額疔

疔科入門 耳疔 額疔

生顴骨之間。屬陽明胃經。不論左右。初如粟米黃色小泡。旋如赤豆。或起疔瘡。或色白而頂凹。堅硬似釘。麻癢疼痛。寒熱交作。多因過食炙煇藥酒。以致胃經積火蘊毒。而生此證。極重極險。初宜用刺法。內服蟾酥丸。大便結則服拔疔毒丸。火盛紅腫。服黃連解毒湯。若乾陷無膿。面目腫亮。身體發熱。此乃正虛邪實。毒氣內攻。不能治矣。又泡色先紫後黑。麻木不知痛癢。四圍腫散。此腎經之毒已深。亦不可治。經云。心病則顴赤。宜降心火。腎病則顴與顏黑。宜滋腎水。是顴之證。不可專委於陽明也。

腮疔

初起如粟。二三日間。面鼻赤腫。甚則咽喉頸項皆腫。此係陽明火毒。並用後方加減服之。便結毒盛者。服貴金丸。不泄服拔疔毒丸。腮疔走黃。十分險惡。用藥以冀百中之一。



紫地丁五錢 蒲公英五錢 當歸尾貳錢 大貝母叁錢 天花粉叁錢

知每貳錢五分 皂角刺叁錢 穿山甲叁錢 金銀花貳兩 甘菊花八錢

白芷壹錢 甘草節叁錢 草河車壹錢 乳香壹錢

服三劑大效

### 龍泉疔 虎鬚疔

生於上唇人中。一名水溝穴。為龍泉。乃督脈經行之地。一名閉口疔。重則飲食

不進故也。人中之旁為虎鬚。係陽明絡經行之處。其輕者因風熱而結。初

狀若蚊咬。而根盤已經堅腫。惡寒身熱。次日頭破如椒一粒。照唇疔各方

治之。火盛者用黃連解毒湯。其重者或因七情內傷。或因高粱厚味。醇酒

炙博。五臟蘊熱。毒邪結聚而發。經曰膏粱味發疔。此之謂也。初起形如粟

粒。或如水泡。按之根深。如釘著骨。痛不可忍。根盤蔓腫不透。面目浮腫。或

堅腫焮紅。惡寒身熱。惡心嘔吐。肢體拘急。三四日後。或口噤如瘕。神識模糊。甚至不省人事。牙關緊閉。此係火毒陷入心包。即名走黃。不善治者。十難救一。急用拔疔毒丸研末。扶起灌下。泄數次。即醒。若有紅絲。照後紅絲疔治法治之。或有生機。如餘毒入絡。遍發流注。治與陽證流注同。

反唇疔 鎖口疔 承漿疔

反唇疔發唇裏稜。生於上下嘴唇。上唇屬脾。下唇屬胃。係脾胃心經火毒結成。鎖口疔生於嘴角。係心脾二經所屬。承漿疔生於唇稜下陷中。係任脈所經之處。三證初起。形如米粟。旋即綳硬。其色或赤或白。或紫黑色。或不痛。或麻癢。其形甚微。其毒極深。其行甚速。不日即四圍腫大。三四日即不救。蓋疔愈小而毒愈橫也。反唇甚則令唇外翻。鎖口甚則口不能開。承漿甚則飲食不進。腫連下頤。俱屬迅速之證。須當速治。遲則毒氣內攻。令

人昏憤惡心。卽刻走黃。治法俱按疔門急刺患處。擠盡惡血。禁用灸法。唇

上各疔。宜刺委中穴。詳便捷治法。如不熟用鍼。喚雍髮匠熟於挑痧者刺之。再

以蛔蟲洗淨。加冰片搗爛敷之。卽刻瘡口流出毒水。腫消痛止。如無蛔蟲。

用五穀蟲一錢。瓦上焙乾。白礬三分。蟾酥三分。燒酒溶化敷唇上。流出毒

水卽愈。如疼痛身發大寒大熱。頭面紅腫。牙關緊閉。勢甚險惡。可用

元參 叁錢 生大黃 四錢 黃芩 貳錢 牛蒡子 貳錢 角刺尖 貳錢 白芷

貳錢 金銀花 叁錢 木通 叁錢 麥冬 叁錢 去心 當歸 叁錢 全蝎尾 八分 酒洗

麻仁 四錢

水煎服。藥後腹如撐動。大瀉。嘴唇流出惡水。漸卽紅消腫退。如不泄。急服拔疔毒丸。無不泄矣。泄後常服緩唇湯。

### 牙疔

疔科入門 反唇疔 鎖口疔 承漿疔

此由胃經火毒。或太陽經溼熱所致。生於牙縫兩旁。腫起初如粟粒。後如豆大。痛連腮項。若麻癢破流血水。疼痛異常者。卽疔也。用披鍼尖挑破。見血爲止。卽搽青果散。再以蟾酥丸噙化。徐嚥。若煩躁口渴。宜服黃連解毒湯。若失治毒竄。兩腮潰爛不堪者。逆頭黑者。名黑疔。則屬腎。治法同。

穿牙疔

附穿牙毒及小兒走馬牙疔。

先二日牙痛發寒熱。牙根上起紫塊。痛不可忍者。是用鍼挑破。擠出紫血。外擦青果散。內服涼血解毒降火之品。若穿牙毒初起未破爲疔。已破爲毒。色紅者可治。色青者不治。又有黑而腐臭者。無論疔與毒。至此則俱云不治。然亦有可生者。浮皮一層。用筋裹綿。輕輕捲去。內有紅肉。尙可吹藥救療。不可少緩。緩則直爛到底。不能治矣。如筋攪不起。以鵝翎攪之。方用

薄荷叁分

兒茶六分

黃柏壹厘

龍骨貳厘

珍珠五厘

梅片叁厘

甘草五厘

白芷

貳厘半如腫  
痛用參四厘

共為細末。吹之兼能長肉。若初腫而熱甚者。多加薄荷。若不甚腫熱。及病久。則以長肉為主。多用兒茶龍骨珍珠。若疔與毒重者。加牛黃倍珍珠。無不奏效。又牙疔牙毒效方。

牛黃叁分

人中白

珍珠

各貳分半

銅錄

兒茶

輕粉

青黛

各貳分

麝香

梅片

各壹分半

共研細末。先用綿蘸米泔水於患處。擦盡腐肉。見血為止。以藥末搽上。硬處以雞蛋清調。宜日換十餘次。再用生半夏生大黃各等分為末。陳醋熬稠。敷兩足心。紙糊紮好。待乾脫落。再敷內服白馬乳。其愈更速。

### 舌疔

心脾火毒。舌生紫泡。其形如豆。堅硬寒熱疼痛。應心初起。宜用蟾酥丸含。

舌上隨化隨噉。或再服三丸。以解內毒。甚者用刀刺破。服黃連解毒湯。兼搽青果散。用元硃丹亦可。

喉疔附喉證治法


喉疔急症也。生喉間。形如靴釘。尖且長。色紫堅硬。初起麻癢。旋即大痛。用鮮菊梗葉四兩煎服。或野菊花根葉煎湯亦可。外貼異功散。一週時起。泡用鍼挑破。擠盡惡水。內吹青果散。或元珠丹。脈洪便結者。下之。再用吳茱萸爲末。醋調敷。兩足心。或服除瘟化毒散。或服加味荊防敗毒散。俱可。

喉如兩邊俱痛。刺兩大指少商穴。如痛一邊。即刺一邊。須擠出惡血。再刺合谷穴。鍼須少停。方可拔出。痛即大減。另再用鮮土牛膝打汁。用鵝毛蘸汁刷入喉內。或土牛膝汁曬乾研末。收固吹之。或用皂角僵蠶爲末。頻吹以吐出風痰爲度。一切風熱喉證。皆可治。喉症頂心發紅紫點。宜急挑破。

用生薑桐油擦至皮白而止。無點者以兩手捏頂。如提痧法。久則皮即癢起。血影顯出。用鍼挑出血。仍以生薑桐油擦至皮白。又用大蒜頭一箇。同食鹽打爛敷虎口穴。男左女右。良久起泡。以鍼挑破。擠盡毒水即愈。凡喉症俱可用此法。少商穴在大指端內側去爪甲角一韭葉許。用三稜鍼刺出惡血。此穴能泄諸臟之熱。但不宜灸。如喉風喉痺。顛額顛音容。大頭也。懸癰。單乳蛾等證。刺之立驗。合谷穴在大指次指骨間陷中。又名虎口穴。

螞蝗疔 又名螞蝗風。

生於上腭。如薤葉形。色白痛而不腫。身發熱。宜速刺之。吹元硃丹。有表發表。無表則解毒瀉火。



此證因怒氣傷心腎所致。不開花者易治。開花而色黑者不治。心腎之氣已絕故也。如不開花。用細辛半夏南

星牙皂各等分爲細末以少許放患處。用刀鍼卽不知痛。此卽喉科麻藥。放藥後用刀刮去下絡。外擦青果散稍加麝香。或用元硃丹內服桔梗湯證極重險。百無一二。恐與別證相混。故繪以表之。

### 松子疔

證生於關內小舌左右。亦有生一邊者。左屬心。右屬肺。初發形如粟色紅或帶紫。兩寸關俱緊。背寒身熱。此風火鬱積也。斷不可用刀。宜用皂角末去風痰。法詳喉疔。外貼異功散。內吹元珠丹。再用治喉六味湯加

蘇葉 赤芍 羌活 連翹 穿山甲 草河車 各壹錢。

開水泡藥。蒸服一劑。喉證屬火。水劑宜蒸不宜煎。煎則欠效。此喉科之秘訣也。去羌活蘇葉。加

乳香叁分 玉樞丹 壹錢。研沖。 治一切喉毒。

數劑卽愈。若失治則轉紅爲黃。逐時脹腫。起魚鱗而向上。鱗如向下起白點爲魚鱗風。



為法同。漸大如菘豆。如蓮子。愈大愈重。未成鱗者易治。已成鱗者難治。

飲食到喉即嘔也。重者去風痰。因虛而發者不可去。服治喉紫地湯。

### 正對口疔 附癰疽治法。

生天柱骨間。初起癢而不痛。有一小吻。頂上一小點。如麻子。或紅或黑者。

是疔也。初發先癢後痛為疔。又癢又痛為疽。痛者為癰。急刺百勞委中二穴。再用茄蒂不拘多寡。茄白

蒂更佳。須預先陰乾收貯。將大銅盤內放火炭上。鋪茄蒂。罩以燈籠壳。剪去下底。令病人仰臥。

床沿另放一椅。將頭擱住。露出瘡口。或將瘡口之皮刮破。以燈籠壳之上

口緊對瘡口。煙薰良久。瘡口自開。有一條血線。流下盤中。不可移動。斷則

不能續。必俟紅絲流盡。則毒散矣。內服加味三星湯。外用消疔毒膏。上加

黑虎丹貼之。四圍腫處。用溏雞糞加荔枝核末調敷。疔癰疽治法同。若茄蒂一時

難覓。另有刮毒法。初起時用小刀將白小泡挑破。不可深刺。擠出一點白

膿。然後輕輕細刮。帶刮帶擠。耐心將毒水擠刮淨盡。則輕者消散。重者轉輕。癰無白泡。不能刮。若潰後有細筋白腐。須用鉗剪修剔乾淨。否則必致反覆。證係上焦鬱熱。蘊於督脈。其發故速。偷肩背拘急。項強不能側。神昏嘔噦者。凶。對口諸證。方書言須隔蒜灸至痛而不癢。然余見灸後。有面目俱腫。煩躁不安者。徐靈胎云。頭項不可灸。誠哉是言也。按正對口來勢雖猛。其證屬陽。故易治。偏對口來勢甚緩。證多屬陰。故難治。陰與陽須分明白。誤則其害非淺。東垣云。對口發背眉疽等證。初起宜用海馬崩毒法解之。

用生鯽魚合陳壁土全搗敷毒上即愈。加頭垢敷錢更效。

偏對口疔 附癰疽治法

生天柱骨側軟肉處。其地屬太陽膀胱經。太陽膀胱主司寒水。性質沉冷。起於巔頂貫兩旁夾脊而下。故證多平塌漫腫。漫腫者。肉腫瘡不腫也。難治。焮腫者。瘡腫肉不腫也。易治。

此係火毒蘊結五臟而發。是處又近於喉。故重險。非若正對口之由外感

而發者之為易治也。發時有小泡甚癢。治照正對口之熏法刮法刺百勞

一節至二節。穴名陶道。及委中。亦可消散。詳上便捷治法。初起服加味三星湯。并服紺

珠丹以出汗。若陰虛火旺。煩渴腫痛。則服加味四妙湯。大潰則服七聖湯。

疔雖陽證。此則生於陰輭之所。使非高突紅腫。始終不可服寒涼之品。若

身倦沉重。體熱而面色形寒。瘡黯而不甚痛。或旁生許多小瘡。不可誤作護場瘡。視

輕證。是謂陰證。如癰而有此形。則陽變為陰。不可作陽治。疔瘡亦然。疽則

無論矣。有三陷變局者不治。

三陷者。火陷乾陷虛陷也。火陷者。氣不引血。外腐成膿。火毒反陷入營。漸

至神迷發瘕發厥。乾陷者。膿未透而營衛已傷。根盤紫滯。頭頂乾枯。神識

不爽。有內閉外脫之象。虛陷者。膿腐脫而肉不生。光白板亮。脾傷食減。腹

痛寒熱。便溏形削。宛如怯損。犯者皆不治。

### 十指疔

此疔醫書不載。俗名十指疔者。因中指生疔。連及旁指故也。中指通連五指。如在首節之尖。漸潰漸愈者。或不旁及。若生中節。或下節。毒之甚者。無不竄入旁指。且男生左手。不但旁及。且必延及右手。女生於右手者亦然。治法將患指末節根刺破。或已旁及。再刺所及之指根。俱須擠盡惡血。其毒自解。宜服蟾酥丸。汗之外。敷葱白汁。調雄黃散。內服敗毒散。膿熟開之。貼琥珀膏。以下指疔俱照此。若十指疔久不收斂。必成損證。各指之經詳左。

大拇指屬手太陰肺經。 食指屬手陽明大腸經。 中指屬手厥陰心

胞絡經。 無名指屬手少陽三焦經。 小指屬手少陰心經。

蛇頭疔 天蛇毒 水蛇頭疔

二證俱生於手指頂尖。雖由手太陰肺經。手心包絡經。積熱所致。然俱兼脾經火毒。疔自筋骨發出。根深毒重。初起如粟。漸大如桃李。堅硬赤腫。痛極連心。其或有青黃紫白黑諸色。或麻癢不痛者。其毒更盛。天蛇毒自肌肉發出。其毒稍輕。初起悶腫無頭。色紅痛如燎火。照土治十指疔。法治之。若四五日後。潰膿有黃頭。可刺者順。如不潰無膿。黑色過節者險。倘毒氣攻心。嘔吐不食。膨脹牙縫出血。則危極矣。未熟不可開刀。開則皮裂肉腐。疼痛倍增。宜輕刺皮破以引藥。患久即生多骨。多骨出盡。方能收口。體弱不斂者補之。更有膿不泄。火毒不化。腐爛其筋骨者。另有與二證相類。輕者名水蛇頭疔。頭有黃泡明亮者是。挑破擠去惡水。照疔方治之。即愈。重者名斷指疔。只生於大指。黑色無膿。蛇頭疔用小泥緘一條搗爛敷之。效。

或用雄黃七分。白芷三分。共研細末。將雄猪胆一箇剪去蓋。傾去胆汁。

一半入藥調勻。套指牢紮。一次不能全消。當再換。以愈爲度。或用生鴨蛋兩個。蜈蚣一條。焙研末。以一半入鴨蛋內攪勻。套指上。俟蛋熱。再用一半蜈蚣末入蛋。再套。痛則照法再治。以消爲止。或用大蜈蚣一條爲末。紙捲作撚。點撚吹息。以煙熏指。三四次亦效。

天蛇毒痛不可忍。臭不可當者。用蜈蚣一條研末。豬膽汁調塗。卽瘥。

### 蛇眼疔

生指甲兩旁尖角間。形如豆粒。色紫。半含半露。硬如鐵釘。係大毒所發。若有黃頭突出如眼者。用鍼挑破。以下四疔俱照蛇頭疔治之。

### 蛇背疔

生於手指甲根後指背上。兩手皆同。形如半棗。色赤。胖腫。

### 蛇腹疔

一名魚肚疔。初起宜灸虎口穴。

生手指中節反面。色赤疼痛。毒易攻心。與鰍肚疔似同。亦治虎口穴。

詳喉疔。

### 蛇節疔

一名蛙節疔。初起宜灸虎口穴。

生手指中節。遠指俱腫。其色或黃或紫。在指節骨者皆是。

### 鰍肚疔

此疔一指通腫。甚於蛇節疔。色紫。形若泥鰍。焮熱痛連肘臂。膿熟開之。治法同上。俗以指疔。輕者。概名鰍肚。誤也。

### 斷指疔

生於一指。黑色無膿。不痛。初起如粟。其形似棗。漸開漸大。發時先患消渴者。多與蛇頭疔。天蛇毒等證。輕重大相懸殊。此毒由於膏梁厚味。房術熱藥。火蘊臟腑。耗灼真陰所致。一旦發出。不可救藥矣。古書惟有截去患指。以洩其毒。照下脫骨疔各方治之。或可挽回。

### 僵節蛙疔

生於手指骨節。體虛之人多患之。與他疔不同。初起不紅不熱不痛。皮色不變。日久方痛。痛久方腐。腫仍不消。非若鰍肚疔之暴發也。其證背面通腫。形如蟬肚。與鰍肚疔相似。由手少陰痰氣凝滯而成。初發時服小金丹。再服生六君子湯。化痰去溼。外以離宮錠塗之。或用生南星醋磨敷之。腐則用八將丹。內服滋補之藥。否則腫處腐爛。膿如清水。變成虛勞。不治。

### 手丫疔丫音鴉

手丫骨縫間。結毒焮腫。此係脾經溼火凝結而成。除大指合谷穴名合谷疔。餘指丫患此。卽名手丫疔。又名手丫發。若手背之丫。是手三陽經受證。手掌心之丫。是手三陰經受證。初起如粟。漸大如豆。焮熱色紅。疼痛不止。膿出稍減。初時宜疏散解毒。成功後其膿不透。須用製蠶灸甲片角刺之。



屬待膿泄邪退。須扶胃和營以收功。

虎口疔一名合谷疔。附虎口毒。

此證生於大指次指歧骨間。屬大腸經溼熱凝結而成。初起如粟。小泡癢熱。焮痛根深。有紅絲上攻腋內。初起將疔根挑去紅絲。當絲盡處。用鍼挑斷。虎口毒用活蟹搗爛敷上。或以蟹黃蜜調塗之亦效。愈後戒食蟹。又方用石灰內未燒化過之石子。和生蜜在粗石上杵融。敷患處。即愈。

托盤疔附手心毒。穿掌毒。

生於手掌中心。係手厥陰少陰二經所司。心火熾盛。逼血妄行。肝風鼓舞。毒散四肢。加以憂思過度。酒色不節。遂致毒流骨髓。侵入勞宮。係心經脈絡毒。故生焉。初起堅硬有泡。色如明亮。速即挑破。治以銀花解毒湯。手心毒。一名擊珠毒。係手少陰心手厥陰心胞絡二經溼火之毒。所結。其瘡如

泡色如血赤。外形雖小。內毒有餘。疼痛非常。日夜無間。輒有不能收功。流血至死者。治法宜大補佐以解毒。方用

元參貳兩

金銀花貳兩

生地黃壹兩

當歸壹兩

紫花地丁五錢

貝母貳錢

甘草貳錢

水煎服

初起時用爛黃雞屎塗之甚效。

又穿掌毒似托盤疔而實輕也。用新桑葉一把。研爛絹包。合上即愈。

### 手背疔 手槽疔

發於液門

小指無名指岐骨陷中。

中渚

液門下一寸。

二穴屬手少陽三焦經。由風火與溼凝滯

而生。初起憎寒壯熱。昏悶嘔逆。漸致手背高腫。破則爛深至骨。成膿速潰者順。發時有一小泡癢極者為疔。腫而痛者為發。初時將患處刺破。擠去惡血。以雄黃散擦之。倘腫及手背。則用細鍼於四圍微刺。外塗雄黃散。內

服敗毒散。或羌活散。有表證用紺珠丹汗之。如裏證內疏。黃連湯下之。潰後元氣虛者宜補。又手槽疔生於威靈穴。手背高骨處。治法與上同。二疔之名。載於刺疔捷法。有刺法而治法不詳。余爲人治有效。故誌之。

### 肉龜疔俗名脚發背

生脚背上。形如龜。初起癢而痛。漸則痛不可忍。一名足跗發。經云。三背不宜生瘡。足背肉少皮薄。骨少筋多。又在至陰之下。所以爲險證也。須辨陰陽。陽則易治。陰則難治。或由三陰精血虧損。或由三陽溼熱下注而生。初起寒熱嘔惡。紅腫堅痛作膿者。係溼熱證屬陽。治較易。若因物撞傷。初如粟粒。漸成白泡。寒熱交作。日重一日。此由溼火熾盛。須俟熱退後。腫始漸消。初宜刺破疔頭。擠去惡血。內服驅溼保脫湯。或不刺疔頭。用灸法疔頭不必刺。用銀鍼徧刺四圍。隔蒜艾灸疔頭亦效。潰後用八將丹。脚背皮肉脫。則用珍

珠生肌散兼服顧步保脫湯。若色微赤。患處微腫。而膿清。係精血大虧。難治。如色黑暗。不腫痛。亦不潰膿。煩熱作渴。小便淋漓。陰敗者不治。速用桑枝外灸。以行壅滯。而助陽氣。服加減補中益氣湯。以補氣壯脾。攻伐之劑。斷不可用。照此法治之。尙有得生者。此疔載於刺疔捷法。僅云鍼刺四圍。治法未備。證極重險。治之不易。余故將治效之法。詳細言之。

### 烏茄疔

足趾腫痛。似潰非潰。北人謂之惹肥。此係農家澆糞於土上。爲烈日曬逼。結熱毒於上層。人或跣足過其地。觸其毒氣。則足趾腫痛。用鴨毛煎湯加皂礬洗之。卽愈。

### 冷疔

此證生於足跟。由溼寒凝結而成。形如棗栗。紫白起泡。疼痛徹骨。漸生黑

氣腐爛孔深。時流血水。氣穢。經久不斂者。宜神燈照法照之。鐵粉散敷之。兼服補劑。如不愈。用白油膏即效。初起時用鴿糞煎湯。放脚盆內。用舊籃頭罩湯上。以患處對熱湯。足踏籃上。外蓋舊衣。俾熱氣歸一處。冷則燒熱。再熏。至不痛而止。上蓋消疔膏。

疔毒走黃。從足趾上及於膝。壅腫可畏。倘火毒攻衝入腹。難於挽救。茲以大劑日夜酣飲。三日內轉輕。即有轉機。如加重則棘手矣。

地丁一兩 銀花二兩 連翹一兩 黃柏一錢 滑石三錢 牛膝二錢

赤苓四錢 大貝母三錢 甘菊一兩 甘草一錢

日服兩劑。三日大效。

### 脫骨疔

此證發於手足大指。醫宗金鑑及各方書俱名脫疽。惟東醫寶鑑則爲脫

骨疔。載入疔部。未發時先煩躁作熱。類消渴證。久而始發者是也。初生黃泡一點。如粟。皮色紫暗。若煑熟紅棗。久則黑氣侵漫。腐爛延開。徧傳五指。攻及脚面。如湯潑火燃。臭氣穢惡。異香難解。至脛卽死。此由膏粱厚味積毒所致。或因房術溢精。丹石熱藥。火蘊臟腑。毒積骨髓而成。方書皆云。初起只有截指一法。孫真人云。在指則截。在肉則割。欲其筋隨骨出。以洩其毒。殊不知此亦疔也。治法於未延散時。先用隔蒜灸法。不痛者宜明灸之。另用金銀花二斤。煎濃湯數十碗。飲之以解其毒。再用極大生甘草研細末。和菜油調敷極厚。日易數次。切勿間斷。如以甘草嚼爛。厚敷更效。忌食發物。尤忌房事。犯之無救再用金銀花三兩。當歸二兩。生甘草一兩。水煎連服十劑。可漸愈。藥味減少不效。切忌抓擦。或兼服驅溼保脫湯。顧步保脫湯。內外並治更妙。其或修甲受傷。及咬傷扎傷所致。亦黑漫足背腐爛。氣穢。

此則較輕。又有大寒冒雪。履冰受冷。其時用熱水。漸溫。可無他慮。若火烘逼寒入骨。春來證發。足指其指必脫。脫後無性命憂。然此皆形似而實非脫骨疔也。脚爲四餘之末。毒所難至。何凶惡若此。不知毒所難至者。一旦聚毒於中。更不能散。

毒蘊五臟發爲大疔。著名者五。

### 火燄疔

此乃心經火毒。生於唇口及手掌指節間。初起紅黃。小泡一點。痛癢麻木。看其部位。照各疔治法。甚則寒熱交作。煩躁舌強。言語疏忽。頭暈心煩。如脈洪便閉者。須下之。火盛者。宜瀉火。如大黃梔子連翹丹皮黃連木香之屬。

### 紫靨疔

此乃肝經火毒。生於手足骨節腰脅筋骨間。初起便發紫泡。起越日破流  
血水。三日後穿筋爛骨。疼痛。重則眼紅目昧。指甲純青。舌強神昏。睡語驚  
惕。若火盛便閉者。下之。宜用黃芩青蒿青皮赤芍川芎青黛膽草之類。

### 黃鼓疔

此乃脾經火毒。生於口角腮頰眼泡。上下太陽等處。初起黃泡。光亮明潤。  
四圍紅色旋繞。發時便作麻癢。綳急強硬。須照面部諸疔治之。重則肢體  
木痛。嘔惡惡寒。壯熱煩渴。若脈洪便閉者。宜下之。如生太陽穴。須將紅色  
繞處輕輕橫挑。去惡血以洩毒。不可深刺。與釘腦疔參看。

### 白刃疔

此乃肺經火毒。生鼻孔及兩手臂膊等處。初生白泡。頂硬根突。麻癢兼痛。  
破流脂水。易腐易陷。若失治至腮損咽焦。咳吐痰涎。鼻掀氣急者。不救。初



起若項現灰色。根脚棉軟。毒不結聚。此爲陷伏陰證。雖大僅如豆。亦不治。蓋不久則昏憤喘急也。鼻爲肺竅。邪氣入肺。故發於鼻。肺位居上。手爲五臟之幹枝。故又發於兩手及臂膊之上。毒盛者有紅絲。照紅絲疔治。生於鼻者治同鼻疔。餘照各疔治。

疔生鼻竅。名曰白刃。昏面腫脹。連及左肋。心煩嘔惡。六脈洪大。業已走黃。勢難挽回。既遠道而來。不得不勉爲圖治。用生礬三錢。蔥頭三個。打和以陳酒下之。取其澄清。無經不達。卽用大劑清解。速速服之。

金銀花一兩	丹皮三錢	甘菊花一兩	連翹五錢	大貝母五錢	天
花粉五錢	當歸一兩	紫地丁一兩	甘草節五錢	知母四錢	皂角
刺五錢	製半夏二錢	白芨三錢	穿山甲四錢	乳香一錢	鬱金一
錢	鮮菊葉一兩				

此方兩日共服四劑。腫消勢減。根束頂高。脈平熱退。後漸愈。

### 黑鬻疔

此乃腎經火毒。生耳竅縫胸腹腰腎偏僻軟肉處。初生黑斑。紫泡。毒串皮膚。漸攻肌肉。頑硬如釘。痛徹骨髓。重至手足青紫。驚悸沈困。軟陷孔深。目精透露者。難治。生於耳者。治同耳疔。餘須滋腎水兼清火。

五疔中惟腎經之疔不宜下。餘疔如火盛而生於上身者。惟有下之一法。最爲妥速。下則毒去。再用清解。可以無慮。否則其來甚捷。稍遲已來不及矣。

有似時疫痧證。而以疔名者。

### 羊毛疔 一名羊毛痧

初起頭痛身發寒熱。重者一二時。輕者一二日。卽死。視其前心坎後背心

有紅點如疹子。先用鍼挑破。取出羊毛。再用明雄末三錢。青布包扎。蘸熱燒酒於前心坎。瘡上一二寸外。四圍徧擦。逐漸擦入瘡眼。其毛卽奔至背心。再於背心照前徧擦。毛俱拔於布上。隨埋入土內。服菊花飲。或地丁飲。葱礬散。護心散。俱效。如醫藥不及。速往十字路口衆人行走之地。挖泥數升。冷水和丸。和雞蛋大。卽在病人臍旁及心窩內外。磨擦良久。俟泥丸稍熱。開視有羊毛卽是。另換泥丸。擦至無毛而止。雖已氣絕而身未冷者。皆可治。用黑豆蕎麥各等分。磨末爲丸。照擦更妙。擦之無羊毛者。卽非此證。

### 羊毛疔瘤

此疔忽起一泡。其形如瘤。內有羊毛。亦名羊疔。初起頭痛。或發寒熱。卽用黑豆蕎麥各等分。研末。挑破疔頭。塗擦。毛落卽愈。內服菊花飲。

### 心經疔

一名硃砂證。初起喉腫脈散。牙緊心痛。手足麻木。閉目不語。或則上嘔下瀉。若誤認爲喉風。則成不治。急用紅紙作捻。浸油照心窩背心二處。如有紅點。卽用鍼破。內有紅絲。趕卽挑出。用雷擊散二三分。吹鼻內。再秤藥末三錢。熱薑湯送下。體極弱者。加台黨參二錢。煎湯沖服。小兒一錢。重者三服卽愈。忌食生冷油膩。此證傳染極易。稍遲則不救。藥宜早服。方保無事。

火疔附一切痧證治法

初起或發寒熱。或無寒熱。與發斑同須於頭髮內耳後耳內眼下舌下肩甲窩

手足彎脚心腎囊陰戶糞門通身細看。或如蚊咬。或如眼如錢。外有小疔者輕。或

嘴唇四圍數疔。生頭面重。或有紅絲青絲。至心卽死。急將絲頭挑破。眼皮上不可挑。取

旱烟筒中油敷之。絲卽退縮。再塗四圍。用水沖煙油服之。用滿天星方亦

可。並用雞蛋清方以除根。不論有絲無絲皆神效。或用油燈草在絲頭燒

之絲亦退散。頭面生疔切不可燒。又有用大蒜切斷於常走處磨下脚泥敷疔頭四

旁。絲退而愈。倘治不合法或夢遺或犯房事則疔縮陷發狂亂語此即走

黃。看有小芒刺即是疔頭先用煙油敷四邊再用鍼挑破擠盡惡血見紅

血爲止仍服煙油用蛋清方以除根若淡紅平塌者是虛火。誤服涼藥必死用煙

油水試之不辣者即對證。辣者即不可服。或用高麗參。一錢。用路黨參四錢亦可。元參三錢北五

味六分麥冬半錢製附子三錢乾薑一錢水煎服。誤服涼藥神昏氣喘者亦效。陰寒虛火必用此

方。方可救命。不必以薑附太熱遲疑自誤。如熱極無脈用加味參麥散。如

眼珠突出手足冰冷此心火熱極無血養手足也仍用煙油及蛋清方最

妙。有愈而復發者根深兇險用巴豆飯米各一粒搗爛敷疔頭其根自出

疔大兩粒。凡一切痧證不可飲米湯喫米食。犯則不救。只可喫藕粉蕎麥粉葛

粉之類亦不可多食。

有似疔非疔而以疔名者。

### 血疔

證生肘下兩太陽兩眼角等處。起如紅瘡。破之有竅如鍼孔。流血不止。用芫花煎膿湯。煮線紮之。或用瘦猪肉貼。或用食鹽麻油塗上紮緊。內飲眞麻油一大碗。菜油亦可。凡血出不止。俱可用此法。血止後用野菊花煎膿湯常服。切忌茶湯。

### 黑疔

瘡毒潰爛日久。中有黑疔突出。狀若筋頭。堅痛不可拔。用紫椴香剉如豆大。炒黑爲細末。搽於四圍患處。敷拔疔紅膏。隔日一換。疔自脫去。先用八將丹。後用玉紅膏收功。生疔時疔脚未去。亦有此證。與耳疔牙疔之黑疔不同。

## 魚眼疔

是疔多發於足。爛孔甚多。宋嚴用和云。非神手不能治也。治法。先以鍼刺。如痛則癢根已走。以榆皮刮淨如線。以綿裹其尖。以線牢繫之。用探疔瘡之穴。榆所不及之處。則鍼破引榆皮而出。再自鍼穴尋之。若鍼破處。病人痛而血出。則是活肌肉矣。卽於疔瘡各鍼孔中。納蟾酥丸二三粒。覆以拔疔膏。四旁腫處。敷以烏龍骨。如有赤暈。敷解毒散。膿盡方可生肌。

## 魚臍疔

此證頭白四面發赤。中央黑色。狀狹而長。肉下有紅線。或潮熱。一因風毒蘊結。二因氣血凝滯。三因誤食人汗所致。用臘豬頭骨燒枯研末。雞蛋清調敷。輕者數日卽愈。或用絲瓜葉及連鬚葱韭等分。同人石鉢內。研爛取汁。溫酒和服。渣另敷患處。如疔在左手。敷左腋下。在右手。敷右腋下。在左

脚貼左膀。在右脚貼右膀。在中敷心及臍。用綿縛住。俟肉下紅線處皆白。則毒散。若潮熱亦用此法。須令人抱住。恐其顛倒不治。或以鍼刺。四圍不大痛者。亦不治。又瘡頭色黑。破流黃水。四圍浮漿。滋膩用蛇脫灰存性研細。雞子清調敷。或用葱白蜂蜜杵塗四圍。亦效。

七星趕月疔 護場疔 三十六疔

此疔與麻子疔相似。逐日漸生。攢聚四圍。形若小瘡。頂有黑點。或雜一大瘡。故名七星趕月。初起惡寒身熱。久則壯熱如傷寒證。此疔面上最多。別處較少。方書載有人唇口患疔。接連七個。頭腫如斗。心悶神昏。一女丐曰。此名七星趕月疔。用蛔蟲搗爛塗之。頃刻瘡口流出黃水。腫消神清。次日即愈。此與唇疔治法相同。若生於頭面者。則照頭面諸疔治。此疔之毒最盛。日生紅髮數根。須令人細尋拔盡。俾毒可稍泄。不可認作護場疔。蓋護



場疔生於正疔之旁。其證極輕。照常法治之即瘥。又有三十六疔。一名滿天星疔。此疔屬腎。其毒最橫。必須早治。初起微癢。形腫如豆。四圍赤色。日生一疔。至三十六之數。雖不再生。亦不能治。此疔之形。亦與前疔相似。宜細細辨之。

### 刀廉疔

形如韭葉。狹長三寸許。肉色紫黑者是。各疔俱宜刺。惟此疔不可刺。刺則不治矣。內服葱礬散。外敷溏鷄糞即愈。遲則毒氣攻心。不可救。浮瀰疔亦如韭葉。形長而曲。與此疔相似。

### 紅絲疔

初起形如小瘡。漸發紅絲。流走最速。生於手者。其紅絲至心。生於足者。紅絲至臍。生於頭面者。紅絲至喉。皆不治。若在手足兩處。可用頭髮離絲頭。

一二寸。緊緊紮住。即從紅絲延處。當頭刺破。再逐寸挑近疔根。擠盡惡血。頭有白泡。速即挑破。擠盡惡血。先用艾火於絲頭燒之。其絲即散不散再燒。以散為度。再用黑魚鱗三錢。炙研。百草霜三錢。研細。將京墨和藥磨敷絲上。或用浮萍打爛塗之。或用煙筒內煙膏塗之。俱效。方書云。紅暈與紅絲有別。紅暈狀若筋。他證毒盛者皆有之。見暈即非美證。一暈二暈三暈已重。四暈不治。紅絲疔亦然。余遇此證。外治後內服貴金丸以泄其毒。絲即漸隱無跡。再服清解大劑。雖有三四暈。無不可消。毒盛者。初起惡心嘔吐。毒已攻心。速服拔疔毒丸。遲恐無救。紅絲疔有從虎口發者。宜刺商陽穴。在食指內側。去爪

甲角菲葉許。

對疔

生於腦門左右。兩眼角兩太陽兩顴兩耳門。在印堂穴則生一個。初時不

覺誤爲熱癰。旋即身發寒熱。飲食不進。神思恍惚。其毒最重。宜服解毒大劑。并服西黃丸。生甘草須用至五錢。方能殺其勢。此疔所生之部位。除兩額外。俱不宜深刺。須淺而帶橫。經所謂刺皮無傷肉也。惡血須耐心擠盡。俾毒可洩。餘治同。

### 水疔

四圍紅赤。中一黑點。堅硬如石。痛不可忍。破後惟流血水。用土牛膝

俗名臭花

娘子。搗爛。入鹽少許。和勻敷之。用消疔毒膏敷之。亦可。此證乃皮膚熱毒。外治可愈。重者稍發寒熱。服敗毒散一二劑已可。其有形如水泡者。因飲不潔宿水而生。挑破後以治疔法治之。即愈。

### 蒲萄疔

紫色光亮。頃刻纍纍如貫珠。周身皆有。或僅生一粒者。形似蒲萄。故名。患

者飲食言笑如常人或不覺。一日半日。一見鼻血。卽死。方書言無藥可救。或云。有女子手腕輭處。生肉如豆。半在肉中。色紅紫痛甚。諸方不效。後用水銀四兩。白紙二張。將水銀揉熱擦之。三日自落。前證似可照此施治。證旣名疔。又見鼻血。其爲熱毒內蘊無疑。如水銀方不見效。可用菊花地丁各四兩。生甘草四錢。煎濃湯。刻刻服之。再取陳菜油三大盃。一時飲盡。並用吳茱萸末。醋調足心。一日一換。引熱下行。或可見效。

### 暗疔

此證生於腋下。由肝脾二經毒火而成。硬若釘頭。癢而且痛。寒熱往來。四肢拘急。其色紫黑。煩躁作嘔。痛引半身。宜服蟾酥丸。急按治疔法。內外治之。其在未發之先。腋下忽然堅腫。散漫無頭。次腫陰囊。畢丸突出。狀如筋頭。身發寒熱。筋脈拘急。腫處焮痛。治法忌用針灸。先以蟾酥丸含化令盡。

以冷水漱去毒涎。再用三丸嚼葱白三寸裹藥送下。蓋被取汗。汗若不出。飲葱白湯催之。如仍無汗。係毒熱滯結。急用霹靂火法使熱薰蒸。至頭面汗出。其毒自滅。再用大黃一兩。白芷三錢。共研細末爲丸。每服三四錢。葱頭三個。酒煎作湯送下。蓋被取汗。候大便通行卽效。人如昏狂。瘡頭紅凸。急取路旁烏柏樹根二尺。去皮打爛。并花水調一鐘。服後泄一二次。卽愈。

### 內疔

先發寒熱。漸次腹痛。或初起卽牙關緊急。數日間忽然腫起一塊。如積聚是也。治法與上暗疔同。暗疔只生腋下。內疔則遍身皆生。糞門陰戶等處俱有。暗內二疔。人所易忽。本屬難辨。慎勿誤作傷寒雜病。若初起尋覓不見。取甌蓋上氣垢少許納口中。必有一處痛甚。卽知疔所在。急宜刺去惡血。見好血爲止。再用蟾酥丸三五粒。葱頭煎湯研化灌之。凡人暴死者。多

是疔毒。急取燈。遍照其身。若有小瘡。卽是其毒。宜急灸之。再以蟾酥丸研化。水調灌下。亦有復甦。須照前法治之。

### 痘疔治法

天花雖爲重險之證。大半皆壞於痘中之疔。俗謂賊痘。生於五六日內。或三五枚。或六七枚不等。雜於諸痘之間。其色紫黯。甚則黑硬如石。患此則諸證蜂起。蓋痘疔能閉諸毒。痘未齊有疔。則不能盡現。痘旣齊有疔。則不能起脹。行漿時有疔。則必致倒陷不救。此由熱毒盛而併結故也。痘疔極易辨。脚有紅暈。似花者。則謂之花。若痘中有紫黑乾硬。而獨大於他痘。其脚無暈。有痛有不痛者。卽痘疔也。急以鉸鉞挑破。擠盡惡血。以拔痘疔毒。散敷之。次日再看。若仍脹硬。復鉸破。仍以前藥敷之。必轉紅活。乃已。若其核甚堅。鉸挑不動。須用鉸從四邊剗開。以小鉗鉗出。其形如疔。有半寸長。

者。仍以前藥敷滿瘡口。乃可無患。又手足有痘。色暗堅硬而甚痛。或外無痘而內有核作痛者。亦痘疔也。宜以艾火燒之。或以燈火烙之。俱效。若不急治。必致深陷。穿筋透髓。而爛見骨。如舌上生痘疔。則用銅綠雄黃硃砂人中白共研勻。搽之。自愈。

### 看疔祕法

天庭當頭從鼻直人髮際五分。承漿唇稜下陷中。地合頷稜正中。有黑陷者。心窩舌上及男陰囊女陰戶必有疔。兩顴面頰骨及四旁。兩頤腮骨前。有黑陷者。腋下腰下必有疔。耳上準頭準頭鼻尖也。有黑陷者。手足必有疔。人中鼻柱下陷中。有黑陷者。臍下必有疔。太陽眉後陷中。有黑陷者。腿足必有疔。

### 捲簾疔生舌根下

小如黑豆。大如葡萄。致兒舌捲喉痛。速用銀鈎鈎破。去盡惡血。隨以苦茶

漱口。搽龍宮丹。方用冰片。硼砂。青黛。黃連。薄荷。荆芥。炒僵蠶。共爲細末。吹用。

火珠疔 生鼻孔內

闌塞噴火。面赤眼紅。用鈎鈎破。用黃連膏加冰片滴鼻。內服瀉金散。方用犀角。牛蒡子。桔梗。芍藥。生地。黃紅花。紫草。甘草。煎服。

忘汲疔 生眼沿

封蛤腫脹。煩熱面紫。宜挑破。用瓦松洗淨。打爛。罨之。

參虎疔 生耳內

會膿時宜挑破。搽拔疔散。

燕窩疔 生腋下

腫硬面赤。謔語。如在左腋。潛注。則在右之痘。沈伏失色。右則反之。宜鍼挑。



破去根。用拔疔散服消毒飲。方用牛蒡子犀角芍藥生地黃紅花甘草木通茯苓連翹燈心水煎服。

注命疔生兩足心

於出痘時腫硬如錢如豆如椒。有紫筋直透足股。挑之去血。用田螺水調冰片點之。次用慎火草葶豆浸脹。搗爛敷之。

透腸疔生肛門旁

出痘在六七朝。腫痛如錐。挑之。煎金銀花防風湯冷洗。次用輕粉珍珠冰片研細塗之。內服黃連解毒湯。

驪龍疔生尿孔內

於五六朝。身熱譫語。眼翻肢厥。腹脹小便閉塞是也。速用蟾酥犀黃銀硃冰片麝香研末。次用黃連細茶濃煎。俟冷取半錠調藥。用細軟稻心蘸藥。

送於孔內。內服木通敗毒散。

### 赤斑疔

又名赤斑核。形如癰癤。無定處。多在活肉筋骨間。有則週身之痘皆不發。盡歸於癰癤一處矣。此極危險。治法將癰癤用手撮起。以紅繩緊扎。後用蒜頭瓣貼患處。艾灸七次。至不知痛癢。庶痘可起而紅活矣。

痘證回毒方 兼治疔腫

銀花五錢 人參二錢 元參一錢 甘草一錢

痘瘡壞證已黑。人將棄之。藥下喉即活。

人參三錢 陳皮一錢 荊芥一錢 蟬退五分 元參二錢 當歸二錢

此乃元氣虛而火不能發也。故用人參以補元氣。元參去浮游之火。陳皮去痰開胃。俾參無礙而相得益彰。荊芥以發之。又能引火歸經。當歸去

瘰生新。蟬退除風解毒。此方之妙。難以盡言。初起不可服。必證壞乃可服。

拔毒膏

痘疔刺出血。擠後塗之。

腰黃 二錢 研末

臘脂膏 五錢

紫草 三錢 研末

和勻用。

痘疔潰爛方

痂後爛見筋骨者。

蜜陀僧 二錢

赤石脂 三分

膩粉 三分

黃柏 三分

杭粉 三分 炒

乳香 三分

沒藥 三分

伏龍肝 一錢

血竭 一錢

飛丹 八分

髮灰 五分

冰片 五厘

如有臭氣。加阿魏三四分。研細摻患處。外蓋膏藥。內服人參敗毒散。加

穿山甲蟬退連翹

牛糞散

治小兒痘疔及溼熱諸瘡。毒水淋漓。久不收口。百藥不效者。

蒜灸方

治痘疔毒氣攻竄。致痘不能透發。或麻木疼痛交作。放蒜片於痘疔上。用艾絨灸之。毒隨火散。若紫血出後。腫痛不止。尤當用灸。

以上所列。爲過玉書之實驗良法。可謂信而有徵。觀此而後。再將過氏所著之治療大全一書。詳攷其灸刺湯方等法。自可應用無窮矣。

最新出版

刺疔部位圖說

……每部定價大洋三角

海 上

行發局書西中

# 中國醫藥入門叢書

中醫百部全通六十種

▲診脈入門	定價洋一元二角
▲辨舌入門	定價洋一元
▲藥性入門	定價洋一元五角
▲湯頭入門	定價洋一元
▲內經入門	定價洋一元五角
▲金匱入門	定價洋一元二角
▲傷寒入門	定價洋一元二角
▲溫病入門	定價洋一元四角
▲女科入門	定價洋一元
▲產科入門	定價洋一元二角
▲幼科入門	定價洋一元二角
▲痘科入門	定價洋一元二角
▲外科入門	定價洋一元八角
▲傷科入門	定價洋一元二角
▲喉科入門	定價洋一元二角
▲眼科入門	定價洋一元二角

全六十部加錦套定價十二圓正

(版權所有)

編輯者 陳景岐

校閱者 吳嘉寶

出版者 中西醫藥書局

發行所 中西書局總店

上海望平街中市

(不准翻印)