

醫方類聚卷之一百三十五

大小便門 二

聖惠方 二

治小便不禁諸方

夫小便不禁者由腎氣虛下膻受冷故也腎

主水其氣下通於陰腎虛下膻冷不能溫制

其水液故小便不禁也

治小便多或不禁兔絲子散方

兔絲子

二兩酒浸三日曝

牡蠣

一兩燒

肉



菹蓉

二兩酒浸一宿刮去魚皮炙乾用

附子

一兩炮裂

五

味子

兩

雞臍脰中黃皮

三兩微炙

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治小便不禁日夜不止方

白茯苓

兩

熟乾地黄

兩

龍骨

兩

甘草

一兩炙微

赤

乾薑

一兩炮裂

桂心

兩

續斷

兩

附子

一兩炮裂

桑螵蛸

二兩微炒

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

煎至六分去滓每於食前溫服

治小便不禁陰萎脚弱鹿茸散方

鹿茸

二兩去毛塗酥炙令微黃

羊躑躅

一兩酒拌

韭子

一兩微炒

附子

一兩炮裂

桂心

兩

澤瀉

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治小便失禁白薇散方

白薇

一兩

白斂

一兩

芍藥

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方栢白皮

三兩

石榴

一顆燒為灰細研

右件藥以水三大盞煮栢皮取汁二大盞去滓每於食前以汁壹小盞調石榴灰二錢服之

又方薔薇根

五兩

鵲巢中草

燒為灰細研

右以水三大盞先煮薔薇根取汁一盞半去滓每於食前取汁壹小盞調下鵲巢灰二錢○聖濟總錄鵲巢散方重鵲巢中草

壹斤燒作灰細研如粉

薔薇根皮

去上五兩

右二味先擣

薔薇根為麤散每服三錢匕水壹盞煎至七合去滓調鵲巢灰兩錢匕空心服

治尿血諸方

夫尿血者是膀胱有客熱血滲於脬故也血得熱而妄行故因熱流散滲於脬內而尿血也

治小便出血心神煩熱口乾眠卧不安栢葉散方

栢葉

二兩

黃芩

二兩

車前子

二兩

甘草

二兩

阿膠

二兩

神巧萬全方

麩炒枯

令黃燥

○

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

煮入生地黃半兩竹葉二七片煎至六分

去滓每於食前溫服

治尿血水道中痛不可忍茅根散方

白茅根

三兩

赤芍藥

壹兩

滑石

壹兩

木通

二兩

劉子芩

壹兩

葵子

叁兩

亂髮灰

壹兩

半

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

煮煎至六分去滓每於食前溫服

治小便尿血皆因膀胱有虛熱所致宜服此

方

栢葉

一兩

黃芩

一兩

甘草

一兩

阿膠

一兩

妙令

右件藥搗細羅為散每於食前煖生地黃

汁一小盞調下二錢○聖濟總錄黃芩湯

方黃芩

去黑

阿膠

炒

甘草

二兩

栢葉

一把

右四味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半

入生地黄一分拍碎同煎至八分去滓溫服食前

治因勞損尿血不止方

生地黄汁合五車前葉汁合五鹿角膠參兩擣碎炒令

黃燥為末

右件藥將二味汁相和每服食前煖壹小盞調下膠末二錢

治虛損膀胱有熱尿血不止宜服蒲黃丸方

蒲黃兩一生乾地黄兩二葵子兩一黃耆兩一麥

門冬二兩去心焙荆實參分當歸參分剉赤茯苓

一車前子參分

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十九

又方大麻子根參兩亂髮灰研令細

右以水二大盞煎麻根取一盞三分去滓

每於食前煖壹小盞調下髮灰壹錢

又方神巧萬全方治小便出血心神煩熱口乾眠臥不安下一方同

蒲黃兩二鬱金兩二

右件藥搗細羅為散每□□□粥飲調下

二錢錄同○聖濟總錄蒲黃散方蒲黃微

二爵金兩剉右二味搗羅為散每服壹錢

匕粟米飲調下空心晚食前服

又方

生地黃汁五生藕汁五蜜壹

右三味相和煖令溫食前分為三服神巧

同方

治小便色赤如血諸方

夫小便色赤如血者此由憂愁驚恐心氣虛
熱客邪邪氣與客熱搏於心所以小便色赤
也心主南方火旺在四月五月六月其色赤
因驚恐動於心心不受邪邪熱即傳於小腸
入脬中所以小便色赤如血也

治腎熱脬囊澁小便色赤如血宜服榆皮散

方

榆白皮四兩剉四兩葵子四兩車前子四兩木通四兩

滑石四兩蜜六兩水一投二代三神四散五

右件藥都擣以水一斗煮取二升絲濾去滓下蜜更煎五七沸每於食前煖壹小盞服之

治小便色赤如血心神煩躁水道中痛宜服此方

生乾地黃二兩黃芩壹兩甘草壹兩炙車前子壹兩

當歸壹兩川芎壹兩消壹兩

右件藥擣羅羅為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓每於食前溫服

治小便如血色小腹脹滿疼痛宜服麥門冬丸方

麥門冬二兩去心焙黃耆去兩茯苓半兩菡藪根

兩壹兩子壹兩參半兩去蘆頭赤芍藥半兩蒲黃壹兩

甘草半兩炙微赤車前子壹兩木通壹兩生乾地

黃壹兩滑石二兩石韋壹兩去毛當歸壹兩微炒

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子每於食前以粥飲下三十九

治小便赤色澀痛茅根飲子方

白茅根二兩 赤茯苓一兩 人參一兩 去生乾地

黃一兩 木通二兩 葵子一兩

右件藥細判和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓每於食前溫服

治小腸壅熱小便如紅花汁宜服此方

木通二兩 葵子壹兩 滑石二兩 石韋壹兩 去毛予苓

壹兩 甘草二兩 炙

右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓每於食前溫服

治脬轉諸方

夫脬轉者是脬屈辟小便不通名為脬轉其

病狀臍下急痛小便不通是也此病或由小

便應下便強忍之或為寒熱所迫此二者俱

令水氣還上氣迫於脬中屈辟不得充張外

水應入不得其入內洩應出不得其出致外

內相壅塞故令不通也此病至四五日乃有

致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而

走馬或小便急因疾走或忍尿入房亦皆令

脬轉或脬落並致於死矣

治脬轉不得小便鬼箭散方

鬼箭羽三兩 蘧麥壹兩 葵子兩 石韋壹兩 滑石壹兩

二兩 木通壹兩 榆白皮二兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盪

煎至六分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

又方川大苗壹兩 玳瑁兩 琥珀兩 車前葉兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

蒸入葱白三莖煎至六分去滓不計時候

溫服

又方車前子兩 雀糞半兩 滑石兩 赤芍藥兩

又木通兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盪煎至六分去滓不計時候溫服

又方亂髮半兩 滑石兩 鯉魚齒壹兩

又右件藥搗細羅為散不計時候以溫水調

下三錢

又方琥珀壹兩 葱白五莖

又右件藥以水二大盞煎取壹盞半去葱分
為三服不計時候服

又方亂髮三兩燒灰兩滑石二兩川芒消一兩

右件藥細研令勻用桃白皮壹斤搗以水
絞取汁二升不計時候以汁壹小盞調下

二錢

又方梁上塵壹錢蒲黃壹錢

右件藥同研勻都為一服食前以溫水調
下

又仿雞子壹枚破取黃不計數

右以溫水調服之不過三服瑣碎錄同

又方浮萍草曝乾魚鱗寸許去鱗以水調下

又右擣細羅為散不計時候以冷水調下二

錢若小便不通利流腫服之亦佳○衛生

易簡方治小便利膀胱水氣流滯用浮

萍日乾為末每服方寸匕日三服

治脬轉小便不得經三四日困篤欲死方

滑石二兩神乃蒲黃壹兩以水調下

右搗細羅為散不計時候以溫水調下二

錢

又方搗半斤熬令熱

右以囊盛熨小腹直指方得須臾熱徹便

通

瑣碎錄同

又方

聖濟總錄車前子錄去根洗

車前子

壹握剉○總錄去根洗

右以水壹大盞煎至七分去滓分為二服

○總錄右一味以水三盞煎至二盞去滓

分三服連併服不拘時

治遺尿諸方

夫遺尿者此由膀胱虛冷不能制約於水故

也膀胱為足太陽腎為足少陰二經為表裏

腎主水腎氣下通於陰小便者水液之餘也

膀胱為津液之府府既虛冷陽氣衰弱不能

制約於水故令遺尿也診其脈來過寸口入

魚者遺尿肝脈微滑者遺尿左手關上脈沉

為陰陰絕者無肝脈也若遺尿尺脈實腹半

痛小便不禁尺中虛小便不禁腎病小便不

禁脉當沉滑而久巢氏病源作反浮大其色當黑而反黃者此土之尅水為逆不可治也

治遺尿恒澁戎塩散方

戎鹽三分甘草一分

牛兩炙蒲黃兩白礬三分
燒令汁盡

龍骨兩鹿角二兩

燒令黃燥

右件藥搗細羅為散每於食前煎棗湯調

下二錢

治遺尿尿血宜服此方

牡蠣二兩燒鹿茸二兩

去毛塗阿膠二兩
搗碎

炒令黃燥桑木耳一兩
微炙

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治遺尿小便澁澤瀉散方

澤瀉兩牡片一兩

牡蠣一兩燒鹿茸一兩
去毛塗

炙微桑螵蛸壹兩阿膠壹兩赤茯苓壹兩
微炒

兩

右件藥搗細羅為散每於食前以酒調下

二錢

又方桑耳一兩牡蠣一兩燒為粉白礬壹兩燒令汁盡

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調
下一錢

又方漢防已兩葵子兩防風壹兩去去

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
煎至六分去滓每於食前溫服

治遺尿不禁方三因方治右用羊肚系盛水

令滿急繫兩頭煮爛開取水頓服深淵

又方雞臍脰十枚炙令微黃

右搗細羅為散每於食前以溫酒調下二

錢○三因方雞內金散治溺床失禁雞脰

脰一具并腸淨洗燒為灰右研細每服方

寸匕醫方大成集成南北經驗方補珍酒

飲調服得效方澹軒方同

又方雄雞腸一具炙黃

右搗細羅為散每於食前以溫漿水調下

二錢云向北斗服之更良

又方右用小豆葉搗取汁空腹溫服壹小盞

瑣碎錄同

又方當歸一兩

右以酒二大盞煎取汁壹盞頓服

治大便不通諸方

夫大便不通者是三焦五藏不和冷熱不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕否結壅塞不通也

治大便不通下焦傷熱壅悶大黃散方

川大黃壹兩碎微炒檳榔一兩木香半兩川芒消壹兩

根殼

壹兩蘇半兩

子半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分葱白七寸煎至六分去滓空

腹溫服如未通晚再服

治腸胃積滯大便不通氣壅上奔宜服大戟

丸方

大戟壹兩碎微炒川大黃二兩碎微炒木香半兩羌活

一兩陳橘皮壹兩湯浸桑根白皮壹兩牽牛

子四兩微炒別擣人參半兩末同煎今

右件藥搗羅為末入牽牛子末同研令勻
鍊蜜和丸如梧桐子大每於空心以生薑
湯下二十九

治大便不通臍腹妨悶不下飲食偏宜服此
方

烏巢子二兩木香壹兩芎藭壹兩青橘皮壹兩
湯壹兩 煎壹兩 焙壹兩 川大黃三兩 碎兩 微炒
右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如
梧桐子大食前煎葱白生薑湯下二十

丸以知餘內氣聚中味自酸之效入土

治大便不通腹內壅悶喘息促宜服此方

川大黃二兩 碎兩 微炒 川芒消壹兩 桑根白皮壹兩
大麻人壹兩 別研

右件藥搗羅為末入麻人令勻鍊蜜和搗
一二百杵丸如梧桐子大每於食前以溫
生薑湯下三十九以利為度

治大腸結實枳殼丸

枳殼壹兩 微黃壹兩 去穢 川大黃壹兩 碎兩 微炒 川芒消壹兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大
每於食前以生薑湯下三十丸

治乾薑寒腸癥腸脹痛不通方

毛桃花膏兩 濕者 麩 參

右件藥和麩作餛飩熟煮空腹食之至日
午後腹中如雷鳴當下惡物爲效

治大便不通十日秘者方

棗壹枚 去核 膩粉 壹錢

右以膩粉內於棗中和白麩裹之於火上

炙令熟碾羅爲末以煎湯調頓服之立效

神巧萬全方同

治大便旬日不通方

鼠糞二枚 白膠香 半棗

右件藥細研入水少許和凡如棗核大以
油塗內穀道中良久便通神妙

又方膩粉一分 黃丹 壹錢

右件藥同研令勻每服以粥飲調下一錢
不過三服效

辨身重

十一

治大便秘澁不通方右用大麻子爛研以米相和煮粥食之良

又方蟻蝦微炒去翅足

右擣羅為末以熱酒調下壹錢

又方牽牛子二兩青半微炒壹半生用

右擣細羅為散每服以生薑湯調下二錢

良久以熱茶投神巧萬全方同○備須百要方牽

牛子細末熱茶清調二錢服壽域神方大

腸風閉壅熱結澁用牽牛子半生半熟為

末每服二錢薑湯調下如未通再以熱茶

調下量虛實無時候加減服下人受好

又方皂莢二挺去黑皮微炙黃

右擣細羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每

服空心以溫水下三十九神巧萬全方同

亦得且不損氣

又方巴豆壹枚去皮以油燥焦去心膜

右以粳米飯二十粒同研熟丸如棗豆大

每服以溫水下三九神巧萬全方參十九如人行十

須要百要方

十一

里當通未通卽再服

又方右用瓜蒂五枚擣羅爲末以絲裏內下

又部中卽通墳碎錄同○備預百要方瓜蒂以搥

水漬之內下部

又方攢榔兩

右擣羅爲末以童子小便一大盞煎至六

分入葱白三寸蓋定良久去葱頓服○嚴

氏濟生方攢榔散治腸胃有濕大便秘澁

攢榔不拘多少右爲細末每服二錢用蜜湯點

服不拘時候

得效方澹寮方醫方集成永類鈔方同袖珍方空心調下

治大便難諸方

夫大便難者由五藏不調陰陽偏有虛實謂

三焦不和則冷熱并結故也胃爲水穀之海

水穀之精化爲榮衛共巢氏病源作其糟粕行之於

大腸以出也五藏三焦既不調和冷熱壅澁

結在腸胃之間其腸胃本實而又爲冷熱之

氣所并結聚不宜故令大便難也

治身有大熱熱毒流於四肢骨節急痛不可

忍腹中煩滿大便澁難大黃飲子方

川大黃壹兩到杏仁壹兩湯浸去尖梔

子人壹兩川升麻壹兩枳實壹兩黃芩兩生

地黃二兩人參半兩甘草半兩炙

右件藥細剉和勻每服半兩以水壹大盞

入生薑半分豉半合煎至五分去滓空腹

溫服○直指方治身熱煩燥大便不通川

大黃濕紙杏仁去皮尖梔子人川升麻枳

殼浸去穢碎生地黃壹兩人參黃芩甘草各

二錢右剉散每服三錢姜五片豉二十壹

粒小烏梅一枚煎服

治五實病大腸難宜服此方

川大黃二兩到郁李仁二兩湯浸川朴消

二兩吳茱萸半兩湯浸七半兩遍焙乾微炒

右件藥擣細羅為散每於食前以蜜水調

下三錢以利為度

治大便難五藏氣壅三膈不和熱結秘澁麻

人丸方

類聚

十一

大麻人兩二川大黃壹兩剉碎微炒枳殼壹兩麩炒

赤芍藥兩郁李人壹兩湯浸去皮微炒川芒消兩檳

榔兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服空心以生薑湯下三十

丸晚再服之

治宿食不消大便難宜服此方

川大黃二兩剉碎微炒甜葶藶壹兩隔紙炒令紫色川芒消

杏仁壹兩湯浸去皮尖青橘皮一兩湯浸去白

飀微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服空心以生薑湯下三十九晚再服之

治腸胃冷熱不和大便難秘食飲不消心腹

妨悶檳榔丸方

檳榔兩訶梨勒皮兩柴胡三分桂心兩草

荳蔻半兩木香兩郁李人壹兩湯浸去皮微炒川大

黃壹兩剉碎微炒吳茱萸半兩湯浸七遍微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

類聚

三十一

每於食前以生姜湯下二十九神巧萬全方同

治脾胃不和常患大便堅難宜服此方

川大黃二兩剉碎枳實壹兩麩炒大麻人二兩別擣

如赤芍藥二兩厚朴壹兩去蘆皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥擣羅為末研入麻人令勻鍊蜜和

擣三二百杵凡如梧桐子大每服空心以

生薑湯下三十九晚食前再服以利為度

強羸臨時加減○肘後方大黃芍藥厚朴

炙各二兩枳實六枚麻人五合擣篩蜜和丸服十

丸日三稍增以通利為度常將自隨姚方

同

治大便卒不通諸方

夫大便卒不通者由五藏氣不調陰陽偏有

虛實三臆不和冷熱并結故也胃為水穀之

海化穀精之氣流行榮衛其糟粕傳行大腸

出焉五藏三臆既不調和冷熱壅澁結在腸

胃其腸胃本實而又冷熱氣相并津液枯燥

腸胃中乾澁故令大便卒不通也

類聚

三十一

類聚

三

治大便卒不通心神煩悶坐卧不安宜服牽

牛子丸方本實而文 牽牛子壹兩 微炒 川朴消兩 大麻人壹兩 川大黃

出牽牛子二兩 微炒 川朴消兩 大麻人壹兩 川大黃

青兩制甘遂 半兩 煨木香兩 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

夫如梧桐子大每服空心以生姜湯下二十

丸如人行十里當通如未通即再服強羸

人加減服之

治大便卒不通心腹氣滿悶木香丸方

木香壹兩 檳榔兩 川大黃壹兩 碎微炒 桂心半兩 巴

豆霜壹兩 川烏頭半兩 炮裂去皮臍 右件藥搗羅為末研入巴豆霜令勻鍊蜜

和丸如梧桐子大每服空心以橘皮湯下

三丸未效加至五丸

治大腸卒不通腹脇脹滿氣上衝心膈宜服

檳榔散方

檳榔壹兩 枳殼兩 微黃去穢 牽牛子壹兩 碎微炒 桑根

白皮壹兩 川大黃壹兩 碎微炒 郁李人壹兩 湯

浸去皮

類聚

類聚

尖微 陳橘皮 壹兩湯浸 炒 去白穢焙

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中 蓋煎至六分去滓溫服如人行十里再服

治大便卒不通氣上奔心膈宜服此方

皂莢 兩去黑皮塗 分壹 巴豆霜 壹 阿魏 半兩 麩裏

煨令麩 熟為度 五靈脂 壹兩

右件藥搗羅為末研入巴豆霜令勻鍊蜜

和丸如棗豆大每服空心以溫生姜湯下

五丸良久未效再服七丸

治大便卒不通氣悶絕方 取此等其粗米

川大黃 半兩 碎微炒 用朴消 半兩 碎微炒 大

右件藥搗細羅為散每服以溫蜜水調下

與每錢 滾湯煎 內熟薑煎不許飲大小如

治大便卒澀結不通方 用朴消 蘇

吳茱萸 生用 十粒 梔子 十四粒 川朴消 壹

右以水壹大盞煎取六分去滓用朴消

內心分為五服 服之 水益二匙 下通 煎

夫此方關格大小便不通諸方 亦不 酸

夫關格者是大小便不通也大便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱不通故為關格也由陰陽不和榮衛不通也陰氣大盛陽氣不得營之故曰關陽氣大盛陰氣不得營之故曰格陰陽俱盛不得相營故曰關格則陰陽氣結腹內脹滿氣不行於大小腸故關格而大小便不通也又風邪在於三焦三焦約痛則小腹病內閉大小便不通一日手足寒者為三陰俱逆三日死也診其脈來浮

牢且滑直者不得大小便也

治風冷氣入小腸忽痛堅急如吹狀大小便不通或小腸有氣結如升大脹起名為關格大小便不通大黃散方

川大黃

一兩到碎微炒

苦參

一兩到

貝齒

一兩燒為灰

滑

石

一兩到

右作藥搗細羅為散不計時候煮葵根湯

調下二錢

治大小便氣壅不利脹滿關格不通吳茱萸

九方

吳茱萸 一分湯浸七粒心 乾薑 一分炮

川大黃 一兩到 當歸 半兩到 赤芍藥 半兩 甘草

芍藥 半兩到 芎藭 半兩 人參 三分去蘆頭 細辛 三分 真

珠 三分 桃白皮 壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服以生姜橘皮湯下三十

丸日三服以通利為度

又方木通 壹兩 川朴消 壹兩 郁李人 壹兩湯浸去皮微炒

黃芩 半兩 車前子 壹兩 蘧麥花 半兩

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓溫服日三四服

治大小便關格不通腹脹喘急立效方

水銀 壹分 膩粉 一分 滑石 一分

右件藥一處研令水銀星盡每服以葱白

湯調下壹錢

又方甘遂 半錢煨 貝齒 二枚燒為灰

右件藥搗細羅為散都為壹服用煖漿水

壹小蒸調服立效○肘後方療卒關格大小便并不通支滿欲死二三日則煞人方甘遂二銖貝齒二枚擣下以三合漿水盡服之須臾即通

又方胡椒二十顆川朴消半

右件藥先以水一大盞煎胡椒至六分去滓入消更煎一兩沸放溫頓服神效

又方膩粉一錢生麻油一合

右件藥相和空腹服之

治大小便關格閉塞方右用蔓菁子油壹合

空腹服之即通通後汗出勿恠

治大小便關格不通肚脹氣築心悶絕方右用烏臼樹東面白皮陰乾搗羅爲菜如五七日不通以熟水調下二錢如急用火土焙乾爲妙

又方蜀葵花一兩麝香半錢

右相和以水壹大盞煎至五分去滓服之如無花即取根拍破用之

治大小便關格不通經三五日方右用無艸
皂莢燒灰細研以粥飲調下得效三錢衛生
十全方立通神功萬全方瑣碎錄肘後
二錢急救仙方壽域方同○
衛生易簡方治大小便不通用皂角燒存
性為末空心米飲或酒調下三錢立通

治大小便難諸方

夫大小便難者由冷熱不調大小腸有遊氣
遊氣在於腸間搏於糟粕小便不得通流故
大小便難也診其尺脉滑而浮大此為陽干

於陰其人若小腹痛滿不能尿尿即陰中痛
大便亦然也

治大小便難心腹滿悶不能可過宜服大黃
散方

川大黃二兩碎微炒川芒消二兩赤芍藥半兩大麻
人二兩桑根白皮一兩蘧麥兩防葵兩榆白
皮一兩

右件藥擣羅為散每服四錢以水壹中
盞煎至六分去滓空腸溫服如人行十里

再服以大小便利為度

治大小便難腹脇脹滿氣急白朮散方

白朮壹兩牽牛子壹兩木通壹兩川大黃壹兩

剉碎陳橘皮半兩湯浸白礬檳榔壹兩川朴消壹兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓空腹溫服如人行十里

再服以利為度

治大小便難宜服此方

木通壹兩川朴消壹兩車前子壹兩黃芩壹兩郁

李人壹兩湯浸去皮微炒

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓每於食前溫服

治大小便難臍腹防悶赤芍藥丸方

赤芍藥壹兩桂心壹兩羌活壹兩川大黃壹兩

郁李人壹兩湯浸去皮微炒川芒消壹兩檳榔壹兩大麻

人壹兩神巧萬全方二兩

右件藥搗羅為末鍊密和搗三二百杵凡

如梧桐子大每服空腹以溫水下三十丸

晚再服

治大小便難腹肚脹滿短氣宜服此方

荆芥兩 麝蟲三十枚 川大黃二兩 芎藭

兩 蒲黃兩 當歸兩 桂心兩 甘草半兩

赤兩 桃人四十枚 湯浸去皮 麩炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵凡如

梧桐子大不計時候煎生姜葱白湯下三

十九

治大小便難腹中有燥糞寒熱煩迫短氣汗

出腹滿宜服此方

葛根兩 猪膏兩 川大黃兩 碎微炒

右件藥以水二人盞煎葛根大黃取汁一

盞半去滓下猪膏煎取膏盞分為二服

治大小便難神效方

木香兩 青黛兩 麻油二

右件藥以水壹大盞同煎令水盡唯有油

去滓分為二服如人行十里服盡

又方 苧實末兩

右分二服以新汲水調下

和劑局方

神功圓治三焦氣壅心腹痞悶六府風熱大便不通腰腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦咽乾心胃煩躁睡卧不安及治脚氣并素有風人大便秘結燥

大麻人

別搗如膏○御醫撮要十兩

人參

去蘆各二兩○撮要十兩

半大黃

鋪紋者極裏煨○二因方得效方蒸亦可撮要八兩 訶黎勒

皮

各四兩○撮要官兩半

右為細末入麻人搗研勻鍊蜜為圓如梧

大桐子大每服二十圓溫水下溫酒米飲皆

可服食後臨卧如大便不通可倍圓數以

利為度

衛生寶鑑同

麻仁圓順三焦和五藏潤腸胃除風氣治冷

熱壅結津液耗少令人大便御醫撮要秘難

或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘

澁尤宜服之

白檀榔

半生半煨○撮要壹兩

山茱萸

去風枝

枳殼去穢兔絲子酒浸車前子別末肉桂去

皮○撮山積各壹郁李仁去皮大黃半蒸

麻仁別搗羌活去木香各壹大黃半生

右為末入研藥勻煉蜜和圓如梧桐子大

每服十五圓至二十圓溫水臨臥服

脾約麻仁圓治腸胃燥澁津液耗少大便堅

硬或秘不通臍腹脹滿腰背拘急及有風人

大便結燥又治小便利數大便因硬而不渴

者謂之脾約此藥主之

厚朴去麩枳實炒芍藥各半大黃蒸

麻仁別研五兩○承杏仁去皮炒研五

兩○醫方大成

右為末蜜和圓如梧桐子大每服二十圓

臨臥溫水下以大便通利為度未利再服

元治老人津液少大便燥小便澁其脾為

約大黃二兩酒厚朴枳殼白芍藥各半麻

子仁壹炒杏仁分右為末蜜左如梧桐子

大每服二十九溫水下加至三十九

七聖圓治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕

唾稠粘心煩而赤咽乾口燥精神不爽夜卧

不安肩背拘急有膈痞悶腹脇脹滿腰滿重

疼衛生寶鑑大便秘結小便赤澀及嵐瘴之

地最宜服

郁李人皮去大黃蒸焙各壹兩一本壹肉

桂去蘆口去蘆寶欖榔生木香生川芎

各半兩

右為末煉蜜搜和為圓如梧桐子大每服

十五圓至二十圓溫熱水下食後臨卧服

更量藏腑虛實加減服

七宣圓療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛

在腹中及積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝

心煩憤悶亂頭旋暗倒肩背重痛心腹脹滿

有膈閉塞風毒腫氣連及頭面大便或秘小

便時澀脾胃氣衛生寶鑑作虛痞不能飲食脚轉筋

掣痛攣急心神恍惚眠臥不安等疾

訶梨勒皮 柴胡去苗洗枳實燈○寶木香

各五兩 桃仁去皮夫燈六大黃麩裏煨甘草

兩 實鑑炒及寶鑑炙四兩

右為末 鍊蜜圓如梧桐子大 每服二十圓

米飲下食後臨臥服實鑑食前臨臥各壹服稍增至

四五十圓取宜利為度覺病勢退服五補

圓不問男女老少並宜服量虛實加減

黃耆湯治年高老人大便秘澁

絲黃芪 陳皮去白各半兩

右為細末每服三錢用大麻仁壹合爛研

以水投取漿壹盞去滓於銀石器內煎候

有乳起即入白密膏大匙再煎令沸調藥

末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服

即無秘澁之患此藥不冷不燥其效如神

得效方同

一本痢聖散子治證同前

草果去皮石菖蒲去毛白茯苓 麻黃去根厚

朴姜汁獨活 枳殼炒藿香 白朮細

辛洗去吳茱萸去甘草燻木猪苓去蒼朮

浸去良薑去赤芍藥 附子炮去藁本去柴

胡去蘆澤瀉 防風去半夏煮各

右判為麤散每服三錢水壹盞半薤白二

條擘碎同煎至八分去滓食前稍溫服老

人小兒加減服食忌生冷油膩之物

大全本草

古方利小便治淋澀多單使滑石又與石葶

同搗末飲服刀圭更駛

廣利方治氣壅關格不通小便淋結臍下妨

悶兼痛以滑石八分研如麵以水五大合

和攪頓服

楊氏產乳療小便不通滑石末壹升以車前

汁和塗臍四畔方四寸熱即易之冬月水

和亦得

經驗方縮小便以顛塊雌黃壹兩半研如粉

乾薑半兩切碎入搯四大錢同炒令乾薑

色黃同為末乾蒸餅入水為丸如棗豆大

每服十九至二十九空心塩湯下

外臺秘要忍小便久致胞轉取梁上塵三指搗以水服之

外臺秘要主發熱口乾小便澁萎蕤五兩煮汁飲之

圖經曰又有七物升麻九升麻犀角黃芩朴消梔子大黃各二兩豉二升微熬同搗散蜜丸覺四肢大熱大便難卽服三十九取微利爲好若四肢小熱於食上服二十九

非但辟瘴兼甚明目

楊氏產乳療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚草三兩以水四升煮取二升半分

三服

葛氏方治小便出血當歸四兩細剉酒三升煮取壹升頓服

張仲景治小便不利有水氣栝樓瞿麥丸主之栝樓根二兩大附子壹箇茯苓山芋各三兩瞿麥壹分五物杵末蜜丸如梧子大

壹服三九日三未知益至七八九以小便利腹中溫爲知也
楊氏產乳治腹滿大小便不利氣急甘遂二分爲散分五服熟水下如覺心下煩得微利日一服
子母祕錄治無故遺血溺舡中故竹茹乾末酒服三錢七日三服
外臺祕要治下部閉不通取蒟藿根壹把搗汁水和絞去滓強人服一升數用之并治

脚氣

陳藏器云取麻鞋尖頭二七爲灰歲朝井華水服主遺溺

食療生榆皮利小便主石淋又取葉煮食之時復食一頓尤良

梔子治心經留熱小便赤澀去皮山梔子火炮大黃連翹甘草炙等分末之水煎二三錢七服之無不效

姚氏方治小便出血末龍骨二方寸匕水調

溫服之日二服差

圖經曰兔毛筆頭灰主小便不通及數而難

淋瀝陰腫中惡脫肛筆並取年久者燒灰

水服之

唐本注云苦瓠煮汁漬陰療小便不通也

三因方

秘結證治

半桃丸 諸方名 治年高風秘冷秘心腹一切

疝癰冷氣暖元臟止泄瀉進飲食

硫黃 研細衛生寶鑑明淨好者 半夏湯

七次焙乾為末

右等分以生姜汁同熬炊餅末攪勻杵數

百下丸如梧子大空心溫酒姜湯下三寸

九 寶鑑十五丸至二 嚴氏濟氏方右等

分利勻用生薑自然汁打麩糊為圓如梧

桐子大每服五十圓空心溫酒姜湯在

醫方大成集成承類鈴方衛生易簡方同

得效方每服二十圓空心飲下酒亦可

直指方右末生薑汁煮白麩糊築圓桐子

大每服二十圓姜湯下或用葱白壹條生

姜三片煎熟入阿膠二片溶開發空送下

胃氣丸治虛人老人風秘不通不可服涼藥

用此其効方見霍亂門自然止吐瀉開胃固心

蜜兌法式蜜三合搗少許煎如餛出冷水中

捏如指大長三寸許納下部立通石得效

方蜜三合入猪膽汁兩枚在內煎如餛以

井水出冷候凝澹寮方稍熱捩如指大長三寸

許納澹寮方下部立通嚴氏濟活人書單



用蜜一法人皂角末在人斟酌用一法入

薄苛末代皂角用尤好又或偶無蜜只嚼

薄苛以津液調作挺用之亦妙肘後方療

白欲死方蜜三升微火煎如餛投水中凝為

丸如大指長六寸導之今小兒不禁更丸

遺尿失禁證治淋瀝遺尿發汗尿澀美

經云膀胱不利為癃不約為遺溺者乃心腎

氣傳送失度之所為也故有小澁而遺者有

失禁而不自知又婦人產蓐產理不順致

傷膀胱遺尿無時又小兒胞冷尿牀亦著成人者治之各有方
 家韭子丸治少長遺尿及男子虛劇陽氣衰敗小便白濁夜夢洩精此藥補養元氣進美飲食○玉機微義下元虛冷小便不禁或成白濁

家韭子 六兩 炒 鹿茸 四兩 酥炙 菴蓉 酒浸 牛膝 酒熟
 地黃 各二兩 當歸 已上四味各乙 巴戟 去心
 兔絲子 酒浸各一兩 杜仲 去皮制製 石

斛 去桂心 乾薑 前各

右為末酒糊為丸如梧子大每服五十九加至百丸空心食前塩湯溫酒下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足故也別作壹等小丸服 得效方醫力
 阿膠飲治小便遺失不禁
 阿膠 二兩 牡礪 取 鹿茸 切酥炙
 右為剉散每服四大錢水壹盞煎七分空心服或作細末飲調亦好

張真君茯苓丸治心腎氣虛神志不守小便
淋瀝或不禁及遺洩白濁水治赤白小便空

赤茯苓 白茯苓 各等

右為末以新汲水按洗澄去新沫控乾別

取地黃汁同與好酒銀石器內熬成膏搜

和為丸如彈子大空心鹽酒嚼下醫方火

補珍方永類鈴方玉機微義壽常服輕身

延年

治溺床失禁用猪胞洗淨鐵鏟上炙香熟嚼

御溫酒派方軒方廣實香乳水香最宜家小

衛生末金方關神王隔表式阿別驗以

胎結囊不出生薑削如小指樣以塩塗了內

入下部即通食補以滋臨至二錢甘草

神巧萬金方

治諸小便方批夫命黃氣阿別驗以二錢甘草

治小便由血心神煩熱口乾眠臥不安刮滑

石末末和傅繞小腹及繞陰際佳驗也

尿在胞中為屈辟津液不通以葱葉尖內陰

莖孔中深三寸微用口吹之胞脹津液大
通便愈凡人候鼻頭色黃法小便難也

治遺尿宜服此方煎口渴知利不安時常

牡蠣火煨成粉鹿茸去毛酥塗炙令黃阿膠麩炒枯各二兩桑

麻木耳附壹

右為末每於食前以粥飲調下二錢

是齋醫方山土蒸附城小許難以蒸下內

治風秘錢知閣傳王嗣康方阿膠麩炒研為
細末煎服三錢氣實者加木香最宜老人

寬氣湯利三焦順臟腑治大便多祕孫盈仲
傳呂子厚右司閣中服之有效

香附子六兩須新砂盆內打令淨潔烏藥

二兩去心取肉縮砂仁壹兩甘草

秤用真天台者良方壹分炒

右為細末每服壹大錢濃煎橘皮湯下不
以時候此方官局小烏沉湯加縮砂仁分
兩不同

治風秘攢宮有一老人患八九日不通有木

匠授以此方只一服便見效衛生方簡方

氣奔不吐皂角當中取壹寸許去黑皮以

沸湯半盞泡上用蓋蓋定候通口服之先

辨少粥通後即食山居四要同

治老人虛人小便不通得效方名琥珀散小便上有心氣閉塞四

字吳內翰方山居四要衛生易簡琥珀研方治腹脹小便不通

如粉得效方人參湯調下壹錢止經驗良方亦治

心痛陳彥修侍郎服驗○朱氏集驗方琥珀

散老人小便不通琥珀研如粉不拘多少右蜜為

丸梧桐子大每服十元煎赤茯苓湯下甚

者加丸數立通如小便純血只以末二錢

煎燈心湯下聖濟總錄治小便不通久即

成淋方經驗秘方治小便閉結不通右以琥珀搗研成

粉每服二錢匕農煎萱草根汁調下空心

服秘方此下云及人曾自小便秘甚久渴成淋瀝諸藥不効者服此立愈

治腹脹小便不通得效方名芡蕒得效方不

拘多少焙乾碾為細末每服三錢重熱酒

調下不能飲者以米飲調下頻進數服以

通為度紹興劉駐泊汝翼云魏邳知明州時宅庫之妻患此疾垂殆隨行御醫某人治此藥令服遂愈

治大小便不通

壽域神方掩臍法

顏尚書方屢試有

驗浦根葱青葙不得洗

神方帶泥

淡豆豉二十

壹粒搗壹捻生薑壹塊胡桃大同研令爛

炒濕填臍內以絹帛縛定良久即通○直

指方掩臍法連根葱一莖

醫方集成南北經方袖珍方

衛生易簡方一二莖不得洗帶上生薑一塊淡豆豉

二十壹粒搗二匙同研爛捏餅烘熱掩臍

中以帛札定良久氣透自通不然再換一

大劑得效方同朱氏集驗方調氣散治老人大小

便不通生薑

半兩

葱壹莖

根葉并泥

鹽壹

豆豉三十

粒右四味搗爛安臍中良久即通

治腹肚脹痛臍腑秘方俞教授論

蒼朮大厚朴

薑汁炙

陳皮

各壹兩

生好硫黃

二兩

用蘿蔔煎沸湯浴三兩次

右件搗羅為末浸蒸餅糊為元如梧桐子

大每服三五十元日兩服米飲下

瑣碎錄

治大小便不通方

東坡云若小便濁大府滑百藥不差取倒粘子嫩葉蒸之焙燥為末以酒糊員日百餘粒二府皆平復

大便不通以熈實於臍內包之通則解去小老人臟腑不通以黃耆人參麤末濃煎服之小便不通懸黃耆為末水二盞藥二大錢

煎一盞溫服小兒以歲數加減服經驗秘方簡奇

又方以麻皮一握細剉入甘草少許同煎服

立通

又方烏梅肉為末水調二錢神效小兒通川

經驗秘方簡奇方此下又云椿木根直此者取直者一條不拘長短刮去皮土煎湯溫服小水結閉不通用葱針插入尿管即通

又方磨剪刀交根水一盞服即通事林廣記山居四要

同

又五苓散加滑石末木通燈心煎湯調下

又琥珀末三錢燈心木通煎湯調下

小便梗澀用四物湯加刮竹青煎服

治便數方炒糯米碾為細末空心服之

小便雜治

欲止夜起用益智二十箇和皮剉碎用水一

椀煎六分臨臥熱服

又胡桃慢火炮熟臨臥溫酒同嚼下

直指方

小便不通證治

草蜜湯治心腎有熱小便不通生車前草搗

取自然汁半盞入蜜一起調服

蒲黃湯治心腎有熱小便不通

赤茯苓 木通 車前子 桑白皮炒 荆

芥 燈心 赤芍藥 甘草微炙 生蒲黃

滑石分

右末每服貳錢葱頭一片紫蘇五葉煎湯

調下

又五苓散加滑石末木通燈心煎湯調下

又琥珀末三錢燈心木通煎湯調下

小便梗澀用四物湯加刮竹青煎服

治便數方炒糯米碾為細末空心服之

又小便雜治

欲止夜起用益智二十箇和皮剉碎用水一

椀煎六分臨臥熱服

又胡桃慢火炮熟臨臥溫酒同嚼下

直指方

小便不通證治

草蜜湯治心腎有熱小便不通生車前草搗

取自然汁半盞入蜜一起調服

蒲黃湯治心腎有熱小便不通

赤茯苓 木通 車前子 桑白皮炒 荆

芥 燈心 赤芍藥 甘草微炙 蒲黃

滑石等分

右末每服貳錢葱頭一片紫蘇五葉煎湯

調下

八正散治心經邪熱小便赤澀不通方見積熱門

五苓散方見水腫門加赤茯苓治小便不通每服

一錢川燈心山茵陳各壹握煎湯調下

參耆湯治心肺虛而客熱乘之小便澀而數

數而瀝

赤茯苓七錢生乾地黃去蘆黃耆得效方桑

螵蛸微炙地骨皮各半兩○得人參得效方

北五味子得效方兔絲子酒浸甘草炙各

半

右細剉每服三錢新水得效方煎臨熟入

燈心貳十壹莖溫服

平補圓治腎虛小便數而瀝如欲滲之狀或

虛勞內損遺尿或下焦虛寒小便欲出而不

禁通用方見消渴門

茸香圓治下焦虛冷尿多或虛勞遺尿或欲

出而不禁

鹿茸酥炙肉苁蓉酒浸當歸各半雞內金七錢

炙半微龍骨炙牡蠣灰炙赤石脂炙禹餘糧

煨醋淬碎為度各研細川白薑益智仁巴戟

乳香各二錢半出右細末糯米糊圓桐子大每服七十圓空

荳心煎湯下

桃仁承氣湯治下焦蓄血漱水迷忘小腹急

痛內外有熱加生蒲黃力見血病門

轉胞證治

轉胞方得效方治胞轉小便不能通先用

良薑葱頭紫蘇莖葉各書

右煎湯客室內熏洗小腹外腎肛門留湯

再添蘸帛洗以手拊摩臍下拭乾絲被中

仰坐垂脚自舒其氣次用大黃赤芍藥白芍藥

蜀葵子二錢赤伏苓赤芍藥白芍藥

各半右剉每服三錢煎取清汁再煖乘熱調蘇

合香圓三圓并研細青藍半錢食前溫服

前便多證治

多溺方暖腎圓治腎虛多溺或小便不禁而

濁

葫蘆巴炒 故紙炒 川練肉用牡蠣炒 大熟

地黃洗焙 益智仁 鹿茸酒炙 山茱萸 代赭

石煮熱醋細研 赤石脂各三分 龍骨 海螵蛸

熟艾米醋浸壹宿炙焦 丁香 沉香 滴乳香各二分

禹餘糧煨醋淬碎為度細研三分 赤芍藥 白芍藥

右細末水煮糯米糊圓桐子大每服五十

圓食前石菖蒲煎湯送下

大便秘澁證治

三黃湯三黃圓治熱證大便結

甘豆湯治熱證風證大便不通方並見積熱門

金液丹治大便挾冷結滯川麻仁杏仁煎湯

下方見脾胃門

膠蜜湯治老人虛人大便秘澁

連根葱白三片

右新水煎去葱入透明阿膠炒二錢蜜二

匙溶開食前溫服

潤腸圓大便秘澁通用得效方名大潤腸圓

杏仁去皮尖枳殼去穢麻仁 陳皮各半

阿膠炒防風各二錢半

右末煉蜜圓桐子大每服五十圓老者蘇

子煎湯下壯者荆芥泡湯下醫方大成集

服五十九蘇子湯荆芥湯在下

肥積圓治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大

便秘結

蓬莪朮三兩京三稜二兩良薑半兩已上川米

內煮乾乘青皮去白南木香各半不蚌皂

角三大錢百草霜採村鍋底

右為細末用川巴豆半兩只去殼研如泥

漸入藥末研和得所麪糊圓麻子大每服

五圓加至十圓得效方每服五十橘皮煎

湯下

木香逐氣圓治食積氣滯通利大便兼治脚

氣小腸氣諸氣攻刺腹痛

橘紅去穢青皮去穢檳榔雞心香南木香二錢

川巴豆肉漸入藥夾研

右件並末用生薑自然汁調神麩末為糊

圓麻子大母版十圓薑湯下如氣攻腹痛

枳殼木瓜煎湯下得効方同

二香圓治積滯氣秘心腹刺痛中滿壅嗽

南木香 丁香 青皮浸去白曬 橘紅 草果

仁 肉豆蔻生 白豆蔻仁 五靈脂香潤者別

研各半兩 蓬朮炮乘熟碎碾 縮砂仁各七錢半

右細末用川巴豆肉半兩研如泥漸入藥

末研和白麵稀糊圓麻子大候乾每服三

圓加至五七圓止薑湯下壅嗽紫蘇生薑

煎湯下

獨棗湯治大便積日不通

大好棗言枚擘開入輕粉半錢

右以棗相合麻線札縛慢火煮熟嚼細以

棗汁送下得効方同

脾約麻仁圓治風秘及脾約證小便數大便

秘方見脚用枳殼散送下

追風毒判散治風氣蕃盛大便秘結方見脚氣門

疎風散治風毒秘結

枳殼製防風 羌活 獨活 檳榔

白芷 威靈仙 炭藥赤麻仁得效方

杏仁得效方湯洗去甘草效方各壹兩○得

右麤末每二錢半薑五片得效方水壹盞

半慢火煎服

桔梗枳殼湯治氣不下降大便不通方見諸

加紫蘇莖葉煎

寬快湯治氣不下降大腑澀滯

香附杵淨天合烏藥去枳殼製各一縮砂

仁七錢蘇子炒半青木香三錢甘草炙七

右末每服二錢陳皮煎湯調下或吞青木

香圓少許

降氣湯治氣不下降才使不通方見脚加枳

殼杏仁煎此藥流行肺氣蘇合蘇合香圓方見咳感應圓

蘇感圓治氣秘不大便用紫蘇橘皮煎湯下

或枳殼散送下蘇合香圓方見咳感應圓

方見脹 蘇合四分感應六分研和別圓太

凡腹痛而嘔欲利其大便諸藥皆此惟蘇

感圓用薑汁泡湯下最妙

又掩臍法

方見是齋醫方

臨用入輕粉少許尤速

熏方不蛀皂角用椀燒置於桶內熏其後部

自通

得効方同

○袖珍方用皂角燒烟馬桶內

坐薰即通

朱氏集驗方

便數

治小便太過王叔繼安撫傳益智子

不以多少為

細末臨卧每服二錢入鹽少許即止○衛

生易簡方治小便多及遺精餘瀝用益智

二十四枚槌碎入鹽用水壹盞煎六分服

縮泉圓治丈夫小便頻數史越王方

烏藥

益智

炒川椒

去目并合口者出汗

吳茱萸

九蒸

九曝

右等分酒糊圓梧桐子大每服五十圓臨

臥搥湯下

雙白圓

白茯苓去皮鹿角霜

右等分細末酒糊圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯下此二方梁氏摠要本

秘結

南木香丸治大便秘結

南木香不見火檳榔麻仁枳殼

右等分先將枳殼去穰每箇切作四片用不蛭皂角三寸生薑五片巴豆三粒略搥碎不去殼用水壹盞將枳殼同煮和袞濾

去生薑巴豆皂角並不用只將枳殼細剉

焙乾碾為末入前木香檳榔麻仁同為末

煉蜜為丸蜜湯下不拘時候南北經驗方

驅風丸治大便不通或年高風秘

皂角七定炮按水兩椀巴豆四十九粒去殼心膜枳殼一兩

右以皂角按水煮乾為度去巴不用炒枳殼為細末入木香半兩蜜丸如梧桐子大每服三十九空心白湯下

治老人小便不通

茵香 白頸地龍

右杵汁傾臍腹中即愈

利氣散治老人小便秘澀不通

絲黃者 陳皮 甘草

右等分爲末水煎

治小便不通壅上心滿五苓散壹貼生薑白

然汁半盞調一方用燈心山茵陳煎湯調

服

輕粉散治大小便秘用大棗十枚却川真輕

粉一匣每壹个入粉少許合住用蒸子盛
紙覆之者湯餽上蒸熟細嚼白湯下虛者
不宜用

潤腸圖治大腸風結氣澀

肥皂角 五片 醋炙 焦去皮及子 五片 生用

揉取濃汁 慮過慢火炒銀 南木香 青橘

皮 一分 檳榔 生用 陳橘皮 白秤 分去

右四味爲末和前皂角末令勻却以皂角

膏搜和成劑看得所後如硬入少蜜圓如

梧桐子大每服三十圓空心溫熱水下北南

經方方袖
珍方同

治閉結并脚氣方

大螺以塩匕和設生壽碎置病者脣
下一寸三分用寬帛繫之即通

饒醫熊彥誠年五十五歲病前後便溲不

通五日腹脹如鼓同輩環視皆不能措力

與西湖妙果僧慧月相善遣信邀致訣別

月驚馳而往過釣橋逢一異客風姿瀟灑

出塵揖之日方外高士何子子走趨如此

月曰一善友久患閉結勢不可療急欲往

問客曰此易事也待奉施一藥即脫鞋入

水探一大螺而出曰事濟矣特抵其家以

塩匕和殼生壽碎置病者脣下一寸三分

用寬帛緊繫之仍辨觸器以須其通月未

深以為然姑異謝之熊昏不知人事妻子

聚泣諸醫知無他策謾以試之曾未安席

窘然暴下醫愧歎而散月歸訪異人無所

見矣熊後十六年乃終白石董守約以脚

氣攻注為苦或教之搥數螺傳兩股上便覺冷氣趁下至足既而亦安

嚴氏濟生方

秘結

和殼圓治腸胃氣壅風盛大便秘實

皂角

書鏡去黑皮微炒○得效枳殼去穰方承類鈴方去皮弦子炙

川大黃

二兩制微炒羌活法蘆木香不見橘紅

桑白皮

蜜水炙香白芷各二兩○得效方各等分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七

十圓空心米飲薑湯任下

醫方大成集成南北經驗方

同珍方 ○得效方云又方只用枳實皂角等

分為末飯飲為元亦妙治法湯引全上

橘杏圓治氣秘老人虛弱人

醫方大成秘下有腑不通四字

皆可服

橘紅

取杏仁湯浸去皮尖○得效方另研

右二味等分和勻煉蜜為圓如梧桐子大

每服七十圓空心用米飲送下

醫方集成南北經驗

方由珍方承類鈴方衛生易簡方與大成同

潤腸圓治發汗利小便亡津液大腑秘老人
虛人皆可服

肉蓯蓉

酒浸焙

沉香

別研

右為細末用麻子仁汁打糊為圓如梧桐

子大每服七十圓空心用米飲送下

得效方澹

方承類鈔方大成集成南北經驗

嚴氏濟生續方

秘結

葦靈仙圓治老人腸胃虛弱津液不能內潤

氣澁不能運掉大便秘結不問風冷氣秘皆
可服之

葦靈仙

洗去蘆

黃耆

去蘆蜜水炙各五兩

枳實

麩炒半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七

十圓空心食前用米飲送下○得效方黃

耆蜜枳實葦靈仙右等分為末用蜜圓如

梧子大每服五七十圓薑湯熟水下一方

用防風無黃耆忌茶

阜角圓治大腸有風大便秘結尊年之人尤

宜服之

皂角炙去子枳殼去穰

右等分爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每

服七十圓空心食前用米飲送下得效方

同○澹寮方風秘氣秘方皂角不蛀者

存枳殼炒右等分爛飯爲圓濃磨沉香湯

吞下經驗良方治裏急後重枳殼炒皂角

干不蛀者用占米右二味各等分炒令乾

燥爲末飯飲爲丸如梧桐子大每服二十

丸至三十丸空心米飲下

淋利

兔絲子圓治小便多或不禁

兔絲子淘淨酒蒸牡蠣煨取粉肉蓯蓉酒

二附子炮去皮五味子壹兩雞肫脰半兩鹿

茸酒炙桑螵蛸酒炙

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服七

十圓食前塩湯搗酒玉機微義在下

革薺圓治小便頻數日夜無時

川革薺洗

右不拘多少為細末酒糊為圓如梧桐子
大每服七十圓空心食前用鹽湯送酒在
下得效
方同

縮泉圓治脬氣不足小便頻數

天台烏藥 益智仁

右等分為細末酒煮山藥末糊為圓如梧
桐子大每服七十圓臨卧用鹽酒送下得
方同

宣明論

鐵脚丸治大小便不通

皂角炙去皮不
多少去却子

右為末酒麵糊為丸如桐子大每服三十

丸酒下

葵子散治小便不通

葵子去黑皮
茯苓各等分

右為末每服四錢水壹盞煎三沸食前

東垣試效方

大便結燥

潤腸圓治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥秘塞不通全不思食乃風結祕血結秘皆令閉塞也以潤燥和血踈風自然通

麻子仁衛生寶鑑半片桃仁去皮尖各一兩○羌

活半常歸尾當歸寶鑑煨大黃○

右件除麻仁桃仁別研如泥外搗羅為末

五上火煉蜜圓如桐子次每服三五十圓

寶鑑每服五空心白湯送下如病人不

大便為大便不通而滋蘭室秘裁作澁其邪寶鑑作榮

盛者急加酒製大黃以利之如血燥寶鑑

澁而大便燥乾者加桃仁酒製大黃如

風結燥大便不行者加麻子仁大黃如

風澁而大便不行者加皂角仁秘藏大黃

秦艽以利之如脉澁覺身有氣澁而大

便不通者加郁李仁大黃以除之氣燥寶鑑

澁如寒陰之病為寒結閉而大便不通者

以局方中半硫圓或加煎附子乾薑湯冰

冷與之其病雖陰寒之證常當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與壹服藥微通其大便不令閉結乃治之大法若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜與陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加如陰燥欲坐井中者其二腎脉必按之虛或沉細而遲此易為辨耳知有客邪之病亦從權加藥以去之

當歸潤燥湯

蘭室秘藏名潤燥湯

升麻錢二當歸錢一秘熱地黃錢生地黃

藏當歸稍甘草錢二衛生寶鑑秘人黃錢寶鑑秘桃仁泥

子麻仁錢各一紅花少許○寶鑑五分

右件除桃仁麻仁另研如泥外剉如麻豆

大作壹服水二大盞入桃仁麻仁煎至壹

錢去滓空心宿食消盡熱服之

導滯通幽湯蘭室秘藏名通幽湯治大便難幽門不通

上衝吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治

在幽門以辛潤之

當歸秘藏當歸身升麻 桃仁泥各壹錢 生地黃

五分紅花壹分 熟地黃五分 炙甘草壹分 不問不

右件作壹服水二盞煎至壹盞去滓調攪

椰細末半錢稍熱服秘藏稍熱食前服之

活血潤燥圓治大便風秘不通通作血秘

常燥結

當歸青錢○秘 防風錢三 羌活壹兩 大黃壹兩 紙

裏桃仁二兩湯泡 麻仁二兩半 二味皂角

燒存性去皮尖 兩半其性得濕則

滑濕滑則燥結自除用之勿悞

右除麻仁桃仁另研外為細末却同拌勻

煉蜜去沫為圓如梧子大每服五十圓三

兩服後秘藏白湯下三兩服後須以 大便

日久不能結燥也以磁器內盛紙封之無

令見風

升陽瀉濕湯蘭室秘藏一 治膈咽不通逆氣

裏急大便不行

青皮二分 甘草四分○秘 槐子二分 黃芪錢一 黃

蘘三分 升麻七分 生地黃三分 熟地黃三分 當歸四分

○秘藏 桃仁 二錢 ○秘藏 蒼朮 半錢

右件咬咀如麻豆大作一服另研桃仁泥

子一處同煎水二大盞煎至壹盞去滓稍

熱服食前

麻黃白朮散治大便不通三藏室秘日一遍

小便黃赤渾身腫而上及腹猶甚其色黃麻

木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動

喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時燥熱發

欲去衣須臾而過振寒項額有時如冰額寒

猶甚頭旋眼黑口中溜火冷淚鼻不聞香臭

少腹急痛當臍有動氣按之堅硬而痛

麻黃不去節桂枝三分杏仁四分吳茱萸秘藏四分

草薺各半錢白薺五分厚朴三分炒麵半錢

五分升麻柴胡三分白朮三分蒼朮三分生

甘草一錢○秘澤瀉四分茯苓四分○秘橘

紅二分青皮一分○秘黃連一分黃皮二分

黃耆三分人參三分炙甘草一分猪苓三分

右咬咀分作兩服水二大盞半先煎麻黃

令沸去沫再入諸藥同煎至一盞去滓稍
 熱服食遠 此證宿有風濕熱伏於榮血
 之中其木火乘於陽道為上盛元氣短少
 喘為陰火傷其四肢痿在腎水之間乃所
 勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實
 其母肺金剋火凌木是大勝必大復其證
 善恐欠多嚏鼻中如有物不聞香臭目視
 眈眈多悲健忘小腹急痛通身黃腹大脹
 面目腫猶甚食不下痰唾涕有血目皆瘍

大便不通只二服皆已

蘭室祕藏

大便結燥

潤腸湯治大腸結燥不通

右	生	一	錢	當	尾	粹	膏	右
咬	地	大	大	歸	方	方	錢	咬
咀	黃	黃	黃	升	升	各	各	咀
水	二	生	熟	麻	桃	紅	紅	水
二	袖	甘	地	仁	仁	花	花	二
盞	珍	草	黃	麻	麻	三	三	盞
煎	方	已	當	人	人	分	分	煎
至	各	上	歸	已	已	分	分	至
一	二	各	拔	上	上	各	各	一
盞	錢	錢	袖	各	各	一	一	盞
去	○	○	珍	分	分	分	分	去
粗	袖	袖	方	去	去	去	去	粗
香	方	方	去	去	去	去	去	香
食	方	方	去	去	去	去	去	食
溫	方	方	去	去	去	去	去	溫
服	方	方	去	去	去	去	去	服

○拔粹方石件剉如麻豆大都作壹服水
三盞先拌藥濕煎至壹盞去滓帶熱服食
前袖珍方右咬阻每服壹兩水二盞煎至
一盞去滓通口食前服
得效方
秘澁

小便不通熱證入正散治心經邪熱小便赤
澁不通加燈心枳殼車前草地膚子煎方
積熱門所
加並半錢

五苓散治小便不通壅上心滿燈心十莖車

前草二根煎湯調方見諸
暑門

通心飲治心經有熱唇焦面赤發熱小便不

通每服四錢水一盞半燈心十莖滑石末

一匕麥門冬二十粒桑白皮七寸煎去滓

再入生車前草汁壹合攪勻服方見虛
諸熱門

芡蓼散方見是
齋醫方

虛證入味圓治腎虛小便秘澁不通或過服

涼藥者每服五十圓溫鹽湯下立效方見
諸虛

門

附子散治小便不通兩尺脉俱沉微乃陰虛故也用淋閉通滑之劑不效者

繇附子

鹽水內浸良久

澤瀉

不蛀者

右剉散每服四錢水壹盞半燈心七莖煎

隨通而愈

琥珀散

方見是

利氣散治老人氣虛小便閉塞不通

繇黃耆

去蘆 陳皮

去白 甘草

各等分

右剉散每服三錢水壹盞煎服自然流通

參耆湯

方見直

轉胞滑石散治胞爲熱所迫或忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外小應入不得入內溲應出不得出小腹急痛不得小便小腹痛不治害人

寒水石

二兩 白滑石

壹兩 葵子

壹兩 亂髮灰

前子

去皮節 木通

右剉散水一斗煮取五升時時服壹升卽

利

八味圓治虛人下元冷胞轉不得小便膨急切痛經四五日困篤欲死每服五十圓搗湯下方見諸虛門

葱白湯治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉而不流氣衝胞系不正

陳皮三兩葵子壹兩葱白二兩右剉散水五升煮取二升分三服

洗方方見直指方

葱熨法治小便難小腸脹不急治殺人用葱白經驗良方連鬚三斤細剉炒令熟以帕子裹分

作兩處更替熨臍下即通方見于

大便不通風秘脾約麻仁圓方見于

皂角圓專治有風人臟腑秘澀大效

猪牙皂角 厚枳殼去穢羌活 桑白皮

檳榔 杏仁湯洗去尖炒別研麻仁別研防風 川

白芷 陳皮去穢

右等分爲末蜜圓如梧子大每服三十五

圓溫水吞下蜜湯亦可

又方皂角圓方見嚴氏踈風散方見直枳殼

圓方見嚴氏

順氣圓治三十六種風七十二般氣上熱下

冷腰脚疼痛四肢無力惡瘡下疳踈風順氣

專治大腸秘澁真良方也

大黃兩半生用山藥刮去山茱萸肉醫

大成麻子仁微炒退散郁李仁炮去兔絲

子酒浸炒○大成酒浸一宿

大成防風去蘆枳殼炒○大成川獨活各

兩檳榔二車前子二兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服二三

十圓用茶酒米飲任下醫方集成南北經

大成百無所忌平旦臨卧各壹服久服自

然精神強健百病不生

搜風散治大便秘結人掛實神效三

青皮去威靈仙去頭洗大黃壹兩大戟一

白去威靈仙各二兩

頭聚

六

牛蒡子

四兩新瓦上炒

右為末每服壹錢人壯實每服三錢蜜酒

調服畢嗽口

二仁圓專治虛人老人風秘不可服大黃藥

者

杏仁

去皮尖炒黃

麻仁

各另研

枳殼

去穰炒赤

訶子

煨火炒極去核

右等分末煉蜜圓如梧子大每服三十圓

溫水下

氣秘三和散

方見諸氣門

四磨湯治氣滯腹急大便秘澀○經驗良方

治老人虛秘

大檳榔

沉香

木香

烏藥

右四味於搗盆內各磨半錢和勻溫服有

熱者加大黃枳殼名六磨湯○良方右用

水磨加白湯溫服然順氣丸極為通利

蘇麻粥最佳

蘇子降氣湯治氣不下降大便不通加枳殼

杏仁

方見諸氣門

橘杏圓

蘇麻粥

方並見嚴氏濟生方

小通氣散治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳

送致令秘澁服燥藥過大便秘亦可用

陳皮

去蘇嫩莖葉

枳殼

去穰木通去節

右等分剉散每服四錢水壹盞煎溫服立

通

積滯秘結脾積圓

木香逐氣圓

方並見直指方

感應圓治飲食所傷三焦氣滯大便秘澁

百草霜

用村庄家鍋底上者細研二兩

新揀丁香

壹兩半

杏仁

去雙仁揀肥者一百四十介去尖湯浸壹宿火皮別研及爛如膏

南

木香

去蘆頭

肉豆蔻

去麤皮用滑

川乾薑

一兩

製巴豆研細出盡油如粉

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味

搗為末與三味同拌研令細川好蠟置和

先將蠟六兩溶化作汁以重絛濾去滓更

以好酒一升於銀石器內煮蠟溶袞數沸

傾出候酒冷更蠟自浮於上取蠟秤用凡

春夏修合用清油膏兩於銚內熬令末散
香熟次下酒煮蠟四兩化作汁就鍋內乘
熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩
半同煎煮熱作汁和蠟置藥末成劑分作
小錠子以油單紙裹之旋圓服餌

虛秘半碗圓方見三

金液州治大便挾冷結滯用麻仁杏仁煎湯

下傷寒陰結亦用方見癩冷門

葳靈仙圓方見嚴氏濟生續方

五仁圓諸方名滋治津液枯竭大腸祕澀傳

導艱難

桃仁炒去皮杏仁各等分栢子仁半松子仁一錢

北二分半經方驗方陳皮四兩另郁李仁一錢

右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜

為丸如梧子大每服五十圓空心米飲下

永類鈔方同

潤腸圓方見嚴氏濟生方

又方 醫方大成集成袖珍方 治大便祕澀連日不通

麻子仁 一盞半細研用水脂麻半盞微炒

取濃汁○衛生 桃仁 湯洗去皮縫 荆芥穗

易簡方各膏 一兩

右用前藥入揀少許同煎可以當茶飲之

以利為度

葱白散 方見于金方

胃氣圓治老人胃寒氣怯大便反祕每服五

十九丸米飲空腹下未效生薑自然汁著熱

水少許吞下 方見霍亂門

黃耆湯 治胃弱食而不化

熱秘神功圓 方並見和

檳榔圓治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大

便秘結

檳榔 大黃 蒸 麻子仁 少去殼 枳實 炒 羌

活蘆 去 牽牛 炒 杏仁 去皮 白芷 黃芩 各壹

人參 半

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九空

心熱水下

醫方大成集成南北經驗方補珍方永類鈔方同

四順清涼飲治同此每服三錢水一盞半燈

野心十莖枳殼十片去穰煎立效

方見積熱門

小三黃圓治熱証大便便秘結每服三十圓濕

水下

方見積熱門

小柴胡湯治傷寒陽結能食而大便不下見方

傷寒門

濕秘檳榔散

方見聖惠方

香蘇散多加枳殼檳榔亦效

方見傷寒門

通治甘遂散治大小便不通右以甘遂二兩

赤皮者為末煉蜜二合和勻每一兩重分

作四服日進一服蜜水下未知日二服漸

天加之

又方葵子末三合水一升煮去滓分作二服

猪脂二兩空心

入散治同上

方見積熱門

推車散治大小便秘經月欲死者

推車客七止狗七

如男子病推車客用頭七狗用身
如女子病土狗用頭推車客用身

右新瓦止焙乾為末用虎目樹皮向南者

濃煎汁調只一服經驗如神

又掩臍法方見是齋醫方

通治大潤圓獨棗湯方直見

敷藥治閉結至亟昏不知人生大螺兩三枚

以鹽一匕和穀生搗碎置病者臍下壹寸

三分用寬帛繫繫之即大通味効烏柏木

根三寸研井水服亦効就多研爛敷臍下

亦可亦見

蜜兌法方見三煨蒜方金方方見千熏方方見直

老人臟腑秘不可用大黃老人津液少所以

臟腑秘澁更服大黃以瀉之津液皆大定

須再秘甚於前只可服寬潤大腸之藥更

用槐花煎湯淋洗亦効更有老人發熱而

大腑秘澁或因多服丹藥脾胃虛弱煮化

不行遂為臟腑積熱須用神保圓得通瀉

一行熱亦即退

漩多

川方五子圓治小便頻數時有白濁

脚弱老人虛人多有此證令人卒死大能

人精液頭昏

兔絲子酒蒸家韭子略益智子去茴香炒蛇

床子去皮

右等分爲末酒糊元如梧子大每服五七

十圓糯米飲塩湯任下澹寮方米飲塩湯

椒末爲衣愚恐椒能麻人咽喉且反

先化於隔土何益於下部未爲

類鈴方右等分爲末酒糊元梧桐子大塩

湯下五十元此膀胱下焦二府冷爲患非

常治心腎一方元訖陰乾以椒末爲衣尤

佳 兔絲子圓治小便多或不禁

兔絲子酒蒸桑螵蛸酒炙牡蠣假取粉肉

菴蓉酒潤附子炮五味子各雞肫胗

半兩鹿茸酒炙

右爲末酒糊元如梧子大每服七十圓食

前塩酒醫方大成集或南北經驗方補任

下一方加巴戟去心破故紙微炒赤石脂

煨革薛各壹兩

橘皮煎圓治小便利數每服三十圓温酒塩

湯下方見諸虛門

革薛圓 縮泉圓方並見嚴氏濟生續方

遺溺

秘元丹治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白菴骨三訶子十五去核○醫方大成縮

砂乙兩去皮○大成集成加靈

右爲末糯米粥圓梧桐子大每服五十圓

空心塩酒下油珍方承類鈴方玉機微義與大成同衛生易簡方與經

驗方同集

桑螵蛸散治小便日數十次如稠米泔色心

神恍惚瘦悴食減以女勞得之○醫方大成

治男子小便頻數如稠米泔色此由勞傷心

腎得之有服此藥不終劑而愈大能安神定

志

桑螵蛸

鹽水炙

遠志

去心

菖蒲

鹽炒

龜骨

人參

茯神

當歸

鱉甲

醋煮○大

成醋炙

右各等分

為末

每服

二錢

夜卧

人參湯調

醫方集成南北經驗方袖

下珍方玉機微義與大成同

澹軒方

夜起小便

夜間數起苦多漩益志和皮研碎煎更入小
揅通下部卧時熱服得安眠

小便不通

先平臍孔滿安塩次取葱根爛搗研捻餅蓋

塩燒艾炷熱才入腹自通漩

瓜蘘細末著些揅米飲濃調三二錢或搗用

螺帶泥殼塞於臍孔亦通漩

小便不通腹漲

葱白三寸須細剉熟炒帛包分兩個更番熨

却臍下溫數日停漩皆得過

大便不通

皂角除皮帶性燒研為細末蜜和調圓如梧

子三米湯服臟腑通流在壹朝

橘萸四兩和皮白神麩半兩微炒赤宿蒸餅

作梧子圓腸秘熟湯吞一百

根葱塊薑膏撮塩三十豆豉同爛研炒溫帛

繫臍中貼立見通流大小便

老人虛秘風秘

葱白一條湯煮濃阿膠三片化命熔食前溫

服壹盃許老人之秘皆可通

松柏并麻三子仁細研溶蠟和令勻圓如桐

子隨宜服湯使黃丹通若神

結糞不出

生姜削如小指許外著瓠梅納後部獨頭大

蒜煨去皮懸裏入之亦能愈

治小水不通

朴硝膏味以生絹帛包之放在臍心小時即

通

肘後方

治大便秘澁不通方

葛氏云大便不通方紙裏搥作三九如大指
內下部中

又方削蒺藜如指大以導下部中

又方煎蜜令極和薑末丸如指導下部

姚方療欲死方

穿猪膽膏頭內下部中倒寫之姚云療七

八日氣奔心欲死者須臾得通

又方大黃三兩芒消黃芩二兩梔子十四枚

甘草壹兩炙水三升煮取壹升八合內芒

消分三服亦療大腸秘結不通無芒消用

朴消亦可也

又有承氣丸療時行結熱不通胃中有乾糞

令人謬語方大黃芒消熬令沸各六分葶

藶五分杏仁五分並熬四物合搗蜜丸如

彈丸煮一枚內湯中盡服之不下須臾更

與壹服不過三服良

姚不得大便十日一月日方葵子三升以水

四升者取壹升去滓膏服不差更作之○
備預百要方卒寒支滿不通方葵子二研
水煮取汁頓服

斗門方治大便不通衛生易簡方治大用烏

白木方停壹寸來劈破以水易簡方煎取

小半盞服之立通不用多喫其功神聖兼

能取水易簡方

又陳藏器云取猪羊膽以葦筒著膽縛一頭
內下部入三寸灌之入腹立下

葛氏小品不通方熬塩熱熨小腹冷復易之

小品同○聖濟總錄治小便不通臍下急

痛脹悶欲絕塩熨方二右一味鑊中炒

令極熱布帛裏熨臍下以小便通快爲度

備預百要方小便澁小腹築實方熬塩布

裏熨之

又方猪脂大如雞子大內熱酒中服之姚云

療大便不通方壹作猪膽大如雞子者

又方以搗內莖孔中即通

又方葵子莖切壹升許以水四升煮取壹升
 內書中白魚壹枚研之服壹合日數過療
 小兒卒不得尿至效驗然西中如之救元
 又方末滑石水服壹七數過小品以水和塗
 小腹近陰云療熱結小則藥費大然然亦
 又方小便不通方車前草壹斤水三升煮取壹
 升半分三服小品同○聖濟總錄車前草
 半石壹味細剉用水七盞煎至四盞分溫
 三服即通

葛氏忍小便久致胞轉方自取爪甲燒飲服
 之○備預百要方取病人十指爪燒灰酒

服

又方亂髮三兩燒末之滑石屑二兩合和又
 生切桃白皮壹斤搗以水和絞取汁二升
 以服散方寸七日三至夕即愈○衛生易
 簡方治小便不出胞轉膨滿欲死者用髮
 灰二錢滑石末壹錢桃白皮煎湯調下日
 進二服大效

又方以蒲黃裹患人腎令頭至地三度即通
 又方取梁上土壹撮若蒲黃壹匕和服之並
 良
 小品小便不通方桑螵蛸三十枚黃芩一兩
 水壹升煮取四合頓服水味難即廿二日
 小便不利莖中痛欲死牛膝飲方亦療婦人
 血結腹堅痛方取牛膝一大把并葉無多
 少煮飲之立愈驗衛生易簡方一大握酒
 煮飲之立愈及治卒暴
 癥腹中石刺并婦人血結堅痛

圖經曰治小便不通臍下滿悶方聖濟總錄
 名海金沙

散海金沙壹兩臘而茶半兩二味擣碾

細每服三錢煎生姜甘草湯調下服無時

未通再服

外臺秘要 治小便不通數而微腫方取陳

久筆頭壹枚燒為灰和水服之

產書療小便不通及胞轉桑螵蛸搗末米飲

服方寸匕日三

產寶方治卒不得小便聖濟總錄
 杏人二七

枚去皮尖炒黃總錄細研米飲服之差

治卒關格大小便並不通方

葛氏療卒關格大小便並不通支滿欲死二

三日則煞人方以苦酒和硝塗腹上乾復

易

姚氏方芒消三兩紙裏三四重炭火燒之令

內壹升湯中盡服當先飲湯壹升已吐出

乃服之姚同欲死方

又方茱萸南枝斷取加手第二指中節含之

立下

姚氏云風寒冷氣入腹忽痛堅急如吹狀大

小便不通或小腹有氣結如升大脹起名

為關格病

又療大小便不利方苦參滑石貝齒三物分

等擣下篩壹匕飲服之煮葵根汁服之亦

弥佳下部不通烏梅五十枚衛生易簡方十介著

湯中漬須臾出核取肉擣之如彈丸易簡方如

棗者壹枚內下部即通

小品療小便不通及關格方取生土苽根搗
 取汁以少水解之筒中吹下部即通秘
 經驗方治大小便不通備預百要方小便不通
 法藥用白礬細研末令患人仰卧置礬末於
 臍中滿以新汲水滴之候患人覺冷透腹
 內即自然通如為會灸無臍孔即於元灸
 盤上用紙作環子籠灸盤高一指半已來
 著礬末在內仍依前法用水滴之○袖珍
 方用明礬末壹匙安臍中冷水滴濕須臾

通效

外臺秘要治大小腸不通搗葱白以酢封小
 腹上

澹寮方

秘結

五仁圓治大便澁秘可以常服

杏仁酒浸去皮尖麩炒令郁李仁湯浸去皮尖取

淨一兩酸棗仁湯浸去皮取栢子仁棟淨

細研大麻子仁晒焙令乾用板子盛油又用

則麻殼自脫揀未脫者
再磨取淨一兩細研

右五味再合研令極細以水浸蒸餅為圓

梧子大每服五十圓空心米飲吞下○永

類鈴方治津液枯竭大腸秘澁傳導艱難

杏仁去皮尖郁李人酸棗人炒栢子人炒麻

仁炒各一兩淨右為末糊元梧子大空心米飲

五十元

三和散治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇

肋腹脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足

微腫腸胃燥澁大便秘難雖年高氣弱並可
服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上攻
胃腹滿悶大便不通○醫方大成治七情之
氣結于五臟不能流通以致脾胃不和心腹
痞悶大便秘澁

大腹皮炙焦紫蘇葉用莖葉去枝梗沉香 宣木

瓜薄切羌活去蘆已上白朮炒芎藭大成三兩

木香 甘草炒陳皮去白檳榔麩裏煨熟去麩各三分

右麤末每服二錢水壹盞煎六分去滓温

藥類彙編

卷四

頁

五

服

醫方集成南北經驗方袖珍方與大成同

老人臟腑秘不可用大黃老人津液少所以臟腑秘澁更服大黃以瀉之津液皆去定須再秘甚於前只可服寬潤大腸之藥如養生必用方二仁圓是也更用槐花末煎湯淋洗亦妙又有一種風秘者當用檳榔七聖圓雖有大黃斟酌服之勿令瀉可也又有婦人產後大便秘須四五日六七日不通者出血已多津液少也濃煎紫蘇湯

飲一兩盞自通更一日不通服局方大麻

仁圓三十圓

醫餘

嘗見惠陽縣李奏院云其家曾有老婦人發熱而大腑多秘澀醫謂勞瘵用三因方青蒿梅桃枝等物取虫因其藥冷而大瀉一行醫視其所下非虫也惟得硬物壹截半寸許淋洗細觀乃藥圓鬪接而成也方知卽其居常所服震靈丹爾旣下之後熱亦隨退蓋老人脾胃虛弱者化不行不免爲

臟腑積熱積為熱理之必然此證既鮮醫
莫能識

便多

小便遺失

阿膠炒珠 牡蠣煨 鹿茸酒炙 桑螵蛸燕酒炙

集成酒浸

右細末純糯米糊圓醫方大成集成南北經驗方油珍方永類

鈴方如梧桐子 每叁五十粒空心塩酒吞下

衛生寶鑑

大便

犀角丸治三焦邪熱一切風氣又治風盛痰

實頭目重肢體拘急腸胃燥澀大小便難

犀角鎔末 黃連各一兩 人參二兩 大黃八兩 黑牽牛二兩

二十

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸至

二十九臨卧温水下量虛實加減

潤腸橘杏丸此二味降氣潤腸服之大腸自

無澀滯久服不損胃氣

杏人去皮尖橘皮等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九空心
溫水下

凡臟腑之秘不可壹槩治之有虛秘有實秘
胃實而秘者能食而小便赤當以麻仁丸七
宜升之類主之胃虛而秘者不能食而小便
清利宜以

厚朴湯

白木五兩厚朴薑製陳皮白去甘草炙各枳實炒

半夏麩各

右為粗末每服三錢水壹錢半姜三片棗
二箇煎至八分去粗大溫服食前夫胃
氣實者秘物也胃氣虛者秘氣也

蜜導煎陽明病自汗出若發汗小便自利此
為津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大
便宜蜜導煎而通之及土瓜根與猪膽汁
皆可為導蜜煎味熬欲凝丸如指大長二
寸頭銳內穀道中欲大便時去之○醫方

大成活人方蜜導法凡秘結壽域神方有字服藥不得通利者宜用此以導之若土瓜根及大猪膽汁皆可為導蜜四兩右置銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦熱時急捻作挺子如指許長投於穀道中以手按住大便來時乃去之醫方集驗南北經方袖珍方衛神效名方坐劑治大便久秘生易簡方同攻之不透者用之右用蜜不計多少慢火熬令作劑稀則粘手硬則脆稀稠得所堪

作劑搓作劑樣如棗核大麤如筋長壹寸許蘸小油內于肛門中坐良久自透有加鹽少許以素問鹹以軟之

胞瘰治小便不利并溺附

胞瘰者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上為清涕夫膀胱者為州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客於胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其證小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便以

足太陽經其直行者上交巔入絡腦下灌鼻

竅則清涕也治胞瘕小便不利腎著湯方見腰脚

門

茯苓丸治胞瘕臍腹痛小便不行

防風去蘆細辛去苗赤茯苓去皮白朮 附子聖濟

總錄炮裂澤瀉 官桂各半兩紫苑總錄去苗土

瓜蒌根玉機微義牛膝酒浸○總錄去苗切焙黃芪

總錄芍藥 甘草炙各三分山芋 生地黃

總錄半夏湯泡○總錄去滑炒獨活總錄去蘆頭山茱萸

各壹分

右十八味為末煉蜜丸如桐子大每服十

丸溫酒送下食前總錄每日空心溫酒下

數

巴戟丸治胞瘕臍腹痛小便不利

巴戟一兩半遠志去心○聖濟桑螵蛸炒

黑山芋 附子炮生地黃總錄焙別於續

斷各書杜仲炙○總錄去麩兔絲子酒浸

錄酒浸一石斛總錄去根鹿茸炙○總五味

子 竜骨 官桂 總錄去 麓皮 山茱萸 各二錢 〇總錄

各三分 玉機 微義各二分 肉蓯蓉 酒浸 壹兩 〇總錄去 皺皮 切焙

右十六味為末煉蜜丸如桐子大每服三

十九溫酒送下空心食前服之 總錄 日再

腎瀝湯治胞瘻小腹急小便不利

杜仲 炒去 絲 桑自皮 炒 犀角屑 木通 五

加皮 麥門冬 法 心 桔梗 各壹 赤芍藥 五

右八味粗末每服五錢水一錢半羊腎一

箇切竹瀝少許同煎溫服 玉機 義同

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽

乾口燥大渴引飲心忪面熱煩躁不寧目赤

睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小

便赤澁或癰閉不通及熱淋血淋並宜服之

藷麥 篇蓄 車前子 滑石 甘草 炙

山梔子仁 木通 大黃 麩裏煨去麩 切焙各壹斤

右為散每服二錢水壹盞入燈心煎至七

分去粗溫服食後臨臥小兒量力少少與

之

白花散 聖濟總錄 治膀胱有熱小便不通申

顯卿傳

朴硝 不以多少

右為末每服二錢用 衛生易簡 茴香湯 總錄

苗香 酒調下食前 總錄不拘時服如熱躁以蜜水調服

良法治小便不通諸藥不效或轉胞至死危

因此法用之小便自出而愈用猪尿胞壹

筒底頭出一小服子翎筒通過放在眼兒

內根底以細線繫定翎筒子口細杖子觀

定上用黃蠟封尿胞口吹滿氣七分繫定

了再用手捻定翎筒根頭放了黃蠟塞其

翎筒放在小便出裏頭放開翎筒根頭于

捻其氣透於裏小便即出大有神效 醫林方同

黃芩清肺湯治因肺燥而得之小便不通

黃芩 二錢 梔子 二介 擘破

右作壹服水壹盞半煎至七分去粗溫服

食後不利加鹽豉二十粒

滋陰化氣湯治因服熱藥過多小便不利或

臍下悶痛不可忍服諸藥不效者

黃連炒黃蘗炒甘草炙各等分

如晝不通者加知母炒至十分去山藥

右咬咀每服三錢水二錢煎至壹盞去粗

黃溫服食前治因熱山黃之小便不通

問此如何得利答曰無陽者陰無以生無陰

者陽無以化又云膀胱者津液之府氣化則

能出焉因服熱藥過度乃亡陰也二藥助陰

使氣得化故小便得以通也或以滋腎丸服

之其效更速

紅秫散治小便不通上喘張文叔傳大妙

篇蓄一兩燈草根一百紅秫黍根二兩

右咬咀每服五錢用河水二盞煎至七分

去粗熱服空心食前

葵花散治小便淋瀝經驗右以葵花根壹握

洗淨剉水煎五七沸服治小便淋瀝經驗

如神拔粹方同

淋痛治驗

參苓琥珀湯中統三年六月中黃明之小便淋葦中痛不可忍相引脇下痛制此服之大

效人參五分茯苓四分去皮川練子去核琥珀三分

生甘草錢一玄胡索七分澤瀉柴胡各三分當歸稍分

右九味咬明都作壹服用長流水三盞煎

至壹盞去粗溫服空心食前水芝丸治下焦真氣虛弱小便頻多日夜無

度此方得之於高麗國王

蓮實去皮不以多少先以好酒浸一二宿

用水煮熟取出將蓮實切開於火上焙乾秤用

右為末醋糊丸如雞頭大每服五十九溫

酒送下空心食前

小便數而欠

中書右丞合刺合孫病小便數而欠日夜約

去二十餘行臍腹脹滿腰脚沉重不得安卧

至元癸未季春下旬一奉

至元癸未季春下旬一奉

至元癸未季春下旬一奉

至元癸未季春下旬一奉

至元癸未季春下旬一奉

至元癸未季春下旬一奉

至元癸未季春下旬一奉

聖旨治之遂往診視脉得沉緩時時帶數嘗
記小便不利者有三不可一槩而論邪若津
液偏滲於腸胃大便泄瀉而小便澀少一也
宜分利而已若熱搏下焦津液則熱濕而不
行二也必滲泄則愈若脾胃氣澀不能通利
水道下輸膀胱而化者三也可順氣令施化
而出也今右丞平素膏粱濕熱內蓄不得施
化膀胱竅澀是以起數而見少也非滲泄分
利則不能快利遂處一方名曰茯苓琥珀湯

內經曰甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍腹
滿當須緩之泄之必以某分爲主是用茯苓
爲君滑石甘寒滑以利竅猪苓琥珀之淡以
滲泄而利水道故用三味爲臣脾惡濕濕氣
內蓄則脾氣不治益脾勝濕必用甘爲助故
以甘草白朮爲佐鹹入腎鹹味下泄爲陰澤
瀉之鹹以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津
液不行以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此爲
因用故以二物爲使煎用長流甘爛水使不

助其腎氣大作湯劑今直達於下而急速也

兩服減半旬日良愈

茯苓琥珀湯方

茯苓去皮琥珀去皮白朮各半澤瀉兩滑石七錢

木猪苓半兩甘草炙桂去皮各三錢

右八味為末每服五錢用長流甘爛水煎

賣蓋調下空心食前待少頃以姜餈壓之

醫方類聚卷之一百三十五