

大德重校聖濟總錄卷第六十七



諸氣門

諸氣

上氣

上氣胸脇支滿

上氣嘔吐

上氣腹脹

上氣喉中如水雞聲

短氣

冷氣

厥逆氣

陽厥

諸氣統論

論曰陰陽雖大未離乎氣故通天下一氣爾人生其間
大喜眈於陽大怒眈於陰一吐納一動靜何所逃哉與
氣流通而已故氣平則寧氣不平則病內經曰百病生
於氣喜則氣緩悲則氣消寒則氣收熱則氣泄恐則氣
下憂則氣亂勞則氣耗思則氣結怒則氣逆蓋榮衛通
利則氣舒而不迫此喜所以氣緩也神情慘悴則氣虧
而不全此悲所以氣消也經絡凝澀則氣積而不散此
寒所以氣收也腠理開通則氣升而汗出此熱所以氣
泄也精却上閉則氣還而不行此恐所以氣下也心多

愁慮則氣散而無歸此憂所以氣亂也內外煩動則氣喘而且汗此勞所以氣耗也身心有止則氣留而不行此思所以氣結也嗔恚傷甚則氣上而嘔血此怒所以氣逆也此九氣者證雖不同大槩診寸口脉伏胸中逆氣是諸氣上衝胸中故上氣面腫膊息其脉浮大不治上氣脉躁而喘者屬肺肺脹欲作風水發汗而愈脉洪則爲氣上脉虛寧伏匿者生牢強者死喘息低仰其脉滑手足溫者生濟而四末寒者死數者亦死譁形損也

諸氣

論曰內經云百病所生生於五藏肺之所主獨主於氣不足有餘蓋由虛實故所病不同其證亦異怒則氣逆甚則嘔血及食故氣逆也喜則氣和榮衛通利故氣緩也悲則心系急肺布葉舉使上焦不通榮衛不散熱氣在內故氣消也恐則精却精却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行而收聚也寒則膚腠閉拒氣道不行氣收而不散也熱則腠理開榮衛通故汗大泄也驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂勞則喘且汗外內皆越故氣耗思則心有所止氣留不行故氣結治寒氣熱氣愁氣怒氣驚氣思氣恚氣七氣方

大黃去黑 人參湯洗 半夏湯洗

吳茱萸湯洗 芫胡湯洗 乾薑湯洗

細辛去苗 桔梗湯洗 菖蒲湯洗

赤茯苓去黑 芎藭湯洗 甘草湯洗

石膏湯洗 桃人去皮尖雙 蜀椒去目并閉口

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

溫酒下三九日三漸加至十九一方加桂心半兩

治諸氣積聚堅牢心腹脹痛蜀椒丸方

蜀椒去目及閉口者 人參湯洗

半夏湯洗 菖蒲湯洗 芫胡湯洗

桂皮去黑 桃人去皮尖雙 乾薑湯洗

木香湯洗 吳茱萸湯洗 乾薑湯洗

細辛去苗 桔梗湯洗 赤茯苓去黑

芎藭湯洗 大黃湯洗

右一十五味搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧

桐子大每於食前以溫酒下十丸漸加至二十九

治一切氣并婦人血氣調胃氣化冷痰薑魏丸方

生薑湯洗 阿魏湯洗

黃湯洗 青橘皮湯洗 甘草湯洗

陳橘皮去白焙 當歸湯洗 白芷湯洗

胡椒

蓬莪茂剉

桂去麤皮

刀砂研為衣

木香

丁香各壹

石一十三味除丹砂外搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵為丸如櫻桃大丹砂為衣每服一丸生薑湯嚼下婦人醋湯下空心食前服

治一切虛冷氣腹脇脹滿胸膈滯悶嘔吐酸水不思飲食藏府滑泄臍腹疼痛均氣丸方

木香

胡椒

胡椒

乾薑炮

烏頭炮裂去

藿香子炒

草澄茄

青橘皮湯浸去

陳橘皮湯浸去

蓬莪茂剉

桂去麤皮

牽牛揀淨半斤炒搗羅取末肆兩餘者不用

右一十一味搗羅為末生薑自然汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸炒生薑鹽湯下不計時候

治一切氣飲食不消紅豆蔻丸方

紅豆蔻皮去

木香

縮沙人

檳榔剉

訶梨勒皮炮用

藿香葉各壹

陳橘皮去白炒

胡椒壹

草澄茄兩

藿香子兩半

右一十味搗羅為末以酒煮麩糊和丸如梧桐子大

每服十九空心食前生薑湯下

治一切氣逆胸膈痞悶中脘不快痰癖留滯嘔吐惡心

肢體倦怠可思食麝香丸方

麝香

研細

丹砂

研細

木香

厚朴

去麝皮生薑伍錢同搗炒乾

肉豆蔻

去殼各半兩

檳榔末

半夏湯洗柒偏去滑別搗末各貳兩

桂

去鹽皮參分

乳香

細研壹兩

丁香

壹分

右一十味除半夏末外搗研為細末再同研令勻將

半夏末以生薑自然汁同煮為膏和丸如梧桐子大

每服十五丸以陳橘皮湯下空心食前服

治一切氣消食木香丸方

木香

丹砂

研

硫黃

研

蘇頌砂

研各壹分

檳榔

剉半兩

肉豆蔻

人參一枚

半夏

紫水煮令透洗淨暴乾

巴豆

各壹兩去皮心膜爛研出

油薑薑子小更研下而為膏心研碎研煎煎

有八味搗研和勻水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服

二丸溫棗湯下大人小兒以意加減大黃發血散

治諸氣疾及產後氣疾桂心丸方

桂

去鹽皮

當歸

剉

赤芍藥

炒

延胡索

炒

芎藭

剉

生乾地黄

剉各壹兩

礪砂兩

芫花根

洗了碎到

米醋伍升

右九味先以醋煮芫花根三分減二去根入礪砂慢

火煎又減半下諸藥末和丸如雞頭大產後血運煩

悶童子小便煎赤馬通磨下一丸產後血敗腰脚腫

痛生薑童子小便磨下血氣衝心痛薄荷汁熱酒磨

下血氣腹脹及痛生地黃汁同熱酒磨下平常血氣

葱酒磨下

治一切滯氣引氣丸方

丹砂研

安息香研

麝香研

白芥子

參佰陸拾粒炒

大戟末

壹錢

牛黃

研半錢

牽牛末

壹錢

五靈脂

研

乳香

研

沒藥

研各壹兩

斑貓

貳拾頭足

去

巴豆

壹柒粒去皮研出油

右一十二味再研令勻用紅米飯為丸如大麻子大

臨時隨意湯使下之

治諸氣不調胸膈痞滯升降不勻藿香湯方

藿香葉

厚朴

去麤皮生薑汁炙香壹兩

青橘皮

湯浸去白

甘草

炙到各參分

桂

去麤皮半兩

乾薑

枇杷葉

炙去毛各壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗
三枚擘煎至七分去滓稍熱服

上氣

論曰人一日一夜凡一萬三千五百息呼隨陽出氣於
是升吸隨陰入氣於是降一升一降陰陽交通氣乃亨
融所謂上氣者蓋氣上而不下升而不降否滿膈中胸
背相引氣道奔迫喘息有聲者是也本於肺藏之虛復
感風邪肺脹葉舉諸藏氣又上衝而壅遏此所以有上
氣之候也

治上氣之急地黃煎方

生地黄升半

生薑升半

白蜜升

牛酥升半

杏仁湯去皮尖雙人

紫蘇子研令細

甘草炙剉壹兩半

貝母去心炒

赤茯苓去黑皮

紫苑去苗土洗焙

竹葉升半

右一十一味先搗後五味為細末以水四升半煎取
二升去滓入紫蘇子地黃汁生薑汁淨濾同白蜜中
酥銅器中重湯煎攪勿住手候如稀餈以乾器貯之
時含一匙細細嚥汁常令喉中藥氣不絕
治上氣及諸氣逆神驗白前湯方

白前去苗

半夏湯洗去滑生薑汁製切焙壹兩

紫苑去苗土焙乾參分

麻黃去根節壹兩

厚朴去麁皮塗生薑汁炙參度

乾焙

人參各參分

甘草炙到兩

桂去麁皮

杏人湯去皮尖雙入妙各參分

右九味麁搗篩每服五錢匕生薑半分拍碎棗二枚

學水二盞煎至一盞去滓溫服日三

治上氣脉沉澤漆湯方

澤漆去根半斤

半夏湯洗去滑生薑汁製焙乾

紫苑去苗土焙

白前去苗各參分

甘草炙

黃芩去心

桂去麁皮

人參各半兩

右八味麁搗篩每服五錢匕生薑半分拍碎水一

盞半煎至一盞去滓溫服日三

治上氣咽中不利欬冬花湯方

欬冬花去梗貳兩

麻黃去根節參兩

五味子炒

半夏

湯洗去滑生薑汁製焙乾各貳兩

紫苑去苗土

細辛去苗葉各壹兩

射干貳兩

正和子煎

右七味麁搗篩每服三錢匕生薑半分切棗二枚擘

水一盞煎至七分去滓溫服日三夜一

治上氣喘急訶梨勒湯方欬冬花一盞入生薑三兩煎

訶梨勒皮兩

五味子炒壹兩

麻黃去節

杏人湯浸去皮尖雙

甘草炙剉

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片煎

至六分去滓熟服不計時候

治上氣不得息喉咽不利沃雪湯方半合

麻黃去根節

細辛去苗葉

五味子微炒

桂去盡皮

半夏湯洗去滑生薑土

右五味麤搗篩每服三錢匕生薑一棗大拍破水一

盞半煎至七分去滓溫服日三

治上氣倚息不得卧葦撥丸方

葦撥

昆布洗炒

吳茱萸湯洗焙

葶藶隔紙炒

杏仁湯去皮尖雙入

右五味先搗前四味羅為細末與杏仁同研令勻鍊

蜜和丸如梧桐子大空腹粥飲下五九稍加至十丸

治上氣喘急馬兜零散方

馬兜零根兩

木香

棟實微炮各

右三味搗羅為散每服二錢匕漫煎烏梅蜜湯調下

食後臨卧服

治積年上氣服藥不差旋復花丸方

旋復花去梗焙

皂莢炙去皮子 大黃剉炒

右三味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸

客則氣收聚故肺葉舉而上焦不通令上氣奔迫否滿
支乘於胸脇也

治上氣胸滿喘息氣絕痰水盛溢厚朴枳殼湯方

厚朴去麩皮全 枳殼去麩炒 甘草炙到各

秦艽去苗土 陳橘皮湯浸去白

治上半夏湯洗去滑生薑 桂去麩

合麻黃去根 杏仁湯去皮尖 黃芩去黑

石石膏碎 赤茯苓去黑 細辛去苗葉

大戟去苗剉

右一十四味鑊搗篩每服三錢匕生薑三錢大棗二

枚擘破水一盞煎至七分去滓溫服日三

治上氣兩脇滿急杏仁丸方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒 赤茯苓去黑 防葵各貳

吳茱萸湯洗焙 陳橘皮湯去白 桂去麩

防風去 白木與酸

射干 芍藥 紫蘇子微

桔梗去盡 枳實去麩炒

右一十四味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大溫

酒服十九日二加至三十丸

治上氣胸滿晝夜不得臥半夏丸方

半夏湯洗去滑生薑汁製焙乾

芎藭各半兩

蜀椒炒出汗及閉口者

附子炮裂去皮臍

貝母微炒桑根白皮剉碎

欵冬花去枝梗焙

細辛各半兩

紫苑去苗土焙壹兩

乾薑炮裂半兩

鍾乳研壹兩

杏人湯浸去皮尖雙人研細半兩

右一十二味先將前十味搗羅為細末與鍾乳杏人

同研令勻鍊蜜丸如梧桐子大每服三九至五九粥

飲下日三服不拘時候

治上氣五藏閉塞不得飲食胸脇支脹乍來乍去虛氣

在心滯氣在胃脘乾口燥肢體動搖手足冷疼夢寐恐

怖此五藏虛乏不足所致此胡當歸湯方

茈胡去苗肆兩

當歸切焙壹兩

細辛去苗葉半兩

防風去叉壹兩

麻黃去根節壹兩

桂去麤皮壹兩

半夏湯洗去滑生薑汁製焙乾貳兩半

人參半兩

黃耆兩壹

黃芩去黑心半兩

杏人湯退去皮尖雙入炒貳拾

伍枚

右一十一味搗篩每服三錢匕生薑一棗大拍碎

棗二枚擘水一盞煎至七分去滓溫服日三

治上氣胸膈噎塞兩脇痞滿利痛消積氣止吐逆定欬

嗽進飲食丁香丸方

丁香 伍拾枚

芫花 醋拌炒

甘遂 炒

大戟 去苗

紫苑 去苗土

白牽牛子 微炒取粉半兩

附子 炮裂去皮臍壹分

巴豆 伍拾枚去皮心膜醋煮黃色研

硃砂

膩粉 各壹錢研

右一十味搗研為細末拌和令勻煮棗肉和丸如雞

頭大每服一九嚼棗一枚同藥乾嚥

調順正氣消腹脇脹滿利胸膈木香丸方

木香

檳榔 剉

肉豆蔻 人

大黃 煨剉

牽牛子 生搗取粉用

郁李人 湯去皮各壹兩

續隨子 去殼

木通 剉

胡椒 各半兩

右九味搗羅為細末鍊蜜和丸如豌豆大食後生薑

湯下五丸至七丸

利胸膈行滯氣消脹滿藥腹脇痛降氣丸方

懷香子 微炒

木香

桂 去麩皮

檳榔 剉

桃人 湯去皮尖雙人研各壹兩

萊菔子

京三稜 煨剉

青橘皮 湯去白焙各參分

厚朴 去麩皮生薑汁炙香熟壹兩

右九味搗羅為細末拌勻酒煮麩糊和丸如梧桐子

大空心鹽酒下二十九至三十九生薑湯下亦得

治胸滿上氣昆布丸方

昆布洗炙乾 大黃剉炒 苦瓠子炒

葶藶子炒令紫 海藻洗去鹹炒 木通剉碎

消石研 水銀研各 桃人湯退去皮尖

右九味先將前六味搗羅為末後與消石水銀桃人

拌和令勻鍊蜜丸梧桐子大食後良久粥飲下三九

日再服

治上氣利胸膈消脹滿檳榔湯方

檳榔剉 木香兩 陳橘皮湯浸去

青橘皮湯浸去 白朮各 京三稜煨

蓬莪茂剉 枳殼去瓤

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞生薑三片鹽少

許煎至一盞去滓稍熱服不計時

治上氣腹脇脹滿利胸膈順三焦烏藥煮散方

烏藥剉 沉香剉 陳橘皮湯去

甘草炙剉 乾薑炮裂 檳榔剉

右六味搗羅為細散每服三錢匕水一盞入生薑一

小塊拍破同煎至六分和滓熱服或入鹽少許沸湯

點服亦得

治上氣胸脇滿不下食嘔逆胸中冷栝樓湯方

栝樓 陳橘皮湯去白

當歸剉焙 參兩 半夏湯洗 桑白皮生薑 汁製 壹兩 半

右四味剉如麻豆大每服五錢匕生薑一棗大拍碎

水二盞煎至一盞去滓溫服日三

治上氣胸脇支滿麻黃石膏湯方麻黃一斤石膏一斤

麻黃去根節 石膏鑿淨者別厚朴去麤皮塗生

半兩兩 杏仁湯去皮尖雙 兩

右四味麤霽篩每服五錢匕入小麥半合水三盞煎

至一盞去滓溫服日三

治胸脇逆滿脹渴茯苓湯方

赤茯苓壹兩 皮人參 兩

右二味麤搗篩以水三盞煎取一盞半去滓分溫三

服

治肺氣喘息不安胸滿土氣人參飲方人參

人參兩 葶藶子隔紙 麻黃去節

木通剉 桑根白皮剉 桔梗炒

紫苑去苗 款冬花去心 甘草錢 各分

赤茯苓去黑皮 烏梅柒 取肉

右一十一味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取

八分去滓空心頓服要通轉下痰併煎服之

治久患上氣胸脇支滿厚朴溫肺散方

厚朴去麩皮用糯米粥浸壹炊飯久暴乾為末壹兩半 葶藶子微炒搗為細末壹兩

皂莢子壹升不蛀者蒸兩遍焙乾為末 接骨草陰乾為末參兩

訶梨勒煨取皮半兩為末 右五味同研為散每日空心以生薑蜜湯調下兩錢

七晚飯後再服若遠行鍊蜜為丸如彈子大含化一

丸

上氣嘔吐

論曰上氣嘔吐者氣上而不下肺胃虛也肺脉起於中焦環循胃口寒氣乘於肺則上氣喘滿升降不利痰飲停積中焦氣動於胃胃氣逆則嘔吐

治上氣嘔吐胸滿喘息不利紫蘇子湯方

紫蘇子食入 半夏湯洗柒遍去滑焙 五味子

青橘皮湯浸去白焙 杏仁湯浸去皮尖雙入麩炒

桂去麩皮 赤茯苓 甘草炙各半兩

右八味麩篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

切同煎取七分去滓溫服不拘時候

治肺胃有寒上氣嘔吐胸滿不食胡椒丸方

胡椒 藜撥 白朮

赤茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白焙 甘草炙

紫苑去苗土各壹兩 桂皮去麩 訶梨勒煨去

人參 各二兩 款冬花 乾薑 炮裂各半兩

右二十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九生薑橘皮湯下不拘時候日三服

治上氣食即吐逆七氣湯方

草豆蔻 生用 人參 赤茯苓 去黑皮

白朮 和皮剉 大腹 生用 訶梨勒 煨去核各半兩

甘草 炙壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不思食入生薑煎服

治氣逆食則嘔吐半夏湯方

半夏 湯洗采偏去滑切焙 生薑 陳橘皮 湯浸去瓢焙各貳兩

桂 去麤皮壹兩

右四味咬咀分作二劑每劑水五盞煎取二盞去滓

分溫三服空腹飲之

治上氣痰壅嘔吐訶梨勒湯方

訶梨勒 煨去核貳兩 半夏 湯洗采偏去滑焙參分

赤茯苓 去黑皮 陳橘皮 湯浸去白焙各壹兩

甘草 炙剉半兩 人參 參分 前胡 去蘆頭壹兩

杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒黃壹兩半

檳榔 剉 紫蘇莖葉 各壹兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半人生薑五片棗三枚擘破同煎至七分去滓不計時溫服

治上氣嘔吐不止芫花散方

芫花壹兩 醋炒

肉豆蔻去殼 壹兩

檳榔壹枚 各

右三味搗羅為細散每服一錢匕煨葱白一寸溫酒

調下

治上氣嘔逆不食半夏湯方

半夏湯洗 柒遍 去滑 壹兩 乾桑葉陸兩

乾薑炮壹兩 去乾

右三味麤搗篩每服三錢匕入生薑五片漿水一盞煎至六分去滓稍熱服不計時候

治上氣嘔吐不能下食半夏湯方

半夏湯洗 柒遍 去滑 壹兩

白朮半兩 壹兩

人參壹兩 桂皮去麤

甘草壹兩

陳橘皮湯浸 去白 焙 參半兩

厚朴去麤皮 塗生薑汁 炙令香

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半人生薑五片

棗三枚擘破煎至七分去滓溫服日三

治上氣嘔吐芥子丸方

芥子伍兩

右一味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服七丸寅時

并華水下亦可作散空腹酒服

治上氣嘔逆及踈利過多虛氣上攻壓氣散方

木香世又子共人參 白茯苓去黑皮

藜蘆香葉煎至陳橘皮湯浸去枳殼去瓢炒

甘草炙附子去皮臍 煎紫蘇木瓜生薑湯

右八味搗羅為散每服二錢匕煎服

調再入銀盞重湯煎五七沸温服

治上氣嘔吐或胸中痰飲停積嘔吐人參散方

人參 白朮剉炒各 白茯苓去黑皮

甘草炙 乾薑炮各 粟米合

右六味搗羅為散每服二錢匕用竹筴生薑煎湯調

下一 上氣腹脹

論曰上氣腹脹者由肺氣上逆胸中否塞腹內虛脹妨

害飲食由穀氣衰少陰濕交攻干連腹膜膨悶不消故

上氣而腹脹也

治上氣腹脹踈氣丸方

大黃剉炒壹兩半 郁李人去皮尖 枳殼去瓢炒半兩

羌活去蘆頭半兩 木香壹分 青橘皮湯浸去白

檳榔炮剉 芎藭半 檀香剉壹分

陳橘皮湯浸去白

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十

丸生薑湯下食後臨臥服每服三十丸

治上氣心腹脹滿不能飲食人參龍甲湯方

人參去裙襖 龍甲去裙襖 知母焙各壹兩貳錢

訶梨勒皮壹兩 芍藥參分 青橘皮湯浸去白半兩

大腹剉 檳榔剉各參分 芫花剉 芫花剉 芫花剉

茯苓去木 當歸切焙各壹兩 甘草兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一聚

大切煎至七分去滓溫服不拘時

治上氣脾胃虛弱心腹疼痛脇肋脹滿或時便泄建脾

豆蔻丸方

白豆蔻人參分 枳殼去炒 陳橘皮湯浸去白

訶梨勒煨取皮壹兩 桂去麤皮壹兩 當歸切焙參分

乾薑炮裂半兩 丹砂細研壹兩

右八味搗研為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十

丸至三十九煎生薑橘皮湯下空心食前服

治上氣喘痞脹滿氣促固氣湯方

烏藥剉 沉香 赤茯苓去黑皮

麥蘖炒 枳殼去炒 黃耆剉

木香

甘草炙各貳兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑少許同煎七分去滓溫服不拘時服

治上氣腹脹脾胃不和心胸滿悶茯苓丸方

白茯苓去黑皮

肉豆蔻人炮

人參

白朮各壹兩

乾薑炮壹兩半

桂去麤皮

訶梨勒

炮去核各半兩

甘草

炙貳錢

右八味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九生薑湯下食前服

治上氣胸膈不利心腹膨脹飲食不消木香散方

木香

藜香子炒

芍藥

乾薑

甘草

青橘皮

湯浸去白焙

并

烏藥對各等分

右七味搗羅為散每服一錢匕炒薑鹽湯調下婦人

當歸酒調下

治上氣胸滿腹脹精神倦怠沉香丸方

沉香剉

丁香

木香

各半兩

巴豆

柴枚去皮鐵條子穿燒灰研

杏仁

柴枚去皮燒灰研

右五味搗研為細末糯米粥和丸菴豆大每服三九至五丸生薑湯下不拘時服

治上氣腹脹半夏生薑湯方

半夏湯洗去滑米

生薑半斤

人參半斤

陳橘皮

湯浸去白

焙參兩

右四味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至入

分去滓溫服不計時候

治上氣心腹脹滿人參湯方

人參

甘草炙

陳橘皮湯浸去白

右三味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入大棗

三枚擘破煎至八分去滓溫服如覺心悶即加白茯苓

一分

治上氣心腹脹滿嘔逆痰唾雞舌香丸方

雞舌香

沉香剉

木香

檳榔剉

白朮

丁香各壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙半兩

丹砂細研壹兩半

人參分

當歸切焙半兩

芍藥

枳殼去瓤炒

甘草炙

右一十三味搗研為細末拌和令勻鍊蜜和丸櫻桃

大每服一九細嚼生薑鹽湯下空心食前服

治氣上逆胸膈痞塞飲食不下及積氣心腹脹滿大腸

虛秘通氣湯方

華撥

連皮大腹壹兩沉香剉

草豆蔻皮去

木香

乾薑炮

訶梨勒核去

甘草炙

青橘皮去白焙炒

桂皮去麤

枳殼去麤炒

桃人去皮尖雙炒黃

檳榔剉各半兩

右一十三味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服

治冷氣呼吸短乏脇肋刺痛皮急寒戰心腹脹滿疼痛
食飲不消藥鹽煎方

木香

厚朴去麤皮生薑汁炙蒼朮米泔浸洗切焙

大腹皮

枳殼去麤炒

芍藥去苗

訶梨勒皮

白檳榔

陳橘皮去白焙各壹兩

右九味並細剉共用水一斗煎取三升瀝去滓入鹽

花二斤文武火煎汁盡如紅雪法收之每用半錢匕

錢匕水一盞生薑三片同煎七分溫服不可日再服

上氣喉中如水雞聲

論曰肺主氣上通於喉嚨肺經客寒則喉嚨不利痰唾

凝結氣道奔迫喘息有聲聲如水雞貝母去心

治上氣欬喉中作聲坐臥不得半夏丸方各壹分

半夏湯浸去滑生薑汁製切焙

紫苑去苗

桑根白皮剉各兩 欵冬花

射干去苗

陳橘皮湯浸去 百部不計半夏 五味子各分

細辛去苗葉 赤茯苓去黑皮 貝母炒去心

皂莢酥炙黃分 杏仁湯浸去皮尖 射干不計半夏

右一十三味搗羅為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐

子大每服三十九食後煎燈心生薑棗湯下日再服

治欵逆上氣胸中痞塞臥不安席咽中如水鷄聲投杯

湯方

欵冬花 甘草炙剉各

桂皮去白粉

麻黃去節各 乾薑炮參

紫苑去苗

細辛去苗葉 半夏生薑汁浸壹宿

杏仁湯浸去皮尖

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入大棗五枚

去核同煎至八分去滓溫服日再服訖卧令汗出數

日內勿飽食

治欵而上氣喉中如水雞聲射干湯方

射干去苗 麻黃去節 細辛去苗葉

五味子炒 紫苑去苗 半夏湯洗蒸乾各

生乾地黄焙 欵冬花參

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞半入大棗三枚

去核同煎至八分去滓溫服日三

治上氣胸滿喉中不利如水鷄聲其脉浮者厚朴石膏

湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙伍兩

石膏碎壹兩

麻黃去節肆兩 杏仁湯浸去皮尖雙入炒肆兩

細辛去苗 半夏湯洗柒遍生薑製炒乾

乾薑炮各貳兩 五味子貳兩半炒

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞更用水研小麥

取汁一小盞同煎至一盞去滓溫服日三

治上氣呀嗽喉中如水鷄聲前胡丸方

前胡去苗壹兩 葶藶隔紙炒紫 巴豆去皮心研

大黃剉炒壹兩壹分 甘遂炒 墨炙各半兩

右六味除葶藶巴豆外搗羅為末再研勻鍊蜜和丸

如梧桐子大每日空腹粥飲下三丸吐利痰涎為度

若吐利多即減丸數三日一服水一盞半煎至八分

治欬逆喉中如水鷄聲貝母湯方

貝母去心炒 麻黃去節 桂去麤皮

半夏湯洗柒遍生薑汁製炒乾 乾薑炮各壹兩

甘草微炙

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服日三黃連三黃連三黃連水一盞煎至六分去滓

治上氣脉浮欬逆喉中如水雞聲喘息不通呼吸狀甚

危者麻黃湯方麻黃湯方

麻黃去節煮掠去沫焙捌兩 甘草微炙

大棗參拾枚 射干兩

右四味咬咀每服五錢匕并華水一盞半煎至八分

去滓溫服日三夜一黃連三黃連三黃連水一盞煎至六分去滓

治久逆上氣胸滿喉中如水雞聲小投杯湯方厚朴

麻黃去節 厚朴去麩皮生薑

石膏碎 杏仁湯浸去皮尖

右四味咬咀每服五錢匕水一盞半先入小麥半合

煎候小麥熟即去麥入藥末煎至八分去滓溫服日

三夜一欬嗽甚者加五味子半夏各三兩乾薑二兩

短氣

論曰短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短氣不能卧其

形如腫者欬也短氣上喘氣道促急者肺虛而寒邪實

也如是者不可槩而論之

治上氣欬逆喘息短氣蜀椒方蜀椒

蜀椒去目及閉口者 麥門冬焙

甘草伍兩 遠志心 桂去

細辛去苗葉各參兩 附子炮裂去皮 人參兩

乾薑炮貳兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸食

前含化細嚥之喉中胸中當熱藥力稍盡更進一丸

日三夜二服

治氣虛胸膈中寒熱短氣不足紫蘇五味子湯方其

紫蘇莖葉貳兩

五味子壹兩 甘草貳分

前胡去蘆頭壹兩

陳橘皮湯浸去白焙 桂去麩皮各參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑棗

大拍碎棗二枚煎至八分去滓溫服日三小麥半合

治上氣咽喉窒塞短氣不得卧腰背痛胸滿不得食面色萎黃貝母湯方

貝母壹兩

桂去麩皮

麻黃去根節

石膏

甘草炙各貳兩

杏仁湯退去皮尖雙入炒參拾

半夏湯洗柒偏去滑焙貳兩半

右七味咬咀如麻子大每服五錢匕水一盞半入生

薑五片煎至八分去滓溫服日三

治短氣不足理氣丸方

杏仁湯浸去皮尖雙入炒 桂去麩皮各壹兩

益智炒去皮

乾薑炮裂各貳兩

右四味除杏人研外搗羅為末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空心食前生薑湯下

治短氣薑麥湯方

生薑兩切參

小麥合參

右二味以水五盞煎至三盞分作兩劑去滓溫服良久再服

治卒短氣紫蘇湯方

紫蘇莖葉兩剉

陳橘皮湯浸去白焙半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕棗二枚擘破酒一盞煎至七分去滓溫服日三

治卒短氣枸杞湯方

枸杞

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大切碎煎至七分去滓溫服日三

治氣極喘甚短乏不欲食口燥咽乾竹葉湯方

竹葉

麥門冬去心

小麥

生地黄各貳兩

麻黃去根節壹兩

甘草炙半兩

石膏貳兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞入生薑五大片大棗三枚擘破同煎至一盞去滓溫服不拘

時日夜共三服

治肺實胸中短氣上焦壅滯不思飲食五味子湯方

五味子壹兩

木香半兩

訶梨勒皮兩壹

甘草各半兩

前胡去蘆頭

陳橘皮湯浸去白

桂皮去麤皮

半夏湯洗各參分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一塊

拍碎棗二枚擘破煎至八分去滓溫服日三

治肺胃氣虛觸冒風寒短氣喘促眠睡不得欬氣秘效

丸方

苦葶藶貳兩紙襯炒紫色別研為細末

桑根白皮炙黃剉

馬兜零根去土壹兩麻黃去根節壹分

右四味除葶藶外搗羅為末入葶藶研拌令勻煮棗

肉為丸如梧桐子大每服二十九煎阿膠皂子湯下

食後臨臥服

治胸脇短氣妨悶不下食赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

人參去蘆前胡去蘆

桂去蘆皮各參分

半夏湯洗各參分芩胡去苗各

甘草炙剉壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘破生

薑五片煎取七分去滓溫服食後

治胸脇短氣妨悶不下食木香丸方

木香

青橘皮湯浸去

陳麩炒

訶梨勒核

煨去核

麥蘖炒各

萊菔子鹽分

蕪荑炒參分

右七味搗羅為末鍊蜜如丸和梧桐子大每服二十

九生薑湯下

治胸脇短氣妨悶不下食陳橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙

芫胡去苗各

半夏湯洗柒

枳殼去瓢炒

訶梨勒皮各參分

木香

升麻

五味子各半兩

右八味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

五片煎取七分去滓溫服

冷氣

論曰冷氣者因寒冷搏於氣所為也肺主氣氣之行如

水流不得息得溫即通值冷則澀若人呼吸少氣脇肋

刺痛皮膚拘急惡寒戰慄百節痠疼欬嗽聲嘶膈脘充

塞者冷氣之為病也

治一切冷氣兩脇脹滿背膊拘急疼痛飲食減少噎塞

不通真氣虛弱精神昏暗困倦少力沉香丸方

沉香剉

乾薑炮

羌活去蘆

棟實剉

木香

甘草炙

肉豆蔻去殼

訶梨勒皮

延胡索

肉蓯蓉酒浸切焙

芎藭

當歸焙

蓬莪茂剉煨

懷香子炒

烏頭生去皮臍

天麻

人參各壹兩

丁香大者

白檀香剉各半兩

青橘皮去白焙

附子炮裂去臍

桂去蟲皮

巴戟天去心

牛膝酒浸切焙各壹兩半

蒺藜子炒去角貳兩 丹砂研壹兩

右二十六味搗羅二十五味為末入丹砂再同研勻

鍊蜜和丸如雞頭大每服一丸煨生薑橘皮湯嚼下

空心食前各一服溫酒下亦可

治久積冷氣發歇疼痛兩脇脹滿飲食不進四肢怠墮

手足無力礪砂煎丸方

礪砂去石研貳兩

阿魏研壹分

陳麴炒壹兩別為末

訶梨勒皮

附子炮裂去臍

青橘皮去白焙

白芥子

藿香子炒

檳榔剉

丁香

華撥各半兩

木香參

右一十二味搗羅九味為末以好酒一升先入礪砂

煎沸次入阿魏同煎五七沸候冷以綿濾去滓入神

麴末攪勻慢火熬成膏將九味藥末和搗二三百杵

九如梧桐子大每服十九至十五丸食前温酒下生薑湯亦得

治一切冷氣及一切傷滯等礞砂丁香丸方

礞砂膏分去石醋貳 蓬莪茂煨

京三稜煨 棟實取肉 檳榔剉

硫黃研各半兩 巴豆取粒去皮 丁香

沉香剉 木香剉 丁香

懷香子炒各壹兩

右一十一味搗研一十味為末入礞砂膏內熬乾搗成劑旋丸如菽豆大每服七丸醋湯下婦人當歸酒

下食傷茶下酒傷温酒下

治冷氣上逆霍亂吐利心腹撮痛吞酸脹滿不欲飲食

温胃調中人参湯方

人參貳兩 檳榔剉 草澄茄

芎藭 甘草炙 白檀香剉

木香 陳橘皮湯浸去白焙

山芋貳兩 半夏湯洗去滑焙壹兩

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑五片煎

至七分去滓空心食前温服

治久積冷氣去痞滿調藏府通秘澀進飲食木香大腹

凡方

木香

檳榔

丁香

桂去麤皮

大腹剉

陳橘皮湯浸去白

牽牛子炒熟

吳茱萸湯洗

訶梨勒皮各半

右九味搗羅為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服

二十九食前生薑湯下

治中寒冷氣臍腹刺痛脹滿便利醋心嘔逆白豆蔻散

方

白豆蔻去皮

厚朴去麤皮

莎草根炒去毛

甘草炙

縮沙蜜皮

青橘皮湯洗去

陳橘皮湯浸去

丁香各半

木香參

右九味搗羅為散每服二錢匕生薑二片鹽少許沸

湯點食前服

治冷氣心腹滿脹臍腹撮痛吐逆泄瀉烏頭湯方

烏頭生用

蒼木剉

右二味水浸七日刮去皮焙乾麤搗篩每服二錢匕

水一盞生薑二片棗二枚擘煎至七分去滓熱服

治心腹冷氣疔刺疼痛丁香煎丸方

丁香

沉香

華澄茄

木香

肉豆蔻

檳榔

懷香子炒

棟實去殼

高良薑

桂去蟲皮

當歸切

蓬莪茂煨切各兩

右一十二味搗羅為末用附子烏頭炮裂去皮臍各

二兩別搗為末米醋五升浸硝砂一兩經宿澄去砂

石以此酒煮附子烏頭末為糊和前件藥末搗三五

百杵成劑丸如彈子大每服一丸細嚼丈夫炒生薑

鹽湯下婦人炒生薑醋湯下有孕不可服

治一切冷氣攻刺疼痛心腹脹滿十味理中丸方

阿魏量分醋化去砂石麩和作餅炙

京三稜煨切

蓬莪茂煨

青橘皮湯浸去白煨甘草炙

陳橘皮湯浸去白煨乾薑炮

乾木瓜切

桂去蟲皮

白朮各壹兩半

右一十味搗羅為末薄麩糊丸如櫻桃大丹砂末為衣每服一丸煎生薑木瓜鹽湯嚥下婦人炒當歸生

鹽湯下

治一切冷氣心腹疼痛嘔逆厥冷正氣丸方

阿魏醋化去砂石麩和作餅炙

附子炮裂去皮臍

菖蒲米泔浸壹宿焙

硫黃研各壹兩半

木香

檳榔剉

白朮

訶梨勒皮各壹兩

乾薑炮半兩

桃人去皮尖雙當歸切焙

厚朴去蘊皮薑汁炙各半分

右一十二味搗羅十味為末與硫黃桃人和勻麵糊

丸如梧桐子大每服十九溫酒或鹽湯下婦人醋湯

下並空心食前服

治諸冷氣胸膈不利噎塞喘悶呼吸少氣惡寒戰慄腹

脇膨脹人參丸方

人參

白茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白焙

積榔剉

白朮

甘草剉

訶梨勒炮取皮各壹兩

厚朴去蘊皮生薑汁炙

乾薑炮各貳兩

右一十味杵羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十九嚼破煎生薑湯下食前服

厥逆氣

論曰字書謂上實下虛外實內虛氣欠而逆者厥也所

謂厥逆氣者以陰氣盛實上乘於陽陽虛於下衛氣厥

逆不能周流和順故其證在內則氣逆上行在外則背

寒肢冷陰盛於上故也

治氣逆攻衝肩膊拘急或脇肋脹滿大便秘澀手臂頭

面浮腫欬氣丸方

木香

陳橘皮湯浸去白切焙 枳殼去麩炒

郁李人麩炒去皮 各參分

吳茱萸湯洗去泥 各參分

桃人去皮尖雙入 麩炒壹兩

京三稜煨剉壹兩半

桂去麩皮 兩半

檳榔剉壹兩半

赤芍藥

赤茯苓去黑皮 各壹兩 黑牽牛伍兩揀淨搗羅 取末貳兩半

右一十二味為細末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九

空心溫酒下生薑湯亦得

治氣虛手足厥逆三焦不順澤瀉湯方

澤瀉

細辛去苗

續斷

秦艽去苗

山芋

黃耆剉各壹兩

防風去

五味子

生薑切焙各壹兩半

右九味麩搗篩每服三錢匕水一盞棗一枚去核同

煎至七分去滓空心臨臥各一服

治氣逆不調不思飲食寬胸膈消脹滿丁香散方

丁香

白朮

藿香葉

丁香皮各壹兩

京三稜煨貳兩

白檀香剉

烏藥剉各壹兩

甘草炙半兩

右八味為細散每服二錢匕食前沸湯點服

治氣逆往來喘急噎悶沉香枳殼散方

沉香壹兩

枳殼去瓢麩炒

前胡去蘆頭各參分

烏藥剉半兩

木香

檳榔剉

人參

甘草炙各壹分

右八味為細散每服二錢匕入生薑二片鹽少許沸湯煎服不拘時

治氣逆上盛頭目昏眩不思飲食時發惡心或作中滿調中順氣消痰利膈藿香湯方

藿香葉

白朮各貳兩

人參

白茯苓去黑皮各壹兩丁香

甘草炙各兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至七分去滓溫服不計時

治氣逆上衝吐逆不止冷痰壅滯開胃進食豆蔻丸

肉豆蔻大者去殼貳枚桂皮去麤皮

青橘皮湯浸去白

附子炮裂去皮臍各半兩半夏湯洗柒遍麤炒黃色乾薑炮各壹兩

右六味為細末生薑自然汁煮麩糊丸梧桐子大每服十九空心食前生薑湯下

治氣逆膈氣胸中痰結飲食不下木香散方

木香兩青橘皮湯浸去白

白豆蔻去皮參分郁李人湯浸去皮微炒別研成膏貳兩

右四味除郁李人外三味為細末和研令勻每服二錢匕煎椒湯調下空心食前服

治氣逆心腹膨脹乾嘔不止手足厥冷橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白

生薑切焙

縮沙人

甘草炙

白芷各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服口乾加牛乳少許同煎

治胸中氣逆時復疼痛枳實散方

枳實去穢

桂去麤皮

木香切

右二味爲細散每服二錢匕不計時熱酒調下

治心胸氣逆刺痛不可俛仰氣促欬睡不下食陳橘皮

湯方

陳橘皮湯浸去白木香

芍藥白

當歸切

檳榔各半

桔梗炒

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

三片煎取八分去滓溫服

陽厥

論曰內經曰有病怒狂者生於陽也陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥夫陰陽不可偏勝偏勝則氣逆陽厥者陽勝而氣逆之謂也蓋陽氣暴折則鬱而不散故多怒而狂怒則氣上故頸脈動而大疾者爲陽厥之證也其治奪食卽已蓋食入於陰長氣於陽陽盛故厥逆怒狂奪食者所以平其氣也

治陽厥善怒除煩下氣鐵落飲方

鐵落漿是藥皂鐵

右一味每服用重湯內溫一盞飲之食後

治陽氣厥逆多怒而狂頸脉復動赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 人參

羚羊角鎊各

遠志心

大黃剉炒各

甘草炙

右六味廔搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去

滓溫服不計時候

治陽厥多怒狂躁不安上攻頭頸竹瀝石膏湯方

竹瀝煨

石膏壹兩

赤茯苓去黑皮

大梔子人 式升 升麻不 枳實各 二劑漸減至

生地黃蒸 葛根末 知母各 林連百 不式 枳實附 干

右本味除竹瀝外剉如麻豆每服五錢七水一盞半

人生薑五片同煎至一盞去滓入竹瀝爭冷再煎三

沸溫服食後臨臥日三服兩 代煎

治陽厥氣逆胸膈煩悶忿忿饑怒如發狂狀竹葉茯苓

湯方煎 粗麻葉 濕姜末 公雞心 鹿角末 琥珀末 鹿角末 鹿角末

鮮淡竹葉體

赤茯苓去黑皮 生地黃升

丹參至一 蓋半 玄參各 枳實半 乾薑三 煎服不

白軍前草格 枳石膏兩 附子六 雞心 木蓋 入坐 煎

細辛去苗葉 兩

甘草炙 兩

升麻各 兩

黃芩去黑心 各 兩

射干兩

酸棗人 兩

右二十二味蠶搗篩每服五錢匕以水二盞大棗二枚擘破煎至一盞去滓溫服日三服

治氣逆怒狂陽氣暴厥竹瀝湯方

竹瀝壹 升

麻黃去根節 參分

石膏兩

生薑兩

芍藥各 兩

大青兩

梔子人 兩

升麻兩

赤茯苓去黑皮 兩

右二十一味除竹瀝咬咀如麻豆大每服六錢匕水

二盞煎至一盞去滓下竹瀝半合再煎三沸溫服日

三

治陽厥怒狂氣逆泄熱湯方

苓夏湯洗 兩

麻黃去根節 兩

芍藥去黑皮 兩

杜蘅兩

枳實去瓤 兩

細辛去苗 兩

杏仁湯浸去皮 兩

右九味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半

分切竹葉十片煎取八分去滓溫服

治陽厥狂怒定神丸方

白茯苓去皮 兩

遠志心 兩

防風去 兩

人參

相子人

妙各壹兩壹分龍骨壹兩

牡蠣煨

棗去皮核取肉

甘草壹兩

右九味搗羅為細末，鍊蜜和丸，梧桐子大，初服二十

九，加至三十九，溫熱水下，日再服。

治腸厥氣逆，善怒狂妄，常羚羊角湯方。

羚羊角銹

五味子

麥糵

茯神木柱

遠志去

沙參去蘆

酸棗人參

微妙各壹兩

右八味，搗篩，每服五錢，匕水一盞，半煎，取入分去

滓，溫服，不拘時候。

八... 聖... 卷... 六... 十...

大德重校聖濟總錄卷第六十七

大德重校聖濟總錄卷第六十八

吐血門

吐血

吐血不止

吐血統論

卷之六
吐血

論曰古人論吐血有三一曰內衄二曰肺疽三曰傷胃
內衄者近從心肺間津液出還流入胃色如豆汁凝留
胃中滿悶卽吐如衄血狀是也肺疽者飲酒滿悶卽吐
血從吐出少或一合多至一升是也傷胃者食飲過度
胃冷不化煩悶強嘔食物與氣俱上衝覺胃脘因致傷
損吐血鮮赤是也三者證雖不同要之皆由大虛損及
飲酒勞傷所致巢元方曰肺者五藏上蓋也心肝又俱
主血上焦有邪則傷諸藏藏傷血下入於胃胃得血則
悶滿氣逆氣逆故吐血也孫思邈又曰吐血之後體中

但自慙惓然心中不悶者輒自愈凡是之類學者宜審吐血

論曰吐血病有三種一則緣心肺蘊熱血得熱則妄行下流入胃胃受之則滿悶氣道貫衝故令吐血二則虛勞之人心肺內傷悲怒氣逆肝不能藏血投虛而出因怒氣逆甚則嘔血三者緣酒食飽甚胃間不安或強吐之氣脉奔亂損傷心胃血隨食出此名傷胃各隨證以

治之

治吐血羚羊角湯方

羚羊角兩 鎊參

伏龍肝兩 伍

熟艾兩 壹

地榆去土 兩

牛膝去苗酒 兩

牡丹去心各 兩

芍藥剉碎 兩

阿膠炒令極 兩

栢葉炙 兩

大薊根各 兩

雞蘇葉壹 兩

螻蛄慢火炙 伍枚

右二十二味麝香篩每服三錢匕水一盞入生薑半

分拍碎同煎至七分去滓溫服

治吐血乾地黃湯方

生乾地黃兩

伏龍肝兩

芎藭兩

當歸酒浸切 兩

桂去麝 兩

赤芍藥

白芷去粗皮 兩

乾薑炮裂各 兩

細辛去苗葉 兩

甘草炙 兩

吳茱萸湯浸去豆用 兩

德錄卷十

三

右一十一味巖掃篩每服三錢七水酒各半盞同煎
至七分去滓溫服空心食前服

治肺損吐血嗽血通聖散方

金星石

銀星石

太陰玄精石

雲母

陽起石

不灰木

右六味等分以甘鍋子一枚先入羅過紫冬灰水牛

是

地可厚二三寸鋪藥一重以灰一二寸築令實又鋪
藥一重准前以灰蓋後鋪藥盡爲度上下以灰封蓋
以泥固濟不限藥多少皆用炭一秤於靜室中周密
不通風處火煨一日一夜候冷取於淨地掘一坑子

深一尺許埋鍋子一宿取出先揀出藥塊子餘以羅
羅羅去灰取藥碾爲末更入乳鉢研令極細卽入罐
子內收之每藥末一兩入龍腦麝香各半錢阿膠一
分炒圓研入前件藥末一兩內合和令勻每服一錢
或半錢匕以糯米少許研細入薄荷汁蜜各少許同
煎爲飲候溫調下空心日午臨臥各一服

治吐血五通散方

巴豆

伍拾枚

白麩

兩

郁李

人拾枚

鹽鼓

拾伍粒

伏龍肝

兩

右五味鍋子內炒熟不佳手攪以煙膏爲度傾出放

濕地出火毒搏羅為散每服半錢匕溫蜜水調下如
患咯血用前件藥末一兩鄆州蛤粉二兩同研羅細

每服一錢匕葶汁半盞生油兩點食後調服

治吐血及一切血病諸藥不効者烏金散方

鯪鯉甲 犀角 黃明膠

赤鯪魚皮 各壹兩 胎髮 壹兩 獨角仙 壹枚去翅頭足

右六味用瓦藏瓶一枚底下開竅內藥以紙筋壅固
濟暴乾用炭五斤簇燒纔候煙絕撥去火放冷取出
細研為散每服一錢匕旋入膩粉少許吐血鼻衄不
止新汲水調下產後血運昏迷悶亂不知人冷醋湯

下血氣溫酒調下咯血及血積藏毒下血赤白痢血
痢蠱毒痢腸風及五痔下血並米飲調下臨臥空腹
服更相度虛實可加至二錢匕服藥後取下積聚物
為効

治男子婦人咯血吐血阿膠散方 白朮

阿膠 炒令燥 白及

白欬 去麤皮蜜水浸

右五味搗羅為散每服三錢匕糯米粥飲調下空心

食前日三小兒量減

治飲食傷肺吐血并嗽血五勝湯方

沉香各兩 蜜陀僧各兩 蟬殼去足

甘草各兩 黃明牛膠片將壹片酥炙

右五味搗篩每服三錢七水一盞煎至五分去滓

食後良久溫服

治吐血黃者散方 白入 白五

黃者劉 白及 白欬

黃明膠妙令燥各貳兩

右四味搗羅為散每服二錢七糯米飲調下黃栗

治吐血綠雲散方 柏葉 百合 人參 血

阿膠各貳兩 金薄片 蚯蚓條

右四味搗羅為散每服二錢七用糯米粥飲調下

治吐血神效金朱丸方 丹砂兩 金薄片 蚯蚓條

右三味先將丹砂金薄研細後將蚯蚓同研和前二

味為丸如小皂子大每服一丸冷酒下不嚼

鹿角膠象吟 黃蘗去鹽皮 杏仁去皮尖

治吐血咯血神効散方 鹿角膠象吟 黃蘗去鹽皮 杏仁去皮尖

右三味搗羅為散每服一錢七用白麴一錢溫水同

治吐血咯血神効散方 鹿角膠象吟 黃蘗去鹽皮 杏仁去皮尖

鹿角膠象吟 黃蘗去鹽皮 杏仁去皮尖

右三味搗羅為散每服一錢七用白麴一錢溫水同

右三味搗羅為散每服一錢七用白麴一錢溫水同

調下食後再服
治吐血金粉湯方

熟乾地黄特 蒲黃各壹兩 芎藭半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入糯米十四粒同煎至七分去滓溫服一食飲斷不復

治吐血咯血綿灰散方

新綿壹兩 黃明膠炙令燥 黃蘗去麤皮蜜炙為末各半兩

右三味細研每服一錢匕地黃汁糯米飲相和調下食後臨臥服

治吐血咯血金沙湯方

紫金沙野苧窠帶是爭兩 貝母去心炙

盧會壹錢

右三味麤搗篩每服二錢匕水半盞入蜜少許煎一兩沸去滓細呷空心食後臨臥服

治吐血熱極聚參散方

紫參 阿膠炒燥各兩 甘草炙

右三味搗羅為散每服三錢匕溫糯米飲調下不計時候

治吐血杏蜜膏方

豬脰壹具用瓷器煮爛冷水浸去膜 杏仁去皮尖

蜜熬熟 兩

右三味同研飯上蒸入木香附子末各二錢和勻成膏每服半匙酒一盞調下日三

治吐血藕汁散方

白茯苓去黑皮

生乾地黄焙

蒲黃

右三味等分搗羅為細散每服二錢匕生藕汁半盞調勻頓服立止

治吐血獨聖散方

晚桑葉微焙不計多少

右一味搗羅為細散每服三錢匕冷臘茶調如膏入

麝香少許夜卧含化嚥津只一服止後用補肺藥

治吐血補肺煮肺散方

杏仁壹伯貳拾粒去皮尖新瓦上焙研

百合兩

糯米壹合

葱白參莖並同杏仁法

蒸頭頭小台去

右四味和勻豬肺一具入藥在內麻線繫沙鍋內煮水去一半翻轉令熟竹片切葱藥細嚼蜜湯下服至

五具為度

治暴吐血嗽血貫衆散方

貫衆兩

黃連去須年老者半兩年少者參分

右二味搗羅為細散每服二錢匕濃煎糯米飲調下

立止

治吐血雲雪散方

雲雪寒食

蒲黃各壹兩

右二味並生用研勻每服二錢匕冷水調下

治吐血香草湯方

莎草根去毛伍兩

甘草壹兩剉炙

右二味搗搗篩每服二錢匕水一盞煎取七分去滓

溫服

治吐血鹿角膠丸方

鹿角膠炙令燥

黃蘗去蘊皮各壹兩

此方與前藥

右二味搗羅爲末入杏仁四十九枚湯浸去皮尖雙

人炒黃研細拌勻鍊蜜和丸如櫻桃大每服一丸含

化嚥津

治諸般吐血朱粉散方

丹砂研飛

蛤粉

右二味等分研細合和令勻每服二錢匕溫酒調下

治吐血黃蘗散方

黃蘗子

防已

右二味等分搗羅爲散每服一錢匕煎小麥湯調下

吐甚者一服減二服定

治吐血異功散方

人參壹兩

右一味搗羅爲散以密絹再羅令極細五更雞鳴時打雞子清調如稀糊匙抄服若服一兩人參盡甚好
不盡半兩亦可服訖却臥

治吐血榭葉散方

榭葉不拘多少

右一味搗羅爲散每服二錢匕水一盞煎五七沸和
滓溫不拘時候

治肺損吐血糯米飲方

薜荔

右一味每一二十葉用紙貼放著肉處至乾切不可
熬收貼起如有患旋碾羅作細末每服先研糯米濃
飲煎若煎餅麩稀稠可入分一盞抄藥末一匙頭同
攪調勻臨臥溫服

治吐血咯血青金散方

荷葉不拘多少

右一味焙乾搗羅爲散米飲調下二錢匕

治吐血黑神散方

栝樓取端正者紙筋和泥通裏於頂間
煨存性地坑內合壹宿

右一味去泥搗羅爲散每服三錢匕糯米飲調下再

服止

治吐血艾灰散方

艾不拘多少

右一味燒灰細研每服二錢匕新汲水調下

治忽吐血一兩口地黄飲方

生乾地黄兩焙伍

王不留行

牡丹皮各賦與同兩

赤芍藥

萹薹各肆兩

麥門冬焙心米麩

續斷

牛膝切

阿膠炙燥各兩

蟾蜍研伍枚

右十味除蟾蜍外麻搗備以生地黄汁三升赤馬

通汁三升并蟾蜍同煎至三升半去滓分溫六服空

心食前

治吐血衄血大小便出血竹葉芍藥湯方詳論下日三

竹葉銜

赤芍藥

甘草炙切各壹兩

阿膠炙燥

當歸切焙壹兩半

甘草壹兩

右五味麻搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服食後日二服

治心肺熱極喘滿吐血地黄飲方

地黄汁

生藕汁

小薊根汁

牛蒡汁各二

生蜜

生薑汁各壹

右六味和勻徐徐呷之以差為度

治吐血唾血赤芍藥散方

赤芍藥去黑 當歸切 木一附子炮裂去衣去

黃芩去黑

白朮切

甘草炙到各壹兩

阿膠炙燥

生乾地黃焙乾

甘草壹兩

右八味搗羅為散每服三錢匕空腹溫酒調下日三

服

治肺損吐血綿膠散方煎至三代半去幹衣搗六服空

新綿燒灰 黃明膠炙燥 黃芩三 代赤風

右二味等分研勻每服一錢匕臨卧糯米飲調下

治吐血湧血衄血竹茹湯方

青竹茹剉壹升

芍藥貳兩

芎藭

當歸切

桂皮去

甘草炙到各壹兩

黃芩去黑心

右七味搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

溫服不拘時

治吐血及大小便血三物湯方

生地黃半

阿膠炙令燥

白欬剉

右三味咬咀如麻豆每服七錢匕水二盞煎至八分

去滓空腹溫服

治吐血方

蛇蛻燒灰

右一味研細每服一錢匕冷熱水調下不拘時候

治吐血天南星散方

天南星寺兩剉如散子大

右以炭灰汁浸一宿漉出湯洗焙乾搗羅為散每服

一錢匕酒磨自然銅調下

治肺損吐血不止地黃飲方

生地黃

剉兩研取汁

鹿角膠

皂兩炙燥為末

酒調下

右二味先以童子小便五合於銅器中煎次下地黃

汁及膠末打令勻煎令鑊寸沸後分作三服當止

又方

地黃汁

合陸

牛皮膠

壹兩細切

生薑

壹塊如大指大

右三味先以二味於銅器中煎十數沸次下牛皮膠

煎令消濾去生薑分作兩服喫便止或微轉一行不

妨吐血不止

又方

白訶梨勒粒為白麩

又右二味等分每服二錢匕糯米粥調下

又方

白藥四兩燒存性以盞蓋地上出火毒爲末每服三錢匕糯米飲調下

吐血不止

論曰藏真高於肺而主氣藏真通於心而主血藏真散於肝而藏血是三者或因愁憂思慮與夫恚怒氣逆傷之則氣亂而血妄行下入於胃胃受之則滿脹其氣衝實於上故吐血不止也

治吐血不止極者大効聖散方

金星石

銀星石

禹餘糧

寒水石

以上並碎

不灰木

半夏

湯洗柴偏去滑生薑汁製

白芨

大黃

蛤粉

右八味等分搗羅爲散每服一錢匕新汲水調更入

龍腦少許桂兼解五毒

治吐血不止阿膠散方

阿膠

炒令燥半兩

生乾地黃

兩

人參

黃蘗

去蘗皮蜜炙

蟬殼

去土

甘草

生

黃耆

剉各半兩

右七味搗羅爲散每服一錢匕糯米飲調下不拘時

宜候服下

治吐血不止芎根散方

芎根

去麩皮塗蜜

白堊隨下不燥

蛤粉各壹分

右四味搗羅為散每服一錢匕糯米飲調下不拘時

候

主黃散黃

治吐血不止金花散方

黃蘗

去麩皮塗蜜

寒食麩壹兩

黃明膠

炙令燥

水調下

右三味搗羅為散每服三錢匕冷熱水調下食後臨

臥服

半

治吐血不止鼈甲散方

鼈甲

壹兩切

蛤粉壹兩鼈甲相和於

熟乾地黄

壹兩半

右三味搗為細散每服二錢匕食後臘茶清調下服

藥訖可睡少時

治吐血不止鬱金散方

鬱金

壹兩

蓮實去

黃耆到各

右三味搗羅為散每服一錢匕冷水調下不計時候

服

治吐血不止二黃湯方

生乾地黃焙 蒲黃各壹兩

右二味麤搗篩每服二錢匕水一盞入竹葉七片煎七分去滓放冷細呷食後

治吐血不止調胃散方

紫背荷葉焙半兩 黃耆剉壹分

右二味搗羅爲細散每服一錢匕生薑蜜水調下不拘時候

治吐血咯血不止白欬湯方

白欬參兩 阿膠貳兩炙令燥

右二味麤搗篩每服二錢匕酒水共一盞入生地黃

汁二合同煎至七分去滓食後溫服如無地黃汁入生乾地黃一分同煎亦得藥性論云地黃水調不吐衄

治吐血肺損不止白金散方

白麩 九節菖蒲末各壹兩

右二味再研勻每服二錢匕新汲水調下未止再服如中暑毒氣生薑蜜水調下中

治吐血似鵝鴨肝晝夜不止生犀散方

犀角貳兩鎊屑生用 桔梗貳兩生用

右二味搗羅爲散煖酒調下二錢匕藥性論云不持治吐血成塊不止若葉散方

若葉

半兩

楓香脂

兩

右二味研爲散每服一錢匕煎黃牛皮湯調下不計時候服

治吐血不止人參散方

人參

壹分

天茄子苗

半兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕新水調下不拘時服治血妄行入胃吐血不止黃耆散方

黃耆

半兩

五靈脂

兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕新汲水調下不拘時服治吐血不止黃藥湯方

黃藥子

萬州者壹兩

右一味搗碎用水二盞煎至一盞去滓溫熱服治吐血不止槐香散方

槐花

不拘多少

右一味火燒存性研細入麝香少許每服三錢匕溫糯米飲調下立効

治吐血不止方

黃蘆木

不拘多少

右一味麝搗篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去滓溫服

治吐血不止如聖散方

右用上色白瓷椀樸椎碎搗羅爲細末打皂莢子入煎湯調下二錢匕連三服立愈

治暴吐血不止人參散方

人參

右一味爲散每服三錢匕用雞子清投新汲水半盞

調下

治吐血不定茜草飲方

茜草壹兩
生用

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

放冷服食後

治吐血不止如聖散方

楓香脂不拘
多少

右一味細研爲散每服二錢匕新汲水調下不計時

候

治吐血不止蛛絲散方

大蜘蛛網壹大
塊

右一味於銚中炒令黃色研爲散以溫酒調下立止

治吐血不止欬嗽補肺百花煎方

生地黃汁壹升 生薑汁壹升 黃牛乳壹升

藕汁壹升

胡桃

拾枚研如糊

乾柿

伍枚細剉研如糊

大棗

貳拾壹枚煮去皮核研如糊

清酒

壹升以上壹處入銀鍋中

煎候沸方下後藥

黃明膠

炙燥爲末

秦艽末

各半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒研如糊入煎中參兩

右一十一味相次下煎減一半却入上色蜜四兩徐

徐著火養成煎後入瓷合中盛每日三度服每服一

匙頭糯米飲調下酒下亦得

治吐不止紅藍花飲方

紅藍花

貳兩

伏龍肝

參兩以水伍升伍合浸濾取汁

犀角

銹壹分

甜竹筍

參分

白茅根

剉

麥門冬

去心剉各半兩

右六味將伏龍肝汁煎諸藥取六合去滓食後分三

服每服更入亂髮灰一錢匕和勻服

治卒吐血不止阿膠湯方

阿膠

炙燥

艾葉

焙各參兩

地榆

芍藥

各肆兩

薊根

伍兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治心肺蘊熱或恚怒氣逆使血妄行日夕不止土馬驥

湯方

土馬騮焙乾 貳兩

枳實去穢 炒

白茯苓去黑皮

秦艽去苗 土

甘草炙 剉

此胡去苗

人參

生乾地黄焙各 壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服

治吐血不止方

生地黄汁

右一味和生蜜每服半盞不拘時候

大德重校聖濟總錄卷第六十八