

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

捌輯·拾冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

捌輯・拾冊目錄

本草方藥參要九卷・之二
〔清〕戴鳴皋撰

一

〔清〕戴鳴皋撰

本草方藥參要
九卷·之二

清鈔本

本草方藥要卷四目錄

高良薑

紅豆蔻

華菱

金銀藤

蒲公英

紫花地丁

山豆根

牛蒡子

根莖

山慈姑

漏蘆

飛廉

苦艾

貫眾

射干

葛尾

蚤休

馬蘭子

蓖麻子

續隨子

狼毒

防葵

木鼈子

番木鱉

白頭翁

王瓜

子

王不留行

葵

根苗子冬葵蜀葵黃蜀葵莢葵

酸漿 苗葉莖
根子

敗醬

白蘚皮

草薺

菝葜

土茯苓

白斂 赤斂

預知子

旱蓮草

嬰粟 殼末
鴉片

劉寄奴

馬鞭草

穀精草 花

青箱 草決明

鷄冠

決明子 即馬蹄
決明

藜子 苗葉水藜
馬藜水藜

虎杖

馬勃

茯苓

茯神

琥珀

松節 毛花
脂

側柏葉 枝節
脂

柏子仁

肉桂 桂心

桂枝

枸杞 苗葉 北骨皮

山茱萸

酸棗仁

杜仲

女貞子 葉 枝 根皮

楮實 白皮

蕤仁

柘

桑白皮 皮中白汁 桑椹 葉 枝 漚

葉紫灰

葉寄生

石南

卮子

猪苓

黃蘗

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

〔元素曰〕入足太陰肝陽明胃經

本草方藥參要卷四

如臬戴鳴皋著

時珍

高良薑

又名蠻薑 綱目子名紅豆蔻 言此出高良郡故名按高良即今高州漢為

高涼縣吳改為郡則

高良應作高涼也

集解

時珍曰出高良郡二三月采根形氣與杜若相似而葉如山薑恭曰出嶺南者形大虛軟

生江左者細紫亦不甚辛其實一也令人呼細者

為杜若大者為一一亦非也頌曰今嶺南及黔

蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑

苗而大高一二尺許花紅紫如山薑花時珍曰范

成大桂海志云紅豆蔻花叢生葉瘦如碧薑春末

始發初開花抽一幹有大籜包之籜折花見一穗

數十蕊淡紅鮮妍如桃杏花色蕊重則下垂如葡

萄又如火齊瓔珞及剪彩鸞枝之狀每蕊有心兩

瓣人比之連理也其子

紅豆蔻亦似草豆蔻

高良薑

希雅曰：一一入足陽明太陰二經為客
寒所犯則逆冷霍亂腹痛諸病生焉辛溫
煖脾胃而逐寒邪則胃中冷逆自除霍亂
腹痛自愈矣受曰：一一辛溫大熱惟客
寒犯胃嘔逆及傷生冷致成霍亂吐瀉之
要藥如胃火作嘔傷暑霍亂火熱注瀉心
虛作痛咸忌之
汪昂曰：脾胃熱者忌之

根辛大溫

志曰辛 苦大熱 元素曰辛熱

治暴冷胃中冷逆霍亂腹

痛別錄

下氣益聲止痢

葢器

治風破氣腹內久冷氣痛去

風冷痺弱

孰權

轉筋瀉痢反胃解酒毒消宿食大含塊

嚥津治忽然惡心嘔清水蘇頌逡即瘥頌健脾胃寬噎

膈破冷癖除瘴瘧

時珍

時珍曰一一紅豆蔻並宜炒過入藥亦有以薑同吳茱

莫東壁土炒過入藥用者

發明

楊士瀛曰噫逆胃寒者一一為要藥人參茯苓佐之為其溫胃解散胃中風邪也時珍曰干

金方言心脾冷痛用一一細切炒判為末米飲服一錢立止又穢跡佛有治心口痛方云凡男心口一點痛者乃胃脘有滯或有虫也多因怒及受寒而起遂致終身俗言心氣痛者非也用一一酒洗七次

焙研末香附以醋洗七次焙研末各記叔之病因寒
得用薑末二錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末
一錢寒怒兼有各一錢半以米飲加生薑一
是鹽一捻服之立止韓飛霞醫通亦稱其功云

方 中惡腹痛

升煮三四沸服 外臺 霍亂腹痛

一兩對以水三大盞煎二盞 半去渣入粳米煮粥食 聖惠 霍亂嘔甚 不止 一

錢大棗一枚水煎冷服 立定名玉壺湯 普濟 腳氣欲吐 蕪茶曰凡患腳氣

少食日晚不食若飢可食鼓粥若覺不消欲致霍亂

者即以 一 一兩水三升煮一升頓服即消若卒

無者以母薑一兩代之清酒煎 服雖不及 一 一亦甚效也 心脾冷痛 一 一 一 一

四兩切片分四分一分用陳倉米炒一分用東壁土

炒一分用巴豆三十四粒炒一分用斑蝥三十四箇

炒檢去米土豆蠶吳茱萸一兩酒浸一夜同炒為末

以浸茱萸酒打糊丸桐子大每空心薑湯下五十九

高良薑 紅豆 卷

二

制以胆

汁有至

理存焉

治瘡者

可思其

美

○永類方用——三錢五靈脂

六錢為末每服三錢醋湯調下

脾虛寒瘡

寒多熱少飲食

不思——麻油炒乾薑炮各一兩為末猪胆汁和

九臨發時酒下四十九吳內翰居全椒歲瘡大作用

此救人以百計大抵寒發於胆用胆汁引二薑入胆

去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制所以有效也一

方用二薑半生半炮各半兩穿山甲三錢灸

為末每服二錢以猪腎煮酒下 朱氏集驗 妊娠瘡

疾 先因傷寒變成者——三錢切以猪猪胆汁浸

一宿東壁土炒黑去土以肥粟肉十五枚同焙為

末每用三錢水煎將 風虫牙痛 ——二寸全蝎一

發時服神妙 永類 箇焙擦之以鹽湯漱

口甚效

百一選方

紅豆蔻辛温

時珍曰 辛熱

治腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔

吐酸水解酒毒

藏器

冷氣腹痛消瘴霧毒氣去宿食温

腸腹止吐瀉痢疾權治噎膈反胃虛瘧寒脹燥濕散

寒時

發明時珍曰一一東垣脾胃藥中常用之亦取其辛熱芳香能醒脾溫肺散寒燥濕消食之功耳

若脾胃素有伏火者切不宜用生編云最能動火傷目致衄食料不宜用之權曰多食令人舌粗不思

飲

華菱

又名華撥時珍曰陳藏器本草作畢勃扶南傳作遍撥大明會典作畢葵

集解

蘇曰一一生波斯國叢生葉似蒟醬其子紫細味辛烈於蒟醬彼人入食味用藏器曰其

根名畢勃葭似柴胡而黑硬頌曰今嶺南有之多

生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉

青圓如蕺菜潤二三寸如菜葉面光而厚三月開

花白色七月結子如小指大長二寸許青黑色類

華菱

三

時珍曰入手足陽明大腸胃經
介賓曰入手足陽明經亦入肝腎

〔京〕曰牙痛因寒者宜乾薑一細辛因熱者宜石膏牙痛因風者宜皂角僵蚕礞石

二烏因虫者宜石灰雄黃

〔介〕實曰其味大辛瀉同參木歸地諸甘溫

補藥用之尤效

〔鳴〕皋曰一一之性下行大腸而下氣故治氣痢凡痢按屬大腸之滯或有形之滯或血滯或氣滯故名滯下也觀冠氏云多服走真氣令人腸虛下重則能通大腸之氣可知也

椹子而長九月收米晒乾南人愛其辛香或取葉生茹之復有番舶上來者更辛香

辛大溫時珍曰氣熱味辛主溫中下氣補腰脚消食除胃冷

陰山癖藏器霍亂冷氣心痛血氣大水瀉虛痢嘔逆醋

心產後瀉痢與阿魏和合良得訶子人參桂心乾薑

治臟腑虛冷腸鳴神效李治頭痛鼻淵牙痛時珍

〔穀〕曰去皮用頭以醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨乃用免傷人肺令人上氣

〔發〕明宗奭曰一一走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛者宜之多服走泄真氣令人腸虛下重頌曰唐太宗

實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進黃牛乳煎一一方用之有效劉禹錫云屢試於虛冷者必效時珍曰牛乳煎詳見獸部牛乳下一一為頭痛鼻淵牙痛要藥取其辛熱

能入陽明經散浮熱也〔又曰〕氣熱味辛陽也浮也入手足陽經然辛熱耗散能動脾肺之火多用令人目昏食料尤不宜之

方 冷痰惡心

飲服半錢 聖惠 胃冷口酸 流清

下連臍痛用——半兩薑製厚朴一兩為末入熟鯽魚肉研和丸綠豆大每米飲下二十九立效 選奇

瘴氣成塊

在腹不散——一兩大黃一兩並生為末入射香少許密丸桐子大每冷酒服三十

丸 婦人血氣

作痛及下血無時月水不調用——永類 鹽水炒蒲黃炒等分為末以鍊密丸

桐子大每空心酒下三十 偏頭痛——為末令患者丸名二神丸 陳氏方 口含溫水隨左右

痛以左右鼻嗅一 風虫牙痛——末搯之煎蒼耳湯字甚有效 經驗 漱去涎○聖濟總錄用

——胡椒等分為末蠟 鼻流清涕——為末嗅之效丸麻子大塞虫孔中 衛生易簡方

華英 金銀藤

昂曰甘寒入肺鳴皋曰觀其治腸癖血痢亦大賜藥

介賓曰甘平微寒善化毒故治癰疽惡瘡風濕諸毒誠為要藥但性緩用須加倍或酒煮或原汁和酒頓飲

中梓曰甘微寒主脹滿下利消癰散毒補虛療風世人但知其消毒之功昧其脹利

風虛之用予于諸症中用之屢見效

子接曰——得當歸治熱毒血痢

鳴皋曰得酒良

希雍曰同甘菊花紫花地丁夏枯草白芨

白欒貝母連翹麻粘子治一切腫毒君

地榆芍藥川連甘草升麻治血痢

金銀藤

又名忍冬別錄鴛鴦藤綱目鴛鴦藤同上老翁鬚同上左纏藤同上金釵股同上通靈草

土宿蜜桶藤同上

甘溫

藏器曰小寒云溫者非也

治寒熱身腫

別錄

治腹脹滿能止氣

下澀

甄權

執毒血痢水痢濃煎服

藏器

治飛尸遁尸風尸

沉尸之瘞兜擊一切風濕氣及諸腫毒癰疽疥癬楊

梅諸惡瘡散熱解毒

時珍

發明

景曰忍冬煮汁釀酒飲補虛療風長年益壽可常服時珍曰——莖葉及花功用皆同昔

人稱其治風除脹解痢逐尸為要藥而後世不知用後世稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一徹論也按陳自明外科精要云忍冬酒治癰疽發背初發便當服此其

效甚奇勝於紅內消洪邁沈括所載諸方甚詳如癩醫丹陽僧江西僧鑿清金陵王琪玉尉子駿海州劉秀才純臣等所載療癩疔發背皆是此物故張相公云誰知至賤之中乃有殊常之效

方 忍冬酒

治癩疔發背不問發在何處或頭面或手足或腰脇或乳皆有奇效但虔心服

之俟其疽破仍以神異膏貼之妙甚用鮮忍冬一把以葉入石器內研爛入生餅子酒少許稀稠得所塗於四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木槌打碎不可犯鉄甘草節生用一兩同將沙石器慢煎至一椀入無灰酒一椀再煎數沸去渣分三服一日一夜吃盡病勢重者一日二劑服至大小腸通利則藥力到無鮮者用乾者然力不及鮮者 外科精義 忍冬丸 治消渴愈後預防癩疔及鮮者 根花葉皆可用入瓶內以好酒浸以糠火煨一夜取出晒乾入甘草少許研細末以浸藥酒打糊丸桐子大每服四五十九或百九湯酒 一切腫毒 已潰未潰任下此丸亦大能止渴 同上 初起皆治

金銀藤

五

以渣敷上敗毒托裏散氣和血其功獨勝
丁瘡便

毒方同 喉痺乳蛾 方同上 俱 瘰癧托裏 發背腸

無名腫毒焮痛實熱狀類傷寒不問虛實服之未成

者內消已成者即潰忍冬葉黃芪各五兩當歸一兩

甘草八錢為細末每服二錢酒一盞半煎

一盞隨病上下服日再服渣敷之 和劑 瘡久成漏

忍冬酒常服 見戴原禮要訣 熱毒血痢 飲 聖惠方 五種尸注 飛

者遊走皮膏洞穿臟腑每發刺痛變動不常也遁尸

者附骨入肉攻鑿血脉每發不可見死尸聞哀哭便

作也風尸者淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得

風雪便作也沉尸者纏結臟腑冲引心脇每發絞切

過寒冷便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏

廢每節氣至則大作也並是身中尸鬼接引外邪宜

用 莖葉熬膏每鴉子大 鬼擊身青 作痛 一兩煎

許溫酒化下日二三服 肘後 鬼擊身青 一兩煎

昂曰——足少陰腎經君藥震亨曰入陽明太陰經希雍曰當是入肝胃解熱涼血之藥

飲 李樓 脚氣作痛 筋骨引痛 一為末每 中野
怪症奇方 温酒服二錢 衛生易簡

蘭毒 急采——咳 忍冬膏 治諸般腫痛金傷瘡患
之 夷堅志 瘡用——四兩吸鉄

石三錢香油一斤煎枯去渣入黃丹八
兩熱至滴水不散攤貼 乾坤秘韞

蒲公英 又名黃花地丁 金簪草綱目 時珍曰
千金方作鳧公英圖經作僕公嬰唐辛玉冊

作鷄 鷓英

集解 保昇曰——莖葉似苦苣斷之有白汁堪
生嫩花如單菊而大頌曰處、有之初生苗

葉如苦苣有細刺中心抽一莖、端出一花色黃
如金錢俗訛為僕公嬰是也宗奭曰即地丁也四

時有花、罷飛絮、中有子落處即生時珍曰地
丁江之南北頗多他處亦有之嶺南絕無小科布
地四散而生莖葉花絮並似苦苣但小耳嫩苗可
食唐辛玉冊云地丁葉似小萵苣花似大旋蒿一

蒲公英

六

希雅曰入肝胃解熱涼血之要藥乳癰屬肝經婦人經行後肝經主事故治之宜生散之良

昂曰乳頭屬厥陰乳房屬陽明故專治乳癰文曰亦為通淋妙品諸家不言試之甚效

鳴春曰入肝腎二經故為通淋妙品

昂曰凡螻螂諸虫盛夏孕育有游諸物上必遺精汁乾久則有毒人手觸之成疾名狐

尿刺慘痛不眠百治不效取汁厚塗即愈希雅曰得夏枯草貝母連翹白芷枯梅根

橘葉甘草頭垢牡蠣蒸山豆根山慈菇治一切乳癰乳岩為上藥

莖聳上三四寸斷之有白汁二月

采花三月采根可制汞伏三黃

茵甘平果曰治婦人乳癰腫水煮汁飲及封之立消苦寒

鮮食毒散滯氣化熱毒消惡腫結核丁腫震擦牙

固齒烏鬚髮壯筋骨時白汁塗惡刺狐尿瘡即愈蘓

發明果曰一一苦寒足少陰腎經君藥也本經必用之震亨曰此草屬土開黃花味甘鮮食毒散

滯氣可入陽明太陰經化熱毒消腫毒有奇功同忍冬藤煎湯入少酒佐之治乳癰服罷欲睡是其功也

辨覺微汗病即安矣頌曰治惡刺方出千金方其序云余以貞觀五年七月十五以左手中指觸庭木至

曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色常聞此方遂試之于下則愈痛除瘡即瘥故

楊炎南行方亦著其效云時珍曰薩謙齋瑞竹堂方有擦牙烏鬚髮還少丹甚言此草之功蓋取其能通

腎也故東垣李氏言其為少陰本經必用之藥而若本草者不知此義

方 還少丹

此方極能固齒壯筋骨生腎水服之鬚髮返黑齒落更生年少服之至老不衰

一宿分為二十團用皮紙包裹三四層扎定用蚯蚓糞如法固濟入窻內焙乾乃以武火煨通紅為度冷定去泥為末早晚擦牙漱之吐
一兩搗爛水二鐘煎一鐘
燕任便久方效 瑞竹堂 乳癰紅腫 兩忍冬藤

服取汗 唐氏 多年惡瘡 救急方 蛇蟻 上方同
疔瘡丁瘡 別搗汁和酒煎

紫花地丁

又名箭頭草 綱目 獨行虎 同上 羊角子 秘 蠶米布袋

集解

時珍曰葉似柳而微細夏開紫花結角平地者起莖溝壑邊生者起蔓普濟方云鄉村雜

蒲公英

紫花地丁

七

落生者夏秋開小白花如鈴兜倒垂葉微似
木香之葉此與紫花者相戾恐別是一種

苦辛寒治一切癰疽發背疔腫癰瘰無名腫毒惡瘡

時珍

方

黃疸內熱

地丁末酒服三錢 乾坤秘韞

稻

粘咽

不得出者 箭頭草嚼

嚙下

方同上

癰疽惡瘡

爛酒一鐘攪汁服 楊誠經驗方
連根同蒼耳葉等分搗

癰疽發背

無名諸腫貼之如神 一 一 一 三伏時取
以白麩和成鹽醋浸一夜貼之 孫天仁

集效

方

丁腫

千金用 一 一 一 搗汁服雖極危者亦效
楊氏用 一 一 一 葱頭生蜜共搗貼之

若瘤瘡加

新黑牛屎

瘰癧發背

同白蒺藜為末油和塗神效
丁瘡諸腫 一 一 一 根去粗皮

乾坤

秘韞

喉痺腫痛

研膏點入取吐 普濟
草葉入醬少許

熏瘡法

昂曰瀉心火以保肺金去肺大腸之風熱
又曰心火降則不灼肺而金清肺與大腸
相表裏肺金清則大腸亦清

不實曰大苦大寒

昂曰急黃乃血熱極所致

希雍曰為解毒清熱之上藥凡痛必因於
熱毒解熱散則痛自止瘡腫自消急黃乃
血熱極所發故必發熱氣上壅則發咳
嗽諸虫亦濕熱所化故志主之而多獲奇
效也又曰虛寒者勿服

子按曰一一專解咽喉腫毒

希雍曰一一入散乳藥中能消乳岩

一一根日乾以罐盛燒烟對瘡
口熏之出盡黃水愈 易簡方

山豆根

又名解毒綱目黃結同上中藥

集解

頌曰一一生劍南及宜州果州山谷今廣
西亦有以忠州萬州者佳苗蔓如豆葉青經

冬不凋八月採根廣南者如小槐高尺餘石鼠食
其根故嶺南人捕鼠取腸胃晒乾解毒攻熱亦效

甘寒

時珍曰沈括筆談云
味極苦云甘誤矣

解諸藥毒止痛消瘡腫發

熱效嗽治人及馬急黃殺小蟲

開寶

含之嚥汁解喉痹

腫毒極妙

蘇頌

研末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢

治女人血氣腹脹又下寸白諸虫丸服止下痢磨汁

服止卒患熱厥心腹痛五種痔漏痛研汁塗諸熱腫

山豆根

八

禿瘡蛇犬蜘蛛傷時珍

方 解蠱毒

蜜取一匙和水研服少許未定再服已禁聲者亦愈

急黃

水

服二錢若帶

蠱氣以酒下

霍亂吐利湯

下三錢效末桶皮

赤白痢

末

蜜九白湯下

以上俱備急方

水蠱腹大

有聲而皮色黑者末酒下二錢 聖惠方

此方 寫舉曰卒患總屬邪熱必卒患者方可用

卒患腹痛

水研半盞服入口即定

頭風

油調末塗兩太陽

頭生白屑

油浸

牙齦痛腫

所以上俱備急方

喉中發瘧

醋

磨喻之追涎即愈 永類鈴方

疥癬虫瘡

臘猪脂調塗 備急

喉痹急症

牙關緊閉

水米不下 白藥等分水煎喻之

嚙下二三口即愈

楊清叟外科方

牛蒡子

又名惡實別錄鼠粘子同上大力子綱目蒡子同 便牽牛同上 蝙蝠刺

布羅回入手太陰足陽明肺胃經

〔希雅〕曰入手畏陰足陽明為散風除熱解
毒之要藥辛能散結苦能洩熱：結散則
臟腑清明故明目而補中風之所傷衛氣
必壅：則發熱辛涼解散則表氣和風無
所留矣故除風傷寒器主風毒腫諸痿元
素主潤肺散結氣利咽膈去皮膚風通十
二經者悉此意耳故用以治痘疹尤獲奇
效

〔中梓〕曰辛溫入肺達肺氣利咽喉又曰一
一入肺理風之劑兼理腰膝凝滯者
一則金為水母一則清肅下輸或謂兼入
腎者非其升浮之用也

〔希雅〕曰升多于降不實曰降中有升治風
毒斑疹散瘡瘍腫毒喉痺及腰膝凝滯
滯之氣以其善走十二經而解中有散也
〔希雅〕曰性冷滑痘家惟宜于血熱便閉之
症若氣虛色白大便秘或泄瀉者慎勿服
沙疹不忌泄瀉故用之無妨

〔昂〕曰性冷而滑利痘虛寒泄瀉者忌之
〔鳴皋〕曰按九牛二虎丸治中風多年手足

集解

〔頌〕曰一子處：有之葉大如芋葉而長實
似葡萄核而褐色外殼似栗核而小如指頭

多刺根有極大者作菜茹益人秋後采子入藥時
珍曰牛蒡古人剪苗淘為蔬取根煮為脯云甚
益人今人罕食之三月生苗起莖高者三四尺四
月開花成叢淡紫色結實如楓楸而小萼上細刺
百十攢之一株有子數十顆其根大者如
臂長者近尺色灰黯七月采子十月采根

辛平

〔藏器〕曰苦
〔元素〕曰溫
明目補中除風傷別風毒腫諸痿
〔藏器〕

研末浸酒每日服三二盞除諸風去丹石毒利腰脚

又食前熟按三枚吞之散諸節結筋骨煩熱毒
〔甄權〕

一枚出瘰癧疽頭
〔蘇恭〕炒研煎飲通利小便
〔孟詵〕潤肺散氣

利咽膈去皮膚風通十二經
〔元〕消斑疹毒
〔時珍〕

牛蒡子

九

不仁腰不能轉側用虎前左掌二个酥炙
 牛左脇第三根骨九根酥炙黃芪五兩生
 晒牛旁子二十兩生研當歸五兩酒炒牛
 夕五兩鹽水炒小川芎二兩半酒炒沙苑
 子十兩生研雲苓五兩乳蒸白朮二十兩
 炒去刺外用雄烏骨鴉一隻將絕勒死乾
 去毛雜頭足者爛連骨一齊搗爛焙乾研
 末同前藥煉蜜為丸此方不知何出見有
 服之神效者然則牛旁果有利腰膝滯
 之功今人知用之者少耳
 希雍曰同紫草犀角生地治天行痘瘡血
 熱粘乾不得出有神功

發明 霜出拭去焙搗用

果曰 酒拌蒸待有白
 能散諸腫瘡瘍之毒利凝滯腰膝之氣是也

方 風水身腫 欲裂 一 一 二兩炒研為末每
 溫水服二錢日三服 聖惠方 風熱

浮腫 咽喉閉塞 一 一 一合半生半
 熟為末熱酒服方寸匕 經驗 痰厥頭疼 一 臘

茶為末旋覆花 頭痛連睛 一 一 石膏等分為末
 湯下 聖惠 茶清調服 醫方摘要 咽

膈不利 疎風壅涎唾 一 一 一微炒荆芥穗一兩炙草
 半兩為末食後湯服二錢緩 取效 寇氏

本草 懸癩喉痛 風熱上搏也 一 一 生甘草等
 行義 分煎含嚙名啓關散 普濟方 咽喉

痘疹 一 一 二錢桔梗一錢半甘草
 節七分水煎服 痘疹要訣 風熱癰疹 一 炒

浮萍等分以薄荷湯服二 痘瘡不快 壯熱煩躁咽膈
 錢日二 初虞世錄驗 壅塞大便秘 一

一炒一錢二分荆穗二分甘草四分水一盞煎七分已出亦可服名必勝散若大便滑勿服亦治咽腫痛
婦人吹乳許溫酒細吞袖珍便瘰腫痛

錢炒研末入蜜一匙芒硝一匙空心酒服同上蛇蝎蠱毒服易簡水

蠱腹大梧桐子大末飲酌下張文仲歷節腫痛風

攻手指赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則大便秘一三兩新豆豉炒羌活各一兩為末每服二錢

本事

根莖苦寒權曰治傷寒熱汗出中風面腫消渴熱

中逐水銀別根主牙齒痛勞瘵諸風脚緩弱風毒瘰疽

咳嗽傷肺瘰癧痰癥冷氣積血蒸根浸酒服去風及

牛蒡子根莖

十

惡瘡和葉搗爛傅杖瘡金瘡永不畏風器主四肢不

健通十二經脉權切根拌豆麩作飯食消壅脹莖葉

煮汁作浴湯去皮間習如虫行入莖生搗塗一切

腫毒孟葺器曰根須蒸熟日

發明頌曰根作脯食甚良莖葉宜釀酒服冬采根蒸

根取時避風以竹刀刮去土搗汁一大升和蜜四

大合溫分二服得汗出即愈此方得之岳鄂鄭中丞

鄭因食熟肉一頓便中

暴風得此方服立瘥

方時氣餘熱不退煩躁發渴四支無力不能飲食

一切風疾十年二十年者牛蒡根切一升地黃廿杞

外 老人風濕 久痺筋骨拘攣服此壯腎潤皮毛益氣力牛蒡根一升切生地一升切大

黑豆二升炒袋盛浸好酒五日隨量溫飲 集驗方 頭面忽腫 熱毒風氣內攻或連手足

赤腫觸着痛者牛蒡根搗爛酒煎成膏貼 患處仍以酒化服一二匙甚佳 斗門方 頭風掣痛

不可禁者摩膏主之牛蒡莖葉搗汁二升酒一升益花一匙熬成膏以摩痛處風毒自散摩時須用力令

熱乃效 頭風白屑 牛蒡葉熬膏塗之 喉中熱腫 牛蒡根一升水五升煎一升分三服

又方牛蒡根搗汁細嚙 延年方 熱毒牙痛 不可忍 搗汁入鹽花少許熬膏塗 根一升水三

上重者不過三次瘡 聖惠 項下癭疾 升煮一升半 分三服或蜜丸常服 諸瘡 牛蒡三莖洗煮爛搗汁

之亦可 救急方 入米煮粥食一椀甚良 普 反花瘡 積年不瘥者搗根和

濟方 臘猪脂封之 千金 小便不通 臍腹急 痛葉汁

牛蒡子根莖山慈姑

十一

生地汁各一合入蜜二合每用一合入水半
盞煎三五沸調滑石末一錢服 聖濟總錄 月水不

通 結成癥塊腹脇脹大欲死根二斤切蒸三
次酒三斗浸五日每溫服一盞 普濟

山慈姑 又名金燈 拾遺 畏燈檠 綱目 朱姑 同上 鹿蹄
草同上 無義草

集解 藏器曰 一一生山中濕地葉似車前根如
慈姑時珍曰 一一處有之冬月生葉如

水仙花之葉而狹二月中出一莖如箭葉高尺許

莖端開花白色亦有紅黃色者上有黑點其花乃

眾花簇成一朶如絲紐成可愛三月結子有三稜

四月箇枯即掘取其根狀如慈姑及小蒜遲則苗

腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉蒜根

無毛一一有毛殼包裹為異用之去毛殼

根甘微辛有小毒治癰腫瘡癤癰癰結核等症醋磨
塗之亦剝人面皮除肝黧 藏器 主疔腫攻毒破皮解諸

昂曰廣州筆記云出廣州遂昌縣洪山無
毛以真者有毛誤也

昂曰功專清熱散結
希雅曰亦入乳岩乳毒方中用之相宜

毒蠱毒蛇出狂犬傷珍時

方 面黠

旦洗 普濟 末夜塗

瘰癧疔腫

及黃疸 連根同蒼耳草

等分搗爛好酒一盞濾汁

風痰癩疾

者一个以茶清

溫服或末服

乾坤生意

研如泥日中時以茶調下即卧日中良久吐出鴉

子大物永不發不吐以熱茶投之

奇效良方 萬

應解毒丸

一名太乙紫金丹一名玉樞丹解毒諸毒療諸瘡利關節治百病行路者宜攜此

去油一兩紅牙大戟去蘆去骨洗焙一兩半射香三

錢為末重羅令勻糯米濃汁和之木杵石臼搗千下

作一錢一錠病甚者連服取利一二行用溫粥補之

凡一切飲食藥毒蠱毒瘴氣河豚土菌死牛馬毒並

用水磨服一錠吐利即愈一切惡瘡及楊梅等毒並

用水磨或酒磨塗日數次立消傷寒狂乱瘟疫喉痹

並用冷水入薄荷汁化下瀉痢霍乱絞腸沙薄荷湯

山慈姑 漏靈

十二

景曰足陽明本經藥胃
昂曰入胃大腸通肺小腸
希雍曰亦入足少陽

下中風中氣口噤眼斜癩癩鬼邪並暖酒下傳尸勞
瘵涼水化服取下惡物虫積為妙久近瘡疾將發時
東流水煎桃枝湯服小兒驚風府痢薄荷湯下頭風
頭痛酒研塗太陽牙痛及一切湯火蟲獸諸傷並磨
塗仍服少

許百一

漏靈

又名野蘭本經英蒿蕪茶鬼油麻日華
時珍曰唐韻作篇

集解

景曰近道亦有市人取苗用之俗中取根
名鹿驪根苦酒摩以治瘡疥恭曰俗名英蒿

莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻之莢大如筋許
有四五瓣七八月後皆黑異於眾草蒿之類也常
用其莖及葉子未見用根其鹿驪山南謂之木藜
薑有毒非一一也今人以馬薊似苦艾者為一一
亦非也志曰別本言一一莖大如筋高四五尺子
房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧
及上黨者佳陶云鹿驪蘇云木藜薑亦非也一一
自別藏器曰南人用苗北土用根乃樹生如茱萸

樹高二三尺有毒殺虫山人以洗瘡疥保昇曰葉似角蒿今曹下濕處最多六七月采莖日乾黑於衆草大明曰花苗並可用形與氣味似乾牛蒡頭上有白花子頌曰今汴東州郡及秦州海州皆有舊說莖葉似白蒿花黃白莖莖若筋大房類油麻而小今惟單州所圖上者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海州者花紫碧如單葉蓮花葉下及根旁有白茸叢之根如蔓菁而細又類葱本黑色淮甸人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦州海州者葉更有鉅齒一物而殊類如此醫家何所適從當依舊說以單州出者為勝又本草飛廉一名一一云與苦苣相類其根生則向白皮黑乾則黑如元參七八月采花陰乾用所說與秦州海所圖一一花葉及根頗相近然彼人但名一一不曰飛廉也時珍曰沈存中筆談云今方家所用一一乃飛廉也飛廉一名一一苗似苦苣根如牛蒡綿頭者是也采時用根今閩中所謂一一莖如

漏靈

十三

昂曰鹹軟聖苦下泄寒勝熱
希雍曰若能下洩鹹能軟聖寒能除熱入
足陽明少陽太陽手太陰陽明寒而通利
之藥也故主皮膚熱患瘡疔痔濕痹下乳
汁止遺溺本經謂聰明耳目亦指軟散病
除之效也

油麻高六七尺秋深枯黑如

漆采時用苗乃真一一也

根苗鹹寒無毒

別錄曰大寒葢器曰
有毒李杲曰無毒

治皮膚熱毒患

瘡疽痔濕痹下乳汁聰明耳目

本經

止遺溺熱氣瘡痒

如麻豆可作浴湯

別錄

通小腸治泄精尿血腸風赤

眼小兒壯熱撲損續筋骨治乳癰癰癰金瘡止血排

膿補血長肉通經脉

大明

之才曰連翹為之使散

曰生甘草對拌蒸晒用

發明

時珍曰一一下乳汁消熱毒排膿止血生肌殺
出故東垣以為手足陽明藥而古方治癰疽發

背以一一湯為首稱也龐安常傷寒論治癰疽及預

解時行痘疹熱用一一葉云無則以山卮子代之亦

〔希雍曰〕一、同貝母、連翹、甘草、銀花、橘葉、鼠糞、白芷、山豆根、小慈姑、夏枯草、治乳癰、乳疔、同連翹、甘草、菊花、紫花地丁、貝母、銀花、夏枯草、治發背、癰、癤、排膿、止痛、同黃芪、人參、排膿、長肉、加狗蹄、猪蹄、汁、能下乳。

取其寒能解熱，蓋不知其能入陽明之故也。

方 腹中虻虫

一、為末，以餅攪和服。外臺秘要。

小兒無辜

疳病，壯張或時。

瀉痢冷熱不調，以一一兩杵散，每服一錢。以猪肝一兩入，鹽少許同煮，頓食之。聖惠。冷勞泄。

痢 一、一兩艾葉炒，四兩為末，米醋三升入，藥末一半同熬成膏，入後末和丸。梧子大，每湯服三十九。

聖方 產後帶下 乳汁不下

乃氣脈壅塞也，又治經絡凝滯，乳內脹痛。

邪畜成癰，服之自然內消。一、二兩半蛇蛻十條，炙焦，瓜蒌十箇燒存性，為末，每服二錢，溫酒調下。良久。

以熱湯投之，以通為度。和劑。歷節風痛。筋骨拘攣，古聖散用一一。麩炒半兩，地龍焙半兩，為末。

末生薑二兩，取汁密三兩，同煎三五沸，入好酒。五合盛之，每以二杯調末一錢，溫服。聖濟。一切。

癰疽。發背初發二日，但有熱證，便宜服。一、湯退毒。下膿乃宣，熱拔毒之劑，熱退即住服。一、用有。

漏靈 飛廉

十四

白茸者連翹生黃芪沉香各一兩半粉甘草半兩大
黃微炒一兩為細末每服三錢薑棗湯下 李迅癘
疽集

驗方

飛蘆

亦名漏蘆 別錄飛雉 同上 木禾 同上 伏兔 同上
伏猪 同上 天蘇 同上

集解

弘景曰：處之有之極似苦艾惟葉多刻缺葉
下附莖：有皮起似箭羽其花紫色今既別

有漏蘆則此漏蘆乃別名耳 恭曰：此有兩種一種
平澤中是陶所說者一種生山岡上葉相似而無
刻缺且多毛其莖赤無羽其根直下更無旁枝生
則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如元參用莖葉
及根治疔蝕殺虫與平澤者俱有驗 保昇曰：葉似
苦艾莖似軟羽花紫色子毛白所在平澤皆有數
曰：赤脂蔓與一一相似只赤脂蔓見酒則色便如
血以此可表識之 頌曰：今秦州所園漏蘆花似單
葉寒菊紫色五七枝同一幹海州所園漏蘆花紫
碧色如單葉蓮花：萼下及根旁有白茸叢之根

黑色如蔓菁而細又類葱本與陶蘓所說——相近然彼但謂之漏蘆今醫家罕有用——者不能的識時珍曰——蒿類也蘇頌圖經疑海州所圖之漏蘆是——沈存中筆談亦言——根如牛蒡而綿頭古方漏蘆散下云用有白茸者則是有白茸者——無疑矣今考二物功用氣味俱不相遠似可通用豈或一類數種而古今名稱各處不同乎

根及花苦平無毒

權曰苦鹹有毒

治骨節熱脛重酸痛久服

輕身

本經

頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起

熱瘡癰疽痔疾濕痹止風邪欬嗽下乳汁久服益氣

明目

別錄

主留血療疔蝕殺虫

蘇恭

小兒疳痢為散水漿

服大效

蕭炳

治頭風旋運

時珍

飛廉

苦寒

十五

之才曰得烏頭良忌麻黃
粗皮杵碎苦酒拌一夜漉出日乾用

發明 時珍曰抱朴子言一單服可輕身延年又言
服一煎可速涉疾行力倍於常本經別錄所

列亦是良藥而後
人不知用之何哉

方 疔蟲蝕口 及下部一萬燒灰搗篩以兩錢匕
著痛處其痛則忍之若不痛非疔也

下部虫如馬尾大相纏出無數
十日瘥二十日平復 千金翼

苦笑 音稷 又名鈞笑爾雅苦板

集解 保昇曰所在下濕地有之莖圓無刺可生噉
子若貓薊五月采苗晒乾用時珍曰笑大如

揆指中空莖頭有莖似薊初生可食許氏說文言
江南人食之下氣今浙東人清明節采嫩苗食之
云一年不生瘡疥亦搗汁和米為食其色清久留
不敗造化指南云一一大者名苦藉葉如地黃味

苦初生有白毛入夏抽莖有毛開白花甚繁結細
實其無花實者名地胆草汁苦如胆處：濕地有
之入爐

火家用

苗苦微寒治面目通身漆瘡燒灰傳之亦可生食別錄

燒灰治金瘡極驗弘景治丹毒大明煎湯洗痔甚效汪穎下

氣解熱時珍

貫衆

又名貫節本經貫渠同上百頭同上又名虎卷
扁府草鵝頭別錄黑狗脊綱目鳳尾草同經貫

中吳

普

集解

〔普曰〕葉青黃色兩：相對莖有黑毛叢生冬
夏不死四月花白七月實黑聚相連卷旁生

三八月采根五月采葉〔頌曰〕今陝西河東及荆襄
多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三

苦笑

貫衆

十六

〔希雍曰〕味苦微寒故主腹中邪熱氣諸毒
 出由濕熱所生苦寒除濕故殺三虫苦以
 洩之亦兼有散之義故破癥結金瘡出
 血後必發熱洩熱散結則金瘡自止
 〔鳴泉曰〕一雖寒而入氣分本經主腹中
 邪熱氣之字當玩故又能破癥結治產後
 血氣腹痛之因熱者也又入血分故治血
 止血及崩帶

稜葉綠色似鶴翎又名鳳尾草其根紫黑色形如
 大爪下有一黑鬚毛又似老鵝爾雅注云葉圓銳
 莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是矣〔時珍曰〕
 多生山陰近水處數根叢生一根數莖大如筋
 其涎滑其葉兩相對生如狗脊之葉而無鋸齒
 青黃色面深背淺其根曲而有尖紫黑鬚叢簇亦
 似狗脊根而
 大狀如伏鵝

根苦微寒有毒治腹中邪熱氣諸毒殺三虫
本經 去寸

白破癥瘕除頭風止金瘡
別錄 為末水服一錢止鼻血

有效
蘇恭 止下血崩中帶下產後血氣腹痛斑疹毒漆

毒骨鯁解猪病
時珍

之才曰藿菌赤小豆
 為之使伏石鍾乳

發明時珍曰——大治婦人血氣根汁能制三黃化

五金伏鍾乳結砂制汞且能解毒軟堅王海巖

治夏月豆出不快斑散用之云——有毒而能解

腹中邪熱之毒病因內感而發之於外者多效非古

法之分經也王瓊百一選方言潯州蔣教授因食鯉

魚玉蟬羹為肋肉所鯁百藥不效或令以——濃煎

汁一盞分三服連進至夜一路而出亦可為末

水服一錢觀此可知軟堅之功不止治血治瘡

方 衄血不止 一錢 普濟 諸般下血 黑——黃

內肉赤色者去皮毛焙為極細 末每空心米飲下二錢 同上 血崩 服立止 集簡

產後亡血 過多心腹微痛者——一箇全用以好醋 浸炙令香熟為末空心米飲下三錢甚效

良方 婦人 赤白帶下 年深諸藥不效者用上方法 治 之名獨聖散甚效 同上 年深

咳嗽 出血及膿——蘇木等分每服三錢水一盞煎 入生薑三片。久嗽成勞瘵——炙為末用魚 貫衆 射干

十七

丹溪曰行太陰肺脾厥陰心包肝經
鳴泉曰觀其通經閉治瘡自係肝胆主藥
希雍曰亦入手少陽

鮮蘼食之

聖惠方

痘瘡不快

赤芍各一錢升麻甘草各五分淡竹葉三片水煎服

海藏

方

漆瘡作痒

油調塗之

千金方

鷓鴣骨鯁見發解輕粉毒

牙縫出血而臭腫一黃連各半

兩研入冰片少許漱之

積德堂

血痢不止

錢酒煎

服簡方

集便毒腫痛

良酒服二錢多能鄙事

射干

一名烏扇本經烏蒲同上烏翼別錄烏吹同上
草薑同上鳳翼各遺鬼扇土宿仙人掌同上扁

竹綱目野薑花同上紫

金牛土宿黃遠吳普

集解

孔叢曰一鳥翼根黃色庭臺多種之人言其葉是鳥尾而復有鳥頭此若相似耳恐

非鳥翼也恭曰鳥尾葉都似一而花紫碧色不

抽高莖根似高良薑而肉白名鳥頭保昇曰一

高二三尺莖黃實黑根多鬚皮黃黑向黃赤所在

皆有葳器曰一一鳥尾二物相似人多不分一

即人間所種為花草名鳳翼者葉如鳥翅秋生紅
 花赤點焉尾亦人間所種苗低下於射干狀如鳶
 尾夏生紫碧花者是也大明曰——根潤形似高
 良薑大小黃色淡硬頌曰慶：有之春生苗高一
 二尺葉大類蠻薑而狹長橫疎如翅羽狀故名烏
 翼葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開花黃紅色
 瓣上有細紋秋結實作房：中子黑色震亨曰根
 為——葉為烏翼紫花者是紅花者非機曰諸註
 一一非一種有花白花黃花紅花紫者丹溪獨取
 紫花者必曾試驗也時珍曰——即今扁竹也今
 人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶其花三四月開
 六出大如萱花結房大如拇指一房四隔一隔十
 餘子：大如胡椒而色紫極硬咬之不破七月始
 枯陶弘景謂——鳶尾是一種蘓恭陳藏器謂紫
 碧者是鳶尾紅花者是——韓保昇謂黃花者是
 一一蘓頌謂花紅者是——朱丹溪謂紫花者是
 紅花者非各執一說何所憑依按張揖廣雅云鳶
 尾——也易通卦驗云冬至——生土宿真君本

射干

十八

〔希雅曰〕苦能下洩故善降兼辛故善散故
 主咳逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣
 胸中邪逆既降且散益以微寒故主飲食
 大熱丹溪主大陰厥陰之積痰消結核又
 治足厥陰濕氣下流因勞而發為便毒皆
 取其洩熱散結之力耳
 〔又曰〕一雖能降手少陽厥陰相火洩熱
 散結消腫痛然無益陰之性凡脾胃薄弱
 臟寒氣血虛無實熱者禁用

草云——即扁竹葉高生如側手掌形莖亦如之
 青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江南
 湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制丹
 砂能拒火據此則鳶尾——本是一類矣但花色
 不同正如牡丹菊花芍藥
 其色各異大抵功不相遠

根苦平有毒〔保昇曰〕微寒〔權曰〕有小
 毒〔時珍曰〕寒多服瀉人 治欬逆上氣喉

痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆飲食大熱 本治

老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣 別 醋磨

塗毒腫 景 治疰氣消瘀血通女人月閉 甄 消痰破癥

結胸膈滿腹脹氣欬疰癖開胃下食鎮肝明目 大治

肺氣喉痺為佳 宗 去胃中癭瘡 元 利積痰疰毒消結

核震 降寶火利大腸治瘡母 時 穀曰以米泔水浸 珍 一夜瀝出以篋竹

葉煮之

日乾用

發明 震亨曰一行太陰厥陰之積痰使結核自消 甚捷又治便毒此足厥陰濕氣因疲勞而發取

三寸與生薑同煎食前服利三兩行甚效時珍

曰能降火故古方治喉痺咽痛為要孫真人千

金方治喉痺有烏扇膏金匱玉函治欬而上氣喉中

作水 有麻黃湯又治瘡母斃甲煎丸亦用

烏扇燒過皆取其降厥陽相火也火降

則血散腫消而淡結自解癥瘕自除矣

方 咽喉腫痛 為末吹之如神 傷寒咽閉 腫

用生 猪脂各四兩合煎令焦去 喉痺不通 水漿

渣每含枣許取瘥 龐安常傷寒論 喉痺不通 不入

者外臺用 舍之燕汁 醫方大成用 一錢黃芩

細 嚥之大腑動即解 便民方用 一錢黃芩

射干 烏尾

十九

甘草各五分
末服立愈
二便不通
諸藥不效紫花一一生水邊者佳研汁一椀服之立通

普濟大腹水蠱
搖動有聲皮膚黑方同上極效
陰疝刺痛
發時腫痛如刺

生一搗汁服取便
亦可丸服
肘後
乳癰初腫
一一根如僵蚕者同萱草根為末蜜調傳

之神效
永類
中射工毒
生瘡者一升麻各二兩水煎溫服滓傳之
姚僧坦集驗方

鳶尾
根名鳶頭

集解
孔景曰方家言是射干苗而主治亦是當別

草不題
恭曰所在有之葉似射干而濶短不抽長

莖花紫碧
色根似高良薑皮黃肉白嚼之戟人喉

與射干全別
射干花紅抽莖長根黃有白保昇曰草名鳶尾根名鳶頭葉似射干布地生黑根似高

良薑而節大
數箇相連時珍曰此即射干之苗非別一種也肥地莖長根粗瘠地莖短根瘦其花自

時珍曰足厥陰肝經藥

有數色諸家
皆是強分

苦平有小毒治蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去

水下三蟲經本殺鬼魅治頭眩別錄

蚤休又名紫河車圖經重臺唐本重樓金線同上草
甘遂同上虫休別錄螫休日華三層草綱目七

葉一枝花蒙
荃白甘遂

集解恭曰今謂金線重樓者是也南人名為甘遂
一莖六七葉似王孫鬼白蔴麻輩葉有二三

層根如肥大菖蒲細肌脆白保昇曰年久者二三

重根如紫參皮黃肉白五月采根大明曰根如尺

二蜈蚣大如肥紫菖蒲頌曰即紫河車也今河中

河陽華鳳文州及江淮間亦有之葉似王孫鬼白

等作二三層六月開黃紫花蕊赤黃色上有金絲

垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉白宗奭曰一一

蚤休

二十

無旁枝止一莖挺生高尺餘顛有四五葉，有歧似苦枝中心又起一莖亦如是生葉惟根入藥時珍曰重樓金線處，有之生於深山陰濕之地一莖獨上莖當葉心葉綠色似芍藥凡二三層每層七葉莖頭夏月開花一花七瓣有金絲蕊長三四寸王屋山產者至五七層根如鬼臼蒼朮狀外紫中白有粘糯二種外丹家采制三黃砂承詒云七葉一枝花深山是我家癩疽如過此一似手拈拿也

根苦微寒有毒天明曰治驚澗搖頭弄舌熱氣在腹冷無毒

中本經癩疾瘡除蝕下三虫去蛇毒別錄生食一升利

水唐本治胎風手足搐能吐瀉瘰癧大明去瘡疾寒熱時珍

時珍曰入藥洗切焙用

發明 恭曰醋磨傳應腫蛇毒甚有效時珍曰一足厥陰藥也凡本經驚癇瘡疾瘰癧腫者宜之

方 **小兒胎風** 手足搐搦用一一為細末每服半錢冷水下 易簡 **慢驚抽搐**

帶陽症者白甘遂末即一一錢天花粉末二錢同於慢火上炒焦黃研勻每服一字煎射香薄荷湯下

乙方 錢

馬藺子 又名蘇實本經荔實別錄馬棟子國經馬藺禮記註馬帚爾雅鉄掃帚救荒草本經早蒲禮記承首

本經三堅

集解 頌曰陝西諸郡及澧州亦有之近汴尤多葉似蕪而長厚三月開紫碧花五月結實作

角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷五月采實許慎說文云荔似蒲而小根可為刷高誘云河北平澤多生之江東亦多種於階庭呼為早蒲不知即馬藺也時珍曰一一生荒野中

馬藺子

三一

就地叢生一本二三十莖苗高三四尺葉中抽莖
開花結子○宗奭曰陶隱居言方藥不用無識者
本草諸家所註不相應若蠶寶果是馬蘭則日華
不當言可為蔬蓋馬蘭葉硬又無味牛馬皆不食
豈堪人食不敢以蠶寶為馬蘭更俟博識時珍曰
別錄蠶寶亦名荔寶則蠶乃荔之訛也張揖廣雅
云荔又名馬蘭其說已明又救荒本草言其嫩苗
苦味燥熟換水浸去苦味油鹽調食則馬蘭亦可
作菜矣寇氏據陶
說疑之欠考矣

甘平無毒保昇曰寒頌曰山治皮膚寒熱胃中熱氣

風寒濕痺堅筋骨令人嗜食本經止心煩滿利大小便

長肌肉別錄治金瘡血內流及癰腫有效恭婦人血氣

煩悶產後血運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癩

止鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃病殺蕈毒傳蛇蟲

咬毒大明治小腹疝痛腹內冷積水痢諸病時珍

時珍曰入藥炒過用

治亦則醋拌炒之

方 諸冷極病醫所不治者一升九升洗淨空腹服一合酒下日三服 千金 寒

疝諸疾寒疝不能食及腹內一切諸疾消食肥肌一升每日取一把麩拌煮吞之服盡愈

姚僧喉痺腫痛衛生易簡用蠶實一合升麻五分水一升煎三合入少蜜攪勻細啣

大驗○聖惠用一升二升升麻一兩為末密丸水服一錢○又一一八錢牛旁子六錢為末溫水服

方寸 水痢張文仲脩急方用一以六月六日麩炒等分為末空心米飲服方寸匕常麩亦

可牛骨灰亦可○又方一一乾薑川連各等分為散熱湯服二方寸匕入腹即斷也冷熱皆治常用神

馬蘭子 蓖麻子

三

驗不得輕之
 腸風下血
 冬七日晒乾何首烏半斤雄
 黃雌黃各四兩為末以浸藥酒打糊丸桐子大
 每服三十九溫酒下日三服甚效 普濟方

蓖麻子

集解 時珍曰其莖有赤有白其葉大如蓀葉每葉
 凡五尖夏秋間極裏抽出花穗纍纍黃色每

枝結實數十顆上有刺攢簇如帽毛而軟凡三四
 子合成一顆枯時劈開狀如巳豆殼內有子大如
 豆殼有斑點其狀如牛惶殼中仁白如續隨
 子仁壓油可作印色子無刺良有刺者毒

甘草平有小毒治水癥以水研二十枚服之吐惡沫

至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡

痒浮腫尸瘡惡氣取油塗之
唐本 研傅瘡疥癩塗于

常曰能利氣故治水癥浮腫

足心催生大治癰癧取子炒熟去皮每卧時嚼服二

三枚漸加至十數枚有效宗主偏風不遂口眼喎邪

失音口噤頭風耳聾舌張喉痹齁欬脚氣毒腫丹瘤

湯火傷針刺入肉女人胎衣不下子腸挺出開通關

竅經絡能止諸痛消腫追膿拔毒時珍

發明震亨曰一一屬陰其性善收能追膿取毒外

膠血者用之時珍曰一一甘辛有毒熱氣味頗近

巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開通諸竅經

絡故能治偏風失音口噤口目喎斜頭風七竅諸病

不止於出有形之物而已蓋鵝鵝油能引藥氣入內
一一油能拔病氣出外故諸膏多用之一人病偏
風手足不舉時珍用此油同羊脂射香穿山甲等藥
蓖麻子

煎作摩膏日摩數次月餘漸復兼服搜風化痰養血之劑三月而愈一人病手臂一塊腫痛亦用一一搽膏貼之一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搽貼太陽穴一夜痛止一婦產後子腸不收搽仁貼其丹田一夜而上此藥外用屢奏奇功但內服不可輕率耳或言搽膏以筋點于鸞鴨六畜舌下即不能食有壽可知矣

方 口眼喎邪 搽貼左貼右：貼左即止○婦人良方用一一七：粒搽餅石喎安左

手心左喎安右手心以銅盃盛熱水坐藥上冷即換五六次即正也○一方用一一七：箇巴豆十九

箇射香五分 風氣頭痛 不可忍者乳香一一一分 研如上用 法 研餅隨左右貼太陽穴解髮

出氣 甚效 一種頭風 一大塊搽如泥糊丸彈子大線穿掛

風慶陰乾用時先將好茶末調成膏塗碗內火燒前藥烟起覆盞薰之待烟盡以百沸蔥湯點碗茶末服

之以被裹頭臥取

汗避風 袖珍

鼻塞不通

一 一 三五粒大冬一枚去皮搗勻綿裹塞之

一日一易

天柱骨倒

小兒疳疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋散貼之木

聖濟

蠶子六箇去壳 一 一 六十粒去壳研勻先將

舌上

包頭擦頂上令熱以津調藥貼之

鄭氏小兒

出血

一 一 油煎紙燃燒烟熏鼻中自止 摘元方

舌脹滿口

一 一 一 四十九粒去壳研

油作紙撚燒烟熏之未退再熏有

急喉痺塞

牙閉緊急不通

人舌腫出口用此而愈

經驗

用此即破研 一 一 紙捲作筒

水氣脹滿

一 一 仁研水解得

燒烟熏吸之即通名聖烟筒

三合清旦一頓服盡日中當下青黃

催生下胎

一 一 七

水也或云壯人只可五粒 外臺

箇研塗足心若胎及衣下連洗去恐子腸挺出若子

腸挺出即以此塗頂心則腸自入也 崔元亮海上

方。或以 一 一 二粒巴豆二

一切腫毒

一 一 一 痛不可忍

粒射香一分研貼臍中並足心

蓖麻子

三四

傳即止
肘後 癰風鼻塌 手指攣曲節間痛不可忍漸至脫

劉豆大以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五日取一二枚劈破以浸藥水吞之漸加至四五粒微利不妨瓶中水盡更添兩月後吃大蒜猪肉試之如不發是效也若發動再服 不發乃止 杜

壬 癩癰結核 生不可吃炒豆犯之脹元 阮氏方
一 一 炒去皮卧時服一二枚取效一

耳卒聾閉 小兒乳汁和丸作錠綿裹一枚塞之覺耳
一 一 百粒去壳大棗十五枚搗爛入乳

內熱為度日一易二 針刺入肉 一 一 搗爛共以帛
十日效 千金方 刺傷處傳之頻看若

刺出即拔去惡勞出好肉或加 魚骨鯁 研爛入百
白梅肉同研更妙 衛生易簡 一 一 仁

藥煎研丸彈子大并 惡犬咬傷 一 一 五十粒研膏
花水化下半丸即下 先以鹽水洗咬處乃

貼此膏 小兒丹瘤 一 一 五枚研入麩一匙
見袖珍方 塗之甚效 修真秘旨

希雍曰病人元氣虛弱者禁用
馮舉曰玉樞丹中用之見山慈姑下

續隨子

又名千金子 開寶千兩金日華一薩豆同上
拒冬開寶聯步

集解

志曰一一生蜀郡處有之苗如大戟頌
曰今南中多有北土產少苗如大戟初生一

莖之端生葉中復出葉花亦類大戟自葉中抽
幹而生實青有殼人家園中多種以為飾秋種冬

長春秀秋實時珍曰莖

中亦有白汁可結水銀

卓溫有毒治婦人血結月閉瘀血癥瘕疾癖除蠱毒

鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡物滯物開積寶

聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾碎研酒服不過三

粒當下惡物蜀本宣一切宿滯治肺氣水氣日服十粒

瀉多以酸漿或薄醋粥吃即止又塗疥癬瘡大明

續隨子

三五

時珍曰去殼取色白者以紙壓去油取霜用

發明 頌曰 下水最速然有毒損人不可過多
時珍曰 與大戟澤漆甘遂莖葉相似主

治亦同其功皆長於利水惟在用之得法亦皆要藥也

方 小便不通

臍腹脹痛不可忍諸藥不效者不過再服 去皮二兩鉛丹半兩蜜

搗作團瓶盛埋陰處臘月至春末取出研蜜丸梧子大每服二三十丸木通湯下化破尤妙急用亦可旋

合 聖 水氣腫脹 一兩去殼研壓去油重研分濟按錄 作七服每治一人用一服丈夫酒

下婦人荆芥湯下五更服之當下利至曉自止後以厚朴湯補之忌鹽醋百日乃不復作 斗門 陽

水腫脹 炒去油二兩 大黃一兩 為末水丸 綠豆大每白湯下五十丸 摘元方

狼毒

集解

別錄曰：一、生秦亭山谷及秦高陳而沉水者良。弘景曰：宕昌亦出之。或言止有數畝地。

生蝮蛇食其根故為難得。亦用太山者。今用者出漢中。及建平云與防葵同根。但沉水者是。一、浮

者是防葵。俗用亦稀為療腹內要藥耳。恭曰：今出秦州。成州秦亭原在二州之界。此物與防葵都不

同類。生處又別太山。漢中亦不聞有。陶說謬矣。志曰：一、葉似商陸。及大黃。莖葉上有毛。根皮黃肉

白。以實重者良。輕虛者劣。秦亭在隴西秦高。是太山下。縣陶云沉者是。一、浮者是防葵。此不足為

信。假使防葵。秋冬采者堅實。見水皆沉。一、春夏采者輕虛。得水亦浮。且二物全別。不可比類。此與

麻黃、檣皮、半夏只實。吳茱萸、芫花為六陳也。保昇曰：根似元參。虛浮者劣。頌曰：今陝西州郡及遼石州亦

有之。狀如馬志所說。時珍曰：一、出秦晉地。今人往往以草藺茹為之。誤矣。說見藺茹。

根辛平有大毒

大明曰

治欬逆上氣破積聚飲食寒

根毒

熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸本經除

胸下積僻別錄治痰飲癥瘕殺鼠大明合野葛納耳中治

聾抱朴子

之才曰大豆為之使宜醋炒

惡麥句薑畏占斯蜜陀僧

方 心腹連痛 作服用 一 二兩 附子半兩 搗篩蜜丸 梧子大 一日服一丸 二日二丸 三

日三丸止 又從一丸起至 九種心痛 一蟲二蛙三風

三丸止以瘥為度 肘後 四悸五食六飲

七冷八熱九氣也 又治連年積冷流注心胸及落馬

墜車瘀血中惡等症 九痛丸用 一 臭香吳萸湯泡

巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩 附子炮去皮

三兩為末蜜丸 桐子大 每空心溫酒下一丸 和劑

局 腹中冷痛 水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴

轉逆害飲食用 一 三兩 附子一兩 旋

覆花三兩搗末蜜丸梧子大每服
三丸食前白湯下日三服 肘後陰疝欲死 九縮入
腹急痛

欲死狼毒四兩防風二兩附子三兩燒以蜜丸
梧子大每服三丸日夜三度白湯下 肘後方 兩脇

氣結 方同腹中 一切蟲病 一末一錢錫一皂子大
沙糖少許水化開卧時空

腹服之次早 乾濕蟲疥 搗爛以猪油馬油調搽
方睡勿以被蒙頭卧恐藥氣

傷面也 蘭 積年乾癬 搽之黃水出 一 惡疾風瘡
氏經驗方 末塗之 聖惠

一 秦芫等分為末每服方寸 積年疥癩 一 一兩
匕温酒下日一二服 千金 半生半炒

研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津
液擦化為末以清油浸藥高一寸三日待藥沉油清

過夜不見灯火蘸油塗瘡上仍以口鼻
於藥蓋上吸藥氣取效 永類鈴方

防葵 又名房苑別錄梨蓋本經 利茹 吳普

狼毒 防葵 三七

集解

恭曰根葉似葵瓜子根香味似防風故名
此物亦稀有襄楚山東及興州西方有

之興州者勝頌曰今惟出襄陽地他郡不開也葉

似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花

如蔥花景天草而色白六月開花即結子根似防

風香味亦如之依時采者乃沉水今多用枯朽狼

毒當之誤矣時珍曰唐時隴西成州貢之蘓頌所

說詳明可據弘景曰今用建平者本與狼

毒同根猶如三建其形亦相似但不沉水耳而狼

毒陳久者亦不沉水矣璣曰凡使勿誤用狼

毒真相似須審之恐誤人疾生葵州沙土中

采得二十日使生蚱用之惟輕為妙恭曰與

狼毒都不同類生處亦別藏器曰二物一是上品

一是下品形質又別陶氏以浮沉為別後人因而

用之將以破堅積為下品之物

與狼毒同功古今因循殊為謬誤

根辛寒無毒

別錄曰甘苦權曰有小毒

治疝瘕腸洩膀胱熱結瀉

不下欬逆濕瘖癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕

身本經療五臟虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志

中火者不可服令人恍惚見鬼別錄久服主邪氣驚狂

蘇恭治瘰癧氣塊膀胱宿水血氣疔大如筮者悉能消

散治鬼瘡百邪鬼魅精怪通氣甄權

甄曰揀去艸末甘草湯浸一宿暴乾用黃精汁拌土器中炒至汁乾用

發明時珍曰一乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言無毒獨別錄言中火者服之

恍惚見鬼陳延之小品方云一一多服令人迷惑恍
惚如狂按難經云重陽者狂脫陽者見鬼是豈上品
養性者所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及
蘇恭所列者是一一功用而別錄所列乃似一一之
防葵 木鼈子

常山入外科

狼毒之功用非一一也狼毒之乱一一其來已遠不可不辨古方治蛇瘕蟹瘕大方中多用一一皆是狼毒也

木鼈子

又名木鱗

集解

志曰出朗州及南中頌曰今湖廣諸州及杭

越皆有之春生苗作藤生葉有五極狀如山

藥青色面光四月生黃花六月結子似枯樓而極

大生青熟紅黃色肉上有軟刺每一實有核三四

十枚其狀扁而如鼈嶺南人取嫩實及苗葉作茹

蒸食宗奩曰一一子蔓歲一枯但根不死春旋生

葉苗如葡萄其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄

相合麻縛定及生去雄者方結實時珍曰核形扁

大如圓甚子仁

青綠色去油者

仁甘溫無毒

時珍曰苦微甘有小毒

治折傷消結腫惡瘡生肌

〔布雅曰〕為散血無除癰毒之要藥夫結腫惡瘡疔痛乳癰等症皆血熱所致折傷則血亦瘀而發熱甘溫能通行經絡則血熱散而諸症愈矣其止痛者指濕熱客於下部所致而非腎虛為病之比也用者詳之

主治治耳卒熱腫一兩赤小豆大黃各半兩為末每以少許生油調搽

止腰痛除粉刺黧婦人乳癰肛門腫痛開寶醋磨消

腫毒大治疔積痞塊利大腸瀉痢痔疣癩癰時珍

發明機曰按劉續靈雪錄云一有壽不可食有

猪肉食之其長子當夜死次子明日死因著以為戒

時珍曰南人取其嫩苗及實作蔬食無恙則其毒未應至此或者與猪肉不相得或犯他物而然不可盡咎一也

方陰疝偏墜痛甚者一箇醋磨調黃柏芙蓉末傳之即愈壽域神方

瘡有母一穿山甲炙等分為末腹中痞塊仁

五兩猪猪腰子一付批開入藥在內定煨熟搗爛

入黃連細末三錢蒸餅丸綠豆大每服三十九醫

方集小兒疳疾一仁使君子仁等分研泥米飲成丸芥子大每服五分米飲下集效

木鼈子者木鼈

二十九

肛門痔痛

孫氏秘寶方用一仁三枚研如泥入百沸湯一盞乘熱先熏後洗日用三次仍

塗少許○瀨湖集簡方用一仁帶潤者雌雄各五枚乳細作七丸益覆濕處勿令乾每以一九唾化

開貼痔上其痛即止一夜一九自

療癰經年

二箇去

消也嘗用此方治人屢有效驗

油研以子白和入瓶內安瓶中蒸

小兒丹瘤

一仁

熟食後食之每日一服半月後必效

研泥醋調塗之日三五上效

風牙腫痛

一仁磨醋搽之普濟

番木鱉

又名馬錢子綱目

集解

時珍曰一仁生回國今西土印州諸處

皆有蔓生夏開黃花七八月結實如枯樓生

青熟赤亦如木鱉其核小於木鱉而色白彼人言

治百二十種病每證各有湯引或云以豆腐制過

用之

良

仁苦寒無毒治傷寒熱病咽喉痺痛消痞塊並含嚙

汁或磨水噙嚙能毒犬

時珍

方 喉痺作痛

一 青木香山豆根等 醫方摘要 經喉風

一 仁一箇木香三分同磨水調熊胆三分胆 醫方摘要 唐珙經驗方

白頭翁

一名野丈人 本經 胡王使者 同上 奈何草 別錄

集解

弘景曰 處：有之近根處有白茸狀似白頭 老翁故名 恭曰 葉似芍藥而大抽一莖三頭

開花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸許許 披下似纛頭正如白頭老翁故名陶言近根有白

茸似不識也太常所貯蔓生者乃是女萎 根似續斷而扁 保昇曰 所在有之有細毛不滑澤

花蕊黃二月采花四月采實八月采根 頌曰 處： 有之正月生苗作叢生狀似白微而柔細稍長葉

菴木醫

白頭翁

三十

東垣曰 苦堅腎頌曰 補下焦 鳴皋曰 觀其

治痢及疝是肝腎二經藥也

昂曰 入陽明二經血分 大腸胃

鳴皋曰 或云近藥肆中所市者皆防風根

俟考察

昂曰涼血

希雅曰本經味苦溫吳綾益以辛寒詳其

所主似為得之東垣謂其氣厚味薄既能

入血主血應云氣味俱厚可升可降陰中

陽也入手足陽明經血分暑伏足陽明經

則發溫瘧伏手陽明經則病毒痢滯下純

血狂易鼻衄者血熱也寒熱者血瘀也癥

瘕積聚癭瘰癧不由血凝而成金瘡血涼

則痛自止苦能下泄辛能解散涼能除熱

生莖頭如杏葉上有細白毛而不滑澤近根處有

白茸根紫色深如蔓菁其苗有風則靜無風自搖

與天麻獨活同也陶註未述莖葉蘇恭言葉似芍

藥實如鴉子白毛寸餘者誤矣宗奭曰一一一生

河南洛陽界其新安山野中嘗見之正如蕪恭所

說山中人賣一一九言服之壽考不失古人命

名之義陶氏所說失於不審宜其排叱也機曰寇

氏以蕪氏為是蘇頌以陶說為是大抵此物用根

命名取像當以蕪頌圖經

為淮恭說恐別是一物也

根苦溫無毒

別錄曰有毒吳綾曰苦
辛寒權曰甘苦有小毒

主治溫瘧狂易

寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止腹痛療金瘡

本經鼻衄別錄

止毒劑

孔景

赤痢腹痛齒痛百節骨痛項下瘤癭

甄權一

切風氣暖腰膝明目消疣贅

大明

涼血始散熱涼血行瘀之要藥歟
子接曰得秦皮連栢治厥陰熱痢

北京人謂之赤土音讀如和包兒

權曰豚實為之使大明曰

得酒良花子莖葉同功

發明

頌曰俗醫合補下藥甚驗果曰氣厚味薄可升
可降陰中陽也仲景治熱痢下重用一一湯

主之蓋腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純
苦之劑堅之男子陰疝偏墜小兒頭禿羶腥及鼻衄

無此不效毒痢有此獲功

緩曰毒痢紫血鮮血宜之

方 白頭翁湯

治熱痢下重用一一二兩川連黃
栢秦皮各三兩水七升煮二升每服

一升婦人產後痢虛極者加甘
草阿膠各二兩 金匱玉函方 下痢咽痛 春夏病此

川連各一兩木香二兩水五
升煎一升半分三服 聖惠 陰癩偏腫 搗敷當作瘡

愈 外痔 根搗敷逐 小兒禿瘡 方同上

外臺 外痔 血止痔 易簡 肘後

王瓜 又名土瓜 本經老鴉瓜 圖經赤雹子衍義野甜

瓜 細目 師姑草 土宿馬 飽瓜 公公鬚

番木籠 王瓜 三十一

昂曰通乳藥多用之
 又曰經疏云能除濕熱、毒略同枯樓但
 此則入血分諸病為多耳傷寒症發斑用
 根搗汁和伏龍肝末服之甚效

集解

弘景曰土瓜生羅院間子熟時赤如彈丸鄭
 康成註月令王瓜生以為蒺藜殊謬矣恭曰

葉似枯樓葉但無叉缺有細毛刺五月開黃花花
 下結實如彈丸生青熟赤根似葛而細北方者其
 子纍、相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不
 同若治黃疸破血南者大勝宗奭曰——其殼經
 寸長二寸許上微圓下尖長七八月熟時紅赤色
 殼中子如螳螂頭者今人謂之赤雲子其根即土
 瓜根也時珍曰——三月生苗其蔓多鬚嫩時可
 茹其葉圓如馬蹄而有尖面青背淡澀而不光六
 七月開五出小黃花成簇結子纍、熟時有紅黃
 二色皮亦粗澀根不似葛但似枯樓根之小者江
 西人栽之沃土取
 根作蔬味如山藥

根苦寒

權曰平葷器曰有
 小毒能吐下人

治消渴內痹瘀血月閉寒

熱酸痛益氣愈聾

本經
 療諸邪氣熱結鼠痿散癰腫留

血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨

節中水治馬骨刺人瘡別錄天行熱疾酒黃病壯熱心

煩悶熱勞排膿撲損瘀血破癥癖落胎大明主蠱毒小

兒閃癖痞滿痰瘡并取根及葉搗汁少服當吐下

藏器利大小便治面黑面瘡時珍

方 小兒發黃 一 根生搗汁三合與服 黃疸變黑

醫不能治用 一 根汁平旦溫服 一 小 小便如汁 乃

升午後黃水嘗從小便出不出再服 小 便如汁 腎

虛也 一 散用 一 根 一 兩 白 石 脂 二 兩 兔 絲 子 酒

浸 二 兩 桂 心 一 兩 牡 蠣 粉 一 兩 為 末 服 二 錢 大 麥 粥

飲下 衛 乳 汁 不 下 一 根 為 末 酒 服 一 經 水 不 利

生寶鑑 錢 日 三 楊 氏 產 乳

玉瓜

三十三

帶下少腹滿或一月再見者一一根散主之一一
芍藥桂枝麩虫各三兩為末酒服方寸匕日三
仲

師金 婦人陰癩 方同 一切漏疾 一
根搗 傳 千金 面上疥瘡

復洗之百日光射射人夫妻不相識也極效 見肘
後

方

子酸苦平生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸

風瀉血赤白痢

大 主蠱毒 甄 反胃吐食 時
明 權 珍

方 消渴飲水

電瓜去皮每食後嚼三兩
杖五七度瘥 聖惠方

傳尸勞瘵

王瓜焙為末每酒服

反胃吐食

馬電兒灯上燒存性
一錢入好枣肉平胃

散末二錢酒服食即

痰疾頭風

懸枯棧一箇赤電子
七箇焙大力子四兩

可下 丹溪算要

薛珍曰陽明衝任之藥
多血

曰曰陽明多氣

焙為末每食後或茶或酒

服三錢忌動風發熱之物

筋骨攣痛為末酒下一錢

日二服

集簡赤目澀痛不可忍小圓瓜數羅上大如彈丸

乾槐花炒赤芍藥等分為末每服

二錢臨卧温酒下衛生家寶方

為末好酒空心

服二錢集簡大腸下血

子大米飲下三

十九 指南方

王不留行

又名禁宮花日華剪金花日華金盞銀臺

集解

弘景曰今處有之葉似酸漿子似菘子人

有之葉似菘藍花

黑似菘子大如黍米根苗花子並用

並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸根黃色如

薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃

王瓜 王不留行

三十三

希雍曰其氣溫而無毒苦能洩辛能散甘入血溫能行故主金瘡止血逐痛除風痺內寒及瘰癧產難等症入血活血之要藥也若夫心煩鼻衄應是血分熱病非同涼血藥用未見其可也入足厥陰經

又曰孕婦忌之

亦賓曰味苦性平乃陽明衝任血海之藥

也治風毒通血脈瘰癧產下乳利小便除

風濕痺痛及衄血瘡疽風疹等症

子接曰功專通血脈瘰癧瘡瘍

紫葉隨莖而生如菘子狀又似猪藍花俗謂之剪金草河北生者葉圓花紅與此小別時珍曰多生麥也中苗高者一二尺三四月開小花如鈴鐸狀紅白色結實如灯笼草子殼有五稜殼內包一實大如豆實內細子大如菘子生白熟黑正圓如細珠可愛陶氏言葉似酸漿蘓氏言花如菘子狀者皆欠審以子為花葉狀也灯笼籠草即酸漿苗子皆入藥

苗子苦草元素曰治金瘡止血逐痛出刺除風痺內

寒止心煩鼻衄瘰癧惡瘡癩乳癰婦人產難久服輕

身別錄治風毒通血脈甄權遊風之疹婦人經血不勻發

背日下乳汁元素利小便出竹木刺時珍蒸熟漿水

發明元素曰能走血分乃陽明衝任之

希雅曰同漏芦貝母山甲青皮沒藥山慈姑山豆根括樓根治乳癰乳岩同山甲

藥俗有穿山甲王不留婦人服之乳常流之語可見其性行而不住也按王執中資生經云一婦人患淋叶久諸藥不效其夫夜告予按既效方治諸淋用剪金花十餘葉煎湯遂令服之明早來云病減八分矣再服而愈剪金花即一一一是也頌曰張仲景師治金瘡有一一一散貞元廣利方治諸風產有

湯皆最效

方 鼻衄不止 一一一 連莖葉陰乾煎 糞後下血 濃汁溫服立效 指南

服一錢 末水 金瘡亡血 傷亡血用一一一十分

八月八日採蒴藿細葉十分七月七日採桑東南根白皮十分八月三日米川椒三分甘草十分黃芩乾薑芍藥厚朴各二錢以前三味燒存性後六味為散合之大瘡飲服方寸匕小瘡但粉之 金匱要略方

婦人乳少 因氣鬱者湧泉散一一一穿山甲炮龍骨瞿麥穗麥冬等分為細末每服一錢酒

王不留行 葵

白芷通草猪蹄煮服下乳汁

調下後食猪蹄湯仍以木梳二乳日三 衛生寶鑑 頭風白屑 一一一香白芷等分為末乾

搽一夜篋 聖惠 癰疽惡瘡 一一一湯治癰疽黏乳月蝕白禿及面上久瘡去虫止痛用

一一一東南桃枝東引茱萸根皮各五兩蛇床子牡荊子苦竹葉蒺藜子各三升大麻子一升以水二

斗半煮一斗 丁腫初起 一一一子為末燬酢丸黍米大每服一丸酒下汗出即

愈 集 誤吞鉄石骨刺 不下危急者一一一黃柏簡方 等分為末湯浸蒸餅丸彈子

大青黛為衣線穿懸風處每用一丸冷水化服 百一

蔡 弘景曰以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵春葵子不堪入藥 又名露葵 綱目 滑菜

集解 恭曰此即常食之葵也 頌曰苗葉作菜茹甚甘美冬葵子古方入藥最多又有蜀葵錦葵

黃葵終葵芫葵皆有功用 時珍曰葵菜古人種為常食今之種者頗少有紫莖白莖二種以白莖為

勝大葉小花，紫黃色其最小者名鴨脚葵其實大如指頂皮薄而扁實肉子輕虛如榆莢仁四五
月種者可留子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年收採正月復種者為春葵然宿根至

春又
生

苗甘寒滑其心傷人別錄脾之菜也宜脾利胃氣滑大

腸思宜導積滯妊婦食之胎滑易生頌煮汁服利小

腸治特行黃病乾葉為末及燒灰服治金瘡出血甄權

除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒熱毒下痢丹

毒並宜食之汪穎服丹石人宜食孟詵潤燥利竅功與子

同

葵

時珍曰食葵須用蒜無蒜勿食凡被犬咬者永不可食之即發能伏硫黃頌曰作菜茹食甚美但性滑利不益人說曰其性雖冷若熟食之令人熱悶動風氣四月食之發宿疾天行病後食之令人失明霜葵生食動五種留飲吐水凡服百藥忌食其心心有毒也黃背紫莖者勿食之不可合鯉魚黍米食之

人

發明

張從正曰凡久病大便瀉滯者宜食葵菜自然通利乃滑以養竅也時珍曰按唐王燾外臺秘

要云天行斑瘡須火遍身皆帶白漿此惡毒氣也高宗永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜薑咬之則止又聖惠方亦云小兒發斑用生葵菜葉絞汁少與服散惡毒氣按此即今痘瘡也今治法惟恐大便頻洩傷其元氣痘不起發而昔人用葵菜滑竅以利二便豈古今運氣不同治法亦異歟

方

天行斑瘡

見發

肉錐怪疾

有人手足忽生倒生肉刺如錐痛不可忍

者但食葵菜即愈
見夏子益怪症奇方
諸癭不合
先以泔清溫洗拭淨
取葵葉微火烘暖貼

之不過二三百葉引膿盡即
內生忌猪魚蒜房事
必效
湯火傷瘡
搗傳之
丹
食物本草

石發動
口乾效嗽者搗汁服一
蓋便卧少時
食療

根甘寒治惡瘡瘰淋利小便解蜀椒毒
別錄
小兒吞錢

不出煮汁飲之神妙
甄權
治疔瘡出黃汁
孟利竅滑胎

止消渴散惡毒氣
時珍

方 二便不通
脹急者生冬葵根二斤搗汁三合生
薑四兩取汁一合和勻分服連用即

通 消中尿多
日夜七八升冬葵根五斤
煮汁平旦服二升
外臺
漏胎下血
盡

子死葵根莖燒灰酒
服方寸匕
千金
癰疽惡瘡
肉中忽生一豨子大
如豆粟或如梅李或

葵 冬葵子
三五

赤或黑或白或青其鱗有核：有深根應心能爛筋
骨毒入藏腑即殺人但飲葵根汁可折其熱毒 姚

僧坦集 根莖及子為末 出黃汁

驗方 妬乳之瘡 酒服 產寶 身面疔瘡 者根燒

灰和猪脂塗 口吻生瘡 用經年葵根燒 外臺

之 食療 灰傳之 外臺

冬葵子甘寒滑治五臟六腑寒熱羸瘦五癢利小便

本經 治婦人乳內閉腫痛 別錄 出癰疽頭 孟洗 下丹石毒 弘景

通大便消水氣滑胎治痢疾 時珍曰黃 珍 苓為之使

發明 時珍曰葵氣味俱薄淡滑為陽故能利竅通乳
消腫滑胎也其根葉與子功用相同按陳自明

婦人良方云乳婦氣脉壅閉乳汁不行及經絡凝滯

奶房腫痛留蓄作癰毒者用一一炒香砂仁等分

為末熟酒服二錢此藥滋氣脉通營
衛行津液極驗乃上蔡張不愚方也

方大便不通

十日者用後用一升三升
水四升煮一升服○聖惠用一升

為未人乳

關格脹滿

欲死者時後用一升二升水
四升煮一升納豬脂一雞子大

頤服○

千金用一升末豬

血淋

任服 煮汁任娠

脂和丸

桐子大每服五十九

血淋

任服 千金

不通

一合朴消八分水

妊娠水腫

身重小便不利

惡寒起即頭眩用

一升茯苓等分為散飲服方寸

七日三小便利則愈

轉脖子加髮灰神效 金匱

生產困悶

效有人服此登廁兒撲廁中 倒生 妙黃為

末酒服二錢神

效 啓殷產寶

乳汁不通

見發

胎死腹中

酒服方寸

口噤者灌之

即甦

胞衣不下

一兩煎服 千金 血痢產

冬葵子

蜀葵

三七

藜音

荊 一 一 每服二錢入臘茶 疥瘡邪熱 為末酒服二

錢良 聖惠方 瘡疽無頭 孟詵曰三日後取 一 一 二百粒 水吞之當日即破也 〇經驗云吞

一粒即破一頭吞 傷寒勞復 一 一 一 二升梁米一升 二粒即破二頭 煮粥食取汗立安 聖

方

蜀葵 又名戎葵 爾雅 吳葵 蒼 爾雅

集解 頌曰 一 一 似葵花如木槿花有五色小花者 名錦葵功更勝 時珍曰 一 一 處三種之宿根

嫩苗時亦可茹食葉似葵葉而大亦以絲瓜葉有 歧又莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫

黑白色千葉單葉之異惟紅白二色入藥其實大 如指頂皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及燕薹仁輕

虛易種其楷剥皮可緝布作繩一種小者名錦葵 即荆葵也爾雅謂之荻花大如五銖錢粉紅色有

紫樓

文

苗甘微寒滑除客熱利腸胃思煮食治丹石發熱及

熱毒下痢藏滑竅治淋潤燥易產時搗塗火瘡燒研

傳金瘡大

根莖治客熱利小便散膿血惡汁藏

發明宗藥曰一一紅色單葉者根陰乾治帶下排膿

若被犬咬者食之永不瘥也李

廷飛曰合猪肉食令人無顏色

方 淋痛 一一根洗對水煎五 血淋 一一根二錢車

服 簡 腸胃生瘕 懷忠丹治內瘕有敗血腥穢殊甚

便單方

蜀葵

紅——根白芷各一兩白枯礬白芍各五錢為末黃蠟溶化和丸梧子大空心米飲下二十九丸膿血出盡

補以十宣 諸瘡腫痛 不可忍者——根去黑皮

散 坦仙 搗爛井華水調貼 普濟

花賊寒 禹錫曰 甘冷 理心氣不足 別錄 小兒風疹痲瘡 嘉祐 治

帶下目中溜火和血潤燥通竅利大小腸 時珍

發明 元素曰 ——花赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥皆取其寒滑潤利之功紫

者入烏 鬚藥用

方 二便關格 脹悶欲死——花一兩搗爛入射香半錢水煎服 痰瘡邪熱

——花白者陰乾為末服之午日 取花按手亦能去瘡 圖經本草 婦人帶下 臍腹冷痛面色

痿黃日漸虛困——花一兩陰乾為末温酒服二錢赤帶用赤白帶用白 聖惠方

鳴鼻曰即今俗名秋葵者是也

子甘冷治淋澀通小腸催生下胎療水腫及一切瘡

疥並癩疵赤壓大明

發明

時珍曰按楊士瀛直指方云一一子炒入宣毒藥中最驗又催生方用子二錢滑石三錢為末

順流水服

五錢即下

方石淋

端午日取葵子炒研酒下一錢當下石出

聖惠

瘰癧無頭

用子為末

水調傳

經驗後方

黃蜀葵花

集解

時珍曰黃葵葉如蓖麻葉深綠色開歧又有五尖如人瓜形旁有小尖六月開花大如椀

鶯黃色紫心六瓣而側且開午收暮落人亦呼為側金盞花結角大如拇指長二寸許本大末尖六

蜀葵 黃蜀葵花

三九

稜有毛老則黑色其稜自綻內有六房如芝蔴房
 其子累之在房內狀如箇麻子色黑其莖長者六
 七尺剥皮可作繩索又曰
 宜入草部而嘉祐本草與蜀葵同入菜部為其同
 名葵而氣味
 主治亦同也

甘寒滑治小便淋及催生治諸惡瘡膿水久不瘥未

傳即愈為瘡家聖藥
嘉祐消癰腫浸油塗湯火傷
時珍

方 沙淋石淋
 服一錢名獨聖散 普濟 催生
焙

研末湯服二錢
 胎產寶鑑 瘡疽腫毒
 中密封經年不壞每用敷

之自平自潰無花
 用根葉 直指方 小兒口瘡
 數之 時後 湯火傷

以瓶盛麻油入花浸之密封
 遇有傷者塗之神效 經驗 小兒禿瘡
 黃芩 芍藥 等分

為末米泔洗淨香
油調搽 普濟方

子及根甘寒滑療癰腫利小便治五淋水腫產難通

乳汁時珍

發明 頌曰冬葵蜀葵黃葵形狀雖不同而性俱寒滑
故所主療不甚相遠時珍曰黃葵子古方少用

為催生及利小便要藥湯散皆宜蓋其性滑
與冬葵子同功故也花子根性功相同可互用

方 產難催生 寇氏曰以四十九粒研末溫水服即
產。經驗用子焙研三錢并華水服

無子用根 煎服亦可 便癰初起 黃蜀葵子七粒皂角半挺
為末石灰同醋調塗 永類 癰

腫不破 黃葵子研酒服一粒則 撲打傷 葵子研酒服
出一頭神效 易簡 二錢 見海

上方

黃蜀葵花 菟葵

四

菟葵

又名紫背天葵 炮炙論 天葵 圖經 蒂 草外丹本草

雷九

集解

恭曰 一苗似石龍芮而葉光澤花白似梅 其莖紫黑煮噉極滑所在下澤田間皆有禹

錫曰 郭璞註爾雅云 一似葵而小葉狀如藜有 毛灼之可食而滑 宗奭曰 一綠葉如黃蜀葵其

花似拒霜甚雅其形至小如初開單葉蜀葵有檀 心色如牡丹姚黃其葉則蜀葵也唐劉夢得所謂

菟葵燕麥動搖春風者是也 時珍曰 按鄭樵通志 云 一 天葵也狀如葵菜葉大如錢而厚面青背

微紫生於崖石凡丹石之類得此而後能神所以 雷公炮炙論云 如要形堅豈忘紫背謂其能堅鉛

也此說得於天台一僧又按南宮促峻嶮神書云 紫背天葵出蜀中靈草也生於水際取自然汁煮

承則堅亦能煮 八石拒火也

苗甘寒下諸石五淋治虎蛇毒諸瘡搗汁飲之塗瘡

能解毒止痛 唐

木

酸漿

又名醋漿 本經燈籠草 唐本皮弁草 食療苦酸
爾雅苦耽 嘉祐天泡草 綱目王母珠 嘉祐洛神

珠同上 小者

名苦藏 郭璞

集解

弘景曰處有之苗似水茄而小葉亦可食
子作房中有子如梅李大皆黃紅色小兒

食之時珍曰楊慎危言云本草燈籠草苦耽一
皆一物也燕京野果名紅姑娘外垂絳囊中含赤

子如珠酸甘可食盈一繞砌與翠草同芳亦可

愛又曰龍葵一一類二種也一一苦藏一種二

物也但大者為一一小者為苦藏耳敗醬亦名苦

職與此不同其龍葵酸漿苗葉一樣但龍葵莖光

無毛五月入秋開小白花五出黃蕊結子無殼累

累數顆同枝子有蒂蓋生青熟紫黑其一一同時

開小花黃白色紫心白蓋其花如杯狀無瓣但有

五尖結一鈴鐸殼凡五稜一枝一顆下懸如燈籠

酸漿

四一

之狀殼中一子狀如龍葵子生
青熟紅以此分別便自明白

苗葉莖根苦寒無毒

禹錫曰有小毒恭
曰苦大寒無毒

治熱煩滿定

志益氣利水道

本經

搗汁服治黃病多效

弘景

治上氣欬

嗽風熱明目根莖花實並宜

唐本

苗子治傳尸伏連鬼

氣症忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱

欬嗽多睡勞乏嘔逆痰壅症癖痞滿小兒無辜瘕子

寒熱大腹殺虫落胎去蟲毒並煮汁飲亦生搗汁服

研膏傳小兒閃癖

嘉祐

發明

震亨曰燈籠草苦能除濕熱輕能治上焦故主
熱欬咽痛此草治熱痰咳嗽佛耳草治寒痰咳

殼名金燈殼輕虛入肺治肺熱咳嗽極妙

嗽也與片苓清金丸同用更效時珍曰一一利濕除
熱除熱故清肺治咳利濕故能化痰治疽一人病虛
之咳嗽有痰愚以此

加入湯中用之有效

方 熱嗽咽痛

燈籠草為末白湯服名清心丸
仍以醋調傳喉外 丹溪算要 喉瘡

作痛

燈籠草煨焦研末酒
調呷之 醫學正傳

子酸平

別錄曰寒

治熱煩定志益氣利水道治產難吞之

立產

別錄

食之除熱治黃病尤益小兒

蘇頌

治骨蒸勞熱

尸疰疔瘦痰癖熱結與苗莖同功

嘉祐

方 酸漿實丸

治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產用
一實五兩莧實三兩馬蔴子炒二

兩榆白皮炒二兩柴胡黃芩枳椇根蔞茹各一兩為
末煉蜜丸梧子大每服三十九丸木香湯下 聖濟

酸漿 敗醬

聖濟

時珍曰手足陽明胃大腸厥陰肝心包藥

天泡濕瘡

天泡草鈴兒生搗傅之亦可為末香油調傅之 鄧才筆峰雜興方

敗醬

又名苦菜綱目苦蕒 同上澤敗 別錄鹿腸本經 鹿首別錄馬草同上

集解

弘景曰出近道葉似稀荳根形如柴胡根作陳敗豆醬氣故以為名恭曰不出近道多生

岡嶺間葉似水荳及薇荷叢生花黃根紫作陳醬

色其葉殊不似稀荳也頌曰江東亦有之狀如蕪

恭所說時珍曰處二原野有之俗名苦菜野人食

之春初生苗深冬始凋初時葉布地生似菘菜葉

而狹長有鋸齒綠色面深背淺夏秋莖高二三尺

而柔弱數寸一節二間生葉四散如織顛頂開白

花成簇如芹花蛇床子花狀結小實成簇其根白

紫頗似柴胡吳普言根似桔梗陳自明言根似蛇

莓根者

皆不然

根苗苦平

別錄曰鹹微寒權曰辛苦大 明曰酸時珍曰微苦帶甘

治暴熱火瘡

赤氣疥癩疔痔馬鞍熱氣本經除癰腫浮腫結熱風痺

未足產後痛別錄治毒氣瘡癰破多年凝血能化膿為

水產後諸病止腹痛餘疹煩渴甄權治血氣心腹痛破

癥結催生落胎血運鼻衄吐血赤白帶下赤眼障膜

努肉聾耳瘡癰疥癬丹毒排膿補漏大明

發明時珍曰一一乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰及古方婦人科皆用之乃易得

之物而後人不知

用蓋未遇識者耳

方 腹癰有膿 苡仁附子一一湯用苡仁十分附子二分一一五分搗為末每以方寸匕

水二升煎一升頓服小便

當下即愈 金匱玉函 產後惡露 七八月不止 當歸各六分

敗醬 白鮮皮

時珍曰入足太陰陽明脾胃兼入手太陰
陽明經肺大腸早曰兼入膀胱小腸

續斷芍藥各八分芎藭竹茹各四分生地黃
炒十二分水二升煮取八合空心服 外臺 產後腰

痛 乃血氣流入腰腿痛不可轉者——當歸各八分
芎藭芍藥各六分水二升煮至八合分二服忌蔥

濟方 廣 產後腹痛 如錐刺者——五兩水四升煮二升
每服二合日三服良 衛生易簡方

蠶 遠腰者——汁
楊氏產乳

白鮮皮 又名白羶弘景白羊鮮 同上地羊鮮 國經金
崔兒椒 日華 時珍曰根白色作羊羶氣子

椒 故名

集解 弘景曰近道處有之以蜀中者為良恭曰
其葉似茱萸高尺餘根皮白而心實花紫白

色根宜二月采四五月采便虛惡矣頌曰今河中

江寧府滁州潤州皆有苗高尺餘莖青葉稍白如
槐亦似茱萸四月開淡紫花似小蜀
葵花根似小蔓菁皮黃白而心實

〔常〕曰女子陰中腫痛皆濕熱乘虛客於腎及膀胱所致

〔希雅〕曰苦能泄熱寒能除熱故主頭風有火証性寒而燥能除濕熱故主五疸欬逆者實火上冲也得寒而散則欬逆止矣濕痺死肌不可屈伸者地之濕氣害人皮肉筋脉也脾主四肢惡濕喜燥今為濕邪所干故四肢不安也時行腹中大熱飲水大呼欲走者邪熱盛也小兒驚癇熱生風也散濕除熱茂不濟矣產後餘痛原是血虛而熱非所宜也〔又〕曰下部虛寒者雖有濕症勿用口〔又〕曰得牛膝石斛改仁黃柏倉朮治足弱頑痺去下部濕熱多加銀花佐以淡防已治下部一切濕瘡〔中〕梓曰多服損中氣

〔昂〕曰行水故性燥
〔不〕曰治毒風瘡癬亦赤爛亦治楊梅

根皮苦寒〔別錄〕治頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫

痛濕痺死肌不可屈伸起止行步〔本經〕療四肢不安時

行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘

痛〔別錄〕治一切熱毒風惡風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆

皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃〔甄權〕通

關節利九竅及血脉通小腸水氣天行時疾頭痛眼

疼其花同功〔大明〕治肺嗽〔蘇頌〕

〔之才〕曰惡蟻蛸枯梗茯苓草薺等藥

發明〔時珍〕曰一一氣寒善行味苦性燥足太陰陽

白鮮皮 草薺 四十四

惡毒眉髮脫落此雖善理瘡瘍而實為諸
黃麻痺要藥

子接曰鼠痿已破服之最效

鳴皋曰頭風自是因風仲淳謂一一主

頭風有火証者則芩連石膏亦主陽明頭

痛何以不云治風乎觀其能通關節利九

竅血脈不僅以散濕除熱為用實有去風

之功故能兼主效逆肺嗽濕痺驚癩瘡後

中風及壯熱惡寒等症也

時珍曰足陽明厥陰胃肝經藥

恭曰一一根細長淺白菝葜根作塊亦黃

痺要藥也世醫止
知施之瘡科淺矣

方 鼠痿已破

出膿血者一一煮汁服一
升當吐若鼠子也 肘後
產後中

風

人虛不可服他藥者一味一一湯用新
汲水三升煮一升溫服 陳延之小品方

草辭

又名赤節別錄百枝吳普竹木炮炙論
時珍曰時人呼為白菝葜象形也赤節百枝

與狗脊

同名

集解

弘景曰根似菝葜而小異根大不甚有角節
色小淺恭曰此有二種莖有刺者根白實無

刺者根虛軟者為勝蔓生葉似薯蕷頌曰今河

陝汴東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉俱青葉作

三叉似山薯又有綠豆葉花有黃紅白數種亦有

無花結白子者根黃白色多節大三指許春秋采

根晒乾今成德軍所產根亦如山薯而體硬其苗

引蔓葉似喬麥子三稜采根切片晒乾用時珍曰

希雅曰味甘平入足陽明少陰厥陰為祛風除濕補益下元之要藥故主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘰熱氣陰痿失溺關節老血老人五緩正以苦能燥濕甘入脾而益血故慈主之又主冷風痺癱癱緩不遂男子腰痛久冷腎間有濕膀胱宿水日華子主頭旋痼疾補水臟堅筋骨益精明日中風失音海藏主肝虛李氏治白濁莖中痛痔漏壞瘡以上諸症無非陽明濕熱流入下焦客于肝腎所致此藥祛下元虛冷濕邪為病也

又曰一木除風濕若下部無濕陰虛火熾以致弱有餘濕莖中痛此真陰不足之候也無濕腎虛腰痛並不宜用

不腐曰一能溫腎去濕但性味緩用宜

一蔓生葉似菝葜而大如盤其根長硬大者如商陸而堅今人以土茯苓為一一誤矣莖葉根苗皆不同吳普以一為狗脊亦誤矣宋以懷慶一一充貢

根苦平

別錄曰甘

治腰脊痛強骨節去風寒濕周痺惡瘡

不瘰熱氣

本經

傷中志怒陰痿失溺老人五緩關節老

血別

冷風痺痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子腰痛

久冷腎間有膀胱宿水

甄權

頭旋痼疾補水臟堅筋骨

益精明日中風失音

大明

補肝虛

好古

治白濁莖中痛痔

漏壞瘡

時珍

之才曰薏苡為之使畏

葵根大黃柴胡前胡

草辭

四十五

大劑

中梓曰苦平胃與肝藥也搜風去濕補腎強筋

又曰入肝搜風故能理風除筋之病入胃

去濕故能理濁除瘡之病古人或稱其攝

溺之功或稱其止水之效何二說相懸耶

不知附藏之本在腎二氣強壯則叔梓而

妄水無家藏之地且善清胃家濕熱故能

去濁分清也楊氏一一分清飲正合此意

仲淳曰得牛膝木瓜瓜仁黃柏骨碎補續

斷杜仲石斛地黃狗脊治腰脊痛強骨節

加木菖蒲茯苓治周痺 同黃芪生地金

銀花皂角刺皂角子牛膝木瓜石斛苡仁

海風藤白僵蚕胡麻治惡瘡久不瘳 同

蓮子茯苓車前子木通澤瀉牛膝黃柏甘

草可分清除濕

發明

時珍曰一一足陽明厥陰經藥也厥陰主筋屬

能治緩弱痺痺遺濁惡瘡諸病之屬風濕者一一菝

蓂土茯苓三物形雖不同而主治之功不相遠豈一

物數種乎炮炙論云菝蓂游多夜煎竹木即一一也

液多白濁皆是濕氣下流一一能除陽明之濕而固

下焦故能去濁分清楊倓家藏方治真元不足下焦

虛寒小便頻數白濁如膏有一一分清飲正此意也

楊子健萬全護命方云凡人小便頻數不計度數便

時莖內痛不可忍者此疾必先大腑秘熱不通水液

只就小腸大腑愈加乾竭甚則渾身熱心燥想凉水

如此即重症也此疾本因貪酒色積有餘毒腐物瘀

血之類隨虛水入於小腸故便時作痛也不飲酒者

必平時過食辛熱葷膩之物又因色傷而然此乃小

便頻數而痛與淋症澀而痛者不同也宜用一一

兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服二錢水

一盞煎八分渣服之使水道轉入大腸仍以葱

湯頻洗穀道令氣得通則小便數及痛自減也

方

腰脚痺軟

行履不穩者一一二十四分杜仲八分搗篩每旦溫酒服三錢匕禁牛肉

唐德宗貞

元廣利方

小便頻數

川一一一斤為末酒丸梧子大盞湯下七十九 摘元

白濁頻數

澁面如油澄下如膏乃真元不足下焦虛寒一一分清飲一一石菖蒲益智仁烏藥

等分每服四錢水一盞

入盞一捻煎七分服

腸風痔瘻

如聖散一一貫衆去土等分為末每

服三錢酒下

見孫氏秘寶方

菝葜

又名菝葜 同莫 金剛根 日華 鉄菱角 綱目 王瓜 草日華 時珍曰莖蔓堅強短小故名金剛根

堅有尖刺故名鉄菱角鄭氏通志

云其葉頗近土瓜故名王瓜草

集羊

頌曰近道及江浙州郡皆有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉而差大秋

生黃花結黑子如櫻桃大其根作塊人呼金剛根

時珍曰山野中甚多其莖似蔓而堅強植生有刺

草辭 菝葜土茯苓

四六

時珍曰 陽明胃本藥

其葉圍大狀如馬蹄光澤似柿葉不似冬青秋開
黃花結紅子根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸瀉
野人采其根葉入

梁家用名鉄菱角

根甘酸平温治腰背寒痛風痺益血氣止小便利

治時疾瘟瘴大補肝經風虛好治消渴月崩下痢時

發明時珍曰一足少陰厥陰藥氣温味酸性瀉而
沈孫真人元旦辟邪屠蕪酒中亦用之頌曰取

根浸赤汁煮
粉食能辟瘴

土茯苓 又名土草薜綱目山猪蕪同上仙道根同上
冷飯團同上硬飯同上山地粟同上刺猪苓

拾遺過山龍
草尚餘根

集解 葳器曰根如蓋連綴半在土上皮下皮如茯苓肉
赤味澀人取以當穀食不飢時珍曰

本草曰瘰癧腫喉痺除周身寒濕惡瘡

楚蜀山箐中甚多蔓生如葶藶有細點其葉不對

狀頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸

其根狀如菝葜而圓其大如鴉鴨子連紹而生遠

者離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種

入藥用白者良昔人不知用近時弘治正德間楊

梅瘡甚行率用輕粉藥取效毒留筋骨潰爛終身

始知用此遂為要藥諸醫無從考証往往指為草

菝葜及菝葜然根苗迥不相同宜參考之但功亦頗

相近亦

其類也

根甘淡平食之當穀不飢調中止洩健行不睡藏健

脾胃強筋骨去風濕利關節止泄瀉治拘攣骨痛惡

瘡癰腫解汞粉銀朱毒時珍

時珍曰

忌茶茗

土茯苓

四七

發明機曰楊梅毒瘡藥用輕粉愈而復發久則肢體拘攣變為癩漏竟致癩篤惟判一一或加皂
角牽牛各一錢水六盞煎三盞分三服不數劑多瘰
蓋此疾多由毒氣干於陽明而發加以輕粉燥烈久
而水衰肝挾相火未凌脾土之屬濕主肌肉濕熱蓄
鬱於肌腠故發為癩腫甚則拘攣內經所謂濕氣害
人皮肉筋骨是也一一甘淡而平能去脾濕去
則營衛從而筋脉柔肌肉實而拘攣癩漏愈矣初病
服之不效者火盛而濕未鬱也此藥長於去濕不能
去熱病久則熱衰氣耗而濕鬱為多故也時珍曰楊
梅瘡古無此病近起於嶺表傳及四方蓋男女淫猥
濕熱之邪積畜既深發為瘡毒遂致互相傳染其類
有數種治之則一也其證多屬厥陰陽明二經而兼
乎他經邪之所在則先發出如兼少陰太陰則發於
咽喉兼太陽少陽則發於頭耳之類蓋相火寄於厥
陰肌肉屬於陽明故也醫用輕粉銀朱劫劑五七日
即愈蓋水銀性走而不守加以鹽礬升為輕粉銀朱
其性燥烈善逐痰涎之乃脾之液此物入胃氣歸陽

明故涎被叔隨火上升從喉頰齒縫而出故瘡即乾
 痿而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡
 筋骨間莫之能出痰涎既去血液耗涸筋失所養營
 衛不從變為筋骨拘攣疼痛發為瘰毒疔漏久則生
 蟲為癬手足裂遂成癩痼惟一一氣平味甘淡
 為陽明本藥能健脾胃去風濕脾胃健則營衛從風
 濕去則筋骨利故諸症多愈此亦得古人未言之妙
 也今醫家有搜風解毒湯治楊梅病深者月餘淺者
 半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服
 之亦效其方用一一一兩苡仁金銀花防風木瓜
 木通白蘚皮各五分皂莢子四分氣虛加人參七分
 血虛加當歸七分水二大盞煎飲一日三服惟忌飲
 茶及牛羊鷄鵞魚肉燒

酒發麵房事蓋秘方也

方 楊梅毒瘡

筆峰雜興用一一一四兩皂角子七
 筒水煎代茶淺者二七深者四七見

效〇一方一一一兩五加皮皂莢子苦

參各三錢金銀花一錢好酒煎日一服

骨攣瘰漏

土茯苓 白欬

四十八

昂曰苦能泄平能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣

鄒真一曰赤斂能治溫瘧血痢腸風痔漏赤白帶下

服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成瘰至

成廢疾者一一一兩有熱加黃芩氣虛加四君子

血虛加四物水煎代

茶薛已外科發揮瘰癧潰爛水煎或入粥內須多

食方致江西所

出色白者良

白斂

一名白草本經白根別錄兔核同上崑崙同上
貓兒卵綱目

集解

弘景曰近道處處有之作藤生根如白芷破
片竹穿日乾恭曰根似天門冬一株下有十

許根皮赤黑肉白如芍藥不似白芷蔓生枝端有

五葉所在有之頌曰今江淮及荆襄懷孟商濟諸

處皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小

葉五月開花七月結實根如烏鴨卵而長三五枚

同一窠皮黑肉白一種赤斂花

實功用皆同但表裏俱赤爾

根苦草

別錄曰甘微治瘰腫疽瘡散結氣止痛除熱
寒權曰有毒

希雅曰瘰癧皆由榮氣不從逆於肉裏所致女子陰中腫痛亦由血分有熱之故目中赤亦血熱為病散結涼血除熱故諸症悉已又曰為瘡疽家要藥又曰瘡疽已潰不宜服

第曰前雖不出者同丹皮或半夏為末酒服

馬泉曰胎孕不下一方五十九疑誤若生半夏服至五十九當麻死矣

目中赤小兒驚濶溫瘧女子陰中腫痛赤白帶下本經

殺火毒別錄治發背瘰癧面上疱瘡腸風痔漏血痢刀

箭瘡撲損生肌止痛大明解狼毒時珍

之才曰代赭為

之使反烏頭

發明弘景曰生取根搗敷瘰癧腫有效頌曰今醫治風

宗奭曰服餅方少用惟飲瘡方多用之故名

方發背初起

水調一末塗一肘後方丁瘡初起方同上聖惠

切瘰癧陶隱居用一二分蒸薑湯火傷一末敷

胎孕不下一生半夏等分為末水丸桐子大榆皮湯下五十九保命諸瘡不斂

白效預知子四十九

希雅曰——得白及紅藥子加米砂雄黃
乳沒膠麝為傅癩疽止痛散毒之上藥
御藥院方治面鼻油欬——白石脂杏仁
各半兩為末鴉子調塗日一洗 肘後治
面生粉刺——二分杏仁半分鴉屎白一
分為末蜜和拭面

希雅曰味苦性寒凡蠱毒多辛熱之物所
造故宜苦寒以洩其熱毒熱毒既解則毒
不靈矣蠱皆濕熱所生蟲得苦則伏故殺
蟲之藥多苦寒

——赤欬黃柏各三錢炒研輕粉
一錢葱白漿水洗淨敷 瑞竹堂 凍耳成瘡 ——黃
柏等分
為末生油調搽 諸瘡腫 ——赤小豆茵草為末

談莖翁方 諸瘡腫 鴉子白調塗 甄權

預知子

又名聖知子 日華聖先子同上 蠱合子同上
仙治子同上

集解

志曰——有皮殼其實如皂莢子相傳取
子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其有聲當

預知之故名 頌曰 舊不著所出州土今惟淮蜀黔

壁諸州皆有之作蔓生依大木上葉綠有三角面

深背淺七月八月有實作房生青熟深紅每房有

子五六枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾今蜀人

每貴重之云亦難得其根冬月采之陰

乾治蠱其勝於子也 山民名為聖無憂

子仁苦寒

大明曰 溫雙 仁者可帶

殺蟲療蠱諸毒去皮研服有

效 寶 治一切風補五勞七傷其功不可備述治瘰癧

常日汁入腎補腎

氣塊消宿食止煩潤利小便催生中惡失音髮落疔
行温疾塗一切蛇蟲蚕咬治一切病每日不過吞于

七粒不過三十粒永瘥

大

方 預知子丸

治心氣不足精神恍惚語言錯忘忪悸煩鬱憂愁慄戚喜怒多恐少睡夜

多惡夢健忘驚魘或發狂並宜服此一一去皮白

茯苓甘杞子石菖蒲伏神柏子仁人參地骨皮遠志

山藥黃精蒸熟米砂水飛等分為末 癘風 有虫眉落

密丸芡子大每嚼一九 和劑局方 聲變一一

膏用一一 雄黃各二兩為末以乳香三兩同水

一斗銀鍋煮至五升入二末熬成膏瓶盛之每服一

匙酒調下有虫如馬尾

隨大便而出 聖惠方

早蓮草

又名鱧腸唐本草蓮子草同上金陵草 綱目 烟草 綱目 墨頭草 同上 墨菜 同上 糊孫頭 必

預知子

早蓮草

五十

用猪

牙草

集解

恭曰一一一 生下濕地所在坑渠間多有苗
似旋覆二月八月採陰乾頌曰處：有之南

方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒
莖高一二尺開花細而白其實若小蓮房蕪恭謂
似旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色
實亦作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆
有汁出頃吹而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草
時珍曰一一一 有二種一種苗似旋覆而花白細
者是鱧腸一種花黃紫而結房如蓮房者
乃是小連翹也爐火家亦用之見連翹條

甘酸平治血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傳之立已

汁塗眉髮生速而繁唐本烏髭髮益腎陰時珍止血排膿

通小腸傳一切瘡并蠱癘大膏點鼻中添腦蕭炳

希雅曰一一一 汁黑味甘酸平純陰之草
也入肝腎亦入胃與大小腸善涼血解髮
白者血熱也齒不固者腎虛有熱也涼血
益血則須髮變黑而齒固矣故古今變白
之草當以此為勝本經主血痢及針灸瘡
發洪血傳之立已塗眉髮生速而繁大明
謂能止血排膿通小腸傳一切瘡蓋血痢

由於血分為濕熱所傷針灸洪血亦因病人素本血熱及加艾炙則益熾血涼則止熱藥則生膿血涼則散小腸有熱則閉熱解則通及傳一切瘡何非涼血益血之功乎

〔鳴泉曰〕——甘酸微瀉甚補腎余治一婦患勞二年漸愈而元虧殆胎六七次俗謂胎滑百治不效因思殞胎當固腎滑則治以瀉乃以——金櫻子熬膏以蒸熟艾膏末和丸與之竟得生子蓋此方本治精滑而胎滑亦同此理也屢用有效又一婦大便本不利滑胎二十餘次余與此方大便更燥燥則努力動胎：仍望大抵腸燥者難服

方 金陵煎 益髭髮變白為黑——一把六月以後採青嫩無泥者洗摘去黃葉搗爛絞汁日中煎五日又取生薑一斤絞汁白密一斤合和日中煎以柘木條攪勿停手待如餲藥乃成矣每日午後各服一匙溫酒化下如欲作丸日中再煎至可丸此藥及時多合為佳其效甚速 千金 固齒

乾研擦牙 攝生 一切頭痛 中 聖濟總錄 擊臂

截瘡 定帝繫住良久起小炮謂之天灸其瘡即止

王執中 小便溺血 心服三杯愈乃止 醫學正傳 腸

風臟毒 下血不止 米飲下二錢 家藏經驗方 痔漏瘡發

取汁飲之其渣傳患處重者不過三服即安屢試其效如神

保壽堂方

早蓮草 嬰粟花

〔粟〕曰入腎〔時珍曰〕斂肺
〔鳴泉曰〕按花與穀同嘗見鄉間人瀉痢不
止用花同麩作餅食即效大抵瀉痢初起
慎不可用耳

粟粟花

又名麗春花 時珍 粟名御米 開寶 米囊子同
上象穀

穀 酸澆微寒止瀉痢固脫肛治遺精久斂斂肺澆

腸止心腹筋骨諸痛

時珍

〔時珍曰〕得醋烏梅橘皮良〔又曰〕凡用洗潤去蒂及筋
膜取外薄皮陰乾細切醋拌炒入藥亦有用蜜炒蜜

者

發明

〔粟曰〕收斂固氣能入腎故治骨病尤宜〔震亨曰〕
今人虛勞咳嗽多用粟穀止劫及濕熱泄痢者

用之止澀其治病之功雖急殺人如劍宜深戒之〔又〕
曰治嗽多用粟穀不必疑但要先去病根此乃收後

藥也治痢亦同凡痢須先散邪行滯豈可遽投粟穀
龍骨之藥以閉塞腸胃邪氣得補而愈甚所以變症
作而淹延不已也〔時珍曰〕酸主收澀故初病不可用
之瀉痢既久則氣散不固腸滑肛脫救嗽諸病既久

氣散不收而肺脹痛劇故俱宜此澀之固之收之飲之按楊氏直指方云粟殼治痢人皆薄之固矣然下痢日久腹中無積痛當止澀者豈容不用不有此劑何以對治乎但要有輔佐耳又王頌易簡方云粟殼治痢如神但性緊澀多令嘔逆故人畏而不敢服若用醋制加以烏梅則用得法矣或同四君子藥尤不致閉胃妨食而獲奇功也

方 久痢 醋炙為末蜜丸彈子大每服一九水煎入生薑三片溫服。集要百中散

一 蜜炙厚朴薑製等分為末每米飲下一錢 **水瀉不止** 肉大棗肉各十枚煎服

久嗽不止 穀氣素壯者用之即效 一 蜜經驗方 久為末每服五分蜜湯下 危氏

方 久嗽虛嗽 一 一 二兩半醋炒取一兩烏梅半兩焙為末每服二錢 宣明

米 甘平 宗奩曰寒多食利 治丹石發動不下飲食

嬰粟花殼米 鴉片 二便動膀胱氣

〔鴨舉曰〕——大毒同酒服數分或錢許即
 殺人〔又曰〕西洋葦用罌粟花熬成——罌
 粟之性不過能飲清耳何以熬成——罌
 而吸之能令人精神陡發日夜不眠房事
 不倦乎此理殊不可解久又令人不能離
 離一日不吸便筋骨抽痛澹然如死且吸
 之久：陽事漸不能舉為其拔取而竭之
 也其害如此惟有久利不止用脂麻大一
 粒吞之却有效此與用粟殼同義

和竹瀝作粥食間逐邪熱治反胃謹潤燥時

方 反胃吐食寶白罌粟米三合人參三錢生山藥五
 寸細切煮粥入生薑汁鹽花少許隨

時服

見圖經

鴉片 又名阿芙蓉綱目

酸澀溫微毒治瀉痢脫肛不止能澀丈夫精氣時

〔時珍曰〕服之忌
 醋令人腸斷

方 痢下 一一木香川連白朮各一分研末飯丸小
 豆大壯者一分老幼半分空心米飲下忌

酸物生冷油膩茶

酒麪無不止者

劉寄奴草 又名金寄奴大明烏藤菜綱目

劉裕字寄奴微時伐荻新州射一大蛇明日再往見童子林中持藥問之答曰吾王為劉寄奴所傷合藥敷之裕曰王何不殺之答曰寄奴王者不可殺也叱之不見乃收藥回敷金瘡立愈故名

〔希雅曰〕——其味苦其氣溫燥之有香氣故應兼辛苦能降下辛溫通行血得熱則行故能主破血下脹然喜走之性又在血分故多服令人痢昔人謂為金瘡要藥又治產後餘疾下血止痛者正以其行血迅速故也

集解

〔恭曰〕——生江南莖似艾蒿長四五尺葉似山蘭草而尖長一莖直上有穗葉互生

其子似稗而細〔保昇曰〕今出越州蒿類也蒿四五尺葉似菊其花白色實黃白色作穗夏月收苗乾之〔頌曰〕今河中府孟州漢中滁州亦有之莖似艾蒿上有四稜高二三尺葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細根淡紫色似蒿莖六七月采苗花及子通用〔時珍曰〕——一莖直上葉似蒼朮尖長糙澀面深背淡九月莖端分開數枝一枝攢簇十餘朵小花白瓣黃蕊如小菊花；罷有白絮如苦蕒花之絮其子細長亦如苦蕒子所云實如黍稗者似與此不同其葉亦非蒿類

苦溫破血下脹多服令人下痢 恭 下血止痛治產後

餘疾止金瘡血極效 別 治心腹痛下氣水脹血氣通

劉寄奴

婦人經脉癥結止霍亂水瀉大小兒尿血新者研末

服即愈時 [數日] 用子去莖葉去薄殼酒拌蒸
晒乾用 [時珍曰] 莖葉花子皆可用

方 大小便血 心服二錢即止 為末茶調空 折傷瘀血 在腹

內者 骨碎補延胡索各一 兩水煎入酒及童便溫服 千金方 血氣脹滿

穗實為末每服三錢酒煎服不可過多令 霍亂成痢 人吐利此破血之仙方也 衛生易簡方

飲 聖濟錄 湯火傷 搗末先以糯米漿 鴛銅掃上後乃搽末並不痛

亦無痕大驗之方也凡湯火傷先以鹽末 風入瘡口 搽之護肉不壞後乃用藥為妙 本事方

腫痛 為末 搽之即止 聖惠方

馬鞭草

又名龍牙草 圓經 鳳頸草

集解 弘景曰 墟陌甚多莖似細辛花紫色微似蓬蒿 恭曰 葉似芎藭抽三四穗紫花似車前穗

類艸稍不似蓬蒿 保昇曰 花白色 頌曰 今江淮湖皆有苗類益母而莖圓高二三尺 時珍曰 一一一

下地甚多春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫花作穗如車前穗其子如蓬蒿子而細根白

而小陶言花似蓬蒿韓言花白色蕪言莖圓皆誤矣

苗葉苦微寒 大明曰 辛涼無毒 權曰 治下部蟲瘡 別錄 苦有毒伏丹砂硫黃

藏血瘕久瘡破血殺虫搗汁熬膏每空心服一匙

藏器 治婦人 血氣肚脹月候不勻 通月經 大明 治金瘡行

血活血 震亨 搗塗瘰腫及蠅蝮尿瘡 男子陰腫 時珍

方 瘡痰寒熱 一 一 搗汁五合酒二 鼓脹煩渴 乾 合分二服 千金方

馬鞭草

五十四

黑瘦 一一 細切晒乾勿見火以酒或水同煮至味
濃出渣温服以六月中旬雷鳴時採者有效 衛生

易
大腹水腫 一一 鼠尾草各十斤水一石煮五斗
去渣再煎令稠以粉和丸大豆大每服

二三九加至四五
九神效 肘後 男子陰腫 大如升核痛人不能治
者 一一 搗傳 集驗

婦人疝痛 名小腸氣 一一 一兩酒煎服
以湯浴身取汗甚妙 纂要奇方 經閉

一熬膏每服半匙用熱酒下有血
塊脇脹欲死者俱治 聖惠方 魚肉癥瘕酒積在
胸

腸不化成結 一一 汁
飲一升即消 千金 赤白痢 一一 五錢陳茶一
撮煎服神效 醫方

摘乳癰 一一 一握酒一椀薑一
要乳癰 塊搗汁服渣傳 易簡方 疥瘡 一一 草不
犯鉄器搗汁

類飲半椀十日 發背 一一 搗汁飲渣傳痛
愈神效 薰炳 不可忍者即緩 集簡 楊梅瘡

一一 煎先熏後洗氣到
便爽痛隨減 本草蒙荃

〔昂〕曰上行陽明胃亦入厥陰肝

〔希雅〕曰——味辛微溫入足厥陰經又入足陽明經補肝氣之要藥也辛能散結微溫能通氣喉痺者手少陰心火與足少陽相火相煽上壅而成散二經之火則氣通而無所結滯矣齒風痛者胃家熱感上

根 辛 潛溫赤白下痢初起焙為末米飲服一錢匕

無所忌

〔蘇頌〕

穀精草

又名戴星草 開寶文星草 綱目流星草

集解

〔頌〕曰處：有之春生於穀田中莖葉俱青根花並白色二三月採花用花白小圓似星可

喂馬令肥主虫癩毛焦病又一種莖梗長有節根微赤出秦隴間〔時珍〕曰此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花蘇云二三月採誤也

花辛溫

〔葳器〕曰甘平

治喉痺齒風痛諸瘡疥 開頭風痛目

盲醫膜痘後生翳止血

時 天明曰可結 珍 水銀成砂子

穀精草

五十五

衝熱則生風、火相搏也。瘡亦由於血熱。諸痛瘡瘍皆屬心火藥宜辛散故悉主之以其入肝補肝氣故為治目散翳之上藥。

【鴉暴曰】——性辛散而平和無妨多用。汪氏云能散陽明風熱實則散厥陰之風熱更勝也。

【時珍曰】入足厥陰。

發明 時珍曰——體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良其明目退翳之功似在菊花之上也。

方 腦痛眉痛

——二錢地龍三錢乳香一錢為末每用半錢燒烟筒中隨左右薰鼻。

聖方 偏正頭痛 麩和貼之 集驗 鼻衄 熟麩湯服

聖目翳 防風等分為末 痘後目翳 末以柿或米飲服甚驗 明目方

羊肝蘸食。一方加蛤粉等分同入羊肝煮食。又方見夜明砂 邵真人濟急方 小兒雀盲

至晚不見物用羯羊肝一具不用水洗竹刀剖開入丸茶服亦可

見衛生家寶方

青箱 一名草蒿本經 蔓蒿同上 崑崙草 唐本野雞冠 綱目 雞冠莧同上 子名草决明

集解時珍曰——生田野間嫩苗似莧可食長則高三四尺苗葉花實與鷄冠花一樣無別但

鷄冠花穗或有大而扁或圓者此則稍間出穗尖長四五寸狀如兔尾水紅色亦有黃白色者在

穗中與鷄冠子莧子一樣

難辨蘓恭言其結角誤矣

莖葉苦微寒治邪氣皮膚中熱風瘙身癢殺三虫經本

惡瘡疥蟲痔蝕下部蟲瘡別錄搗汁服大療溫癘蘓恭止

金瘡血大

明

子苦微寒權曰治唇口青本經治五臟邪氣益腦髓鎮

苦平

肝明目堅筋骨去風寒濕痺大治肝臟熱毒衝眼赤

明

障青盲翳腫惡瘡疥瘡甄權

甄

青相明鷄冠

五十六

常曰青箱子能助陽火瞳子最大者忌服

發明 病曰治眼有一子丸宗奭曰一子經不言
治眼惟藥性論日華子始言治肝明目今人多

用治眼殊與經意不相當時珍曰一子治目與決

明子莧實同功本經雖不言治目而云主唇口青則

明目之功可知矣目者肝之竅唇口青足厥陰之證

古人除熱亦多用之一子之為厥陰藥又可知矣

况用之治目性有驗尤可徵據魏畧云有

青牛先生服一子丸年百餘加五六十者

方 衄血不止 眩冒欲死一子汁三合
灌入鼻中 貞元廣利方

雞冠

集解 時珍曰處有之花有紅白黃三色其穗圓
長而尖者儼如青箱之穗扁卷而平者儼如

雄鷄之冠花大有圍圓一二尺

者子黑細光滑與莧實一樣

苗甘涼治痔瘡及血病

特珍

子甘涼止腸風瀉血赤白痢藏器崩中帶下入藥炒用

大 明

花甘涼治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶下分赤

白用時珍

方吐血不止白一花醋浸七次為末結陰便血

一花椿根白皮等分為末蜜丸桐子大每服三十九丸黃芪湯下聖濟糞後下血白一花

並子炒煎聖惠五痔成漏久不愈一花鳳眼草等下血

脫肛白一花防風等分為末糊丸經水不止紅一花

晒乾為末每服二錢空心酒調下忌魚肉孫氏集效方產後血痛白一花酒煎服李樓

難冠 映明

五十七

鳴皋曰

厥陰肝經藥

奇
白帶 白——花日乾為末空心酒服
赤白痢 煎
三錢赤帶用赤者 孫氏集效

酒服赤用紅白

用白 集簡

决明子

集解

頌曰人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺根帶紫色葉似首管而大七月開黃花結角其

子如綠豆而銳十月採之時珍曰决明有二種一

種馬蹄决明莖高三四尺葉大於首管而本小末

夕晝開夜合兩々相帖秋開淡黃花五出結角如

初生細豇豆長五六寸角中子數十粒參差相連

狀如馬蹄青綠色入眼藥最良一種苙芒决明救

荒本草所謂山扁豆是也苗莖似馬蹄决明但葉

之本小末尖正似槐葉夜亦不合秋開深黃花五

出結角如小指長二寸許角中子數成列狀如黃

葵子而扁其色褐味甘滑二種苗葉皆可作酒釀

但苙芒嫩苗及花與角子皆可淪茹及點茶食馬

蹄決明苗葉皆
鞠苦不可食也

子臧平

別錄曰苦
甘苦寒

治青盲目淫膚赤白膜眼赤淚出

久服益精光輕身

本經

療唇口青

別錄

助肝氣益精以水

調末塗腫毒瘡太陽穴治頭痛又貼心胸止鼻洪作

枕治頭風明目甚於黑豆

日華

治肝熱風眼赤淚每旦

取一匙按淨空心吞之百日後夜能見物

甄權

益腎解

蛇毒

震亨

葉作菜食利五臟明目甚良

甄權

之才曰一一子著實

為之使惡大麻子

決明

發明時珍曰相感志言蝮種一蛇不敢入丹溪言

解蛇毒本於此也王旻山居錄葉花皆可食切

忌飽茶多食無不患風按馬蹄一苗角皆勒而苦

不宜於食縱食之有利五臟明目之功何遂至於患

風耶又霏雪錄言家種一生子多跋此迂儒說不可信

方積年失明一子二升為末食後青盲一升地

膚子五兩為丸梧子大米飲下二三十丸普濟方補肝明目一子一升蔓

升煮乾為末每溫水目赤痛一子炒研茶調傳兩

下二錢日三聖惠太陽穴乾則易之一夜

即愈醫頭風方同鼻洪方見發背初起一子生

方摘元上生甘草一兩水三升煮一升分二服大抵血滯則生

瘰癧肝主藏血一一子和肝氣不損元氣也本車方

高舉曰本經云下水氣治浮腫甄權云除
腎氣肘後治邪腫或縮入腹別錄除大小
腸邪氣葳蕤云能入腰脚是葳乃肝腎之
藥而行下焦者也○厥陰肝脈絡陰器治
邪腫外縮是行厥陰下水氣除腎氣是行

集解

弘景曰此類多人所食有三種一是青一人
家常用其葉有圓有尖以圓者為勝一是紫

一相似而紫色一是香一相似而香並不甚辛好

食保昇曰一類甚多有青一香一水一馬一紫一

赤一木一七種紫赤二一葉小狹而厚青香二一

葉亦相似而薄馬水二一葉俱濶大上有墨點木

一一名天一蔓生葉似柘葉六一花皆紅白子皆

大如胡麻赤黑而尖扁惟木一花黃白子皮青滑

諸一並冬死惟香一宿根可為生菜食時珍曰韓

保昇所說甚明古人種一為蔬狀子入藥故禮記

烹雞豚魚鱉皆實一於其腹中而和羹膾亦須切

一也後世飲食不用人亦不復栽惟造酒趨用其

汁耳今但以平澤所生

香一青一紫一為良

子辛温明目温中耐風寒下水氣面浮腫瘰癧傷本
經歸

鼻除腎氣止霍亂治小兒頭瘡多食吐水壅氣損陽

藜

五光

少陰

權甄

方傷寒勞復

因交後邪腫或縮入腹痛薺子一把水按汁飲一升 肘後

霍亂

煩渴

薺子一兩香薷二兩每服二錢水煎服

小兒頭瘡

薺子為末蜜和雞子白同

塗之虫出不作痕藥性論

蝟牛咬毒

毒行遍身者薺子煎水浸之立愈不可近陰令弱也

陳

藏器

苗葉辛温無毒

思邈曰食多有毒

治歸舌除大小腸邪氣利

中益志

別錄

乾之釀酒主風冷大良

引

作生菜食能入

腰脚者湯浸脚能治霍亂轉筋者汁日飲治瘧癘搗

傳狐尿瘡

藏器

脚暴軟赤煎燒灰淋汁浸之以桑葉蒸

暑立愈 明殺虫伏砒 時珍

孫真人曰黃帝云食一過多發心痛和生魚食令人脫氣陰核痛求死二月食一傷人胃扁鵲云久食令人寒熱損髓減氣少精婦人月事

來時食一變為淋與大麥麩相宜

方 蓼汁酒 治胃脫冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧足冷八月三日取一日乾煮

汁釀酒日飲之明 肝虛轉筋 吐瀉赤一莖葉切水一

日壯氣 千金 蓋酒一盞煎服 聖惠

方 又方 一葉一升水三升煮二升去渣入香 小兒冷

疝 擣汁服 血氣攻心 痛不可忍一根治 犬咬傷 搗傳

千金 浸酒飲 斗門方 之

後 附

水蓼

蓼 水蓼 馬蓼

六

集解

宗奭曰——大桑與水薺相似但枝分耳今造酒取葉以水浸汁和麩作麴亦取其辛耳

時珍曰此水際所生之蓼葉長五六寸比

水薺葉稍狹比家蓼葉稍大而功用髣髴

莖葉辛治蛇傷搗傅之蛇毒入腹心悶絞汁服之又

治脚氣腫痛成瘡水煮汁漬之

唐本

馬蓼

又名大蓼 綱目 墨記草

集解

弘景曰——生下濕地莖斑葉大有黑點亦有數種其最大者即水薺也時珍曰俗呼大

蓼是也高四五尺有大小二種但每葉中

間有黑跡如黑點記故方士呼為黑記草

莖葉辛温去腸中蛭虫輕身

本經

水薺

又名薺草 別錄 天蓼 同上 石龍 同上 游龍 詩經 大蓼

集解

弘景曰生下濕地甚多極似馬藜而甚長大詩稱隰有游龍即此也頌曰似藜而葉大赤

白色高大餘時珍曰其莖粗如拇指有毛其葉大如高陸花色淺紅成穗秋深子成扁如酸棗仁而

小其色赤黑而向白不甚辛

子醎微寒治消渴去熱明目益氣別錄

方 療癰

子不拘多火一半微炒一半生用同研末食後好酒調服二錢已破者亦治日

三服久則效則止

癰痞腹脹

及堅硬如盃盞者用水紅花子一升另研

寇氏本草衍義

獨頭蒜三十箇去皮新狗腦一箇皮消四兩石臼搗

爛攤在患處上用油紙以長帛束之固時貼之次日

辰時去之未效再貼二三次倘有膿潰勿怪仍看虛

實日逐間服錢氏白餅子紫霜丸塌氣丸消積丸利

之磨之服至半月甚者一月無不瘥矣以

欲滿者為實不欲為虛 蘭氏經驗方

藜水紅 虎杖

卒一

花散血消積止痛時珍

方 胃腕血氣

作痛 | 花一大撮水二鍾煎一鍾服百戶毛菊庄屢效方也 薰炳集

驗

方 心氣痛

花為末酒服二錢〇又法男用酒水各半女用醋水各半煎服一婦年三十病

此一服立

效 摘元

腹中痞積

仍以酒調膏服忌葷腥油膩

劉松石

保壽堂

虎杖

又名苦杖 拾遺大虫杖 藥性 斑杖 日華 酸杖 時珍曰杖言其莖虎言其斑或云一名杜牛

膝者

非也

集解

弘景曰田野甚多狀如大馬藜莖斑而葉圓保昇曰生下濕地作樹高丈餘其莖赤根黃

二月三月採根頌曰今出汾州越州滁州處有之三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑初生便分枝

子葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無
花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高大餘者爾
雅云落虎杖郭璞註云似葑草而粗大有細刺可
以染赤是也宗奭曰此草藥也蜀本言作木高丈
餘者非矣大率皆似寒菊然花葉莖蕊差大為異
仍莖葉有淡黑斑六七月旋開花至九月中方
已花片四出其色如桃花差大而外微深陝西山
麓水次甚多數曰凡使勿誤用天藍及斑袖根根
形味皆相似也機曰或云似葑似杏似寒菊各不
相侔豈所產不同耶時珍曰其莖似葑蓼其葉圓
似杏其根黃似柳其花狀似菊
色似桃花合而觀之未嘗不同

根微温

權曰甘平宗奭曰微苦今暑月多煎根為飲
不得甘草則不堪飲云甘是甘草味非一一

味也

通利月水破留血癥結

別錄

漬酒服主暴癥

弘景

風在

骨節間及血瘀煮酒服之

葑器

治火熱煩躁止渴利小

虎杖

六二

便壓一切熱毒甄治產後血運惡血不下心腹脹滿

排膿王瘡疔損瘀血破風毒結氣大燒灰貼諸惡

瘡焙研鍊蜜為丸陳瘡米飲服治腸痔下血燕研末

酒服治產後瘀血痛及墜撲昏悶有效時

發明權曰暑月以根和甘草同煎為飲色如琥珀可

子吸之且尊於茗極解暑毒其汁染米作糕益美搗

末浸酒常服破女子經脉不通有孕忌服時珍曰干

金方治月經不通腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦

治丈夫積聚有一煎取高地一根剉二斛水二

石五斗煮取一斗半去滓入醇酒五升煎如餲每服

一合以知為度又許學士本事方治男婦諸般淋疾

昨珍曰上焦肺經藥

十三年每溲痛楚不可忍尿管中小便下沙石剝
剝有聲百方不效得此一服而愈余所目睹者

方 五淋

方見

月水不通

發明

一兩為末熱酒服一錢

又方治經水不通腹大如甕氣短欲死一一石去
頭日乾切土瓜根汁牛漆汁二斗水一斛浸一一

宿煎取二斗入二汁同煎如餲每酒服

特疫流毒

一合日二夜一血當下也

聖惠方

足腫痛欲斷一一根

腹中暴癥

硬如石痛刺不治百
日內死用一一根勿

煮汁漬之 肘後方

令影臨水上取石餘洗乾搗末稜米五升炊飯納入
攪之好酒五斗漬之封固須俟藥消飯浮可飲一升

半勿食魚鹽此方治

癥大勝諸藥 外臺

馬勃

又名馬疔

音尼

馬竅

音危

灰菰

綱目

集解

弘景曰俗名一竅一是也紫色虛軟狀如犬
肝彈之粉出宗奭曰生濕地及腐木上夏秋

虎杖

馬勃

李三

采之有大如斗者小亦如升杓

辛平無毒治惡瘡馬疥

別錄

傳諸瘡甚良

私景

去膜以蜜

拌搽少以水調呷治喉痺咽痛宗清肺散血解熱毒

時

時珍曰凡以生布張開將

珍

于上摩擦下以盤承取末用

發明

時珍曰一輕虛上焦肺經藥也故能清肺熱咳嗽喉痺衄血失音等病李東垣治大頭病咽

唯不利普濟消

毒飲中亦用之

方咽喉腫痛

噉物不得一一分蛇蛻一條

走馬

喉痺

一字吐涎血即愈經驗

失音

馬牙消

和丸舍之

久嗽不止

湯下二十九即愈普濟方

摘元

宗華曰蓋心脾元素曰入手太陽
古曰白入手太陰脾足太陽
赤入足太陰脾手少陰心太陽
代腎邪

昂曰色白入肺瀉熱而下通膀胱又能通
心氣於腎使熱從小便出然必其上行入
肺清其化源而後能下降利水也

瘡入目
一蛇蛻各五錢皂子十四箇為末入罐
內鹽泥固濟燒存性研酒服一錢 關氏
廉

瘡不合
蔥鹽湯洗淨拭乾以
末敷之即愈 仇遠稗史

伏苓
又名伏靈 綱目 伏兔 本經 不死麴

集解
弘景曰今出鬱州大者如三四升器外皮黑
而細縐內堅白者良虛赤者不佳 恭曰今泰

山亦有實而理小不復採用第一出華山形極粗
大雍州南山亦有不如華山 頌曰今東人見山中

古松久為人斬伐其枯折槎枿枝葉不復上生者
謂之——撥即於四面丈餘地內以鉄頭錐刺地

如有——則錐固不可拔其撥大
者——亦大皆自作塊不附着根

甘平 元素曰 甘淡温 治胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛

寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神 本經

馬勃 伏苓 卒四

〔節〕五皮散用皮以皮行皮之義凡腫而
煩渴便秘溺赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲
不煩渴大便澀小便數屬陰水宜實脾飲
疏氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小
便

止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水腫淋結開胸腑

調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神氣別錄開胃止嘔逆

善安心神主肺痿痰塞心腹脹滿小兒驚癇女人熱

淋甄權補五勞七傷開心益志止健忘暖腰膝安胎大明

止渴利小便除濕和中益氣利腰臍間血元素逐水緩

脾生津導氣平火止泄除虛熱開腠理李杲瀉膀胱益

脾胃治腎積奔脈好古

赤茯苓破結氣甄權瀉心小腸膀胱濕熱利竅行水時珍

皮主水腫膚脹利水道開腠理時珍

汪昂曰宜用人乳拌煎

醫曰搗細入水盆中攪之浮者濾去此是

赤筋若誤服令人盲目鳴按一後

人用之多矣未見其害若此雷敷毒說甚

多不足信也

子接曰得人來能下氣得半夏能滌飲

鳴皋曰世醫但知一利小便若遇大熱

症泥於古人釜底抽薪之法誤用一猪

苓等將邪熱引入下焦遂成癰閉此等弊

非聞歷下知○凡遇大熱症摠宜大清邪

熱一解而使自利不必用利藥也即用利

藥須俟熱衰過半之後

之才曰馬蔴為之使得甘草防風芍藥紫石英麥冬
共療五臟患白飲畏牡蒙地榆雄黃秦光龜甲忌米

醋及
酸物

發明 弘景曰一白者補赤者瀉俗用甚多仙方云
其通神而致靈和魂而鍊魄利竅而益肌厚腸

而開心調營而理衛上品仙藥也 宗奭曰一行水
之功多益心脾不可缺也 元素曰一其用有五利

小便也開腠理也生津液也除虛熱也止瀉也如小
便利或數者多服則損人目汗多人服之亦損元氣

為其淡而滲也 果曰白者入壬癸亦者入丙丁味甘
而淡降也陽中陰也其用有六利竅而除濕益氣而

和中治驚悸生津液小便多者能止結者能通又云
濕淫所勝小便不利淡以利竅甘以助陽溫平能益

脾逐水乃除濕之聖藥也 好古曰白者入手太陰足
太陽經氣分赤者入足太陰手少陰太陽氣分伐腎

邪小便多能止之小便瀦能利之與車前子相似雖
利小便而不走氣酒浸與光明朱砂同用能秘童元

伏苓

六五

馮舉曰余少因鑿喪致虛弱至夏必病濕
 熱勞醫教余以一一代茶遂至遺精急止
 藥始不復遺再溪接引之說甚切
 富舉曰一一走而不守入少陰而伐腎邪
 故多服單服而無監制滲利太過每有損
 目走精之患然用為接引則甚妙如和劑
 之咸喜丸用一一之滲利入腎取速加以
 黃蠟之膠粘固滯所以能固元陽治帶濁
 也所謂天道好過制此方者有神悟

款音去玉
 高云治言
 九也詩願言
 明噴毛訓
 噴作款

味甘而平如何是利小便耶震亨曰仲景利小便藥
 多用之此暴病新病之要藥也若陰虛者恐未為宜
 此物有行水之功久服損人八味丸用之者不過接
 引他藥歸就腎經去胞中久陳積垢耳時珍曰一一
 本草又言利小便伐腎邪至李東垣王海藏乃言小
 便多者能止澀者能通同朱砂能秘真元而丹溪又
 言陰虛者不宜用義似相反何哉一一氣味淡而滲
 其性上行生津液開腠理滋水之源而下降利小便
 故潔古謂其屬陽浮而升言其性也東垣謂其為陽
 中之陰降而下言其功也素問云飲食入胃游溢精
 氣上輸於肺通調水道下輸膀胱觀此則知淡滲之
 藥俱必上行而後下降非直下行也小便多其源亦
 異素問云肺氣盛則便數而欠虛則欠故小便遺數
 心虛則少氣遺溺下焦虛則遺溺胞移熱於膀胱則
 遺溺膀胱不利為癰不約為遺厥陰病則遺溺閉癰
 所謂肺氣盛者實熱也其人必氣壯脉強宜用一一
 甘淡以滲其熱故曰小便多者能止也若夫肺虛心
 虛胞熱厥陰病者皆虛熱也其人必上熱下寒脉虛

鳴泉曰威喜丸說見黃蠟下

而弱法當用升陽之藥以升水降火膀胱不約下焦虛者乃火投於水：泉不藏其人必肢冷脉遲法當用溫熱之藥峻補其下交濟坎離二證皆非——葷淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當

因人而用焉

方 濁遺帶下

威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻

遺洩婦人白淫白帶並皆治之白——去皮四兩作

置以猪苓四錢五分入內煮二十餘沸取出日乾揀

去猪苓將——為末化黃蠟和丸如彈子大每服一

九空腹細嚼俟滿口生津送下以小便利為度○抱

朴子云——十歲上生小木狀似蓮花名曰木威喜

芝夜有光帶之辟兵服之長生威喜之名蓋取諸此

和劑 吳仙丹 朱氏集驗方云中丞常子正苦痰飲

局方 每食飽或陰晴節變皆同約十日一

發頭背寒嘔吐酸水即數日伏枕不食服葯罔效後

得吳仙丹方服之遂愈每遇飲食過多腹滿服五七

按苓 李六

十九便已少頃小便作吳莢氣酒飲皆隨小便去前
後痰藥甚多無及此者用吳茱萸湯泡七次一
等

分為末煉丸梧
子大開水送下
小便頻多
一
去皮乾山藥去皮以
礬水淪過焙等分研末米

飲服二錢
儒門事親方
小便淋濁
由心腎氣虛神不守舍或夢
遺赤白一
等分為末新汲

水飛去浮沫控乾以地黃汁同搗酒熬作膏
和丸彈子大空腹鹽湯嚼下一丸
三目方
卒然耳

聾
一
為末黃蠟和丸
細嚼茶湯下
普濟
水腫尿澀
一
皮椒日等分
煎湯日飲取效

見普
血餘怪症
手十指節斷壞惟有筋連每節肉虫
出如燈心長數寸遍身綠毛卷名曰

濟方
血餘
以
一
胡黃連煎飲
服茯苓法
取白
一
一斤
夏子益怪症奇方
去皮搗篩絹囊

盛於二斗米下蒸之米熟取出晒乾又蒸如此三遍
乃取牛乳二斗和合銅器內微火煎膏收之以竹刀

割食辟穀不飢○又以
一
合白菊花
或合白朮為散常服甚補益人
蘇頌

抱恨而不
雖者為伏
神

茯神甘平療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善

忘開心益智安魂魄養精神別錄補勞乏主心下急痛

堅滿人虛而小腸不利者加而用之甄權

發明時珍曰神農本草止言茯苓名醫別錄始添
而主治皆同後人治心病必用一故張潔

古云風眩心虛非一不能除然茯苓亦未嘗不治

心病也弘景始言伏苓赤瀉白補李杲復分赤入丙

丁白入壬癸此其發前人之秘者時珍則謂伏苓一

一只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍

藥之義不當以丙丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則

白一不能治心病赤一不能入膀胱矣張元素

不分赤白之說

却於理欠通

方 交感丹

凡人中年精少神衰蓋由心血少火不
下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕營

茯神

六十七

乳香能伸胸木瓜能舒筋也

衛不知上則多驚中則痞塞飲食不下則虛冷遺

精愚醫只知峻補下焦非惟不能生水滋陰反見焦

悴但服此方半年屏去一切暖藥絕欲養攝其效不

可殫述香附子一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃

一一去皮去木四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸

侵晨細嚼以降氣湯下。降氣湯用香附如上法五

錢用一一二兩炙甘草兩半為末

煎沸湯服前藥 瑞竹堂經驗方 養心安神 治心神

不足恍惚健忘不樂火不下降水不上升時復振跳

常服此丸消陰養火全心氣一一二兩沉香五錢為

末鍊蜜丸小豆大每服三十

丸食後人參湯下 百一

伏神心木 又名神木 治偏風口面喎斜毒風筋攣不

黃松節 治脚氣痺痛諸筋牽縮時

語心神驚掣虛而健忘 治脚氣痺痛諸筋牽縮時

方 松節散 用一一心木一兩乳香一錢石器炒研

為末每服二錢木瓜酒下治風寒冷濕

元素曰——清肺利小腸

搏於筋骨足筋攣痛行步艱難但是
諸筋攣縮疼痛並主之 聖濟錄

琥珀 又名江珠

集解

弘景曰舊說松脂淪入地千年所化今燒之
亦作松氣有煮椒雞子及青魚鮓偽之者惟

以手心摩熱拾芥為真今並從外國來保昇曰楓
脂入地千年變為——不獨松脂也宗奭曰今西
戎亦有其色淡而明徹南方者色深而重濁地理
志云海南林邑多出——時珍曰內有蜂蟻松枝

形者
尤好

甘平安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋
錄別

壯心明目磨翳止心痛顛邪療蠱毒破結瘕治產後

血枕痛大止血生肌合金瘡清肺利小腸
元素

琥珀

辛八

發明丹溪曰古方用為利小便以燥脾土可助脾能
運化肺氣下降故小便可通若血火不利者反

致其燥急之苦弘景曰帶之避惡剗削服治瘀血甚

驗葢器曰和大黃鱉甲作散酒下方寸匕下惡血婦

人腹內血盡即止宋高祖有

枕碎以賜軍士敷金瘡

方 琥珀散

止血生肌鎮心明目破癥結氣塊產後
血運悶絕兒枕痛一兩鱉甲一兩

三稜一兩延胡半兩沒藥半兩大黃六銖熬搗為末
空心酒下三錢日再服神效產後各疾減大黃海

藥本 小兒胎癩一末朱砂各少許全蠋一枚 小便

草 為末麥冬湯調下一字 直指

轉胞 水四升葱白十莖煮汁三升入真一末 小便
二錢溫服石淋沙淋三服皆效 聖惠

淋瀝 一末二錢入射香白湯下或萱草 從高墜下
根湯下亦可蜜丸赤苓湯下 普濟

有瘀血在內一末酒服方寸匕或入 金瘡悶絕

蒲黃二三日四五服 外臺秘要

研粉童便調下一錢三服瘡鬼遺

松節甘温治久風：虛脚痺疼痛別錄釀酒主脚弱骨

節風弘景炒焦治筋骨間病燥血中之濕震亨治風蛀牙

痛煎漱或燒灰搯有效時珍

發明時珍曰一松之骨也質堅氣勁久亦不朽故治筋骨間風濕諸病宜之

方 歷節風痛 四支如解脫松節酒用一二十斤酒五斗浸三七日恣飲 外臺轉

筋攣急 一一兩對如米大乳香一錢瓦上慢火炒佳存一二分性研末每服一二錢熟木瓜酒

下一應筋病皆 反胃吐食 煎酒細

治 秘寶方 飲 百一方

松脂苦甘温治癰疽惡瘡頭瘍白禿瘰癧風氣本經除

又名松膏 松脂松香 滙音

松節脂

一五九

胃中伏熱咽乾消渴風痺死肌別錄煎膏生肌止痛排

膿祛風貼諸瘡膿血癢爛塞牙孔殺虫甄權強筋骨利

耳目治崩帶時珍

發明時珍曰——松之津液精華也抱朴子云上黨趙瞿病痛數年垂死其家棄之山中遇仙人與

藥服百餘日遂愈顏色豐潤肌膚玉澤仙人再過之

瞿求其方仙人曰此是——鍊服可長生瞿歸家鍊

服身輕力倍年百餘歲人間瞿服此脂皆競服之不過月餘未覺大益輒止焉志之不堅故無效

方鍊松脂法——十斤桑柴灰汁一石煮五七沸澆出以冷水中再煮之凡十次乃白

研細末每粥飲服一二錢又法——十斤鍊五度令

可以辟穀延年千金方苦味盡每一斤入茯

苓四兩每旦強筋補益四聖不老丹——一斤好酒服一刀圭已煮數沸傾冷水內結塊復以

酒煮九次不苦不瀉為末用十二兩入茯苓末半斤
黃菊末半斤柏子霜半斤蜜九椀于大每旦服七十

丸
健陽補中
強筋潤肌松梅丸一一如法鍊每斤八
熟地末十兩烏梅末六兩鍊蜜為丸每

服七
十丸
歷節風
和鍊酥三斤攪令極稠每旦酒服方寸
百節酸痛不可忍一鍊十次每三斤

七日三忌血腥生冷酸
物果子百日愈
外臺
婦人白帶
細酒九桐子大每

服百丸酒
下
摘元
小兒禿瘡
麻油兩半熬以攤貼神效
一兩黃蠟兩半銅綠錢半

生寶
鑑
風虫牙痛
立止極效
集簡
金瘡出血
末少
一滾水泡化一漱

愈
加生銅末搽之立
唐珣經驗方

即松葉

松毛苦溫治風濕瘡生毛髮
別搗屑丸服可辟穀治

惡疾
弘
章
灸暑凍瘡風瘡佳
明
去風痛脚痺殺米虫
時
珍

松脂
毛
花

六

方 辟温疫

一切細酒服方寸匕日三能辟温疫 傷寒類要

中風口喎

一斤搗汁清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出愈 千金方 三年中風

一升細切酒一斗煮取三升頓服取汗甚效 千金 歷節風 酒三升浸七日

服一合日 脚氣風痺 酒治十二風痺不能行衆

三 同上 脚氣風痺 療不效者服此一劑便瘥重者

不過兩劑 一六斤細剉以水四石煮取四斗以

米五斗釀如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥封

頭七日後發澄飲取醉得 大風惡酒 猪毛松葉二斤

此酒力者甚衆 千金方 麻黃去節五兩

剉以絹袋盛之寘清酒二斗中浸之 春五日夏三日

秋七日冬七日每温飲數杯常令醱之 聖惠方

松花 又名 松黃 甘温潤心肺益氣除風止血

丹溪曰多食發上焦熱病

發明

丹溪曰多食發上焦熱病

鳴皋曰——養陰治血分病是亦足厥
陰肝藥也

鳴皋曰凡藥味辛而香者非熱即溫柏葉
之清肺止血謂其性平則可謂其性寒則
不然

昂曰養陰滋肺而燥土最清血分為補陰
要藥鳴皋按肺喜潤惡燥脾喜燥惡潤故
潤肺之藥多傷脾燥脾之藥多傷肺一舉
兩得者其惟——乎

頌曰
性溫

側柏葉

又名栴

苦微溫

權曰苦平
頌曰性寒

治吐血衄血崩中赤白去濕

痺生肌

別錄

治冷風歷節疼痛止尿血

甄權

灸胃凍瘡燒

取汁塗頭烏髻髮

大明

傳湯火傷止痛滅癩服之療蠱

痢常服殺五臟蟲益人

蘇頌

權曰與酒相宜之才曰瓜子牡蠣桂

為使畏菊花羊蹄諸石麩麩伏砒硝

發明

丹溪曰此補陰之要藥其性多燥久服之大益
脾土以滋其肺時珍曰柏性後凋而耐久乃多

壽之木所以道家以入服食元旦以之浸酒飲辟邪
皆有取也秦宮人因賊至走入山飢無所食一老人
教食松柏葉初覺苦澀久相宜遂不飢至漢成帝時
獵者見一人身生黑色越澗如飛乃捕獲之已二百
側柏葉發節

七十二

餘歲矣見

抱朴子

方 中風不省

涎潮口禁言語不出手足躄曳得病之日便進此方可使風退氣和不成

癱人一一一握去枝葱白一握連根研如泥無灰

酒一升煎一二十沸溫服其人如不飲酒分作數服

再進他藥

吐血不止

張仲景師一一湯用青柏葉一把乾薑二片阿膠一挺

見楊氏家藏 炙以水二升煮一升去渣別絞馬通汁一升合煎一

升濾淨一服盡之○聖惠方用一一米飲服二錢

或蜜丸或水

尿血

酒服三錢 涿急 大腸下血 隨四時方

煎服並良 向米一一炒研米飲服二錢王洪之

在舒州病此得此方二服愈 百一 酒毒下血 或下

荆一一九蒸九晒二兩陳槐花一兩炒 普濟 蠱痢下血

焦蜜丸梧子大每服四十九酒下 小兒洞痢

男婦及小兒大腹下黑血茶脚色或膿血

如靛色一一焙乾為末與川連同煎服

好古曰栢子仁入肝經氣分時珍曰透心
腎益脾胃
常曰香通竅故聰明耳目甘故益血心生
血汗為心液補心故止汗

煮汁代
茶 經驗方 月水不斷 三錢水酒各半煎服。室

女用 一 一 木賊炒微焦等分為末 大風癩疾 肩髮
每服二錢米飲下 見聖濟總錄

一 一 九蒸九晒鍊蜜丸梧子大每服五
丸至十九日三夜一百日即生 聖惠方

枝節煮汁釀酒去風痺歷節風燒瀝塗治癩疥及虫

癩 蘓頌曰陳承曰久不愈者
燒瀝油敷數次無不愈

脂治身面疣目同松脂研勻塗之數夕自失 聖
惠

栢子仁 甘平治驚悸益氣除風濕安五臟久服令

人潤澤美色耳目聰明 本
經療恍惚虛損吸氣歷節腰

中重痛益血止汗 錄別
治頭風腰腎中冷膀胱冷膿宿

栢脂 栢子仁

辛三

昂曰略陳即不堪用

昂曰凡補脾藥多燥此潤藥而香能舒脾藥脾藥中兼用取良

水興陽道去百邪鬼魅小兒驚癇權潤肝好養心氣

潤腎燥安魂定魄益智寧神燒滌澤髮治癬疥時珍

甄權曰畏菊花羊蹄

草之才曰見柏葉下

發明好古曰一一肝經氣分藥也又潤腎古方十精丸用之時珍曰一一性平而不寒不燥味甘而

補辛而能潤其氣清香能透心腎益脾胃

蓋仙家上品藥也宜乎滋養之劑用之

方服柏子法

斤白朮末地黃末各一斤搗勻丸彈

子大每服一丸日三服百日

百病皆愈久服延年奇效老人虛秘火麻仁等分

研溶蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯

食前調服二三十丸冠宗爽黃水瘡二兩香油

二兩煎桐塗之

如神陸氏方

鳴皋曰桂類多綱日集解中辨之紛然地
 道既難細辨形狀亦難詳求惟有書之一
 法其味甚香油多甘味極濃而長辣味少
 於甘味細嚼嚼覺味美性平和毫不猛
 烈便為上品甘辣相半者尚可用治中焦
 病有一種辣舌至痛如椒薑者專能借肺
 斷不可用一種味微帶苦者亦不可用○
 古云交趾桂乃交趾清華山野生者所謂
 清華桂是也彼國亦難得而禁嚴不可得
 矣今之用者惟廣西梧州為第一次則雲
 南之迤安桂蒙自桂嘗之味長而平和者
 皆可用也安邊桂厚大油多可治脾胃之
 病如潯桂等下品斷不可用
 節曰入肝腎血分補命門辛能散肝甘能
 益脾
 鳴皋曰一性辛熱入血分極能動血故
 血病性用之熱味辛純陽陰虛血熱之
 人用之靡不成大禍至謂能引火歸源必
 得清華桂乃可今已不可得時醫沉于本
 草之言不辨貨之美惡任意用之不惟不

桂香散

肉桂

桂 兩雅 茵桂 木經

甘辛太熱有小毒利肝肺氣心腹寒熱冷痰霍亂轉

筋頭痛腰痛出汗止煩止嘔欬此指肺氣鼻鼈墮胎温中堅

筋骨通血脉理疎不足宣導百藥無所畏別錄補下焦

不足沉寒錮冷之病滲泄止渴去營衛中風寒表虛

自汗春夏為禁藥秋冬下部腹痛非此不能止元補

命門不足益火消陰好古治寒痺風瘡陰盛失血瀉痢

驚癩此指慢驚時珍

之才曰得人參甘草麥冬大黃黃芩調中益氣

得柴胡紫石英乾地黄療吐逆忌生葱石脂
 肉桂

本草

能抑肝風而且大煽肝陽不能扶脾土而
且大損肺陰以致困篤者不知凡幾也
鴨泉曰一一之性以通為用者也必得真
者而後可用又曰陽盛失血者多陰盛失
血者少亦時有之不可用涼藥須桂附必
須有確見乃可用

希雅曰得芍藥給糖甘草黃芪則建中兼
止榮弱自汗得石膏知母人參竹葉麥
冬治陽明瘧渴欲引飲汗多寒熱俱甚
得朴硝當歸下死胎入桂苓甘靈飲治
中暑霍亂吐瀉殊驗得薑黃蘇合治起
氣傷肝脇痛得當歸牛膝治冬月產難
交骨不開字按曰得紫石英治吐逆

桂枝

發明時珍曰一一性下行益火之源東垣所謂腎苦
燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣者也

聖惠方言桂心入心引血化汗化膿蓋手少陰君火
厥陰相火與命門同氣者也別錄云桂通血脉是矣
曾世榮云小兒驚風及泄瀉並用五苓散以瀉兩火
滲土濕內有桂能抑肝風而扶脾土又醫餘錄云有
人患赤眼痛腫脾虛不能飲食肝脉盛脾脉弱用涼
藥治肝則敗脾用熱藥治脾則肝愈盛但於溫平藥
中倍加一一殺肝而益脾故一治而兩得傳云木得
桂而枯是也此皆與別錄桂利肝肺氣壯桂治脇風
脇痛之義相符人所不知者今為拈出又桂性辛散
能通子宮而破血故別錄言其墮胎龐安時云炒過
則不損胎也又丁香一一治痘瘡

灰塌能溫托化膿詳見丁香下

方心腹脹痛

氣短欲絕桂二兩
水煮頓服

中惡心痛
方同
死

胎不下

桂末二錢待痛紫時童便溫熱調下名觀音
救生散亦治產難橫生加射香少許酒下

希難曰肉桂三心實一物也祇去皮耳
 鳴皋曰李士材本草通元云在下近根者
 為肉桂在中者為桂心在上枝條為桂枝
 二說未知孰是嘗謂雷斅多臆說難信李
 氏亦似強分閱桂心列方治病與桂無異
 似亦不必分矣且肉桂之精華在裏層斷
 無刮去之理大約未去皮為肉桂去外皮
 便為桂心鄙意如此俟高明証之
 昂曰九種心痛一虫二症三風四驚五食
 六飲七冷八熱九去來痛皆邪乘於手少
 陰之絡邪心相激故令心痛——苦入心

中風失音

含桂嚙汁○又桂末三錢水煎服取汗千金頭風塗聖惠足

健筋急

同小兒久痢赤白桂去皮以薑汁炙黃川連以吳茱炒過等分為末紫菀木

瓜湯服名金鎖

散全幼心鑑打撲傷血瘀昏悶辣桂末乳癭腫痛

方見附

子下

桂心

數曰用紫厚者去上粗皮并內薄皮取心中味辛者用之

苦辛無毒治九種

心痛腹內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅痺脚痺不仁

止下痢殺三蟲治鼻中瘻肉破血通月閉胞衣不下

甄權治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明

目暖腰膝治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉消瘀血

桂心

主

辛走血故治之(鳴泉按)痛則不通：則不痛桂以通為用故也

昂曰氣薄浮升入太陰肺太陽膀胱經
鳴泉曰治脇風脇痛則亦入肝胆經矣

破痧癰癥瘕大治風僻失音喉痺陽虛失血內托瘡

疽痘瘡能引血化汗化膿解蛇蝎毒時珍

方九種心痛聖惠一錢為末酒煎服大效外臺一末酒服方寸匕產後

心痛惡血冲心氣悶欲絕一為末犬胆汁九芡子大熱酒下一丸聖惠寒疝心痛

四肢逆冷全不飲食同上血崩不止砂鍋內煨存性

為末米飲空腹服一二錢吐血下血肘後用一為末水服方寸匕

名神應散婦人良方吐血下血末水服方寸匕

○王繆曰此陰采陽之症也不可服涼藥趙宣德吐暴血二服而止屢效中風口喎舌不能轉

桂枝又名牡桂本經時珍曰此即木桂也薄而味淡其最薄者為一

嘉言老人曰仲景用一一以和榮衛而解肌此定例也不但為太陽經中風之本藥即少陰之宜汗者亦取用之其妙處在用芍藥以養陰而和陽太陽之營衛得芍藥之酸收則不為甘溫之發散所逼而安其位也至若少陰則更為陰臟而少血所以強逼少陰汗者重則血從耳目口鼻出而厥絕可虞輕亦小便不利而枯涸可待用藥自當比芍藥之例而倍加陰以和陽余每用一一必加生地以佐芍藥之不逮三十年來功多鹿一可紀蓋得此例法也仲景於冬月太陽中風之症而用一一為例不為春月之病溫設也春月病溫用一一勢必佐以辛涼而冬不藏精之溫屬在少陰陰不得用一一之溫解之以少陰本陰樞寒邪入其界非溫不散也豈惟一一甚則麻黃附子在所必用所青倍加陰藥以輔之如芍藥地黃猪胆汁之屬是也今人未達此理但知惡藥性之溫概以羌獨柴葛混表則治太陽而遺少陰屢表而病不

辛溫無毒權曰治氣欬逆結氣喉痺利關節補中益

氣本經心痛脇痛脇風溫經通脈止煩出汗別錄去冷風

疼痛甄權去傷風頭痛開腠理解表發汗去皮膏風濕

元素泄奔豚散下焦畜血利肺氣成無已橫行手臂治痛

風震

發明好古曰或問本草言桂能止煩出汗而仲景治傷寒有當發汗凡數處皆用一一湯又云無汗

不得用一一汗家不得重發汗若用一一是重發其汗之多者用一一甘草湯此又用一一開汗也一藥

二用與本草之義相通否乎曰本草言桂辛甘大熱能宣導百藥通血脈止煩出汗是調其血而汗自出

也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者此為營弱衛強陰

桂枝

七十五

除莫可如何矣

鳴皋曰觀嘉言所論是火陰腎亦取用

一也

嘉言曰春傷於風夏生食泄謂腸胃受風

不俟脾之運化食入即出以故食已即泄

也不知者以為脾虛完穀不化用冬月冷

泄之法反以補脾剛燥之藥助風性之勁

有泄無已束手無策倘知從春令治之以

一領風從解肌而出一二劑可愈也

鳴皋曰此即夏英公風泄用葦葉湯之意

與葦葉本來看

嘉言氏曰經云一入咽陽盛則鬱春夏

發者為禁藥也桂能動血熱者為禁藥

也木得桂而死肝不足者為禁藥也暴按

春夏當用必用但以陽盛血熱為禁耳

鳴皋曰別錄溫經通脈一語東壁氏透達

營衛一語可以參桂枝之性矣

鳴皋曰一專入營血而溫經通脈故解

肌用一湯加葦根湯解肌後身疼痛脈

沉者有——加人參芍藥新加湯解肌後

虛陽必湊之故皆用——發其汗此乃調其營氣而

衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非——能開腠

理發出其汗也汗多用——者以之調和營衛則邪

從汗出而汗自止非——能閉汗孔也味者不知出

汗閉汗之義遇傷寒無汗者亦用——誤之甚矣成

無已曰——本為解肌若太陽中風腠理緻密營衛

邪實津液禁固其脈浮緊發熱無汗者不可與也必

也皮膚疎泄自汗脈浮緩風邪干於衛氣者乃可投

之發散以甘草為主故以——為君以芍藥為臣甘

草為佐者風淫所勝平以苦辛以甘緩之以酸收之

也以薑棗為使者辛甘能發散而又用其行脾胃之

津液而和營衛不專於發散也故麻黃湯不用薑棗

專於發汗不待行其津液也宗奭曰桂甘辛大熱素

問云辛甘發散為陽故仲景治傷寒表虛皆須此藥

正合辛甘發散之義承曰凡桂之厚實氣味重者宜

入治水臟及下焦輕薄氣味淡者宜入治頭目發散

藥故本經以茵桂養精以牡桂利關節仲景發汗用

——乃枝條非身幹也取其輕薄能發散時珍曰麻

汗出過多心下悸欲得按者有——甘草湯
 湯下悸欲作奔豚者有茯苓——甘草
 大棗湯解肌領邪有——加生地湯清陽
 瀉火有——加大黃湯溫經止汗有——
 加附子湯解肌瀉火有——白虎湯——
 加瓜蒌湯治誤攻腹滿時痛有表症相碍
 者有——加芍藥湯他如——加紅花湯
 ——加苓連湯亦在人隨症領悟而用之

耳
 希雍曰——于甘平氣微寒潤而滋補兼
 能退熱而專於補腎潤肺生津益氣為肝
 腎真陰不足勞乏內熱補益之要藥本經
 主五內邪熱消渴周痺別錄主風濕下胸
 脇氣客熱頭疼當指葉與地骨皮而言寒
 能除熱也至於補內傷大勞嘔吸堅筋骨
 強陰利大小腸久服輕身耐寒暑當是指
 子之功用老人陰虛者十之七八故服食
 家為益精明目之上品蓋熱退則陰生陰
 生則精血自長肝開竅於目黑水神光屬
 腎二臟之陰氣增益則目自明矣

黃遍徹皮毛故專於發汗而寒邪散肺主皮毛辛走
 肺也——透達營衛故能解肌而風邪去脾主營肺
 主衛甘走脾

辛走肺也

枸杞

又名枸檮爾雅枸杞忌別錄杞棘衍義地骨本經
 仙人杖別錄西王母杖
 花實並用
 天精抱朴
 時珍曰此通指根苗

苦寒主五內邪熱氣熱中消渴周痺風濕久服堅筋

骨耐寒暑

本經下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞嘔吸

強陰利大小腸

別錄補精氣諸不足易顏色明目安神

甄權

發明

時珍曰考本經所列主治蓋通根苗花實而言
 初無分別後世以杞子為滋補藥地骨皮為退

枸杞 地骨皮

七十六

希雅曰：雖為益陰除熱之上藥，若脾胃弱泄瀉者勿用，必用亦須同山藥蓮肉車前茯苓相兼。

時珍曰：去上焦心肺客熱。

好甘曰：入足少陰腎，手少陽三焦經。
鳴暴曰：亦入肺肝二經，介實曰：兼入胆經。
昂曰：地骨皮能涼血而補正氣，故治五內邪熱。

熱藥始分而二之，竊謂苗葉味甘苦而氣涼，根味甘淡氣寒，子味甘氣平，氣味既殊，功用當別。其單用之

功列於左

苗苦寒

時珍曰：甘涼。

除煩益志，補五勞七傷，壯心氣，去皮

膚骨節間風消熱，毒散瘡腫。

大明

和羊肉作羹，益人除

風明目，作飲代茶，止渴消熱，煩益陽事，解麩毒，與乳

酪相惡，汁注目中，去風障赤膜，鼠痛。

甄權

去上焦心肺

客熱

時珍

地骨皮

數曰：掘得根，東流洗去土，搥去心，甘草湯浸焙用。

苦寒

權曰：甘平。時珍曰：甘淡寒。杲曰：苦辛寒。

細剉，拌麩煮熟，吞之，去腎

昂且能上除頭風頭痛者肝腎同治也肝有熱則自生風與外感之風不同熱退則

風自息矣中能平胸脇痛為能清肝也

又曰腸骨者忌杞子中寒者忌地骨皮

又曰亦治欬嗽

介賓曰南產苦甘平北產大苦性劣入藥

以南者為佳其性辛寒善入血分肝腎三

焦胆經退陰虛血熱凡不因風寒而熱在

精髓陰分者最宜此物涼而不峻可理虛

勞氣輕而辛故亦清肺假熱者勿用

馮杲曰瀉白散用之以瀉肺方見葉根白

皮發明中

家風益精氣甄

去骨熱消渴孟

鮮骨蒸肌熱消渴風

濕痺堅筋骨涼血元

治在表無定之風邪傳尸有汗

之骨蒸李

瀉腎火降肺中伏火去胞中火退熱補正

氣好古

治上膈吐血煎湯漱口止齒血治骨槽風吳治

金瘡神驗陳

去下焦肝腎虛熱時

發明

弘景曰杞葉作羹小苦補益精氣強盛陰道根

實為服食家用甚美名為仙人杖遠有旨乎蘇

頌曰莖葉及子服之輕身益氣有花實葉根莖作煎

或單取子汁煎膏服之者其功並同甚益人也敬曰

其根似物形者為上時珍曰其苗名天精苦甘而涼

上焦心肺客熱者宜之根名地骨甘淡而寒下焦肝

腎虛熱者宜之此皆三焦氣分之藥所謂熱淫於內

治以甘寒也至於子則甘平而潤性滋而補不能退

地骨皮

七十一

熱止能補腎潤肺生精益氣此乃平補之藥所謂精不足者補之以味也分而用之則各有所主合而用之則一舉兩得世人但知用苓連苦寒以治上焦之火知伯苦寒以治下焦之火謂之補陰降火久服致傷元氣而不知杞子地骨皮甘寒平補使精氣充而邪火自退之妙予嘗以青蒿佐地骨皮退熱屢有殊功人所未喻者苗及根皮俱能制硫黃丹砂伏砒石

方 枸杞煎 治虛勞退虛熱輕身益氣令人切癭瘰癧永不發用枸杞十斤春用莖葉秋冬用

根實搗碎砂鍋熬膏如**地骨酒** 壯精骨補精髓延年

錫每酒服一合 千金 地骨皮生地菊花各

一斤搗碎以水一石煮汁五斗炊糯米五斗

麴拌勻如常釀封待熟澄清日飲 聖濟錄 虛勞客

熟地骨皮為末白湯調服 骨蒸煩熱 及一切勞或大

有錮疾者勿服 千金 病後煩熱並用

地仙散地骨皮二兩防風一兩炙草五分 熱勞如燦地

分每用五錢生薑五片煎服 濟生方 骨

皮二兩柴胡一兩為末每服二

錢麥門冬湯下 聖濟摠錄

虛勞苦渴

骨節煩熱 或寒熱用

地骨皮切五升麥冬三升小麥二升水煮

至麥熟去渣每服一升口渴即飲 千金

腎虛腰痛

地骨皮杜仲川草薜各一斤好酒三斗漬

之瓶中密封隔水煮一日任飲之 千金

吐血不止

地骨皮為散日

煎飲 聖濟摠錄

小便出血

新地骨皮洗淨搗汁無 汁則以水煎汁每服一

蓋入酒少許食

前溫服 簡便

帶下脉数

地骨皮一斤生地黃五斤 酒一斗煮五升日服之

千

天行赤目

暴腫地骨皮三斤水三斗煮三升去 渣入鹽一兩取二升頻洗之 謝道

人天

風蟲牙痛

地骨皮醋煎漱之虫即 出亦可煎水飲 肘後 口舌糜爛 地

皮湯治膀胱移熱於小腸上為口糜生瘡潰爛心胃

壅熱水穀不下用柴胡地骨各三錢煎服 東垣方

小兒耳疳

生耳後腎疳也地骨皮一味煎湯洗之仍 以香油調末塗之 高文 葵洲閑錄

地骨皮

六

〔即〕掘鮮者同鮮小蘗煎濃浸下疳極效

氣癢疔瘡

多年不愈者應效散又名托裏散用地骨皮冬月者為末每用紙蘸入瘡內頻用

生肌生肉更以米飲服

二錢日三 外科精義 男子下疳

先用米泔水洗之後搽地骨皮末生

肌 衛

生寶鑑

婦人陰腫

或生瘡地骨皮煎水頻洗 永類方

瘡疽惡瘡

膿血不止

地骨皮不拘多少洗刮去粗皮取細白瓢以粗皮同

骨煎湯洗令膿血盡以細瓢貼之立效一朝士腹脇

間患疽經歲或以地骨皮淋洗出血一二升家人俱

欲止之病者曰疽且少快更以淋之用五升許血漸

淡乃止以細瓢貼之次日

結痂愈

唐慎微本草

十三種疔

春上建日采葉 夏上建日采枝

秋上建日采子冬上建日采根並日乾為末如不得

依法采但得一種亦可再以絛繒一塊裹藥牛黃一

梧子大鈎棘針三七枚赤小豆七粒為末先於繒上

鋪亂髮一鴉子大乃鋪牛黃等藥包作團以髮束定

熨斗內炒令沸冷定刮搗為末以一方寸匕合前

把末二匕空心酒服二錢半日再服 千金方 瘰

刺即刺針

鳴皋曰杞子肝腎二經血分藥

昂曰能生精助陽利大小腸滑者勿用

又曰亦能清肝

不實曰此物微助陽而無動性用以助熱

地最妙善補勞傷尤止消渴真陰虛而臍

腹疼痛不止者多用神效

子接曰得杜仲草蘇治腎虛腰痛得青益

川椒治肝虛目暗

鳴皋曰一一汁紅勝胭脂能入血分而

補血活血也汁點目赤醫神效者亦活血

散瘀之功前人之論所不及

疽出汗

着手足肩背累如赤豆用地骨皮蔡根葉煮汁煎膏如飴隨意服之千金火赫

毒瘡

此患急防毒攻心腹杞葉打汁服立瘥肘後目濇有翳各二兩搗汁

以桑葉聚陰地一夜取汁點

雞眼瘡地骨皮紅花

之不過三五度十便良方同研細末傳之即愈

圍閣事宜

杞子時珍曰酒潤搗爛入藥

甘平堅筋骨耐老除風去虛勞補精氣孟主心病噎

乾心痛渴而引飲腎病消中滋腎潤肺明目時

方金髓煎杞子搗紅熟者以無灰酒浸之封固兩

銀錫慢火熬膏淨瓶密收每早服二大

是晚再服積年不輟可以羽化四神丸治腎

杞子 山茱萸 七十九

中梓曰：一平而不熱，有補水制火之能，與地黃同功，而降蒸者未嘗用之，惜哉。

好古曰：入足厥陰，肝足少陰，腎經最分。

中梓曰：酸屬東方，而功多在北方者，以水

同源也。肝為木，腎為癸水。

希雍曰：其治心下邪氣，腸胃風邪，寒熱頭

風，氣鼻塞者，皆肝腎二經所主之病。二

經虛熱，故見前症。經曰：諸風掉眩，皆屬肝

此藥溫能通行，辛能走散，酸能入肝，而做

虛熱風邪消散，則心下腸胃寒熱自除，頭

目亦清利，而鼻塞等症亦愈也。肝腎在下

損眼目昏花，或雲翳遮睛，一一斤好酒浸透，分四

分，四兩用川椒一兩，炒四兩，用小茴一兩，炒四兩，用

脂麻一兩，炒四兩，用川楝子肉一兩，炒棟出，一一如

熟地、白朮、茯苓各一兩，為末，密丸，九日服。瑞竹堂

肝虛下淚

一浸無
一酒飲

目赤生翳

一搗汁日點三
五次神效 肘後

面

黑肝肥

一十斤生地三斤為末，每服方寸
匕溫酒下，日三服，久則童顏。

聖惠 注夏虛

病

一五味子滾水泡
透代茶 攝生方

山茱萸

又名蜀酸棗，本經肉蓯綱，日魁實，同上。雞足
吳普 鼠矢 同上

集解

頌曰：木高丈，葉似榆花，白色，雷斅言雀兒蕪，
真相似，只是核八稜為異。時珍曰：雀兒蕪即

胡頹

子也

實酸平

別錄曰
微溫

治心下邪氣，寒熱溫中，逐寒濕，痹去

居至陰之位非得溫暖之氣則孤陰無以
生此藥正入二經氣分溫而補酸而飲故
精氣益而陰強也精益則五臟自安九竅
自利又腎與膀胱為表裏膀胱虛寒則小
便不禁耳為腎之外竅腎虛則耳聾肝虛
則邪熱客之而目黃二經受寒和則為心
痲二臟受補則諸症可瘳矣○鳴皋曰經
經氏所論前列諸症是肝腎二經所主者
可用非二經所主者不可泥也

希雅曰命門火熾者忌之膀胱熱結小便
不利者不宜用陰虛血熱不宜用欲用宜
同黃柏

昂曰聖劑云如何清劑以通九竅經疏云
精氣充則九竅利夫一一通九竅古今
疑之得經疏一言而意旨豁如又曰別錄
甄權嘗言發汗酸收之劑何以反發汗恐
誤

不寤曰亦能止帶濁節小便調經收血
希雅曰同兔絲茯苓巴戟鹿茸牛膝白膠
車前杞子地黃沙苑來冬能添精固髓

三蟲久服輕身本經腸胃風邪寒熱疝瘕頭風氣去

來鼻塞目黃耳聾面皯下氣出汗強陰益精安五臟

通九竅止小便利久服明目別錄治腦骨痛療耳鳴補

腎氣興陽道堅陰莖添精髓止老人尿不節治面上

瘡能發汗止月水不定甄權暖腰膝助水臟除一切風

逐一切氣破癥結治酒皯大溫肝元素

之才曰蓼實為之使惡枯梗防風防己數日酒潤
去核一斤只取四兩烘乾用核能滑精不可服

發明好古曰滑則氣脫瀉劑所以收之一一止小
便利秘精氣取其酸瀉以收滑也仲景八味丸

用之為君其

性味可知矣

山茱萸 酸棗仁

同人參五味牡蠣益智治老人小便淋瀝
及遺尿 同人乳沙苑熟地人參麥冬牛
膝菊花治腦骨痛腦為髓海髓足則腦痛
自除 同石菖蒲地黃、柏五味治腎
虛耳聾 入六味丸為腎虛而有濕熱者
所須

時珍曰足厥陰肝火陽胆藥

鳴皋曰雖係肝藥亦自入心而補心

昂曰炒熟則香能醒脾故歸脾湯用之

昂曰經疏云凡服固表藥而汗不止者用
棗仁炒香同生地黃白芍五味麥冬竹葉
桂圓肉煎服多效汗為心液故也又曰心
君易動皆由胆怯所致經曰十一官皆取

方 草還丹

益元陽補元氣固元精壯元神乃延年
嗣續之藥也 酒浸取肉一斤破
故紙酒浸炒半斤當歸四兩射香一錢為末蜜丸梧
子大每服八十一丸臨卧益湯下或酒下 吳曼扶

壽

鳴皋曰一老人浮腫小便不利百治不效一醫用八
味加車前牛膝丸服而愈可為 利竅之明証

但病不在肝腎虛者似非所宜腎為二便關開腎氣
虛故送小便不出山萸收斂腎氣腎氣旺則送出矣

故云利

小便也

酸棗 又名棗 爾雅 山棗

宗奭曰微熱時珍 治心腹寒熱邪結氣聚四肢

酸痛濕痺久服安五臟 心煩不得眠臍上下痛血

決於胆東仁補胆故寧心

轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令

人肥健

別錄筋骨風炒仁研湯服

之才曰

惡防已

發明

恭曰本經用實療不得眠不言用仁今方皆用仁補中益肝堅筋骨助陰氣皆酸枣仁之功也

宗奭曰

酸枣經不言用仁今則天下皆用仁志曰按

五代史俊唐刊石藥驗云酸枣仁睡多生用不得睡

炒熟用陶云食之醒睡而經云治不得眠蓋其子肉

味酸食之使不思睡核中仁服之治不得眠正如麻

黃發汗根節止汗也時珍曰酸枣實味酸性收故主

肝病寒熱結氣酸痺久泄臍下滿痛之症其仁甘而

潤故熟用治胆虛不得眠煩渴虛汗之症生用治胆

熱好眠皆足厥陰少陽藥也今人以為心家藥殊昧

此

理

酸棗仁

[昂曰] 治胆虛不眠温胆湯中或加用之肝
 虛則胆亦虛肝不藏魂則不寐血不歸脾
 則卧不安金匱治虛勞虛煩不眠用酸
 仁湯枣仁二升炙草一兩知母川芎茯苓
 各二兩深師加生薑二兩此補肝之劑經
 曰卧則血歸於肝二方枣仁並生用豈以
 煮過便為熟乎又曰又治胆熱好眠胆熱
 必心煩口苦何反能好眠乎温胆湯治不
 眠用二陳加竹茹只實皆涼藥乃以涼肺
 胃之熱非以温胆經之寒也其以温胆名
 者以胆欲不寒不燥當温為候耳胆熱好
 眠四字不能無疑也
 [鴨泉曰] 胆為甲木胆熱則木剋脾土脾受
 剋則倦而好眠枣仁非治胆熱其或為醒
 脾之效乎
 [好古曰] 肝經黃分藥時珍曰子能令母實
 故兼補腎

方 胆風沉睡

胆風毒氣虛實不調昏沉多睡用酸
 枣仁一兩生用全挺臘茶二兩以生

薑汁塗炙微焦為散每服二錢水
 七分煎六分温服 簡要濟衆方 胆虛不眠 心多驚
 悸用酸

枣仁一兩炒香搗末每服二錢竹葉湯下口和
 劑加人參一兩辰沙半兩乳香二錢半蜜丸服 振悸

不眠 胡洽方酸枣仁湯用酸枣仁二升伏苓白朮人
 參甘草各二兩生薑六兩水八升煮三升温服

見 虛煩不眠 深師方酸枣仁湯用酸枣仁二升蠶
 母乾薑茯苓川芎各二兩炙草一兩

水一斗先煮枣仁減三升乃同 骨蒸不眠 心煩用枣
 煮取三升分服 圖經本草 仁一兩水

二盞研絞取汁下粳米二合煮粥候熟 睡中汗出 酸
 下地黃汁一合再煮勻食 聖惠方

仁人參茯苓等分為末
 每服一錢 簡便方

杜仲 又名思仲 別錄思仙 本經木綿 吳普櫛 時珍
 曰有杜仲服此得道因以名之思仲思仙皆由

昂曰按腰痛不已者屬腎虛痛有定處屬
 死血往來走痛者屬痰膠冷身重遇寒即
 發者屬寒濕或痛或止屬濕熱而其原多
 本於腎虛以腰背腎之府也鳴皋曰往來
 走痛亦有屬肝氣者
 介賓曰治腰痛有殊功療足痛見立效內
 熱火威者亦當緩用
 希雍曰腎虛火熾者用當與知柏同入
 又曰同牛膝杞子川斷白膠地黃五味兔
 絲黃柏山藥治腎虛腰痛及下部軟弱無
 力

此義

皮辛平 別錄曰甘溫 甄權曰苦暖 治腰膝痛補中益精氣堅筋骨

強志除陰下濕瘡小便餘瀝久服輕身耐老 本經 治脚

中酸痛不欲踐地 別錄 治腎勞腰脊攣 大明 腎冷腰痛人

虛而身強直風也腰不利加而用之 甄權 能使筋骨相

着 李杲 潤肝燥補肝經風虛 好古

之才曰 忠元參蛇蛻 甄曰 削去粗皮每斤用

酥一兩蜜三兩和塗炙以盡為度細判用

發明 時珍曰 古方只知滋腎惟王好古言是肝
 經氣分藥潤肝燥補肝虛發昔人所未發也蓋

肝主筋腎主骨腎充則骨強肝充則筋健屈伸利用
 皆屬於筋——色紫而潤味甘微辛其氣溫辛甘溫

杜仲

八十一

能補微辛能潤故能入肝而補腎子能令女實也一
 少年新娶後得脚軟病痛甚醫作脚氣治不效孫琳
 診之用一一味寸斷片折每以一兩用半酒半水
 一大盞煎服三日能行又三日全愈琳曰此乃腎虛
 非脚氣也一一能治腰

方 青娥丸

方見補骨脂下

腎虛腰痛

崔元亮海上方用一
 去皮炙黃一斤分

十劑每夜取一劑水一升浸至五更煎三分減一取
 汁入羊腎三四个切再煮三五沸如作羹法和以椒
 鹽空腹頓服○聖惠入薤白
 七莖○篋中方加五味子 風冷傷腎 腰背虛痛一
 一斤切炒
 酒二升漬十日服三合此陶隱居得病後虛汗及
 效方也○三因方為末每旦酒服二錢 頻慣墮胎 受孕一
 月用
 中流汁一牡蠣等分為末卧時 肘後 兩月用
 水服四五錢不止更服 楊
 一八兩糯米湯浸透炒去絲續斷二兩酒浸山藥
 為糊丸或棗肉為丸梧子大糯米飲下五十九

常曰此二藥大補腎氣托住胎元則不墜

〔馮奉曰〕一腎經藥

〔張介賓曰〕味苦性涼陰也降也養陰氣平
陰火解煩熱骨蒸止虛汗消渴及淋濁
溺便血尿血陰瘡痔漏痰痛清肝明目
止淚

〔希雅曰〕甘寒涼血益血之藥入足少陰經
蓋腎水木寒曰虛而熱而軟此藥氣味俱
陰正人腎除熱補精之要品〔又曰〕此藥有
變白明目之功累試輒驗經文不載為闕
略也

起簡便

女貞

又名貞木山海經蠟樹〔時珍曰〕琴操載魯有
處女見一木而作歌者此也近時以放蠟

出故又

名蠟樹

集解

〔時珍曰〕一冬青一類二種一葉長子黑
色冬青葉微圓子紅色為異耳〔又曰〕一綱

目亦名冬青今方書
所用冬青皆一也

子苦平

〔時珍曰〕溫補中安五臟養精神除百病久服肥健

輕身不老

〔本經〕強陰健腰膝變白髮明目
〔時珍〕

發明

〔時珍曰〕一子乃上品妙藥古方罕用何哉典
術一木乃少陰之精故冬不落葉觀此則其

益腎之功尤可推矣世傳一丹方云一子酒浸
一日夜布袋擦去皮日乾為末待旱蓮草出多取數
女貞

今三

又曰同地黃首烏人參麥冬旱蓮草牛膝
杞子山藥桑椹黃柏椒紅蓮頭為變白要
藥同甘菊生地蒞藜杞子能明目

石搗汁熬濃膏和九梧子大每夜酒送百丸不旬日
間膂力倍加老者即不夜起又能變白髮為黑強腰
膝起

陰氣

方 虛損百病

一子酒蒸晒乾二十兩桑椹乾十
兩旱蓮草十兩家九如四月即搗桑

椹汁七月即搗旱蓮汁和藥即不必用密
每服七八十九鹽湯送下 見簡便方 風熱赤眼

一子搗汁煎膏瓶收埋地
中七日每用點眼 濟急

葉微苦平除風散血消腫定痛治頭目昏痛諸惡瘡

腫疔腫潰爛久者以水煮乘熱貼之頻換醋煮亦可

口舌生瘡舌脹出搗汁含漱吐涎

時珍

方 風熱赤眼

一葉五斗搗汁浸新磚數片五日
掘坑架磚於內蓋之日久生霜刮下

入龍腦少 一切眼疾 許點之 葉研爛入朴硝貼 俱普濟

楮 又名穀音楮亦作楮詩疏穀桑 頌曰陸佃詩疏云楮幽州謂之穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀

集解 恭曰一有二種一皮有花斑文謂之斑穀今人用皮為冠者一皮白無花枝葉大相數但

取其葉似葡萄葉作餅而有子者為佳其實初夏

生大如彈丸青錄色至六七月漸深紅色八九月

采冰浸去皮瓢取中子陸氏詩疏云南人績其皮

以為布又搗以為紙甚好大明曰皮斑者是皮

白者是穀時珍曰按說文一穀乃一種不必分別

惟辨雌雄耳雄者皮斑而葉無極又三月開花成

穗如柳不結子雌者皮白葉有極又亦開碎花結

子如楊梅二種並易生葉多澀毛南人剥皮搗煮

作紙亦緝練為布不堅易朽

鴨泉曰細緝一一之功用不迥消腫利水 耳時珍既引軟骨之說則益氣補虛之說 楮桃

實 甘寒治陰痿水腫益氣充肌明目 壯筋骨助

楮實

八十四

不可沉也

陽氣補虛勞健腰膝益顏色

大 驗方六月六日取穀子五升水
明 酒蒸焙乾用口經

一斗煮五升去渣熬膏如錫用

發明

頌曰仙方單服其實正赤時叔子陰乾篩末水
服二錢七久乃益佳時珍曰別錄言一功用

大補益而修真秘旨言久服令人成骨軟之病濟生
秘覽治骨鯁用一煎湯服豈非軟骨之徵乎按南
唐書云烈祖食飽喉中噎國醫莫能愈吳廷紹請進
一湯一服疾如失羣醫他日取用皆不驗扣之答
曰噎味甘起故以此治之愚謂此乃治
骨鯁軟堅之義耳治他噎故不驗也

方 水氣蠱脹

白丁香一兩半為末以膏和九梧子

大便少至多服至小便利脹減為度後服治中
湯調養忌甘苦峻補發動之物 活法机要 肝熱

生翳

服一錢日二 直指 身面石疽 狀如痲癩而皮
厚一搗傳

外臺金瘡出血
之 搗傅
同上

白皮 甘平逐水利小便
別錄治水腫氣滿
甄權喉痺
吳普

煮汁釀酒飲治水腫入腹短氣咳嗽為散服治下血

血崩
時珍

方 血痢血崩
楮白皮荆芥等分為末冷醋調服一錢之神效不可具述 危氏得效方

風水腫浮
一身盡浮楮白皮散用楮白皮猪苓木通各二錢桑白皮三錢陳橘皮一錢生薑三

片水二鍾煎服
魚骨鯁咽 楮樹嫩皮搗爛為丸水下

日一劑 聖濟
二三十丸 衛生易簡方

蕤仁
又名蕤核 本經白接 爾雅

集解 別錄曰蕤核生幽谷及己酉弘景曰今出彭城大如烏頭形圓而匾有文理狀似胡桃核

楮膏 蕤仁

八十五

[昂]曰入心脾肝三經消風散熱益水生光
 又曰三經皆血臟也血得其養則目疾平
 凡目病在表當疏風清熱在裡傷腎虛血
 少神勞宜補腎養血安神遠視為腎水虧
 近視為火不足
 [馮]舉曰雷敷所說製法當是眼藥如此服
 食當不爾也

破取仁用保昇曰今出雍州葉細似枸杞而狹長
 化白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺五
 六月熟采實頌曰今河東并州亦有之木高五七
 尺莖間有刺時珍曰郭璞云白桉小木也叢生有
 刺實如耳瑤紫
 赤可食即此也

甘溫 別錄曰 治心腹邪熱結氣明目 赤痛傷淚出

目腫皆爛久服益氣 本經 強志明耳目 吳普 破心下結痰

痞氣鼻鼈 別錄 治鼻衄生治足睡熱治不眠 藏器 數日 凡使

一以湯浸去皮去擘作兩片每四兩用芒硝
 一兩木通七兩同煮一伏時取仁研膏入藥

發明 弘景曰醫方惟以治眼仙經以合守中丸也頌

曰按劉禹錫傳信方所著治眼法最奇云眼風
 癢或生翳或赤皆一切皆主之宣州黃連末一一去
 皮研膏等分和勻取不蛀乾棗二枚割下頭去核以

時珍曰能通腎氣

二物填滿却以割下頭合定用少薄綿裹之大茶鍾
盛於銀器中文武火煎取一鴉子大以綿蘆罐收點
眼萬不失前後試驗數十
人皆應今醫家亦多用得效

方 春雪膏

治肝虛風熱上攻眼目昏暗痛癢隱澀
赤腫羞明迎風流淚黑花 一 去皮壓

去油二兩龍腦二錢半研勻

生密六錢和收點眼 和劑 取膜翳

者二錢研勻收之 百點膏 治一切目疾 一 去油三

去醫妙不可言 五錢以三味熬取濃汁次下

一 膏日點 孫氏集效 赤爛眼 一 杏仁各一

入膩粉少許為丸每用 熟湯化洗 經驗良方

柘 宗奭曰 木裏有紋可旋為器葉可飼蚕然葉

硬不及桑入藥以無刺者良 時珍曰 處 山中

有之喜叢生幹疎而直葉厚團而有尖飼蚕取

絲作琴瑟清響勝常其實狀如桑子而圓粒如

雜仁 柘

八十六

椒其木染黃赤
色謂之一黃

禾白皮東行根白皮 甘温治崩中血結瘡疾大明釀

酒服主風虛耳聾補損虛羸夢與人交洩精者藏

發明時珍曰一能通腎氣聖惠治耳聾二十年者有

一斗故鉄二十斤煨赤水五斗浸取清合水一石五
斗用米二石麩二斗釀酒成用真磁石三斤為末浸

酒中三宿日夜飲之取
小醉而眠聞人聲乃止

方 洗目全明 一木煎湯日洗
甚效 海上方

桑根白皮別錄曰出土上者殺人時珍曰根見土上
者名馬額殺人旁行出土者名伏蛇亦有

毒而治

心痛

好古曰入手太陰肺經

〔厚〕曰能散瘀血故治崩中垂血能降逆故治欬滿止霍亂

〔希雅〕曰得二冬秋冬百部薄荷甘草沙參貝母枇杷葉五味子為治嗽要藥 得芍藥杏仁木瓜茯苓橘皮赤小豆為治水腫之神劑

〔子接〕曰得地骨皮瀉肺得白茯苓利水得糯米阿膠治咳嗽吐血

〔子接〕曰得地骨皮瀉肺得白茯苓利水得糯米阿膠治咳嗽吐血

甘寒 〔厚〕曰甘辛 寒 權曰平 治傷中五勞六極羸瘦崩中絕脉補

虛益氣 〔本〕 經 去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利

水道去寸白可以縫金瘡 〔別〕 錄 治肺氣欬滿虛勞客熱

頭痛內補不足 〔甄〕 權 煮汁飲利五臟入散用下一切風

氣水氣 〔孟〕 洗 調中下氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲

止霍亂吐瀉研汁治小兒天吊驚癇客忤及傳鷲口

瘡大驗 〔大〕 明 瀉肺利大小腸降氣散血 〔時〕 珍

之才曰續斷桂心麻子為之使 〔數〕曰忌鉄及鉛凡使

采十年以上向東嫩根銅刀刮去薄皮取白皮用皮中涎勿去力

俱在涎也 葉白皮皮中白汁

發明

果曰

一甘以固元氣之不足而補虛卒以

不純良不宜多用時珍曰

則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十

劑云燥可去濕赤小豆之屬是也錢乙治肺

氣熱盛效嗽而後欬面腫身熱瀉白散用

一兩地骨皮焙一兩甘草炒半兩每服二錢入粳米

百粒水煎食後溫服地骨皮皆能瀉火從小

便去甘草瀉火而緩中粳米清肺而養血此乃瀉肺

諸方之準繩也羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣

瀉邪所以補正也若肺虛而小便利者不宜用之

曰作線縫金瘡腸出更以熟鴉血塗之唐安

金藏剖腹用

此法而愈

方 欬嗽吐血

鮮米泔浸三宿刮去黃皮剖

米飲下

產後下血

更入糯米四兩焙乾為末每服一錢

血露不絕

根取屑

經驗

肘後

〔馮奉曰〕牛皮膠最能軟堅一婦乳腫硬而木醫不能治或教以真牛皮膠類博即軟而消人莫解其理予曰腸胃結滯大黃巴豆莫能消何以霞天膏能消之乎即此理也

馮奉曰——足少陰腎經藥
馮奉曰——色黑故益腎水色帶紫故入血分古人皆言其性涼實則生搗汁飲則涼熱膏則溫也惟其入血分故滑腸結

五指撮醇酒服之
日三服 肘後方 墜馬損傷 止瘀散 煎膏傳之便痛 經驗後方

髮脫 煎水類洗 小兒流延 脾熱也胸膈有痰 聖惠 搗自然汁

飲少許甚效 驚爛天吊 葉東行根取汁 小兒火丹 聖惠方 聖惠方

煮洗 石瘖堅硬 不作膿者蜀——陰乾為末煇 千金 膠和酒調傳以軟為度 千金方

皮中白汁小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刀

傷燥痛消兕血止仍以白皮裹之甚良 蘇頌 塗蜈蚣如

蛛傷有驗 時珍

桑椹 一名文 武實 甘平單食止消渴 蘇恭 利五臟關節痛血

氣久服不飢安魂鎮神令人聰明 蘇恭 搗汁飲解中酒

桑椹

六十八

燥者宜之惟其益腎水故亦能明目

毒釀酒服利水氣消腫

時珍

發明

宗奭曰本經言桑甚詳而獨遺一桑之精英盡在於此濾汁熱膏入蜜窰器收貯每用一二

錢夜卧以泚湯點服治服金石發熱口渴生精神及小腸熱其性微涼故也酒服亦良時珍曰一有紫白二種楊氏產乳云孩子不得與一令兒心寒而陸機詩疏云鳩食一多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲一酒能理百種風熱其法用一汁三斗重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑一合瓶收每以一合和酒飲之和入燒酒藏之經年彌佳

方 水腫脹滿

水不下則滿溢水下則虛竭還脹十無一活宜用一治之桑白皮切以

水二斗煮汁一斗入一再煮取五升以糯米五升造酒飲 普濟方 小兒赤禿 汁頻

服 小兒白禿 一入嬰中曝三七日化為 十金 水洗之三七日神效 聖濟 拔白變

時珍曰手足陽明大腸胃藥
昂曰能涼血燥濕

子持曰得麥冬治勞熱得生地阿膠石膏
批杷葉治肺燥咳嗽

解毒白葉
大如葉而
厚者為白
赤者為赤
葉者為赤

黑 一斤料蚪一斤瓶盛封閉懸屋東一百
日晝化為黑泥以染白髮如漆 陳藏器
瘰癧

一熱膏白湯點服
名文武膏 保命集

桑葉苦甘寒有小毒 大明曰家
除寒熱出汗 本煎濃
桑葉無毒

汁服能除脚氣水腫利大小腸 蘇
灸熟煎代茶止渴

洗煎飲利五臟通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風

蒸熟搗膏風痛出汗并撲損瘀血接爛塗蛇虫傷 大

研汁治金瘡及小兒吻瘡煎服治霍亂吐下腹痛亦

可以乾葉煮之雜桑葉熬膏服去老風及宿血 藏治

勞熱咳嗽明目長髮 時
珍汁解蜈蚣毒 別錄

桑椹 桑葉

八十九

吊曰一僧就枕汗出衣被皆透二十年政
教米帶露桑葉焙為末米飲下二錢遂愈

發明

頌曰

四月桑茂時采葉十月經霜二分已落一

分猶存名神仙葉采取與前葉同陰乾為末丸

散任服或煎水代茶可常服又霜後葉煮湯淋手足

去風痺又微灸和桑皮煎服治痢及金瘡止血丹溪

曰經霜一一研末米飲服止盜汗時珍曰霜

一一乃手足陽明藥煎汁代茗能止消渴

方 風眼下淚

臘月不落桑葉煎
湯日洗 集簡

赤目澀痛

末紙卷

燒烟薰鼻取效此海

上方也 普濟方

吐血不止

霜一一焙研冷茶下
三錢只一服止後用

補肝肺藥

聖濟摠錄方 小兒渴疾

一一逐片塗生蜜懸繫陰

霍

亂轉筋

入腹一一煎一二
服立定 聖惠

瘡口不斂

霜一一為末
傳之 直指 湯

火傷

霜一一焙存性香油
調傳 醫學正傳

手足麻木

霜一一煎水
頻洗 救急 肺

毒風瘡

狀如大風綠雲散一一蒸熟日
乾為末水調二錢服 經驗方

刀斧傷

為末

馮舉曰一一之性近桂枝能行四肢故治脚氣及四肢拘攣但桂枝熱一一涼耳性近桑根皮故亦治嗽利小便但根皮性微峻而枝性平耳

乾貼之

甚良

桑枝苦平治遍體風癢乾燥行水氣治脚氣風氣四

肢拘攣上氣眼運肺氣咳嗽消食利小便久服聰明

耳目瘳口乾及瘰癧後渴嫩條細切一升炒香煎飲

亦無忌久服終身不患偏風蘇頌燒漚治大風瘳疥生

眉毛時珍

發明頌曰一一不冷不熱可以常服抱朴子言一切仙藥不得桑煎不服時珍曰煎藥用桑者取其

能利關節除風寒濕痺諸痛也觀靈樞治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙布熨痺處治口僻用馬膏法以

桑鈎其口及生桑灰上皆取此意也又瘰癧瘳背不起發或瘳肉不腐潰及陰瘳癰癰流注膿瘳惡瘳

桑枝

九十

常曰——能養津液行水釀酒服甚良

鳴皋曰昔年 老母患臂痛五六年作痰
治風治養血舒筋悉不愈一人傳方用
一蒸膏服之遂愈又一老婦患臂痛十餘
年 老母以此方授之亦服之而愈蓋因
熱傷筋者多效亦有去風之能

久不愈者用素木炙法未潰則拔毒止痛已潰則補
益元氣亦取通關節去風寒火性暢達出鬱毒之意
其法以乾素木劈成細片紮作小把然火吹息災患
處每吹炙片時以菸肉腐動為度內服補托藥誠良
方也又趙潛養荷慢筆云越州一學錄少年苦嗽百
藥不效或令取南向柔柔條一束每條寸折納鍋中
以水五碗煎至一碗盛瓦器中渴即飲
之服一月而愈此亦——煎之變法耳

方 水氣脚氣 —— 二兩炒香以水一升煎二合每
日空腹服之亦無禁忌 聖濟總錄

風熱臂痛 —— 一升切炒水三升煎二升一日服盡
許叔微云常病臂痛諸藥不效服此遂愈

本 破傷中風 —— 燒灑好酒對和溫服以醉
為度醒服消風散 摘元方 紫白

癩風 —— 十斤益母草三斤熬成
膏卧時溫酒服半合 聖惠

素柴灰辛寒有小毒蒸淋取汁為煎與冬灰等分同

滅瘰癧果子蝕惡肉煮小豆食大下水腫脹傳金瘡

止血生肌蘇恭桑霜治噎嗝積塊時珍淋汁入鍊五金家

可結汞伏硫孟洗

方 洗青盲目 煎湯澄清溫洗一方以童便和作丸泡湯澄清洗 龍木論

瘰癧症 其病變動有三十六種至九十九種使人寒熱恍惚默、不知所苦累年積月以至於死

復傳親人宜急治之用素白皮燒灰二斗瓶中蒸透以釜中水淋之又淋取濃汁澄清止取二斗以漬赤

小豆三斗漬一夜晒乾復漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊肉或鹿肉作羹進此豆飯初食一升至二升取

飽病淺者三四斗愈深者七八斗愈病去時體中自覺痛痒淫、若根本不盡再為之神效方也 肘後

瘰癧氣塊 瘰癧用大蠶一個蚕沙一斗一一一斗淋濃汁同煮如泥去骨再煮成膏丸梧子

辛柴灰 辛寄生 九十一

鳴皋曰——寄生素上為能拔取此一樹之精也綱目之集解粉如形狀不一或云是鳥食物子隨糞落於桑上而生或云是感造化之氣別是一物大約是鳥糞中落于而生者為近是余在江南曾得二枝俱是冬青蓋雀食冬青落子而生者若得以此寄桑則更妙殊不可得

宗奩曰——真者下咽必驗如神時珍曰必自採或連桑採者乃可用他樹寄生服之反有害也

介賓曰味苦性涼主女子血熱崩漏

大每服十九日 身面水腫 淋汁煮赤小豆飽 食不得吃湯飲 梅師

金瘡 之 同 上 瘡傷風水 瀆之 同 上 大風惡疾 毛 眉

脫落 淋汁洗頭面次用熱水綠豆粉濯之 頭 三日一洗頭一日一洗面不過十度愈 聖惠

風白屑 淋汁沐 之神效 同 上

桑寄生 又名寄屑 本經 寓木 同 上 宛童 同 上 葛

苦平治腰痛小兒背強癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉

安胎 本 去女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁主

金瘡去痺 別 助筋骨益血脈 大 主懷妊漏血不止令

胎牢固 甄 數曰采得陰乾 權 別用勿見火

昂曰苦堅腎甘益血外科用之散瘡湯退風濕

希雍曰同杞子地黃川斷胡麻首烏當歸牛膝治血虛手足臂骨節痛入獨活寄生湯治一切風濕痺

希雍曰八足厥陰肝少陰腎二經

實甘平明目輕身通神本經

方 隔氣 生一一搗汁一 集簡方 胎動腹痛 半阿膠炒半

兩艾葉半兩水煎温 毒痢膿血 六脉微小並無寒熱 服或去艾葉 聖惠 宜一一二兩防風

二錢半大芎二錢半炙草三銖為末每服二 錢水一盞煎八分和渣服 楊子健護命方 下血後

虛 下血止後但覺丹田元氣虛乏腰膝沉重無力 為末每服一錢白湯服無時 同上

石南 又名風藥

集解 蒸曰葉似茵草凌冬不凋闊中者葉細為好 江南者葉長大如枇杷葉無氣味不任用宗

藥曰似枇杷葉之小 者背無毛面不皺

葉辛苦平有毒養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛 本經 療

桑寄生 石南

九十二

昂曰——補陰祛風則有之然味辛不熱不助相火亦未聞春方中用之者別錄思男之說未可信

希雍曰同巴戟肉從容瑣陽鹿茸杞子山

黃治腎絕虛寒精滑精冷 同疾黎葉葉

首烏淫羊藿巴戟五加皮皂莢威靈仙虎

骨治肝腎為風寒濕所乘以致痺弱不能

行

又曰腎虛而陽道數舉者不宜用足弱由

於肝腎虛而不由於風寒濕客於下部者

不宜用

脚弱五臟邪氣除熱女子不可久服令思男別錄能添

腎氣治軟脚煩悶疼痛殺虫逐諸風甄權浸酒飲治頭

風時珍

之才曰五加皮

為使思小薊

發明恭曰——葉為療風邪丸散之要權曰雖能養

腎亦令人陰痿時珍曰古方為治風痺腎弱要

藥今人絕不知用識者亦少蓋由甄氏藥性論有令

人陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之

人藉此放恣以致痿弱

歸咎於藥良可慨矣

方小兒通睛

小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致腫人不正觀東則見西觀西則

見東宜——散吹鼻通頂——葉一兩黎蘆三分瓜

丁五七个為末每吹火許入日三度內服牛黃平肝

景曰入手太陰肺經血分昂曰色赤入心
輕飄象肺故亦入肺經
希雅曰亦入足陽明胃經

藥譜

危子

又名木丹 木經越桃別錄鮮支細目花名簷荷
時珍曰佛書稱其花為簷荷或云簷荷金色非

集解

弘景曰有三種小異以七棱者為良亦入
染家用頌曰入藥用山一一方書所謂越桃

也皮薄而圓小刻房七棱至九棱者佳大而
長者雷氏炮灸論謂之伏尸一一入藥無力

苦寒

別錄曰大寒

治五內邪氣胃中熱氣面赤酒皸鼻

白癩赤癩瘡瘍

本經

治目赤熱痛胸心大小腸大熱心

中煩悶

別錄

去熱毒風除時疫熱解五種黃病利五淋

通小便解消渴明目主中惡殺疰蟲毒

甄權

解玉支毒

主瘡啞紫癩風

孟詵

治心煩懊懷不得眠臍下血滯

危子

九十三

昂曰最清胃脫之血炒黑末服本草瀝云
治實火之血順氣為先氣行則血自歸經

治虛火之血養正為先氣壯則自能攝血
丹溪云治血不可單行單止不可純用寒

涼

昂曰臣用瀉火炒黑止血薑汁炒止嘔嘔
內熱用仁表孰用皮丹溪曰治上焦中焦

連殼用治下焦去殼洗去黃殼炒用治血
病炒黑用

昂曰心痛而厥有寒熱三種孰厥宜之
丹溪曰凡心痛當分新久若初起因寒因

食宜溫散久則鬱而為熱若用溫藥反助
痛添病故古方多用一一為君熱藥為之

嚮導此病雖日久不食不死若痛止逐食
病必再作

希雍曰一一苦寒損胃而傷血脾胃虛弱
者忌之血虛發熱者忌之性能瀉有餘之

火心肺無邪熱者不宜用小便不通因于
膀胱虛無氣以化之而非熱結小腸者不

宜用瀉因氣血虛不能收斂則為久冷敗

而小便不利元素瀉三焦火清胃脫血治熱厥心痛解

熱鬱行結氣震亨治吐血衄血三痢下血淋損傷瘀

血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷時珍

發明元素曰一一輕飄而象肺色赤而象火故能瀉
肺中之火其用有四瀉心經客熱一也除煩燥

二也去上焦虛熱三也治風四也震亨曰一一瀉三
焦之火及痞塊中火邪最清胃脫之血其性屈曲下

行能降火從小便中瀉去凡心痛稍久不宜溫散反
助火邪故古方多用一一以導熱藥則邪易伏而病

易退好古曰本草不言一一能吐仲景用為吐藥一
一本非吐藥為邪氣在上拒而不納食全上吐則邪

因以出所謂其高者因而越之也或用為利小便藥
實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之

府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚
合又與丙合又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁

合又與丙合又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁

瘡非溫燥補益則不愈所謂既潰之後一
毫寒藥不可用也世人又以治諸血症不
知血得熱則行得寒則凝瘀血凝結則反
致寒熱或反發熱勞嗽飲食減少治吐血
之法以順氣為先蓋血隨氣而行氣降則
火降血自歸經矣此治療之要法也

鳴泉曰繆氏謂血症不得用涼藥亦一偏
之見有邪熱迫血逆行者十居大半不過
黃連龍胆等寒而凝滯者宜暫忌他如大
黃芩柏等藥尚須用之何況危子乎如必
不用涼藥任邪火熾燄逼血不止不所傷
更多耶如云血得寒則凝喻氏用當歸龍
蒼丸治經脈不行者則又何說也至于順
氣一語自有至理不可易也大抵治病不
可有偏見古人之說貯之胸中而不泥斯
良醫矣如謂治吐血必須涼藥則又誤景
岳用桂附治吐血法景又嘗用之而得效
焉

鳴泉曰一一之寒或配以生薑或配以川
烏白芷或用酒九此古人之妙用

用一一豉湯煩者氣也躁者血也氣主肺躁主血故
用一一以治肺煩香豉以治腎躁景曰仲景以一一
色赤味苦入心而治煩香豉色黑味鹹入腎而治躁
宗璣曰仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇
者必反覆顛倒心中懊懣一一豉湯治之因其虛故
不用大黃有寒毒故也一一雖寒而無毒治胃中熱

氣既亡血亡津液臟腑無潤養內生虛熱非此物不
能去也又治心經留熱小便赤澀用去皮一一火煨
大黃連翹炙甘草等分為末水煎三錢服無不利也
頌曰仲景及古今名醫治發黃皆用一一苗陳甘草

香鼓四物作湯飲又治大病後勞復皆用一一
鼠矢等湯利小便而愈其方極多不可悉載
方 血 血 淋 瀉 痛 生 一 一 末
有效 黎氏易簡方 滑石等分

蔥湯下 熱毒血痢 子大每服三九日三服大效亦
可水煎服 臨產下痢 匙甚者不過五服 勝金 婦

厄子 九十五

鳴皋曰火痛一方用之宜審施之寒痛則
特宜

介賓曰同枳朴除煩滿同生薑陳皮除嘔

噦同延胡索破熱滯瘀血腹痛

中梓曰古方治心痛多用一一此為火氣
上逆不得下降者設令人泥丹溪之說重
寒者何以堪之

鳴皋曰飯直出一方所謂邪熱不殺穀
也用之宜審

人胎腫

屬濕熱一一一合炒研每服
二三錢米飲下丹溪方

熱水腫疾

仁炒

研米飲服三錢若上焦

冷熱腹痛

疔刺不思飲食一
川烏頭等分生

熱者連皮用同上

胃脘火痛

大山一
七枚

薑湯下小腹痛小茴湯下

博濟

或九枚炒水一盞煎七分入生薑汁飲之立止復

發者必不效用元明粉一錢服之立止丹溪五

臍諸氣

益少陰血一一炒研末生
薑同煎飲之甚捷同上

熱病食復

及交接
後發動

欲死不能語一一三十枚水三升

盤腸釣氣

一一仁
半兩草

煎一升服令微汗關氏集效方

烏頭少許同炒過去草烏入香白芷一錢

普濟

折傷腫痛

為末每服半錢茴香葱白酒下

之甚效

集簡方

眉中練癬

一一炒黑研和油塗
保幼大千方

亂轉筋

心腹脹滿未得吐下一一二七枚
炒研熱酒服之立效肘後方

喫飯直出

好古曰入足太陽少陰經膀胱腎
昂曰茯苓走氣分此說不盡然走血分

昂曰瘧多由暑必兼濕經曰夏傷於暑
秋必痲瘧

高基曰治傷寒溫疫大熱汪昂云大熱利
小便亦分消之意此說宜審傷寒或可用

溫疫用之害不旋踵蓋瘟疫全是一團邪
火熾灼津液此時利其小便斷利他不動

反使火邪隨藥引入膀胱成癰閉者多矣
惟宜先泄其火以救陰俟火邪退已過半

方可利小便

昂曰仲景五苓散為治水之提劑經云勝
脫者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

一二十枚去皮微炒

水煎服 怪症奇方

猪苓

又名豨猪矢 本經豨素莊子地烏桃 圖經

集解

弘景曰是楓樹苓皮黑肉白而實者佳去皮
用頌曰蜀州習州皆有之生土底不必楓根

下始有也時珍曰一亦是木之
餘氣所結他木皆有楓木為多耳

甘平

普曰神農甘雷公苦
王好古曰甘重於苦

治痰瘡解毒蠱症利水道

本經 鮮傷寒溫疫大熱發汗主腫脹腹滿急痛甄權治渴

除濕去心中懊懣元素瀉膀胱好古開腠理治淋腫脚氣

白濁帶下妊娘子淋胎腫小便不利時珍取其行

溫生用

為佳

猪苓

九十五

用肉桂辛熱引入膀胱所以化其氣也除
桂名四苓散實生經云五苓散能生津液
亦通大便曾世榮治驚風亦用五苓散曰
茯苓安心神澤泄利小便小腸利而心氣
平木得桂而枯能抑肝而風自息可謂善
用五苓矣

發明

頌曰仲景治消渴脉浮小便不利微熱者一
散發其汗病欲飲水而復吐名為水逆冬時寒

嗽如瘧狀者亦與一此即五苓散也一茯苓朮
各三兩澤瀉五分桂二分細搗篩水服方寸匕日三
多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此駛令人
皆用之果曰苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除

濕利小便宗奭曰一一引水之功多久服必損腎氣
昏人目宜審之元素曰一一淡滲大燥亡津液無濕

症者勿服時珍曰一一淡滲氣升而又能降故能開
腠理利小便與茯苓同功但入補藥則不如茯苓也

方 傷寒口渴

邪在臟也一一湯主之一一茯苓澤
泄滑石阿膠各一兩以水四升煮取

二升每服七合日三服嘔而

思水者亦主之

仲景方

小兒秘結

煎雞屎白一

錢調服立通

通身腫滿

小便不利一一五兩為末水
服方寸匕日三

外臺秘要 妊娠腫渴

從脚至腹小便不利微渴引
飲方同上 見子母秘錄

方 妊娠子淋同

昂曰五苓散雜症當用桂枝寒症表未解者亦當用桂枝兼取鮮表

元素曰六足少陰經胃為足太陽膀胱經引經藥

上日三夜二以通 五苓散 一茯苓白朮各七錢半

為度 小品方 澤泄一兩六銖半桂半兩

為末每服三錢多飲 仲景 威喜丸 見茯苓

熱水汗出愈 俗作黃柏

黃蘗 藥木 本經 根名檀桓

集解 別錄曰藥木生漢中及永昌 弘景曰今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色淺其

根檀桓於道家入木芝品又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡 恭曰子藥

名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小藥今云皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小

藥也 禹錫曰按蜀本圖經云一一樹高數丈葉似

吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色其

根結塊如松下茯苓今所在有之本出房商合等

州山谷中皮緊厚二三分鮮黃者為上 頌曰以蜀

中出者肉厚

色深者為佳

黃蘗

九六

〔平〕——補腎非真能補也腎苦燥急食
 辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之也相火
 退而腎固則無狂蕩之患矣又曰腎本屬
 水虛則熱矣心本屬火虛則寒矣又曰諸
 痿癱瘓皆由熱甚則傷血不榮筋則矣
 短而為拘濕勝則傷筋不束骨則弛張

苦寒

〔元素曰〕
苦微辛

治五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止瀉痢

女子漏下赤白陰傷蝕瘡〔本經〕療驚氣皮間肌膏熱赤

起目赤熱痛口瘡〔別錄〕熱瘡炮起蟲瘡血痢止消渴殺

疰虫〔藏器〕男子陰痿傳莖上瘡治下血如雞肝〔甄權〕安心

除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疔蟲治虻

咬心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛〔大明〕瀉膀胱相火

補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癱瘓利下

竅除熱〔元素〕瀉伏火救腎水治衝脉氣逆不渴而小便

不通諸瘡痛不可忍〔李杲〕得知母滋陰降火得蒼木除

而為痿合蒼朮則為二妙散清熱利濕為
 治痿要藥或兼氣虛血虛脾虛腎虛濕痰
 死血之不同當隨症加治之又曰凡治口
 瘡用涼藥不效者乃中氣虛火上炎宜
 用反治之法參朮甘草補上焦之虛乾薑
 散火之標甚者加附子或含肉桂引火歸
 元為舉按此亦一法也臨症不可不知
 昂曰尺脈弱者禁用又曰炒黑能止崩帶
 希雅曰一為腎經藥然以柴胡引之則
 入胆以川連升葛引之則入腸胃及脾經
 治濕熱滯下 佐牛膝杞子地黃五味藥
 甲青蒿則益陰除熱 佐甘菊地黃杞子
 蒺藜女貞則益精明目
 又曰陰陽兩虛之人病兼脾胃薄弱飲食
 少進或兼泄瀉或惡冷物腎虛痰泄上熱
 下寒小便不禁少腹冷痛子宮寒血虛不
 孕陽虛發熱血停滯產後血虛發熱金
 瘡發熱瘰癧潰後發熱陰虛小便不利脾
 虛小便不利血虛不得眠血虛煩躁等症
 咸忌之

濕清熱為治痿要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡

震傳小兒頭瘡時珍

之才曰惡乾漆伏硫黃時珍曰一性寒而沉生

用則降實火熟用則不傷胃酒制則治上蓋制則治

下密制

則治中

發明元素曰一之用有六瀉膀胱心火一也利小

便結二也除下焦濕腫三也痢疾先見血四也

臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水膀胱不

足諸痿厥腰無力於黃芪湯中加用使兩足膝中氣

力湧出痿軟即便去也乃癰瘻必用之藥密炒砂末

治口瘡如神故雷氏炮灸論云療口瘡舌折立愈黃

酥謂以酥炙根黃舍之也景曰一蒼朮乃治痿要

藥凡去下焦濕熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便

不利及黃溼者並用酒洗一一知母為君茯苓澤瀉

黃藥

九十七

馮泉曰知柏治吐血果有效但不可放手用之古人謂丹溪用知柏治失血多致敗脾而死亦宜鑒之

中梓曰南清龍雷之火滋濡腎水之枯疎小便癢結駝下焦濕腫

不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之——知母是也王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚腿裂破出水雙睛亞出飲食不下痛苦不可言狀治滿利小便滲沖之藥服遍矣予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在下焦但治下焦其病必愈逆處以北方寒水所化大苦寒之劑——知母各一兩酒洗焙研入肉桂一錢為引水丸梧子大每服二百丸白湯下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如暴泉涌出床下成流轉盼之間腫脹消散內經云熱者寒之腎惡燥急食辛以潤之以——之苦寒瀉熱補水潤燥為君知母之苦寒瀉熱為佐肉桂辛熱為使寒因熱引也丹溪曰——走至

陰有瀉火補陰之功非陰中之火不可用也火有二
 君火者人火也心火也可以濕伏可以水滅可以直
 折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也
 陰火也不可以水濕折當從其性而伏之惟一一之
 屬可以降之時珍曰古書言知母佐黃伯滋陰降火
 有金水相生之義一一無知母猶水母之無蝦也蓋
 一一能制膀胱命門陰中之火知母則清肺金滋腎
 水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥
 古人所未言也蓋氣為陽血為陰邪火煎熬則陰血
 漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣盛能食者
 用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者久服則有寒
 中之變近時虛損縱欲求嗣之人用補陰藥往往以
 此二味為君日服餌降令太過脾胃受傷真陽暗
 損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲久
 服有反從火化之害故葉氏醫學統旨有四物加知
 藥久服傷胃不能生陰之戒好古曰黃芩梔子入肺
 黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也故
 活人書四味解毒湯乃上下內外通治之藥

黃蘗

九十八

方 陰火為病 大補陰丸 一 鹽水炒褐色為末蜜
九血虛四物湯下氣虛四君湯下

丹 坎離丸治諸虛百損小便淋瀝遺精白
濁等症 一 去皮切二斤熟糯米一升

童便浸之九浸九晒蒸過晒研末酒煮麩糊
丸如桐子大每酒下百丸 孫氏集效方 上盛下

虛 水火偏盛消中等症 一 一斤分四分用好酒童
便蜜鹽水各浸炒為末以知母一斤熬膏和丸桐

子大白湯下 臟毒下血 不止痔漏孫氏集效藥皮丸
活人心統 用 一 一斤分四分三分用

酒醋童便各浸七日焙一分生炒黑為末蜜丸酒下
五十九丸久服除根 陸一峯藥皮丸 一 一斤分四

分三分用好酒鹽湯童便各浸晒研一分用酥炙
研以猪大腸一條入藥紫定煮熟搗丸如上法服 妊

娠下痢 晝夜數十次 一 蜜炒焦為末大蒜煨去皮
搗爛和丸每空心米飲下三五十九日三神

妙 婦 小兒熱瀉 一 焙為末米湯和丸 赤白濁淫
人良方 米湯下 十全博救方

及夢洩精滑真珠粉九一炒蛤粉各一斤為丸一
苦而降火蛤粉賦而補腎也又方加知母牡蠣山

藥 潔 積熱夢遺 心忪恍惚腦中有熱宜清心丸主

古家珍 積熱夢遺 之一一兩冰片一錢密九桐子

大每服十五丸麥冬湯下此 消渴尿多 煮湯恣飲數

大智禪師方也 本事方 日即止必能

食者可用 嘔血熱極 一蜜炙為末麥冬湯

獨行方 嘔血熱極 調服二錢立瘥 經驗 下血數

升 一兩去皮雞子白塗灸為末水丸綠 時行赤

豆大服七丸溫水下名金虎丸 普濟方

目 一為末濕紙包裹黃泥固煨乾每一彈子大紗

怕包之浸水一盞飯上蒸熟乘熱薰洗極效此方

有金木水火土故名五行湯 眼目昏暗 每旦含一

一丸可用二次 龍木論 一吐津洗

之久行永無目 卒喉痺痛 一斤酒一斗

疾 普濟方 煮任飲 肘後 口舌生

瘡 外臺用一含之 深師用蜜浸取汁含之吐涎

○冠氏治心脾有熱舌頰生瘡用蜜炙一青黛

黃蘗

九十九

等分入龍腦一字搽之吐涎口赴避散
細辛等分為末或一乾薑等分搽之俱良
口疳臭

爛綠雲散一五錢銅綠二錢
為末搽之漱去涎三因方
癰疽腫毒
馬炮等分

為末唾調塗留
頭頻潤集簡
小兒膿瘡
不乾一末入枯礬少許
搽之即愈楊氏簡便方

臘瘡熱瘡
調搽或只用密炙一二味
火毒生瘡
凡

冬月向火氣入內兩股生瘡其汁淋漓以川
未搽之立愈一人病此無識者用此而愈
醫說

飲瘡生肌
塗效
宣明方
末麩糊調

本草方藥參要卷五目錄

秦皮

枳實

枳殼

厚朴

檳榔

槐實

大腹皮
花葉

棟子皮

蔓荊子

牡荊

子根
瀝

紫荊

辛夷

郁李仁

龍李

金櫻子

葉皮

訶黎勒

烏藥

五加皮

椿樗

莢

榆白皮

葉莢

海桐皮

密蒙花

木芙蓉

山茶花

木槿

楓脂香	乳香	紫檀	蘇木	胡椒	櫻	樟木	皂角 <small>刺子</small>	合歡皮 <small>子</small>
冰片	沒藥	降香	沈香	碧澄茄	吳茱萸 <small>根葉</small>	樟腦	肥皂角	杉
血竭	蘇合香	丁香 <small>雞古香</small>	檀香	茶	川椒 <small>枝目葉</small>	楠木	樺木	烏桕

質汗

安息香

阿魏

靈薈

胡桐淚

燕羨

衛矛

漆葉

巴豆

大風子

相思子

柳葉
根絮
枝

水楊

白楊

檉柳

梓白皮葉

楸白皮葉

桐梧桐

桐油

竹葉
根茹
瀝

天竹黃

雷丸

果部

二

大棗

栗
栗

桃
仁
花
皮

膠
葉

桃
枝
島

時珍曰足厥陰肝少陽胆經藥常曰蓋腎

鳴皋曰一亦安胎要藥一掃受胎五十日必殞百藥不效余詢其病狀極云受胎後大便非痢而後重如痢既殞則後重亦愈余思之是因後重而努力以傷胎也遂以治後重法治之重用一一佐以連柏服二十餘劑生一女蓋胎元在腎一一能益肝胆而補腎也
鳴皋曰一一治痢果有奇效熱毒痢不止後重者所必用也
子接曰一一得川連白頭翁阿膠治產後下痢

本草方藥要卷五

如鼻戴鳴皋著

秦皮

又名石檀別錄樊槻弘景益桂日華苦楸
椀皮淮南椀木 苦楸淮南
本出秦地故得秦名也

得秦名也

集解

蒸曰此樹似檀葉細皮有白點不粗錯取皮清水便碧色書於紙上看之皆青色者是真

苦微寒

別錄曰大寒甄權曰平

治風寒濕痺洗寒氣除熱目

中青翳白膜

本經

療男子少精婦人帶下小兒驚癇可

作洗目湯久服澤膚有子
別錄明目去目中久熱兩目

赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清洗

赤目極效
甄權主熱痢下重下焦虛好同葉者湯洗蛇

秦皮

咬并研末傅之

歲器

權曰惡苦瓠防葵之才曰

惡吳茱萸大戟為之使

發明

天明曰一一之功洗肝益精明目退熱元素曰

白幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古曰

痢則下焦虛故仲景白頭翁湯以黃蘗黃連一一同

用皆苦以堅之也一一浸水青藍色與紫草同用治

目病以增光暈尤佳時珍曰一一色青氣寒味苦性

瀉乃是厥陰肝少陽胆經藥也故治目病驚癇取其

平木也治下痢崩帶取其收瀉也又能治男子少精

益精有子皆取其瀉而補也故老子云天道好瀉此

藥乃服食及驚癇崩痢所宜而人止知其治目一節

幾於廢棄良為可悅淮南子云椹皮色青乃治目之

要藥也又萬畢術云椹皮止水謂其能收淚也高誘

解作致水言能使水沸者謬也

鳴皋曰入脾肺胃大腸氣分按東垣雖曰
主血仍主氣分居多也血分用大黃氣分
用一

昂曰濁氣在上則生腹脹枳實枳壳俱能
破濁消滿

方目赤生翳

一水煮澄清
溫洗外臺

眼暴赤腫

一川連
各一兩竹

葉半升水煎食

後服外臺

血痢連年

一鼠尾草薔薇根等分
水煎取汁熬膏令可丸

如梧子大每服五六丸稍加
增以知為度亦可煎服

千金天蛇毒瘡

似癩非癩
天蛇乃草

間花蜘蛛也人被螫為露水所濡乃成此
疾一煮汁一斗飲之即瘥

寇氏本草安胎

枳實

集解

頌曰洛西江湖州郡皆有之以商州者為佳
木如橘而小高五七尺葉如橙多刺春生白

花七八月采者為一九月十月采者為枳殼今醫
家以皮厚而小者為枳實完大者為枳殼陳久者
勝近道所出者俗

呼臭橘不堪用

苦寒

別錄曰酸微寒善曰李
當之大寒元素曰寒苦

治大風在皮膚中如麻

秦皮 枳實

二

昂曰本草枳實枳殼皆云明目思之不得其解然日疾方中多用之豈以其破濁氣即能升清氣乎本經又言益氣相同此理也故厚朴調中亦有益氣明目之文

希雅曰所主除胸膈痰癖逐停水破結實脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止瀉瀉者皆足陽明太陰受病二經氣滯則不能運化精微而痰癖停水結實脹滿所

自來矣胃之上口名曰賁門賁門與心相連胃氣壅則心下亦自急痞痛邪塞中焦則升降不舒而氣上逆肝木鬱于地下則不能條達而脇痛得其破散衝走之力則諸症悉除

又曰此藥性專消導破氣觀味丹陰所云其為勇悍之氣可知凡中氣虛勞倦傷脾為痞滿者當用補中益氣補其不足則痞自除此法所當忌也脹滿非實邪結于中下焦手不可按七八日不更衣者必不可

用其傷食停積多因脾胃虛不能運化所致者不可輕用時醫不識虛實性概施

豆苦痒除熱結止痢長肌肉利五臟益氣本經除胸膈

痰僻逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風

痛安胃氣止糖泄明目別錄解傷寒結胸主上氣欬欬

腎內傷冷陰痿而有氣加而用之甄權消食散敗血破

積堅去胃中濕熱元素

穀曰一枳殼性效不同若使枳殼取辛苦腥要陳久年深者佳以小麥麩炒至麩焦去麩用

發明震亨曰一瀉痰能衝墻倒壁滑竅破氣之藥也元素曰心下痞及宿食不消並宜一黃連

果曰以蜜炙用則破水積以泄氣除內熱潔古用去脾經積血脾無積血則心下不痞也好古曰益氣則佐以人參白朮破氣則佐以牽牛大黃芒消此本經所以言益氣復言消痞也非白朮不能去濕非一

損人真氣為害不淺

又曰同三棧蓬葢青皮檳榔為消磨堅積

之劑 同橘皮白朮厚朴甘草砂仁為枳

朮九治心下痞滿因于食入陷胸湯治傷

寒寒熱結胸 入大小承氣治傷寒熱入

裏結實脹滿痛不可當數日不更衣者

子按曰得瓜婁消痞結得皂角通大便得

白朮去痰飲

不能除痞故潔古制枳朮丸方以調脾胃仲景治心

下堅大如盤水飲所作枳實白朮湯用一一七枚朮

三兩水一斗煎三升分三服

腹中軟即消也餘見枳殼下

方 胸痺結胸

胸痺心下痞堅留氣結胸脇下逆氣

厚朴四兩薤白半斤栝樓一枚桂一兩水五升先煎

一一厚朴取二升去渣納餘藥煎兩三沸分三服溫

服當愈

傷寒胸痛

傷寒後胸膈卒閉痛一一匙炒

金匱要略

產後腹痛

為末米飲服二錢日二服 嚴

子札濟

產後腹痛

水煎服亦可末服 聖惠 奔豚

氣痛

方寸匕 外臺

大便不通

一一皂莢等分為末飯丸米飲下

危腸風下血

一一半斤麩炒黃芪半斤灸為末 皮膚

風疹

之即消 外臺

三

元素曰瀉肺走大腸

希雍曰枳實形小氣全性烈故善下達如

少年猛將勇性直前一形大氣散性緩

故其行稍遲能入胸膈脾胃之分及入大

腸也其主風痒麻痺利關節止風痛者蓋

肺主皮毛胃主肌肉風寒濕入于二經則

皮膚癢痒或作痛麻木一有苦泄乎散

之功兼能引諸風藥入于二臟故為治風

所需又肺與大腸相表裏風邪入肺則并

入大腸風熱相搏而為腸風下血苦寒下

泄之氣則血熱清而風自除矣

馮舉曰子甥女年十一二歲得痘症頭痛

甚其平日氣稟亦不弱一醫喜用枳殼每

劑三錢服二劑已神昏撮空理線矣予視

之曰急用人參未服而斃得病甫三日耳

以此見損氣之戒宜三復未可視為無關

輕重之藥也又見一富人因憂愁致傷心

脾腹泄服參朮瀉止而氣不適平日尅伐

藥毫不能服一醫放胆用厚朴數分一瀉

而不可救但人之氣稟不同又見一貧醫

枳殼苦酸微寒權曰主風痒麻痺通利關節勞氣欬

嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大脇風

妄胃止風痛開寶遍身風疹肌中如麻豆惡瘡腸風痔

疾心腹結氣兩脇虛脹關格壅塞甄權健脾開胃調五

臟下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結

瘕癖五膈氣及肺氣水腫利大小腸除風明目灸熱

耐痔腫大明泄肺氣除胸痞元素治裏急後重時珍

發明元素曰一破氣勝濕化痰泄肺走大腸多用

而氣刺痛者看其在何部經分以別經藥導之杲曰氣

血弱者不可服以其損氣也好古曰枳殼主高枳實

專喜用大劑自己平素多病亦弱回患腹脹自己屢方用只壳一兩桔梗四錢服數劑病雖未愈亦無大害蓋人之腸胃有受藥不受藥之分

嗚呼曰關竇主治背膊悶倦當是背膊疼痛肺愈穴在背脊上兩旁背膊之痛每有因肺病肺為痰阻則背膊痛肺氣不降而考橫則背膊痛肺熱成痺則背膊痛一人患背膊痛醫作風治而愈其子用二冬高治之而愈蓋肺痺也只壳瀉肺氣其治背膊亦同此理希雍曰脾胃虛中氣下運而痰壅欲急者急之咳嗽不因風寒入肺而氣壅者服之反作劇咳嗽因虛火炎者服之立致危殆又曰同換子橘皮枳椇木香白蔻香附治上焦壅氣脹滿因于寒者同川連槐花乾葛防風制莽芍藥黃芩當歸生地：榆側柏治腸風下血初起者神效同枳櫛為藥黃連升麻甘草葛根紅曲滑石治裏急後重得入參麥冬治氣虛大便不軟同向桂治右脇痛

主下高者主氣下者主血故穀主胸膈皮毛之病實主心腹脾胃之病大同小異朱肱活人書言治病宜先用桔梗一湯非用此治心下痞也果知誤下氣將陷而成痞故先用此便不致於痞也若已成痞而用此失之晚矣不惟不能消痞反損胸中之氣先之一字有謂也時珍曰枳實一氣味功用俱同上世亦無分別魏晉以來始分實殼之用潔古張氏東垣李氏又分治高治下之說大抵其功皆能利氣下則痰歇止氣行則痞脹消氣通則痛刺止氣利則後重除故以枳實利胸膈一利腸胃然仲景治胸痞痞滿以枳實為要藥諸方治下血痔痢大腸秘塞裏急後重又以一為通用則枳實不獨治下而一不獨治高也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已則二物分亦可不分亦無傷杜壬方載陽湖公主產難方士進瘦胎飲用一四兩甘草三兩五月後日服一錢臨月不惟易產仍無胎中惡病也張潔古活法機要改以枳木丸日服令胎瘦易生名東胎丸寇宗奭言胎壯則子有力易生服一藥反

枳殼

四

子接曰枳桔湯治虛痞

致無力恐子亦氣弱以理思之寇氏之說似優或胎前氣盛壅滯者宜用之所謂八九月胎必用枳殼蘓梗以順氣胎前無滯則產後無虛也若氣稟弱者大非所宜矣震亨曰產難多見於鬱悶安逸之人富貴奉養之家古方瘦胎飲為陽湖公主作也子妹苦於產難其形肥而好坐予思此與公主正相反彼奉養之人其氣必實故耗其氣使平則易產今形肥則氣虛久坐則氣不運當補其母之氣以紫蘓飲加補氣藥十數帖服之遂快產

方老幼腹脹

血氣凝滯用此寬腸順氣各四炒丸去瓢四兩分四分一分用蒼朮

一兩同炒一分用蘿蔔子一兩同炒一分用乾漆一

兩同炒一分用小茴一兩同炒黃祇取一為末

以蒼朮等四味煮汁打麩糊丸梧消積順氣治五積

子大食後米飲下五十九易簡六聚不

拘男婦老幼但是氣積並皆治之乃仙傳方也一

三斤去瓢每箇入巴豆仁一箇合定札煮慢火煮一

日湯減再加熱湯勿用冷水待時足汁盡去豆切片
日乾勿炒為末 煮糊丸梧子大每服三四十九

即真人
經驗方 順氣止痢 方同 懷胎腹痛 一三兩麩炒黃
水一盞半煎一盞服若脹滿身 小兒驚風 不驚丸治

痛加白朮一兩 活法機要 小兒驚風 小兒因驚
氣吐逆抽搐痰涎壅塞手足掣癱目斜 去蠶麩

妙淡豆豉等分為末急驚薄荷自然汁下慢驚荊芥
湯入酒三五滴下每服 風癩作痒 一三兩麩炒為

五分 陳文仲小兒方 末每服二錢水煎
服仍以汁塗 利氣明目 一匙炒為末點 下早成痞

經驗方 傷寒陰症下早成痞心下滿而不痛按之虛軟
一 檳榔等分末服三錢川連湯下 宣明方 順氣

治痢 一二兩四錢甘草六錢為末 疏導腳氣 方同
每沸湯點服二錢 嬰童百問 上木

瓜湯服 小兒秘塞 煎服 全幼心鑑 腸風下血
直指 厚朴 五

枳殼 厚朴 五

昂曰入足太陰陽明脾胃

不實且能墮胎孕婦忌之
昂曰脹滿症多不同清與補貴得其宜氣
虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導痰滯
宜行痰挾熱宜清熱濕盛宜利濕寒鬱者

燒黑存性五錢羊脰骨炭三錢共為
末五更米飲服少頃再一服 博濟
一 煨熟熨之七枚立定○本單方
用 一 水煎百沸先熏後洗甚效
牙痛 一 浸酒
含漱 聖

方惠

厚朴 又名烈朴 日華赤朴別錄厚皮 同上 重皮 廣雅
樹名榛別錄子名逐折別錄

集解 頌曰今洛陽陝西江准湖南蜀中皆有之而
以梓州龍州者為上木高三四丈葉如櫛葉

紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而
白者不堪時珍曰朴樹膚白肉紫實如冬青子生
青熟赤有

核味甘美

皮苦辛溫 別錄曰大溫 治中風傷寒頭痛寒熱驚悸

氣血痺死肌去三虫 本經 溫中益氣消痰下氣療霍亂

散寒怒鬱者行氣畜血者消瘀不宜專用
 行散藥亦有多服於後而脹滿反甚者以
 扶血扶食扶熱扶寒不可概作脾虛氣弱
 治也嗚皋按葉天士治一腹脹者請醫不
 效葉用歸尾桃仁山甲麝虫等藥即愈曰
 絡瘀則脹吾與通絡也此即所謂挾血也
 希雍曰一一之功長於泄結散滿溫暖脾
 胃一切飲食停滯乳壅暴脹與夫冷氣逆
 氣痰飲胃冷嘔逆腹痛泄瀉及脾胃壯實
 之人為要藥然而性專消導散而不收故
 凡嘔吐不因寒痰冷積而由於胃虛火氣
 上炎腹痛因於血虛脾陰不足而非停滯
 洩瀉因於火熱暴注而非積寒傷冷腹滿
 由於中氣不足氣不歸元而非氣實雍滯
 傷寒發熱頭痛而無痞塞脹滿之候小兒
 吐瀉將成慢驚大人氣虛血槁見發膈症
 老人脾虛不能運化偶有停積孕婦傷食
 停冷孕婦腹痛瀉利產後血虛腹痛產後
 中滿作歇產後泄瀉反胃以上諸症法所
 咸忌

及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔惡不止洩痢淋露除

驚去留熱心煩滿厚腸胃別錄健脾治反胃霍亂轉筋

冷熱氣瀉膀胱及五臟一切氣婦人胎前產後腹臑

不安殺腸中虫明耳目調關節大明治積年冷氣腹內

雷鳴虛吼宿食不消去結水破宿血化水殺止吐酸

水大溫胃氣治冷痛主病人虛而尿白甄權主肺氣脹

滿膨而喘效好古

之才曰乾薑為之使惡澤瀉消石寒水石忌豆食之
 動氣大明曰去粗皮用薑汁炙或浸炒用宗奭曰得

薑不辣

人喉

厚朴

馮舉曰：繆氏所忌諸條，頗有執泥處。凡脾胃弱及氣血虛之人，其病必當用亦須用之。故古人有佐以參朮之法，如執其說其病與藥相符而不敢用，不能愈矣。且一得參朮甘茂而其力愈大。
中梓曰：行氣峻極虛者勿多與也。

發明 宗奭曰：一平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃又能走冷氣為世所需也。元素曰：一之用有三平胃一也去腹脹二也孕婦忌之。三也雖除腹脹虛弱人宜斟酌用之誤服脫人元氣惟寒脹於熱藥中兼用乃結者散之神藥也。丹溪曰：一氣溫能瀉胃中之實平胃土之太過以致於中和而已非謂溫補脾胃也。習以成俗皆謂之補謬哉。其治腹脹者因其味辛以提其滯氣滯行則宜去之。若氣實人誤服參朮藥多致氣悶脹或作噉宜此瀉之好古曰：本草言一一治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣厚腸胃去腹滿果益氣乎果泄氣乎蓋與枳實大黃同用則能泄實滿所謂消痰下氣是也。若與橘皮蒼朮同用則能除濕滿所謂溫中益氣是也。與解利藥同用則治傷寒頭痛與治瀉痢藥同用則厚腸胃大抵其性味苦溫用苦則泄用溫則補也。故成無己曰：厚朴之苦以泄腹滿。杲曰：若能下氣以泄實滿溫能益氣故散濕滿。

方 厚朴煎丸

孫兆甫云補腎不如補脾。胃氣壯則能飲食，飲食進則益榮衛養精血。

素問云：精不足者補之以味，形不足者補之以氣。此藥大補脾胃，虛損溫中降氣化痰，進食去留飲嘔吐。

泄瀉等症——去皮剉用。生薑二斤切水五升。

同煮乾去薑焙朴，再以乾薑四兩甘草二兩水五升。

同朴煮乾去草焙薑朴為末，煮棗肉搗泥和丸，梧

子大每米飲下四五十九，一方加熟附百一。痰

壅 嘔逆 心胸滿不下飲食——一兩薑炙 腹脹脉數

為末每用米飲服二錢 聖惠方

——三物湯——半斤只實五枚水一斗二升煎取

五升入大黃四兩再煎三升溫服一升轉動更服不

動勿服 腹痛脹滿——七物湯製——半斤甘草

金匱要略 大黃各三兩棗十箇只實五枚

桂二兩生薑五兩水一斗煎取四升溫服 反胃泄瀉

八合嘔者加半夏五合 金匱要略方

——薑汁炙焦黑為末 氣脹心悶 飲食不下久 中滿

陳米飲下二錢 斗門 不愈方同上

厚朴

七

洞瀉 一乾薑等分為末鍊蜜為丸 九梧子大米飲下 鮑氏方 小兒吐瀉 胃虛及有痰驚

梓朴散用梓州一兩半夏湯泡七次薑汁浸半日晒乾三錢以米泔同浸一日水乾為度如末乾微

火烘乾去一一只研半夏每服 霍亂腹痛 湯用半錢薄荷湯下 錢乙小兒方 一灸四

兩桂心二兩只實五枚生薑二兩水六升煎取二分三服此陶隱居方也 聖惠用一薑炙研末新

汲水調服 下痢水穀 久不愈一川連各三兩 尿渾二錢如神 水煎緩服之 梅師方

白濁 心脾不調腎氣渾濁用一薑炙一兩白茯苓一兩水酒各半煎成溫服 經驗良方 月

水不通 一三兩炙切水三升煎一升分二服空心飲不過三四劑神驗一加桃仁紅花 梅師

檳榔 又名賓門 李富之藥對 仁類 顏師古上林賦註

苦辛溫 澀消穀逐水除痰辟殺三虫伏尸寸白 別治

希雍曰同草果只實橘皮治食積加三棱
莪朮蘇紅、麩山查麥牙消一切堅硬固
食及米麵生冷食積成塊作痛 同雷丸
使君子蕪荑芦荈向菟胡連治小兒疳虫
同棟根鶴虱錫灰葶苈根貫眾烏梅治

腹脹生搗末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒灰傳

口吻白瘡菴菴宣利五臟六腑壅滯破胸中氣下水腫

治心痛積聚權除一切風下一切氣通關節利九竅

補五勞七傷健脾調中破癥結大主責豚膀胱諸氣

五膈氣風冷氣脚氣宿食不消李治衝脉為病氣逆

裏急好治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣秘痰氣喘

急療諸瘧禦瘴癘時

發明元素曰一一苦以破滯辛以散邪泄胸中至高

於下極故治諸氣後重如神也時珍曰南人以一一

禦瘴代茶酒後食之則寬氣下痰餘醒頓解飽後食

寸白虫 同蒼木草果青皮甘草治山嵐瘴氣發瘴

希雍曰氣虛者忌之下痢非後重者不宜用心腹痛無留結及非虫攻咬者不宜用瘴非山嵐瘴氣者不宜用子母曰得木瓜治脚氣衝心

之則飲食快消按吳興章傑瘴說云嶺表之俗多食
一一日至數十夫瘴癘之作而因飲食過度氣痞積
結一最能下氣消食去痰故人習於近利而閤於
遠患也夫嶺南地熱四時出汗人多黃瘡食之則穢
氣踈洩一旦病瘴不敢攻下發散豈盡氣候所致一
一蓋亦為患殆未思耳又東陽盧和云一一云能祛
瘴有瘴服之可也無瘴服之豈不
損正氣而有開門延寇之禍乎

方 嘔吐痰水 一筒烘熟橘皮二錢半傷寒痞
一為末水煎溫服 千金方

滿 陰病下早成痞按之虛軟而不痛一宣明方傷寒
等分為末每服二錢川連煎湯下

結胸 已經汗下後者一兩酒二蓋 虬厥腹痛方
煎一蓋分二服 龐安時傷寒論

上 脚氣衝心 悶亂不識人用一十二枚為末分二
服空心熱童便調下日二服或入薑汁

溫酒同服 脚氣脹滿 非冷非熱或老人弱人病此用
廣利 仁為末以殼煎汁調

常曰陰毛生虱世少良方惟以一一煎水洗之即除

服二錢或茶飲蕪湯鼓寸白虫病一一二七枚為末先以水二升半煮

汁俱可甚利外臺一一皮取一升空心調服方寸七晝日出出千金方小兒頭瘡水磨一一晒取末生油調

塗聖

惠方

大腹皮

孫真人曰鶴鳥多集栝柳樹上凡用宜先以酒洗後以大豆汁洗過晒乾用

辛微溫治冷熱氣攻心腹大腸蟲毒痰膈醋心並以

薑鹽同煎入疏氣藥用之良開寶下一切氣止霍亂通

大小腸健脾開胃調中大降逆氣消肌膚中水氣浮

腫脚氣壅逆瘡瘡痞滿胎氣惡阻脹悶時珍

方 漏瘡惡穢一一煎湯洗之直指

檳榔大腹皮梔實

九

好古曰入肝經氣分鳴皋曰與桃仁入肝經血分稍異 宗奭曰涼大腸

希雅曰入手足陽明兼入足厥陰肝

鳴皋曰功能明目治產難催生及花能治

吐血助血仍屬肝經血分藥而兼主氣分

之熱也功能治諸痔及下血及花能治腸

風赤白痢仍屬大腸經血分藥也至於治

瘡瘍楊梅等毒則又屬胃經藥也應是大

腸主藥而兼入胃肝者也是血分藥而兼

入氣分者也

又曰蕪頌云能主頭風補腦純陰之品豈

能去風補腦仍是清陽明邪熱也陽明之

脈上絡腦故陽明熱則頭痛陽明之邪熱

清則頭目亦清故云去頭風明目補腦也

又曰能通大腸結閉

槐 又作榲玉篇槐之別名

槐實苦寒治五內邪熱止涎唾補絕傷火瘡婦人乳

癩子臟急痛本經久服明目治五痔瘡癢以七月七日

取之搗汁銅器盛之前令可丸丸如鼠屎納竅中日

三易乃愈又墮胎別錄治大熱難產甄權殺虫去風合房

陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸間熱風煩悶風眩

欲倒心煩吐涎如醉瀆瀆如船車者藏器治男女陰瘡

濕痒催生吞七粒大明疎導風熱宗奭治口齒風涼大腸

潤肝燥李杲數曰采得去單子及五子者只取兩

子三子者烏牛乳浸一宿蒸過用

發明好古曰——純陰肝經氣分藥也治證與桃仁

同弘景曰——以十月己日米相連多者新益

盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不

白頌曰折嫩房角作湯代茗主頭風明目補腦水吞

黑子以變白髮時珍曰視者虛星之精十月上己日

米子服之去百病梁書言庾肩吾常服槐實年七十

餘髮黑日夜看細字亦其驗也古方以子入冬月牛

胆中漬之陰乾百日每食後吞一枚云久服明目通

神髮白還黑有痔及

下血者尤宜服之

方 槐角丸 五腫腸風一應諸痔皆治——一兩地

末酒丸梧桐子大每服 榆當歸酒焙防風黃芩只壳各半兩為

五十九丸米飲下 和劑 內痔外痔 ——一斗搗汁晒

梧子大每服十九兼作 稠苦參末同煎丸

提子納下部 外台 目熱昏暗 ——川連為末蜜

十九日二 大熱心煩 ——末炒酒服

聖濟 方寸匕 千金

槐實十花

十

鳴皋曰：一善去大腸濕熱，炒煎服治肝門熱，詳如神。可知為陽明主藥。陽明多氣多血，故能止諸血而治痔瘻腸風也。

槐花 苦平治五痔心痛眼赤殺腹臟虫及皮膚風

熱腸風瀉血赤白痢並炒研服
大涼大腸素炒香頻

嚼治失音及喉痺又療吐血衄血崩中漏下
時珍

宗奩曰：未開時采收

陳久者良入藥炒用

發明 時珍曰：一味苦色黃氣涼陽明厥陰經血分藥也故所主之病多屬二經

方 舌衄出血 無故出血如線名舌衄 吐血不止
朱氏

炒存性入射香少許研勻 咯血唾血 飲下三錢仰臥

糯米飲下三錢 普濟 鬱金煨各一兩為末每服

一時取效 小便尿血 二錢淡豆豉湯下立止 筐中

朱氏

秘 大便下血 經驗用 荆穗等分為末酒服二錢
集簡用側柏葉三錢 六錢煎湯

日服〇袖珍用一一只
壳等分炒研新汲水下
暴熱下血 猪大腸一條
填滿水煮加醋煮

爛搗丸彈子大當歸
酒化下一丸 永類
酒毒下血 山
一 半生半炒一兩
施焙五錢為末新

汲水下二錢
經驗良方 臟毒下血
新 一 炒研酒服三錢日
三或槐白皮湯下 普濟婦

人漏血 不止 一 炒存性研每服
三錢食前酒下 聖惠方
血崩不止 一 一 三
兩黃芩

二兩為末每服五錢酒一盞銅秤錘
柴火燒紅淬酒調服忌口 乾坤秘蘊
中風失音 炒

一三更後仰卧嚼
燕 危氏得效 瘰癧發背
凡 人中毒熱眼花頭運
口 乾舌苦心驚背熱四

支麻木覺有紅暈在背後者即取
杓內炒褐色以好酒一盞浸之乘熱飲酒一汗即愈
如未退再炒一服極驗即成膿者亦無不愈彭
辛癩云此方三十年屢效者 劉松石保壽堂 楊梅

毒瘡 乃陽明積熱所生 一 四兩暑炒入酒二盞
煎數十沸熱服胃虛寒者勿用 集簡方 外

梔葉枝

十一

〔馮〕曰見一人發便毒用核桃殼同全蝎燒研服即愈蓋蝎性善通經絡而以核桃引入腎經也疔瘡一方亦同此理

〔皋〕曰槐木所生木耳治腸紅止血崩神效蓋木耳能涼血止血得槐上者更妙

痔長寸

用一煎洗並服自縮同上一切瘡疽發背不問已成未成但焮赤痛者皆

治一微炒核桃仁各二兩無灰酒一

大鍾煎十餘沸熱服甚效醫方摘要發背散血

綠豆粉各一升同炒象牙色研末用細茶一兩煎一

盞露一夜調末三錢傅之留頭勿犯女人手揖生

妙白帶不止炒牡蠣煨等分研

為末酒下三錢摘元

葉苦平煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖

同用大產難絕傷及癰疹牙齒諸風采嫩葉食孟誥

方腸風痔疾一斤蒸熟晒乾研末煎茶代飲久服明目食醫心鏡

槐枝苦平洗瘡及陰囊下濕痒八月斷大枝候生

嫩葉煮汁釀酒治大風痿痺甚效別錄燒瀝塗癬焮黑

醫泉曰此方當治虫痛

指牙去虫煎湯洗痔核蘇頌燒灰洗頭長髮藏器治赤目

崩漏時珍

發明頌曰劉禹錫傳信方著槐湯灸痔法甚詳以煎濃湯先洗痔便以艾炙其上七壯以知為

度一人乘驛行路其痔大作狀如胡瓜熱氣如火至驛僮郵吏用此法灸至三五壯忽覺熱氣一道入

腸中因大轉瀉先血後穢痛甚瀉後其患若失登驛而馳

方心痛當太歲上取新生一握去兩頭用水三大升煎一升頓服千金方

樹皮根白皮苦平治爛瘡喉痹別錄煮洗陰囊腫墜

漱口齒齲疳齒衄甄權治中風皮膚膏不仁洗痔洗瘡煎

膏塗湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫大明煮汁服治下

槐枝皮

十二

血頰蘇

方 中風身直

不得曲伸反復者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升稍服

之後方

痔有虫

作痒或下膿血槐白皮濃煎先熏後洗大便當有虫出即愈 梅師 蠟

蝮思瘡

槐白皮醋浸半日洗之 千金翼

破傷中風

避陰槐枝上皮刻取一片安傷

處艾炙皮上不痛者炙至痛者炙至不痛 普濟

槐膠

苦寒治一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及

急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如虫行或

破傷風口眼喎斜腰背強硬任作湯散丸煎雜諸藥

用之 嘉祐

東垣曰入心小腸好古曰瀉膀胱曰能
入肝舒筋脈曰亦入手厥陰心包經
希確曰亦入足陽明胃足太陰脾經

常曰脾胃虛寒忌之

棟

又名苦棟 園 總子名金鈴子

集解

恭曰有雌雄兩種雄者無子根亦有毒服之
使人吐不止有至死者雌者有子根白微毒

入藥當用雌者頌曰棟實以川蜀者為佳木高丈
餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭
其實如彈丸時珍曰棟長甚
速三五年即可作椽川產良

棟子

苦寒有小毒

元素曰
酸苦平

治溫疾傷寒大熱煩狂

殺三虫疥瘍利小便水道

經本

主中大熱狂失心躁悶

作湯浴不入湯使

權

入心及小腸止上下部腹痛

李杲

瀉膀胱

好古

治諸虫疔

時珍

時珍曰得酒煮良乃寒
因熟用也苗香為之使

棟子

十三

發明 〔元素曰〕熱厥暴痛非此不能除〔時珍曰〕一導

小腸膀胱之熱因引心包相火下行故心腹痛及疝氣特為要藥甄權乃言不入湯使則本經何以有治熱狂利小便之文耶近方治疝有四治五治七

治諸法

方 **熱厥心痛** 或發或止身熱足寒久不愈者先炙大溪昆侖引熱下行內服金鈴子散

苦一延胡索各一兩為末溫酒調下三錢 潔古活法機要 小兒冷疝 氣痛膏囊 浮腫苦一

去核五錢 吳萸二錢半 酒丸 黍米 癰疝腫痛 澹寮

大鹽湯下二三十丸 全幼心鑑 寶丸用苦一肉五兩分五分一用故紙二錢炒黃

一用小茴三錢 食鹽錢半同炒 一用萊菔子一兩同炒 一用牽牛子三錢同炒 一用斑蝥七箇去頭足同

炒 棟去斑蝥 葶子食鹽牽牛只留故紙茴香為末 酒丸 梧子大酒下五十九 〇得效方治一切疝痛大有

神效 苦一酒浸取肉一斤分四分一用小麥一合

斑蝥四十九箇同炒去蝨一用小麥一合巴豆四十
 九粒同炒去豆一用小麥一合巴戟肉一兩同炒去
 戟一用小茴一合食鹽一兩同炒去鹽留茴加故紙
 一兩酒炒木香不見火一兩研酒煮麩丸桐子大鹽
 湯下五十九丸○直指方棟實丸治外腎脹大麻木痛
 破及奔豚疝氣用川楝子四十九箇分七分切取肉
 七箇用小茴五錢同炒七箇用故紙二錢半同炒七
 箇用黑且二錢半同炒七箇用食鹽二錢同炒七箇
 用菴子二錢半同炒七箇用巴豆十四箇同炒七箇
 用斑蝥十四箇同炒棟去菴子斑蝥巴豆三味不用
 入青木香五錢南木香官桂各二錢半為末酒煮臟
 麩糊丸梧子大每服三十九食前鹽湯下日三服臟

毒下血
 川一炒黃為末蜜丸梧子大米
 飲下十九至二十九 經驗方

腎消膏淋
 病在下焦川一茴香等
 分為末酒服一錢 同上

小兒五疳
 川一芎藭等
 分猪胆汁丸米

飲下
 摘元方
 棟皮

十四

寫舉曰若洗瘡疥似宜雄者更有力但不
可服耳

根及木皮 苦寒微毒治虻虫利大腸別錄苦酒和塗

癬疥甚良弘景治遊風熱毒風疹惡瘡疥癩小兒壯熱

並煎湯浸洗大明

大明曰雄者根赤毒人不可誤服用雌者每一兩可
入糯米五十粒同煎殺毒若瀉以冷粥止之不瀉者

以熱葱
粥發之

方 消渴有虫 苦棘皮一握切焙入射香少許水煎
空心飲之雖困頓不妨下虫如虻而

紅色其渴自止消渴有 小兒虻虫 根皮去粗皮為末
虫人所不知 夷堅志 米飲服二錢 斗

門 小兒瘡疥 及癬並宜棘樹根皮為末
方 猪胆汁調傅 千金方

蔓荊

昂曰——入足太陽膀胱陽明胃厥陰

肝經

希雅曰——味辛氣溫入三臟而去風寒濕之邪至輕身耐老之說必非風藥之所能也

又曰頭目痛不因風邪由於血虛有火者忌之

中梓曰辛而微溫足太陽藥也主太陽頭風頂痛暴按規李氏說是太陽主藥

集解

恭曰——生水濱苗蔓延長大餘春因舊枝而生小葉五月葉成似杏葉六月有花紅白色黃蕊九月有實黑斑大如梧子而輕虛冬則葉凋今人誤以小荆為——以——為牡荆也大明曰海鹽亦有之大如豌豆蒂有輕軟小蓋子七八月采之頌曰近汴京秦隴明越諸州多有之苗莖高四五尺對節生枝葉類小棟至夏茂盛有花作穗淡紅色蕊黃白色花下有青萼至秋結子舊說蔓生今所有並非蔓也宗奭曰諸家所解——牡荆紛——不一經既言蔓荆明是蔓生非高木也既言牡荆自是木上生又何疑焉特

珍曰其枝小弱如蔓故曰蔓生

子

苦微寒

別錄曰辛平溫
元素曰辛溫

治筋骨間寒熱濕痺拘

攣明目堅齒利九竅去白虫久服輕身耐老小荆實

亦等

本頭風頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤
錄治

蔓荆

十五

賊風長髭髮親利關節治癩疾赤目大太陽頭痛頭

沉昏悶除昏暗散風邪涼諸經血止目睛內痛元素搜

肝風好

之才曰惡烏頭石膏穀曰凡使去蒂子下白膜一重酒浸蒸時珍曰尋常用只去膜打碎用之

發明元素曰胃虛人不可服恐生痰疾時珍曰入太陽經

味辛體輕而浮上行而散故所主者皆頭面風虛之症恭曰小荆實即牡荆子其功與一同故曰亦

也等

方 頭風作痛一升為末絹袋浸斗酒中七日溫飲千金乳癩初起

一炒為末酒服方寸匕渣傳之危氏得效方

牡荊 又名黃荊 圖經小荊本經楚

集解

弘景曰：今人都無識者，仙方用。必枝葉相對者是。不對者非也。莫

詳虛實更須博訪。頌曰：今眉州蜀州近汴京

亦有之。俗名黃荊是也。枝莖堅勁，作科不作蔓。葉

如蓖麻，更疎瘦。花紅，作穗，實細而黃，如麻子。大或

云即小荊也。按陶隱居登真隱訣云：荊木之葉華

通神，見鬼精。註云：荊有三種，荊木即今作鞭。善者

葉香，亦有花。子不入藥。方術則用。其子入

藥，此人無識。其木者，天監三年，天子將合神仙飲

奉敕論。曰：荊花白多，子粗者，歷疎生不

過三兩莖，多不能圓，或扁或異，或多似竹節。葉與

餘荊不殊。蜂多采。汁冷而甜。餘荊被燒

則烟火氣而苦。質實，烟火不入其中。主治心

風。第一於時遠近尋覓，遂不值也。保昇曰：陶氏不

惟不別蔓荊，並不識。蔓荊蔓生。樹生理

自明矣。時珍曰：山野處，都有樵采為薪。年

牡荊子根

十六

希雍曰——入足陽明胃厥陰肝經
又曰苦溫能通行散邪故利胃氣而除寒
熱效逆亦和氣壅胃所致邪散氣下則效
逆止矣

久不樵者其樹大如盤也其木心方其枝對生一
枝五葉或七葉如榆葉長而尖有鋸齒五月秋
開花成穗紅紫色其子大如胡荽子而有白膜皮
裏之頌云葉似菟麻者誤矣有青赤二種青者為
荆赤者為楷嫩
條皆可為管籥

牡荊子 苦溫時珍曰除骨間寒熱通利胃氣止效

逆下氣別錄得柏實青箱木療風之才炒焦為末飲服治

心痛及婦人白帶震亨用半升炒熟入酒一盞煎一沸

熱服治小腸疝氣甚效浸酒飲治耳聾時珍

之才曰防已為

之使畏石膏

根甘苦平時珍曰水煎服治心風頭風肢體諸風解

肌發汗別錄

發明時珍曰牡荊苦能降辛溫能散降則化痰散則祛風故風痰之病宜之其解肌發汗之功世無

知者按王氏寄方云一人病風數年予以七葉黃荊根皮五加根皮接骨草等分煎湯日服遂愈蓋得此

也

荊瀝甘平飲之去心悶煩熱頭風旋運目眩心頭澹

澹欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人

不睡藏器除風熱開經絡導痰涎行血氣解熱痢時珍

發明時珍曰一氣平味甘化痰去風為炒藥故千金翼云凡患風人多熱常宜以竹瀝一薑汁

合五合和勻熱服以瘥為度陶弘景亦云牡荊汁治心風為第一延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用一

荊瀝 紫荊

七

時珍曰入手足厥陰心包肝血分

震亨曰二汁同功並以薑汁助送則不凝滯但氣虛不能食者用竹瀝氣實能食者用

方 中風口噤 升 范汪方 頭風頭痛 之日服 集驗方

喉痹腫痛 一細一噉之或以荆 目卒痛 一肘

後 心虛驚悸 羸瘦者 一升煎一升六 赤白下痢

五合 外臺 濕癬 深師方

紫荊 又名紫珠拾遺皮名肉紅細目內消

集解 頌曰 一處有之入多種於庭院似黃荊 葉小無極花深紫可愛 宗奭曰春開紫花甚

細碎共作朶生出無常處或生於木身之上或附 根上枝下花罷葉出光緊微圓 時珍曰高樹柔條 其花甚繁歲二三次皮入藥 以川中厚紫味苦如胆者勝

〔舉曰〕凡物之紅紫者皆入血分以類相從也。一花紫艷殊常故能活血破血而治諸血症。至於通小腸治五淋利小便則其性能下行又能解諸毒治諸瘡瘰疬是亦外科之要藥。

木及皮苦平

〔葺器曰〕苦寒〔大明曰〕皮梗及花功用並同

破宿血下五淋濃

煮汁服

〔開〕通小腸

〔大〕解諸毒物瘰疬喉痹飛尸蠱毒

丁腫下痔蛇虺蚕虫狂犬毒並煮服亦以汁洗瘡腫

除血長膏

〔葺器〕

活血行氣消腫解毒治婦人血氣疼痛

經水凝滯

〔時珍〕

發明

〔時珍曰〕一氣寒味苦色紫性降入手足厥陰血分寒勝熱苦走骨紫入營故能活血消腫利

小便而解毒楊清叟仙傳方有冲和膏以一一為君

蓋得此意也其方治一切瘰疬發背流注諸腫毒冷

熱不明者一一皮炒三兩獨活去節炒三兩赤芍炒

二兩生白芷一兩木蠟炒一兩為末用葱湯調熱傳

血得熱則行葱能散氣瘡不甚熱者酒調之痛甚者

筋不伸者加乳香大抵瘰疬流注皆氣血凝滯而成

紫荊

時珍曰入手太陰肺足陽明胃經

過溫則散過涼則凝此方溫平一皮破血消腫獨活止風動血引拔骨中毒去痹濕氣赤芍生血止痛木蠟消腫散血同獨活能破石腫堅硬白芷去風生肌止痛蓋血生則不死血動則流通肌生則不爛痛止則不燥風去則血自散氣破則硬可消毒自除矣

方 婦人血氣

一皮為末醋糊丸櫻桃大鶴膝風每酒化服一丸 熊氏補遺

續

一皮三錢老獐犬咬傷一皮末沙糖調塗留酒煎服 直指

仁以去毒 見仙傳外科

發背初生

一切癰疽皆治單用一皮為末酒調蘘住自然撮小內

服柞木飲子乃救貧良方也 仙傳外科

癰疽未成

用白芷一皮等分為末酒調服外用一

皮木蠟赤芍等分為末酒調作蘘藥 同上

草夷

又名辛雉本經侯桃 同上 房木 同上 木筆 拾遺

平曰肺主鼻脫移熱於腦則鼻多濁涕而
淵風客於腦則鼻塞經曰腦涕為涕王氏
曰腭液不澄則為濁涕如泉不已故曰鼻
淵又曰一一性走亂氣虛火甚者忌服

集解宗奭曰一一即木筆花也有桃紅紫色二種
入藥當用紫者須未開時采之已開者不佳

時珍曰亦有白色者人呼為玉蘭

別錄曰去毛用毛射人肺令人嗽

花辛溫治五臟身體寒熱頭風腦痛面黧本經溫中解

肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩胃身兀

如在車船之上者生鬚髮去白虫別錄通關脉治頭痛

憎寒體噤瘙痒入面脂生光澤大治鼻淵鼻斂鼻窒

鼻瘡及痘後鼻瘡並用研末入射香少許葱白蘸入

數次甚良時珍

之才曰川芎為之使惡五石脂

畏菖蒲、黃、連、石膏、黃環

辛夷 郁李

十九

〔鴨鼻〕古人謂九竅不和皆傷胃而氣
發明有至理

〔元素〕曰脾經氣分藥希雅曰入足太陰脾
手太陽大腸太陽小腸經

鳴鼻曰按一形狀味似即今所市之山
櫻桃也 禹錫云五月始熟今北京櫻桃
市罷即市山櫻桃似櫻桃而有毛不光味
甘酸潘未知即是——否倭考

希雅曰其主大腹水腫面目四肢浮腫者
經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰諸腹脹大

發明時珍曰鼻氣通於天者頭也肺也肺開竅於
鼻而陽明胃脉環鼻而上行腦為元神之府而
鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之
傾九竅為之不利——之辛溫走氣而入肺其體輕
浮能助胃中清陽之氣上行通於天所以能溫中治
頭面目鼻九竅之病軒岐之後能達此理者東垣一
人而已

郁李又名莫李詩疏鬱李別錄車下李同上爵李本
經崔梅詩疏棠棣爾雅

集解弘景曰山野處有之子熟赤色保昇曰樹
高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻
桃甘酸而香味瀟宗奭曰——子如御李子紅熟
堪啖微瀟亦可蜜煎陝西甚多時珍曰其花粉紅
色實如

小李

核仁酸平權曰苦辛元
素曰辛苦治大腹水腫面目四肢浮腫

皆屬於熱脾虛而濕熱客之則小腸不利
水氣泛溢於面目四肢辛苦能潤熱結降
下善通利小便則水氣從之而出矣

常日治標之劑多服誘人津液

利小便水道

經本

腸中結氣關格不通

權

泄五臟膀胱

急痛宜腰膝冷膿消宿食下氣大破癖氣下四肢水

酒服四十九粒能瀉結氣

孟

破血潤燥

元

專治大腸

氣滯燥澀不通

李

研和龍腦點赤眼

宗

穀曰去皮
尖蜜浸研

用如膏

發明

時珍曰

一一一

甘苦而潤其性降故能下氣利
水按宗史錢乙傳云一乳婦因悸而病既愈目

張不得瞑乙曰煮郁李酒飲之使醉即愈所以然者
目系內連肝胆恐則氣結胆橫不下郁李能去結隨

酒入胆結去胆下則目瞑矣此蓋得肯綮之妙者也
頌曰必效方療癖取車下李仁湯潤去皮及双仁者

與乾麩相拌搗如餅若乾入水少許作餅大小一如
病人掌為二餅微炙使黃勿令至熟空腹吃一餅當

郁李仁 鼠李子

二十

快利如不利更食一餅或飲熱米湯以利為度利不止以醋飯止之利後當虛若病未盡一二日量力更進一服以病盡為限不得食酪及牛馬等肉屢試神效但須量病輕重以意加減小兒亦可用

方 小兒多熱

研一一如杏酪日服姚和衆至寶方

小兒秘結

大小便不

通並驚熱痰實大黃酒浸炒一研各一錢滑石一兩搗和丸黍米大量兒大小加減服錢乙直訣

腫滿氣急

不得卧一一大合搗末和麩作餅吃入口即大便通泄氣便愈楊氏產寶

脚氣浮腫

心腹滿大小便不通氣急欲息者一十二分搗爛水研汁苡仁三合同煮粥食

獨

行方

鼠李子

又名楮李錢氏鼠梓別錄山李子圖經牛李別錄皂李蘇恭趙李同上牛皂子綱目烏槎

于同上烏

巢子圖經

集解

頌曰即烏巢子也今川蜀多有之枝葉如李其實若五味子色黑其汁紫色熟時采日

乾宗奭曰即牛李也木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生時青熟則紫黑色至秋葉落子尚在枝是處有今關陝及湖南江南江北甚多時珍曰生道路邊其實附枝如穗人采其嫩者取汁刷綠色又曰可以染綠故俗稱皂李

苦涼微毒治寒熱癰癤

經本

水腫腹脹滿下血及碎

肉除疝瘕積冷丸蒸酒清服三合日再服又搗汁傳

牛馬六畜瘡中生虫

蘇恭

豆瘡黑陷及癬疥有虫

時珍

發明

時珍曰

治痘瘡黑陷及出不快或觸穢氣黑陷古昔無知者惟錢乙小兒直訣必勝膏

用之云牛李子即一九月采黑熟者入砂盆搗爛生絹挾汁用銀石器熬成膏瓷瓶收貯常令透風鼠李子

每服一皂子大煎桃膠湯化下如人行二十里再進
一服其瘡自然紅活入射香少許尤妙如無生者以
乾者為末水熬成膏又九篇衛生方亦云瘡瘡黑陷
用牛李子一兩炒研桃膠半兩每服一錢水七分煎

四分服

皮苦微寒

恭曰有小毒

治身皮熱毒

別錄

風痺大諸瘡寒熱

蘇恭

口疳齧齒及疔虫蝕人脊骨者煮濃汁灌之神良

孟詵

忌鉄

發明

頌曰劉禹錫傳信方治大人口中疔瘡發背萬
不失一用山李根一名牛李野薔薇根各細切

五升水煎濃汁再於銀石器中盛之重湯熬稠膏
器收貯每稍含燕必瘥忌醬醋油膩熱麪及肉如發
背以帛塗之神效襄州軍事柳崖妻賈氏
患口疔十五年齒盡落不可近用此而愈

希雍曰入足太陽膀胱手陽明胃兼入足少陰腎經高舉曰自是少陰主藥

希雍曰滿可去脫脾虛滑洩不禁非滑劑無以固之膀胱虛寒則小便不禁腎與膀胱為表裏腎虛則精滑從小便出此藥氣温味酸滲入三經而收斂虛脫之氣故主諸症

鳴皋曰用治胎滑易殞案見早蓮草介實曰善治夢遺崩淋帶漏吐血衄血生津液收虛汗斂虛火益精髓補五臟養血氣平咳嗽定欬急療怔忡驚悸止脾泄

金櫻子 又名刺梨子 開寶山石榴 綱目山雞頭子 時珍曰小葉並名山石榴同名異物

集解 保昇曰一在處有之花白子形似楹棹而嶺外者為勝叢生效野中大類薔薇有刺四月開

白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草

謂之營實今校之與營實殊別也時珍曰山林間甚多花最白膩其實大如指頭狀如石榴而

長其核細碎而有白毛如營實之核味甚澁

酸澁平治脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐

寒輕身 蜀本

發明 頌曰洪州昌州在 有之者其子作煎寄餽人服食家用煎和芡實粉為丸服名水陸二仙丹

益氣補真最佳 慎微曰沈存中筆談云一一止遺泄取其温且澁也世人待紅熟時取汁熬膏味甘全

金櫻子葉根

三十二

小水不禁此固陰養陰之佳品而人忽之可惜也鳴皋按瀉以止脫故能治崩帶至於治吐衄瀉善用之如火寶血湧處以瀉止之恐致於凝米係虛脫用之嘗有神效

失瀉味失本性矣惟當取半黃者用之宗奭曰九十
月霜熟時採用不爾反令人利震亨曰經絡隧道以
通暢為平和而味者取潛性為快熟——膏食之
自作不靖咎將誰執時珍曰無故而服之以取快態
則不可若精氣不固
者服之何咎之有

方 活血駐

——去刺去核熬膏似稀餈每酒
服一匙其功不可備述 孫真人食

忌 補血益精

——去刺及核焙四兩縮砂二兩
鍊蜜為丸每酒下五十九 奇效方 久

痢不止

罌粟殼醋炒——及花葉等分研末蜜
丸芡子大每陳皮湯下五七丸 普濟方

葉 五月五日采同桑葉等分陰乾研末傅之

治金瘡出血極妙名軍中一捻金

時珍

根 用東行者治寸白虫剉二兩入糯米三十粒水

高鼻曰——手太陰肺陽明大腸經藥

昂曰苦以泄氣消痰酸以斂肺降火瀉以收脫止瀉濕以開胃調中
希雍曰苦所以瀉滯所以收濕所以通惟斂故能主心腹脹滿惟濕故能下食斂權用以止水道蕭炳用以止久痢久瀉蘇頌用以治腸風下血帶下丹溪用以實大腸無非苦瀉收斂治標之功也

此音比
白也

二升煎五合服須臾瀉下神效
大

訶黎勒 又名訶子

集解 恭曰——生交州愛州 頌曰今嶺南皆有廣州最盛樹似木槎花白子似卮子橄欖青

黃色皮肉相着七八月熟時采六路者佳未熟時風飄落者名隨風子暴乾收之益小者佳彼人尤

貴之蕭炳曰波斯舶上來者六路黑色肉厚者良六路即六稜也 毅曰凡使勿用訶黎勒箇、毗頭

也——文只六路或多或少並是雜路不堪用

苦溫 權曰苦甘 炳曰苦酸 珣曰酸滯 治冷氣心腹脹 溫王好古曰苦酸平苦重酸輕

滿下食 破胸膈結氣通利津液止水道黑髭髮 唐本 權

下宿物止腸癖久波赤白痢 蕭 消痰下氣化食開胃 炳

訶黎勒

子三

〔常〕能開音止渴肺飲則音開火降則渴止故古方有訶子清音湯

〔常〕曰生用清金行氣煨用溫胃固腸

希雍曰訶子性溫味濡主收不主散故

咳嗽因於肺有實熱泄瀉因於濕熱所致

氣嗽因於火逆衝上帶下因於虛熱而不

因於虛寒及腸癖初發濕熱正感小便不

禁因於腎家虛火法並忌之至濕熱滯下

實火喘嗽用之立致殺人

〔常〕曰得人參治肺虛寒嗽得陳皮砂仁治

冷氣腹脹佐白木蓮子治虛寒久瀉佐檇

除煩治水調中止嘔吐霍亂心腹虛痛奔豚腎氣肺

氣嗽急五膈氣腸風瀉血崩中帶下懷孕漏胎及胎

動欲生脹悶氣嗽并患痢人肛門急痛產婦陰痛和

蠟燒烟熏之及煎湯熏洗大治痰嗽咽喉不利含三

數枚殊勝蘇實大腸飲肺降火震

發明宗藥曰一一氣虛人亦宜緩煨熟少服此

物雖濡腸而又泄氣其味苦濡故耳杲曰肺苦

氣上逆急食苦以泄之以酸補之訶子苦重瀉氣酸

輕不能補肺故救藥中不用丹溪曰訶子下氣以其

殊苦而性急肺苦急食苦以瀉之謂降而下走也

氣實者宜之若氣虛者似難輕服又治肺氣因火傷

極遂一過脹滿其味酸苦有收斂降火之功也時珍

曰訶子同烏梅五倍子用則收斂同橘皮厚朴用則

皮治腸辟使血同蛇床五味山萸川斷杜仲治虛寒帶下同益智子止氣虛寒小水不禁

〔皋曰〕凡酸收之品未有不滯氣者如木瓜烏梅等藥是也惟一一酸收而又能下氣

下氣同人參用則能補肺治咳嗽東垣云嗽藥不用者非矣但嗽未久者不可驟用耳〔珣曰〕一一皮主嗽肉主眼瀉痛波斯人將一一大腹等在船上用防不虞或過大魚放涎滑水中數里船不能通乃煮此洗其涎滑尋化為水則其治氣消痰之功可知矣

頌曰一一主痢唐本草不載仲景治氣痢有方劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下痢諸藥服遍久不瘥轉為白膿今狐將軍傳此方用一一三枚兩炮一

生並取皮末之以沸漿水一合服之若只水痢加甘草末一錢若微有膿血加三錢血多亦加三錢

方 下氣消食 一一一枚為末水煎三五沸如麴塵色入少盞飲之 食醫心鏡 一

切氣疾 宿食不消 一一一枚入夜 氣嗽日久 生 一 舍之嚙汁瘥後口爽不知味 千金方 一 一枚

煎棋柳湯服即知味 經 嘔逆不食 一 一皮二

梧子大白湯下二 風痰霍亂 食不消大便瀉 一 一

十丸 廣濟方 三枚取皮為末和酒頓

訶黎勒 烏藥 二十四

好古曰入足陽明少陰胃腎經常旦上入
脾肺下通腎經
介履曰亦入三焦膀胱

服炒
外臺方 小兒霍亂 一枚為末湯服一
半未止再服 子母秘錄 小兒風

痰 壅閉語音不出氣促欲悶手足動搖 全幼心鑑
半炮大腹皮等分煎服各二聖散 全幼心鑑 半生

氣痢水瀉 可飯丸一加木香○長服方 橘皮
厚朴各三兩蜜丸桐子大白

湯下二三十丸 圖經本草 下痢轉白 二炮一生為

末白湯調服水痢加 赤白下痢 六熟為末赤痢生甘

甘草末一錢 普濟 草湯下白痢炙甘 妬精下疳 少許先以末泔洗淨捺

之或以黃柏荆芥甘草馬鞭草葱白煎 湯洗一人莖爛二寸用此愈 夷聖志

烏藥 又名旁其拾遺 鱗鮓 倭樟 時珍曰葉
狀似鱗鮓鮓魚故名亦呼矮樟其氣似樟也

集解 藏器曰 生嶺南及江南樹生似茶高丈
餘一葉三柙葉青背白根狀似山芍藥及烏

昂曰瘰癧瘡疔皆成於血逆故理氣亦可治之

樟根色黑褐作車轂紋橫生其直根者不堪用頌曰今台州雷州衡州皆有之以天台者為勝木似茶椹高五七尺葉微圓而尖面青背白有紋四五月開細花黃白色六月結實根有極大者嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並以八月采根如車轂紋形如連珠者佳或云天台者香白可愛不及南海者力大時珍曰吳楚山中極多人以為薪根葉皆香但根不甚大纔如芍藥耳嫩者肉白老者肉褐色

根辛溫治中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天

行疫瘴芳香透穢也膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹

中諸蟲藏器除一切冷霍亂反胃吐食瀉痢瘰癧疥癩

并解冷熱其功不可悉載猫犬百病並可磨服大理

烏藥

二十五

昂曰厥逆痰壅口禁脉伏身温為中風身
冷為中氣又有痰為中風無痰為中氣局
方治此用——順氣散許學士云暴怒傷
陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆每得中
氣症不可作中風治又曰氣虛氣熱者禁
用

元氣好古中氣脚氣心氣：厥頭痛腫脹欬急止小便

頻數及白濁時珍

發明宗奭曰——性利 氣少走泄多但不甚剛猛
同沉香同磨作湯點服治胸腹冷氣甚穩當時

珍曰——辛温香竈能散諸氣故惠民和劑局方治

中風中氣諸證用——順氣散者先疎其氣：順則

風散也嚴用和濟生方治七情鬱結上氣故急用四

磨湯者降中兼升瀉中帶補也其方以人參烏藥沈

香枳榔各磨濃汁七分合煎細：燕之朱氏集驗方

治虛寒小便頻數縮泉丸用同益智仁等分為丸服

者取其通陽明少陰

經也方見益智下

方 烏沉湯 治一切氣一切冷補五藏調中壯陽暖

腰膝去邪氣冷風麻痺俯仰不利風水

腫毒吐瀉轉筋痲痺刺痛中惡心痛鬼氣症忤天行

瘴疫婦人血氣痛用——一百兩沉香五十兩人參

三兩甘草四兩為末每服一切氣痛不拘男婦冷氣

半錢薑薑湯點服和劑肥氣血氣息賁

伏梁奔豚搶心切痛冷汗歇息欲絕一者酒浸

一夜炒回香炒青橘皮去白炒良薑炒等分為末温

水童便下香烏散用香附一一分為

衛生家寶方男女諸病末每服一二錢飲食不進薑

棗湯下瘡疾乾薑白薑湯下腹中有虫檳榔湯下頭

風虛腫清茶下婦人冷氣米飲下產後血攻心脾痛

童便下婦人血海痛男子疝小腸疝氣一兩升

痛茴香湯下乾坤秘製麻八錢水煎

露一宿空心熱昏沉或搐一磨

服孫氏集效小兒慢驚水灌之濟急方氣厥頭

痛不拘老少及產後頭痛烏藥川芎等分為末每

服二錢臘茶調下產後霹靂酒下濟生方

喉閉痛生一以酸醋濃煎減半先

濃汁一盞入橘皮一片心腹氣痛水磨

蘇葉一片煎服集簡

烏藥五加皮

鳴皋曰汪昂云一一療筋骨拘攣又云腎得其養則妄水去而骨壯肝得其養則邪風去而筋強然則一一乃肝腎二經藥也

布羅曰入足少陰腎厥陰肝經
鳴皋曰仙經以地榆為玉鼓以一一為金盞

五加皮

又名五佳 綱目 五花炮炙論文章草 綱目 白刺同上 追風使國經木骨同上 狩漆本經 狩

節別 錄

集解

頌曰江淮湖州郡皆有春生苗葉俱青作叢赤莖又似藤葛高三五尺上有黑刺葉生五

枚作簇者良四葉三葉者最多為次每一葉下生一刺三四月開白花結青子至六月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白色骨硬一說今有數種北地者大片類秦皮黃柏輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘無所用吳中乃剝野椿皮為五加柔韌而無味殊為乖失今江淮所生者根類地骨皮輕脆芳香其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出香氣如檉欖春結子如豆粒而扁青色得霜乃紫黑俗但名為追風使以漬酒治風乃不知為真五加也今吳中往往以為藩籬正似薔薇金銀輩而北間不知用此種機曰生南地者類草故小生北地者類木故大時珍曰唐時惟取峽州者充

昂曰辛順氣而化疫苦堅骨而益精温祛
 風而勝濕逐肌膚之瘀血瘡筋骨之拘攣
 希雅曰觀本經所主諸症皆因風寒濕傷
 於二經之故而濕氣尤為最也其治疝氣
 腹痛瘰癧小兒不能行陰蝕瘡疽陰痿囊
 濕小便餘瀝女子陰痒脊痛脚痛痺風弱
 者何莫非二經受風寒邪所致經云傷於
 濕者下先受之又云地之濕氣感則害人
 皮肉筋脉肝腎居下而主筋骨故風寒濕
 之邪多自二經先受此藥辛能散風濕能
 除寒苦能燥濕二臟得其氣而諸症悉愈
 矣又濕氣浸淫則五臟筋脉緩縱濕氣留
 中則虛羸之氣濕邪去則中佳治而筋骨
 堅氣自益而中自補也

貢別錄曰 五葉者

良弘景曰 四葉者亦好

根皮同 辛温主心腹疝氣腹痛益氣療癩小兒三歲

不能行疽瘡陰蝕本經 男子陰痿囊下濕小便餘瀝女

人陰瘡及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益

精堅筋骨強志意久服輕身耐老別錄 破逐惡風血四

肢不遂賊風傷人軟脚腰脊痛主多年瘀血在皮肌

治濕痺肉不足對 明目下氣治中風骨節攣急補五

勞七傷大 釀酒治風痺四肢攣急蘇頌 浸酒飲治目僻

眼睢雷 葉作蔬食去皮膏風濕大明

五加皮五

寫鼻曰遠志辛散能舒通心腎之氣故與相宜

千金方云忌醋

希雍曰得牛膝木瓜黃柏麥冬生地苡仁石斛虎脰骨山藥治濕熱痿痺腰脚不能行動同川斷杜仲牛膝山萸巴戟故紙治腎虛寒濕客之作腰痛同二木川鮮石菖蒲苡仁白茯苓甘菊防風二活白鮮皮石斛治風寒濕成痺

之才曰遠志為之使忌蛇皮

發明時珍曰治風濕痿痺壯筋骨其功良深造酒之法用去骨莖葉亦可煮汁和麴

釀酒時飲之亦可煮酒飲加遠志更良一方加木瓜談堊翁試驗方云神仙煮酒法用五加皮地榆刮

去粗皮各一斤袋盛入無灰酒二斗中大罈封固安大鍋內文武火煮之罈上安米一合米熟為度取出

渣晒乾為丸每旦服五十九丸藥酒送下臨卧再服能去風濕壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年功難

盡述王綸醫論云風病飲酒能生痰動火惟一味浸酒日飲數盃最有益蓋與酒相合也

方虛勞不足煮七斗分四斗浸麴三斗拌飯釀酒

任飲男女脚氣骨節皮膚腫濕疼痛服此進飲食

千金方健氣力不忘事四兩遠志去

心四兩浸酒春秋三日夏二日冬四日出渣日乾為

丸梧子大每服四五十九丸原酒下見瑞竹堂方

見瑞竹堂方

希雅曰入手足陽明大腸胃本經
 又曰再溪言涼而燥考其用自是微寒苦
 燥之藥

小兒行遲 三歲不能行者用此便走 一 一 五錢半
 膝木瓜各二錢半為末每服五分米飲入

酒數滴下 婦人血風勞 憔悴困倦欲滿虛煩喻
 見全幼心鑑 少氣發熱多汗口乾舌滑

不思飲食名血風勞宜油煎散用五加皮赤芍當歸
 各一兩為末每用一錢水一盞用青錢一文蘸油入

藥煎七分温 五勞七傷 五月五日採五加莖七月七
 服 和劑 日采葉九月九日取根篩研

每酒服方寸匕日三 服石發毒 或熱漿白冷地卧
 久服去風勞 千金 一 二兩水煮發時

便服 外 台秘要 香者為椿臭者為檇 又名虎目樹 谷遺大服

椿 檇 葉苦温煮水洗瘡疥風疽檇木根葉尤良 唐本白禿不

生髮取椿桃楸葉心搗汁塗之 時珍

五加皮 椿檇 二八

發明 說曰椿芽多食動風重十二經脉五臟六腑令人神昏猪肉熱麩食則中滿蓋擁經絡也時珍

曰椿葉無毒

樗葉有小毒

白皮及根皮苦温 震亨曰凉而燥藏器曰樗根有小毒 治疔蟲樗根尤

良 唐本 去占鼻疔蟲殺虬虫疥蟲鬼疰傳尸蠱毒下血

及赤白久痢 藏器 得地榆止疔痢 蕭炳 止女子血崩產後

血不止赤帶腸風瀉血不止腸滑瀉縮小便蜜炙用

大 利尿瀦治赤白濁赤白帶濕氣下痢精滑夢遺燥

下濕去肺胃陳積之痰 丹溪

駁曰凡使椿根不近西頭者為上時珍曰椿樗木皮根皮並刮去粗皮陰乾臨時切焙用樗根制硫黃砒

昂曰醋炙蜜炙用忌肉麩

石黃

金

發明

說曰女子血崩及產後血不止月信來多并赤帶下宜取東引細椿根一大握洗淨以水一大

升煮汁分服便斷小兒疳痢亦宜多服仍取白皮一

握粳米五十粒葱白一握炙甘草三寸豉兩合水一

升煮半升以意服之枝葉功用皆同震亨曰椿根白

皮性涼而能瀉血凡濕熱為病瀉痢濁帶精滑夢遺

諸證無不用之有燥下濕及去肺胃陳痰之功治瀉

痢有除濕實腸之力但痢疾滯氣未盡者不可遽用

宜入丸散亦可煎服不見有害予每用炒研糊丸看

病作湯使名固腸丸也時珍曰椿皮色赤而香樗皮

色白而臭多服微利人蓋椿皮入血分而性瀉樗皮

入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而瀉利

之效則異正如茯苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病

不足者宜用椿皮氣分受病有鬱者宜用樗皮此心

得之微也乾坤生意治瘡腫下藥用樗皮以無根水

研汁服二三碗取利數行是其驗矣故陳藏器言樗

椿樗

二九

昂曰按此方仍是作疳治標皮止瀉劑仍
是清劑
馮果曰大腸連肛門甚痛係濕熱然則標
皮之性涼可証

皮有小毒蓋有所試也宗奭曰一婦年四十餘耽飲

多食魚蟹積毒在臟日夜數十瀉便與膿血雜下大

腸連肛門甚痛用止血痢藥不效用腸風藥益甚蓋

腸風有血無膿也服熱藥則痛甚血多服冷藥則注

瀉食減服溫平藥則若不知年餘待死或教服人

參樗皮散二味等分研末酒或米飲調下遂愈

方 去鬼氣

樗根一握細切以童便二升豉一合浸
一宿絞汁煎一沸三五日一度服 陳

藏器本

小兒疳疾

椿白皮日乾二兩為末以粟米濃
草方 汁和丸梧子大十歲三四丸米飲

下量兒大小加

休息痢疾

日夜無度腥臭不可近臍
減 子母秘錄 腹撮痛東垣脾胃論用椿

根白皮訶子各半兩母丁香三十箇為末醋丸梧子

大每服五十九米飲下○椿白皮用東南行根長流

水漂三日去黃皮焙為末每一兩加木香

水穀不痢

二錢飯丸每米飲下一錢二分 經驗方

久不愈兼腰痛樗皮一兩研細以麩和如

下痢清血

皂子大每空心服十九丸水煮熟服 傅信

時珍曰手足太陽三焦厥手陽明大腸

腹中刺痛椿白皮晒研醋糊丸桐子大每
早米飲下四十九一加只壳蒼朮 經驗 臟毒下血

温白丸椿白皮酒浸晒研棗肉和丸
桐子大每酒下五十九 儒門事親 下血經年 樗白

錢水煎入酒半盞服作丸
亦可虛者加參 仁存方 女人白帶 椿根白皮滑石
等分為末粥丸

梧子大空腹白湯下一百丸。又椿根白皮一兩半
乾薑炒黑白芍炒黑黃柏炒黑各二錢為末粥丸服

丹 漢 男子白濁 方同

英 又名鳳 眼草 治大便下血 嘉 祐

方 腸風下血 椿莢半生半燒為末 米飲下二錢 普濟

榆白皮 甘平滑利治大小便不通利水道除邪氣

本 療腸胃邪熱氣消腫治小兒頭瘡疔別 通經脉

椿樗 榆白皮

泉曰榆皮性粘滑似人津液故行津液凡人津液足則胃中渣滓皆隨津液而滑下津液涸則粘乾於胃矣所以榆皮能消留者有形也但榆皮性涼而滑不入氣分久服泄真氣之說似亦不然

如虛養生論云榆皮入腹

乳汁不出中結成腫名如乳

搗涎傳癬瘡大滑胎利五淋治齁欬瘵不眠孰生皮權

搗和三年醋滓封暴患赤腫女子妬乳腫日六七易

效孟利竅滲濕熱行津液消癰腫時

發明說曰人搗白皮為末和菜菔食甚美令人能食服丹石人亦服之取利關節故也時珍曰榆皮

榆葉性皆滑利下降手足太陽手陽明經藥也故人小便不通五淋腫滿欬嗽不眠經脉胎產諸病宜之本草十劑云滑可去著冬葵子一一之屬是也蓋亦取其利竅滲濕熱消留者有形之物耳氣盛而壅者宜之若胃寒而虛者久服滲利恐洩真氣蘇頌謂榆粉久食不損人恐非確論榆莢作羹食令人多睡

方 齁喘不止 五合煎如膠服日夜數次 陰乾焙為末每用二錢水食療虛

勞白濁 濃汁分服 千金 五淋澀痛 為木每以二錢

煎如膠服 渴而尿多 非淋也 煎濃取 身體暴

普濟 末同米作粥 臨月易產 服方寸匕 日三產

腫 食小便利良 備急 胎死腹中 或母病欲下胎 子母秘錄 瘡疽

極易 草別說 根一切清水洗搗極爛和香油傅之留頭

發背 出氣燥則以苦茶頻潤不粘更換新者將愈以

葉 嫩者作羹食消水腫利小便下石淋壓丹石 藏

煎汁洗酒鼓鼻同酸枣仁等分蜜丸日服治胆熱虛

勞不眠 時珍

英 作羹食令人多睡和牛肉作羹食主婦人帶下

榆白皮 海桐

希雅曰入足太陽明 脾胃經

鳴皋曰一一諸家罕言之然自葛洪藥
痛痺家不可缺也觀其所主功在去風濕

器 歲

海桐

又名刺桐

集解

頌曰海桐生南海及雷州近海州郡亦有之
葉大於手作三花尖皮若梓白皮而堅韌可

作繩及水不爛又云嶺南有刺桐葉如梧桐其花
附幹而生側敷如掌形若金鳳枝幹有刺花色深
紅江南有頡相紅花無實時珍曰一一皮有巨刺
如龜甲之刺或云即刺桐皮也按嵇含南方草木
狀云九真有利刺桐布葉繁密三月開花赤色照映
三五房凋則三五房復發陳翥桐譜云刺桐生山
谷中文理細密而性喜拆裂體有巨刺如櫟樹其
實如楓楨桐身青葉圓大而長高三四尺便有花
成朶而繁紅色如火為夏秋榮觀

皮苦平

大明曰溫

治霍亂中惡赤白久痢除疔蠱疥癬牙

惟去風濕故又殺虫東壁言能行經絡達病所是亦以通為用之品也

茵虫痛並煮服及含之浸水洗目除膚赤開寶主腰脚

不遂血脉頑痺腿膝疼痛赤白瀉痢李珣去風殺虫煎

湯洗赤白時珍

發明頌曰古方多用浸酒治風蹶南唐筠州刺史王

不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥莫療因覓劉禹錫續傳信方備有此驗脩服一劑便減五分其方用

一兩二兩半膝芳莖羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩苡仁二兩生地黃十兩並淨洗焙乾對以綿

已裹入無灰酒二斗浸之冬二七夏一七空心飲一盞每日早午晚各一次常令醱此方不得加減禁

毒食時珍曰一一能行經絡連病所又入血分及去風殺虫

方風癰有虫蛇床子等分為末以臘風虫

海桐皮 蜜蒙花

三十二

希雅曰：一廠陰肝家正藥

牙痛 煎 中惡霍亂 煮
激 聖惠 服 聖濟

密蒙花 又名水錦花 炮炙論

集解

頌曰

冬青葉而厚背白有細毛又似橘葉花微紫

色二三月采花物乾宗奩曰利州甚多葉多不凋亦不似冬青柔而不光潔不深綠其花細碎數十

房成一朶

冬生春開

甘平微寒治青盲膚翳赤腫多眵淚消目中赤脉小

兒麩豆及疔氣攻眼

開寶

蓋明怕日

劉守真

入肝經氣分

潤肝燥好

古

酒浸或蜜拌蒸

方 目中障翳

黃柏根各一兩為末水丸梧子大每卧時湯服十九或十五丸

聖濟

方

木芙蓉

又名地芙蓉 圓經木蓮 綱目華木 同上 柞木 音化 拒霜

葉花 微辛平清肺涼血散熱解毒治一切大小瘰

疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛

時珍

發明

時珍曰芙蓉化并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治瘰疽之功殊有神效近時瘍

醫秘其名為清涼膏清露散鐵籬散皆此也其方治一切瘰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗於腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆研末尤妙

方 久欬羸瘦

九尖拒霜葉為末以魚鮮蘸食屢效 危氏得效方 經血不止

木芙蓉 山茶花

三三

芙蓉花 蓮蓬壳 等分為末 每
米飲下二錢 婦人良方
偏墜作痛 芙蓉花葉黃
柏各三錢為

末以木蟹子仁一箇醋磨塗
陰囊其痛自止 簡便方
癰疽腫毒 重陽前取芙
蓉葉研末端

午前蒼耳燒存性研末等分蜜水調塗
四圍其毒自不走散名鉄井闌 簡便
頭上癩瘡 芙蓉

根皮為末香油調塗先以松
毛柳枝煎湯洗 醫學集成

山茶花 此樹注昇陽要綱日藥味法
甘微辛寒治吐血衄血腸風下血並用紅

者為末入童便薑汁及酒調服可代爵金 震亨
湯火傷

研末麻油調塗 時珍

木槿 概爾雅槿同上日及綱目朝開暮落花同上藩
蘿草同上花奴 玉蒸 萍詩 [時珍曰]

川中來者佳
厚而色紅

皮及根 甘平滑 大明曰涼 止腸風瀉血痢後熱渴作飲

服之令人得睡並炒用 藏器 治赤白帶下腫痛疥癬洗

目令明潤燥活血 時珍

發明 時珍曰木槿皮及花並滑如葵花故能潤燥色色如紫荆故能活血川中來者氣厚力優故尤

效有

方 赤白帶下 槿根皮二兩以白酒一椀半煎一椀空心服之甚妙 蔡要奇方 頭

面錢鮮 槿樹皮為末醋調重頓如牛皮癬 川槿皮一膠傳之 王仲勉經效方 兩大風子

仁十五箇半夏五錢判河水井水各一椀浸露七宿入輕粉一錢秃筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙

忌沐浴夏月用 癬瘡有虫 川槿皮煎入皂角浸水頻擦之或以槿皮浸水磨

尤妙 扶壽方 木槿 合歲子

雄黃尤妙
簡便方
痔瘡
蕩蘿草根煎湯先
熏後洗
直指
脫肛
槿皮煎洗後
以白礬五倍
子末傅之

救急方

花甘平滑治腸風瀉血赤白痢並焙入藥作湯代

茶治風明消瘡腫利小便除濕熱時珍

方下痢噤口
紅木槿花去蒂陰乾為末麩餅蘸食
趙宜真濟急方
風痰擁

逆心沸湯下白花尤良
木槿花研末每服一二匙空
簡便
反胃
千葉白槿花陰乾為末陳糯米

湯調送三五口不

轉再服 袖珍

合歡皮
又名合昏唐本夜合日華青裳園經萌葛綱
烏賴樹
崔豹古今注云欲鬪人之忿

贈以青裳謂植之

庭除使人不忿

希雍曰入心脾二經心為君主之官脾為萬物之母脾虛則五臟不安心氣躁則佛鬱甘主益脾脾實則五臟安甘可緩心氣心氣舒則神明暢矣

秘康養生論云合歡藥忘憂

又曰子合橘核木瓜牛膝能治風濕熱加黃柏寒濕加茴香秦按子能治疝並治孕婦腰脇痛則合歡之入肝經可証矣

鳴皋曰嘗見一孕婦患腰脇痛服藥不效或傳一單方用合歡葉炒熟研末燒酒沖服即愈則此藥亦能通厥陰肝絡也觀冠氏折傷疼痛之用則通行之性可知鳴皋曰同健仁服能治不眠

甘平安五臟和心志令人歡樂無憂明目本經煎膏消

瘰癧續筋骨大明殺虫搗末和錨下墨生油調塗蜘蛛

咬瘡用葉洗衣垢藏器折傷疼痛研末酒服二錢寇氏

和血消腫止痛時珍

發明震亨曰合歡補陰之功甚捷長肌肉續筋骨與白蠟同入膏用神效而外科家不見錄用何也

方 肺癆唾濁心胸煩錯取夜合皮一掌大水三撲升煮取一半分二服 獨行方

損折骨去粗皮炒黑色四兩芥菜子炒一兩為末每服二錢溫酒卧時服以渣傳之接骨

甚妙 小兒撮口枝煎濃汁拭口中并洗之 子女秘錄中風攣縮

百一方 枝酒 枝栢枝槐枝桑枝石榴枝並生剉各五兩卷活二兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗

合歡子 杉木

三五

希雍曰入足陽明經

鳴皋曰杉木芳香能除邪穢之氣辛溫能散寒濕之鬱為風家所寶尤為濕家所時

煎五枝取二斗五升浸糯米五升黑豆五升蒸熟入麴與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉常令有

酒氣 奇效良方

杉 又名^{音杉}姑蘇雅沙木綱目檜木

木 辛微溫治漆瘡者湯洗之無不瘥^{別錄}煮水浸脚

氣腫滿服之治心腹脹痛去惡氣^{蘇恭}治風毒奔豚霍

亂上氣並煎湯服^{大明}

發明 ^{丹溪曰}一節浸符脚氣腫滿尤效^{頌曰}椰子厚纂救死方云得脚氣夜半疔絕脇有塊大如

石且死困不知人搗搗上視家人號哭滎陽鄭洵美傳一一湯服半食頃大下三行氣通塊散方用一一節一大升橘葉一大升無葉則以皮代大腹楨榔七枚連子碎之童便三大升共煮一大升半分為兩服

希雍曰入手足陽明經大腸胃

希雍曰本經味苦氣溫日華子言涼然詳其用應是辛苦溫之藥與巴豆牽牛大略相似

若一服得快即停後服死病曾有教者乃得不死恐人病此故傳之

方 肺壅痰滯

上焦不利卒然致數一肩一兩皂角去皮酥炙三兩為末蜜丸桐子大

未飲下十九丸

日三服 聖惠

肺壅失音

湯音出乃止 集簡 燒炭用湯淋下飲

瘡黑爛

多年老一節燒灰麻油調傳 若葉隔之絹包定甚效 救急

烏白木

又名鴉白

集解

葳器曰葉可染皂子可壓油作燭時珍曰南方平澤甚多今江西人種植采子蒸煮取脂

澆燭子上皮

脂勝於仁也

根白皮苦涼有毒治暴水癥結積聚 唐本療頭風通大

小便

大解蛇毒 震亨

杉木 烏白

〔鴛〕李氏擬以大戟主性涼解氏擬諸
巴豆牽牛主性溫觀其能傳頭瘡治腫毒
鮮砒毒則性涼可証

發明〔時珍曰〕烏白根性沉而降陰中之陰利水通
腸功勝大戟一野人病腫滿氣壯令掘此根搗

爛水煎服一碗連行數行而病平氣虛人不可用之
此方出太平聖惠方言其功效神聖但不可多服耳

誠然或慢

火炙黃用

方 小便不通

烏白根皮煎湯飲 肘後

大便不通

烏白根皮方長一寸切水

一盞煎半盞服立通不用多

二便闕格

二三日則殺人烏白東南

吃其功神聖兼治水

根皮乾為末熟水服二錢先以芒

硝二兩煎湯服取吐甚效

時後水氣虛腫小便澀

皮栲榔木通各一兩為末

脚氣濕癢

極癢有虫烏白根為末傳之有

每服二錢米飲下

聖惠

涎出良

尸注中惡

心腹痛刺沉然錯亂用烏白根皮煎濃汁一合調硃砂末一錢服肘

後方無硃

砂 永類 暗疔昏狂

瘡頭凸紅烏白根經行路者取二尺許去皮搗爛井華水調服

昂曰極能瀉下凡患腫毒中乾毒者不拘根皮枝葉搗汁多飲得大利即愈虛人忌用

好古曰入厥陰肝時珍曰入太陰陽明肺大腸兼入足厥陰肝

希辨曰頭風淚出者皆厥陰風木為病一主之金能勝木也昂曰厥陰脈絡陰器寒客肝經則為囊結

一盞待瀉過以三角銀杏仁浸油搗奮患處 聖濟 小兒胎瘡 滿頭用水邊烏白根研入雄黃

少許生油調搽 鼠莽砒毒 根皮半兩搗水 醫方大成

皂角 又名皂莢 本經雞栖子 綱目烏犀同上 懸刀外丹本草

集解 時珍曰皂樹有三種一種小如猪牙一種長而肥厚多脂而粘一種長而瘦薄枯燥不粘

以多脂而粘者佳樹多刺難采以篋籬其樹一夜自落亦一異也有不結實者樹鑿一孔入生鐵三

五斤泥封之即結莢人以鐵砧槌一即自損鉄碾之之久則成孔鉄錫鑿之多爆片落豈一與

鉄有感台之情耶

辛鹹温有小毒治風痺死肌邪氣頭風淚出利九竅

殺精物 經本 療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落

烏白 皂角

寫鼻曰——服之多吐痰結肺經者可以此吐之

好古曰蜜炙酥更絞汁燒灰各隨方用

希雍曰稀涎散風和暴病氣實者用之殊效第似中風症由於陰虛火炎煎熬津液

明目益精可為沐藥不入湯別錄通關節頭風消痰殺

虫治骨蒸關胃中風口噤大破堅癥腹中痛能隨胎

又將浸酒中取盡其精煎成膏塗京貼一切腫痛權

溽暑久雨時合蒼朮燒烟辟瘟疫邪濕氣宗燒烟熏

久痢脫肛汪搜肝風瀉肝氣好通肺及大腸氣治咽

喉痹塞痰氣喘效風癘疥癬時珍

之本曰柏實為之使惡麥冬畏人參苦參機曰伏丹砂粉霜硫黃礞砂穀曰新汲水浸一宿銅刀刮去

皮酥炙透用

發明好古曰——厥陰之藥活人書治陰正氣散內用——引入厥陰也時珍曰——屬金入手

結而為痰熱極生風以致猝仆人多用稀涎散吐之大損津液
鳴皋曰如繆氏所指入屬控涎丹之症也

太陰陽明之經金勝木燥勝風故兼入足厥陰治風木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之導之則通上下諸竅服之則治風濕痰飲腫滿殺虫塗之則散腫消毒搜風治瘡按龐安時傷寒總病論云元祐五年自春至秋蘄黃二郡人患急喉痹十死八九速者半日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數千人其方治九種喉痹急喉痹纏喉風結喉爛喉疔虫：蝶重舌木舌飛絲入口用大——四十挺切水三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去渣入無灰酒一升釜煤二已煎如錫入瓶封埋地中一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內取惡涎盡為度後含甘草片又孫用和家傳祕寶方云凡人卒中風昏、如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此證風涎潮於上胸痹氣不通宜用救急稀涎散吐之用大——肥甯不蛀者四挺去黑皮白礬光明者一兩為末每用半錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微、稀冷涎或出一升二升當待醒、乃用藥調治不可使大吐

皂角

三八

昂曰凡卒中不省人事口噤不能進藥者
急捉頭髮手插人中用一末或半夏末
吹鼻有生無噤死蓋肺氣絕也

之恐過劑傷人屢效不能盡述宗彙曰此法用一
一兩生白礬末半兩膩粉半兩水調一二錢過咽即

吐涎用礬者分
隔下之涎也

方 中風口噤

痰涎潮壅一錢 一挺去皮猪脂塗灸
黃色為末每服一錢温酒調下氣壯

者二錢以吐出血痰
為度 簡要濟眾

中暑不省

草一兩微炒為末温

水調一錢灌
之 澹寮

鬼魔自縊

等暴卒一末吹
之噤則甦 千金 溺死 絛裝

末納下部候須臾出水
即活 外臺秘要方

急喉痹

遂巡不救一一生研
末以火許點患處外

以醋調厚封項下須臾便破出血即愈或按水灌之
亦良。直指用一肉半截水醋半盞煎七分服出

血 愈 咽 喉 腫 痛

去皮醋浸炙七次勿令太
焦每吹少許吐涎即止 聖濟 風邪癰

疾 一兩為末九梧子大硃砂為衣每服三四十九棗
一燒存性四兩蒼耳根莖葉日乾四兩蜜陀僧

昂白老人風松取中殿湯泡眼即通

湯下日二服稍退只
胸中痰結
三十挺去皮切

服二十九 永類
水五升浸一夜按取

汁慢火熬至可丸、
以柿餅搗膏丸彈
欬逆上氣
唾濁不得卧
一丸用

鈞痰膏用半夏醋煮過以
膏和勻入明礬少許

子大含之 聖意
一炙去皮子研末蜜

丸梧子大每服一丸
長一三條去

湯下日三夜一
仲景
痰欬咳嗽
皮子一英入巴

豆十粒一英入半夏十粒一英入杏仁十粒用薑汁

製杏仁麻油製巴豆蜜製半夏一處慢火炙黃色為

末每用一字臨卧以薑
卒寒咳嗽
一燒研末豉湯

汁調之吃下效
選奇
服二錢 千金

痰欬
喉中作水雞聲用
一兩挺酥炙取肉為末蜜

丸豆大每服一丸取微利為度不利更服日一

服
腫滿入腹
脹急
一升日三服 肘後方

必效
石噐煮沸服一升日三服

二便關格
千金用
一燒研粥飲下三錢立通
○宣

明方鉄脚丸用
一炙去皮子為末酒麩

皂角

三十九

糊丸每服五十九酒下。○聖惠用
燒烟於桶內坐上熏之即通食氣黃腫氣欲胸

蛙一去皮子醋塗炙焦為末一錢巴豆七粒去油

膜以淡醋研好墨和丸麻子大每服三丸食後陳橘

皮湯下日三服隔一日增續長一尺

一丸以愈為度經驗卒熱勞疾以上酥一兩微

塗緩炙酥盡搗篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五

丸漸加至二十九重者不過兩劑愈崔元亮海上

方急勞煩熱體瘦三皂丸用一皂刺皂樹皮各一

五度煎之候少凝入射香一分以童子小傷寒初得

便浸蒸餅丸小豆大每服七丸聖惠

不問陰陽以一挺肥者燒赤為末時氣頭痛

以水五合和頓服之陰病極效千金

用一燒研新汲水一盞薑汁蜜各用

少許和二錢服之取汁即愈聖惠風虫牙痛用

塗患處吐牙痛食鹽等分為末霍亂轉筋

涎外臺日楷之千金方末吹

鼻取嚏即
安深師下部惡瘡
導之
燒研綿裹
外腎偏墜
疼痛

末傳之
梅師便毒
塗患處頻以水潤之
又方用牙
末以熱醋調

七片煨黃去皮弦為末
空婦人吹乳
袖珍方用猪牙
心酒下五錢
袖珍方

酒服一錢
又詩云婦人吹乳法如何
燒
大風
灰蛤粉和熱酒一盃調八字管散立刻笑呵

諸癩
長一二十條
炙去皮子以酒煎稠
濾過候積
冷入雪糕和丸
梧子大酒下五十九
直指

年疥瘡
猪肚內放
煮熟
丁瘡惡腫
酥炙為
去一食之
袖珍
末入射香少

許人薰少許和塗五
小兒頭瘡
白禿
燒黑為末
日後根出
普濟
去茄傳之
不過三次

愈筆
小兒惡瘡
搗爛塗之
肘後
腎囊風痒
以
草燒
一相熏十餘
水洗淨
以麻油

次即止
濟急仙方
肘後

皂角
皂刺

皂刺

一名天丁

辛温米醋熬嫩刺作煎塗瘡癬有奇效

頌

治瘰癧妬

乳風癘惡瘡胎衣不下殺虫

時珍

發明

楊士瀛曰一一能引諸藥性上行治上焦病震

殺虫功與茨同但其銳利直達病所為異耳神仙傳云雀言一旦得大風惡疾双目昏眉毛脫落鼻梁崩倒勢不可救遇異人傳方用一一三斤燒灰蒸一時久日乾為末食後濃煎大黃湯調一一飲之一旬眉髮再生肌潤目明又劉守真保命集云癘風乃營氣熱風寒客於脉而不去宜先用樺皮散服五七日後灸承漿穴七壯三灸後每旦早服樺皮散午以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸晚服一聖散用大黃半兩調一一刺灰三錢乃緩踈泄血中之風熱也仍戒房室三年樺皮散見樺皮下又追風再造散即一聖散

云服之便出黑虫為驗數日再服即候
虫盡為絕根也新虫嘴赤老虫嘴黑

方 小兒重舌

一 一 灰入朴硝或冰片少許
小兒重舌 聖惠 小便淋
摻舌下涎出自消 聖惠

閉

一 一 燒存性破故紙等分
腸風下血 便前近肝腎
為末無灰酒下 聖濟錄 便後近心肺

一 一 灰二兩胡桃仁破故紙炒槐花炒各
一兩為末每服一錢米飲調下 普濟
腸風下痢

風傷久不已而下痢膿血日數十度用一 一 枳實麩
炒槐花生用各半兩為末蜜丸桐子大米飲下三十

九 袖珍 胎衣不下 一 一 燒為末每服一 一 錢
錢酒下 熊氏補遺 乳癰 性一兩蚌

粉一錢和研每酒 一 一 錢
乳結毒 一 一 蔓荆子各燒存性
下一錢 直指方 等分為末每酒服二錢

珍 袖 腹内生瘡 在腸臟不可藥治者取一 一 不拘多
少好酒一椀煎至七分溫服其膿血

悉從小便出不飲酒 瘡腫無頭 一 一 燒灰酒服三錢
水煎亦可 蘭氏方 爵葵子三五枚其處

皂刺 皂角子

四十一

時珍曰通陽明燥金大腸
鳴皋曰皂子大腸主藥去風潤燥皮中白
肉入治肺藥者肺與大腸為表裏腸氣通
則肺氣降也

如針刺為效
儒門事親大風癩瘡
選奇方用黃柏末一灰各
三錢研勻空心酒服取下虫

物並不損人食白粥二三日服補氣藥數劑名神效
散忌一切魚肉動風之物取下虫一二升病乃愈也

仁
發背不潰
甘草半兩為末每服一二錢酒一椀

乳香一塊煎七分服
本事方

皂角子辛温炒去皮以水浸軟煮熟糖漬食之疎

導五臟風熱壅
宗
核中白肉入治肺藥核中黃心嚼

食治腸痰吞酸
蘇
仁和血潤腸
李
治風熱大腸虛秘

療癰腫毒瘡癬
時
珍
斲曰煮熟剝去硬皮取向裏
白肉去黃用其黃消人腎氣

發明
機曰一一一燒存性治大便燥結其性得濕則
滑則燥結自通也時珍曰皂荚味辛屬金能

通大腸陽明燥金乃辛以潤之義非得濕則滑也

方 腰脚風痛

不能履地 一 一 千二百箇以少酥熬者為末蜜丸梧桐子大空心蒺藜

子棗仁湯下三

大腸虛閉

風人虛人脚氣人大腸或秘結或利用上方服至百

九以通為

下痢不止

諸藥不效服此三服宿垢去盡即變黃色屢驗 一 一 瓦焙為

末米糊九梧子大每服四五

裏急後重

新皂角子米糠炒香只壳

十九陳茶下 醫方摘要

炒等分為末飯丸桐子大

腸風

一 一 槐實各一兩穀糠炒香去糠為末

米飲下一錢

小兒流涎

脾熱有痰 一 一 仁半兩半夏薑湯泡七次一錢二分

末薑汁九麻子大每

產難

一 一 二箇 多年癩癩 一

湯下五丸

聖濟錄

一 百枚米醋一升硃砂二錢同煮乾炒令酥看瘰子多少如一箇服一粒十箇服十粒細嚼米飲下酒浸皂角子 肥皂角 單二

〔節曰〕——治無名腫毒頗有奇功不拘奇
鳩惡瘡用生——去皮弦及筋搗爛
醋和傅立愈不愈再傅奇驗此方三書不
載若貧人僻地無藥者用之甚便

〔香雅曰〕——入足陽明經胃

煮服亦可。聖濟錄言
虛人不可用礪砂也

肥皂角

〔時珍曰〕其樹高大葉如檀及皂角葉結角長
三四寸而肥厚多肉十月采角煮熟搗爛和

白麩及諸香作九澡身面
去垢其膩潤勝於皂角也

辛温微毒去風濕下痢便血瘡癬腫毒

〔時珍〕

方 下痢噤口

——以少許入粥內食之效 乾坤生意

眉癬諸瘡

——分研勻香油調塗 摘元 臘梨頭 獨核

去核填沙糖入巴豆二箇益泥煨存性入檳榔輕
粉五分研勻香油調搽先以灰水洗過温水洗再洗拭

乾乃搽一宿 玉莖濕痒 調搽即愈 攝生方

樺木皮

又作檣 〔藏器曰〕晋王珣傷寒身驗方中作
檣字〔時珍曰〕——燒烟熏紙作古畫

鴉暴曰其皮輕虛像肺宜入肺故治肺風毒瘡惟入肺清肺故治小便熱短也

希雍曰五疸皆濕熱鬱於陽明所致苦平能除濕熱故主之其治傷寒時行熱毒瘡又治肺風毒皆取其苦涼能散風邪熱毒之義也
鴉暴曰觀其治五疸並為滄滹要藥又治小便熱短其為苦涼可証

集解藏器曰似山桃皮可為燭宗藥曰皮上有紫黑花勻者裘鞞弓鞞時珍曰樺木生遼東及臨洮河州西北諸地其皮厚而輕虛軟柔皮匠用襯靴裏及為弓鞞之類謂之暖皮以皮裹蠟可作燭點

苦平治諸黃疸濃煮汁飲之良開寶煮汁冷飲主傷寒

時行熱毒瘡特良即今豌豆瘡也藏器燒灰合他藥治

肺風毒宗藥治乳癰時珍

方 乳癰初發腫痛結硬破一服即瘥以此來真沈存中靈苑方燒存性研和無灰酒溫服方

寸匕即卧醒即瘥沈存中靈苑方乳癰腐爛執內年久燒灰酒服一錢唐珣經驗

肺風毒瘡遍身瘡疥如癩及癰疹瘡痒並用樺皮散主之燒灰四兩只殼燒四兩荆芥

樺木皮 樺木

甲三

藜藿 曰：辛烈香竈能逐邪惡所謂芳
 香逐穢也通關利數故能驅濕李氏用為
 吐藥既能上通復能旁達故特良也但乾
 霍亂有由於熱結者切不可妄用
 又曰：按脚痛外治特為要藥見一船婦失
 跌傷足以下煎水洗並燒烟熏之次日
 即愈

穗二兩炙草半兩杏仁水煮過去皮尖二兩研爛研
 勻每服二錢食後酒下瘡疥甚者日三服 和劑

小便熱短 一一濃煮
 汁飲 集簡

樟木

辛溫治惡氣中惡心腹痛鬼疰霍亂腹脹宿食不消

常吐酸臭水酒煮服無藥處用之煎湯浴脚氣癬疥

風癢作履除脚氣 葳器

發明 特珍曰：霍亂及乾霍亂須吐者以一一屑煎濃
 汁吐之甚良又中惡鬼氣卒死者以一一燒烟

熏之待醒乃用藥此物辛烈
 香竈能去濕氣辟邪惡故也

方 手足痛風 一一屑一斗急流水一石煎極滾泡
 之乘熱安足於桶上熏之以被圍不

可令湯氣入目其功甚捷
三木節散 治風勞面色青白
肢節沉重脊間痛

或寒或熱或躁或噎思食不能食被虫侵蝕證狀多
端天靈蓋酥炙研二兩牛黃人中白培各半兩射香
二錢為末別以一一福節皂莢木痛節槐木痛節各
為末五兩每以二錢水一盞煎減半去渣調前藥末
一錢五更頓服取下
出物為效 聖惠方

樟腦 又名韶腦 出韶州以樟木切片并水浸煎成

辛熱通關竅利滯氣治中惡邪氣霍亂心腹痛寒濕

脚氣疥癬風癩齒殺虫辟蠹著鞋中去脚氣

時珍

發明 時珍曰一一純陽與硝磺同性水中生火其燄

益熾今丹爐及烟火家多用之辛熱香竄稟龍
火之氣去濕殺虫此其所長故燒烟熏衣筐席簾能
辟壁虱虫蛀博物志云脚弱病人用杉木為桶濯足
樟木 樟腦 楠木

四十四

非一一於兩股間用帛束定月餘甚妙王璽醫材集
要方治脚氣腫痛用一一二兩烏頭三兩為末醋丸
彈子大每置一丸於足心踏之下以
微火烘之衣被圍覆汗出如涎為效

方 小兒禿瘡

一一錢花椒二錢脂麻二兩為
末以退猪湯洗後搽之簡便牙

齒虫痛

普濟用一一一
用一一黃丹肥皂去皮核等分研勻蜜丸塞

孔中

楠木

又作柟

辛微温

葳器曰
苦温

治霍亂吐下不止煮汁服別
錄煎湯洗

轉筋及足腫

大明

方 水腫自足起

一一桐木屑煮汁漬足並
飲少許日三為之肘後心腹脹

〔帝曰〕苦能沖熱清可收脫燒黑能止血紅見黑則止也不可燒過——側柏葉卷柏燒存性飯丸止遠年下血甚妙失血初起者未可遠用

痛未得吐下——肩三四
兩煮汁飲之 肘後

櫻櫚 又名栝櫚 〔時珍曰〕三月於木端莖中出數黃苞二中有細子成列狀如魚子謂之櫻魚亦曰

櫻櫚漸長出苞則成花穗結子如豆

皮 苦瀼平止鼻衄吐血破癥治腸風赤白痢崩中

帶下燒存性用 大主金瘡疥癬生肌止血 李珣

發明 〔宗奭曰〕——燒黑治婦人血露及吐血須佐以他藥 〔時珍曰〕櫻灰性瀼若失血去多瘀滯已

盡者用之切當所謂澀可去脫也與亂髮同用更良年久敗櫻入藥尤妙

方 血崩不止 櫻皮燒存性空心酒服三錢 血淋不 或加燒白礬 婦人良方

止 一——半燒半炒為末 小便不通 一——燒存 性以水酒服 衛生家寶

櫻櫚

四十五

好古曰入足太陰脾經血分少陰厥陰
肝經氣分鳴泉曰一一入肝經氣分最
速一婦人半身疼痛不能轉側或作肝氣
治與左金丸一服即定

二錢即通累試
甚驗 押生方

吳茱萸

集解

頌曰今處有之江淮蜀漢尤多或云顆粒
紫小經久色青綠者是一一粒大經久色

黃黑者是食茱萸恐亦不然按周處風土記云九
月九日茱萸熟氣烈色赤可折其房以挿頭云辟
惡氣又續齋諧記云汝南桓景隨費長房學道長
房曰九月九日爾家有厄宜各作絳囊盛茱萸繫
臂登高飲菊花酒此禍可消如其言舉家登高山
夕還見雞犬一時皆暴死故人至此日登高飲菊
花酒戴茱萸囊沿以為俗時珍曰一
種粒大一種粒小二者入藥為勝

辛温有小毒

權曰辛苦
大熱有毒

温中下氣止痛除濕血痺逐

風邪開腠理欬逆寒熱

本利五臟去痰冷逆氣飲食

昂曰止嘔黃連水炒治衄蓋水炒治血醋

不消心腹諸冷絞痛中惡心腹痛別錄霍亂轉筋胃冷

吐瀉腹痛產後心痛治遍身瘡痺刺痛腰脚軟弱利

大腸壅氣腸風痔疾殺三蟲甄權殺惡虫毒牙齒虫蠱

鬼魅疰氣藏器下產後飲血治腎氣脚氣水腫通關節

起陽健脾大明主痢止瀉厚腸胃肥健人孟詵治痞滿塞

胸咽膈不通潤肝燥脾好古開鬱化滯治吞酸厥陰痰

涎頭痛陰毒腹痛疔氣血痢喉舌口瘡時珍

之才曰麥實為之使惡丹麥消石白堊畏紫石英

宗奭曰凡用一一須深湯中浸去苦烈汁七次始

可焙用斲曰凡使去梗葉每十兩以鹽二兩投東流

水四斗中洗盡涎日乾用若用醋煮者每十兩用醋

昂曰——辛熱故性上氣味俱厚故善降然走氣動火昏目發瘡血虛有火者禁

用
馮皋曰——仍是降氣之品謂其性上者乃過服則積熱上冲非性上也寇氏謂下氣最速東垣謂多用損元氣誠然弟于安腹痛不過小恙一醫適與——三錢腹痛雖愈氣餒十日乃復元又曰多服久服大燥津液損陰偶用治病中肯有立地之效

希雍曰陽厥似陰手足難逆冷而口渴喜飲大小便秘小便或通亦赤澀短少此火極似水誤用殺人嘔吐吞酸屬胃火者不宜用欬逆上氣非風寒及冷痰宿水者不宜用腹痛屬血虛有火者不宜用下痢因暑邪入於腸胃而非酒食生冷停滯積垢者不宜用心氣非驟感寒邪及初發者不

所長善於開通氣分

一 鑑者三十沸入

熬乾用

發明頌曰段成式言椒氣好下茱萸氣好上言其衝

藥曰此物下氣最速腸虛人服之愈甚元素曰氣味

俱厚浮而降陽中陰也其用有三去胸中逆氣滿塞

止心腹感寒疔痛消宿酒為白豆蔻之使也杲曰濁

陰不降厥氣上逆咽膈不通食則令人口開目瞪陰

寒隔塞氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹

下利宜以——之苦熱洩其逆氣用之如神諸藥

不可代也不宜多用恐損元氣好古曰衝脉為病逆

氣裏急宜此主之震坤合見其色綠故仲——湯

當歸四逆湯方治厥陰病及溫脾胃皆用此也時珍

曰——辛熱能散寒溫中燥濕解鬱之功而已案朱氏

集驗方云中丞常子正苦痰飲每食飽或陰晴節變

率同十日一發頭痛背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不

食服藥罔效後得吳仙丹服之遂不復作每遇飲食

宜用宜亂轉筋由於暑熱而非寒濕者不
宜用一切陰虛及有熱無寒者法所感忌

過多腹滿服五七十九便已少頃小便作菜莢氣酒
飲皆隨小便而去前後痰藥甚多無及此者用
一湯泡七次茯苓等分為末煉蜜九梧子大每熟水
下五十九梅楊柳方只用一酒浸三宿以茯苓
末拌之日乾每吞百粒酒下又咽喉口舌生瘡者以
一末醋調貼兩足心移夜便愈其性雖熱而能
引熱下行亦從治之義或謂一之性上行不下
行者似不然也又治小兒痘瘡口噤嚙一
粒擦之即開亦取其辛散耳

取其辛散耳

方賊風口偏

不能語者一升薑豉三升清
酒五升和煎五沸待冷服半升日三

服得汗即瘥

吐涎頭痛

一湯用一升棗二十
枚生薑一兩人參一兩水五

升煎三升服

七合

金匱

嘔吐胸滿

同

脚氣衝心

一汁飲良孟詵

腎氣上噦

腎氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而
不能出或至數十聲上下不得喘息此由

吳茱萸

四十七

寒傷胃脘腎虛氣逆上乘於胃與氣相併難經謂之
噦素問云病深者其聲噦宜服此方如不止灸期門
關元腎俞穴用——醋炒橘皮附子去皮臍炮各
一兩為末麩為丸梧子大薑湯下六七十丸 孫氏

仁存 心腹冷痛 沸服 千金 冷氣腹痛 打爛酒一杯

調之用香油一杯入鍋煎熟入菜 脾元氣痛 發歌不
酒煎一滾服立止 唐珪經驗方

仁去皮尖研細葱白三莖煨酒浸溫服 經驗 小腸

山 奪命丹治遠年近日小腸疝氣偏墜掣痛臍下撮
痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長及陰間濕癢

成瘡用——一斤分四分四兩酒浸四兩醋浸四
兩湯浸四兩童便浸一夜同焙乾澤瀉二兩為末酒

九桐子大每服五十丸空心益 食已吞酸 胃氣虛冷
湯或酒下一名星斗丸 和劑

湯泡七次焙乾薑炮等分為末 多年脾瀉 老人多此
每服一二錢湯酒任下 聖惠 謂之水土

同化——泡過煎湯入鹽少許通口服蓋——能暖膀胱水道既清大腸自固他藥雖熱不能分解

清濁也 孫 下痢水瀉——泡炒川連炒 赤白下

氏仁存方 等分煎服 聖惠

痢 戊巳丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用——川連白芍各一兩同炒為末蒸餅丸米飲下

和 劑 赤痢腹痛——合黑豆 煎飲 千金 蛇咬毒瘡——為末作三服

冷水下立 安 勝金 風痺痒痺——溫洗立效 孟詵 頭風作痛——

根 濃煎蘸拭髮 腹中癥塊——布裹熨瘕上冷更炒熱更

互熨之瘕移走逐熨之消 乃止 姚僧坦集驗方 口瘡白疔——塗足心 咽喉作

痛 同 煎酒含漱 孟詵 陰下濕痒 煎湯洗 外臺

葉 辛苦熱治霍亂下氣止心腹痛冷氣內外腎鈞

吳茱萸 葉枝根 四八

痛鹽碾罨之神驗乾即易轉筋者同艾搗以醋和罨

大明治大寒犯腦頭痛酒拌袋盛蒸熟更互熨之痛

止為度時珍

枝治大小便卒闕格不通取南行枝如手第二指

中節含之立下出姚僧坦集驗方

根性味同葉殺三虫本經治喉痹欬逆止注瀉食不

消療白癬別錄殺牙虫止痛藏器治中惡腹中刺痛瘡漆

瘡甄權

方一寸白蟲菜莢東北陰細根大如指者四寸洗切以水酒各一升漬一夜平旦分服當取

時珍曰手足太陰肺脾命門氣分藥

下虫

千金方

肝勞生虫

眼中赤脈吳萸根為末一兩半粳米半合鳩子白三箇化蠟一兩半

和丸小豆大米湯下

三十丸當取下虫

川椒

又名蜀椒本經巴椒別錄漢椒日華南椒炮炙
論唐菽

椒紅

辛温有毒

別錄曰大熱多食令人
乏氣欲促閉口者殺人

治邪氣欬

逆温中逐骨節皮實死肌寒熱痺痛下氣久服頭不

白輕身

本經

除六腑寒冷傷寒温瘡大風汗不出心腹

留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪癥

結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺虫魚毒久服開腠理通血

脉堅齒髮明目調關節耐寒暑可作膏藥別錄治頭風

川椒

四十九

下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石水治欬嗽腹

內冷痛除齒痛漱之破癥結開胸治天行時氣產後宿

血壯陽療陰汗暖腰膝縮小便止嘔逆大利五臟下

乳汁滅癥生毛髮孟散寒除濕解鬱結消宿食通三

焦溫脾胃補右腎命門殺蛇虫止泄瀉時

之才曰杏仁為之使得盡佳畏款冬花防風附子雄黃可次水銀中其毒者凉水麻仁漿解之宗奭曰

凡用椒微炒出汗搗去裏面黃殼取紅用

發明頌曰段成式言椒氣下達餌之益下不上衝也時珍曰一一純陽之品乃手足太陰右腎命門

氣分之藥其味辛而麻其氣溫而熱稟南方之陽受西方之陰故能入肺散寒治咳嗽入脾除濕治風寒

濕痺水腫瀉痢入右腎命門補火治陽衰洩數足弱
久痢諸證一婦年七十病瀉五年百藥不效余以感
應丸五十九投之大便二日不行再以平胃散加一
一茴香棗肉為丸與服遂愈每因怒食舉發服之即
止此除濕消食溫脾補腎之驗也但一一丸雖云補
腎不分水火未免誤人大抵此方惟脾胃及命門虛
寒有濕鬱者相宜若脾胃素熱者大宜遠之故丹溪
云椒屬火有下達之能服之既久則火自水中生故
世人服椒者無不被其毒也又清訣云凡人吃飯傷
飽覺氣上衝心胸痞悶者以水吞生椒一二十粒即
散取其能通三焦引正氣下惡氣消宿食也又戴原
禮云凡人嘔吐服藥不納者必有蛭虫在腸間蛭聞
藥則動則藥出而蛭不出但於嘔吐藥中加炒一
一十粒良蓋蛭見椒則頭伏也觀此則仲景治蛭厥
烏梅丸中用一一亦此義也許叔微云凡腎氣上逆
瀕以一一引之歸經則安李廷飛曰久食令人失明

傷血
脈
川椒

方 椒紅丸 治元臟虛憊目暗耳聾服此身輕少睡足有力益智悅顏色黑鬢髮用川椒去

目及閉口者炒出汗日乾搗取紅一斤以生地熬膏和椒丸梧子大每酒下三十九合藥勿令婦人鴉犬

見**腹內虛冷** 川椒四十粒漿水浸一宿空心新汲水吞下閉口者不用久服煖臟腑進食

斗 心腹冷痛 以布裹椒安痛處用熨斗熨之令椒出汗即止 孫真人 **呃逆不止**

川椒炒研麩糊丸梧子大每服十丸醋湯下神效 卽以正經驗方 **傳尸勞瘵** 最殺勞

川椒去子及閉口者以紙隔之炒出汗取放地上以砂盆蓋之以火炭密圍四旁約一時許為細末去內

殼以老酒浸白糕和丸梧子大每服四十九服至一斤其疾自愈此藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛茴

香湯下 **陳 寒濕脚氣** 以布袋盛椒踏脚 **諸瘡受風** 川

三曰方 大全良方 一升濕麩裹之勿令透氣作兩裹於塘火灰中燒熟刺頭作孔對瘡熏之令椒氣射入瘡中冷即易瀕吹

瘡中出水及身出冷
汗即愈 獨行方
夏月濕瀉 川椒炒取紅肉豆蔻
煨各一兩為末粳米

飯丸小丸 及火荊川椒一兩蒼朮二兩炒
量人與服 殮瀉不化 研醋丸每米飲服五十丸 普

濟 洩瀉不愈 川椒二兩醋二升煮醋盡慢火
焙研甕器收每米飲下二錢 風虫牙

痛 川椒四錢牙皂七箇 小兒暴驚 啼哭絕死川椒左
醋煎漱之 總錄 顧牡蠣各六銖以

酢漿水一升煮五合 蝎螫 川椒嚼塗之微麻 腎囊風
每灌一合 千金方 即止 杏林摘要

痒 川椒杏仁研膏塗手心合
陰囊而卧甚效 直指

椒目苦寒 權曰 治水腹脹滿利小便 蘇
苦辛 治十二種水 蘇

氣及腎虛耳卒鳴聾膀胱急 甄 止氣欬 丹
權 溪

發明 權曰 椒氣下達故椒目能治腎虛耳鳴用巴豆
菖蒲同碾細以松脂黃蠟溶和為提納耳中抽

川椒 椒目 葉 五十一

之治腎虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒聾者
一日一易神驗宗奭曰椒目治盜汗有功將目微炒
碾細用半錢以生猪上唇煎湯一合時時調服無不
效蓋椒目能行水又治水蠱也丹溪曰諸嗽不止用
椒炒研二錢白湯調服二三服以止劫之後乃隨痰
火用藥李時珍曰椒目性下達能行滲道不行殺道
所以能下水燥
濕定嗽消蠱也

方 水氣腫滿

椒目炒研細酒服
方寸匕 千金

留飲腹痛

椒目二兩巴豆

一兩去心皮熬搗棗肉和丸麻子大
每服二丸吞下其痛即止 肘後

痔漏腫痛

椒目
研細

空心水服三錢

崩中帶下

椒目炒研溫酒
服 金匱鈞元

眼生黑花

如神 海上方

年久不可治者椒目炒一兩蒼朮炒一兩為末
醋糊丸梧子大每服二十九醋湯下 本事方

葉 辛熱治奔豚伏梁氣及內外腎釣并霍亂轉筋

鳴皋曰——辛入肺溫暖胃肺胃藥也

和艾及葱碾以醋拌罨之大明殺虫洗脚氣及漆瘡時珍

胡椒 辛大溫下氣溫中去痰除臟腑中風冷唐本去

胃中虛冷氣宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上

衝李珣調五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚鱉蕈毒大明去

胃寒吐水大腸寒滑宗爽暖腸胃除寒濕反胃虛脹冷

積陰毒牙齦浮熱作痛時珍

發明宗爽曰——去胃中寒痰治食已則吐水甚效
大腸寒滑亦可用須以他藥佐之過劑則走氣

也丹溪曰——性燥食之快膈積久則脾胃肺氣大
傷凡病氣疾人益大其禍也牙痛必用——華荬者

散其浮熱也時珍曰——大辛熱之物腸胃寒濕者
宜之有熱人食之動火傷氣陰受其害時珍自火嗜

胡椒

五十二

張從正儒門事親云壹膈之病或因酒或因氣或因胃火醫者不察火裏燒薑湯中煮桂丁香未已豆蔻繼之華荈未已繼之難日和胃本不寒難曰補胃本不虛况三陽既結食必上潮只宜湯丸小潤之可也時珍云此說亦是然亦有食入反出無火之症又有痰氣鬱結得辛熱則開之症不可執一也

馮奉曰壹膈因酒因氣者多陰火與實火熬乾胃液食入滯滯不下復反吐出再用辛熱藥不更枯胃汗乎張氏之說是也至李時珍云無火之症乃胃寒反謂與壹膈兩症臨症者審之

之歲病目後痛絕之目病遂止纔食一二粒便發近醫每與綠豆同用治病有效蓋一寒一熱陰陽配合得宜且豆能制椒毒也

珣曰多食損肺令人吐血

方心下大痛 薑湯女用當歸酒下。又方一綠

豆各四十九粒研爛 霍亂吐利 一四十九粒綠豆酒下神效 壽域 一百四十九粒研勻

木瓜煎湯下一反胃吐食 戴元禮用一醋浸日乾錢 直指方 如此七次為末酒丸桐子

大每服三四十九醋湯下。百一方用一。半 夏湯泡等分為末薑汁糊丸薑湯下三十丸 赤白

下痢 一綠豆等分 大小便閉 關格不通脹悶二三為丸服 集簡 日則殺人 一二十

一粒打碎水一盞煎六分入 小兒虛脹 塌氣丸 一

芒消半兩煎化服 總錄 一兩蝎尾半 兩為末麩糊丸粟米大每服五七丸 風虫牙痛 衛生 米飲下一加萊蕪子半兩 錢乙 易簡

厚加陀
四河加
陀九雁
足記厚
為阿

方一華菱等分為末蠟丸塞蛀孔中口醫通治風

虫容寒三般牙疼呻吟不已用一一九粒綠豆十一

粒研末以絲綿裹一粒沙石淋痛一一朴硝等分為

咬患處涎出吐去立愈末每服二錢白湯

下名三拗婦人血崩阿伽陀丸用一一柴檀香鬱金

散普濟苗根黃藥皮等分為末水丸梧

子大每服二十

九阿膠湯下

碧澄茄又名畢澄茄開寶毗陵茄子時珍曰與胡椒

一類

二種

實辛溫苦溫下氣消食去皮膚間風心腹間氣脹

令人能食療鬼氣治一切冷氣痰癖并霍亂吐瀉

肚腹痛腎氣膀胱冷大暖脾胃止嘔吐噦逆時

胡椒 珀石澄茄 茶

好古曰入手足厥陰經心腎

方 噎食不納 白豆蔻等分為末乾砥之 反胃 吐出黑

愈者 為末米糊九梧子大每服三四 傷寒呃

十九蕃湯下愈後服平胃散 永類鈐方

逆 日夜不定用 高良薑等分為末每服二

錢水六分煎十沸入醋少許服之 燕頌圖經

茶 又名茗 檟 頌曰 郭璞云早米為茶

晚采為茗一名薈蜀人謂之苦採陸羽云其各有

五一茶二檟三 護四茗五薈

苦甘微寒治痿瘡利小便去痰熱止渴令人少睡悅

志 神農 下氣消食作飲加茱萸葱薑良 破熱氣除

瘴氣利大小腸 清頭目治中風昏憤多睡不醒

治傷暑合醋治泄痢甚效 陳 炒煎飲治熱毒赤白痢

同川芎葱白煎飲止頭痛

吳瑞

濃煎吐風熱痰涎

時珍

時珍曰服威靈仙

土茯苓者忌飲茶

發明

好古曰一氣寒味苦入手足厥陰經治陰症湯藥內入此去格拒之陰及治伏陽大意相似經

云苦以泄之其俸下行所以能清頭目機曰頭目不

清熱上薰也苦泄其熱則上清矣一采摘之時茅藥

初萌得春升之氣味雖苦而氣則薄陰中之陽可升

可降所以能清頭目楊士瀛曰薑一治痢薑助陽

助陰並能消暑解酒食毒且一寒一熱調平陰陽

不問赤白冷熱用之皆良真一生薑等分濃煎服

方 氣虛頭痛

用上春一末調成膏置瓦蓋內覆轉以巴豆四十九粒燒烟作二次熏之

晒乾乳細每服一字別以好茶末食後煎服立效

醫方大成熱毒下痢臘一末以白梅肉和

凡赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下各百丸一方建

和醋煎服即止。經驗良方用蠟茶二錢湯點入

茶 蘇木

五十四

寫皋曰——辛涼入血分自係心肝二經

種方國

麻油一規殼和服須臾腹痛大便下血榮衛氣虛或受風邪或飲

食過度熱積腸間下利清血臍腹作痛裏急後重並治之用細一半斤研末川百藥煎五箇燒存性每服

二錢半飲下日產後秘寒以葱涎調臘一末九百丸茶服自通 郭氏婦人方

年久心痛煎湖一以頭醋和勻痘瘡作癢房中宜燒服之 兵部手集 烟熏之

月水不通清一瓶入沙糖少許露一宿服之痰欬雖三月胎亦通不可輕視 鮑氏

效嗽不能睡卧好一末一兩白僵蚕一兩為末放盞內蓋定傾沸湯一小盞卧時再添湯點服 瑞

竹堂

蘓木又名蘓方木 唐本

甘鹹平果曰甘鹹涼好古破血治產後血脹悶欲死曰甘微酸辛性平

鴉舉曰此吐法其妙蓋乳香最能引吐又能去血中之風一破血又能去血中之風也一一能止嘔逆者熱結血分只理氣分無效故以一一通血分甚有理
鴉舉曰產後有邪熱不得用芎歸等溫藥一一最佳以其辛涼而行血也

者水煮五兩取濃汁服唐本婦人血氣心腹痛月候不

調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血

噤赤白痢并後重急痛大虛勞血癖氣壅滯產後惡

露不行心腹攪痛及經絡不通男女中風口噤不語

並宜細研乳香末方寸匕以酒煎蘓木調服立吐惡

物瘥海霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服藏器破瘡瘍

死血產後敗血李常曰忌鐵

發明元素曰一一性涼味微辛發散表裏風氣宜與防風同用又能破死血產後血脹腫滿欲死者

宜之時珍曰一一乃三陰經血分藥少用則和血多用則破血

蘓木 沉香

五十五

鴉鼻曰氣歇一方理具神妙產後必虛人
 參為要藥又恐參補住瘀血濃一一補
 氣虛一行血滯且肺居至高之分血藥所
 不能達惟水能達之以參引一一入肺故
 神效也凡產後有熱不能不行氣虛不能
 不補又脈數有熱難用芎歸之辛溫上升
 者此方俱可參用

方 產後血運 煎取二升分服 產後氣歇 面黑欲死乃血

入肺也用一一二兩水兩碗煮一椀入人參末 破傷
 一兩調服隨時加減神效不可言 胡氏方

風 效名獨聖散 普濟 脚氣腫痛 分細判入定粉

少許水煮熏 偏墜腫痛 頻飲立效 集簡 金瘡接

指 以凡刀斧傷及指斷者一一末敷之外 撮生方

沈香 又名沉水香 綱目 蜜香

集解 恭曰一一青桂雞骨馬蹄煎香同是一樹出 天竺諸國藏器曰一一枝葉並似椿其枝節

不朽沉者為沉香其肌理有黑脈浮者為煎香鴉 骨馬蹄並是煎香並無別功止可熏衣頌曰一一

青桂等香出南海諸國及交廣崖州沈懷遠南越 志云交廣蜜香樹彼人取之先斷其積年老木根

經年其外皮幹皆朽爛木心與枝節不朽堅黑沉水者即一也半沉半浮與水面平者為鴉骨香細枝繁實不爛者為青桂香其幹為撲香其根為黃熟香其根節輕而大者為馬蹄香六物同是一樹有精粗之異耳又丁謂天香傳云海北竇化高雷皆出香之地止海南者優劣不侔既所學不同復售者多而取者速其香不待稍成乃趨利賊伐之深也非同瑤管黎人非時不妄伐故木無天札必得異香焉宗奭曰嶺南諸郡悉有傍海處尤多交幹連枝岡嶺相接十里不絕葉如冬青大者數抱木性虛柔山民以楫茅廬為桶梁為飯甑有香者百無一二蓋香得水方結多在折枝枯幹中或為沉或為煎或為黃熟自枯死者謂之水盪香南息高竇等惟產生結香蓋山民入山以刀斫曲幹斜枝成坎經年得兩水浸漬遂結成香乃鋸取之其香結為斑點名鷓鴣斑燻之極清烈香之良者惟任瓊崖等州俗謂之角沉黃乃枯木得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中年

沉香

五十六

〔京〕曰諸木皆浮——獨沉故能下氣而降
痰氣香故能理諸氣而調中色黑體陽故
入命門暖精助陽行氣而不傷氣溫中而
不助火其性能降又能升東垣云上至天
下至泉用為使最相宜

久不待剗剔而成薄片者謂之龍鱗削之

自捲咀之柔韌者謂之白蠟沉尤難得

辛微溫

〔珣〕曰苦溫〔大明〕曰辛熱時珍曰咀爵香甜者性平辛辣者性熱

治風水毒腫

去惡氣

〔別錄〕

主心腹疼痛霍亂中惡邪鬼疰氣清人神並

宜酒煮服諸瘡腫宜入膏中

〔李〕

調中補五臟益精壯

陽暖腰膝止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風痲痺骨節

不任風濕皮膚瘙癢氣利

〔大明〕

補右腎命門

〔元〕

補脾胃

治痰涎血出於脾

〔李〕

益氣和神

〔完〕

治上熱下寒氣逆

喘急大腸虛閉小便氣淋男子精冷

〔時珍〕

〔甄〕曰凡使——不枯如甯甯沉水者為上半沉者次
之不可見火時珍曰入丸散磨粉用煎劑磨汁臨時

胃大腸經
元素曰入于大陰肺足少陰腎通行陽明

之入

方 胃冷久呃

紫蕪白豆蔻各一錢為末
枳蒂湯下五七分 活人心統 心神

轉肥治
其氣是
亦一法

不足 火不降水不升健忘驚悸
用朱雀丸方見茯神

胞轉不通

非小腸膀胱 厥陰受病乃

強忍房事過忍小便所致當治其氣則愈非利藥所能通也
木香各二錢為末白湯空心服 醫壘

元 大腸虛閉

因汗多津液耗涸者
一兩肉苁蓉 酒洗二兩各研末以麻仁研汁糊丸梧

桐子大蜜湯下
百九 濟生方

檀香

一名旃檀 細目真檀

辛溫

大明曰熱

消風熱腫毒

弘景

治中惡鬼氣殺虫

藏器

煎服

止心腹痛霍亂腎氣痛水磨塗外腎并腰腎痛處

大明

沉香 檀香 紫檀

五十七

散冷氣引胃氣上升進飲食元治噎膈吐食又面生

黑子每夜以漿水洗拭令赤磨汁塗之甚良時珍

發明

果曰——調氣引芳香之物上至極高之分最宜橙橘之屬佐以薑棗輔以葛根縮砂益智豆

蔻通行陽明之經在胸膈之上處咽喉之間為理氣

要藥時珍曰白檀塗身能除一切熱惱杜室大業錄

云清有壽禪師妙醫術作五香飲濟人沈香飲——

飲丁香飲澤蘭飲甘松飲皆以香為主更加別藥有

味而止渴兼

補益人也

紫檀

賦微寒摩塗惡毒風毒別錄刮末傳金瘡止血

止痛治淋

弘景醋磨傳一切卒腫大明

發明

時珍曰白檀香辛溫氣分之藥也故能理衛氣調脾肺利胸膈——賦寒血分之藥故能和營

氣消腫毒

而治金瘡

降香

又名紫藤香 綱目 雞骨香

集解

珣曰生南海山中及大秦國其木似蕪方木
燒之初不甚香得諸香和之則特美入藥以

番降紫而潤者良時珍曰今廣滇漢中

湖南安南占城暹羅琉球諸番皆有之

辛溫燒之辟天行時氣宅舍怪異小兒帶之辟邪惡

氣

李時珍曰折傷金瘡止血定痛消腫生肌

時珍

發明

時珍曰降香唐宋本草失收唐慎微始增入而
不著其功用今折傷金瘡家多用其節云可代

鴉梟極葉天士治吐血多用降香末以止
之蓋金瘡出血者外之皮內傷故血外溢
也吐血者內之脉絡傷故血內溢也降香
既可止血外溢則用以止內溢之血亦同
此理

設藥血竭按名醫別錄云周岳被盜刃傷血出不止
筋如斷骨如折用花蕊石散不效軍士李高用紫金
散掩之血止痛定明日結痂如鐵遂愈且無癩叩其
方乃用紫藤香瓷瓦刮下研末紫藤香即降香最佳
降香 丁香

五十八

經
性好古曰入手太陰肺足少陰腎陽明

者曾救萬人羅天益
亦取此方云甚效

方

金瘡血出

一五倍子銅花等分
為末傳之 醫林集要

丁香

又名丁香香 嘉祐雞舌香 時珍曰雄為丁香
雌為瑪舌

集解

珣曰一一生東海及崑崙國實小者為丁香
大者如巴豆為母丁香志曰一一生交廣南

苗按廣州圖上一樹高丈餘木類桂葉似櫟葉

花圓細黃角凌冬不凋其子出枝蕊上如釘長三

四分紫色其中有粗大如山茱萸者俗呼為母一

一二月采或云盛冬生花子至次年春采之

辛溫

時珍曰
辛熱

溫脾胃止霍亂攤服風毒諸腫齒疔蟲

能發諸香

開風蠶骨槽風口臭殺勞虫辟惡治奶頭

花止五色毒痢五痔

李珣治口氣冷氣冷勞反胃鬼疰

蠱毒殺酒毒消疰癰療腎氣奔豚氣陰痛腹痛壯陽

暖腰膝大療嘔逆保甚效昇去胃寒理元氣血盛者

勿服元治虛噦小兒吐瀉痘瘡胃虛灰白不食時

穀曰雌者力大若用雄者須去丁蓋

乳子發人背癩也不可見火畏鬱金

雞舌香即母辛微温時珍曰治風水毒腫霍亂心痛

去惡熱別吹鼻殺腦疔甄同薑汁塗拔去白鬚孔中

即生黑者甚效藏喜忌同丁香

發明好古曰丁香與五味子廣茂同用治本脈之氣

亦能泄肺能補胃大能療腎宗奭曰丁香治口

氣治脾胃冷氣不和甚良母丁香氣味尤佳震亨曰

口居上地氣出焉脾有鬱火溢入肺中失其清和之

丁香雞舌香

五十九

昂曰乾症忌用

意而濁氣上行發為口氣若以丁香治之是揚湯止沸也惟香薷治之最捷時珍曰宋太醫陳文中治小兒痘瘡不光澤不起發或脹或瀉或渴或氣促表裏俱虛之症並用木香散異功散倍加丁香官桂甚者丁香三五十枚官桂一二錢亦有服之而愈者此丹溪所謂立方之時必運氣在寒水司天之際又值嚴冬鬱遏陽氣故用大辛熱之劑發之者也不分氣血虛實寒熱經絡一槩用之殺人必矣抱朴子云凡百病在目以鴉舌香川連乳汁煎注之皆愈此得辛散苦降之妙

方 暴心氣痛

鴉舌香末酒下一錢 肘後

乾霍亂病

不吐不下 丁香十四

枚為末沸湯一升和之 頰服不瘥再作 千金

小兒吐瀉

丁香橘紅等分蜜丸黃豆大米湯化

下 劉 **小兒嘔吐**

不止丁香生半夏各一錢薑汁浸一夜晒乾為末薑汁打麩糊丸黍

氏小兒

小兒嘔吐

面黃腹大食即吐者丁香七

米大量用

小兒冷疝

枚為末乳汁和蒸三次薑湯

見全幼心鑑

小兒冷疝

枚為末乳汁和蒸三次薑湯

下 胃冷嘔逆 氣厥不通 母丁香三箇 陳皮一
易簡 塊去白水煎熱服 十便良方 反胃

吐食 母丁香一兩為末 鹽梅肉搗和 反胃關格 不通
九芡子大每含一丸 袖珍方

丁香木香各一兩 每服四錢 水一盞 半煎一盞 先以

黃泥做成盞 瀘汁於內 食前服此方 甚效 土盞取其

助脾也 德 傷寒呃逆 及噎逆不止 丁香一兩 乾柿

生堂經驗方 帶焙為末 每服一錢 煎人參

湯下 簡 毒腫入腹 鴉舌香青木香 薑陸香 麝香各

要濟眾方 一兩水四升 煮二升 分二服

時 婦人產難 母丁香三十六粒 乳香三錢 六分為末

後 同活兔腦和搗 干下丸作三十六丸 每

好酒化下一丸 名如意丹 乳頭破裂 丁香為末 敷

立驗 順真堂經驗方 之 梅師 妬

乳痛 丁香末水服方 癰疽惡肉 丁香末 傅外以膏

寸匕 同上 藥護之 見怪症

奇方

丁香 藥古香 乳香

實曰善窺入乎少陰心經曰能通十二經

泉曰——沒藥治婦人血氣痛果有奇效

昂曰亦治癩狂以能去風散癩也靈苑
沙散辰砂一两乳香棗仁各五錢酒下送

乳香 又名薰陸香 別錄馬尾香 海藥天澤香 內典摩
勒香 綱目 宗奩曰——即薰陸垂滴如乳頭

者鎔塌在地者
為塌香皆一也

集解

恭曰薰陸香形似白膠香出天竺者色白出
單于者夾綠色香亦不甚 承曰西出天竺南

出波斯等國西者色黃白南者色紫赤 時珍

曰——今人多以楓香雜之惟燒之可辨

微温無毒

大明曰辛熱微毒 元素曰苦辛

主風水毒腫去惡氣伏尸

癰疹瘡毒 別錄

治耳聾中風口噤不語婦人血氣止大

腸洩瀉瘵諸瘡令內消能發酒理風冷

藏器下氣益精

補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎

膏止痛長肉

大明治不眠

補腎定諸經之痛 元素仙方

飲酒醉飽睡一二日勿動驚醒驚醒則不可治本方加人參一兩名寧志骨

用以辟穀李消癰疽諸毒托裏護心活血定痛伸筋

治婦人產難折傷時珍

發明時珍曰一一之竅能入心經活血定痛故為癰疽瘡瘍心腹痛要藥素簡云諸瘡痛癢皆屬心

火是矣產科諸方多用之亦取其活血之功耳陳自明婦人良方云施少卿得神寢丸方云婦人臨產月

服之令胎滑易生極有效驗用通明一一半兩枳殼一兩為末煉蜜丸梧子大空心酒服三十九李嗣立

治癰疽初起內托護心散云香徹瘡孔中能使毒氣外出不出內攻也方見下按抱朴子云南海浮炎洲出

薰陸香結掘啖之此獸所刺不死以杖打之皮不傷而骨碎乃死現此則一一之治折傷雖能活血止痛

亦性然也楊清叟曰凡人筋不伸者敷藥宜加用之其性能伸筋頌曰一一性粘唯碾以繒袋掛於窠

隙間良久取研乃不粘大明曰入丸散微炒殺毒則不粘時珍曰或言以灯心同研則易細或言以糯米

乳香

六十一

子接曰得真茶鹿血治心疼痛

數粒同研或言以人指甲數片同研或言以乳鉢坐熱水中研皆易細外丹本草云一一以韭實葱蒜煨

伏成汁最柔五金丹

房鑑源云一一啞銅

方 口眼喎斜

一一燒烟熏之以順其血脉 證治要訣

祛風益顏

二斤

白蜜三斤甕器合煎如錫

急慢驚風

一一半兩廿遂 半兩同研末每

服半錢一一湯下童便

小兒內釣

腹痛用一一浸藥 亦可 王氏博濟方 木香等分水煎服

阮氏 產難催生

簡要濟眾方用黃明一一五錢母 猪血和九梧子大酒下五九〇海

上方用一一硃砂等分為末入

骨鯁

一一一錢研服 射香少許酒服一錢良久自下 衛生月筋方

出牙

痛不可忍者梅師用一一嚼燕汁立瘥 〇聖惠用一一枯礬等分蠟丸鑿之

痘斑不

快

一一研細猪心血和九芡子大每以 溫水化服一丸 聞人規痘疹論

瘡疽寒戰

昂曰入十二經鳴皋曰好古云補心胆虛
肝血不足是亦足少陽手少陰足厥陰主藥也

半熟水研服戰發於脾

一入脾故也直指

內托護心散

凡瘡症一日至三日宜連

進十餘服方免變症使毒氣外出服之稍遲毒內攻
漸生嘔吐或鼻生瘡菌不食即危矣四五日後亦宜
間服用真綠豆粉一兩一兩半兩燈心同研和勻以

生甘草湯濃煎調下一錢時呷之若毒已衝心有
嘔吐之症大宜服此服至一兩則香

徹瘡孔真神藥也李嗣立外科方

沒藥又名木藥

集解

志曰一一生波斯國其塊大小不定黑色似
安息香頌曰今南海諸國及廣州或有之木

之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有脂液

流滴在地下凝結成塊或大或小類安息香

苦平破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目

中翳暈疼痛膏亦開寶破癥瘕宿血損傷瘀血消腫痛

沒藥

六十二

希雅曰同延胡乳香乾漆鱉甲琥珀為末
治產後血暈有神效 加參澤蘭生地黃
母穗木作湯送前藥治兒枕痛及惡露未
盡腹痛寒熱等症立效 同乳香白及白
欵紫花地丁夏枯草忍冬連翹甘菊貝母
治一切瘰癧疔腫 同乳香當歸牡丹皮
牛膝川斷川芎降香山甲治內傷胸臆骨
痛
又曰孕婦不宜服凡骨節與胸膈腹痛非
瘀血停留而因於虛者不宜用產後惡露
多腹中虛痛者不宜用瘡已潰不宜用
寫真曰一婦人殞胎不下腹痛不止病甚
因與乳香末藥痛止胎下或有因虛痛者
亦不妨與補劑兼用

大心胆虛肝血不足好古隋胎及產後心腹血氣痛並

入丸散服 李珣散血定痛生肌時珍 修治同乳香

發明 權曰凡金刀所傷打折跌墜傷筋骨疼痛心
腹血瘀者並宜爛研熱酒調服推陳致新能生

好血宗奭曰一大概通滯血滯則氣壅瘀氣壅

瘀則經絡滿急經絡滿急故痛且腫凡打撲跌跌皆
傷經絡氣血不行瘀壅作腫痛也時珍曰乳香活血

散血皆能止痛消腫生肌故二藥每相兼而用

方 歷節諸風 骨節疼痛晝夜不止一末半兩虎
脛骨酥炙為末三兩每服二錢溫酒

調服 圖 筋骨損傷 米粉四兩炒黃入一乳香各
經本草方 半兩為末調成膏貼 御藥院

方 金刀傷 未透膜者乳香一各一錢以
童便酒溫化服 奇效良方 小兒盤腸

氣痛乳香一一分為末木香磨水 婦人腹痛內傷
煎沸調下一錢立瘥 嬰兒寶鑑 痰刺

煎沸調下一錢立瘥 嬰兒寶鑑 婦人腹痛內傷
痰刺

末一錢酒服
婦人血運
方同上
血氣心痛
末

立止
圖經本草
血竭末各一錢童便温

半酒半煎服
產後惡血
酒各半煎服良久再服惡血

醫林集要
自下痛便止
女人異疾
女人月事退出昏作禽獸形

婦人良方
頓服
一末一兩白

湯調下
危氏方

蘓合香

集解
恭曰今出西域及崑崙紫赤色與紫真檀相

似堅實極芳香性重如石燒之灰白者好頌

曰今廣州雖有
但類蘓木無香氣藥中只

用如膏油者極芬烈梁書云中天竺國出

是諸香汁煎成非自然一物也又云大秦國人采

得
先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸國

賈人是以展轉來達中國者不大香也然則廣南

貨者其經煎煮之餘乎今用如膏油者乃合治成

沒藥
蘓合香

六三

昂曰以筋挑起懸絲不斷者真

者耳時珍曰寰宇志云蘓合油出安南三佛齊諸國樹生膏可為藥以濃而無滓者為上劉夢得傳信方言一一一多薄葉子如金色按之即少放之即起良久不定如蟲動氣烈者佳如此則全非今所用者宜精攷之

甘温辟惡殺鬼精物温瘡蠱毒爛瘻去三蟲除邪令

人無夢魘別錄

發明時珍曰能通諸竅臟腑故其功能辟一切不正之氣沈括筆談云太尉王文正公氣羸

多病宋真宗面賜藥酒一瓶令空腹飲之可以氣血辟外邪公飲之大覺安健次日稱謝上曰此

酒也每酒一斗入一一一丸一兩同煮極能調和五臟却腹中諸疾每胃寒風興最宜飲一杯此方遂

盛行於時千金外臺謂治疾有殊效

方 蕙合香丸

治傳尸骨蒸肺痿症忤鬼氣卒心痛
霍亂吐利時氣鬼魅瘡瘻赤白痢瘵

血月閉瘵癰丁腫小兒驚癇客忤大人中風中氣狐
狸等病用——油一兩安息香末二兩好酒熬成
膏入蕙合油內白木香附青木香白檀香沈香丁香
麝香華芫訶子肉煨朱砂犀角屑各二兩龍腦薰陸
香各一兩為末以香膏和鍊蜜為丸蠟皮果叔每服
旋丸梧子大早起化服四九老人小兒一九并葦水
溫水俱可 水氣浮腫 一——白粉水銀等分搗勻蜜
下和劑 丸小豆大每服二九當下水出

後方 肘

楓脂香

又名白膠香

集解

菴曰——所在大山中皆有頌曰今南方

及關陝甚多樹甚高大似白楊葉圓而作歧
有三角而香二月開花白色著實大如鴨卵八九
月熟時暴乾可燒其脂為白膠香說文解字云楓

蕙合香

楓脂香

字四

木漢宮殿中多植之霜後葉丹可愛故稱楓宸任
 昉述異記云南中有栴子鬼木之老者為人形亦
 呼為靈楓蓋癭瘤也至今越巫有得之者以雕刻
 鬼神可致靈異保昇曰王瓘軒轅本紀云黃帝殺
 蚩尤於黎山擲其械於大荒之中化為楓木之林
 爾雅註云其脂入地千年化為琥珀時珍曰孫炎
 爾雅正義云栴子鬼乃攝木上寄生枝高三四尺
 天旱以泥塗之即雨也荀伯子臨川記云嶺南楓
 木歲久生瘤如人形遇暴雨大雨則暗長三五尺
 謂之楓人宋齊邱化書云老楓化為羽人數說不
 同大抵癭瘤之
 說猶有理也

辛苦平治癭疹風癢浮腫煮水浴之又主齒痛唐一木

切癩疽瘡疥金瘡吐血咯血活血生肌止痛解毒燒

過搯牙永無牙疾

時珍

時珍曰凡用以蠶水煮二十沸
入冷水中揉扯數十次晒乾用

發明 震亨曰其性疎通故木易有虫穴外科要藥近
世不知誤以松脂之清瑩者為之甚謬宗奭曰

楓香松香皆可亂乳香但楓香微白黃色燒之可見
真偽時珍曰楓香松香其功雖次於乳香亦仿佛相
近

方 吐血不止 一 一 為散每服二錢
新汲水下 簡要濟眾 吐衄 蛤粉等

分為末薑汁調 服 百一選方 吐血咯血 一 一 灸黃一兩新綿一
兩燒灰為末每服一錢米

飲下 聖惠方 金瘡斷筋 一 一 傳之 瘰癧軟癰 一 一 一
危氏方 兩化開以

蓖麻子六十四粒研入成 膏攤貼 儒門事親方 諸瘡不合 一 一 輕粉等
分猪油和塗

直 惡瘡疼痛 一 一 臘粉等分為末漿 小兒疥癬 一
指 水洗淨貼之 養老書

楓脂香 冰片 辛五

鳴皋曰：一香竄無所不入，古方之入心經東垣言入骨治骨痛則又腎經藥也。

一黃柏輕粉等分研末羊骨髓和搽 儒門事親

水片

又名龍腦香 唐本片腦 綱目 羯婆羅香 衍義 婆律香 恭曰：龍腦是樹根中乾脂 婆律香是根

中清脂舊出

婆律國故名

集解

恭曰：龍腦香出婆律國，樹形似杉木，腦形似白松香，明淨者善。頌曰：今惟南海番禺舶貨之

南海山中亦有之。今南海多用火逼成片，其中雜偽入藥，惟貴生者狀若梅花片者佳。時珍曰：相感志言以杉木炭養之，瓷器中則不耗。今人多以樟腦升打亂之，不可不辨。

辛苦微寒

珣曰

治婦人產難，研少許新汲水服，立下。

別錄

心腹邪氣，風濕積耳聾，明目去赤，膚醫內外障。

眼鎮心秘精治三虫五痔

李珣

散心盛有熱

好古

入骨治

希雅曰：一性善竄無性不入芳香之氣能辟一切邪惡辛溫之性能散一切風濕故主心腹邪氣及風濕積聚也

又曰：凡中風非外來之風邪乃因氣血虛

者忌之小兒急驚屬實熱可用慢驚屬虛

寒切不可服目疾屬肝腎虛者切不可照

本實曰用此宜少而暫多則走洩真氣大

能損人

昂曰余幼時問叔建侯公曰薑性何如叔

曰體熱而用涼蓋味辛多然風熱必藉辛

以散之風熱散則涼矣此即本草所云水

性涼之義

寫泉曰東垣謂風在骨髓及引風入骨髓

之說似不盡然風之所傷不過氣血經絡

皮肉筋骨而已何以即入髓乎然往有

服膠射而致患者然惡而知其故凡人之

中風非如中風寒之風也皆痰火為患耳

火升則痰湧火動則風生乃自生之風也

蓋中風之人必有一二經虛極于是痰火

因虛而入遂至壅塞而成偏癱遽用腦射

骨痛 李 治脫肛 元 療喉痺腦痛鼻瘻齒痛傷寒舌出

小兒痘陷通諸竅散鬱火 時 珍

發明 宗真曰此物大通利關隔熱塞大人小兒風涎

行則勢弱佐使則有功萬物中香無出其右者震亨

曰龍腦屬火世知其寒而通利然未達其熱而輕浮

飛越喜其香而貴細動輒與麝同為桂附之助然人

之陽易動陰易虧不可不思昂曰龍腦入骨風病在

骨髓者宜之若風在血脉肌肉輒用腦射反引風入

骨髓如油入麩莫之能出也王綸曰龍腦大辛善走

故能散熱通利結氣目痛喉痺下疳諸方多用之者

取其辛散也人欲死者吞之為氣散盡也世人誤以

為寒不知其辛散之性似乎寒耳豈有香之至者而

反寒乎時珍曰古方眼科小兒科皆言龍腦辛涼能

入心經故治目病驚風方多用之痘瘡心熱血瘀倒

鷹者用引猪血直入心竅使毒氣宣散於外則血活

以散之通之壅塞輕亦或通散而愈壅塞
重者通散不動反致竄烈之性衝入不壅
塞之經而別經受傷矣別經俱受傷則經
氣難復而此壅塞之經愈不能動遂成痼
疾此東垣所以有引風入髓之說也他如
真中風類中風之強分雖古大家亦不無
誤說足見此事難知矣惟喻氏嘉言葉氏
天士謂自生之風不可驅宜有以熄之所
見獨起千古今葉醫者能以中風二字
泥諸胸中斯可耳

又曰嘗見一人暑月于金山寺閣上當風
而卧醒後抽搦幾發服風藥數月始愈此
等乃可謂之中風

又曰一一通經絡去壅塞亦中風痰之要
藥惟在能審病體之輕重酌藥力之大小
善為配合亦建殊功倘執前議而不敢用
使良藥見弃亦固矣

痘發其說皆似是而實未當也目病驚病痘驚皆火
病也火鬱則發之從治之法辛主發散故耳其氣先
入肺傳於心脾能走能散使壅塞通利則經絡條達
而驚熱自平瘡毒能出用猪心血能引龍腦入心經
非龍腦能入心也沈存中良方云痘瘡周家盛則變
黑者用生猪血一椀白斗龍腦半分温酒和服潘氏
云一女病發熱腰痛手足厥逆日加昏悶形症極惡
疑是痘症時暑月急取屠家敗血倍用龍腦和服得
睡頃刻一身瘡出而安若非此方則橫夭矣又宋文
天祥賈似道皆服腦子求死不得惟廖瑩中以熟酒
服數握九竅流血而死此非腦子有毒乃熟
酒引其辛者散溢經絡氣血拂亂而然耳

方 目赤生膜 一 雄雀屎各八分為末人乳
調勻日點之無不驗 聖惠 頭腦

疼痛 一 一錢捲紙燒烟熏鼻
吐出血涎即愈 壽域方 瘧肉 點之自入 傷寒
集簡

舌出 過寸者 一 半分為末 中風口噤 無門下藥
之隨手即愈 夷堅志 者用開闔

解珍曰——手足厥陰藥心包肝

散端午日午時用——南星等分為末
每以一字措牙二三十遍其口自開
痘瘡狂躁心煩

氣歇妄語或見鬼神其瘡色赤未透者經驗方用
一錢研細以猪心血和丸芡子大紫草湯下一丸
少時心神定得睡瘡發○摠微論用積猪第二番血

清半盞酒半盞和勻入——一分溫服良久利下瘡
血一二行痘即紅活此治黑癩
惡候醫所不治者百發百中
婦人產難方見
痔瘡

一——二分葱涎化
搽之 見簡便方
夢漏口瘡 經絡中火邪夢漏恍
惚口瘡咽燥——三
錢黃柏三兩為末蜜丸梧子
大每麥冬湯下十九 摘元

血竭 又名麒麟竭 唐本

集解 蜀曰南越志云麒麟竭是紫釰樹之脂也欲
驗真偽但嚼之不爛如蠟者為上 頌曰今南

番諸國及廣州皆出之木高數丈婆娑可愛葉似
櫻桃而有三角其脂液從木中流出如膠飴久凝

冰片 血竭

六十七

希雍曰甘主補鹹主消乃散瘀血生新血之要藥

又曰此藥難得真者理折傷有奪命之功
又曰同乳香沒藥自然銅麻皮灰狗頭骨
煨存性麝虫骨碎補治一切打撲傷損
同血餘皮乳香沒藥冰片麝粉象牙末紅
粉霜為細末搽一切金瘡及腫毒生肌止
痛

乃成竭作血色舊說與紫釧大都相類而別是一物功力亦殊醫曰凡使勿用海母血真相似只是

味鹹并腥氣騏驎竭味微鹹耳似危子氣也時珍

曰騏驎竭是樹脂紫釧乃此樹上出所造成今分

入虫部多出大食諸國今人試之以透甲者為真

獨孤滔丹房鑛源云以火燒之有赤汁涌出久而

反不變本

色者真

甘鹹平治心腹卒痛金瘡血出破積血止痛生肉去

五臟邪氣唐本傷折打損一切疼痛血氣攪刺內傷血

聚補虛並宜酒服李本補心包絡肝血不足好古益陽精

消陰滯氣太清修鍊法傳一切惡瘡疥癬久不合性急不

可多使却引膿大明散滯血諸痛婦人血氣小兒癩癧

時珍

大明曰得蜜陀僧良散曰先研作粉入丸散中同眾藥持則化作塵飛也

發明時珍曰麒麟竭木之脂液如人之膏血其味甘鹹而走血蓋手足厥陰藥也肝與心包皆主血

故耳劉河間曰一除血痛為和血之聖藥是矣乳香沒藥雖主血病而兼入氣分此則專入血分也

方白虎風痛走注兩膝熱痛腫用一疏黃末各一兩溫酒服一錢聖惠新久

腳氣一乳香等分同研以木瓜一箇剉孔入藥在內以麩厚裹沙鍋煮爛連麩打九梧子大每服

三十九溫酒下慢驚癩癧定魄安魂益氣一兩兩忌生冷奇效乳香二錢半同研人參湯

下御藥院方鼻衄一蒲黃等分為末金瘡出血一末吹之醫林集要傅之立

止廣產後血運不知人及狂語用一兩為末利方每服二錢酒下太平聖惠方

血竭質汗

六八

產後血衝

心胸滿欬命在須臾用——沒藥各一錢研細童便和酒服 醫林集要 水飲

瘡口

——一字射香少許大棗燒灰 半錢同研津調塗之 究原方 臆瘡不合 末傳

之以乾為度

腹中血塊 —— 沒藥各一兩滑石丹皮 濟急仙方 同煮過一兩醋丸梧子大服

之摘

元方

質汗

汗音韓

集解

藏器曰——出西蕃煎榨乳松液甘草地黃 并熱血成之昔人試藥以小兒斷一足以藥

納口中將足踏之

即時能走者良

甘溫治金瘡折傷瘀血內損補肌肉消惡血下血氣

婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並以酒服之亦

馮泉曰芳香可以逆穢凡中惡及鬼氣勞
瘵傳尸等症皆穢也繆氏謂主穢神通神
明故能辟邪主鬼症惡氣是入乎少陰此
說亦未必然

傳傷處

方寶女經閉

血結成塊心腹攻痛——薑黃川大
黃炒各半兩為末每服一錢溫水下

濟方 聖

安息香

集解

恭曰——出西域狀如松脂黃黑色為塊
新者亦柔靱珂曰生南海波斯國樹脂也狀

若桃膠時珍曰今安南三佛齊諸番皆有葉廷珪
香錄云此乃樹脂形色類胡桃殼不宜於燒而能

發眾香故人取以和香機曰
或言燒之能集鼠者為真

辛苦平治心腹惡氣鬼症

唐本邪氣魍魎鬼胎血邪辟

蠱毒霍亂風痛男子遺精暖腎氣婦人血噤並產後

安息香 阿魏

六九

昂曰——脾胃藥

血運大明婦人夜夢鬼交同臭黃燒熏丹穴永斷李燒

之去鬼來神蕭炳治中惡魔寐勞瘵傳尸時珍

阿魏 又名阿虞綱目薰渠唐本哈昔泥 形虞

集解恭曰——生西番及崑崙苗葉根莖似白芷搗根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者次

之體性極臭而能止臭亦奇物也西國人常食用

之云去臭氣珣曰按廣志云生昆崙國是木津液

如桃膠色黑者不佳黃散者為上頌曰今惟廣州

有之云是木膏液滴釀結成與蘓恭所說不同按

酉陽雜俎云——木生波斯國及北天竺杖汁出

如飴久乃堅凝名——其說與廣州所上者相近

承曰——合在本部今二浙人家亦種之但淡薄

無膏液耳時珍曰——有草木二種草者出西域

可炳可煎蘓恭所說是也木者出南番取其脂汁

李珣蘓頌所說是也一統志所載有此二種云出

火州及沙鹿海牙國者草高尺許根株獨立枝葉如蓋臭氣逼人取汁熬膏名一一出三佛齊及暹羅者樹不甚高土人納竹筒於樹內俟脂滿冬月破筒取之或云其脂最毒人不敢近每采時以羊繫於樹下自遠射之脂毒着羊：斃即為一一觀此則有二種明矣繫羊射脂之說俗亦相傳但無實據諺云黃芩無假一一無真以其多偽也劉純詩云一一無真却有真臭而止臭乃為珍炳曰人多言煎蒜白為假者數曰驗法以半銖安熟銅器中一宿沾一一處白如銀汞無赤色或將一銖安於抽樹上樹立乾便是真者凡用乳鉢研細熟酒器上燒過用

辛平無毒殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼

蠱毒唐本治風邪鬼疰心腹中冷痛李璠傳尸冷氣辟瘟

治瘡主霍亂心腹痛腎氣瘟瘡禦一切葷菜毒大明

阿魏

七十

自死牛羊馬肉諸毒

王機消肉積

發明

炳曰一一下細虫極效時珍曰一一消肉積殺

症按王璆百一選方云夔州潭遠病瘡半年故人竇

藏叟授方用真一一好丹砂各一兩研勻米糊和丸

皂子大每空心人參湯化服一丸即愈世人治瘡惟

用常山砒霜毒物多有所損此方平易人所不知周

密云此方治瘡以無根水下治痢以黃

連木香湯下瘡痢亦多起於積滯故耳

方 辟鬼除邪 一一棗許為末以牛乳或肉汁煎五

次者不過十日忌一切 惡症腹痛 不可忍著一一末

菜 唐雀行功纂要 熟酒下一二錢即

止 尸症中惡 近死尸惡氣入腹終身不愈一一二

承類 錢拌麩作餛飩煮食日三服七日永

除忌五辛油膩 小兒盤腸 內吊腹痛不止用一一為

等物 聖惠 末大蒜半瓣爛熟研爛為

時珍曰：一厥陰肝經藥

昂曰：味苦色綠首真

丸麻子大母艾湯
服五七丸 總微 痞塊有積 一五錢五靈脂炒烟
盡五錢為末以雄黃犬

胆汁和丸黍米大空心津唾送下
三十九忌羊肉醋麪 扶壽精方 噎膈 方同 痰瘧寒

熟 一脂各一豆大研勻以蒜泥
和覆虎口上男左女右 聖濟

盧會 又名奴會 開寶訥會拾遺象胆藏器

集解 珣曰：一一生波斯國狀似黑錫乃樹脂也 頌
曰：今惟廣州有來者 時珍曰：一一向在草部

藥譜及圖經所載皆言是木脂而一統志云瓜哇
三佛齊諸國所出者乃草屬狀如蠶尾采之以玉

器搗成膏與前說不同
何哉豈亦木質草形乎

苦寒治熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒驚癇

療五疳殺三虫及痔瘡瘰癧疾解巴豆毒 寶主小兒諸

盧會 胡桐淚

七十一

原曰小兒脾胃虛寒作瀉者勿服

疔熱李單用殺疔虻吹鼻殺腦疔除鼻癢欒研末傳

蠱齒甚妙治濕癬出黃水蘇頌

發明時珍曰乃厥陰經藥也其功專於殺虫清熱以上諸病皆熱與虫所生也頌曰劉禹錫云

余少年患癬初在項間後延上左耳遂成濕瘡浸淫用斑蝥犬胆桃根諸藥其瘡轉盛一人教用一一兩炙草半兩研末先以溫漿水洗之拭淨傅之立乾便瘡真神奇也

方小兒脾疔使君子等分為末

胡桐淚又名胡桐驗綱目胡桐律時珍曰律當作瀝

集解恭曰出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹脂

淪入土石驗鹵地者其樹高大皮葉似白楊青桐桑葦故名胡桐木堪器用保昇曰涼州以西有之

其津入地與土石相染狀如薑石極鹹苦得水便消若礬石消石之類天明曰此有二般木律不堪入藥惟用石律石上采之形如小石片子黃色者為上時珍曰木液乃樹脂流出者其狀若膏油石液乃脂入土石間者其狀成塊以其得鹵斤之氣故入藥為勝

鹹苦大寒治大毒熱心腹煩滿水和服之取吐牛馬

急黃黑汁水研三二兩灌之立瘥唐本主風虫牙痛殺

火毒麩毒大明風疔惡齒骨槽風勞能軟一切物多服

令人吐李珣瘰癧非此不能除元素咽喉熱痛水磨掃之

取涎時珍

發明頌曰古方少用今治口齒家多用為最要之藥時珍曰石液入地受鹵氣故其性寒能除熱其
胡桐淚 蕪荑

味鹹能入
骨軟堅

方 濕熱牙疼

喜吸風
入射香摻之

牙痛出血

兩研末夜

夜貼之或入射
香少許 聖惠

走馬牙疳

末摻之
黃丹等分為

牙疳

宣露

膿血臭氣者
一兩地骨皮一升煎水
熱漱○又一一葶藶子等分研搽 聖惠

牙

齒靈黑

乃腎虛也
一兩丹砂半
兩射香一分為末摻之 聖濟

蕪荑

音啼 又名並荑 爾雅無姑 木名 椴時
珍曰按說文椴山粉榆也有刺其實為一

集解

別錄曰一一生晉山峇 弘景曰今出高 狀
如榆莢氣臭如虱彼人以醬食性殺虫置物

中辟蠹但患其臭恭曰今延州同州者甚好珣曰

按廣州記云生大秦國是波斯一一也藏器曰一

一氣羶者良乃山榆仁也時珍曰一一有大小兩
種小者即榆莢也採取仁醞為醬味尤辛人多以

希雅曰察其所主雖能除風濕邪氣之為
害而其功則長于走腸胃殺虫消積故小
兒疳冷痢所必資

外物相和不可不擇去之
入藥皆用大一別有種

辛平

權曰苦平
珣曰辛温

治五内邪氣散皮膚骨節中淫濕

行毒去三虫化食

本經

逐寸白散腸中噎喘息別錄主

積冷氣心腹癥痛除肌膚支節中風淫如虫行蜀本

五臟皮膚肢節邪氣長食治五痔殺中惡蟲毒諸病

不生

孟說

治腸風痔瘻惡瘡疥癬大明殺虫止痛治婦人

子宮風虛孩子疳瀉冷痢得訶子豆蔻良李珣和猪脂

搗塗熱瘡和蜜治濕癬和沙牛酪或馬酪治一切瘡

張

鳩

燕美

昂曰諸虫皆由濕而生氣食皆曰寒而滑
辛能散滿苦能殺虫濕能燥熱化食
亦能祛五臟支節間風濕

發明

說曰作醬甚香美功尤勝於榆仁可少食之
過多食發熱為辛故也秋月食之尤宜人

方 脾胃有虫

食即作痛面黃無色一仁二兩和
麩炒黃為末米飲下二錢 千金

制殺諸虫

生一一生檳榔各四兩為末蒸餅
丸桐子大每下二十九 本事 疳熱有

虫

瘦悴久服克肥一一川連等分猪胆汁入盞內飯
上蒸之九蒸乃入射香半錢湯浸蒸餅丸小豆大

每服七丸至二

小兒虫瘕

胃寒虫上諸症危惡與瘕
相似用一一乾漆燒存性

十九 錢乙

等分研為末米飲下

結陰下血

一一一兩搗爛絲壓
去油雄猪胆丸桐子

一字至一錢 杜壬

大每服九丸煎甘草湯下日

脾胃氣泄

久患不止一
五兩為末

五服三日斷根 普濟方

飯九梧子大每空心米飲下三十九久

腹中繫痲

服去三虫益顏益神 王氏續傳信方

嗜酒血入於酒則為酒蠶平時多氣血凝於氣則為

氣蠶虛勞痲冷敗血雜痰則為血蠶搯頭掉尾如虫

之行上侵人咽下蝕人肛或附脇背或隱胸腹大則
 如驚小或如錢治法惟用一炒煎服之兼用暖胃
 益血理中之類乃可殺之徒用雷
 丸錫灰之類無益 仁齋直指方 **小兒驚疳** 疳不能
 言肥兒丸一炒神曲炒麥牙川連炒各一錢為末
 猪胆丸黍米大每服十丸木通湯下 全幼心鑑
衛矛 又名鬼箭別錄神箭廣雅

集解

別錄曰生霍山：谷普曰葉如桃箭如羽弘
 章曰山野處有之削取皮羽入藥頌曰今

江淮川郡亦有之三月以後生莖長四五尺許
 其幹有三羽狀如箭羽葉似山茶青色宗奭曰山
 谷皆有平陸未見也葉絕少其莖黃褐色若藤皮
 三面如鋒办人家多燻之遺崇時珍曰一一生山
 谷間小林成叢春長嫩條上四面有羽如箭羽
 視之若三羽耳葉似野茶對生味酸濇三四月開
 碎花黃綠色結實大如
 冬青山人不識樵采之

衛矛

苦寒

大明曰甘滑
權曰有小毒

治女子崩中下血腹滿汗出除邪

殺鬼毒蠱症

經本

中惡腹痛去寸白蟲消皮實風毒腫

令陰中解

別錄

治婦人血氣大效

蘇恭

破陳血能落胎主

百邪鬼魅

甄權

通月經破癥結止血崩帶下殺腹臟虫

及產後血咬腹痛

大明

甄曰采得只使箭頭拭
去赤毛以酥緩灸用

發明

頌曰古方崔氏療惡症在心痛不可忍有鬼箭
羽湯姚僧坦集驗方治卒暴心痛忽中惡氣毒

痛大黃湯亦用之並大方也見外臺千金諸書中時

珍曰凡婦人產後血運血結血聚於胸中或偏於少
腹或連於脇肋者四物湯四兩倍加當歸加

方 產後敗血

硬塊痛及新產乘虛風寒內搏惡露
不快臍腹堅脹當歸散用當歸炒

昂曰損傷必有瘀血停滯漆能化瘀血為水故能續筋骨絕傷
 希雍曰一氣味俱厚通行腸胃入肝行血之藥也凡風寒濕邪之中人留而不去則腸胃鬱而生虫久則五臟六腑皆受病或為癰瘰或為拘攣所自來矣此藥能殺虫消散逆腸胃一切有形之滯積腸胃清則五臟安毒緩癢急自調矣又損傷一證專從血論蓋血者有形者也形質受病惟辛溫散結而兼鹹味者可入血分而消之瘀血消則絕傷自和而筋骨自續矣至于咳嗽有瘀血停留發為骨蒸癆瘵以致咳嗽者得其消散瘀血之力則骨蒸退而咳嗽亦除也

去中心木紅花各一兩每服三錢酒一椀煎七分服和劑鬼瘡一穿山甲燒末每以一字發時啗鼻○又法一兩砒黃一錢五靈脂一兩為末發時冷水下一錢並聖濟錄

漆說文作漆弘景曰一桶中自然乾者狀如蜂房孔隔者為佳

辛溫無毒權曰辛鹹宗奭曰苦元素曰平有毒治絕傷補中續筋骨填

髓腦安五臟五緩六急風寒濕痺生漆去長虫本乾

漆治咳嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去虻

虫別錄殺三虫主女人經脉不通甄權治傳尸勞除風大明

削年深堅結之積滯破日久凝結之瘀血元素

之才曰半夏為之使畏鴉子忌油脂弘景曰生一毒烈人以鴉子和服之去虫猶自啗腸胃也大明曰毒漆卷十五

發飲鉄漿並甘豆湯吃蟹並可制之時珍曰貨一者多雜桐油故多毒淮南云一見蟹不乾相感志云漆得蟹成水蓋物性相制也凡人畏一者嚼川椒塗鼻則可免生一瘡者杉木湯紫蘓湯漆姑草蟹湯浴之良大明曰乾一搗碎炒熟不爾損人腸胃若是生一煎乾更好亦有燒存性用者

發明弘景曰仙方用蟹消漆為水鍊服長生抱朴子云淳一不粘者服之通神長生九虫悉下惡血

從鼻中出震亨曰一性急而飛補用為去積滯之藥中節則積滯去後補性內行人不知也時珍曰一性

毒而殺虫降而行血所主諸病雖繁其功只在二者而已

方 小兒虫病 胃寒危惡症與疳相似者乾一炒烟

一錢 九種心痛 及腹脇積聚滯氣乾一一兩炒烟

杜壬方 盡研末醋煮麩糊丸梧子大每服

五九至九九酒 女子血氣 婦人不曾生長血氣痛不

下簡要濟眾 可思及治丈夫疝氣小腸

氣撮痛者並宜服二聖丸生一兩熬一食頃入乾
一兩和丸梧子大每服三四丸怕一人不可服

經閉 指南方萬應丸治女子經閉繞臍寒疝痛徹
驗 及產後血氣不調癥瘕等病乾一兩炒烟

盡牛膝末一兩生地汁熬膏和丸梧子大每服一丸
加至三五丸○產寶治月經不利血氣上攻欲嘔不

得睡用當歸四錢乾一燒研三錢密丸梧子大每服
十五丸酒下○千金治經閉臍下堅如盃時發熱往

來下痢羸瘦此為血瘕若生肉瘕便不可治乾一
燒研生地膏和丸梧子大每服三九空心酒下 五

勞七傷 補益方用乾一柏子仁山茱肉棗仁各等分
為末密丸梧子大每服二七丸酒下日二

千解蠱毒 平胃散末以生一和丸梧子大
金 酒下七十九至百九 直指方

漆葉 治五尸勞疾殺虫暴乾為末日用酒服一錢

時 珍

漆葉

巴豆

羊六

發明頌曰華佗傳云彭城樊阿師事佗：授以

青黏散服之去三虫利五臟輕身益氣後阿壽

二百歲人問之秘其說曰醉誤說人始得之多效後

人無復識青黏者或云即黃精之正葉者也時珍曰

抱朴子云一一青黏樊阿服之得壽二百耳目聰明

猶持針治病此近代之實事或云青黏即歲蕤也

巴豆又名巴菽本經剛子炮炙老陽子時珍曰

此物出巴蜀故名兩頭尖者為剛子緊小者是

雌有稜及兩頭尖者者是雄：者峻利

集解頌曰嘉州眉州戎州皆有木高一二丈葉如

櫻桃而厚大初生青色後漸黃赤十二月葉

漸稀二月復生四月舊葉落盡新葉齊生即花發

成穗微黃色五六月結實生青八月熟黃類白豆

菴一房有二瓣一瓣一子或三子子仍有殼用之

去殼戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩

三道土人呼為金線一一為上等他處少有時珍

曰一一房似大風子殼而脆薄子及仁皆似海松

子與白豆
寇殊不類

辛溫有毒

別錄曰有大毒元素曰性熱味苦
果曰性熱味辛時珍曰氣熱味辛

治傷寒

溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲瘦癖大腹蕩練五

臟六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪

物殺蟲魚

本經

療女子月閉能爛胎治金瘡膿血不利

大夫殺斑蝥蛇虺毒

別錄

治十種水腫癭疰落胎

藥性宣

通一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃消痰破血排

膿消腫毒殺腹臟虫治惡瘡癰肉及疥癩丁腫日華導

氣消積去臟腑停寒治生冷硬物所傷元素治瀉痢驚

巴豆

七十一

痢心腹痛疝氣風鳴耳聾喉痹牙痛通利關竅時珍

之才曰芫花為之使畏大黃、連蘆、菖蒲、菖蒲、藜蘆、薑豉冷水得火良惡藜蘆草與牽牛相反中其毒者以冷水黃連汁大豆汁解之時珍曰——氣熱味辛生猛

熱緩能吐能下能止能行可升可降藥也不去膜則傷胃不去心則作嘔以沉香水浸則能升能降與大黃同用瀉人反緩其性相畏也弘景曰新者佳用之

去皮心熬令黃黑搗如膏乃和丸散大明曰凡入丸散炒用不如去心膜換水煮五度各一沸也時珍曰

——有用仁者用殼者用油者有生用者醋煮者燒存性者有研爛以紙包壓去油者謂之——霜

發明 元素曰——乃斬關奪門之將不可輕用震亨曰——去胃中寒積無寒積者勿用元素曰世

以——熱藥治酒病膈氣以其辛熱能開腸胃鬱結也但鬱結雖開而亡血液損其真陰從正曰傷寒風

濕小兒瘡痘婦人產後用之下膈不死亦危奈何庸人畏大黃而不畏——以其性熱而劑小耳豈知以

昂曰：一稟火烈之性，爛人肌肉，試以少許擦皮膚，即生一泡，况腸胃耶？不可輕用。鳴泉曰：人之腸胃，全恃涎液，故乾物入胃，得涎液之滑，則下行，所謂直陰也。峻利之藥，雖能推蕩陳積，而涎液亦蕩去，故食物不得涎液，粘滯于胃，而不能消。此元素從正，所以有損陰留毒之戒也。但一稟是烈之性，攻堅陷陣，力無與侔，積滯腸胃，非此不能通用之，得當亦有起死之能。故元素從正，言其過其過當戒也。好古時珍言其功，其功亦不可輕也。

蠟墮之猶下後，使人津液枯竭，胃熱口燥，耗却天真，留毒不去，他病轉生。故下藥官以為禁藏器。曰：一主癥癖，疰氣痞滿，積聚冷氣，血塊宿食，不消痰飲，吐水取青黑大者，每日空腹吞一枚，去殼勿令白膜破，并四邊不得有傷損，吞之以飲壓令下，少頃腹內熱如火，利出惡物，雖利而不虛。若久服亦不利。人白膜破者，勿用好古曰：若急治為水穀道路之劑，去心膜油生用，若消痞磨堅，緩治之劑，炒去烟令紫黑，用可通腸，可以止瀉。世所不知也。張仲景治百病客忤，備急丸用之。時珍曰：一峻用則有戩亂劫病之功，微用亦有撫緩調中之妙。譬之蕭曹絳灌，乃勇猛武夫，而用為相，亦能輔治。太平海藏言：可以通腸，可以止瀉，此發千古之秘也。一老婦年六十，素病溇泄，已五年，內食油膩，生冷犯之，即作痛，服調脾升提止瀉諸藥，入腹則瀉，反甚。余診之，脉沈而滑，此乃脾胃久傷，冷積凝滯所致。王太僕所謂大寒凝內，久利溇泄，愈而復發，綿歷歲年者，法當以熱下之，則寒去利止，遂用蠟墮一丸，五十九與服，二日大便不通，亦不

巴豆

六八

利其泄逆愈自是每用治泄痢積滯諸病皆不瀉而
病愈者近百人妙在配合得宜藥病相對耳用之不
當則犯損
陰之戒矣

方 寒滯宿食

不消大便閉塞一仁一升清酒五
升煮三日三夜研熟合酒微火煎令

可丸如豌豆大每服一九
水下欲吐者二九 千金 食瘡積瘡 一去皮心二

六錢搗丸如綠豆大一服 積滯瀉痢 腹痛裏急杏仁
一丸冷湯吞下 附後方 去皮尖一去

皮心各四十九粒同燒存性研泥溶蠟和丸綠豆大
每服二三丸煎大黃湯下間日一服一加百草霜三

錢 劉 夏月水瀉 不止一一粒燒存性化蠟和
河間 作一丸倒流水下 危氏得效 伏

暑霍亂 傷冷吐利煩渴水浸丹用一一二十五粒去
皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃蠟和

丸綠豆大每服三五丸水浸少 乾霍亂病 心腹脹痛
頃別以新汲水下 和劑局方 不吐不利

昂曰：經喉急痺，緩治則死。用解毒丸、雄黃、一兩、附金一兩、巴豆十四粒，去皮去油，為丸。每服五分，津嚥下。雄黃破結，氣鬱金、破惡血、巴豆下稠涎，然屬屬劑，不可輕用。或紙捲離巴豆油，吹息刺喉，或搗巴豆絲，裹塞鼻中，吐出惡涎，紫血即寬，鼻少生瘡，不碍。

希雅曰：向白卷枯，過去豆單用，鬱研細吹入喉中，吐去熱毒，涎治急喉痺如神。

欲死——一枚，去皮心，執寒痰氣歇。青橘皮一片，包水研服，得吐利即定也。——一箇麻札。

定火上燒存性，研末，薑汁和酒一鍾，呷服到口，便止神方也。張杲醫說：風濕中痰，人坐中將新——四十九粒，研如泥，紙壓去油，分作三餅。

如病在左，令病人將右手仰置掌上，安藥於掌心，以益安藥上，傾熱水於盆內，水涼即換，良久汗出，立見神效。病在右，安左手，一云隨左右安之。保壽陰。

毒傷寒：心結按之極痛，大小便秘，但出氣稍暖者，急取——十粒，研入麩一錢，捻作餅，安臍內，以小艾炷灸五壯，氣達即通。喉痺垂死，以線穿——一細此大師陳北山方，直指入喉中，牽出即醒。

醒——千三物備急：方見大一切惡瘡。——一三十箇香金方。黃下。油煎黑去豆，以油調琉黃輕粉末。瘡疽惡肉，烏金膏解一切瘡毒，及頻塗取效。普濟。腐化瘰癧肉，最能推陳致新。——炒焦研膏，點痛處，則鮮毒塗瘰癧肉上，則自化。

加乳香少許，亦可。若毒深不能收斂者，宜作搥純之巴豆。

七十九

不致成癭

見外科精義

箭鏃入肉

不可拔者用新
一畧炒與

痒忍之待極痒

不可忍便撼動

拔之取出速以生肌

散傳之亦治瘡腫一婦病背瘡呻吟不已夏侯鄆用

此方試之即痛

止也

小兒痰嗽

一粒并爛綿果塞鼻

經驗

男左女右痰即自下

氏醫

鑑

穀 消積滯治瀉痢

時珍

方 一切瀉痢

脉浮洪者多日難已脉微者服之立

研化蠟九綠豆大每甘草湯

下五丸 劉河間宣明方

樹根

治瘡疽發背腦疽鼻疽大患掘取洗搗傳患

處留頭妙不可言乾者臨時水搗亦可

時珍 出楊誠經方

大風子

集解

時珍曰今海南諸蕃國皆有之按周達觀真臘記云一一乃大樹之子狀如椰子而圓

中有核數十枚大如雷丸子中有

仁白色久則黃而油不堪入藥

仁 辛熱有毒治風癰疥癩楊梅諸瘡攻毒殺虫

時珍

時珍曰取油法用子三斤去殼及黃油者研極爛瓷器盛之封口入滾湯中蓋鍋密封勿令透氣文武火煎至黑色如

膏名大風油

發明 震亨曰粗土治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先

失明者時珍曰大風油治瘡有殺虫劫毒之功蓋不可多服用之外塗其功不可沒也

方 大風諸癩

糊丸 椰子大每服五十九丸空心温酒

大風子

相思子

八十

下仍以苦參
湯洗 普濟 大風瘡裂
研塗仍以殼煎湯洗之 嶺

南衛 楊梅惡瘡 方同
上方

相思子 又名紅豆

集解 時珍曰 生嶺南樹高丈餘白色其葉
似槐花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆

半紅半黑彼人以嵌首飾或
言用子收龍腦香令香不耗

苦平有小毒吐人通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛

風痰瘡瘡殺腹臟及皮膚內一切虫除蠱毒取二七

枚研服即當吐出 時珍

方 瘡瘡寒熱 十四枚水研 蠱毒 用 十四枚研
服取吐立瘥 千金

末温水半盞和服欲吐却之勿吐少頃
當大吐輕者但服七枚神效 外台

柳 又名小楊 說文

集解

弘景曰一即今水楊柳也恭曰一與水楊全
不相似水楊葉圓潤而尖枝條短硬柳葉狹

長而青枝條長軟陶以一為水楊非也葳器曰

揚樹枝葉短一樹枝葉長時珍曰楊枝硬而揚起

故謂之楊柳枝弱而垂流故謂

之柳蓋一類二種蘊蒸之說是

葉 苦寒治惡疥痂瘡馬疥煎者洗之立愈又療心

腹內血止痛

別錄

洗漆瘡

弘景

天行熱病傳尸骨蒸勞熱

下水氣煎膏續筋骨長肉止痛治服金石人發大熱

悶湯火瘡毒入腹熱悶及疔瘡

日華

治白濁解丹毒時珍

方 小便白濁

煎湯代茶 集簡

卒得惡瘡

一或皮水煮 汁入少盪洗之

肘 痘爛生蛆

嫩柳葉鋪席上卧之 後方 蛆盡出 李樓奇方

枝及根皮 苦寒治瘧熱淋疾為浴湯洗風腫瘙痒

煮酒漱齒痛

蘇恭

煎服治黃疸白濁酒煮慰諸痛腫去

風止痛消腫

時珍

發明

頌曰柳枝及根皮肘後方治瘰疽腫毒妬乳等 多用之 宙獨行方主下瘡及反花瘡並煎柳

枝葉作膏塗之令人作浴湯膏藥牙齒藥亦用之為 最要藥時珍曰柳枝去風消腫止痛削為牙杖甚妙

方 走注氣痛

氣痛之病忽有一處如打撲之狀不 可忍走注不定靜時其處冷如冰此

暴寒傷之也酒煮柳白皮熨之有赤點處鑿去 血炒凡諸急痛卒腫熨之皆即止 姚氏集驗 風毒

卒腫同黃疸初起柳枝煮濃汁
上半升頓服外台

柳絮 苦寒治風水黃疸面熱黑經本痂疥惡瘡金瘡

柳實主潰癰逐膿血子汁療渴別錄花主止血治濕痺

四肢攣急膝痛甄權

發明原璣曰實及子汁之文諸家不詳今人亦不見
用時珍曰本經主治風水黃疸者柳花也別錄

主治惡瘡金瘡潰癰逐膿血藥性論止血治痺者柳絮及實也花乃嫩蕊可搗服子與絮連難以分別惟

可貼瘡止血畏痺之用所謂子汁療渴者則連絮浸漬研汁服之耳又崔寔四民月令言三月三日及上

除日采絮愈病則入藥多用絮

方吐血咯血一焙研米飲金瘡血出一封之
下一錢 經驗 即止 外

柳絮 水楊

八十二

台面上膿瘡一賦粉等分以灯

蓋油調搽 普濟

水楊

又名青楊 綱目蒲柳爾雅蒲楊古今注蒲楊
移柳同上 音又蒲 荏

集解

恭曰一葉圓濶而尖枝條短硬與柳全別

柳葉狹長條枝長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其

枝勁韌可為箭倚河北沙地多生之楊柳之類亦

多古今注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細核

楊葉圓而弱一即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖

可作矢赤楊霜降則葉赤材理亦赤然令人鮮能

分別機曰蘓恭說水楊葉圓濶荏豹說蒲楊似青

楊青楊葉長似不類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳

有二種一種皮正青一種皮正

白可為矢北地尤多花與柳同

枝葉苦平久痢赤白搗汁一升服日二大效唐本主

癩腫痘毒

時珍

鳴皋曰嘗見一小兒痘悶不出昏悶不哭
醫用芫荽煮水上安一蒸籠緩火蒸之上
覆以被水不宜過熱冷再加熱湯蒸一
二時許兒啼強出矣此博愛心鑑法同一
理也

發明

時珍曰水楊根治癰腫故近人用枝葉治痘

直博愛心鑑云痘數日陷頂漿滯不行或風寒
所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜
煎湯溫浴之如冷添湯良久照見壘起有暈絲者漿
行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴
不起者氣血敗也不可再浴始出及痒塌者不可浴
痘不行漿乃氣滯血滯膜理固密或風寒外阻而然
浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹每隨暖氣而發
行漿貫滿功非淺也若內服助氣血藥藉此升之其
效更速風寒亦不得而阻之矣直見一媪在村中用
此有驗叩得其方行之百發百中慎勿易之
誠有變理之妙羣書皆無此法故詳著之

白皮及根苦平治金瘡痛楚乳癰諸腫痘瘡

時珍

發明

時珍曰李仲南永類鈴方云有人治乳癰持藥

一根生搗貼瘡其熱如火再貼便平求其方乃
水楊根也葛洪肘後治乳癰用柳
根則楊柳性不遠可以通用也

水楊 白楊

分三

方 金瘡苦痛

楊木白皮炒燥碾末水服方寸匕仍傳之日三次 千金方

白楊

恭曰——葉圓大蒂小無風自動葳器曰——此地甚多人種墟墓間樹大皮白頰曰葉圓如

梨葉皮白色木似楊宗奭曰陝西甚多居人修蓋多此木風纏至葉如大雨聲

木皮

苦寒

天明曰酸冷

治毒風脚氣腫四肢緩弱不隨

毒氣游移在皮膏中痰癬等症酒漬服之

唐本去風癬

宿血折傷血滯在骨肉間痛不可忍及皮膏風瘙腫

雜五木為湯浸損處

葳器

治撲損瘀血並煎酒服煎膏

可續筋骨

大明

煎湯日飲止孕痢煎醋含漱止牙痛煎

漿水入鹽含漱治口瘡煎水釀酒消癭氣

時珍

希雅曰入足陽明手太陰少陰胃肺心經
 近世以治痧疹熱毒不能出用為發散之
 神藥蓋熱毒熾于脾胃則發斑疹于肌肉
 間以肺主皮毛胃主肌肉也此藥正入肺
 胃心三經三經毒解則邪透肌膚而內熱
 自消此皆開發升散甘鹹微溫之功用也

方 妊娘下痢

白楊皮一斤水一斗煮
 二升分三服 千金 瘦氣 秫米三
 斗炊熟

取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煮二
 升清麴末五兩釀酒每旦飲一杯日二 崔氏

枝 消腹痛治吻瘡

時珍

方 吻瘡

白楊嫩枝銕上燒灰
 和脂傅之 外臺

音 檉柳

又名赤檉 日華 赤楊 古今注 河柳 爾雅 雨師詩
 垂絲柳 綱目 俗名觀音柳 長壽仙人柳 西河

柳三春柳或

記為山川柳

集解

禹錫曰爾雅檉河柳也郭璞注云今河旁赤
 莖小楊也陸機詩疏云皮赤如絳枝葉如松

時珍曰

一一小幹弱枝赤皮細葉如絲婀娜可愛
 一年三次作花穗長三四寸水紅色如蓼花色

段成式酉陽雜俎云涼州有

赤白檉為炭其灰汁可煮銅

白楊 檉柳 梓

八十四

〔昂曰〕西河柳能使痘疹毒外出未服四錢治沙疹不出喘嗽煩悶沙糖調服治疹後痢

〔希雅曰〕同石膏知母薄荷荆芥牛蒡元參麥冬連翹黃芩甘草之屬治斑疹不出或雖發不透如熱甚毒熾舌生芒刺大渴語斑色紫黑者加入三黃石膏湯內大效

枝葉 甘鹹溫消痞解酒毒利小便 時珍

方 腹中痞積 煎湯露一夜五更空心 飲數次痞自消 衛生易簡 一切諸

風 不問遠近 一斤切枝亦可 荆芥半斤水五升 煮二升 澄清入白蜜五合 竹瀝五合 瓶盛封好入

重湯煮一伏時 每服 長壽仙人柳晒乾為

一小盞 日三 普濟 酒多致病 末每服一錢 溫酒調

下 衛

生易簡

梓 又名木王 時珍曰 木莫良於 故書以 材名篇 禮以 人名 匠帝以 宮名 棺屋有此木則餘材 皆不震其為

木王可知

集解 頌曰 人家園亭亦多植之 木似桐而葉小花 紫爾雅云 椅 郭璞注云 即楸也 詩云 椅桐

漆陸機注云 楸之疏理白色而生子者為 實桐皮為椅大同而小異也 入藥當用有子者 天

明曰一有數般惟楸一皮入藥佳餘皆不堪機曰
賈思勰齊民要術以白色有角者為一即角楸也
其角細長如箸其長近尺冬後落葉而角猶在樹
時珍曰一有三種木理白者為一赤者為楸一之
美文者為椅楸之小者為椶諸家疏
注殊欠分明桐亦名椅與此不同

梓白皮 苦寒治熱毒去三蟲本經療日中疾主吐逆

皮胃小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡煎湯浴之并搗傳別錄

煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙癢大明治温病復

感寒邪變為胃呃煮汁飲之時珍

方 時氣温病 頭痛壯熱初得一日用生梓木削去
黑皮取裏白皮一升水二升半煎汁

每服八合

肘後

梓白皮葉 楸白皮葉

葉 療手足火爛瘡時珍 別錄云葉飼猪肥大三倍

楸 又名楸

集解 見梓下周憲王曰一有二種一種刺一其樹高大皮色蒼白上有黃白斑點枝梗間多大

刺葉似一而薄味甘嫩時燥熟可食時珍曰一有行列莖幹直聳可愛至上垂條如線謂之一線其

木濕肘腕燥則堅故謂之良

材即梓之赤者宜作棋枰

白皮 苦小寒珣曰微溫 治吐逆殺三虫及皮膚虫煎膏

傳惡瘡疽癰腫疔痔除膿血生肌長筋骨藏器 消食

澀腸下氣治上氣欬嗽李珣 口吻生瘡貼之頻易取效

時珍

方 瘰癧

椒枝作煎類洗
取效 肘後

白癩風

椒白皮五斤煎膏
日三摩之 聖濟

葉 苦小寒搗傅瘡腫者湯洗膿血冬取乾葉用之

諸瘰腫潰及內有刺不出取葉十重貼之

藏器

發明

時珍曰椒乃外科要藥而近人少知葛常之韻
語陽秋云有人患發背潰壞腸胃可窺一醫用

太陽未升時采椒葉熬膏傅其外內以雲母膏作小
丸服盡四兩不累日而愈也東晉名醫范汪亦稱椒

葉治瘡腫之功則椒有
拔毒排膿之力可知

方 一切毒腫

不問硬軟取椒葉十重敷瘡上舊帛
裹之日三易之當重有毒氣為水

流在葉上冬取乾葉鹽水浸軟或取椒皮搗爛
傳之皆效止痛消腫食膿血勝於衆 范汪方 瘰癧

瘰癧

椒煎神 秋分前後早晚摘椒葉取十五斤以
水一石煎取三斗換鍋煎取七八升再換鍋煎

椒白皮葉 桐

八十六

取二升乃納瓷器中用時先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消化又取杏仁七粒生薑少許同研米粉二錢同入膏中攪勻先塗瘡上經二日乃拭去即以篋子勻塗椒煎滿瘡上以帛裹之且日一拭更上新藥不過五六上已破者即生肌未破者即內消愈後須將慎半年采藥及煎時禁雞犬婦人僧道孝子

見之
瘡 聖惠
頭痒生瘡
瘡 聖惠

桐 又名白桐 弘景黃桐 圓經 泡桐 綱目 椅桐 弘景 榮桐 爾雅 時珍曰 本經桐葉即白桐也 其華成筒故

曰桐其材輕虛色白而有綺文故俗謂之白桐 泡桐古謂之椅桐也 先華後葉故爾雅謂之榮

桐或言其華而不實者未之察也 陸機以椅為梧 桐 郭璞以榮為梧 桐 並誤

集解 弘景曰 桐樹有四種 青桐 葉皮青似梧而無子 梧 桐皮白葉似青桐而有子 肥可食 白

桐一名椅 桐人家多植之 與岡桐無異 但有花子 二月開花 黃紫色 禮云 三月 桐始華者也 堪作琴

瑟岡桐無子是作琴瑟者本草用桐應是白桐頌
曰陸機言白桐宜為琴瑟雲南牂牁人取花中白
堯漬績為布似毛服謂之華布椅即梧桐也今作
桐油者即崗桐也有子大如梧子宗奭曰本經桐
葉不指定何桐致難執用但四種各有治療白桐
葉開三杈開白花不結子無花者為岡桐不中作
琴體重柱桐子可作桐油梧桐結子可食時珍曰
陶注桐有四種以無子者為青桐岡桐有子者為
梧桐白桐寇注言白桐岡桐皆無子蘇注以岡桐
為油桐而賈思勰齊民要術言實而皮青者為梧
桐華而不實者為白桐白桐冬結似子者乃是明
年之華房非子也岡桐即油桐也其說與陶氏相
反以今咨訪互有是否蓋白桐即泡桐也葉大徑
尺最易生長皮色粗白其木輕虛不生虫蠹作器
物甚良二月開花如牽牛花而白色結實大如巨
棗長寸餘殼內有子片輕虛如榆莢葵實之狀老
則殼裂隨風飄揚其花紫色者名岡桐荏桐即油
桐也青桐即梧桐之無實者按陳翥桐譜分別白

桐

公

桐岡桐甚明云白花桐文理粗而體性慢喜生朝陽之地曰子而出者一年可起三四尺由根而出者可五七尺其葉圓大而尖長有角光滑而莖先花後葉花白色花心微紅其實大二三寸內為兩房：內有肉：上有薄片即其子也紫花桐文理細而體性堅亦生朝陽之地不如白桐易長其葉三角而圓大如白桐色青多毛而不光且硬微赤亦先華後葉花色紫其實亦同白桐而微尖狀如訶子而粘房中肉黃色二桐皮色皆一但花葉小異體性堅慢不同耳

桐葉 苦寒治惡蝕瘡着陰 本經 消腫毒生髮 時珍

方 手足浮腫 一煮汁漬之并飲少許 或加小豆尤妙 聖惠 瘰癧發背

大如盞鼻腐不可近 一醋蒸貼上退熱 止痛生肉收口極驗 秘方也 醫林正宗

梧桐

葉 治發背灸焦研末蜜調傳乾即易時

嬰子桐 又名荏桐 何義虎子桐 拾遺油桐

集解

時珍曰油桐枝幹花葉並類因桐而小花亦微紅但其實大而圓每實中有二子或四子

大如大風子其肉白色味甘而吐人亦或謂之紫花桐人多蒔之叔子為油入漆家用

桐油 甘微辛寒有大毒摩瘡疥虫癬虫瘡毒瘡毒

鼠至死

藏塗脛瘡湯火傷吐風痰喉痺時珍

時珍曰吐

人得酒即解

方 臙瘡

胡粉煨過研一調作隔紙膏貼之○又方用船上陳一石灰煨過又以人髮拌

一灸乾為末仍以一一調作解砒毒一一二升灌膏塗紙上刺孔貼之簡便方

桐 梧桐 桐油 竹

八十八

元素曰涼心經

希雍曰入足陽明手少陰經

胃心

昂曰葉生在竹上故治上焦之病

希雍曰陽明熱客則胸中生痰熱阻滯

則欬逆上氣辛寒解陽明熱故痰消氣下

而欬逆止

華陀

危病方

竹

集解

弘景曰竹類甚多入藥用篔竹次用淡竹苦竹又有一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實

中竹篔竹並以筍為佳於藥無用頌曰篔竹淡竹

苦竹三種人多不能盡別按竹譜篔竹堅而節促

體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可為笛

苦竹有白有紫甘竹似篔而茂即淡竹也然今之

刺船者多用桂竹作笛自有一種苦竹亦有二種

一出江西閩中本極粗大笋味殊苦不可噉一出

江浙肉厚而葉長濶微有苦味俗呼甜苦筍是

也今人燒瀝惟用淡竹一品肉薄節間有粉者

篔竹葉

苦平

別錄曰

治欬逆上氣筋急惡瘍殺小

經

除煩熱風瘧喉痺嘔吐

別錄

煎湯熨霍亂轉筋

珍時

竹葉止嘔噦亦能發汗仲景治傷寒發熱大渴有竹葉石膏湯乃假其辛寒以散陽明邪熱也

淡竹葉

辛甘大寒

權曰

治胸中痰熱欬逆上氣

別錄

吐血熱毒風止消渴壓丹石毒

能入心涼血

消痰治熱狂煩悶

權

中風失音不語壯熱頭痛頭風止驚悸瘟疫迷悶妊

婦頭旋倒地小兒驚癇

明大

喉痹鬼疰惡氣煩熱殺小

虫

孟

涼心經除熱緩脾益元氣

元

煎濃汁漱齒中出

血洗脫腕不收

時珍

苦竹葉

苦寒治口瘡目痛明

自利九竅

別錄

治不眠止消渴解酒毒除煩熱發汗治

中風瘡癰

大明

殺虫燒末和猪胆塗小兒頭瘡耳疥癬

和雞子白塗一切惡瘡頗用取效

時珍

竹葉根

十九

〔希維曰〕煎湯調棗仁炒熟末五錢臨卧服
治心虛不得眠 同麥冬棗仁遠志丹參
茯神丹砂犀角治心經有熱虛煩不眠
一入白虎湯治傷寒煩熱大渴引飲

發明

〔說曰〕竹葉筍苦淡甘之外餘皆不堪入藥不宜
人淡竹為上甘竹次之〔宗奭曰〕諸荀性寒故知

其葉一致也仲景竹葉湯所用淡竹〔杲曰〕竹葉辛苦
寒可升可降陽中陰也其用有二除新久風邪之煩

熱止喘促氣

勝之上衝

方 上氣發熱

因奔趁走馬後飲冷水所致者竹葉
三斤橘皮三兩水一斗煎五升細服

之三日一劑

時後方

時行發黃

竹葉五升切小麥七升石膏
三兩水一斗半煮取七升細

服盡劑愈

時後方

筍竹根

益氣止渴下氣

〔本經〕消毒

淡竹根 除

煩熱解丹石發熱渴者汁服

〔藏器〕

消痰去風熱驚悸迷

問小兒驚癇

〔大明〕

同葉煮湯洗婦人子宮下脫

〔時珍〕

甘

希雅曰淡竹茹入足陽明經胃

昂曰淡竹茹開胃土之鬱清肺金之燥治

上焦煩熱能涼血故治吐血崩中肺痿尿

血等症能清胃熱故止嘔吐能涼胎氣故

治胎動

又曰皮主肺故入肺治上焦○温胆湯用

之

竹根 煮汁服安胎止產後煩熱時珍 苦竹根 治

心肺五臟熱毒氣剉一斤水五升煮一升分三服孟洗

方 產後煩熱 逆氣用甘竹根切水一斗五升煮取 七升去渣入小麥二升大棗二十枚

煮三四沸入甘草一兩麥冬一升再

煎至二升每服五合 婦人良方

淡竹茹 甘微寒治嘔啞温氣寒熱吐血崩中別錄 止

肺痿唾血衄血治五痔甄權 勞熱大 噎膈孟 傷寒勞復

婦人胎動能散肝火 小兒熱癩時珍 苦竹茹 下熱壅孟 水煎

服止尿血時珍

方 傷寒勞復 病後交接勞復印腫服痛一一升 水三升煮五沸服汁 南陽活人書

竹茹

九十

〔昂曰〕竹之有漚猶人之有血故能養血益
 陰清大而行經絡又曰和米煮粥能治反

婦人勞復 病愈因勞動致熱氣衝胸手足搖擗如中
 風狀一一斤栝樓二兩水二升煎一升

分服 產後煩熱 內虛短氣甘竹茹湯甘竹茹一升
 方同上 人參茯苓甘草各二兩黃芩二兩

水六升煎二升分服 婦人殞胎 孕八九月或墜傷或
 日三 婦人良方 牛馬驚傷心痛用青

竹茹五兩酒一升煎 月水不斷 青竹茹炙每用三錢
 五合服 子母秘錄 水一盞煎服 普濟

小兒熱病 口喎體熱竹茹三兩醋三升 齒血不止 生
 煎一升服一合 子母秘錄 竹

茹醋浸令人含之嘆其背 牙宣 竹茹當歸尾煎湯
 三過以茗汁漱之 千金 入鹽含漱 永類 飲

酒頭痛 竹茹二兩水五升煮三升入鴉 傷損內痛 兵
 子三枚煮三沸食之 千金 杖

木石所傷血在胸背脇下刺痛用竹茹亂髮各一團
 炭火炙焦為末酒一升煮三沸服三服愈 千金

淡竹瀝 甘大寒治暴中風之痺胸中大熱止煩悶

中

希雅曰：一性滑流利走數逆痰為中風家要藥凡中風之証莫不由于陰虛火旺前熱津液結而為痰壅塞氣道不得升降熱極生風以致猝然僵仆或偏痺不仁此藥能走經絡搜剔一切痰結兼之甘寒能益陰而降熱痰之熱既祛則氣道通利經脈流轉外症自除矣觀古人治中風用一則知中風未有不同陰虛痰熱所致如果外來風邪安得用此甘寒滑利之藥哉

鴻臚曰：凡古名手治中風無不云陰虛人炎乃自生之風非外來之風本何今之庸醫咬定中風二字專用風藥醫者殺人而不顧病者被殺而不怨天哉

希雅曰：同貝母枯樓仁霞天膏白芥子糖子橘紅鬱金香便麥冬治中風口眼喎邪言語蹇澀半身不遂等症

消渴勞復別錄

中風失音不語養血清痰風痰虛痰在

胸膈使人顛狂痰在經絡四肢及皮裏膜外非此不

達不行震亨

治子冒風瘧射罔毒時珍

篋竹瀝 治

風瘧別錄

苦竹瀝 治口瘡目痛明目利九竅別錄功

同淡竹大

治牙疼時珍

發明

弘景曰：凡取竹瀝惟用淡苦篋竹者數曰久渴

不能行諸方治胎產金瘡口瘡與血虛自汗消渴小便多皆是陰虛之病無不用之產後不得虛胎前不

損子本草言其大寒似與石膏黃芩同類而世俗因

弃而不用經云陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰

虛之有大熱寒而能補與山藥寒補義同世人食筍

竹茹並

九十一

但能食者用刺瀝不能食者用竹瀝時珍曰竹瀝性寒滑大抵曰風火燥熱而有痰者宜之若寒濕胃虛腸滑之人服之則反傷腸胃也筍性滑利多食瀉人僧家謂之刮腸篋即此義也神仙傳云姜公服竹汁餌桂得長生蓋竹汁性寒以桂濟之亦與用薑汁佐竹瀝之意相同淡竹令人呼為水竹有大小二種此竹汁多而甘

方 中風口噤

竹瀝薑汁等分

小兒口噤

身熱竹瀝二合暖飲

見兵部手集

產後中風

口噤身直面青手足反張竹瀝飲一二升即醒

梅師破傷

風

凡折傷金刃諸瘡受風發瘡口噤項急甚危急飲竹瀝二三升忌冷飲食及酒竹瀝酒溫飲外臺

小兒傷寒

竹瀝葛根汁各六合細服之

小兒狂語

夜後便發竹瀝與服

至寶方 妊娠胎動

曰火者雖因飲竹瀝一升即愈

孕婦子煩

竹瀝頻飲

常曰涼心鎮肝 又曰片如竹節者真

常曰利氣發痰 希雍曰小兒驚風天吊諸風熱者亦猶大

○梅師方茯苓二兩竹瀝一升水 時氣煩躁 五六日 不鮮竹

瀝半盞煎服厚 消渴尿多 竹瀝恣飲 效嗽肺痿 大人 覆取汗 千金 肘後 小兒

咳逆短氣胸中吸 欬出涕唾嗽出臭膿 竹瀝任飲以愈為度 李緝兵部手集 小兒目赤

竹瀝點之良 丹石發毒 竹瀝頻飲 古今錄驗 同上

竹黃 又名天竺黃 志曰天竺黃出天竺國今諸竹內 注得之人多燒諸骨及葛粉等雜之 大明曰

此是南海邊竹內沙塵結成者 宗奭曰此是竹 內所生如黃土着竹成片者 時珍曰吳僧贊寧

云一一生南海鋪竹中此竹極大又名天竹其 內有黃本草作天竺者非矣 筭竹亦有黃此說

得之

甘寒 天明 治小兒驚風天吊去諸風熱鎮心明目療

竹黃 雷丸

九十二

人熱極生風之症也此藥能除熱養心豁痰利氣心家熱清而驚自平

雷丸 又名雷寶 別錄 雷矢 同上 竹苓

金瘡滋養五臟寶治中風痰壅卒失音不語小兒客

忤攔疾伏粉霜大明制藥毒發熱保昇

發明宗奭曰天竹黃涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也時珍曰一一出於大竹之津氣結成

其氣味功用與竹淮同而無寒滑之害

方 小兒驚熱 天竹黃二錢雄黃牽牛末各一錢研勻麩糊丸粟米大每服三五丸薄荷

湯下 錢 乙小兒方

雷丸 又名雷寶 別錄 雷矢 同上 竹苓

集解弘景曰出建平宜都間葉相連如丸恭曰一一竹之苓也無苗蔓皆零無相連者今出

房州金州時珍曰一一大小如栗狀如猪苓而圓皮黑肉白甚堅實

昂曰功專除熱消積殺虫

布雅曰入手足陽明經其主殺三虫治寸

白虫自由不止者腸胃濕熱甚也逐毒氣

治胃中熱逐邪氣惡風汗出除皮中執結

積者腸胃邪熱甚也一苦寒能除二經

濕熱邪氣則以上諸症自除又曰久服令

人陰痿正見其過于苦寒偏至之氣

又曰同蕪荑使君子蘆薈胡連五穀虫皆

能治小兒疳蚘有神效

李當之云大寒

苦寒有小毒

別錄曰鹹微寒有小毒赤者殺人白者善時珍曰甘微苦平

殺三虫

逐毒氣治胃中熱利丈夫不利女子

本經作摩膏除小

兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒治白

蟲寸蟲自出不止久服令人陰痿

別錄逐風主顛癇狂

走 甄 權

之才曰荔實厚朴蓄根芫花為之使惡葛根數曰凡使用甘草水浸銅刀刮去黑皮破開以甘草水再浸

蒸日乾大

明日炮用

發明弘景曰本經云利丈夫別錄云久服陰痿於事相反志曰經言利丈夫不利女子乃疏利男子

元氣不疏利女子臘氣故曰久服陰痿也時珍曰接

陳正敏遊齊聞覽云楊劭中年得異疾每發語腹中

雷丸

九十三

有小聲應之久漸聲大有道士曰此應聲虫但讀本草取不應者治之讀至一一不應遂頰服數粒而愈

方

小兒出汗

有熱一一四兩粉半斤
為末撲之 千金方

寸白虫

水浸

去皮切焙為末五更時食炙肉少許以稀粥飲下一錢須上半月服虫乃下 經驗

時珍曰脾經血分藥

昂曰北產者良余華者更勝

鳴皋曰亦入肺益肺又益胃肺主皮毛胃主肌肉故發汗家用以行津液也

果部

大棗

又名乾棗別錄

甘平

思邈曰甘辛熱滑果曰甘溫

治心腹邪氣安中養脾氣平胃

氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚

四肢重和百藥

本經

補中益氣堅志強力除煩悶療心

下懸除腸癖久服不飢延年

別錄

潤心肺止嗽補五臟

治虛損除腸胃癖氣和光粉燒治疔痢大小兒患秋

痢與蛙食之良

孟詵

殺烏頭附子天雄毒和陰陽

調營衛生津液

李杲

大明曰有齒病疳病蟲羸人不宜食棗小兒尤不宜食又忌與葱同食令人五臟不和與魚同食令人腰

腹痛

發明

孔景曰——其皮利肉補虛所以合湯皆之也
杲曰——氣味俱厚陽也溫以補不足甘以

緩陰血成無已曰邪在營衛者辛甘以解之故用薑棗以和營衛生發脾胃升騰之氣張仲景治奔豚用

——滋脾土以平腎氣也治水飲腸痛十棗湯益土而勝水也
震亨曰棗屬土而有火味甘性緩甘先入

脾補脾者未嘗用甘故今人食甘多者脾必受病也
時珍曰棗為脾之果脾病宜食之謂治病和藥棗為

脾經血分藥也若無故頻食則生虫損齒貽害多矣
按王好古云中滿者勿食甘令人滿故仲景建中

湯心下痞者減錫棗與甘草同側此得用棗之方矣
又許叔微云一婦病臟燥悲泣不止祈禱備至予憶

古方治此用——湯遂與服盡劑而愈古人識病治方妙絕如此又陳自明云一婦妊娠四五月滿晝則

鳴皋曰大棗湯治臟燥許叔微亦不言其
 義余默思其理肝藏魂肺藏魄肝虛不能
 藏魂則見鬼一婦忽見鬼僧道皆無益余
 與大劑歸地參遂愈此則無故悲傷而
 不見鬼應是肺虛不能藏魄心火又逼金
 余不能平木故悲傷也大棗甘草益脾肺
 小麥涼心此其制方之義歟存以質明者
 又曰反胃一方不可信斑駁專走小腸勝
 眊與腎却與胃大腸無涉用之不能中病
 反成也禍用治小腸氣却相宜

果部

慘感悲傷淚下數欠如有所憑醫巫皆無益或言治
 此須一一湯遂一投而愈方見下條又摘元方治此
 証用紅棗燒存性酒服
 三錢亦一一湯變法也

方 大棗湯 一十枚小麥一升甘草二
 兩每服一兩水煎亦補脾氣 反胃吐食

一箇去核斑蝥一箇去頭翅入在 小腸氣痛 方
 內濕紙包煨熟去蟲空心食之白湯下 同

上用桂心畢澄 大便秘塞 一一枚去核入輕粉半
 茹湯下 直指 錢煨食棗湯下 直指方

煩悶不眠 一十四枚葱白七莖水 耳聾鼻塞 不聞
 三升煮一升頓服 千金 聲音

香臭者 一十五枚去皮核蓖麻子三百粒去皮和
 搗綿裹塞耳鼻日一度三十餘日即效先塞耳後塞

鼻不可並塞 走馬牙疳 新棗肉一枚同黃柏燒焦為
 末油和傅之若入砒少許更

妙 王 諸瘡久壞 不愈者棗肉三升煎
 氏博濟 水洗之取愈 千金

大棗 栗

九十五

弘景曰補腎

鳴皋曰一何嘗有鹹味古人俱云鹹温不知何解

栗

鹹温益氣厚腸胃補腎氣耐飢別錄生食治腰脚不遂

思遜療筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼塗之有效蒸栗蘓

時珍曰一棗三類治骨風痛士活血尤效頌曰今衡

其中痛者栗楔也良山合活血

丹用之每日生食七枚破冷疰癖又生嚼普患刺出箭

頭傳瘰癧腫毒痛大明

發明思遜曰一腎之果也腎病宜食之弘景曰有人患腰脚弱往一樹下食數升便能起行此是補

腎之義然應生嚼宗奭曰一之補腎為其味鹹又滯

其氣也時珍曰有人內寒暴瀉如注食煨一二三十

枚頓愈腎主大便一能通腎於此可驗經驗方治腎虛腰脚無力以袋盛生一懸乾每旦吃十餘箇次吃

節曰小兒多食發瘡

李東垣曰手足厥陰心包肝經血分藥
鳴皋曰一能治血瘀腹脹一小兒腹脹
醫攻補俱無效葉天士與一歸尾小甲
瘰癧等藥遂愈或問之曰絡瘀則脹吾與
通絡也愚按治氣分無效者當治血分凡
病皆然不獨脹也

果部

猪腎粥助之入必強健蓋風乾之一勝於日晒仍須
細嚼連液吞嚥則有益若頓食至飽反傷脾矣宗真

曰小兒不可多食生則難化熟則滯氣
膈食生虫恭曰小兒多食令齒不生

方小兒疳瘡

生一嚼傳
之外台

葦刺入肉

方同上

馬汗入肉

成瘡者
方同上

犬咬成瘡

方同上

金刃斧傷

用獨殼大一研傳
之嚼傳亦可集

簡方血不止

大七枚刺破連皮燒存性入麝香少
許研勻每服二錢水下 聖濟總錄

桃仁

頌曰圃人種桃以他木接成者殊
失本性入藥當用本生者為佳

苦甘平

思邈曰苦甘
辛說曰温

治瘀血之閉癥瘕邪氣殺小蟲

本經止欬逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血通月水止

心腹痛別錄

治血結血秘血燥通潤大便破畜血素殺

栗 桃仁

九十六

三虫孟主血滯風痹骨蒸肝瘡寒熱鬼疰疼痛產後

血病時珍

時珍曰香附為之使又曰行血宜連皮尖生用潤燥活血宜湯浸去皮尖炒黃用或麩炒或燒存性各隨本方雙仁者有毒不可用

發明果曰一苦重于甘氣薄味厚沉而降陰中之陽手足厥陰血分藥也苦以泄滯血甘以生新

血故破凝血者用之其功有四治熱入血室一也泄腹中滯血二也除皮膚血熱燥痒三也行皮膚凝滯之血四也成無己曰肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急食甘以緩之一一之甘以緩肝散血故仲景

抵當湯用之以治傷寒八九日內有畜血發熱如狂小腹痛滿小便不利者又有當汗失汗熱毒深入吐血及血結胸煩躁譫語者亦以此湯主之與蟲虫水蛭大黃同用

希雅曰一善破血凡血結血秘血凝瘀血留血畜血血痛血癢等症用之立通第散而不收瀉而無補過用及用不得當能使血下不止為害非小故凡經閉由于血枯而不由于瘀滯產後腹痛由于血虛而不由于留血結塊大便不通由于津液不足而不由于血熱閉結並忌之

又曰同當歸芍藥澤蘭延胡蘇木五靈脂紅花牛膝生地益母草治產後瘀血并治壯盛婦人經閉 同當歸麻仁地黃麥冬芍藥黃芩肉苁蓉治大腸血燥便秘 同

番降香川通草山查山甲乳香沒藥紅花
川斷當歸治上部內傷瘀血作痛

方 偏風不遂

血滯風痺癱疾用——二十七百枚
去皮去雙仁以好酒一斗三升浸二

十一日取出晒乾研作九梧子大
每服二十九原酒下 外臺秘要 肝瘡寒熱 一一百
共研膏不得犯生水入黃丹三錢九梧子大每服三
九當發日北而温酒下五月五日午時合之忌婦人

雞犬見 唐 上氣欬急 一杏仁各半兩去皮去炒
慎微本草 研水調生麩和九梧子大每

服十九薑蜜湯下 尸疰鬼疰 乃五尸之一又挾鬼邪
微利為度 聖濟 為崇其病變動有三十

六種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉、默不知
所苦而無處不惡累年積月以至於死、後復傳傍

人急以——五十枚研泥水煮取四升 傳尸鬼氣 咳
服之取吐吐不盡三四日再吐 肘後 傳尸鬼氣 咳

疫癘注氣血氣不通日漸消瘦——一兩去皮去
搗碎水一升半煮汁入米作粥空心食 救急方 鬼

症 心 痛 一合爛研煎 卒然心痛 一七枚去皮
湯服之 同上 共研極爛水一

桃仁 九十七

合煎服 產後百病 千金煎治婦人產後百病諸
時後 氣取一 一千二百枚去皮尖雙

仁熬搗極細以清酒一斗半研如麥粥納小瓶中麩
封入湯中煮一伏時每服一匙日再服溫酒下 圖

經本 男子陰腫 作痒用 一 炒香為末酒服
方寸匕日二仍獨傳 外臺 小兒疳

癩方同 風虫牙痛 針刺 一 灯上燒烟出吹滅安痛
牙上咬之不過五六次愈 衛生

家寶 唇乾裂 一 研和猪脂 崩中漏下 不止者桃核燒
傳之 海上方 存性研細酒服

方寸匕日 上氣咳嗽 胸滿氣欬 一 三兩去皮尖以
三 千金 水一升研汁和粳米三合煮粥

食之 卒得咳嗽 一 三升去皮并着器中密封蒸
心鏡方 熟日乾絹袋盛浸二斗酒中七日

可飲日飲 下部虫蠱 病人齒無色舌上白喜睡憤
四五合 不知痛痒處或下痢乃下部生

虫食肚也 一 十五枚苦酒二 大便不快 裏急後重
升蓋一合煮六合服之 肘後 一 三兩

凡瘡痛熱透但不破頭畏刀刺針挑者用
一研取油煎熟點之即破神效 喉源

方

昂曰桃為五木之精其枝葉花仁並能辟
邪殺鬼

果部

去皮吳萸二兩食鹽一兩同炒熟

去鹽萸每嚼一五七粒 總錄 急勞咳嗽 煩熱 一三兩

去皮尖猪肝一枚童便五升同煮乾於木臼內搗爛

入蒸餅和丸梧子大每溫水下三十九 聖惠方

冷勞減食

漸至黑瘦一五百枚吳萸三兩同入銚
中微火炒一炊久將一一去皮微黃色即

漸加火待微烟出即乘熱收入新瓶內厚紙封住勿

令洩氣每日空心取一一二十粒去皮嚼以溫酒下

至重者服五百

粒愈 聖惠方

桃花

苦平殺疰惡鬼

本經

除水氣破石淋利大小便下三虫

別錄 消腫滿下惡氣

蘇頌

治心腹痛及禿瘡

孟詵

利宿水痰

飲精滯治風狂研末傅頭下肥瘡手足癩瘡 時珍

桃花

九十八

發明

時珍曰初學記載北齊崔氏以——白雪與兒
疝面云令面妍華光悅陶弘景蘇頌乃引服——

法不知——性走泄下降利大腸甚快用以治氣

實人病水飲腫滿積滯大小便閉塞者則有功無害

若久服即耗人陰血損元氣豈能悅澤顏面耶按儒

門事親載一婦滑瀉數年百治不效或言此傷飲有

積也——落時以棘鍼刺取數十莠勿犯人手以麩

和作餅煨熟食之米飲送下不一二時瀉下如傾六

七日行至數百行昏困惟飲涼水而愈觀此則——

之峻利可徵矣又蘇鶚杜陽編載一女喪夫發狂閉

之室中夜斷窓檣登桃樹上食——幾盡及旦家人

接下遂愈也珍按此亦驚怒傷肝痰挾敗血遂致發

狂——利痰飲散滯血故有功與張仲景治積熱發

狂用承氣湯畜血發狂用桃仁承氣湯之意相同而

陳藏器云——
食之患淋何耶

方大便艱難

——為末水服方
寸匕即通 千金

產後閉塞

大小便不通

葵子滑石栝榔等分為末
空葱白湯服二錢 集驗
心腹積痛 晒乾為末水服二錢

良孟 瘡疾不已 一為末酒
服良 梅師 痰飲宿水 一散一

末酒服一合取利覺虛食少
脚氣腫痛 一為末酒細呷

粥不似轉下藥也 崔行功
一宿即消 腰脊作痛 一斗一升麴六升米六升
外臺 釀酒每服一升日三神效 千

金 乾薑塞腸 脹痛不通 一濕者一兩和麴三兩作
方 餽飽空心食之日午腹鳴當下惡物也

聖 惠方

桃葉

苦平除尸虫出瘡中小虫 別錄
治小兒寒熱客忤 大療明

傷寒時氣風痺無汗治頭風通大小便止霍亂腹痛

桃葉

鷓臬曰果是真傷寒一汗便解如瘟疫熱
 症服表藥大汗便成壞症以其劫乾胃肺
 津液也今之庸醫不辨瘟疫傷寒拋藥表
 散且云宣通之法無弊病亦以為然至
 死不悟試觀蒸法發汗不過劫其表尚至
 促壽况服藥發汗劫其裏乎可見發汗之
 戒從古已然非余之臆說也

時珍

發明

張文仲備急方治天舒病有
 夫太醫——湯熏法用水二石煮——取七斗
 安床簣下厚被蓋卧床上乘熱熏之少時當雨汗
 遍去湯速粉之并灸大椎穴則愈又陳療邱小品方
 云連發汗：不出者死可蒸之如中風法燒地令熱
 去火以少水洒之布乾——于上厚二三寸安席葉
 上卧之溫覆得大汗被中傅粉極燥便瘡也凡柏葉
 麥麩蠶沙皆可如此法用有人疲極汗出卧簾受冷
 但苦寒倦四日凡八發汗：不出用此法而瘥時珍
 曰許叔微本事方云傷寒病醫者須顧表裏循次第
 昔范雲為梁武帝屬官得時疫熱疾召徐文伯診之
 是時武帝有九錫之命期在旦夕雲恐不預求速愈
 文伯曰此甚易但恐二年後不能起坐耳雲曰朝聞
 道夕死可矣况二年乎文伯乃以火煨地布柏柏葉
 於上令雲卧之少頃汗出粉之翌日即愈後二年果
 卒取汗先期尚能促壽况不顧表裏時日便欲速愈

者乎夫——發汗妙法也猶有此戒可不慎歟

方 二便不通

——杵汁半升服
冬用榆皮 千金 霍亂腹痛
升切水

煮服

外臺方 除三尸虫

——杵汁服一
升 外臺秘要 腸痔出虫
斛杵納

小口瓶中生蒸之

有虫自出 肘後 女人陰痒
如虫交痒痛者——生
傷綿畏寒之日三四易

食

療方

枝及白皮

時珍曰樹皮根皮皆可用根皮尤
良取東行者刮去粗皮取白皮用

苦平除邪鬼中惡腹痛去胃中熱
別錄 治疰忤心腹痛

鮮薑毒辟疫癘黃疸身目如金殺諸瘡虫
時珍

方 天行疫癘

常以東行桃枝煎
湯浴之 類要 黃疸如金
清明時
清晨勿

桃枝及白皮

一百

令婦人雞犬見取東引根細如筋如釵股者一握切細以水一大升煎一小升空腹頓服後三五日其黃雖如薄雲最百日方平復也黃散後可時飲清酒一杯則眼中易散否則散遲忌食熱麪猪魚等物此是徐之才家秘方

初實世必效

鬼疰心痛

東引桃枝一握去粗皮水一升煎半升頓服

崔氏蠱毒

東引桃白皮烘乾大戟斑蝥去足翅等分為末以冷水服半方寸匕即出不出更服因酒

得酒服食得食服初實世云此李饒州法也亦可以米泔丸服

下部蠱瘡

桃白

皮煮濃汁如柿錫入熊胆少許以綿蘸藥納瘡中

梅師口瘡成蠱

桃枝煎濃汁含之類要

婦人經閉

數年不通面色萎黃唇口青白腹內成塊肚上筋起腿脛或腫桃根煎湯主之用桃

根牛蒡根馬鞭草根牛膝蓬蘽各一斤剉以水三斗煎一斗取汁更以慢火煎如錫收之每熱酒調服一

是聖惠

鳴皋曰痘癩發癩一方未見有用者存以
備驗按症屢發癩像絕症惜未試此方也

鳴皋曰凡中邪、瘡皆肝病——主之宜
是肝經藥
果部

桃膠 頌曰仙方服膠法取二十斤袋盛入櫟木灰汁
一石中煮三五沸掛高處候乾再者凡三度晒

乾蜜丸酒服二十
丸久服身輕不老

苦平下石淋破血治中惡疰忤 蕪恭主惡鬼邪氣 孟和

血益氣治下痢止痛 時珍曰采得以紫
時 灰湯浸過晒乾用

方 石淋作痛 服日三當下石盡則止 錄驗血
如棗大夏以冷水冬以湯和

淋作痛 石膏木通各一錢 產後下痢 裏急後重
水煎服 楊氏家藏方 腹痛

焙炒蒲黃沉香等分為末每 痘癩發癩 黑陷者
服二錢米飲下 婦人良方 煎湯飲之或

水熬成膏酒化服
之大效 總微論

桃烏 又名桃奴 別錄 桃景同上 神桃家寶 別錄曰
桃實着樹經冬不落者正月采之中實者良

桃膠 桃烏

百一

〔馮昇曰〕觀——治腹痛心痛肺氣破伏梁結氣是行氣分主吐血衄振下血破血是走血分

〔希雍曰〕桃為五木之精最辟邪——着於樹上最久得氣尤全苦溫之性又能通滯

散邪其治血之功與桃仁同

〔又曰〕——假存性同棗灰蒲黃木沙星為

末臨卧以童便調服三錢小便解色漸淡

為度治內傷吐血神效 同菴降香辰沙

治鬼擊吐血

苦微溫有小毒殺百鬼精物本經殺精魅五毒不詳療

中惡腹痛別錄頌曰胡洽治中惡毒氣蠱疰有——湯治肺氣腰痛破血

療心痛酒磨暖服大主吐血諸藥不效燒存性研末

米湯調服有驗汪穎治小兒虛汗婦人妊娠下血破伏

梁結氣止邪瘡燒烟熏痔燒黑油調傅小兒頭上肥

瘡軟癰時珍

方 伏梁結氣在心下不散——三兩為末鬼瘡

二七枚為末水丸梧子大朱砂為衣每服一丸侵晨而東井華水下 聖濟

本草方藥彙要卷六目錄

果部

杏仁

烏梅 白梅

橘皮

青皮

橘葉

柿乾

霜蒂

木瓜

山查

梨

枇杷葉 實

白果

石榴

花皮根

胡桃

龍眼

荔枝

核殼

橄欖 核

榧子

海松子

枳椇子

藕節

蓮子

薏

蓮鬚

蓮蓬殼

荷葉

茨實

勃躑

慈菇

甘蔗

西瓜

皮子

甜瓜

子

瓜蒂

菱

穀菜部

粳米

米泔

糯米

飴糖

穀牙

小麥

麥粉

麥牙

秫米

蕎麥

苡仁

黑大豆

大豆黃卷

糟豆

豌豆

刀豆

赤小豆

扁豆

花葉

綠豆

粉皮

豆豉

脂麻

火麻仁

造釀部

神曲

紅曲

酒

醋

菜部

韭

葱

子葉汁鬚

薤

蒜

大蒜

胡荽

薑

皮

二

乾薑

山藥

百合
山丹

萊菔子

芥子
白芥子

蔓菁
子 根 葉

冬瓜
皮 子

絲瓜

元素曰入手太陰肺經

神曰肺虛咳嗽者酌用 又曰一紫堯
並能解肺鬱利小便

鳴皋曰一亦能吐人一婦病顛癩見鬼
神百治不效強余開方余亦無法姑開

一兩以塞責服之竟大吐得愈

布菲曰雷鳴者大腸不和也喉痹者火炎

乘金也產乳金瘡指為風寒所乘者言也

心寒貴脈者心虛而腎邪凌之也驚癩者


疫熱感也搃之取其下氣消痰溫散甘和

苦沒潤利之力也

果部

本草方藥參要卷六

如皋戴鳴皋著



東部

杏仁

時珍曰雙仁者有毒殺人可毒狗

甘苦溫冷利有小毒

震亨曰性熱因寒者可用

治欬逆上氣雷鳴

喉痹下氣產乳金瘡寒心貢脈

本經

驚癩心下煩熱風

氣往來時行頭痛解肌消心下急滿痛殺狗毒

別錄解

錫毒

治

腹痹不通發汗主溫病脚氣咳嗽欬促入

天門冬煎潤心肺和酪作湯潤聲氣

權除

肺熱治上

焦風燥利胸膈氣逆潤大腸氣秘

元素

殺虫治諸瘡

杏仁

鳴皋曰肺與大腸為表裏一氣相通者也故大腸氣秘宜開通肺氣嘗見一人服大劑承氣湯數帖竟不能通一醫重用杏仁遂連前藥注下吳又可曰肺與大腸譬如碗水壺有二孔按其一孔則涓滴傾不出故開則傾出矣可謂妙論

希難曰——溫散肺經風寒滯氣殊效第陰虛咳嗽忌之風寒外邪非壅逆肺分欲急急促者不得用產乳金瘡非風寒擊襲者不得用驚瀾喉痹亦非必須之藥用者詳之

青門胃
之上一口
紅門即

消腫去頭面諸風氣瘡泡

特珍

徐之才曰得火良惡黃芩黃芪葛根畏藜草思邈曰——作湯如白沫不解者食之令氣壅身熱湯經宿者動冷氣弘景曰湯浸去皮尖炒黃或用麩炒時

珍曰治風寒肺病藥中有連皮尖用取其發散

發明 元素曰——氣薄味厚濁而沉墜降也陰也入手太陰經其用有三潤肺也消食積也散滯氣

也果曰——散結潤燥除肺中風熱效嗽——下欬

治氣也桃仁療狂治血也俱治大便秘當分氣血晝

使難行陽氣也夜便難行陰血也故虛人便秘不可

過泄脉浮者屬氣用——陳皮脉沉者屬血用桃仁

陳皮手陽明與手太陰為表裏貴門主往來魄門主

况閉為氣之通道故並用陳皮佐之好古曰仲章麻

黃湯及王朝奉治傷寒氣上欬逆並用——者為其

利氣瀉肺解肌也時珍曰——能散能降故解肌散

風降氣潤燥消積治傷損藥中用之治瘡殺虫用其

毒也按醫餘云凡索麩豆粉近——則爛頃一兵官

食粉成積醫師以積氣丸一
相半研為丸熟水下數服而愈

方 萬病丸

治五勞七傷一切諸疾一斗二升
童便者七次以蜜四兩拌勻再以童便

五升於碗內重蒸取出日晒
夜露數日任意食之 傳信 補肺丸 治咳嗽一以
童便浸之春夏

七日秋冬二七日研取汁微火煎如麩
糊攤器上晒令可丸茶酒任下 傳信 久患肺氣 喘
急

款甚者不過二劑即瘥一
日三四換半月後取出焙研每服一棗大薄荷一

葉蜜一匙前 款逆上氣 一三升去皮尖炒黃研膏
服 勝金 入蜜一升杵和含化 千金

肺病咯血 一四十箇以黃蠟炒黃研入青黛一錢
作餅用柿餅一箇破開包藥紙裹煨熟食

丹 卒不小便 一二七枚去皮尖炒
黃研米飲下 錄驗 血崩不止 甜

一黃皮炒存性為末每服
三錢空心酒下 保壽堂 穀道蟲痛 一研膏
杏仁 傳 肘後 陰瘡

果部

鳴泉曰肺病咯血用黃蠟炒一與威喜
丸用黃蠟同義說見苦蠟
鳴泉曰卒不小便一方與大腸氣閉開肺
同義

鳴泉曰痔瘡腫痛用苦一研泥入少麩為餅貼瘡生之甚效

好古曰烏梅脾肺二經藥鳴泉曰酸走筋肝主筋酸為木肝胆為甲乙木亦為肝胆

經藥

希雅曰經云熱傷氣邪客于胸中則氣上逆而煩滿心為之不安一味酸能斂浮熱能吸氣歸元故下氣除煩滿安心也

爛痛

研膏傳之風虫牙痛
透取汁頻漱千金目

中赤脉

痒痛初生杏子取仁一升五銖錢七枚入瓶內蜜封埋門限下百日化為水取點聖濟

目中努肉

漸覆瞳仁一去皮二錢半針入肉內
賦粉半錢研勻點之同上

一研以車脂調貼自出瑞竹堂

犬咬傷

嚼爛鮮狂犬毒
研水

和服

千金方一切食停

氣脹滿一三百粒巴豆三十粒同炒色變去巴豆不用研一為

末橘皮湯下楊氏家藏

諸瘡腫痛

杏仁研膏入輕粉麻油調搽神效鮑氏

烏梅

時珍曰造法取青梅藍盛於突上熏黑若以稻灰淋汁潤濕蒸過則肥澤不蠹

酸温平瀼

寒

下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯

杏仁去死肌青黑痣蝕惡肉

經本

去痺利筋脉止下痢

本草曰和紫薇煎湯解傷寒時氣瘧瘧大能作汗

昂曰治虛勞骨蒸者亦取其酸收

又曰凡為疔瘡嗽失血等症初起皆忌用

又曰多食損齒傷筋經曰酸走筋病母多食酸

鳴泉曰多食妨小便利昂曰蛇上攻而拉什為蛇厥虫得酸則伏故仲景有蛇厥烏梅丸

昂曰食梅齒齩者嚼胡桃肉即解衣上生毒點梅子煎湯洗之葛衣最佳

鳴泉曰烏梅飲肺性大急用宜斟酌又曰凡少年人筋與骨相著甚緊故肢體無疼痛之患老人血不榮筋故筋縱弛不能束

骨肢體所以痛也烏梅之止肢休痛乃縱弛之痛非受寒濕之痛希雍謂濕氣侵于經絡之痛誤矣

又曰烏梅之止瀉痢仍是斂肺之功肺氣散不能攝大腸故瀉痢不止斂其肺則氣能攝下故瀉痢止非瀉腸也

果部

烏梅白梅

好唾口乾別錄水漬汁飲治傷寒煩熱弘景止渴調中去

痰治瘡癩止吐逆霍亂除冷熱痢藏器治虛勞骨蒸消

酒毒令人得睡和建茶乾薑為丸服止休息痢大驗

明飲肺溼腸止久嗽瀉痢反胃噎膈虬厥吐利消腫

涌痰殺虫解魚毒馬汗毒硫黃毒時珍

白梅又名鹽梅霜梅時珍曰取大青梅鹽汁漬之日晒夜漬十日成矣久乃生霜

酸醎平和藥點痣蝕惡肉弘景刺在肉中者嚼傅之即

出孟詵治刀箭傷止血斫爛傅之大明乳癰腫毒杵爛貼

之佳汪穎除痰蘇頌治中風驚癇喉痺痰厥僵仆牙關緊

烏梅白梅

又曰烏梅之止吐逆有捷效

又曰煮烏梅犯銅器服之惡吐人

希雅曰素問云味過于酸肝氣以津又云

酸走筋之病無多食酸以肝主筋性喜升

散酸味斂束是違其性也病當發散者咸

忌之

鳴皋曰肝喜升散然有肝陰大虛以致肝

陽不斂強橫克土亦當食酸以斂之位之

以甘所謂甘酸能化陰也故亦治虛勞胃

蒸

鳴皋曰凡吐逆由于肝橫犯脾胃者烏

梅長于治吐逆是伐木以平土也足証其

為肝胆藥

閉者取梅肉搯牙齦涎出即開又治瀉痢煩渴霍亂

吐下下血之崩功同烏梅

時珍

果曰烏梅白

發明

弘景曰生梅烏梅白梅功應相似好古曰烏梅

脾肺二經血分藥也能收肺氣治燥嗽肺欲收

急食酸以收之時珍曰烏梅白梅所主諸病皆取其

酸收之義惟仲景治蚘厥烏梅丸及虫蠹方中用之

者取虫得酸即止之義稍有不同耳醫說載魯公

荆血百餘日國醫不能療陳應之用鹽梅肉一枚研

爛合臘茶入醋服之一啜而安大丞梁莊肅公亦痢

血應之用烏梅胡黃連竈下土等分為末茶調服亦

效蓋血得酸則斂得寒則止得苦則瀉故也其蝕惡

瘡努肉雖是酸收却有物理之妙劉子涓鬼方用

烏梅肉燒存性研傅惡肉上一夜立盡聖惠用烏梅

和蜜作餅貼者其力緩按楊起簡便方云起臂生一

瘡百日方愈中有惡肉突起如蚕豆大月餘不消醫

治不效因閱本草得此方試之一日夜去其大半再

鳴皋曰：日生瘰癧，一於銅器中煎膏，照之。

希雅曰：烏梅同川連、白芍、滑石、甘草、蓮肉、白扁豆、葛根、升麻、紅曲、橘紅作丸，治滯下如神。一味作湯代茶，治火炎頭痛。治暑氣霍亂，白梅一箇搗爛入絲瓜葉一葉或扁豆葉再搗爛，用新汲水調灌即解。

果部

上一日而平乃知世有奇方如此

方 諸瘡努肉 見發 喉痺乳蛾 水梅丸用青梅二十箇，鹽十二兩，淹五日。

取梅汁入明礬三兩，桔梗白芷防風各二兩，猪牙皂角三十條，俱為細末，拌汁和梅入瓶，收之，每用一枚。

噙嚙津液中風痰厥牙 泄痢口渴 烏梅煎湯代茶 關不開用此擦之尤佳 扶壽精方 產

後痢渴 烏梅二十箇，麥冬十二分，水煎細呷，必效方 赤痢腹痛 直指用白梅同臘茶

蜜水煎飲 〇聖惠用烏梅肉炒，川連各四兩，為末，密丸，桐子大，米飲下二十丸 便痢膿血 烏

肉燒存性為末，米飲 久痢不止 賜培已出肘後，用烏梅肉二十箇，水一盞

煎服分二服 〇袖珍方用烏梅白梅各七箇，搗爛入乳香末少許，丸服茶下 大便下血 烏

燒存性醋煮米和丸 尿血 方同 血崩不止 烏梅燒存性七箇，米

烏梅白梅

四

飲下日 大便不通 魚奔欲死烏梅十箇取肉湯浸 霍

亂吐利 蓋梅煎水細 虻虫上行 出于口鼻烏梅煎湯 頻飲即安 食鹽本

草 水氣滿急 烏梅大棗各三枚水煎 梅核膈氣 取半 青半

黃梅子每箇用鹽一兩淹一晝夜晒乾又浸又晒至 水盡乃止用清錢三箇夾二梅線縛定入罐內埋地

下百日取出每用一箇含嚥汁入喉即消收 一年者治一人二年者治二人神妙 龔氏 勞瘡劣

弱 烏梅十四箇豆豉二合桃柳枝各一虎口甘草 三寸生薑一塊童便煎減半服即止 圖經 久

嗽不已 烏梅肉微炒粟殼去筋膜蜜炒 金瘡 烏梅燒 等分為末睡時蜜湯下二錢 灰存性

研調傅一宿 指頭腫毒 痛甚者梅肉和魚鮓搗 小兒 即瘥 千金 李樓奇方

頭瘡 烏梅燒末生油 聖濟 調傅之

果曰脾肺二經氣分藥
昂曰脾為氣母肺為氣翁凡補藥清藥必
佐此以利藥

橘皮

又名陳皮 食療時珍曰一一下氣消痰其肉生
痰聚飲表裏之異如此

集解

時珍曰一一紋細色紅而薄肉多筋脈其味
辛苦柑皮紋粗色黃而厚肉多白膜其味辛

甘柚皮最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋其味

甘多辛少一一性溫柑柚皮性冷今多以柑柚皮

雜之柑皮猶可用柚皮則懸絕矣凡一一入和中

理胃藥則留白入下氣消痰藥則去白去白者以

白湯入盪洗潤透刮去筋

膜晒乾用亦有煮焙者

苦辛溫治胸中痰熱逆氣利水穀久服去臭下氣

本經

下氣止嘔欬治氣衝胸中吐逆霍亂療脾不能消穀

止洩除膀胱留熱停水通淋利小便去寸白虫

別錄清

痰涎治上氣咳嗽開胃主氣痢破癥瘕瘰癧

甄權治反

昂曰人身以氣為主氣順則濕除濕除則百病散故一一能除濕兼能發表散寒者皮能達皮膚也

又曰大法治痰以健脾順氣為主故潔古云一一軟穀利其氣而痰自下

希雍曰痼者假也如痞滿鬱悶之類鳴舉曰痼應是痼痼之痼作積聚解食物積聚胸中成痼而作熱一一利導下積則痼散而熱除

希雍曰脾為運動糜物之臟氣滯則不能消化水穀為吐逆霍亂泄瀉等症一一苦溫能燥脾家之濕使滯氣運行諸症自已矣肺為水之上源肺氣舒則津液貫輸氣化運動故膀胱留執停水五淋皆通也

又曰氣虛氣不歸元者忌與耗氣藥同用胃虛有火嘔吐者忌與溫熱香燥藥同用陰虛咳嗽生痰者不宜與星夏厚同用瘧非寒其亦勿與

馮舉曰參芪得之可陳其滯地黃得之可去其泥大抵一一利陽分之氣香附利陰

胃嘈雜時吐清水痰痞痰瘕大腸閉塞婦人乳癰入

食料鮮魚腥毒

發明 果曰一一氣薄味厚陽中之陰可升可降為脾肺二經氣分藥留白則補脾胃去白則理肺氣

同白朮則補脾胃同甘草則補肺獨用則瀉肺損脾其體輕浮一能導胸中寒邪二破滯氣三益脾胃加青皮減半用之去滯氣推陳致新但久服多用能損元氣也原曰一一能散能瀉能溫能補能和化痰治

嗽順氣理中調脾胃快膈通五淋療酒病其功當在諸藥之上時珍曰一一苦能泄能燥辛能散能溫能和其治百病搃是取其理氣燥濕之功同補藥則補

同瀉藥則瀉同升藥則升降藥則降脾乃元氣之母肺乃攝氣之籥故一一為二經氣分之藥但隨所配而補瀉升降也潔古云陳皮只殼利其氣而痰自下

蓋此義也同杏仁治大腸氣閉同桃仁治大腸血閉皆取其通滯也詳見杏仁下按方洵泊宅編云一一

分之氣也

布雜曰同人參首烏桂枝當歸薑皮治三

日瘧熱少寒多者 同白蘞生薑藿香半

夏治胃有寒痰傷冷嘔吐不止 同參朮

茯苓甘草山藥白蘞藿香麥牙山查扁豆

治脾胃虛飲食不化或不欲食亦無味

同藜子貝母枇杷葉麥冬桑皮沙參枯

椹五味百部治上氣欬嗽能消痰下氣

同尺壳烏藥檳榔木香草果治氣實人暴

氣壅脹 同蒼朮厚朴甘草為平胃散

果部

寬膈降氣消痰飲極有殊功他藥貴新惟此貴陳一

人得疾食已即胸滿不下百方不效偶家人合橘紅

湯因取嘗之似相宜連日飲之一日忽覺胸中有物

墜下大驚目瞪汗出如雨頃刻腹痛下數塊如鉄彈

子真不可聞自此胸次廓然頓愈蓋脾之冷積也其

方用——一斤去白甘草薑花各四兩水五碗慢火

煮乾焙研為末白湯點服各二賢散治一切痰氣特

驗世醫但知半夏南星之屬何足以語此哉珍按二

賢散丹溪變之為潤下丸用治痰氣有效

惟氣實者服之相宜氣不足者不宜用

方 潤下丸 治濕痰因火泛上停滯胸膈欬唾稠粘

草二兩去皮蜜炙研末蒸餅和丸 治脾氣不

和冷氣容

于大每白湯下百丸 丹溪 **寬中丸** 治脾氣不

於中過而不通是為脹滿——四兩白朮二兩為橘

末酒丸 梧子大木香湯下三十丸日三 指迷方 橘

皮湯 治傷寒并一切雜症嘔噦手足厥冷者方

用——四兩生薑一兩水煎徐呷 仲景 **霍亂**

橘皮

六

吐瀉 將死但有一點胃氣存者服之再生 一 去白五錢真霍香五錢水煎時 溫服 百一選方

○一方 **經年氣嗽** 一 神曲生薑等分為末蒸餅丸加甘草 梧子大每服三五十九食後夜卧

各一服有人患此服之舊患 **脚氣衝心** 或心下結硬勝脫氣皆愈 冠氏衍義 一 一斤杏

仁五兩加蜜搗丸桐子大每 **老人氣悶** 方同上 **風痰麻**食前米飲下三十九 食療

木 凡手臂麻木皆是濕痰死血用 一 一斤逆流水五碗煮爛去渣再煮一碗頓服取吐不吐加瓜蒂

乃吐痰聖藥 **脾寒諸瘧** 不拘老少孕婦兩服便止 一 去白切生薑自然汁浸過也 摘元

一指銀器內重湯煮乾焙研每服三錢用隔年 **小兒** 青州棗十枚水一盞煎半盞發前以棗下之

疳瘦 久服消食和氣長肌肉用 一 一兩川連以米泔浸一日一兩研末入射香三分用猪胆或藥

以漿水煮熟取出以粟米飯和丸綠豆大 **產後尿閉** 每服一二十九米飲下 錢氏小兒方

元素曰入厥陰肝少陽胆經果曰足厥陰
 引經藥靈草曰入肝胆二經氣分
 昂曰柴胡疎上焦肝氣青皮疎下焦肝氣
 凡瀉氣藥皆能瀉肺
 人曰入肝散邪入脾除痰瘡家必用之品
 故清脾飲以之為君
 果部

不通者一兩為末每空心服二錢
 酒下即通此張不愚方也 婦人良方 產後乳吹

一兩甘草一錢 水煎服即效 乳癰 未成者即散已成者即消痛極
 者即不痛神效 用真一湯浸

去白晒麩炒微黃為末每服二錢 射香調酒下名橘香散 張氏方 諸氣呃噫 兩去白

水一升煎五合頓服或加 只殼尤良 孫尚藥方 卒然失聲 除呬 肘後

反胃 真一以日照西壁土炒香為末每服二 錢生薑三片棗一枚水煎減半服 直指 大腸

氣閉血閉 見發 明下

青橘皮 時珍曰乃橘之未黃而青者薄而光氣芳烈
 今多以小柑小橙偽之不可不辨湯浸去瓢

切片醋拌 炒過用

苦辛溫 治氣滯下食破積結及膈氣 頌破堅癖散滯

青皮 橘葉

七

希雅曰：一性最酷烈，則堅破滯是其所長，然誤服損真氣為害非淺，凡欲施用，必與參朮芍藥等補脾藥同用，不可單行也。

昂曰：最能發汗者，皮能達皮，辛能發散也。
鳴皋曰：一發汗不過謂其辛能發散耳。

氣去下焦，諸濕治左脇，肝經積氣。元治胸膈氣逆，脇

痛并小腹疝氣，消乳腫，疏肝胆，瀉肺氣。時珍

發明 元素曰：青皮氣味俱厚，沉而降陰也。入厥陰少陽經，治肝胆之病。杲曰：青皮乃足厥陰引經藥，能引食入太陰之倉，破滯削堅，皆治在下之病。有滯氣則破滯，氣無滯則損真氣。好古曰：陳皮治高青皮治低，與枳殼治胸膈，枳實治心下，同意。震亨曰：青皮乃肝胆二經氣分藥，故人多怒有滯氣，脇下有鬱積或小腹疝疼，用之以疎通二經行其氣也。若二經虛者當先補而後用之。又云：疎肝氣加青皮炒黑則入血分也。時珍曰：青皮古無用者，至宋始用之。其色青氣烈味苦而辛，治之以醋，所謂肝欲散急食辛以散之，以酸泄之以苦降之也。陳皮浮而升入脾肺氣分，青皮沉而降入肝胆氣分，一體二用，物理自然也。小兒消積多用青皮，最能發汗有汗者不可用。說出楊仁齋直指人罕知之。嘉謨曰：久瘧熱甚必結癍塊。

亦不得與羌防輩同論也然下焦有表裏不通者正可假其辛散之力若羌防輩只能發上焦之汗

希雍曰同人參繫中能消瘡母 同只壳

川芎肉桂治左脇痛 同人參白朮三稜

我遂阿魏繫紅山查紅曲木香消瘡癖氣

塊及一切肉食堅積

昂曰丹溪云乳房屬陽明乳頭屬厥陰乳母或因忿怒鬱悶厚味醱積致厥陰之氣果部

宜多服清脾湯內有青皮
疎利肝邪則癖自不結也

方 快膈湯

治冷膈氣及酒食後飽滿用青皮一斤
作四分四兩薑浸四兩酒浸四兩白沸

湯浸四兩醋浸各三日取出白切絲以薑一兩微炒焦每用二錢以茶末五分水煎溫服 **理脾**

快氣

青皮一斤日乾焙研甘草末一兩檀香末半兩和勻服之每用一二錢入薑少許白湯點服

法製青皮

常服安神調氣消食解酒益胃青皮一斤浸去苦味去瓢藍花五兩炙草六兩茴香

四兩甜水一斗煮之不住攪勿令著底候水盡慢火焙乾勿令焦去甘草茴香只取青皮收用 王氏易

簡方 瘡疾寒熱

青皮一兩燒存性研末發前酒服一錢臨時再服 聖惠 傷寒呃逆

登聞四鄰四花青皮全者研末 產後呃逆 青皮為末 每服二錢白湯下 醫林集要 蔥白童便

童便煎二錢服 乳岩 日久積憂鬱乳房內有核如指 經驗後方 大不痛不痒五七年後成癯名

橘葉

八

不行故穀不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有其子有滯痰腸熱含乳而嘔嘔氣致成結核者初起便須忍痛揉軟吮令汁透自可消散治法以青皮球肝氣石膏清胃熱甘草節行濁血瓜萎消腫導毒或加橘葉金銀花蒲公英皂刺當歸佐以少酒若於腫處灸三五壯尤捷久則凹陷名乳岩不可治矣

時珍曰橘核入足厥陰肝經

希雅曰橘核味苦溫而下氣所以能入腎與膀胱除因寒所生之病也

震亨曰厥陰肝經行經藥

曰乳岩不可治也用青皮四錢水煎徐

徐服之日一服或酒服亦可 丹溪

橘核

時珍曰用時以新瓦焙香去殼取仁研碎入藥

苦平治腎症腰痛膀胱氣痛腎冷炒研溫酒服一錢

或酒煎服 大 小腸疝氣陰核腫痛炒研五錢老酒煎

服或酒丸服甚效

時珍

發明 時珍曰一入足厥陰與青皮同功故治腰痛瘡疝在下之病和劑局方治諸疝痛及內瘡疔

腫偏墜或硬如石或腫至潰有

凡用之有效品味頗多詳見本方

方 腰痛

杜仲各二兩炒研末每服二錢鹽酒下 簡便方

橘葉

布羅曰橘葉古今方書不載能散陽明胃厥陰滯氣婦人妬乳內外吹乳、瘰乳石用之皆效以諸症皆二經所生之病也

時珍曰脾肺血分之果噶暴曰固大腸

昂曰肺與大腸相表裏臟清則腑熱亦除故能治腸風臟毒痔漏等症

噶暴曰柿霜之生痰實甚暴最喜食之故知其生痰過甜故也大約少用入藥則甘能益肺胃之陰涼燥則惟有動痰何能化痰

果部

柿俗字 本作柿 俗字亦

苦草導胸膈逆氣入厥陰行肝氣消腫散毒乳癰脇

痛用之行經震亨

方 肺癰 綠一洗搗絞汁一盞服之 吐出膿血即愈 經驗良方

柿乾

甘平瀉補虛消腹中宿血瀉中厚腸健脾胃氣說開

胃瀉腸消痰止渴治吐血潤心肺治肺痿心熱咳嗽

潤聲喉殺虫大明治反胃咯血、淋腸癖痔漏下血時珍

柿霜清上焦心肺熱生津止渴化痰寧嗽治咽喉口

舌瘡痛時珍

柿乾霜蒂

九

鳴皋曰柿餅甘能益胃陰性能降氣大凡反胃多因肝陽上冲胃陰大虧胃家津液愈吐愈涸食入不能滑下故復嘔出也柿餅甘以蓋其津液降以安其逆氣故主之若同青黛用更妙

發明 時珍曰 一乃脾肺血分之果也其味甘而氣平性滑而能收故有健脾澀腸治嗽止血之功

蓋大腸者肺之合而胃之子也真正柿霜乃其精液

入肺病上焦藥尤佳按方洵泊宅編云一人病臟毒

下血凡半月自分必死得一方只以一一燒灰飲服

二錢遂愈又王璆百一方云一人病下血十年亦用

此方一服而愈為散丸皆可與本草治腸澼消宿血

解熱毒之義相合則柿為太陰血分之藥蓋可徵矣

又經驗方云有人三世死於反胃至孫得一方用乾

柿餅同飯日食之絕不用水飲遂愈此又一徵也

宗奭曰生柿同蟹食令人腹痛作瀉時珍曰一人食

蟹多食紅柿入夜大吐繼之以血昏不知人或云惟

木香可解磨

汁灌之即愈

方 腸風臟毒 方說 小便血淋 葉氏燒 一為末米

花烏豆煎湯 見上 湯下〇經驗 一盞

入墨汁服之 小兒秋痢 一入粳米煮 反胃吐食 一

烏梟曰觀產後效逆一方則柿餅亦治效
逆與柿蒂同也

烏梟曰效逆大約因痰阻氣逆者多嘗用
橘皮青皮旋覆花等藥獲效甚眾症當用
溫補者頗少

鳴皋曰一下人呃逆半載余用代指旋覆
湯為之降痰鎮逆而愈兒子錫爵幼時呃
逆竟日不止及睡默更甚呃逆一聲手足
抽動床帳皆搖余濃煎橘皮湯服之而愈
此皆痰阻氣逆者也又見一老人因病後
果部

三枚連蒂打爛酒服甚效
勿以他藥雜之 同上
痰嗽帶血 破開入真青黛
煎湯飲 產寶 賺瘡不

一錢卧時食之薄
產後效逆 氣亂心煩
煎湯飲 產寶 賺瘡不

合 柿霜柿蒂等分燒研
傳其效 筆峰雜興

柿蒂

潘平治效逆噦氣煮汁服

發明 丹溪曰人之陰氣依胃為養土傷則木挾相火
直冲清道而上作效逆古人以為胃寒既用了

香一一不知其孰為補虛孰為降火不能清氣利痰
惟有助火而已時珍曰效逆者氣自臍下冲脉直上

至咽膈作呃忒蹇逆之聲也朱肱南陽書以噦為效
逆王履源洄集以效嗽為效逆皆誤矣噦者乾嘔有
聲也效逆有傷寒吐下後及久痢產後老人虛人陰
氣大虧陽氣暴逆自下焦逆至上焦而不能出者有

木瓜

十

呃逆半月不止一醫用參芪補劑而愈此
即丹溪所云土傷則木挾相火直冲清道
而上者也愚謂無論祛痰補中總當以降
氣為主其偏熱偏寒之症却不多見果遇
其症當審諦明確乃可用偏熱偏寒之藥
鳴皋曰偏熱偏寒之症一一俱可加用

呆曰入手足太陰肺脾血分宗莖曰酸能
入肝時珍曰一一脾胃藥

昂曰脾主四肢或寒濕傷於足絡或胃受
濕熱之物上輸於脾下流至足則成脚氣
惡寒發熱狀類傷寒第腫掣痛為異耳
宜利濕清熱忌用補劑及淋洗

傷寒失下及平人痰氣遏抑使然者當視其虛實陰
陽或溫或補或泄熱或降氣或吐或下可也古方單
用一一煮汁飲取其苦溫能降逆氣也濟生一一散
加以丁香生薑之辛熱以開痰散鬱蓋從治之法而
昔人亦常用之收效矣潔古又益以人參治病後虛
人效逆亦有功丹溪但執以寒治熱之理而不及從
治之法橋枉之過矣若陳氏三因又加以良
薑之類是真以為胃寒而助其邪火者也

方 欬逆不止

濟生一一散欬逆胸滿用一一丁香
各二錢生薑五片水煎服或為散點

服○潔古加人參一錢治虛人欬逆○衛生
寶鑑加青皮陳皮○王氏易簡加半夏生薑

木瓜

又名楮 音茂爾雅

酸溫

思邈曰酸
鹹瀋溫

治濕痹脚氣霍亂大吐下轉筋不止

錄別 治脚氣冲心取嫩者一顆去子煎服佳強筋骨下

常曰酸則飲：則化故能消食與山查同
酸能生津故止渴香薷飲用之取其能和
脾去濕

鄭奠一曰：酸收之品世用治水腫誤
矣一人買一數百置舟中舉舟皆病溺
不得出醫用通利藥不效予曰但去一
則溺出矣果然

鳴皋曰：強筋骨者能飲縱弛之筋與烏梅
同說見烏梅

鳴皋曰：古人多用一治水腫蓋水腫原
于脾濕脾濕則氣滲散酸以斂之則氣聚
而脾健脾健則腫消矣第一款水腫不宜
用酸收似亦不然古人既舉其功必有所
試矣

希雍曰：酸能斂濡滿之濕

昂曰：夏月暑熱濕邪傷脾胃陽不升陰不
降則霍亂吐瀉

果部

冷氣止嘔逆心膈痰唾消食止水利後渴不止 飲

服之 器 止吐瀉奔豚消水腫冷熱痢心腹痛 明調營

衛助穀氣 去濕和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下

煩痞 好 聖曰勿 犯鐵器

發明 景曰：一入手足太陰血分氣脫能收氣滯能
和弘景曰：一最治轉筋如轉筋時呼其名及

書土作一：字皆愈此理亦不可解 宗奭曰：一得
木之正酸能入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力皆

不可缺也人以鉛霜塗之則失酢味且無渣蓋受金
之制也 時珍曰：一主霍亂吐利轉筋脚氣皆脾

胃病非肝病也肝雖主筋而轉筋則由濕熱寒濕之
邪襲傷脾胃所致故筋轉必起於足脾：及宗筋皆

屬陽明：一治轉筋非益筋也理脾而伐肝也土病
則金衰而木盛故用酸溫以收脾肺之耗散而藉其

木瓜

鳴皋曰令人癢閉者自係多用所致

希雅曰得白扁豆藿香茯苓橘皮白梅人
參白朮甘草砂仁香薷治傷暑霍亂吐瀉
不止同當歸石斛牛膝川斷芍藥橘皮治
血虛轉筋 同薏仁白朮茯苓五加皮石
斛川蘇黃柏治濕熱脚氣 同人參茯苓
麥冬藿香白朮竹茹枇杷葉治胃虛嘔吐
一一味為末白湯吞三錢日五服治楊
梅結毒有效

走筋以平肝邪乃土中瀉木以助金也木平則土得
令而金受癢矣素問云酸走筋病母多食酸孟詵
云多食一一損齒及骨皆伐肝之明驗而一一入手
足太陰為脾肺藥非肝藥益可徵矣又針經云多食
酸令人癢閉酸入于胃其氣滯以收兩焦之氣不能
出入流入胃中下去膀胱胞薄而軟得酸則縮卷約
而不通故水道不利而癢滯也羅天益寶鑑云太保
劉仲海日食蜜煎一一三五枚同伴數人皆病淋以
問天益天益曰此食酸
所致也但奪食則已

方 項強筋急

不可轉側肝腎二臟受風也用一一
一箇去殼入沒藥二兩乳香二錢半

蓋好縛定飯上蒸爛研膏每用三錢入生地汁半盞
無灰酒化溫服〇許叔微云有人患此自午後發日
暮時定予曰此必先從足起火陰之筋自足至項筋
者肝之合今日中至黃昏陽中之陰肺也自離至兌
陰弱陽旺之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝
氣弱肝腎二臟受邪故發於此時余授此方及都梁

丸服之而愈
脚氣腫急
一切囊盛踏之一人患脚
氣腫痛因附舟以足閣一袋

本方
上漸不痛問之乃一也及歸製
囊盛一踏之遂愈
名醫錄
小兒洞痢
汁服

干霍亂轉筋
服仍煎湯浸青布裹腿
聖惠
霍亂

腹痛
一枚煎服
同上
方
四蒸木瓜丸
治肝腎三
經氣虛為

風寒暑濕相搏流注經絡凡遇氣化更變七情不和
必致發動或腫滿或頑痹憎寒壯熱嘔吐自汗用宣

一四箇切蓋挖空一箇入黃芪川斷末各半兩一
箇入烏藥茯神心木末各半兩一箇入蒼木橘皮末

各半兩一箇入威靈仙苦草藤子末各半兩以原蓋
蓋定酒浸透蒸晒三浸三蒸三晒搗末以榆皮末水

和丸梧子大每服五十九
酒盞湯任下
御藥院方
反花痔瘡
魚身上涎調貼

紙護住

醫林集要

山查

希雍曰入足陽明太陰胃脾二經
鳴皋曰兼入肝經血分

寫皋曰
檀俗說
為查作
山查仍
俗也

昂曰消油膩腥羶之積與麥牙消殺
積者不同又曰凡服人參不宜者服一
即解較勝於萊菔子

鳴皋曰目生痰肉厚錢許山查於銅器內
熬膏點之俟痰肉退去七八分再以烏梅
膏點之一膏似峻利於烏梅膏

希雍曰脾胃有積滯則成下痢產後惡露
不盡畜於太陰部分則為兜枕痛一能
入脾胃消積滯散宿血故治水痢及產婦
痛塊也又曰如脾胃虛有積滯者當與補

藥兼行

鳴皋曰凡腰膝痛多由筋鬆不能束骨所
致一味酸亦能斂筋故治腰痛

鳴皋曰前汁色媽紅凡色紅者皆入

山查 又名山檀 音湛唐本赤瓜子同上靛檀同上
檀危氏枕子郭璞羊棕唐本棠棣子圓經山裏

果食難時珍曰赤
瓜當是赤棗之訛

酸冷 時珍曰甘 煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡痒唐
酸微温

煮汁洗漆瘡多瘡 景弘 治腰痛有效 頌 消食積補脾治

小腸疝氣發小兒瘡疹 吳 健脾行結氣治婦人產後

兜枕痛惡露不盡煎汁入沙糖服之立效 震 化飲食

消肉積癥瘕痰飲痞滿吞酸滯血痛脹 時 珍 化血塊氣

塊活血 原

發明 震亨曰大能尅化飲食若胃中無食積脾
虛不能運化不思食者多服則反伐脾胃生發

之氣時珍曰凡脾弱食物不化胸腹酸刺脹悶者每食後嚼二三枚絕佳但不可多用恐反耗伐也凡煮老雞硬肉入一二枚則易爛則其消肉積之功可知矣余鄰家一小兒因食積成黃腫腹脹如鼓偶往羊枕樹下取食之至飽歸大吐痰水遂愈羊枕乃山楂同類醫家不用而有此效則其功應相同矣

方 偏墜疝氣 一內茴香炒各一兩為末糊丸梧子大每服百丸空心白湯下 衛生

易 老人腰痛 及腿痛用一二鹿茸灸等分為末丸梧子大每服百丸日二服 腸風下

血 用寒藥熱藥及脾胃藥俱不效者獨用一乾者為末艾湯調下應手而愈 百一 痘疹不

快 乾一為末湯點服 痘疹黑陷 危困者一二肉為之立出紅活 危氏 末紫草煎酒調服

一錢 全

幼心鑑

山查核 化食磨積治癩疰

時珍

梨

十三

鳴皋曰：寒能清肺火，甘能益胃陰，二經邪熱必用之。

鳴皋曰：王尚書鼎在翰林時病熱，症自以為傷寒，服善附遂牙關緊閉，角弓反張，友人鹿君治之以梨漿灌之，用梨數百乃愈。周公履諫亦病熱，醫與肉桂服數劑，遂舌焦口乾，神昏如寐，不能言動，不大便，其棺以待矣。余以生地數斤，搗汁灌之，盡劑目漸動，知索水，余憶鹿君言，令以梨汁與。

梨

甘微酸，寒。治熱嗽，止渴，切片貼湯火傷，止痛，不爛。茶

治客熱中風不語，治傷寒熱發，解丹石熱毒，驚邪利。

大小便開除眠風，止心煩，氣歇熱，狂作漿吐，風痰。大

卒暗風不語者，生搗汁服，胸中痞塞熱結者，宜多食。

之益潤肺，涼心，消痰，降火，解瘡毒，酒毒。時

發明時珍曰：古人于一多言其害，陶隱居言一不入藥，蓋古人論病多主風寒，用藥多是桂附，故不

知一有治風熱，潤肺，涼心，消痰，降火，解毒之功也。今人痰病火病，十居六七一之有益，不為一，但不宜過耳。按類編云：一士人狀若有疾，厭一無聊，往謁楊吉老，診之曰：熱證已極，氣血消鑠，三年當以疽死，不可。

之日飲十餘盞漸知索梨食乃與以甘寒

之藥十餘劑而復生計食梨亦百數也

昂曰搗汁用熬膏用並良加薑汁蜂蜜能

清痰止咳惟脾虛泄瀉者忌之

鳴皋曰凡瘟疫熱症內邪熾其燥乾胃液

津液則死矣止傷寒無汗瘟疫有汗庸醫

復汗之遂至津液隨汗走液愈枯火愈

熾雖亟與水灌不能下也最宜於熱症

以其真能抑邪解毒甘能益胃陰而保津

液也古法用大黃謂急下以救陰然大黃

雖法非其健絡傷胃陰非病大勢急不輕

用口又曰熱症而腹不固者亦不宜烈

成旁流

又曰生食瀉胃熱而清肺熬膏則甘能益

胃而補肺惟有滑腸之弊用者防之

希雅曰入手太陰肺足陽明胃經

希雅曰經曰請送上衝掌厲火：煎上炎

則為卒嘔不止啞音噦也其聲濁惡而長

果部

為也士人不樂而去聞茅山有道士醫術通神乃衣

僕衣詣之願執薪水之役久之以實白道士診之笑

曰汝但日食好梨一箇如生梨已盡取乾者泡湯食

渣飲汁疾自平士人如其教一歲復見吉老吉老曰

君必遇異人士人備告吉老吉老乃望茅山拜

自咎其學之未精也觀此則一之功豈小補哉

方消渴

化服 汁熬膏水 普濟

卒得效嗽

搗汁一椀入椒 四十九粒煎一沸

服 崔元

亮海上方

中風失音

搗汁一盞飲 日二 食療

小兒心臟

風熱 昏

躁悶搗汁入粳

米煮粥食

反胃吐食

汁一椀丁香 十五粒煎服

赤目腫

痛

汁一鍾川連末半兩輕粉一 字和勻汁中點之 聖惠方

枇杷葉

苦平

權曰甘 微辛

治卒嘔不止下氣煮汁服 別錄 治嘔噦不

枇杷葉實

經曰樹枯者葉落病深者聲啞病者見此
為危證——善下氣：下則火不上升
而胃安故卒吮止也其治產後口乾及消
渴飲嗽氣急脚煎上衝皆取其下氣之功
又佐以補陰之藥治婦人發熱飲嗽經事
先期

昂曰氣有餘便是火：則生痰氣順則火
降火降則痰消

止婦人產後口乾

大

煮汁飲主渴疾治肺氣熱嗽及

肺風瘡胃面上瘡

孟詵

和胃降氣清熱解暑毒療脚氣

時珍

恭曰拭去毛不爾射人肺令嗽不已毀曰濕葉重一

兩乾者三葉重一兩乃為氣足每兩以酥二錢半塗

灸用時珍曰治胃病以薑汁塗

灸治肺病以蜜塗灸用乃良

發明

時珍曰

病大都取其下氣之功耳氣下則火降而痰順

火降痰順則逆者不逆嘔者不嘔渴者不渴嗽者不

嗽矣宗奭曰治肺熱嗽甚有功一婦人患肺熱久嗽

身熱火炙肌瘦將成癆以——木通款冬花紫苑

杏仁桑白皮各等分大黃減半如常治訖為末蜜丸

櫻桃大食後夜卧各含

化一丸未終劑而愈

希雅曰得生地麥冬白芍杞子桑皮童便
 茅根天冬菟子五味桔梗根治陰虛咳嗽
 吐血 同竹茹木瓜蘆根石斛麥冬人參
 茯苓治胃熱嘔吐加童便人乳竹瀝菟子
 白芍燕漿治噎膈 同人參白芍茯苓竹
 茹橘紅菟子麥冬木瓜治妊娠惡阻

時珍曰入肺經

鳴皋曰一一入肺而收斂肺氣當云固氣
 不當云益氣也惟其固氣故多食難兼肺
 果部

方 卒呃不止 煮汁服 溫病發噦 因飲水多者
別錄 去毛炙茅根各

用半斤水四升煎二升 反胃嘔逆 兩人參二兩每服
 稍飲之 龐安常

三錢水一盞薑三 衄血不止 一二錢佳 同上方
 片煎服 聖惠

上風瘡 溫酒下二錢日三 本事
梔子各等分為末

實 甘酸平止渴下氣利肺氣止吐逆主上焦熱潤

五臟 大明

說曰實溫多食發痰熱傷脾同
 炙肉及熟麪食令人患熱黃疾

白果 又名銀杏 日用鴨脚子

核仁 甘平苦澆 時珍曰熟食微甘 生食降痰解酒
小苦性溫有小毒

白果 十五

為水之上源肺蒸暢則水道長——之縮
小便有速效為能固瀉肺氣也

又曰賽神出會有辨抬閣者用童男女縛
于抬閣之上從早至晚恐其小便但與白
果食之便不小便

又曰腎為肺之子肺氣固則能攝腎氣故
止白濁

熟食益人 李廷 熟食溫肺益氣定欬嗽縮小便止白

濁生食降痰消毒殺虫嚼漿塗鼻面手足去鼓炮野

鰾皴皴及疥癬疔毒陰虱 時 多食壅氣動風小兒多

食昏霍發驚引疔同鰾食患軟風 吳

發明 時珍曰 銀杏宋初始著名近時方藥亦時用之
其氣薄味厚性溫而收色白屬金故能入肺經

益肺氣定欬嗽縮小便生搗能浣油膩則其去痰濁
之功可類推矣其花夜開人不得見蓋陰毒之物故

又能殺虫消毒然食多則收令太過令人氣壅臃脹
昏頓三元延壽書言——食滿千箇者死又云有飢

者同以——代飯
飽食次日皆死也

方 寒嗽痰欬 ——七枚煨熟以熟艾作丸每果
入艾一丸濕紙包再煨香去艾吃之

鳴皋曰：一定嗽湯與麻黃蕪子款冬並用一水一散一降最得製方之妙又佐以半夏桑皮之去痰水杏仁之利氣黃芩之降火故效也

〔鳴皋曰〕肺氣耗散之嗽款可用肺氣壅實之嗽款用之宜慎

必效方 嗽痰嗽 鴨掌散 一箇麻黃二錢半炙草

嗽 一二十一枚炒黃麻黃三錢蕪子二錢款冬花法製

甘草一錢水三鍾煎二鍾分二服 並攝生方 效

嗽失音 一斤煮熟日乾為末以乳汁半碗拌濕九蒸

九晒丸綠豆大每服五十丸神效 余居士方 小便頻數 半煨食之取效

小便白濁 生一十枚 搗水飲之 赤白帶下 下元虛憊 一蓮

椒一錢半為末烏骨雞一隻 去腸入藥煮爛食之 集簡腸風下血 出火食之 頭

面癬瘡 生一研塗 下部疔瘡 同上方 陰毛生虱 不

可忍 一嚼塗 劉長春方 乳癰潰爛 以四兩研塗 救急良方

白果 石榴

十六

腸風臟毒 一四十九枚去殼生研入百藥煎末和丸彈子大每服二三丸空心細嚼米飲送

下治

證要訣

石榴

又名安石榴別錄若榴廣雅丹若古今註金罌

時珍曰博物志漢張騫出使西域得安石

國榴種以歸故名安石榴筆衡云

五代吳越王錢鏐改榴為金罌

集解

頌曰有甘酸二種甘者可食酸者入藥

宗奭曰酸一一入藥收留陳久者佳

酸溫瀼治赤白痢腹痛連子搗汁頓服一枚

誦 止瀉

痢崩中帶下

時珍

發明

時珍曰一一其味甘酸其氣溫瀼具木火之象

故多食損肺齒而生痰涎酸者則兼收斂之氣

故入斷下崩中之藥或云白榴

皮治白痢紅榴皮治紅痢亦通

馮景曰痢疾腹痛腸胃有滯也當用瀼法不得再用瀼劑用治久痢久泄則有理

馮舉曰向飲齋醫道好嘗語予曰一一

浸水則黑二腎之色故大能補腎不知此

言何所據茲閱本草甄權治筋骨腰脚之

說或補腎之功與

昂曰瀉痢至於脫肛者石榴皮以陳壁土

炒如明礬少許煎濃重洗再以五倍子炒

研敷托而上之

方 腸滑久痢

黑神散酸一一一箇煨烟盡出火毒
一夜研仍以酸一一一塊煎湯服

神效 久瀉不止

方同 並普濟

石榴皮

酸瀉止下痢漏精

別錄

治筋骨風腰脚不遂行步攀急

疼痛澀腸取汁點目止淚下

權

煎服下蛭虫藏止瀉

痢下血脫肛崩帶

時珍

方 久痢

一一一燒存性為末米飲下方寸匕
時後○寒滑者加附子赤石脂 小兒

風癩

石榴一枚去頂挖空入全蝎五枚黃泥
包煨存性為末防風湯下半錢 聖濟 脚肚生

瘡

初起如粟搔之漸開黃水浸淫痒痛潰爛遂至繞
脛用酸一一煎湯日二掃之取愈 醫學正宗

石榴皮根花

昂曰客坐新聞云一人患腹脹一醫診之曰飲食如常非水腫蟲脹乃濕熱生虫之象也以一一一皮椿東引根皮檳榔各五錢空心服腹大痛瀉出長尺餘遂愈

鳴皋曰觀經閉一方豈石榴根亦能破瘀行血歟觀東垣赤石脂云胎胞不下難消劑可以下之又云國腸胃有收滯之能下胎胞無推蕩之峻夫石脂瀉劑也而能下胎胞則榴皮之通經或此理歟故存此方以俟試驗

久瀉久痢 陳一 一 培研細末每服二錢米飲下有患二三年百治不效者服之神效 普濟

石榴東行根 治蛇虫寸白 別錄 治口齒病 頌 止瀉痢崩帶功與皮同

珍時

方 金蚕蟲毒 吃礬味甘嚼黑豆不腥者即是中蟲也 一一一皮煎濃汁服即吐出

活蠱無不愈者 見朱丹溪摘元方 寸白蛇虫 水三升煎半蠱五更溫服盡至明取出出一大團遂愈食粥補之

崔元亮海上方用榴皮煎水煮粥食亦良 女子經閉 酸 一一一 一握炙乾水煎濃

赤白久痢 方同上 空心服之未通再服 斗門方

石榴花

時珍曰——命門三焦藥也補腎

昂曰——皮軟肺定款固腎瀉精若用之得當勝於金櫻蓮瀉也

又曰——肉多服亦動風痰助腎火有痰火積熱者少服又曰——連皮同燒酒嚼三枚果部

陰乾為末和鉄丹服一年能變白髮如漆藏器○鉄丹鉄粉之

千葉者治心熱吐血研末吹鼻止衄立效傳金瘡

出血頌 燕

方 金瘡出血 一——半斤石灰一升搗和陰乾每用少許傳之立止 崔元亮 鼻

衄 一——二錢半黃蜀葵花一錢為末水煎服效乃止 聖濟 九竅出血 揉塞之

可 葉亦

胡桃 又名核桃

仁 甘温頌曰 熱食之令人肥健潤肌黑鬚髮利小便

去五痔燒存性和松脂研傳療瘰瘡開 寶令人能食通

胡桃

六

能久戰

鳴皋曰嘗見一人患腹瀉參朮無靈將死
醫令服青娥丸而愈兩月以後健而且肥
先大司馬體執素偏於陽因暑月遠行
患痢計日餘亦未服藥痢止而大虧患海
瀉身進青娥丸五服而全愈大司馬仍
服不輟諫不聽半月後得頭眩痰撮藥始
愈

潤血脉

孟說

治傷損石淋同破故紙蜜丸服補下焦

頌

補氣養血潤燥化痰益命門利三焦溫肺潤腸治虛

寒喘嗽腰脚重痛心腹疝痛血痢腸風散腫毒發痘

瘡制銅毒

時珍

油胡桃殺虫攻毒治癰腫癩風癬楊

梅白禿諸瘡

時珍

發明

韓愈曰

破故紙屬火能使心包與命門之火相
通——屬水主潤血養血：屬陰惡燥故

油以潤之佐故紙有木火相生之妙故古有云黃柏

無知母破故紙無——猶水母之無蝦也時珍曰三

焦者元氣之別使命門者三焦之本原蓋一原一委

也命門指所居之府而名為藏精繫胞之物三焦指

分治之部而名為出納腐熟之司蓋一以體名一以

用名其體非脂非肉白膜裹之在七節之旁兩腎之

間二系著脊下通二腎上通心肺貫屬於腦為生命
之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆
由此出靈樞本臟論已著其厚薄緩結之狀而扁鵲
難經不知原委體用之分以右腎為命門謂三焦有
名無狀而高陽生偽撰脉訣承其謬說以誤後人至
朱肱南陽活人書陳言三因方論戴起宗脉訣刊誤
始著說闕之而知之者尚少一一仁頗類其狀而外
皮水汁皆青黑故能入北方通命門利三焦益氣養
血與破故紙同為補下焦腎命之藥夫命門氣與腎
通藏精血而惡燥若腎命不燥精血內充則飲食自
健肌膚光澤腸腑潤而血脉通此一一佐補藥有令
人肥健能食潤肌黑髮固精治燥調血之功也命門
既通則三焦利故上通於肺而虛寒咳嗽者宜之下
通於腎而腰脚虛痛者宜之內而心腹諸痛可止外
而瘡腫之毒可散矣勇堅志止言一一治痰嗽能敏
肺蓋不知其為命門三焦藥也洪邁云邁有痰疾因
晚對上諭令以一一內三枚生薑三片卧時嚼服即
飲湯兩三呷又嚼桃薑如前數即靜卧必愈邁如言
胡桃

新羅朝
鮮地

服之及旦而痰消嗽止又溧陽洪氏幼子病痰嗽凡
五晝夜不乳食醫以危告其妻夢神授方令服人參
一湯遂取新羅人參寸許一一肉一枚煎湯一瓊
殼灌之嗽即定明日以湯剥去一一皮用之嗽復作
仍連皮用信宿而疹蓋人參定嗽一一連皮能斂肺
也油一一有毒傷人咽肺外科取之用其毒也一一
制銅此又物理
之不可解者

方 青娥丸

見破故
紙下

胡桃丸

益血補髓強筋壯骨延
年明目能除百病一一

仁四兩搗膏故紙杜仲草薜各四兩為末丸
梧子大酒盞湯任下五十九 御藥院方 老人欬

嗽 氣促睡卧不得服此立定一一肉帶皮杏仁去皮
尖生薑各一兩搗研入蜜少許為丸彈子大卧時

嚼下
普濟方

血崩不止

一一肉五十枚灯上燒存性研
作一服空心温酒調下神效 石

淋痛楚

尿中有石子者一一肉一升細米煮漿粥一
升相和頓服即瘥 崔元亮海上方中載

寫鼻曰便毒初起一方經仲淳云與山甲
全蝎同服更妙鼻嘗見一賊僕患便毒用
胡桃連殼炙全蝎燒存性服即愈乃知散
腫毒之文非誣也

急心痛

一肉一枚大棗一箇去核夾一紙裹煨
熟生薑湯一鍾細嚼送下永久不發名蓋落

湯趙

便毒初起 儒門事親用一七箇燒存性研
酒服不過三服效○楊氏經驗用

一箇食之即愈

三箇夾銅錢 一切癰腫 未成膿者一十箇煨
熟去殼槐花一兩研末

杵勻熱酒調服

古今錄驗

疔瘡惡腫

一箇平破取仁嚼爛
安殼內合在瘡上類換取

效 痘瘡倒陷

一箇燒存性乾胭脂半錢研勻
胡荽煎酒下 此方見儒門事親

消腎溢精

一丸治消腎病因房慾無節及服丹石
或失志傷腎遂致水弱火強口舌乾精自

溢出或小便赤黃大便燥實或大小便大利而不甚
渴用一肉白茯苓各四兩附子一枚去皮切片薑

汁蛤粉同焙為末蜜丸桐子大 風寒無汗 發熱頭痛

每服三十九丸米飲下 普濟方

白細茶生薑等分搗爛水煎

熱服覆衣取汗 談堊翁方

龍眼

常曰——心脾二經之果

常曰——養心葆血心為脾母故歸脾湯用之亦治腸風下血又曰心生血脾統血思慮過多則心脾傷而血耗致有健忘怔忡驚悸諸症歸脾湯能引血歸脾而生補之腸風亦由血不歸脾而妄行

龍眼

又名龍目 吳普益智別錄 亞荔枝 開寶比目 吳普驪珠 燕外 蜜脾 鮫淚 南方草

木狀圓

眼俗名

實

甘平

蒸曰

治五臟邪氣安志厭食除蠱毒去三

蟲久服強魂聰明

別錄

開胃益脾補虛長智

時珍

發明

時珍曰嚴用和濟生方治思慮勞傷心脾有歸脾湯取甘味歸脾能益人智之義

方 歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸用——肉酸棗仁炒黃

芪炙白朮焙 茯苓神各一兩 木香半兩 炙甘草二錢半 咀切每服五錢 薑三片 棗一枚 水二鍾煎一鍾溫服

濟

生方

荔枝

又名離枝 綱目

昂曰：一少食亦可補中，多食發病動履。
執鼻切牙疼之患。

馮春曰：嘗遇一外科李君，奏技甚效。學

曰：凡腫毒初起，無論輕重，但以公丁香

一兩二味研得，無不消者。此言可與丹法

相發明，若與白梅同用，更妙。

實

甘平

璣曰：甘酸

止渴益顏色

開寶

益智健氣

孟詵 治瘰

癰疔贅赤腫疔腫發小兒痘瘡

時珍

發明

丹溪曰：一屬陽主散無形質之滯氣，故疣贅赤腫者用之，苟不明此，雖用之不應。時珍曰：一

氣味純陽，其性熱鮮者，食多即齧腫，口痛或衄血

也。病齒齲及火病人尤忌之。按物類相感志：食

多則醉以殼浸水飲之，即解。此即食物不消，還以本

物消之之意。頌曰：食一過度飲蜜漿一杯，即解

方 痘不起發

一肉浸酒飲之，忌生冷。聞人規痘疹

疔瘡惡腫

白

梅肉各三箇，搗貼瘡上，根即出也。濟生秘覽

風牙疼痛

一連殼燒存性，研末擦牙即止。乃

治諸藥不效之

呃逆不止

一七箇連皮核燒存性，為末白湯下即止。醫方

仙方也

普濟

摘要

荔枝核殼

時珍曰荔枝核入厥陰肝

希雍曰其氣溫而通行入肝腎散滯氣辟寒邪

又曰同牛膝補骨脂延胡合歡子茴香木瓜杜仲橘核川蘇治風氣執音加黃柏寒者加桂

核 甘溫瀼治心痛小腸氣痛以一枚煨存性研末

酒調服

宗

治癩心氣痛婦人血氣刺痛

時珍

發明

時珍曰

核入厥陰行散滯氣其實雙結而核肖峯丸故其治癩心疔腫有述類象形之義

方 脾痛不止

荔枝核為末醋服二錢即愈 衛生易簡方

婦人血氣刺痛

荔枝核燒存性半兩香附一兩炒為末 癩心 孫氏用每盞湯下二錢名礪痛散 婦人良方 荔枝核

炒存性大茴香炒等分或加青皮為末每服一二錢酒下○皆效方玉環來笑丹荔枝核四十九箇陳皮連

白九箇硫黃四錢鹽水麩打糊為丸綠豆大每痛時空心酒下九九良久再服神效

殼

治痘瘡出不快煎湯飲之解食荔枝熟浸水飲

時珍

橄欖

又名青果 梅聖愈集 忠果 記事珠 諫果 農書

酸甘温

震亨曰 酸澆甘

生食煮食並消酒毒解鯀鮎魚毒

開寶

嚼汁燕治魚鯀

宗

能解諸毒

蘇頌

開胃下氣止瀉

大明

津液止煩渴治咽喉痛咀嚼嚙汁解一切魚鱉毒

時珍

發明

志曰 鯀鮎即河豚誤食其肝及子迷悶至死惟

浮出物之相畏有如此者時珍曰 名醫錄云 一人食

鯀魚被鯀不上不下半月餘將死一漁人令食

時無此果以核研末急流水調下骨遂下而愈按延

壽書云食

不病疔宗奭曰 性

熱多食能致上壅

燒研猪

下部疔瘡

研末油調傳

橄欖核推子

二十二

之或加孩兒茶
乾坤生意

核 磨服治鯁及食鱈成積又治小兒痘瘡倒壓燒

研服之治下血

時珍

方 腸風下血

橄欖核灯上燒存性研末每服二錢陳米飲下 仁齋直指

陰腎

癩腫

橄欖核荔枝核山查等分燒存性研末每服二錢茵香湯調下 乾坤生意

榧實

又名榧子 神農本草日用 玉榧同上 玉山果 時珍曰 玉山縣者佳故名

甘平瀟

瑞曰 性熱

治五痔去三虫盡毒鬼疰惡毒

別錄

白虫

弘景

消穀助筋骨行營衛明目輕身令人能食

孟詵

多食滑腸五痔人宜之

宗真

治咳嗽白濁助陽道

生編

震亨曰入肺大腸

鳴皋曰一一味甘微瀟自係性平若云溫

尚可謂其性熱則非也丹溪云多食引火

入肺謂其走肺亦未嘗謂其性熱至于終

仲淳同其治五痔則為苦寒能去濕熱之

說更為妄矣大抵一一之性平溫而能以

通為用故能入腸治痔入肺治吐血也

果部

鳴泉曰一一為松之實故性能去風凡
駢風藥多燥以此加入頗相宜為其甘溫
滋潤能益血也若恃此以逆原痺知其

鳴泉曰一一潤肺瀉大腸兼能補心

發明

丹溪曰一一肺家果也但多食則引火入肺大
腸受傷耳原曰一一殺腹虫大小虫小兒黃瘦

有虫積者宜之東坡詩云駢除三彭虫已我心腹疾

是矣瑞曰同鷲肉食生斷節風又上壅人時珍曰物

類相感志云一一同甘蔗食其渣

自軟又云一一皮反綠豆能殺人

方寸白虫

孟詵曰日食一一七枚七日後虫皆化
為水〇外臺用一一百枚火燃啖之胃

弱者五

好食茶葉

方同上楊
起簡便方

卒吐血

先食蒸餅一
二筒以一一

末白湯點服三錢日

尸咽痒痛

言語不出一一半兩
燕羨一兩杏仁桂各

三服 聖濟總錄

半兩為末密丸焚

子大含嚙

同上
海松子 珣曰出遼東新羅甘美甚香亦出雲南似巴
豆其味不及多食發熱毒

甘小温治頭眩去骨節風潤五臟不飢

開 逐風痺補

榧子 海松子 枳椇子

二十三

力所勝任矣
鳴皋曰多食飽食亦能生痰

汪昂曰一仁一兩胡桃肉二兩鍊蜜丸
治肺燥咳嗽

不足虛羸少氣潤皮膚別錄主諸風溫腸胃李珣潤肺治

燥結欬嗽時珍同柏子仁治虛秘宗奭

方小兒寒嗽或作壅欬用一仁五十箇百部炒麻黃蜜炙各三錢杏仁四十箇去

皮尖以少水略煮三五沸化白糖丸艾子大每食後含化十九大妙錢乙小兒方大便虛秘

一柏子仁麻子仁等分研泥溶蠟丸梧子大每服五十九黃芪湯下名三仁丸寇氏

枳椇子又名陸機詩疏蜜屈律廣記木蜜拾遺
木餽同上木珊瑚廣志雞距子蘇文木名析

雜批
棋音

甘平治頭風小腹拘急唐本止渴除煩去膈上熱潤五

臟利大小便功用同蜂蜜枝葉煎膏亦同葺止嘔逆

解酒毒辟蟲毒時珍

發明 震亨曰一男子三十餘因飲酒發熱又兼房勞
虛乏乃服補氣血藥加葛根以解酒毒微汗出
反懈熱如故此乃氣血虛不禁葛根之散也遂於煎
藥中加一一解其毒乃愈時珍曰按東坡集云揭
穎臣病消渴日飲水數斗飯亦倍進小便頻數服消
渴藥日甚延張肱診之曰君幾誤死取麝香當門子
以酒瀉作十許丸煎一一湯吞之遂愈問其故肱
曰消渴消中皆脾弱腎敗土不制水而成今穎臣脾
脉極熱腎脉不衰當由酒果過度積熱在脾所以多
食多飲、多溲不得不多非消渴也麝香壞酒果一
一能勝酒故假二物以去其酒果之毒也頌曰若
以其木為柱則屋中之酒皆壞張肱曰屋外有此樹
屋內釀酒多不佳孟詵
詵曰多食發蛇蠍

水果部

時珍曰：主心脾血分之疾。

常曰：生甘寒涼血散瘀止渴除煩解酒鮮毒熱甘溫益胃補心止瀉止怒。

常曰：辛中毒箭者，汁飲多，益善方見。

藕 其根一其實蓮其中葍、中葍郭璞云蓮乃房也葍乃子也葍乃中心苦葍也。

甘平治渴散留血生肌久服令人心歡別錄止怒止洩。

消食解酒毒及病後乾渴葍搗汁服止悶除煩開胃。

治霍亂破產後血閉搗膏普金瘡并傷折暴痛蒸煮。

食之大能開胃明大生食治霍亂後虛渴蒸食甚補五。

臟實下焦同蜜食令人腹臟肥不生諸虫孟說汁鮮射。

用毒蟹毒徐之才

蟄音勸
血葉也

發明弘景曰宋時大官作血蝟庖人削一皮誤落血中遂散淚不凝故醫家用以破血多效也說曰

產後忌生冷獨一不同生冷者為能破血也時珍

曰一之所主皆心脾血分之疾與蓮之功稍不同。

〔昂〕藕節治瘧功用同藕

方 恃氣煩渴

生一汁一盞生蜜一
合和勻細服 聖惠 傷寒口乾 生一汁

汁童便和服

霍亂吐利

生一搗汁

產後悶亂

血氣

見麗氏傷寒論

聖惠

上衝

口乾腹痛梅師用生一汁三升隔熱水令温飲

小便

之○麗安時用一汁生地汁童便等分温服

熱淋

一汁生地汁葡萄

墜馬血瘀

積在胸腹唾血者 乾一為末酒服

千金

食蟹中毒

一汁解之

上焦痰熱

一汁梨汁各半 蓋和服 簡便

方

藕節

〔大明曰〕 伏硫黃

瀉平消瘀血解熱毒產後血悶和地黃研汁入熱酒

小便飲

大能止

瘀血唾血之淋溺血下血之痢血崩

時

珍

藕節

字五

時珍曰——脾之果也。鳴皋曰亦補心。
昂曰黑而沉水者為石——清心除煩開

發明 時珍曰 一男子病血淋痛脹祈死予以藕汁調
髮灰每服二錢三日而血止痛除宋孝宗食蟹

成痢國醫不能治高宗偶見一小藥肆名問之遂診
脉曰此冷痢也用新藕節搗爛熱酒調下數服遂愈
大抵藕能消瘀解熱開

胃而又解蟹毒故也

方 吐衄不止 藕節杵汁 便血 藕節晒乾為末人參
飲之良 白蜜煎湯調服二錢

全幼 暴吐血 雙荷散用藕節荷葉各七箇以蜜少
許搗爛水二鍾煎八分去滓溫服為

末丸服亦可 遺精白濁 心虛不寧金鎖玉關丸用藕
節蓮鬚蓮子肉芡實山藥白

茯苓茯神各二兩為末用金櫻子二斤搗碎以水熬
膏入少麩和藥丸梧子大每服七八十九丸米飲下

普濟 鼻淵腦瀉 藕節川芎焙研為末每
服二錢米飲下 同上

蓮子 蒟爾推藪 同上音吸 水芝 本經澤芝 古今注石
蓮子別錄

胃進食專治噤口痢淋濁諸症

甘平瀉

時珍曰嫩藹性平石蓮性温

補中養神益氣力除百病久

服耐老不飢

本經

主五臟不足傷中益十二經脉血氣

孟詵

止渴去熱安心止痢治腰痛及泄精多食令人歡

喜明

交心腎厚腸胃固精氣強筋骨補虛損利耳目

除寒濕止脾泄久痢赤白濁女人帶下崩中諸血病

時珍

安靖上下君相火邪

嘉謨

發明

時珍曰一一味甘氣温而性瀉稟清芳之氣得

稼穡之味乃脾之果也脾者黃宮所以交媾水

火會合木金者也土為元氣之母二氣既和津液相

成神乃自生久視耐老此其權輿也昔人治心腎不

交勞傷白濁有清心蓮子飲補心腎益精血有瑞蓮

丸皆得此理藏器曰經秋正黑石一一入水則沉惟

蓮子

二六

果部

昂曰肆中所市石蓮產廣東樹上不可入
藥真石蓮落田野中百年不壞人得食髮
黑不老

煎藍鹵能浮之煎園人以之試鹵蓮浮至頂鹵乃可
煎說曰諸鳥猿猴取得不食藏之石室內人得三百
年者食之永不老也時珍曰今藥肆一種石一狀
如土石不知何物又曰得茯苓山藥白朮枸杞子良

方 清心寧神

石一兩去皮留心同為末
入龍腦點湯服 寇宗奭

補虛損

水芝丹一兩半升酒浸二宿以猪肚一箇洗淨入

一在內縫好煮熟取出晒乾研末米糊丸梧子大每

服五十九食前溫酒下 醫學發明 小便頻數 下焦真氣虛弱者 遺精

白濁 石一兩龍骨益智仁等分為末每服二錢米飲下 普濟用石蓮肉茯苓等分為末湯調

痢噤口 石蓮肉炒為末每服二錢陳倉米汁調下 便覺思食甚妙或加香連丸尤妙 升溪 脾

泄腸滑 方同上 噦逆不止 石蓮肉六枚炒黃為末熟水 和服即止 蕪頌園經 產

後效逆 嘔吐心忡目暈石蓮子一兩半雲苓一兩丁香五錢為末米飲服二錢 見良方補遺

後效逆 嘔吐心忡目暈石蓮子一兩半雲苓一兩丁香五錢為末米飲服二錢 見良方補遺

〔布雅曰〕一詳其所主乃是足少陰腎藥亦能通乎少陰心經能清心固精氣止吐血療消泄同黃柏沙仁沙苑疾黎魚腥五味覆盆甘草牡蠣作丸治夢遺精滑最良

反胃吐食

石蓮肉為末入少肉豆蔻為末米飲調下 直指方

蓮意

即蓮子中青心也〔藏器曰〕食蓮子不去心令人作吐

苦寒治血渴產後渴生研末米飲服三錢立愈良止

霍亂大清心去熱時

珍

方勞心吐血

蓮子心七箇糯米二十一粒研末酒服此臨安張上舍方也 是齊百一

方小便遺精

蓮子心一撮為末入辰砂一分每服一錢白湯下日二 醫林集要

蓮鬚

一名佛座鬚

甘瀉溫清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏色益血止血

崩吐血

時珍

蓮意 蓮鬚 蓮蓮殼

時珍曰入厥陰血分肝

發明 時珍曰 一一本草不收而三因諸方固真丸巨勝子丸各補益方往用之其功大抵與蓮子

同也 大明曰

忌也 黃葱蒜

方 久近痔漏

三十年者三服除根用一一黑豆頭末各一兩半當歸五錢為末空心酒

服二錢忌熱物五日

見效 孫氏集效

蓮蓬殼

又名蓮房時珍曰陳者良

苦瀉温治便血

孟說

治血脹腹痛及產後胎衣不下酒

煮服之解野菌毒水煮服之

藏器

止血崩下血溺血

時珍

發明

時珍曰 蓮房入厥陰血分消瘀散血與荷葉功同

方 經血不止

瑞蓮散用陳一一燒存性研末每服二錢熱酒下

婦人經驗 血

崩不止 不拘冷熱用 一 一 荆芥穗各燒存性
等分為末每服二錢米飲下 聖惠方 產後

血崩 一 一 五箇香附二兩各燒存性為末
每服二錢米飲下日二 婦人良方 血淋 一

一 燒存性為末入麝香少許每服
二錢半米飲調下日二 經驗方 天泡濕瘡 一 一
燒存性

研末并泥調塗
神效 海上方

荷葉 蒂名荷鼻 大明曰入藥並多用 時珍曰畏桐油
伏白銀伏硫黃

止渴落胞破血治產後口乾心肺燥煩 大 治血脹腹

痛產後胎衣不下滴煮服之荷鼻安胎去惡血留好

血止血痢殺菌葶毒煎水煮服 藏 生發元氣補助脾

胃瀆精散瘀消水腫癰腫發痘瘡治吐血咯血衄血

下血溺血、崩血淋產後惡血損傷敗血

時珍

發明

景曰潔古先生口授枳朮丸方用一燒飯為丸當時未悟其理老年始悟夫震者動也人感

之生足少陽甲膽是屬風木為生化萬物之根蒂人之飲食入胃營氣上行即少陽甲胆之氣與手少陽三焦元氣同為生發之氣一其色青其形仰其中空象震食藥感此氣之化胃氣何由不升乎用此為引可謂遠識更以燒飯和藥與白朮協力滋養令胃厚不致內傷其利廣矣世之用巴豆牽牛者豈足語此○時珍曰東垣試效方云雷頭風證頭面疔瘡腫痛憎寒發熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒涼誅伐無過一人病此諸藥不效余為慮清震湯而愈用一一枚升麻五錢蒼朮五錢煎服蓋一色青形象震乃洩類象形之義也又聞人規痘疹八十一論云痘已出復為風寒所襲則竅閉血凝其點不長或變黑色倒靨必身痛四肢微厥但溫肌散邪則熱氣復行而斑自出也宜紫背一散蓋一能升發陽

氣散瘀血留好血僵蚕能解結滯之氣故也勝於人
牙龍腦多矣又戴原禮云一一服之令人瘦故單服
可以消陽水
浮腫之氣

方一陽水浮腫 啟一一燒存性研末每服二錢 脚膝
米飲調下日三 證治要訣

浮腫 煎湯洗 心葉本等分 痘瘡倒靨 紫背一一散治風
寒外襲倒靨勢危

者萬無一失用霜後一一貼水紫背者炙乾直僵蚕
去絲炒等分為末芫荽湯下半錢酒下亦可 聞人

規 諸般癰腫 拔毒止痛一一中心帶不拘多少煎洗
拭乾以寒水石臘猪脂塗之 本事方

打撲損傷 惡血攻心悶亂疼痛者以乾一一五片燒
存性為末每服一二錢熱童便食前調下

日三利下惡 產後心痛 惡血不盡也一一炒香為末
物愈 聖惠 每服方寸匕沸湯或童便調

下煎汁飲亦可 胎衣不下 同上 孕婦傷寒 大熱煩渴恐
救急方 傷胎氣用嫩

荷葉

二十九

卷一 一培半兩蛤粉二錢半為末每服三錢新
汲水入蜜調服并塗腹上名單胎散 鄭氏方 妊娠

胎動

已見黃水者乾一蒂一箇炙研為末
末糯米汁調下即安 唐珣經驗 吐血不止

嫩一七枚搗水服甚佳 又方乾一蒲黃等分

木服三錢桑白皮湯下 肘後用霜後敗一燒存

性新汲水 吐血咯血 一培乾為末米湯調下 吐血

調下二錢 吐血咯血 三錢 聖濟用麥冬湯下 吐血

吐血 陽乘於陰血熱妄行宜服四生丸日華云屢得
效用生一艾葉生柏葉生地黃等分搗爛

丸鴉子大每吃一丸 崩中下血 一燒半兩蒲黃

水煎去滓服 濟生 崩中下血 芩各一兩為末酒服

三錢 血痢不止 一帶煎服 下痢赤白 一炒研每服
普濟方 二錢赤痢蜜白

痢沙糖 脫肛不收 貼水一培研酒服二錢仍 漆瘡

湯調下 脫肛不收 以一為末或坐之 經驗 漆瘡

作痒 煎洗 腎囊風 方同 遍身風癢 一三十箇
集驗 上 石灰一斗淋

昂曰功能補脾去濕故治洩瀉能固腎滯
精故治夢遺小便不禁帶濁

希雅曰得山藥雲苓木蓮子以仁扁豆
為補脾胃要藥
果部

汁合漬之半日乃出
數日一作 聖惠 偏頭風痛
升麻蒼朮各一兩一
一箇水二鍾煎一

鍾食後服或炒一箇為
末以前汁調服 簡便方 刀斧傷
一炒末搽 赤
集簡

遊火丹 新打爛入 陰囊痛痒
一浮萍蛇床等
鹽塗之 摘元 分煎洗 醫壘元

戎牙疼 青一帶七箇濃米醋煎半盞熬
成膏時擦之妙 唐珙經驗

爽實 一名鳩頭本經雁喙同上雁頭古今註鴉雍莊
子卯菱管子藟子弘東水流黃

甘平治濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志

聰明耳目 本經 開胃助氣 華 止渴益腎治小便不禁遺

精白濁帶下 時 珍

發明 弘景曰小兒多食令不長又曰仙方取此合蓮
實餌之甚益人說曰生食多動風冷氣頌曰去

芡實

三十

馮奉曰分清丸用黃蠟亦與威喜丸同義
說見黃蠟

穀暴乾搗篩末熬金櫻子膏和丸服之云補下益人

謂之水陸二仙丹時珍曰孫升談圃云一不益人

而俗謂之水流黃何也蓋人之食芡必咀嚼之而味

甘平腴而不膩食之者能使華液流通轉相灌溉其

功勝於乳石也淮南子云狸頭

愈癩雞頭去過之功已瘵雞頭即一也

說曰蒸熟晒乾搗粉用時珍曰煮食良入酒精藥連

殼用亦可陳彦和云一一斗以防風煎湯浸過用

良丹經

久不壞

方 雞頭粥

益精氣強志意利耳目一一三合煮熟
去殼粳米一合煮粥空心日食 經驗

四精丸

治思慮色欲過度損傷心氣小便數遺精用
秋石茯苓一一蓮肉各二兩為末蒸棗肉丸

梧子大每服三十

丸鹽湯下 永類

服百丸鹽湯
下 搞元

分清丸

治濁病用一一粉茯苓粉
黃蠟化蜜和丸梧子大每

鴨梨曰——與海蜇同煮服名為雪羹能去久積以——能消堅海蜇鹹能軟堅也且能治肝氣肝積此方甚效而奇

正勃臍 又名烏芋 別錄危菀 濟地栗通志 瑞曰小者名危菀 大者名地栗 危菀 黑三棱 博

甘微寒治消渴痺熱 別錄 下丹石毒除胸中實熱消黃

疸 孟說 開胃下食 大明 作粉食厚腸胃能解毒服金石人

宜之 頌 蘇頌 療五種膈氣消宿食治誤吞銅物 汪機 主血痢

下血 崩碎蠱毒 時珍

發明 機曰烏芋善毀銅合錢嚼之則錢化可見其為消堅削積之物故能治五種膈氣而消宿食治

誤吞銅物 時珍曰按王氏博濟方治五積冷氣攻心

變為五膈諸病金鎖丸中用黑三棱註云即危菀之

乾者則汪氏消堅之說蓋本於此又董炳集驗方云

地栗晒乾為末白湯服二錢能碎蠱毒傳聞下蠱之

家知有此物便不敢下

此亦前人所未知者

勃臍 慈菇

鳴皋曰：北方所常食不見其害或曰：食之或食之過多乃致此與抑南產與北產有別歟

方 大便下血 一汁一鐘酒半鐘空心 温服三日效 赤白痢 日 午

午時取完好一拭淨勿令破損好燒酒浸之黃泥密封遇有患者用二枚空心嚮原酒送下 經驗

血崩 一歲一箇燒存性 研末酒服之 李氏方

慈姑 又名慈姑 日華藉姑 別錄 水萍 同上 河危菰 圖 經白地粟同上

甘苦微寒治百毒產後血悶攻心欲死產難胞衣不

出搗汁服一升又下石淋 大明

發明 大明曰：多食發虛熱及腸風痔漏崩中帶下瘡 痢以生薑同煮佳懷孕人不宜食 說曰：吳人常

食之令人發脚氣癰緩風損齒失顏 色皮肉乾燥卒食之使人乾嘔也

葉 治諸瘡腫遊丹瘤毒搗塗之即消甚妙 蘇頌調蚌

嗎泉曰蔗性味殊不瀆凡熱瀉飲其漿即止者是甘寒除胃熱清則瀉止非瀉也余在江南患熱瀉日渴飲蔗漿一盃而愈寒瀉滑瀉者非所宜嗎泉曰甘涼能益胃陰故止嘔吐微寒能解暑故治疰瘧

粉塗瘰癧

時珍

甘蔗

甘平瀉下氣和中助脾氣利大腸別錄利大小腸消痰

止渴除心胸煩熱解酒毒大明止嘔噦反胃寬胸膈時珍

發明時珍曰漿甘寒能瀉火熱素問所謂甘溫除大熱之意也煎成糖則甘溫助濕熱所謂積

溫成熱也與生漿之性異矣按野史云盧絳病疰瘧

瘵忽夢白衣人云食一可愈因食數挺即愈此亦

助脾和中之驗也

方發熱口渴小便赤瀉飲漿外臺痰欬氣急方見山藥反胃

吐食漿七升生薑汁一斗和勻細呷梅師方乾嘔不息方同上疰疾瘵

甘蔗 西瓜皮子 甜瓜子 華

鳴皋曰清脾胃

馮泉曰一解暑故治暑痢一老耆年七十餘痢日夜數十次醫忌生冷已將斃渴極求食一家人與食即愈

又曰余喜食生冷在北京暑月每日食此二枚三十歲後多食即患腹脹寒胃傷脾故也穀食即愈

療見發

西瓜

甘寒治消渴解暑熱吳療喉痺汪利小水治血痢解

酒毒寧含汁治口瘡震

發明穎曰一解暑熱有天生白虎湯之號然亦不可多食時珍曰一一多食取快一時須防秋來

有瘡痢之患

皮甘涼治口舌唇内生瘡燒研噙之震

瓜子仁甘寒主治與甜瓜子仁同時珍

甜瓜

甘寒滑止渴除煩熱利小便
嘉祐藥 解暑

發明
思邈曰多食發黃疸病後食多或反胃脚氣人食之患不瘥宗奭曰 雖解暑多食未有不

下痢深秋作

痢尤為難治

甜瓜子仁

甘寒治腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內壅要藥

別錄 止月經太過研末紙壓去油水調服
藏器曰 不去油其力

短 清肺潤腸和中止渴
時珍

方 腰腿疼痛
一仁三兩酒浸十日為末每服三錢空心酒下日三 壽域神方

腸癰已成
小腹腫痛小便似淋大便艱澀下膿用一仁一合當歸炒一兩蛇蛻皮一條切

甜瓜蒂

時珍曰：一陽明經除濕熱之藥，胃曰陽明，胃經吐藥。

丹溪曰：吐中有發散之義，張子和云：諸汗法古方多有，惟以吐發汗，世罕知之，故予

碎，每用四錢水一盞，半煎一盞。

食前服，下惡物為效。聖惠。

瓜蒂 又名瓜丁，千金。苦丁香，象形。時珍曰：唐璠云：甜瓜蒂以瓜團而短，及團瓜者良。若香甜瓜及長

如瓠者，皆供菜之

瓜，其蒂不堪用。

苦寒有毒

大明曰：無毒。

治大水，身面四肢浮腫，下水殺蠱。

毒欬逆上氣及食諸果病在胸腹中，皆吐下之。

經本去

鼻中瘕肉，療黃疸。

別錄

治腦寒熱，眼昏吐痰。

大明吐風

熱痰涎，治風眩頭痛，癩癩喉痹，頭目有濕氣。

時珍得麝

香細辛，治鼻不聞香臭。

古好

發明

仲景曰：病如桂枝證，頭不痛，項不强，寸脈微浮，胸中痞硬，氣上衝咽喉，不得息者，此為胸中有

嘗曰吐法兼汗

汪昂曰仲景一散掩鼓湯並是吐藥張
子和治痢吐法尤多丹溪治許白雲大吐
二十餘日治小便不通亦用吐法甚至用
四物四君以引吐或法其在按汗吐下和
乃治病之四法今惟知汗下和吐法竟不
用遇邪在上焦及當吐者不行涌越致結
塞而成壞症者多矣

又曰語云大吐亡陽大下亡陰凡吐法須
天氣晴和全病人隔夜勿食卒病者不拘
類編云一女子病胸欬不止遇一道人教
取一七枚為末調服其汁即吐痰如膠
三進而病如失

馬泉曰丹溪治小便不通亦用吐法甚有
理小便不通多係肺氣鬱閉或濕熱痰壅
吐則胃家開肺氣亦通肺氣通則小便出
矣

果部

寒也當吐之太陽中暈身熱頭痛而脈微弱此夏月
傷冷水：行皮中也宜吐之少陽病頭痛發寒熱脈
緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上諸實鬱：而
痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸
口脈微弦者當吐之懊憹煩躁不得眠未經汗下者
謂之實煩當吐之宿食在膈上者當吐之並宜一
散主之惟諸亡血虛家不可與也成無己曰高者越
之在上者涌之故越以一香豉之苦涌以赤小豆
之酸東垣曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者
死此飲食內傷填塞胸中食傷太陰風木生發之氣
伏於下宜一散吐之素問所謂木鬱則達之也吐
去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣
若尺脈絕者不宜用此恐損真元令人胃氣不復也
宗奭曰此物吐涎甚不損人全勝石綠礞沙輩也丹
溪曰一性急能損胃氣胃弱者宜以參蘆代之病
後產後宜深戒時珍曰一一乃陽明經除濕熱之藥
故能引去胸腕痰涎頭目濕氣皮膚水氣黃疸濕熱
諸病凡胃弱人病後產後用吐藥皆宜加慎何獨一
甜瓜蒂

三四

然
一為

方 瓜蒂散

治症見上用一錢半炒黃赤小豆
二錢半為末每用一錢香豉一合熱湯

七合煮爛去渣和末服少

太陽中暈

治症見上
一七枚水

加之快吐乃已 傷寒論

一升煮五合類

風涎暴作

氣塞倒仆一錢以水半
一二錢膩粉一錢以水半

服取吐 金匱 合調灌良久涎自出不出

諸風癇

諸風膈痰諸癇涎
涌用一炒黃為

含沙糖一塊即出 寇氏

末量人以酸漿水調下取吐癲癇加蝎尾半錢濕氣

腫滿加赤小豆末一錢有燕加狗油五七滴雄黃一

錢甚則加芫花半錢立

風癇喉風

欬嗽急涎潮等症
不拘大人小兒此

吐虫出 活法机要 藥不大吐逆只出涎水一為末壯年服一字老少

半字早晨井華水下一食頃含沙糖一塊良久涎如

水出年深者出黑涎：盡食粥二兩日如吐甚

不止以射香泡湯一盞飲之即止 經驗後方 急黃

歎息 心上堅硬欲得水喫者一赤小豆研末漿
水服取吐吹鼻取水亦可 傷寒類要方 遍

身如金 一四十九箇丁香四十九枚炒存性為末
每用一字吹鼻取出黃水亦可揩牙取涎

熱病發黃 一末以豆許吹鼻中 身面浮腫 方同
少頃流黃水愈 千金

濕家頭痛 同上 十種蠱氣 一末枣肉和九梧子
活人書 大棗湯下三十九 瑞

瘡疾寒熱 一 二枚浸一宿 發狂欲走 一末并
頰服取吐 千金 華水服一

鼻中瘰癧 青甜一 二箇雄黃射香各半分
為末先搗破後貼之日三次 同

牙痛 一炒研射香 白朮 甜瓜蔓一不拘多少
少許畏咬取涎 水浸一夜煮汁煎如飴

先刺去痂洗淨以膏和半夏末二錢薑汁一匙大胆
汁一枚塗之不過三次忌食動風物 儒門事親

鼻欬痰氣 一三箇為末
水服 朱氏

淺

菱 又名菱別錄

甘寒鮮者鮮暑鮮傷寒積熱止渴鮮酒毒射罔毒

珍時

鮮丹石毒

珍時

發明

說曰生食性冷多食傷臟腑損腸氣痿莖生燒
虫水果中此物最不治病若過食腹脹者可暖

薑酒服之即消時珍曰

生者性冷熟者性平

時珍曰——色白入肺

穀菜部

粳米 音庚 又名杭 音庚

甘平

時珍曰北粳涼南粳温赤粳熱白粳涼晚白粳寒新粳熱陳粳涼

益氣止渴止

瀉

別錄

温中和胃氣

蜀本

斷熱毒下痢

孟詵

發明

好古曰本草言——益脾胃而仲景白虎湯用之入肺以味甘為陽明之經色白為西方之象

而氣寒入手太陰也少陰證桃花湯用之以補正氣竹葉石膏湯用之以益不足時珍曰六七月收者為早粳止可充食八九月收為遲粳十月收為晚粳北方氣寒粳性亦涼八九月收者即可入藥南方惟十月晚粳氣涼乃可入藥以得金氣多故色白入肺而解熱也早粳得土氣多故赤者益脾而白者益胃若滇嶺之粳則性熱惟彼土宜之耳詵曰忌馬肉不可同蒼耳食令人卒心痛急燒倉米灰和蜜漿服之不

穀菜部

粳米 米泔

昂曰集成云陳米飯緊作團火煨存性麻油膩粉調傳一切惡瘡百藥不效者

死爾

方 米瘕嗜米

有人好食生米久則成瘕不得米則吐清水得米則止米不消化久亦斃

用白米一升合雞屎一升同炒為末水一升頓服少時吐出米瘕如研米汁或白沫或淡水乃愈也

金方 初生無皮

色赤但有紅筋乃受胎未足米粉撲之

聖濟 小兒甜瘡

生於面耳

令母嚼一盞時塗之三五次愈

胎動腹痛

下黃汁用一盞煎黃芪六兩水七升煎

服 二升分四

自汗不止

包撲之

米泔

用第二次者

甘寒清熱止煩渴利小便涼血

時珍

方 吐血不止

陳米泔水溫服一鍾日三次

普濟方 衄不止

頻飲米泔仍以

鳴皋曰——補肺

昂曰——能解毒化膿助漿故痘瘡用之

鳴皋曰梅花一方當是治肺氣熱渴吐血
一方當是治心脾家血白糯米用同白芷
穀菜部

真麻油或蘿蔔汁

滴入 證治要訣

糯米

甘溫溫中令人多熱大便堅別錄能行榮衛中血精解

芫青斑蝥毒士良益氣止瀉思邈止霍亂後吐逆不止以

一合研水服之大明暖脾胃止虛寒瀉痢縮小便收自

汗發痘瘡時珍

發明士瀛曰痘瘡用——取其解毒能釀而發之也
時珍曰——性溫釀酒則熱蒸錫尤甚故脾胃

虛寒者宜之若素有痰熱風病及脾病不能轉輸食
之最能發病成積孟詵蕪頌乃謂其性寒涼者謬也

方 三消渴病 梅花湯用——穀炒出白花菜根白
皮等分每一兩水二椀煎飲 三因

糯米

三七

甚妙以白芷能出濕熱治白濁淋濁最驗
金瘡癰疽一方云最驗惜余未試也

白芷自汗不止同糯米粉龍骨粉撲之亦佳

鼻衄不止

服藥不應獨聖散用一微炒黃為末每服二錢新汲水調下仍吹少許入鼻簡

要濟

吐血

一兩半兩蓮子心七枚為末酒服孫仲盈曰曾用多效或墨汁為丸亦妙 澹寮

金瘡癰疽及竹木刺毒

用一三升於端午前四十九日以冷水浸之一日兩換

水輕淘勿攪碎至端午日取出陰乾絹袋盛掛通風處每用現取炒黑為末冷水調如膏藥隨瘡大小農定瘡口外以布包定勿動直等瘡癒○若金瘡犯水作膿腫甚者急裹一二食久即不作膿腫也若癰疽初發才覺焮腫急貼之
白糯米 治八夜小便脚停白
一夜便消 靈苑方 濁老人虛人多此症
令人卒死大能耗人精液主頭昏重用一五升炒赤黑白芷一兩為末糯米粉糊丸梧子大每服五十丸
饅頭湯下無此用局方補腎湯下若後生稟賦怯弱
房室太過小便太數水管蹇澀小便如膏入石菖蒲
壯糯米甚
效 經驗 自汗不止 木每服三錢未飲下

好古曰脾經氣分藥

鶴從易
音從易
音從始
和鐵也

飴糖

又名錫 音徐盈切信平聲

集解

保昇曰飴即軟糖也糯米粳米秫米粟蜀林
米大麻子枳椇子黃精白朮並堪熬造惟以

糯米作者入藥粟米者亦可餘不堪用時珍
曰一一用麥蘖或穀牙同諸米熬煎而成

甘溫補虛去血

別錄

止腸鳴咽痛治唾血消痰潤肺

止嗽

思遊

健脾胃補中治吐血打損瘀血者熬焦酒服

能下惡血又傷寒毒嗽于蔓菁薤汁中煮一沸服之

良

孟說

脾弱不思食少用能和胃氣亦用和藥 寇氏解附

子草烏頭毒

時珍

發明

弘景曰古方建中湯多用之成無己曰脾欲緩
急食甘以緩之一一之甘以緩中也好古曰一

飴糖

穀牙

三八

鳴泉曰治嗽方有用蘿蔔搗汁納一
塊泡化溫服者與蔓菁薤汁同義

董厚曰一一大發濕中之熱時珍曰凡中
滿吐逆秘結牙虫赤日疳病者切忌之生
穀菜部

痰動火最甚甘屬土腎病母多食甘傷腎骨痛而齒落

一乃脾經氣分藥甘能補脾之不足時珍且集異記云邢曾進河朔健將也為飛矢中目拔矢而鏃留中鉗之不動痛困俟死一僧教以寒食錫點之如法用之清涼頓減痛楚至夜瘡用力一拔而出旬日而瘡

方 蛟龍癥病

凡人正二月食芹誤食蛟龍精為蛟龍病發則似癩面色青黃每食寒食

錫五合日三服吐出蛟龍有兩魚臍瘡良塗之頭可驗吐虺者勿用金匱

疽惡瘡

方同箭鏃不出見發火灼傷燒灰粉之易燥小品方烏

附毒

食一即解搥錄

穀牙

一名穀禁

甘溫開胃快脾下氣和中消食化積時珍

方 啓脾進食

穀神丸一四兩為末入薑汁鹽少許和作餅焙乾入甘草炙砂仁白朮

素問曰麥心之穀也

昂曰汗為心液麥為心穀浮麥能涼心故
止汗麥熱同功

昂曰寒食日以小麥麩飲寒厥懸風處名
寒食麩取其年久不熟入藥尤良

穀菜部

麩炒各一兩為

末丸服澹寮

小麥

甘微寒

權曰平恭曰小麥作湯皮拆則性溫不能消
熱止煩也葢器曰麥涼麩溫麩冷麩熱時珍

曰新麥熱

陳麥平和

除客熱止煩渴咽燥利小便養肝氣止漏

血唾血

別錄

養心氣心病宜食之

思

煎湯飲治暴淋

寇氏

陳者煎湯飲止虛汗燒存性油調塗諸瘡湯火傷

時珍

浮麥

甘鹹寒除熱止自汗盜汗骨蒸虛熱婦人勞

熱

時珍

麥麩

撲折損傷瘀血醋炒晷之

日華

醋拌蒸袋盛熱

小麥

三九

鳴皋曰仲景治婦人臟燥症悲切欲絕狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥一升甘草一兩每服一兩大抵悲泣欲絕自係心家熱狀若神靈自係肝家病所謂肝虛見鬼也小麥涼心而養心氣別錄亦云養肝氣雖以大棗名湯實小麥之功
 又曰凡治吐血衄血宜生用生則性涼其性又能補滲瀉也

斃折傷處止痛散血器亦斃手足風濕痺痛寒濕脚

氣互斃至汗出良末服止虛汗時

發明時珍曰素問云麥屬火心之穀也孫真人云麥養心氣其功除煩止渴收汗利溲止血皆心之病也又曰麩乃麥皮也與浮麥同性而止汗之功次

於浮麥凡人身體疼痛及瘡瘍腫爛沾漬及小兒暑月出痘潰而不能着席者並用夾紵
 盛麩作褥藉卧性涼而軟誠妙法也

方中喝井華水和麩一大撮服之千金方吐血飛羅麩略炒以陳墨汁或藕節汁調

服二錢 醫學集成 大衄血出口耳皆出者用白麩入鹽少許冷水調服三錢 普濟 虛

汗盜汗浮小麥炒為末煎湯代茶飲 產後虛汗麥麩牡蠣等分為末肉汁調服二錢

日寒痢白色炒麩每以方寸匕入粥中食之能治日瀉百行師不能救者 外臺 金瘡

血出

不止用生麩傳五七日即愈

折傷瘀損

白麩梔子同搗以水調傳即散

老人五淋

身熱腹滿小麥一升通草二兩水三升煮一升飲之即愈

奉親書

麥粉

即今洗麩筋澄出之粉今人漿衣多用之

甘涼和五臟調經絡炒一合湯服斷下痢

孟說醋熬成

膏消一切瘰腫湯火傷

時珍

發明

時珍曰古方鮮用按蕭表積善堂方云烏龍膏治一應腫發背無名腫毒初發焮熱未破者取

效如神用隔年小粉愈久愈佳以鍋炒之初炒如錫久炒則乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬成如黑漆磁罐收之用時攤紙上剪孔貼之即如冰冷疼痛即止少頃覺痒乾亦不能動久則腫毒自消藥力亦盡而脫落甚妙此方屢有效濟生者宜藏之

麥粉 麥牙

罕

常曰——能助胃氣上行而資健運賦能
軟堅故祛痰散結又曰久服消腎氣

麥牙 一名麥蘗

鹹溫消食和中別錄破冷氣去心腹脹滿藥性開胃止霍

亂除煩悶消痰飲破癥結催生落胎日華補脾胃虛寬

腸下氣腹鳴者用之元素消化一切米麪諸果食積時珍

胃為六
土脾為
已土

發明好古曰——神曲二藥胃氣虛者宜服之以代
戊己腐熟水穀豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味

為之使時珍曰——穀牙皆能消導米麪諸果食積
觀造錫者用之可類推矣但有積能消化無積而久

服則消元氣不可不知久服
者須同白朮諸藥則無害

方 快膈進食 一四兩神曲二兩白朮橘皮各一
兩為細末蒸餅丸桐子大人參湯下

五十丸 產後腹脹 不通轉氣急坐卧不安以一一
時後 合為末和酒服良久通轉神驗

昂曰薛立齋治一婦人喪子乳脹欲成癰
用一一二兩炒煎服立消其破與散氣
之功如此良方云神曲亦善下胎皆宜酌
用

時珍曰肺之穀

鳴泉曰即今黃小米之粘者古方半夏秫
米湯用此

鳴泉曰婦人白帶黃米作粥同雞子煮食
神效又曰一一性温曰微寒曰平似不確
穀菜部

兵部
手集 產後青腫
乃血水積也乾漆大一層一分為末
新瓦中鋪漆一層一一層重三令

滿鹽泥固濟煨赤研末熱酒調服
二錢產後諸疾皆宜 婦人經驗
產後秘塞 五七日
不通不

宜妄服藥宜用大一一一兩炒為末用
沸湯調下三錢與粥間服 婦人良方
妊娠去胎

一升蜜一升煎服
下胎神驗 外臺
產後回乳 產婦無子食乳不消
令人發熱發寒用大一

一二兩炒為末每服五錢
白湯下甚良 丹溪纂要

秫
又名糯粟 唐本黃糯

集解 禹錫曰一米似黍米而粒小宗奭曰一米初
搗出淡黃白色最粘故宜作酒時珍曰一即

梁米粟米之粘者有赤黃白三
色皆可釀酒熬糖作饘糕食

秫米 甘微寒
說曰平時珍曰養生集云味酸性
熱粘滯易成黃積病不宜多食
治

秫米 平

鳴皋曰半夏能通陰陽：不能入陰：不能攝陽故不眠通則眠矣靈樞一：半夏湯用之者以制半夏之烈也其得眠者仍係半夏通陰陽之功未必一：蓋陰氣之力

寒熱利大腸療漆瘡別錄生搗和雞子白傳腫毒孟詵治肺瘡及陽盛陰虛夜不得眠及食鷺鴨成癥孕婦下

黃水

時珍

發明

時珍曰

一：肺之穀也肺病宜食之故能去寒熱利大腸大腸者肺之合而肺病多作皮寒熱也千金治肺瘡方用之取此義也靈樞經岐伯治陽盛陰虛夜不得眠半夏湯中用之取其益陰氣而利大腸也大腸利則陽不盛矣方見半夏條又異苑云有人食鴨成癥醫用一：研粉調水服之頃頃頓蹀吐出一鴨雛而瘡也千金方治食鴨成病胸滿面赤不能食一：湯一盞飲之

方 肺瘡寒熱

痰聚胸中病至令人心寒：甚乃熱善驚如有所見常山三錢甘草半錢

一：三五粒水煎未發

妊妊下水

黃色如膠或如小豆汁一：黃

時分作三次服 千金

飭奉曰——此人常以作飯食乃云大脫
 元氣未見其害如此也至云能鍊腸胃滯
 滯亦未見其功如此大抵書言多太過者
 未可盡執也惟貽頭風有效一婦偏頭風
 痛不可忍醫以——麩茶葉末細辛調貼
 穀菜部

各一兩水七升煎

三升分三服 梅師

蕎麥

又名菽麥 烏麥 吳瑞

甘平寒

思邈曰 微寒

實腸胃能鍊五臟滓穢

孟說

作飯食壓

卅石毒甚良

蕭炳

以醋調粉塗小兒丹毒赤腫熱瘡

吳瑞

降氣寬腸磨積滯消熱腫風痛除白濁白帶脾積洩

瀉以沙糖水調炒麩二錢服治痢疾炒焦熱水衝服

治絞腸沙痛

時珍

發明

時珍曰

——最降氣寬腸故能鍊腸胃滯而

治濁帶洩痢腹痛上氣之疾氣盛有濕熱者宜
 之若脾胃虛寒人食之則大脫元氣而落鬚眉非所
 宜矣按楊起簡便方云肚腹微：作痛出即瀉：亦

蕎麥

四十三

之遂愈又一婦偏頭痛予教以一麩貼太陽次日痛稍減而兩目俱赤去之目乃愈大抵此物能拔熱毒氣外出太陽穴與日近故火毒外出而牽連於目也目思痘瘡毒陷棗回者用此貼之或可拔出或加蓖麻子必應有效當勝於今之貼紫草黃蠟膏也

不多日夜數行者用一麩一味作飯連食三四次

即愈予壯年患此兩月瘦怯尤甚用消食化氣藥俱

不效一僧授此而愈轉用皆效此可徵其鍊積滯

之功矣普濟治小兒天吊及歷節風方中亦用之

方 咳嗽上氣

一椀順手攪千下飲之良久氣下不

止即愈

儒門事親

十種水腫

和作餅炙熟為末空心茶服以

大小便利為

瘰癧發背

華水和作餅晒收之每用一

度 聖惠

餅磨水傅之痛則令不痛

瘡頭黑凹

即起 同上

湯火傷

和傅如神 奇效方

蛇盤瘰癧

圍接項上

去殼海藻白僵蚕炒去絲等分為末白梅浸湯取肉

減半和丸綠豆大每服六七十丸食後臨卧米飲下

日五服其毒當從大便泄去若與淡菜 頭風畏冷

同服尤好忌豆腐雞羊酒麩 阮氏方 人

蘇頌曰補肺時珍曰陽明胃藥也虛則補其母故肺痿肺癰用之

昂曰厥陰風木主筋然治筋骨之病以陽明為本陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利

藪菜部

頭風首裹重綿三十年不愈以一一粉二升水調

作二餅更互合頭上做汗即愈李樓怪症奇方

薏苡仁

又名解蠱本經芑實別錄籩米別錄蘇珠陶氏總米雷氏回二米救荒本草薏珠子圖經

甘微寒

說曰

治筋急拘攣不可屈伸久風濕痺下氣

久服輕身

本經

除筋骨中邪氣不仁利腸胃消水腫令

人能食

別錄

主不饑溫氣者飲止消渴殺虻蟲藏器治肺

痿肺氣積膿血欬涕唾上氣煎服破毒腫

甄權

去乾

濕脚氣

孟詵

健脾益胃補肺清熱去風勝濕利小便治

熱淋

時珍

發明

宗奭曰一一一本經云微寒主筋急拘攣拘攣

薏苡仁

有兩等素問註中大筋受熱則縮而短故攣急

四十三

機關者也陽明虛則宗筋縱弛故經曰取
痿獨取陽明又曰肺熱葉焦發為痿躄蓋
肺者相傳之官治節出焉陽明濕熱上蒸
于肺則肺熱葉焦氣無所主而失其治節
故痿躄——理脾而兼清熱補肺
又曰筋寒則急熱則縮濕則縱然寒濕久
留不變為熱又有熱氣熏蒸水液不行久
而成濕者——去濕要藥曰寒曰熱者
皆可用也行義云曰寒筋急者不可用恐
不然

不伸此是因熱而拘攣也故可用——若素問言
因寒則筋急者不可更用此也蓋受寒使人筋急寒
熱使人筋攣若但受熱不曾受寒亦使人筋緩受濕
則又弛長無力也此藥力勢和緩凡用須加倍即見
效震亨曰寒則筋急熱則筋縮急因於堅強縮因於
短促若受濕則弛——則引長然寒與濕未嘗不挾熱
三者皆因於濕然外濕非內濕召之不能成病故濕
之為病因酒而魚肉繼之甘滑陳久燒炙并辛香皆
致濕之因也時珍曰——屬土陽明藥也故能健
脾益胃虛則補其母故肺痿肺癰用之筋骨之病以
治陽明為本故拘攣筋急風痺者用之土能勝水除
濕故泄瀉水腫用之按古方小續命湯註云中風筋
急拘攣語遲脉弦者加——亦扶脾抑肝之義後
漢書馬援在交趾嘗餌——云能輕身資欲以勝
瘴氣也又張師正倦遊錄云辛椽軒忽患疝疾重墜
大如盃一道人教以蒼珠用東壁土炒過水煮為膏
服數服即消程沙隨病此椽軒授之亦效頌曰——
——心肺之藥多用之故范汪治肺癰張仲景治風濕

胸痺並有方法濟生方治肺損咯血以熟猪肺切煎
末空心食之補肺猪肺引經也趙君

獸言屢
用有效

方 風濕身痛

日脯劇者仲景麻黃杏仁一湯
主之麻黃三兩杏仁二十枚甘草一
各一兩以水四升煮
取二分分兩服 金匱 水腫欬急 郁李仁二兩研
以水瀝汁煮一

飯日二食
之 獨行方 沙石熱淋 痛不可忍用一子葉
根皆可用水煎熱飲夏冷

飲以通為度
見楊氏經驗方 消渴飲水 湯送飲之 煮粥 周痺緩急 偏
者

一十五兩大附子十枚 仲景 肺痿咳唾膿血 十兩杵
炮為末每服方寸匕

碎水三升煎一升入
酒少許服 梅師 肺癆咯血 心胸甲錯者醇苦酒
煮令濃微温頓服肺

有血當吐出 喉生癭腫 吞一
愈 范汪方 枝 外臺

薏苡仁 黑豆

平四

時珍曰：——腎之穀入腎功多

鳴皋曰：生平煮寒之說似不可信。煮食者多如粟，甚寒食者何以未見其寒也。凡米穀類生食無不寒，何黑豆獨生平熟寒乎？生研能傳毒，毒寒可知也。自是生寒熟平。

昂曰：——功在補腎，其能鎮心、腎水足則心火寧也。其能明目，腎水足則目明也。其治脚弱、腎強則骨健也。豆淋酒善於祛風，故治風痺。口禁產後風等症，又善破積，故治產後諸疾。甘豆湯制諸風熱，又善解毒。豆淋酒兼能發表散五臟結積之內寒。

黑大豆

甘平

藏器曰：——生平炒食極熱，煮食甚寒。作豉極冷，造醬及生黃卷則平。牛食之溫，馬食之冷。

一體之中，久服令人身重生。研塗癰腫，煮汁飲殺鬼用之。數變。

毒止痛

經本

逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散

五臟結積內寒殺烏頭毒

別錄

煮食治瘟毒水腫

唐本調

中下氣通關脈制金石藥毒牛馬瘟毒

日華

煮汁解鬱

石砒石甘遂烏附射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒及

蠱毒入藥治下痢臍痛衝酒治風痺及陰毒腹痛牛

胆貯之止消渴

時珍

炒黑投酒中飲之治風痺癱疾口

穀菜部

希雅曰同益母草澤蘭菴木人參牛膝荆
芥生地黃便蒲黃治產後血暈悶絕同
蔓荆子土茯苓銀花甘菊元參川芎天麻
芽茶刺芥烏梅治偏頭風痛有神
又曰大豆穀向密蒙花穀精草川連木賊
草決明菊花銀花生地羚羊角羊肝治小
兒痘日驚

噤產後頭風食罷生吞去心胸煩熱：風恍惚明目

鎮心器主中風脚弱產後諸疾同甘草煮湯飲去一

切熱毒氣治風毒脚氣同桑柴灰汁煮食下水鼓腹

脹和飯搗塗一切毒腫孟治腎病利水下氣制諸風

熱活血解諸毒

時珍

之才曰惡五參龍胆得前胡烏喙杏仁牡蠣諸胆汁

良誥曰忌猪肉小兒以炒豆猪肉同食必壅氣致死

十有八九十歲以上不畏也時珍曰服蓖麻子者忌

炒豆犯之脹滿致死服厚朴者亦忌之犯之動氣用

者宜

慎

發明頌曰仙方脩治服之可辟穀然多食令人體重
甄權曰每食後吞三十粒令人長生初服時似

黑大豆

四十五

身重一年以後便覺身輕又益陽道也穎曰陶華以
一入鹽煮常時食之云能補腎蓋豆乃腎之穀
形類腎而又黑色通腎引之以鹽所以妙也時珍曰
李守愚每晨水吞黑豆二十七粒到老不衰夫豆有五
色各治五臟惟黑豆屬水性寒為腎之穀入腎功多
故能治水消脹下軋制風熱而活血解毒所謂同氣
相求也又古方稱大豆解百藥毒予試之大不
然又加以甘草其驗乃奇如此之事不可不知

方 炒豆紫湯

蘇頌曰古方有紫湯破血去風除氣
除熱產後兩日尤宜服之

升清酒一斗炒令烟出投酒中待酒紫赤色去豆量
性服之可日夜三盞神效中風口噤加雞矢白二升
和炒 豆淋酒 寇氏曰治產後百病或血熱覺有餘血
水氣或中風困篤或背強口噤煩熱痰
癢口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆或手足頑痺頭旋
目眩此皆虛熱中風也 一三升炒熟至微烟出
以酒五升沃之瓶封一日以上服酒一升溫覆令少
汗即愈口噤者加獨活半斤打破同沃之產後宜服

以防風氣
又消結血

中風口喎

上方同

頭風頭痛

即上方密封七日溫服 千金

破傷中風

口噤上方溫服
取汗 千金方

暴得風疾

四肢攣縮不能
行取 一 一 三

斗洗蒸以醋二升傾入瓶中鋪於地上設席豆上令
病人卧仍重蓋衣被五六層豆冷漸去却衣被仍令
一人於被內引挽攣急處更蒸豆再作併飲
荆瀝湯如此三日三夜即休 崔氏纂要 風入臟

中

治新久腫風入臟中以 一 一 一 斗水五斗煮一
斗二升去渣入好酒斗半煎取九升但服取汗其

效如神
千金翼方

風毒攻心

煩躁恍惚大豆半升洗淨水
二升煮七合食後服 心鏡 卒

風不語

一 一 煮汁煎稠如飴
含之并飲汁 肘後方

喉痺不語

方同上
千金 陰

毒傷寒

危篤者黑豆炒焦投酒熱飲或灌之
吐則復飲汗出為度效 居家必用

腸痛如

打

一 一 半升炒焦入酒
一升煮沸取醉 肘後

腸脇卒痛

方同

脚氣冲心

黑大豆

四六

煩悶不識人 一升水三升者濃汁服未定再服 廣利 身面浮腫 千金用一

水五升者汁三升八酒五升更煮三升分服不瘥再服。百一選方云烏豆煮至皮乾為末每服二錢末

飲下吳內翰女忽發腫檢 新久水腫 一斗煮取八升

外臺得此方服之立效 去豆入薄酒八升再煎取八升服之

再三服水當從小便出 范汪方 霍亂脹痛 一升

研水服方寸 水痢不止 一升一炒一升白朮半兩為

匕 普濟方 末每服三錢米飲下 指南

赤白痢 臘月猪胆盛黑豆八內入射香少許陰 男子

乾每用五七粒為末生薑湯服 奇效

便血 一升一炒焦研末熱酒淋 小兒沙淋 黑豆

之去豆飲酒神效 治人心統 難治者 一百

二十粒生甘草一寸者熟入滑 腎虛消渴 炒天

石末乘熱飲之良 全幼心鑑 消渴飲水 黑豆

花粉等分為末糊丸梧子大黑豆湯 普濟方 納牛

下七十九日二名救活丸 普濟方 消渴飲水 納牛

下七十九日二名救活丸 普濟方 消渴飲水 納牛

鳴皋曰豆性俱能傳腫毒一外科云凡遇腫毒以生黃豆研末調傳最效古方又有用赤小豆芋根傳腫毒由此推之則黑豆傳瘡亦必效也疏豆綠豆俱傳瘡毒方見後

穀菜部

胆中陰乾百日
 吞之效 肘後 疫癘發腫 一錢水一盞煎汁時飲
 之夷堅志云靖康二年京師大疫 墮墜折傷 瘀血在
 有人書此方於壁間用之立效 腹氣短
 大豆五升水一斗煮汁二升 痘瘡煩躁 黑豆煮汁飲
 頓服劇者不過三作 千金 痘瘡煩躁 子母
 秘錄 痘瘡濕爛 一 一 研 小兒頭瘡 一 一 炒存性研
 末傳之 水調傳之 普濟
 月經不斷 用前紫湯 子死腹中 月數未足母欲悶絕
 服之佳 者 一 一 三升醋煮
 濃汁頓服立 胞衣不下 大黑豆半升醇酒三升 肝虛
 出 產乳 者 一 升半分服 產書
 自暗 迎風下淚用臘月牛胆入黑豆陰 小兒胎熱 黑
 乾每夜服三七粒效 龍木論 豆
 二錢甘草一錢燈心七寸竹 一切腫毒 生研 辟穢時
 葉一片水煎 全幼心鑑 塗之 辟穢時
 氣 新布袋盛黑豆一斗納井中一 領要
 夜取出每服七粒佳

大豆黃卷

〔思〕 〔魏〕 曰宜腎 宣明方曰補腎氣

大豆黃卷

又名豆蘗〔弘景曰〕浸黑豆生芽五寸乾之炒用〔時珍曰〕一法壬癸日以井華水浸大

豆候生芽取皮陰乾用

甘平治濕痺筋攣膝痛

〔本經〕主五臟不足胃氣結積〔別錄〕

破婦人惡血

〔孟詵〕宜腎〔思〕除胃中積熱消水病脹滿〔時珍〕

〔普〕曰得前胡杏仁牡蠣烏喙天雄：鼠屎共蜜和良惡海藻龍胆〔頌〕曰古方葶婦藥中多用之

方 大豆蘗散

治周痺邪在血脉中木痺不痛上下周身故名此藥主五臟留滯胃中結

聚益氣出毒潤皮毛補腎氣用大豆蘗一斤炒香為末每服半錢溫酒調下日三服 宣明方 頭風

濕痺

筋攣膝痛胃中積熱大便結滯黃卷散用一炒一升酥半兩為末食前溫水服一匙日

二服 普濟方 水病腫滿 喘急大小便澀 醋炒大黃炒等分為末葱橘皮湯下二錢

時珍曰主脾胃

穀菜部

以利為度 小兒撮口 初生豆芽研絞汁和 乳灌少許良 普濟

魯豆 時珍曰魯乃自生稻名也此豆 原是野生故名今人亦種之矣

集解 藏器曰一一生田野小而黑堪作醬時珍 曰此即小黑豆也小科細粒霜後乃熟

甘温去賊風 痺婦人產後冷血炒令焦黑及熟投

酒中漸飲之 藏器

豌豆 又名胡豆 拾遺戎菽 爾雅畢豆 唐史青小豆 千金

甘平治消渴淡煮食之良 藏器 治寒熱 中除吐逆止

泄痢辟下利 便腹脹滿 思邈 調營衛益中平氣煮食

下乳汁 吳瑞 煮食殺鬼毒心病解乳石毒發研末塗瘡

稽豆 刀豆 粟

腫痘瘡作燥粉去野贈

時珍

發明

瑞曰多食發氣病時珍曰一屬土故其所主病多係脾胃元時飲膳每用此搗去皮同羊肉

治食云能
補中益氣

方 四聖丹

治小兒痘疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此症十死八九惟牛御史

得秘方點之最妙用一四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研為末以油胭脂同杵成膏先以簪批疔破啞去惡血以服丹石毒

一以半升研以水八合絞汁飲

即愈

外臺方 霍亂吐利

水三盞煎一盞分服 聖惠

刀豆

甘平溫中下氣利腸胃止呃逆益腎補元

時珍

鳴皋曰凡豆生用無不解毒

時珍曰一益腎

時珍曰——心之穀也性下行通小腸

發明

時珍曰——本草不載近小書載其暖而補元陽也又有人病呃逆不止聲聞鄰里或令取一

子燒存性白湯調服二錢即止

此亦取其下氣歸元而逆自止也

赤小豆

時珍曰此豆以緊小而赤黯色者入藥其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病

甘酸平

思邈曰甘鹹冷

下水腫排癰腫膿血

本經

療寒熱中

消渴止洩痢利小便下腹脹滿吐逆卒澀別錄治熱毒

散惡血除煩滿通氣健脾胃令人美食搗末同雞子

白塗一切熱毒癰腫煮汁洗小兒黃爛瘡不過三度

甄權

縮氣行風堅筋骨抽肌肉久食瘦人士散氣去關

節煩熱令人心孔開暴痢後氣滿不能食者煮食一

頓即愈和鯉魚煮食甚治脚氣孟鮮小麥熟毒煮汁

鮮酒病日辟瘟疫治產難下胞衣通乳汁和鯉魚鯽

魚黃雌雞煮食並能利水消腫時

惡逆曰合魚鮮食成消

渴作醬同飯食成口瘡

發明弘景曰一一逐津液利小便久服令人肌膚枯

燥頌曰水氣脚氣最為急用有人患脚氣以袋

盛此豆朝夕踐踏展轉之久一一遂愈好古曰治水者

惟知治水而不知補胃則失之壅滯一一消水通

氣而健脾胃乃其藥也藏器曰一一和桑白皮煮

食去濕氣痺腫和通草煮食則下氣無限名脫氣丸

時珍曰一一小而色赤心之穀也其性下行通乎

小腸能入陰分治有形之病故行津液利小便消脹

除腫止吐而治下痢腸澼鮮酒病除寒熱癭腫排膿

散血而通乳汁下胞衣產難皆病之有形者久服則

降令太過津血滲洩所以令人肌瘦身重也其吹鼻瓜蒂散及辟瘟疫用之亦取其通氣除濕散熱耳又陳自明婦人良方云予婦食素產後七日乳脉不行服藥無效偶得一一升煮粥食之當夜遂行又朱氏集驗方云宋仁宗在東宮時患疔肥道士贊寧取一一七粒咒之為末傅之而愈中貴任承亮見之後承亮患惡瘡或投以藥立愈叩其方乃一一始悟道士之咒偽也予苦腸疽既至五臟醫以藥治之甚驗適承亮見之曰得非一一耶醫謝曰某用此活三十人願勿復言有僧發背如爛瓜鄰家乳媪用此治之如神此藥治一切瘡不拘善惡水調塗之無不愈者但性粘乾則難揭入芋根末即不粘尤佳

方 水氣腫脹
 蕪頰用一一一五合大蒜一顆生薑五錢商陸根一條並碎切同水煮爛去藥食豆旋：啖汁令盡即腫消也○韋宙獨行方治水腫從脚起入腹則殺人一一一斗煮極爛取汁五升漬足膝若已入腹但食一一一勿雜食亦愈

○梅師治水腫取東行花棗枝燒灰一升淋汁煮豆赤小豆

五十

一升代 飯良 水蠱腹大 動搖有聲皮膚黑者用 一 一 三 升白茅根一握水煮食豆 肘後

傷寒狐惑 狐惑病脉數無熱微煩然 但欲卧汗出 初得三四日赤如鳩七八日目四皆皆

黃黑若能食者膿已成也赤豆當歸散主之 一 一 一 三升水浸令牙出當歸三兩為末漿水服方寸匕日

三 下部卒痛 如烏喙之狀用小豆大豆各囊盛 蒸熱更互坐之即止 肘後方 水

金匱 穀痢疾 一 一 一 合鎔蠟三兩 頰服取效 必效方 腸痔下血 一 一 一 三 升苦酒五

升煮熱日乾日浸至酒盡乃止 為末酒服一錢日三 肘後方 熱淋血淋 一 一 一 三 合慢炒為

末葱一莖搗爛熱調 服二錢 脩真秘旨 重舌驚口 一 一 一 末醋 中酒嘔

逆 飲之 煮汁徐 頻致墮胎 小豆末酒服方 寸匕 千金 妊娠

行經 同上 產難 產寶用 一 一 一 生吞七粒佳 〇 集驗 治產難日久氣乏用 一 一 一 一 升煮

飲之 食鑑本草 頻致墮胎 小豆末酒服方 寸匕 千金 妊娠

時珍曰：脾之穀也，入太陰氣分。

鳴泉曰：常食之物，殊不覺其微寒，當以性平為是。炒食當溫，生嚼當微寒。

鳴泉曰：之功不過除濕消暑耳。余最忌食之，偶食一椀，則中宮壅滯，終日不飢。

雖曰人之脾胃有各不相宜之弊，然其下

劑及通利三焦之說，未知其效也。至于暑濕滯於三焦者，服之則暑濕去而三焦利。

穀菜部

汁入炙黃明膠一兩，同煎少時。胞衣不下。一服五合，不過三四服，即產。七枚，女二。

七枚，東流水吞。產後目閉。心悶。一服，生研，東流水下。方寸匕。肘後。產。

救急方。不能食用。一服，二七粒。乳汁不通。方見一。

後悶滿。燒研，冷水服。千金方。即消入芙蓉葉末在內，尤妙。金瘡煩滿。一。

切癰疽。丹毒，非腮，雞子白調，傅隨手。酒浸一日，炒乾，再浸滿三日，令黑色。為末，每服方寸匕，日三服。千金。

扁豆。又名扁豆，別錄。蛾眉豆。時珍曰：白者入藥。

甘微溫。說曰：和中下氣。別錄：補五臟主嘔逆。孟說：療霍亂。

吐利不止，研末和醋服之。行風氣，治女子帶下。鮮。

酒毒河豚魚毒。鮮一切草木毒，生嚼及煮汁飲取。

扁豆花葉。五。

應生所用。

鮮毒生用。

五。

五。

五。

五。

五。

五。

五。

五。

耳

印曰：一功多除濕，去土強則正氣自

旺，暑亦濕也，故一能消脾胃之暑，但多

食壅氣

鳴皋曰：患瘧者，但犯扁豆，必增甚，新愈者必復發，陶氏患寒熱，不可食，當指此也。

效 甄 權 止泄痢消暑暖脾胃除濕熱止消渴 時珍

發明

時珍曰：硬殼白，其子充實白而微黃，其氣腥香，其性溫平，得乎中和，脾之穀也。入太陰氣

分通利三焦，能化清降濁，故專治中宮之病，消暑除

濕而解毒也。其軟殼及黑鵲色者，性微涼，可供食，亦

調脾胃，弘景曰：患寒熱者不可食。

方 消渴飲水

金豆丸白，浸去皮為末，以天花粉汁同蜜和丸。梧子、大金箔為衣，每

服二、三十丸，天花粉汁下，日三服，忌

炙燥酒色。次服滋腎藥，仁存堂 霍亂吐利 香薰

各一升水六升煮，霍亂轉筋 白，為末醋和服 普濟 赤白帶

二升分服 千金 毒藥墮胎 生白，去皮為末，米

下 白，炒為末 毒藥墮胎 女人服藥墮胎，腹痛者

飲下亦可。九服若胎氣已傷，未墮者，或口噤，手強，自

汗頭低，似乎中風，九死一生，醫多不識，作風治，必死。

希雍曰——入足陽明胃經

鳴皋曰——之甘寒在皮故煮至皮裂則力減凡資其甘寒以解毒熱者不宜過煮
又曰——一人因夏晒枕、未涼即枕之遂患身內作響百治不效往訪葉天士天士令穀菜部

俱 惡瘡 疥癩 作痛以白——搗封
永類 疥落即愈 肘後方 中砒毒 研絞汁
灌之

永類方

白扁豆花 解一切藥毒垂死功同扁豆 時珍

方 血崩不止 入——焙為末空心炒米煮湯 入薑少許調下二錢即效 奇效

葉治霍亂吐下不止吐下後轉筋生搗汁入少醋絞

汁服立瘥 蒸 蕪

綠豆

甘寒 截器曰用宜連皮去皮則令 煮食消腫下氣壓 人少壅氣蓋皮寒而肉平也

熱解毒生研絞汁服治丹毒煩熱風疹及藥石發動

綠豆

以——皮作枕：之遂愈此意亦本於日

希雍曰：熱客陽明則發風疹，胃主肌肉故也。陽明熱解則風疹除矣。

熱氣奔豚 寶開 治寒熱、中止瀉痢、卒澀利、小便脹滿

思厚腸胃作枕明目治頭風頭痛除吐逆 華日補益元

氣調和五臟安精神行十二經絡去浮風潤皮膚宜

常食之煮汁止消渴 孟說解一切藥草牛馬金石毒 原竇

治豆毒利脹腫 時珍

時珍曰反樞子殼害人合鯉魚鮮食久則令人肝黃成渴病

發明 時珍曰——鮮金石砒霜草木一切諸毒宜連皮生研水服爽堅志云有人服附子酒多頭腫

如斗唇裂血流急求——黑豆各數合嚼食並煎湯飲之乃解

方 痘後癩毒 初起以三豆膏治之神效—— 赤小豆等分為末醋調時——掃塗

醫學

正傳

小兒丹毒

一五錢大黃二錢為末用生薄荷汁入蜜調塗全幼心鑑

赤痢

不止

以火麻仁水研濾汁煮

老人淋痛

皮二兩者煮豆

粥下麻子仁汁一升空心漸

消渴

一煮汁多食易

食之并飲汁效

養老書

普濟

饑

一黃麥糯末各一升炒熟磨粉每以白湯服一杯三五日見效

十種水氣

用

合半大附子一枚去皮臍切作兩片水三椀主熟空心卧時食次日將原附子切四片再以一如常煮

食第三日別以附子一如前者法水從小便出腫自消未消再服忌生冷毒物鹽酒六十日效 朱氏

集

扁鵲三豆飲

治天行豆瘡預服此飲疎解熱毒縱出亦少用 一赤小豆黑大豆各一

升甘草節二兩以水八升煮極熟任意食豆飲汁七日乃止 一方加黃大豆白大豆各五豆飲

綠豆粉

甘涼平解諸熱益氣解酒食諸毒治發背

綠豆粉

五十三

瘡疽及湯火傷吳瑞痘瘡潰爛不結痂者以此撲之良

原新水調服治霍亂轉筋解諸藥毒死心頭尚溫者

時

珍

發明時珍曰一屬水通於厥陰陽明其性平消腫治痘之功雖同赤小豆而清熱解毒之力過之

且益氣厚腸胃通經脈無久服枯人之忌外科治瘡

疽有內托護心散極言其神效丹溪有論發揮震亨

曰外科精要謂內托散一日至三日進十數服可免

毒氣內攻臟腑竊謂一解丹毒治石毒味甘入陽

明性寒能補為君以乳香去惡腫入少陰性溫善竅

為佐甘草性緩解五金八石百藥毒為使想此方專

為服丹石發疽者設也若夫年老者病深者證備者

體虛者一一雖補將有不勝其任之患五香連翹湯

亦非必用之劑必當助氣壯胃使根本堅固而行經

活血為佐參以經絡時令使毒氣外發此則內托之

本意治施之早
可以內消也

方 護心散

又名內托散又名乳香萬金散凡有瘰
疽一日至三日之內連服十餘劑方先

變症使毒氣出外服之稍遲毒內攻或嘔吐或鼻生
瘡菌不食即危矣四五日後亦宜間服綠豆粉一兩
乳香半兩燈心同研和勻以生甘草濃煎調下一錢
時：呷之若毒沖心有嘔逆之症大宜服此服至一

兩則香徹瘡孔真
聖藥也 李立嗣 瘡氣嘔逆 綠豆粉三錢乾胭脂半
錢研勻新汲水調服立

止 普 霍亂吐利 綠豆粉白糖各二兩新
濟方 汲水調服 生：編 打撲損傷

一人誦觀音經甚誠出行折一足夢僧授一方
新鈔炒紫色井水調厚傅紙貼杉木札定其效如神

秦方

綠豆皮 甘寒解熱毒退目醫

時珍

綠豆皮 豆豉

五十四

方通神散

治斑痘生醫——菊花穀精草等分
為末每用一錢乾柿餅一箇同煮食柿

日三五服

直指方

豆豉

藏器曰入藥用無益者時珍曰以黑豆造者入

藥外臺秘要造淡——法用黑大豆二三斗六

月內淘淨水浸一宿瀝乾蒸熟取出攤席上候微濕

蒿覆每三日一者候黃衣上遍不可太過取晒敲淨

以水拌乾濕得所以汁出指間為準安甕內築實素

葉厚蓋三寸泥密封於日中晒七日取出晒一時又

以水拌入甕如此七次再蒸過

攤去火氣甕收築封即成矣

苦寒

思邈曰苦

治傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿

甘寒瀆

悶虛勞喘吸兩脚疼冷殺六畜胎子諸毒別錄治時疾

熱病發汗熱末能止盜汗除煩生搗為丸服治寒熱

馮景曰：汗散頗有力。一庖人患傷寒，身痛無汗，予與羌活湯二劑，不汗乃去羌，防用一，佐以桔梗杏仁，遂大汗。

馮景曰：傷寒發汗一方，指傷寒言之，故可加葛根、麻黃。若誤認瘧疾為傷寒，加入葛根、麻黃，斯大謬矣。若抱鼓滿，雖瘧疾亦可。

藜蘆部

風胸中生瘡者，服治血痢腹痛，研塗陰莖，生瘡。性藥治。

瘡疾骨蒸，中毒藥，蠱氣犬咬。大下氣，調中治傷寒，温。

毒發斑嘔逆。時珍

發明：弘景曰：春夏之氣不和，蒸炒以酒漬服之，至佳。患脚氣人常漬酒飲之，渣傳患處皆瘡。○蘇頌

曰：古今方書用一，治病最多。江南人善作之，凡時

氣即先用葱豉湯取汗，性便瘡。時珍曰：一調中

下氣，黑豆性平，作豉則温，既經蒸冒，故能升能散。得

葱則發汗，得鹽則能吐，得酒則治風，得薤則治痢，得

蒜則止血炒熟，又能止汗。亦麻黃根節之義。

方：傷寒發汗。肘後方云：傷寒有數種，庸醫卒不能

分別者，今取一藥兼治之。初覺頭痛，身熱脉洪，一二日便以葱豉湯治之。葱白一虎口，

一升水，三升煮一升，頓服。取汗不汗，更作加葛根

豆豉

五五

若再不汗加麻黃○又方豉一升
童便三升煎一升分服取吐取汗
傷寒不解 已三四
日胸中

悶惡者豉一升鹽一合水四升煮升
半分服取吐此秘法也 梅師方
傷寒懊憹 吐下
後心

中懊憹大下後身熱不去心中痛者並用梔子豉湯
吐之大梔子十四枚水二盞煮一盞入豉半兩同煮

至七分服待吐止
後服 傷寒論
傷寒暴痢 藥性論曰以豉一升薤
白一握水三升煮薤熟

納豉更煮色黑
去豉分作二服 血痢不止 用一一大蒜等分杵丸梧
子大每服三十九盞湯下

王氏 血痢如刺 一升水浸煎兩沸絞
將濟方 汁類服不瘥再作 藥性
赤白重

下 葛氏用豆豉炒微焦以水溫汁服甚驗○外臺
用一炒末一升分四服酒下入口即斷也 臟

毒下血 烏犀散淡豆豉十文大蒜二枚煨同搗丸梧
子大煎香菜湯下二十九日二服安乃止永

除根○彭大祥云此方甚妙大蒜九蒸更佳以冷齏
水下嘗見數十年之疾得此方永不復作也 究原

小便血條 淡一煎湯空 瘡疾寒熱 一煮飲數

肘 斂 痰 積 天陰便發生卧不得飲食不進乃肺

後方 八次即出惡痰藥性亦隨 風毒膝攣 骨節痛一

飲 食 咽 生 瘰 肉 鹽鼓和搗塗之刺破 口舌生瘡 用

醫 心 鏡 跌 末 舍 一 宿 即 頰滿鼓一升水煮汁調服

愈 聖 惠 方 錄 妊 娠 胎 動 一炒煎汁 一切惡瘡 一為末傅之

揚 氏 產 乳 蹉 跌 破 傷 傷筋骨鼓三升水三升漬 濃汁飲止心悶 千金 打傷瘀聚

瘡 再 作 一 升 煮 飲 不 腫從脚起 鼓汁飲之渣傅 解一切

食物藥毒 煮汁 飲

豆鼓 脂麻

昂曰補肺氣益肝腎色黑者入腎柔色者名鱉蝨胡麻尤佳

昂曰能涼血故治阻能解毒故傳頭瘡劉河間云麻本殺而治風又云治風先治血血活則風散胡麻入肝益血故風藥中不可闕也鄭奠一用鱉蝨胡麻佐苦參葦藜治大癩疥癩屢有愈者
又曰性滑腸與白朮同用為勝

俗作芝麻 脂麻 又名巨勝 本經油麻 食療胡麻別錄時珍曰胡麻即脂麻也按本經胡麻一名巨勝諸家承誤

各誤各疑今肆市間遂以芫薺子偽為巨勝以黃麻子及大藜子偽為胡麻誤而有誤矣芫薺子長一分許有三稜黃麻子黑如細韭子味苦大藜子狀如壁蝨及酸棗仁味辛甘並無脂油不可不辨弘景曰以純黑者為巨勝

甘平治虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦本經明耳

自耐飢渴療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸

潤養五臟補肺氣止心驚利大小腸逐風濕氣

遊風頭風治勞氣產後虛羸催生下胎胞白蜜蒸餌

治百病日炒食不生風病久食則步履端正語言不

希雅曰得首烏茅朮茯苓葛蒲辛葉牛膝
 當歸川斷地黃桑寄生治風濕痺 同菊
 花天冬黃柏生地首烏柏子仁桑葉牛膝
 杞子麥冬作丸治似中風半身不遂久服
 有神驗
 鴈泉曰同桑葉為丸名桑麻丸補肝腎去
 風明目

蹇李廷 牛疔塗小兒頭瘡煎湯洗惡瘡及婦人陰瘡

大效蒸 白者甘寒原曰生者性寒炒者性熱 滑腸
而發病蒸者性溫而補人

胃行風氣通血脉去頭上浮風潤肌肉食後生噉一

合終身勿輟又令乳母服之孩子不生病客熱可作

飲服生疔傳小兒頭瘡良孟

發明弘景曰胡麻取黑者九蒸九晒搗餌之斷穀
長生蒸不熟令人髮落性與茯苓相宜時珍曰

胡麻取油白者為勝服食以黑者為良胡地者尤妙

取其色黑通腎而潤燥也赤者狀如老茄子殼厚油

少但可食不堪服食唯錢乙治小兒痘瘡變黑歸

腎百祥丸用赤一煎湯下蓋亦取其解毒耳又按

蕪東坡與程正輔書云凡痔疾宜斷酒肉與鹽酪醬

菜厚味及粳米飯唯宜食淡麩一味及以九蒸胡麻

脂麻五十七

即黑——同去皮茯苓入少白蜜為麩食之日久氣力不衰而百病自去痔可漸退此亦長生要訣但易知而難

行耳

方 小兒急疔

生嚼傳之 外壺

小兒療癰

——連翹等分 為末頻食之

簡便方

疔腫

——炒炭針砂等分為末 醋和傳之日三 普濟

瘡不合

烏——炒黑研

傳 千金

鮮蠱毒及

河豚砒石等毒一時無藥急用 清麻油多灌取吐 衛生方

鼻血

不止

紙摺蘸真油入鼻取嚏即愈有人 一夕血盈盈用此而效 普濟

瘰癧發背

油

一斤銀器煎二十沸和醇醋二梳分

五次一日服盡毒不內攻 直指

大風熱疾

手足不遂

用硝石一兩生烏——油二大升同納鑊中以土埵蓋口紙泥封固細火煎初煎氣腥藥熟則香更以生

——油二大升和合微煎納磁器中用紙屋子生病人外面燒火發汗日服一大合壯者加倍三七日飽

好古曰手足陽明大腸胃足太陰脾經也

希雍曰風併於衛則衛實而營虛營者陰也血也經曰陰弱者汗自出益血養

瘡皆滅 瀉熱毒 清麻油一合和雞子二枚芒硝一兩 攪服少時即瀉下熱毒甚良 孟詵

髮癢 外臺云病髮癢者欲得飲油用油一升入香澤 煎之盛置病人頭邊令氣入口鼻勿與飲疲極

眠睡出當從口出急石灰粉手捉取抽盡即是髮也 初出如不流水中濃菜形○又云胸喉間覺有癢蟲

上下嘗聞葱豉食香此乃髮癢虫也二日不食開口 而卧以油煎葱豉令香置口邊蟲當出以物引去之

必愈 髮癢腰痛 南史云宋明帝嘗宮人腰痛牽心發則氣 絕徐文伯診曰髮癢也以油灌之吐物

如髮引之長三尺能動搖 懸之滴盡汁惟一髮耳

大麻 又名大麻 日用黃麻 俗名漢麻 爾雅翼雄者名 臬麻 牡麻 詩疏雌者名苴麻 同上 苧麻 音字花

名麻 菁本經 麻勃 時珍

大麻仁 甘平 補中益氣 久服肥健 治中風汗出

本經

大麻

大麻

大麻

大麻

陰使營衛調而風和去故汗自止也
鳴皋曰觀千金治產後瘀血不盡金瘡瘀
血在腹中普濟治月經不通諸方自係血
分藥別錄破積血復血脉之文可証

逐水氣利小便破積血復血脉復脈湯中用之乳婦產後餘疾別錄下

氣去風痺皮頑令人心歡炒香浸小便絞汁服之婦

人倒產吞二七枚即正葢潤五臟利大腸風熱結燥

及熱淋多食損血脉滑精氣痿陽氣婦人多食發帶

疾士通乳汁止消渴催生日取汁煮粥去五臟風潤

肺治關節不通孟託利女人經脉調大腸下痢塗諸瘡

癩殺虫取汁煮粥食止嘔逆時

時珍曰畏牡蠣白微茨苓普曰先葢地中者食之殺
人宗奭曰極難去殼帛包置沸湯中浸至冷出之

懸井中一夜勿令着水取出晒乾
新瓦上按去殼取仁粒、皆完

發明 劉完素曰麻木穀也而治風同氣相求也好古
曰手足陽明足太陰藥也陽明病汗多

胃熱便難三者皆燥也故用之以通潤也成無己
脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥宗奭

曰仲景麻仁丸所用即此

方 大麻仁酒 治骨髓風毒疼痛不可運動
水浸沉者一大升晒乾炒香木白中

搗萬杵如粉分十帖每用一帖取無灰酒一大碗同
麻粉入石器中柳槌搗之漚去殼煎至減半空腹服

輕者四五帖重者十帖神效 篋中方
大麻仁粥 治風水腹大腰臍重
痛不可轉動

半斤入水研取汁入粳米二合
作粥下葱椒鹽豉食 心鏡
老人風痺 同上
五淋

溻痛 如上
大便不通 如上
麻子仁丸 治脾約大便秘
小便數

二升芍藥半斤厚朴一尺大黃枳實各一斤杏仁一
升炒研蜜丸桐子大漿水下十九不知再加日三

大麻 五十九

仲景 產後秘塞 許學士云產後汗多則大便秘難於
用藥惟——粥最穩及老人風秘

皆得力也——蕪子各二合洗淨 老人風秘 同上
研細再以水瀝汁煮粥分服 本事

產後瘀血 不盡——五升酒一升漬一夜明旦去
渣溫服不瘥再服不吐不下不得與男子

通一月將養如 月經不通 或數月或半年一年者用
初 千金方 一——二升桃仁二兩研

勻熟酒一升漬一 嘔逆不止 一——杵熬水研取汁
夜溫服 普濟 入鹽少許服立效 外

台 虛勞內熱 下焦虛熱骨節煩滿肌肉急大便不利
小便數少氣吸——口燥熱淋——五

合研水二升煎減 消渴飲水 日至數斗小便赤澀用
半分服 外臺 一——一升水三升煮

三四沸飲數服 腳氣腫渴 一——炒香水研取一升
即愈 肘後 再入水三升煮一升入赤

小豆一升煮食 腳氣腹痺 一——仁一升研酒三升
豆飲汁 同上 清三宿溫服大良 俱同

清三宿溫服大良 俱同

上 血痢不止 一 一 汁煮綠豆空 小兒痢下 赤白體

者 一 一 炒研末每漿水 俱同上 弱大困

下一錢立效 子母秘錄 金瘡瘀血 在腹中 一 一 一

枚搗熟水九升煮一升半頓 小兒頭瘡 疳瘡 一 一 一

服血出不盡再服 千金 研汁和蜜傳

之 大風癩疾 一 一 三升淘晒酒一斗漬一夜研

同上 取白汁瀝入瓶中重湯煮數沸收之

每飲一小杯兼服茹根散

乳香丸取效 聖惠方

元素曰入足陽明經

造釀部

神麴

俗作神曲

集解

時珍曰昔人用麴多是造酒之麴後醫乃造

一專以供藥力更勝之葉氏水雲錄云五

月五日或六月六日或三伏日用白麴百斤青蒿

自然汁三升赤小豆末杏仁泥各三升蒼耳自然

汁野藜自然汁各三升以配白虎青龍朱雀元武

勾陳騰蛇六神用汁和麴豆杏仁作餅麻葉或楮

葉色譬如造醬黃法

待生黃衣晒收之

甘草温化水穀宿食癥結積滯健脾胃暖胃藥性養胃

氣治赤白痢元素消食下氣除痰逆霍亂泄痢脹滿諸

疾閃挫腰痛者煨過滓酒温服有效婦人產後欲回

神麴

三一

造釀部

乳者炒研酒服二錢日二甚驗時珍

發明 元素曰入足陽明經凡用酒火炒黃以助土氣陳久者良時珍曰啓微集云一一治目病生能

發其生氣熱能飲其暴氣也

方 胃虛不剋 一一半斤麥牙五升杏仁一升壯脾

進食 療痞滿暑泄麴木丸一一炒蒼朮米泔浸炒

胃思食 養食丸治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹腸膨脹食減嗜卧口無味一一六兩麥

牙炒三兩乾薑炮四兩烏梅肉焙四 **虛寒反胃** 方同上

俱和劑 **產後運絕** 一一炒為末水服 **食積心痛** 一一塊

局方 **燒紅濟酒服** **摘元方**

紅麴

集解

時珍曰：一近世始出其法，白粳米一石五斗，水淘浸一宿，作飯分十五處入麴母三斤。

搓揉令勻，併作一處，以帛密覆，熱即去帛攤開，覺溫急堆起，又密覆，次日日中又作三堆，過一時分作五堆，再一時合作一堆，又過一時分作十五堆，稍溫又作一堆，如此數次，第三日用大桶盛新汲水，以竹羅盛麴，作五六分，蘸濕完，又作一堆，如前法作一次，第四日如前，又蘸若麴半沉半浮，再依前法作一次，又蘸若盡浮，則成矣，取出日乾，收之。其米過心者，謂之生黃，入酒及酢醢中，鮮紅可愛。未過心者不佳。入藥陳久者良。

甘溫消食活血健脾燥胃治赤白痢下水穀震釀酒亨

破血行藥勢殺山嵐瘴氣治打撲損傷吳治女人血

紅麴

六三

昂曰：一破血亦能活血和血。
昂曰：釀酒則辛熱有小毒發腸風痔瘻脚氣哮喘痰嗽諸疾。
昂曰：一燥濕能腐生物故魚肉多用之。
造釀部

不特取其色也

氣痛及產後惡血不盡搗酒飲之良

時珍

發明

時珍曰人之水穀入胃受中焦濕熱熏蒸游溢精氣日化為紅散布臟腑經絡是為營血此造

化自然之微妙也造一者以白米飯受濕熱鬱蒸變而為紅即成真色久亦不變此人窺造化之巧者

也故一有治脾胃營血

之功得同氣相求之理

方 濕熱泄痢

丹溪青六丸用六一散加炒一錢為末蒸餅和丸梧子大每服五

十九白湯送下

心腹一香附乳香等分小兒吐逆

朱丹溪心法 為末酒服 摘元

頻仍不進乳食手足心熱用一一年久者三錢半白

木麩炒一錢半炙甘草一錢為末每服半錢煎麥子

米湯下 聖濟 小兒頭瘡 因傷濕入水成毒膿汁不止 用一嚼甚效 百一

酒

鴛巢旦酒同薑合大驚肺氣。或云以葛花赤小豆花為末酒下可飲酒不醉

苦甘辛熱有毒行藥勢殺百邪惡毒氣別錄通血脉潤

皮膚散濕氣藏器養脾氣扶肝除風下氣孟詵開胃下食

暖水臟溫腸胃禦風寒殺一切蔬菜毒日華解馬肉桐

油毒和血養氣暖胃辟寒多飲發痰動火時珍

士良曰凡服丹沙石亭脂鍾乳諸石不可長用酒下

能引石藥氣入四肢滯血化為癭疽藏器曰酒漿照

人無影不可飲空酒自耗不可飲酒合乳飲令人氣

結同牛肉食下附人生蠱酒後卧黍穰食未亦猪肉患大風

時珍曰酒後食辣物及薑芥緩人筋骨酒後飲茶傷

腎令腰脚重墜膀胱冷痛兼患痰飲水腫消渴攣痛

之疾一切毒藥回酒得者難治又酒得醜而解者水

制火也酒性上醜潤下也畏枳椇葛花赤豆花綠豆

粉者寒

酒勝熱也

鳴皋曰常飲冷酒者必患手戰不能執筆
丹溪之言不能無弊

發明

弘景曰大寒凝海惟酒不冰其性熱藥家多用
以行其勢多飲則體弊神昏有毒故也三人胃

霧晨行一人飲酒一人飽食一人空腹空腹者死飽
食者病飲酒者健酒能辟惡也好古曰酒能引諸經
不止與附子相同味之辛者能散苦者能下甘者能
居中而緩用為導引可以通行一身之表至極高之
分味淡者則利小便而速下也古人惟以麥造麴釀
黍為酒已為辛熱有毒今之釀者加以烏頭巴豆砒
霜薑桂石灰竈灰之類大毒大熱以增其氣味豈不
傷冲和損精神涸營衛竭天癸而夭人壽耶震亨曰
本草止言酒熱有毒不言其濕中發熱近于相火觀
于醉後振寒戰慄可見矣又性喜升氣必隨之痰鬱
於上溺澀於下恣飲寒涼其熱內鬱肺氣大傷其始
也病淺或嘔吐或自汗或瘡疥或鼻衄或瀉痢或心
脾痛尚可散而去之其久也病深或消渴或內疽或
肺痿或鼓脹或失明或哮喘或勞瘵或顛癇或痔漏
為難名之病非具眼未易處也夫醇酒理宜冷飲有
三益焉過于肺入於胃然後微溫肺得濕中之義可

案曰馬汗入瘡毒攻內也故殺人飲酒至醉散毒出外也故即愈此理可類推

以補氣次得寒中之溫可以養胃冷酒行遲傳化以漸人不得恣飲也今則不然徒取快喉舌焉耳時珍曰少飲則和血行氣壯神禦寒痛飲則傷神耗血損胃亡津生痰動火害不勝言

方 驚怖卒死 溫一灌 馬汗入瘡 馬汗馬毛入瘡其毒最甚皆致腫痛

煩熱入腹則殺人多飲 醇酒至醉即愈 肘後 蛇咬成瘡 暖一淋洗日三次 癩利 蜘蛛

瘡毒 同上 毒蜂螫人 同上 耳聾 三十年者一三升浸壯荆子一升七去

渣任飲 千金 產後血悶 清一升和生地黃 汁一升煎服 梅師

附諸酒方 五加皮酒 去一切風濕痿痺壯筋骨填精髓以五加皮煎汁和麴釀

或切碎袋盛浸煮飲或 加當歸牛膝地榆諸藥 白楊皮酒 治風毒脚氣腹中痰癖如石以白楊

皮切浸 女貞皮酒 治風虛補腰膝女貞 仙靈脾酒 治

酒

六四

風不遂強筋骨仙靈脾一斤袋盛浸酒一斗密封三日飲 聖惠方 薏苡仁酒 去風濕強

筋骨健脾胃用新苡仁粉 天門冬酒 潤五臟和血脉 久服除五勞七

傷癩癩惡疾忌生冷常令酒氣相續勿令醉十日當出風疹毒氣三十日當瘥用天冬去心煮汁同麴米

釀成初熟酸久乃 白石英酒 治風濕周痺肢節濕痛 味佳 千金方 及腎虛耳鳴耳聾用白

石英磁石煨醋碎七次各五兩研末袋 盛浸酒中五六日飲酒少再添 聖濟 地黃酒 補虛弱壯

筋骨通血脉治腹痛變白髮用肥生地絞汁同麴米 密封五七日發之中有綠汁真精英也宜先飲之乃

濾汁歲貯如牛膝汁效 牛膝酒 壯筋骨治痿痺補虛 更速亦有加羣藥者 損除久瘡用牛膝煎

汁釀一或袋 菖蒲酒 治三十六風一十二痺通血脉 盛浸煮飲之 治骨痿久服聰明耳目石菖蒲

煮汁釀一 杞子酒 補虛益精去冷風壯陽道止目淚 或浸煮飲 健腰脚用杞子煮搗汁釀一或以

子同生地袋
盛浸一煮飲
菊花酒
治頭風明耳目去痿痺消百病

當歸杞子冬
黃精酒
壯筋骨益精髓變白髮治百病

青諸藥亦佳
黃精酒
黃精蒼朮各四斤地骨皮柏葉

各五斤天冬三斤煮汁一石同
素椹酒
補五臟明耳目治水腫不

麴十斤糯米一石如常釀一飲
素椹酒
目治水腫不

下則滿下之則虛入腹則十無一活者用
茵香酒
治

素椹搗汁煎過同麴米如常釀法飲之
茵香酒
腎

氣痛偏墜引及心腹痛茵
砂仁酒
消食和中下氣止

香浸一煮飲番舶者尤良
砂仁酒
心腹痛行經砂仁

炒研袋盛
莎根酒
治心中客熱膀胱腸下氣鬱常憂

浸酒煮飲
莎根酒
不樂以香附一斤切炒香袋盛浸

酒日夜飲之常令
茵陳酒
治風疾筋骨攣急茵陳

酒氣相續勿令醉
茵陳酒
炙黃如常造釀任飲之青

葛酒
治虛勞久瘡搗
百部酒
百部浸酒飲治

葛酒
汁煎過造酒飲
百部酒
一切久近咳嗽海藻酒

洗淨浸一
松節酒
見松

治癭氣
松節酒
下見松

酒
柏葉酒
見柏

六十五

鳴皋按醋音非說文云客酌主人也玉篇云進酒于客曰獻客答主人曰醋古人酬

脚用牛蒡根切
浸醉一飲之
花蛇酒 見本
烏蛇酒
蚺蛇酒
蝮

蛇酒 俱見
雞矢醴 見鷄
豆淋酒 破血去風治男子口
喝中風陰毒腹痛及

小便尿血婦人產後一切中風
諸病黑豆炒焦以淋之飲
霹靂酒 治疝氣偏墜
婦人崩中下

血胎產不下以鉄
器燒赤淬一引藥
龜肉酒 治十年咳嗽
釀法見龜條
虎骨酒 治臂
脛疼

痛歷節風痛
釀法見虎條
麋骨酒 治陰虛腎弱久服令人肥
白麋骨煮汁如常釀一飲
鹿骨

酒 同上
法 同上
鹿茸酒 治陽虛痿弱小便頻數帶損諸虛
症用鹿茸山藥浸一飲詳見鹿茸
戊

戊酒 大補元陽其性大熱陰虛無寒者不
宜多飲用黃犬肉一隻者糜連汁釀
羊羔酒 大補

元氣同
上造法 膾胸臍酒 助陽益精髓破癥結冷氣大補
膾胸臍酒浸打爛如常釀法

醋 又名酢 音醋 醞音兮 苦酒

醋字作醋亦酢音昨醑之名則作酢音措後人以醑為醋俗相承之變也

鴛鴦曰多食損肺收斂太過也一人嗜醋每燕飲枵腹人輸飲酒渠輸飲醋可飲斤

酸苦温消癰腫散水氣殺邪毒別錄理諸藥消毒扁鵲治

產後血運除癥塊堅塊堅積消食殺惡毒破結氣心

中酸水痰飲藏器下氣除煩治婦人心痛血氣并產後

及傷損金瘡出血昏運殺一切魚鱉肉菜毒日華醋磨

青木香止卒心痛血氣痛浸黃柏含之治口瘡調大

黃末塗毒腫煎生大黃服治瘰癧甚良孟詵散瘀血治

黃疸黃汗好古曰仲景治黃汗有黃芪芍藥桂枝苦酒湯治黃疸有麻黃醇酒湯用苦酒清酒

方見金匱要略

弘景曰多食損人臟腑藏器曰多食損筋骨亦損胃不益男子損人顏色醋發諸藥不可同食時珍曰酸

醋

李六

許後患嗽百治不效而死
[希雍]曰經曰酸走筋：病母多食酸凡筋
攣偏痺手足屈伸不便皆忌之為能助肝
賊脾也凡脾病者亦不宜過食

屬木脾病母多食酸：傷脾肉膈而唇揭。服茯苓
丹參人不可食。鏡源曰米一制四黃丹砂膽礬常
山諸

藥

發明

[宗奩]曰產婦房中常以火炭沃一氣為佳酸益
血也以磨雄黃塗蜂蠆毒亦取其收而不散之

義造靴者須得一而紋皺故知其性收斂也[時珍]曰
此夢瑣言云一婦抱兜落炭火上燒灼以一泥傅之

旋愈無痕又一少年眼中常見一鏡醫不與食俟其
餓甚以芥一旋：吸之遂覺胸中豁然眼花不見醫

曰君吃魚鱠太多魚畏芥一故也觀此二事可證別
錄治癰腫殺邪毒之驗也大抵一治諸瘡腫積塊心

腹疼痛痰水血病殺魚肉菜及諸虫毒氣無非取其
酸收之義而又有散瘀解毒之功李廷飛云一能少

飲辟寒勝酒又曰入藥
米一為佳餘不入藥

方

身體卒腫

和蛭蚓糞
傳之千金

白虎風毒

以三年陳一
五升煎五沸

切葱白三升煎一沸瀉出以布染
之乘熱裹之痛止乃已
外臺 足上轉筋 同上 霍

亂吐利 鹽醋煎服甚
良 如宜方 霍亂脹悶 未得吐下 飲
三升 千金 瘰疽

不潰 和雀屎如小豆大傳
瘡頭上即穿也 肘後 舌腫不消 以和釜底
墨厚傳舌之

上下脫則更 木舌腫強 糖 一時含
傳致 千金 普濟 牙齒痛 骨皮含

漱即瘡 食雞子毒 飲 少許即
肘後 消 廣記 毒蛇傷螫 清醞醋急
飲一二椀

令毒氣不散然 湯火灼傷 以 淋洗并
後用藥 濟急 泥塗之甚妙 胎死不下

月未足者大豆煮一服三升立
便分解未下再服 子母秘錄 胞衣不下 腹滿則殺
人以水入

少許啜面神 丁腫初起 用麩圍住以針亂刺瘡上
效 聖惠方 銅器煎一沸傾入團中令

客一盞冷即易 三度根即出也

醋 三度根即出也

鴉奉曰補肝腎

菜部

菜部

韭

又名草鍾乳拾遺起陽草侯氏藥譜

辛微酸温

時珍曰生辛湯熟甘酸大明曰熟

歸心安五臟除胃中熱

利病人可久食

別錄時珍曰千金方作可久食不利病人

煮食温中下氣

補虚益陽調和臟腑令人能食止洩膿血腹中冷痛

生搗汁服主胸痹骨痛不可觸者又解藥毒療狂犬

咬人數發者亦塗蛇惡蟲螫毒葢煮食充肺氣除心

腹痼冷瘕癖搗汁服治肥白人中風失音日華煮食歸

腎壯陽止洩精暖腰膝原汁服治胸痹刺痛如錐即

韭

菜

吐出胸中惡血甚驗孟主吐血唾血衄血尿血婦人

經脉逆行打撲傷損及噎膈病搗汁澄清和童便飲

之能消散胃脘瘀血甚效震飲生汁主上氣歇息欲

絕鮮肉脯毒煮汁飲止消渴盜汗熏產婦血運洗腸

痔脫肛時珍

說曰不可與蜜及牛肉同食熱病後十日食之即發
困多食動宿飲吐水宗藥曰多食能昏神暗目酒後

尤忌

發明頌曰菜中此物最溫而益人宜常食之昔人正
月節食五辛以辟厲氣謂一薤葱蒜薑也思邈

曰一味酸肝病宜食之大益人心時珍曰一坐則辛
而散血熟則甘而補中入足厥陰乃肝之菜也素問

言心病宜食一葉食鑑本草言歸腎文雖異而理則相質蓋心則肝之子腎乃肝之母能令子實虛則補其母也有人貧叟病噎膈食入即吐胸中刺痛或令取一汁入鹽梅鹵汁少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升而愈此亦仲景治胸痹用薤白皆取其辛溫能散胃脘痰飲惡血之義也震亨曰心痛有食熱物及怒鬱致死血留於胃口作痛者宜用一汁桔梗加入藥中開提氣血有腎氣上攻以致心痛者宜用一汁和五苓散為丸空心茴香湯下蓋一性急能散胃口血滯也又反胃宜用一汁二杯入薑汁牛乳各一杯細溫服蓋一汁消血薑汁下氣消痰和胃牛乳能解熱潤燥補虛也一人臘月飲剗酒三杯自後食必曲屈下膈硬澹微痛右脉甚濇關脉沉此瘀血在胃脘之口氣因鬱而成痰阻塞食道也遂以一汁半盞細冷呷

盡半斤而愈

方 胸痹急痛

如錐刺不能俯仰自汗出痛或微背上不治或死可取生一五斤或根搗

韭

空丸

汁服 食 陰陽易病 男子陰腫小腹絞痛頭重眼花
療本草 宜蝦鼠湯用蝦鼠矢十四粒

根一大把水煮去渣服得汗 傷寒勞復 同 喘息欲絕
愈未汗再服 南陽活人書

效 千金 產後嘔水 產後困怒傷肝吐青綠水用
一汁飲一升 葉一斤取汁入薑汁少許

和飲即愈 赤白帶下 根汁和童便露一夜 鼻衄不
摘元 溫服效 海上仙方

止 根葱根同搗塞鼻中頻 獐犬咬傷 七日當一發
易二三度即止 千金 三七不發乃

脫也 急於無風處洗淨即服 一汁一椀隔七日又一
椀七 共服七椀百日忌食酸醃一年忌食魚腥終

身忌食犬肉否則十有九死徐本齋云此方出肘
後見一獐犬咬三人惟一人用此方得活 簡便 消

渴 苗日用三五兩作羹勿入鹽食 夜出盜汗 根
至十斤即愈極驗 秦副憲方 四十

九根水二升煮一 脫肛不收 生一斤切以酥拌炒
升頓服 千金 熟帛包作二包更互熨

之以入為痔痛用盆盛沸湯蓋之蓋上留一孔用一度聖惠萊一把泡湯中坐孔上先薰後洗數次自然脫產後血運萊安瓶中沃以熱醋令氣入鼻中即醒丹溪

韭子

辛甘溫治夢中洩精溺血錄暖腰膝治鬼交甚效華

補肝及命門治小便頻數遺尿女人白淫白帶時珍

時珍曰伏鍾乳香大明曰入藥蒸熟曝乾簸去黑皮炒黃用

發明

頌曰一得龍骨桑蝶蛸主漏精補中弘景曰一棘刺諸丸主漏精時珍曰棘刺丸方見

外臺治諸勞小便數藥多不錄按梅師方治遺精用一合白龍骨一兩為末空心酒服方寸匕千金方治夢遺小便數用一二兩桑蝶蛸一兩微炒研末每旦酒服二錢三因方治下元虛冷小便不禁或

韭子

七十

成白濁有家——丸蓋非乃肝之菜入足厥陰經腎
主閉藏肝主疎洩素問曰足厥陰病則遺尿思想無
窮入房太甚發為筋痿及為白淫男隨洩而下女子
綿——而下——之治遺精漏泄小便頻數女人帶下
者能入厥陰補下焦肝及命門之
不足命門者藏精之府故同治也

方 夢遺
藏器曰——生吞二十粒 蒸湯下○聖惠
虛勞傷腎夢遺——二兩微炒為末食前

酒下
二錢 玉莖強中
莖硬不痿精流不住時——如針刺控
之則痛名強中乃腎滯疾也用——

故紙各一兩為末每服三
錢承煎日三服效
腰脚無力 ——一升揀淨
蒸兩炊許暴乾

炒黃為末安息香二兩水煮一二百沸慢火炒赤色
和搗為丸梧子大如乾入少蜜每日空腹酒下三十

丸以少飯壓之大佳
崔元亮海上方
女子帶下
及男子遺精——七
升醋煮焙研末蜜丸

梧子大每服三十
丸温酒下 千金

元素曰入手太陰肺足陽明胃經希雅曰
亦入足厥陰肝

鳴泉曰辛無不溫白冷之說恐不盡然傷
寒湯中不用青者白入肺主皮毛用以
出汗也

希雅曰傷寒熱邪氣并也中風面目浮
腫風熱鬱也傷寒骨肉痛邪始中也喉痺
不通君相二火上乘于肺也辛涼發散得
汗則火自散而喉痺通也肝開竅于目散
肝中邪熱故云歸日除肝邪藥邪氣散則
正氣通血自調和而有安胎安中利五臟
之功

菜部

蔥 又名乳綱目菜伯同上和事草同上鹿胎

蔥白 辛平 弘景曰白冷青熱傷 作湯治傷寒熱
寒湯中不得用青

中風面目浮腫能出汗 本經 傷寒骨肉碎痛喉痺不通

安胎歸目益目睛除肝中邪氣安中利五臟殺百藥

毒根治傷寒頭痛 別錄 王天行時疾頭痛熱狂霍亂轉

筋及奔豚氣脚氣心腹痛目眩止心迷悶 大 通關節

止衄血利大小便 孟詵 治陽明下痢下血 李杲 達表和裏

止血 原 除風濕身痛麻痺蟲積心痛止大人陽脫陰

毒腹痛小兒盪腸內釣婦人妊娠瀉血通乳汁散乳

蔥

三

癩利耳鳴塗狽犬傷制蚯蚓毒時珍殺一切魚肉毒良士

思邈曰生葱同蜜食作下利燒葱同蜜食壅氣殺人

仲景曰生葱同棗食令人病同犬雉肉食令人病血

時珍曰服地黃

常山人忌食之

發明 元素曰葱白味辛而甘平氣厚味薄升也陽也
入手太陰足陽明經專主發散以通上下陽氣

故活人書治傷寒頭痛如破用連鬚葱白湯主之仲

景治少陰病下利清穀裏寒外熱厥逆脈微者白通

湯主之內用葱白若面色赤者四逆湯加葱白腹中

痛者去葱白成無己解之云腎惡燥急食辛以潤之

葱白辛溫以通陽氣也時珍曰葱生辛散熟甘溫外

實中空肺之菜也肺病宜食之肺主氣外應皮毛其

合陽明故所治之症多屬太陰陽明皆取其發散通

氣之功通氣故能解毒及理血病氣者血之帥也氣

通則血活矣金瘡損折傷血出疼痛不止者王璆

百一方用葱白砂糖等分研封之云痛立止更無癢

痕也葱葉亦可用又葱管吹入玉莖內治小便不通及轉脬危急者極有捷效余常用治數人皆驗宗
輿曰多食昏人神說曰
多食發人虛氣上冲

方 感冒風寒 初起葱白一握淡豆豉一合 煎服取汗 瀕湖集簡方 傷寒頭

痛 如破連鬚葱白半斤生薑 傷寒勞復 因交接者腹 痛邪腫葱白 二兩水煮溫服 活人書

搗爛苦酒和 風濕身痛 生葱搗爛入香油數滴水煎 服 千金 調川芎麝金末各一錢取吐

丹溪 胎動下血 疼痛搶心葱白煮濃汁飲之未死 心法 即安已死即出未效再服一方加

川芎一方用銀器同 卒中惡死 或先病或平居寢卧 未作粥食 深師 奄忽而死皆是中惡

急取葱心黃刺入鼻中七八寸男左女右 小兒卒死 鼻目血出即生無血不治此扁鵲秘方也

葱涎灌入鼻中氣通 小兒盤腸 內釣腹痛用葱湯洗 得嚏即活 經驗 兒腹仍以炒葱搗貼

葱 三

臍上良久尿出痛止

楊氏嬰兒寶鑑

陰毒腹痛

厥逆唇青卵縮六脉欲絕者用葱一大束

切去根切去青留白二寸烘熟安臍上以熨斗熨之葱壞再換良久透入手足溫有汗即瘥乃內服四逆

湯若手足不溫

不治 活人書 脫陽危症

凡人大吐大瀉之後四肢厥冷不省人事或與女子

交後小腹痛外腎縮冷汗出厥逆須臾不救先以葱

白熨臍法熨之後以葱白三七莖打爛酒煮灌之陽

氣即回此華佗

救卒病方也 卒心急痛

牙關緊閉欲死以老葱白五莖去皮鬚搗汁以匙送

入咽中灌以麻油四兩得下咽即醒少頃虫積皆化黃水而下永不再發屢效 瑞竹堂 虻虫心

痛 用葱白二寸鉛粉二錢搗丸服之即止 楊氏經驗方 小便閉脹

葱能通氣粉能殺虫也 楊氏經驗方 小便閉脹

不治殺人葱白三斤切炒怕盛用二

箇更互熨小腹氣透即通 本事 大腸虛閉 勻氣散用

連須葱一莖薑一塊藍一捻豆豉三七粒共搗

作餅烘掩臍紮定氣通即愈不通再作 直指 急淋

急淋

陰腫 煨葱搗泥貼 腫毒尿閉 日腫毒未潰小便不通 取葱切入麻油煎至黑

色去葱取油時塗 腫處即通 普濟 水瘡病腫 葱根白皮煮汁服一盞 當下水出病已困者取

根搗爛坐之取氣 陰囊腫痛 葱白乳香搗塗即時痛 止腫消又方用煨葱搗

水自下 聖濟錄 泥入鹽 小便尿血 葱白一握鬱金一兩水一升 煎二合溫服日三 普濟 赤白

塗之 葱白切碎和米煮 粥食 食醫心鏡 便毒初起 葱白和蜜搗傅怕畏 內服通氣藥即消

類 永 一切腫毒 葱汁漬之 乳癰初起 葱汁一升頓服 即日三五度 即散 千金 疔

瘡惡腫 刺破以老葱生蜜搗貼兩 禿瘡 米泔洗淨葱 疔出醋湯洗神效 聖濟 搗泥和蜜塗

之神效 見楊氏方 刺瘡金瘡 百治不效葱煎 金瘡瘀血 在腹 者葱 濃汁漬之甚良

白二十莖麻子三升搗碎水九升煮升半頓服 當吐出膿血而愈未盡再服 並出千金方 腦破

葱葉

七十二

骨折 蜜和葱白搗勻厚封立效 肘後 **縊死** 葱心黃刺耳鼻中有血出即甦

葱葉 煨研傳金瘡水入鞍腫益研傳蛇虫傷及中

射干溪毒 日華 主水病足腫 蘇頌 利五臟益目睛發黃疸

思 邈

發明 頌曰 煨葱治打撲傷見劉禹錫傳信方云取葱新折者煨火煨熱剝皮其間有涕便將罨損處

似多煨續：易熱者李抱真以球杖按毬子其軍將以杖相格目傷拇指并甲爪劈裂遽索金瘡藥裹之強索酒飲而面色愈青思痛不止有軍吏言此方三易而面色赤斯酒曰己不痛凡十數度用熱葱并泔纏裹其指遂畢席笑語 時珍曰 按張氏經驗方云金創折傷血出用葱白連葉煨熱或鍋烙炒熱搗爛傅之冷即再易石城尉戴堯再試馬損大指血出淋漓余用此方再易而痛止明日洗面不見痕跡宋推官

鮑縣尹皆得此方每有創傷氣未絕者用此活人甚衆又凡人頭目重悶疼痛時珍每用蔥葉插入鼻內三寸并耳內氣

通即便清爽也

方 水病足腫

煮湯漬之日三五次獨行方

小便不通

搗泥入蜜合外腎上

即通 水類方 瘡傷風水

腫毒取蔥青葉和乾薑黃柏等分煮湯浸洗立愈 食療 蜘蛛

咬傷

編身生瘡青蔥葉一莖去尖入蚯蚓一條在內待化成水取點之即愈 兵部手集

汁 辛温治瀉血飲之解藜蘆及桂毒 別錄 散瘀血止

衄止痛治頭痛耳聾消痔漏解諸藥毒 時珍 能消玉為

水化五石

私景

發明

時珍曰葱汁功同葱白古方多用葱涎九藥亦取其通散上焦風氣也勝金方取汁入酒少許

葱汁

七十四

瘰癧下

台一方

詳乾薑

下

滴鼻中治衄不止云即覺血從腦散下也又唐瑤經
驗方以葱汁和蜜少許服之亦佳云鄰媪用此甚效
老僕試之亦驗古云二物同食則害人何以能
治此疾恐人脾胃不同非甚急不可輕試也

方

衄血

見發明

痔漏作痛

葱汁白蜜和塗之先以木
盤子煎湯熏洗其冷如水

即效一人苦此早用之

中鈎吻毒

面青口噤欲死以
葱涕啖之即解

晚即安也

唐仲舉方

金十

鬚

通氣

孟詵

療飽食房勞血滲入大腸便血腸澀成

痔研末酒服二錢

時珍

方

喉中腫塞

氣不通者葱鬚陰乾為末每用二錢
入胆礬末一錢和勻每吹一字 杜

方

鳴皋曰入手足陽明大腸胃經

鳴皋曰凡味辛者無不溫蕪頌於葱薤皆云白冷青熱恐未必然大抵葱薤之法取其能通則熱散亦猶生薑之性熱而用涼也

菜部

實 辛太溫明目補中氣不足本經 溫中益精日華 宜肺

歸頭思

方 目暗補中

葱子半升為末每取一匙煎湯升半去滓入米煮粥食之亦可為末蜜丸

梧子大食後米飲服一二

十九日三服 食醫心鏡

薤

又名藟子音叫火葱綱目

集解

時珍曰一八月栽根正月分時宜肥壤數枝一本則茂而根大葉狀似韭葉中實而扁

有劍脊一葉中空似細葱葉而有稜氣亦如葱二月開花紫白色根如小蒜一本數顆相依而生

薤白 辛苦溫滑

頌曰去青用白冷而青熱

治金瘡敗本經 歸骨

除寒熱去水氣溫中散結氣作羹食利病人諸瘡中

薤

七十五

常曰按後重者亦有氣虛血虛火熱風燥之不同

馮景曰日華云止久瀉冷痢東垣云治瀉痢下重者亦當指久瀉冷痢也熱痢用之當佐以苦寒取其能入下焦泄大腸氣滯耳今治痢者不論寒熱悉加之宜其無效矣

風寒水氣腫痛搗塗之別錄煮食調中補不足止久痢

冷瀉肥健人日華治瀉痢下重能泄下焦陽明氣滯果

再古曰下重者氣滯也四逆散加此以泄氣滯治少陰病厥逆下痢及胸痹

刺痛下氣散血安胎時珍心病宜食利產婦思邈治女人

帶下赤白作羹食之骨鯁在咽食之即下孟詵白者補

益赤者療金瘡及風生肌肉蘇恭同蜜搗塗湯火傷甚

速宗溫補助陽道時珍

說曰發熱病不宜多食三四月勿食生者大明

曰生食引涕唾不可與牛同食令人作癥瘕

發明說曰白色者最好服之可通神安魂魄益氣續筋力頌曰煮與葶婦飲易產亦主脚氣時珍

戴音在
酢漿也

曰一味辛氣溫諸家言其溫補獨蘊頌謂其冷補蓋亦不然也又按王禎云一生則氣辛熟則甘美食之有益老人宜之薛用弱齊諧志云一人得天行病後遂能大餐日食至一斛五年家貧行乞一日至一園大饑食一畦大蒜一畦便悶極卧地吐一物如龍漸縮小有人撮飯於上即消成水而病尋愈按此亦散結蒜消癥之驗也宗奭曰一葉光滑露亦難貯千金治肺氣喘急方中用之亦取其滑泄之義

方

胸痹刺痛

仲景括樓一湯治胸痹痛徹心背喘息欬唾短氣喉中燥痒寸脉沉遲

關脉弦數不治殺人用括樓一枚一升白酒七升煮二升分二服○千金治胸痹半夏一湯用

一四兩半夏一合枳實半兩生薑一兩括樓半箇以白截三升煮一升溫服○肘後治胸痛瘥而復發

一五升搗霍亂乾嘔不止以蘊一握水三升汁飲立瘥者減半頓服獨行方奔豚氣

痛

搗汁飲

赤痢不止

服陳藏器

赤白痢

蘊蒜

七十六

煮粥食
食醫心鏡
小兒疳痢
一熟與食不過三兩服
楊氏產

乳
產後諸痢
多煮一食或
作羹
范汪方
妊娠胎動
胎內冷痛
一升當歸

四兩水煮服
古今錄驗
瘡犯惡露
甚者殺人
一搗爛以帛裹
煨熟去帛傅之冷即易換亦

可搗作餅以艾炙之熱氣
入瘡水出即瘥也
梅師
疥瘡痛痒
煮薤葉搗爛
塗之
時後
手

足癩瘡
生薤一把以熱醋投入
搗封瘡上取效
千金
毒蛇犬咬
諸傷
搗汁飲并

傳之
葛洪方
又名小蒜

蒜
保昇曰
小蒜野生處
有之苗葉根子皆似
葫而細數倍也
頌曰
本草謂大蒜為葫小蒜

集解
為蒜爾雅云萬山蒜也即小蒜也
宗奭曰
小蒜苗
如葱針根白大者如烏芋子
時珍曰
家蒜有二種

萬音方

鳴象曰本草於大蒜下註云合家食殺人小蒜下不言然性味相同自應一律忌之

根莖俱小而瓣少辣甚者小蒜也根莖俱大而瓣多辛而帶甘者葫也大蒜也

辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃温

中除邪痺毒氣別錄主溪毒弘景下氣治蠱毒傳蛇蟲沙

蟲瘡

日華菘曰此蒜與胡蔥相得主惡戴毒山溪中沙虱水毒大效山人狸獠時用之

塗丁

腫甚良

孟詵

思貌曰三月勿久食傷人志性黃帝書云同生魚食令人奪氣陰核痛瑞曰脚氣風病人及時病後忌食

發明

頌曰古方多用小一治冷霍亂者汁飲之南齊諸澄治李道念雞瘕便瘡時珍曰李道念病五

年褚澄診之曰非冷非熱當是食白滄雞子過多也取一升煮食吐一物起果視乃雞雛也吐凡十二

枚而愈後漢書云華佗見一人病噎食不得下令取一盞大可二升飲之立吐一蛇而愈夏子益奇疾方

蒜

羊七

云人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也
用一汁半兩和酒服當吐出如蛇狀觀三書所載則
乃吐蠱要藥而

後人少有知者

方 霍亂轉筋

入腹殺人以小一盞各一兩搗
傳臍中灸七壯立止 聖濟 積年

心痛

不可忍不拘十年五年者隨手見效濃汁煮小
蒜食飽勿着鹽曾用之有效再不發也 兵部

手 水毒中人

一名中溪一名中濕一名水病似射工
而無物初得惡寒頭目微痛旦醒暮劇

手足逆冷三日則生虫蝕下部不痒不痛過六七日
虫蝕五臟注下不禁以小一三升煮微熟大熟則無

力以浴身若身發赤斑文者 射工中人 成瘡者取一
母以他病治之也 肘後 切片貼瘡上

灸七壯 止截瘡疾

小一不拘多少研泥入黃丹少許
丸如芡子大每服一九面東新汲

水下至妙

陰腫如刺

汗出者小一升韭根一升楊
柳根二斤酒三升煎沸乘熱熏

唐慎微

時珍曰入太陰肺脾陽明胃大腸經希雅
日亦入肝

菜部

洗 惡核腫結 小一吳萸等分 五色丹毒 無帶及發 足踝者杵

永類 厚封類 蜈蚣蝎螫 嚼小一塗之

大蒜 又名葫 別時珍曰按唐韵云張騫使西域始得 一則小蒜乃中土舊有而一一來自胡地故

蒟 日

辛温有毒久食損目歸五臟散癰腫蠹瘡除風邪殺

毒氣 別錄 下氣消穀化肉 蕪恭 去水惡瘡氣除風濕破冷

氣爛疹癢伏邪宣通温補療瘡癬殺鬼去痛 藏器 健脾

胃治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪崇解温疫療勞瘡

冷風傳風損冷痛惡瘡蛇虫蠱毒溪毒沙虱並搗貼

大蒜

七六

之熟醋浸經年者良日温水搗爛服治中暑不醒搗

貼足心止鼻衄不止和豆豉丸服治暴下血通水道

宗搗汁飲治吐血心痛煮汁飲治角弓反張同鯽魚

丸治腸蕩同蛤粉丸治水腫同黃丹丸治痢瘡厚痢

同乳香丸治腹痛搗泥傅臍能達下焦消水利大小

便貼足心能引熱下行治泄瀉暴痢及乾濕霍亂止

衄血納肚中能通幽門治關格不通特珍

思邈曰四月八月食葫傷神令人噉多食生葫行房

傷肝氣令人面無色生葫合青魚鮓食令人腹内生

瘡腸中腫又成疝瘕發黃疾合蜜食
殺人凡服一切補藥者不可食之

昂曰——通竅以其臭也。極香極臭者俱能通竅。

菜部

發明 **宗** 藥曰——氣極臭置臭肉中反能掩臭凡中暑毒人爛嚼三兩瓣溫水送下。咽即知但禁

飲冷水又鼻衄不止者搗貼足心衄止即拭去震亨

曰——屬火性熱喜散快膈善化肉暑月人多食之

傷氣之禍積久自見養生者忌之化肉之功不足論

也 **頌** 曰——多食傷肺傷脾傷肝胆生痰助火昏神時珍

曰——入太陰陽明其氣薰烈能通五臟達諸竅去

寒濕辟邪惡消癰腫化癥積肉食此其功也王禎稱

之云化臭腐為神奇調鼎俎代醢醬携之旅途則炎

風障雨不能加食餲腊毒不能害夏月食之解暑毒

北方食肉麩尤不可無乃食經之上品也不知其辛

能散氣熱能助火傷肺損目昏神之害也嘗有一婦

衄血一晝夜不止諸治不效時珍以——搗傅足心

即血止真竒方也葉石林避暑錄云一僕暑月馳馬

忽仆地欲絕或用——及道上熱土各一握研爛以

新汲水和取汁決齒灌之少頃即甦 **藏器** 曰——有患瘧

癖者夢人教每日食——三顆初服遂至瞑眩吐逆

下部如火後有人教取數片合皮截去兩頭吞之名

大蒜

字九

鳴皋曰若腫毒無頭者以濕紙蒙上先乾者便是瘡頭可安炷灸之

昂曰謂頭上毒不得灸此言過矣頭為諸陽所聚艾宜小如米粒炷宜三五壯而已又按東垣灸元好問腦疽艾大如兩核許

曰內灸果大效也頌曰兵部手集云惡瘡腫毒號叫
卧眠不得人不能別者取獨頭一一兩顆搗爛麻油
和厚傅瘡上乾即易之屢用救人無不神效盧坦侍
即肩上海作連心痛悶用此便瘥又李僕射腦疽久
不瘥與此方亦愈又肘後方云凡背腫取獨頭蒜橫
截一分安腫頭上炷艾如梧子大灸蒜百壯不覺漸
消多灸為善勿令太熱若覺痛即起蒜三焦更換新
者勿令損皮肉葛洪嘗苦小腹下生一大腫灸之亦
瘥數用灸人無不應效又江寧紫石宮刻石記其事
云但是發背及癰疽惡瘡初起有異皆可灸之惟要
痛者灸至不痛不痛者灸至痛極而止疣贅之類灸
之亦便成疔自脫其效如神時珍曰李迅云癰疽之
法用灸勝于用藥綠熱毒中隔上下不通必得毒氣
發洩然後解散凡初發一日之內便用大獨頭蒜切
如錢厚貼瘡頭上灸之三壯一易大槩以百壯為卒
一使瘡不開大二使肉肉不壞三使瘡口易合一舉
而三得之但頭及項以上切不可用此恐引氣上更
生大禍也又史源云母背上作痒有赤暈半寸白粒

灸至百壯始覺痛而疹由是推之頭毒若不痛艾大壯多亦無碍也

如黍灸二十七壯其赤隨消信宿有赤流下長二寸舉
家歸咎于灸外科用膏藥日增一暈二十餘日橫斜
約六七寸痛不可言聞一尼病此得灸而愈予奔問
之尼云劇時昏不知人灸八百壯方甦用艾一節予
歸以炷如銀杏大灸十數殊不覺乃灸四旁赤處皆
痛每一壯熯則赤隨縮入三十餘壯赤暈收退蓋灸
遲則初發處向已壞故不痛直待灸到好向方痛也
至夜則火熯滿背瘡高阜而熱夜亦得睡矣至曉如
覆甌高三四寸上有百數小竅色正黑調理而安蓋
高阜者毒外出也小竅多毒不聚也色正黑皮肉壞
也非艾火出其毒於壞肉之裏則內逼五臟
而危矣庸醫傳貼涼藥消散之說何可信哉

方 疔瘡惡腫

用門白灰一撮羅細以獨頭蒜染灰
擦瘡頭候瘡自然出少汁再擦少頃

即消散也

五色丹毒

搗蒜厚傳乾即
易之 肘後

關格脹滿

大小
便不

通獨頭蒜燒熟去皮綿

乾濕霍亂

轉筋搗貼足心
立愈 永類
泄

裹紉下部立通

外臺

大蒜

半

瀉暴痢

方同上亦可貼
臍中 千金

下痢噤口

同上
方 衄不止

方同上
上詳

發 水氣腫滿

田螺車前子等分搗貼臍中水
從便澀而下數日即愈 仇遠釋史

山

嵐瘴氣

生煎一各七片共食之少頃腹鳴或
吐血或大便泄即愈 攝生妙用方

瘡疾

寒熱

用桃仁半片安內關穴將獨頭蒜搗爛卷之用
帛縛定男左女右即止 簡便方〇一方獨頭

蒜燒熟

寒瘡冷痢

端午日以獨頭蒜十箇黃丹二錢
搗丸梧子大每服九九長流水下

酒服

甚妙
千金方

腸毒下血

蒜連丸用獨頭蒜煨搗和黃連
末為丸日：米湯服 濟生方

暴

下血病

用一五七枚去皮研膏入豆豉搗九桐子
大每米飲下五六十九無不愈者 本草衍

義 血逆心痛

生搗一汁服一
升即愈 肘後

鬼疰腹痛

不可思者
獨頭蒜一

枝香墨和棗大搗和
醋汁一合服 永類

心腹冷痛

醋浸一
者食數枚其效如神

瀕湖

鬼毒風氣

獨蒜一枚和雄黃杏仁研為丸空腹飲下三九靜生少時下毛出即

安孟

喉痺腫痛

一塞耳鼻中日

產後中風

角弓反張

洗食療 不語用一三十辨水三升煮

小兒氣淋

宋寧宗少時病淋日

一升灌之即醒 子母秘錄

夜凡三百起國醫因指孫琳用大蒜淡豆豉蒸餅三

物搗丸溫水下三十九日今日三服病當減三之一

三日病除已而果然賜以千緡或問其理曰小兒何

緣有淋只是水道不利三物皆能通利故也 談藪

金瘡中風

角弓反張不語一升無灰酒四升煮爛并渣服得汗便瘥 外台

婦人

陰腫

煮湯洗之效 永類

陰汗作癢

淡豉搗凡梧子大硃砂為衣每空腹灯心

湯下三

毒蛇螫傷

即嚼一厚封之日六七易仍以

心頰服明日又進外以蒜一升搗

蛇瘖面光

發熱如火炙人

大便煮三四沸浸損處

孟說

全

飲一汁一碗吐如蛇狀即安危氏吐盛見小蒜腿肚轉筋足心令

熱即安仍以冷水

食一瓣攝生

胡荽

又名香荽拾遺葶荽俗名又作芫荽

辛溫微毒消穀利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭

痛癢沙疹豌豆瘡不出作酒噴之立出通心竅嘉祐補

筋脉令人能食治腸風用熟餅裹食甚良孟說辟飛尸

鬼疰蠱毒

吳瑞

說曰多食損人精神華佗云胡臭口臭齒齲及脚氣人皆不可食病更加甚藏器曰久食令人多忘根發綱疾不可同邪蒿食令人汗臭產難時珍曰服一切補藥及藥中有白木丹皮者不可食此伏石鍾乳

舉曰嘗見一小兒出痘條間症昏不知人不啼不食常用一鍋煮——上用蒸籠罩小兒於籠內以被覆之使熱氣熏透熱氣須得直不得過熱少頃兒啼痘出矣

發明 時珍曰——辛温香竈內通心脾外達四肢能辟一切不正之氣故痘瘡出不快者先發之諸瘡皆屬心火營血內攝於脾心脾之氣得芳香則運行得惡臭則壅滯故耳楊士瀛直指方云痘疹不快宜用——酒散之以辟惡氣床帳上下左右皆宜挂之以禦汗氣胡臭天癸淫佚之氣一應穢惡所不可

者無

方 痘疹不快

——二兩切以酒煎沸蓋定勿令洩氣候温微：含嘆一身令遍勿喫頭

面 熱氣結滯

經年數發者——半斤五月五日采陰乾水七升煮升半去渣分服未瘥

再服

產後無乳

乾——煎飲

小便不通

——二兩葵根一握

必效方

水二升煎一升入滑石末

一兩分三四服

聖濟

鮮薑毒

——根搗汁半升和酒服立下神驗

必

肛門脫出

——燒烟熏之即入 子母秘錄

效方

胡荽 生薑

全

昂曰有聲有物為嘔有聲無物為噦有物無聲為吐或因寒因熱因食因痰氣逆上冲而然生薑能散逆氣故為嘔家聖藥東垣云辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣發表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜薑胃推湯穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之昂曰人特知陳皮生薑止嘔不知亦有發嘔之時以其性上升胃熱者非所宜也藿香亦然昂曰胃熱作嘔

生薑

辛微温久服去臭氣通神明經本歸五臟除風邪寒熱

傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐去痰下氣別錄去水

氣脹滿瘵咳嗽時疾和半夏主心下急痛和杏仁作

煎下急痛氣實心胸擁隔冷熱氣神效搗汁和蜜服

治中熱嘔逆不能下食甄權散煩悶開胃氣汁作煎服

下一切結實衝胸膈惡氣神驗孟詵破血調中去冷氣

汁解藥毒葳除壯熱治疫欬脹滿冷痢腹痛轉筋心

滿去狐臭殺腹內長虫張鼎生用發散熟用和中解食

此黃連所以止嘔也丹溪曰陰分者多屬陰虛宜用貝母勿用生薑以其辛散也
常曰能行血痺產後血上冲心及汗穢不盡煎服亦良

鳴皋曰苦與辛合則降欲假其降宜與川連同用

又曰凡水停中焦小便不利必用生薑乾薑以開太陽之路方效徒用寒涼滲利之藥無益也

野禽中毒成喉痺浸汁點赤眼搗汁和黃明膠熬貼

風濕痛甚妙時珍

乾生薑治嗽温中治脹滿霍亂不止腹痛冷痢血

閉病人虛而冷宜加之甄權薑屑和酒服治偏風孟詵

經氣分之藥能益肺好古

之才曰秦椒為之使殺半夏芫荽毒惡黃芩黃連天

鼠矢藏器曰生薑要熟則去皮要冷則留皮思邈曰

八九月多食薑至春多患眼減筋力孕婦食之令兒

枝指杲曰古云秋不食薑令人瀉氣蓋夏月火旺宜

汗散之故食薑不禁辛走氣瀉肺故秋則禁之時珍


曰食久積熱患目珍屢試有准凡病痔人多食兼酒

食立發患瘡人多食則生惡肉此皆昔人

所未言者也糟薑瓶內入蟬蛻則無筋

生薑

十三



發明成無己曰薑棗味辛甘專行脾胃之津液而和營衛藥中用之不獨專於發散也 呆曰生薑之用有四制半夏厚朴之毒一也發散風寒二也與棗同用辛溫益脾胃元氣溫中去濕三也與芍藥同用溫經散寒四也孫真人曰薑為嘔家聖藥蓋辛以散之嘔乃氣逆不散此藥行陽而散氣也或問生薑辛溫入肺何以云入胃口曰俗以心下為胃口者非矣咽門之下受有形之物及胃之系便是胃口與肺系同行故能入肺而開胃口也曰人云夜間勿食生薑令人閉氣何也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收斂反開發之則違天道矣若有病人則不然也生薑屑比之乾薑則不熱比之生薑則不溫以乾生薑代乾薑者以其不借故也俗云上床蘿蔔下床薑能開胃蘿蔔消食也時珍曰薑去邪惡生啖熟食糟醬蜜煎無不宜之凡山行早行宜含一塊不犯霧露清濕之氣及山嵐不正之邪按方廣心法附餘云凡中風中暑中氣中毒中惡乾霍亂一切卒暴之病用薑汁與童便服立可解散蓋薑能開痰下氣童便降火也 頌

曰崔元亮集驗方載薑茶治痢以生薑切細和好茶一兩監任意呷之便瘥熱痢連皮用冷痢去皮用大妙楊士瀛曰薑能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調和陰陽且解濕熱及酒食暑氣之毒不問赤白通宜用之東坡治

文潞公有效

方 痰癖卒風 生薑二兩附子一兩水五升 煮二升分服忌猪肉 千金 胃虛風

熱 不能食用生薑汁半杯生地汁少 許蜜一匙水二合和服之 食療 瘡疾寒熱 脾胃 聚痰

發為寒熱生薑四兩搗汁一酒杯露一夜 於發日更更面此立飲未止再服 易簡 寒嗽不止

生薑五兩錫半升火熬 熟食盡效 初虞世 久患欬噫 薑汁半合蜜一大匙煎溫服效 外

方 乾嘔厥逆 頻嚼生薑嘔 家聖藥也 嘔吐不止 生薑二兩醋二合石器煎連渣

服又殺腹內長 心痞嘔噦 心下痞堅生薑八兩煮一 升半夏五合洗盡涎滑水

生薑皮

八十四

鳴皋曰點眼一方久聞其效惜未試也

鳴皋曰辛藥必溫謂薑皮辛涼似不宜然
昂曰薑皮能行水五皮散用之以皮行皮
昂曰王氏云一一心脾二經氣分藥余以
為脾胃二經藥以其守中也又為肺經藥

五升煮一升取汁
同煮分服 千金 反胃羸弱 搗汁作粥食 傳信方

用生薑切片麻油煎
過為末軟棗蘸嚼嚥 消渴飲水 生薑焙乾一兩為末 以鯽魚胆和丸梧子

大水飲下七
十九 聖惠 暴赤眼腫 寇宗奭曰用古銅錢刮生薑 汁點之淚出今日點明日愈

勿疑 一治暴風容熱目赤睛痛腫者臘月取生薑 搗汁陰乾取粉入銅青末等分每以少許沸湯泡澄

清溫洗 牙痛 老生薑焙為末入枯礬末擦之一 淚出妙 人日夜呻吟用之即愈 普濟 食野

禽毒 獠犬傷人 並飲薑汁即 刀斧金瘡 生薑嚼傳 即生肉甚 跌撲損傷 生薑汁和酒調麩 貼之 簡易方

薑皮 辛涼消浮腫腹脹痞滿和脾胃去翳 時 珍

乾薑 又名白薑頌曰造法采根於長流水洗過晒為 一以漢溫池州者為良時珍曰一一以母薑

以其性上得也故仲景云亡血、虛用人參肺寒者去參加一、無令氣壅也至於入肝入腎宜以肝腎藥引之

希雍曰一一言止血者蓋血虛則發熱則妄行一一炒黑則能引諸補血藥入陰分補血也

蘇曰韓太史鶴莊腹中患濕熱積滯泄瀉面目晦黯醫用消補藥不效淹延半年或令服一一炭遂暢下積滯而愈大明消宿食之文可徵也

希雍曰向木用能逐風濕痺炒黑同生地白芍當歸牛膝治產後惡露不盡血虛發熱同橘皮木貝茂苓治痰瘕久不愈

造之今江西襄均皆造以白淨結實者為良故人呼為白薑入藥並宜炮用

辛溫

褚曰苦辛好古曰大熱

治胸滿欬逆上氣溫中止血出汗

逐風濕痺腸澼下痢生者尤良

本經

寒冷腹痛中惡霍亂

亂脹滿風邪諸毒皮霄間結氣止唾血

別錄

治腰腎間

冷痛冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑宣通

諸絡脉去風毒冷痺夜多小便

甄權

消痰下氣治轉筋

吐瀉反胃乾嘔散撲損瘀血止鼻紅鮮冷熱毒開胃

消宿食明主心下寒痞目睛久赤

好古

發明

元素曰一一氣薄味厚半沉半浮可升可降陽中之陰也又曰大辛大熱陽中之陽其用有四

通心助陽一也去臟腑沉寒銅冷二也發諸經之寒
氣三也治感寒腹痛四也腎中無陽脈氣欲絕黑附
子為引水煎服名薑附湯亦治中焦寒邪寒淫所勝
以辛散之也又能補下焦故曰逆湯用之——本辛
炮之稍苦故止而不移所以能治裏寒非若附子行
而不止也理中湯用之者以其回陽也景曰——生
辛炮苦陽也生則逐寒邪而發表炮則逐胃冷而守
中多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣也須生
甘草緩之辛熱以散裏寒同五味子用以溫肺同人
參用以溫胃也好古曰——心脾二經氣分藥也故
補心氣不足或言——辛熱而言補脾今理中湯用
之言泄不言補何也蓋辛熱燥濕泄脾中寒濕邪氣
非泄正氣也又云服——以治中者必借上不可不
知震亨曰——入肺中利肺氣入腎中燥下濕入肝
經引血藥生血同補陰藥亦能引血藥入氣生血故
血虛發熱產後大熱者用之止唾血利血須炒黑用
之有血脫色白面天不澤脈濡者此大寒也宜——
之辛溫以益血大熱以溫經時珍曰——能引血藥

入血分氣藥入氣分又能去惡養新有陽生陰長之意故血虛者用之凡人吐血衄血下血有陰無陽者亦宜用之乃熱日熱用從治法也又曰大清外術言孕婦不宜食——全胎內消蓋其性熱辛散故也韓保昇曰久服

令人目暗

方 脾胃虛冷

不下食成瘵者用——漿水煮透取出焙乾為末陳米粥丸每服三五十

九神效

脾胃虛弱

食減易傷難化無力肌瘦——研末四兩以白錫溶化和丸桐子大

蘇頌

每米飲下三十

陰陽易病

傷寒後婦人雖愈未滿百日不可與男子合為病拘

急手足拳腹痛欲死丈夫名陰易女名陽易宜汗之

即愈滿四日不可治也——為末每用一兩白湯調

下覆被取汗手足伸

中寒水瀉

——炮為末粥飲下二錢甚效 千金

即愈 傷寒類要

寒痢青色

——切豆大每米飲服六七枚日三夜一甚效 肘後方 血痢不止

乾薑

全六

炒黑存性為末每服一錢
米飲下神驗 姚氏集驗 脾寒成瘡 外臺用一高

每服一錢水煎服○又一錢
炒黑為末臨發時酒服三錢 效嗽上氣 炮去皮子桂

心去皮同研等分白蜜和搗三千杵丸梧子大每飲
下三九日三服忌食葱麩油膩其效如神李亞每用

此治人而不傳方或謂其吝李曰凡人患嗽
多進涼藥若見此方必不服也 傳信方 冷氣效

嗽 一末酒調服或 吐血不止 宜黑 一錢良 廣利方

赤眼瀉痛 一粉泡湯點洗○又方令人嚼 聖濟 瘡

疽初起 一炒紫為末醋調傅四圍留 瘰癧不斂 諸症辨疑

末生薑汁打糊為劑黃丹為衣隨瘡大小入藥在內
追膿盡生肉口合為度如不合以葱白汁調大黃末

搽之即愈 救急方

時珍曰入手足太陰肺脾二經常曰色白故入肺味甘故歸脾肺為腎母故又益腎虛則補其母也脾為心子故又益脾子能令母實也能清虛熱者補陰之功能止泄痢者滲濕之功其性濇故又治遺精也

山藥

又名諸蕪音諸山諸圖經薯蕷本經山芋吳普玉延同上修脆同上

甘平補虛羸除寒熱邪氣補中益氣長肌肉強陰本經

主頭面遊風止腰痛治虛勞羸瘦除煩熱別錄鎮心神

安魂魄補心氣不足開心孔多記事甄權主泄精健忘

大益腎氣健脾胃止洩痢化痰涎潤皮毛時珍生搗貼

腫硬毒能消散震亨

之才曰忌甘遂宗奭曰古方皆用乾一一蓋生則性滑不可入藥熟則滯氣只堪啖竹刀削皮陰乾或微

火烘乾亦佳數曰用山中野生者佳

發明

說曰利丈夫助陰力熟煮和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之入藥更妙杲曰一一入手太陰仲

山藥

全七

鳴皋曰余少患氣淋服縮泉丸得效過一
 良醫謂余曰汝知縮泉用一糊丸之意
 乎益智得一則不上僭也初用米湯丸
 果覺上僭以一丸則佳後余凡用辛燥
 藥必用一瀕湖以一制蒼朮大有理

景八味丸用乾一以其涼而能補也亦治皮膚乾

燥以此潤之時珍曰吳綬云一一入手足太陰二經

補其不足清其虛熱又王履洄集云一一雖入手

太陰然肺為腎之上源一既有滋流豈無益此八味

丸所以用其強陰也又曹毗杜

蘭香傳云食一一可以辟霧露

方 心腹虛脹 手足厥逆或飲苦寒之劑多未食先
 嘔不能飲食一一半生半炒為末米

飲下二錢一日二服大有 噤口痢 一一半生半炒為

功效忌鐵器生冷 普濟 碗和勻頓熱服 簡便單方 濕

衛生 痰氣欬急 生一一搗爛半碗入甘蔗漿半

易簡方 碗和勻頓熱服 簡便單方 濕

熱虛泄 一一蒼朮等分飯丸米飲服 腫毒初起 帶泥

大人小兒皆宜 瀕湖經 或赤腫硬痛以生

范麻子糯米等分水浸 項後結核 一一挺去皮范

研傳之即散 普濟 項後結核 一一挺去皮范

麻子二箇同研貼之 如神 救急良方

昂曰百合潤肺寧心鳴象曰淚係肝熱觀於能止涕淚治邪魅及顛邪狂叫驚悸是又能清所益肝也

案曰同味胡知母等藥用亦治瘡

菜部

零餘子 即山藥子

甘溫補虛損強腰脚益腎

百合

又名強瞿別錄蒜腦諸俗名弘景曰俗呼強仇即強瞿之訛吳普曰一名重邁一名中庭

集解

恭曰花白者宜入藥時珍曰一一葉似竹葉而短不似柳葉五六月莖端開大白花長五寸六出紅蕊四垂色亦不紅二者葉似柳乃

山丹也一一結實畧似馬兜鈴內子亦似之

甘平無毒

權曰有小毒

治邪氣心腹脹痛利大小便補中

益氣

本經

除浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉

痺止涕淚

別錄

百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治

脚氣熱欬

動權

所以治百合病安心定膽益志養五臟治顛邪狂叫驚

百合

八六

朱二允曰久嗽之人肺必虛：則宜斂之斂勝於五味之酸收也
 李士材曰——治百合病亦清心安神之效耳

博產後血狂運殺盡毒氣脇癰乳癰發背諸瘡腫大

心急黃宜蜜蒸食之 孟治百合病 宗溫肺止咳 元

發明 頌曰仲景治百合病有——知母湯——滑石代赭石湯——雞子湯——地黃湯凡四方病

名百合而用——治之不識其義時珍曰王維詩云

冥搜到——真授當重肉果堪止淚無欲縱望江目

蓋取本草止

涕淚之說

方 百合病 ——知母湯治傷寒後百合病行住坐卧不定如有鬼神狀已發汗者用——

七枚泉水浸一宿更以泉水二升煮一升以知母三

兩用泉水二升煮一升同——汁再煮取升半分服

○雞子——湯治百合病已經吐後者——七枚泉

水浸一夜明旦更以泉水二升煮一升入雞子黃一

箇分服。——代赭石湯治百合病已經下後者——

七枚泉水浸一夜明旦更以泉水二升煮取一升

却以代赭石一兩滑石三兩水二升煮取一升同

一汁再者取升半分服〇一地黄湯治百合病未

經汗吐下者一一七枚泉水浸一宿明旦更以泉水

二升煮取一升入生地黃汁一升同煎取升半分二

服並金**百合變渴**病已經月變成消渴者一一

置要略升水一斗漬一宿取汁温浴病

人浴畢食白湯餅**百合變熱**一一兩滑石三兩為

陳延之小品方末飲服方寸匕小品

方**百合腹滿**作痛者一一炒為末**肺病吐血**新

飲服方寸匕同上搗汁和

水飲亦可煮食**耳聾耳痛**乾一一為末温水服

衛生易簡方二錢日三千金方

山丹又名紅百合日華時珍曰葉短而濶微似竹葉

白花四垂者百合也葉長狹尖如柳葉紅花不

四垂者一一也莖葉似一一而高紅花帶黃而四垂

上有黑斑點其子四月先結於枝葉間入秋開花在

顛頂者卷丹也大

抵一類三種也

山丹 菜菔

時珍曰入太陰肺脾陽明腸胃少陽三焦氣分

甘涼

正要曰平

治瘡腫驚邪明女子崩中

時珍

萊菔

音北

又名蘆菔 耶璞蘆音羅菔音北 蘿菔

根辛甘葉辛苦溫散服及炮煮服大下氣消穀和中

去痰癖生搗汁服止消渴大驗

唐本

利關節練五臟惡

氣制麪毒行風氣去邪熱

蕭炳

消痰止咳治肺痿吐血

溫中同羊肉銀魚煮食治勞瘦效嗽

日華

生搗服治禁

口痢

汪穎

汁服治吐血衄血

吳瑞

寬胸膈利大小便生食

止渴寬中煮食化痰消導

寧原

治豆腐積

汪機

主吞酸化

積滯鮮酒毒散瘀血甚效末服治五淋丸服治白濁

煎湯洗脚氣飲汁治下痢及失音并烟熏欲死生搗

北方燒石炭性：重死未死者

塗打撲湯火傷

時珍

馬果曰

思邈曰不可與地黄同食令人髮白為其澀營衛也

亦忌何首烏

時珍曰多服一動氣惟生薑能制其毒又伏砒砂

發明頌曰一功同燕菁然力猛更出其右斷下方亦用其根燒熟入藥尤能制麩毒故相傳食麩

必啖一兩日搗爛制麩食飽食亦不發熱酥煎食

之下氣凡飲食過度生嚼食之便消宗奭曰服地黃

首烏食一則令人鬢髮白世皆以為此物味辛下

氣速也然薑芥更辛何止能散而已蓋一辛而又

甘故能散緩而又下氣速也所以散氣用生薑下氣

用一震亨曰一屬土有金與水冠氏言其下氣

速人性：煮食過多停滯成溢飲豈非甘多而辛少

乎時珍曰一根葉同功生食升氣熟食降氣蘇氏

冠氏止言其下氣速孫真人言久食澀營衛亦不知

其生則噫氣熟則洩氣升降之不同也大抵入太陰

菜蔬

陽明少陽氣分故所主皆肺脾腸胃三焦之病李九
 華云一一多食滲人血則其白人髮蓋亦由此非
 獨因其下氣澀營衛也洞微志云有人病狂云夢中
 見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌遂歌云五靈樓
 閣起玲瓏天府由來是此中惆悵悶懷言不盡一九
 一一火吾宮有一道士云此犯大麥毒也少女心神
 小姑脾神醫經言一一制麪毒故曰火吾宮火者數
 也遂以藥并一一治之果愈張杲醫說云饒民李七
 病幼甚危醫以一一汁和無灰酒飲之即止蓋血隨
 氣運氣滯故血妄行一一下氣而酒導之故也又云
 一人食豆腐中毒醫治不效偶見造豆腐者誤以
 一湯入鍋中遂致不成其人心悟飲一一湯而愈物
 理之妙如此又延壽書載李師逃難入石窟中賊以
 烟熏之垂死摸得一一嚼汁嚥下便甦此法可脩急
 不可
 不知

方一食物作酸

一一生嚼數片即愈乾者熟者盪
 醃者及人胃冷者皆不效 瀕湖反

胃噎膈

一蜜煎浸細
普濟方 消渴

生搗汁服或汁煮粥
服或日乾為末每服

二錢猪肉湯澄清調
下日三 圖經本草

肺痿嗽血

一和羊肉或鯽魚
煮食妙 普濟血

血不止

方見發明又以汁注
鼻中亦良 易簡

下痢禁口

一蓋水一蓋

同煎早一服午一服日晡吞阿膠丸百粒無一以
子研汁亦可一方用枯礬七分同煎一方一煮汁

大腸便血

大皮燒存性荷葉燒存性蒲黃生
飲 用等分為末每服一錢米飲下 普濟

大腸下血

蜜炙一任意食之
甚效 百一選方

小便白濁

生一刺
空留蓋入

吳茱萸填滿蓋定糯米飯上蒸熟去萸以
一研丸 梧子大鹽湯下五十九 普濟

沙石諸淋

痛不可忍蜜浸炙乾如此數次不可炙焦
細嚼鹽湯下日三名瞑眩膏 普濟方

偏正頭痛

生一汁一規殼仰卧隨左右注鼻中神效王荆公
病頭痛有人傳此方數十年之病二注而愈以此治

菜服 蘿蔔子

人不可勝
數如宜
失音不語
汁服
普濟
喉痹
皂角漿服

取吐痰
同上
滿口爛瘡
涎妙
瀕湖
湯火傷
之
聖惠

打撲傷
皮未破者
搗封之
邵氏

蘿蔔子

辛甘平研汁服吐風痰同醋研消腫毒
華日下氣定欬

治痰消食除脹利大小便止氣痛下痢後重發瘡疹

時珍

發明
震亨曰
治疫有推用
之功長於利氣生能升熟能降升則吐

風痰散風寒發瘡疹降則定痰欬咳嗽調下痢後
重止內痛皆是利氣之效予曾用之果有殊功

方 上氣痰嗽

嗽促唾膿血以
合研細煎服
食醫心鏡
肺痰欬嗽

一 一 半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
丸芡子大綿裹含之嚙汁甚妙
勝金方
欬痰促

遇厚味即發者
一 一 蒸熟舂研薑汁浸蒸餅丸梧
子大每服三十九口津嚙下名清金丸日三
醫學

集 痰欬
一 一 炒皂莢燒存性等分為末薑汁和鍊
成 蜜丸梧子大每服五七十九丸白湯下
醫易

單 久嗽痰欬
一 一 炒杏仁去皮尖等分蒸
方 餅丸梧子大類服
醫學集成
高年氣

欬 每服五十九丸
濟生秘覽
宣吐風痰
勝金用
一 末溫水調

服三錢良久吐出痰涎口丹溪吐法
一 一 半升搗
細以水一梳濾取汁入香油密少許溫服以桐油浸

鷺翎晒
乾探吐
中風口噤
一 一 牙皂莢各二錢
小兒風寒

一 一 生研末一錢溫葱酒服
風秘氣秘
一 一 炒

取微汗大效
衛生易簡方
風秘氣秘
一 一 炒

蘿蔔子
芥
九十三

時珍曰入肺開胃馮臯曰別錄云除腎經邪氣是亦入少陰矣

和皂莢末二錢服
立通 壽域神方
年久頭風 入麝香少許搗鼻立止

濟方 瘡疹不出 二錢良 衛生易簡方

芥

集解

恭曰一有三種葉大子粗者葉可食子入藥用葉小子細者葉不堪食子但作齏又有白

青一似菘有毛味極辣紫一莖葉純紫作齏最美

有白一見本條時珍曰青一又名刺一似白菘有

柔毛有大一又名皺葉一大葉皺紋色尤深綠味

更辛辣二一宜入藥用有馬一葉如青一有花一

葉多刻缺如蘿蔔莢紫一莖葉皆紫石一低小皆

以八九月下種冬月食者俗呼臘菜春月食者俗

呼春菜四月食者俗呼夏菜三月開黃花四出結

莢一二寸子大如蕪子而色

紫味辛研末泡過為一醬

莖葉 辛溫歸鼻除腎經邪氣利九竅明耳目安中

久食溫中別錄止咳散上氣除冷氣日華主效逆上氣去

頭面風孟詵通肺豁痰利膈開胃時珍

思邈曰同兔肉食成惡邪病同鮑魚食發水腫原曰瘡瘍痔疾便血者忌之說曰煮食多動氣與風生食

多發丹石大葉良細葉有毛者害人

發明時珍曰性辛熱而散故能通肺開胃利氣豁

受病昏眼目發瘡痔而別錄謂其明耳目者蓋知暫時之快而不知積久之害也素問云辛走氣病無

多食辛多則肉脈而唇褰此類是矣

方 飛絲入目青汁點之如痔腫痛葉搗餅頻

芥子

九十三

鳴皋曰芥子自係肺經主藥而利氣豁痰
又胃經藥其氣至疏時珍云能散瘀是又
旁及肝經矣

公狗經
效方

芥子

辛熱歸鼻去一切邪惡疰氣喉痹景疰氣發無常處

及射工毒丸服之或搗末醋和塗之隨手有驗蘇恭治

風毒腫及麻痺醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生

薑研塗貼之又治心痛酒調服之日華研末作將雪通利

五臟孟誥研末水調塗頂顛止衄血吳瑞溫中散寒豁痰

利竅治胃寒吐食肺寒咳嗽風冷氣痛口噤唇緊消

散癰腫瘀血時珍

信 顛音

發明時珍曰一功與菜同其味辛其氣散故能利九竅通經絡治口喎耳聾鼻衄之證消痰血癥

腫痛痺之邪其性熱溫中故又能利氣豁痰治嗽止吐主心腹諸痛白一子辛烈更甚治病尤良見本條

方 風毒麻痺醋研傳撲損瘀血和生薑研腰痛腎

痛同上心痛酒調服之止衄血研末水調貼感寒無

汗水調一末填臍內以熱物隔楊起簡便單方中風口喎舌本縮

一升研入醋二升煎一升傳於頷頰下效耳卒聾芥子末人乳和綿

鬼疰癆氣一三升研絹袋盛入三斗霍亂吐瀉

研水調塗臍聖濟反胃末酒服方寸上氣嘔吐末蜜

九桐子大井華水寅時下方同臍下絞痛腰脊痛

七九申時再服 千金

芥子 白芥子

末酒調貼之
一切癰腫
猪胆汁調一末
癰腫熱毒

家一末同柏葉搗塗無不愈
婦人經閉
至一年者
脇腹痛腰

腿沉重寒熱往來用一
二
陰症傷寒
腹痛厥逆
一研末水調

貼臍
生編

白芥子
又名胡芥
蜀本蜀芥
時珍曰種來自戎

集解
恭曰一粗大白色如白梁米甚辛美保
昇曰白芥葉大子白且粗入藥最佳時珍曰

白芥慶可種但人知種之者少耳八九月下種
冬生可食春深莖高二三尺莖易起而中空性脆

大風雪須謹護之乃免摧折三月開黃花結角如
芥角子大黃白色又一種莖中實者尤高大其子

亦大雖是芥類迥然別
種也然入藥勝於芥子

辛温發汗主胸膈痰冷上氣面目黃赤又醋研傅射

工毒別錄熨惡氣瘧尸飛尸及暴風毒腫流四肢疼痛

引燒烟及服辟邪魅日華藏器曰效嗽胸脇支滿上

氣多唾者每用温酒吞下七粒思遠利氣豁痰除寒暖

中散腫止痛治喘嗽反胃痺木脚氣筋骨腰節諸痛

時珍

發明震亨曰痰在脇下及皮裏膜外非一一莫能

達古方控涎丹用之正此義也時珍曰一一

辛能入肺温能發散故有利氣豁痰温中開胃散痛消腫辟惡之功按韓愈云凡老人苦於痰氣喘嗽胸滿懶食不可妄投燥利之劑反耗真氣恣因人求治其親為處三子養親湯治之隨試隨效蓋一一主白芥子

〔早曰〕過煎則無力

痰下氣寬中紫蘇子主氣定嗽止嗽蘿蔔子主食消
痞降氣各微炒研破看所主為君每劑不過三四錢
用生絹袋盛入湯煮飲之勿煎太過則味苦辣若大
便素實者入蜜一匙冬月加薑一片尤良南陵未齋

有辭
替之

方 反胃上氣

一錢 末酒服 普濟方

熱痰煩運

芥子大戟

甘遂芒硝硃砂等分為末糊丸 梧子大量 冷痰痞滿
服一二十丸薑湯下名白芥丸 普濟方

黑芥子 大戟甘遂胡椒肉桂等分為末糊
丸梧子大每服十九丸薑湯下名黑芥丸 普濟方

冷氣起

每用薑湯吞十九丸甚妙 續傳信方 腳氣作

痛 方見 小兒乳癖

平為度 研成膏攤貼以 本草權度

防痘入目

歸下可免 全幼心法 胸脇痰飲 一兩為末棗肉和

九梧子大湯下
五十九 摘元 腫毒初起
瀕湖集簡方
蔓菁 又名蕪菁 別錄九英菘 食療諸葛菜

下氣 消食 治嗽 解毒 治瘡 降血
根葉 苦温 時珍曰 辛甘苦 利五臟 別錄 常食通中 蘇頌 消食下

氣治嗽止消渴去心腹冷痛及熱毒風腫乳癰如乳

寒熱 洗

方 衄血 蔓菁搗汁飲 十便良方 丁腫有根 用大鉄針刺作孔 削蔓菁根如針大

搗塗有膿出即易涸矣根出忌口 肘後方 乳癰

寒熱 蔓菁根并葉 搗傅熱即換三五次即瘥 只用 根亦可此方已救數十人 涸避風 兵部手集

陰腫如斗 蔓菁根搗封能治人 犬咬傷 重發者蔓菁 所不能治者 集療 根搗汁服

蔓菁 根葉

九十六

昂曰腹脹滿瀉汁飲或吐或下腹中自寬得汗即愈

鳴泉曰一一之性生則以通為用蒸熟有補之功觀其明目治青盲是入肝經也

能治黃汗急黃是入脾胆二經也能治霍亂腹脹通二便關格能吐能下是又中焦脾胃藥也能汗則又入肺也

又曰黃疸有因濕熱者有因血瘀者一一之治黃疸亦能通血分矣肝開竅於目

目得血而能視惟能通血分故治目故蕭炳云尤宜婦人也

又曰其功長於治目自係肝經主藥

通肝去風

去濕

通氣

發表

明目

解毒

治黃

疸

肘飛絲入目

蔓菁葉汁滴之神效 普濟

一切腫毒

生蔓菁根一握入鹽花火

許同搗封之日三易之

子 苦辛平明目

別錄

療黃疸利小便水煮汁服主癥

癥積聚少飲汁治霍亂心腹脹末服之主目暗

恭蘇

和油塗蜘蛛咬傷

器

油塗頭能變蒜髮

孟

入丸藥服

令人肥健尤宜婦人

蕭炳

發明

葳器曰

仙經言蔓菁子九蒸九晒為末可斷穀長服蜘蛛咬傷者恐毒入內為末酒亦以油

和塗之蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也時珍曰蔓菁子可升可降能汗能吐能下能利小便又能明目解

毒其功甚偉而世罕知用何哉子油點燈甚明然烟損目

方明目益氣

蔓菁子一升水九升煮乾如此三度
研服方寸匕亦可煮粥食 外臺

明目

蔓菁子三升醋三升煮數日乾為末并華水服
日三抱朴子云服盡一升能夜視見物 千金

青盲障翳

但瞳子不壞十得九愈蔓菁子六升蒸之
日乾以釜中湯淋之如是三遍研末酒服

方寸匕日再

海上方

虛勞目暗方同

補肝明目

蔓菁子一斤
黃精二斤同

和九蒸九晒為末米飲下○又方蔓菁子二

風邪攻

升决明子一升酒煮為末水調服 聖惠

目視物不明肝氣虛者蔓菁子四兩入甕瓶中燒黑
取出入蛇蛻二條又燒成灰每食後酒下半錢

聖濟黃汗染衣

涕唾皆黃蔓菁子為末并華水服一匙
日再加至二匙以知為度不過服五升

當愈外

臺秘要黃疸如金

生蔓菁子末湯服方寸
匕日三 孫真人食忌 急黃 及

黃腹結不通蔓菁子末水絞汁服當得嚏鼻出黃

水及下利則愈子油服一盞更佳 本草拾遺 二

蔓菁子花

昂曰寒泄熱甘益脾

行水 治消 渴腫 毒貼

便關格 脹悶欲死蔓菁子油空腹服 心腹作脹 蔓菁子打

和水絞汁服以項自利 霍亂脹痛 蔓菁子水煮汁 飲 瀕湖集簡 妊

或吐或汗即愈 外臺 風疹入腹 體強舌乾硬蔓菁子末酒服一

娠尿澀 蔓菁子末水服方寸匕 子母秘錄 子末和傳日 千金

錢 骨疽不愈 骨從孔中出者蔓菁子 搗傅之日一易 千金 小兒頭禿 蔓菁

子末和傳日 千金

花 辛平治虛勞目暗久服可夜讀書三月三日采

花陰乾為末每服二錢空心并華水下 慎微

冬瓜 又名白瓜 本經

甘微寒 弘景曰 治小腹水脹利小便止渴 別錄 搗汁服

止消渴煩悶解毒弘景益氣除煩除心腹滿去頭面熱

孟詵消熱毒癰腫切片摩癩子甚良大利大小腸壓丹

石毒頌

發明說曰熱者食之佳冷者食之瘦人煮食練五臟

者削一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒甚良震亨

曰性走而急寇氏謂其分散熱毒氣蓋亦取其

走而性急也久病滑瀉虛寒者忌之孫真人言九月

勿食令人反胃須被霜食之乃佳說曰一箇和

桐葉飼猪弗與諸物

食一冬大可三四倍

方消渴一一枚埋地中一日取出破開取清聖濟

後渴痢久病津液枯竭四肢浮腫口舌乾燥用一

冬瓜九十八一枚黃泥厚五寸包煨熟絞汁飲亦治傷寒

昂曰——亦行水之劑

行水
主折傷

補肝
明目
治腸
瘧

渴痢 古
小兒渴痢 汁飲
水病危急 吃之任意
今錄驗 千金

兵部
十種水氣 浮腫欲滿大——一枚切蓋去黏
以赤小豆填滿蓋合簽紙泥封固

糠火煨一日取出焙乾為末糊丸梧子大每
服七十九——煎湯下小便利為度 楊氏

冬瓜皮 治驢馬汗入瘡腫痛陰乾為末塗之又主

折傷損痛 時珍

方 跌打損傷 乾——一兩真牛皮膠一兩舂研
末每服五錢好酒熱下仍飲酒一杯

厚蓋取汗其痛即 損傷腰痛 一錢 生：編
止極效 搗元方

冬瓜子 又名白瓜子

甘平 別錄曰 除煩滿不樂作面脂令人好顏色 去
甘寒 錄

〔菜〕一絡所主通經絡行血脉下乳汁通經絡
治疔痛及崩中乾血氣痛皆是肝家之病
是為足厥陰肝經之藥

下乳
去風
治便血
療疔痛
血氣痛
發痘瘡

皮膚風潤肌膏

明補肝明目治腸瘕時珍

方 補肝明目

治男子五勞七傷明目用一一一七
升絹袋盛投沸湯中須臾取晒乾如

此三度又以清苦酒漬二宿晒乾為末日服方寸匕
○又法取子三五升去皮為丸日服三五十九外

臺

多年損傷

不瘥者一一一為末
酒服 孫真人方

白帶

陳一一一炒
末米飲服五

錢救

急良方 男子白濁

上同

絲瓜

又名天絲瓜 本事 天羅事類合璧

甘平

人藥用
老者

治痘瘡不快用枯者燒存性入朱砂研

末蜜水調服甚妙

震亨

煮食除熱利腸老者燒存性服

去風化痰涼血解毒殺虫通經絡行血脉下乳汁治

絲瓜

汪穎曰——本草諸書無考惟痘瘡及脚
 癩方中燒灰用亦取其性冷解毒耳
 〔案曰〕一人臂痛十餘年諸治不效一醫與
 桂枝絲瓜絡服之遂愈足見其通脈絡臟
 腑而去風之功

大小便下血痔漏崩中疝痛卵腫血氣作痛癩疽瘡

腫齒蠱痘疹胎毒 特珍 暖胃補陽固氣和胎 生編

發明 特珍曰老——筋絡貫串聯屬故能通人脈絡
 及臟腑而去風解毒消腫化痰祛痛殺虫治諸

血病

方 痘瘡不快 初出或未出多者可令少少者可令
 稀老——近蒂三寸連皮燒存性研

砂糖水服 腸風下血 本事方老絲瓜燒存性為末酒
 直指方 下二錢○普濟方危篤不可救

者——一箇燒存性梔 血崩不止 老——燒存性棕
 花減半為末米飲下 燒灰等分益酒或

益湯下 經脈不通 研末每服二錢酒下先服四物
 奇效良方

湯日三服 乳汁不通 乾——連子燒存性研酒服
 見海上名方 一二錢被覆取汗 簡便單

方乾血氣痛

婦人血氣不行上衝心膈變為乾血氣者一箇燒存性空心溫酒下壽

域小腸氣痛

繞臍衝心連蒂老一燒存性為末酒調下三錢甚者不過兩三服即消

腫偏墜

初結者留之待瓜結盡葉落取下燒存性為末用白蜜調成膏每燒酒服一匙患左

左睡患右睡保壽堂

卒然中風

防風荆芥一兩升麻五錢薑三片水一盞煎半盞以

子研取漿半盞和勻灌之唐珣經驗方

風氣牙痛

百藥不效者用此大能去風惟虫牙不效

老一箇擦鹽燒存性研末頻擦涎盡即愈腮腫以水調貼之馬叔敏云此嚴月軒家傳屢效之方一

試便可睡也

水蠱腹脹

老一箇去皮一枚剪碎巴豆十四粒同炒豆黃去豆以瓜同陳倉米

再炒熟去瓜研米為丸梧子大每服百丸蓋米收胃氣巴豆逐水一象人脈絡借其氣以引之此元名

醫宋會之方也

絲瓜

考

本草方藥參要卷七目錄

菜部

茄 莖 蒂 根 葉

薯蕷 子

白菜

馬齒莧

萹苣子

木耳 菜耳 槐耳 白木耳

獸部

猪 全件附

犬 全件附

羊 全件附

牛 全件附

黃明膠

牛黃

馬 全件附

鹽 尿 屎

阿膠

虎 全件附

犀角

麝羊角

鹿 全件附

鹿角膠

麋 茸 角

麝

熊 胆

象 牙 胆

水獺 肝

狷 皮

兔 全件附 敗筆

羸 全件附

鱗介魚虫部

龍

蚺蛇胆

白花蛇

烏蛇

蝮蛇

蛇蛻

鯉魚

鯽魚

青魚

鱧魚

鱖魚

鱒魚

鰻鱺

石首魚

烏賊魚

膾膾臍

鮑魚

穿山甲

龜

瑤瑁

鱉

蟬

石蟬

海蛇

蝦

牡蠣

蛤粉

文蛤

海蛤

石決明

魁蛤

車渠

珍珠

田螺

蝸牛

蜂蜜

黃蠟



蜜蜂子

土蜂

大黃蜂

露蜂房

二



白蠟

本草方藥參要卷七

如鼻戴鳴皋



菜部

茄子

又名落蕪 拾遺 崑崙瓜 御覽 草壘 甲 全隱 居曰 治瘡方用乾茄能治寒熱故名草壘甲

甘寒治寒熱五臟勞

孟詵

治溫疾傳尸勞氣醋摩傳腫

毒明老裂者燒灰治乳裂

震亨

散血止痛消腫寬腸

時珍

志曰多食發瘡及痢疾李廷飛曰秋後食多損目時珍曰生編云一一性寒利多食必腹痛下利女子

傷子 宮也

發明

震亨曰一一屬土故甘而喜降大腸易動者忌之老實治乳頭裂根者湯漬凍瘡折蒂燒灰治

口瘡俱獲奇效皆甘以緩火之義也時珍曰段氏酉陽雜俎言茄厚腸胃動氣發疾蓋不知茄之性滑不

茄蒂花根莖葉

鳴皋曰北方四五月新茄極佳無日不食 無人不會無腹痛下利之說其發瘡及 痢疾損目則有之一人患吼欲歲發甚甚 舉令其勿食茄是冬發甚輕

散血 消腫

菜部

厚腸
胃也

方 腸風下血

經霜——連蒂燒存性為末
每旦溫酒下二錢 靈苑方 腰脚拘

攣

腰脚氣血積冷筋急拘攣疼痛——五十斤水五
斗煮濃汁去渣更入小鍋中煎至一升即入生粟

粉同煎令稀稠得所入射香朱砂末同丸梧子大每
旦酒下三十九近暮再服一月可愈男女通用皆效

圖經

本草 磕撲青腫

老黃——極大者切片焙乾為末
卧時酒調服二錢一宿消盡無痕

迹也

勝金方 墜損跌撲

散血止痛重陽日水老——百枚
去蒂切消石十二兩以磁器先鋪

茄一重撒硝一重間鋪令盡以紙數重審置淨處上

下以新磚承覆勿犯地氣至正月後取出去紙兩重

日中曝之曝至二三月度茄已爛開瓶傾出渣去渣

別入新器中以薄綿蓋頭再曝至成膏每以酒調半

匙許空腹飲之日二惡血散則痛止而

愈矣膏久乾硬未飲化用 圖經本草 發背惡瘡 用上

方酒服更以膏塗四圍甚妙
圖經本草 大風熱痰
用黃老一一大者不拘多少以新瓶盛埋土中經一年盡化為水取出入苦參末同丸梧子大食已及卧時酒下三十九甚效此方出江南人所傳

上 同 乳裂
見發

蒂 燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血痔
吳瑞

生切擦癩風
時珍

發明
時珍曰 治癩風用茄蒂蘸硫附末搽之取其散血也白癩風用白茄蒂紫癩風用紫茄蒂

方 風蛀牙疼
茄蒂燒灰擦之或加細辛末等分 仁存堂

花 治金瘡牙疼
時珍曰 秋茄花乾之燒研塗痛處立止此海上名方也

根及莖葉 治凍瘡皸裂者湯漬之良
開寶 散血消腫

茄蒂花根莖葉

鳴皋曰——若云是薑菜則惟江南有之
 北方並無此菜何云種自苦寒之地方
 所種惟冬月之白菜夏月之小白菜所謂
 菘也且薑菜之味亦不甚辛而曰云辛溫
 江南人無日不食菜食油亦不覺其能破
 癥瘕積血時珍指——為薑菜不能無疑
 且——之味甚佳何寇氏云不甚佳其欺

治血淋下血：痢陰挺齒齲口輩時珍

方 血淋疼痛 茄葉烘乾為末每服二錢酒下或腸
 益湯下隔年者尤佳 經驗良方

風下血 方同上 牙齒齲痛 茄根取汁塗之○陳茄根
 燒灰先以露蜂房煎水漱

過傳之 海上名方 女子陰挺 茄根燒存性油調
 搽 乾坤生意 口中生輩 用

漱口以茄母燒灰飛鹽等分 取牙法 茄料以馬尿浸
 醋調稠時：搽之 摘元方 三日晒炒為末

每用點牙即落 真妙 鮑氏方

寒菜 又名薑菜 押雅 油菜 綱目 寒菜 胡洽 胡菜 同上
 時珍曰 羌隴瓜胡其地苦寒冬月多種此菜故

名胡菜

集解 宗藥曰——不甚香經冬不死辟毒於諸菜
 中亦不甚佳時珍曰——方藥多用諸家註

不臭非葱蒜可比何道家忌為五葷之一
宜俟博雅攷證
又曰觀本經云辛溫其子又能行血破氣
疑是芥菜葶菁之流蓋辛則能通也

菜部

亦不明今人不識為何菜珍訪攷之乃今油菜也
九月十月下種生菜形色微似白菜冬春採薑心
為茹開小黃花四瓣子如芥子灰赤色炒過榨油
黃色燃灯甚明食之不及麻油近人因有油種者

廣益

莖葉 辛溫 大明曰涼 治風游丹腫乳癰 唐本 破癥瘕積血

開寶 治產後血風及瘀血 日華 煮食治腰脚痺搗葉博女

人吹乳 藏器 治瘰癧豌豆瘡散血消腫伏蓬砂 時珍

別錄曰春月食之能發膝痲痲疾 說曰 先患腰脚者不
可多食之之加劇又損陽氣發瘡及口齒病胡臭人
不可食又能生腹中諸虫

道家特忌為五葷之一

發明 藏器曰 破血故產婦宜食之 馬志曰 宜血病 思邈曰 貞觀七年三月予在內江縣飲

薑薑子

三

多夜覺四肢骨肉痛疼至曉頭痛額角有丹如彈丸
腫痛至午通腫目不能開經日幾斃予思本草——
治風遊丹腫遂取葉搗傅隨手
即消其驗如神也亦可搗汁服

方 丹毒

見發明

天火熱瘡

初起似痲漸如水泡似火
燒瘡赤色急速能殺人

一葉搗汁調大黃末芒硝
生鉄衣等分塗之 近效

一切腫毒

一苗葉根蔓
普根各三兩為

末以雞子清和貼之即消若無蔓
菁以高陸根代之甚效也 同上

血刺腹痛

日夜不
止以

一葉搗汁二合入蜜

腸風下血

同上

一合溫服 聖惠

薯蕷子 辛溫治夢中洩精與鬼交

思

行滯血破冷

氣消腫散結治產難產後心腹諸疾赤丹熱腫金瘡

血痔

時珍

發明 時珍曰 葶藶子葉同功其味辛氣溫能溫能散其用長於行血滯破結氣故古方消腫散結治產後一切心腹氣血痛遊風丹毒熱腫瘡痔諸藥咸用之經水行後加入四物湯服之云能斷產又治小兒驚風貼其頂額則引氣上出也婦人方治產難歌云黃金花結粟米實細研酒下十五粒靈丹功效妙如神難產之時能救急

方 葶藶散

治產後惡露不下血積氣衝刺痛後來纔過胃寒踏冷其血必往來心腹間痛

不可忍謂之血母並治產後心腹諸疾產後三日不可無此——炒當歸桂心赤芍等分酒服三錢趕

下惡物 追氣丸治婦人血刺小腹痛不

楊氏產乳 補血破氣 可忍補血虛破氣塊甚效用

——微炒桂心各一兩良薑半兩為末醋 腸風臟毒

丸梧子大每淡醋湯下五丸 靈苑方

下血——生用炙甘草為末

每服三錢水煎服 普濟方

葶藶子 白朮

鳴皋曰北方之美無如黃芽白菜其味優於南方之笋多矣種菘云北土不生又云北土種之變為蕪菁又云味少苦豈彼之所謂菘非北土白菜之菘歟詳釋所云江南之白菜所謂箭幹白其味甚不佳雖煮熟炒熟亦微帶苦其莖莖不似北菘之潤細長直上微似蕪菁葉所指之菘或是此也且北地人無論貧富無日不吃白菜未見火害至如大明孟詵弘景吳瑞時珍所說也

白菜 又名菘 別錄

甘溫天明 通利腸胃除煩解酒渴別錄 治瘴氣止熱氣

嗽冬汁尤佳蕭炳 和中利大小便原

大明曰涼微毒多食發皮膚風痒說曰發風冷內虛人不可食有熱者食之亦不發病性冷可知弘景曰性和利人張仲景言藥中有甘草食菘即令病不除也瑞曰夏至前食發氣動疾有足疾者忌之時珍曰氣虛胃冷人多食惡心吐沫氣壯人則相宜

方 小兒赤遊 行於上下至心即死菘菜搗傳之即止張傑子母秘錄漆瘡上

方 飛絲入目 一搽爛汁滴之 入目即出 普濟

馬齒莧 又名馬莧 別錄 五行草 圖經 五方草 綱目

集

保昇曰有二種葉大者不堪用葉小者節葉

間有水銀每十斤有八兩或十兩然至難燥當以槐木槌碎向日東作架晒之三二日即乾入藥須去莖、無效 醫曰大葉者不是——亦無

水銀

酸寒治諸腫痿疔目搗搯之破瘰癧止消渴器治女

人赤白下頌飲汁治反胃諸淋金瘡流血破血癰癥

瘰癧小兒尤良用汁治紫唇面皰解馬汗射工毒塗之

瘰癧蒸作膏塗濕癬白禿杖瘡又主三十六種風者粥

止痢及疔痢治腸痛孟治癰瘡殺諸蟲搗汁服當下

惡物去白蟲和梳垢封丁腫又燒灰和陳醋滓先炙

昂曰亦反魚鱉

後封之即根出開寶散血消腫利腸滑胎解毒通淋治

產後虛汗時珍

時珍曰方士采取一伏砒結汞者丹砂伏硫黃死雄制雌列有法度

發明時珍曰一多主諸病皆取其散血消腫之功也頌曰多年惡瘡百方不瘥痛焮不已者並

搗爛傅上不過二三遍武元衡在西川苦脛瘡焮痒不可忍百醫不效到京有人傳此方用之便瘥事見

兵部手集

方脚氣浮腫心腹脹滿小便澀少食醫心鏡和產後

血痢小便不通臍腹痛一杵汁小兒血痢上方同

鏡心小便血淋服一聖惠赤白痢不問老稚男女孕婦悉可服一搗汁

鳴皋曰萬世菜人所常食不見其害彭乘所云未免過甚竇原云明耳目李廷飛云久食昏目兩存之參驗可也

和雞子白溫腹中白蟲服海上方腹中白蟲腹服少頃白虫盡出食療

陰腫痛極及痔瘡火丹一切臙瘡生虫蜜調傳之其

虫自出神效海上牙痛甚效本事方

葛苣

苦冷微毒利五臟通經脉開胸膈藏器利氣堅筋骨去

口氣明目甯原通乳汁利小便殺虫蛇毒時珍

李廷飛曰久食昏人目患冷人不宜食時珍曰按彭乘云有**毒百蟲不敢近蛇虺觸之則目瞑不見物**人中其毒以薑汁解之藏器曰紫有**毒入燒鍊用丹房鑑源云**用硫黃種結砂子制珠砂又

白紫和土作

器大煨如銅也

葛苣子

鳴皋曰友人郭公之母患偏風不遂手足拘攣痰涎甚多已數年矣或傳傳青主方用白木耳四兩生研萬莖子二兩炒研枸杞子二兩炒研蜜丸服半年全愈初不解其義茲釋方中治腎黃如金則其入腎利濕可知也治閃損腰痛下乳汁則其活血可知也治癩腫是又能入肝也故用偕杞子以入腎補腎而活血利氣也故陳藏器謂萬莖通經脉腎原謂萬莖堅筋骨雖于子缺之想其性亦同白木耳詳本條○傳青主晉人名山工書法精醫道奇方極多國朝定為屢徵不就

鳴皋曰木耳大腸藥也現人有腸滑者犯之即瀉可知矣其治痔治痢皆涼大腸之

子入藥炒用

下乳汁通小便治陰腫痔漏下血傷損作

痛時珍

方 乳汁不行

萬莖子三十枚研細酒服○又萬莖子一合甘草三錢糯米粳米各半合

同煮粥

小便不通

萬莖子搗餅貼臍中 腎黃如金 萬莖子一合細研水一盞煎 陰囊癩腫 萬莖子一合搗末 五分服 外臺秘要 水一盞煎五沸溫

服 閃損腰痛 趁痛丸用白萬莖子炒三兩白粟米炒一撮乳香沒藥烏梅肉各半兩為末煉

蜜丸彈子大每嚼一九 鬚髮不生 瘡疤上不生毛髮 熟酒下 玉機微義 先以竹刀括損以

萬莖子搗碎薑末 頻擦之 摘元

木耳

又名木樨

木菌

木樨

樹鴉

木蛾

素木上生者名素耳素樨素蛾素鴉

力
時珍曰生：編云柳城補胃木耳衰精言
老柳之城能補胃理氣朽木所生之耳有
衰精冷腎之患

鳴皋曰木耳之性自係寒涼女子將出閣
恐吉日月水來多吃木耳便能截止數日
則涼血止血可知也治痔極效是能涼大
腸也凡患痢者皆濕熱積滯阻於大腸故
氣滯後重木耳能治痢以其性滑能利大
腸而去其濕熱也○白色者名瓊耳能堅
筋骨治腰膝痛一晉醫語云凡人骨節
菜部

素黃素臣生槐木上者名槐耳槐櫛槐菌
槐鴉赤鴉槐蛾柳木上生者名柳耳柳蛾

集解

恭曰煮漿粥安諸木上以草覆之即生茸耳
時珍曰一各木皆生其良毒必隨木性不

可不審然今貨者多雜木惟素柳楮榆之耳為多
云權曰茸耳古槐樹素樹上者良柘木者次之其
餘樹上多動風氣發痲疾令人助下急損經絡背
膊悶人葳器曰一一忌蛇虫從下過者有毒楓木
上生者令人笑不止采歸色變者有毒夜視有光
者欲爛不生蟲者並有毒並生搗冬瓜蔓汁解之
時珍曰按張仲景云一一
赤色及仰生者並不可食

素耳甘平有毒

說曰寒無毒
權曰平無毒

黑者主女人漏下赤白

因濕熱者

汁血病癥瘕積聚陰痛本經療月水不調其黃熟陳白

者止久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金

此因大腸濕熱者

木耳

七

處有筋束之筋緊則堅筋弛則痛故老人骨痛也白木耳能緊筋使筋骨相着此係傳青主所說觀於婦人食白木耳產時令交骨不開則緊筋之說非無理矣鳴泉細繹郭公母之症與白木耳丸方之義更有涼血祛風去濕之義在。白木耳丸見高荳子上。白木耳生湖北鄖陽山中種此者初以為不祥為一木生白者則諸木之黑耳皆爛近年嗜之者多菜中以為珍品藥中亦用之此物遂貴每斤值十餘金

時珍曰菜耳軟耳也菜黃硬菰也其功性則一

瘡別錄治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子瘡

癖甄權止血衄腸風瀉血婦人心腹痛大利五臟宣腸

胃氣排毒氣壓丹石發熱孟詵

方少小鼻血小勞輒出菜耳炒焦為末每發時以杏仁大塞鼻中數度即可斷肘後

五痔下血菜耳作羹空心飽食三日一作待孔卒痛如鳥啄狀取大豆小豆各一升作兩囊蒸

之及熟更互生之即瘥聖惠月水不斷黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者皆

可服菜黃焙研每服二錢食前熱酒下普濟崩中漏下菜耳炒為末酒服方寸匕日三千

金赤白帶下菜耳酒煎遺尿且澀菜耳為末每酒下方寸匕日三聖

濟心下急痛菜耳燒存性熱酒服二錢集簡瘰癧潰爛菜黃菰五錢水紅豆

水字應是小子之訛

一兩青苔二錢水片一分為末雞子白調
傳以車前艾葉桑皮煎湯洗之
纂奇方
咽喉痺痛

五月五日收桑上木耳白如魚鱗者臨時搗
碎綿包彈子大蜜湯浸含之立效
近效方
足趾肉

刺
先以湯浸刮去一層用黑木
刺耳貼之自消爛不痛
近效

槐耳 苦辛平治五痔脫肛下血心痛婦人陰中瘡

痛 治風破血益力
蘇恭 甄權

發明
穎曰一人患痔諸藥不效用
木耳煮羹食之遂愈極驗

芳 腸痔下血
槐耳為末飲服
方寸匕
肘後
崩中下血
不問年月
遠近槐耳

燒存性為末酒溫
服方寸匕
產後血痛
欲死槐雞半兩為末酒
濃煎服立愈
婦人良

方 月水不斷
勞瘦暫止後發小勞
取劇者槐耳炒黃
赤石脂各一兩為末食前熱酒服二錢

木耳

八

聖方 臙毒下血 臙耳燒二兩 乾漆燒一兩 為末 虻虫

忘痛 熱水一升 虻虫立出 張文仲備急方

獸部

猪

又名豚 木經 瑕音加壯曰瑕 積去勢曰積

猪肉 壓丹石解熱毒 遺補腎氣虛竭 金

時珍曰 反烏梅桔梗黃連胡黃連犯之令人瀉犯蒼

耳令人動風合百花菜吳茱萸食發痔合胡荽食爛

人臍合龜蟹

回食傷人

發明 時珍曰 錢乙治小兒疳病麝香丸以猪胆汁和

丸猪肝湯服疳渴者以一一湯或燀猪湯服其

意蓋以猪屬水而氣寒能去火熱也 弘景曰 一一不

宜多食令人暴肥 蓋風虛所致也 震亨曰 四性入胃

便作濕熱 生痰 生則氣不降而諸症

猪頭肉 有病者食之生風發痰 時 臘猪頭燒灰

猪

九

鳴皋曰腦髓皆滑精病遺洩者不可食

治魚臍瘡時珍

發明時珍曰名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散傳之日數易而愈求其方曰但雪玄一味耳遍訪無知者有名醫却化曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰雞子白調傅即此也

豬脂 甘微寒解斑發光青毒別錄利腸胃除五疔水

腫時珍潤肺入膏藥主諸瘡蘇頌治皮膚風塗惡瘡日華

豬腦 甘寒有毒時珍曰損男子陽道臨房不能行事治風眩腦鳴

別錄主癰腫塗紙上貼之乾則易時珍

髓 甘寒治撲損惡瘡蘇頌塗小兒解顛頭瘡及臍腫

眉瘡痼疥服之補骨髓益虛勞

時珍

發明

時珍曰丹溪治虛損補陰丸多用猪脊一和丸取其通腎命以骨入骨以補髓也

血

鹹平生血治賁脈暴氣

日華

卒下血不止清酒和

炒食之

思邈

清油炒食治嘈雜有虫

時珍

壓丹石解諸毒

吳

瑞

發明

時珍曰陳自明云婦人嘈雜皆血液汗變而為痰或言是血嘈多以猪血炒食而愈蓋以血

導血歸原之意此固一說然亦有虬虫作嘈雜者虫

得血腥則飽而伏也又曰服地黃何首烏諸補藥者

忌之云

能損陽

心血

調朱砂末服治驚癇癩疾

吳瑞

治卒惡死及痘

猪

十

瘡倒壓時

珍

發明

時珍曰古方治驚風癲癇瘡疾多用心血蓋以

心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不

息也猪為水畜其血性寒而能解毒制陽故也韓飛

霞云猪心血能引藥入本經沈存中云猪血得龍腦

直入心

經是矣

尾血 治痘瘡倒壓用一匙調龍腦少許新汲水服

又治卒中惡死

時珍

心 治驚邪憂恚

別錄

治虛悸氣逆婦人血氣驚恐

思邈

主小兒驚癇汗出

蘇恭

鎮恍惚

劉完素

肝

治驚癇

蘇恭

切生以薑醋食治脚氣當微洩若先

洩勿服藏器治冷勞臟虛久洩冷滑赤白帶下以一葉

薄批蘸訶子末灸之再蘸再灸盡末半兩空腹細嚼

陳米飲下燕作引補肝明目治肝虛浮腫時珍

發明時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝千

目方多有猪肝散皆此意也又曰餌藥人不可食

合魚膽食生癭疽合鯉魚子食傷人神延壽書云猪

臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

脾俗名治脾胃虛熱同橘紅人參葱薑白陳米煮

羹食頌

肺頌補肺燕療肺虛咳嗽麻油炒同粥食又治肺虛

猪

巢曰同骨碎補灸食治腎虛久瀉又曰楊
介坪先生云少年患腰痛或教以猪腎炒
食勿過熟須帶血逐愈

嗽血者蘸苡仁末食之時珍

腎俗名理腎氣通膀胱別錄治耳聾日華除冷利思止

消渴治產勞虛汗下痢崩中時珍

發明時珍曰猪腎性寒不能補命門精氣方藥所用
借其引導而已別錄理字通字最為有理腎有

虛熱者宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣又千金治
消渴有猪腎薺菜湯補腎虛勞損諸病有腎瀝湯方
甚多皆用猪羊腎煮湯

煎藥俱是引導之意

脰音夷亦作腭時珍曰一名腎脂生兩腎中間似脂
非脂似肉非肉乃人物命門三焦發源處也肥則

多瘦能治多平虛效治肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治疰癘羸瘦

治肺氣乾張欬急潤五臟去皴皵野黧殺斑蝥地

胆毒治冷痢成虛

類補下藥同用 頌 燕

一切肺病欬嗽膿血不止鏡心通

乳汁之

吐

斷暴痢治虛弱

別錄

補虛損殺勞虫釀黃糯米蒸

搗為丸治勞氣并小兒疳蚘黃瘦病日華主骨蒸勞熱

頌 燕

消積聚治惡瘡

吳普

發明

時珍曰胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

腸

補下焦虛竭

孟詵

止小便

日華

去大小腸虛熱

燕頌

調

血痢臟毒

時珍

脬

亦作胞

治夢中遺溺疝氣墜痛陰囊濕痒玉莖生

猪

馬舉曰猪胆眼科要藥外點內服俱不可
缺效驗逾常

治疳 治熱毒 治痢 治疾受 藥 瀉心火 肝火胆 熱 通大腸

瘡

發明

時珍曰猪一所主皆下焦病亦以類從耳一故
病轉時小便不通腹脹如鼓數日垂死或用猪

愈此法載羅天益衛生寶鑑知者頗少亦妙法也
吹脹以管安上插入陰孔捻一氣吹入即大尿而

胆

苦寒治傷寒熱渴

別錄

骨蒸勞熱小兒五疳殺蟲

蕪

敷小兒頭瘡治大便不通灌之立下

藏器

通小便傳

惡瘡殺疳虫治目赤目翳明目清心藏凉肝脾

時珍

發明

成無己曰仲景以猪一汁和醋少許灌穀道中
通大便神效蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也又治

少陰瀉利不止厥逆無脈乾嘔煩者以白通湯加猪
一汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則熱物冷服
下咽之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以
和人尿猪胆鹹苦之物于白通熱劑之中使其氣相

從而無格拒之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脉微欲絕者通脉四逆湯加猪一汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加一汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也汪機曰朱奉議治傷寒五六日斑出有猪一雞子湯時珍曰方家用猪一取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝胆之火也

膏汪機曰好古以為猪皮吳緩以為燭猪肘刮下黑一二說不同吳說為是甘寒治少

陰下痢咽痛時珍

發明仲景曰少陰下痢咽痛胸滿心煩者猪一湯主之用猪一一斤水一斗煮五升取汁入白蜜一

升白粉五合熬香分六服成無己曰猪水畜也其氣先入腎鮮少陰客熱加白蜜以除煩潤燥加白粉以

益氣斷

利也

猪

藥治小兒驚瀾燒灰服別錄治痘瘡倒陷時珍

母猪乳時珍曰取法須馴猪待小猪飲乳時提後脚急以手持而承之非此法不可得治

小兒驚瀾及鬼毒寒熱去來燕恭小兒天吊大人猪雞

癩病日華

發明時珍曰小兒體屬純陽其驚瀾亦生於風熱一氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云初生小

兒一月內以一一類滴之最佳張煥云小兒初生無乳以一一代之出月可免驚瀾痘疹之患楊士瀛云小兒口禁不開一一滴之甚良月內胎驚同朱沙牛乳抹口中甚妙此法諸家方書未知用予用之有效

蹄用母猪者下乳汁洗傷搥諸敗瘡別錄通乳脉托癰疽

者清汁洗癰疽清熱毒去惡肉有效時珍

法 取皂用猪一湯煎藥洗瘡是以肉補肉之

發明 時珍曰外科精要洗瘡疽有猪一湯數方用猪一煮汁去油煎衆藥蘸洗也

懸蹄甲 一名猪退 治五痔伏熱在腹中腸瘻內蝕 本經同

赤木燒烟熏辟一切惡瘡 仲景天焦用時珍曰古方有用

左蹄甲者有用後蹄

甲者未詳其義也

方 內 小兒刮腸劑 禁口閉目至危者精猪肉一两薄切炙香以膩粉末半錢鋪上

令食或置鼻間聞香自然要食也 活幼口議 破傷風腫 新殺猪肉乘熱割片貼患處連換其

腫自消 小兒火丹 猪肉切片貼之 男女陰蝕 肥猪肉煮汁洗不過二十斤即

簡便 千金酒積面黃 腹脹以項肉一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香酒下當利出酒

布袋也 普濟

猪

方 脂

發背發乳

猪脂切片冷水浸貼日易
四五十片甚妙 急救方

方 髓

骨蒸勞傷

脊髓一條猪胆汁一枚童便一盞
柴胡前胡、黃連烏梅各一錢非

白七根同煎七分温服不過

三服其效如神 瑞竹堂方

小兒眉瘡

猪頸骨髓六
七枚白膠香

二錢同入銅器熬稠

待冷為末麻油調塗

小兒頭瘡

猪鬃骨中髓和膩粉
成劑煨香研末先用

温鹽水洗淨

傳之

小兒疔瘡

同

方 血

中滿腹脹

旦食不能暮食用不着鹽水猪血
澆去水晒乾為末酒服取洩甚效

李樓

杖瘡血出

猪血一升石灰七升和劑燒灰再
以水和丸又燒凡三次為末傳之

奇方

效 驚癇癩疾

心血調朱沙
木服 吳瑞

心病邪熱

藥珠丸用猪
心血一箇敲

花末一匙朱沙末一兩同研梧

子大每酒服二十九

奇效

痘瘡黑陷

臘月取積
猪心血瓶

乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒服
消火紅活用生血亦可神效 沈存中 催生 開骨膏
和乳香末九梧子大珠沙為衣而東 卒中惡死 斷猪
酒服一丸未下再服 婦人良方 尾取

血灌之並縛猪枕
之即活 肘後方

方 **肝**

休息痢

猪肝一具切片杏仁炒於淨鍋內一
重肝一重杏仁八童便二升文火煎

乾取食日一
次千金

中蠱腹痛

支太醫秘方猪肝一具蜜一
升共煎分二十服或丸服

肘後 急勞疾悴

日晚即寒熱驚悸煩渴用猪肝一具
切熟生甘草末十五兩於鍋中布肝一

重撒甘草末一重以盡為度入童便五升文武火煮

爛搗丸梧子大每空心米飲下二十九漸加至三十

丸 聖

愈方

方 **脾**

脾積痞塊

猪連貼七箇每箇用針刺爛以皮
消一錢擦之七箇並同以磁器盛

猪

馮景白楊介坪先生云少年病腰痛或教吃腰子勿炒過熟帶血為佳食之遂愈

七日鉄器焙乾又用水紅花子七錢同搗為末以無灰酒空心調下一年者一服可愈二年以下者二服十年以下者三服 保壽堂方

方

腎虛遺精

多汗夜夢鬼交用猪腎一枚擘去膜入附子末一錢濕紙裹煨熟空

心食之飲酒一杯 經驗

腎虛腰痛

用腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末三錢在內

荷葉包煨熟食之酒下 本草權度

閃肋腰痛

雄猪腎一枚椒鹽淹過入甘遂末三錢荷葉包

煨熟食之酒送下 儒門事親

卒然腫滿

用腰子批開入甘遂末一錢紙裹煨熟食以小便利

為度否則再服 時後

久嗽

腰子二枚入椒四七粒煮食 張文仲

久瀉不止

腰子

批開入骨碎補末煨食神效 瀕湖

傳尸勞瘵

腰子一對童便二盞無灰酒一盞瓷罐盛之泥

封炭火煨自成至子時止待五更溫熱飲酒食腰子病篤者只一月效 邱真人經驗方

瘰癧瘻

馮景白甘遂不應用至三錢疑是三分

背 初起者用猪腰子同飛
麩搗如泥塗之即愈

方 **脰** **猪脰酒** 治冷痢久不愈此是脾氣不足暴冷
入脾舌上生瘡飲食無味或食下還

吐小腹雷鳴時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸
成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩四支無力丈夫

瘡癬兩肋虛脹變為水氣服之皆效此法出于傳尸
方取猪脰一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大

升微火温之酒熟納脰其中令消盡又取桂心末一
小兩納酒中每旦温服一小盞午夜各再一服甚驗

忌麩食油膩 **膜内氣塊** 猪脰一具炙蘸延胡索
末食之 衛生易簡 肺

氣咳嗽 猪脰一具苦酒煮食
不過二服效 肘後 **二十年嗽** 猪脰三具大
棗百枚酒五

升漬之秋冬七日春夏五
日絞去渣七日服盡忌鹽

方 **肚** **水瀉不止** 用猪肚一具入蒜煮爛搗丸梧
子大每米飲服三十丸丁必卿云

猪 十六

予五更水瀉百藥不效用此方入
平胃散末三兩丸服遂愈 普濟 消渴飲水 雄猪肚 一具煮

汁入少豉湯即飲之。仲景猪肚黃連丸用猪肚一
具入川連末五兩花粉白梁米各四兩知母三兩麥

冬二兩縫定蒸熟搗丸梧
子大每服三十九米飲下

方 **腸風臟毒** 奇效用川連入猪大腸內煮爛搗
丸梧子大米飲下三十九。又方

入槐花末令滿傳定以醋煮爛搗為
丸桐子大每服三十九温酒送下 **脇熱血痢** 方同

臟寒洩瀉 體倦食減用大腸一條去脂以吳茱萸填滿
蒸熟搗丸桐子大每服五十九米飲下

奇效

方 **疝氣墜痛** 用猪脬一箇洗入小茴香大茴香
破故紙川棟子等分填滿入青鹽

一塊縛定酒煮熟食之
其藥煨搗為丸服之 **產後遺尿** 猪肚猪脬各一枚
糯米半升入脬內

更以豚入肚內同五味
煮食之 醫林集要
產後尿床 同上

方 **胆** **小陰下利**
不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加
胆汁主之葱白四莖乾薑一兩生

附子一枚水三升煮一升八人尿
五合猪胆汁一合分服 傷寒論
或瀉或止 久而不愈二聖

九用黃連黃柏末各一兩以猪胆汁煮熟和丸
綠豆大量宛大小每米飲服之 見總微論
赤白

下痢 臘月用猪胆百枚俱入黑豆在內着射香少許
陰乾每用五七粒為末生薑汁調服 奇效

熱病虫蠱 吐下用猪胆一枚醋一合
煎沸服虫立死 梅師
傷寒斑出 猪胆

湯用猪胆汁苦酒各三合雞子一箇
合煎三沸分服汗出即愈 張文仲
喉風閉塞 臘月初一

日取猪胆五六枚用川連青黛薄荷僵蚕白礬朴消
各五錢裝入胆內青紙包了將地掘一孔方深各一
尺以竹橫懸此胆在內蓋好候立春日取出待風吹
去胆外青紙研末密藏每吹少許神效乃萬金不傳
猪 十七

之方 邵
真人經驗 癆病咳嗽 猪胆汁和人尿薑汁桶皮訶子
皮同煮汁飲之良 拾遺方

小便不通 猪胆汁一枚熱酒和服。又用猪胆
連汁籠住陰頭一二時汁入自通 消渴

猪胆汁五枚同定粉一兩同煎為
丸芡子大每服二丸 聖濟總錄

方 懸蹄甲
肺氣齁欬 猪爪甲二枚燒存性研入
射香少許茶服 普濟 定

欬化痰 用猪蹄甲四十九枚洗淨每甲入半夏白礬
各一字罐盛固濟煨赤為末入射香一錢每

用糯米飲下
五分 經驗

犬

肉 臙酸温安五臟補絕傷益氣 別錄 宜腎 思 補胃氣

壯陽道暖腰膝 日華補五勞七傷益陽事實下焦 孟 說

也 鮪 小魚
凡食其
去以則
力小不
燕人

反商陸畏杏仁同蒜食損人同菱
食生癩同海鮪食之必得惡病

發明 弘景曰黃犬肉大補虛勞黑者白者次之壯者尤勝時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒犬性溫暖能

治脾胃虛寒之疾脾胃溫和而腰腎受廢矣若素常氣壯多火之人則宜忌之不宜炙食令人消渴妊婦

食之令子無聲熱病後食之殺人

方 戊戌酒 大補元氣用黃犬肉一隻煮一伏時搗一伏時搗泥和汁拌炊糯米三斗入麴

如常釀酒候熟每旦 **戊戌丸** 治男女一應諸虛不足空心飲之 養老方 骨蒸潮熱等證用黃童

子犬一隻去皮毛腸肚同外腎于沙鍋內用酒醋八分水二升入地骨皮一斤前胡黃芪肉蓯蓉各四兩

同煮一日去藥再者一夜去骨再煮肉如泥搗漚入當歸末四兩蓮子蒼朮末各一斤厚朴橘皮末十兩

甘草末十兩和杵丸梧子大空心鹽酒下五七十九 乾坤秘韞

犬 十六

血 黑犬血治產難橫生血上搶心和酒服之別錄熱

散治虛勞吐血點眼治痘瘡入目及鬼擊病辟諸邪

魅時珍

胆 苦車有小毒明目本經 傳惡瘡別錄 殺虫除積能破

血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下時珍治

刀箭瘡日華 去腸中膿水孟詵

方 眼赤痒 肝虛目暗白犬一枚螢火出二七枚陰乾為

末點之 血氣撮痛不可忍者黑犬一箇半乾半濕

鐵淬酒下痛 反胃吐食不拘男女老少遠年近日五靈脂末黃犬一汁和丸龍眼

立止 經驗

羊頭蹄
內水腫
人食之
百不一
愈

大每服一九好酒半盞磨化服

不過三服即效 見本事方

瘡塊肝積

五靈脂炒
烟盡真可

魏去砂研等分用雄黃犬一汁九黍米大

空心燕三十九忌羊肉醋麪 簡便方

陰莖 治陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十

羊疾

本經

乳汁 治十年青盲取白朮生子目未開時取乳頻

點狗子目開後即瘥

藏器

羊

又名羖 壯羊也 羖音低亦壯羊 羯去勢曰羯

南 大熱 說曰 暖中治字乳餘疾汗出虛勞寒冷補

溫

中益氣 別錄 利產婦 思 治風眩瘦病丈夫五勞七傷 孟說

犬 羊

十九

開胃健力

日華

時珍曰熱病及天行病瘧疾後食之必發熱致危
妊婦食之令子多熱煮羊以杏仁或瓦片則易糜以
胡桃則不燥以銅器煮之男子食之

損陽女子暴下汪機曰反半夏菖蒲

發明

頌曰肉多入湯劑胡洽有大羊肉湯治婦人產
後大虛心腹絞痛厥逆醫家通用大方也宗奭

曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一婦冬月生

產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也醫欲投抵當

湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減水二服即愈景

曰羊肉有形之物能補有形肌肉之氣故曰補可去

弱人參羊肉之屬是也人參補氣羊肉補形凡味同

羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰長也時珍曰開河記

云隋大總管麻叔謀病風逆起坐不得煬帝命太醫

元方視之曰風入腠理病在胸臆須用嫩肥羊蒸

熟摻藥食之則瘥如其言未盡劑而瘥自後每食羊

羔同杏酪五味日食數枚觀此則羊肉補虛之功可

證矣

方 羊肉湯

仲景治寒勞虛羸及產後心腹疝痛用羊肉一斤水一斗煮汁八升入當歸五

兩黃芪半斤生薑六兩煮取二升分四服 胡洽方無黃芪千金有芍藥 金匱要略 胡洽大羊

肉湯

治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘草各七錢半水一斗煮肉取七升

入諸藥煮

崩中垂死

一三斤水二斗煮一斗三升入生地黃一升乾薑當歸各三

二升服

兩煮三升分

骨蒸傳尸

用一一一拳大煮熟皂莢一尺炙以無灰酒一升銅器內

煮三五沸去渣入黑錫一两令病人先啜

肉汁乃服一合吐虫如馬尾為效 外臺

虛寒瘡疾

一煮食更飲酒

暖卧取汗 集驗

血 鹹平治產後血悶欲絕者熱飲一升即活 恭熱

羊

二十

飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九竅出血解芥

草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發

時珍

發明

時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊一十年一

食前功盡亡此物能制丹沙水銀輕粉硝沙砒

霜硫黃鍾乳陽起石等毒凡覺毒發刺飲一升即解

服地黃首烏諸補藥者亦忌之嶺表異錄言其能解

胡蔓草毒解毒之功如

此本草不言誠缺文也

方 衄血一月

不止刺羊一熟飲即止 聖惠

產後血攻

熱羊一三

兩服甚妙

梅師

妊娠胎死

不出及胎衣不下產後諸疾狼狽者刺血熱飲一小盞極效

見聖

惠方

乳

甘溫潤心肺治消渴

甄權

補虛勞益精氣補肺腎

張利大腸治小兒驚癇含之治口瘡日主心卒痛可

溫服之蚰蜒入耳灌之即化成水孟治大人乾嘔反

胃時溫服之舌腫含之時鮮蜘蛛咬毒蘇頌曰有人為蜘蛛

咬腹大如妊偏身生絲

有僧教服羊乳遂愈

發明孔景曰牛羊一補腎故北人多肥健時珍曰丹溪曰反胃人宜時飲之取其能開胃院及大

腸之榮也

骨髓甘溫利血脉益精氣以酒服之別却風熱久

服不損人孫真和酒服補血主女子血虛風悶孟潤

肺氣澤毛髮滅癩痕時珍曰刪繁治肺虛毛悴有酥一湯中用之

羊

三一

方 肺痿骨蒸

煉羊脂煉羊一各五兩煎沸下鍊蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不

住手攪微火熬成膏每日空心溫酒調服一匙 飲膳正要

白禿頭瘡

生羊一調輕粉搽

之先以泔水洗淨一日

二次數日愈 經驗

瘡痂不落

減癩方用羊一煉一兩輕粉一錢

和膏塗之

陳文仲

心有孔者 殺人

止憂恚膈氣

別錄補心器

方 心氣鬱結

羊一一枚回：紅花浸水一盞徐塗心上炙熟食之令人心安多喜 見

正安

方

肺 補肺止咳

別錄

方 久嗽肺痿

作燥羊一湯用一具洗淨以杏仁柿霜真豆粉真酥各一兩白蜜二兩

和勻灌一中白水煮
食之 葛可久方 咳嗽上氣 積年垂死用菴蓐子
炒熟羊一切晒乾等

分為末七月七日醋拌每夜
服一方寸匕粥飲下 千金

腎 補腎虛耳聾壯陽益胃治虛損盜汗 療勞痢

甚效合蒜薤食之治癥瘕 治腎虛消渴

發明 時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴
脚氣有 瀝湯方甚多皆用羊一煮湯煎藥蓋

用引導各
從其類也

方 五勞七傷

陽虛無力經驗用羊一一對去膜切
向菴蓐一兩酒浸一夕去皮和作羹

下五味食。正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷
用羊一三對羊向半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五

味煮成汁下 老人腰硬 老人腎臟虛寒內腎結硬雖
米作粥食之 服補藥不入用羊一一對杜

羊

三

馮泉曰目得血而能視血滯則結而目盲
矣羊肝生用最破瘀行血熱用則無力矣
凡諸血生用皆能破血肝藏血者也故與
血同例丹溪治一人目飲熱酒致青盲丹
溪曰此血因酒滯于胃也宜破瘀可愈重
用蕪木而痊亦此理也

仲長二寸濶一寸一片同煮熟空心食之

令人內腎柔軟然後服補藥 雞峰條急

肝苦寒

頌曰

補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後

失明並用子肝作生食神效

蕪木

弘景曰含猪肉及梅子小豆食傷人心思邈曰含生
椒食傷人五臟最損小兒合苦筍食病青盲妊婦食

之令子

多厄

發明

時珍曰羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝
經受邪之病今羊肝丸治目有效可徵汪機曰

羊肝明目性也他肝則否凡各畜

臨殺時念氣聚于肝故諸肝不利

方 肝虛目赤

青羊一薄切水浸吞
之極效 龍木論

病後失明

方同上

熱病失明

見目 蕪木

青盲內障

白羊子一具川連一兩
熟地黄二兩同搗九梧子

鳴皋曰目病初起最忌用苦寒藥點之時
邪熱激住惟猶羊胆雖苦寒不忌蓋胆為
血向之類與黃連黃柏等不同也不必同
蜜蒸但生用點之亦神效

大食遠茶服七十九日三服崔承元病內障失
明有人遺此方以報德服之遂復明 傳信方

膽 苦寒治青盲明目錄別點赤翳白翳權療疔時行

熱瘰瘡和醋服良蘇治諸瘡能生人身血脉思

張明時珍曰肝開竅於目胆汁減則目暗目者肝之
外候胆之精華也故諸一皆治目病夷堅志載

二 味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一
切暴赤目疾用羯羊一一枚入蜂蜜於內蒸之候乾

研膏每含少許並點之一日淚止二日腫消三日
痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二 草花之名

方 碧雲膏臘月取羯羊一以蜜調朴硝裝入紙套
籠住懸簷下待霜出刮下點目神效

張三 代指作痛乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺
冷水中三度即以羊一塗之立愈甚

效外 臺秘要

羊

鴨屎白 治腹中諸疾是以腸中之物
治腸中之患以類相從也其治痢與用白
馬糞鴉屎白人中黃治熱毒下痢同義

鴨屎白
應首寒

脛 潤肺燥治嗽時珍治婦人帶下外臺

方 遠年咳嗽 羊一三具大棗百枚酒五
升漬七日飲之 肘後

康 苦平治小兒洩痢驚癇別錄 罾竹木刺入肉治箭

鏃不出日華治腹中諸疾相熱燒烟熏痔瘻治骨蒸彌

良 種 恭

方 疔痢欲死 新羊一升浸一夜絞汁日午
服極重者不過三服愈 總錄 心氣

痛 不問遠近以山羊一七枚頭髮一
團燒灰酒服永斷根 孫氏集效 慢脾驚風 活脾
散用

羊一二十一枚炮丁香一百粒胡椒五十粒為末
每服半錢用六年東日照處壁土煎湯下 聖濟

牛

黃牛肉 甘溫安中益氣養脾胃 補益腰脚止消

渴及嘔涎

思

日華曰 微毒食之發藥毒動病不如水牛 說曰黃牛動病黑牛尤不可食自死者不可食 藏器曰牛病死者食之發痼疾疰癘令人洞下疰病黑牛白頭者不可食獨肝者大毒令人痢血至死北人牛夜多以蛇從鼻灌之故肝獨也水牛則無之 時珍曰仲景云嗽蛇牛毛髮白而後順者是也中其毒者惟人乳可解之食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黃牛水牛合猪肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭蘆食令人熱病煮牛

向入杏仁薑葉則易爛

發明

時珍曰 韓愈言牛肉補氣與黃芪同功觀丹溪

倒倉法論則牛之補土可心解矣丹溪倒倉論曰腸胃為積穀之寶故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰

牛

三四

丹溪治林德方咳而咯血謂肺癰非吐不可血耗非補不可惟倒倉法二法兼備服之而愈又治蕭伯善便濁滑精亦用倒倉法而愈又治許懿公病心痛用燥藥靈丹艾灰雜治數年不愈自分為棄人丹溪先

獸部

用防風通聖散下其積滯而病稍起思食
然兩足難移次年行倒倉法節：應手復
生子活十四年又臨海林兄久嗽吐血發
熱消瘦眾以為瘵百方不應丹溪脉之兩
手弦數日輕夜重計無所出亦用倒倉而
安次年生子

雷聲曰觀於飲數十杯身體覺痛可見藥
力之周身悉到也

丹溪曰倒倉法中年後行一二次亦却病
養生之一助也

積血互相纏糾發為癰瘻為勞瘵為蠱脹成形成質
為窠為血以生百病而中宮愆和自非丸散所能去
也此方出自西域其法用黃牡牛肉二十斤長流水
煮成糜去滓濾取汁再熬成琥珀色收之前一晚不
食至旦空腹坐密室取汁每飲一杯少時又飲積數
十杯身體覺痛如病在上則吐在下則利在中則吐
而且利利後必渴即飲已溺數椀以滌餘垢行後倦
卧覺饑先與米飲次與薄粥三日後方與厚粥軟飯
調養半月即精神煥發沉疴悉亡矣須忌牛肉五年
蓋牛坤土也黃土色也肉者胃之所樂也熟而為液
無形之物也故能由腸胃而透肌膚毛竅指爪無所
不到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁
道者自利而除有如洪水泛漲陳莖順流而去益然
渙然潤澤枯槁而有精爽之樂也王綸曰牛肉本補
脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢耳借補為
瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難
施之

汪昂曰胃槁胃冷脾不磨食故氣逆而成
 反胃氣血不足其本也曰痰飲曰食積其
 標也胃槁者滋血生津胃冷者溫中調氣
 東垣云上焦吐者由乎氣治在和中而降
 氣中焦吐者由乎積治在行氣而消積下
 焦吐者由乎寒治在溫中而散寒又曰噎
 膈不通服香燥藥取快一時破氣而燥血
 是速其死也不如少服藥飲牛一加進汁
 或薑汁或陳酒為佳江南臬司多公患禁
 口痢粒米不進鄭奠一令服牛一久之亦
 斃部

水牛肉 消水腫 藏器 餘同黃牛

鼻 水牛者良 治消渴同石燕煮汁服 藏器 治婦人無乳作

羹食最效 孟詵 口眼喎邪火熯之即漸正 宗奭

乳 甘微寒補虛羸止渴 別錄 養心肺解熱毒潤皮膏

日 冷補下熱氣 藏器 患熱風人宜食之 孟詵 老人煮食有

益 思邈 治反胃嘔噦補益勞損潤大腸治氣痢除黃疸 方見秦苑

時 藏器曰凡服一必煮一二沸停冷啖之熱食即壅不

欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之

同生魚食作 瘕○制秦苑

牛

二十五

痊

暴曰壹腸有二種有因憂鬱怒者治在血分氣分當和血調氣有因胃槁及下焦枯乾者惟有潤法嘗見西人得此病最多皆因早起不食油膩但飲乾燒酒作點心久胃家津液燒乾食入滯滯不能下復行吐出此等症惟飲牛乳以潤其枯竭若得津液復行食入自可滑下其吐可止香附藥如火上加薪矣

北牛曰
養南牛
曰猴

發明

恭曰犛牛乳性平生飲令人利熱飲令人口乾溫可知也水牛一作酪濃厚勝犛牛一弘景曰

犛牛一佳震亨曰反胃壹腸大便燥結宜牛羊一時

時燕之並服四物湯為上策不宜用人乳人乳有飲

食之毒七情之火也時珍曰一煎葦菱治氣刺有效

蓋一寒一熱能和陰陽也按獨異志云唐太宗患氣

刺眾醫不效金吾長張寶藏進一煎葦方立愈逾月

疾復作復進之又平授鴻臚御其方用牛一半斤葦

菱三錢同煎減
半空腹頓服

血一臧平治金瘡折傷垂死下水蛭

時珍

時珍曰元史云布智兒從太祖征回身中數

天悶仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之牛腹

浸熱血中移時遂甦又李庭從伯顏攻鄂州砲傷左

脇矢貫胸幾絕亦用此法而甦此法知者甚少故書

於此以

備緩急

鳴皋曰牛骨一炒麩日服潤肺補腎治勞傷極損果有捷效

方

誤吞水蛭

腸痛黃瘦牛一熟飲一二升次早化猪油一升飲之即下 肘後

髓

甘溫補中填骨髓久服延年

本經

平胃氣通十二

經脈

思

治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服

孟詵

潤肺補腎澤肌悅面理折傷捺損痛甚妙

時珍

方

補精潤肺

壯陽助胃用鍊牛一四兩胡桃肉四兩杏仁四兩山藥末半斤煉蜜一斤

同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服 瑞竹堂方

腦

治風眩

蘇恭

治脾積痞氣

時珍

方

偏正頭風

諸藥不效者如神用白芷川芎各三錢為細末以黃牛腦子撒藥在上瓷

器盛之加酒頰熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗 保壽堂方

脾積痞氣

牛一丸大

牛

二十六

有神效黃牛一子一枚去皮筋搗爛皮硝末一斤蒸餅六箇細研和勻糊丸梧子大每服三十九空心好酒下日三服百
日有驗 聖濟 氣積成塊 牛一散牛一枚去筋雄雞一具連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一椀杵千下入生鍋內文武火焙乾研為細末入輕粉三錢令勻每服三錢空心酒下日三 同上

胆 苦大寒除心腹熱渴止下痢及口焦燥別錄臘月

釀槐子服明目治疔濕彌佳藥性釀黑豆百日後取出

每夜吞一粒鎮肝明目藥性釀南星末陰乾治風痰有

奇功藥性除黃殺虫治瘰腫時珍

喉白水牛治反胃吐食取一具去膜及兩頭逐節

時珍曰 一 厥陰少陰 肝腎 血分之藥

北牛曰 洋

以醋浸炙燥燒存性每服一錢米飲下神效

時珍

發明

時珍曰普濟方云反胃吐食藥物不下結腸三五日至七八日大便不通如此者必死昔周禪

師得正胃散方于異人十痊八九用白水牛喉一條

去兩頭節并筋膜脂肉收之臨時 灸用米醋一盞

浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡為度研末厚紙

包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾服一錢食

前陳米飲調下

輕者一服立效

牛角鯁

時珍曰此即角尖中堅骨也藏器曰水牛黃連牛者可用餘皆不及

苦温 甄權

寒 曰苦 下閉血瘀血疼痛女子帶下血燭之酒服 本經 燒

灰治赤白痢

宗 藥

主血崩瀉血水洩

性 藥

治水腫

時珍

發明

時珍曰 一 一 筋之粹骨之餘而鯁又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性瀟故止血

牛

三

痢血崩
諸病

牛角 苦寒 之才 水牛角者煎汁治熱毒風及壯熱 華日

牛者治喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳

不快似喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥 蘇頌 治淋破血

時珍

方 石淋破血 一燒灰酒服方寸匕日五服 總錄 血上逆心 煩悶 刺痛

水牛角燒為末酒服方寸匕 子母秘錄方

牛蹄甲 損傷接骨 乾坤秘製用一箇乳香沒藥各一錢入甲內燒研末以

黃米粉糊和 成膏傅之

馬家也牛角牛蹄俱能接骨為能散瘀以骨補骨也

牛涎 日華曰以水洗老牛口鹽塗之少頃即出 治反胃 日華 水服二匙終

身不噎 思 灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞

治喉痺口噤 時珍

方 噎膈反胃 香牛飲用一一盞入射香少許銀盃頓熱先以帛束緊胃腕令氣歇解

開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與食危氏得效方

牛屎 苦寒治水腫乾者燒之傅惡瘡 別錄 傅小兒爛

瘡爛痘及癰腫不合能滅癩痕 時珍 絞汁服治消渴黃

痘脚氣霍亂小便不通 恭 蒸

發明 時珍曰 一一散解熱毒利溲故能治腫痘霍亂疔痢諸疾燒灰則收濕生肌拔毒故能治癰疽

牛 黃明膠 天

爛痘諸疾也宋孫法宗苦頭瘡遇神
教以——煮傳之即驗如其言果愈

方 水腫尿澀

黃——一升絞汁飲澀
利即瘥勿食鹽 梅師

濕熱黃病 黃

一日乾為末麩糊九梧子大
食前白湯下七十九 簡便

霍亂吐下

不止四支逆
冷用黃——

半升水二升煮三
沸服半升 外臺

疝痢垂死

——一升水二升
攪清服汁 必效 痘瘡

貴爛

白龍散以臘月黃——
燒白灰傳之甚妙

癰腫不合

——一燒末用鴉
子白和封乾即

易之神效

千金月令方

黃明膠

又名牛皮膠食療水膠 外臺 海犀膠

甘平治吐血衄血下血三淋下痢妊婦胎動下血風

濕走注疼痛打撲傷損湯火灼瘡一切癰疽腫毒活

鴨泉曰友人親公言親見一婦乳腫硬如
 木石醫不能療亦不能名其症或教以牛
 皮膠化傅乾則再上漸柔軟而愈泉竊思
 之甚有理牛內膏既能化數十年之老痰
 癖積而通血脉則牛皮與肉之性應不相
 遠故亦通血脉血脈通則腫硬消矣觀方
 中傅膠腫乳癰發替等方可相發明
 汪昂曰阮氏唐氏方能使毒不內攻如果
 效驗勝于服蠟蟻丸矣

獸部

五止痛潤燥利小大腸
時珍

方 肺痿吐血

每服三錢生地黃汁調下 普濟
 或嗽血不止海犀膏 一大片炙黃

肺破吐血

塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即止

斗 吐血咯血

研每服一錢食後米飲下 食療
 一兩切片炙黃新綿一兩燒

跌撲損傷

真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存
 性研末每服五錢熱酒一鍾調服仍飲酒

二三杯暖卧取微汗即瘥

諸般癰腫 開入黃丹一兩煮勻以

者塗四圍自消 本事

乳癰初發 塗之立消 楊起

簡發背初起

阮氏經驗用 一 一 四兩酒一盞重湯
 頰化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之

服此毒不內攻不傳要症 唐氏經驗
 加穿山甲四片同燒存性云極妙無比

黃明膠 牛黃

二九

鳴皋曰：一入肝胆經入心經

鳴皋曰：近世以山牛黃為重，廣牛黃為劣。

近日北京回民甚眾，宰牛甚多，其黃較別

處有者，氣味苦，黃一兩價四五十金。○回

民殺牛，手捨其胆，內有硬核者，即黃也。連

胆携至藥肆售之，大約俱得于胆中，所謂

生黃、角黃、心黃，未嘗見也。○據藥肆人云

駝黃亦能透甲，但駝黃較牛黃大。

鳴皋曰：世以牛黃、羚羊等為風藥，誤矣。肝

熱極則生火；盛極則自生風；火相煽

而氣升，痰壅為驚，搐等症，原無關外藥之

風。讀喻嘉言書說，不磨之論也。牛黃能涼

肝胆，肝胆涼則風息矣。世遂疑牛黃能驅

風。

鳴皋曰：華天士云：牛黃能治腫中瀰漫之

熱，故熱症中熱入心包，古絳神昏如寐者

性：用至寶丹。

昂曰：牛黃善通竅，故能發痘墮胎。

鳴皋曰：世言小兒多服牛黃則痴呆，不知

牛黃 又名丑寶

集解 恭曰：一有一必多，吼以盆水承之，伺其吐出

漫黃若鴉子黃，藏在肝胆間。數曰：喝迫而得者名

生黃，殺死角中得者名角黃，心中刺得者名心黃。

肝胆中得者名肝黃。頌曰：一一如鴉子黃，大重疊

可揭而執，香者佳。磨指甲黃透甲者為真。宗奩曰

一輕鬆自然，微香，西戎犛牛黃，堅而不香，又有駱駝黃亦能相亂，不可不審。

甘涼治驚癇熱盛狂瘵除邪逐鬼本經治小兒百病諸

癇熱口不開墮胎別錄主中風失音口噤驚悸天行時

疾健忘虛乏日華安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜啼

益肝胆定精神除熱止驚辟惡氣除百病思邈清心

小兒臟腑之氣未全肝熱過甚則抽搐痰
壅邪竄心胞則神昏及用牛黃寧涼藥病
雖愈而心氣過傷竅為之閉以致痴呆
時雖不用牛黃未必不痴呆也及至痴呆
而歸咎于牛黃良藥蒙冤矣

昂曰中風中暈者重多滯力竅中腑稍輕
多着四肢若外無六經形症內無便溺阻
隔為中經終為又輕初宜順氣開痰後宜
養血活血不宜專與風藥大抵五臟皆有
風而犯肝者為多肝屬風木而主筋肝病
不能榮筋故有舌強口喎喝和癱瘓不遂
不仁等症若口開為心絕手撒為脾絕眼
合為肝絕遺尿為腎絕吐沫鼻衄為肺絕
髮直頭搖面赤如粧汗絳如珠者皆為不
獸部

化熱利痰涼驚
窟痘瘡紫色發狂謔語者可用
時珍曰出

王氏

之才曰人參為使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨龍胆

草地黄常山蜚廉畏牛膝乾漆時珍曰別錄言一

惡龍胆而錢乙治小兒急驚疳病涼驚九射香九皆

兩用龍胆治驚癇解熱殺虫與一一主治相近亦肝

經藥也下
應相惡

發明李杲曰一一入肝治筋病凡中風入臟者必用

牛雄腦射之劑入骨髓透肌膚以引風出若風

中腑及血脉者用之恐引風邪流入骨髓如油入麩

莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也因其病在心

及肝胆之間凝結成黃故還能治心及

肝胆之病正如人之淋石復能治淋也

方初生三日
去驚邪辟惡氣以一一豆許研
細入窠綿蘸令吮之姚和衆方七

治若止見一二症猶有可治者○又曰心熱則火自生缺肝熱則木自生風火相搏膠痰上壅遂致中風不語○鳴皋曰自生二字宜玩

希雅曰同犀角琥珀天竺黃勾藤茯苓神珠金箔射香朱沙治小兒驚癇百病入外科內服藥能解疔腫癰疽毒並可入傳藥止痛散毒如神 同鐘乳真珠皂莢牙末僵蚕紅鉛水片明礬沒藥蛙竹屑天靈蓋為丸土茯苓湯下治結毒有神

日口噤 一為末竹瀝化 初生胎熱 或身體黃 一豆大家調乳

化時、滴口中形色 小兒熱驚 薑汁各一杯和勻與

服 總 小兒驚候 小兒積熱毛焦睡語 發驚者一

微論 小兒驚候 六分朱沙五錢同研以犀角磨

錢 同上 驚癇嚼舌 迷悶一豆許研和 蜜水灌之 廣利

內 有毒 士良曰 煮汁洗頭瘡白禿 時珍曰 有大毒 出聖惠

髮膏 著項上也 有小毒治偏風口僻 時珍

發明 時珍曰靈樞經云卒口急僻者類筋有寒則急引類移類筋有熱則縱緩不收以桑鈞之以生桑灰置坎中生之以馬膏尉其急類以白酒和桂末塗其緩類飲美酒噉炙肉為之三拊而已靈樞無

註世多不知此方之妙竊謂口類喝僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡于口會太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱于右中寒則逼熱于左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其經絡索能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒

嗽灸肉云

肝 有大毒

時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又云文成食馬肝而死

駒衣胞 治婦人天癸不通煨存性為末每服三錢

麝香少許不過三服良

孫氏集效

馬汗 有大毒

說曰患瘡人觸一毒攻心欲死者燒粟榦灰淋汁浸洗出白沫乃毒氣

馬

三十一

也嶺南有人
用此得力

百馬溺 辛亥有毒破癥結堅聚男子伏梁積疝婦

入癥積 別錄 熱飲治反胃殺虫 時珍

發明 時珍曰 治癥瘕有驗按祖台之志怪云 昔有人與奴皆患腹痛奴死剖腹得一鱉尚活

以諸藥投口中不死灌以馬尿即化成水乃服 而愈反胃亦有回瘕積者故亦能治之

方 食髮成癥 咽中如有虫上下者是也 伏梁心疾 千金

銅盤盛 一升 瘡塊心痛 僵蚕末二錢 調服並塗塊上 摘

元 頭瘡白禿 盪洗 惡刺瘡 日漬十次 利骨取牙 愈同上

點之即落勿近好牙 鮑氏 浸茄根三日炒為末

鳴皋曰馬屎應寒凡人畜之糞皆寒豈馬
屎獨溫乎友人魏公言馬屎絞汁治絞腸
痧如神此方甚有理蓋以腸胃中之遺物
而藉以通腸胃也又馬屎能解毒絞腸痧
多由熱毒凝結故治之

馬通

時珍曰馬屎曰通牛屎曰洞猪屎曰零

微溫止吐血衄血下血

金瘡出血婦人崩中

別錄

絞汁服治傷寒時氣當吐下

者

藏器

治時行病起合陰陽垂死者

絞汁三合日夜各二服

又治

杖瘡跌打損傷中風作痛者炒熟包熨數十遍極效

王孟

燒灰水服治久痢

時珍

方 吐血不止

燒白一一以水研絞汁服梅師

衄血不止

用赤一絞汁

飲一二升乾者浸水亦可並滴鼻中

千金 卒中惡

吐利不止不知是何病一一九絞汁灌

之乾者水浸汁亦可此扁鵲方也

肘後方 攪腸沙痛

飲之立愈 經驗

傷寒勞復

一燒末冷酒服方寸匕 聖惠

熱毒攻手足

腫痛欲脫以水煮馬

糞汁漬之

外臺

驢溺 辛寒有小毒浸蜘蛛咬瘡良藏治反胃噎膈器

癩癬惡瘡並多飲取瘡珍

發明

震亨曰一婦病噎用四物加一一與服以防其生虫數十帖而愈時珍曰張文仲言幼年患反

胃每食羹粥諸物須臾吐出貞觀中諸名醫奉敕調治不能療命在旦夕一人云服一一極效遂服二合所食止吐一半再服二合食粥便定次日奏知宮中患反胃者數人一時同服俱瘥此物稍有毒服時不可過多須熱飲之

病深者七日當效

屎 絞汁服主心腹疼痛諸症忤癘癖反胃不止牙

痛治水腫每服五合良

畫體成字者為驢水用牡驢不成字者為濕水用馱驢

張元素曰氣味俱薄而升陽也入手少陰
 心足少陰腎厥陰經肝揚士瀉曰一為
 肺經要藥又為大腸經要藥昂曰亦滋益
 腎藥

獸部

唐本。燒灰吹鼻止衄甚效和油塗濕癬惡瘡時珍

方 卒心痛 駱一絞汁五合熱經水不止 及血崩用
 眼即止 時後方 黑駱一燒

存性麩糊丸梧子大每空心酒下 疔瘡中風 腫痛駱
 一炒熨

五七十九神妙 龔雲林醫鑿 普濟方 小兒眉瘡 塗立效 聖惠

極驗 阿膠 黑駱一燒研油調

阿膠

集解 頌曰以阿縣城北井水作煮者為真其井官
 禁真膠極難得其膠以烏駱皮得阿井水煎

成乃佳陳藏器言諸膠皆能療風止洩補虛而駱
 皮膠主風為最是一所以勝諸膠也時珍曰阿

井乃濟水所注取其水攪濁水則清故煮膠服之
 下膈疎痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治淤

濁及逆上之痰古方所用多是牛皮後世乃貴駱
 皮以黃透如琥珀或光黑如漆者為真者不作

驢 阿膠 三十三

[鳴皋曰] 汪昂云傷暑伏熱成痢者必用之
 又云妊婦血痢尤宜又云瀉者忌用按痢
 疾摠曰大腸阻滯蓋大腸回曲者也或因
 熱燒乾津液以致乾糞留結少許于回曲
 之處是以腹痛後墜用消黃以通之可愈
 他若氣滯用木香血滯用桃仁杏仁痢多
 而腸液乾澇則用潤劑摠不過以通為用
 也通則不痢矣——滑腸瀉者忌用惟痢
 疾却取其滑以通其滯與用內蘘蓉同例
 至于痢久腸虛阻滯難去而關闢大開預
 用澇劑故治痢不外通澇二法

皮臭夏月亦不濕軟

音平治內崩勞極^{音詳}如瘡狀安胎益氣^本 大夫小

腹痛虛勞羸瘦陰氣不足養肝氣^別 益氣止痢^{藥性}

連黃蠟尤佳 治吐衄血淋尿血腸風下血女子血

痛血枯經水不調崩中帶下胎前產後諸疾男女一

切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽喘疾肺痿唾

膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤燥化痰清肺利

小便調大腸之聖藥也^{時珍}

^{高路} 得火良薯蕷為之使畏大黃^{時珍} 旦炒成珠用或以
^{蒲葦} 麩炒或以火炙或以蛤粉炒或以草灰炒或水化酒
^{止血}

化各從

本方

發明

歲器曰諸膠皆主風止瀉補虛而駝皮主風為

鳥者取其烏色屬水以制熱則生風之義時珍曰

大要只是補血與液故能清肺益陰而治諸証按

陳自明云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無已日

陰不足者補之以味一一之甘以補陰血楊士瀛云

凡治嗽嗽不論肺虛肺實可下可溫須用一一以安

肺潤肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後腫人不

正者以一一人參煎服最良一一育神人參益氣也

又痢疾多日傷暑伏熱而成一一乃大腸之要藥有

熱毒留滯者則能疎導無熱毒留滯者

則能平安數說足以發一一之蘊矣

方 肺風欬促

涎潮眼竄用好一一炒以紫
蕪烏梅焙研等分煎直指

老人虛

秘煎一二錢葱白三莖

赤白痢

黃連一一丸治腸胃
氣虛冷熱不調下痢

阿膠

三五

赤白裏急後重小便不利 一兩川連三兩
茯苓二兩為末丸梧子大每服五十九 和劑 吐血

不止 千金翼 一兩二兩蒲黃六合生地三升水煮服
○經驗用 一兩蛤粉各一兩入辰沙少許為末

藕節搗汁 大血不止 口耳俱出用 一兩蒲黃各半兩
入蜜調服 每服二錢水一盞生地汁一合

前六分溫服急以 妊娘血痢 一兩二兩酒 妊娘下血
帛束兩乳 聖惠 煎服 梅師

不止 一兩三兩酒 胎動 產寶膠艾湯用 一兩炒熟
煎服 梅師方 艾葉葱白水煎服 產寶

後虛閉 一兩只壳各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧
子大每服五十九溫水下未通再服 和劑

久嗽經年 一盞葱白少許煎服日三 聖濟撻錄 肺
并開胃用 一兩炒三錢木香一錢糯米一合

損吐血 半為末每服一錢百沸湯點服日二 普濟
又名烏髑 音徒左傳作烏冀 烏擇 漢書大蟲 肝後

虎 李耳 郭璞

虎骨 辛微熱無毒之才治邪惡氣殺鬼疰毒止驚

悸治惡瘡鼠痿頭骨尤良別錄治筋骨毒風攣急屈伸

不得走注疼痛治尸疰瘡疾犬咬毒甄權煮汁浴去骨

節風毒腫和醋塗膝止脚痛腫脛骨尤良孟詵追風定

痛健骨止久痢脫肛時珍

頌曰用雄虎者勝藥箭射殺者不可入藥

時珍曰用一棰碎酥炙或酒或醋炙用

發明頌曰兵部手集有一酒治臂脛痛崔元亮海

上方治腰脚不隨有一脛一酒方宗奭曰虎金

也風木也木受金制故嘯則風生所以治風病攣急

屈伸不得走注骨節風毒癩疰驚癩諸病機曰虎死

而脛猶竄立不仆故治脚脛無力用脛骨時珍曰

一通用凡碎邪疰治驚癩温瘡頭風當用頭骨治手

鳴泉曰
久瘡邪

瘡寒瘡
可用溫
瘡不宜
用蓋性

熱也

足諸風當用脛骨治腰背諸風當用脊骨各從其類也諸證辨疑云虎之一身筋節氣力皆出前足故以

為勝

方 臂脛痛

酒不拘深淺皆效用脛骨二兩打碎炙黃羚羊角屑一兩新芍藥二兩切

好酒浸七日秋冬倍之每日空腹飲若要速服即以銀器盛于火傍暖養三日亦可 兵部手集 腰

脚不隨

拘急冷痛虎脛骨五六寸打碎酥炙黃搗細絹袋盛酒一斗浸之燂火微溫七日任飲當

微利便效口又方虎腰脊骨一具前脚全骨一具打

碎炭火炙待脂出投無灰酒中密封七日秋冬三七

日任飲十年久病三劑

歷節風走痛

百節皆痛不可忍虎頭骨一具

可瘥 崔元亮海上方

打碎酥炙浸醇酒五宿

休息痢

一方寸匕日三 張文

隨量飲之 聖惠方

仲 方

肉 酸平無毒益氣力止多唾別錄食之治瘡辟精魅

孟詵○弘景曰

熱食虎肉傷齒

膏 治反胃

時珍○虎一半斤切清油一斤瓦甑浸一月勿洩氣每以油一兩入無添酒一

盞溫服以瘥為

度油盡再添

吐 治反胃吐食

時珍○取生者勿洗新瓦固煨存性入平胃散末一兩和勻每白湯

服三錢

神效

胆 治小兒驚癇

蘇小兒疳痢神驚不安研水服之

孟詵

虎睛

治瘡疾小兒驚悸

孟詵

主驚啼客忤鎮心安神

虎

日明目去翳 時珍曰以生羊血浸一宿漉
華 出微火焙乾用時珍曰千金治狂邪有

一湯一丸並
用酒浸炙乾用

方 虎睛丸 治癩疾發作涎潮搐搦時作謔語一
一對微炙犀角屑大黃遠志去心各一

兩梔子仁半兩為末蜜丸綠豆
大每溫酒服二十九 千金 小兒驚癇 及夜啼一
散竹瀝調少許 生一一枚臘月豬血少

與服 姚和衆 邪瘡時作 許殊沙阿魏各一分為末
端午糝夫七枚和黍米大綿裹

塞耳中男左女右 聖惠方

虎牙 治丈夫陰瘡及疽癩 孫真人 殺癩蟲 時珍

方 白虎風痛 大一副四箇赤足蜈蚣十條酒
浸三日晒乾天麻二兩乳香沒藥各

一兩麝香半兩為末每服二錢
溫酒下日三服 聖濟總錄

元素曰入陽明胃經昂且涼以瀉肝清胃

中大熱

鳴泉曰本經治迷忍藥性治煩毒入心海

藥治風毒攻心孟說治心風煩悶是又手

厥陰少陰之藥也

鳴泉曰一今都中尚有真者其形下大

如座子上粗而短據藥肆人云所謂將軍

帽者此也來自暹羅他處俱不可用形長

者來自西藏俗名天馬角小藥肆用以亂

一泉察其紋理切作薄片總是白底黑

花其法則黑多白少未見有黃花者即今

雲而亦不聞出一也藥肆之說亦難作

準即集解之說亦多可疑宜俟訪考

獸部

爪

繫小兒臂辟邪惡

別錄

皮

治瘡疾

藏器

辟邪魅

時珍

發明

時珍曰今人卒中惡病燒一飲之或繫衣服亦甚驗也起居雜記云其毛入瘡有大毒

犀角

集解

時珍曰一西西南南諸處有山犀

人多得水犀出入水中最難得並有二角鼻角長

而額角短水犀皮有珠甲而山犀無之兕犀即犀

之特也止有一角在頂文理細膩斑白分明不可

入藥蓋犀角文大而特角文細也陳藏器謂犀無

水陸郭璞謂犀有三角蘇頌謂毛犀為牯犀皆出

訛傳今並正之毛犀即旄牛也一一紋如魚子形

謂之粟紋中有眼謂之粟眼黑中有黃花者謂

之正透黃中有黑花者為倒透花中復有花者為

犀角

三七

重透並名通犀乃上品也花如椒豆
斑者次之烏犀純黑無花者為下品

苦酸

別錄曰微寒
李珣曰大寒

治百毒鬼疰邪鬼瘴氣殺鉤

吻鳩蛇毒除邪不迷惑驚寐

本經

傷寒溫疫頭痛寒熱

諸毒氣令人酸健

別錄

鎮心神解大熱散風毒治發背

癰疽化膿作水治時疾熱如火煩毒入心狂言妄語

藥性

治心煩止驚鎮肝明目安五臟補虛勞退熱消痰

鮮山瘴溪毒

日華

主風毒攻心耗熱悶赤痢小兒驚

癩

海藥

燒灰水服治卒中惡心痛飲食中毒藥毒熱毒

筋骨中風心風煩悶中風失音以水磨服治小兒驚

昂曰傷寒下早熱乘虛入胃則發斑下達熱留胃中亦發斑

暴曰一地黃湯治傷寒畜血發黃及熱盛吐衄不止

弘景曰入藥生犀為佳現成器物多被蒸煮及染手汗不堪用

不實曰一性升而善散故治傷寒熱毒表閉煩熱昏悶而汗不得解者磨尖搽入

藥中取汗速如響應仲景曰如無一以升麻代之者正以此兩物俱入陽明功皆

升散今人莫得其解每致疑詞是但知一解心熱而不知一之能升能散尤峻

于升麻也倘中氣虛弱脉細無神及痘瘡血虛真陰不足等症凡畏汗畏寒畏散者

皆忌之焉泉按此景岳獨得之解

獸部

瀉 孟 磨汁治吐血衄血下血及傷寒畜血發狂譫語

發黃發斑痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂瀉肝凉心

清胃解毒 時珍曰之才曰松脂為之使惡雷丸葶藶

鹽厚婦勿服能消胎氣頌曰有黑白二種黑者為勝

角尖尤勝李珣曰一鋸成片紙裹納懷中待熱搗

之立成粉歸田錄云人氣粉犀 宗奭曰湯劑生犀磨汁為佳

發明 時珍曰一犀之精靈所聚足陽明藥也胃為

水穀之海飲食藥物必先受之故一能解一切諸毒五臟六腑皆稟氣于胃風邪熱毒必先干之

故一能治諸血及驚狂斑痘之症抱朴子云犀食百草之毒及衆木之棘所以能解毒凡蠱毒之鄉有

飲食以此角攪之有毒則生白沫無毒則否以之煮毒藥則無復毒熱也北戶錄云凡中毒箭以一一刺瘡中立愈由犀食百毒棘刺也淮南子云一一置穴

犀角

三八

狐不敢歸則犀之精靈
辟邪不惑益可見矣

方 吐血不止
似鵝鴨肝用生一桔梗各一兩為末酒下一錢 總錄
中忤中

惡 思氣其症或暮夜如廁或出外忽然倒地厥冷
握拳口鼻出清血瀕死不救似乎尸厥但腹不鳴

心腹暖耳勿移動令人圍繞擊鼓或燒蕪合香候醒
乃移動用一五錢入射香辰沙各二錢半為末服

二錢 華真人 小兒驚癇
嚼舌仰目者一廣利
痘瘡稠密

唐冷飲 食雉中毒
同上
瘰癧惡瘡
喜着十指狀如代指根深至肌

能壞筋骨毒氣入臟殺人宜燒鐵
烙之或炙百壯飲一汁 千金 山嵐瘴氣
一磨集

下痢鮮血
地榆生地各一兩為末蜜丸彈子大每用一丸水煎去渣服 聖惠

麋羊 又名羚羊 俗名麋羊 說文

集解

別錄曰：一角出石城華陰山谷。弘景曰：今出建平宜都蠻山中及西域多兩角一角者

為勝角多節蹙：圓繞，別有山羊角極長，惟一邊有節，亦疎大不入藥用。乃爾雅云：羴羊者。恭曰：

一今南山商洛間大有梁州真州亦貢其角細如人指長四五寸而文蹙細。山羊或名野羊大者

如牛角可為鞍。又有山駝大如鹿皮可作靴。有兩角大小如山羊角俗人亦用之。陶氏所謂一

有粗文者是此非山羊也。歲器曰：山羊山駝一三種相似而一有神夜宿防患以角掛樹不着

地但角彎中深銳緊小有掛痕者為真其疎慢無痕者非也。真角耳邊聽之集：鳴者良陶氏言一

角者謬也。頌曰：今秦隴龍蜀金崗州山中皆有戎人捕得來貨其形似羊青色而大其角長一二尺

有節如人手指握痕又最堅勁。郭璞註爾雅云：羴似羊而大其角細而圓銳羴似羴羊其角大而墮

出西方本草諸註各異觀今所市者與爾雅之一陶註之山羊羴註之山駝大都相似今人相承

羴羊

三九

時珍曰：入厥陰肝經最捷。鳴皋曰：亦入少陽胆經。昂曰：痘科多用以清肝火而本草不言治痘。鳴皋曰：鹹寒之品而別錄言能起。

鳴皋曰：無溫理。

耳 畏

用之以為羴羊細角長四五寸者佳。彎有磨角成痕處詳諸說此乃真。一。角而世多不用何也。又閩廣山中出一種野羊彼人亦謂之。一。也。陳氏謂耳邊聽之鳴者良。今牛羊但殺之者聽之皆有聲不獨。一。也。自死角則無聲矣。寇氏曰：諸角附耳皆有聲。不如。有掛痕一說為盡之。然有偽作者宜察焉。時珍曰：一。角短小羴羊角長。大山駢。之身而羴之角但稍大而節踈慢耳。陶言羴有一角者陳氏非之。按寰宇志云安南高石山出羴羊一角極堅能碎金剛石則羴固有一角者矣。金剛百鍊不消物莫能擊。惟。一。角扣之則自碎。又獾骨充佛牙物亦不能破。用此角擊之亦碎。皆相。

羴羊角

鹹寒

別錄曰：微寒。權曰：甘溫。

明目益氣起陰去惡血

注下辟蠱毒惡鬼不祥令人不厭鬼寐。本經除邪氣驚夢。

陰利丈夫人頗疑之蓋人之外腎其強弱係于內腎以其氣本乎內腎也而其體則筋：則本乎肝：盛則筋強矣肝之合為胆而外腎之強弱取決焉如微房之人平日亦不劣獨新娶之夕陽不起或外遇而陽不起何也心有所怯而胆氣不至也若胆大之人雖腎甚虛亦無此患故古人有治陽痿先治胆之說其有理也——肝胆二經藥又能強筋治痿用熟藥可以此為引經

鳴皋曰——雖寒終係血向之品不同於參連如產後風搖不妨放胆用之蓋風搖非此不能定也予治一婦胎動下血抽餘逆至血竭變為抽搐予於回物中加羚羊管絨紛：卒用之而搖止血亦止而胎不下予曰萬勿再行血胎因無血故澀而不再行血則血更傷矣養血以馳之當無恙半月後胎果下

馮宗曰——安胎甚良胎前肝火甚者必用之且其性能散血下氣也

獸部

狂越療傷寒時氣寒熱：在肌膚濕風注毒伏在骨

間及食噎不通強筋骨起陰利丈夫此肝經藥火之味治中風筋攣別錄

耐骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣諸和等肝病

治一切熱毒風卒死昏亂不識人散產後惡血衝心

煩悶燒末酒服治小兒驚癇治嵐瘴及噎塞藥性治驚

悸心胸惡氣瘰癧惡瘡溼毒藏器平肝舒筋定風安魂

散血下氣辟惡解毒治子癰瘻疾時珍○微曰有神羊角甚長有二十

四節內有天生木胎此有神力抵千羊凡使不可單用要不拆原對繩縛鐵銼：細蜜裹避風旋：取用

搗篩極細更研萬入藥免刮人腸

麋羊

四十

鳴皋曰世以一一為驅風藥而不知其實清肝火之藥也肝熱則自生風膏陰可以息之于於外感之風多用荆防于山生之風多用一一乾蝎其應如响東壁云定風定字最確

鳴皋曰一一目疾要藥不可缺也

發明

時珍曰羊火畜也而羴羊屬木故其角入厥陰肝經甚速也肝主木開竅于目其發病也日暗障翳而一一能平之肝主風其合為筋其發病也

小兒驚癇婦人子癇大人中風搖擗及筋脈掣急歷節掣痛而一一能舒之魂者肝之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬癡寐卒死而一一能安之血者

肝之藏也病發則痰滯下注疝氣毒痢瘡腫瘰癧瘰癧後血氣而一一能散之相火寄於肝胆在氣為怒

病則煩懣氣逆噎塞不通塞熱及傷寒伏熱而一一能降之羴之性靈而筋骨之精在角故又能辟邪

惡而解諸毒碎金剛而燒烟走蛇虺也本經別錄甚著其功而近世罕能發揚惜哉

方 噎塞不通 一一為末飲服方寸匕 胸脇通滿

燒末水服方寸匕 腹熱滿 同上 墮胎腹痛 血出

子母秘錄 腹熱滿 同上 墮胎腹痛 不止

豆淋酒下 普濟 產後煩悶 汗出不識人 一一燒末

舉曰：一能舒筋產難者多交骨不開，骨不開筋緊也，故用以催生有效。

埤雅云：鹿仙獸六十年必懷瑞于角，斑痕紫色行則有涎，故曰鹿戴玉而角斑魚鱗而鱗紫。

時珍曰：鹿茸鹿角右腎精氣不足者宜之，昂曰：惟脈細相火衰者宜之，鳴皋曰：能通

督脈，希雍曰：手足厥陰心也，肝手足少陰腎經。

獸部

愈再服或加只
實芍藥 千金 血氣逆煩 水服 肘後 臨產催生

一磨尖酒服方寸匕 產寶 小兒下痢 服方寸匕 中骨燒末飲 秘錄 遍身

赤丹 調塗神效 外臺 赤斑如瘡 痺甚則殺人 一磨汁摩之

數百遍效 肘後 山嵐瘴氣 一錢 集簡 末水服

鹿 又名斑龍 澹寮時珍曰：喜山而屬陽故夏至則解角北無角牡有角大如小馬黃質白斑牝者小

而無斑

鹿茸

集解 宗奭曰：以如紫茄者為上取其難得耳 然太嫩血氣未具其實少力堅者又太老惟

長四五寸形如分歧馬鞍茸端如瑪瑙紅玉破之如朽木者最善凡含血之物肉差易長筋次之骨

鹿

單一

鳴皋曰：嚴葺性熱，不止于溫。

鳴皋曰：一能發瘰癧，本草所未言。有瘰癧，

重小兒之氣血，不能供以至毒，不外出而

紫陷枯萎。一能峻補氣血，其性熱而外

發，能送毒出成膿，近醫用之，間有回生者。

若非氣血不供，由執毒太甚而陷者，似不

可用。

希雅曰：婦人衝任脈虛，則為漏下，惡血或

瘀血在腹，或為石淋。男子肝腎不足，則為

寒熱，或虛勢，如瘰癧或羸瘦，四肢酸痛，

腰脊痛，或洩精溺血。此藥走命門，心包及

肝腎之陰，分補下元。真陽故主以上諸症，

癰腫疽瘍，皆學氣不從所致。甘溫能通血

脈和腠理，故亦主之。

最難長，故人自胚胎至成人二十年，骨髓方堅。惟

麋鹿角自生便堅，兩月之久，大者至二十餘斤。骨

生之速，無速于此者。所以能補骨血，堅陽道，益精

髓也。頭者諸陽之會上，鍾于茸，自豈可與凡血為

比

哉

甘溫治漏下，惡血益氣，生齒不老。本經療虛勞酒：如

瘰癧瘦，四肢酸痛，腰脊痛，小便數，洩精溺血，破瘀血

在腹，散石淋，癰腫骨中熱，疽癢安胎，下氣殺鬼精物

久服耐老，不可近丈夫陰，令痿。別錄補男子腰腎虛冷

脚膝無力，夜夢鬼交，精溢自出，女子崩中漏血，赤白

帶下，灸末空心酒服，方寸匕，壯筋骨。日華生精補髓益

陽養血強筋健骨治一切虛損耳聾目暗眩運虛痢

等疾時珍

福來曰
用牛乳
人乳竟
便浸俱

誥曰——不可以鼻嗅之中有小白虫視之不見入
人鼻必為蟲類藥不及也璣曰凡使——用黃精自
然汁浸兩日切焙搗用兔渴人時珍曰澹寮濟生
諸方有用酥炙酒炙及酒蒸焙用者當各隨本方

發明時珍曰澹寮方云一道士貨斑龍丸一名茸珠
丹歌曰尾閭不禁滄海竭丸轉靈丹都慢說惟

有斑龍頂上珠能補玉堂闕下穴其方盖用——鹿
角膠鹿角霜也又戴原禮證治要訣治頭眩運甚則
屋轉眼黑用茸珠丹甚效或用——半兩無灰酒三
蓋煎一盞入射香少許溫服亦效云茸生于頭以類
相從也

方 斑龍丸

——酥炙鹿膠炒珠鹿角霜陽起石煨
酒滓肉蓯蓉酒浸棗仁柏子仁炒黃芪

鹿

希雍曰鹿茸稟壯健之性故能峻補腎家
真陽南敷成膠則氣味甘緩能通周身血

蜜炙各一兩當歸附子炮熟地九製各八錢辰沙
半錢各為末酒丸梧子大酒下五十九 瀉察 陰

虛腰痛 不能反側——灸兔絲子各一兩茴香半兩
為末以羊腎二對酒煮爛搗丸梧子大每服

三五十九酒 **精血耗涸** 耳聾口渴腰痛白濁上燥下
下 本事 寒不受峻補者——酒蒸當

歸酒浸各一兩焙為末烏梅肉煮膏搗 **虛痢危困** 目
丸梧子大每米飲服五十九 濟生 血

氣衰弱者——酥炙一兩為末入射香五錢以燈心
煮棗肉和丸梧子大每米飲下三五十九 同上

飲酒成瀉 骨立不能食但飲酒即瀉用——酥炙肉
蕤蓉煨一兩入生射香五分為末陳米飯

丸米飲下名香 **白帶** 曰衡任虛寒者——酒焙二兩
茸丸 普濟 金毛狗脊白斂各一兩為末用

艾煎醋打糯米糊丸梧子大每
溫酒下五十九日二 濟生

鹿角 醎溫主惡瘡癰腫逐邪惡氣治留血在陰中

脉生用則味鹹氣溫性散熱行血消腫辟
惡氣而已酸能入血軟堅溫能通行散邪
故主瘡腫逐邪惡及留血在陰中少腹血
急痛折傷惡血等症也
鳴皋曰鹿角以通為用為行血活血要藥
生用行血尤良熟則溫生則平

獸部

除少腹卒痛腰脊痛折傷惡血別錄治中惡心腹痛蘇恭

水磨生服則不執行血尤良水磨汁服治脫精尿血夜夢鬼交醋磨汁塗瘡瘍癰

腫熱毒日華蜜炙研末酒服強骨髓補陽道絕傷又治

婦人夢與鬼交清酒服一撮即出鬼精燒灰治婦人

胞中餘血不盡欲死以酒服方寸匕日三甚妙孟詵

時珍曰杜仲為之使

發明時珍曰一一生用則散熱生血消腫辟邪熟用則益腎補虛強精活血鍊霜熬膏則專于滋補

方 脫精尿血水磨汁服骨虛勞極面腫垢黑脊痛不能久立血氣

衰憊髮落齒枯甚則喜唾用一一二兩牛膝酒蒸腎一兩半為末蜜丸梧子大鹽酒下五十九濟生

鹿

四十三

虛腰痛

如錐刺不能動搖 | 一肩三兩炒黃研末空心溫酒服方寸匕日三 肘後方 婦人

腰痛

方同上日四 五服 產乳 妊 娠 腰 痛 | 一燒赤投一升酒中 又燒又浸如此數次細

研酒服

產後腹痛 血不盡者 | 一燒研末豉汁 妊 娠 產 寶 服方寸匕日二 子母秘錄 女 娘

下血

不止 | 一肩當歸各半兩用水煎減半 頰服不過二服 普濟 胎死腹中 | 三寸

為屑煮葱豉湯和服

墮胎血瘀

不下狂悶寒熱 | 一肩一兩研極細豉湯

服一錢日三血

當下

聖惠 小兒瘧疾 生研為末先發時以乳調服一字 千金 小兒

流涎

脾熱也 | 一肩末米 飲服一字 普濟 面上皮皴 | 一尖磨濃汁 厚塗之神效

面上風瘡

一尖磨酒 跌打損傷 血瘀骨痛 | 一末 塗之 聖惠 酒服方寸匕日三

金方 竹木入肉

不出 | 一燒末水和塗上刺 立出久者不過一夕 千金 乳發初

起 不治殺人——共磨濃汁塗之並
令人爛去黃水隨手即愈 梅師
吹乳揪痛 屑妙

黃為末酒服二三錢仍 鬼魅諸病
以梳之 唐氏經驗
病人不肯言與一
屑水服方寸匕

即言實也

錄驗

鹿角膠 一名白膠 初經粉名鹿角霜時珍曰煮爛成
粉者為鹿角霜取粉熬膠或以濃汁熬成

膠者名

鹿角膠

甘平 別錄 治傷勞絕腰痛羸瘦補中治婦人血閉無
曰温

手止痛安胎 本經 治吐血下血崩中不止四肢作痛多

汗淋露折跌傷損 別錄 治漏下赤白 藥性 炙搗酒服補虛

勞又治勞嗽尿精尿血瘡瘍腫毒 時珍曰得火
良畏大黃

鹿

四十四

發明

數曰凡使鹿角勝于麋角頌曰今醫家多用麋角云力緊于鹿角也時珍曰東坡云鹿陽獸見

陰而角鮮麋陰獸見陽而角解故補陽以鹿角為勝補陰以麋角為勝按此說與沈存中鹿茸利補陰麋

茸利補陽之說相反以理與功推之蘓說為是

方 異類有情丸

韓氏醫通云凡丈夫中年覺衰便可服此蓋血氣有情各從其類非

金石草木也鹿角霜龜板酒浸七日酥炙各三兩

鹿茸酒洗酥炙虎脛骨長流水浸七日酥炙各二兩

四錢續猪脊髓九條共研搗蜜丸梧子大空心鹽湯下五七十九丸如厚味善飲者加猪胆汁一二合

汗遺精 鹿角霜二兩生龍骨炒牡蠣煨各一兩為末酒糊丸梧子大每鹽湯下四十丸 普濟

甘溫補中益氣生者治中風口僻切片貼之

○華陀云中風口偏者以生鹿一同生椒搗貼正即除之

養血治產後風虛邪僻

時珍。說曰同堆肉蒲

白鮑魚蝦食發惡瘡

發明思邈曰凡藥餌之人久食鹿一服藥必不得力為其食解毒之草制諸藥也時珍曰邵氏言鹿

一身皆益人大抵鹿純陽多壽之物能通督脉又食良草故其肉角有益無損

骨微熱作酒主內虛續絕傷補骨除風思邈燒灰水

服治小兒洞注下痢時珍曰千金鹿骨煎補益虛羸用鹿一具枸杞根二斤各以

水一斗煎汁五升和勻

共煎五升日二服良

髓治傷中絕脉欬逆酒和服良別錄壯陽令人有子

同地黄汁煎膏填骨髓日華補陰強陽益髓潤燥澤肌

時珍。聖惠鹿一煎治肺痿咳嗽傷中脉絕用鹿一
生地黃汁各七合酥蜜各一兩杏仁桃仁各三兩去

鹿

四十五

[舉]曰凡血無不活血行血通生用鹿血之
 性又能補陽故兼行氣通現刺熱飲為尤
 佳取其生氣未散也諸氣痛欲危者搥由
 肝血大虛肝陽不斂土衰木橫或血瘀經
 絡而然熱飲鹿血有瘀者則血活而瘀散
 瘀散而氣行無瘀者則補血補氣而又能
 活血行氣故主之也

皮炒酒一升同搗取汁先煎杏仁桃仁地黃
 汁減半入三味煎如稀餒每含嚥一匙日三

血 治陰痿補虛止衄治折傷狂犬傷治肺痿吐

血及崩帶 諸氣痛欲危者飲之立愈大補虛損

益精血解痘毒藥毒

發明 頌曰近世服鹿一酒者云得于射生者因采捕
 入山失道數飢渴將委頓獲一生鹿刺一數升

飲之飢渴頓除歸途覺血氣充盛異人今服者刺鹿
 頭角間一和酒飲更佳時珍曰近世有斑龍晏法孫

氏解痘毒有陰陽二
 血丸皆古所未知者

方 斑龍晏 養壯鹿一二隻以時喂之將行晏法夜
 前減食次早縛鹿于床令有力者抱定

前足拘其首使不得動用三稜針刺其眼之大眥前
 毛孔名天池穴以銀管長三寸許插向鼻梁坐定啞

其血飲藥酒數杯再啞再飲以醉為度流出者亦可
接和酒飲：畢避風行升降工夫為一晏用生肌散
傳鹿傷養之月可一度一鹿可用六七年不拘男女
老少服之無疾而壽乃仙家服食丹方之一也藥酒
以八珍散加沉香木香
煮之 韓飛霞補益方 陰陽二血丸 鹿一免血晒乾
乳香末藥各一
兩雄黃：連各五錢硃砂射香各一錢為末蜜丸綠
豆大每服十九酒下兒小者減之治小兒痘瘡未出
者稀已出者減

孫氏集效方

麋

時珍曰：似鹿而色青黑大如小牛而蹄目下有
二竅為夜目壯者有角喜澤而屬陰故冬至解角

麋茸 甘温治陰虛勞損一切血病筋骨腰膝酸痛

滋陰益腎

時珍

麋角 甘熟治風痺止血益氣力 別錄作屑熬香酒服

麋

四六

鳴皋曰麋茸大而毛青大於鹿茸兩倍鹿茸小而毛黃陳自明以大小分之甚確但予所見北都之鹿茸麋茸如此南方所產不知何如

鳴皋曰麋茸鹿茸性俱相近而執于泥于東壁氏補陰之說用之屢知其仍偏于補陽也東坡謂鹿角見陰而解麋角見陽而解遂謂鹿茸補陽麋茸補陰亦似有理用之始知其不然也孟詵燕恭俱言麋茸功力勝鹿必有所試矣大抵鹿茸麋茸俱性熱補陽又係血向之品與草木石之燥

大益人景弘酒服補虛勞添精髓益血脈暖腰膝壯陽

療風氣偏治大夫日華作粉常服治丈夫冷氣及風筋

骨痛若卒心痛一服立瘥漿水磨塗面令人光華赤

白如玉孟詵滋陰養血功與茸同時珍曰麋鹿茸角人罕能分別陳

自明以小者為鹿茸大者為麋茸亦臆見不若親視其采取為有準也造膠霜並與鹿角同法又集靈方

錯屑以牛乳浸透隔水蒸待屑軟如麪取出焙研成霜用

發明說曰麋角常服大益陽道煎膠與鹿角同功茸亦勝鹿茸恭曰麋茸功力勝鹿茸膠亦勝鹿膠

日華曰鹿角屬陰故治腰膝不仁補一切血病也時珍曰鹿之茸角補陽右腎精氣不足者宜之麋之茸

角補陰左腎血液不足者宜之此千古之微秘前方法雖具而理未發出故論者紛：又楊氏家藏治

烈者不同以血補血故補陰亦勝但欲補陽佐以桂附欲補陰須佐以歸地耳

虛損有二至丸兩角並用但藥性過溫止宜于陽虛寒濕血痺者耳于左腎無與焉千金言麋角丸百一十方惟容成子羔所服者特出眾方之外今觀其方比二至丸似可常服

方 麋角丸

補心神安五臟填精髓理腰膝聰明耳目新麋角四五具自蛻角根下平者不

堪用去尖一寸截斷以長流水浸十宿每夜換水乾即取出削去皺皮鎊之鎊取白霞至心即止以青粟米泔浸兩宿漚出置新絹上晒乾以無灰酒于大磁器中浸兩宿其藥及酒俱入淨釜中初用武火煎一食時後以文火微煎柝木枝徐攪不得住手時添酒以成煎為度煎時須以平旦下手不得經宿看屑如稀膠即以牛乳五升酥一片漸次下後項藥仍以麋角一條炙黃為末與諸藥同製之檳榔通草秦芫肉蓯蓉人參兔絲子酒浸兩宿別搗焙乾甘草各一兩共搗為末將膠再煎一食頃似稠粥即止火少時投諸藥末相和得宜眾手一時丸如桐子大如粘手以酥塗手酒服三十九日加一九加至五十九丸為度

日二百日內忌房事服至一月腹內諸疾自相驅逐
 有微利勿怪患氣者加木香枳實青皮各一兩服至
 三年腸胃如筋合時勿令陰人孝子鴛犬見之婦人
 服之尤佳如口乾眼濇內熱者即服三黃丸微利之
 如此一度發動後方始 **二至丸** 補虛損生精血去風
 條暢也 孫真人方 濕壯筋骨鹿角鎊以
 酥一兩酒一升慢火炒乾取四兩麋角鎊酥二兩醋
 一升煮乾慢火炒乾取四兩蒼耳子酒浸一宿焙半
 斤山藥白茯苓炙黃芪各四兩酒浸當歸五兩酒浸
 肉蓯蓉去心遠志人參沈香各二兩熟附子一兩共
 為細末酒煮糯米糊丸桐子大每服 **麋角丸** 使人丁
 五十九丸鹽湯下日二服 楊氏家藏 **麋角丸** 使丁
 房室不勞顏色不衰麋角末十兩生附子一枚雀卵
 和丸日服二十九溫酒下二十日大效亦可單熬為
 末酒服但性緩不及有
 附子者 彭祖服食經
 麋射 又名射父爾雅香樟

集解弘景曰一形似獐而小黑色常食柏葉又噉蛇其香正在陰莖前皮內別有膜袋裹之今人以蛇蛻皮裹香云彌香是相使也一噉蛇多至

寒則香滿自以瓜剔出着屎中覆之常在一處不移曾有過得乃至斗許此香絕勝殺取者今出羌

夷者多真出隨郡義陽晉漢諸蠻中者亞之出益州者形扁仍以皮裹之多偽時珍曰一出西北者

香結實出東南者謂之土一亦可用力次之南中靈貓其氣如

一人以雜之

麝香 辛温無毒辟惡氣殺鬼精物去三蟲蠱毒温

瘡驚癩癩寐本經療中惡心腹暴痛脹急痞滿去目中

膏翳婦人產難墮胎別錄佩服辟惡夢及尸疰鬼氣療

蛇毒弘景曰抱朴云入山辟蛇殺臟腑蟲治瘡疾吐

麝

零八

風痰納子宮暖水臍止冷帶下日治小兒客忤止小

便利又能蝕疽癰膿水藥性通諸竅開經絡透肌骨解

酒毒消瓜果食積治中風中氣中惡痰厥積聚癥瘕

時珍曰甄權曰忌大蒜李廷飛曰一一莫近鼻有
蟲入腦令人患癩久帶其香透關多令人成異疾

發明景曰一一入脾治內病凡風病在骨髓者宜用
之使風邪得出若在肌肉用之反引風入骨莫

之能出也丹溪曰五臟之風不可用一一以瀉衛氣
口鼻出血乃陰盛陽虛有升無降當補陽抑陰不可

用腦麝輕揚飛竄之劑婦人以血為主凡血海虛而
寒熱盜汗者宜補養之不可用一一之散琥珀之燥

嚴用和曰中風不省以一一清油灌之先通其關則
後免語蹇癱瘓之證而他藥亦有效也時珍曰嚴氏
言風病必先用一一而丹溪言風病血病必不可用
皆非通論蓋一一走竄能通諸竅之不利開經絡之

壅遏若諸風諸氣諸血諸痛驚癇癥瘕諸病經絡壅
閉孔竅不利者安得不用為引導以開之通之耶非
不可用也但不可過耳濟生方治食瓜果成積作脹
者用之治飲酒成消渴者用之云果得麝則壞酒得
麝則敗此得用

一之理者也

方 中風不省

一錢研入清油二兩和
勻灌之其人自甦也 濟生

中惡客

忤 項強欲死 一少許乳汁 破傷風水 毒腫痛不可
塗兜口中取效 廣利方 忍一末一

字納瘡中出盡膿 中惡霍亂 一錢醋半 諸果成
水便效 普濟 蓋詢服 聖惠

積 傷脾作脹 氣急用 一錢生桂末一兩飯丸綠
豆大人十五丸小兒七丸白湯下蓋果得麝則

落木得桂則 酒果消渴 方見枳 偏正頭痛 久不除者
枯也 濟生 棋子 精明時將

髮分開用 一五分皂角末一錢薄紙裹置患處以
布裹熱蓋於上熨之冷則易如此數次永不發 簡

麝

四九

齊東野語曰熊胆善辟塵撲塵水上投胆米許則塵豁然而開也

便單 五種蠱毒 指大以刀割開罌藥吞之 衛生口

肉肉球 有根如線五寸餘吐出乃能食物捨之痛徹心一錢研水服日三自消 夏子益奇

疾 催生易產 續千金一錢研水服立下 濟生勝金散治人弱難產一錢鹽豉一

兩以舊青布裹之燒紅為末以秤錘淬酒服二錢即下郭松中云產難及橫逆生者乃兒枕破而敗血累

子服勝金散逐 死胎不下 一錢桂心末二錢酒服即下 本草 鼠咬其敗血自生也

成瘡 封之 蚕咬成瘡 密調一傳 山嵐瘴氣 經驗 廣利 服

集簡方 三分解

熊 時珍曰如爪色黑者一也大而色黃白者羆也小而色黃赤者鼯也熊頭長脚高力能拔樹虎亦畏之過人則人立而攫之故俗呼人一爾雅翼曰猪一形如豕有馬一形如馬者即羆也

時珍曰：手少陰心厥陰心包足陽明胃經藥鳴皋曰：猪胆羊胆等類俱用為肝胆經引經則一當亦屬足少陽足厥陰藥也。馮泉曰：凡猪羊牛胆皆可治症，不獨熊胆也。

希雍曰：凡胆皆極苦寒而走肝胆，瀉有餘之熱，蓋以類相從也。小兒疳積多致目內生翳障者，以肝脾二臟邪熱壅滯，則二臟之氣血日虛閉塞，日甚故也。用此瀉肝脾脾家之熱，則內清而外障去矣。如不因疳症而生障翳及痘後蒙蔽者，多因肝腎兩虛，宜滋陰養血清熱為急。諸胆皆不得用，有病者不可食，能回今終身不愈。

獸部

熊膽 苦寒 治時氣熱盛變為黃疸 暑月久痢 疔瘡 惡

心痛 疰忤 治諸疔 耳鼻瘡 惡瘡 殺虫 小兒驚癇

癰癧 以竹瀝化兩豆許服之 去心中涎 甚良 退熱

清心平肝明目 去翳殺虻蠅虫 時珍曰：權曰：惡防已 地黄 頌曰：一陰乾

用然多偽者 但取粟許 滴水中 一道若線不散者 真 時珍曰：錢乙云：一佳者 通明 每以米粒許 點水中

運轉如飛者 餘 胆亦轉 但緩耳

發明 時珍曰：一苦入心 寒勝熱 手少陰厥陰足陽 明經藥也 故能涼心平肝 殺虫為驚癇疰忤 疔瘡

障疔痔虫牙 虻痛之劑焉

方 赤目障翳 每以一一少許 化開入水片少許 銅 器盛點之 奇妙 痒加生薑粉少許

熊 象

希雍曰——又能拔毒長肉生肌去漏管
為瘡家用

齊東野語
小兒鼻蝕——化抹
十年痔漏——塗之神效
一切方不及也

外臺
虻虫心痛——一大豆許水
小兒驚癇——方見
大詳虫

牙痛——入片腦猪胆
攝生方
諸疳羸瘦——使君子末等
分研勻磁器蒸溶

蒸餅丸麻子大每米飲
下二十九 保幼大全

象牙 甘寒諸鉄及雜物入肉刮牙屑敷之立出
開寶

諸物刺口中磨水服亦出
蘇頌 主風癩驚悸一切邪魅

熱疾骨蒸及諸瘡並宜生屑入藥
時珍

發明
時珍曰周禮壺涿氏掌水蟲欲殺其神者以棒
木貫象齒而沉之則其神死而淵為陵註云棒

木山榆以——作十字貫于木而沉之則龍罔象之
類死也觀此則象之駭怪辟邪宜乎其能治心肝驚

癩迷感邪

鬼之疾也

方 小便不通

脹急者一煎服之

救急 小便過多

燒灰飲服 總錄

象膽

苦寒與熊膽同功

時珍曰：一乾了上有青竹文斑光膩其味微

甘

帶

方 內障日翳

如僵月或如棗花用一胆七箇熊胆半兩牛胆半兩射香一

分石決明末一兩糊丸綠豆

大每茶下十九日二 總錄

水獺

集解

弘景曰：獺有兩種入藥惟取以魚祭天者一種形大而頸如馬身似蝙蝠者為獺獺不入

藥時珍曰

一狀似青狐而小毛色青黑似狗膚

如伏翼長尾四足水居食魚今川沔漁舟往：馴

象

水獺

五十一

果曰懶肝厥陰肝經藥

希雍曰懶肝能益陰氣補虛損保勞極入肝入腎之藥

景曰瘡多見鬼症以肝虛則見鬼肝藏魂不安舍而邪祟乘之也懶肝能益肝而善除邪祟故治瘡

畜之使捕

魚甚捷

懶肝 甘温

頌曰由及五臟皆寒惟肝温也

治鬼疰蠱毒止久嗽除

魚鯁並燒研酒服之

別錄

治虛勞嗽病

藥性

治傳尸勞極

虛寒客熱四肢寒瘡及產勞

蘓頌殺虫

時珍曰諸畜肝葉皆有定

惟一一一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多偽也

發明

宗奭曰

一一治勞用之有驗頌曰仲景治冷勞有一一丸崔氏治九十種蠱疰傳尸骨蒸伏連

玲瑋諸鬼毒癘疾有一一丸二方俱妙說曰疰病一

門俱患者以肝一具火燒水服方寸匕日再服葛洪

云尸疰鬼疰乃五尸之一又挾諸鬼邪為害其病變

動乃有三十六種至九十九種大畧使人寒熱沉

默不知病之所苦而無處不惡積月累年淹滯至

死後傳至絕門覺有此患惟以一一一具陰乾為

〔稟〕曰——詳其所主自係厥陰肝經藥而兼入手陽明大腸者也下血陰蝕肝之病也凡疝無不屬肝也又治五痔及腸風痢疾脫肛是兼入大腸

〔稟〕曰凡鋒銳之物皆能達病所如皂刺藥刺是也猶刺鋒銳又係血肉之類故治痔特佳且獨之陰伏有類狐鼠及獾故亦能辟蟲

末水服方寸匕日三以瘥為度時珍曰五月五日午時急斫一竹節中必有神水瀝取和——為丸治心腹積聚病甚效也

方 鬼魅 七日三 千金翼 腸痔 有血——燒末水 服一錢 肘後

下血 不止——一具煮熟 食之妙 飲膳正要

猬皮 又名彙古 猬字 毛刺 爾雅 蝟 宗 彙 曰——治胃 逆 關 胃 故 從 虫 從 胃

苦平治五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛

引腰背酒煮服之 療腹痛疝積燒灰酒服 別錄 治腸

風下血痔痛有頭多年不瘥灸末飲服方寸匕燒灰

吹鼻止衄血甚驗解一切藥力 藥性。甄權曰得酒 良畏桔梗麥冬炒黑

猬

五十二

鳴泉曰余聞真人云彼處有呪蠱之術用蛇蝦蟇之類日呪之俟蠱成放出害人但有捐之家蠱不敢入則謂之治蠱有來由矣

藥入

方 五痔下血

衍義云用——穿山甲等分燒存性入肉豆蔻一半空腹熱米飲下一錢

炒○外臺用——三指大熏黃如棗大熟艾一錢穿地作坑調和取便熏之取口中有烟氣為佳將息三日再熏之三度永瘥勿犯風冷忌鴉魚猪肉生冷二十日後用藥補之 腸痔有虫 燒末

生油和塗 腸風下血 白——一箇燂焦去皮留刺木 賊半兩炒黑為末每服二錢熱

酒下 楊氏方 蠱毒下血 當吐蠱出 千金方 五色痢疾

二錢 燒末酒下 大腸脫肛 桂心五錢為末每服二錢

米飲下 葉氏摘立 眼睫倒刺 獨刺棗刺白芷青黛等分為末 隨左右目嚙鼻中口含冷水

瑞竹 反胃吐食 燒灰酒 獅犬傷人 分燒灰水服 普濟

臺方

兔肉

辛平

說曰酸冷時
珍曰甘寒

治熱氣濕痺止渴健脾壓

丹石毒

日

臘月作醬食去小兒豌豆瘡

藥性

涼血解熱

毒利太腸

時珍曰弘景曰妊娠不可食令子缺唇不
可合白鴉肉及心肝食令人面黃合獺肉

食令人病道尸不可合薑橘芥食葢器曰一一久食
損陽事令人痿黃八月至十月可食餘月傷人神氣

發明

宗奭曰兔白毛者得金之氣入藥尤效秋深可
食金氣全也時珍曰今俗以兔飼小兒云令出

痘稀蓋亦曰其性寒而解熱耳故又能治消渴丹石
毒也若痘已出及虛寒者宜戒之劉純治例云反胃

結腸甚者難治常食一一則
便自行又可證其性寒利矣

方消渴

煮極爛去渣澄汁渴即
冷飲不過二兔即愈海上

兔

血 酸寒涼血活血解胎中熱毒催生

時珍

方 兔血丸

小兒服之稀痘臘八日取生兔一隻刺血和蕎麥麩少加雄黃四五分九級豆

大初生以乳汁下二三丸遍身發紫點為驗兒長成常以兔肉啖之 保壽堂 催生丹 臘月餅染兔血陰乾為末每服

二錢乳香湯下 指迷 心氣痛 談楚翁方臘八日取生兔血和麩丸

桐子大每白湯下二十一丸或加茶末乳香丸服

腦 催生滑胎

時珍

方 催生丹

臘月取兔一箇攤紙上陰乾入乳香末同研以猪肉搗和丸芫子大紙袋盛

懸風處每服一丸醋湯下末下更 發背痛甚 臘月兔服用冷酒下此仙方也 經驗 腦入瓶

內密封久彌佳痛時每用厚塗執 痛即止如水也頻換取瘡 勝金

風熱上衝目睛常食甚好生食故尤速

肝明目補勞治頭旋眼眩

日華○和決明目丸服最明目

發明

時珍曰劉守真云兔肝明目因其氣有餘以補不足也眼科書云兔肝能瀉肝熱蓋兔目瞭而

性冷故也

皮毛

燒灰酒服方寸匕治產難及胞衣不出餘血

搶心脹刺欲死者極驗

蘇恭

頭皮灰主鼠瘻及鬼疰毒

氣在皮膚如針刺毛灰治灸瘡不瘥

蘇恭

皮灰主婦人

帶下毛灰主小便不利

時珍

兔屎

一名望月沙

明月沙 聖惠 甄月沙 集驗 兔

泉曰一一去目醫治癰瘰五疳應係足厥陰經之藥

泉曰一一治痔漏以腸中之物治腸中之

病也 獸部

治目中浮翳勞瘵五疳瘡痔癭殺虫解毒

時珍○臘月收

發明 時珍曰：一能解毒殺虫故治目疾疔勞瘡痔

方中注：用之諸家本草不言亦缺漏也沈存

中良方云江陰萬融病瘡四體如焚寒熱煩躁夜夢

一人腹擁一月光明使人心骨皆寒醒而孫元規遺

藥服之遂愈問之乃明月丹也

芳 明月丹 治瘡瘰疬虫用一四十九粒礱沙如

月望前以水浸甘草一夜五更取汁送下七丸有虫

下急甜入油鍋內煎殺三日不再服 蕪沈良方

痔瘡下虫 一慢火炒黃為末每服二錢入乳

香五分空心酒下日三 集驗方 **痘瘡**

入目 一錢 普濟 **痘後生翳** 直往山中東西地上

回顧以雌雄楨榔各一枚同磨不落地

井水調服百無一失如神 蘭氏經驗

敗筆 時珍曰惟 燒灰水服治小便不通及數難淋

瀝陰腫脫肛中忌唐本酒服二錢治男子交婚之夕莖

痿藥性酒服二錢治產難漿飲服二錢治咽喉痛不下

飲食時珍

發明時珍曰筆不用新而用敗者取其沾濡膠墨也膠墨能利小便胎產故耳

方心痛不止一頭三枚燒灰無根水服經驗催生勝金方聖妙寸金散一

頭燒灰生藕汁一盞調下立產陸氏治產難第一方用兔毫一頭三枚燒灰金三片以蠟和丸酒服

鼠日華曰北不入藥治踈折續筋骨生搗傳之三日一易

別錄猪脂煎膏治打撲折傷凍瘡湯火傷說曰臘月以油煎枯去渣

熬膏收用頌曰油煎入蠟煎油治小兒驚痛日華五月

傳湯火傷滅癩痕極良

手五

時珍曰一屬子治腎病

獸部

五日同石灰搗收傳金瘡神效

時珍

煎膏治諸瘡癩

弘景

發明

完素曰善穿用以治瘡癩者因其性而為用也

方 鼠瘻潰爛

壯一枚亂髮一鴉子大以三歲臘猪脂煎令消盡以半塗之以半酒服

姚氏云不傳之妙法也

瘡腫熱痛

靈一斤煎焦滴水不散瀝去渣

再煎下炒紫黃丹五兩柳枝不住攪勻滴水成珠下

黃蠟一兩熬帶黑色成膏甕瓶收之每用攤貼止痛

而涼

經驗方 潰癰不合

雄一燒末傳之千金

破傷風病

口噤角弓反張雄

一箇和尾燒灰臘

又方

取活去五臟乘熱貼之

婦人狐癩

因片水來

或悲或驚或逢疾雨暴風被濕致成狐癩精神恍惚

有水不通胸脇腰痛引陰中小便難嗜食飲嘔如

有孕狀其癩手足成形者殺人未成者可治用活雄

一箇以新絮裹之黃泥固住入地坎中索薪燒其

泉曰腎主骨能治腎病故主骨蒸勞極用骨尤良以骨治骨也

獸部

上一日夜取出去絮入桂心末六銖為末每酒服方寸匕不過二服當自下外臺素女經 合子

易產壯一燒末并花水服方寸匕日三子母秘錄 乳汁清少雄一頭燒末酒服方寸

知勿令婦同上 杖瘡腫痛未生毛一同桑椹子入麻油中浸釀臨時取塗甚效 西湖志

湯火傷小老一泥包燒末菜油調塗 談楚翁方

肉 甘平治小兒哺露大腹灸食之別錄 小兒疳疾腹

大貪食黃泥畏燒熟取肉作羹食勿食骨甚瘦人孟詵

更主骨蒸勞極殺虫及小兒疳瘦酒熬入藥蘇頌 灸食

治小兒寒熱諸疳時珍○並用雄鼠

胆 點目治青盲雀目不見物滴耳治聾時珍○時珍曰胆在

龍

五十六

肝之短葉間大如黃豆正白色貼而不
垂衛生家寶方言其胆紅色者何耶

發明

時珍曰癸水之位在于氣通于腎開竅于耳注
精于瞳其標為齒鼠亦屬子宮癸水其目夜明

在卦屬坎其精在胆故胆能治耳聾青盲睛能明目
而骨能生齒皆腎病也諸家不言胆能治聾肘後方
甚稱其妙云能治三十年老聾若卒聾者不過三度
也有人側卧瀝胆入耳須臾汁從下耳出初時益聾
十日乃瘥矣後世羣方祖此多用之
弘景曰其胆纔死便消不易得也

方 多年老聾

衛生家寶方勝金透關散用活鼠一
枚熱湯浸死破喉取胆真紅色者是

也用川烏頭一箇炮去皮真華陰細辛二錢胆礬半
錢為末以胆和勻焙乾研細入射香半字管吹入耳
中口含茶水日二次十日見效○聖惠方臘月
取鼠胆二枚熊胆一分水和滴少許入耳日二
鼠胆鯉魚胆各二枚和
勻滴之立效 聖惠

青盲

馮泉曰李氏所引不過術家無稽之言而
主治不錄近醫用治慢驚頗有效者余取
要藥

視之極臊臭火焙時其氣尤不可近因思
汪昂云惟極香極臭之物可以通竅祛邪
如射香極香能通竅壅閉此物極臭亦
能通竅絡故治慢驚也又係腎丸自能補
腎補腎通竅以定風甚合治慢驚之法○
焙熟研用毒死者不可用
泉曰蒲目燒研點目不如生刺取瀝點目

時珍曰一入足厥陰 肝經
王子接曰婦人病溫後毒移男子為陰易
男子必手足拘攣顯厥陰之証而湯以韭
獸部

治骨蒸

胤印 即外腎
中丸也

佩之令人悅媚 時珍○時珍曰岫嵒
神書云一一合歡註

云惟胤外腎丸上有文似印兩腎相對有符篆朱文
九折者尤佳以十一月十二月或五月五日七月七
日正月朔旦子時面北向子位割取陰乾佩于青囊
中男左女右繫臂上人見之無不歡悅所求如心
胤目 明目 弘景○肘後治目澀好眠取
一一燒研和魚膏點目皆

脊骨 治齒折多年不生者研末日搯之甚效 藏器
○雷

公炮灸論云長齒生

牙賴雄鼠之骨末

方 牙痛 老鼠去皮以礪沙擦上俟肉爛化盡取骨
焙末入蟾酥二分樟腦一錢每用少許點

牙根上立止

孫氏集效

鼠糞 弘景曰兩頭尖者是
雄一一北一一不用

微寒無毒 時珍曰小毒
誤食令人目

胤

五十七

根為君滑利通陽疾于下行再以一一之
 陰霍引入至陰之虞以通陰舒陽鳴皋曰
 按李王二公之言是一一專為厥陰肝經
 引經藥也但陰易由交接復毒由腎入南
 陽用一一是又為腎經引經矣似不輕為
 肝經也再觀後方用塗瘡毒而能散癰腫
 服之而散吹奶及乳癰南陽一一湯云服
 之得粘汗為效則一一之性又能宣通也
 王子接曰一一亦治膀胱水結
 舉曰一一入足厥陰少陰而以通為用嘗
 見友人以一一為君佐以樟腦乳香末藥
 水磨研末填臍中上蓋槐木薄皮以艾炷
 如彈丸大灸之治腹中痞塊血塊及經脈
 不通腹中結痛頗有奇驗則一一宣通之
 力可知也普濟用塗臍中治大小便秘古
 方已有之矣

黃成 治小兒大腹疝疾葱豉同煎服治時行勞復別錄

仲景及古今 治癩疾明目日華 治男子陰易腹痛通

女子月經下死胎研末服治吹奶乳癰鮮馬肝毒塗

鼠瘻瘡燒存性傳折傷疔腫諸瘡時珍

發明時珍曰一一入足厥陰經故所治皆厥陰血分之病上列諸症是矣

方 傷寒勞復 外臺用雄一一二十枚豉五合水二升煮一升頓服。活人書一一豉湯

治勞復發熱用一一二七枚危子二十四枚只壳三枚為粗末水一盞葱白二寸豉三十粒煎一盞分三

服 男子陰易 及勞復癢一一湯用一一兩頭尖者十

得粘汗為效未汗再 大小便秘 雄一一末傳臍 室女 服 南陽活人書 普濟

經閉 壯 一 一兩炒研空心 子死腹中 堆 一 一 二 七 枝水三升煮

一升取汁作 產後陰脫 以溫水洗軟用雄 一 一 婦人 熊氏 燒烟熏之即入

吹奶 一 一 七枝紅棗七枝去核包 一 一 燒 乳癰初起 集要

雄 一 一 七枝研末溫酒 乳癰已成 用新濕 一 一 黃連 大黃各等分為末

服取汗即散 壽域 甌瘰潰壞 新 一 一 一百粒收密 器中五六十日研碎

即傳之效 疔瘡 一 一 亂髮等分燒灰刺 鬼擊吐血 胸 腹 普濟 瘡頭納入大良

千金 刺痛 一 一 燒末水服方寸 折傷瘀血 傷損筋骨疼痛 一 一 燒末猪脂

調傳之急果不過 小兒鹽鼻 一 一 燒研水酒空 小兒 心服之一歲一錢

半日痛止 梅師 窩瘡 一 一 研香 中馬肝毒 一 一 三七枚研 油調塗之 水飲 梅師 貓咬成

鼠

五八

瘡一燒末油調傳
曾經效驗
壽域
毒蛇傷野一水和
塗印真人
小兒白禿

粉麻油調塗百一
狂犬咬傷傳之二升燒末
梅師

時珍曰入手足少陰心腎厥陰肝經

鴛泉曰氣不歸元之效逆用一一之重鎮
入腎攝氣歸元而效逆止故又治腎不納
氣之效當與補腎藥同進女子漏下崩帶
男子遺洩下焦之病惟重鎮之品可以沈
入下焦而潛以止脫與用赤石脂同例其
止瀉痢膿血病久腸虛者可用新病者不
可用也吐血衄血不止以其氣血上逆也
惟重鎮之法可以止之

鱗介魚虫

鱗介魚虫部

龍

集解

別錄曰

生晋地川谷及太山巖水岸上穴中

孔景曰

今多出梁益巴中白地錦紋紙之著

古者良皆是龍蛻非實死也普曰色青白者良恭

曰今出晋地五色具者良宗真曰曾有崖中崩出

龍骨一副皮體頭角

皆備不知是蛻是斃

龍骨

甘平無毒

別錄曰

治心腹鬼疰精物老魅此氣不歸效

元之效逆

逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇本經

心腹煩滿恚怒氣伏在心下不得喘息腸瘕內疽陰

蝕四肢枯萎夜卧自驚汗出止汗縮小便溺血養精

龍

五十九

神定魂魄安五臟白龍骨主多寐洩精別錄逐邪氣安

心神夜夢鬼交虛而多夢止冷痢下膿血女子崩帶

甄權主懷孕漏胎止腸風下血鼻洪吐血止瀉痢渴疾

澀腸胃日華益腎鎮驚止陰瘡收濕氣脫肛生肌斂瘡

時珍○權曰忌魚及鉄器之才曰得人參牛黃良畏

石膏時珍曰許洪云牛黃惡一一而一一得牛黃更

良又龍喜食燕肉畏鉄故食燕肉者忌渡水祈雨者

用燕鎮水患者用鉄敷曰用一一搗粉絹袋盛之用

燕子一隻去腸肚安袋于內懸井面上一宿取出研

細入補腎藥其效如神時珍曰近世方法但煨赤為

粉亦有生用者如急用酒煮焙乾或云須水飛過晒

乾每斤用黑豆一斗蒸一伏特用否則著人腸胃晚

年作

熟也

發明 時珍曰其氣收陽中之陰入手足少陰厥陰經

曰溼可去脫故成氏云一一能收飲浮越之正氣固大腸而鎮驚又主帶脉為病

方健忘 一一遠志等分 **勞心夢洩** 方同上蜜九朱砂為衣蓮子湯

下 **遺尿** 一一棗蠟蛸等分蜜丸 **老瘡** 一一方寸匕先發一時酒一升

半煮三沸及熟服盡 **傷寒毒痢** 傷寒八九日至十餘日大煩渴作熱三焦

溫覆取汗效 時後 有瘡蠱下痢或張口吐舌目爛口古生瘡不識人用此除熱毒止痢 一一半斤水一斗煮四升沈之井底

冷服五合漸進之 **熱病下痢** 欲死者一一半斤研水一斗煮至五升候極冷稍飲

得汗愈 **吐衄九竅** 出血並用一一末吹入鼻中昔有時後 人衄血斗餘用此即止 三因方

小兒臍瘡 一一粉撲 **陰汗** 一一牡蠣粉撲 聖惠 醫宗三法

龍 蚺蛇 毒

時珍曰蚺蛇胆主厥陰太陰之病肝脾

龍齒

澀涼當之曰
大寒

主驚癇癲狂心下結氣不能歇

息本

小兒身熱不可近大人骨間寒熱殺蟲毒別錄

同龍骨

時珍曰修治同龍骨或云以酥炙

發明

時珍曰龍者東方之神故骨與角齒皆主肝病許叔微曰肝藏魂能變化故魂遊不定治之以

即

此義也

蚺蛇

又名南蛇細目埋頭蛇時珍曰身大而行徐以

集解

頌曰一一弘景言出晋安蕪恭言出桂廣以南今嶺南諸郡皆有之弘景曰大者二三圍

在地行不舉頭者是真舉頭者非真也保昇曰若

蛇而粗短藏器曰酉陽雜俎云一一長十丈嘗吞

鹿：消盡乃遠樹則腹中之骨穿鱗而出時珍曰劉恂錄異記云一一大者五六丈圍四五尺小者

希雅曰今人受杖時用此喻化可得不死
其功能獲心止痛使惡血不上薄心有神
力也泉按如繆氏言是亦活血行血之品也

鱗介魚虫

三四丈身有斑紋如故錦又顧玠海槎錄云一
胆以小者為佳王濟手記云橫州山中多一一能
食麋鹿肉極腴美

皮可胃鼓作樂器

膽 甘苦寒有小毒治目腫痛心腹蠱痛下部蠱瘡

錄 小兒八癩甄殺五疔水化灌鼻中除小兒腦熱疔

瘡蠱漏灌下部治小兒疔痢同麝香傳齒疔宣露孟

破血止血痢蟲蠱下血藏明目去翳主大風特珍

曰其胆上旬近頭中旬近心下旬近尾弘景曰真胆

狹長通黑皮膜極薄舐之苦甜恭曰別取粟許著淨

水中浮游水上回旋行走者為真其沉者非真也勿

多著多著亦沉散說曰人多以猪胆虎胆偽之雖水

中走亦

遲耳

蝮蛇 白花蛇

空一

希雍曰同血竭乳香末藥狗頭骨灰麝虫
天靈蓋象牙末麻皮灰丹砂作丸臨杖服
一丸護心止痛多杖無害

發明

時珍曰一一稟己土之氣其一受甲乙風木故
其味苦中有甘所主皆厥陰太陰之病能明目

涼血除疔殺虫慎微曰顧含養媿失明
須用一一含求得用之速復明也

方 小兒急疔瘡

水調一一一
灌之 聖惠 小兒疔痢 羸瘦多腫
生則閉目

食不下用一一豆大二枚煎通草汁研
化隨意飲之并塗五心下部 楊氏產乳 疔痛 一香

油調塗 醫方摘要 牙露 出膿血一一三錢枯礬一錢
杏仁四十七粒研勻以布揩眼

激盡血搽 之 聖惠

白花蛇

又名蕪蛇 綱目 寒鼻蛇 宗奭曰蛇鼻向下獨
此鼻向上

集解

頌曰黔中及蕪州鄧州皆有之其文作方勝
喜螫人足黔人有被螫者立斷之續以木脚
此蛇入人室屋中作爛瓜氣者不可驚之須速辟
除之時珍曰一一湖蜀皆有今惟蕪蛇擅名然

希雅曰——性走竄有毒癩風疥癬頑
癖等證誠為要藥然而中風口面喎斜半
身不遂定緣陰虛血少內熱而發與得之
風濕者殊科非所宜也

鱗介魚虫

蕪地亦不多得市肆所賣官司所取皆自興國州
山中來其蛇龍頭虎口黑質白花脇有二十四方
勝文腹有念珠斑口有四長牙尾有佛指甲長一
二分腸形如連珠多在石南藤上食其花葉人以
此專獲之先撒土一把則蟠而不動以叉取之去
腸物炕乾出蕪地者雖乾枯而眼光不陷地處則
否元 長慶集云巴蛇凡百種惟——人不常
見毒人則毛髮豎立飲于溪澗則泥沙盡滯巴人
亦用禁術制之重以雄黃烟則腦裂也今蕪蛇亦
不甚毒則黔蜀之蛇雖有白花恐性類不同故入
藥獨取蕪
產者也

甘醖温有毒治中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎邪

半身不遂骨節疼痛脚弱不能久立暴風瘡痒大風

疥癬

開寶○頌曰——治風速干諸蛇黔人治疥
癬遍體諸藥不効者生取此蛇切斷以磚燒紅

白花蛇

三

沃醋令氣蒸置蛇于上以盆覆一夜如此三次去骨
取肉芘以五味令爛頰食之瞑睡一晝夜乃醒瘡厄
隨皮便退治肺風鼻塞浮風癰癧身上白癩風癩瘍
其疾如此

斑點甄通治諸風破傷風小兒風熱慢急驚風搖擗
此風藥宜慎用

療癰漏疾楊梅瘡瘡倒陷時珍頌曰頭尾各一
尺有大毒不可用只用

中段乾者以酒浸去皮骨其骨須遠奔之傷人毒與
生者同宗夔曰凡用去頭尾換酒浸三日去盡骨此

物甚毒不可不防時珍曰黔蛇長大故頭尾可去一
尺蕪蛇小只可各去三寸亦有單用頭尾者大蛇一

條只得淨肉四兩而已久留易蛀取肉
密封藏之十年亦不壞也又曰得酒良

發明穀曰蛇性竄能引藥至於有風疾處故能治風
時珍曰風善行數變蛇亦善行數蛇而花蛇食

石南所以能透骨搜風截驚定搐為風痺驚搐癩癰
惡瘡要藥取其內走臟腑外徹皮膚無處不到也凡

鳴皋曰——稟毒烈之性能通經絡而
驅風濕無處不到故能攻楊梅毒瘡治瘡
瘡黑陷

服蛇酒藥

切忌見風

方 驅風膏

治風癱瘋風遍身疥癬 一 一 四兩酒
灸天麻七錢半薄荷荆芥各二錢半為

末好酒三升蜜四兩熬膏每服一盞溫 白花蛇酒治

湯下日三急于暖處取汗 醫墨元戎 諸

風痺無新久及惡瘡疥癩等症 一 一 一條洗淨去

頭尾酒浸取淨肉一兩去骨刺入全蝎當歸防風羌

活各一兩獨活白芷天麻赤芍甘草升麻各五錢剉

碎以絹袋盛用糯米二斗如常造酒以袋置缸中待

成取酒同袋密封煮熟寘陰地七日 又一方 治諸風

出毒每飲數杯常令相續 瀕湖 癘癧用

一 一條如法取淨肉絹袋盛之蒸糯米一斗安

麩于缸底寘蛇于麩上以飯安蛇上密蓋三七日取

酒以蛇晒乾為末每服三五分酒下仍 又一方 一

以濁酒及糟作餅食之佳 瑞竹堂 一

條取淨肉四兩羌活二兩歸身二兩天麻二兩秦艽

二兩五加皮二兩防風一兩對勻絹袋盛入金華酒

白花蛇

六十三

鱗介魚虫

罈內懸浸水煮一日埋陰地數日每飲一二杯渣日

乾研酒丸桐子大每服三五丸酒下忌見風犯欲

及羊魚鷺麩發治營衛不和陽少陰多手足

風之物瀕湖又一方舉動不快淨肉一兩

天麻狗脊各二兩為末好酒一升浸之隔湯煮成

膏入生薑汁半杯熬勻每服半匙神效備急治

癩一五寸取肉炙乾雄黃一兩飛細白蜜一斤

杏仁一斤研爛同鍊為膏每服一錢酒下日三酒

先服通天再造散下去時作肘止

虫物用此除根三日偏正頭風取肉南星漿煮軟

切炒各一兩石膏荆芥各二兩地骨皮二

錢半為末每服一錢茶下日三聖濟潔古白花

蛇散治大風病烏梢蛇各取肉二錢酒炙雄

黃二錢大黃五錢為末每服二錢白湯下三日

一治楊梅瘡先服發散藥後服此用肉酒炙

龜板酥炙穿山甲炙蜂房炙頭粉朱砂

各一錢為末紅棗肉為丸梧子大每服七丸冷茶下

日三忌魚肉服盡則愈後服土茯苓藥調之近方

托痘花蛇散

治痘黑陷 一 一 連骨炙勿令焦 三錢 大丁香七枚為末 每服五分 以水和淡

酒下神效 移時身熱即

紅活也

王氏手集

三蛇愈風丹

治厲風手足麻 木眉毛脫落皮

膏燥痒及一切風瘡 一 一 烏梢蛇土蝮蛇各一條

並酒浸取肉焙乾苦參末四兩為末以皂莢一斤切

酒浸去酒以水一椀按取濃汁石器熬膏和九梧子

大每服五六十丸煎通聖散下以粥飯壓之日三服

三日一浴取汗避風 〇 治例

無蝮蛇有大風子肉二兩

烏蛇

一名烏梢蛇 綱目 黑花蛇 綱目

集解

志曰 一 一 生商洛山背有三稜色黑如漆性 善不噬物 頌曰 蕪州黃州山中有之 乾寧記

云此蛇不食生命不害人多在靈叢中其身烏而

光頭圓尾尖眼有赤光至枯死眼不陷如活者稱

之重七錢至一兩者為上十兩至一鎰者為中粗

大者力彌減也作偽者用他蛇熏黑亦能亂真但

烏蛇

空四

眼不光耳宗奩曰——脊高世稱劔脊烏梢尾細長能穿小銅錢百文者佳有長丈餘者蛇類中惟此入藥最多景曰蕪州——頭上有逆毛二寸一路可長半分許頭尾相對入藥如神只重一兩以下腹下白帶子長一寸者雄也宜入藥用去頭及皮鱗帶子切斷苦酒浸一宿柳木炭炙乾再以酥采用或用酒煮乾用亦可時珍曰——有二種劔脊細尾者為上一種長大無劔脊而尾稍粗者名風梢蛇亦可治風而力不及

甘平無毒

綸曰有

治諸風頑痹皮膏不仁風癩癰癬

疥癬開寶熱毒風皮肌生癩眉毛脫落癰疥等瘡甄權功

與白花蛇同而性善無毒

時珍

方 大風

朝野僉載云商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有——墮酒罌中病人不

鴉舉曰此法大妙凡用毒藥俱可倣此可
稱無弊用其真亦佳

知飲酒漸瘥。治例治大風用烏梢蛇三條取肉焙
末蒸餅丸以喂烏鴉待盡烹鴉取肉焙末酒服一錢
不過三五
鴉可愈

膏治耳聾綿裹豆許塞之神效時珍

蝮蛇 又名反鼻蛇

集解弘景曰——黃黑色如土白斑黃領尖口毒
最烈虺形短而扁毒與蝮同恭曰——作地

色鼻反口長身短頭尾相似山南漢沔間多有之
一名虺無二種也頌曰——形不長頭扁口尖頭

斑身赤紋斑亦有青黑色者人犯之頭足貼着東
間諸山甚多草行不可不慎藏器曰——錦紋亦

有與地同色者着足斷足着手斷手不爾合身糜
爛七八月毒盛時啣樹以洩其毒樹便死又吐涎

沫於草木上着人成瘡名曰蛇漢瘡卒難治療方
與蛇螫同時珍曰蝮與虺陶氏言是二種蘓恭言

鱗介魚虫

蝮蛇

空五

是一種爾雅云蝮虺身博三寸首大如擘是以蝮虺為一種也郭璞云——惟南方有之一名反鼻細頸大頭焦尾鼻上有針錦紋如綬紋間有毛如猪鬃大者長七八尺虺則所在有之俗呼土虺與地同色顏師古曰以俗名證之郭說為是蓋蝮長大虺短小自不難辨陶說為是椰子厚——文云目兼蜂蠆色泥塗其頸感忽其腹次且察鼻鉤牙穴出榛居頗盡其狀也抱朴子云——中人甚急即時以刀割去瘡肉投於地其涕如火炙酒炙焦盡人乃得活

甘温有毒釀酒療癩疾諸痿心腹痛下結氣除蟲毒

別錄 五痔腸風瀉血 諸惡風惡瘡癰癰皮膏頑癬半

身枯死 藏器○頌曰—— 齒人急治之用細辛雄黃 等分為末內瘡中日三四易之又以瓜萎根

桂末着管中密塞勿令走氣 佩之中毒急敷之緩則不救

發明時珍曰痛疾感天地肅殺之氣而成惡疾也
稟天地陰陽毒烈之氣而生惡物也以毒物

攻毒病從其類也藏器曰取活蛇一條着器中投以
醇酒一斗封定埋馬溺處一年取開蛇已消盡酒味
猶存有患諸證者不過服一升當覺身習而愈然
有小毒不可頓服又曰生癩者取一條或他蛇亦可
燒熟生上當有赤虫如馬
尾出仍取蛇肉塞鼻中

方

白癩

一條勿令傷酒一斗漬之糠火煨
稍熟取蛇一寸和臘猪脂搗傅時後

膽

治蠱瘡

別錄

殺下部虫

甄權

治諸漏研傅之若作痛

杵杏仁摩之

時珍

脂

綿裹塞耳龍耳

時珍

蛇蛻

一名龍退細目龍子衣本經龍子皮別錄弓衣
本經蛇符別錄蛇筋吳普蛇皮甄權

蝮蛇

字六

集解

弘景曰草中少見也蝮蛇惟有長者多是赤
蝮黃領輩其皮不可辨但取石上完全者佳

頌曰蛇蛻無時但着不淨即蛻大飽亦蛻 敬曰凡

使勿用青黃蒼色者只用白色如銀者醋浸炙乾

用時珍曰今人用一一先以皂莢水洗淨或酒醋

蜜各浸炙黃用或燒存性或鹽泥固煨各隨本方

鹹甘平無毒火熬之良

權曰有毒

治小兒百二十種驚癇

蛇癩癩疾瘰癧弄舌搖頭寒熱腸痔蠱毒

經本

大人五

邪言語僻越止嘔逆明目燒之療諸惡瘡

別錄

治喉痺

鬼魅

甄權

灸用辟惡止小兒驚悸客熱煎汁傳癰瘍白

癩風催生

日華

安胎

孟詵

止瘡

藏器曰

正發日取塞耳又
以手持少許并服鹽醋汁

吐令辟惡去風殺虫燒末服治婦人吹奶大人喉風退

自翳消木舌傳小兒重舌重齶唇緊鮮顛面瘡月蝕

天泡瘡大人丁腫漏瘡腫毒者湯洗諸惡虫傷時珍

磁石及酒或
曰孕婦忌用

發明時珍曰入藥有四義一能辟惡取其變化性靈也故治邪僻鬼魅毒諸疾二能去風取其屬

性竅也故治驚癇癡駭喉舌諸疾三能殺虫故治惡瘡痔漏癬疥諸疾用其毒也四有蛻義故治膜翳

胎產皮膏諸疾
會意從類也

方 小兒喉痹 燒末乳汁服 一錢 心鏡 纏喉風 氣閉者一服 當歸等分為末

酒服一錢取吐。一方用一燒烟筒吸 入即破。又方一白梅含之嚥汁 小兒木舌

及重舌乳服末 小兒口緊 不能開合飲食言語即死 少許 千金 燒末拭淨傳之 干

蛇蛻

金 小兒頭瘡

面瘡月蝕並用一燒
木臘猪脂和博 時後 痘後目翳 齊東
莖語

云小兒痘後目翳一一條焙天花粉五錢為末以
羊肝破開夾藥縛定米泔煮食子女及甥皆用此得

效真奇

卒生目翳

一一條洗剪碎麩和餅炙焦
黑為末每食後服一錢 聖惠 橫

生逆產

衣胞不下千金方用一炒焦為末面向東
酒服一斗圭即順○十全博救方用一藍

泥固濟煨二錢榆白皮湯下○濟生秘覽治逆生須

火不救一一具蟬退十四箇頭髮一握並燒存性

分二服酒下仍以小針刺兒足

心三七下擦鹽少許即生也 乳吹 燒末酒下 產

乳 腫毒無頭

一灰猪脂 石瘰無膿 堅硬如石一
和塗 肘後 貼之經宿即愈

錄 諸漏有虫

一灰水和博 丁腫魚臍 外臺用一
即出出 十金 雞子大

水者三四沸服汁立瘥○直指治魚臍瘡 惡瘡似癩
出水四畔浮漿一一灰存性雞子清和搽

十年不瘥全——一條燒灰猪脂和傳
仍以一條燒存性酒服 見千金方 癩風白駁

灰醋調搽 耳忽太痛 如有虫在內奔走或血水流
或乾痛不可忍者——燒存性

研末吹之立愈經驗秘
方也 楊拱醫方摘要

鯉魚 甘平 宗奭曰素問言魚熱中脉訣言熱則生
風食之多能發風動熱時珍曰朱丹溪

言諸魚皆動風動火不
獨鯉也日華曰涼非也 煮食治效逆上氣黃疸治水

腫脚氣 別錄 治懷妊身腫及胎氣不安 日華 煮食下水氣

利小便 時珍 作膾去冷氣瘕癖氣塊結在心腹 藏器 燒末

能發汗定欬嗽下乳汁消腫米飲調服治大人小兒

暴痢用童便浸煨止反胃及惡風入腹 時珍

鯉魚

突

洗日 一脊上兩筋及黑血有毒溪澗中者毒在腦
俱不可食凡災一烟入目損目光三日內必驗也
天行病後下痢及宿癥俱不可食服天門
冬殊沙人不可食不可合葵菜犬肉食

發明 特珍曰 一陰中之陽其功長於利小便故能
消腫脹黃疸脚氣喘嗽濕熱之病作膾則性温

故能去疰結冷氣之病燒之則從火化故能發風寒
平肺通乳解腸胃及腫毒之邪也劉河間云鯉之治
水驚之利水因
其氣相感也

方 水腫 范汪方用大醋三升煮乾食一日一
作外臺用大一箇赤小豆一升煮

熟食飲汁一頓食盡
當下利即愈甚良 妊娘水腫 同上 水腫脹滿 赤尾

一斤一箇破開不見水及鹽入生礬末五錢於腹內
紙包外以黃泥包煨熟食頭者上消食身尾者下
消一日食盡屢試 妊娘感寒 燒末酒服方寸
屢效 醫方摘要 秘錄 胎

動不安

婦人數傷胎下血——一箇阿膠一兩炒糯
米二合入葱橘皮薑各少許煮食五七日效

太平

惡風入腹

久腫及女人產後風入產戶內如
馬鞭噓吸短氣咳嗽者——大者

尿浸一宿文火炙熟去皮

反胃

——童便浸一夜炮
焦研末同米煮粥食

壽域

神書

胆塗小兒熱腫點眼治赤腫

甄權
滴耳治聾
器

方

目翳

大鯉魚——滴銅鏡上陰
乾刮下點少許 總錄

鯽魚

又名鮒魚

說曰寬大者是——狹小者是鱈

甘温止下痢治腸痔

保昇○夏月熱痢
有益冬月不宜

生搗塗惡核

腫毒不散同赤小豆搗塗丹毒燒灰和醬汁塗諸瘡

鯽魚

辛九

十年不瘥者以猪脂煎灰服治腸癰

蘇恭

合小豆煮汁

服消水腫采油塗婦人陰疔殺虫止痛釀白礬燒研

醫事曰
礬礬一
法亦治
喘水便
咳

飲服治腸風血痢

時珍

昂曰和蒜食少熱同沙糖食生疔虫同芥菜食成腫

疾同猪肝雞雉鹿肉食生瘰癧同麥門冬食害人

發明

震亨曰諸魚屬火獨一屬土有
調胃實腸之功若多食亦能動火

方水腫

一三尾去腸以商陸赤小豆等分填
滿煮熟去魚食豆小便利即愈 肘後

崩

一箇長五寸者去腸入血竭乳香
在內燒存性末服三錢酒調下 摘玄 消渴 去腸

留鱗茶葉填滿煨

熟食之心統

腸風

大一一去腸留鱗入五倍子
末填滿泥固煨存性為末酒

服一錢

反胃吐食

大一一去腸留鱗綠礬末填滿泥
固煨存性研末每米飲服一錢日

陳藏器註鮫魚云似鯉形長身圓肉厚而鬆狀類青魚

鱗介魚出

二 浸浮毒瘡 凡卒得毒氣攻身或腫痛或赤痒上
本事 下周匝煩毒欲死此浸注毒瘡也生

類馬之 聖惠方

青魚 時珍曰青亦作鯖大者名鱈魚

集羊 頌曰一江湖南方多北地時或有之
似鮫而背正青色其頭中枕骨蒸令氣涌日

乾狀如琥珀荆人煮
拍作酒器梳篦甚佳

膽 臘月取
苦寒點暗目塗熱瘡消赤目腫痛吐

喉痺痰涎療惡瘡 時珍

發明 時珍曰東方青色入通肝胆肝胆開敷於目用
胆以治目疾蓋取此義其治喉痺骨鯁則

取涌洩係乎
酸苦之義也

青魚 鱧魚

方 乳蛾喉痹

陰乾點之。一方用朴消代胆礬。含嚥。萬氏用胆礬入胆中。

赤目障翳

加黃連海螵蛸等分。一切障翳。魚胆丸用。

魚胆青羊胆牛胆各半兩熊胆二錢半射香少許石決明一兩為末糊丸梧子大每空心茶下十九龍

木論

鱧魚

又名鱘魚。本經黑鱧。圓經玄鱧。埤雅烏鱧。綱目鱧魚。本經文魚。俗名烏魚七星魚。

集解

孔景曰言是公蠋蛇所化亦有相生者性至難死猶有蛇性也時珍曰形長體圓頭尾相

等細鱗玄色有斑點花紋類蠍蛇有舌有齒背腹有鬚連尾無歧狀可憎氣息惡首戴七星夜

朝北斗道家指為

水厭齋錄所忌

甘寒無毒

源曰有小毒無益不宜食

療五痔治濕痹面目浮腫下

大水 本經弘景曰合赤小豆煮食治腫滿甚效 **下大小便壅氣作膾治脚**

氣風氣 孟詵曰 **主妊娠有水氣** 蘇頌曰別錄曰有瘡者不可食令人癩白宗奭曰能

發痼疾治病亦取其一端

方十種水氣 岳死一斤重者煮汁和冬瓜葱白作羹食心鏡 **下一切**

氣 孟詵曰大一頭開肚入胡椒末半兩蒜三頭

俱切碎煮熟空腹食之至飽并飲 **一切風瘡** 疥癩年久不愈

者不過二三服必愈 **一箇去腸肚以蒼耳葉填**

滿外以蒼耳安鍋底置魚於上火着水慢火煨熟

淡食功效甚大 **浴兒稀痘** 除夕黃昏時取大一箇小者二三箇煮湯浴兒

遍身都到不可嫌腥洗去此方極神驗如不信洗時 **留一手或留一足出痘時未洗處必多** 醫方摘要

鱧魚 鱖魚

胆 甘平 〔日華曰〕諸魚胆皆苦獨此胆甘可食為異臘月取陰乾 治喉痺將死

者點入少許即瘥病深者水調灌之 靈苑方

鰕魚 音音 又名鱸魚 石桂魚 開寶水脈

集鮮 時珍曰一扁形濶腹大口細鱗有黑斑采斑色明者為雄稍晦者雌皆有鬚鬣刺人厚

皮繫肉向中無細刺夏月居石穴冬月偎泥魚之沈下者也小者味佳至三五斤者則不美

甘平治腹內惡血去腹內小虫 開寶 治腸風瀉血 日華補

虛勞益脾胃 孟詵

發明 時珍曰醫說曰一女子年十八病癆瘵累年偶食一黃遂愈觀此正與補勞殺虫之說相符

鱓魚 音善 又名黃鱓 時珍曰蛇變者名蛇鱓害人以缸貯畜數百頭夜以灯照之蛇化者項下有白

鳴皋曰余夏月友人邀飲食一歸而吐
 瀉交作徹夜逾其二日後始愈同食者三
 人一人與余同病一人無恙想必所食較
 少或脾胃較強也余以前常食此獨中此
 一次所謂蛇變者歟

點通身浮水
 上有毒害人

甘大温治濕痺藏補五臟逐風邪除濕風惡氣孟專

貼一切冷漏痔漏膿瘡引蟲時珍曰孫真人曰黑者有毒弘景曰時行病後

食之多復宗奭曰動風多食令人霍亂
時珍曰多食發諸瘡不可合大肉食

方 膿瘡蛙爛數條打死香油抹腹纏瘡上紫
定頃則痒不可忍然後取下看腹有

針眼皆出也未盡更作後以
 人脛骨灰油調搽奇效方

尾血 塗癬及痿藏療口眼喎斜和少射香左喎塗
右喎塗左正即

洗 滴耳治耳痛滴鼻治鼻衄點目治疹後生翳同蒜

汁墨汁塗赤疵又塗赤遊風時珍

昂曰千金方盤血傷冠血和伏龍肝並治口喝

發明時珍曰鱗善穿穴無足而竄與蛇同性故能走經脉療十二風邪及口喝耳目諸竅之病風中血脉則口眼喝邪用血主之從其類也

頭 同蛇頭地龍頭燒灰酒服治小腸瘕有效集

鰻鱺魚 又名白鱓綱目蛇魚同上乾者名風鰻

甘平有毒治五痔瘡癢殺諸虫

說曰痔瘡有虫燒熏之即死諸虫燒灰為

末空腹食三五度即愈 治惡瘡女人陰瘡陰蝕虫瘡治傳尸症

氣補勞損暖腰膝起陽日華療濕脚氣腰腎間濕風痺

常如水洗者食甚補益患諸瘡癢癰瘍風人宜長食

之孟治小兒疳勞及虫心痛時珍治婦人帶下及一切

風瘙如串行

張鼎曰吳瑞曰腹下有黑斑者毒甚與銀杏同食患軟風機曰大重四五斤及

水行昂頭者不可食夷堅志曰四目者殺人無腮背有白點不可食

發明

頌曰雖有毒却能補人虛損及久勞瘵時珍曰所主諸病其功專在殺虫去風耳與蛇

同類故主治近之昔有人病瘵傳死數人乃取病者寘棺中棄於江以絕後害為漁人所得開視乃一女子也每以一一食之遂愈因為漁人妻張鼎云燒烟熏蚊令化為水熏種及屋舍竹木斷蛙虫置骨於衣箱斷諸蠹觀此則別錄殺虫之說益可證矣

方諸虫心痛

多吐清水冷氣上攻滿悶一淡煮飽食三五度瘥外臺骨蒸

勞瘦

一斤酒二椀煮入鹽醋食之聖惠方腸風下虫方同

膏治諸瘰瘡

耳中虫痛蒸曝乾微炙取油塗白

鱧魚石首魚

駁風即時轉色五七度便愈宗

骨 炙研入藥治疔刺腸風崩帶燒灰傅思瘡燒烟

重痔瘻殺諸虫時

方 一切惡瘡用鰻魚骨炙為末入膏藥中貼之 經驗方

石首魚又名黃花魚 臨海志音魚 鱈魚拾遺 乾者名鱖魚 音想 亦作鱖

甘草合葶菜作羹開胃益氣開寶

蠶 治暴下痢及腹脹開寶

發明時珍曰陸文量云痢疾忌油膩惟白蠶宜食此說與本草主下痢之文相合

頭中石 治石淋水磨服亦燒灰飲服開寶研末或燒

寫舉曰食黃花魚小便必作黃花魚氣可見此物走水道甚速宜乎首中石能治石淋也既走水道其速必補腎故其膠合故紙等藥名魚膠丸又能煖精種子也

鱗介魚虫

研水服羊淋瀝小便不通者汁服鮮砒霜野菌毒母蠱

毒時珍

方石淋諸淋

石首魚頭中石十四枚當歸等分為末水二升煮一升頓服立愈外臺

烏賊魚

又名烏鮑素問墨魚綱目鱘魚日華骨名海蝶蛸

集解

頌曰一一形若草囊口在腹下八足聚生於口旁背上只有一骨厚三四分狀如小舟

形輕虛而白又有兩鬚如帶甚長腹中血及膽正如墨可書字但逾年則迹滅惟存空紙耳時珍曰

一一無鱗有鬚黑皮白肉大者如蒲扇味脆美背骨名海蝶蛸色白脆如通草重有紋以指甲

可刮為末

肉

益人通月經

大明動風吳瑞

石首魚

烏賊魚

七十四

時珍曰：藏陰肝血分藥，常曰：入肝腎血分。昂曰：通血脈，祛寒濕，性能燥膿，收水故瘡。家恃之。

希雍曰：一一入足厥陰，肝經少陰，腎經。厥陰為藏血之臟，女子以血為主，虛則漏。

下赤白或經汁血閉，寒熱癥瘕，少陰為藏。精之臟，主隱曲之地，虛而有濕，則陰蝕腫。

痛虛而寒客之，則陰中寒腫。男子腎虛則精竭，無子。女子肝傷則血枯，無孕。鹹溫入。

肝腎通血脈而祛寒濕，則諸症除。精血足，令人有子也。

不實曰：一一善補益精氣，益精固精。又曰：治瘕瘡。

子按曰：得生地治血淋，得乾薑治血瘕，得鹿茸阿膠治崩中帶下。

唐蔭翳 去痰 殺虫 為血枯 經閉之 要藥

海螵蛸 即烏 鱗骨 鹹微溫 普曰 治女子赤白漏下經閉

陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子 本經 驚氣入腹 痛環臍大

夫陰中腫痛又止瘡多膿汁不燥 別錄 療血崩殺虫 日華

炙研飲服治婦人血瘕大人小兒下痢殺小虫 藏器

器曰投骨於井水虫皆死 治眼熱淚及一切浮翳研末和蜜點之

久服益精有子 孟詵 主女子血枯病傷肝唾血下血治

瘡消癭研末傅小兒疔瘡痘瘡臭爛丈夫陰瘡湯火

傷跌傷出血燒存性酒服治婦人水戶嫁痛同鴉子

黃塗小兒重舌鵝口同蒲黃末傅舌腫血出如線同

槐花末吹鼻止衄同銀朱吹鼻治喉痹同白礬吹鼻

治蝎螫疼痛同射香吹耳治聾耳出膿及耳龍耳時

之才曰惡白及白微附子能淡蘆伏晒縮銀弘景曰

用魚鱗更黃用散曰沙魚骨形相似但以上紋順者是真橫

浸芙蓉者是假以魚酒浸

便可用并煮一伏時入藥

言

發明時珍曰一一厥陰血分藥其味鹹而走血也故血枯血瘦經閉崩帶下痢疔疾厥陰本病也

寒熱瘡疾聾癭少腹痛陰痛厥陰經病也目翳流淚

厥陰竅病也厥陰屬肝主血故諸血病皆治之素

問云有病胸脇支滿者妨於食病至則先開腥臊臭

出清液先唾血四肢清目眩時前後血病名血枯

得之年少時有所大脫血或醉入房中氣竭肝傷故

月事衰少不來治之以四烏鯁骨一蠶茹為末丸以

雀卵大如小豆每服五丸飲以鮑魚汁所以利腸中

及傷肝也觀此則其入厥陰血分無疑矣時珍曰

烏賊魚

七五

張鼎云久服絕嗣無子按本經云主癥瘕無子別錄
令人有子孟詵云久服益精鼎說獨背戾必誤矣若
云血病無多食鹹——亦主血閉故有此說然經
閉有餘不足二症有餘者血滯不足者肝傷烏賊
所主者肝傷血閉不足之症正與素問相合

豈有令人絕嗣之理當以本經別錄為正

方 女子血枯

見發明

赤白目翳

聖惠治傷寒熱毒攻
眼生赤白翳用——

——兩去皮為末入龍腦少許點之日三〇治諸目
翳——五靈脂等分為末熟猪肝蘸食之日二

赤翳攀睛

照水丹治目翳厚者尤效及赤翳攀睛貫
腫用——一錢辰沙半錢研細水飛以

黃蠟少許化和成劑取之臨卧時火上旋丸如黍米
大揉入背中睡至天明溫水洗去未退再用一次即

效 海上血風赤眼

女人多有——二錢銅綠一錢
研為末每用一錢熱湯泡洗 楊氏

家疔眼流淚

——牡蠣等分研為丸鬼子大
每用一丸同猪肝煮食 經驗 小兒

臍瘡 出血及膿 一 一 臍脂
為末油調塗 聖惠
鼻瘡疳 各一錢輕粉

二字為末搽之
錢乙小兒方 **小兒痰** 多年 一 一 末米飲
服一錢 葉氏摘玄 **血淋**

赤苓等分為末每服一錢柏葉車前湯下 經 驗 大
一 一 末一錢生地汁調服 又方 一 一 生地

腸下血 不拘大人小兒臟毒腸風及內痔下血日久
多食易飢先用 一 一 炙黃研末每服一錢

木賊湯下三日後 **卒然吐血** 一 一 末米飲
服臟連丸 直指 下二錢 聖惠 **舌腫出**

血 如線 一 一 蒲黃等分炒
為末傅之 簡便單方 陰囊濕痒 一 一 蒲黃
為粉撲之

醫宗

三方

腹中墨 治血刺心痛醋磨服之 藏器 〇 炒研
醋服亦可

膈 音元諾 膈 又名海狗腎

烏賊魚 膈 膈

〔寫〕今出關東關東人每持為土物相

〔鯢〕遺者問之係魚類故移入魚部本草綱目

目次入獸部

〔希〕雜曰賦溫入腎

陳氏所

言是獸

肺

集解

〔藏〕器曰骨胸獸西番有之狀似狐而大長尾

若鹿形頭似狗長尾每日出即浮水面以弓矢射

取之取外腎陰乾〔頌〕曰今東海亦有之舊說似狐

今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色

有紫斑點醫家多用之異魚圖云試其臍於臘月

盂水中不凍者為真〔數〕曰一一多偽者真者有

一對則兩重薄皮累丸核其皮上自有肉黃毛一

穴三莖狀之器中經年濕潤或置睡犬頭上犬忽

驚跳者為真〔宗〕夔曰今出登萊其狀非犬非獸亦

非魚但前脚似獸而尾即魚身有短密淡青白毛

毛上有深青黑點久則亦淡腹脇下全白色皮厚

鞞可以飾鞍竊似狐長尾之說今人多不識之時

珍曰唐書云骨蝕獸出遼西營州一統志云一一

一出女直及三佛齊國獸似狐脚如犬走如飛取

其腎漬油名一一觀此則似狐之說非無因也

又異物志納獸出朝鮮似狸蒼黑色無前兩足能

捕鼠據此則臚胸有水陸二種陳氏所謂似狐者

希確曰：——得水中之陽氣大溫其味
 與補肝相似第其氣熱耳所主鬼氣尸症
 鬼交狐魅心腹痛中惡邪氣者蓋因真陽
 虛則神明不振幽暗易侵故諸邪惡纏注
 為病此藥補陽氣則陰邪自辟故能治以
 上諸症也誠能入血軟堅溫能通行消散
 故又主宿血結塊及瘰癧癭瘦也
 宋曰此藥血內之品非比草木之燥烈既
 能補肝腎之陽亦能補肝腎之陰

鴛鴦曰時珍謂——即鮑魚魚之可包者
 故字從包可謂繫而不通矣若是則與鮑
 鱗介魚虫

補腎助
 陽為腎
 氣長時
 精寒瘧
 弱之要
 藥

其陸
 類歟

鹹熱治鬼氣尸症夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡

宿血結塊瘰癧癭瘦咸治男子宿癥氣塊積冷勞氣

腎精衰損多色成勞瘦悴藥補中益腎氣暖腰膝助

陽氣日治五勞七傷陰痿少力腎虛背膊勞悶面黑

精冷最良海藥○穀曰酒浸一
日紙裹炙香入藥

發明時珍曰和劑局方治諸虛損有——丸今之
 滋補丸藥中多用之精不足者補之以味也大

抵與從蓉瑣陽之功相近亦
 可同糯米法麩釀酒服之

鮑魚 辛臭溫治墜踠折瘀血下痺在四肢不散者

照肉臍 鮑魚

三七

魚勃蘇何異既列於石首則勃蘇於勃
魚又有——不重出乎今所用之——形
同似無頭足尾之龜有肉無骨塊然一物
名曰——不知是古人所謂——石然以
入血分補陰頗有效近代高手如葉天士
輩性——用之取其味鹹入血分而為補陰
之良品也若如時珍言即今之淡乾魚則
是雜魚果能利腸而治肝傷血枯歟故李
氏集解正誤俱不錄仍俟博物君子正之
王子稷曰入足厥陰經肝

時珍曰——入厥陰肝陽明胃經
希羅旦佐補藥汗經發痘瘡
昂曰瘡家用以消腫潰膿排膿止痛痘疹
家用以發痘疹以能出入陰陽貫穿經絡
達於營分以破邪結也元氣虛者慎用瘡
瘍已潰忌之。一婦人項下忽腫一塊漸
延至頸偶刺破出水一椀瘡久不合有道
士曰此蟻瘻也因飯中偶食蟻得之用——
燒存性傳之立愈

女子崩中血不止別錄煮汁治女子血枯病傷肝利腸見海蟾蛰

同林什葱豉煮羹通乳汁時珍

穿山甲又名鱖鯉別錄龍鯉郭璞石鱖魚

集解時珍曰——狀如鼈而小背如鯉而潤首如鼠而無牙腹無鱗而有毛長舌共喙尾與

身等尾鱗尖厚有三角腹內臟腑俱全而胃獨大常吐舌誘蟻食之曾剖其胃約蟻升許也

鹹微寒有毒治五邪驚喘悲傷燒灰酒服方寸匕別錄

小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及疥癬痔漏大治蟻瘻瘡明

癩及諸疰疾仲章燒灰傳惡瘡又治山嵐瘴癘甄權除痰

瘡寒熱風痺強直疼痛通經脉下乳汁消癰腫排膿

醫界曰瘡屬少陽胆邪伏半表半裏胆與肝為表裏——入肝通經絡則胆亦在所不遺矣且瘡繁陰陽不通是以爭戰而為寒熱往來陰陽通斯寒熱和故——治瘡與用威靈用例

血通竅殺蟲

時珍曰或炮或燒或酥炙醋炙童便炙或油煎土炒蛤粉炒各隨本方

未有生用者仍
以尾甲乃力勝

發明

弘景曰此物食蟻故治蟻瘻時珍曰——入厥陰陽明經古方鮮用近世風瘡瘡科通經下

乳用為要藥蓋此物穴山而居寓水而食出陰入陽能竅經絡達於病所故也劉伯溫多能鄙事云油萸滲漏刮——裏面肉腐投入自至漏處補住入永州記云此物不可於隄岸上殺之恐血入土則隄岸滲漏觀此二說其性之走竅可知矣諺曰——王不留婦人服之乳常流亦言其迅速也李仲南言其性專行散中病即止不可過服又德生堂經驗方云凡風濕冷痺之症因水濕所致渾身上下強直不能屈伸痛不可忍者於五積散加——七片看病在左右手足或臂脇疼痛處即於——身上取甲炮熟同全蝎炒十一箇葱薑同水煎入無灰酒一匙熱服取汗避風甚良

鱗介魚虫

穿山甲

六

方 中風癱瘓

手足不舉用 1 1 左癱用右甲右

蛤如基子大者各二兩為末每用半兩搗葱白汁和成厚餅徑寸半隨左右貼足心縛定浸熱湯中待身

汗出急去藥宜密室行之避風為要半月再行一次忌口遠色調養神效 衛生寶鑑 熱瘡不

寒 1 1 一兩乾棗十箇同燒存性為末每服二錢發日五更井華水下 楊氏家藏 下痢後

重 裏急 1 1 蛤粉等分同 炒研酒服一錢 普濟 腸痔氣痔 出膿血用 1 1 燒存性

一兩肉豆蔻三枚為末每米飲服二錢 甚者加蠟皮灰一兩中病即止 衍義 鼠痔成瘡 腫痛

用 1 1 尾尖甲一兩炙存性鱉甲酥炙 婦人陰癩

一兩射香半錢每服一錢茶服 直指 硬如卵狀隨病之左右五錢沙 湯泉散用

炒焦為末酒下二錢 摘玄 乳汁不通 1 1 1 炙 研酒下方寸匕以油梳 1 乳品乳癩 方同 瘡腫疔毒

乳即通日二 單藥方

時珍曰龜甲補心益腎，曰能通心益腎，故資智。癩瘡老瘡也，或經數年中有瘡，現名瘡母。

昂曰：龜版益陰，最能清熱。昂曰：本草有鹿膠，而不及龜膠，然版不如膠，誠良藥也。合鹿膠一陰一陽，名龜鹿二仙膠。

鱗介魚虫

一燒存性，貝母等分為末，酒服三次。乃用下藥，利去惡物，即愈。鮑氏：瘰癧潰壞。

燒研傳：耳鳴耳聾。一大片以蛤粉炒，蝎梢七箇射香少許為末，麻油化蠟。

和挺子綿裹塞：耳內疼痛。穿山甲二片，夾土狗二箇，同炒焦黃為末，每吹一字。

入耳內亦治：眉鍊癬瘡。油煎粉調塗。直指：腫。

毒初起：每服二錢半酒下。直指方：炮焦為末，入射香少許。

龜：又名玄衣，督部。甲名神屋。本經：敗龜板。日華：將同上。

龜甲甘平有毒。甄權曰：治漏下赤白，破癥結，治痰瘡。

五痔陰蝕濕痺，四肢重弱，小兒顛不合。本經：驚恚氣心。

腹痛不可久立，骨中寒熱，傷寒勞復，或肌體寒熱欲。

穿山甲 龜

廿九

〔鳴皋〕曰治瘡母癥瘕積滯痢疾等症宜用上甲其性帶攻也補陰用下甲其性專于滋補也

〔希雍〕曰經云勿令中濕中濕即有毒以其性神靈能變化中濕則遂其變化之性而成癥瘕于腹中

〔又〕曰氣味俱陰入足少陰經方家多入補心藥用以心藏神借其氣以相通且得水大既濟之義實非補心之正藥也其主骨中寒熱及傷寒勞復肌體寒熱欲死痰瘕者皆陰虛而邪熱為病也此藥補腎家真陰則大氣自降而寒熱邪氣俱除益陰除熱軟堅故主漏下赤白癥瘕五痔陰蝕及小兒頭瘡也經曰邪熱不殺殺熱去故令人能食

〔又〕曰驚甲走肝益腎以除熱菟甲通心入腎以滋陰但驚甲無毒可多用菟甲非自死者則有毒不宜頻使孕婦不宜用病人虛而無熱者不宜用入藥須研極細不爾留滯腸胃成癥瘕

死久服益氣資智使人能食燒灰治小兒頭瘡難燥

女子陰瘡別錄殼主久嗽斷瘡景殼灸末酒服主風腳

弱蕭版治血麻痺日華燒灰治脫肛甄下甲補陰主陰

血不足去瘀血止血痢續筋骨治勞倦四肢無力丹

治腰脚酸痛補心腎益大腸止久痢久瀉主產難消

瘰癧燒灰傳膿瘡時珍○之才曰惡沙參○龜甲鋸去四邊石上磨淨灰水泡過酥灸

黃或酒炙醋灸 猪脂灸或燒用

發明震亨曰敗龜版屬金水大有補陰之功而本草不言惜哉蓋龜乃至陰之物稟北方之氣而生

故能補陰治血治勞也時珍曰龜鹿皆靈而有壽龜首常向腹能通任脉故取其甲以補心補腎補血皆

介眉曰：龜膠功用亦同龜板而性味濃厚尤屬純陰能退孤陽陰虛勞熱陰火上炎吐血衄血肺熱咳嗽消渴煩擾熱汗驚悸諸妄狂躁之要藥然性稟陰寒善消陽氣凡陽虛假熱及脾胃命門虛寒者忌之

中梓曰：龜甲稟北方純陰之氣大有補水以制火之功又曰：大凡滋陰降火之藥多是寒涼損脾胃惟龜甲益大腸止瀉痢使人進食真良品也

泉曰：凡骨蒸勞熱是腎病以腎主骨也龜板入腎滋陰故治骨蒸

以養陰也鹿鼻常向尾能通督脈故取其角以補命補精補氣皆以養陽也乃物理之玄微神工之能事現龜甲所主諸病皆屬陰虛血弱自可心解矣

方 補陰丸 丹溪方 龜板酒炙熟地九蒸九晒各六兩黃柏鹽水浸知母酒炒各四兩猪脊

髓和丸 梧子大 瘡不止 龜板燒存性研酒服 胎產下 空心酒下百丸 方寸匕 海上名方

劑 用龜甲一箇醋炙為末米 飲服一錢日二 經驗 催生 秘錄用龜甲燒研酒服口摘立治產

難三五日不下垂死及交骨不開用龜甲一箇酥炙婦人頭髮一握煨灰川芎當歸各一兩每服七錢水煎如人行五里再服

七錢生胞死胎俛下

內 釀酒治大風四肢拘攣癱瘓 恭 治筋骨痛及二

十年寒嗽止瀉血 時 珍

時珍曰——色赤入心

方 十年效嗽 用生龜三箇去腸以水五升煮取三升浸麴釀秫米四升酒成如常飲之

令盡二十年 嗽皆可愈 勞瘵失血 葱椒醬煮食甚效 吳球

尿 以猪鬃刺其鼻即尿出 滴耳治聾 藏器 點舌下治大人中風

不語 時珍

毒瑁 又名玳瑁 音代昧 又音毒目

集解 藏器曰——生嶺南大如扇似龜甲中有文士良曰身似龜嘴如鸚鵡時珍曰范成大虞

衡志云——狀如龜鼈而殼稍長背有甲十二片黑白斑文相錯而成其裙邊缺如鋸齒無足而有四鬣前長後短皆有鱗斑文如甲海人養以鹽水飼以小魚又顧玠海槎錄云大者難得小者時有之老者甲厚而色明小者甲薄而色暗取時倒懸以滾醋潑之則甲逐片應手落下頌曰入藥瀕

希雅曰：一、蠱類也。解一切執毒其性最靈。凡遇飲食有毒，則必自動搖然。須生者乃靈，死者則不能矣。人中蠱毒，則昏憤悶亂，九孔流血而死。惟用活一刺其血飲，或生者磨汁服，可解。又能解痘毒神效。

鱗介魚虫

用生者今人多用雜龜筒作器皿，皆殺取之。又經者拍故生者難得。

申 甘寒解嶺南百藥毒歲破癥結消瘰毒止驚癩

日 療心風解煩執行氣血利大小腸士磨汁服解蠱

毒佩之辟蠱毒燕解痘毒鎮心神急驚客忤傷寒熱

結狂言時珍曰宗奭曰入藥生用經湯火即不堪用與生熟犀角同義

發明時珍曰一解毒清熱之功同於犀角古方不用至宋時至寶丹始用之

方 解蠱毒生磨濃汁服一盞預解痘毒遇行時服此未發可

內消已發可稀少生一生犀角痘黑陷乃心血凝也用生一

磨汁和勻服半合日三靈苑許紫草湯五匙和勻溫服 痘疹論

玳瑁 鱉 鱗

本寶曰肝脾腎血分藥

時珍曰厥陰肝經血分藥

昂曰瘡必兼暑邪類多陰虛之人瘡久不愈元氣虛羸邪陷中焦則結為瘡母

能益陰除熱而散結故為治瘡要藥

鳴皋曰亦治瘡後痢性近龜上甲補中帶

攻

鳴皋曰味鹹故能軟堅性破瘀活血故能散結其治癥瘕堅積痞痞疾者軟堅之功也

其治血癥經脈不通產難症者破瘀活血之功也至於瘡邪必兼暑濕暑濕之氣乘

人陰虛而中之混處氣血之中不能分解補陰之藥多滯補氣之藥不能達病所故

用一既能補陰又能活血而散結所以為治瘡之要藥

中梓曰一能行瘀血補新血

希雍曰仲景一煎丸治瘡母之要藥

得牛膝當歸佐以橘皮首烏知母麥冬治久瘡

同知母石膏冬貝母竹葉治溫或眼蟹瘡熱其瀉甚若瘡熱甚瀉甚又寒甚汗多

甲藥犯

用童便煎盡一斗二升乃去裙留骨搗粉用時珍曰

蟹甲亦時珍曰之才曰惡攀理頌曰入藥以醋炙黃用數日

要綠色九肋重七兩者為上若治癥塊定心藥用頭

醋大火煎盡三升乃去裙取骨炙乾用若治勞去熱

用童便煎盡一斗二升乃去裙留骨搗粉用時珍曰

鱉 又名神守 淮南子河伯從事 古今注俗名團魚脚

鱉甲 鹹平治心腹癥瘕堅積寒熱去痞疾瘕肉陰

蝕痔核惡肉 本經 治溫瘡血癥腰痛小兒脇下堅別宿

食癥塊瘰癧冷癥勞瘦除骨熱骨節間勞熱結實癰

塞下氣婦人漏下五色下瘀血 日補陰補氣 震除老

瘡 母陰毒腹痛勞復食復斑痘煩欬小兒驚癇婦

人經脈不通難產之後陰脫丈夫陰瘡石淋斂潰瘰

癧

癧

癧

發時指甲色黯狀若欲死并加桂枝有神效得青蒿麥冬五味地黃甘杞牛膝治骨蒸勞熱甚則加銀柴胡地骨皮胡黃連

平梓曰龜鱉皆主養陰滌熱一色青故

入東方而理肝家諸症色甲色黑故走北方而理腎經諸症

希雍曰孕婦忌之胃弱及嘔惡等症不宜用

介宥曰取活鱉大者去肉用醋煮乾火用若者熟骨露者不堪用

鱗介魚虫

之遂成 監殺

衛生寶鑑云凡一以煨竈灰一斗酒五升浸一夜者令爛如膠用更佳柴灰尤妙

發明 宗奭曰經不言治勞惟藥性言治勞瘦骨蒸故虛勞用之然甚有據但不可過劑耳時珍曰一

乃厥陰肝經血分之藥肝主血也嘗思之鱉色青入肝故所主者瘡勞寒熱疰癖癥瘕驚癇經水滯腫陰瘡皆厥陰血分病也瑋瑋色赤入心故所主者心風驚熱傷寒狂亂瘧毒腫毒皆少陰血分之症也秦龜色黃入脾故所主者頑風濕痺身重蠱毒皆太陰血分之症也水色黑入腎故所主者陰虛精弱腰脚酸痿陰冷洩痢皆少陰血分之病也介虫陰類故並主陰經血分之病從其類也

方 老瘡勞瘡 醋炙研末酒服方寸匕隔夜一服清早一服臨時一服無不斷者入

雄黃少許更妙 肘後 奔豚氣痛 上銜心腹一醋炙三兩三稜煨二兩桃仁四兩湯浸研

汁三升煎二升入各藥末煎良久下醋一升煎如飴以餅水之每酒服半匙 聖濟 血瘕 甄權

龜

八三

一 琥珀大黃研末等分酒服二錢少時惡
血即下若婦人小腸中血下盡即休服也 產難

燒存性研末酒服方 勞復食復 篤病初起受勞傷食
寸立出 梅師 致復者欲死 燒

研水服 小兒癩疾 一錢 炙研乳服 卒 腰痛 一 炙
肘後 子母錄 研酒服

肘 沙石淋痛 一 醋炙研末酒服方寸 吐血不止
後方 日三石出瘥 同上

一 蛤粉各一兩同炒色黃熟地 斑痘煩欬 小便不
焙一兩共為末每服二錢 聖濟 利者

一 二兩灯心一把水一升 瘰疽不斂 一 燒存性研
煎六合分二服 麗安時 搽之甚妙 李

樓怪症 腸瘕內痛 一 燒存性研末水 陰頭生瘡 人
奇方 服一二錢 傳信方

能治者 一 燒存性研 雞子白和傳 千金翼

鱉肉 甘平治熱氣濕痺腹中激熱煮食當微泄 器 歲

治婦人漏下羸瘦孟治帶下腰痛血疲日補虛久食

性冷種補陰震治久痢作丸服治虛勞瘵癰脚氣時

馮泉曰藏器曰禮記食鱉去醜謂項下有軟骨如龜形食

鼻一殺之令人患水病凡鱉三足者赤足者獨目者頭足不

者殺人縮者其目四陷者腹下有王字卜字文者腹有蛇文

以雜者者並不可食殺人弘景曰忌菟菜同食令人生鱉瘕

林泉則不可合鴉子食思邈曰不可合猪兔鴨食損人合芥

雞即變子食生惡瘡孕婦食之令子短項時珍曰三元參贊

為蛇云一一性冷發水病有冷勞氣癥瘕人不宜食生

李九華編言鱉性熱戴原礼言鱉之陽聚于上甲久食令人

生發背似與性冷之說相反盖一一性本不熟食之

言薄荷者和以椒薑熱物太多失其本性耳李九華云一一

毒能害人主聚鱉

甲主散

方 骨蒸咳嗽 潮熱團魚丸用團魚一箇柴胡前胡

貝母知母杏仁各五錢同煮熟去骨

鱉 鱉

甲裙再者食肉飲汁將藥焙末仍以骨甲裙煮
汁和丸梧子大黃芪湯下三十九日二 奇效 寒濕

腳氣 蒼木尋風藤各半斤煎至七升去渣重蒸浸洗

神效 乾 瘰癧氣塊 用大蟹一枚以蚕涎一斗柴

坤生意 灰一斗淋汁五度同煮如泥去

骨再者煮成膏搗丸梧子大

每服十九日三 聖惠

蟬又名螃蟬蟹譜郭索揚雄方言橫行介士蟹譜無

臍寒有小毒治胸中邪熱結痛喝僻面腫能敗漆燒

之致胤 本經曰弘景曰以黑犬血 解結散血愈漆瘡

養筋 產後腹痛血不下者以酒食之筋骨折傷者

生搗炒署之 能繼絕筋骨去殼同黃搗爛微炒納

入瘡中筋即連也藏小兒解顱不合同白及末搗塗

以合為度宗鮮鮮魚毒治瘡及黃疸搗膏塗疥瘡癬

瘡搗汁滴耳聾時珍曰孔景曰未被霜云食水菖所

腹下有毛腹中有骨背有星點足斑目赤者並有毒

害人冬瓜汁紫蘇汁蒜汁蘆根汁皆可解之時珍曰孕

婦食之令子橫生宗奭曰此物極動風疾人不可

食屢驗時珍曰不可同柿及荊芥食發霍亂動風木

香汁可解生于波池田港中故有毒令人吐下生沙

穴中見人便走者沙狗也不可食兩螫極小如石者

蚪江也不可食生溪澗石穴中小而殼堅赤者石蟹也野人食之

發明慎微曰食鮮中毒者食一即解性相畏也沈括

鱗介魚虫

鱗石蟹

八十四

臬曰蟹性鹹寒足少陰經兼入足厥陰
肝經性能散血故能治折傷而續筋骨以
性銳利尤能破血而入下焦其性帶攻故
治血閉墜胎尤效

方 濕熱黃疸

燒存性研末酒糊丸梧子大每
服五十九丸白湯下日二 集簡
骨

節離脫

生一搗爛以熱酒傾入連飲數椀其渣塗
之半日骨內各一有聲即愈 唐珣經驗

蟹瓜

破胞墮胎

破宿血治產後血閉酒及醋湯

煎服良

能安胎

墮生胎下死胎辟邪

時

方 千金神造湯

治子死腹中并雙胎一死一生服
之令死者出生者安此神方也用

一升甘草二尺東流水一斗以葦薪煮至二升

瀝去渣入真阿膠三兩令洋頓服或分二服若困不

能服者灌

胎上搶心

胡洽有

下胎蟹瓜散

治孕婦有病欲去胎

入即活 用一二合桂心瞿麥各一兩牛膝二

兩為末空心溫酒服一錢 千金方

石蟹

生溪澗石穴中
小而殼堅赤者

搗傳久疽瘡無不瘥者

龍

〔果曰〕——鹹能軟堅故能祛痰消積頗近
海帶海藻同乎膈者食名雪羹能消痰積
而治肝氣

鱗介魚虫

發明

〔時珍曰〕夷堅志云一盜被生漆塗兩目不能覩
物有村叟令尋——搗碎濾汁點之則漆隨汁

出而瘡愈也用之果明如

初漆之畏蟹莫究其義

海蛇

〔音宅作二音〕又名水母拾遺樗蒲魚同上石鏡異苑〔時珍曰〕
今訛為海折或作蜡鮓者並非

集解

〔藏器曰〕——狀如血蛭大者如床小者如斗
無眼目腹胃以蝦為目蝦動蛇沉故曰水母

目蝦〔時珍曰〕水母形渾然凝結其色紅紫下有物

如懸絮羣蝦附之啞其涎沫浮汎如飛為潮所擁

則蝦去而蛇不得歸人因割取之浸以石

灰礬水去其血汁其色遂白生熟皆可食

鹹温治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷

藏器

療河魚之疾

〔時珍曰〕出異苑

蝦

海蛇 蝦

十五

甘温有小毒治赤白遊腫搗傅之

孟詵

托痘瘡下乳汁

壯陽道煮汁吐風痰搗膏傅虫疽

時珍曰弘景曰無積及腹下通黑并

者之色白者並不可食昂曰動風發

瘡疥冷積源曰動風熱有病人勿食

方 蟹假

類編云陳拱病蟹假隱見於皮內痛不可忍外醫洪氏曰可以鮮一作羹食之久

久痛止明年又作再如

前治法而愈遂除根

補腎興陽

米一斤蛤蚧二枝茴香蜀椒各四

兩並以青鹽化酒炙炒以木香粗末一兩和勻乘熱收新瓶中密封每服一匙空心鹽酒下甚妙 宣

吐風痰

用連殼一斤入薑醬煮汁先吃後吃汁以驚翎探吐痰涎良

賺瘡生虫

小一三十箇去頭足殼同糯米飯研爛隔紗貼瘡別以紗罩之一夜解下掛看皆是小赤虫即以葱椒湯洗淨用舊茶萋內白竹葉隨大小剪貼一日二換待汁出盡逐日煎苦棟根湯洗之以好膏藥貼之將生

好古曰一一入足少陰腎經血分昂曰肝腎血分藥

鱗介魚虫

化痰散
空清熱
除濕飲
汗同稍
同大小
腸

好肉勿換膏藥

忌發物 直指

血風腫瘡

生一黃丹搗和貼之日一換 集簡

牡蠣

又名牡蛤別錄 蟻蛤 本經 古貴 異物志 蟻 時珍曰海氣化成純雉無雌故名牡

集解

弘景曰以大者為好其生著石皆以口在上 藥以腹向南視之口斜向東則是左顧但多

右顧不堪用也 頌曰海旁皆有而通泰及南海閩

中尤多皆附石而生硯礪相連如房呼為蠣房初

生止如拳石四面漸長至一二丈者巖巖如山俗

呼蠟山每一房內有肉一塊大房如馬蹄小房如

人指面每潮來諸房皆開有小虫則合之以充腹

海人取者皆鑿房以烈火逼之挑取其肉味美好

更有

益也

鹹平微寒治傷寒之熱温瘧洒之驚恚怒氣除拘緩

崩瘕女子帶下赤白殺邪鬼 除留熱在關節營衛

牡蠣

六六

虛熱去來不定煩滿心痛氣結止汗止渴除老血療

神精澀大小腸止大小便治喉痺欬嗽心脇下痞熱

別錄粉身止盜汗同麻黃根蛇床子乾薑為粉去陰汗

藏器治崩中止痛除風熱風瘡鬼交精出孟說男子虛勞

補腎安神去煩熱小兒驚癇李恂去脇下堅滿瘰癧一

切瘡好古化痰栗堅清熱除濕止心脾氣痛痢下赤白

濁消疝瘕積塊癭疾結核時珍之才曰貝母為使

良惡麻黃辛夷吳茱萸穀曰鹽水煮一伏時再煨研

粉用時珍曰亦有以童便浸四十九日五日一換取出以黃泥固濟煨過用

宗奭曰亦有生用者

昂曰貝母為使能消積結

不實曰同白木燥脾利濕同大黃消癭腫

同熟地固精氣止遺洩

希雅曰同黃柏五味地黃山茨杞子牽前
 子沙苑蒺藜蓮頭杜仲治夢遺加牛膝則
 兼治赤白濁 同地黃：柏阿膠木耳必
 黑香附白芍地榆川斷青蒿寧甲蒲黃止
 崩中下血及赤白帶 仲景方同龍骨入
 柴胡桂枝各湯內取其收斂浮越之陽氣
 固脫而鎮驚更能除胸脇中痞硬
 泉曰：一雞為聖可去脫之劑若末服又
 有重積之義

鱗介魚虫

發明

權曰病虛而多熱者宜同地黃小草用之好古
 曰：一入足少陰為軟堅之劑以柴胡引之能
 去脇下硬以茶引之能消項上結核以地黃引之能
 消股間腫以地黃為使能益精收瀉止小便腎經血
 分之藥也成無己曰：一之醜以消胸膈之滿以洩
 水氣使痞者消硬者軟也元素曰壯水之主以制陽
 光故渴飲不思蓋蛤
 蠃之屬能止渴也

方

心脾氣痛

氣實有痰者一服粉
 酒服二錢 丹溪心法

瘧疾寒熱

粉杜仲等分為末蜜丸梧子大
 每服五十九丸溫水下 普濟
氣虛盜汗 同上方為
 末酒下方

寸匕

虛勞盜汗

粉麻黃根黃芪等分為
 末每用二錢水煎服 本事
產後

盜汗

粉麥麩炒黃等分每服
 一錢猪肉汁調下 經驗
消渴飲水 一黃

煨研末每服錢許活鯽魚
 湯下二三服即愈 經驗
百合變渴 傷寒傳成百合
 病如寒無寒如

牡蠣

分七

熱無執欲卧不卧欲行不行欲食不食口苦小便赤
得藥則吐利變成渴疾久不瘥者用一炒二兩枯

棗根二兩為末每服方寸匕
日三米飲下 金匱玉函方 病後常飢 小勞即作一
十分石膏

五分為末酒下方寸匕
亦可丸服日三 肘後 小便淋閉 服血藥不效者一
黃相等分為末

每服一錢小茴香
湯下 醫學集成 小便多數 升煎二升分服神效

乾坤 生息 夢遺便糖 粉醋九梧子大米飲
下三十九日二 丹溪 水病囊腫

如大乾則再上小便利即愈一方用葱汁白麩同調

小兒不用乾薑 月水不止 粉醋和團再煨研末
初虞世方 以米醋調艾葉末煎膏丸

醋湯下四五 普濟 金瘡出血 粉傳 癰腫未成 用此拔
毒水調

姚氏集驗方 粉塗頻換 療癰 經驗用一煨研四兩元參末
三兩麩糊丸梧子大每服三十

好古曰——腎經血分藥常曰亦肝腎血分藥與牡蠣同功高舉曰牡蠣能滑小便——能利小便為異耳

鱗介魚虫

丸酒下日三〇初虞世云瘰癧不問已破未破——四兩甘草一兩為末食後臘茶調下一錢其效如神

蛤粉時珍曰長者曰蚌圓者曰蛤大抵海中蚌蛤性味鹹寒功能軟堅江湖蚌蛤無鹹水浸漬但能

清熱利

濕而已

鹹寒治熱痰濕痰老痰頑痰疝氣白濁帶下同香附

木薑汁調服主心痛丹溪清熱利濕化痰飲定嗽止

嘔逆消浮腫利小便止遺精白濁心脾疼痛化積塊

解結氣消癭核散腫毒治婦人血病油調塗湯火傷

時珍曰震亨曰燒煨或粉用不入煎劑時珍曰吳球云凡用——取紫口蛤蚧殼炭火煨研粉用熟瓜萎

連子同搗和成

團風乾用最妙

蛤粉文蛤海蛤

六八

于接曰得滑石甘草芒消治傷寒血結

發明

震亨曰一一能降能消能軟能燥時珍曰寒制火而鹹潤下故能降為寒散熱而鹹走血故能

消為堅者軟之以鹹取其屬水而性潤也濕者燥之以滲取其經火化而利小便好古曰一一乃腎經血分之藥故所主

濕敷腎滑之疾

方氣虛水腫

一人患腫垂死諸醫不效或以大蒜十枚搗如泥入一一丸梧子大食前

白湯下二十九丸服盡小

便下數桶而愈

普濟

心氣痛

真一一炒過佐以香附末等分白湯滓服

聖遺精

潔古曰陽盛陰虛故精洩也真珠粉丸主之一一煨一斤黃柏炒一斤為細末丸梧

子大每服百丸空心溫酒下日二一一

雀目

黃為末

味鹹能補腎黃柏苦而能降心火也

油蠟化和丸皂子大納猪腰子

咳嗽不止

白蠟殼研粉米飲調

內紮定蒸熟食之

儒門事親

服甚效

聖惠嗽不得

宋徽宗妃痰嗽面腫不寐李防禦藥治之不效當誅李技窮聞市人賣

救藥一文一貼色淡碧吃了得睡李市之恐藥猛先

自試無害併三帖為一以進妃嗽止得卧面腫消帝

悅賜萬金李求其方乃此肝腎二經少加

青黛也淡蘆水加麻油數滴調服

文蛤 又名花蛤 ○弘景曰大小皆有紫斑

鹹平治患瘡蝕五痔本經治欬逆胸痹腰痛脇急羸痿

出血女人崩漏別錄止煩渴利小便化痰軟堅治口鼻

疔蝕 時珍曰修治同蛤粉

發明 時珍曰或無已云一之賦走腎以勝水氣

方傷寒文蛤散 仲景云病在陽當以汗解反以冷水之或灌之更益煩熱欲水不

渴者此散主之一五兩為末每服方寸匕沸湯下其效疔蝕口鼻數日欲盡一燒灰以臘

蛤粉文蛤海蛤

猪脂和塗之

千金翼

海蛤

集解

時珍曰沈存中筆談云——即海邊沙泥中得之大者如碁子小者如脂麻粒黃白色或黃赤相雜乃諸蛤之殼為海水磨礮日久光瑩都無僑質不能分別其為何蛤故通謂之——也

苦鹹平治欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱本經療陰痿

別錄主十二水滿急痛利膀胱大小腸唐本治浮腫下小

便消癭甄權治嘔逆胸脇脹急腰痛崩帶日華清熱利濕去濕之效

化痰飲消積聚除血痢婦人血結胸傷寒反汗搖擗

中風癰瘰

時珍曰之才曰蜀漆為使畏狗胆甘遂羌花保昇曰取得以半天河水煮一日以枸

杞汁拌勻入篋竹筒
內蒸一伏時搗用

方 水癰腫滿

藏器曰用一粉杏仁模防己棗肉
各二兩葶藶子六兩為末丸梧子大

服十九服至

水腫發熱

小便不通者一湯主之
木通猪苓澤瀉滑石黃葵

利下水為妙

子桑白皮各一錢燈

石水肢瘦

腹獨大者一丸主
之煨防己各七

心湯煎服 聖惠

錢半葶藶子赤茯苓桑白皮各一兩槁

皮郁李仁各半兩蜜丸服

聖濟總錄

氣腫水腫

海帶海藻昆布海螵蛸鳧朮

血痢內熱

一末蜜服
二錢 傳信

荔枝殼等分煎

何氏方

傷寒血結胸

脹痛不可近仲景無方宜一散主之
并刺期門一滑石甘草各一兩芒消

半兩為末每服二錢雞子清調服更服桂枝紅花湯

發汗則愈蓋膈中血聚則小腸壅血不行服此則小

腸通血行而胸膈利

中風癱瘓

方見穿
山甲 衄不止 粉一

矣 朱肱活人書

石決明

九十

昂曰能清肝肺。又曰古方多用治瘡疽。
希雅曰足厥陰肝經藥。

希雅曰鹹寒入肝除血熱入腎滋陰

戰包服
五十兩
水不得
食山龜
內犯之
畏日

兩羅七遍槐花半兩炒焦研勻每

服一錢新汲水調下 楊氏家藏

石決明

又名九孔螺 日華 殼名千里光

集解

宗奭曰登萊海邊甚多殼大如手小者如三
兩指大可以浸水洗眼七孔九孔者良十孔

者不佳海人亦噉其肉時珍曰一一形長如小

蚌而扁外皮甚粗細孔雜雜內則光耀背側一行

有孔如穿成者生於石崖上海人泗水

乘其不意取之否則紫粘石上難脫也

鹹平

保昇
曰寒

治障翳目痛青盲久服益精別
錄治肝肺風

熱青盲內障骨蒸勞極

李珣

水飛點障翳

氏

通五淋

時珍

○惡旋覆花以鹽同東流水

煮一伏時研細水飛入藥

方 蓋明怕日

黃菊花甘草各一
錢水煎冷服 明日集驗

痘後目翳

今俗名
瓦楞子

魁蛤

又名蚶 郭璞 魁陸 別錄 瓦屋子 嶺南錄 瓦壘子

定少頃即不酸
研末投熱酒中蓋

為末以猪肝披開入藥紮定瓦器煮熟
以氣重日待冷食肝飲汁 龍木論 解酒酸 燒

即加朽木末五分 勝金方 青盲 兩蒼朮三兩去皮

錢日二服如淋中有軟硬物
末猪肝煮熟蘸食 鴻飛集 五淋 去粗皮為
末飛過熱水服二

集解

別錄曰 一 生東海正圓兩頭空表有文係
昇曰 今出萊州形圓長似大腹楸榔兩頭有

孔 藏器曰 殼如瓦屋時珍曰 郭璞云 魁陸即今之

蚶也 狀如小蛤而圓厚臨海異物志云 蚶之大者

徑四寸背上滿

文似瓦屋之壘

殼 甘酸平燒醋淬醋丸服治一切血氣冷氣癥癖

魁蛤 車集

九十一

時珍曰入厥陰肝鳴泉曰亦入心鎮心

日消血塊化痰積丹連肉燒存性研傅小兒走馬牙

疔有效

時珍曰日華曰燒醋淬
三次出火毒研粉用

發明

時珍曰一賦走血而軟
堅故能消血塊散痰積

車渠

又名海扇

今六品
官以作
帽頂

集解

時珍曰一一大蛤也大者長二三尺厚二三寸殼外溝壑如蚌殼而深大皆縱文如瓦溝

無橫文殼內白哲如玉番人以篩器物類玉石楊
慎丹銘錄云一一作孟注酒滿過一分不溢果然

殼 甘鹹大寒解諸毒藥及虫螫同玳瑁等分磨人

乳服之極驗

李珣曰時珍曰一一即瓦壘
之大者故其功用亦仿佛

珍珠

帝雍曰心虛有熱則神氣浮越肝虛有熱則目生浮翳膜障除二經之熱故能鎮心除目翳也

鹹甘寒鎮心點目去翳開寶磨翳墜痰甄權合知母治煩

熱消渴李珣除小兒驚熱宗奩安魂定魄止遺精白濁解

痘疔主產難下死胎胞衣時珍曰入藥不用首飾及見尸氣者以人乳

浸三日煮過研極細用又法以絹袋盛入豆腐腹中煮一炷香研用珣曰研不細則傷人臟腑

發明時珍曰入厥陰肝故能安魂定魄明目治聾

方安魂定魄一末豆大一粒辛忤不言一末

和丸小豆大以三四密和服婦人產難一末一兩酒胞衣

粒納口中同上子死腹中一末二兩酒痘疔方

不下一末一兩醋服同上肝虛目暗一末一兩白蜜二合鯉魚胆二枚

疏豆一末一兩白蜜二合鯉魚胆二枚和勻銅器煎至一半綿濾過瓶盛頻

麟介魚虫

珍珠田螺

九十二

點取瘡
見聖惠方
青盲不見
同上

田螺
別錄作田蠃

肉 甘大寒治目熱赤痛止渴
別錄煮汁療熱醒酒用

珍珠黃連末內入取汁注目止痛
弘景煮食利小便

大便去腹中結熱目下黃脚氣衝上小腹急硬小便

赤澀手足浮腫生浸取汁飲之止消渴搗肉傅熱瘡

藏 壓丹石毒
孟詵 洗利濕熱治黃疸搗爛貼臍引熱下行

止禁口痢下水氣淋瀝取水搽瘡及胡臭燒治瘰癧

癬瘡
時珍

方消渴

小便數者一五升水一斗浸一夜渴即飲汁每日換螺及水煮汁飲亦妙 心鏡

點目赤

見大註

肝熱目赤

於殼內取汁點之 藥性論

爛弦風眼

入銅綠取汁點之

小便不通

腹脹如鼓大一枚鹽半匕搗敷臍下

一寸三分效能彥誠曾患此得此方善然暴下而愈 類編

禁口痢

大一二枚搗入射香三

分作餅烘熱貼臍間半日熱氣下行即思食矣 丹溪方

反胃嘔噎

一洗淨水養待出泥澄

取晒半乾九梧子大每服

水氣浮腫

大一一大蒜車前子等分搗膏

三十丸藿香湯下 經驗 攤貼臍上水從便旋而下象山民病此得方即愈 稗史

酒疸諸疸

一一水養吐去泥搗爛入

好酒瀝汁飲之日 三服極效 壽域 脚氣攻注

搗大一傳兩股便覺冷趨至足而安又可傳

丹田利小便 極效 稗史

痔漏疼痛

冬瓜湯洗淨用大一筒入水片一分取水搽之亦有

田螺

九十三

用白礬末者

乾坤生意

殼 甘平燒研主尸症心腹痛失精止瀉別錄爛者燒

研水服止反胃卒心痛器爛殼研細末服止下血小

兔驚風有痰瘡瘍膿水時珍

方 心脾痛 不止者水甲散主之用田螺殼溪間者亦可以松柴層之壘上燒過火吹去松

灰取殼研末以烏沈湯寬中散之

類調服二錢不傳之妙 集要 小兒急驚 遠年白田螺殼

燒灰入射香少許

水調灌之 普濟

蝸牛 又名蝸牛時珍藥性蝸蝓爾雅蝸蝓同上山蝸弘景蝸蝓山海經作保累土牛兔俗名大明曰此即

負殼蝸

揚雄方 言蜘蛛 亦謂之 蝸蝓音 移猶

蚰也

希雍曰其氣大寒非真有風熱者不宜用
[昇]曰經云治賊風鳴僻古人必有用法惜
無所考希雍經疏所解殊為勉强故不錄

鹹寒治賊風鳴僻踈跌大腸脫肛筋急及驚癇別錄生

研汁飲止消渴甄權小兒疳風撮口利小便消喉痹止

血通耳聾治諸腫毒痔漏塗蜈蚣蝎毒李時珍曰須
日久雨乍晴

林治開墻陰處多有以大
而圓者為勝小者無力

發明頌曰入小兒藥最勝時珍曰一
所主大抵解熱消毒之功多

方 小便不通 一 加射香少許搗 大腸脫肛 一 兩
貼臍下妙 簡易

燒灰猪脂調傅立縮。又治上症及痢後脫肛乾
一 百枚炒研每用一錢以飛過慈石末五錢水煎調

一 末 痔瘡腫痛 丹溪用 一 浸油搽之。濟生用
射香納 一 內化水取塗之效

發背初起 一 二百箇新汲水一盞瓶封一夜取涎
水入真蛤粉調塗日數度熱痛止則瘡

鱗介魚虫

蝸牛 蜂蜜

九十四

集
驗 瘰癧已潰 燒研輕粉少許
瘰癧腫塞 危氏 喉痺腫塞 枝白梅

肉三枚研爛含 又方 取點之 唐氏方 喉痺口噤

炙二七枚白梅肉炒二七枚白礬半生半燒 赤白膜

翳 一箇搗入朱砂末火上 撮口臍風 乃胎熱也

取汁塗口 消渴引飲 夜取水飲一劑即愈 崔元亮

海上 耳聾 一兩石胆鍾乳乳粉各二錢半為末 固濟大煨研末入冰片少許油調滴入即

愈 聖 惠方

蜂蜜 生巖石者名石蜜 本經石飴 同上

甘平 時珍曰生 涼熱溫 益氣補中解毒止痛和百藥 本經養脾

氣除心煩止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目別錄治牙疳

齒羸唇口瘡點目中赤翳殺虫歲治卒心痛及赤白

痢作漿頰服一椀止渴或以薑汁同水和頰服甄權治

心腹血刺痛及赤白痢同生地黄汁各一匙服血即

下孟同薤白搗塗湯火傷即時痛止宗奭○肘後用

說和營衛潤臟腑通三焦調脾胃時珍○思邈曰

芑同食令人利下食蜜飽後不可食鮮令人暴亡宗

藥曰多食亦生諸風震亨曰蜜入脾西北高燥宜食

之東南卑濕多食則害生于脾時珍曰

多食亦生濕熱虫蠱小兒尤當戒之

發明時珍曰——入藥之功有五清熱也補中也解

毒也潤燥也止痛也生性涼故能清熱熟性温

九十五

鱗介魚虫

故能補中甘而和平故能解毒柔而潤澤故能潤燥
甘緩可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛甘緩可
以和中故能調和百藥與甘草同功仲景治陽明結
燥大便不通蜜導煎誠千古神方也孟詵曰但凡覺
有熱四肢不和即服蜜漿一椀
甚良與薑汁熬膏治癩甚效

方 大便不通

傷寒論云陽明病自汗小便反利大便硬者津液內竭也蜜煎導之用蜜

銅器熬令可丸乘熱捻作挺子令頭銳長寸許冷即
硬納穀道中少頃即通或加皂角細辛末少許效

尤 產後口渴

鍊蜜不拘多少水調服良 產寶 難產橫生 各半椀煎

減半服即下海上

天行瘡瘡

有病天行斑瘡頭面及身須臾週匝皆帶白漿隨決隨生不即

瘡數日即死世人云建武中南陽擊虜所得呼為虜
瘡以好蜜摩瘡上再以蜜煎升麻數匕拭之 財後

瘡 痂作瘡

抵成瘡百花香膏用好一湯和時以翎刷之其痂易落全幼心鑑 口瘡

鳴皋曰：一淡而無味，綱目云補中心頗疑之。及見古方威喜丸云治元陽虛，隱而為遺濁帶下者，更不喻其理。久乃悟曰：此所謂天道好澆也。一性味緩澆，能久留於中，威喜丸以茯苓、楮苓之誘引，一之潛入於下焦，澆故能補久留，即是補功能。續絕傷所以能補下焦之元陽虛，隱而止濁帶也。大抵濁帶，摠係下焦虛，滑下焦虛，滑則精華走洩，而元精愈傷。若以草木血肉之品補之，不過假其無形之性味耳。每難久留，故難奏功。一能澆而久留以補鱗介魚虫。

浸大青葉含之
良藥性論
五色丹毒
和乾薑末
湯火傷
白

一塗之
梅師
疔瘡惡腫
生一與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五里則疔出後以醋湯

溫洗去
濟急仙方
大瘋癩瘡
白一一斤生薑二斤搗汁同入銅鑊中微火煎之薑汁共蜜

煎至一斤則藥成矣患三十年者平旦服棗大一丸日三服酒下忌生冷滑臭物食療

黃蠟
本經名蜜蠟

甘微溫主下痢膿血補中續絕傷金瘡
本經曰權曰和松脂杏仁

棗肉茯苓等分為丸服五十九丸便不飢頌
曰古人歲荒食蠟度飢合大棗嚼即易爛治孕婦胎

動下血不絕欲死以鷄子大煎沸投美酒半升服立

瘥
甄權曰之才曰
慈芫花齊蛤

黃蠟

之所謂以有形補有形也且其瀉亦非若
粟殼木瓜之欬滯

王子孫曰——功專調氣

鳴皋曰再觀治胎動下血及瀉痢亦是甘
瀉之功本經云續絕傷其治胎動下血是
續帶脉之絕傷也其治瀉痢是續腸胃之
絕傷也其治帶濁是續腎經之絕傷也同
蛤粉治肺虛咳嗽是續肺經之絕傷也治
金瘡及欬瘡生肌是續皮膚之絕傷也然
則續絕傷三字內外同一理也然以上諸
病初起而未甚傷者不宜驟用

鳴皋曰古人用巴豆硝沙等藥慎其速下
用蠟置之用香燥等藥慎其上借傷肺以
蠟置之皆妙法也

鼻曰調氣二字頗不得其解——留滯之
物何能調氣嘗思之患痢過重大腸已虛
氣隨下陷氣不能舉愈不能運故小腹痛
不可忍此時欲補氣則和銅參朮毫不
投惟用——瀉以止脫阿膠補陰微兼補
氣使入腸胃留住下陷之氣故云調氣也

發明時珍曰味甘於蜜莫淡於蠟蜜之氣味俱厚
屬陰故養脾胃之氣味俱薄屬秋故養胃厚者

味甘而性緩質柔故潤臟腑薄者味淡而性瀉質堅
故止洩痢仲景治痢有調氣飲千金治痢有膠蠟湯
其效甚速蓋有見於此歟又華佗治老少下痢食入
即吐用白蜜蠟方寸匕鴉子黃一箇石蜜苦酒髮灰
黃連末各半鴉子殼先煎蜜蠟鴉子苦酒四味令勻
乃納髮灰熱至可丸二日服盡神效無比也此方用
之屢驗乃知本經主下痢
膿血之言深當服膺也

方 金匱調氣飲

治赤白痢小腹痛不可忍下重或
面青手足俱變者用——三錢阿

膠三錢同溶化入川連末五錢
攪勻分三次熱服神妙 金匱

千金膠蠟湯

治熱痢
及產後

下痢用——二碁子大阿膠二錢當歸二錢半川連
三錢黃柏一錢陳倉米半升水三升煮至一升去米
入藥煎至一鍾溫
服神效 千金 急心痛
——燈上燒化丸芡子大
百草霜為衣井水下三九

王子接遂謂功專調氣似不然

肺虛咳嗽

立效丸治肺虛膈熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音

嘶不出——溶濾令淨八兩化作一百二十九丸以蛤粉四兩為衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼溫水下

即卧閉口不語 普濟 肝虛雀目 不拘多少溶化入蛤粉和勻每用二錢以猪肝二兩

批開入藥在內扎定水一梳者熟乘熟蒸眼溫則食之日二其效如神 集驗 頭風掣痛

二斤鹽半斤和溶作一帽合頭大小至額痛立止 經驗 破傷風濕 如瘡者——一塊熱酒化

間服立效與玉真散對用尤妙 瑞竹堂方 妊娠胎漏 梳溶化熱服即止

哕逆不止 燒烟重二三 霍亂吐利 熱酒一鍾化

服即止 諸般瘡毒 腫瘡金瘡湯火傷——一兩香見肘後方 油二兩黃丹半兩同化冷攤貼

王仲 湯火傷 嫩赤疼痛成膿用此拔毒止痛生肌 勉經驗 敏瘡口香油四兩當歸一兩煎焦去

黃蠟 蜜蜂子 九文

渣入蠟一兩溶化放冷攤

帛貼神效 醫林摘要

蜜蜂子

即蜂蛹也

甘平微寒有毒治心腹痛面日黃大人小兒腹中五

虫從口吐出者

別錄

主腹內留熱利大小便澀下乳汁

及婦人帶下

藏器

治大風癩疾

時珍曰之才曰畏黃芩芍藥牡蠣白前大明曰

冬瓜苦蕒生薑

紫蘊制其毒

發明

時珍曰蜂子古人以充饌品故本經別錄著其功而聖濟錄治大風疾兼用諸蜂子蓋亦足陽

明足太陰

之藥也

方 大風癩疾

鬚毛脫落皮肉已爛成瘡者用一胡蜂子黃蜂子並炒各一分白花

胡蜂子即大黃蜂之黑者

蛇烏梢蛇並酒浸去皮骨炙乾全蝎去勻白僵蚕炒各一兩地龍去土炒半兩蝎虎全用炒赤足蜈蚣全者炒各十五枚丹沙一兩雄黃一兩龍腦半錢共為末每服一錢溫蜜湯下日三五服 見聖濟總錄

土蜂

又名蜚零 木經 郭璞註爾雅云今江東呼大蜂 在地中作房者為一

子甘平有毒治癰腫

本經

噉痛

別錄

功同蜜蜂子

藏器○ 畏惡亦

同蜜

蜂子

土蜂房 治癰腫不消為末醋塗之乾即易

藥性 療疔

腫瘡毒

時珍

方 疔腫瘡毒

已薦者二服即愈輕者一服即效 一箇蛇蛻一條黃泥固濟煨存

性為末每服一錢空心好酒下少頃腹中大痛止其瘡已化為黃水矣 普濟

土蜂 大黃蜂 露蜂房

九八

即今屋上及林中之馬
大黃蜂 黑色者名胡蜂 廣雅 壺蜂 方言 儼與蜂

手甘涼有小毒治心腹脹滿痛乾嘔 別錄 餘功同蜜蜂

手 時珍曰畏 惡亦同

方 面上雀斑 七月七日取露蜂子於漆椀中水酒浸過漉汁調胡粉塗之 普濟

露蜂房 又名蜂腸 本經蜂勣與窠同 百穿 並別錄 保 昇曰此樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如

桶十一二月取之恭 曰樹上得風露者良

甘平有毒 別錄 治驚癇瘰癧寒熱邪氣癩疾出鬼精 曰賦

蠱毒腸痔火熬之良 本經 療毒腫合亂髮蛇皮燒灰以

酒白服二方寸匕治惡疽疔骨癰根在臟腑癰節腫

時珍曰一一陽明藥 胃大腸 鳴皋曰一一功能去風以毒攻毒也時珍定為陽明藥然觀其能出鬼精治牙疼主陰痿則不止陽明兼為少陰腎經藥也如附骨疽屬腎經毒鬱不外宣附骨成膿一一治之後方陰痿服二錢可御十女若然非入腎經乎他如漱牙止痛最效牙齒屬腎也崩中漏下五色服三指撮大神效崩漏亦下焦病也蓋此物主下焦而能以通為用者 昂曰附骨疽不破附骨成膿不知者誤作

賊風治按附骨痛處發熱四體乍熱乍
寒小便赤大便秘而無汗瀉熱發散則消
賊風痛處不熱亦下發寒熱覺身冷欲得
熱對則小寬時有汗宜風藥治之

出下腫惡脉諸毒皆瘥別錄療上氣赤白痢遺尿失禁

燒灰酒服主陰痿水者洗狐尿刺瘡服汁下乳石毒

恭煎水洗熱病後毒氣衝目炙研和猪脂塗瘰癧成

漏頌煎水漱牙止風中疼痛又洗乳癰惡瘡疔毒大明

○之才曰惡乾薑丹參黃芩芍
藥牡蠣大明曰入藥並灸用

發明時珍曰一一陽明藥也外科齒科及他病
用之者皆取其以毒攻毒及殺虫之功耳

方 臍風濕腫 久不瘥者一一燒
末傳之 子母秘錄 手足風痺 大

者一箇小者三四箇燒灰獨頭蒜一盞百草霜一錢
半同研傳上一時取下埋在陰處忌生冷葷腥 乾

坤秘 又方 濃汁洗之 煎風熱牙腫 連及頭面用一一
燒存性研末以酒調

露蜂房

九十九

鱗介魚虫

噙漱之
十便良方
風虫牙痛
醋煎熱漱之。袖珍用
一枚鹽實孔內燒存性

研末搽之
鹽湯漱去此秘方也。普濟同細辛煎候
漱。又同乳香煎漱。又全蝎研末搽之。

痺腫痛
心鏡用
灰白僵蚕等分為末乳香湯下半錢
燒灰以一錢吹入喉內

重舌腫痛
之日三四次
灸研酒和傳
聖惠
舌上出血
竅如針孔

上寶慶一兩貝母四錢蘆薈三錢為末蜜丸彈子大
每以一丸水煎半小盞溫服吐血酒服 雲臺方

吐血衄血
方同
崩中漏下
五色使人無子
三指撮溫酒服之大神效

張文
仲方
小兒下痢
赤白
燒末飲
子母秘錄
小兒咳嗽

每服一字米
寸白虻虫
燒存性酒服一
匙虫即死出 生編乳

石執毒
壅悶頭痛口乾便漩赤少者
五合服之乳石末當從小便中下大效
藥

毒上攻

如聖散用——甘草等分麩炒黃色去麩為細末水二椀煎八分臨卧頓服取下惡物

經方

頭上瘡癬

和塗——末猪脂

女人妬乳

乳汁不出內結成癧

名妬乳——燒灰研每用二錢水煎去渣服酒眾

痔漏

大——燒存性

子油搽之

見唐氏經驗

蜂螫痛疼

猪脂調末搽之或煎洗千金方

陰痿

研新汲水下二錢可御十女

陰寒痿弱

上即熱起——灰夜傳陰千金

白蠟

會編名蟲白蠟

集解

時珍曰唐宋以前無之自元以後人始知之今為日用物矣川湖滇廣吳越諸郡皆有之

蠟樹枝葉狀類冬青其出大如蟻虱芒種後則延綠樹枝食汁吐涎化為——處暑後剥取若過白露即粘住難刮矣其嫩時白色作蠟老則赤黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如鴉頭

白蠟

子紫赤色纍纍抱枝蓋虫將遺卵作房正如雀窠
蝶蛸之類次年立夏日摘下若包分繫各樹芒種
後苞折虫復上樹作蠟也樹
下要潔淨防蟻上樹食其虫

甘温生肌止血定痛補虛續筋接骨震亨入丸散服殺

療虫時珍

發明震亨曰——屬金稟受收斂堅強之氣為外科
要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神效但
未試其可服否也時珍曰蠟樹葉亦治瘡腫故——
為外科要藥正如桑蝶蛸與桑木之氣相通也