

秘傳花鏡卷之三

西湖花隱陳淏子訂輯

花木類攷

是編乃綠野名園所必需主人好花而不善植者所當細閱也然詳圃而畧農非棄本以趨末五穀簡而草木繁若不細審其性情分別其宜忌則萬卉千葩安望其色之妍香之濃葉之肥實之美耶今以不傳之秘公之同人則世無不生之花矣

松爲百木之長。諸山中皆有之。兩鬚三鬚而細者常松也。五鬚六鬚爲一朶葉者別名。栝子松也。潤瓣厚葉者羅漢松也。其質礫石修聳多節永年。皮粗如龍鱗葉細如馬鬃遇霜雪而不凋歷千年而不頽其花色黃而多香但有粉而無瓣實似猪心登成鱗砌秋老則子長鱗裂味最甘香可口。廣南子色黑遼東子色黃千歲松屢於天目武功黃山高不滿三三尺性喜燥背隈生深巖石場上永不見肥故歲久不大可作天然盆玩又有赤松白松雀尾松之異惟剔牙松青皮而嫩稍傷其皮則脂易溜須以火鐵燙正用糞泥密封方不洩氣凡欲松偃益必截去松之大根惟留

四旁根鬚則無不俱蓋矣。種法於春分前浸子十日治畦下糲
浸撒畦內如種菜法。其苗自生一切花木皆貴少壯獨松柏梅
等世人多貴蒼老古勁歲久松能化石脂能成珀。如上有兔絲
則根下有茯苓爲仙家服食之藥。其花亦可作粉食。

柏

柏一名蒼官。一名搃。與松齊壽。有扁柏。檜柏。黃柏。瓊瑤柏之異。
惟扁柏爲貴故園林多植之。因其葉側向而生又名側柏。其味
微澁而甘香道人多採作服食用點茶湯諸木向陽柏木西指
其性堅緻有脂而香故古人破爲暢白用以擣鬱三月開細鎖

花不甚可觀結實成球狀如小鈴霜後四裂中含數子大如麥
粒亦自芬香仁亦道家所服食者檜柏體堅難長亦難萎黃木
聳直而皮薄肌細葉至冬更青翠瓊瑤柏枝葉俱垂下宜栽庭
際皆無花有子峨嵋山有竹葉柏身者名竹柏稟堅凝之質不
與羣卉同凋其小者止二二尺可作盆玩又乾陵有柏木之文
理大者多爲昔蘿雲氣人物鳥獸狀態分明徑尺一株可值萬
錢柏性喜晒每年中用晒過漑水澆三四次則色鮮潤秋時剪
小枝二三尺者挿肥地亦活或收子至二三月間用木淘取沉
者着濕地隔兩日再淘候芽出將剝熟地成畦以子勻撒其中

覆以細土三三日亦澆苗出土後須圍以短籬防蝦蟆所食

梓

梓一名木玉林中有梓樹諸木皆內拱葉似梧桐差小而無岐
春開紫白花如帽極其爛熳生莢細如箸長尺許冬底葉落莢
猶在樹種法秋末冬初取莢曝乾播種一年薅之二年方可移
植或交春斷其根壅於土亦能發條其葉飼豕最肥

牡丹

牡丹爲花中之王北地最多花有五色千葉重樓之異以黃紫
者爲最自歐陽修作記後人皆烘傳其名遂有牡丹譜今乃取

其一百三十一種詳釋於後。其性宜涼畏熱喜燥惡濕根窠樂
得新土則茂。懼烈風酷日須栽高敞向陽之所。則花大而色妍。
移植在八月社前或秋分後皆可。根下宿土少留切勿掘斷細
根每種過先將白斂末一斤拌勻新土內因其根甜多引土蚕
之再以小麥數十粒撒下然後坐花於上以土覆滿復將牡丹
提與地平使其根直則易活不可踏實隨以天落水或河水灌
之子類母丁香而黑六月收置向風處晾一日以瓦盆拌濕土
盛之至八月中取其下水卽沉者而畦種之待其春芽長大五
六月以華箇遮日夜則露之至次年便可移種矣然結子畦種

不若根土生苗分植之。便其接換亦在秋社前後。將種活五箇。
以上小牡丹去地留一寸。將利刀斜削去一半。再以佳種旺
條截一段。斜削去一半。上留二三眼。貼於小樹上。合如一木。以
麻縛定。用濕泥抹其縛處。兩瓦合之。內填細土。待來春驚蟄後。
出瓦與土。隨以草薦圍之。未有不活者。其花愈接愈勻。昔張戎
卿接牡丹於椿樹之上。每開則登樓宴賞。至今稱之。夏月灌漑
必清晨或初更。必候地涼方可澆。八九月五七日一澆。十月十
一月三四日一澆。十二月地凍止可用猪糞壅之。春分後便不
可澆肥。直至花放後。畧用輕肥。六月尤忌澆。澆則損根。來年無

花未放時去其瘦葉謂之打剝。花將放必用高幕遮日則花耐久。開殘卽剪勿令結子。留子則來年不盛。冬至日以鍾乳粉和硫黃少許置根下有益。如枝梗蟲蛀當尋其蛀眼用硫黃或塞或熏。或用杉木作針釘之自斃。性畏麝香桐油生漆氣旁宜植逼麝草如無卽種大蒜葱韭亦可。不使亂草侵土并熟手撫摩。若折枝挿瓶先燒斷處鎔蠟封之可貯數日不萎。或用盆養更妙。花謝後蜜仍可用養芍藥亦然如將萎者剪去不截用竹架起投水缸中浸一宿復鮮一法以白末末放根下諸般花色悉帶腰金。若北方地厚雖無肥糞卽油粃肥壅之亦盛不可一例論也。但忌大

二月十五是牡丹生日。洛下名園有植牡丹數千本者。每歲盛開。主人輒置酒延賞。若遇風日晴和。花忽盤旋翔舞。香馥異常。此乃花神至也。主人必起其酒脯。羅拜花前。移時始定。歲以爲常。

附牡丹釋名共一百三十一種

正黃色計十一品

御大黃

千葉似黃葵

姚黃

千葉樓子淡黃

淡黃

平頭初黃後淡黃

平頭斯白

禁院黃

千葉淡黃

黃氣毬

瓣圓轉

子葉起樓子

甘草黃

革葉深黃

愛雲黃

大瓣平頭宜重肥

黃

淡黃

金帶腰

腰一色濃喜陰

太平樓閣

千葉高樓密嬌本如

尖長花五瓣蜜蜂
色中有蕊根檀心

大紅色 計十八品

錦袍紅 即潛溪狀元紅 千葉樓

日照如猩血

喜陰舞青倪吐

五青石榴紅 千葉樓

子喜陽九蕊珍珠紅

葉上有醉胭脂千葉頭長

西瓜穰 千葉樓

邊淡淡金繡球白點

如珠醉胭脂頭垂

多缺金綠紅 平頭瓣上

千葉樓

有金線如剪映日紅千葉細

如剪金綠紅 平頭千葉

中

七寶冠 千葉樓

難開映日紅 千葉細

瓣喜陽石家

紅 平頭千葉

不甚緊 鶴頂紅 千葉中

心更紅 千葉樓

王家紅 尖微曲小葉大紅頭小

難開

花色 計二十七品

蓮

有青點
三重

西番頭

千葉難

開宜陰

壽安紅

平頭細葉

添色紅

漸紅

後深
千葉圓

鳳頭紅

花高大
中特起

大葉桃

紅潤瓣
子宜陰

梅紅

千葉平頭
深紅色

紅花宜陰

舞青霓
千葉心吐

西瓜紅

胎紅而長
宜陽

美人紅

千葉軟條
樓子

嬌紅

樓臺
千葉重

海天霞

平頭花大如盤

輕羅紅

千葉而薄
皺紅有瓣

紋宜陰

陳州紅
千葉以地得名

殿春芳

晚開有

花紅綉毬

細瓣圓花

鏡

有旋瓣
四面花

醉仙桃

外白內紅
宜陰

出莖桃

千葉長有
莖尺許

翠紅粧

起樓難開宜陰

嬌紅

似魏紅而不甚大

猩紅

單葉紅花
稍開

碧粟紅

倒暉單葉皆

魏家紅

千葉

肉紅畧

有紅稍開

最大以姓得名

觀音面 千葉花 繫宜陽粉西施 淡中微

玉兔天香 中二瓣

玉樓春

于葉

多雨素嬌千葉樓

有紅暈

玉兔頭

大倒暈

盛開素嬌千葉樓

有紅暈

玉兔頭

大倒暈

檀心外紅千葉

有紅暈

玉兔頭

大倒暈

醉春客似醉西施

千葉外白

三學士

係三頭

細長本紅千葉

有紅暈

玉兔頭

一蒂雙

醉春客似醉西施

千葉內紅

如毬

三學士

細長本紅千葉

有紅暈

玉兔頭

一蒂雙

朝天紫金紫如腰金紫

腰間圈

夫人服

有黃鬚

金花狀元微紫葉

有黃鬚

紫重樓

于葉

花色

計二十六品

樓最

難開

房山紫

圓正富

紫雲芳

千葉花中

紫羅袍

千葉瓣

丁香

難開

房山紫

圓正富

紫雲芳

千葉花中

紫羅袍

千葉瓣

丁香

難開

房山紫

圓正富

紫雲芳

千葉花中

紫羅袍

千葉瓣

丁香

紫

千葉小

茄花紫

千葉

樓深

瑞香紫

淺紫大

舞青猊

千葉有

紫羅袍

千葉瓣

丁香

駝褐紫

大娘色似

駝褐

衣宜陽

紫姑仙

大娘

樓淡紫

烟籠紫

千葉淺

淡交映

潛溪紺

叢中

特出紺

者一二

紫金盤

千葉深

紫宜陽

紫繡球

即魏紫也

千葉樓子

檀心

紫

檀心

紫

中

有深

葉底紫

似墨紫

花在叢

中旁必生

發墨紫

深紫色鹿

中

有深

胎紫

千葉紫

瓣上有白點

即軍容

紫發墨紫

類墨葵鹿

千葉

紫纖

若鹿皮紋

宜陽

魏家紫

千葉大花

產魏相家

平頭紫

即左紫

花大徑

尺而

乾道紫

色稍淡

而暈紅

紫玉

千葉白

瓣中有深

紫色絲紋

宜陰

錦團綠

其幹亂

生成叢葉齊小

而知厚花

千瓣

紫色合紅

如叢瓣

細紋

白色

計二十二品

玉天仙

多葉白瓣

慶天杏

千葉粉

玉重樓子

千葉高樓子宜陰

線邊白

邊瓣

有綠

密嬌姿

初開微紅

卷書

即玉玲瓈

點子

千葉樓子宜陰

景

垂下

玉剪裁

平頭葉邊

水晶

千葉纖細長銀粧點子

千葉樓子宜陰

毬

垂瓣圓俱

玉剪裁

平頭葉邊

白青貌

青瓣中有五瓣

蓮香白

平頭花香如蓮

伏家白

以姓得名

鳳尾白

中有長瓣特出

玉盤盂

多葉大瓣開早

玉版白

單葉

細長如

鵝絛白

多葉而長瓣心

金絲白

淡黃絲上有羊脂玉

千葉樓子大白瓣

青

心白

千葉青色心

玉碗白

單葉大圓花

平頭白

花大尺許瓣長

多葉

黃蘿

檀心花

最大此品

賞至一百五日先開
計三品

青色

佛頭青

一名歐碧群花

綠蝴蝶

一名夢綠華

鴨蛋青

如蛋花青

牡丹

丹花之五色。爛爛其形其色。其態度變約。原莫可名狀。後之名亦隨人之喜好。約數百種。然而雷同者亦不少。茲存一百十種。尙有疑似處。望博雅裁之。

梅

二

空名桺。一名猿葉實花。俱似杏。差小而花獨優於杏。昔范石

有梅譜。約九十餘種。大底一花二三名者多。今特取其山林
有。而人所常植者二十種。詳釋於後。桺本出於羅浮。更嶺。喜
故也。而古梅多著於吳下。吳興西湖。會稽四明等處。每多百

年老幹其枝樛曲萬狀。蒼蘚鱗皴。封浦花身。且有苔鬚垂於枝

開長寸許。風至綠絲飄動。其樹枝四蔭週遭可羅坐數十人。好

者多載酒賞之。蓋梅爲天下尤物。無論智愚賢不肖。莫不慕

其香韻而稱其清高。故名園古刹。取橫斜疎瘦。與老幹枯株。以

甘點綴。早梅冬至前卽開。晚梅春分時始放。如多植則相
而

切最久。性潔喜晒。澆以塘水則茂肥。多生虧。但結實微酸而酸
功用甚廣。人多取焉。食若畏酸。同韶粉嚼。則味不酸而牙不

齶。或以胡桃肉解虧。

音育

附梅花釋名

共二十二種

白萼梅

凡梅跗蒂皆絳

重葉梅

花頭甚豐千葉

王蝶梅

花頭大而

紫此獨純綠

重葉梅

開如

小白蓮

王蝶梅

花頭

微紅色甚

冠城梅

單葉者實大五月

消梅

卽江梅花與冠城

相似實微甘而脆

照水梅

花開朵朵向下而香濃亦梅中奇品

鴛鴦梅

重葉數層紅艷

輕盈一蒂雙實

黃香梅

一名

細梅花小而心瓣

黃香在烈品字梅

一花結三實但其實小不堪啖

紅梅

丁葉實少來自潭州

湘有福州紅

潭州紅名

杏梅花色淡紅實扁

墨梅

此係練

樹所接江梅

而花成淡墨色者

花繁而蒂紫但

冰梅實生葉鱗而不花色鶴頂梅

花如常梅

惟實大而

結實不甚大

如米玉無核含自融

鶴頂梅

花如常梅

惟實大而

紅冬梅

結實甚小十月

九英梅

此花爲白樂天

杜子美所賞鑒

朱梅較之千

色更深而艷

江梅

白花檀心紫蒂玉

臺閣梅

花開後心中復有榔

一小蘿再放出

梅出均州太和山相傳真武折梅枝撞榔樹上誓曰吾道若成花開果結後榔果開梅結實至今尚在五龍宮北

蠟梅

蠟梅俗作臘

俗作臘

一名黃梅木非梅類因其與梅同放其香又相近色

似蜜蠟且蠟月開故有是名樹不甚大而枝叢葉如桃闊而厚有磬口荷花狗英三種惟圓瓣深黃形似白梅雖盛開如半含者名磬口最爲世珍若瓶供一枝香可盈室狗英亦香而形色不及近日圓瓣者皆如荷花而微有尖僅免狗英者皆用狗英接換故也若以子出不經接過者花小而香淡其品最下實如垂鈴夏熟採取試水沉者種之多生姪荆刺

爲上今南浙

外盛其本宜過枝不宜接換

山茶

山茶一名萼陀羅樹高者一二丈低者二三尺枝榦交加葉似木樨潤厚而尖長面深綠光滑背淡綠經冬不凋以葉類茶故得茶名花之名色甚多姑列於後其開最久自十月開至二月方歇性喜陰燥不宜大肥春間臘月皆可移栽四季花寄枝宜用本體黃花香寄枝宜用茶體若用山茶體花仍紅色白花寄枝同上磬口花鬯口花宜子種以單葉接子葉則花盛而樹久以冬青接十不活一二

附山茶釋名

共十九種

諸色茶花

瑪瑙茶

產溫州紅黃自心大紅盤鷄頂紅
粉爲心大紅盤鷄頂紅浦如鷄頂出雲南

寶珠茶

瓣中心塞子葉

攢簇殷丹砂出蘇

荳蔻白寶珠

似寶珠蕊白九月開甚香

楊妃茶

單葉花開最早桃紅色

正宮粉

賽宮粉

花皆粉紅色

不相交

中有梅瓣碎花小花

榴茶

亦粉紅

茶

淡紅色

萊榴茶

有類山躑躅

串珠茶

亦粉紅

磬口茶

花瓣皆圓轉

茉莉茶

色純白一名白菱

一捻紅

白瓣有紅點

照殿紅

大葉

而且紅

晚山茶

二月方開

南山茶

出廣州葉有毛實大如拳

瑞香

瑞香一名蓬萊花。有紫白紅三色。本不甚高而枝幹極婆娑。隔年發蕊。蓓蘂於葉頂。立春後卽開。花紫如丁香者。其香更濃。葉邊有黃暈者。名金邊瑞香。又有似楊梅葉者。或球子者。攀枝者。性喜陰耐寒。然又惡濕。婦人多喜扦帶。不宜壅澆。惟用洗衣垢水。或燙猪湯燒。或壅人頭垢。則茂。芒種時剪取嫩條破開。放大麥一粒。用亂髮纏之。挿入土中。根旁壅好。勿令見日。以垢水澆之。一云左手折花。隨卽扦挿。勿換手種。無有不活。其根甚甜。多藏蚯蚓。必須以法去之。又名麝囊。能損花宜另植。

結香

結香俗名黃瑞香。幹葉皆似瑞香。而枝甚柔弱可編結。花色鬱黃比瑞香差長。亦與瑞香同時放。但花落後始生葉。而香大不如。

迎春花

迎春花。一名腰金帶。叢生高數尺。方莖厚葉開最早。交春即放淡黃花。形如瑞香。不結實。對節生小枝。一枝三葉。候花放時移栽肥土。或巖石上。或盆中。而柔條散垂。花綴枝頭。實繁且韻。分栽宜於二月中旬。須用燭壯冰澆方茂。

櫻桃

櫻桃。一名楔。又有荆桃。含桃。

謂鳥
音今

崖蜜。蠟櫻。色皆朱英。赤麥英。

黃

色

赤

麥英

色皆

數名。此木得正陽之氣。故實先諸果而熟。禮薦宗廟亦取其先出也。本不甚高而多蔭。春初開白花。繁英如雪。其香如蜜。葉圓有尖邊如細齒。結子一枝數十顆。有朱紫蠟三色。又有千葉者。其實少但果紅熟時必須守護。否則爲鳥雀自頭翁所食無移也。枝節間有根鬚垂下者。二月間取栽於肥土中。常以糞澆之。卽活。若陽地種者還種陽地。陰地種者還種陰地。不可用糞。實熟時當張葦箔以護風雨。一經雨打。則蟲自內生。人莫之見。須用水浸良久候蟲出方可食。

玉蘭

玉蘭古名木蘭。出於馬跡山。紫府觀者佳。今南浙亦廣有。樹高大而堅。花開九瓣。碧白色如蓮心。紫綠而香。絕無柔條。隆冬結蕾。一幹一花。皆看木末。必俟花落後。葉從蒂中抽出。在未放時。多澆糞水。則花大而香濃。但忌水浸。與木筆並植。秋後接換甚便。其瓣擣洗精潔。拖麵麻油煎食極佳。或蜜浸亦可。其製法與牡丹辦同。

杏花

杏花有二種。單瓣與子瓣。効州山有千葉杏花。先紅後白。但嬌

而。不。育。樹。高。大。而。根。生。最。淺。須。以。大。石。壓。根。則。花。易。盛。而。結。
實。始。繁。其。核。可。種。而。仁。不。堪。食。其。可。食。有。係。關。西。巴。且。杏。一。天。

寶。小。而。肉。薄。核。內。仁。獨。甘。美。點。茶。上。品。杏。黃。而。帶。醉。沙。杏。甘。

而。有。沙。木。杏。扁。而。青。黃。柰。杏。青。而。微。黃。又。一。種。金。杏。圓。大。如。梨。

深。黃。若。金。橘。每。種。將。核。帶。肉。理。於。糞。土。中。任。其。長。大。來。年。須。移。

栽。若。不。移。過。則。實。小。味。苦。又。不。可。栽。密。密。則。難。長。少。實。昔。李。冠。

卿。家。有。杏。花。多。不。實。一。媒。姥。見。而。笑。曰。來。春。與。嫁。此。杏。冬。至。忽。

攜。一。樽。酒。過。云。婚。家。撞。門。酒。也。索。處。子。紅。裙。繫。樹。祝。曰。青。陽。司。

令。庶。彙。惟。新。木。德。屬。仁。更。旺。於。春。森。森。柯。幹。簇。簇。繁。陰。我。今。家。

汝萬億子孫。明年結子果多。相傳爲韻事。

丁香

丁香一名白結。葉似茉莉。花有紫白二種。初春開花。細小似丁。
香甚。當雷而生於枝杪。其瓣柔色紫清香。人接分俱可。但畏濕
而不宜大肥。

辛夷

辛夷一名木筆。一名望春。較玉蘭樹差小。葉類楠而長。隔年發
蕊。有毛儼若筆尖。花開似蓮。外紫內白。花落葉出而無實。別名
侯桃。俗呼猪心花。又有紅似杜鵑者。俗呼爲石蓀。其木可接。

蘭亦宜研條扦插可同玉蘭並植至秋後過枝卽生皆可變爲
王蘭多澆糞水則花大而香濃人多取蓋合香

杜鵑

杜鵑一名紅躑躅樹不高大重瓣紅花極其爛漫每於杜鵑啼
時盛開故有是名先花後葉出自蜀中者佳花有十數層紅艷
比他處者更佳性最喜陰而惡肥每早以河水澆置之樹陰之
下則葉青翠可觀亦有黃白二色者春鵑亦有長丈餘者須種
以山黃泥澆以羊糞水方茂若用映山紅接者花不甚佳切忌

桃

桃爲五木之精。能制百鬼。乃仙品也。隨處有之。枝幹扶疎葉狹而長。二月開花。有紅白粉紅深紅之殊。他如單瓣大紅。千瓣粉紅。千瓣白之變。爛綬芳非其色甚媚。花最易植。木少則花盛實甘子繁。性早實。三年便結子。大七年卽老。結子便細。十年後多枯。其皮最緊。若四年後用刀剥樹本。暨剝其皮。至生枝處。便膠盡出。則皮不脹不死矣。有數年之活。傳云千歲桃。豈尋常之物。惟仙家稱之。究竟桃無久壽。而種類甚多。詳載於後。種法取佳種熟桃。連肉埋糞地中。尖頭向上。覆熟肥土尺餘。至春發生。芽

土移栽別地則旺若仍在糞地則實小而苦。凡種桃淺則出深則不生。故其根淺不耐久。近得所傳云。於初結實次年砍去其樹復生又斫。又生。但覺生虱卽斫。令復長。則其根入地深。而盤結自固。百年猶結實如初。又桃實太繁。則多墜於社日春根下。土石壓其枝則不落。桃子若生蟲。以煮猪首淡汁冷澆之。自無。如生蚜蟲。以多年竹燈挂。縣樹稍間。則蟲自落。

附桃花釋名共一十四品

諸色桃

日月桃其種二枝有二 崑崙桃一名王母桃出洛
花或紅或白 巨核桃中、表裏皆赤、冬熟
霜下

始花、大暑方熟，出當山。

瑞仙桃

花最稠密，其色則深紅。

人面桃

花粉紅，千葉少實，又名美人桃。

毛桃

爾雅名穠桃，小而多核。

綯桃

卽綯桃花，如剪絨。

金桃

出太原

黃桃

以柿接之，遂成金黃。

鶯鶯桃

千葉深紅，開最遲。

銀桃

單葉實圓。

熟桃

單葉深紅花實圓。

雪桃

卽十月桃花，紅形圓。

桃色青肉不粘核

桃色青肉粘核

味甘酸。

水蜜桃

出上海顧氏家，有水蜜桃。

其味甜如蜜。

油桃

有赤斑點，光如塗油。

新羅桃

其子可食。

性獨熱

扁桃

出波斯國，形扁而肉

熟。

雷震

在仁雷雨過輒見。

紅暈

更爲難得。

磨嘴

桃

有尖如磨嘴狀。

餅子桃

單葉，紅花實狀如香餅，味甘。

桃花紅實，在六月熟。

雷震

系紅暈。

紅暈更爲難得。

磨嘴

木有尖如磨嘴狀。

白碧桃

單葉千葉二種，肉指桃。

單葉紅花結實繁。

脂

壽

皇桃

樹矮而花千葉。

桃

出自福州，其實

實大可作盆玩。

錄

五瓣色青黃。

金絲桃

金絲桃一名桃金娘出桂林郡。花似桃而大。其色更顏。中莖純紫心吐黃鬚鋪散花外儼若金絲。八九月實熟青細若牛乳狀。其味甘可入藥用。如分種當從根下劈開。仍以土覆之。至來年移植便活。

夾竹桃

夾竹桃本名枸那。自嶺南來。夏間開淡紅花。五瓣長筒微尖。一朶約數十萼。至秋深猶有之。因其花似桃葉似竹。故得是名。非真桃也。性惡濕而畏寒。十月中卽宜置向陽處以避霜雪。最喜

者肥不可缺壅冬。逢和暖日微以水潤之。但水多則恐冰凍而死。分法在季春以大竹管韜於枝節間。用肥土填貯。朝夕不失水。久之根生截下另植。遂可得種矣。今人於五六月間以此花配茱莉。婦女簪髻。嬌最可挹。

李花

李樹大者有一二丈性較桃則耐久可活三十餘年。老枝雖枯子亦不細花白小而繁多開如雪。其實名不一有木李青宵御黃均亭夫人皮青肉紅皆李之上品也。紫粉小青白李杏李馬月牛心扁絳鼠精朱李餽李肥黏似餌乃李之下品也。又麥李紅而甜麥秀

其分根種接之法。皆與桃同。故不贅。但培壅宜猪糞。不可用蚕糞。如少實於元旦五更。將火把四面照看。謂之稼李。當年便生。若以桃接。則生子紅而甘。

梨花

梨。一名果宗。一名玉乳。處處有之。其木堅實。扶疎似杏而微厚大。二月開花六出。似李花稍香。不香之別。上已日無風。則結實必佳。其果名。

細葉梨。芳梨。實青梨。大胸山梨。大谷梨。張公梨。

夏禦

雀梨甘棠梨鵝梨皮薄將
城皮厚而肉實稻稍梨蠶羅梨捧槌梨

因其形似

香水梨

出北地爲上品

壓沙梨

出山西信州

紫梨

花以

桺梨鳳棲梨綿梨水梨

小赤梨

鹿梨

葉如茶而實小

紫梨

花以秋日

色以上諸品或形色或香味種種不同每顆生十餘子種之

唯一二生梨餘皆生杜植法用最熟大梨全埋經年至來春生

芽次年分栽之多著肥水及冬葉落附地刈殺之以炭火燒頭
二年即開花接法在春秋二分時用桑木或棠梨或杜接過其

實必大史記云淮北柴南河濟之間家植千

梨其人與千戶

時又夷陵山中多紅梨花且有千葉者時

馬溫公曾作詩

攀之昔梁緒於花開時折花簪多壓損而至頭不能舉人爲美談。

木瓜

木瓜。一名楙。一名鐵榔榔。獨蘭亭宣城者爲最。樹高丈餘。葉厚而光。狀如海棠及柰。春深未發葉。先有花。其色深紅微帶白。實大如瓜。小者如拳。皮黃似著粉。香最幽甜。而津潤。有鼻者木瓜無鼻而濃者木李。比木瓜小而酢澁者木桃。惟木瓜香而可食。宣州人種滿山谷。每實將成。好事者鏤紙花粘瓜上。夜露日照。漸變紅花色矣。其文如生。本州用充土貢。名爲花木瓜。樹可以

子種亦可接壓。在秋社前後移栽者較春栽更盛耳。畏日喜肥更宜大糞。其直枝可作杖。謂老人築之利筋脉。實可浸酒或蜜漬爲果亦佳。蜜漬法先切去皮。煮令極熟。多換水浸。使拔去酸澀之味。然後用生蜜熬成煎。將木瓜晾乾。投於蜜瓶中藏之。經久不壞而香馥猶存。昔天台山石罅有木瓜一株。花時一巨蛇盤其上。至實落供大士後乃去。號爲護聖瓜。

棠梨

棠一名棠梨。卽棠梨也。樹如梨而小葉似蒼朮。亦有圓者。三叉者。邊有鉅齒。色黯白。二月開小白花。實如小棟子。生青熟紅。亦

黃白者。土人呼爲山楂果。味酸而澀。採之入藥。兼可製爲糖。民取花日乾。淪之亦能克蔬。若以此接換梨或林檎與西湖海棠。氣質極其相宜。

山
郁李

山郁李。一名棠棣。又名夫移。喜梅俗呼爲壽李。樹高不過五六尺。枝葉似李而小。實若櫻桃而赤。味酸甜可食。其花反而後合。有如亦白粉紅三色。單葉者子多。千葉者花如紙剪簇成。色最嬌艷。比山楂下。覆繁縟可觀。似有親愛之義。故以喻兄弟。周公昔賦十朱棣。卽此性潔喜曠。春間宜栽高燥處。燒以清木。不用大肥。仁

可入藥。

貼梗海棠

海棠有數種貼梗其一。叢生單葉綬枝作花磬口深紅無香不結子。新正卽開。但取其花早而艷。不及西府之嬌媚動人。二月間于根傍開一小溝攀花着地。以肥土壅之。自能生根。來冬截斷。春半便可移栽。其樹最難大。故人多植作盆玩。近法皆不用壓。直於根上分栽。而分必須正月中澆。性不喜肥。頗畏寒。宜避霜雪。亦有四季花者。

西府海棠

門府海棠。一名海紅樹。高一二丈。其木堅而多節。枝密而條暢。
果有類杜。二月開花五出。初如胭脂點點然。及開則漸成纈。量
廿明霞落。則有若宿粧。淡粉蒂長寸餘。淡紫色。或三萼五萼成叢。
心中有紫鬚。其香甚清烈。至秋實大。如櫻桃而微酸。宜種壚壤。
膏沃之地。如花謝後結子。卽當剪去。則來年花盛而葉遲。可愛。
右以棠梨接之。卽活。又一種黃海棠。葉微圓而色青。初放鶯黃。
已盛開便淺紅矣。

垂絲海棠

海棠之有垂絲。非異類也。蓋由櫻桃樹接之而成者。故花梗細。

長似櫻桃。其瓣叢密而色嬌媚。重英向下。有若小蓮。微遜西府。

一籌耳。世謂海棠無香。而蜀之瀘州昌州海棠獨香。不可一例。

論也。

接二詩十
八社

林檎

林檎一名來禽。因其能來衆鳥於林一名冷金丹。卽柰之類也。二月開粉紅花似西府。但花六山實則圓而味甘。非若柰之實長而味稍苦。果之香甜可口。五月中熟者蜜林檎爲第一。金林檎以花爲重。唐高宗時李謹得五色林檎以貢。有金紅水蜜黑五色之異帝悅賜謹以文林郎。因名爲文林郎果。但此木非接不結。多以柰樹摶接之。

王沃與接梨同。歲月可將嫩條移栽。若樹生毛蟲。埋蠶蟻於樹下。或澆魚腥水可除。好事者以枝頭向陽好實。於未熟時剪紙爲花。貼於其上。待熟時猶若花木瓜樣。入盤何可愛。又四月取林檎一百。內取二十枚搗碎。入冰同煎。候冷。納甕巾浸之。密封其口。久留愈佳。

卷

柰。一名頻婆。係楚音猶言端好也。江南雖有。而北地最多。與林檎同類。有白赤青三色。白爲素柰。涼州有大如兔頭者。赤爲丹柰。青爲綠柰。皆夏熟。涼州又有一種冬柰。十月方熟。子帶碧色。又土林苑

有紫奈大如升核紫花青其汁如漆著衣便不可浣名脂衣奈此皆異種也西方奈多家家收切曝乾爲脯數十百斛以爲蓄種謂之頻婆糧

文官果

文官果產於北地樹高丈餘皮粗多縲磈木理甚細葉似榆而尖長周圍鉅齒紋深春開小白花成穗每瓣中微凹有細紅筋貫之蒂下有小青托花落結實大者如拳一實中數闊間以白膜仁與馬櫑榔無二異以白軟皮大如指頂去皮而食其仁甚清美如每日常浣或雨水多則實成者多若遇旱年則實難

小而無成矣。

山楂

山楂。一名茅楂。樹高數尺。葉似杏葉。二月開白花。結實有赤黃白三色。肥者如小林檎。小者如指頭。九月乃熟。味似楂子而微酸。多生於山原素林中。猿鼠喜食。小兒以此爲戲果。

山躡躅

山躡躅俗名映山紅。類杜鵑花而稍大。單瓣色淡。若生渭山頭。其年必豐稔。人競採之。亦有紅紫三色。紅者取汁可染物。以羊糞爲肥。若欲移植家園。須以本山土壅始活。

粉團花

粉團一名繡球。樹皮體皴葉青而微黑。有大小二種。麻葉小花一蒂而衆花攢聚。圓白如流蘇。初青後白。儼然一簇。其花邊有紫暈者爲最俗。以大者爲粉團。小者爲繡球。閩中有一種紅繡球。但與粉團之名不相侔耳。麻桂。猢桐俱可接繡球。

八仙花

八仙花卽繡球之類也。因其一蒂八蕊簇成一朶。故名八仙。其花白瓣薄而不香。蜀中紫繡球卽八仙花。如欲過貼。將八仙移就粉團樹畔。經年性定。離根七八寸許。如法貼縛水澆。至十月

候皮生截斷次年開花必盛。昔日玉花至元時已朽。後人遂移八仙花補之。亦八仙之幸也。

紫荆花

紫荆花一名滿條紅花叢生深紫色。一簇數朵。細碎而無瓣。發無常處。或生本身。或附根枝。二月盡卽開。柔絲相繫。故枝動。朵朵嬌鷗。若不勝。花謝後葉出。光緊微圓。根旁生枝。可以分種。性喜肥。畏濕。若與棣棠並植。金紫相映而開。更覺可人。冬取其莢種肥地。交春卽生。昔臨潼田。其兄弟分居復合。荆枯再榮。勿謂草木無情也。

金雀花

金雀花枝柯似迎春葉如槐而有小刺。仲春開黃花其形尖而
旁開兩瓣勢知飛雀可愛乘花放時取根上有鬚者栽陰處卽
活用鹽湯焯草可作茶供。

山欒花

山欒花一名芸香。一名鄭花。多生江浙諸山。葉如冬青。生不對
節。凌冬不凋。三月看白花細小而繁。不甚可觀。而香馥最遠。故
俗名七里香。北人呼爲瑪花。其子熟則可食。土人採其葉以染
黃。不借火力而自成色。故名山欒。二月中可以壓條分栽。採宜

夕而益香。放床席下。去蚤虱。置書帙間。辟蠹魚。

桑

桑之功用甚大。原非玩好之木。此獨不遺者。以存圃中之本務也。其種類稍異。白桑葉大如掌而厚。雞桑葉細而薄。子桑先椹後葉。山桑葉尖而長。女桑樹小而條長。壓桑材中。引絳絲中。琴瑟橫柔似赤棘。以子種者。不若壓條之易大。若以構接則葉大。根下埋龜甲。則茂盛不蛀。又桑生黃衣。謂之金桑。其木必枯。葉傳飼蠶。一歲三採更盛。二云。蝗之所至。無葉不食。獨不食桑。亦造物之靈也。握桑條宜燥。二則根易生。

佛桑花

佛桑一名扶桑。枝頭類桑與槿。花色殷紅似芍藥。差小而輕柔。過之開當春末秋初。五色婀娜可愛。有深紅粉紅黃白青色數種。非單葉重葉之異。今北地亦有之。皆自南方移植者。但易凍死。逢冬須密藏之。

南天竹

南天竹一作竺。一名大椿。吳楚山中甚多。樹高三五尺。歲久亦有長至丈者。但不易得耳。糯者矮而多子。梗者高不結實。葉似竹。梗而小。經冬不凋。實幹敷枝。三四月間開細白花。結子成筭。

冬漸紅如丹砂。雪中甚是可愛。亦可製食。其性喜陰而惡濕。用山黃泥種。背陰處自茂。不宜澆壅。但用肥土或鞋底泥壅之。若澆只宜冷茶。或臭酒糟水。退雞鴵毛水最妙。人多植庭除間。不特供玩好。尤能辟火災。若秋後髡其幹。留取孤根。俟春生後。遂長條肄而結子。則木低矮而實紅。可作盆中冬景。

合歡花

合歡。一名蠲忿。生益州。及近京雍洛間。樹以梧桐枝甚柔弱。葉類槐莢。細而繁。每夜枝必互相交結。次朝一遇風吹。卽自解散。了不牽綬。故稱夜合。又名合昏。五月開紅白花。瓣上多有絲茸。

實至秋作莢子極薄細人家第宅園池間皆宜植之能令人消
忿冬月可以分栽分汁搗爛絞汁洗衣最能去垢

櫟

櫟一作漆生蜀漢江浙等處木高二三丈皮白葉似椿花似槐子
若牛李木心黃可作杖夏至後以剛斧斫其皮將竹管承取其
汁用漆器具甚妙漆若不取多自蠶

柿

柿宋果也葉似山茶而厚大四月開黃白小花結實青綠九月
微黃卽摘少藏數日卽便紅熟甜美可啖但未熟時最澁將水

三兩核雜於生柿盤中數日或以植桶置其中亦能大滋產
開州者更佳。古云柿有七絕。一樹多壽二葉多蔭三無鳥巢四
少蟲蠹五霜葉可玩六嘉實可餐但不可與七落葉肥厚可以

蠅同食

肺書如冬間核種待長移栽不若春後用椑柿接或取好枝於
根上接最妙。大凡柿接三次過則核全無矣。蓋柿之種類
不一。有紅柿。烏柿。黃柿。牛奶蒸餅八稜方蒂圓蓋塔柿等名色。
不有文而根最固俗謂之柿盤。別有一種椑柿葉上有毛實皆
可黑最不堪食。止可收作柿漆。八月間用椑柿擣碎每柿一升。
用水半升釀四五時搾取漆令乾添水再取傘扇全賴此漆糊。

成也

柳

柳。一名官柳。一名垂柳。本性柔脆。北土最多。枝條長軟。葉青而狹長。初春生柔黃。粗如筋。長寸許。開黃花。鱗次更生。甚細碎。以漸生葉。至暮春葉長成。花已結細子。如粟米大。扁小而黑。土帶白絮如絨。俗名柳絮。臨風飛舞。若着毛衣。卽生蛙蠅。人池沼卽化浮萍。此乃官柳也。若叢葉成陰。長條數尺。或至丈餘。嫋嫋下垂者。此爲垂柳。雖無香艷。而微風搖蕩。每爲黃鸝交語之鄉。吟蟬托息之所。人皆取以悅耳娛目。乃園林必需之木也。種法在

大多以糖製或蜜浸其用甚廣誠佳果也。一種香橙似蜜橙小
皮薄味酸。花皆類橘葉亦有尖一種蠟橙即臭橙。北蜜橙皮
味辣無所取用。蜀有給客橙似橘而實非若柚而獨香。冬夏
花實相繼通歲得以食之亦名盧橘。

金柑

柑一名金橘。一名瑞金奴。生江浙用廣間。其樹不甚大。而葉
婆娑如黃楊。夏開小白花。秋冬實熟。則金黃色。大如指頭。或
如彈丸。更有小如豆者。皆皮薄而堅。肌理瑩細。其味酸甜而芳
可口。一種牛奶柑形長如牛乳。但香味稍劣。又一種名金豆。

白樹只尺許。結實如櫻桃大。皮光而味甜。植於盆內。冬月可觀。
多產於江南太倉。與湖之寧波。又一種蜜羅柑。其大似香櫞而
反皺。味更香美。

金衢月前接皆以四

香櫞

香櫞俗作一一名枸櫞。不似橘而葉畧尖長。枝間有刺。花之色與
杏亦類相。其實正黃色。有大小二種。皮光細而小者爲香櫞。皮
粗而大者爲大櫞。香味不似。惟香櫞清芬襲人。能爲案頭數月
不凋供翫。可作湯皮。可作糖片。糖丁。葉可治病。其樹必待小鳥作
巢後方得開花結實。亦物類之感召也。下子亦易出。

本草

一名木奴。大曰橘。小曰柚。多生南方暖地。木高二三丈。刺出

其

葉間。葉冬不凋。初夏開小白花。其香甚觸。六七月成實。交冬黃

其

然。福橘大而紅。爲諸橘之最。溫衢者亦佳。其類真多。韓彥直有

其

小譜可考。今錄其要。有朱橘。密橘。乳橘。芳竭橘。包橘。綿橘。沙橘。

丁黃。穿心波斯荔枝。脫花柑。凍橘。蘆橘等。至如油橘。則最下之

其

也。春初取核撒地。待長三尺許。移栽宜於斥鹵之處。忌用猪

日

糞。夏時澆以糞水。則葉茂而實繁。性畏霜雪。至冬以河泥大糞

口

壅其根。以爲來年之益。稻草裹其幹。則不凍死。若在閩粵則不然也。其木有二病。蘚與蠹是也。猝生苔蘚。須速刮去之。見蛀屑

者。其木有二病。蘚與蠹是也。猝生苔蘚。須速刮去之。見蛀屑

不錄
飄出必有蟲穴以鉤索之。再用杉木釘塞其孔。經年橘踰淮而爲枳。則枳卽橘之變種也。故其木與花葉皆類橘。惟所結子不同。橘有瓤可食。枳則皮粗厚。內實而不堪食。只可入藥用。其樹多刺。最宜編籬。凡遇旱以米泔水澆。則實不損落。根下埋死鼠。則結實加倍。藏橘於綠豆內。至春盡不壞。橙相亦然。若見糯米卽爛。

橙

橙。一名蜜橙。一名金毬樹。似橘而有刺。葉長有兩刻缺。如兩段者。實似橘而微大。經霜早黃。皮皺厚而甜。香氣馥郁。但瓤稍酸。

臘月研方幹。蟠其小焦而扦之。如劈開其皮夾日草一片入土。則不生蟲。壅土宜實。種後若不動搖。雖縱橫顛倒。插之盡活。乃最易生之物也。昔人因其花似絮。故有飛綿飛絮寒無用。如雪如霜暖不消之咏。

楊

楊有二種。白楊葉芽時。更有白毛及畫展。似梨葉長而厚。面淡青而背白。畫長爾。兩相對遇風則簌簌有聲。人多植之墳墓間。高可十餘丈。又青楊樹。彼白楊較小。葉似杏葉而稍長。大色青綠。本亦聳直。大槩柳枝長脆。葉狹長。楊枝短硬。葉潤柳性耐。

水楊性宜旱二木迥不相侔何可因其並稱而遂認爲一木耶
特表而出之赤者近水生根須可樹以護堤堤

檉柳

檉柳一名觀音柳一名河西柳幹不甚大赤莖弱枝葉細如絲
縷婀娜可愛一年作三次花花穗長二三十其色粉紅形如蓼
花故又名三春柳其花遇雨即開宜植之水邊池畔若天將雨
檉先起以應之又名雨師葉經秋盡紅負霜不落春時扦插易
活

橘枳附

佛手柑

佛手柑。一名飛櫻。產閩廣間。樹似柑而葉生枝間。有刺。植之近水乃生。結實形如人手指。長有五六寸者。其皮生綠熟黃色。若橙而光澤。肉白而無子。雖味短而香馥最久。置之室內筒中。其香不散。南人以此雕鏤花鳥。作蜜煎果食。甚佳。

檳榔

檳榔。一名馬金。南生南海。今嶺外皆有。木大如桃榔。高五七丈。初生若竹竿。積硬引莖直上。有節而無旁枝。柯條從心生。端頂有葉。似芭蕉。條脈開破。風至則如羽扇。三月葉中腫起一房。因

自折裂出穗。凡數百實。其大如李。皆有皮殼。又生刺重累於下。以護其實。五月成熟。剝去其皮。煮肉曝乾。交廣人邂逅設此代茶食。必以扶留藤。牡礪灰同咀嚼之。吐出紅水一口。則柔滑甘美。不澀。又大腹子。卽猪欖榔形扁而味澀。必須葉與蛤粉卷和而食。

虎刺。一名專庭木。生于蘇杭蕭山。葉微綠而光。上有一小刺。夏開小白花。花開時子猶未落。落後復結子。紅如珊瑚。其子性堅。雖嚴冬厚雪不能敗。性畏日。喜陰。本不易。百年者止高二

天春初分栽亦多不活用山泥忌糞水并人口中熟氣相冲澆梅水及冷茶吳中每栽盆內紅子累累以補冬景之不足。

官

蜜蒙花

五蒙花生益州及蜀之州郡木高丈餘葉似冬青而厚背白色
密
細毛花微紫色三月採花暴乾則味甘甜如蜜其花一朵
數子房蒙蒙然細碎故有是名。

右

平地木

右地木高不盈尺葉似桂深綠色夏初開粉紅細花結實似南
竹子至冬大紅子下綴可觀其托根多在甌蘭之傍虎刺之

下及巖壑幽深處。三月分栽。乃點綴盆景。少需之物也。

梔子花

梔子花一名歲桃。一名林蘭。釋號簷蔚。小木也有三種。單葉小
者結子多。千葉大花者不結子。色白而香烈。又有四季花者。
亦不生山梔。蘇州產一種矮樹。梔子高不盈尺。益玩清香動人。
夏花潔白而六出。秋實丹黃有稜。可染黃色。亦可入藥。昔孟果
十月宴芳林園。賞紅梔子花。清香如梅。近日罕見此種。冬初取
子晒乾來春畦種。覆以灰土。如種茹法。次年三月移栽。至四年
即開花結實矣。又梅雨時。隨花剪扦肥地亦活。若干葉者宜生

厭

旁生小枝久則根生分栽自活。惟布喜糞。惟以輕肥沃之。若太肥又恐生虫虱。一法苦種時穴一腐板。泥塗剪枝種其上。浮置水面。候其根生後移而種之。

十

石榴

石榴。一名丹若。一名金碧。又一種味最甜者。名天漿。其種自安
南國張騫帶歸。今隨在有之。樹高一二丈。梗紅葉綠而狹長。其
石。單葉者結實。干葉者不結實。性宜砂石。柯枝附幹。自地便生
石叢。孫枝甚繁。種極易活。惟山種者實大而甘。千房同膜。千子
如一花有數色。千葉大紅。千葉白或黃或粉紅。又有並蒂花者。

中一種四季花者。春開夏實之後。深秋忽又大放。花與子並生枝頭。碩果罅裂。而其傍紅英燦爛。併花折挿瓶中。豈非清供也。又一種中心花瓣如起樓臺。謂之重臺榴。花頭最大。而色更鮮艷。海榴花跗萼皆大紅。心內鬚黃如粟密。又有紅花白緣白花紅緣者。亦異品也。其實可禦饑渴。釀酒漿解醒療病。裁以三刀初。取嫩枝如拇指大者。研令長一尺半。八九枝共爲一窠。燒土頭二寸許。不燒恐漏。引難活。掘圓深坑一尺七寸。口徑尺。堅於培壅。環石枝令勻正。置枯骨殭石於枝間。骨石乃樹下肥土性所宜也。一重土間一重置石至平坎乃止。其土令淺枝頭過一寸。采之。一重土間一重置石至平坎乃止。其土令淺枝頭過一寸。

許水澆常令潤澤。若已生歲又將寄石布其根王。則柯圓棱茂。
可愛。其孤根獨立者。雖生亦不佳。十月終以蒲藁裹其木而纏
之。不致凍壞。至二月初解放。若以大石壓其根上。則實繁而不
落。性喜暖。雖酷暑烈日中。亦可澆以水糞。

火石榴

火石榴以其花赤如火而得名。究不外乎榴也。樹高不過一二
尺。自能開花結實。以供盆玩。亦有粉紅純白者。皆可入目。若嫌
其葉多花少。嘗摘去嫩頭。偏於烈日中以肥水澆之。則花更茂。
亦物性使然也。大抵盆種土少力薄。更不耐寒。逢冬必須收藏。

房簷之下。庶不凍壞。養盆榴法。無間寒暑。以肥爲上。盛夏置之
架上。或屋上。使不近地氣。則枝不大長。若蟻虧作穴。用米沮水。
沉沒花盆。浸約半時。取出日晒。如土乾。又復浸之。則無矣。倘發
霉太密。須掐去其半。則花開始有精神。結實不至半大便落。又
有一種細葉柔條者更佳。多產楊州。

櫟

櫟樹有二種。青皮櫟堅紪可爲器具。其皮肉俱青色。火櫟性質
輕脆。其皮肉皆紅。樹高一二丈。葉密如槐而尖。夏開紅花紫色。
一蕚數朵。芬香滿庭。實如小鈴。生青熟黃。又名金食子。鳥雀專

皆食之。故有鳳凰非棟實不食之語。江南自春至夏有二十四
番花信風。梅花爲首。棟花爲終。實熟鳥不食者。俗名苦棟子也。
木不有雌雄。雄者根赤無子。

棗

棗一名木蜜。樹堅直而高大。身多刺而少橫枝。葉細而有尖。四
五月開小淡黃花。香味甚濃。北地最廣。而青晉降州者更佳。今
貯之鮮者。通謂之白蒲棗。乾者率自河南山東北直諸處產。而
丁酉州樂氏棗爲最。浙之金衢紹出南棗。獨浦江者甘膩似蜜。雲
棗而形長大。蜜棗雖小而核細肉甜。羊棗實圓而紫黑色。江寧

窑坊棗與膠棗無皮核而人多重之。又東海有棗五年一實。棗
類甚多不能詳載。其實未熟雖擊不落已熟不擊自落。凡種擇
鮮棗之味美者交春種下候葉一生卽便移栽三步植一株行
欲相當地不必耕也。毋蠶入簇時以杖擊其枝間使振去狂花
則結實繁而且大。又於白露日根下遍堆草焚之以辟露氣使
不至於乾落。至正月初一早以斧背斑駁槌之名曰嫁棗。本年
必花盛而實繁。俗云移棗樹三年不發不斂死亦有久而復生
者。又東海之中有水赤棗。華而不實。

椿附而

柏

俗名香椿。樹高聳而枝葉疏。無花而不結莢者是也。其根立
枝春秋二分日移植卽活。其嫩葉初放時。土人摘以佐庖。點
香美絕倫。一種似椿而葉臭。有花而結莢者。俗呼爲臭椿。是
非椿也。江東人呼爲虎目。葉脫處有痕枯似也。

椿

楓

一名夔。香木也。其樹最高大。似白楊而堅。可作棟梁之材。葉
有三尖角。枝弱善搖。一月開白花。旋卽着實。圓如龍眼。上有
刺。不但不可食。且不中看。惟焚作香。其脂名白膠香。一經霜
葉盡皆赤。故名丹楓。秋色之最佳者。漢時殿前皆植楓。故人

柏

帝居爲楓宸。一云。楓脂入地千年。卽成琥珀。又有一種小楓。
高止尺許。老幹可作盆玩。

樹

楮

一曰。一名穀樹。有二種。一雄皮斑而葉無極父。三月開花。卽成長
枝似柳花而無實。一雌皮白。中有白汁如乳。葉有極父。似蒲
而碎花。結實紅似楊梅。但無核。而不堪食。皮可作紙。汁可克
蟲。二月內將子淘晒過種卽生。亦可佐服食。

明

梧桐

桐。一名青桐。一名櫟。木無節而直生。理細而性堅。皮青

葉缺如花。妍雅華淨。新發時賞心悅目。人家軒齋多植。

開花嫩黃。小如棗花。墜下如醭。五六月結子。蒂長三寸許。

合成老則開裂如箕。名曰橐鄂子。綴其上。多者五六。少者二

大如黃豆。

雲南者
更大

皮乾則皺而黃。其仁肥嫩而香。可生噉。亦可

炒食點茶。此木能知歲時。清明後桐始華。桐不華。歲必大寒。立

秋是何時。至期一葉先墜。故有梧桐一葉落。天下盡知秋之句。

每枝生十二葉。一邊六葉。從下數一葉爲一月。有閏則十三葉。

視葉小處。卽知閏何月也。二三月畦種。如種葵法。稍長移種。背

陰處。方盛地。喜實。不喜鬆。凡生岩石上。或寺旁。時聞鐘磬。

採東南大枝爲琴瑟音極清麗別有白桐油桐海桐刺柏

紫桐之異惟梧桐世人皆尚之又一種最小者因取其婆娑伸

茂堪充盆玩

楊梅

楊梅一名桃。昔爲吳越佳果。樹若荔枝而小葉細陰厚。至冬凋。隔年開花結實如穀樹子。而有核與仁。生青熟紅如鶴頂壯亦有紫白色者。肉在核上。無皮殼而有仁可食。以糖蜜拌核。則自裂仁出。

大畧生太湖杭紹諸山者實大肉鬆核小而味甘美。管辦有實小而醇。止堪鹽淹蜜漬火薰而已。種法六月間將子於糞坑中。

收金待來年二月。以青石屑拌黃土。

裡之待長尺許。

次年三月移栽澆以羊糞水自盛四年後取別樹生子好枝

之復栽山黃泥地移時根下須多留宿土臘月開溝於根旁

處離四五尺以灰糞壅之不可着根每遇雨肥水滲下則結

必大而甜若以桑樹接楊梅則不酸如樹生癩以甘草削針

之卽愈春分前海桐可接

於

接

古同

釤

實

橄欖

欖一名南威。一名味諫。俗呼青果。生嶺南及閩廣諸州郡。有種丁香欖。故欖瓣相繚。新婦欖樹似木槐聳直而枝高生

十八有數圓者。春開花似橘。其香甚甜美。實長寸許。其形似核。而頭銳核內無仁。而有三竅。深秋方熟。入口雖醉後漱清芬勝水雞舌者。是實先生者向。下後生者漸高。有樹大不可揷者。將熟時以木釘釘之。或於根旁刻一方寸坎。納鹽其中。久後實自落。木亦無損。其尖而香者。名丁香橄欖。最爲珍品。圓而大俗名柴橄欖。初食之甚澀。殆咀嚼久之。隨飲以水。回味自甘。餐可解酒毒。置湯中可以代茶。鹽淹蜜漬皆宜。又廣西出方十九。有三角邕州者。色類相似。但核作兩瓣之異耳。

荔枝

者

核。一名丹荔。一名離枝。爲南方珍果。嶺南蜀中俱產。惟門中
爲第一。樹有高至五六丈者。其形團圓如椎。蓋葉似冬青。花如
枳。又若冠之梨。綏柔如蒲萄。結實多雙核。類枇杷而尖長。殼
如紅綢。膜如紫絹。肉如白肪。甘如醴酪。花於春末。實於夏中。其
不堅久。其根多浮。須常加糞壤以培之。但性不耐寒。最難培植。
經繁霜。枝葉立萎。必待三春再發。初種五六年。交冬便須覆
土。直至四五十年。始開花結實。有四百餘年老幹。猶能結實。亦
名君品也。每逢夏至。將中其實。翕然俱赤。採食味甘多汁。而香大
美。不可百斛。妙在人未採時。百蟲不敢食。一經染指。鳥雀

蠶之類。俱來傷殘孰曉必趁日中併手採摘此果若離木枝
日色變二日香減三日味變四五日外色香味皆盡矣非惟北
地不可得卽江浙亦未之見也然其名色荔枝譜載之甚詳茲
畧舉蔡君謨之大概而錄之總由愛其實而摹擬其色香味與
地土形狀姓氏而巧爲名之耳多食病熱以蜜解之

附荔枝釋名共七十五種

諸色荔枝

狀元紅

實圓而小核細如丁香上品也

大將軍

五代時有此因種自將軍府得名

一品紅

於

枝爲極品產

玳瑁紅

紅有黑點類

陳紫

出著作卽陳琦家

陳紫乃爲果中第一

方紅

徑可一寸石木俱美

出自興化方家

石院色白其江綠

類陳紫差大而香

家紅

初爲第一今重

大次於藍紅江綠

類陳紫方紅而此

石院色白其江綠

類陳紫方紅而此

石院色白其江綠

類陳紫方紅而此

大丁香

殼厚色紫味微

色不長可三四寸

薄曲如

爪牙無核然不易得

宋公荔

枝

此陳紫而小

十八娘

王女年十八好此

珍珠荔

圓自如

珠無核

荔枝

此陳紫而小

荔枝

出南越四月熟

味甘肉薄

最小

水山荔

味甘肉薄

荔

每一百粒

粉紅

荔枝

荔枝

皮色深紅此

荔枝

出南越四月熟

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

荔枝

皮色深紅此

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

皮色綠而細

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

皮色綠而細

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

皮色綠而細

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

皮色綠而細

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

荔枝

味甘肉薄

命游家紫

出泉州
游氏

何家紅

漳州

綠核

荔核皆紫

蕙園

每十首

雙朱補

色似朱硫黃

以其色類硫

學士紺

實色最紅可愛

水晶

楓亭驛

出興化肉厚味甘

焦核

因其核最細

小雷國

水晶楓亭驛

出興化肉厚味甘

六月蜜

取六七月熟

七夕紅

因其七月中秋熟

因太遲也

三皺玉

肉微有皺紋

星毬紅

實圓有綠羅

實熟也

中秋熟

因太遲也

三皺玉

肉微有皺紋

星毬紅

似乎毬綠羅

包裹

猶帶綠

天茄子

色如麝香同

其香微有

天茄子

似於麝

松柏蟲

其形有

松柏蟲

類於松

實金鐘

金纓

紫璫

茨藜

延壽紅

以上諸名皆取其色

驅蹄

餛頭

蛇皮

雙髻

僧耆頭

以上取其形相似

脆玉

栗玉

玉芙蓉

郎官紅

水母

以上取其肉色

沉香

壽香

透背

中半熟

此種

取其

百步蘭

以上取其香相似

進鳳子

爭龍瓶

星角子

星角子

星角子

星角子

星角子

不翫子 大蠟 小蠟 雜舞引子

羊狗亦取其色得名

龍眼

龍眼。一名益智。一名比目。一名海珠。聚樹似荔枝而葉幹差小。
凌冬不凋其枝蔓延縹木而生春末開細白花結實圓如彈而
殼青黃核如木院子而不堅肉白有漿其甘如蜜一朶四五十
顆作穗若蒲萄然其性畏寒自露後方可摘荔枝有後方熟故
俗呼爲荔枝又因其色香味皆不及荔枝故稱爲奴在食品則
荔枝肉厚漿多而香因可人口特珍異之若論益人則龍眼功
用良多荔枝性熱而龍眼性最和平宜與荔枝比肩烏得不

本草綱目
卷之三
隸之耶。

黃楊木

黃楊木樹小而肌極堅細枝叢而葉繁四季長青每歲止長一寸不溢分毫至閏年反縮一寸昔東坡有詩云園中草木春無數惟有黃楊尼閏年因其難大人多以之作盆玩

椰

椰出海南今嶺南亦有之葉如棕櫚樹高六七餘丈亦無枝條葉在木末如東蒲實生葉間一穗數枝大如寒瓜皮中子殼可爲飲器鋸開子中白瓢厚有半寸味似胡桃極肥美有漿飲之

初極清芬。久之則渾濁不堪飲矣。人皆取其殼作瓢。能解
毒。如酒有毒。則酒滾沸而起。今人反漆其裏。是失本旨矣。

椒

椒。一名薈蕊。一名漢椒。有秦搘三種。今處處有之。惟蜀產者香
烈。木高四五尺。似茱萸而小。木有針刺。葉堅而滑。昧亦辛香。蜀
人取嫩芽作茶。其葉對生。尖而有刺。四五月結子。枝葉間如小
豆而圓。生青熟紅。皮皺肉厚。均有小黑子突出。如人之瞳子。故
有椒目之稱。喜陰惡糞。宜壅河泥。又一種胡椒。生於西戌北入。
冥物中多尚之。廣東一種小椒。係蔓生。其辣味與樹椒同。

茱萸

茱萸隨處皆生木高丈餘皮青綠色葉似椿而潤厚色青紫
間有刺三月開紅紫細花其實結於枝梢紛繁成簇而無核嫩
時微黃至熟則深紫味辛辣如椒并側河邊宜種此樹葉落其
中人飲是水永無瘟疫懸子於屋能辟鬼魅九月九日折茱萸
戴首可辟惡氣除鬼魅

銀杏

銀杏一名鴨腳子以其葉似鴨脚也多生南浙木最耐高丈餘大
可數圍其肌理甚細可爲器其梁棟之用又名公孫樹言公孫

而孫始得食也。緣其子曰俗呼爲白果。其花夜開即落。人罕見之。實大如枇杷。每枝約有百十顆。初青後黃。八九月熟後。打下堆積空處。待其皮自腐爛。方取其核。洗淨曝乾。核形兩頭尖扁而中圓。或炒或煮。而食俱可。春初種肥地。週年後方可移栽。其核有雌雄。雌者兩稜。雄者三稜。須雌雄同種。方肯結實。或將雌樹臨水種之。照影亦結。或將雌樹鑿一孔。以雄木填入。泥封之。亦結。大約接過易生。實熟時。以竹籜篩樹本。但擊篩。則果自落。雖爲佳果。可以療痼。究竟不可多食。食多動風。惟舉子廷試。袁飮能截小水。如食多誤中其毒。一時腹內痛脹。連飲冷白。

孟一吐卽愈

胡桃

胡桃。一名羨桃。一名萬歲子。樹高數丈。葉翠似梧桐。兩兩翠對而長。且厚而多陰。三月開花如栗花。穗蒼黃色。實似青桃。有二種。殼薄多肉易碎者。名胡桃。產荆襄。殼堅厚須重搥乃破者。名山核。桃產燕齊。採用先剖去青皮。乃得核桃。核內有白肉。形如猪腦。外有黃膜微澁。須湯泡去之。可食。然其性熱。只宜少食。下種必擇其佳者。殼光紋淺體重之核。平埋土中。卽能發芽。若以尖縫向上。則土浸其仁壞。多不能活。春研皮中出汁。婦女承取。

頭則黑髮。又將核入火中燒半紅。埋灰中作火種。經三四日
不動亦不燼。

六月雪

六月雪。一名悉茗。一名素馨。六月開細白花。樹最小而枝葉扶
疎。大有逸致。可作盆玩。喜清陰。畏大陽。深山叢木之下多有之。
春間分種。或黃梅雨時扦挿。宜澆淡茶。

茶

上茶一名薜。音早。採爲茶。晚採爲茗。其葉以穀雨前採者爲貴。花
巴月白而心黃。清香隱然。瓶之高齋。誠爲雅供。且蓋在枝。

逐一皆開性畏水與日不澆肥者茶更香美其所產之地
但不宜於北今就最著名者而衡之松羅伏龍天池陽羨等處
色翠而香遠界片產吳興是茶而實非茶種皆爲江浙第一如
虎丘龍井又爲吳下第一惜不多產至於荆溪武夷稍下六安
可入藥而香味不及天目徑山次之此外所產只可供本上之
用耳藏茶須用錫瓶則茶之色香雖經年如故近日閔茶以松
羅雜真珠蘭焙過而香更烈者終不若天然香味之足貴也但
茶性甚淫梅花茉莉玫瑰木樨隨拌隨染其香矣

枳椇

枳椇。一名木蜜。一名雞距子。樹高三四丈。葉圓大如桑柘。枝柯不甚直。子着枝端。夏月開花。實長寸許。紐曲開作二三岐。形若雞之足距。嫩時青色。經霜乃黃。味甘如蜜。嫩葉生啖亦甜。老枝細破煎汁成蜜。倍甜能止渴解煩。但敗酒味。若以此木爲柱。則屋十之酒必薄。每實開岐盡處。結一二小子。內有扁核。色赤如酸棗仁。飛鳥喜巢其上。

槐

槐。一名檳。一名盤槐。一名守宮槐。樹高大而質鬆脆。葉細如豆瓣。季春之初五日如兔目。十日如鼠耳。更旬始規。二旬葉生。

疏可觀。花淡黃而形彎轉。在秋初時開。故有槐花黃舉子。
説人多庭前植之。一取其蔭。一取三槐吉兆。期許子孫三公才。
意。花可染色。結實至明年春暮方落。落卽自生小槐。懷槐葉大。
而色黑。本如棠盤。槐膚理葉色俱與槐同。獨枝從頂生。皆下垂。
盤結叢密如涼傘。性亦難長。歷百年者高不盈丈。或植廳署前。
或種高阜處。甚有古致。守宮槐幹弱花紫。晝蟲夜炕。又俗名猪
屎槐者。材不堪用。種法收子晒乾。夏至前以水浸生芽。和麻子
撒肥地。當年卽與麻齊刈。麻留槐別樹竹竿以繩攔定。來年復
種麻護之。三年後方可移栽。老槐經秋可取火。

紫薇

紫薇。一名百日紅。其花紅紫之外有白者。曰銀薇。又有紫帶藍色者。曰翠薇。俗呼爲怕痒樹。其樹光滑無皮。人若搔之。則枝幹無風而自動。亦其性使然也。葉對生。一枝數穎。一穎數花。六月始花。其蕊開謝相接續。可至九月。約有百日之紅。其性喜陰。宜栽於叢林之間。不蔽雨露處。自茂。根旁小本分種易活。

白菱

白菱葉似梔子。花如千瓣菱花。一枝一花。葉托花朵七八月間發花。其花垂條。色自如玉。綽約可人。亦接種也。

木槿

木槿。一名薈英。一名玉蒸。又名日給。愛老。重臺。花上花諸名。惟千葉白與紫大紅粉紅者佳。葉繁密如桑而小。花形差小。如蜀葵。朝榮夕隕。遠望可觀。若單葉末條五瓣成一花者。乃籬槿也。止堪編篋。花之最下者。南海有朱槿。但不易得耳。在春初扦插。以河泥壅之。卽活。若欲扦籬。須一連插去。不可住手。如斷續插。生後雖盛。亦必斷而不接也。其嫩葉可代茶飲。

桂

桂。一名梗。一名木樨。一名巖桂。葉對生。豎厚而硬。凌寒不凋。枝

條繁密木無直體。花甚香甜。小而四出。或有重臺。亦不易得。其種不一。自名銀桂。黃名金桂。能著子紅名丹桂。不甚香。又有四季桂。月桂。聞中最多。葉如鏘齒。而紋粗。花繁而香濃者。俗呼毬子木樨。花時凡三放。爲杜桂第一。澆以猪胰則茂。壅以土糲沙則肥。但不宜壅。而喜潤。沈若移栽。須擗高掌。半日半陰處。以臘雪高壅其根。則來年不遺白蕊。冬月以擗猪湯澆一次。尤妙。如禾生蛆。取芝麻梗懸之樹間。能殺諸蛆。一云。木樨接於石榴樹上。其花即成丹桂。花謝後。摘去其蒂。亦如鳳仙可發三次。屈其條壓土中。良久自能生根。一年後截斷。八月含蓋時移種。

冬青樹接亦可。花以鹽漬浸之，經年色香自在。以糖椿竹。

茶香美

皂莢

皂莢。一名皂角。所在有之。樹最高大。葉如槐而尖。細枝多刺。夏開小黃花。結實有三種。小而尖者名豬耳。長而肥厚多脂者可用。長而瘦薄不粘者劣。初生時嫩芽可茹。莢老可入藥。二三月宜種。如樹大不結莢。當於南北二面去地鑽孔。用木釘釘入泥封其孔。來年卽結。

櫻櫛

櫟一名鬚葵。木高數丈。直無旁枝。葉如車輪。叢生木杪。有棕
色於木上。二旬一剝。轉復上生。三月間木端發數芽苞。苞中
種子成列。卽花穗亦黃白色。結實大如豆而堅。生黃熟黑。每
個墮地。卽生小樹。宜植庄園之内。性喜鬆土。或鳥雀食子。遺糞於
地。亦能生苗。秋分移栽。先掘地作坑。用狗糞鋪坑底。再以肥土
益之。初種月餘。以河水澆灌。日一澆。後此隨便可也。至其粽之爲
此。織衣帽。禡椅之類甚廣。再製爲繩索。縛花枝。紮屏架。雖經雨
雪。耐久不爛。園圃中極當多植數本者。

紅豆樹

紅豆樹出嶺南。枝葉似槐。而材可作琵琶槽。秋間發花。
蟲蠶七下垂。其色妍如桃杏。結實似細皂角。來春三月。則莢
子老。內生小豆。鮮紅堅實。永久不壞。市人取數殼子。或貯銀囊。
俗皆用以爲吉利之物。又有一種半截紅。半截黑者。名相槐子。
土人多採以爲婦人首飾。

無花果

無花果。一名優曇鉢。一名映日果。一名蜜果。樹似胡桃。三月發
葉似楮子。生葉間五月內不花而實。狀如木饅頭。生青熟紫。味
如柿而無核。植之其利有七。一味甘可口。老人小兒食之有益。

無益。二曝乾與柿餅無異可供邊實。三立秋至霜降取次成熟可爲三月之需。四種樹取効最速。桃李亦須三四年後結實。此果截取大枝扦插。本年即可結實。次年便能成樹。五葉爲醫時勝藥。六霜降後知有未成熟者可收作糖蜜煎果。七得土即活。隨地廣植多貯其實以備歉歲種法在春分前取三尺長條插土中澆以糞水若生葉後惟澆清水結果後更不可缺水常置瓶其側出以細雷日夜不絕實大如甌。

枇杷

枇杷。一名盧橘。樹高一二丈。葉似枇杷。又如驢耳。背有淡

枝葉婆娑。凌冬不凋。秋發細蕊成韻。冬開白花。來春結子。
作球。微有毛。如鶯黃小李。至夏成熟。滿樹皆金。其味甘美。收
種之卽出。待長移栽。春月用本色肥枝接過。則實大而核小。若
再接一次。則無核矣。性不善糞。但以淋過淡灰壅之。自能榮茂。
果木中獨備四時之氣者。惟枇杷核能去徽垢。

栗

栗產濮陽。范陽。兗州。而宣州。杭州者更佳。樹似櫟。而花色青黃。
與他花特異。枝間綴花長二三寸許。有似胡桃。人俟其落時收
之。點火風雨不滅。結實如毬。外有芒刺。內有栗房。一包三五枚。

則鏟拆子山如欲乾收或亦可懸迎風處若欲生收

熟

中至春三四月尚如新摘者冬未春初將子埋濕土中

沙

地待生長六丈餘方可移栽春分時取櫟樹或本樹生子肥
潤者接之亦可栗生數年不可掌近凡屬新栽樹皆然而栗尤

粗

十月天寒以草包之二月方解或云與橄欖同食能作梅花

木

味而橄欖無楂。

甘

棗

生關中鄆坊山東等處樹似梓而高丈餘葉色如牛李冬發

春結實外殼堅內肉香狀如小栗其核中悉如李生則

味乾則甜美可食產遼東新羅者更肥美栽種法與栗同

榧

榧一名坡子。一名玉榧。俗呼赤果。產自永昌杭州者不及信州玉山之佳葉似杉而異形其材文彩而堅本大連抱高有數仞古稱文木堪爲器用樹有牝牡牡者開花而牝者結實理有相感不可致詰也冬日開黃圓花其實有皮殼如棗而尖短去皮殼可以生食若火焙過便能久藏食更香美大槢以細長而心實者爲佳一樹可得數十斛二月下子種。

木蘭

木蘭一名木蓮。一名杜蘭。生零陵山谷及泰山。上狀如楠樹。高數丈。枝葉扶蘇。皮似桂而香。葉似長生。有三道縱紋。花似辛夷。內白外紫。亦有紅黃自數種。交冬則榮。亦有四季開者。實如小柿。甘美可食。

茶梅花

茶梅非梅花也。因其開於冬月。正衆芳凋謝之候。若無此花點綴。二三則子月幾虛度矣。其葉似山茶而小。花如鶯眼錢而色粉紅心深黃。亦有白花者。開最耐久。望之雅素可人。

天仙果

天仙果出自四川。樹高八九尺。葉似荔枝而小。不開花。子如櫻桃。六七月中熟。其味最美。

古度子

古度子出自交廣諸州。本無葉似栗。不開花而實。枝間生子。大如安石榴。及櫛子。而色赤。味酸。煮以爲糴食之。若遲數日不煮。則化作飛蟻穿皮飛去矣。此蓋無情化有情之一驗也。

攀枝花

攀枝花一名木綿。產於南越。樹頗梧桐高四五丈。葉類桃而稍
卷似山茶。則時殷紅如錦。味甘。性寒。酒盃架吐於10。

花土人取其實。斧紮鋪香甚軟美。但不可作綿線。若樹上有
不盡者。猶如柳絮。卽飛揚四散矣。

柏

柏。一名烏柏。一名柏柳。出浙東江西浙最高大。葉如杏而薄小。
淡綠色。可以染皂。花黃白。子黑。可以取脂爲燭。其子中雜核。
可笮取油。止可燃燈油。全不可食。食則令人吐瀉。木必接過方。
結子。不接者。雖結不多。秋晚葉紅。可觀。亦秋色之不可少者。

石楠

石楠。昔楊妃名爲端正木。南北皆有之。樹大而婆娑。其

葉如枇杷。有小刺而皆無毛。名曰鬼目。春盡開白花成簇。
細紅實。冬有二葉爲花苞。苞既開。中有十五餘花。大小如椿。
其細碎。每一苞約彈子大而成簇。一花六葉。一朵有七八簇。淡
白綠色葉本微淡赤色。花既開。甚濃。花。但見葉。不見花。花纏罷。
陽年綠葉始落。漸生新葉。綠葉密多蔭。人皆移植庭院間。清明
時紅葉墮地。小兒拾爲冠帶嬉戲。蜀中一種最大者。可數十圍。
中梁柱之用。小者爲梳最精。

鐵樹

鐵樹葉類石楠質理細厚。幹葉皆紫黑色。花紫白。如瑞香四瓣。

叔少園一開累月不凋。嗅之乃有草氣。因憶古人嘗見事或難
成。便云除須鐵樹開花。疑無是樹。及至馴象衛。般指揮園中見
有此樹。高可三四尺。詢其名。則曰鐵樹。每遇丁卯年。便放花。其
年果花移置堂上。治酒歡飲。作詩稱賀。若非到此目睹。則安知
真有是木耶。及聞海南人言。此樹黎州極多。有一二尺長者。葉
密而花紅。樹叢類鐵。其枝梗穿結。甚有畫意。益玩最佳。但人所
罕見。故稱奇耳。五臺山有鐵樹

冬青

冬青。一名萬年松。樹似狗骨。枝幹疏勁。葉綠而亮。隆冬

以染緋。庄園徑路多排直面種。號曰冬牆。要開小白
不佳。花含蘊必雨。花落後必晴。結子圓而青。名曰女貞。

釀酒子墜地即生苗。移植易活。欲其茂盛。須用猪糞壅。再以猪
湯澆。雖至凋瘁。復榮。一種細葉冬青。枝條細軟。乘小時種。旁籬
邊用以密編。可蔽籬眼。堅久如壁。又一種水冬青。葉細而嫩利。
於衣蝶子取白蠅。宋徽宗試畫院諸生。以萬年枝上太平雀爲
題。無一知者。及扣之。冬青也。洪武時。杭城各街市。比屋植冬青。
亦取吉祥之意。

榆

死猫能引他人之竹過牆如不欲其過牆須掘一溝便止長至

四五年即宜伐去庶不得新笋如笋生花結實似稗謂之竹

人謂林皆枯治法在初發時擗一二大竿截去止留下三

丈高之則花自止竹亦不敢矣種竹有四字

顧者謂三四尺方種一顆欲其土虛易

竽一堆使其根密自相

每用河泥厚壅之

六。八月初八及

其實落地多生之矣遂成町矣

江南俗有竹實大若雞卵葉包裹味甘

附竹釋名共三十九種

諸異

二時竹

麻勸畊繞節凸生子丑寅卯等十二宗

箇

新

州一枝竹

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

以酸鷄竹

州一枝竹葉皮利刃爲鷄甲用以微滑

新

二尖竹

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

如鷄竹

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

列庭竹

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

用其幹似竹非竹黑色有皮心實肉內有白鬃紋

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

葉如棕身如竹密節而實心厚理瘦骨天然

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

圓取爲樂器聲中管籥者

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

生山石者音更清亮可人

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

湘妃竹

安福周侯叔家得此種亦造物之奇也

新

如淚痕狀竹

金鑲碧嵌竹

產自成都近日浙杭亦有與常竹無異但幹上每節兩青兩黃相間

孝順竹

幹細而長作大叢夏則筍從中發涼讓母

方竹

產於澄州

桃源

杭州今江南俱有體方有如鳳尾竹

紫幹高不過二尺葉細小而猗那

削成而勁挺堪爲柱杖亦異品也

鳳尾竹

紫幹高不過二三尺葉細小而猗那

類鳳毛盆種

竹

一作毛竹浙間最多幹大而厚葉細而小可作清玩

竹

異於他竹人取編牒作舟或造屋皆可

蘄竹

出楚郡蘄州王人取其色之

雙竹

生浙之武林西山其

蘄竹

盤潤者爲簾節缺者爲簾笛

雙竹

妙在侈篁嫩筍對抽

最可愛龍公竹

許節長丈二葉若芭蕉

紫竹

山艮餘細而

色深紫艮之可爲

弓竹

產於東方本長百尋其曲如藤狀

竿管今浙中皆有

必得大木乃倚而上質有文理

柯

亭竹

產在雲夢之南其幹後期年

之後伐爲樂器音最清亮

桂竹

出自南康麻幹高四

似甘草皮

其節中復又生筍出海外

月竹

產於江

嘉定

每月抽節其形輕翹而叢生有如箭背
璇竹_{產於吳越諸山其斑綵雖不及湘妃而細波無旋紋色}
{古辣湘妃然在器皿所用最廣}墨竹{其狀如古藤長有}
{理之黑}大夫竹{以其修長幹直凌雲圃有龍鬚竹生辰州及}
如鐵_{二尺故得是名出鄭延}青鬚竹_{浙之山谷}
間高不盈尺而枝幹細僅如針_{其幹之大至有十抱}
可作盆玩但遇冬不可見霜雪_{臨賀竹被之龍公竹更奇出}
臨慈_{有其幹內實而節疎性弱而}
賀慈竹_{形堅其細勑可代簾用}龜文竹_{產於寶陀岩昔年}
甚奇今不復見_{本以之製扇}
可得矣_{大皆兩兩相對而生}疏節竹_{其幹最高}
一寸許出自_{丹青竹}丹青竹_{出自熊耳山其葉有三}
黎母山_{陽凝波竹}凝波竹_{其枝葉皆似常竹但有紅浦竹}
直上無節而中心空洞無節亦異種也_{花開似安石榴亦奇種也}
昔傳是竹長百丈出自南荒之域附此以誌異月

竹

漢武帝遣人開
并洞致邛竹

徑寸竹

產湖湘可
爲翫用

觀音竹

出占城國

靈芝

靈芝。一名三秀。王者德仁則生。非市食之菌。乃瑞草也。種類不同。惟黃紫二色者。山中常有其形如鹿角。或如繖蓋。皆堅實芳香。叩之有聲。服食家多採歸。以蘿盛置飯甑上。蒸熟則乾。藏久不壞。備作道糧。又芝草一年三花。食之令人長生。然芝雖稟山川靈異而生。亦可種植。道家植芝法。每以糯米飯搗爛。加雄黃。鹿頭血。包曝乾。冬筍候冬至日。埋於土中。自出。或灌藥入老樹腐爛處。來年雷雨後。即可得各色靈芝矣。雅人取置盆盎之子。

蘭蕙之中。甚有致。且能耐久不壞。

附靈芝釋名

共計四十一品

五色芝

五品

赤芝

一名丹芝。色如珊瑚。其體異黃。

黃芝

一名金芝。色如紫金。光明洞徹。多產

於嵩山之上。

食之不老。黑芝

一名玄芝。色如澤漆。

青芝

一名龍芝。色如翡翠之羽。

多產於泰山。

白芝

一名素芝。色如截肪。

生華山。唐時延

木芝

十一品

千歲芝

生於蘆木下。根如坐人刻之有血。取血

木威喜芝

松脂

金二足可行水。隱形延年。却疾者。

涓涓化爲茯苓。歲久一生小木。狀似

童子。夜視有光。執之不焦。服之得血。

飛節芝

生千年老松上。

皮中有脂。其狀

茹飛舞服之木渠芝

寄生大木上狀似蓮花而叢有九莖味則甘而帶辛

黃葉芝

生於

可以長生

木渠芝

寄生大木上狀似蓮花而叢有九莖味則甘而帶辛

黃葉芝

千年黃葉根下另有細根如絲縷服之可得地仙

參成芝

赤色有光拍其枝葉如金石之音

建木芝

生都廣皮如鳥纓實如鸞

五德芝

其形如車馬食之者壽可得千歲

樊桃芝

木如龍花如丹蘿實如飛

九光芝

形如盤槎生臨水之高山頂

九莖芝

幹九莖其色紅黃可愛

草芝

十三品

龍仙芝

形似昇龍相負食之可以長生

白雲芝

生名山白石之陰有白雲時覆其上

青雲芝

三重其理則

獨搖芝

根大如土莖粗如指能無風自動

牛角芝

生虎壽山形似葱而特出

赤食之主壽類

紫珠芝

莖黃葉赤實如李而紫色生盤田

火芝

葉赤而莖青昔爲赤松子之所服

九曲芝

每曲三葉實至季夏始實

白符芝

似梅大雪開花

夜光芝

生華陽洞山有五色

生菜間其莖如針

九曲芝

每曲三葉實至季夏始實

白符芝

本草

卷之四

半浮鳳臘芝

其苗如匏而結實若桃

生山陰時有雲護

金芝

漢秋採食令人身輕

元

康中玉芝九莖蓮葉生于醴德殿銅池

又唐主元二年含輝院產金芝

石芝

七品

玉暗芝

生於有玉之山狀似烏獸色無常形多七明芝

生臨水石戶中

崖間葉有七孔寶堅如石夜見其

光不食至七枚則七孔洞然矣

石蜜芝乃不易得者桂

芝生石穴中似桂樹乃

月精芝生少室石戶中

石勝芝而出自石中而色黃

金蘭芝冬生於山

多壽

月精芝秋生山陽石上

間食之月精芝莖青上赤味辛

肉芝

五品

人掌芝

蕭何之掘也得一物類人掌烹食之後過一道人見其神氣不凡語曰子得食肉芝自此壽可等乎

龜鵠蝙蝠芝

明成化間長洲產肉芝其形類蝙蝠人皆以爲異而特誌之

千歲鮑

矣

萬年芝

因其形似萬年芝人皆以爲異而特誌之

丁歲蟾蜍

燕胎芝

皆肉芝也

芝原仙品其形色變幻莫可端倪故有靈芝之稱惟有緣者得遇之耳據採芝圖所載名目有數百種茲止錄其十分之三以備山材高隱之士爲服食參攷之一助也。

凌霄花

凌霄。一名紫葳。又名陵苕。鬼見。蔓生必附于木之南枝而上高可數丈。蔓間有鬚如蝎虎足。着樹最堅牢。火則本大如盃。春初生枝一枝數葉尖長有齒深青色開花每枝十餘朵大若牽牛

狀花頭開五瓣。上有數點黃色。夏中乃盛。深秋更赤。八月結莢。
如豆角長三寸許。子輕薄如榆仁。用以蟠綉石。自是可觀。但氣
香多聞太久。則傷腦。婦人聞之能墮胎。不可不慎。昔洛陽富難
公家植一本。初無所依附。而能特立。歲久遂成大樹。亭亭可愛。
亦草木之出乎其類者也。

真珠蘭

真珠蘭。一名魚子蘭。枝葉有似茉莉。但軟弱須用細竹幹扶之。
花卽長條細蕊。蕊大便是花開。其色淡紫而瑩。如珠。性宜陰
濕。又最畏寒霜。降後須同建蘭茉莉。一樣入窖收載。若在閩粵。

則又當別論矣。三月初方可入窖，當以魚腥水五日一澆，雖喜肥，却忌澆壅。花與建蘭同時，其香相似，而濃郁尤過之。好清者每取其蕊，以焙茶葉甚妙。但其性毒，止可取其香氣，故不入藥。

茉莉

茉莉一名抹利。東坡名曰暗麝。釋名鬚葦。原出波斯國。今多生於南方暖地。北土名奈木。木者出閩廣。幹粗莖勁。高僅三四尺。莖木者出江南。羽莖叢生。有長至丈者。葉似茶而微大。花有單瓣重瓣之異。一種寶珠茉莉。花似小荷而品最貴。初蕊時如珠。每至暮始放。則香滿一室。清麗可人。摘去嫩枝使之再發。則枝

繁花密。以米泔水澆。則花間不絕。或浸皮層。不經消或黃豆汁。井糞水皆可。性喜暖。雖烈日不懼。但五六月間。每日一澆。宜於午後。至冬節。當加土壅根霜降後。須藏暖處。清明後方可出土。怕春之東南風。故藏宜以漸而密。出亦宜以漸而散。如土藏太乾。日暖時。界澆冷茶。直待芽發後。方可澆肥。梅雨時。從節間摘斷。將折處劈開。挿大麥一粒。以亂髮纏之。扦插肥喫地內。卽活。若根下生蟻。灌以烏頭冷湯。卽無如換盆過。須易新土更妙。六月六日。宜用魚腥木一澆。或鹿糞。或雞屎壅最盛。又聞閩廣有一種紅黃二色茉莉。余實未之見。想亦不易得之物也。

萬年藤

萬年藤。一名天棘。生於金陵半首山及浙之東天目係晉魏至今者。其本大如桶。葉如綠絲。古致不同。誠神物也。春間根旁嫩苗可以分植。

紫藤

紫藤喜附喬木而茂。凡藤皮著樹從心重。重有盧。其葉如綠絲。四月間發花。色深紫。重條綽約可愛。長安人家多種飾庭院。以助喬木之所不及。春間取根上小枝。分種自活。

葡萄

蒲萄俗名李桃。張騫從大宛移來。近日隨地俱有。然味不如北
地所產之大而甘。蔓梗柔條。葉盛枝繁。極其長大。延蔓可數十
丈。必依架附木。若蟠之高樹。其實纍纍。懸掛可觀。三月開黃白
小花。成穗實圓如櫻桃。有紫白黃三色。白名水晶。紫名馬乳。蜀
中又有練絲者。夏中坐卧其下。葉密陰厚。納涼最宜。富室取其
實。挾汁作酒甚美。春分剪其枝。插肥地。卽活。結子後。卽宜剪去。
繁葉。彼受雨露之滋。則實易肥大而甜。每日灌以冷茶。間兩日
澆水。或用米泔水和黑豆皮。或以煮肉淡汁澆之。不宜用糞。碧
以此藤穿棗木而生者。味更甘美。入麝香於其皮內。則蒲萄熟

時盡帶香味可口。十月終落葉後去根一步許掘一大坑收捲其枝條悉埋之。細枝莖嫩恐傷雜襯以黍穰更佳如無黍穰竟以土蓋亦無礙。因其性不耐寒不埋恐凍死耳。待二月中還出舒於架土。若歷歲久而幹老者只須穰草覆之。南方則不必坑矣。凡扦插在正月下旬取肥枝長四五尺者捲爲小圈令繫先治地極肥鬆種之止留三節在外俟春氣發動衆萌盡吐而土中之節不能條達則莢華盡萃於出土之二節不二年而成棚矣。又波斯國蒲萄有大如雞卵者土魯國蒲萄有小如胡椒者名瑣瑣蒲萄無核而味更甜美物之不齊地土使然也。

枸杞

枸杞。一名枸櫞。一名羊乳。南北山中及丘陵墻垣間皆有之。以其棘如枸之刺。葉如杞之條。故兼二木而名之。生於西北者高而肥。生於南方者矮而瘠。歲久本老。虬曲多致。結子紅點若綴。頗堪盆玩。春生苗葉微苦。沖過可食。秋生小紅紫花。結實雖小。而味甘。澆水必清晨。則子不落。壅以牛糞。則肥多。取陝西甘州者。因其子少而肉厚。入藥最良。其莖大而堅直者可作杖。故俗呼仙人杖。

天蓼

天蓼。一名木蓼。非草也。產於天。明二山本與梔子相類。其葉冬月不凋。花開黃白色。結實。不但未審蓼之性何來。子可爲燭。

棣棠花

棣棠花。藤木叢生。葉如茶蕨。多尖而小。邊如鋸齒。三月開花。金黃色。圓若小球。一葉一蕚。但繁而不香。其枝比薔薇更弱。必延蔓屏樹間。與薔薇同架。可助一色。春分剪嫩枝。扦於肥地。卽活。弭本妙在不生蟲蟻。

薔薇

薔薇一名買笑。又名刺紅玉雞苗藤本青莖多刺宜結屏種花
有五色。達春接夏而開葉尖小而繁經冬不大落一枝開五六
朵深紅薔薇大花粗葉最先開荷花薔薇千葉淺紅似蓮刺梅
堆千葉大紅花如刺綉所成開最後又有淡黃薔黃金黃之異
爲薔薇中之上品但易盛而難久白者類玫瑰而無香若寶相
亦有大紅粉紅二色其朵甚大而千瓣塞心可爲佳品又有紫
者黑者出自白馬寺正月初剪肥嫩枝長尺餘者插於陰肥之處
卽活但不可多肥太肥則腦生莠虫如有虫以煎銀鍤中爐灰
撒之則虫自死夏間長嫩枝時有黑翅黃腹小飛虫名鑄花娘

子。以簪入枝梗生子。三五日後出細青虫。而嘴黑者。食葉傷枝殆盡。大而又變前虫。專在玫瑰。薔薇。月季。十姊妹等樹上生活。見則速宜捉去。以免食葉之患。又薔薇露。薤瓜哇園。以一滴置盆湯內。滿盆皆香。沐面盥手。可以竟日受用。

玫瑰

玫瑰。一名徘徊花。處處有之。惟江南獨盛。其木多刺。花類薔薇而色紫。香膩馥郁。愈乾愈烈。每抽新條。則老本易枯。須速將根旁嫩條。移植別所。則老本仍茂。故俗呼爲離娘草。嵩山深處。有碧色者。燕中有黃色者。花差小於紫玫瑰。每年正月盡二月初。

分根種易活。若十月後移。恐地脈冷。多不能生。凡種難於久遠者。皆緣人溺澆殺之也。惟喜穢汚澆壅。但本太肥。則易悴不可不察。此花之用最廣。因其香美。或作扇墜香囊。或以糖霜同烏梅搗爛。名爲玫瑰醬。收於磁瓶內。曝過。經年色香不變。任用可也。

月季

月季。一名鬪雪紅。一名勝春。俗名月月紅。藤本叢生。枝幹多刺而不甚長。四季開紅花。有深淺白之異。與薔薇相類。而香尤過之。須植不見日處。見日則白者一二紅矣。分栽種扦俱可。但多蟲莠。須以魚腥水澆。人多以盆植爲清玩。

木香花

木香。一名錦棚兒。藤蔓附木。葉比薔薇更細小而繁。四月初開花。每穎三蕊。極其香甜可愛者。是紫心小白花。若黃花則不香。卽青心大白花者。香味亦不及。至若高架萬條。望如香雪。亦不下於薔薇。剪條扦種亦可。但不易活。惟攀條入土壅泥壓護。待其根長。自本生枝外。剪斷移栽。卽活臘中養之。二年大盛。

野薔薇

野薔薇。一名雪客。葉細而花小。其本多刺。蔓生籬落間。花有純白粉紅二色。皆單瓣。不甚可觀。但香最甜似玫瑰。多取蒸作露。

採含蘆。拌茶亦佳。患瘧者。烹飲卽愈。若花卸時。摘去其蒂。猶如鳳仙花。開之無已。此種甚賤。編籬最宜。

十姊妹

十姊妹。又名姊妹花。似薔薇而小。千葉磬口。一蓓十花。或七花。故有此二名。色有紅白紫淡紫四樣。正月移栽。或八九月扦插。未有不活者。

纏絲花

纏絲花。一名刺孽。葉圓細而青。花儼如玫瑰。色淺紫而無香。枝葉皆有刺針。每逢煮繭。纏經時。花始開放。故有此名。二月中根

可分栽

茶簾花

茶簾花。一名佛見笑。又名獨步春。百宜枝。雪梅墩數名蔓生多刺。綠葉青條。須承之以架。則繁花有三種。大朵千瓣。色白而香。每一穎者二葉如品字。青附紅萼。及大放。則純白。有密色者不及黃薔薇。枝梗多刺而香。又有紅者。俗呼番茶簾。亦不香。詩云。開到茶簾花事了。爲當春盡時明也。種則攀條入土。壅之以肥泥。候其枝長。剪斷移栽自活。

千歲蘿

千歲藥生太山深谷間藤蔓如葡萄實似桃而多綠木土汁白而味甘亦可食但醉而不甚美在土人亦不棄也

柳穿魚

柳穿魚一名二至花葩甚細而色微絢謂之柳穿魚者以其枝柔葉細似柳而花似魚也其花發於夏至歛於冬至故名二至花又名如意花性喜陰燥而惡肥糞宜用豆餅浸水澆或熟豆壅根亦可吳門花市多結成樓臺鳥獸形以售

珍珠花

珍珠花一名玉屑葉如金雀而枝幹長大三四月開細白花皆

綴於枝上。繁密如字婁狀。俗名芋花。非。春初發萌時可以栽。

鳳尾焦

鳳尾焦。一名畚焦。產於鐵山。江西福建皆有。葉長二三尺。每葉出細尖瓣。如鳳毛之狀。色深青。冬亦不凋。如少萎黃。卽以鐵燒紅釘其木上。則依然生活。平常不澆壅。惟以生鐵屑和泥壅之。自茂。且能生子。分種易活。極能辟火患。人多益種庭前。以爲玩。

玉蘂花

玉蘂花。向爲唐人所重。故唐昌觀有之。集賢院有之。今自招隱寺得一本。蔓若茶蘞。冬凋春榮。葉似柏莖。微紫。花苞初甚細。經

月漸大暮春方八出。顏如冰絲上綴金粟花心復有碧筍狀類膽瓶。其中別抽一英。出衆鬚上散爲十餘蕊。猶刻玉然。世多未之見。亦猶瓊花之難得也。

錦帶花

錦帶花一名對邊絲。三月開。花當可愛。形如小鈴。色內白而外粉紅。長梗密花。如垂錦帶。但艷而不香。無子。亦有深紅者。一樹常開二色。有類海棠種於屏籜之間。頗堪點綴。種法於秋分後剪五寸長枝。插鬆土中。每日澆清糞水。良久自活。

鴛鴦藤

鴛鴦花。之名恐多。隨處有之。延蔓多附樹。莖微色紫。有甚心方。之其嫩莖色青。有毛。葉生到節似蘚荔。三四月間開花不絕。長其許一蒂兩花二瓣。一大一小長短初開。則葢瓣俱曰經三。口則變黃。新舊相參。黃白相映。如飛鳥。又名金銀藤。氣甚清芬。而莖葉花皆可入藥用。因其藤左纏。俗名左纏藤。

鋪荔枝

錦荔枝。一名紅姑娘。一名癩葡萄。四月下子。抽苗延蔓附木而生。葉似天蘿有微刺。七八月開黃花。五瓣如橈形。結實似荔枝而大。初青色。後金紅。內瓤裏子如血塊。味甜可食。懸掛可觀。若

種盆玩須結縛成蓋子似西瓜子而邊缺可入藥用。

鐵線蓮

鐵線蓮一名番蓮或云印度靈仙以其木細似鐵線也苗出後卽當用竹架扶持之使盤旋上長葉類木香每枝三葉對節生一朵平瓣先有包葉六瓣似蓮一開內花以漸而錦有似鷺毛菊性喜燥宜鴉毛水澆其瓣最緊而多每開不能到心卽謝亦一間事春間壓土移栽。

史君子

史君子一名留求子藤生千指大如葛苗繞樹而玉葉青似五

如海棠月開花五出一簇二三十瓣初淡紅久則深紅色市面
若海棠作架植之蔓延似錦實長寸許五瓣相有棱初時半
黃熟則紫黑其中仁白上有薄黑皮如榧子仁而嫩其味如栗
治五疳殺蟲小兒宜食

萬苣

萬苣。一名千金菜。俗名金盞花。隨在有之。葉似白苣而尖。色稍
青。折之有白汁粘手。而花色金黃。細瓣攢簇肖盞。四月始開。無
甚風味。聊備員耳。冬澆濃肥水。則春發始茂。梗葉皆可作蔬。

虎耳草

虎耳。名石荷葉。俗名金絲草。其葉類荷錢而有紅白絲繚繞。其上三四月間開小白花。春初栽於花砌石罅。背陰高處。常山河水澆之。則有紅絲延蔓遍地。絲未生苗最易繁茂。但見日失水便無生理矣。以瓦坑邊瓦礫敲碎堆壅其側。則易長。小兒耳病取汁滴入。卽愈。

翠雲草

翠雲草無直梗。宜倒懸及平鋪在地。因其葉青綠蒼翠重重碎蹙。玉若翠鉢雲翹。故得但有色而無花香。非芸也。其根遇土卽生。見日則萎。性最喜陰。三五於背陰石罅。或虎澆。苣花。秋海棠。

下極有雅趣種法用舊草鞋浸糞之一日夜取起晒乾再浸再
晒凡數次將石壓平安放鄧雲草之側待其蔓自上生移栽
別地無有不活者

淡竹葉

淡竹葉。一名小青。一名鴨跖草。多生南浙隨在有之。三月生苗
高數寸。蔓延於山紫莖竹葉其花纖似蛾形。只二瓣。下有綠萼
承之。色最青翠可愛。土人用綿收其青汁。貨作畫燈。夜色更青。
畫家用以破綠等用。秋末抽莖。結小長穗。如麥冬而更堅硬性。

喜陰

射干

射干一名扁竹。一名秋蝴蝶。生南陽。今所在有之。仲春引蔓布地苗似瞿麥葉似蘆而狹長。葉中抽莖似護莖而硬。六月開黃紅色。亦有紫碧者。瓣上有細紋。秋結實作房。一房四隔。數子咬之不破。根可入藥。分根下子種俱可。

牽牛花

牽牛。一名草金鈴。一名天茄兒。有黑白二種。三月生苗。卽成蔓。或逸籬墻或附木上。長二三丈許。葉有三尖如楓葉。七日花。不作瓣。白者紫花黑者碧色。花結實外有白皮。畏作蟻。

有子四五粒狀若茄子差小色青長寸許採嫩實鹽炒可供茶食近又有異種一本上開二色者俗因名之曰四

南花。

馬兜鈴

馬兜鈴一名青木香春生苗作蔓附木而上葉如山蕷而厚大背自六月開黃紫花似枸杞結實如大棗作四五瓣葉晚後其實尚垂狀如馬頸之鈴

鼓子花

鼓子花。一名旋蓄。又名繆枝牡丹。蔓延川澤間葉似薯蕷小而

狹長花開如拳不放頂慢如缸鼓式色粉紅有千葉者人多植
以爲屏籬之玩根無毛節蒸煮味甘可啖花不結子取根寸截
置土灌漑卽活生萬青有一絕對云風吹不響鈴兒草雨打無
聲鼓子花

五味花

五味花產高麗者第一今南北俱有葉似杏而尖圓花若小蓮
而黃白蔓赤而長非架不能引上或附木亦可結實如梧桐子
大叢綴枝間生青熟紅不異櫻珠分根種當年卽旺若干種者
次年始盛出江北者入藥最良

薛荔

薛荔。一名巴山虎。無根可以
木四時凋在石曰石綫布
石與牆上紫花發後結實。

有瓢滿腹皆細子。霜降後瓢紅而甘。鳥雀喜啄。兒童亦當採食
之。謂之木饅頭。但多食發瘡。夏月毒蛇喜聚其叢中。如或乘涼
其下。不可不慎。

芙蓉

芙蓉。一名木蓮。又名文官。拒霜葉似梧桐大而有尖。花有數種。

滕蔓葉厚實而圓勁如
竹木曰長春藤。好內岩
砌似小蓮蓬。外青而內

單葉者多。千葉者有大紅、粉紅、白。惟大紅者花大而四面有心，一種早開純白。向午桃紅晚變深紅者名醉芙蓉。另有一種黃芙蓉亦異品。不可多得者此花獨耐寒，且不結子，亦不必分根。惟在十一月，將好種肥條剪下，俱段作一尺許長，向陽地上掘坑橫埋之，仍以土掩。至二月初，將條於水邊籬側遍插之。先將木針釘一穴，填泥漿並糞令滿，然後挿條，上露二寸，遇以爛草無不全活。且當年卽能發花，清姿雅質，獨殿群秋色之最佳者。昔蜀後主城上盡種芙蓉，名曰錦城。俗使爛獺毛，故池塘有芙蓉，則獺不敢來。其皮可沤麻作線織。

綢衣暑月衣之最涼且無污氣。

水木樨

水木樨一名指田枝軟葉細五六月開細黃花頗類木樨中多鬚蕊香亦微似其本叢生仲春分種

壺蘆

壺蘆一名瓠瓜俗作葫蘆非正三月下種生苗引蔓而上葉以冬瓜而稍圓有柔毛五六月開白花結實初白霜降後老而色黃一種圓而大者曰匏亦名瓢因其可以浮水如泡如漂也亦可作藏酒之器一種下大上小腰細口細者曰壺蘆可盛丹藥大可

爲甕盎小可爲冠帽。小兒用以浮水。樂人用以作笙。膚瓢養家。犀辦澆燭。實初結時。剖藤。尉。巴豆三三日後柔弱可紐。隨去豆卽活。以筆蘸芥辣界瓢上。其界處永不長。欲去內瓢。開瓠頂納巴豆水。燭之瓢出卽空。

獮猴桃

獮猴桃。一名陽桃。生山谷中。藤着樹而生。枝條柔弱。高二三尺。葉圓有毛。花小而淡紅。實形喜食之。皮堪作紙。今陝西永

甚多。

孽興

蓼蕡音嬰
多生林野間。四散延蔓。實葉並花實。皆與葡萄無異。
但實小而圓。色不甚紫。而味亦佳。毛詩云。六月食蕡。卽此也。

紫茉莉

紫茉莉。一名狀元紅。本不甚高。但婆娑而生。衍易生葉。似蔓菁。秋深開花似茉莉。而色紅紫。清晨放花。午後卽斂。其艷不久。而香亦不及茉莉。故不爲世重。結實頗繁。春間下子。卽生。

白蘿豆

蘿豆。一名蛾眉豆。一名籬豆。其蔓最長。須搭高棚引上。夏月可以乘涼。不可使沿樹上。樹若繞蔓。卽枯葉大如盆。一枝三葉。其

花狀似小蟻有翅尾之形。莢生花下。點上成枝。花有紫白二色。實亦有紫白二種。清明下種。以灰覆之。不宜土蓋。太肥生虧。

龍膽草

龍膽草。一名陵游草。齊胸及南浙葉如龍葵味苦。生苗高尺餘。秋間花如牽牛青碧色。

落花生

落花生。一名香芋。引藤蔓而生葉極開小白花。花落於地根卽生實。連絲牽引土中。纏纏不斷。冬盡掘取。煮食香甜可口。南浙多產之。

大戟

大戟俗名下馬仙。春生紅芽長作叢高一二尺。葉似初生楊柳小團。又似芍藥。夏開黃紫花團圓似杏花。又類燕支。根似苦參多戟人咽喉。

葛

葛一名鹿藿。產南方。春初生苗引藤蔓長二三丈。葉類揪青而小。七月開花紅紫色結莢纍七似豌豆形但不結實粗大如芋臂紫黑色端午採根曝乾以入土深者爲佳。其藤皮可作絺綌惟廣中出者爲最。根可作粉能解酒病。

紫花地丁

紫花地丁。一名獨行虎。隨在有之。葉青而肥。根直如釘。仙夏開紫色花。結細角。平地生者起莖。可以不扶。溝壑邊生者起蔓。必待竿扶。又一種白花者。不入藥用。

薺草

薺一作薺
舊又名茅蒐。茹處多生高山上。染絳之草。葉青背綠。頭尖下濶似棗。其莖方葉濃四五葉對生節間。蔓延於木上。至秋聞花結實如小椒。中有細子。根亦紫赤色。今所在有之。說文云。人血所在故俗名地血。齊人謂之蒨草。貨殖傳曰。千畝卮茜。其人

皆與于戶侯等則誠嘉草也

獨搖草

獨搖草。一名獨活。多生於嶺南及蜀漢川谷中。春生苗葉。夏開小黃花。一莖直上。有風不動。無風自搖。其頭如彈子。尾若鳥尾。而兩片閉合間。每見人轍自動搖。俗傳佩之者能令夫婦相愛。雖非異卉。亦自有一種風致。可取根入藥用。

虎杖

虎杖。生下濕地。隨在有之。春盡發苗莖如紅蓼。葉圓如杏。夏末開花四出如菊。色紅如桃。次第開落。至九月中旬已。陝西山麓。

水潤甚廣人於署月取根和甘草同煎爲飲色如琥珀甘美可
變瓶置井中令冷如冰呼爲冷飲子可以代茗極能解暑其汁
染米粉作粧更佳

落葵

落葵。一名承露。春初下種。仲夏始蔓延籬落間。其葉似杏而肥厚。至秋開細紫花結實纏七。大如五味子。熟則紫黑色。土人取其汁紅如胭脂。婦女以之漬粉傅面最佳。或用點唇亦可。故又名染絳子。但暫用則色不變。若染布帛等物。不能常久。

欵冬花

欵冬花。一名欵凍。出常山及閩中。叢生水傍葉似葵而大開花
黃瓣青紫萼出自根下偏於十二二月霜雪中發花獨歲又有
紅花者葉如荷而斗直俗呼爲蜂斗葉亦花中之異品也

仙人掌

仙人掌出自閩粵。非草非木。亦非果蔬。無枝無葉。又並無花。土
中突發一片。與手掌無異。其膚色青緣光潤。可觀掌上生米色
細點。每年只生一葉。於頂今歲長在左。來歲則長在右。層累而
上植之家中。可鎮火灾。如欲傳種。取其一片。切作三四塊。以把
土植之。自生全掌矣。近今南浙亦間或有之。錄此以見草木之

異云爾。

王簇

王簇花產於閩中。花發於秋冬之交。性最畏寒。遇寒則花萎。植之者必十月。中藏向陽室內。如土乾將殘茶畧潤。至二月中。方可取出。

鉤藤

鉤藤產自梁州。今秦楚江南江西皆有。葉細長而青。其莖間有刺。纖若鉤鈎。對節而生。其色紫赤。卷曲而堅利。長二丈。大如指。生用致酒甕。封口挿人取。

指。生用致酒甕。封口挿人取。
酒以氣吸之。涓涓不絕。

清風簾

清風簾。一名青藤。出浙東會州天台山。其苗多蔓延喬木之上。四時常清。風吹飄揚有致。亦不可得者。

長生草

長生草。一名豹足。一名萬年松。究竟卽卷柏也。產自常山之陰。今出近道。其宿根紫黑色而多鬚。春時生苗似柏葉。而細碎拳攣如雞爪。色備青黃綠。高三四寸。無花實。多生石上。雖極枯槁。得水則蒼翠如故。或懸於梁不用滋培。卽歲長青。或藏之巾笥中。復取砂水植之。不數日卽活。可爲盆玩。

藤蘿

藤蘿。一名女蘿。在木上者。一名鬼絲。在草上者。但其枝蔓軟弱。必須附物而長。其花黃赤如金。結實細而繁。冬則萎落。

零餘子

零餘子。一名山藥。生苗蔓延籬落之間。夏開細白花。結實。在葉下。長圓不一。皮黃肉白。大者如雀子。小者如蚕豆。煮食勝於芋子。霜後收子。亦最易落。墜地卽能生根。其根肥白而長。蔬果上品。宜壅牛糞。

土參

土參。一名神草。一名土精。一名血參。產於南浙。四月開花。細小如粟。葉如絲。白色。秋後結實。生青熟紅。性最喜燥。春間分種。

萎蕤

萎蕤。處處山中皆有。其根橫生。莖幹強直。似竹箭榦而有節。葉狹而長。表白裏青。亦類黃精而多鬚。大如指長一二尺。三月中開青花。結圓實。亦可分根種。極易繁衍者。

揚搖子

揚搖子。產自閩粵。其子生樹皮內。身體有脊。而形甚異。味甘無核。長五寸。而色青。

簡子

簡子出自合浦。及交趾。藤蔓緣樹木而生。正二月開花。四五月實熟如梨。赤如雞冠之色。核如魚鱗。其味甚甘美。

酒杯藤

酒杯藤出自西域。昔張騫得其種而歸。藤大如臂。其花堅硬可
以酌酒。文章映澈。實大如指。味香如豆蔻。食之能消酒。

侯驥子

侯驥于蔓延而生子如雞卵。既甘且冷。王大僕曾獻之。能消酒
除溼。輕身延年。

千歲子

千歲子。出粵西交趾。蔓延而生。子在根下。有鬚綠色。苞多至二百餘顆。狀似李而皮殼青黃。殼中有肉如栗。味亦如之。乾則殼肉相離。搗之而有聲。極能解酒消暑。

波羅蜜

波羅蜜。產自海南。樹如荔枝。差大。皮厚葉圓。有橫紋。小枝附樹本而生一枝。含數實。花落實出。其大如斗。皮亦似荔枝。有刺類佛首。螺髻之狀。肉若蜂房。近子處可食。與熟瓜無異。而半韻過之。子如肥皂核大。亦可燜音食。味似豆。春生秋熟。粵人珍之。其

甘如蜜。

菩提子

菩提子。一名無患子。產自南海。今武當山亦有之。花如冠蕤葉似冬青而稍尖長。實似枇杷稍長大。味甘色青而香。核堅黑可燭食。亦可作念珠。俗名鬼見愁。以其能辟邪惡也。前朝皇太后曾種二株於內宮。

娑蘿花

娑蘿樹產雅州瓦屋山。今江淮古寺內及浙之昌化山中皆有之。其本高數丈。葉大似楠。夏月多蔭。而冬不凋。初夏開花。頗香。

實大如核桃栗殼色可治心痛病。又聞瓦屋山者五色燦然若移他處則閼而多槁故不可多得。

人面子

人面子出自粵中樹似梅李春花秋熟子如桃實而少味須剗漬可食其核兩邊如人面耳目口鼻無不具足人皆取以爲玩

都念子

都念生嶺南樹高丈

心金色南中婦女多

有四葉如柿蒂食必折其蒂故又名倒捺子味甚甘美。

而細葉如苦柰花紫赤如蜀葵

如小軟柿外紫內赤無核頭上

慧苡

慧苡。一名芭實。隨在有之。若留有宿根。三月自生葉如初生芭蕉。五六月抽莖。開細黃花。結實青白色。上尖下圓。其殼薄仁粘者。卽慧苡也。一種殼厚堅硬者。俗名菩提珠。小兒多穿作念佛數珠爲戲。

木竹子

木竹子。出自廣西。皮色形狀全似大杵杞。而肉味甘美過之。但實熟在秋冬。

韶子

韶子。生嶺南葉如栗赤色子亦如栗苞有棘刺破其苞內有肉如猪肝着核不離味甘而醇核如荔枝又有山韶子夏熟色正紅肉如荔枝一種藤韶子至秋方熟其大如鳧卵

馬檳榔

馬檳榔產自滇南金齒沅江延蔓而生結實大如葡萄色紫而味甘內有核頗似大楓子但殼稍薄其形圓長斜扁不等核內有仁亦甜

萐楚

萐楚一名業楚一名羊桃葉如桃而光尖長而狹花紫

木生最弱過一尺節引蔓於草土多生平澤中子細女
似桃而味苦不堪食

蕷椒

蕷椒出山澤山磽處處亦有之。生林箐間。枝軟覆地延蔓。花作
小朵色紫白。子葉皆似椒形小而味微辛。因擣葉而生。土人取
以煮肉食。香美不減花椒但不多耳。

文章草

文章草。一名五加。生漢中及寃句今近道皆有。春生苗作叢赤
莖青葉又似藤蔓高四五尺上有黑刺一枝五葉三四月開白

花香氣如橄欖結實如豆北方者長丈餘類木

蘿摩

蘿摩一名研合子人家多種之三月生苗蔓延籬垣間極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉摘之皆有白汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴頭尖其殼青軟中有白絨及漿相後枯裂則子飛其子輕薄亦如兜鈴子主人取其絨作坐褥以代綿亦輕暖

雪下紅

雪下工一名珊瑚珠樹以山茶小而色嫩藤本蔓延

萬木間小白結子秋青冬熟若珊瑚珠纍七下
照耀如日至於積雪盈顆似更有致但防白頭鳥喫

久留

胡椒

胡椒一名昧脣又謂番諸國及交海南皆有之其苗蔓
附樹或作棚引之葉如山藥有細條與葉齊條條結子兩瓣
相對其葉晨開暮合合則裹其子於葉中正月開黃白花結椒
纍七生青熟紅五月採收曝乾乃饑食器中用之最能殺腥

浣草

沉草一名蘡。一名天門冬。處處有之。春生莖葉。大如銚船。高至丈餘。葉如茴。香極尖細而疎滑。有逆刺。亦有無刺者。夏開小白花。亦有黃紫色者。入伏後無花。暗結黑子。在其根枝芳艸長一寸。千枚以大者爲勝藥。當須沃地種栽。子種者但晚成耳。

枯樓

一名瓜蔓。一名澤姑。所在有之。三四月生苗。引蔓上瓜而宿。作久有細毛。秋開花似蘆花。

有長者生苦熟赤