

醫方考羅經

醫方考繩愆序

夫鑿之有方猶如匠氏之

有材材之所用大者為末

細者為タルキト桶盤脩曲直各量

其宜而屋成于此醫之取

方對症治病其良之可擇

者亦當如匠氏之求良此

參黃子方考之所以編也

蓋材已有用屋之得成於

其間實有不可得而言者

焉苟非究精微于工巧之

先而直繩墨于程式之外

則斧削之痕風穿棟宇而  
抗瓦縫之隙雨瀝檐牙而  
朽其始差在分毫而其愆  
至於竟壞廣廈况脈理之  
難明虛實之易惑豈特代  
匠傷手將見立致委弊罪

極不淺淺矣凡任司命之  
權者奚得不盡心而教正  
之哉此吾友松先生繩愆  
之所以作也惟先生學識  
之至乎眼之親糾謬于已  
驗取證于現効使人就之

則難明者易明易惑者無  
惑其志一在濟物而未始  
有挾勝之心可謂用切一  
時功蓋百世者也白雖不  
敏敢不感發激勵于中因  
茲叨為閱校鏤梓以廣其

傳云 嘗

元祿九年歲次丙子孟夏  
穀旦攝陽平野門入北山

白梅庵寶玉拜書

經筵論

綱。愆成。或索序。予曰。序。叙也。叙。一篇之大綱也。於凡例中。已喃喃矣。奚以嚙嚙乎。序。且夫著書立言。誠不易易。而竄長年。甫十五。而觀覽醫書。乃因舉業。弗售。越十年。投筆而就。醫焉。察其始末。才得十八載工夫。倭署名。醫方考。而吧吧者。乃失之。易易也。後成素問。吳註。

自序有云。不斑白。語道失者。蓋爬  
箸青鬢之瘡。或有未痊之瘡耶。惜  
乎。不回護此書者。其失道也大矣。  
予也。生長長崎。家貧而學醫。凡來  
朝采藥。及觀厥名家。莫不下禮。而  
請益焉。庚子春。仲。幸遇方外異之。  
化林老漢。一旦。真醒醫夢。而拭目  
拜受。方外之方。法外之法。迺心胸  
豁然矣。爾來韞匱有年。焉今也。桑

榆景迫。或不時化去。則生平苦心  
一得。乃落空矣。因弗獲已。把所得  
菁囊。以泐托於繩。翹而吐露於方  
端耳。如金匱已下名方。夏浩繁矣。  
其不載於方考者。並略之。曰待日  
後。由老齒饒舌。而有舉一明三之  
君子也。或曰安得如先生。用古方  
之嚴且察乎。子曰。孔子曰。十室之  
邑。必有忠信。何本邦無作者哉。或

唯然。予曰。子輩後生。切不可言十  
三經。爲醫門墳典也。醫道與儒。蒼  
負不同矣。夫黃帝君也。岐伯臣也。  
至於下問。時多誓嘗禮拜者。蓋因  
承授微妙秘密。而敬重之也。不得  
不如此乎。其如秦越之之親受於  
長桑君。張仲景之於張伯祖。李明  
之之於張潔古。羅謙甫王海藏之  
於李明之。朱彥脩之於羅太霖。並

皆北面叩首百拜。謹承面命，然後  
出手濟世。而成醫中之傑矣。豈可  
謂之泛泛事業乎。此數君子者，本  
於斯文，有超然見過於師之資。及  
學鴻術，則湛焉青出於藍之美者  
也。所編醫書，當作秦漢文章。三復  
可矣。如吳氏自弱敏慧，搜覽幾家  
醫書，酌己心見，曰謂道在。雖石質  
諸午亭余老者。或是黃冠方士。脩

蒼者流。於醫其森名。下士矣。其書中。迭迭。曰。變例爲己任。於崇法則。渾渾然矣。不知古。南陽。易水。東垣。丹溪。所編方策。載其變法者。鮮矣。夫。夫。數。君子。豈不知變哉。由乎經。常之法。可曰爲規模。而權變之例。乃臨機制宜。不可曰爲準則也。是。目。今。復。抄。出。原。方。症。治。的。法。使。子。僧。得。之。於。心。然。後。變。亦。可。也。不。變。

而手割亦可也。隨其所利，適其至  
所。初非拘拘于一隅矣。而觀吳氏  
序中有云：世有覺者，觸目而疵之。  
從而可否之。吾幸吾之得師也。予  
何心哉。敢於班門弄斧，妄繩先達  
之愆乎。然予恐予徒依樣葫蘆，則  
予行醫四十多年，於濟世一念之  
心，有歉歉焉。故由吳書，叨從而可  
否之。已得後賢，復繩予愆，而相成

一部医鑑。豈非幸中之幸乎。予森  
文。就此討論當序焉。或拜矣。遂命  
之書。

嘗丙子冬至日友松老物述於  
北山之迷禪室

名醫方考自序

上醫治未病方無尚也垂經論焉經論醫之奧也中醫治已病於是乎始有方方醫之粗也非其得已視斯民之疾苦故因病以立方耳季世人知醫尚矣習方其簡也窮經其煩也乃率以方授受而求經論者無之舍斯道之奧寶斯道之粗安望其術之神良也余年十五志醫術逮今十有八稔懼辱醫名蚤夜遑遑惟經論是蒐不敢自是遊海內者數年就有道者而贅謁之見賤工仕九良上仕一不惟上古之經論昧焉雖中古之方猶弗達也弗明方之旨與方之證及諸藥升降浮沈寒熱溫平良毒之性與夫宣通補瀉輕重滑澀燥濕反正類從之理而徒執方以療病

惡能保其不殃人乎。題爲之。愍惻取古昔良鑒之方七百  
餘首。揆之於經。酌以心見。訂之於證。發其微義。編爲六卷。  
題之。端曰。聲方考。蓋以考其方藥。考其見證。考其名義。考  
其事迹。考其變通。考其得失。考其所以然之故。匪徒苟然  
誌方而已。君子曰。夫夫也。弱齡謬陋。輕議古人。則崑有罪  
焉。爾世有覺者。觸目而疵之。從而可否之。吾幸吾之得師  
也。遊藝者。玩索而情之存。而左右之。吾幸吾之朋與也。如  
山野之陬。湖海之遠。求良鑒而不速得。開卷檢方能究。愚  
論而斟酌自藥焉。則吾濟人之丁念也。或者尚論千古末  
葉孫而本軒岐。劣群方而優經論。則孟軻氏所謂遊于聖  
人之門者。難爲言矣。安用夫斯藉之贅也。

皇明萬曆十二年歲次甲申孟冬月古歛吳崑序

名醫方考總序凡例

一凡本書所用醫方多見移易古法以逞新奇焉以故查考昔賢當時因病製宜之法而併書之蓋效儒家教學生輩先誦四書正文其次讀朱文公集註而頗知其義然後自看百家諸說則於學不多乖矣醫猶是也先知古人立方本意後以本書變法之義則得心應手由乎人也

一凡古方載於鰲頭者欲便於翫索也其方義事長者列於本方之後也

一凡新標古方藥下詳載分兩暨本書所載分兩誤者正之所以然者昔賢以配君臣佐為治病之準的也譬如

錠藥只硝硫灰三種相夾用火發之有遠有近有上竄有走散之異者乃三種之有製法分兩之有增損故也醫藥殆猶是也隨其製法因人各經隨其分兩各異其治以桂枝建中二湯詳之則思過半也

一凡藥有用流水井水諸水有用桑蘆柴炭諸火以文火武火煎煮之別不可不仍古法故併載水火煎煮原文無者闕之

一凡藥治病正以煎法爲要務如補藥煎熟汗下及是又如太黃黃連瀉心湯二味以麻沸湯漬之須臾絞去滓分溫再服此蓋古人治病之極則或在於斯也今於方後詳載煎法者爲不敢越度也瞻彼嗜茶清客必以水

味火色爲要務夫夫暢懷之物尚且留神况於養命之藥而不精致也乎

一 凡本書課寫古方藥味者仍舊正之考方之義或未當者繩其愆而評之此非敢辨駁前輩乃與吾徒講習討論之餘爲進醫學之階梯也

一 凡所用單方處治者多見於諸家本草故畧而不論老筆厭繁故也有志醫士必自參閱焉無心於濟世者予何暇爲之擎燈也哉

一 凡本文有可師者傍以○賞之其次以△證之於醫學之要義亦以○別之其不合義者傍以△舉之使後達易識其可不也

一凡冠之以○者吳氏本文也其低一字以△者乃不佞區區臆見或援古老之言以證其是不也

一凡藥品有差者以□標之其分兩有差亦以□標之如本文中文字有魯魚之差以□圍之其字卽書於上層曰某一本作某乃不敢擅改其字也或古人原文卽曰某字某人原作某以便考索也

一凡不佞醫按暨見聞事跡直書其人姓字者本非爲撈長短乃欲使有據云

名醫方考繩愆凡例 終

醫方考繩愆摠目錄

卷之一

中風 第一

傷寒 第二

感冒 第三

暑 第四

濕 第五

瘟疫 第六

大頭瘟 第七

燥 補遺

卷之二

火 第八

斑疹 第九

瘧 第十

痢 第十一

泄瀉 第十二

秘結 第十三

霍亂 第十四

痰 第十五

哮喘 第十六

咳嗽 第十七

卷之三

虛損 第十八

氣 第十九

嘔吐 第二十

噎膈 第二十一

卷之四

脾胃 第二十二

餽雜 第二十三

消渴 第二十四

小便不通 第二十五

勞瘵 第二十六

血證 第二十七

呃逆 第二十八

情志 第二十九

傷食 第三十

鬱 第三十一

水腫 第三十二

小便不禁 第三十三

五尸傳症 第三十四

脫肛 第三十五

翻胃 第三十六

吞酸 第三十七

五疸 第三十八

鼓脹 第三十九

淋瀝 第四十

精濁 第四十一

自汗 第四十二

盜汗 第四十三

積聚癥瘕 第四十四

卷之五

痿痺 第四十五

厥證 第四十六

瘧 第四十七

癰疾 第四十八

癩狂 第四十九

驚悸怔忡 第五十

健忘 第五十一

痛風 第五十二

癘風 第五十三

喉閉 第五十四

頭痛 第五十五

腹痛 第五十六

脇痛 第五十七

腰痛 第五十八

七疝 第五十九

脚氣 第六十

眼疾 第六十一

耳疾 第六十二

鼻疾 第六十三

口齒舌 第六十四

卷之六

蟲 第六十五

痔漏 第六十六

疥瘡 第六十七

暴死 第六十八

痘 第六十九

婦人 第七十

廣嗣 第七十一

延年 第七十二

卷之七

脉語

醫方考繩愆卷之一

歙邑 參黃子 吳崑著

攝陽 北山友松子繩愆

平野 門人白梅庵校閱

中風門 第一

叙曰風者百病之長得行天之象故其發也暴然  
上世論風主于外感乃河間主火東垣主氣丹溪  
主濕而未世之論紛然矣今考各方二十三首為  
風為火為氣為濕皆時出而主之初不泥於一說  
也

烏梅擦牙關方

病人初中風筋急口噤不開便以鐵物開之恐傷其齒宜用烏梅肉擦其牙關牙關酸軟則易開矣此酸先入筋之故也其有中風證而口開不噤者筋先絕也不治

稀涎散

猪牙皂角

四條去黑皮

白礬

一兩

共為末每進三字水下

陳氏急救稀涎散能吐痰涎壅盛此藥不大嘔吐但冷涎微微自口角流出而自涎猪牙皂角肥實不蛀者四挺去黑皮晋礬一兩光明者各為細末研勻輕者五分

病人初中風暴仆痰涎湧盛此藥與之頻吐涎沫壅塞少疏續進他藥○清陽在上濁陰在下則天冠地履無暴仆也若濁邪風湧而上則清陽失位

重者三字溫水調灌下按陳師古方用明礬一兩牙皂五錢為末每用一錢溫水調下愚謂此藥平平病候極重不須炙枯以全藥力用之庶乎成功一經製煉則力老而難敵強也用者察之

而倒置矣故命人暴仆所以痰涎壅塞者風盛氣湧而然也經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本故不與陳風補虛而先為之吐其涎沫白礬之味鹹苦鹹能軟頑痰苦能吐涎沫皂角之味辛鹹辛能利氣竅鹹能去污垢名之曰稀涎固奪門之兵也師曰凡吐中風之痰使咽喉疏通能進湯液便止若攻盡其痰則無液以養筋能令人變急偏枯此大戒也

**通頂散**

藜蘆

生井艸

川芎

細辛

人參

各一錢

石膏

五錢

共為末

病人初中風不知人事口噤不能開用此藥一字  
吹入鼻中有嚏者肺氣未絕可治○中風不知人  
事病則急矣以平藥與之不能開其壅塞故用藜  
蘆與人參細辛相反使其相反而相用也肺苦氣  
上逆故用石膏之重以墜之其艸之平以緩之乃  
用芎之川芎之用取其清氣利竅而已

△愚按初中風不知人事口噤不開當急用通  
頂散吹入鼻竅中男子先吹左女子先吹右吹  
則得嚏而甦目瞤動而牙關開矣不嚏則不治  
此可以驗其受病淺深知其可治不可治之症  
矣如倉卒不備單用生半夏末吹入鼻中亦得

也方名破棺散能試五絕病之神藥也病深者  
雖嚏而牙關仍不開者或用烏梅肉搗膏擦其  
牙關或白梅亦可或作好醋炭薰之令醋氣衝  
入鼻內輕者即時蘇醒重者亦省人事耳由此  
言之通頂散當寫在中風門首方而山甫排在  
第三何也○再按直指方用川芎白芷防風薄  
荷牙皂細辛藜蘆号搐鼻通天散矣蘇頌謂藜  
蘆服之能吐風痰吹鼻則通頂令人嚏此其所  
以有通天通頂之目由藜蘆之能通矣乎

蘇合香丸

沈香

青木香

烏犀角

香附子

丁香

硃砂

訶梨勒

白檀香

麝香

龍腦

安息香

蘇合油

草撥

白朮

各二兩

薰陸香

一兩

△按和劑局方蘇合香圓書載蘇合香油薰陸

香龍腦各壹兩餘藥十二味各二兩備載製法

學之者當察焉不知山用何故倍用香竈龍腦

與諸品相等者蓋未聞廖瑩中以熱酒服之九

竅流血而死之故事也耶師云古老傳和劑局

方蘇合香圓開載藥品之下蘇合油入安息膏

內原有三兩二字今本無有須宜意解用爲之

君玉肯堂云卒然仆倒昏不知人並可用麻油

竹瀝薑汁調之孫一奎云用獨參湯調之後進  
不可不知此意然而服之中病則止不可過劑  
河間劉氏所謂中風之人不宜腦麝硃砂礬之  
提鈴巡於街衢使盜者伏而不出焉服之使風  
邪入於骨髓如油入麵莫能出焉

病人初中風喉中痰塞水飲難通非香竄不能開  
竅故集諸香以利竅非辛熱不能通塞故用諸辛  
爲佐使犀角雖涼涼而不滯訶梨雖澁澁而生津  
世人用此方於初中之時每每取効丹溪謂辛香  
走散真氣又謂腦麝能引風入骨如油入麵不可  
解也緊者但可用之以救急慎毋令人多服也

許胤宗黃芪防風湯蒸法

許胤宗者唐時常州義興人也初仕陳爲新蔡王  
外兵參軍時柳太后感風不能言脉沈而噤胤宗  
曰口不下藥宜以湯氣蒸之令藥入腠理周時可  
瘥遂造黃芪防風湯數十斛置于牀下氣如烟霧  
次日便得語由是超拜義興太守崑謂鼻氣通乎  
天故無形之氣由鼻而入呼吸傳變無處不之黃  
芪其而善補得防風而功愈速驅風補虛兩得之  
矣自非胤宗之通達不能主乎此法醫者能善用  
之則亦可以治乎今之人矣

△王肯堂云齊仆偏枯之症雖有多因未有

因真氣不用而病者故黃芪為必用之君藥防風為必用之臣藥黃芪助真氣者也防風載黃芪助真氣以周於身者也亦有治風之功焉許胤宗治王太后中風口噤二藥薰之而愈况服之乎更有因症添藥之法極好文繁不備

二陳湯

半夏姜製 陳皮去白 白茯苓去皮各等分 甘艸炙減半

和劑二陳湯每服四錢水一盞生薑七片烏梅一個同煎六分熟服不拘時候

風盛痰壅既用稀涎等藥開其氣道續以此方主之。○風于於脾則痰壅然痰之生本於濕半夏所以燥濕也茯苓所以滲濕也濕去則痰無由以生痰之為患本於脾虛氣滯甘艸所以補脾也陳皮

所以利氣也。補脾利氣則土又足以制濕而痰且無壅滯矣。此二陳之旨也。名曰二陳以橘半二物貴乎陳久耳。正考見痰門。

△二陳湯以下三方乃朱彥脩調理類中風之心法也。其言曰：真中風邪者，東垣中血脈中府中藏之說甚好。子和三法亦可用。諸書唯謂外中風邪，惟劉河間作將息失宜，水不制火，極是。然地有不同，西北人外中者，亦有東南人只是濕土生痰，痰生熱，熱生風也。大率主血虛有痰，或挾火與濕治法，以痰為先，補養次之。云云。由是言之，於二陳湯中亦須用竹瀝薑汁一以利。

濕痰之拘滯一以清風熱之盛熾可也況丹溪  
活套明加竹瀝薑汁乎

四君子湯加竹瀝薑汁方

人參 白朮 茯苓 甘草 竹瀝 薑汁

丹溪曰半身不遂在右者屬氣虛以此方主之○  
經曰左右者陰陽之道路也故左屬血而右屬氣  
氣虛者補之以其故用人參白朮茯苓甘草四件  
稱其爲君子者謂其其平有冲和之德而無剋伐  
之性也其加竹瀝謂其行痰其加薑汁所以行竹  
瀝之滯而共成夫伐痰之功耳

四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁方

當歸

酒洗

川芎

洗去土

白芍藥

酒炒

熟地黃

桃仁

去皮尖

紅花

酒洗

竹瀝

薑汁

丹溪曰半身不遂在左者屬瘀血以此方主之○  
芎歸芍地生血藥也新血生則瘀血滑而易去桃  
仁紅花消瘀藥也瘀血去則新血清而易生然亦  
加夫竹瀝薑汁者以痰之為物靡所不之蓋無分  
于左右而為患也

△丹溪纂要曰半身不遂大率多痰在左屬虎  
血與無血宜四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁在  
右屬痰屬氣虛二陳湯四君子湯加竹瀝薑汁  
愚按加竹瀝薑汁五字連二陳四君一併而言

之也非特加入于四君而不加入于二陳之文也賢者察之又繼之曰肥人多濕少加附子烏頭行經遺尿者屬氣虛以參芪補之設使肥人半身不遂在左而又遺尿則只用四物桃紅而不以烏頭行經參芪補氣者乎吁先正之言載在方冊或說不到者後學以意消息之可也俾治一武官年五旬許體肥氣急因會客時率倒用人參三生飲醒後左半身不遂脈浮而少機神乃用六君子湯加附子煎成充薑汁竹瀝將飲之時一時聚在廳冷笑吾謂之曰知子博覽強記之人也莫記得川溪謂半身不遂在左屬

死血與無血吳崑謂在左者屬痰血之句也耶  
鑿曰然予曰丹溪下字不苟半身不遂下所以  
有大率二字者不曾直斷而存疑之詞也唯其  
吳崑見丹溪一唱則肆意和之使今時鑿者以  
此藉口而致良工掣肘不能盡其術遷延日久  
遂成廢人者多矣吾此藥亦丹溪治肥人氣虛  
因濕痰卒倒之藥也何不加察焉且將陰陽應  
象太論天不足西北地不滿東南一則究之參  
之則用前藥以補左手足之精氣而要効者何  
待贅焉今時流弊拘於左血右氣之言紛然所  
以來王宇泰曰丹溪云大率多痰在左挾死血

與無血在右挾氣虛與痰亦是無本杜撰之談  
不必拘之之訛愚嘗謂王太史不期作朱家忠  
臣也

八味順氣散

白朮炒

白茯苓

青皮

去穢炒

白芷

陳皮去白

台烏藥

人參

各一錢

甘艸

五分

中風正氣虛痰涎壅盛者宜此方主之○人參白  
朮茯苓甘艸四君子湯也經曰邪之所湊其氣必  
虛故用四君子以補氣治痰之法利氣為先故用  
青皮白芷台烏陳皮以順氣氣順則痰行而無壅  
塞之患矣此標本兼施之治也

△按嚴用和自叙云治外來諸風皆載之於千金矣茲不復叙太抵人之有生以元氣爲根榮衛爲本根氣強壯榮衛和平滕理緻密外邪焉能爲害或因七情過制飲食不節或勞役過傷遂致真氣虛耗邪氣乘虛而入及其感也變症多端治療之法當推其所自若內因七情而得之者法當調氣然後依所感六氣隨症治之此良法也云云由此觀之此方乃先調氣道之藥而非能治痰涎壅盛之物也設其人正氣不順而痰盛者須加法製半夏皂角等輩用驅痰涎可也嚴氏所謂隨症治之

烏藥順氣散

麻黃 去節

陳皮 去白

烏藥 各一錢

枳殼 去穰 炒二兩

炙甘草

白芷

桔梗 各二兩

川芎 洗去土

白僵蠶 炒

乾薑

炒黑 半兩

中風遍身麻痺語言寒澁口眼喎斜喉中氣急有  
痰者此方主之○遍身麻痺表氣不順也故治以  
麻黃川芎語言寒澁裏氣不順也故治以烏藥陳  
枳口眼喎斜面部之氣不順也故治以白芷僵蠶  
喉中氣急甘草可緩脚氣上逆桔梗可下痰之為  
物寒則結滯熱則流行佐以乾薑行其滯也此治  
標之劑也然必邪實初病之人方可用之若氣虛

病久者則勿之與也宜以補劑兼之

△和劑局方主治一切風氣攻在四肢骨節疼  
痛遍身頑麻頭目旋暈及治癱瘓語言寒澁筋  
脉拘攣又治云云者學者須自讀之文繁不備  
愚按此方疎風順氣之妙劑理調癱瘓之良方  
也本朝名於醫者如翠竹延壽兩院暨玄冷翁  
自有授受妙訣用治半身不遂者及口眼喎斜  
語言寒澁者無不立効焉小倉良醫原長德庵  
先生屢語及此余亦目擊其奏驗焉然而未聞  
能治喉中氣急有痰之說當刪六字

牽正散

白附子

白蠶

全蝎

並生用爲末每服酒調下二錢

中風口眼喎斜無化證者此方主之○芎防之屬可以驅外來之風而內生之風非其治也星夏之輩足以治濕土之痰而虛風之痰非其治也斯三物者療內生之風治虛熱之痰得酒引之能入經而正口眼又曰白附之辛可使驅風蠶蝎之鹹可使軟痰辛中有熱可使從風蠶蝎有毒可使破結鑿之用藥有用其熱以攻熱用其毒以攻毒者大易所謂同氣相求內經所謂衰之以屬也

△按楊氏牽正散治風痰極驗之毒品也經驗方用全蝎薄荷治大人小兒之風痰勝金方用

疆蠶薑汁治一切風痰者明載于本艸綱目矣然則中風口眼喎斜下加風痰壅盛四個字無化證化字作熱字可也所以然者三物俱屬熱故也

**星香湯**

牛膽南星

八錢

木香 一錢

中風體肥痰盛口不渴者此方主之○南星燥痰之品也曰體肥曰痰盛曰不渴則宜燥也可知矣故以南星主之而必入於牛膽者制其燥也佐以木香者利痰氣也

△易簡星香散南星四錢木香一錢生薑十四

片治壯人風痰云茲書徃徃失載生薑者蓋未  
讀傷寒論之過也以生薑大棗爲藥物之外故  
歟王肯堂於準繩卒中門易簡三生飲方下云  
氣盛人止用南星半兩木香一錢生薑七片名  
星香散氣虛人用生附子并木香加前數煎名  
附香飲並治卒中始作無不克効視乎二則南  
星之烈附子之溫思過半矣何多增南星至八  
錢乎○愚謂氣有盛有虛證有輕有重中風一  
症乃有生者之大患也故不厭煩而補三生飲  
以供參考况與星香湯同類易効之方也

易簡三生飲

治卒中昏不知人事口眼喎斜

半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒  
內傷喜怒或六脈沈伏或指下浮盛並宜服之  
兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神効但口開  
手撒眼合遺尿聲如鼾睡者難治

南星 一兩

川烏

生附子

各半兩

木香

二錢半

右咬咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分去  
渣溫服記得薛立齋云三生飲乃行經絡治濕  
痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許  
以祛其邪而補助真氣否則不惟無益適足以  
取敗矣

省風湯

○活一本作治

防風 去芦

半夏

姜製各一錢

全蝎

二錢

膽南星

炙甘草

生白附

生川烏

木香

不見火各五分

中風口眼喎僻痰涎壅盛者此方主之○風湧其痰于於面部則口眼喎僻塞於胸中則痰涎壅盛是方也防風白附全蝎川烏可以活經絡之風痰而正口眼南星半夏甘草木香可以療胸次之風痰而開壅塞方名曰省風者省減其風之謂也

△按和劑省風湯治中風口噤全不能言口眼喎斜風盛痰實頭目眩重手足麻痺骨節煩痛等症云云用防風南星半夏生甘草黃芩生薑六味也方謂減省其風也與哉以防風南星治

外來之風風加於軀必熱以黃芩生其州治熱  
風加於表必令人氣逆而生痰以半夏生薑治  
逆而順痰斯立方之旨也後人去黃芩生薑而  
加全蝎生白附生川烏生木香雜霸之物而欲  
全驅風痰者古者所謂似則似而是則未是也  
所以然者增損古方大有意義存乎其中矣如  
張易水治虛損先四君子次合爲八物復次復  
爲十全飲劉河間治風熱先涼膈次通聖復次  
合爲雙解散之類愈增愈佳愈出愈奇者蓋君  
子道長之象也又如元素變仲景十棗爲神祐  
如子和又變十棗爲泄水丸之類此乃霸術劫

法不足貴也。精者用之一時，劫病昧者無不誤入矣。如省風加減，亦猶是也。后學切莫求一時之譽而毀人百年之命也。由乎此方似緩非緩，似急非急，於緩急之間總不可濟事，故也。

**改容膏**

蓖麻子 一兩

真冰片 三分

共搗為膏

寒月加乾姜  
附子各一錢

中風口眼喎僻在左，以此膏傅其右，喎僻在右，以此膏傅其左。今日傅之，明日改正，故曰改容。或以蠅螂冰片傅之，或以鮮血冰片傅之，皆良葢。此三物者皆引風拔毒之品也。佐以冰片取其利氣而

善走竅佐以薑附取其溫熱而利嚴寒此惟冬月加之他時弗用也

△改容膏傅之有效然傅於頰車有頃則落須攤太乙膏剪作銅錢樣次將改容膏安在太乙膏上貼於頰車為便冬月乾薑附子之加不如加桂枝其效更速也良方用蓖麻子仁七七粒研作餅右囑安在左手心左囑安在右手心却以銅盞盛熱水坐於藥上冷即換五六次即正也一方加巴豆十九粒麝香五分如上用之

小續命湯

○虞天民曰金匱載古今錄驗本方有不膏膏歸無附

麻黃去節

人參去芦

黃芩酒炒

芍藥酒炒

子防已防風懸按  
石膏常歸固不可  
無而千金方之附  
子防風防已亦不  
可缺此恐傳寫者  
之脫簡耳

川芎

炙甘草

杏仁

去皮  
火炒

防已

去皮

桂枝

淨洗

防風

去芦  
各一錢

附子

炮去皮  
臍五分

古人以此方混治中風未詳其證崑謂麻黃杏仁

麻黃湯也仲景以之治太陽證之傷寒桂枝芍藥

桂枝湯也仲景以之治太陽證之中風如此言之

則中風而有頭疼身熱赤強者皆在所必用也人

參七州四君子之二也局方用之以補氣芍藥川

芎四物湯之二也局方用之以養血如此言之則

中風而有氣虛血虛者皆在所必用也風淫未疾

故佐以防風濕淫腹疾故佐以防已陰淫寒疾故

佐以附子陽淫熱疾故佐以黃芩蓋病不單來雜

揉而至故其用藥亦兼該也○熱者去附子用白  
附子筋急語逆脈弦者倍人參加葱豉以常歸去黃  
芩芍藥以避中寒煩燥不大便去附桂倍加芍藥  
竹瀝日久大便不行胃中不快加枳殼大黃語言  
蹇澁手足攣掉加石菖蒲竹瀝口渴加麥門冬瓜  
蒞天花粉身疼發指加羌活煩渴多驚加犀角羚羊  
角汗多去麻黃苦燥加石萍去附桂

△愚按千金錄驗等冊多收續命湯散者爲其  
治中風之急證而未言及總治六淫之疾因血  
虛氣虛之故事也故嚴用和製八味順氣散而  
自叙云治外來諸風皆載之於千金續命等方

是也今山甫多引左傳以感堯舜蓋非博物君子之用心也若夫晉侯求鑿於秦秦伯使醫和視之曰疾不可爲也是爲近女室疾如蠱非鬼非食惑而喪志良臣將死天命不祐公曰女不可近乎對曰節之云云繼之曰天有六氣降生五味發爲五色徵爲五聲滯生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也分爲四時序爲五節過則爲菑陰滯寒疾陽滯熱疾風滯末疾雨滯腹疾晦滯惑疾明滯心疾女陽物而晦時滯則生內熱惑蠱之疾今君不節不持能無及此乎云云此段如張雞峯虞太氏輩凡稱有識之鑿者併合天

元紀六元正紀之五運六氣同論蓋失之鑿也  
夫國君疾篤求鑿於他邦而鑿承召對診有伺  
服迂談五運六氣之事哉觀其自進至退極言  
其致病于惑蠱斷其不可爲也之理也明矣六  
氣曰陰陽風雨晦明也分爲四時序爲五節云  
云如春溫滯于風嵐夏陽滯於酷暑秋涼滯於  
霧露冬陰滯于嚴寒者因馳騁田獵以爲遊佚  
不顧時氣之傷軀乃勞役過制之謂也明晝也  
晦夜也言晝則思慮爭鬪以勞心神夜則滯惑  
陽物以傷腎精乃腎陰虛心火亢世謂陰虛火  
動之候也乃以晝夜序爲一節故曰分爲四時

序爲五節過則爲蓄也。今夫逆推晉平公之病，當時寒熱交作，心胸煩悶，驚悸不安，四肢顛振，以及肚腹脹大，食飲不進等，惡候也。細觀鑿和之言，思過半矣。非此續命方所能及也。不待贅矣。○虞天民曰：夫初病暴仆昏悶，不省人事，或痰涎壅盛，舌強不語，兩寸脈浮大而實者，急宜以瓜蒂、藜蘆等藥吐之，以過其勢。或人迎脈緊急，或六脈但浮弦者，急以小續命湯表之。蓋風氣大盛，心火暴升，而痰涎壅遏於經絡之中，於斯時也，豈尋常藥餌而能通達于上下哉。故本方用附子以其稟雄壯之資，而有斬關奪將之

勢能引人參茸並行於十二經以追復其散失  
之元陽又能引麻黃防風杏仁茸發表開腠理  
以驅散其在表之風寒引當歸川芎芍藥並入  
血分行血養血以滋養其虧損之真陰或加石  
膏知母以降胃火或黃芩以清肺金有所按見  
證與夫時月寒溫加減施治癘勢稍退精神稍  
復輒當改用丹溪之法而以補氣補血清痰之  
劑以調養其本氣而安此急則治其標與夫標  
而本之之治也○易水張氏曰凡中風不審六  
經之形證加減用藥雖治之不能去其邪也內  
經曰開則漸然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜

先以加減續命湯隨證治之云云加減見本書  
 又雲岐子因證加減之法極好亦見本書學者  
 考之雲岐子即易水之令嗣也

**大秦朮湯**

秦朮 去蘆

石膏 用生

當歸 酒洗

芍藥 酒炒

羌活 去芦

防風 去芦

黃芩 酒炒

生苻 洗去土

熟苻

甘草 炙

川芎 洗

白朮 酒炒

白芷

茯苓 去皮

獨活 各一錢

北細辛 去土五分

中風手足不能運動舌強不能言語風邪散見不  
 拘一經者此方主之○中風虛邪也許學士云留  
 而不去其病則實故用驅風養血之劑兼而治之

用秦艽爲君者以其主宰一身之風石膏所以去  
胃中總司之火羌活去太陽百節之風疼防風爲  
諸風藥中之軍卒三陽數變之風邪責之細辛三  
陰內流之風濕責之芩朮去厥陰經之風則有川  
芎去陽明經之風則有白芷風熱于乎氣清以黃  
芩風熱于乎血涼以生芩獨活療風濕在足少陰  
其艸緩風邪上逆于肺乃當歸芍藥熟芩者所以  
養血於疎風之後一以濟風藥之燥一使手得血  
而能握足得血而能步也

△機要太秦艽湯中風外無六經之形證內無  
便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運

動而強不能言語宜養血而筋自榮此方主之  
○康天民曰愚按此方用芍歸芍藥生地以補  
血養筋甚得體既曰外無六經之形證但當少  
用羌活秦艽引用以利關節其防風獨活細辛  
白芷等藥恐太燥而耗血雖用此用芍唯可六  
分之一尤宜加竹瀝薑汁同制最好遠者詳之  
○俞嘉言曰既曰養血筋自柔何得多用風燥  
之藥既欲靜以養血何復用風以動之是其方  
與言悖矣偶論三化湯愈風湯及木秦艽湯三  
方爲似是而非及查三方皆出機要方中云是  
通真子所撰不知其姓名然則無名下士煢亂

後人見聞非所謂一盲引衆盲耶業醫者當深  
 入理要自具隻眼可矣○愚謂一家所論機要  
 方下治例甚爲切當茲得吳山甫贈風邪散見  
 不拘一經者此方主之是猶九轉還丹點鐵成  
 金也不勝起敬

**三化湯**

厚朴姜湯炒

大黃酒浸

枳實數炒

羌活各等分

中風二便數日不利邪氣內實者以此方微利之  
 ○大黃厚朴枳實小承氣湯也上焦滿治以厚朴  
 中焦滿破以枳實下焦實奪以大黃用羌活者不  
 忘乎風也服後二便微行則三焦之氣無所阻塞

而復其傳化之職矣。故曰三化。此方惟實者可用。虛者勿妄與之。若實者不用。則又失乎通達之權。是當大寇而亡九伐之法矣。非安內之道也。

△俞嘉言曰。按此乃攻裏之峻劑。非堅實之體。不可輕服。蓋傷寒證。胃熱腸枯。不得不用大承氣。以開其結。然且先之以小承氣。調胃承氣。恐誤用不當。即傷人。也在中風證。多有虛氣上逆。關隘阻閉之候。斷無用大承氣之理。古方取藥。積腹中不下。以漸填其空竅。俾內風自熄。奈何令人每開竅以出其風。究竟竅空而風愈熾。長此安窮也哉。○愚按俞先生此論。蓋借入仲景

先生風引湯與黑散二方之旨而立言也今人不習古而多出新意致有誤入之咎不待數也所謂生乎今之世反古之道如此者裁及其身者也然或一等實熱之輩苦於秘結不得已者亦當用東垣潤腸丸或麻仁丸等丸藥不傷上焦直入胃腸之中以漸化之潤以下之可也設邪熱內實欲用三化湯者亦有增損焉如燥熱在於氣分用小承氣加藜蘆防風在於血分用桃仁承氣仍加藜蘆防風而羌活不必用也所以然者羌活之散風勝濕非比柔懦之主而藜蘆療風泄熱兼能養血榮筋防風療風散結而

風藥中潤劑也此雖惡羌活而仍用風藥者不  
忘乎風也

瀉青丸

龍膽艸

川芎

梔子

炒

當歸

酒洗

大黃

酒蒸

羌活

防風

等分

○寶鑑瀉青丸用  
七味各等分爲末  
煉蜜爲雞頭大每  
服一丸煎竹葉湯  
同砂糖溫水化下

中風發熱不能安臥者此方主之○肝主風少陽  
膽則其府也少陽之經行乎兩脇風熱相干故不  
能安臥此方名曰瀉青瀉肝膽也龍膽艸味苦而  
厚故入厥陰而瀉肝少陽火實者頭角必痛故佐  
以川芎少陽火鬱者必生煩燥故佐以梔子肝者  
將軍之官風搖火熾勢不容以易治故又奪以太

黃用當歸者培養乎血而不使其爲風熱所燥也  
復用乎羌活防風者二物皆升散之品此火鬱發  
之木鬱達之之意乃上下分消其風熱皆所以瀉  
之也

△按寶鑑瀉青丸羅謙甫治頭屑之方而山甫  
移治中風發熱不能安臥之候可謂隨機應變  
之活手也用之者須知山甫考方移法之意可  
也不然則是梁王兜羊移粟救荒之類而非濟  
世之良才也茲載羅氏之說以備參考羅云肝  
經風盛木自搖動尚書云滿招損老子云物壯  
則老故木凌脾土金來剋之是子來爲母復仇

○按和劑原方用  
 地龍六兩與南星  
 葶等分吳山甫減  
 之者或有理耶或  
 不經救耶○右細  
 末和勻酒麵糊圓  
 如梧桐子大每服  
 二十圓空心日午  
 茶酒送下荊芥茶  
 下亦得

也使梳頭有雪皮見肺之證也肺主皮毛太便  
 實瀉青丸主之虛者人參消風散主之

**活絡丹**

膽南星

川烏

炮去皮  
臍

艸烏

炮去皮  
各六兩

**地龍**

去土  
火乾

乳香

去油

沒藥

各二兩  
二錢

中風手足不用日久不愈者經絡中有濕痰死血  
 此方主之○南星之辛烈所以燥濕痰二烏之辛  
 熱所以散寒濕地龍即蚯蚓也濕土所生用之者  
 何易曰方以類聚欲其引星烏直達濕痰所聚之  
 處所謂同氣相求也亦內經佐以所利和以所宜  
 之意風邪注於肢節久久則血脈凝聚不行故用

乳香沒藥以消瘀血

蠲痺湯

○原方六味水二

鍾薑三片棗二枚煎一鍾不拘時服

黃芪炙 蜜

防風去芦

羌活

赤芍藥

酒炒

薑黃炒

當歸

酒洗各二錢五分

甘草

炙五分

中風表虛手足頑痺者此方主之○內經曰榮氣虛則不仁衛氣虛則不用故用黃芪以實表氣然黃芪與防風相畏用之者何紫古云黃芪得防風而功愈速故並用之欲其相畏而相使耳羌活驅散風邪得當歸不至燥血薑黃能攻痺血得赤芍足以和肝復用甘草調之取其味平也

△嚴氏蠲痺湯原治周痺及手足冷痺脚腿沈

重或身體煩痛背項拘急謂周痺者在血脉之中上下遊行周身俱痛也原用六種乃防風者或山茱加添之以治中風表虛手足頑痺之候與此加添甚諦當矣

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥炒 麻黃去節

大黃蒸 芒硝 連翹 薄荷 梔子炒

桔梗 石膏生 黃芩炒 白朮炒 荆芥穗

滑石 甘草

風熱壅盛表裏三焦皆實者此方主之○防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荆

芥薄荷清上藥也風熱之在巔頂者得之由鼻而  
 泄大黃芒硝通利藥也風熱之在腸胃者得之由  
 後而泄滑石梔子水道藥也風熱之在交瀆者得  
 之由溺而泄風淫于兩肺胃受邪石膏桔梗清肺  
 胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火風之爲  
 患肝木主之川芎歸芍和肝血也而其艸白朮又  
 所以和胃氣而健脾劉守真氏長於治火此方之  
 旨詳且悉哉

△原方防風通聖散

併加減法

防風 川芎 川歸 白芍藥 大黃

芒硝 連翹 薄荷 麻黃 去節各四分

石膏

桔梗

黃芩

各八分

白朮

梔子

荊芥穗

各二分

滑石

二錢四分

苁艸

炙一錢

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞

溫服日再服勞汗當風汗出為鼓鬱乃瘞去芒

硝倍加芍藥當歸或生癰疹或赤或白倍加去

節麻黃鹽豉蔥白發汗罷依前方加四物湯黃

連解毒三藥合而飲之日二服小便淋閉去麻

黃加滑石連翹煎調木香末一錢匕腰脇走注

疼痛加硝石當歸苁艸煎調車前子末海金沙

末各一錢匕破傷風者如在表則辛以散之在

裏則苦以泄之用此以兼散之汗下後通利血

氣驅逐風邪加荊芥穗太黃煎調全蝎末一錢  
匕羌活末一錢匕諸風潮搐小兒急慢驚風太  
便秘結邪熱甚腸胃乾燥寢汗咬牙目睛上  
竄睡語不安轉筋驚悸倍太黃梔子煎調茯苓  
末一錢匕如肌肉蠕動者調羌活末一錢匕風  
傷於肺咳嗽喘急加半夏枯梗紫苑如打撲損  
傷肢節疼痛腰中惡血留滯不下加當歸大黃  
煎調乳香沒藥各一錢匕解利四時傷寒加益  
元散半兩加蔥白鹽豉生薑水一大碗煎至五  
七沸溫服不半以鵝翎探之即吐吐後更服一  
半汗出立解如飲酒中風身熱頭痛如破加黃

連蔥白煎服立愈頭旋腦熱鼻塞濁涕時下加薄荷黃連煎服內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不已也如氣逆者本方煎調木香末一錢匕此方最治痢後鶴膝風良驗

史國公藥酒方

防風去

藜朮去

油松節

虎脰骨酥炙

鱉甲醋炙

白朮各二兩炒

羌活

草薺

晚蠶砂炒

當歸酒洗去土

川牛膝去

杜仲去皮姜炒各三兩

蒼耳子四兩

枸杞子五兩

乾茄根八兩去土

△仙傳史國公浸酒良方臣謹沐聖恩叨居相

職節宜弗謹遂染風疾半體偏枯手足拘攣不

○萬氏積善堂經驗方號徐國公萬病無憂酒專治左癱右瘓四肢頑麻骨節痠痛諸般寒濕風氣忌食發風動氣之物

魁行步官醫診治良劑屢投今越十載全無寸  
効乞歸故里廣訪名醫途至奉先驛獲遇異人  
臣陳病狀蒙授一方臣依方浸酒未服之先非  
人扶不能起及飲一升使手能梳頭服二升手  
足屈伸有力服三升語言舒暢行步如故服四  
升肢體通緩百節遂和舉步如飛其効如神言  
之不及盡述乞賜頒行天下使其黎庶咸臻壽  
域謹錄是方隨表拜進以聞○按本藥十五味  
併有製法不可苟簡一方加白花蛇酒浸去皮  
骨焙乾四兩其効如神○右細剉用好酒三十  
五斤將生絹袋盛藥懸浸于內封固過十四日

將罈入鍋懸空著水煮令罈內滾響取出入土  
內三日去火毒每開罈取酒不可以面對罈口  
恐藥力冲傷眼目每飲一二鍾毋令藥力斷絕  
忌動風之物凡製此酒不可煮之太過則無効  
只可盡一炷香爲度凡左癱右瘓口眼喎斜四  
肢麻痺筋骨疼痛三十六種風二十四般氣無  
不動也

中風之久語言蹇澁半身不遂手足拘攣不堪行  
步痿痺不仁者此方神良○語言蹇澁風在舌本  
也半身不遂邪併於虛也手足拘攣風燥其筋也  
不堪行步風燥而血不濡也痿痺不仁風而濕也

是方也乾茄根蒼耳子羌活秦艽防風松節萆薢  
蠶砂可以去風亦可以去濕風去則蹇澀拘攣之  
證除濕去則不遂不仁之患愈當歸牛膝杜仲枸  
杞所以養血亦所以潤燥養血則手得血而能攝  
足得血而能步潤燥則筋得血而能舒矣若虎骨  
者用之以驅入骨之風白朮者用之以逐冲和之  
氣風痺之久血必留居龍甲之用所以治風邪之

**固**  
一本  
作潤血也

**豨薟丸**

豨薟艸 不拘  
多少 此艸處處有之其葉似蒼耳對節

而生用五月五日七月七日九月九日採來曬

○師曰此艸採以  
六月六日七月七  
日可也五月太早  
而氣味未周九月  
太晚而藥汁已燥

矣製法得此神每  
離地五六寸剪刈  
以清水洗去泥土  
摘葉及枝頭去其  
莖以沙銷柳木甑  
層層酒以蜜酒蒸  
晒九次仍熬搗爲  
末入煉蜜再搗爲  
丸服之更佳

乾鋪入甑中用好酒層層勻灑蒸之復曬如此  
九次爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸  
空心無灰酒下

病人骨節疼痛緩弱無力此方主之良○骨節疼  
痛壅疾也壅者喜通此物味辛苦而氣寒用九蒸  
九曬則苦寒之濁味皆去而氣輕清矣本州云輕  
可以去實蓋輕清則無礙不入故能透骨驅風勁  
健筋骨若未之九蒸九曬或蒸曬之數不滿於九  
濁味猶存陰體尚在則不能透骨驅風而却病也  
此陰陽清濁之義惟明者求之○唐江陵節度使  
成訥進稀蒼丸知益州張詠進稀蒼丸事考並見

傷寒門 第二

叙曰仲景傷寒方，群方之祖也。自晉唐而降，歷朝醫哲，固不宗之。初學之士，能究其方，識其證，雖施之雜療，不可勝用。豈徒曰傷寒云爾哉。今取其方七十五首，考之如左。有治人之志者，幸教我焉。

△傷寒一病，實難為言也。仲景先正神述於後漢之末，晉王叔和任意改頭換顏，移易使全篇朱却面目焉。歷乎千五百多載，而其間有成無已。朱肱、陶萃等輩，重釋疊解，愈多愈亂，真矣所。

嗟沒把不刊之妙典將作封堯之故紙矣然真  
金終不和沙於是明清之際托吳大之太德弗  
忍死入於非命也歟出玉宇泰命嘉言二先達  
憲章長沙之成法著述傷寒準繩尚論篇二太  
部使長沙之法依舊回天之先得非澆世生人  
之太寶乎愚也自弱讀之壯而習之老而未得  
十之二三歎歎古人之深奧未可以蠡測之也  
故於傷寒醫方考弗敢強措鈍辭一仍吳氏舊  
貫者良由太病變症多端一言有誤喪人百手  
故也醫諸敵手博弈一著有差死活判矣評棋  
去爾戒之慎之

其中發明一二弗忍靈不藏和  
盤托出二任後進思捨焉

桂枝湯

桂枝 三兩 洗淨

芍藥 三兩 炒

甘草 二兩 生

生薑 三兩

大棗 十二枚 擘

頭痛發熱汗出惡風脉緩者太陽中風也此湯主之。○風之傷人也頭先受之故令頭痛風在表則表實故令發熱風為陽氣亦為陽同類相從則傷衛外之氣衛傷則無以固衛津液故令汗出其惡風者衛氣不能衛也其脉緩者衛氣不能鼓也上件皆太陽證故曰太陽中風桂枝味辛其辛則能解肌其則能實表經曰辛甘發散為陽故用之以治風然恐其走泄陰氣故用芍藥之酸以收之佐

○蓋一本作若

以甘艸生薑大棗此發表而兼和裏之意是方也  
惟表邪可以用之若陽邪去表入裏裏作燥渴二  
便秘結此宜承氣之時也而誤用之則反矣論曰  
桂枝下咽陽盛則斃蓋謂陽邪去表入裏故也又  
曰桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者  
不可與也蓋以與之則表益實而汗益難出耳故  
申之以常須識此勿令誤也

麻黃湯

麻黃

去節 三兩

桂枝

洗淨 二兩

杏仁

去皮尖 七十枚

甘艸

生 一兩

太陽傷寒頭痛發熱身疼腰痛骨節不利惡寒無汗而喘脉來尺寸俱緊者麻黃湯主之○足太陽

經起目內背循頭背腰膈故所過疼痛不利寒邪  
外束人身之陽不得宣越故令發熱寒邪在表不  
復任寒故令惡寒寒主閉藏故令無汗人身之陽  
既不得宣越于外則必壅塞于內故令作喘寒氣  
剛勁故令脉緊麻黃之形中空而虛麻黃之味辛  
溫而薄空則能通腠理辛則能散寒邪故令爲君  
佐以桂枝取其解肌佐以杏仁取其利氣入其艸  
者亦辛其發散之謂抑太陽無汗麻黃之用固矣  
若不斟酌人品之虛實時令之寒暄則又有汗多  
亡陽之戒汗多者宜撲粉亡陽者宜附子湯

葛根湯

葛根 四兩

麻黃 去節 三兩

桂枝 二兩 洗淨

芍藥 二兩 炒

甘草 二兩 生

生薑 三兩

大棗 十二枚

太陽病項背強無汗惡風者名曰剛瘧此方主之

○風寒傷經絡之經則所過但痛而已未至於強

風寒傷筋骨之筋則所過筋急強直而成瘧瘧瘧

字之誤也曰剛瘧者無汗之名也本艸云輕可去

實葛根麻黃形氣之輕者也此以風寒表實故加

二物於桂枝湯中○又太陽與陽明合病必自下

利下利裏證也今之庸醫皆曰漏底傷寒不治仲

景則以此方主之蓋以邪氣併於陽則陽實而陰

虛陰虛故下利也與此湯以散經中表邪則陽不

實而除氣平利不治而自止也斯妙也惟明者知

之

小青龍湯

麻黃

三兩 去節

桂枝

三兩 洗淨

芍藥

三兩 炒

五味

半斤 炒

半夏

半升 泡

細辛

北去 土

甘草

生

乾薑

各三兩

傷寒表不解心下有水氣乾嘔或咳或噎或喘小  
青龍湯主之。表不解者頭疼發熱身痛尚在也  
傷寒留渴飲水過多故心下有水氣有聲無物謂  
之乾嘔名曰水氣則有形之水已散但無形之氣  
仍在耳故無物可吐而但有聲或咳或噎或喘皆  
水寒射肺故也青龍者東方木神主發育萬物。

方以發散為義故名之麻黃桂枝甘艸發表邪也  
半夏細辛乾薑散水氣也芍藥所以和陰血五味  
所以收肺氣也

大青龍湯

麻黃

六兩 去節

杏仁

四十枚 去皮尖

桂枝

淨洗

甘艸

生各二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

石膏

如雞子大一塊

傷寒太陽證見風脉者此方主之○仲景法太陽

傷寒治以麻黃湯太陽中風治以桂枝湯今傷寒

太陽證見風脉是有頭痛身熱無汗惡寒但脉來

不緊而緩為傷寒且中風矣故二方併而用之風

寒外盛則人身之陽鬱為內熱此石膏之所加也

名曰大青龍其發表之尤者乎而亡陽之戒筋惕肉瞤之弊則用青龍之過者也有此者急以大溫太補之劑主之又仲景救弊之方也

升麻葛根湯

升麻

葛根

芍藥炒

甘草

各等分

傷寒日痛鼻乾不眠無汗惡寒發熱者陽明經證也此方主之○足陽明之脉抵目挾鼻故日痛鼻乾其不能眠者陽明之經屬於胃胃受邪則不能安臥此其受邪之初猶未及乎狂也無汗惡寒發熱者表有寒邪也藥之爲性辛者可使達表輕者可使去實升麻葛根辛輕者也故用之達表而去

實寒邪之傷人也氣血爲之壅滯佐以芍藥用和血也佐以芩艸用調氣也

白虎湯

石膏

一斤 槌不見饑

知母

去浮皮六兩

芩艸

二兩粳米

六合

傷寒傳入於胃不惡寒反惡熱有汗作渴脉大而長者此方主之○傳入於胃邪入裏矣表無其邪故不惡寒裏有實熱故反惡熱熱越故有汗裏燥故作渴邪盛故脉大邪在陽明故脉長白虎西方金神也五行之理將來者進功成者退如秋金之令行則夏火之炎息此方名曰白虎所以行滯肅之令而除熱也石膏太寒用之以清胃知母味厚

○血虛以下十六  
字乃東垣李氏教  
入治立夏前后發  
熱者有中暍用白  
虎症有血虛發熱  
者用當歸補血病  
以脉虛實辨焉與  
傷寒無關故繩

用之以生津太寒之性行恐傷胃氣故用甘草粳  
米以養胃是方也惟傷寒內有實熱者可用之若  
血虛身熱證像白虎誤服白虎者絕無救又東垣  
之所以垂戒矣

小柴胡湯

柴胡

半斤 去芦

黃芩

三兩

人參

三兩 去芦

甘草

三兩

半夏

半升 製

生薑

三兩

大棗

十二枚

傷寒寒熱往來脇痛口苦脉弦者此邪在少陽經  
半表半裏之證也本方主之○邪在表則惡寒邪  
在裏則發熱邪在半表半裏則惡寒且熱故令寒  
熱往來少陽之脉行於兩脇故令脇痛其經屬於

膽膽汁上溢故口苦膽者肝之府在五行爲木有  
垂枝之象故脉弦柴胡性辛温辛者金之味故用  
之以平木温者春之氣故就之以入少陽黃芩質  
枯而味苦枯則能淨苦則能降君以柴胡則入少  
陽矣然邪之傷人常乘其虛用人參其州者欲中  
氣不虛邪不得復傳入裏耳是以中氣不虛之人  
則雖有柴胡證俱而人參在可去也邪初入裏裏  
氣逆而煩嘔故用半夏之辛以除嘔逆邪半在表  
則榮衛爭故用薑棗之辛甘以和榮衛○仲景云  
胸中煩而不嘔去半夏人參加括蕁實一枚若渴  
者去半夏更加人參一兩五錢括蕁根四兩若腹

中痛者去黃芩加芍藥三兩若脇下痞鞭去大棗  
 加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓  
 苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩  
 溫覆取微汗若咳者去人參太棗生薑加五味子  
 半升乾薑二兩○以上加減法皆去其所弊加其  
 所宜茲惟明者求之不復贅也

**大柴胡湯**

柴胡

半斤 去芦

黃芩

三兩 炒

芍藥

三兩 炒

半夏

半升 泡 十次

生薑

五兩

枳實

四兩 炙炒

大黃

二兩 酒浸

大棗

十二枚

傷寒陽邪入裏表證未除裏證又急者此方主之

○表證未除者寒熱往來脇痛口苦尚在也裏證

又急者大便難而燥實也表證未除故用柴胡黃芩以解表裏證燥實故用大黃枳實以攻裏芍藥能和少陽半夏能治嘔逆大棗生薑又所以調中而和榮衛也

調胃承氣湯

大黃 四兩 酒浸

芒硝 半斤

甘草 二兩

傷寒陽明證俱大便秘譫語脈實者此方主之○陽明證俱者不惡寒反惡熱作渴是也傳至陽明則熱經數日矣熱久則五液乾涸故大便秘液亡則無水以制火故譫語譫語者呢喃而語妄見妄言也邪入於裏故脈實大黃苦寒可以蕩實芒硝

鹹寒可以潤燥，其艸其平可以和中。此藥行則胃中調而裏氣承順，故曰調胃承氣。然猶有戒焉：表證未去而早下之，則有結胸痞氣之患；此大小陷胸湯之所以作也。夫人惡可以不慎乎？

小承氣湯

大黃

四兩 酒浸

厚朴

二兩 炒

枳實

三枚 煨炒

傷寒腹脹滿潮熱狂言而喘者，此方主之。○邪在上焦則作滿，邪在中焦則作脹，胃中實則作潮熱。曰潮熱者，猶潮水之潮，其來不失時也。陽乘於心則狂，熱干胃口則喘。枳實去上焦之痞滿，大黃瀉胃中之實熱。此其裏證雖成，病未危急，痞滿燥實

堅猶未全俱以是方主之則氣亦順矣故曰小承氣

大承氣湯

大黃

四兩 酒浸

厚朴

半斤 姜湯炒

枳實

五枚 麩炒

芒硝

三合

傷寒陽邪入裏痞滿燥實堅全俱者急以此方主

之○調胃承氣湯不用枳朴者以其不作燥滿用

之恐傷上焦虛無氤氳之元氣也小承氣湯不用

芒硝者以其實而未堅用之恐傷下焦血分之真

陰謂不伐其根也此則上中下三焦皆病痞滿燥

實堅皆全故主此方以治之厚朴苦溫以去痞枳

實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟堅大黃苦寒以泄實去熱雖然仲景言急下之證亦有數條如少陰屬腎水病則口燥舌乾而渴乃熱邪內炎腎水將絕宜急下之以救將絕之水又如腹脹不大便土勝水也宜急下之陽明屬土汗出熱盛急下以存津液腹滿痛者爲土實急當下之熱病日不明熱不已者如此腎水將竭不能照物則已危矣須急下之此皆太承氣證也若病未危急而早下之或雖危急而下藥過之則又有寒中之患寒中者急溫之宜與理中湯

桃仁承氣湯

桃仁

五十枚  
去皮尖

桂枝

二兩洗淨  
姪娠用炒

大黃

四兩  
酒浸

芒硝

二兩

甘草

二兩

傷寒外證已解小腹急太便秘小便利其人如狂

者有畜血也此方主之○無頭痛發熱惡寒者為

外證已解小腹急者邪在下焦也太便秘者瘀血

漬之也小便利者血病而氣不病也上焦主陽下

焦主陰陽邪居上焦者名曰重陽重陽則狂今瘀

熱客于下焦下焦不行則于上部清陽之分而未

若不寧矣故其證如狂桃仁潤物也能澤腸而滑

血大黃行藥也能推陳而致新芒硝鹹物也能軟

堅而潤燥甘草平劑也能調胃而和中桂枝辛物

前書方考 卷五  
○三十五  
也能利血而行滯又曰血寒則止血熱則行桂枝之辛熱君以桃仁芒硝大黃則入血而助下行之性矣斯其制方之意乎

小陷胷湯

黃連

一兩  
去毛

半夏

泡七次  
半升

枳實

一枚  
去皮

傷寒下之早熱結胷中按之則痛者小結胸也此方主之○三陽經表證未去而早下之則表邪乘虛而入故結胸結胸者陽邪固結於胸中不能解散為鞭為痛也按之則痛者不按猶未痛也故用小陷胸湯黃連能瀉胸中之熱半夏能散胸中之結枳實能下胸中之氣然必下後方有此證若未

經下後則不白結胸

大陷胸湯

大黃

六兩 酒浸

芒硝

外一

甘遂

錢一

傷寒下之早從心下至小腹鞭滿而痛不可近者太結胸也此方主之○三陽經表證未解而用承氣湯以攻裏者此下之早也下之早則裏虛裏虛則表邪乘之而入三焦皆實故心下至小腹鞭滿而痛不可近也此其為證危急尋常藥餌不能平矣故用大黃以蕩實硝石以軟堅甘遂以直達噫人稱三物之峻矣抑孰稱其有起死之功乎用人之勇去其怒惟善將將者能之

半夏瀉心湯

即其艸瀉心湯

半夏

半外製

黃芩炒

乾薑

人參

去

甘草

各三兩

黃連

一兩去毛

大棗

十二枚

傷寒下之早胸滿而不痛者為痞此方主之○傷寒自表入裏傳至三陰三陰亦有在經表證如太陰有桂枝加芍藥湯少陰有麻黃附子細辛湯厥陰有當歸四逆湯之類若不治其表而用承氣湯下之則傷中氣而陰經之邪乘之矣以既傷之中氣而邪乘之則不能升降濁痞塞於中如天地不交而成否故曰痞瀉心者瀉心下之邪也薑夏之辛所以散痞氣芩連之苦所以瀉痞熱已下之

後脾氣必虛人參甘艸大棗所以補脾之虛

附子瀉心湯

附子

一枚去皮臍

大黃

酒浸

黃連

去毛炒

黃芩

炒各一兩

傷寒心下痞汗出惡寒者此方主之○心下痞故用三黃以瀉痞惡寒汗出故用附子以回陽無三黃則不能以去痞熱無附子恐三黃益損其陽熱有附子寒有三黃寒熱並用斯為有制之兵矣張機氏誠鑿家之善將將者也俗醫用寒則不用熱用熱則不用寒何以異以膠柱而鼓瑟乎

生薑瀉心湯

生薑

四兩

甘艸炙

人參

去芦

黃芩

炒各三兩

半夏

半升 製

黃連

去毛

乾薑

各一兩

大棗

十二枚

傷風中風，鑿反下之，其人下利，日數十行，穀不化，腹中雷鳴，心下痞硬而滿，乾嘔，心煩不得安者，此方主之。○病在表而反下之，則逆矣。下而虛，其中氣則表邪乘之而入，虛不任邪，故下利日數十行。今人謂之挾熱利也。火性急速，穀雖入而未及化，故穀不化，虛陽奔迫，故令腹中雷鳴。中虛不能化氣，故令痞硬而滿。胃虛客氣上逆，故令乾嘔心煩，不得安。人參、甘草、大棗，胃虛之聖藥也。生薑、半夏、乾薑，嘔逆之聖藥也。黃芩、黃連，痞熱之聖藥也。

十棗湯

芫花熬

芫遂

大戟各五分

大棗十枚

傷寒表證已去其人澀澀汗出心下痞鞭脇痛故嘔短氣者此邪熱內畜而有伏飲也本方主之○芫花之辛能散飲戟遂之苦能泄水又曰芫遂能直達水飲所結之處三物皆峻利故用大棗以益土此成衣之後而發鉅橋之意也是方也惟壯實者能用之虛羸之人未可輕與也

**三物白散**

桔梗

貝母各三分

巴豆一錢炒黑

傷寒寒實結胸無熱證者此方主之○此證或由表解裏熱之時過食冷物故令寒實結胸然必無

熱證者為是桔梗貝母之苦用之以下氣巴豆之  
 辛用之以去實又曰病在膈上則吐病在膈下則  
 利此桔貝主上巴豆主下之意服後不行者益以  
 溫湯行之過多者止以涼粥

大陷胸丸

大黃 酒浸 半斤

葶蘆 炒

杏仁 去皮

芒硝 各半 升

甘遂 一錢

白蜜 二合 為丸

頓服之一宿乃下不下者又服之

傷寒結胸項強如柔瘕狀此方下之則和○結胸  
 項強者胸滿鞭痛能仰而不能俛也有汗項強為  
 柔瘕此雖有汗其項強乃胸中滿實而不能俛非

是中風瘧急故曰如柔瘧不用湯液而用丸劑何也湯主蕩滌前用太陷胸湯者以其從心下至少腹皆鞭痛三焦皆實故用湯以蕩之此惟上焦滿實用湯液恐傷中下二焦之陰故用丸劑以攻之太黃芒硝之苦寒所以下熱葶藶杏仁之苦其所泄滿其遂取其直達白密取其潤利

抵當湯丸

水蛭

三十枚  
炒褐色

蜚蠊

去翅足炒  
三十枚

桃仁

三十枚  
去皮尖

大黃

酒浸  
三兩

傷寒不結胸發狂少腹鞭滿小便自利脉沈結者以太陽隨經瘀熱在裏而有瘀血也此方主之○

宜結胸而不結胸故曰不結胸瘀熱內實故令發狂發狂則重於桃仁承氣如狂矣少腹鞭滿者下焦實也小便利者血病而氣不病也病深入裏故脈沉內有積瘀故脈結脈行肌下謂之沉遲時一止謂之結自經而言則曰太陽自府而言則曰膀胱陽邪由經而入結於膀胱故曰隨經瘀熱在裏熱結血燥是瘀血也經曰苦走血鹹勝血蜜蟲水蛭之鹹苦所以除畜血滑能利腸苦能瀉熱桃仁大黃之苦滑所以利血熱

梔子豉湯

梔子

十四枚  
抄

香豉

四合

傷寒汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹者此方主之○汗吐下之後正氣不足邪氣乘虛而結於胃中故煩熱懊憹煩熱者煩擾而熱懊憹者懊惱憹悶也梔子味苦能湧吐熱邪香豉氣腐能剋制熱勢所謂苦勝熱腐勝焦也是方也惟吐無形之虛煩則可若用之以去實則非梔子所能宣矣宣實者以後方瓜蒂散主之

瓜蒂散

苦瓜蒂

畧妙

赤小豆

各五分

傷寒胸中多痰頭痛者此方吐之○胸中多痰便是實證與虛煩不同痰熱交滯故令頭痛經曰苦

能湧泄瓜蒂苦物也故用之在上則湧胸中實痰  
陶隱居曰燥可去濕赤小豆之屬是也此用之爲  
佐亦是燥其濕痰之意是方也吐痰誠爲快利諸  
亡血虛家則又在所禁矣蓋血亡而復用吐則氣  
亦去虛家而復用吐則損其陰

△苦瓜蒂當作瓜蒂一名瓜丁一名苦丁香用甜  
瓜之短與團者其味苦仲景用爲吐藥者乃甜  
瓜熟時其蒂自然脫在蔓上約截一寸許曝乾  
其形大似丁香故有苦丁香香瓜丁之目也吳氏  
每誤寫作苦瓜蒂失考也本艸另載苦瓜釋名  
錦荔枝詳見蔬菜部且大仲景用瓜蒂故不

傷寒胸中多痰頭痛而已雖頭不痛但痰涎壅塞胸中或宿食填滿胃脘作苦惱者併宜吐之內經所謂高者因而越之在上者涌之是也茲略舉張仲景所示一二以證之曰病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞噎氣上衝咽喉不得息者此爲胸中有寒也當吐之少陽病頭痛發寒熱脉緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上諸實鬱積而痛不能食飲人按之而反有涎唾者下利且寸餘行寸口脉微弦者當吐之懊憹煩躁不得眠未經汗下謂之實煩當吐之大陽中喝身熱頭痛而脉微弱此夏月傷冷

水水行皮中也宜吐之宿食在上脘者當吐之  
已上並主以瓜蒂散唯諸亡血虛家不可與瓜  
蒂散云者又先正加慎之訓也

文蛤散

文蛤

爲末方寸匕

病在陽反嘔以水熱攻於內寒更益堅欲飲水而  
不渴者此方主之○不當與水而與飲之故曰反  
嘔以水熱雖攻於內因水寒不散故欲飲而不渴  
此其有停水可知矣故用文蛤之鹹以潤下而破  
水

五苓散

茯苓

猪苓

白朮

各十  
八銖

澤瀉

一兩  
六銖

桂

半兩

傷寒小便不利而渴者此方主之。○水道為熱所  
秘故令小便不利小便不利則不能運化津液故  
令渴水無當於五味故用淡以治水茯苓猪苓澤  
瀉白朮雖有或潤或燥之殊然其為淡則一也故  
均足以利水桂性辛熱辛熱則能化氣經曰膀胱  
者州都之官津液藏焉氣化則能出矣此用桂之  
意也桂有化氣之功故並稱曰五苓濁陰既出下  
竅則清陽自出上竅又熱隨溺而泄則渴不治可  
以自除雖然小便不利亦有因汗下之後內亡津

液而致者不可強以五苓散利之強利之則重亡津液益虧其陰故曰大下之后復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈師又曰太陽隨經之邪直達膀胱小便不利其人如狂者此太陽之邪不傳他經自入其府也五苓散主之亦是使陽邪由溺而泄互考見霍亂門

**猪苓湯**

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

各三錢

阿膠

蚌粉炒一錢

傷寒少陰下利而主此方者分其小便而下利自止也傷寒渴欲飲水小便不利而主此方者導其

陽邪由瀉而泄則津液運化而渴自愈也又曰猪苓質枯輕清之象也能滲上焦之濕茯苓味甘中官之性也能滲中焦之濕澤瀉味鹹潤下之性也能滲下焦之濕滑石性寒清肅之令也能滲濕中之熱四物皆滲利則又有下多亡陰之懼故用阿膠佐之以存津液於決瀆爾

茵陳蒿湯

茵陳蒿

半兩

梔子

四枚炒

大黃

三錢酒浸

傷寒頭汗出渴飲水漿小使不利者身必發黃此方主之○頭汗出者祇是頭有汗躋頸而還皆無汗也內有實熱故渴飲水漿并降不交故小便不

利濕熱鬱於中而不得越故必發黃經曰太熱之氣寒以取之故用茵陳苦入心而寒勝熱故用梔子推除邪熱必假將軍故用大黃又曰茵陳梔子能導濕熱由小便而出故用之

井栝湯

栝梗 一兩

甘草 二兩

少陰病咽痛者此方主之○口燥舌乾而渴脉來沈者少陰病也少陰之脉循喉嚨挾舌本病故咽痛甘草緩邪熱而兼發散栝梗下膈熱而治咽喉

小建中湯

桂

甘草

生薑

各三兩

芍藥六兩 膠飴一斤 大棗十二枚

傷寒腹中急痛者此方主之○腹中急痛則陰陽  
乖於中而脾氣不建矣故立建中湯桂肉與桂枝  
不同枝則味薄故用之以解肌肉則味厚故用之  
以建裏芍藥之酸收陰氣而建脾生薑之辛散寒  
邪而輔正經曰脾欲緩急食甘以緩之故用其州  
太棗膠飴以緩急痛又曰嘔家不可用建中爲其  
其也則夫腹痛而兼嘔者又非建中所宜矣

△謹按傷寒論太陽篇第五十一條曰傷寒陽  
脉澁陰脉弦法當腹中急痛先與建中湯不差  
與小柴胡湯成無己曰腹中急痛當作裏有虛

寒治之與小建中湯溫中散寒若不差者非裏寒也必由邪氣自表之裏裏氣不利所致小柴胡去黃芩加芍藥以除傳裏之邪又第五十二條曰傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之成氏曰傷寒二三日邪氣在表未當傳裏之時心中悸而煩是非邪氣搏所致心悸者氣虛也煩者血虛也以氣血內虛與小建中湯先建其裏悉按仲景先生治病之法先補後攻為故正與難經陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰而後瀉其陽之旨同出共轍所謂先聖后聖其揆

一也一則以脉弦之與澁示人先補之意一則以悸與煩論人下補之法者乃鑿門救世大菩薩乎可謂應以醫者身得度者卽現鑿者身而爲說法者也出乎鑿者貪著邪見昧却正法雖菩薩現身亦莫如之何也如今世鑿不察神聖補虛瀉實之法攻實者常七八補虛者無二三且動輒稱急則治標緩則治本究其所爲緩急虛實顛倒交錯舉手誤人者失於不從明師講究耳△再按此方仲景先生取焉建中諸家各有臆說愚特不敢輕從焉諒此方乃從上古師徒口授以至於張公公恐其久而亡失乃著述

於方冊耳。王肯堂太史公曰：黃岐猶義文也。仲景其孔子乎？世皆以爲知言也。傷寒論一百一十三方，冠以桂枝湯者，諒長沙神機妙用或在是矣。乃建中湯者，醜轉桂枝湯，面目變作建中之神品也。東垣李氏得其理要，謂仲景治表虛，製桂枝湯，桂枝味辛熱發散，助陽體輕，本乎天者親上，故桂枝爲君，芍藥甘艸爲佐，如陽脈澹陰脈弦法，當腹中急痛，乃製小建中湯，以芍藥爲君，桂枝甘艸佐之一，則治其表虛，一則治其裡虛，故各有主用也。愚謂此方所以爲神品者，芍藥酸寒，在四時爲春初，在下干爲甲木，甘艸

非平在四時為長夏在十干為巳土而甲巳相  
合化土從稼穡也五行化運之法逢龍乃變柱  
枝辛溫在時為春夏之交在十二支屬辰猶龍  
雷之火屬於震也推月建法甲巳之年震宮值  
戊辰乃龍上加戊是謂上運五運同此例推故号此三  
品曰建中焉建者置也立也中者土也非聖人  
安能及此微妙通玄之法也哉所以此方有實  
表救裏親上親下之功用者非中則不能四達  
矣其如黃芪建中或當歸建中六味建中十全  
大補十四味建中樂令建中太建中及雙和散  
養榮湯等榮衛併補之藥多出於此方也俞嘉

言論金匱小建中湯黃芪建中湯二方曰虛勞  
裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱  
咽乾口燥小建中湯主之虛勞裏急諸不足黃  
芪建中湯主之按虛勞病而至於亡血失精消  
耗精液枯槁四出難爲力矣內經於鍼法所其  
制者訓以甘藥金匱遵之而用小建中湯黃耆  
建中湯急建其中氣俾飲食增而精液旺以至  
充血生脉而復其真陰之不足但用稼穡作甘  
之本味而酸辛鹹苦在所不用蓋捨此別無良  
法也然用法者貴立於無過之地寧但嘔家不  
可服建中之耳卽服甘藥微覺氣阻氣滯更當

慮其藥太過令人中滿蚤用橘皮砂仁以行之  
可也不然其藥又不可恃更將何所恃哉

黃著建中湯

黃芪

桂 各一錢半

白芍藥 三錢

甘草 一錢

傷寒汗後身痛脈遲弱者此方主之○汗後身痛者此出汗多耗損陰氣不能榮養筋骨故令身痛陽虛故令脈遲汗後故令脈弱黃芪甘州之甘補中氣也然桂中有辛同用之足以益衛氣而實表芍藥之酸收陰氣也桂中有熱同用之足以利榮血而補虛此方以建中名者建立中氣使其生育榮衛通行津液則表不虛而身痛自愈矣

黃芩湯

黃芩

三兩 炒

甘草

二兩

芍藥

二兩 炒

大棗

十二枚

太陽與少陽合病必自下利者此方主之○太陽與少陽合病者有太陽證頭痛身熱脊強而又有少陽證耳聾脇痛寒熱往來嘔而口苦也必自下利者表實裏虛邪熱漸攻於裏故也若太陽與陽明合病自下利為在表當與葛根湯發汗陽明少陽合病自下利為在裏可與承氣湯下之此太陽少陽合病自下利為在半表半裏非汗下所宜故與黃芩湯師曰虛而不實者苦以堅之酸以收之故用黃芩芍藥以堅欬腸胃弱而不實者甘以補

桂枝之炒衍

之故用甘州大棗以補益腸胃其有加半夏者為其嘔也

黃連湯

黃連去毛炒

乾薑炒

桂枝炒

甘州

各三兩

人參二兩

半夏半升

大棗十二枚

傷寒胸中有熱而欲嘔胃中有寒而作痛者與此湯以升降陰陽○黃連之苦以泄上熱而降陽薑桂半夏之辛以散中寒而升陰人參甘州大棗之甘可緩中急而益胃是方也以黃連之寒佐以薑桂之辛則寒者不滯以薑桂之熱君以黃連之苦則熱者不燥寒熱之相用猶音正之相倚耳况夫

有等方考

卷二

桂枝 炙 衍

人參 甘艸 之益胃 又所以 幸中 而建 招搖 矣乎

炙甘艸湯

甘艸 炙 四兩

桂枝 炒

生薑 各三兩

生地黄 一斤

人參

阿膠 各二兩

麥門冬

麻仁 各半升

大棗 十二枚

傷寒脉結代 心動悸者 此方主之 ○ 結與代皆止 脉也 此由氣血虛衰 真氣不能相續 故有此脉 心動悸者 動而不自安也 亦由真氣內虛 所致 補可以去弱 故用人參 甘艸 太棗 溫可以生陽 故用生薑 桂枝 潤可以滋陰 故用阿膠 麻仁 而生地 麥門者 又所以清心而寧悸也