



Library of



Princeton University.

永樂大典卷之一萬四千九百四十九

六暮



婦

婦人證治二十五

婦人八瘕

論

**靈樞**水脹篇石瘕何如。岐伯曰。石瘕生於胞中。寒氣客于子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當寫不寫。衃以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。可導而下。羅謙甫衛生寶鑑云。夫膀胱為津液之府。氣化則能出矣。今寒客于子門。則必氣塞不通。血壅不流。而衃以止之。結硬如石。是名石瘕也。此氣先病而血後病。故月事不來。則可宣導而下出者也。故難經云。任之為病。其內苦結。男子為七疝。女子為瘕聚。此之謂也。非大辛之藥不能已。可服見規丹。方見後。**王素外臺秘要方**素女經論婦人八瘕積聚。無子斷絕不產。今有子受胎養法。黃帝問於素女曰。吾聞天下婦人產乳有子而病者。未曾生子而病者。又產乳後而中絕不復產者。何也。諸病從生。而令婦人腹中有積聚。曾脇腰背攣而痛。久而生八瘕之聚。病深

可畏不在腸胃。療之或者已復。其狀寧可得聞之乎。對曰。婦人之病。皆由於月病生產所致。又從胞胎所起。其病不同。鍼灸食藥。不得其方也。黃帝曰。安心其要。易聞之。為寶受之。良久詳思其事。曰善哉。療將柰何。素女曰。誠為主說。婦人胞胎之數。皆在陰裏。萬物皆從生。淵深血脈。精氣所從行。腎為陰。陰主開閉。左為胞門。右為子戶。主定月水生子之道。胞門主於子精神氣所出入。合於中黃門。玉門四邊。主持關元。禁閉子精。臍下三寸。名曰關元。主藏魂。婦人之胞。三焦之府。常所從止。然婦人經脈俞絡。合調則月水以時來至。故能生子而無病。婦人榮衛經絡斷絕不通。其人愁思。邪氣便得往來。入合於子藏。若生惡露未已。而合陰陽。即令婦人經脈攣急。令人少腹裏急支滿。胃脇腰背相引痛苦。四肢酸削。飲食不調。結牢惡血不除。月水不如時。或在前後。乍久不止。因生積聚。如懷胎狀。邪氣盛甚。令人恍惚多夢。寒熱。四肢不欲時動。陰中生氣。腫肉生風。甚者小便不利。苦痛如淋狀。面目黃黑。歲月成病。即不復生子。黃帝曰。吾深所憂也。療之柰何。可得愈病。令人有子。願拜受。非其不敢妄傳。何以神良耳。素女曰。今詳面圖。一曰黃癥。黃癥者。婦人月水始下。若新傷墜。血氣未止。卧寢未定。五藏六腑虛羸。精神不定。因向大風。便利陰陽。開閉關節。四

遠中於風濕。氣從下上。入於陰中。稽留不去。名為陰虛。則生黃癥。癥之聚。令人病苦。四肢寒熱。身重淋露。卧不欲食。左脇下有氣結牢。不可得而抑。苦腰背相引痛。月水不利。則令人不產。少腹急下引陰中如刀刺。不得小便。或時寒熱。下赤黃汁。病苦如此。令人無子。療當刺關元氣衝。行以毒藥。有法療癥。當下即愈矣。二曰青癥。青癥者。婦人新生未滿。十日起行。下以湯浣洗太蚤。陰陽虛。玉門四邊皆解散。子戶未安定。骨肉皆痛。手臂不舉。飲食未復。內藏吸吸。久當風卧。不自隱。為障。若居濕地及濕席。令人苦寒。洒洒入腹。心腹煩悶。沉淖惡血不除。結熱不得散。則生青癥之聚。在左右脇下。藏於背脊上。與肩甲腰下。攣急兩足。腹下有氣起。喜唾不可多食。四肢不欲動搖。恍惚善夢。手足腫。面目黃。大小便難。其候月水不通利。或不復禁。狀如崩中。此自過所致。令人少子。療之當刺胃管。行以毒藥。有法癥當下即愈矣。三曰燥癥。燥癥者。婦人月水下。惡血未盡。其人虛憊。而以夏月熱行疾步。若舉重移輕。汗出交流。氣力未平。而卒以恚怒。致腹中猥咽不泄。經脉攣急。內結不舒。煩滿少力。氣上達膈中。背脊少腹壅急。月水與氣俱不通利。而反以飲清快心。月水橫流。溢入他藏。不去。有熱則生燥癥之聚。大如半杯。上下腹中苦痛。在兩脇下。上引心而煩。害飲食。欲嘔吐。

胃及腹中不得太息。腰背重。喜卧盜汗。足酸削。又立而痛。小便失時。忽然自出。若夫精月水閉塞。大便澀難。有此病者。令人少子。療之以長鍼。按而刺之。法度行以毒藥。瘕當下即愈矣。四曰血瘕。血瘕者。婦人月水新下。未滿日數而中止。因飲食過度。五穀氣盛。溢入他藏。若大飢寒。吸吸不足。呼吸未調。而自勞動。血下走腸胃之間。流落不去。內有寒熱。與月水合會。則生血瘕之聚。令人腰痛。不可以俛仰。橫脅下有積氣。牢如石。少腹裏急苦痛。臂脅疼。腰股下痛。陰裏若生子。風冷。子門僻。月水不時。乍來乍去。有此病者。令人無子。療之當刺以長鍼。行以毒藥。瘕當下即愈矣。五曰脂瘕。脂瘕者。婦人月水新來。若生未滿三十日。其人未復。以合陰陽。絡脉分胞門傷。子戶失禁。關節散。五藏六腑。津液流行。陰道潤動。百脉關樞四解。外不見其形。子精與血氣相遇。犯禁子精化。不足成子。則生脂瘕之聚。令人支滿。裏急痛痺。引少腹重。腰背如刺。四肢不舉。飲食不甘。卧不安席。左右走腹中切痛。時差時甚。或時少氣頭眩。身體疼解。苦寒惡風。膀胱脹。月水乍來乍去。不如常度。大小便血不止。有此病者。令人無子。療之當刺以長鍼。行以毒藥。瘕當下即愈矣。六曰狐瘕。狐瘕者。婦人月水當日數來。而反悲哀自恐。若以遠行。逢暴風疾雨。雷雷驚恐。衣被濕沉。罷音倦少氣。

心中恍惚未定。四肢懈惰。振寒若寤寐。脉氣絕。精神游亡。邪氣入於陰裏。不去。則生狐瘕之聚。食人子藏。令人月水閉不通。少腹癢滯。胷脅腰背痛。陰中腫。小便難。胞門子戶不受男精。五藏氣盛。令人嗜食。欲嘔喜唾。多所思。如有身狀。四肢不舉。有此病者。終身無子。其瘕有手足。卒成形者。殺人。未者可療。以長鍼急刺之。行以毒藥。有法。瘕當下即愈矣。七曰蛇瘕。蛇瘕者。婦人月水已下。新止。適閉未復。胞門子戶勞動。陰陽未平。榮衛分行。若其中風暴病。羸劣。飲食未調。若起行當風。及度泥塗。因衝太早。若坐濕地。名曰陰陽亂。腹中虛。若遠行道路。伏飲汚井之水。不潔之食。通吞蛇鼠之精。流落不去。則生蛇瘕之聚。上食人之肝心。苦病長大。條條在臍下。上還絞。左右脅。不得吐氣。兩股脛間苦疼。少腹多熱。小便赤黃。膀胱引陰中。攣急。腰目俱痛。難以動作。喜發寒熱。月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘕手足成形者。殺人。未者可治之。療有法度。行以毒藥。瘕當下即愈矣。

八曰鼈瘕。鼈瘕者。婦人月水新至。其人劇作罷音疲勞。汗出衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。蹠立未安。顏色未平。復見所好。為開蕩。魂魄感動。五內脫消。若入水浣洗沐浴。不以時出。而神不守。水氣與邪氣俱入。至三焦之中。又暮出入。或玉門先閉。津液妄行。留絡不去。則

生。蠶。瘕。之。聚。大。如。小。杯。令。人。少。腹。內。切。痛。惡。氣。左。右。走。上。下。腹。中。苦。痛。若。存。若。亡。持。之。躍。手。下。引。陰。裏。腰。背。亦。痛。不。可。以。息。月。水。不。通。面。目。黃。黑。脫。聲。少。氣。有。此。病。者。令。人。絕。子。其。瘕。有。手。足。成。形。者。殺。人。未。者。可。治。之。療。有。法。度。以。長。鍼。按。療。之。行。以。毒。藥。瘕。當。下。即。愈。矣。與。巢。元。方。病。源。同。但。多。黃。帝。素。女。問。答。之。辭。及。各。瘕。後。刺。法。柳。森。可。用。方。又。有。食。瘕。者。由。臟。腑。虛。弱。月。候。未。止。時。食。生。冷。之。物。脾。胃。既。不。能。消。化。與。臟。氣。相。搏。結。聚。生。塊。日。漸。生。長。盤。牢。不。移。故。謂。食。瘕。嚴。用。和。濟。生。論。方。血。瘕。論。治。論。曰。腹。中。之。病。經。書。所。載。有。積。有。聚。有。癖。有。疝。有。瘕。有。瘕。蓋。積。者。五。藏。所。積。其。痛。不。離。其。部。聚。者。六。腑。所。聚。其。痛。無。有。常。處。癖。者。病。據。兩。脇。之。傍。疝。者。弦。急。而。多。痛。瘕。者。徵。也。有。塊。可。驗。瘕。者。假。也。假。物。成。形。其。結。聚。浮。假。推。移。乃。動。此。無。他。皆。由。飲。食。不。節。寒。溫。不。調。氣。血。勞。傷。臟。腑。虛。弱。受。於。風。冷。與。氣。血。相。結。而。成。也。惟。婦。人。血。瘕。為。病。異。於。丈。夫。其。所。以。異。者。非。獨。關。於。飲。食。不。節。而。已。多。因。產。後。勞。動。太。早。喜。怒。不。調。臟。虛。受。寒。或。月。水。往。來。取。涼。過。度。惡。血。不。散。遇。寒。搏。之。寒。搏。則。凝。皆。能。成。血。瘕。也。病。作。之。時。令。人。心。脇。攻。刺。少。腹。痛。重。或。腰。背。互。相。引。而。痛。久。而。不。消。令。人。黃。瘦。羸。弱。遂。致。絕。產。診。其。脉。弦。急。大。者。生。虛。小。弱。者。死。不。治。

方

孫思邈千金要方治婦人血瘕。心腹積聚。乳餘疾絕生。小腹堅滿。貫臍中。

熱。腰背痛。小便不利。大便難。不下食。有伏蟲。臙脹。癰疽腫。久寒留熱。胃管有邪氣。方千金翼方。作牡蒙丸。危亦林。名烏喙丸。

半夏 一兩 陸銖 石膏

藜蘆

牡蒙

茯苓 各十八株 桂心

乾薑 各一兩

烏喙 半兩

巴豆 六十枚。研如膏

右丸味為末。蜜丸如小豆。服二丸。日三。及治男子疝病。

治婦人血瘕痛方

乾薑

烏賊魚骨 各一兩

右二味治下節。酒服方寸匕。日三。

又方 末桂心。溫酒服方寸匕。日三。

王燾外臺祕要方皂莢散。導之療黃瘕方

皂莢 一兩。炙去皮子

蜀椒 一兩 汗

細辛 六分

右三味搗散。以三角囊大如指長二寸貯之。取內陰中。欲便悶則出之。已則復內之。惡血畢出。乃洗以溫湯。三日勿近男子。忌生菜等。

導藥療青瘕方太平聖惠方名戎鹽散

戎鹽一升

皂莢半兩去皮子炙

細辛一兩六銖

右三味搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但卧瘕當下青如葵汁養之如產法

療燥瘕方

大黃如雞子許 乾薑二兩

黃連三兩

雞臍胫中黃膜一

枚炙

桂心一尺

麝蟲三枚微炒厚朴十銖炙

郁李仁一兩去皮心熬

右八味搗散早朝空腹以温酒一盞和三錢匕頓服瘕當下下畢養之如產婦法三月無子者當有三日勿合陰陽

崔氏療婦人血瘕痛方

乾薑

烏賊魚骨各一兩炙

桃仁二兩去皮炙熬

右三味搗散酒服二方寸匕日二

又方

取古鐵秤槌或大斧頭或鐵杵以炭火燒令赤投好酒三升中稍稍飲之

導藥古今錄驗。療婦人血瘕。攻刺腹脅時痛方。

大黃

當歸 各半兩

山茱萸 一兩

皂莢 一兩 去皮子炙

細辛

戎鹽 各六銖

右六味搗。以香脂丸。如指大。每以綿裹內陰中。正坐良久。瘕當下。養如乳婦之法。

又療脂瘕方

皂莢 十八銖 去皮炙

礬石 六銖 燒

五味子

蜀椒 汗

細辛

乾薑 各半兩

右六味搗散。以香脂和。如大豆。著男子陰頭。以合陰陽。不三行。其瘕乃愈。

又療婦人絕不復生。及未曾生。皆以脂瘕腹中有塊。以湯前自下。尚不受子。導散方。

皂莢 炙去皮子

吳茱萸

當歸 各一兩

蜀椒 汗 各二兩

細辛 熬

礬石 燒

五味子 各三分

大黃

戎鹽 各二兩

乾薑 二兩

右十味搗散。以輕絹袋。如指大。長三寸。盛藥令滿。內陰中。坐卧隨意。

令勿行走。小便時去之。別換新者。  
療狐瘕方

取新死鼠一枚。裹以新絮。塗以黃土。穿地坎。足沒鼠形。置其中。桑薪  
灼其上。一日一夜出。分去絮。內桂心末六銖。酒服二方寸匕。病當下。  
甚者再服。差止。

療蛇瘕方

大黃

黃芩

芒消各半兩

甘草大如指一尺炙

烏賊魚骨二枚 皂莢六枚 去皮子尖

右六味。搗以水六升。煮之三沸。下絞去滓。下硝。適寒溫服之。十日一  
劑。空腹服之。當下。

療鼈瘕方

大黃六分

乾薑

側子各半兩

附子

人參各九銖

麈蟲一寸匕

桂心一兩六銖

細辛

土鱖各十八銖

白朮一兩

右十味。搗散。以酒服方寸匕。日三

許叔微普濟本事方治婦人血瘕。血積。經候不通。桃仁煎

桃仁 去皮尖麩炒黃

川朴消 各一兩 蟲蟲半兩炒黑

大黃 一兩

右四味末之。以醇醋二升半。銀石器中慢火煎取一升五合。下大黃桃仁蟲蟲等。不住手攪。欲好丸。下朴消更不住手攪。良久出之。丸如梧桐子大。前一日不用喫晚食。五更初用溫酒吞下五丸。日午取下如赤豆汁。雞肝蝦蟆衣。未下再作。血鮮紅即止。續以調氣血藥補之。

此出千金方。頃年在毗陵有一貴人妻。患小便不通。臍腹脹不可忍。眾醫皆作淋治。如八正散之類。數種治皆不退。痛愈甚。予診之曰。此血癥也。非瞑眩藥不可去。予用此藥。更初服。至日午。痛大作不可忍。遂卧少頃。下血塊如拳者數枚。小便如黑汁者一二升。痛止得愈。此

藥治病的切。然猛烈太峻。氣虛血弱者。更斟酌與之。

**陳無擇三因方烏金散**。治婦人血氣血癥血風。勞心煩燥。筋骨疼痛。四肢困瘦。

好黑豆 十兩 沒藥

當歸 各半兩 洗焙乾為末

右先將黑豆不犯水淨拭。用砂瓶一隻。入豆在內。以瓦片蓋。鹽泥固濟。留甬通氣。炭火二斤煨煙盡存性。以鹽泥塞瓶甬。退火。次日取出。

豆如鷄翼研細。方入後末研勻。不拘時候溫酒調下二錢。重者不過三五服。忌鯉魚毒肉水母之類。

**嚴用和濟生論方**三稜煎丸。治婦人室女血癥。月經不通。臍下堅結。大如杯升。而不治。必成血蠱。

京三稜

蓬朮各二兩

芫花半兩

青皮去瓢淨一兩半

右剉如豆大。用好醋一升煮乾。焙為細末。醋糊為丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前用淡醋湯吞下。

**琥珀丸**。治婦人血癥。腹中有塊。攻刺小腹。痛重。或腰背相引而痛。久而不治。黃瘦羸之。

琥珀別研

白芍藥

川烏炮去皮

川牛膝去蘆酒浸

鼈甲醋炙

蓬朮茂炮

當歸去蘆酒浸  
厚朴薑製炒各一兩

木香不見火

澤蘭葉

官桂不見火各半兩

麝香別研半錢

右為細末。酒糊為丸。如梧桐子大。每服七十丸。空心溫酒。米飲任下。

**通經丸**。治室女月經不通。臍下堅結。大如杯升。發熱往來。此名血癥。

當歸去蘆酒浸一錢半

蓬朮炮

桂心不見火

青皮去白 大黃炮

乾薑炮

桃仁去皮尖炒

乾漆炒令煙盡 紅花

川椒去目及閉口者微炒放地上

密蓋出汗各一錢

右十味為末。將一半用醋煮熬成膏子。後入一半。入雞子清同搗勻。

丸如梧桐子大。每服二十九。空心用淡醋湯下。

六合湯。治婦室經事不行。腹中結塊疼痛。腰痛腿痛。

當歸去蘆酒浸 白芍藥 官桂去皮 熟地黃洗

川芎 蓬朮炮各等分

右呶咀。每服四錢。水一盞。煎至七分。去滓。溫空心服。

羅謙甫衛生寶鑑見現丹

附子四錢炮去皮臍 鬼箭羽 紫石英各三錢

澤瀉 肉桂 玄胡索 木香各二錢

血竭研一錢半 水蛭一錢炒盡煙 檳榔二錢半

桃仁麩炒黃三十粒 京三稜剉五錢 大黃剉二錢用酒

同三稜浸一宿焙

右各研末和勻。用原浸酒打糊丸。梧子大。每三十九。鹽湯或酒送下。

空心食前

和血通經湯。治因受寒。月事不來。惡血積結如石

當歸

京三稜 各五錢 廣木 炮四錢

熟地黄

木香

肉桂 各三錢

紅花

貫衆

蘇木 各二錢

血竭 研一錢

右極細末令勻。每三錢。熱酒一盞調下。食前鹽湯亦得。忌一切生冷

物。及當風大小便。

和血通經丸。治經水凝澀不行。臍腹腰背痛。漸成血瘕

木香

當歸

乾漆 炒煙盡

五靈脂

官桂

廣木

大黃 各半兩

芍藥 一兩

水蛭 二錢半 炒 蟲 三十箇。去足翅頭炒

桃仁 二十七箇。去

皮尖

右細末醋糊丸。梧桐子大。每二十九。溫醋湯。或溫酒下。日進一服。食前  
素當時大方大黃散。治血瘕。諸傷衄內損

羊脛 炭燒赤。酒淬十度五兩 巴豆肉漿水煮黃色

大黃 小便浸七日。日一易。日足。濕紙包煨。切三兩半

半兩錢煨醋淬為末。二兩二錢半

右為細末。每服半錢。當歸二錢半。小便濃煎。稍溫調服。

婦人腹中瘀血

論

巢元方病源此或月經否澀不通。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。為風冷所乘。血得冷則結成瘀也。血瘀在內。則時時體熱面黃。瘀久不消。則變成積聚癥瘕也。聖濟總錄論曰。瘀血者。由經水蓄聚。或產後惡露不盡。皆本衝任氣虛。風冷所乘。氣不能宣。故血瘀也。瘀血不去。結痼成積。則令人面黃肌瘦。煩渴憎寒。腰腹重痛。久變癥瘕。

脉

史載之方。婦人肝脉洪大。而反結澀。訣云。澀脉主婦人敗血。若脉洪大。而又伏。則積塊而血不行。久則陰門腫。以厥陰脉絡門而過。

詹炎舉太素脉訣。婦人敗血者。蓋肝當洪大。而反結澀。澀主敗血。洪大而反伏。則積塊而血不行。久則陰門腫。蓋以厥陰之脉。絡陰門而過也。

方

王燾外臺祕要方。療一切宿血。及損傷瘀血在腹內。不問新久。并婦人月

經不通。產後惡血不下。皆良方。

大黃

芒消各三兩

桃仁四十枚去皮尖

右三味。芒消桃仁合搗。四五百杵。以酢漿二升半。漬一宿。空腹攪調。頓服之。不能頓服者。分作兩服。良久。先下糞。次下如豆泥汁。或黑血。為驗。強人日別服一劑。弱人兩日服之。下血盡便止。不過三兩劑。忌生冷茶葵。

**太平聖惠方** 蟲蟲散。治婦人臟腑宿冷。經脈不利。腹中有瘀血。攻刺疼痛。

蟲蟲半兩。炙令微黃。去翅足。水蛭半兩。炒微黃。

桃仁三分。湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃。烏賊魚骨半兩。

牛膝半兩。去苗。鯉魚鱗燒灰。枳殼半兩。麩炒微黃。去瓢。

芫花半兩。醋拌炒令乾。當歸半兩。剉微炒。

赤芍藥半兩。硃砂半兩。桂心半兩。

右件藥搗細羅為散。每服食前。以煖酒調下一錢。烏金散。治婦人臟腑風冷。宿有瘀血不消。令人黃瘦羸困。

鯉魚鱗三兩。亂髮二兩。槐蛾三分。桑蛾三分。

水蛭一分。水蛭一分。川大黃一兩。剉碎。

蟲蟲一分

硃砂半兩

芫花半兩

牛膝半兩去苗

右件藥並入甕餅子內。用瓦子蓋。以鹽泥固濟候乾。以大火煨令通赤。慢慢去火。候冷取出。入麝香二錢。同研令細。每服空心。以熱酒調下二錢。

治婦人臟腑瘀血氣脹。頭疼咽乾。胃中妨悶。食即嘔逆。臍下滿疼。四肢無力。痿黃瘦弱。宜服此方。

亂髮灰一兩

釜下墨一兩

桂心一兩

神麩一兩微炒

麝香一分細研入

右件藥搗細羅為散。每服空腹。以熱酒調下一錢。

芫花散。治婦人腹中宿有瘀血。結聚不散疼痛。

芫花一兩醋拌炒令乾

川烏頭一分炮裂去皮臍

鬼箭羽一分

蟲蟲一分炒令微黃去翅足

水蛭一分炒令微黃

桃仁一分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右件藥搗細羅為散。每服食前。用熱酒調下半錢。

地龍散。治婦人氣血不調。腹中積聚。瘀血疼痛。

地龍一兩微炒

蟬蜥一兩微炙

芎藭一兩

桂心一兩

乾薑半兩炮裂剉

蒲黃三分

赤芍藥三分

蘇枋木一兩剉  
牡丹三分

木香三分  
水蛭三分微炒

桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃

右件藥搗細羅為散。每服二錢。食前以溫酒調下

騏驎竭丸。治婦人經絡否澀。腹內有瘀血疼痛不忍

騏驎竭半兩

沒藥半兩

硃砂一兩。用狗膽內浸一七日

乾漆一兩。搗碎炒令煙出

紅藍花一兩

芫花一兩醋拌炒

今乾

玄胡索半兩

白附子半兩

川烏頭半兩。炮裂

去皮臍

當歸一兩。剉微炒

砒霜半兩

伏龍肝

蝨蟲一兩。微炒去翅

水蛭一兩微炒

巴豆一分。去皮心研。紙裹壓去油

右件藥搗羅為末。用生鐵銚子內。入頭醋一升。先下硃砂攪勻。然後

下藥末一半。用慢火熬如膏。後入餘藥末和丸如小豆大。每服不計

時候。以熱酒下五丸

當歸丸。治婦人經絡澀滯。致有瘀血在藏。結聚欲成癥塊

當歸一兩半。剉微炒

鼈甲半兩。塗醋炙令黃。去裙襖

琥珀半兩

桃仁一兩。去皮尖雙仁。麩炒微黃

菴藺子半兩

川大黃半兩。剉碎微炒

牡丹半兩

牛膝半兩。去苗赤芍藥半兩

芍藥半兩

桂心半兩

水蛭三分。炒令黃

蟲蟲三分。炒微黃。去翅足

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心用熱酒下二十九

硃砂丸。治婦人積瘀血在臍。攻心腹時痛。四肢黃瘦。夜卧心煩

硃砂半兩

硫黃半兩。與硃砂同結為砂子細研

沒藥半兩

芫花半兩。醋拌炒令乾

水蛭半兩。炒令黃

牡丹半兩

當歸半兩。剉碎微炒

蟲蟲半兩。炒令黃

去翅足

川大黃半兩。剉碎微炒

右件藥搗羅為末。入砂子研令勻。煉蜜和搗三二百杵。丸如菉豆大。每服空心。以熱酒下五丸

勝金丸。治婦人久積瘀血在腹內。疼痛不可忍

水銀二兩

硫黃一兩。已上二味。同結作沙子細研

玄胡索半兩

椶櫚皮一兩。燒灰

乾漆一兩。搗碎炒

令煙出

桂心半兩

鯉魚鱗一兩燒灰

自然銅一兩細研

騏驎竭一兩

狗膽一枚乾者當歸一兩剉微炒

蝨蟲一分微炒令黃去翅足

水蛭一分炒令微黃

烏地

一兩酒浸去皮骨炙微黃沒藥半兩

亂髮一兩燒灰

右件藥擣羅為末都研令勻以酒煮麩糊和丸如梧桐子大不計時候以熱酒下十丸

桃仁丸治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來心腹滿急

桃仁三兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

蝨蟲四十枚炒微

黃去翅足

水蛭四十枚炒令微黃色擣

川大黃三兩剉碎微炒

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣百餘杵丸如梧桐子大每服以空心熱酒下十五丸

產寶諸方歸魂散治婦人血氣垂死者并敗血不盡

石菖蒲一兩米泔浸洗切焙

當歸一兩酒浸一宿火炙

右為末每二錢熱酒下

聖濟總錄桃仁湯治婦人經水否澀因冷血瘀不通結積臍腹發為氣痛

面黃體瘦

桃仁去皮尖雙仁炒

大黃生用各一兩

當歸切焙各三分

桂心去麋皮 甘草炙半兩

蟲蟲去頭翅足炒

水蛭炒焦各十枚

右七味麋擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓下芒消半錢匕攪勻放溫空心日晚再服

芎藭湯治婦人經水不利血瘀不消

芎藭

大黃生用各一兩

荷葉蒂燒灰三七枚

桂去麋皮

菴藷子各一兩

右五味麋擣篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞入朴消一錢匕去

滓空心溫服

順經散方治婦人經水或通或止或產後寒凝血積成瘀

吳茱萸三兩湯洗七枚炒

麥門冬五兩半去心

芎藭二兩

半夏二兩半湯洗七次

當歸二兩去蘆頭

芍藥二兩

人參二兩去蘆頭

牡丹皮二兩

桂二兩去麋皮

阿膠二兩碎炒令黃燥

甘草二兩剉炒

右一十一味。擣羅為麋散。每服三錢匕。水一盞半。入生薑五片。煎至一盞。去滓熱服。空心食前。

琥珀散方。治婦人經絡否澀。腹內有瘀血。疼痛不可忍。

琥珀半兩細研。沒藥半兩細研。生地黄汁半升。

右三味。除地黄汁外。二味和勻。每服二錢匕。水酒各半盞。煎至七分。地黄汁二合。再煎數沸。去滓溫服。不拘時。

大黃湯方。治婦人血瘀不消。及撲損血瘀。

大黃生用。桃仁湯浸。去皮尖。雙仁。各一兩。生乾地黄焙一兩。

桂去麋皮。郁李仁去皮。研半兩。

右五味。鹿擣篩。每服三錢匕。水酒各半盞。同煎至七分。去滓溫服。

敗蒲湯方。治婦人因澀。內瘀不散。疼痛。

敗蒲燒灰。當歸各二兩。牡丹皮。芎藭。

豉心一合。赤芍藥各一兩。桃仁湯浸。去皮尖。雙仁。半兩。

陳橘皮去白。焙一兩。蒲黃紙上炒。半兩。

右九味。鹿擣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓。入地黄汁一合。朴消一錢匕。溫服。日二。

陳曄家藏經驗方地榆散治敗血

何首烏

肉桂

地榆

香白芷

右各等分為麩末。每服二錢。米泔一盞半。沙糖一小塊。煎至八分。去滓服。空心食前。余內子在吳興。忽苦此。用王克明翰林調治。三服而

止。即厚酬之。

陳自明大全良方桃仁散

蟲蟲

水蛭

烏賊骨

鯉魚鱗燒灰

芫花醋炒

枳殼

當歸炒

牛膝

赤芍藥

硃砂

桂心各半兩

桃仁三分

右為細末。食前溫酒調下一錢。

楊仁齋直指方調榮湯治瘀血不消。臍腹引腰背俱痛。

川芎

當歸

芍藥

生乾地黄

三稜

莪朮

白芷

玄胡索

蒲黃

香附子

澤蘭

細辛

川白薑

厚朴製

桃仁浸去皮焙各二分

辣桂

半夏製

甘草炙各三分

右判散。每服三錢。薑棗煎。食前服。  
加減四物湯。治血氣不足。肢體乏力。或瘀血腹痛。或下血過多。

當歸

川芎

白芍藥

乾薑炒各半兩

南木香

甘草炒各二錢半

右判散。每服三錢。食前煎服。若腹不痛。則無瘀血。更加人參。又能益血。

燒鹽酒。治血閉腹痛。產後瘀血腹痛。

新布數重包裹。白鹽一合。炭火燒存性。

右研細。溫酒調下。新布即青麻也。能逐瘀血。

桂枝酒。治打撲傷墜。瘀血滯悶。身體疼痛。

辣桂

右為末。每二錢。溫酒調下。或用辣桂一分。大黃當歸各半分。每三錢。生薑紫蘇煎服。取下黑物即安。或未有藥。倉卒且服米醋一小盞。亦散瘀血。

仙傳濟陰方。陰紅湯。專治婦人傷損瘀血不散。腹肚膨脹。大小便不通。上

攻心腹悶亂至死者。急將此藥通下瘀血。却依前次第服藥。

鹿角膠

產婦油髮各一錢燒灰沒藥三錢

右用酒一大盞調服

永樂大典卷之一萬四千九百四十九

大英大史卷之四十四



