


醫便二集

五六尾



內閣文庫		
番號	漢	12358
冊數	7	(7)
函號	301	76



醫便二集卷五

禁方

遇仙膏

治無

名腫毒癰疽發背痞塊瘡瘍等症

三百

當歸

白

各四

兩頭尖

即白

四兩

穿山甲

二十

巴豆

研

早麻子

一百二

土木別

二十

麻油

斤

黃丹

兩水

乳香

沒藥

輕粉

血竭

射香





各四

海陽

張受孔心如父

姚學顏伯愚父

重訂



右兩頭尖等俱剉入香油一斤內浸春五夏三秋
七冬十日入鍋內熬白芷焦色將鍋取下溫冷用
生絹濾去渣再文武火熬下黃丹用桃柳枝不住
手攪滴水不散不老不嫩入松香五兩攪勻取鍋
下冷乃下經粉射香血竭乳香沒藥攪勻用水一
桶將藥煎水一一次夜七週時去火
力用時以涼水作開攤如人烘手熨膏藥上一
百餘手出汗妙 若病不二便秘貼臍中咳喘
貼肺俞穴

返毒膏 呼臙長肉三百十四

單麻子肉一兩 銅青一兩 同 大薊汁一碗

松香一斤水煮 豆油表春夏三兩 秋冬四兩

先將油煎滾下松香溶盡下大薊汁沸水盡下木
缸內如絞糖法入單麻銅青絞勻以器盛之如用
夾湯煮化攤貼

火線膏 治諸般腫毒初起二四日內一點即退三百十五

當歸 赤芍藥 三稜 蓬朮各一兩俱燒灰存性

巴豆才二粒以針刺透 單麻子肉十五粒

上燒烟盡為度

乳香三錢 沒藥二錢 射香三分 蟬酥五分

血竭二錢

右為末先將黃蠟三兩溶化入歸芍稜朮巴甲用柳枝攪勻取出離火下乳沒射酥蠟攪勻擦作長條如筋大長三寸重一錢臨用燈火上燒點焯毒土周圍四五十點再用煎藥消之

冰梅丸 治喉痺三百十六

南星一十二箇切片 半夏二十四箇切片 明礬 防風

皂角各二兩 桔梗一兩 食鹽 朴硝各一兩

揀半熟梅子大者五十箇先將硝鹽水浸一週時然後將各藥研勻拌和梅子置水中其水過梅子三指為度浸七日取出曬乾又浸又曬汁盡為度將梅子入瓶密封若用時以綿裹梅喻在口令津液嚥下痰出即愈

鼠黏子散 治風熱上壅咽喉腫痛三百十七

牛旁子 玄參 升麻 桔梗 犀角磨水

天花粉 黃岑 木通 甘草

水煎服

如服涼藥不効乃中氣不足虛火汎上無制用附

子理中湯

治牙疼神効方 三百

米片 一分

右為末密入... 點入疼處

治小兒胎毒 二百

小青葍 水萍 犀角 雄黃 菜豆

生地黃 當歸尾 金銀花 地龍 牛旁子

水煎服

水銀膏 治肥疥瘡 三百

水銀 雄黃 枯礬 川椒 各三錢 輕粉 二錢

苦參 二錢 蘆甘石 二錢 蛇床子 二錢

大風子肉 五十筒

右為末以燭油調先以金銀花苦參防風荆芥當歸尾煎湯浴洗次以藥擦之

薰筒 治風濕疥癬 三百二

蒼朮 五錢 荆芥 防風 各一兩 雄黃 五錢

川椒 三錢 章腦 一錢 蛇床子 五錢 土木別肉 五錢

右爲末以艾先鋪粗紙上以藥末四錢勻摻捲作筒先以煎湯浴之次燃火燻之取燒過藥存性擦之立効

又疥瘡藥 三百二

信 五錢 硫黃 四兩 朴硝 二兩 小麥 一升

同炒焦色爲末擦之

四黃散 治頭上瘡 三百二

黃連 黃蘗 黃岑 大黃 消石 各五錢

五倍子 二錢五分

右爲末以清油調搽患處

專治肥疥瘡 三百二

威靈仙 石菖蒲 苦參 胡麻 各四兩
何首烏 四兩 甘草 二兩

右判用好酒十觔浸藥春夏二日秋冬四日夾瓶煮一時候冷漸服

擦牙散 三百二

羌活 二錢五分 升麻 一兩 羊脛骨 炙 旱蓮草 各五錢
防風 三錢 細辛 二錢 青鹽 五錢 龍胆草 四錢

當歸 一兩

右為末每日清晨擦牙

又方 三百二十六

青鹽 四兩旱蓮草汁一

槐角子 五錢

川椒 去核五錢用好醋

碎骨補 五錢

白芷 五錢 細辛 三錢

萹撥 五錢

右為末石膏六兩半生半熟為末拌勻瓦器下積

柴灰以粗紙蓋之置藥在上任用擦牙嚥下亦可

烏鬚方 三百二十七

烏合霜 用沒石子三對麩裏煨熟訶子肉二錢炒白炭三錢炒共為末再加炒麩六錢

和勻聽用

老鉛 黑鉛三錢水銀三錢大黃末三錢合成研

礬 明礬一兩膽礬二錢研勻聽用

青鹽 洗去土煎炒聽用

銅末 用舊紅銅器火煨醋淬落末研細聽用

五倍子 敲碎淨如米大用沙器炒黑不老不嫩用濕青布包踏一時為末聽用

每用五倍子一錢烏合霜二分老鉛五厘礬三分

銅末三分青鹽一分五厘

共和勺用好牙茶煎極濃去茶葉下前藥煎膩先用肥皂湯洗鬚淨以藥染之可黑二十五日再染

又方 三百二十八

銅末 用紅銅火燒紅入冷水內淬再燒再淬四五次取末用醋炒淬三次為末八分

五倍子 如前製 二錢 食盐 三分 明礬末 六分

白麵 二分

共和勺用濃茶調藥於盞內以銅杓注水夾盞煮如糖香成鏡面方取出如前法染之

治口舌生瘡 三百二十九

黃連 錢 黃栢 名三 錢 人中白 錢

青黛 錢一 枯礬 分五

右為末先以濕布攪去瘡上白屑以藥敷之

蠟丸方 治痢疾腹痛婦人經行腹痛難產并產後

瘀血作痛 三百三十

大黃 九蒸九晒 晒八兩 當歸 紅花 川芎 青皮

桃仁 玄胡索 蘿蔔子 大小茴香

雄黃 草豆仁 檳榔 蓬朮 陳皮 枳實

砂仁 香附 白朮 草果 白芷 急性子

水紅花子各五錢 乳香 沒藥各三錢 木香二錢

沉香二錢 射香二分 京墨三錢燒存性

右瀉末蜜丸如彈子大以黃蠟封固每用一九好

酒化下

阿魏丸 治男婦氣痞食痞形如覆杯面色痿黃三五

人參 厚朴 當歸姜汁炒 黃連吳茱萸煎汁炒各五錢

沉香三錢 阿魏二錢 柴胡一兩 青皮三錢醋炒

蘇子五錢 萊服子五錢 白芥子七錢 三稜

蓬朮各三錢醋煮 昆布水洗去沙焙五錢 薑黃三錢

白豆仁三錢 川烏三錢 川椒二錢 半夏五錢

水紅花子五錢 巴霜三分 桃仁去皮尖三錢

右為末大麥牙粉黃米粉共糊為丸如棗豆大每用五十九丸空心淡薑湯送下漸消

透骨散 治婦人血痞三百三十二

鳳仙花曬乾一錢 檳榔二箇 五靈脂 乳香

沒藥 血竭 肉桂 玄胡索各三錢 蜈蚣一條

穿山甲二十四片煨 阿魏三錢 沉香二錢 礶砂五分

當歸 白豆仁 木香 琥珀各二錢

右爲末每用一分用猪肉毬內蒸熟空心好酒送下先服煎藥四帖次用此藥

煎藥方 三百三十三

三稜 蓬朮 紅花 枳實 陳皮 桃仁
生地 丹蔘 當歸 赤芍藥 玄胡索

酒煎服

千金散 專點內外痔瘡枯藥 三百三十四

白礬 三兩 赤色信 一兩

研細

先將信置鍋底攤如餅大次用礬末蓋之火煨乾

取出再以猛火中煨紅取出加辰砂一錢乳香沒藥各一錢

右共爲末如用以唾津調稀塗痔上以紙封之日上二次至五日止藥十日自潰脫以生肌散敷之又藥條卽此藥麪糊爲之插入管內更用手法

花蛛散 點內外痔 三百三十五

用花蜘蛛不拘多少煨存性爲末加水片輕粉熊胆枯礬

右爲末猪胆調塗痔上漸消先宜薰洗

痔漏藥線三百三十六

用絲綿各半為線取秋露水芫花自然銅共煮

乾為度

洗藥三百三十七

苦參 當歸 荊芥 瓦花 鳳尾草

食鹽 地骨皮

煎湯燻洗次以花蛛散敷之

內痔脫落腸頭不收三百三十八

密陀僧 枯礬 海螵蛸 黃蘗末

百藥煎 冰片少許 輕粉各等分

右為末香油調塗以綿紙封之日換二次漸收

紙丁眼藥 治風沿爛眼目赤三百三十九

用煨蘆甘石一兩 礪砂三錢 黃連二錢五分

射香二分

右為末以方圓紙裁成一寸濶二寸半長將藥抄分半許放紙中間撚緊打一結以水三四匙放盞內浸半刻水轉黃色就將此藥包撐開眼皮拖在珠上再停片時再拖一日四五次其病即愈

煨蘆甘石法 蘆甘石半斤盛在果罩內外以紙筋泥打一團毬晒乾再將鉄絲十字花結在外以炭火藏毬在內煨至通紅以童便浸之取出再煨如此七次爲止

赤眼洗藥 三百四十

當歸尾 黃連 防風 皮硝 銅青 明礬

水浸頻洗

吹鼻藥 治赤眼 三百四十一

鷺不食草 二錢 白芷 四分 川芎 六分 細辛 三分

藁本 三分 羌活 一分八 當歸 六分 麻黃 六分

右爲末左眼赤吹右鼻反此

眼胞赤腫

萊菔子 苧根 大黃

右青鹽搗爛圍目胞上

治鼻痔 三百四十二

葷撥 五分 雄黃 一錢 白芷 一錢 白梅

艾 各一錢 冰片 二分

右爲末將白梅肉丸如蚕豆大以綿臙脂裹塞鼻

肉其痔自消又將一丸噙化

風濕氣膏 兼治跌打損傷三百四十三

川烏一兩 草烏一兩 當歸二兩 紅花 官桂

白芷 赤芍藥 桃仁 防風 補骨脂

穿山甲 羌活各一兩

右到用麻油二觔入前藥煎枯以布絞去渣取油
另煎滴水成珠為度聽用

又用松香十觔煎銷以夏布濾下流於水內又沸
去水取出松香又將葱薑汁各一碗燒酒一觔入

松香內和勻畧煎過方入前油慢火熬成膏住火
加乳香沒藥各一兩阿魏一兩射香一錢和勻攤
用

風濕氣痛煮酒方三百四十四

眼菱頭根 罌子根 烏梢蛇草根 風藤

開陽花根 野薔薇根 五加皮各一把

每用好白酒一斗米入藥在內以箬包瓶口煮熟
空心熱服

鷺掌風三百四十五

用銅青一兩研細以好醋調染匾栢葉陰乾先用皮硝湯洗手自乾又以桐油抹手用炭火漸將栢葉置火上薰手黃色為度即愈

楊梅瘡 初起用此藥表利永無結毒之患 三百四十六

大黃 川芎 威靈仙 麻黃 蟬蛻 各一兩

用羊湯五碗煎至二碗查再煎一碗作三次服羊肉過口愚謂治毒瘡與治痘同法初起宜發散之劑毒盡透出辨虛實補瀉而兼解毒之劑若失於解散而後為結毒腫潰者有矣如過於解散而正

氣虧耗漸為勞怯者有矣又不可執寒涼一定之方而繆於施治哉

楊梅結毒方 三百四十七

白砒	錢五	雄黃	分五	硃砂	錢五	水銀	錢五
輕粉	錢二	礞砂	錢三	大黃	錢五	大管仲	錢七
火硝	一兩五錢						

右為末入洋成罐以鉄油蓋蓋口塩泥封固文武火煨三炷香為度取出用上升藥每服三厘土茯苓煎湯送下一月全愈

又方三百四十八

白朮

四兩碎如豆大以菜豆一升煮一週時去豆再換煮

木香

一兩

雄黃

五錢

硃砂

五錢

右為末粘米糊丸如麻子大每服三四丸土茯苓

湯送下服至三錢全愈

楊梅點藥

三百四十九

輕粉

硃砂

各一錢

水片

一分

杏仁

四十粒

右為末鷺胆調搽

白粉霜

專點梅瘡

三百五十五

水銀

一兩

食鹽

明礬

火硝

朱礬

各二兩五錢

硃砂

雄黃

各三錢

內除水銀先將餘藥和勻漸入洋成罐內洋盡方

下水銀慢火令乾有霜頭起為度以空罐對合搵

泥封固壑一地窟以水盆一箇置窟內以空罐放

水盆內以泥壅之只留上瓶武火煨三炷香為度

取出上白藥每用一厘冷水調點上三四日即愈

便毒方

三百五十一

五靈脂

炒四錢

僵蚕

炒四錢

穿山甲

土炒四錢

大黃

五錢

右為末每服三錢好酒送下即消

又方三百五十二

白芷 穿山甲炒 牙皂 甘草節

僵蚕各二錢 大黃四錢炒

右為末用當歸四錢水酒各一碗煎半碗空心調

前藥末三錢服

下疳瘡三百五十三

水片五厘 草果灰三錢 輕粉三分

右為末先以茶洗淨敷之

又方 治小便腫脹三百五十四

水片一分五厘 大黃二錢 黃蘗二錢 輕粉一錢

血蝟三分

右為末以田螺肉搗爛塗患處

治下疳三百五十五

真珠三分 雄黃五分 孩兒茶五分 青黛三分

冰片五厘 紅毯子灰一錢

右為末熬猪油如膏將護領絹攤貼

治蛙疔三百五十六

真珠 錢二

雄黃 錢一

硃砂 錢一

冰片 一分

僵蚕 錢一

牙皂 錢二

各為末和勻每用七厘土茯苓湯調下或以飯為丸前湯送下一分吃乾物壓之

治懸癰

并治癰疽

三百五十七

大粉甘草

十兩

每根劈作二片用河水二碗輪流蘸炙以水盡為度切片用水十碗煎一碗空心服盡即愈

治乳癰

三百五十八

瓜蒌 一箇

乳香

沒藥

貝母

各一錢

穿山甲

三片

川木鱉

一箇

右入瓜蒌內以重紙封之微火煨存性為末每用

二錢好酒調下

治乳癰

三百五十九

白芷

鼠糞

各一錢

右為末好酒調服必多飲一醉睡一覺愈

立馬回疔散

治無名腫毒疔癰

三百六十六

蜈蚣

二錢五分

雄黃

三錢

射香

蟾蜍

人言

硃砂各五分 牙皂四錢

右將人言硃砂同炒共為末每用一分以煨熟葱白搗汁包藥好酒送下盡醉汗出自愈

敗毒散三百六十一

大黃三錢炒 白芷三錢炒 全蝎二錢灸

蜈蚣四條灸 穿山甲三錢炒

右為末每用三錢好酒調下利下為度

驚掌瘋三百六十二

上茯苓八兩打碎水八碗煎至五碗去渣聽用

塩三錢 川椒一把 猪胰子二兩切片 白粳米三把

右入砂礮內同前汁煮粥空心乘熱食盡吃三料愈外用童便洗手以黃紙板和常山燒烟燻手熱為度

痰核方 治小兒項間生塊三百六十三

連翹 天花粉 貝母 何首烏各二兩

山梔一兩 山豆根一兩 紫貝天葵二兩 玄參一兩

右為末用夏枯草煎膏丸如彈子大每用一九薄荷湯化下

噙化丸 治大人小兒痰嗽久不止三百六十四

括蕞根 欵冬花 天門冬 麥門冬

甘草 紫苑各一兩 桑皮 百部各二兩

枇杷葉去七蜜炙二兩 桔梗七錢 五味五錢打碎蜜蒸

薄荷葉三兩五錢

右為末蜜丸如彈子大不拘時噙化或燈心湯化

下

治多年冷哮三百六十五

用雌猪剗出花腸以燒紅磚二塊上下壓定待脆

取出研細燒酒調服 又用匾栢青子研爛沙糖

調漸服

治痘作痒煩躁泄瀉三百六十六

蓮肉一兩為末 加真鴉片三分

右和勻每用三分米湯調下或保元湯調下

疳積散 治小兒飲食不節傷脾面黃腹大溺如米

泔雙目羞明丁奚嘔露等症三百六十七

厚朴姜汁製炒一兩 陳皮一兩 甘草七錢 蘆薈七錢

蕪荑五錢 百草霜 青黛各三錢 旋復花一錢五分

右各取淨末和勻每一歲小兒用藥一分空心清米湯調下

生神丸 小兒生精神健脾胃 三百六十八

人參 二兩 白朮 三兩 五味 二兩碎 蜜蒸 麥門冬 二兩

砂仁 一兩 山查肉 二兩 芍藥 三兩 陳皮 一兩 五錢

黃連 五錢 姜炒汁 肉果 一兩 甘草 五錢

右為末蜜丸如彈子大米湯化下

治牙疼 三百六十九

章冰 川椒 薄荷

各等分研末綿裹入患處立止又只用章冰綿裹入患處愈後用濃茶半碗服之

擦牙方 三百七十七

旱蓮草一担洗淨搗汁三十碗加青鹽六兩

食鹽 一碗 當歸 六兩 細辛 六兩

煎乾研為末清晨擦牙

調中丸 治積聚胸腹飽脹等症 三百七十一

卷舒 即酒藥 蚌屑 白朮 陳皮 半夏 各二兩

黃連 木香 厚朴 甘草 象礬 晒乾

砂仁 枳實 各一兩 山查肉 二兩

右為末米糊丸如梧子大每用一錢五分空心砂仁湯下

治痰火 三百七

梨 一斤 搗爛 錫糖 一斤 嫩苧根 一斤半 搗爛 好酒 三斤

共煎數沸去杏隨時服之

治無名腫毒發背楊梅瘡 三百七

夜明砂 一斤 炒 蟬蛻 二兩 焙 百草霜 一兩

哺過鷄子壳連衣 兩 煨

右為末用饅頭去鉛研勻為丸如乾加米飲研之

丸如桐子大每用三錢空心好酒送下一日可服
二三次毒初發即消成膿即潰

治痰嗽久不愈 三百七

鵞管石 煨 寒水石 煨 井泉石 煨 肉桂

青蒙石 煨 雄黃 欬冬花 甘草 各一錢

右為末每夜用藥三分將蘆管吹入喉中白湯過下服四夜全愈

治頭風右邊痛屬痰與熱 三百七

天麻 玄參 各六分 川芎 辛夷 各三分

蔓荆子 九分 金銀花 三錢 薄荷 芥茶 一錢五分 黑豆 廿粒

土茯苓 六兩 燈心 廿莖

火盛加石膏 二錢 片苓 六分 艷山紅根 二兩 大紅者佳

用陰陽水各一碗半作三次食遠溫服

治頭風左邊痛屬風少血 三百七十六

防風 薄荷 川芎 芍藥 藁本

蔓荆子 金銀花 天麻 辛夷 各錢

當歸 三錢 酒蒸 生地黄 一錢 土茯苓 四兩

艷山紅根皮 二兩

如前法服頭風而兼害眼者宜壯水之主益陰地

黃丸

治心氣痛 三百七十七

黑丑 二斤八兩 半生半熟 檳榔 一斤 大黃 五兩 生

雷丸 四兩 炒 乾漆 四兩 炒烟 盡為度 木香 一兩 不見火

右為末每服六錢空心薑糖湯調下取利下四五次以溫粥止之忌暈腥油麵煎炒三四日

又方 三百七十八

沉香 白豆仁各一錢 乳香 沒藥

五靈脂各一分 雄黃五分 玄胡索

草果各二錢

右為末醋糊丸如菉豆大每用二十九白湯送下

治痢疾三百七十九

大黃一斤 用好酒十斤煮乾用厚朴末五兩

木香末三錢

和為丸如菉豆大大人每服三四錢白痢淡薑湯

送下赤痢白湯送下大小加減取漸消積盡則愈

治隔食隔氣三百八十

急性子用鹽水炒 硃砂 雄黃 木香

丁香各五錢 沉香三錢 射香一錢

右為末每服三分火酒調下

治腸風下血 兼治血痢三百八十一

黃連八兩為末 生地二兩 當歸二兩 芍藥二兩

右入猪大腸內以線扎定用蒸籠內置韭菜一皮

藏猪腸於中再用韭菜蓋上置鍋上蒸腸爛取出

以石臼內搗爛加占米飯丸如梧子大空心白湯

送下三錢加槐花末二兩炒

又方 三百八十二

烏梅肉 二兩焙乾為末

明礬 二兩為末

阿膠 五錢

搗共為丸如桐子大每用二錢空心白湯送下

急救小兒臍風噤口 三百八十三

用槐樹皮如錢大置臍上外以麵條密圍四弦以

艾火灸之啼聲一出愈

治內外癰瘡 三百八十四

龍骨 五分半

黃丹 三分半

黃臘 三錢五分

桐油 一兩

先以桐油煎沸下臈溶下前二味勻即投水中取

出碗合濕地上做夾紙膏貼之

治爛腿瘡 三百八十五

乳沒 各一錢

射香 一分

血竭 五分

銅青 五分

松香 三兩

各藥合成入剝淨卑麻子肉三百粒搗成膏磁器

收之以油紙做膏藥貼之要一器打成忌見鐵

順氣治痰方 三百八十六

半夏 泡

南星 泡

生薑 切

皂角 剉

生礬 各一斤

用水煎南星心內無白點為度去皂角剉晒乾或焙乾聽用配後藥

青皮 去白 陳皮 去白 蘇子 炒 蘿蔔子 炒另研

神麴 姜汁煮炒 香附 姜汁煮炒 麥芽 炒 杏仁 去皮尖

乾葛 山查肉 各半斤

右共前藥為末以生薑自然汁浸蒸餅為丸如桐子大每服五六十丸臨臥茶送下

治瀉久不止 三百八十七

文蛤 一斤 分四製 鹽水 黄土 好醋

薑汁

各炒為末臨用以好醋調作膏藥貼臍上立止

胡麻丸滋補精血壯陽益腎 三百八十八

用枸杞子 肉從容 兔絲子 何首烏

破故紙 熟地 杜仲 胡麻 各一斤 當歸 兩

茯苓 各半斤 製法同前 巨勝子丸

右為末麵糊丸如桐子大每服三錢空心鹽湯下

加味香連丸 治赤白痢 三百八十九

黃連 十二兩四製酒浸童便浸吳茱萸煎湯水浸俱晒乾炒

木香 三兩

茯苓 四兩 白朮 一兩 蒼朮 鹽水浸

肉果 去油各一兩半

右為末麵糊丸如菉豆大小兒一錢大人三錢白

痢姜湯下赤痢白湯下加陳皮一兩

治瀉痢疾不止 三百九

甘草 一兩 滑石 六兩 黃土 何陽者 硃砂 各三錢五分

右為末用車前子一兩五錢煎汁滴水為丸重一錢每服一丸白湯化下

又方用地蜈蚣五錢細茶五錢水煎服

治血痢 三百九

生地黄 黃連 黃芩 條 甘草 防風

芍藥 腹痛加山查蟬蛻

水煎服

治腸風下血 三百九

生地黄 芍藥 甘草 荆芥穗 丹皮

黃連 黃芩 苦參

水煎服

治遺精 三百九

山茱萸肉四錢 黃栢 牡蠣各二錢 山藥三錢

茯苓一錢五分

水煎服

治心痛身熱脉數三百九十四

黃連 黃芩 山梔 生地黄 芍藥 甘草

水煎服

治老年目昏三百九十五

當歸四兩 羚羊角一兩 蜜蒙花三兩 熟地黄

枸杞子各六兩 羌活二兩 川椒四兩 龍胆草一兩

右為末蜜丸菜豆大每用三錢食遠白湯下

治赤眼後羞明三百九十六

菊花 柴胡 當歸 熟地 决明子


枸杞子

或蜜丸或水煎服

治頭風三百九十七

用蘄艾微炒同陳年好酒糟搗成餅煨極熱以絹帕包細患處一夜得汗愈

治夢遺三百九十八



苦參 四兩剉水煎成膏

入茯神末二兩漸收晒乾為

度 牡蠣 醋煨末 一兩

共和勻以山藥末二兩打糊丸如梧子大硃砂為

衣臨臥鹽湯送下一錢

紅鉛丸 溫補陽氣 三百九十九

童女 月經 三錢 大附子 一箇童 浸煮

人參 五錢

沉香 硃砂 各一錢

共為末麻黃煎膏丸如小豆大空心好酒送下一

丸

四製黃岑丸 治赤鼻面上酒瘡酒鱗

枯黃岑 六兩炮 刮去皮 足稱四兩分作四貯

荆芥穗 四兩 薄荷葉 四錢 牡丹皮 八錢 鬱金 五錢

右剉各用水一碗煎半碗去渣四起浸岑二日夜

有汁不乾或濕或曬合為一處曬乾為末以葛粉

二兩煎湯打糊丸如菉豆大食後清茶送下一錢

服盡愈

治腦漏 四百

用紫背浮萍為末鋪紙上捲作筒火點熏鼻內口

內

治赤鼻 四百

白礬 硫黃 乳香 黃連 輕粉 各等分

右為末 搗破擦之

治耳聾 四百

草麻子肉 杏仁 去皮 松香 各五錢 食鹽

巴豆 去心膜 不去油 乳香 各二錢五分 黃蠟 五錢

共搗如膏 捻作棗核樣 以蜜蠟薄捲之 以大針劄

二三眼子 兩頭透用 塞耳內 一夜黃水出 愈

又方 四百

蝎尾 七枚 焙 淡豉 二十二粒 焙乾 巴豆 七粒 去膜 不去油

右先研蝎尾 淡豉 令細 另研巴豆 成膏 同研 勻捏

如小棗核狀 用葱白小頭取孔 以藥一粒 置在內

用薄綿裹定 臨臥時 置耳中 一夜取出 如未通 再

用以通為度

又方 四百

用鷄子一箇 開一孔 將巴豆一粒 去心膜 納入鷄

子內 以紙兩重 麵糊貼蓋 與鷄掩 以其餘鷄子出

雜為度取汁滴耳中日二次

治耳中出膿四百六

枯礬 海飄肖 黃連 龍骨煨各等分

右為末以綿裹一七如棗核大塞耳中日三易

口瘡四百七

黃連 朴肖 白礬 薄荷葉各等分

右為末用臘月牛胆將藥入胆內風處掛兩月如

用取藥研細吹入口內

又方四百八

冰片少許 黃栢 礪砂煨 薄荷葉各等分

右為末生蜜丸如圓眼大每用一丸津液化下

治口舌生瘡糜爛四百九

胆星 黃連各五錢 牛黃一錢 歸身 甘草

硃砂以上各二錢五分

右為末湯浸蒸餅丸如棗豆大每用五十九臨臥

時唾津嚥下

治牙疼四百十

用五倍子大者不俱多少裝食塩在內鋪鍋內大

火燒存性為末擦之

牙疼塞耳方 四百一十一

巴豆一粒煨黃熟去壳用蒜三郎切一頭作蓋剝去心入巴豆其中以蓋合之用綿裹隨患左右塞

耳中

蛙牙疼 四百一十二

用不蛙皂角一定去子弦於子處各安巴豆一粒塩泥固臍燒灰研末每用挖耳抄少許填入蛙牙孔內

牙疼 四百一十三

石羔 一兩

巴豆 十粒以針杆燈火上燒存性

章冰 一錢

蜂窠 一具燒存性

右為末糊丸如菉豆大每用一丸綿裹置疼處

治小兒痘瘡入眼半年內者服一月愈

猪懸蹄甲 二兩煨存性

蟬蛻 一兩為末

羯羊肝 焙乾末二錢五分

右和勻三歲一錢六歲二錢猪肝湯調服食後一

日四服

治痘後星障四百十五

谷精草 蟬蛻 菘豆皮 猪懸蹄甲煨存性 各等分

右為末每用二錢食後米泔調下

回生錠 治小兒慢驚風四百十六

人參 胆星 赤石脂煨各五錢 白朮 山藥

桔梗 茯苓各一兩 甘草 硃砂 乳香

青礞石煨金色 各三錢 射香一錢 牛黃一錢

右為末五月五日五時取粽搗勻印作錠金箔為

衣陰乾薄荷湯磨下三分

雷火針 治諸般腫毒風寒濕氣四百十七

射香二分 乳香 沒藥 木香 丁香各一錢

右為末以熟艾一兩分三處以藥鋪上捲作筒火

燃夾紙焯患處許久即愈

治腸風下血兼治婦人血崩四百十八

大柿餅一斤剉片瓦 煨存性 阿膠牡蠣粉拌炒 成珠二兩 生地

當歸各四兩 百草霜二兩 蒲黃一兩炒 褐色

右為末用烏梅一斤去核飯上蒸搗爛和丸如桐

子大每服百丸空心白湯送下

追虫取積方

四百十九

黑丑

一斤取頭末

大腹子

匾者一斤晒取末

三稜

炮

木香

炒各五兩

蓬朮

二兩煨

雷丸

炮五兩

右爲末用皂角半觔去弦子剉用水兩大碗浸二宿去查磁器內熬數沸白沫出爲度放冷和搗爲丸桐子大每用四錢五更沙糖水送下取利下三五行以冷粥補之孕婦弗服

治夏月瘧疾

四百二十

柴胡

升麻

葛根

羌活

防風

知母

黃岑

石羔

猪苓

穿山甲

甘草

水煎服一劑愈

治瀉痢久不止

四百二十一

砂仁

一兩

肉果

五錢

共爲末用羊肝半具細切拌藥以濕紙三五重裹上更以麪裹用文火燒令熟去麪并紙入軟飯搗爲丸童子大每用三十九食前米湯下

治咳嗽痰涎

四百二十二

南星

半夏

各四兩姜製爲末

為主熱痰加黃岑兩四

寒痰加官桂兩二

濕痰加

白朮

兩四

氣痰加陳皮

兩四

右為末姜汁浸蒸餅丸如棗豆大每服七十九生
姜湯食後送下

定喘化痰丸

四百二十
十三

猪蹄田四十九箇洗淨挖乾每箇甲內入半夏白
礬各一字裝罐內塩泥封閉勿令烟出火煨通赤
去火毒研入射香五分每服一七占米湯調下

治脇痛遇勞恐飢則發乃勞傷之候也宜補養之百四

二汁

入參

黃芪

白朮

當歸

地黃

川芎

牛膝

木瓜

山茱萸

石斛

米仁

桃仁

酸棗仁

栝子仁

水煎服

加味香連丸

治夏秋患痢嬰兒尤甚施之取効如

響百發百中如神治妙不可言

四百二十
十五

黃連

吳茱萸
炒

黃岑

滑石

澄

烏梅肉

瓦上焙
為末

山查肉

各四
兩

芍藥

六

匾豆

三

砂仁

厚朴姜製

葛根

升麻

蟬蛻去土

甘草

陳皮各二兩

木香二兩

右為末煉蜜丸如彈子大每用一九白痢薑湯化

下赤痢白湯化下赤白痢清米湯化下如大人痢

疾滴水為丸如小豆大每用三錢如前湯送下

香連五靈丸

專治久痢不止

四百二十六

黃連土炒四兩

木香煨二兩

枯礬一兩

白芍藥酒炒二兩

右為末用烏梅肉四兩泡爛搗和為丸小豆大每

用二錢空心清米湯送下姜湯亦可

治下部痠痛神方

四百二十七

枸杞子

天麻

合三錢

木通錢

牛膝

白蘚皮

黃栢

當歸

各二錢

紅花

五加皮

各一錢五分

此方庚戌秋余患大腿上下骨節內痠痛不能轉

動咸謂陰虛用六味地黄丸料加當歸枸杞牛膝

杜仲不効服順氣丸又不効自謂不起忽一道人

來曰汝所刻醫書甚妙送我一部即瘳汝病余喜

送之渠曰此是勞傷腎氣當泄不泄淫火留滯經絡所致遂索筆傳方服之果一劑痛止再劑行步如常余謝問其姓則曰孫問其號則笑而不荅遂別去後遍覓之竟無踪跡余感而思曰莫非思邈祖師指點於余乎於是積誠塑像朝夕焚誦頗覺靈應凡遇有前病者即以此方治之効亦如嚮余用前方增十倍分兩加虎頸骨二兩鋸片好酒炙脆共為細末煉蜜丸如桐子大每服三錢空心淡塩湯送下更効湖州朱惠民記

復光丸 專治眼目昏花青盲亦効 四百二十八

枸杞子 八兩以四兩川椒炒去椒四兩芝蔴炒去芝 當歸 酒洗四兩

生地黄 四兩焙乾忌鉄 熟地黄 四兩酒煮搗爛 乾菊花 一兩

甘草 五錢 阿膠 真者五錢洋入蜜內 川芎 二兩

白茯苓 二兩 麥門冬 去心三兩 薄荷葉 一兩

藜本 一兩 黃栢 各二兩俱鹽水炒 夏枯草 一斤

白芍藥 三兩酒炒

右共為細末煉蜜為丸如桐子大每服四錢食遠燈心湯送下如有暈加木賊草四兩去節青箱子

白朮藥 三兩
 黃酥 一兩
 味甘 益木也
 長林草 一

白芍藥 二兩
 麥門冬 三兩
 蕪荊葉 一兩

甘草 五錢
 何類 羊人蜜內
 川芎 二兩
 薄蔞葉 一兩

蘇子 四兩
 蘇子 四兩
 當歸 四兩
 蘇子 四兩

醫便二集卷六

海陽 張受孔心如父 重訂

姚學顏伯愚父

外傷金鏡錄序

夫人之受病傷寒為甚傷寒之治仲景為詳人皆知之而未必能行之者豈非以其法浩繁有難卒貫者乎舊有敖氏金鏡錄一篇專以青色視病既圖其狀復著其情而後別其方藥爾卷然一覽具在雖不期乎仲景之書而自悉合乎仲景之道可謂深而通

約而要者矣予昔承乏留都嘗刻之太醫官舍本
皆繪以五采恐其久而色渝因致謬誤乃分注其色
於上使人得以意會焉今廷尉景山錢公體仁博施
一旦見而悅之遂命工登梓名之曰八傷金鏡錄蓋
寒之所傷本自外至嘗見傷於內亦有徵焉將銓次
而繼傳之茲姑以外別之也所以然者八之一身皆
受生於天心名天君故獨爲此身之主舌乃身之苗
凡身之病豈有不見於此者尚何內外之間哉特患
人之不化耳

嘉靖丙辰秋日奉政大夫太醫院院使致仕姑蘇薛
巳撰

敖氏傷寒金鏡錄

凡傷寒熱病傳經之邪比雜病不難辨矣辨其脉癢舌
表裏汗下之庶不有誤况脈者血之府屬陰當其得
病之初正氣初搏若真氣衰寒脈必微細而有力病
久熱甚氣衰脉必微細而無力方數甚也但可養陰
退陽此識脉之要也或初起發熱後必有渴
水燥熱之證或逆厥而脈微細者此陽虛經之邪也若始

醫便二集
終皆熱瘧惟熱而不惡寒者為病初則頭痛必
無發熱惡寒渴水之症一病便痛或利或但惡
寒而無發熱此寒症也其病初在表則
心之竅於舌心屬火其熱入於舌本者乃
舌自紅而無白胎等色其熱入於半表半裏之間其
舌色變為白胎而滑見矣若不早治不明表症故邪傳
於表未罷則舌必見黃胎乃邪已入於胃急宜下之
胎黃自去而疾安矣至此醫之不依次悞用湯丸失
於遲下其胎必黑變症時起此為難治若見舌胎如
漆黑之光者十無一生此心火自炎與邪熱二火相
乘熱極則有兼化水象故色從黑而應水化也若乃
臟腑皆受邪毒日深為症必作熱症雖宜下之乃去
胃中之熱否則其熱散入絡臟之中鮮有不死者譬
如火之自炎初則紅過則薪為黑色炭矣此亢則害
承廼制今以前十二舌明著猶恐未盡諸症復作二
十四圖并方治列於左則區區推源尋流實可決生
死之妙也

時至正元年一陽月上澣之日

傷寒用藥說

夫醫者何猶防之將也。凡視人疾在究其淺深之異而療之。且疾之襲人若寇之侵境。方其至也。必瞰其勢之強弱。先以安撫。次以講和。戒嚴守禦。以防其返也。如堅然不退。至再至三。恣強肆侮。意謀土地。當此之際。奈何必選將鍊兵。尅期致戰。寇滅乃已。若愴惶無措。則地土陷矣。豈非將者不識韜略。不知合變。以致悞也。可勝嘆哉。夫今之醫不閱方書。不察脉理。臨症茫然。當解而不解。當吐而不吐。下畏首畏尾。顛

倒錯亂。助病日深。殊不知醫乃司命。其可輕忽如此。大抵病之輕淺者。卽爲和解。深重者。卽便攻擊。故曰用藥之時。膽欲大而心欲小。毋使君臣失職。佐使不當。反嫁疾焉。苟能如將之用兵。進退合宜。操存有法。何疾之不愈也。余每察脉用藥。覺有凝滯。幸承先師之誨。故姑撮其要領。以告後人云。

至正改元一陽吉日永和三仙至人蕭璜鳴書

驗證舌法

白胎舌



舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱胸中有寒乃少陽半表半裏之症也宜用小柴胡湯
 之
 小柴胡湯方見後

將瘟舌
 純紅
 梔子豉湯方見後

將瘟舌



舌見紅色熱蓄於內也不問何經宜用透骨清神散治之

透骨清神散

猪牙皂角

細辛

白芷

當歸

右為末等分和勻令病人先噙水一口以藥少許吹鼻內吐去水取嚏為度未嚏仍用藥吹入凡瘧疫之家不拘已未患者皆宜用之

中焙舌



舌見純紅內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也君

火熾盛反兼水化宜涼膈散大柴胡湯下之

涼膈散

方見後

大柴胡湯

方見後

生癍舌



舌見紅色而有小黑色者熱毒乘虛入胃蓄熱則發斑矣宜用玄參升麻葛根湯化斑湯解之

玄參升麻葛根湯 即玄參升麻湯加葛根方見後
化斑湯 即白虎湯加人參方見後



舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也所
不勝考 受火勢 土將欲發黃之候也宜用茵
陳五苓散治之

黑尖舌



茵陳五苓散 方見後

舌見紅色尖見青黑者水虛火實腎熱所致宜用竹
葉石膏湯治之

竹葉石膏湯 方見後

裏圈舌



舌見淡紅色而中有一紅暈沿皆純黑乃餘毒遺於
心胞絡之間與邪火鬱結二火亢極故有是證也以
承氣湯下之
承氣湯 方見後

人裂紋



人亦有此形

舌見紅色更有裂紋如人字形者乃君火燔灼熱毒
炎上故發裂也宜用涼膈散
涼膈散 方見後



舌見紅色更有紅點如蟲蝕之狀者乃熱毒熾甚火
在上水在下不能相濟故也宜用小承氣湯下之

小承氣湯 方見後


裏 黑 舌



舌見紅色內有乾硬黑色形如小長舌有刺者此熱
毒熾盛堅結大腸金受火剋不能平水故也急用調
胃承氣湯下之

調胃承氣湯 方見後

厥陰舌



舌見紅色內有黑... 於肝主筋故

四逆湯

甘草

六錢

附子

一枚

去皮生作八片

右每服五錢水一鍾煎六分不拘時溫服

理中湯

煎服法如

人參

甘草

乾姜

炮

白朮

炒

死現舌



舌見黑色水尅火明矣患此者... 治者審之

余在留都時地官主事鄭汝東妹壻患傷寒得此

舌院內醫士曾禧謂當用附子理中湯人咸驚駭
遂止亦莫能療困甚治棺曾與之隣往視之謂用
前藥謂言生理其家既待以死請從之數劑而愈
大抵謂之蓋有火極似水者謂注學士所謂薪
為黑出之也宜以隔散之謂其湯有水來
尅火謂所療之人是出謂理中湯以消
陰謂切平擦其謂色謂者可治
堅不謂治

弘治辛酉金臺姜夢輝患傷寒亦得此舌手足厥
冷吃逆不止眾醫猶作火治幾致危殆判院吳仁
齋用附子理中湯而愈夫醫之為道有是病必用
是藥附子療寒其效可數奈何世皆以為必不可
用之藥寧視人之死而不救不亦哀哉至於火極
似水之症用藥得宜效應不異不可便謂為百無
一治而棄之

敖氏傷寒金鏡錄方

黃胎舌



舌見尖白根黃其表證未罷也須宜解表然後方可
 攻之如大便秘者用涼膈散加硝黃泡服小便澀者
 用五苓散加木通合益元散加薑汁少許以白滾湯
 調服

涼膈散

生甘草 二兩

連翹 四兩

山梔 一兩

大黃 二兩

黃岑 薄荷葉

朴硝 各一兩

右每服一兩水二盞淡竹葉二十餘片煎至一盞
 去粗入生蜜少許熱服以利為度

五苓散

加茵陳即茵陳五苓散

澤瀉 二兩五錢

茯苓 猪苓

白朮 各二兩五錢

桂 五錢

木通

滑石

甘草 炙各一兩

右為末每服五錢入薑汁并蜜各少許白滾湯調

服

黑心舌



舌見弦白心黑而脉沉微者難治脉浮滑者可汗沉實者可下始病即發此色乃危殆之甚也速進調胃承氣湯下之

調胃承氣湯

甘草 錢三

大黃 錢六

硝 錢二

右用水一中半先煎甘草大黃將熟去粗下芒硝再煎三五沸頓熱服

十五舌



舌尖白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如飲水不至甚者五苓散自汗渴者白虎湯下利者解毒湯此

醫便二集

卷六

十三

赤危症也

五苓散 方見前

白虎湯

知母 一錢五分

甘草 多三錢

石膏 四錢

粳米 一撮

右每服一兩用水一鍾半入糯米先煎下諸味再煎去粗服之加人參亦可

解毒湯

黃連 一兩

黃柏 五錢

山梔子 二十箇

黃岑 五錢

右每服五錢水一鍾半煎至一鍾去粗頓熱服



舌見白胎中有黑小點亂生者尚有表證其病來之雖惡宜涼膈散微表之表退即當下之下用調胃承

氣湯

涼膈散 方見前

調胃承氣湯 方見前


舌 七 十



舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘腎與命門也宜急下之服解毒湯下三五次遲則難治如初服量加大黃酒浸炮

解毒湯 方見前

舌 八 十



舌見微黃色者初病即得之發識語者由失汗表邪入裏也必用汗下兼行以雙解散加解毒湯兩停主之

雙解散加解毒湯

- 防風
- 川芎
- 當歸
- 芍藥
- 大黃
- 麻黃

連翹 芒硝 各半 石膏 黄岑 桔梗 各一

滑石 三兩 甘草 二兩 荆芥 半兩 白朮

山梔 各五錢

右每服一兩水一鍾半薑三片煎八分服不拘時
一云有桂枝二兩

舌九

白胎 微黃

中見白胎外則微黃者必作泄宜服解毒湯惡寒

者五苓散

五苓散 方見前

解毒湯 方見前

舌十二

微黃

舌見微黃色者表證未罷宜用小柴胡湯合天水散

主之可下者大柴胡湯下之表裏雙除臨證審用之

小柴胡湯

柴胡四錢 黃芩 甘草 人參 半夏各二錢

右每服一兩水一鍾半姜三片棗一枚煎一鍾溫服

天水散

甘草炙一兩 桂府滑石六兩


右各另為末每服五錢入生姜汁并蜜各少許用白滾湯任意調服如發表用豆豉葱頭煎湯調服

大柴胡湯

柴胡四錢 黃芩 芍藥各一錢五分 半夏
大黃各二錢五分 枳實炒二錢

右咬咀每服八錢水一鍾半薑三片棗一枚煎一鍾溫服


十二一舌



舌見黃色者必初白胎而變黃色也皆表而傳裏熱
已入胃宜急下之若下遲必變黑色為惡證為亢害
鬼賊邪氣深也不治宜用調胃承氣湯下之

調胃承氣湯 方見前


二十二 舌



舌左白胎而自汗者不可下宜白虎湯加人參三錢

服之

二十三 舌



舌右白胎滑者病在肌肉為邪在半表半裏必往來
寒熱宜小柴胡湯和解之

小柴胡湯 方見前

舌四十二

白胎

本色

舌左見白胎滑此臟結之證邪併入臟難治

舌五十二

黃

色白

舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之 兼有表

者五苓散益元散兼服須待黃盡方可下也

益元散 方見前

五苓散 方見前

舌六十二

色黃

舌見黃而有小黑點者邪遍六腑將入五臟也急服

調胃承氣湯下之次進和解散十救四五也

調胃承氣湯 方見前

和解散

陳皮 姜製各一錢

藜本 炙各五分

蒼朮 三錢

右水一鍾半薑三片棗二枚煎七分去粗不拘時

服

舌七十二



舌見黃而尖白者表少裏多宜天水散一服涼膈散

二服合進之脉弦者宜防風通聖散

涼膈散 方見前

防風通聖散 方見前

又天水散 方見前

二十八舌

純黃 *

舌見黃而澁有隔瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴急宜大承氣湯下之若身發黃者用茵陳湯下血用抵當湯末在脇內十棗湯結胸甚者大陷胸湯痞用大黃瀉心湯

大承氣湯

厚朴 薑製 三錢

枳實 炒 二錢

大黃 三錢

芒硝 二錢

右每服一兩水一鍾半先煎枳實候熟入大黃再煎數沸入芒硝煎三五沸去粗熱服

茵陳湯

茵陳 五錢

大黃 三錢

山梔子 七枚

右每服一兩水一盞半先煎茵陳半熟次入二味再煎去粗通口熱服

抵當湯

醫便二集

水蛭糯米炒

蝨蟲炒去羽足七箇

大黃三錢

右作一服水一盞半煎一鍾去粗通口服

十棗湯

芫花醋炒

大戟

甘遂煨各等分

右每服二錢弱人減半以水一鍾半大棗十枚劈碎煎取八分去粗通口服

大陷胸湯

大黃七錢

芒硝三錢

甘遂四分

右用水二鍾先煎大黃至一鍾去粗下芒硝煎三五

沸再下甘遂末溫服取利

大黃瀉心湯

大黃五錢

黃連

黃芩各三錢五分

右作一服水二鍾煎一鍾去粗通口溫服若有宿食痰飲者加半夏麴二錢

二十九

微
黑灰色
紅

醫便二集

二十九

舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而藥劑太
承氣湯下之熱退可愈必三四下方退五次下之微
不退者不治
大承氣湯 方見前

三十一舌



舌見黃而黑點亂生者其證必渴譫語脈實者生脈

瀉者死循衣摸床者不治若下之見黑糞亦不治

宜大承氣湯

大承氣湯 方見前

三十一舌




舌見黃中黑至尖者熱氣已深兩感見之十常九死
惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治宜用調胃承

氣湯主之

調胃承氣湯 方見前

舌二十三



舌見外淡紅心淡黑者如惡風表未罷用雙解加解毒湯相半微汗之汗罷急下之如結胸煩躁目直視者不治非結胸者可治

雙解散 方見前

解毒湯 方見前

舌三十三




舌見灰色尖黃不惡風寒脉浮者可下之若惡風惡寒者用雙解散加解毒湯主之三四下之見糞黑不治

雙解散 方見前


解毒湯 方見前

舌四十三



舌見灰黑色而有黑紋者脉實急用大承氣湯下之
脉浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其二三

舌五十五




舌根微黑尖黃脉滑者可下之脉浮者當養陰退陽
若惡風寒者微汗之用雙解散若不汗用解毒湯十
生七八也

雙解散 方見前

解毒湯 方見前

醫傳二卷 卷六

三十六
舌 色 灰



舌根微黑尖黃隱見或有一紋者脉實急用大承氣湯下之脉浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其二

三

已上三十六舌乃傷寒驗證之捷臨證用心處之

百無一失
終

