

血未病故月不斷以時下本非妊娠可以以爲辨矣

劉宗厚曰按以謂石瘕爲血壅不流故月事不來
腸壅爲氣聚而濁結成瘕故血未病月水不斷
而知此二積之異然亦有諸積所致或有病瘕
膿而似此二證者不可不察也


丹溪曰瘕現在中爲痰飲在右爲食積

痰積一云瘕積存左

爲血塊氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與
食積死血而成也用醋煮海石醋煮三稜蓬朮

桃仁紅花五靈脂香附之類爲丸石醮白朮湯
吞下 瓦壘子能消血塊次消痰石醮一物有
痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 治塊
當降火消食積食積即痰也 行死血塊塊去
須大補 凡積病不可用下藥徒損真氣病亦
不去當用消積藥使之融化則根除矣 九婦
人有塊多是血


生生子曰積聚一證難經以某日得積及不受欲
還之說後人皆難尊信以諸書雖亦各有發



明終未有能擴其蘊而可為萬世法者近汪子
良持揭而辨之乃分表裏邪正臟腑內外曰積
曰聚及著治驗救條多有啟悟與丹溪治案可
相表裏深有功於難經者而後人得以此取則
焉幸亦大矣謹述於左

汪子良曰嘗讀難經積聚之說而疑之雖有及於
病情而其說自相矛盾有膠固而難通予慮後
學之悞于承用也為之辨論附以積聚常變之
法亦有自效於匡救之患已乎

五十五難曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而
伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰
聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成積者
陰氣也其始發有常處聚者陽氣也其始發無
根本上下無所留止其痛無常處又五十六難
曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足
久不愈令人發欬連年不已以季夏戊巳日得
之何以言之肺病傳脾脾季夏通旺者不受
邪肝復欲還肺脾不肯受故留結為積故知
肥氣以季夏心之積名曰伏梁起臍上大如臂
戊巳日得之



上至心下久不愈令人煩心以秋庚辛日得之

何以言之腎病傳心當傳肺秋適旺者不肯受邪心緩欲尋腎不肯受故番結為積故知伏梁以庚脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如

盆久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌

膚以冬壬癸日得之何以言之肝病傳脾者不肯受故留結

曰息賁在右脇下覆大如杯久不已令人洒洒

寒熱喘嗽發肺癰以春甲乙日得之何以言之肺病傳脾者不肯受故番結為積故知息賁以春甲乙

肺當傳脾以春適旺者不肯受邪肺復欲還心心不肯受故番結為積故知息賁以春甲乙

之腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下或

上或下無時久不已令人喘逆骨痠少氣以夏

丙丁日得之何以言之肝病傳腎當傳心心

脾不肯受故番結為積故知奔豚以夏丙丁日得之夫謂積者陰氣也

聚者陽氣也是以血氣分陰陽也殊不知陰血

陽氣也皆能成積但臟腑所主之不同耳心肝

多主于血丹溪所謂在左屬血是也脾肺多主


於氣本文所謂肺積息賁者是也息者氣之息

也是陽氣亦能成積况又曰氣之所積名曰積



與其積陰之說不相合矣又謂積者五臟之所
生也聚者六腑之所成也殊不知有形質之物
積滯不行則為之積五臟六腑俱有之如仲景
所謂熱結膀胱搏血畜積下焦其人如狂小腹
滿硬而小便自利抵當湯主之又東垣所謂食
積腸胃腹滿卒痛者備急丸下之是六腑之位
亦有其積豈謂積于臟乎至論肝積肥氣夫肥
氣者言其皮裏膜外有塊以致皮膚有肥滿之
狀所謂瘧母是也此肝之外積非肝之內積也

又謂脾積痞氣夫脾居於右脇今積在於心膈
之位乃與本文積在本位之說不相合矣又謂
腎積賁豚發於少腹上至心下若豚狀或上或
下無時乃與聚証走動相類與本文積屬陰沉
伏之比不相合矣且五臟之積未言所因治何
所據又謂肝積於季夏戊巳日得之之類其說
之失明者自當知之愚謂積伏而有常處其症
靜也因於血氣痰食水火之所成聚者對散而
言散而無形或集為有象其症動也因於氣虛



不能運行之所致作於腹中者屬內作於皮膚
四肢者屬外如血積左脇作痛日輕夜甚其脉
沉澹者所謂在左屬血治用芎歸紅花蘇木射
香肉桂莪朮之類又有火鬱左脇而痛甚者治
用當歸龍會丸之類又有裏熱畜水在於左脇
而作痛者如仲景所謂心下痞硬痛引脇下乾
嘔短氣汗出不惡寒者十棗湯主之又有食積
右脇而作痛者所謂在右屬食丹溪云右脇一
條降起作痛色不紅者與食積也予嘗用補中

益氣湯去陳皮加青皮草果木香之類又有食
塊積於右脇而不痛者宜治消導為主如白朮
枳實三稜莪朮砂仁吳茱萸之類又有痰飲積
於心膈作痛絛食熱辣湯則暫止而脉沉滑治
用白螺丸之類又有氣積胸中而為脹痛喘急
脉沉者治用紫蘇杏仁之類又有水積胸膈作
痛手不可近身涼脉沉緊者治用陷胸湯之類
又有濕鬱心膈而為痞滿者治用大消痞丸之
類所謂五臟之積者如此又有積于六府之位




者余嘗治一人膈下大痛有塊不移嘔吐不食
吐蕪腹痛此中焦吐也從於積用紫沉丸下之
而愈又嘗治一人腹中大痛不移緣得大便秘
痛稍減兩尺脉沉弦而濡他醫作房後陰症治
之弗應余曰據其尺脉陰沉當作陰症治之據
其大便去後而痛減者此食積也用備急丸下
之而已又嘗治一婦產後將及一月小腹之位
有塊如雞卵作痛日輕夜重嘔吐寒熱此血積
也治用芎歸肉桂義朮乳沒琥珀射香之類一

服而塊消諸症悉退又寶鑑云寒氣客於子門
則氣塞不通血壅不流而衄以止之結硬如石
是名石瘕見規丸主之又云清濁之氣結聚腸
外成如懷姙按之則堅推之則移月事以時下
名曰腸覃晞露丸又嘗治一婦人經閉三月臍
下脹痛不移他醫作血積治弗効予曰此氣虛
不能上升而陷於下也丹溪所謂陽病極於下
者此也治用人參陳皮而安又嘗治一人臍左
有塊不痛或時降起此亦食積也治用白朮三



稜義朮砂仁吳茱萸木香神麩糊丸服之外於塊上灸之而消又嘗治一人小腹左邊有塊堅痛不移大便燥結或因惱怒辛苦即作膈痛嘔吐不食諸醫罔效已一年餘余作痰火治用順氣消痞丸遠志肉酒炒黃連姜製厚朴各二兩海藻昆布青皮山查肉神麩蒼朮川椒松實各一兩玄明粉六兩同牛肉一斤切碎煮熟焙乾同前諸藥為末醋煮蒸餅糊為丸每服二錢空心湯下未及一月而塊前痛止又治一人右脇塊痛用三補丸加梔子蒼朮服至半月而愈所謂六府之積者如此其餘菓酒肉寒冷等積可類推焉

腑之積甚者倒倉法治之此皆內積之症治者也又有外積者作于皮膚四肢之位也如癰疽癩癧瘡母之類治各從其所宜夫癰疽屬陽者仙方活命飲之類屬陰者內托復煎湯之類癩癧未消者破結散之類已破者如神散之類瘡母又名肥氣宜降痰火之劑余嘗治一人瘡後左脇之下皮裏膜外有塊大如掌許用七膜散治之瓦壘子煨天蓼花子各二兩為末猪胰七箇針亂刺孔同玄明粉四兩煮熟入前二末搗爛焙乾為末每服之而効此皆外積之二錢酒下為丸服亦可



症治者也且以聚病言之夫內聚者腹中走痛也由於氣虛不能運行故耳余嘗治一人腹中有塊作痛或上或下或有或無此聚也治用人參黃芪白朮當歸枳殼木香之類而止此內聚之症治者也又有外聚者亦由氣衰滯於四肢百節作痛痛作隨腫痛退腫消經曰先痛而後腫者氣傷形也此也治用補氣散邪之劑如人參黃芪白朮為君佐以羌活五加皮薏苡仁之類此外聚之症治者也由是觀之積者由於氣

血痰食水火之所成而有臟腑外內之分也聚者由於氣虛不運之所致而表裏邪正之別也則常變虛實之治得矣難經之說云乎哉

湯氏三稜散 治積氣肚痛 砂仁 甘草炒

益智仁炒去壳 三稜 莪朮 青皮去穢炒

右末白湯點下

散聚湯 久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下心腹絞

痛攻刺腰脇小腹填脹大小便不利

半夏 檳榔 當歸各三分 陳皮 杏仁去皮炒



桂各二兩 茯苓 甘草 附子炮 川芎 枳殼

厚朴 吳茱萸湯洗各一兩 大黃看勢輕重用

每服四錢水煎 大便利者去大黃

大七氣湯 治同上 京三稜 蓬朮 陳皮

益志 香附各一兩半 肉桂 藿香 甘草

青皮 桔梗各三兩 每服五錢水煎

玄胡丸 內消癥瘕氣結虫煩心腹脹痛

玄胡索 川歸 青皮 木香 雄黃飛另研

檳榔 廣朮炮各四兩 京三稜炮六兩 右末入雄黃

拌勻糊丸梧子大每服三十丸姜湯下不拘時

木香三稜散 和胃進食消化生冷物心腹刺痛

木香 神麴炒各一兩 京三稜炮 甘草炙各二兩 廣茂六兩

益志 橘紅各四兩 右末每二錢入鹽沸湯點服


五食丸 虛實積氣蠱脹積塊水氣年深癥瘕

大戟去皮 甘遂生各半兩 牙皂去皮生子 芫花醋浸一宿炒黃

胡椒各一兩 巴豆去心膜醋煮二十箇研半兩 右末入巴豆和

勻糊丸菘豆大每服五七丸氣實者十九夜卧

水一鍾用白米白麵黑豆生菜猪肉各少許煎



至半鍾去渣用湯下藥忌油膩粘滑物

聖散子

遠年積塊及婦人乾血氣

調砂

麥蘖各六兩 大黃八兩 乾漆燒過 扁蓄 茴香

炒檳榔

各一兩 如婦人乾血氣加川山甲二兩

右細末每三錢溫酒調下仰卧此藥只在心

頭至天明大便如魚腸小便赤為驗並無毒

神効小兒用一錢十五以上二錢空心服之

更効

荆蓬煎丸

破癥瘕消癥塊及冷熱積聚順氣消

食 木香 檳榔 枳殼 青皮 茴香

三稜

各二兩酒浸三日夏一日 廣茂二兩醋浸三日夏一日 以去皮

巴豆二十箇同炒黃色去巴豆不用

右末糊丸如菘豆大每服三十丸姜湯下

三稜丸 治五穀等積食

陳倉米

一兩巴豆五枚去殼同炒焦色去巴豆不用

陳皮 三稜各一兩

兩砂仁

各二錢

麥芽

木香一錢

右末醋糊丸

菘豆大每十五丸至二十九丸姜湯食遠服

麩孽丸

治熱酒積噎酸脇痛



神麴

麥芽

各一兩

黃連

五錢

同巴豆

同麻

右末沸湯和丸桐子大每五十九食遠姜湯

送下

一方 治冷酒積 平胃散加丁香砂仁麥芽神

麴姜末鹽煎服

水積丸 甘遂錢一為末以猪槽頭肉一兩細切搗

爛和末作一丸紙裹火煨令香熟取出臨卧嚼

細酒嚥下取下病根 若治酒積用棗湯吞下

涎積炒粉丸 積聚涎塊結於心腹乾嘔刺痛

蚌粉

一兩

巴豆

七枚去壳及膜

右二味同炒赤色去巴豆

以醋丸桐子大夫臍腹痛炒茴香酒下二

十九婦人血氣姜酒下敗血冲心童便和當

歸酒服常服姜湯下

茶積丸 治茶積飲食減少面黃腹痛

陳倉米

半升巴豆七粒去壳同炒赤色去巴豆


青皮

陳皮各二兩

右末醋丸如菉豆大每二十九食後淡姜湯

下

又方 花椒為末麵糊丸桐子大每二十九茶湯



任下

茶癖散 治茶積 黃芩 石膏 升麻 等分

為末每三錢砂糖湯調下

驚甲桃仁煎丸 治諸積 桃仁 澆去皮尖五兩

三稜 煨 木香 檳榔 青皮 各一兩 煎甲 醋炙黃

右末將桃仁汁慢火熬二升再加醋一升再熬如糊和藥丸桐子大每服七十丸淡醋湯下空心食前日二服

晞露丸 感寒氣凝結腸外久為癥瘕疼痛名腸

覃 廣木 三稜 各一兩 酒浸用巴豆三十粒

不用乾漆 炒 川烏 各五錢 茴香 炒 青皮 雄黃 各三

川山甲 炮二錢 硃砂 研四錢 輕粉 錢一 射香 分五

右姜汁糊丸桐子大每服二三十九空心姜

湯下

阿魏丸 諸積聚癥瘕痞塊 山查 南星 皂角 水浸

半夏 同 麥芽 神麴 黃連 姜炒各一兩 連翹 炒

阿魏 醋浸 瓜蒌 貝母 各五錢 石礮 風化硝

蘿蔔子 胡黃連 各二錢半 右末姜汁浸餛餅糊



為丸桐子大每服五十丸姜湯下

見睨丸 婦人石瘦狀如懷子者 大附子 炮

鬼箭羽 煆石英 肉桂 玄胡索 澤瀉

木香 各二錢 血竭 水蛭 一錢 炒 檳榔 二錢 桃仁

三枚 炒 三稜 錢五 大黃 三錢 同三稜 右末酒糊丸桐

子大每三十九食前鹽湯或酒下

脾積膏 治諸積神效 雞子 五枚 阿魏 五分 黃蠟 兩一

鍋內一處煎分作十服溫湯空心服諸物不

忌設腹痛是積化動十日後當有血大便中

出是其効也

剪紅丸 專治久積有虫者 雷丸 檳榔

三稜 莪朮 各醋 木香 蕪荑 黑丑

狗脊 大黃 史君子 鶴虱 牙皂 錫灰

茵陳 黃丹 各等 為末以茵陳煎湯為丸梧子

大外以黃丹為衣大人每服三錢小兒每用一

錢空心以酒下 福建者以冷茶吞

奇驗方 黑羊肝一副入左顧牡蠣三錢黃蠟一

兩水煮肝爛食肝并湯空心食肝盡即効但不



厭其苦須多服効

敷方 蕎麥麵水調圍硬處內用皮硝蔥重重鋪

三層以火熨之日三次 外服橘半枳朮丸加

莪朮

又方 以紅麴為糟將生威靈仙同搗極爛敷之
外覺痞塊消即拭去遲恐壞肌膚

熨痞方 吳茱萸三升研碎酒煮熱以布裹熨癥

上冷更炒更番熨之癥逐移走熨之消乃止

二仙膏 貼痞氣及積塊

明礬 雄黃 為末先將二兩水糊和成膏貼

患處俟大便如膿下即愈未愈再以二兩和

膏貼之即効

七臍散 汪子良論中七臍散有瓦楞子 只用皮硝七錢每一

錢擦一臍醃七日鉄器上焙乾燥為末又水

紅花子只用七錢無瓦楞子

羅太無乾柿丸 取虛實積下膈甚妙

硃砂飛為沒藥 牙皂去皮乾姜炮乾漆炒

尽三稜炮輕粉 青礞石煨各巴豆三十粒去



十錢 水銀一錢 鉛一錢

右末和勻飯丸菜豆大

煎柿蒂湯冷下三九或五九 有孕婦人服勿

神功助化散 男婦腹中痞塊不拘氣血食積所

成 扁蓄 麥芽 瞿麥穗 甘草 各五分

木香 沉香 神麴 各半 大黃 二兩

右末和勻男以淡竹葉甘草等煎湯及無灰

酒同調服 婦以紅花灯心當歸等煎湯及

無灰酒同調服 忌酒多於 忌油膩動氣之物

及房事一月其藥夜服大小便見惡物為度

此方神妙不可盡述

紅丸子 大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四

肢無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳

痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積

骨瘦面黃腹脹氣急不嗜飲食漸成脾虛並宜

服之方見傷食

二賢散 進食消積塊 橘紅 一斤 甘草 四兩

鹽 兩 用水三四碗從早煮至夜以爛為度水

乾則添日乾為末淡姜湯調下 有塊者加



姜黃半兩 氣滯者加香附二兩俱同前藥
煮 氣虛者加沉香半兩 噤口痢加蓮肉
二兩去心俱另入

小三稜煎 食癥酒癖血癥氣塊時發刺痛全不
思飲食積不消心腹堅脹痰逆嘔噦酢吞酸

京三稜

蓬朮

各四兩

芫花


一兩去梗蘆

右同入甕器中用米醋五升浸滿封器以炭
火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微
焦焙乾為末醋糊丸棗豆大每十五丸
下姜湯

猪腰子方 治腹中有塊

猪腰子一雙切薄片木鱉子肉一兩與猪腰片
相間縛定外用溫紙包火煨熟去紙搗碎肉
搗如泥入黃連末和丸每二十九烏梅甘草
湯下第二服二十五丸三服三十丸漸加至
以痛為度大便利其塊自消神効

元戎溫白丸 治心腹積聚久壅痞塊大如杯碗
黃疸嘔吐滿悶上氣腹脹心下堅結上搶心傍
及脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆噎膈五種



淋疾九種心疼積食不消成瘡連年不瘥及一切風身軀頑痺不知痛痒或半身不遂眉髮墮落七十二種風三十六種遁尸症忤癩癩或婦人諸疾斷續不生下淋瀝五邪失心憂愁思慮不樂飲食無味月水不調及一切病有似懷孕羸瘦困弊或歌如鬼所使等症

川烏

去皮臍炮
二兩半

紫苑

菖蒲

柴胡

厚朴

製

吳茱萸

桔梗

皂莢

去弦
子炒

茯苓

乾姜

炮

人參

黃連

巴豆

去油
研炒

桂

蜀椒

去目
各五錢

右末入巴豆令勻蜜丸桐子大每三九姜湯下食後臨卧服加至五六丸止

肝之積肥氣溫白丸加柴胡川芎治之 心之積

伏梁溫白丸加菖蒲桃仁黃連治之 脾之積

痞氣溫白丸加乾姜吳茱萸治之 肺之積息

賁溫白丸加人參紫苑治之 腎之積奔豚溫

白丸加丁香茯苓遠志治之

肥氣丸 肝之積在左脇下如覆杯脉弦而細

青皮

當歸

蒼朮

各一兩半

蛇含石

煨醋淬
七次



蓬朮

三稜

鐵孕粉

各二兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時

右末醋煮米糊丸菘豆大每四十丸當歸酒

送下

伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心温

酒調下桃奴樹上乾桃子是也正月採經冬不落者

肺喘久不愈為息賁五靈丸

五靈脂

二兩

木香

半兩

馬兜苓

炒一兩

葶藶

右末枣肉丸桐子大每二十九丸姜湯下日三

本事云肺之積曰息賁在右脇下大如杯令人洒

酒寒熱喘嗽發肺癘凍膏丸

葶藶子

陳皮

桔梗

各等分

右下二味末入葶藶研勻煮肥枣肉和丸桐

子大每五七丸米飲下予嘗患停飲久漬肺

經食已必噎喘覺肺系大急服此良驗

當歸丸 治婦人月經不調血積

當歸

赤芍

川芎

熟地

京三稜

廣茂

各五分神麩

百草霜

各二分

右末酒糊丸桐子大

温水下



尚書媳婦馬氏年三十二腹中血塊作疼經五六
年形已骨立衆皆曰不可為柰其未死何家甚
貧而大小慙之一日召杜至告杜曰但以濟物
為懷則可業已請召明公非所言也遂以少物
帛贈杜杜不受曰但服其藥必獲安無以是為
疑遂示方用沒藥牛膝乾漆當歸各半兩硃砂
木香水蛭炒紅娘子炒紅花牡丹皮硃砂各一
分海馬一箇斑猫去翅足炒十四箇為末酒醋
各半升熬為膏每日天明用一皂子大酒醋化

下一月病過六十日漸安果如其言

黑神丸

神麩

茴香

各四兩

木香

川椒

炒香出汗

丁香

各半兩

檳榔

四箇

乾漆


六兩

半生

半熟用

姜湯浸半日令香

右除椒漆外五物皆半生半炒為細末用前
生熟漆和丸彈子大又用茴香十二兩鋪陰
地陰乾候外乾并茴香收器中至乾去茴香
用治腎氣膀胱瘕癖及疝墜五膈血崩產後
諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆
綿灰酒下若難產炒葵子四十粒杵碎酒煎



下 諸疾不過三服 痰氣十服 膈氣癥癖 五服 血瘦三丸 一婦有塊如杯 每發痛不可忍 諸藥莫愈 投此丸三服 杯塊盡消 終身不復 作矣

沒藥散

治一切血氣臍腹作痛 產後惡露兒枕

痛 血竭 沒藥並研 桂心 當歸 蒲黃

紅花 木香 玄胡索 乾漆炒 赤芍各等分

右細末 每服二錢 熱酒調下 食前 血塊冲心痛甚者 以大順散三錢 酒調服 立止

牡丹散 婦人久虛羸瘦 血塊走注 心腹疼痛

牡丹皮 玄胡索 桂心 當歸各一兩 牛膝

赤芍藥 莪木各三兩 京三稜一兩

每服三錢 水酒各半 盞煎服

芍藥湯 治產後諸積 不可攻 宜養去熱

芍藥一斤 黃芩 茯苓各六兩

右每服半兩 水煎 日三服

帝曰 病脇下滿 氣逆二三載 不已 是為何病 岐伯曰 病名曰息積 坎不妨於食 不可刺 灸祇為導



引服藥藥不能獨治也

奇病論○王註云氣逆息難故名息積也

用息積法治之亦可

磨積丸

胡椒

一百五十粒

木香

二錢半

全蝎

十枚去毒

右末粟米糊丸菜豆大每十五丸陳皮湯下

化氣湯 治息積

木香

砂仁

桂心

各二錢半

甘草

炙

茴香

炒

丁香皮

青皮

陳皮

乾姜

蓬朮

炮各半兩

沉香

胡椒

各一錢

右末每服二錢姜蘇鹽湯調

下婦人醋湯服

肝之積肥氣丸 治積在左脇下如覆杯有頭足

久不愈令人欬逆瘕瘕連年不已

厚朴

半兩

黃連

七錢

柴胡

二兩

椒

四錢

巴霜

五分

皮

錢二分

乾姜

五分

皂角

去皮弦子一錢半

白茯苓

一錢半

廣茂

炮

昆布

人參

各二錢半

甘草

三錢

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研巴

霜旋入和勻煉蜜丸桐子大初服二九一日

加一丸二日加二丸漸加至大便微澹再從

兩丸加服周而復始積減大半勿服 右後



積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在
各條下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃
連一錢半若治風癩於一料中加人參茯苓
菖蒲各三錢黃連只依春用七錢雖秋冬不
減淡醋湯空心服下

加減肥氣丸 治同前仲夏合此

柴胡 厚朴 各半兩 黃連 兩 川椒 甘草 各五分

肉桂 川烏 各二錢 巴霜 六錢 乾姜 人參 各半兩

右細末旋入巴霜研勻煉蜜丸桐子大初服

二九一日加一九二日加二九漸加至大便

微澹再從二九加服空心淡醋湯下大便利

秋冬去乾姜半錢加厚朴一倍減黃連一半

心之積伏梁丸 起臍上大如臂上至心下久不


愈令人心煩 黃連 一兩 人參 厚朴 去皮姜製各半

兩 黃芩 三錢 肉桂 紅豆 茯苓 丹參 各一錢

菖蒲 乾姜 巴霜 川烏 炮去皮臍各五分

右末研巴霜旋入和勻煉蜜丸桐子大初服

二九日加一九漸加至大便澹從二九加服



食遠淡黃連湯下周而復始即減半勿服秋

冬加厚朴半兩減黃連半兩黃芩不用

鱉甲湯 治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便

不利 鱉甲去裙醋炙黃色 三稜 大腹皮 芍藥

當歸 柴胡 生地各一兩 官桂 生姜切片焙乾各三

分每服三錢水一大盞入生姜木香半錢同煎

至八分空心溫服

脾之積痞氣丸在胃脘腹大如盤久不愈令人四

肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴製半生半炒 黃連錢八 吳茱萸 黃芩 白朮各三

錢 白茯苓另為末 澤瀉各一錢 巴豆霜另研四分 乾姜炒

縮砂 茵陳各半錢 川烏炮去皮 川椒炒各五分 桂四分

人參錢一 右末旋入巴霜茯苓和勻煉蜜丸桐


子大初服二丸日加一丸漸加至大便微澹再

從二丸加服食遠淡甘草湯下周而復始積減

大半勿服

加減痞氣丸 孟秋合此

黃芩酒炒 益智 吳茱萸 歸尾 橘紅





附子分各三厚朴錢一黃連酒半半夏錢一紅花分各五

青皮 廣茂 神麴 茯苓 昆布 熟地

人參 炙甘草 巴霜 葛根分各二澤瀉

右末蒸餅糊丸桐子大初服二丸日加一丸
加至大便微澹再從二丸加服淡甘草湯下

宣明白朮丸 治息積脇下氣逆妨悶喘息不便
呼吸引痛不已不可針灸宜導引服藥爾

白朮 枳實 官桂各一兩半人參二兩桔梗醋炒陳皮

甘草錢各一為末煉蜜丸桐子大每服二十九

溫酒下日三服

加減息賁丸 仲夏合此其積為病寒熱喘欬氣

上奔脉瀆失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒

熱相叅氣分寒血分熱治宜益元氣洩陰火破

氣消其堅也 川烏 乾姜 桔梗 白豆寇

各一錢人參 桂枝各二錢陳皮八錢黃連一兩紫苑

厚朴 茯苓 川椒炒去汗京三稜 天門冬去心

各一錢半青皮分七紅花少許巴豆霜分四右末餠餅糊

為丸桐子大初服二丸日加一丸加至大便

微澹從二九加服食前姜湯下忌酒麵辛辣
生冷物

腎之積奔豚丸 發於小腹上至心下若豚狀或

上下無時久不已令人喘逆骨痠少氣及男子

內結七疝女子瘕聚帶下 苦楝酒黃黃連炒

錢白茯苓 澤瀉 菖蒲各二錢川烏各丁香各

分玄胡索一錢半全蠍 附子 獨活各一錢巴豆

霜四錢厚朴姜製肉桂三錢右末旋入巴豆霜茯苓

苓和勻蜜丸桐子大服法如前食遠淡鹽湯

下秋冬加厚朴半兩 如積熱堅大先服前

藥不減於一料中加牡蠣三錢疝帶勿加

如大積大聚消其大半乃止藥過劑則死

如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先

服本臟積藥諸疾自愈是其本也餘積皆然

如服藥人覺熱加黃連 如服藥人氣短加

厚朴 如服藥人悶亂減桂

治積要法 許學士云大抵治積或以所惡者攻

之所喜者誘之則易愈如礪砂水銀治肉積神



麩麥蘗治酒積水蛭蚘治血積木香檳榔治
氣積甘遂牽牛治水積雄黃膩粉治痰積巴豆
礞石治食積各從其類也若用群隊之藥分其
勢則難取効須要認得分明是何積聚兼見何
證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨
時通變也治積當察其所痛以知其病有餘不
足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如寒者
熱之結者散之客者逐之番者行之堅者削之
强者奪之賊以粟之苦以瀉之全真氣藥補之

隨其所積而行之節飲食慎起居和其中外可
使必已不然遽以大毒之劑攻之積不能除反
傷正氣終難復也可不慎歟

治魚蟹積

香蘇散多加生姜陳皮橄欖煎服

菓菜積

平胃散加丁香射香為末鹽湯調服

索粉積

紫蘇濃煎汁加杏仁泥服即消

麩積阿魏丸

濃煎羅蔔子湯下

糞糕傷積

酒麩五錢木香一錢為末鹽湯調服

口有酒香是効



治婦人血塊有孕難服峻藥

香附子

醋煮

桃仁一兩去尖

海石

醋煮

白朮

一兩

一兩

神麴糊為丸

奇方

治一切癥瘕積聚

蠶甲

醋煮

三稜

五錢

白朮

五錢

青皮

桃仁

紅花

昆布

各二錢

香附

醋煮

右末

糊丸

梧子

大每一錢

煎

白朮

湯下

治中脘有塊中常跳動

橘紅

四錢

桃仁

去皮尖

二錢

木通

一錢

白朮

八錢

水煎服

治中脘水飲積塊堅大如盤

白朮

二兩

枳實

七錢

分三服水煎

治小兒疳積

大安丸加胡黃連末五錢神麴糊

丸黍米大米飲下

丹溪治一人肚左邊帶脇下有塊先吃匾食牛乳

者成氣痛又因酒肉塊大如桃食減三分之一

滑石

五錢

白朮

四錢

陳皮

三稜

各三錢

蘿蔔子

黃連

連翹

各一錢

乾葛

二錢

桃仁

二十枚


甘草

一錢

半錢黃芩

分三帖水煎服

一婦脇下有塊大如掌脉瀯時作熱此虛中有氣



積先與補虛次與磨積藥

白芍藥 當歸尾各四分 白朮三錢 青皮 川芎

木通各錢 甘草五分 水煎服

磨積藥 三稜一錢 醋煮 青皮 枳實 桃仁 大黃

名五錢 桂枝半錢 海藻醋煮三錢

神麴糊為丸梧子大每服五十丸

一人有塊在脇內有痰熱汗不得泄而脉大而散

軟此挾虛症 三稜五錢 黃連 白朮 連翹

木通各錢 三人參二錢 桂 川芎各一錢 甘草五分

水煎吞下保和丸

一婦瘡後左脇下有塊小便少

厚朴 柴胡各二錢 三稜 青皮 木通各五錢

白朮六錢 甘草五分 姜一片水煎服


一人因飽食牛肉豆腐患嘔吐又不節飲食右脇

下生一塊漸長大如掌痛發則見痛止則伏脉

弦數性急塊上不可按按之愈痛痛則必吐黃

酸苦水此足太陰食積濕痰

荔枝核二枚 山梔仁五枚 枳實十五枚 山楂九枚



吳茱萸

炒九

一方有人參 急流水一盞煎沸入生姜汁服四帖止其痛却與消塊藥

消塊藥方

半夏末

六錢皂角六枚水煮取汁拌半夏末晒乾

黃連

炒五錢

石碱

二錢

右末以糖棗膏為丸胡椒大

驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱉甲燒各三錢

玄胡索蓬朮各四錢每服五十九加至七十九

以利為度

妙應丸即控涎丹方見痰門

酒積方累効

即烏梅丸方出傷飲門

愆義有人病心腹懣煩彌二歲診曰腹有蠱誤食

髮而然令餌雄黃一劑少刻吐一碗如拇指無

目燒之有髮氣乃愈此殺毒虫之驗也

丹溪治食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈

雜眩運身熱時作時止

黃連

一兩半吳茱萸

益智仁同炒

山梔

半兩 川芎 神麩

桃仁

去皮

三稜

蓬朮

各半兩

香附

重便

山查

各一兩

蘿卜子

炒一兩半

一方有青皮

半兩

白芥



子

炒一兩半

右麩糊丸

治婦人血塊

牛膝根切焙乾酒煎溫服効

腸覃生於腸外月事時下石痕生於胞中月事不

以時下二病皆似蠱脹

並見腰門

產後消血塊

滑石

錢三

浸藥

錢二

血竭

錢一

右末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末

麩糊丸白湯下陳皮湯下妙

又方 消血塊

香附

童便浸

桃仁

去皮


為末醋糊丸


陳無擇云導引法隨意行之皆可愚謂或按摩滿

處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以

氣通為効









國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC





國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

114



Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007.

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

健忘

煩躁

不得卧

附多卧


瘰癧門

癩癧

顫振

癩狂癩門

赤水玄珠第十四卷目錄





赤水玄珠第十四卷

新安生生子孫一套著

癩狂癩門

此三證大旨已於醫旨緒餘中詳言之矣當參看

生生子曰靈樞云癩癩瘰癧不知所苦兩蹠之下

男陽女陰

後人以癩癩為一門者迹此也


又曰暴擊癩眩足不

任身取天柱

後人言風癩者迹此也

明癩症

書云多喜為癩多怒為狂難經謂重陰者癩重陽者狂



素問厥論篇曰陽明之厥則癩疾欲走呼腹滿不
得卧面赤而熱妄見而妄言長刺節論篇曰病
之初也歲一發不治月一發不治月四五發名
曰癩病又通評虛實論篇曰癩疾厥狂久逆之
所生也脉搏大滑久自已小堅急死不治虛可
治實則死

靈樞癩狂篇曰癩疾始生先不樂頭重痛視舉目
赤甚則極已而煩心啼呼喘悸先反僵因而脊
痛又有骨癩筋癩脉癩嘔多沃沫氣下泄者不

治又曰癩疾者疾發如狂若死不治

據此言疾
發如狂者

死不
治可見癩
狂非一病也

素問奇病論篇黃帝曰人生而有病癩疾者病名
何安所得之岐伯曰病名為胎病必得之在母
腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居
故令子發為癩疾

啓玄子註曰癩謂
上巔即頭首也

綱目曰以其病在頭巔故曰巔疾治之者或吐痰
而就高越之或鎮墜痰而從高抑之或內消其
痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑發



散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭
巔脉道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癩
癩之癩與厥成癩疾眩冒癩疾之癩一疾也王
註悞分癩為二疾獨孫真人始能一之今特冠
此氣亂頭癩等經文於癩癩篇首使人知疾有
所歸而治有所據也

王機徵義曰按內經言癩而不言癩古方以癩癩
或併言或言風癩或言風癩或言癩狂所指不
一蓋癩病歸于五臟癩病屬之於心故今以風
癩另立一門而癩狂合為一門也

生生子曰按此以風癩另立一門明其不與癩狂
相類則是之矣而云癩狂合為一門今終集考
之並無癩狂門目豈未之補歟

孫兆治相國寺僧克忽患癩疾半年名醫皆不効
召孫療之孫曰但有醜物儘與食之但待云渴
可來取藥今夜睡着明日便愈也至夜僧果渴
孫乃與酒一角調藥一服與之有頃再索酒與
之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故僧謝



之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏
得睡此乃靈苑方中硃砂酸枣仁乳香散也人
不能用耳

辰砂散

治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮

迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目

寃魄不守醫藥無驗

辰砂

光明有瑤
壁者一兩

酸枣仁

微炒
半兩

乳香

半兩

各為末右量患人能飲酒幾何先令恣飲但
勿令吐至靜室中以前藥都作一帖温酒調

下作一盞調之令頓飲如飲酒素少者但隨
量取醉服藥訖便安置床枕令卧病淺者半
日至一日病深者二三日令家人伺之鼻息
勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺須待其自
醒則神魄定矣萬一驚寤不可復治正肅吳
公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

經云悲哀動中則傷魂寃傷則狂妄不精不
精則不正此悲哀傷寃而狂當用温藥補魂
之陽仲景方以地黄湯本事驚氣丸之類即



是也

經云喜樂無極則傷魄，魄傷則狂。狂者意不存人，此喜樂傷魄而狂。當用涼藥補魄之陰，辰砂礬金白礬之類是也。

濟世方 治失心

礬金

七兩 兩頭四川
蟬肚者乃真

明礬

三兩

為末，薄糊為丸。桐子大，每六十九湯水任下。昔有婦人癲狂，數年不愈。後遇至人授此方，初服覺心胸中有物脫去，神氣洒然。再服頓

甦。至人云：此病憂鬱而得之，痰暴心竅。此藥能去鬱痰。

明狂症

靈樞癲狂篇曰：狂之始生也，先自悲也。喜忘善怒，善恐，得之憂飢，及狂之發，少卧不飢，自高賢也。自辨智也，自貴倨也。善罵詈，日夜不休，狂言驚善笑，好歌樂，妄行不休者，得之大恐，目妄見耳。妄聞善呼多食，善見鬼神善笑而不發于外者，得之有所大喜。

林億公曰狂為痰火盛實癲為心血不足狂病宜

大吐下

生生子曰據此言心血不足者乃醫治攻剋太過以致中氣餒弱而神志不定非癲病一起初便有此不足症也

丹溪曰神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心除熱如痰逆心竅當去痰寧心大率多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結亦有中邪而成此疾者大藥是熱又曰狂病宜大吐


下則除之

素問云陽厥強怒飲以銜落

之意予曾用數次果効於本年餘治也以前未
安心神治驚邪主癲癩鎮心熱狂走陳賢脈中
痰涎

病能為帝曰有病狂怒者此病安生岐伯曰生于

陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也曰治之柰何曰奪其食即已夫食入



於陰長氣于陽故奪其食即已使之服以生鉄落為飲生鉄落者下氣疾也

夫狂之為病少卧少卧則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填則不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

王海藏治許氏病陽厥狂怒罵詈親踈或哭或歌六脉舉按無力身表如冰后發則叫呼聲高內經云奪其食即已因不與之食乃以大承氣湯

下之得臍臍積穢數升狂稍寧數日復發下如此五七次行大便數斗痰瘕身温脉生良愈此內經奪食法也

保命當歸承氣湯

當歸

大黃

各一兩

芒硝

七錢

甘草

五錢

右每二兩水一大碗姜五片枣十枚煎至一半温服若陽狂奔走罵詈不知親踈此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜棗者胃屬土此引入胃

也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以
大利為度微緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末
吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散
解毒湯等調之安

明癩症

生生子曰癩痰火所致前人有稱為風癩者劉河
間謂由熱甚而風燥為其薰化涎溢胸膈而癩
癢昏冒僵仆也

東垣曰病癩者涎沫出于口冷汗出于身清涕出

于鼻皆陽蹻陰蹻督衝四脈之氣上行腎不任
煎煎薄糜上行為之也此奇病為病不係五行
陰陽十二經所拘當從督衝二蹻四穴奇邪之
法治之

癩症亦從衝任督三脈氣逆而發者當尋此三脈
治之○督脈尋長強擗骨間灸之○任脈尋氣
海陰交衝脈附足少陰脈上行去中行各五分
陰交穴乃任脈陰衝之會

潔古曰晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻各二七壯陽蹻



起於跟中循外踝上行入風池申脉穴也陰蹻亦起于跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉照海穴也

劉宗厚曰癰與瘰癧相類而實不同其病發身軟時醒者謂之癰身強直反張如弓不時醒者謂之瘰癧病隨其痰之潮作故有時而醒瘰癧比癰為甚而有挾虛者故因其昏冒而遂致亡者多矣

綱目曰癰癧即頭眩痰在膈間則眩微不仆痰溢

膈上則眩甚仆倒于地而不知人名之曰癰癧徐嗣伯云大人曰癰小兒曰瘰其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不同凡癰癧仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時無涎沫後不復發間有發者亦非如癰癧常發狀也

千金方云病先身熱掣癰驚啼叫喚而後發癰脉浮者為陽癰病在六腑外在肌膚猶易治也病



先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沉者為陰
癇病在五臟內在骨髓為難治也劉宗厚謂此
論癇之陰陽後世有認為寒熱者悞也蓋此疾
皆以痰熱所作而得在表而淺為陽故云易治
入裏而深為陰故曰難治乃表裏淺深之謂非
寒熱之謂也

張子和曰夫癇病不至目瞠如愚者用三聖散投
之更用火盆于煖室中令汗吐下三法並行次
服通聖散百餘日則愈矣至于目瞠愚者不可

治內經曰神不守謂神亂也大凡此疾乃肝經
有熱吐後可服瀉青丸下之劉宗厚謂多由風
痰膠固胸膈上下故大法先宜吐之吐後可用
清熱之藥如東垣安神丸守真龍會丸之類皆
可服不獨通聖散也痰實在裏不解宜導痰清
熱亦不獨瀉青丸也

劉宗厚曰按癇病古方或云風或云驚癇或云癩
癇由此疾與中風顛狂急慢驚相類故命名不
同也原其所由或在母腹中受驚或因聞大驚



而得蓋小兒神氣尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲以致痰迷心竅而作者治法必當尋火尋痰而論前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在上者必先用吐吐後方宜服此更有痰實在裏者亦須下之隨病輕重而用也或曰癰有陰陽何也予曰此與急慢驚者可同論也陽癰不因吐下由其有痰有熱客于心胸之間因聞大驚而作若

盛熱雖不聞驚亦自作也宜用寒藥以攻治之陰癰亦本于痰熱所作醫以寒涼攻下太過損傷脾胃亦而成陰宜用溫平補胃燥痰之藥治之若曰不因壞症而有陰陽之分則是指痰熱所客表裏臟腑淺深而言癰病豈本自有陰寒者哉

丹溪曰癰屬驚與痰不必分五等大率行痰為主黃芩黃連瓜蒌半夏南星隨痰火多少治之無有不愈有熱以涼藥清其心此症必用吐



吐後用平肝之藥青代柴胡川芎之類
素問大奇論篇云心脉滿大癰痺筋挛肝脉小急
癰痺筋挛

凡灸癰必須先下之乃可灸不然則氣不通能殺
人針則不拘 鳩尾穴必高手乃可下針但宜
灸亦不可多壯壯多則令人健忘

心癰面赤心下熱短氣喘息灸巨缺三壯

肝癰面青反視手足搖動灸丘墟三壯

脾癰面黃腹大善利胃腕并腕傍一寸各三壯衝

陽隱白

肺癰面白口吐沫灸肺俞少商少陽各三壯

腎癰面黑正直視身不搖如尸厥金戶少海至陰

湧泉各三壯刺一分

治癰之劑

始治多用攻痰法繼以
養心壯神補劑收功

礬丹丸 治五癰五癰無拘陰陽冷熱

礬丹

晉礬各一兩

右用磚鑿一窠可容二兩

許先安丹在下次安礬在上以炭五斤煨令
炭盡取出研細以不經水猪心血為丸如菜

豆大每服十九至二十九橘皮湯下

元戎二白丸 治癩與癰

白礬一兩以濕麪包蒸熟去麪入輕粉三五分量虛實加減丸如桐子大每服二三十丸生

姜湯下 小兒丸小些

鷓鴣丸

皂角

五條酥炙

鷓鴣頭

一枚燒存性

號冊

五錢研細

右末糯米糊為丸菴豆大每服十五丸加至二十九米飲下

神應丸 治風癰久服甚疾隨糞而下

生明礬

一斤

臙茶

五錢

右末蜜丸桐子大每服三十九臙茶下

乳硃丹

乳香

硃砂 飛

右用乳香融化拌和硃砂丸如龍眼大每服一丸以側柏葉浸酒磨化溫服

天冬散 治風癰脇痛耳鳴吐逆

天門冬

去皮

乾為末酒調下二錢



寶鑑龍腦安神丸 治男婦五種癩癩無問遠近

發作無時 地骨皮 麥門冬 桑白皮

甘草 人參各二兩 茯神三兩 馬牙硝二錢

射香 冰片各三錢 牛黃五錢 烏犀一兩

硃砂二錢 金箔大者五帖

右細末煉蜜丸彈子大金箔為衣如風癩病
冬月溫水化下夏月涼水化下不拘時二三
歲者日進二服小兒一九分作二服 虛勞
發熱咳嗽新汲水化下

茯苓丸 常服治心疾良驗

人參 石菖蒲 遠志 茯神 茯苓 辰砂

飛 南星 半夏麩 真鉄粉各等分

右末姜汁打糊丸桐子大另用辰砂為衣每
服十九加至三十九夜卧姜湯下

養心湯 治心虛血少驚悸癩痴

黃耆灸 茯苓 茯神 半夏 川歸 川芎各五錢

酸枣仁 栢子仁 五味子 人參

遠志 桂心各二錢半 甘草灸四錢 加姜枣水煎服



加赤茯苓檳榔治停水怔忡

星黃湯 治心風及邪祟

南星 大黃 等分水煎服 吐痰

蓋珠丸 治心恙及邪祟

猪心血 硃砂兩一 乾青龍花匙一

先將猪心血同龍花研勻入硃砂末和丸桐子大每二十九丸茶酒任下 甚者不過三服

治癩癩經驗方一宗先服此一劑伐和

竹茹錢一 半夏錢半 枳實 橘紅 甘草各

分五 山梔錢半 玄明粉 灯草各三 加姜末

水煎服

第二次服方可服三劑又服前方一劑又再服此

方三劑 人參錢半 黃芪錢五 歸身錢一 百合錢二

酸枣仁生三分 熟酸枣仁分四 貝母 小草各一

麥門冬分五 白芍藥吳茱萸炒過八分 甘草梢分三

茯苓 酒紅花各二分 姜片三 朮枚二 水煎服

第三方服前二方半月覺神氣稍完繼服此藥

紫河車一具洗淨砂鍋煮爛入鹽少許與服後



半月勿服藥覺少減又服前方一劑第二方三劑又再服下項丸藥仍將前二藥間服

丸藥方

牛膽南星

八錢

真牛黃

四錢

辰砂

三錢

真射香

三分

煮甘草膏為丸芡實大金箔為衣薄荷湯下

九五分

清神湯

治痰迷包絡心熱癲症

茯神

黃連

各一錢

酸棗仁

沙

后菖蒲

栝子

仁肉

遠志

各一錢

甘草

五分

水煎服

痰盛者加南星半夏橘紅瓜蒌竹瀝姜汁

海藏治癲癩狂邪不欲眠自賢自智妄行不休此

方能安五臟下心氣

白雄雞一隻煮熟五味調和作羹粥食之

仲景防已地黄湯

治病如狂狀妄行獨語不休

無寒熱其脉浮

防已

一錢

桂枝

防風

各三錢

甘草二錢右以酒一杯漬一宿絞取汁生地黃二

斤蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地

黃汁和勻分二服効

一醉膏

治心恙

無灰酒二碗香油四兩和勻



用楊柳枝二十條逐條攪一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒時或吐下即安矣

治狂之劑

瀉心湯 治心受積熱譫語發狂踰牆上屋

大黃 黃芩 黃連

每四錢水煎服瀉數行然後用安神藥調理

古參丸 治狂發無時披髮大叫殺人不過水火

苦參為末蜜丸梧子大每服十五丸薄荷湯下

調胃承氣湯 治狂方在火熱門

大承氣湯 治陽明大實發狂 方在傷寒門

抱膽丸 治癲狂不定非輕劑所能愈者

水銀二兩 黑鉛半兩 辰砂 乳香各一兩

右將鉛入銚內熔化離火畧冷入水銀攪硬

研碎入辰砂乳香乘熱用柳木槌搗勻丸如

芡實大每服一九灯心湯下病者得睡切莫

驚動覺來即安再進一九又方以猪心血為

丸井水吞下用治狂言妄語



牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂言妄語心神不安

牛黃 冰片 硃砂各一錢半 大黃生一兩

右末每服三錢生薑蜜水調下

六神散 治發狂 此二方皆禁方

寒水石 黃連壹便炒 丹皮三錢 青礞石過

龍膽草各五分 冰片二分 右末壹便調下

鎮心丹 治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡不自

知忘魂失魄狀若神靈所憑及男子遺泄女子

帶下 辰砂飛 白礬炒

右末水丸鷄豆大每一九人參湯下

婦人熱入血室發狂不認人以保命集牛黃膏妙

牛黃二錢半 硃砂 鬱金 丹皮各三錢 甘草

冰片各一錢 右末煉蜜丸枣子大新汲水化下


本事方寧志膏 治狂不睡

人參 酸棗仁各一兩 辰砂五錢 乳香二錢半

右末煉蜜丸彈子大每一丸薄荷湯化下

予族弟緣共火失心與此方服二十九良愈

親舊多傳云服之皆驗



治癩之劑

碧霞丹

治五種癩疾時作搐掣痰涎壅塞牙關

緊急心神迷悶目睛上視

石碌

研九度飛一兩

附子尖

七枚

烏頭尖

七枚

蝟梢

右末麵糊丸芡實大每用薄荷湯化下一丸

更以酒半合溫服之須臾吐出痰涎然後隨

症治之口噤者斡開灌之

仲景風引湯

除熱治癩癘又治大人風引少小

驚癩癘癘日數十發醫所不療又治脚風

大黃

龍骨

乾姜

各四兩

桂枝

三兩

甘草

牡蠣

各二兩

寒水石

赤石脂

白石脂

滑石

石

膏

紫石英

各六兩

右粗末以韋囊盛之取三指

撮井花水三升煮三沸溫服一升

治風熱癩癘食後量多少

呷之無不効不用渣

犀角丸

治風癩癘發作有時揚手擲足口吐痰

涎不省人事暗倒屈伸

犀角末

五錢

赤石脂

三兩

朴硝

二兩

白芷

全兩

薄荷葉

一兩

右末麵糊丸

梧子大每服二十丸



至三十九溫水下日三服不拘時如覺痰多

即減數忌油膩燻灸

楊氏家藏五癩丸 治癩癩不問新久並宜服之

南星 泡烏蛇肉酒浸一宿去皮骨焙乾 白礬各一兩 辰砂二錢

半全蝎二錢去尾炒 半夏二兩酒洗焙 雄黃一錢 蜈蚣半條

去頭足炙 姜蚕半兩炒 白附子兩炮半 射香錢三 皂角兩四

右先將皂角搗碎水半升揉汁與白礬同熬

乾為末入各藥末以姜汁打麵糊丸桐子大

每服三十九姜湯下

丹溪金丸丸 治諸癩

明礬 欒金 防風 牙皂角各一兩 川芎二兩

蜈蚣一條 右末蒸餅糊丸梧子大空心茶下十

五丸一日除根


錢氏五色丸 治五癩

辰砂錢五 水銀半錢 雄黃飛 玳瑁一兩 鉛三兩 同水

右末蜜丸麻子大每四五丸金銀薄荷湯下

三因六珍丹 治風癩失性顛倒欲死或作五畜

等聲掣縱吐沫久而方甦





丹砂錢五水銀半一兩鉛二兩與水雄黃雌黃

玢珠兩各一右細末煉蜜丸梧子大每服三五丸

姜東湯下丸此藥須要搗二三萬杵不然九難

嚴氏控涎丸 治諸癰久不愈頑涎聚散無時

生川烏半夏姜蚕不炒以生自然全蠲

去尾鐵粉錢三甘遂半二錢

右生姜自然汁打薄糊為丸棗豆大硃砂為

衣每服十五丸食後姜湯下忌甘草此下痰

癰也

千金龍膽湯 治嬰兒血脉盛實四肢驚掣發熱

并諸驚癰 龍膽草 鈎藤 柴胡 黃芩

桂枝 芍藥 茯苓 甘草各六 螳螂二

大黃兩一右水一升煮取五合服之

本事人參散 治諸癰并慢脾風神昏痰盛

人參錢五南星一兩切片以生薑汁并漿

右每服一錢姜三片水煎服加冬瓜仁少許

斷癰丹 治因驚成癰者

黃芪 鈎藤 細辛 半夏 南星 菖蒲各三

錢蟬退 甘草 桂心 遠志 防風 露蜂

房錢各二杏仁半錢煉蜜丸菴豆大用硃砂麝少

許為衣每服二十九丸東湯下日二服夜一服

甘遂丸 甘遂不蛀者三錢為細末將猪心剖開

入甘遂以線縛定用紙裹數層慢火煨熟不可

令焦取甘遂乘潤入辰砂末一錢搗勻作四丸

每服一丸猪心煮湯下

蛇黃丸 蛇黃小者二十枚以猪膽汁拌勻入火

煨通紅取出地上出火毒研極細 右用狗膽

一枚取汁和粟米飯丸菴豆大每服十五丸

溫酒下吐涎乃効

蛇黃丹 治諸癩及小兒急驚風

蛇黃四枚猪胆一枚內煨紅以白附子 南星 辰

砂另研麝香各錢五右末粳米糊丸桐子大每服量

大小或一二丸或三五丸溫酒米湯任下

當歸龍膽丸 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸

癩搖 即龍會丸 方在脇痛門

補胃燥痰丸 治陰癩服涼藥太過損傷脾胃



白木錢二 蒼木 陳皮 半夏 南星 茯苓各一
半錢木香錢一 藿香分七 甘草分四 甚者加附子分五
姜五片水煎服

寶鑑沉香天麻丸 治一小兒四歲因長老摩頂
受記生人念呪恐懼發搐痰涎有聲目多白睛
強項背一時許方醒後每見皂衣人即發多服
犀硃腦射鎮墜之藥已四年餘無功又添行步
動作神思如痴脉沉弦而急針經云心脉滿大
癰痺筋挛病久氣弱多服鎮墜寒涼之劑復損

正氣故添動作如痴先灸兩躡各二七壯次服
此藥

又肝脉小急蓋小兒神氣尚弱因而被驚神思
無依又動于肝肝主筋故癰痺筋挛


沉香 益智 川烏錢各二 天麻 防風 半夏

附子炮各三錢 羌活錢五 甘草 當歸 姜蚕錢各一

獨活錢四 經云恐則氣下精氣怯而上焦閉以

羌活獨活苦溫引氣上行又入太陽為引用以

為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫



以補氣血之不足養胃氣以為臣附子川烏益
智大辛溫行陽退陰又治客寒傷胃腎主五液
入脾為涎以生姜半夏燥濕化痰沉香辛溫躡
重氣清去怯安神故以為使 每服五錢生姜
三片水煎去渣溫服食前三劑愈

劉宗厚曰按癰症本從熱治然亦有壞症而成陰
者如錢仲陽所治王氏子吐瀉諸醫藥下之至
虛變慢驚手足痺癱而身冷醫復與八正散錢
氏曰不能食而胃中虛若利大小便即死久則
脾腎俱虛當身冷而閉目必用益黃散史君子
丸補脾遂能飲食後又不語錢氏以地黃丸補
腎一月而安皆此意也此方用大熱之藥乃從
權以救前治之失非常治之道也


蜜佗僧

治暗風癩癰以開痰迷心竅

蜜佗僧成塊者纏以鐵線又用鐵線掛火中煨
紅用酒醋一升淬盡出火毒為極細末每服一
錢射香湯調下

許學士驚氣丸

發則牙關緊急涎潮昏塞醒則



精神若痴

附子

木香

姜蚕

白花蛇

橘紅

天麻

麻黃

乾蠋

天南星

姜汁浸一夜各五錢

蘓子

兩

硃砂

二錢半為衣

右為末加水射少許煉蜜丸如龍眼大每服一丸金銀薄荷湯化下溫酒亦可此予家秘方也一軍人犯法臨刑得釋縛精神頓失如痴與一丸服訖而寐及覺病已失矣一婦因避盜失心數年授此方不終劑而愈又一婦

狂厥者十年諸治不驗予授此方去附子加鉄落亦不終劑而愈鉄粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪大盛鉄粉能制伏之此金制木之意也

顫振門

生生子曰顫振者非寒禁鼓慄乃木火上盛腎陰不充下虛上實實為痰火虛則腎虧法則清上補下


新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣



成風搖已三年矣病大發則手足顫掉不能持
物食則令人代哺口目張睽唇舌嚼爛抖擻之
狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜卧發熱衣
被盡蹇遍身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手
不能繩傾產求醫至破其家而病益堅叟之子
邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病
甚易治若陰暑時不過一涌再涌奪則愈矣今
已秋寒可三之如未更刺膻穴必愈先以通聖
散汗之繼服涌劑則痰一二升至晚又下五七

行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如鷄
黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代
探咽嗑腫傷昏愒如醉約一二時許稍省又
下數行立覺足軀顫減熱亦不作足亦能步手
能巾櫛自持匙筋未至三涌病去如濯病後但
覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾
之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可
以熱劑溫之恐反成他病也

生生子曰據戴人此治非真知其為痰火盛實者



莫敢如此療也木之有餘由金之衰弱病既久
恐亦有始同而終異者况吐汗下之後謂絕不
必補養得乎病之輕者或可用補金平木清痰
調氣之法在人自斟酌之

摧肝丸 鎮火平肝消痰定顫

膽星 鈎藤 黃連炒酒 滑石飛 鉄華粉各一兩

青黛三錢 姜蚕炒五錢 天麻酒洗二兩 辰砂飛五錢 大甘草

二錢 右末以竹瀝一碗姜汁少許打糊充棗豆大
食後及夜茶下一錢五分忌鷄羊

本事鈎藤散 治肝厥頭搖眩暈能清頭目

鈎藤 陳皮 半夏 麥冬 茯苓各七分 人參

甘菊勿樛用野菊 防風各五分 石膏一錢 甘草三分

姜二片水煎服

參朮湯 氣虛顫掉

人參 白朮 黃芪各二錢 茯苓 甘草 陳皮

各一錢 甚者加附子 水煎服

統旨秘方補心丸 心虛手振

當歸 生地各一兩半 川芎 甘草 人參各一兩





栢子仁

酸枣仁

各三兩

遠志

去心二兩半

辰砂

飛

膽星

各五錢

金箔

二十片

麝香

錢一

琥珀

錢三

石菖蒲

錢六

茯神

去皮心七錢

為末 餛餅糊丸 菘豆大 辰砂為衣

每七八十九津唾嚥下或姜湯下

統旨秘方定心丸

老人戰動風氣所致及血虛

而振

天麻

蒸熟

秦艽

去蘆

全蠲

去頭尾

細辛

各一兩

熟地

生地

川歸

川芎

芍藥

各二兩

防風

荊芥

各七錢

白朮

黃芪

各兩半

葶靈仙

酒洗五錢

為末 酒糊丸 梧子大 每服七八十九丸 食遠白

湯或酒送下

癰瘕門

生生子曰癰縮也癰伸也伸縮不止手如拽鋸搗

之類也汗多不止為虛無汗能食為實

內經曰心脉急甚者為癰瘕此心經虛寒治宜補

心牛黃散之類

又曰心脉滿大癰癰筋挛此心火實熱也治宜瀉

心火涼蘄丸主之

又曰肝脉小急亦癰癰筋挛此肝虛也宜續斷丸

主之若肝脉盛宜救脾加減建中湯內經謂脾
脉急甚亦為痺癢此脾虛肝乘之而痺也故宜
實土瀉木之劑建中湯是也

劉河間曰諸熱瞽癢皆屬于火熱勝風搏并于經
絡風主動而不寧風火相乘是以瞽癢生矣治
以祛風滌熱之劑折其火熱瞽癢立愈若妄加
灼艾或飲以發表之劑則死不旋踵矣

東垣人參益氣湯 熱傷元氣四肢困倦手指麻
木時時痺癢 黃芪錢二 甘草錢二 升麻各五分 柴胡

六分 五味子三十一粒 甘草生五分 人參一錢二分 白芍七分

水煎服

獨活湯 風虛昏瞶不自知覺手足痺癢或為熱

血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之


獨活羌活 人參 防風 川歸 細辛 茯苓

神 遠志 半夏 桂心 白薇 菖蒲 川

芎各五錢 甘草錢半 每一兩姜五片煎溫服

胃風飲 虛風症能食麻木牙關緊急手足痺癢
目肉蠕睞胃中有風面腫





白芷 二錢 升麻 二錢 葛根 蒼朮 蔓荊子

川歸身 各一錢 甘草 柴胡 藁本 羌活

草豆仁 黃柏 麻黃 不去節 各五分 姜三片 枣二

枚 水煎溫服

千金薯蕷丸 腎氣虛弱風氣百疾頭眩驚悸癰

癰 薯蕷 廿八分 當歸 十分 桂心 七分 神曲 炒 熟地黃

人參 各十分 川芎 芍藥 白朮 麥冬 杏仁

各六分 甘草 一分 柴胡 桔梗 茯苓 各五分 鹿角

膠 七分 乾姜 白欬 各三分 防風 黃芩 各六分 大豆

黃卷 七分 大棗 百枚 右末和棗膏加煉蜜丸如

彈子大空心酒服一丸日三服

續斷丸 肝勞虛寒脇痛脹滿眼昏不食挛縮癰

癰 續斷 酒浸 川芎 川歸 半夏 姜製 橘紅 乾

姜 炮各一兩 桂心 甘草 炙各五錢

右末煉蜜丸桐子大每百丸白湯下

牛黃散 心虛風筋脉挛搐神昏語澀

牛黃 冰片 硃砂 射 各一錢 蟬退 烏蛇肉

各一兩 全蠍 炒 姜蚕 炒 桑螵蛸 羚羊角 天麻

阿膠 防風 甘菊 桂心 細辛 蔓荊子
側子去皮 獨活 犀角各五錢 麻黃七錢半
右為末和勻再研每服一錢荳淋酒下
續命煮散 風氣留滯心中昏瞶四肢無力口眼
潤動或時搖擗或渴或自汗
防風 獨活 當歸 人參 細辛 葛根
熟地黄 芍藥 川芎 甘草 遠志 荆芥
半夏各五錢 官桂七錢半 每一兩姜三片煎汗多者
加牡蠣一錢半


獨活散治風熱化痰 細辛 石膏 甘草各五錢

獨活 防風 藁本 旋覆花 川芎 蔓荊

子各一兩 右每服三錢姜三片水煎服

瘧門 附勞風

生生子曰內經云肺移熱于腎傳為柔瘧瘧古云
瘧勁切之謂也仲景諸公傷寒書皆以為太陽
風濕所致亦有蕪陽明經者仲景謂汗下過多
及瘡家發汗過度皆成瘧此指外感之邪原係
傷寒家法也陳無擇張子和諸公云亦有風火



痰熱之內因者謂此病多由亡血筋無所營故邪得以所釀丹溪謂此癰為虛此皆指內傷之症也觀剛柔二字則亦當有虛實之別大抵剛者多從外感柔者多從內傷故治斯疾者但明知從外感而來則用傷寒家法若從雜症而來則用陳無擇丹溪劉宗厚張子和諸家之法庶表裏詳盡始無遺此失彼之患矣

內經云諸瘧項強皆屬于濕

王注大陽傷濕

又云諸暴強

直皆屬于風

王注陽內營而陰行于外

劉宗厚云按內經言


瘧肺腎太陽督脈與夫六氣皆能為之大抵皆主于濕

仲景云太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧

成無已曰瘧者瘧也強也千金曰太陽中風重感寒濕則變瘧太陽病發熱無汗為表實則不當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感于寒為瘧病也以表實感寒故曰剛瘧

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔瘧

成無已曰太陽病發熱汗出為表虛則當惡寒



其不惡寒者為陽明病今發熱汗出而不惡寒者非陽明証則是太陽中風重感于濕為柔瘧也表虛感濕故曰柔瘧

太陽病發熱脉沉而細者名曰瘧

成無已曰太陽主表太陽病發熱為表病脉當浮大今脉反沉細既不愈則太陽中風重感于濕而為瘧也金匱要畧曰太陽病其証備身體強兀兀然脉反沉細此為瘧括菱桂枝湯主之

太陽病發汗太多因致瘧

成無已曰太陽病發汗太多則亡陽內經曰陽氣者精則養神柔則養筋陽微不能養筋則筋脉緊急而成瘧也

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨搖頭卒口噤背反張者瘧病也

成無已曰太陽中風為純中風也太陽中寒為純傷寒也皆不作瘧惟是太陽中風重感寒濕乃變為瘧也身熱足寒者寒濕傷下也時頭熱面赤目脉赤風傷于上也頭搖風主動也獨頭



搖者頭為諸陽之會風傷陽也若純傷風者身亦為動搖手足為之搖擗此皆內挾寒濕故頭搖也口噤者寒主急也卒口噤者不常噤也有時而緩若風寒相搏則口噤而不時開此皆加之風濕故卒口噤也足太陽之脉起于目内眦上額交巔上其支別者從巔入絡腦還出别下項循肩膊内夾脊抵腰中下貫臀以下至足風寒客于經中則筋脉拘急故頸項強急而背反張也

風病下之則瘥洩發汗必拘急

瘥家雖身疼痛不可發汗、出則瘥

劉宗厚曰按此謂汗下而致瘥則不專于風寒濕之外傳矣是又因壞證而成也發汗下之太過皆亡津液損血之所由也


劉宗厚曰按瘥症屬風寒濕所傷有汗者脉必浮緩無汗者脉必浮緊若其脉沉細者濕所傷也堅直上下行皆緊之象也發汗已其脉如蛇亡津液而無胃氣之象也



子和云呂君王妻年三十病風搖目眩角弓反張
數日不食諸醫皆作驚風暗風風癩治之以南
星雄黃烏附用之不効戴人曰諸風掉眩皆屬
肝木曲直搖動風之用也陽主動陰主靜由火
盛制金金泉不能平木肝木茂而自病因湧風
痰二三升次以寒劑下十餘行又以排針刺百
會穴出血一杯愈

劉宗厚曰按風搖本與痙症不同而痙症屬濕土
極必兼風木動搖之化風搖屬木木極必見金

燥緊歛之形要之亦可同論故取此條以證痙
病不專風寒濕之外至亦有風火熱之內作也
三因方云夫人之筋各隨經絡結束于身血氣內
虛外為風寒濕熱之所中則痙以風散氣故有
汗而不惡寒曰柔痙寒泣血無汗而惡寒曰剛
痙原其所因多由亡血筋無所營故邪得以襲
之所以傷寒汗下過多與夫病瘡人及產後致
于斯疾者槩可見矣診其脉皆沉伏絃緊但陽
緩陰急則久久拘攣陰緩陽急則反張強直二



證各異不可不別

丹溪曰瘧切不可作風治兼用風藥 大率與癩

相似比癩為甚為虛宜帶補 多是氣虛有火

有痰宜用人參竹瀝之類 一男子二十餘歲

患瘧瘡醫謝後忽患口噤不開四肢強直不能

屈時或遠臍腹痛一陣則冷汗如雨痛定則汗

止時作時休其脉絃緊而急如真弦狀向知此

子極勤舌意其因勞倦傷血山居多風寒乘虛

而感又因瘧瘡其血愈虛當用辛溫養血辛涼

散風遂以當歸芍藥為君川芎青皮釣藤為臣

白朮陳皮甘草為佐桂枝木香黃連為使更加

紅花少許服二十帖而安

王海藏云發汗太過多因致瘧身熱足寒項強惡


寒頭熱面腫目赤頭搖口噤背反張者太陽瘧

也 若頭低視下手足牽引肘膝相搆陽明瘧

也 若一目或左右邪視并一手足搐搦者少

陽瘧也汗之止之和之下之各隨其經可使必

已 在表無汗宜汗之有汗宜止之陽明瘧屬



裏宜下之少陽瘧半表半裏宜和之所謂各隨其經也

劉宗厚曰謹按傷寒瘧病活人以太陽中風又感寒濕而致則專于外邪所傷然仲景亦有汗下過多之戒則又出于壞証所成矣蓋外邪所傷者通宜解散仲景言剛柔活人分陰陽難知論經絡等諸方詳矣至于治壞証補虛救失之法諸方則亡也又千金謂溫病熱入腎中亦為瘧小兒病癩熱盛亦為瘧若此治法俱未見之也

况此二者之外又有血氣本虛之人如產後汗出多而變瘧者或因七情怒氣而發瘧者或因濕熱內盛痰涎壅遏經絡而作瘧者治各不同也大抵傷寒有外邪之可解宜用風藥發散風寒又風藥亦能勝濕耳至于邪熱入腎亦非風藥之所能療也其內證作瘧本無外邪前人豈可仍用風藥處治惟宜補血降火敦土平木清痰去濕隨證而用不可不察也

海藏云若汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來



寒熱脉弦者少陽風痙宜柴胡防風湯

柴胡

防風

人參

黃芩

半夏

各五錢 刺六錢

生姜

甘草

各六錢 半三枝

每服一兩水煎服

若發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽兼陽明也宜去風養血防風當歸散主之

防風

當歸

川芎

地黃

每服一兩水煎

神木湯 治剛痙解利無汗

蒼朮

錢三

防風

錢二

甘草

錢一

姜蔥水煎服

白朮湯

加桂心

黃芪

治柔痙

解利

有汗

白朮

兩三

防風

兩二

甘草

兩一

每服五錢

姜三片

水煎服一日二服漸汗止為解

仲景葛根湯

太陽無汗而小便少氣上衝胸口

禁不得語欲作剛痙者

葛根

兩四

麻黃

生薑

兩各三

桂枝

芍藥

甘草

兩各二

大棗

兩十二

每服五錢

煎服取微汗

若發熱無汗惡寒名曰剛痙宜麻黃加獨活防風

湯

麻黃

桂枝

芍藥

甘草

獨活

兩各一

每服一兩水煎溫服

防風

兩各一

每服一兩水煎溫服



瓜蒌桂枝湯 太陽病其証備身體強兀兀然脉

反沉遲此為柔瘧

瓜蒌根 甘草 芍藥 桂枝 生姜

大棗 水九升煎取三升分三服取微汗

汗不出啜粥發之

海藏 治發汗自汗而不惡寒者名柔瘧宜桂

枝加川芎防風湯

桂枝 芍藥 生姜 甘草 防風 川芎

每服一兩水煎服

凡剛柔二瘧皆可與小續命湯 但要識加減法

若柔瘧自汗者去麻黃夏間及病有熱者減桂

枝一半冬及初春去黃芩

千金續命湯 卒中半身不遂手足拘急不得屈

伸身體冷或智或痴或身強直不語或生或死

狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食

大小便不利皆療之

人參 桂心 川歸 獨活 黃芩 甘草

乾姜 炮各七 后膏 杏仁 以水九升煮



取三升分温三服日二服無汗者加麻黃

若汗後不解乍靜乍躁目直視口噤徃來寒熱脉弦者少陽風痙宜柴胡加防風湯

柴胡 防風各一兩 人參 黃芩各五錢 半夏六錢 生

姜 甘草各六錢 束三枚 每服一兩水煎

倉公當歸湯 賊風口噤角弓反張痙証

川歸 防風各七錢半 獨活一兩 附子一枚 細辛五錢 麻

黃一兩三錢 酒五升煮取三升服一升口不開者

祿口納之一服當蘇二服小汗三服大汗

活人八物白朮散 陰痙一二日面腫手足厥冷

筋脉拘急汗不出恐陰氣內傷

麻黃 白朮 茯苓 五味子 羌活各五錢 桂

心 附子各三分 良姜一分 每四錢姜五片水煎服

附子散 陰痙手足厥逆筋脉拘急汗出不止頭

項強直頭搖口噤

桂心 川芎各三錢 附子炮 白朮各一兩 獨活五錢

每三錢束一枚水煎服

桂心白朮湯 陰痙手足厥冷筋脉拘急汗出不



止 白朮 防風 甘草 桂心 川芎 附

子 每五錢姜五片束二枚水煎溫服

丹溪治虛婦因怒手足強直十指如束右手脉弦
虛左手脉弦大而強稍堅此風木攻脾土宜速
瀉肝氣助肺金補脾土之陰

黃連二錢 南星 白朮 人參 黃芩 天麻

川芎 木通 陳皮 青皮各五分 甘草一分

水煎入姜汁辣服

肘後方 中風體強直不得屈伸反覆刮桤樹皮

細切一升以酒二升浸一宿每日溫服半升酒
盡再作枳實樹皮
去風溫効

千金方 治口噤手足不隨而手體強直

伏龍肝五升以水七升攪勻取汁飲之

瘥瘥辯

生生子曰丹溪云瘥當作瘥傳寫之悞耳攷之諸
書亦未有能辯之詳註之確者惟郭雍氏云瘥
與瘥當是二病謂昔劉寅氏有言病以時發者
謂之瘥不以時發者謂之瘥似亦未能詳悉厥



後以其所歷見及治之効與不効者反覆考攷
二症之名二字之義其用心可謂至勤至懇者
矣然終未能昭著允若故後之人疑其為二症
者不亦宜乎愚按靈素仲景以下諸書云瘧云
瘧字雖兩般治多雷同殆亦不必犁而為二也
苦辯之則愈支離膚見謂瘧乃病之名瘧乃病
之狀原其有剛柔二種以病發之時而經筋脉
絡僵勁角弓反張故曰瘧瘧是勁急也是以其
病發之狀象而名之也不然何歷代諸公或以

治瘧之方治瘧或以治瘧之方治瘧諸皆能効
治既同而不殊則瘧當一而不二也焉用分

勞風

即瘧之類

丹溪云瘧比痢為虛蓋因勞汗遇風內挾太陽寒
濕之邪治亦與瘧同法但當視其所勞則知虛
在何臟如房勞則腎虛汗出腠理開風入皮腠
得寒則閉風不能出與水俱行其人當目下腫
如卧蚕之狀戴人云腎主水其經至于目下故
也不禁房室則死明其虛在腎也所以関于太



陽何也太陽主寒其經最在外腠理得寒則閉
故太陽先受邪也治宜八物白朮散倉公嘗

黃芪湯 汗多氣虛發瘧

黃芪 蜜炙 二錢 人參 白朮 茯苓 白芍 炒 各一錢

甘草 炙 八分 桂枝 五分 水煎服

當歸散 血虛及去血過多發瘧

當歸 酒洗 二錢 川芎 熟地 防風 黃芪 各一錢

芍藥 半一錢 甘草 四分 水煎服

理氣平肝散 七情所傷發瘧

烏藥 香附 各一錢半 青皮 枳殼 芍藥 川芎

柴胡 木香 各一錢 甘草

姜三片水煎服木香磨水二匙加入

清痰湯 痰久攻作項強口噤角張反瘧

山梔 黃芩 半夏 炮 橘紅 茯苓 瓜蒌仁

枳殼 貝母 香附 重便浸 各一錢 甘草 五分

水煎入竹瀝姜汁各三四匙食遠服

去濕青熱散

白朮 二錢 蒼朮 半二錢 澤瀉 茯苓 天花粉 山



梔各一分 羌活七分 甘草四分 水煎服

芎藭丸 治勞風強上冥視肺熱上壅唾稠

川芎 枳殼等分 為末蜜丸桐子大每服三五

十九食後溫水下日三服

祛風清金散 肺熱壅盛痰唾如膿

防風 括萎根 桔梗 枳殼 旋覆花 川

芎各一分 山梔 黃芩 貝母 瓜蒌仁炒 茯苓

天門冬 麥門冬 橘紅各八分 五味子十五粒 甘

草四分 水煎服

生生子曰按內經評熱病論篇帝曰勞風之病何如岐伯曰勞風發在肺下其為病也使人強上冥視唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病帝曰治之柰何岐伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬出清黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也

引精謂目中之精明引動能辨人與物也

啓玄子註曰勞風者從勞風生故曰勞風勞謂腎



勞也腎脉者從腎上實肝膈入肺中故腎勞風
生上居肺下也強上好仰也冥視謂合眼視不
明也腎精不足外吸膀胱膀胱氣不能上營故
使人頭項強而視不明也肺被風薄勞氣上薰
故令唾出若鼻涕狀腎氣不足陽氣內攻勞熱
相合故惡風而振寒肺傷則營衛散解魄不內
治故宛林氏謂強上者似角弓反張也冥視者
目開不見物也凡瘖病皆同不識人或反視斜
視也治法當與瘖同千金方冥視作目眩

不得卧

靈樞曰病而不得眠者何氣使然岐伯曰衛氣不
得入于陰常留于陽晉于陽則陽氣滿陽氣滿
則陽驕盛不得入于陰則陰氣虛故目不瞑矣

大意論

黃帝問于伯高曰夫和氣之客人也或令人目不
瞑不卧出者何氣使然伯高曰五穀入於胃也
其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積于胸中
出於喉嚨以貫心脉而行呼吸焉營氣者泌其



津液注之於脉化以為血以榮四末內注五臟
六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而
先行于四末分肉皮膚之間而不休者也晝日
行于陽夜行于陰常從足少陰之分間行于五
臟六腑今厥氣客于五臟六腑則衛氣獨衛其
外行于陽不得入於陰行于陽則陽氣盛陽氣
盛則陽蹻陷不得入于陰陰虛故目不瞑黃帝
曰善治之柰何伯高曰補其不足瀉其有餘調
其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑

陰陽已通其卧之至黃帝曰善此所謂決瀆壅
塞經絡大通陰陽和得者也頽聞其方伯高曰
其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取
其清者五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升
治半夏五合徐炊令竭為一升半去其滓飲汁
一小杯日三稍益以知為度故其病新發者覆
杯則卧汗出則已矣久者三飲而已矣此去飲之劑也
內經曰胃不和則卧不安帝曰人之不能偃卧者
何也岐伯曰肺者臟之蓋也肺氣盛則肺大肺



大則不能偃卧

王海藏云膽虛不眠寒也聖惠方酸枣仁炒為末以竹葉湯調服

張子和治一富家婦人因思慮過甚二年不得寐無藥可療其夫求治脉之兩手俱緩此脾受邪也脾主思故也乃與其夫議以怒激之多取其財飲酒數口不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是食其脉得平

此怒勝思法也

水腫病令人不得卧卧則驚則欬甚此水氣凌肺也

温膽湯治大病後虛煩不得眠或則驚悸極効丹溪治煩不得眠益元散加牛黃服之

有心血不足而不寐者用益榮湯

仲景酸枣湯 治虛煩不得眠

酸枣仁二升 甘草一兩 知母 茯苓 川芎各一兩

水八升煮酸枣仁得六升內諸藥煎取三升

分温三服 一方加生姜二兩

本事驚甲丸 膽虛不得眠四肢無力

酸枣仁 驚甲 羌活 牛膝 黃芪 人參



五味子

各等分

蜜丸梧子大每四五十九温酒下

聖惠酸枣地黄湯

骨蒸勞煩心不得眠

酸枣仁

一兩

水一大碗半研絞取汁下米二合煮

粥熟再入地黄汁一合更煮過不計時服之

六物湯治振悸不得眠

四君子加酸枣仁

生薑煎服

許學士珍珠母丸

肝虛內受風邪卧則寬散而

不收狀若驚悸

珍珠母

另研末三錢

當歸

熟地

各一兩

人參

茯苓

酸枣仁

栝子仁

犀角

各一兩

沉香

龍齒

各五錢

錢 為末蜜丸梧子大辰砂為衣每四五十九金

銀薄荷湯下日午及夜服

一方多虎睛一對射春一錢

獨活湯 治同前相兼服

獨活

羌活

人參

前胡

細辛

半夏

酸枣仁

沙參

茯苓

甘草

五味子


各等分

每七錢姜三片烏梅一箇不拘時煎服

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧

每卧則竟飛揚覺身在牀而神竟離体驚悸多


魔通夕無寐更豎不効予為診視詢之曰豎作



何病治董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝
經受邪非心病也肝氣因虛邪氣散之肝藏魂
者也遊魂為變平人肝不受邪卧則魂歸于肝
神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧則魂
飛揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰
前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣願求
治之予曰公且持此說與衆醫議所治之方而
徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方無與病
相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除

此方用真珠母為君龍齒佐之真珠母入肝經
為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以
為鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其
類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎
金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎
能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以
虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不
失在夫人達之而已

益榮湯 血不足不寐及怔忡驚悸



當歸 黃芪 遠志 酸棗仁炒 茯神 栝子
仁 麥冬 白芍 人參 紫后英各一錢 木香
七分 甘草五分 姜三片 枣二枚 水煎服

多卧

黃帝曰人之多卧者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉腸胃大則衛氣留久皮膚濕則分肉不解其行遲夫胃氣者晝常行于陽夜行于陰故陽氣盡則寤陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則

行遲留于陰也久其氣不精則昏故多卧矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解則衛氣留于陽也久故少瞑焉黃帝曰其非常經也卒然多卧者何氣使然岐伯曰邪氣留于上焦上焦閉而

不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒

然多卧焉

大惑篇

海藏曰膽實多睡熱也

生枣湯 治膽熱多睡

生酸枣仁為末 茶姜汁調服



又方

生酸枣仁

兩一

鵬茶

兩二

以生姜汁塗灸

微焦為末每服二錢水七分煎六分溫服

醒睡湯

酸枣仁

沙參

錢各一

麥冬

錢一

茯神 甘

草

各五

姜一片水煎服

煩躁門

仲景云煩屬肺躁屬腎火入於肺則煩入于腎則躁大抵煩躁皆心火為病火旺則金燥而水虧也惟火獨存故肺腎合而為煩躁又脾經絡于心中心經起于脾中二經相搏濕熱生煩夫煩

者擾擾心亂兀兀欲吐怔忡不安

成無已曰煩為擾亂而煩躁為憤怒而躁合而言之煩躁為熱也析而言之煩陽也躁陰也煩為熱之輕者躁為熱之甚者

陳無擇曰內熱為煩外熱為躁又曰虛煩身不覺

熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清又不寐皆虛

煩也

婁英曰先賢治煩躁齊作有屬熱者有屬寒者獨煩而不躁者多屬熱惟悸而煩者為虛寒躁不煩者多屬寒惟火邪者為熱蓋煩者心中煩或

胸中煩皆內熱也躁者身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲坐井中為外熱也內熱者有本之熱故多屬熱外熱者多是無根之火故屬寒生生子曰仲景成無已二公所論煩躁皆為火熱是祖內經夫熱病皆傷寒之類也乃傷寒家語言其邪自外而入至于煩躁皆為熱候予謂躁有陰陽煩有虛實陶節庵曰先煩而悸者為實先悸而煩者為虛又曰煩漸生躁有陰陽虛實之別心熱則煩陽實陰虛腎熱則躁陰實陽虛

煩為熱輕躁為熱重此亦傷寒家語也雜症之煩躁又各有虛實寒熱不同須當分別而治虛煩者心中擾亂精神不能任持似脹不脹悒悒悶飲食不甘美睡卧不安寧者是也治以養心血鎮火安神之劑如安神丸之類實煩者或心火熾盛或水飲痰涎停于胸膈壅悶不安者是也治以消痰逐飲散邪之劑如梔子豉湯蠲飲湯五苓散之類陽躁者煩渴欲飲憤激躁怒二便不利經云諸躁狂越皆屬于火者是也




治如丹溪用妙香丸之類陰躁者渴不欲飲極其躁擾或上熱下寒此為陰盛格陽為陽氣虛憊不能凌入皇、欲坐井中者是也治以理中湯回逆湯之類大抵煩症多屬于虛經曰夏脉者心也其不及令人煩心又云肝腎脾虛皆令人体重煩寃迹是知煩多由于虛也當尋傷寒法外之治今錄治方于左以備採用
內外俱虛身冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆不得安靜者死 熱病七八日其脉微細小便不

利加暴口燥脉代舌黑焦乾者死

保命集云起卧不安睡不穩謂之煩宜梔豉湯竹葉石膏湯

活人書云但獨熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實也不可下病此者內外皆不可攻之必遂煩渴當與竹葉湯若嘔者與陳皮湯一劑不愈再與之孫真人云此法數用有效



陳皮湯

陳皮一兩

甘草炙

竹茹各五錢

人參一錢

每服七錢姜三片棗二枚水煎服

淡竹茹湯

心虛悶頭疼短氣內熱不解心中悶

亂及產婦心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬去心

小麦各二兩

甘草炙

人參

茯苓

各

一

兩

半夏湯洗

每服四錢

姜七片

棗二枚

淡竹

茹

一塊

水煎服

東垣硃砂安神丸

心亂煩熱怔忡心神顛倒兀

兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊懣之狀皆膈上

血中伏熱蒸之不安宜用權法以鎮陰火之浮

行以養上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸

生地又為長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕

熱硃砂納浮游而安神明方見怔忡門


仲景下痢後更煩按之心下濡者為虛煩也

丹溪治一女子年二十餘歲在室素強健六月間

發煩悶困憊不食發時欲入井六脉皆沉細而

弱數兩日後微渴衆以為病暑治不効四五日

加嘔而人瘦手心極熱喜在陰處漸成伏脉時



妄語予急製局方妙香丸如桐子大以井水下
一丸半日許大便藥已出病無退減遂以射香
水洗藥以針穿三竅次日以凉水送下半日許
大便下稠痰數升是夜得睡困頓伏枕旬日而
愈因記金匱云昔肥而今瘦者痰也遂作此藥
治之

妙香丸丹溪云疏決腸胃制伏木火藥也

辰砂

飛五兩

牛黃

龍腦

膩粉

射

研各一兩

巴豆

一百五十粒去皮膜炒熟研

金箔

九十片

右研勻煉黃蠟六兩

入好蜜三分同煉令勻為丸每兩作三十丸
如要此藥速行針刺一眼子冷水浸少時服
効更速小兒百病丸如菜豆大

遠志湯 治心虛煩熱夜卧不寧及病後虛煩

遠志

去心

黃芪

當歸

麥冬

石斛

酸枣仁

炒各一錢二分

人參

茯神

各七分

甘草

五分

水煎服

煩甚者加竹葉知母

竹葉湯 傷寒大病後及霍亂吐瀉後心虛煩悶

內熱不解 竹葉 麥冬 人參 茯苓 小



麥 半夏 各一兩 甘草 五錢 每六錢姜五片水煎服

小草湯 虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃芪 川歸 麥冬 石斛 酸棗仁

各一兩 人參 甘草 各五錢 每六錢姜五片水

煎服

地仙散 傷寒後伏暑後煩熱不安及虛勞不安

地骨皮 二兩 防風 一兩 甘草 五錢 每六錢姜五

片水煎服

竹茹麥冬湯 大病後表裏俱虛內無津液煩渴

心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不

痛不可汗下者 淡竹葉 麥門冬 等分 每八錢

水煎

酸棗仁湯 霍亂吐下後增劇虛勞煩擾奔氣在

胸中不得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁 一兩七錢半 人參 桂心 各二錢半 知母 茯苓

各三錢 石膏 五錢 甘草 二錢 每七錢姜東煎服

人參竹茹湯 胃口有熱嘔吐欬逆虛煩不安

人參 五錢 半夏 一兩 分二帖加姜七片陳皮二



錢半竹茹一錢水煎服

竹茹石膏湯 大病後餘熱煩悶

溫膽湯 大病後虛煩不得眠及驚悸

五苓散 水停心下作驚悸煩悶

清心蓮子飲 方見癰閉門

梔子豆豉湯 治邪在上焦

四逆湯

理中湯

健忘門

戴元禮曰健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非比生成之愚頑也

靈樞經曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心氣虛則榮衛留于下久之不以時上故善忘也

丹溪心法曰此証皆由憂思過度損其心胸以致神舍不清遇事多忘病在心脾凡思傷脾以故令人轉盼遺忘治之以歸脾湯須兼理心脾神寧意定其証自除也



歸脾湯

思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯神

黃芪

酸棗仁

各一人參

木

香

甘草

炙二錢半

每六錢姜三片棗二枚圓

眼肉五枚水煎服

定志丸

心氣不定恍惚多忘

遠志

石菖蒲

各二兩

人參

一兩

白茯苓

三兩

右末煉蜜丸梧子大硃砂為衣每服三十九

米飲下

一方加茯神

加味茯苓湯

痰迷心竅健忘失事

二陳湯加益智仁香附人參姜水煎服

讀書丸

健忘服之日記千萬言

石菖蒲

兔系子

遠志

各一兩

地骨皮

二兩生地

五味子

川芎

各一兩

為末薄糊丸梧子大每服

七八十九臨卧白湯下

孔子大聖枕中湯

常服令人聰明

龜甲

龍骨

遠志


菖蒲

各等分為末酒

服方寸七日三服

聖惠千金翼同

補心虛治健忘令人耳目聰明



以戊子日服之開心不忘

菖蒲 遠志 各等分為末每服方寸匕常服

令人耳目聰明從外見裏令人長生去三百
病毒不能為害

二丹丸 安神定志和血治健忘

熟地黄 天門冬 丹參各一兩半 茯苓 甘草各一兩

遠志 人參各五錢 麥門冬一兩 右末煉蜜丸梧

子大硃砂五錢為衣每服五十九丸白湯下

又讀書方

菖蒲遠志桂甘草 地骨人參巴戟天

倍煮茯苓糊丸服 讀書日記萬千言

狀元丸 教子第一方

菖蒲去毛 遠志甘草水煮去 白茯苓去木 巴戟


天心五錢 人參 地骨皮去心各三錢

右末用白茯苓去皮二兩糯米二兩共為粉

用石菖蒲三錢煎濃湯去渣打糊為丸每食


後午時臨睡各服三五十九






國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

31



Inches

Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black



赤水玄珠第十五卷目錄

秘結門

大小便不通

閉癃遺溺不禁辨

小便不通門

癃門

遺溺門

小便不禁門

溺赤



脫肛門

附炭
腸病

前陰諸疾門

疝門

赤水玄珠第十五卷

新安生生子孫一奎著輯

秘結門

經曰大便者腎之所主腎主五液也腎氣充則大便潤虛則津液耗竭而燥結矣又飢飽勞役損傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火邪伏於血中煎熬真陰皆能使大便燥結又有年老陰血不足而燥者惟當補而潤之不可用峻利之劑又大便秘結者不得發汗、則重亡津液必秘



結而死矣

有陽結有陰結有風結有實結有虛結有氣秘有血秘

仲景曰脉浮數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇陽結者散之陰結者熱之風結者諸藥中加羌活防風之類此二味雖是風藥然味辛所以能潤燥也經曰

腎惡燥急食辛以潤之

潔古曰臟腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者能食小便赤以麻仁九七宣丸之類主之胃虛不能食而小便清利者厚朴湯主之實秘者物也虛秘者氣也

東垣曰有物有積而結者當下之食傷太陰腸滿

食不化腹嚮嚮然不能大便者以苦泄之仲景

九局方七宣丸皆以治注夏大便瀯滯者血少

大黃為君之類是也血中伏火也黃耆人參湯加生地當歸身桃仁泥潤之如潤之大便仍久不快者少加煨大黃



微利之如加大黃久不快利者非血結血秘是
熱生風止當服黃耆人參湯內用羌活防風各
五錢水四盞煎至一盞空心服之其便必大也
丹溪戒人用峻利但宜滋養陰血使孤陽之火不
熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行津
液津液入胃則腸潤而通矣須知在西北以開
結為主在東南以潤燥為主慎勿膠柱而調也
王海藏云桃杏仁俱治大便秘當以血氣分之年
老虛人大便秘脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉

在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其干
陽明病與手太陰為表裏也

脉多沉伏而結 陽結脉沉實而數 陰結脉
伏而遲或結 老人虛人便結脉雀啄者不治

七宣丸

紫胡

枳實

炒

訶子皮

木香

各五

桃仁

去皮

尖炒

甘草

炙四

大黃

麴包

右煉蜜丸

桐

子


每服二十九米飲下漸加四五十丸以利

為度

厚朴湯

胃虛而秘者不能飲食小便清利





陳皮 半夏麴炒 枳實炒各一兩 甘草炙 厚朴製各二兩

白朮兩三 每三五七錢 姜三片 朮一枚 水煎服

保命集大黃牽牛散 相火之氣遊走臟腑大便

秘結 大黃兩一 牽牛錢五 通末 為細末 每三錢有

厥冷合用酒調無厥冷而手足煩熱者蜜湯調

下食後以微利為度此謂不時而熱者濕熱也

凡用大黃半兩至一兩而大便不通利者加射

香少許調于藥中則大便必大走也

半硫丸 治年高虛秘冷秘 方見燥門

大潤腸丸 治大便秘澁通用

杏仁炒 枳殼 麻仁 陳皮各五錢 阿膠 防風

各二錢半 右煉蜜丸 梧子大每五十九丸 老人蘇子

煎湯下壯者荊芥湯下

麻仁丸 實秘能飲食小便赤此丸與七宣丸主

之 枳殼 川芎等分 麻仁泥減半

煉蜜丸 梧子大 食前溫水下

又麻仁丸 風秘脾約症小便數大便秘

大黃 枳殼 赤芍藥各一兩 厚朴錢五 麻仁

杏仁 各一兩 煉蜜丸 梧子大每服三五十丸
皂角丸 治有風人大便秘澀

牙皂 枳殼 羌活 桑白皮 檳榔 杏仁

麻仁 防風 白芷 陳皮 分等

蜜丸 梧子大每服三五十丸 蜜湯下

皂角枳殼丸 大腸有風秘結老人宜服

皂角 炙去皮子 枳殼 炒分

蜜丸 梧子大每七十九丸 空心食前米飲下

搜風順氣丸 治大腸秘澀

大黃 五兩半 熟半生 山茱萸 麻仁泥 郁子仁 炮去皮研

兔絲子 山藥 牛膝 檳榔 各二兩 防風 枳

殼 獨活 各一兩 車前子 二兩 煉蜜丸 梧子大每

二三十丸 米飲下 平旦臨卧各一服

二仁丸 治老人虛人風秘不可服 大黃者妙

麻仁 杏仁 枳殼 訶子 分等

蜜丸 梧子大每三十九丸 溫水下 未利增之

四磨湯 氣滯腹急大便秘澀

沉香 木香 檳榔 烏藥 分等 各磨半鍾和



勻溫服有熱者加大黃枳殼名六磨湯

橘杏丸 治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅 杏仁分 煉蜜丸梧子大每七十九空

心米飲下

蘓麻粥 順氣滑大便 蘇子 麻仁 二味不

拘多少研爛水濾取汁煮粥食之

茯苓瑣陽粥 老人陰血不足大便燥結

肉茯苓 瑣陽 煮粥服

小通氣散 虛人憂怒傷肺致令秘澀曾服燥藥而大便秘

陳皮 蘇葉 枳殼 木通分等 水煎服立通

金液丹 治挾冷結滯蕪治傷寒陰結以杏仁麻

仁煎湯吞下 方在寒門

神功丸 治氣壅風盛秘結後重疼痛煩悶

大黃 訶子各四兩 人參 麻仁各二兩

右蜜丸梧子大每二十九米飲下食後臨卧

服此藥虛實加減

小柴胡湯 治傷寒陽結能食而大便結

積柳丸 治大腸實熱不通心腹脹滿



欖柳 大黃 麻仁 枳實 羌活 杏仁

牽牛 白芷 黃芩 各一人參錢五

蜜丸 梧子大每四十九 空心溫水下

四順清涼飲 治同前 每加灯心十根 枳殼十

片水煎服効

欖柳散 治腸胃有濕大便秘結

欖柳 不拘多少 為末 每服二錢 蜜湯點服

香蘊散 治同上 加枳殼 欖柳水煎服

五仁丸 津液枯竭 大腸秘結 傳道艱難

桃仁 杏仁 各一兩 栝子仁 郁李仁 松子仁

各二錢半 陳皮 四兩另為末 右五仁另研為膏 入陳皮末

研勻 蜜丸 梧子大 空心米飲下 五十九

調氣滋補溫腸丸 治發汗利小便 亡津液 以致

秘結 沉香 一兩另為末 肉蓯蓉 二兩 為末 用麻子

仁汁打糊 為丸 梧子大 每七十九 空心米飲下

潤腸丸 治脾胃中伏火 秘結及風結 血結

桃仁 麻仁 當歸尾 大黃 羌活 各五錢 升

麻 紅花 郁李仁 右除桃麻仁 另研為泥



外餘為末煉蜜丸梧子大每三五十九空心
白湯下

一方加防風錢三皂角仁悅存性無升麻以下味

葳靈仙丸 治年高氣衰津液枯燥秘結

黃耆 枳殼 葳靈仙

煉丸梧子大每五七十九姜湯熱水任下

陳黃湯 治老人大便秘結

黃耆 陳皮各五錢每服三錢用火麻仁一合

研爛以水投取汁一鍾濾去渣于銀石器中

煎候有乳花起即入白蜜一大匙再煎令滾

調藥末空心服

獨束湯 治大便積日不通

大棗一枚劈開入輕粉五分依舊合起以麻線
縛扎慢火水煮熟嚼碎以束汁送下

丹溪治虛熱大腸秘

白芍藥一兩 陳皮 生地黃 當歸身各一條

苓 甘草各二錢 右粥丸每七八十九白湯下

潤麻丸 治血燥大便不通此丹溪秘方



麻仁 當歸 桃仁 生地黄 枳殼 各一兩

蜜丸梧子大每五十九空心白湯下

導滯通幽湯 治大便秘幽門不通上冲吸門不

開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤

之 當歸身 桃仁泥 升麻 各一錢 生地 熟

地 各五分 炙甘草 紅花 各三錢 水煎食前調攪柳

末五錢或加麻仁泥一錢若加大黃名當歸

潤燥湯

潤燥湯

升麻 生熟地黄 各二錢 當歸梢 生甘草 大

黃 煨 桃仁泥 麻仁泥 各三錢 紅花 五分

右除二仁另研作一服水煎數沸下二仁煎

空心熱服

活血潤燥丸 治大便秘血秘時常燥結

當歸稍 一錢 防風 三錢 大黃 煨 紙裹 一兩 羌活 各一兩 桃仁

麻仁 各二兩 研如泥 皂角 煨 存性 一兩 三錢 其性滑 濕則滑 燥則燥 濕自解

右除二仁另研外餘為末蜜丸梧子大空心服五十九白湯送下三兩服後以蘇子麻仁



粥每日早晚食之大便不致燥結以磁器盛

藥紙封

脾約麻仁丸 和劑方 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 去皮姜製 枳實 炙炒各八分 杏仁 去皮炒

麻仁 另研各五錢 大黃 兩六錢 蜜丸梧子大每二

十九臨卧溫水下以通利為止

潤腸丸 治大便秘澁連日不通

麻子仁 一盞半細研用水浸濾去皮取汁 芝蔴 半盞微炒研用水浸取汁

桃仁 泡去皮尖炒黃研如泥 荆芥穗 為末各一兩

右前藥入鹽 許少 同煎可以代茶飲之以利 為度

三和散 治七情之氣結于五臟不能流通以致

脾胃不和心腹痞悶大便秘澁

川芎 三兩 羌活 去蘆 紫蘇 去梗 沉香 宣木瓜 白朮

木香 檳榔 陳皮 甘草 各七錢半 大腹皮

每服五錢水煎服

木香三稜散 治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑丑 半生半炒 大腹子 君 檳榔 木香 三稜 煨

雷丸 義朮 煨 錫灰 炒 大黃 已上各二兩



右為末每服三錢空心蜜水調下或砂糖水亦可須先燒肉一片口中嚼之久吐出口中肉汁然後服藥

大小便不通

烏柏湯

治大便不通如神亦能通小便

烏柏木皮方一寸七劈破以水煎取小半盞服之立通不用多服其功神聖兼能取水或以此湯調下五苓散二錢空心服

推車散

治大小便秘經月欲死者

推車客

七枚

土狗

七枚

如男子病推車客用頭

土狗用身

如女子病土狗用頭推車客用

身右新瓦上焙乾為末用虎目即虎杖樹

皮向南者濃煎汁調只一服經驗如神

皂莢散

治大小便閉格不通經三五日

不炷皂角燒灰米湯調下三錢即通

甘遂散

治大小便不通

甘遂

二兩

用赤皮者為末煉蜜二合和勻每一

兩重分作四服蜜水下如未効第二服漸之



蜜硝湯 治大小便不通

好蜜一鍾入皮硝二錢用滾水一碗空心

調下

導引法

蜜二匙

葱汁二匙

猪膽汁二匙

青黛二分

皂角末五分

玄胡索三分

右同和一處以猪小

腸一節將此藥灌入腸內一頭用竹筒一箇
兩頭俱用線扎定將竹管入肛門徐徐擠藥
進去肛門得藥氣即通神効

兌法 凡諸秘結不通或兼他症及老弱虛極
不可用下藥者 蜜熬老入皂角末少許以葱

作骨乘熱捍作兌候冷硬用油塗肛門挿入主

猪膽汁導法

大猪膽一枚瀉汁和醋少許入竹

管灌穀道中少刻即通

霹靂煎

用鹽與蜜乘熱捍如蜜兌法上頭銳用

寸許納入穀道中少刻化開即通

一法 用蜜兌不通者 用鹽吹入肛門亦妙

提盆散 治雜病非陰候者

草烏頭不拘多少為極細末每用葱一枝肥者
削去鬚圓頭上有汁濕蘸之納穀道中



海藏用鹽與蜜兌相合如用草烏頭末相合亦可
蓋鹽能軟堅潤燥草烏能化寒消結可隨症陰
陽所宜用之

宣積丸

巴豆 乾姜 韭子 良姜 硫黃 白攢柳
甘遂各等分 為末研飯為丸圓眼大早朝先用椒
湯洗手麻油塗手掌口握藥一粒移時便瀉
欲止以冷水洗之

大小便不通

鹽燒紅填臍內切蒜一片蓋鹽上艾炷灸三五

壯即通

孫尚治趙令女忽吐逆大小便不通煩亂四肢漸
冷無脉凡一日半與大承氣湯一劑至夜半漸
得大便通脉漸和翌日乃安此闕格之病極為
難治垂死而活者惟此一女耳

孫兆方 治大小便不通

皂角燒存性為末粥飲調下三錢立通

外臺秘要方 治脹滿大小便不通



獨蒜煨熟去皮紙包納入下部氣立通

止吐透格湯

藿香 砂仁 白叩仁各一錢 陳皮 半夏各二錢

茯苓 厚朴 蒼木各一錢 水二鍾煎七分入姜

汁三匙徐頻服如火熱者去藿香叩仁加

黃連炒 山梔竹茹鬱結氣滯者加香附貝母檳榔

通關導滯散

木香 檳榔 枳殼 當歸尾 厚朴各一錢半

大黃錢三 如小便不通加瞿麥木通活后各一

錢半或用八正散水煎食前服

閉癃遺溺不禁辨

生生子曰閉者小便不出塞而不通也癃者罷弱而氣不充淋瀝瀝點滴而出或澁而癃一日數十次或百次俗名淋病者是也閉則多是急病癃則是緩病遺溺睡夢中溺出醒而方知是也不禁者日夜無遍數頻而溺也今各分枝門詳載治法以見新久虛實寒熱氣血各有所攸重也惟肝與督脉三焦膀胱主之



經云肝主小便淋洩肝足厥陰之脉遠陰器所生病者遺溺閉癃又云督脉者女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其男子循莖下至纂與女子等其生病癃痔遺溺故遺溺閉癃皆取厥陰腧穴及督脉腧穴也又三焦主之者經云三焦下脉在于足太陽之前少陽之後出于腠中外廉名曰委陽足太陽絡也三焦者足太陽少陽之所將太陽之別也上踝五寸別入貫膈腸出於委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛

則遺溺遺溺則補之閉癃則瀉之是也又膀胱主之者經云膀胱不利為癃不約為遺溺然遺溺閉癃不取膀胱腧穴者蓋膀胱但止藏溺其出溺皆三焦及肝督脉也又經云三焦者決瀆之府水液出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣由是言之膀胱藏水三焦出水治小便不利故刺灸法但取三焦穴不取膀胱也

小便不通門

東垣謂小便不通有在氣在血之異夫小便者足




太陽膀胱所主長生於申申者西方金也金能
生水金者肺也肺中伏熱水不能生是絕小便
之源也人法象天地膀胱之源自頭項下至于
足故曰陽中之陰如渴而小便不通者肺不能
降是也治法者用清燥金之正化氣味薄之藥
茯苓豬苓澤瀉琥珀燈心通草車前子瞿麥扁
蓄之類皆為淡滲之藥能瀉肺火而清肺金滋
水之化源也若不渴熱在下焦是絕其流而溺
不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者

之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血
分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易
分別耳

綱目云氣鬱于下微者香以散之甚者吐以提之
血鬱于下微者輕劑行之甚者峻劑破之


丹溪云小便不通有氣虛血虛有實熱有痰氣閉
塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋氣乘
載其水也先哲譬之如滴水之器必使上竅通
而後下竅之水出焉氣虛參朮升麻先服後吐



血虛四物湯先服後吐痰氣閉塞者二陳加木
通香附探吐實熱當分利之或八正散大便動
則小便自通老人氣短者四物加參芪吞滋腎
丸下焦血氣乾者死

統旨云氣虛而小便不通者經曰膀胱者津液藏
焉氣化則能出矣氣虛則不能化故不通也血
虛而小便不通者蓋血即津液之屬血虛即津
液燥而溺道不利故不通也與痰氣閉結於下
者虛實之情不同今丹溪皆用吐法乃急則治


其標也雖然氣虛血虛以虛為本虛則必補之
而後可夫以參朮四物調其真氣而吐之誠可
以通其溺而其本之虛也豈參芪四物之類頃
刻下咽遂能以補益之耶吾恐病根猶在不久
必復作故愚意以為若果氣虛血虛必用補氣
補血之藥使其氣盛而施化血生而津潤其便
自可以通不必探吐果宜吐者必須先吐俟其
溺通繼服補劑庶可平復非如痰氣閉結者但
吐之而可已此丹溪未盡之意予故表而出之



戴元禮云汗多而小便赤澁夏月多有此症盛暑所飲既多小便反澁緣上停為飲外發于汗津道不通小腸閉澁則水不運下五苓散然有虛勞汗多而反澁者乃是五內枯燥滋腴既去不能生津當以溫養潤肺十全大補湯或養榮湯不可過用利小便藥蓋汗者心液心主血養血則心得所養汗止金生不待通溺而自清矣諸失精血及患癘毒人或有小便反澁之症亦是枯竭不潤之故也

羅太無曰小便不利有三不可槩論若津液偏滲于腸胃大便泄瀉而小便澁少者一也宜利而已若熱搏下焦津液則溫熱不能行者二也必滲泄則愈若脾胃氣澁不能通調水道下輸膀胱而化者三也可順氣令施化而出

丹溪云諸淋皆屬于熱余每用黃柏滋腎丸每百丸用四物湯加甘草稍杜牛膝木通梔仁活石木香煎湯空心吞服無炙三陰交如鼓應桴累試累効



保命集云淋閉者涼膈散加滑石四兩茯苓一兩

治熱在氣分之劑

東垣清肺散 治渴而小便閉或黃澁邪熱在氣

分 茯苓_{錢二} 猪苓 澤瀉_{各三錢} 琥珀 瞿麥

桂_{各五分} 通草 燈心_{各二分} 木通 扁蓄_{各七分} 車

前子_{錢一} 每服五錢水煎熟服五苓散八正

散亦宜用

仲景猪苓湯 治脉浮發熱渴而小便不利

猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉_{各一兩}

水四升煎二升去渣內膠煎滾溫服一日_{服三}

茯苓戎鹽湯

茯苓_{半斤} 白朮_{二兩} 戎鹽_{彈丸大一枚}

為末白湯調下


清肺飲 治肺燥而小便不通

黃芩_{錢一} 山梔子_{枚三} 鹽豉_{粒二十} 長流水煎服

治熱在血分之劑

東垣滋腎丸 下焦陰虛脚膝軟無力陰汗陰痿

足熱不能履地不渴而小便閉者邪熱在血分



也

黃栢

知母

俱酒洗焙
各二兩

肉桂

二錢

右滾水為丸梧子大每百丸加至二百丸煎百沸湯空心服

潔古黃連丸

治因服熱藥過小便不利諸藥莫

能効者或臍下痛不可忍

黃連

炒

黃栢

炒

甘草

各等分

水煎服

如再不通加知母此藥助氣使氣得化則通矣

羅太無白花散

治小便不通膀胱有熱

朴硝為末每服二錢煎茴香湯調下

東垣導氣除燥湯

小便不通乃血濕致氣不通

而竅澁

知母

酒洗

澤瀉

各三分

黃栢

四錢

滑石

炒 茯苓

苓

各二錢

水煎不拘時服

小便不通腹下狀如覆椀痛悶難忍者乃腸胃乾


涸膈中氣不下則便不化啓玄子謂胞器若得

氣海之氣施化則溲便下氣海之氣不及則隱

秘不通故不得便利也先用木香沉香各三錢

酒調下令氣通達便自通利

又方 煎陳皮茯苓湯調木香沉香末服之



上二方正綱目所謂氣鬱于下微者香以散之是也

丹溪治氣鬱於下甚者以吐法提之

血鬱于下小便不利微者輕劑行之如蒲灰散滑石白魚散茯苓益湯皆主之

仲景蒲灰散

蒲黃粉七分滑石三分為細末白湯調一日三服

滑石白魚散

滑石 乳髮灰 白魚各二分乃衣魚也

為末米飲服五分一日三服

羅太無髮灰散 治臍下急滿小便不通

髮灰錢二 米醋二合調服 一法與葵子等分

為末米飲服二錢訖即炒黑豆葉蓋其上即通

右滑石能逐汚血蒲黃髮灰能消汚血丹溪謂髮髮補陰之功甚捷

血鬱于下小便不利甚者峻劑破之

本事桃仁煎治婦人積血小便不通臍腹脹疼不可忍衆醫皆作淋治如八正散之類數種皆治



不効診之乃知血瘕也非瞑眩藥不可去予用

此藥得愈

桃仁

大黃

朴硝

蜜虫

兩半

炒四味為末先以醇醋二升半銀后器內慢

火煎取一升五合下大黃桃仁蜜虫等不住

手攪良久出丸如梧子大前一日不晚食五

更初温酒吞下五丸至日午腹大痛不可忍

卧少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁

或如鷄肝蝦蟇衣狀其痛止此藥極峻氣虛

血弱者不可輕用凡用宜少服之漸加可也

如見鮮血即止藥續以補藥調理此方

出千金方

倒換散

治瘕閉大小便不通小腹急痛肛門腫

痛

大黃

小使不通減半

荆芥穗

大使不通減半

為末每服二錢温水調下

朴硝牛膝湯

治小便不通或血淋

杜牛膝

兩二

以雪水二碗煎至一碗調朴硝一

兩空心服立通

雜方

治小便閉

用大田螺生去殼搗細封臍上即通



治傷寒後小便不通

生姜八九塊杵碎水十餘碗麻布五六尺同煎
數沸用漏盛候可通手以布熨小腹良久恰
用紅豆末錢一江茶錢二并花水調服神効小便注如

本事方 治小便難小腹脹急不速治即死

葱白一斤細切炒令熱以帕子裹分作兩處更
替熨臍下即通

聖通方 治小便難腹滿悶不急療即死

秦艽一兩以水一大碗煎七分食分二服服之

濟世方 治小便不通

杏仁二十枚研碎水調分作二服効

千金方 治婦人卒不得小使用紫苑末以井水

調服三撮便通如小便血五撮立止

灸小便淋澁法

炒鹽不拘多少熱填满病人臍中是神闕穴也
却用筋頭大艾炷灸七壯良驗或灸三陰交穴
又法 治小水秘澁

猪膽連汁籠套玉莖少刺汁入即通



婦人用藥末貯袋子安入玉戶中必通

玄珠經云陰陽閉格前後不通利小水自行中有轉胞之症諸藥不効無救則脹滿悶亂而死曾以甘遂末水調敷臍上內以甘草節湯飲之藥汁至臍二藥相反而胞自轉小水來如湧泉此救急良方

一法 治小便不通諸藥無効或轉胞至死

用猪尿胞一箇底頭出箇小竅用翎筒通過放在竅內根底細線繫定翎筒口子細杖子堵定
上用黃蠟封尿胞口頭吹滿氣七分繫定了再用手捻定翎筒根頭放了黃蠟堵塞其翎筒放在小便頭放開翎筒根頭手其氣透入裏自然小便下神効

瓜蒌散 治腹脹小便不通

瓜蒌仁 不拘多少為末每服三錢溫酒調下如不能食酒米飲下以通為度

葵子散 治小便不通

黃蜀葵子 赤茯苓 各三錢 水煎服



鷄蘇散 治小便不通

鷄蘇

一

生地

通草

各四

滑石

石葦

各一

去毛

冬葵子

一兩

以水六碗煎至三碗分三服空

心進一服約人行五里路又進一服

一方加榆莢黃芩車前子

治小便不通垂死者

玄明粉

一兩

淡竹葉

三十

灯心

五分

煎湯徐

下

即通

治老人虛人小便不通 亦治心痛

琥珀為末人參湯調下妙

王海藏云脬轉小便不通非膀胱小腸厥陰之氣

也蓋因強力房事或過忍小便以致此疾非可

利之藥所能利之法當治氣宜以沉香湯主之

沉香 木香

各三錢

為細末煎陳皮茯苓湯空心食前調服

癃門

生生子曰癃罷也下元罷憊而氣餒弱不能施化

故小便淋瀝點滴而下是又稱為淋也

陳無擇曰淋古謂之癃名稱不同也癃者罷也淋



者滴也古方皆云腎氣鬱致小腸膀胱不利復
有冷淋濕淋熱淋等屬外所因既言心腎氣鬱
與驚思恐憂即內所因况飲啖冷熱房失勞役
及乘急忍溺多致此病豈非不內外因也大率
有五曰冷曰熱曰膏曰血曰后五種不同皆以
氣為本

嚴氏曰五淋氣后血膏勞是也氣淋為病小便澀
常有餘瀝后淋莖中痛尿不得卒出膏淋尿似
膏出勞淋勞倦即發痛引氣衝血淋遇熱即發

甚則溺血候其鼻頭色黃者小便難也大抵此
症多由心腎不交積蘊熱毒或酒後房勞服食
熱燥七情鬱結所致癃閉淋閉為病皆一類也

張子和曰世人多為服金石燥熱之劑得之常見
農家有此症豈是服金石之人也大抵是膀胱
蓄熱而成此疾如湯瓶久在火中煮瓶底白碱
而不能去沙后淋之症與此理同 劉宗厚曰
此譬極當內經云小腹熱澀出白液亦甚似也
東垣曰凡小便癃閉是無陰而陽氣不化也凡



利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此乃奉養太過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨為閔非格病也潔古云熱在下焦填塞不便是治閔格之法因治王善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如后壅塞之極腿脚腫脹破裂出黃水雙睛突出晝夜不得眠飲食不下苦痛不可名狀求予治之因問受

病之始知病不渴近苦嘔噦衆醫皆用治中滿利小便滲淡之藥急難措手乃辭歸從夜至旦耿々不寐窮究其理記素問有云無陽則陰無以生無陰則陽無以化此病小便癃閉是無陰則陽無以化也今病者內閔外格之症悉具死在旦夕但治下焦可愈隨處以北方寒水所化大苦寒之氣味俱陰者黃柏知母為君桂為引名曰滋腎丸沸湯下二百丸少頃前陰如刀刺火燒之痛溺出如湧泉卧具皆濕床下成泥願



一五
二五
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

盼之間腫脹消散予驚喜曰大哉聖人之言豈可不適覽而執一者也其症小便閉塞而不渴時見煩燥者是也凡諸病在下焦皆不渴也

千金方 治小便淋痛以杜牛膝以酒煮服

肘後方 以杜牛膝根莖葉酒煮服治小便不利莖中痛欲死及治婦人血結堅痛如神蓋牛膝治淋之聖藥也但虛人當用補藥監治之耳

仲景云淋家不可發汗發汗則便血

寶鑑曰痺論云胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出焉令風寒濕邪客于胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其症小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀于小便以足太陽經其直行者上交額下入絡腦氣下灌於鼻竅則為清涕也

劉宗厚曰按此則知淋閉有寒熱之殊大抵人之所稟虛實受病不同宜參脈理分治

方古庵云淋症其感不一或因勞房厚味醇酒忿



怒所致夫房勞者陰虛火動也忿怒者氣動生
火也醇酒厚味者釀成濕熱也積熱既久熱結
下焦所以小便淋瀝欲去不去不去又來而痛
不可忍者初則熱淋血淋久則煎熬水液稠濁
如膏如沙如石也諸方中類多散熱利小便而
于開鬱行氣破血滋陰蓋少焉若夫散熱利小
便只能治熱淋血淋而已其膏淋沙淋石淋三
者必須開鬱行氣破血滋陰方可也古方用鬱
金琥珀開鬱藥也用青皮木香行氣藥也用蒲

黃牛膝破血藥也用黃栢地黃滋陰藥也東垣
用藥凡例小腹痛用青皮黃栢夫青皮踈肝黃
栢滋腎緣小腹小便乃肝腎之部位也學者不
可不知

治熱之劑

火府丹 治心經熱小便澀及治五淋臍下瀉痛

生地 木通 黃芩 甘草

煉蜜杵丸梧子大每二十九丸木通煎湯下

導赤散 治心蘊虛熱小便赤澀或成淋痛



生地 甘草 木通 加竹葉水煎服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子錢五 淡竹葉 赤茯苓 灯草 荆芥

穗各二分 分二帖水煎服

地膚子湯 治諸病後体虛觸熱、結下焦小便

赤澁多起少出莖痛如刺或尿血

地膚子 猪苓 知母 黃芩 海藻 通草

瞿麥 枳實 升麻 葵子各等分 姜三片水煎服

立効散 治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草炙三兩 瞿麥兩一 山梔仁炒五錢 每一兩姜

三片葱白三根灯心三十根水煎服

通草湯 治諸淋

通草 葵子 茅根 蒲黃 當歸 王不留


行 梔膠 瞿麥 滑石各一兩 甘草五錢

每一兩姜五片水煎服

后葦散 治膀胱有熱淋瀝不去臍腹急痛蓄作

有時勞役即發或尿如豆汁或出沙石並治

芍藥 白朮 滑石 葵子 木通 瞿麥各二



兩當歸 甘草 主不留行各一兩 石葦去毛二兩
為末每服二錢空心小麦湯調下

五淋散 腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出
或如膏如沙如石如豆汁並治之

赤芍藥 山梔仁各十兩 當歸 甘草生各五兩 條芩

兩三 赤茯苓兩六 每服七八錢水煎

八正散 治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便
赤澀癰閉不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆
治之 車前子 瞿麥 扁蓄 滑石 甘草

山梔 大黃麤包 木通各等分 每服五七錢入灯

心十莖煎至六分食前服

又方 治諸淋

四苓散錢二 益元散 山梔子各一錢

灯心三十根水煎服

又方 益元散加車前子末錢一 或加阿膠錢一

石葦飲 治小便不利莖中痛

石葦去毛 冬葵子各二兩 瞿麥一兩 滑石五兩 車前子三兩

為末每服二錢日三服熱水下



蔡花湯 治小便淋澀

蔡花根洗淨搗碎水煎服

又方 治沙淋

車前草搗汁半碗入蜜一兩懸井中五更取起

溫服若是沙淋石淋則以煨寒水石為末

如治白淋用砂糖

治淋閉莖中作痛神効方

石葦 滑石 瞿麥 扁蓄 木通 冬葵子

王不留行 地膚草 各等分 為末每服三錢 白湯調下

一方 治淋及尿血立効

旱蓮草 車前草 同取汁每服半碗

一方 治淋痛及尿血

側柏葉 藕節 車前子 等分


取汁調益元散三錢神効

治石淋方

杜牛膝 搗碎水五碗煎至一碗去渣入射香

少許調服効

一方 治沙淋



石首魚腦骨

五對
火煨滑石

錢五為末分二服煎木

通湯調下連服數劑看沙盡止藥

海金沙散 治膏淋

海金沙

滑石末

各一錢
甘草半

為末每二錢麥冬湯調服灯心湯亦可

一方加木通瞿麥穗通草杏仁

鹿角霜九 治同上

鹿角霜

白茯苓

秋石 各等分

為末麵糊丸梧子大每五十九丸米湯送下

大海金沙散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施

化或五種淋疾癰閉不通

海金沙

研木通

瞿麥穗

滑石

通草

各半兩

杏仁 去皮尖每五錢入灯心二十根水煎服

牛膝膏 治死血作淋

牛膝

四兩去苳
酒洗一宿桃仁 一兩去
皮尖炒

當歸尾

二兩赤芍

藥

一兩生地

一兩半川芎

錢五

用水以炭火慢熬至二鍾入射少許分作四服空心服如夏月用涼水換此膏不壞



滋陰降火湯 治火燥血少氣不得降而淋

當歸 黃柏 鹽水炒各一錢半 知母 牛膝 生地 各一錢

白芍 一錢 甘草梢 木通各八分 水煎食前服

靈苑透膈散 治五種淋疾氣淋熱淋勞淋石淋

及小便不通至甚者 硝石 一兩雪白者為末 每服二

錢各依湯使服 如勞倦虛損小便不出小

腹急痛葵子煎湯下通後更須服補虛丸藥

如血淋小便不出時下血疼痛並用冷水

調下 如氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木

通煎湯下 如石淋莖內痛尿不能出內引

小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末

先入銚子內隔紙炒至紙焦為度再研令細

溫水調下 如小便不通小麦湯下 卒患

諸淋並以冷水調下 以上並空心先調藥

消散如水即服之更以湯使送下凡服藥未

効者服此立愈

靈苑方 治卒患諸淋遺溺不止小便赤澁疼痛

三葉酸漿草取嫩者搗汁一合酒一合攪勻空



心服之主通 酸漿草即布谷飯

一方 治血后淋

楊樹蛀屑烏梅一大束三水煎服

羅太無后燕丸 治后淋多因憂鬱氣注下焦將

所食醜物結成砂石小便碇痛不可忍必俟砂

后出而後小便通 石燕燒赤水中淬三滑石

石葦去毛瞿麥穗兩各一為末糊丸梧子大煎灯心

瞿麥湯吞下十九丸一日三服

葛粉丸 治男女淋病疼痛効速勿輕忽之

沙糖本草云治心葛粉 和丸梧子大井花水

化開一二丸

斗門方 治五淋

苧麻根兩莖打碎水煎頓服大妙丹溪云苧根

治后淋方 鱧鮓一枚 鹽二兩 用於新瓦上鋪蓋

焙乾研末温酒調下一錢七服下即愈

白薇散 治熱淋血淋

白薇 芍藥分等 為末每服二錢温酒調下立

効或加欖榔



一方 治血淋諸熱淋

山茵陳 淡竹葉 木通 山梔 滑石 甘

草 猪苓 瞿麥 每服五七錢加灯心煎服

大便秘加大黃

神散 治諸淋急痛

海金沙七錢半 滑石五錢 為末每服二錢木通麥

冬車前草煎湯入蜜少許調下

治淋閉便濁神方

五爪龍藤連根兩一 土茯苓 杜牛膝根各八錢

共用酒三碗煎至一碗空心服三服全愈

又治下疳如神五帖後疳愈再不發他瘡毒

腎瀝湯 治胞痺小便不利小腹急

麥冬 木通 桔梗 桑白皮 杜仲炒 犀角

屑 五加皮各一錢 赤芍五分 水二鍾加羊腎一

枚切碎煎至八分入竹瀝少許食前服

濟生木通散 小便不通小腹痛不可忍

木通 活石各一兩 黑丑頭末五錢

每服五錢灯心十莖葱白一莖水煎服



治氣開鬱之劑

芍藥檳榔散 治五淋

赤芍藥一兩 檳榔一枚 麩

為末每服一錢七空心白湯調下

丹溪 生氣藥

砂仁三錢 海金沙 紅曲 檀香各二錢 白豆仁

木香 丁香各一錢 分五帖研桃仁十四枚入生

治諸般沙石淋

琥珀二錢 研細末空心用葱白頭煎濃湯調下

無問諸般淋疾一二服神効本草云琥珀清濁血極驗

通秘散 治血淋痛不可忍

陳皮 香附 赤茯苓等分 水煎服

沉香散 治氣淋疼甚多因五內鬱結氣不舒行

陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便溺不通

沉香 石葦 滑石 當歸 玉不留行各五錢

葵子 芍藥各七錢半 甘草 陳皮 木香 青皮

為末每服三錢煎大麥湯下

治卒淋急痛方



益元散

錢二

苗香

一錢微

木香

檳榔

各二分

右為末水調服

琥珀散

治五淋砂石淋

滑石

琥珀

各一兩

木通

當歸

木香

鬱金

扁蓄

各五錢

為末每五錢以蘆葦葉煎湯調服

如無蘆葦葉以竹葉煎湯送下

一方 治同上

石燕子

七枚傷如黍米大

新桑白皮

三兩剉同擘勻

二味分作七帖用水煎一日三服

治肝經氣滯蘊熱小便淋痛方

甘草稍子

錢五

青皮

黃栢

澤瀉

各一錢

水煎服効

補氣血之劑

丹溪治朱郎小便淋痛脉大右瀉此為勞傷經血

勿作淋治可補血行肝經滯血自愈

生地

當歸

赤芍

各一錢

川芎

條芩

甘草

梢

陳皮

木通

各五分

黃栢

炒二分


紅花

一分

杜牛膝

錢一

右以桃仁泥研滑石同煎待淋病退



減桃仁滑石杜牛膝木通入川牛膝代木通
分兩倍之

氣虛者八物湯加杜牛膝黃芩煎服

老人氣虛亦能淋參朮中加木通山梔

治勞苦傷血脉沉而大下焦蘊結而淋

人參 歸尾 白芍 香附各五錢 條芩三錢 木通

山梔仁炒三錢 黃芩 甘草梢生各五分

分四帖煎杜牛膝湯煎服

茯苓琥珀湯 小便澀莖中痛不可忍相引脇下

痛 川練子去核 甘草生各一錢 人參五分 茯苓四分

琥珀 當歸梢 澤瀉 柴胡各三分 玄胡索七分

水煎服數服効

六味地黄丸 治久淋陰虛者

清心蓮子飲 治上盛下虛心火炎上口舌咽乾

煩渴微熱小便赤澀或欲成淋並治之

黃芪蜜炙 石蓮肉 赤茯苓 人參各七錢半 甘草

車前子炙 地骨皮 麥門冬 黃芩各五分

每服七八錢水煎溫服 發熱加薄荷柴胡



治氣虛脾虛消渴淋濁

人參

滑石各一錢

白木半錢

赤茯苓

澤瀉各七

麥門冬

甘草

竹葉

三十片

加灯心二十根水煎服

治寒之劑

千金茯苓丸

治胞痺小便內痛

赤茯苓

防風

細辛

白木

澤瀉各五錢

紫

苑

天花粉

牛膝

黃芪

芍藥

甘草

各一錢

三山藥

山茱萸肉

獨活

半夏

各一錢

附子

炮官桂各二錢

煉蜜丸梧子大每服五六十丸

空心溫酒下

腎著湯

治胞痺小便不通

赤茯苓

白木

各四兩

甘草

灸三兩

乾姜

炮一兩

每服五七錢水煎一日三服

巴戟丸

治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟

去心一兩半

桑螵蛸

炒遠志

去心

生地黃

山藥

附子

炮

肉苁蓉

酒浸續斷

各一兩

杜仲

炒

鹿茸

酥灸

石斛

兔絲子

五味子

山茱萸

官桂



龍骨

各三錢

煉蜜丸梧子大空心溫酒下三十九

三因生附散

治淋而脉沉微小便秘澀數起不

通竅中痛

瞿麥

木通

半夏

各一兩半

滑石

五錢

附子

五錢

每二錢生姜三片灯心二十莖蜜半

匙水煎食前服

淋閉餘論

生生子曰淋閉一證玉機微義闡述詳盡極當檢閱如劉河間之熱羅知悌之寒張潔古分在氣在血之異嚴用和之五淋陳無擇之三因朱彥

修之痰積死血劉宗厚之腎虛火熾述素問靈樞脉經之要旨門分類析甚便後學惟煩人治法尚畧碩今時婦人患此頗多鮮獲竒効緣由未得其真括也考之經曰肝主小便淋澀煩人經未絕年皆厥陰肝經用事肝主謀慮者也婦人之性多枯偏鄙鬱而不決氣道因澀鬱久成火凝滯濁液漸結成粒名曰砂石淋是也今之治淋者動手輒用五苓八正之類皆淡滲利竅之劑于病未嘗遠也而底績不樹何耶殊不知

淡滲皆在天之陽也但能利肺氣是氣降而水利矣非治有形之陰病也腎乃肺之子也淡滲過劑腎氣奪矣陰血日虧鬱火日熾經曰無陽則陰無以化無陰則陽無以生淡滲皆泄氣而損血者血損則寔愈溢、則病劇治當開鬱火養陰血兼之以導氣之藥經曰壯者氣行則愈陰血旺氣道滑病自瘳矣正如河涸舟粘縱用力多未若決水之為易也學者其可忽諸
丹溪牛膝膏加礬金以開鬱山梔以降火生地以

補陰琥珀以導氣利竅則愈矣

遺溺門

生生子曰按遺溺遺失也睡夢中遺失醒而後覺童稚多有此大人少有也夫童稚陽氣尚微不甚約束好動而魂遊故夜多遺失也古方多用煖藥乃溫養陽氣之意經謂虛則遺溺又曰不約為遺溺從可知矣曾見數人二三十歲仍遺失不止後皆無子得非下元虛寒所致歟

東垣曰小便遺失者肺金虛也宜安卧養氣禁勞



後以黃芪人參之類補之不愈當責有熱加黃
栢生地又曰立夏前候用白虎湯過多致遺溺
者宜溫藥升陽以解之

甲乙經云肺脉不足以息卒遺失無度

原病式云遺尿不禁者是熱甚客于腎部干於足
厥陰之經廷孔鬱結極甚而氣不能宣通則痿
痺而神無所用故液滲入膀胱而旋溺遺失不
能收禁也

丹溪嘗治一男子遺溺不覺脉洪大盛以黃栢知

母杜牛膝為君青皮甘草為臣木香為佐桂
小為反佐服數帖大効此法與千金翼白薇散
皆治熱甚廷孔鬱結神無所用不能收禁之也
生生子曰按劉河間丹溪千金翼方有認為熱者
必以脉症相叅看治庶無偏熱偏寒之弊予前
論寒者以大槩而言也諸病皆有寒熱虛實多
有始同終異故治法不能執一而無權也

桑螵蛸散 治遺溺

桑螵蛸酒炒為末姜湯調下二錢



鷄內金散 治溺床失禁

鷄胫脛一具即鷄肫內黃皮并腸洗淨燒存性

男用雌女用雄研為末每二錢酒服妙

大人遺溺不知薔薇根細研酒下

雞腸草湯 治小便不禁或睡中遺出不覺

雞腸草一兩 牡蠣粉三錢 龍骨 麥冬 白茯苓

桑螵蛸各五錢 每服三錢末一枚去枝煎服

一方 治同上

補骨脂炒為末黃栢煎湯調下

又方 治同上

桂皮末 雄雞肝 等分搗丸如小豆大溫水

治小兒夢中遺尿

蒼朮仁一合去心不去殼敲碎入鹽一小撮同

炒黃色水煎空心服之効

縮泉丸 治小兒遺尿脬氣不足小便頻多

烏藥 益智仁去壳炒 等分為末酒煮山藥

糊為丸空心鹽湯下二錢

又方 治同上



烏藥

益智仁

各五錢

桑螵蛸

一兩

為末空心鹽湯調下二錢効

治遺尿方

白茯苓

牡蠣

煨

桑螵蛸

各五錢

龍骨

桂

各三錢

為末以雞腸一具燒存性為末和勻空心

白湯調下一錢

禁方

治遺溺

阿膠炒牡蠣煨鹿茸

酒炙桑螵蛸

酒炙各等分

為末粳米為丸梧子大每五十九丸空心酒下

治遺溺淋瀝

桑螵蛸

多焦

龍骨

分等

為末每二錢空心鹽

湯下

千金翼白薇散 治尿出不知時

白薇

白芍藥

分等

為末溫酒下方寸七日三服

濟世方神芎導水丸 治遺尿有實熱者每百丸

空心白湯下若一服得大便利止後服

此謂淫氣遺溺痺聚在腎痺謂氣不宣通也

雞腸散 腎與膀胱虛冷不能約制故遺尿失禁

或睡自出


肉桂

龍骨

各一錢半

白茯苓

桑螵



蛸

牡蠣粉

名三雞腸具


分二帖水煎姜三片棗二枚空心溫服

小便不禁

生生子曰不禁謂無禁約小便多而頻不計遍數按經云水泉不止者是膀胱不藏也有溫熱有下元虛憊數而少為熱數而多為虛老人多有此蓋陽氣衰微不能約束歷見數人卒皆不救由其不能攝養而神氣耗散故也古人有謂不通為熱不禁為寒乃心腎氣弱陽道氣冷而傳

化失度法當溫補溫存以養其神藥后以堅其腎神完腎固膀胱氣充自可約束然必調治及早庶或十全三五

王節齋曰小便不禁或頻數古方多以為寒而用溫澁之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數來也故年老人多類此是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱萸五味子之類不可用溫藥也病本屬熱故



宜瀉火因水不足故火動而致小便多小便既多水益虛矣故宜補血瀉火治其本也收之澁之治其標也

按此乃本之於原病式熱鬱廷孔之說也

生生子曰按節齋此論亦是以大槩言也老人下元虛憊氣弱不能乘載其水膀胱停濕浸淫皮薄不能收持故頻數不禁必如河間節齋所云然則癰閉已主於熱矣而不禁又主於熱是無虛寒之症也何古方有溫補之法經有寒虛之

文耶不若以小便頻而清白長者為虛寒頻而少黃赤澁者為熱及脉洪數有力無力或滑或瀋參驗之始無差悞凡熱天小便少寒月小便多寒熱之理亦易見爾

大便秘結而小便頻多屬脾約症以脾約丸治之
茯苓丸 心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁

赤茯苓 白茯苓 等分為末新汲水投洗澄

去新沫控乾別取熟地黄汁與好酒同於銀石器內熬成膏為丸彈子大空心鹽酒嚼下丸



二氣丹

治內虛裏寒膀胱積冷陽氣漸微小便

不禁

硫黃

肉桂

乾姜

硃砂

各二錢

附子

一枚大者炮去皮臍為末五錢

右糊丸梧子大每五十九益湯下

姜附赤后脂丸

小便數而不禁怔忡多忘夢覺

不已

附子

乾姜

赤后脂

硃砂

各五錢

者一

酒糊丸菘豆大每十五九至三十九

大便有病米飲下

小便不禁茯苓湯下

王海藏云此方妙在硃砂伏火上

論載玉機微義甚詳

御藥院秘元冊

治內虛裏寒自汗時出小便不

禁

白龍骨

訶子

砂仁

靈砂

各一兩

右稗米糊為丸梧子大每五十九空心益湯下

兔系子丸

治小便多或致失禁

兔系子

肉蓯蓉

牡蠣

附子

五味

各二兩

子 鹿茸

雞脰脰

桑螵蛸

酒炙各一兩

右酒糊丸梧子大每七十九空心益湯溫下

三因家韭子丸

下元虛冷小便不禁或成白濁

家韭子

鹿茸

肉蓯蓉

牛膝

熟地

酒炙各四兩



黃

當歸

各二兩

巴戟

去心

兔系子

酒浸各一兩

杜仲

石斛

桂心

官姜

炮各一兩

酒糊丸梧子大每百丸空心鹽湯酒任下

桑螺蛸散

治小便頻數或如米泔稠濁

桑螺蛸

鹽水炙

遠志

石菖蒲

鹽炙

龍骨

人參

茯苓

當歸

鱉甲

剉炙各一分

為末每二錢臨卧

人參湯調服一方用龜甲

五子丸

治小便頻數時有白濁

兔系子

酒蒸

家韭子

炒

益智

茴香

炒

蛇床子

去皮炒各半分

酒糊為丸梧子大每七十九米飲

鹽湯任下

丹溪鹿茸丸

治久虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸

川椒

去子取頭末

桂心

附子

牡蠣

石

斛沉香

補骨脂

肉蓯蓉

雞胫脰

各一兩

桑螺蛸

三分

右酒糊為丸梧子大食前酒下三

九十丸

又方 治汚血淋瀝

鹿角屑炒黃為末温酒下二錢妙

本草云鹿角逐陰中邪氣

血惡

水芝丸

治下焦真氣虛弱小便頻多日夜無度



蓮子

去皮

先以好酒浸一二宿用猪肚一具入

蓮子在內水煮熟取出蓮子切片曬乾為末

醋糊丸如雞頭子大每五十九丸溫酒送下

一方 治稟賦虛弱小便頻數不禁

五味子

四兩

肉蓯蓉

一斤

肉地

六兩 兔系子

右酒煮山藥糊為丸梧子大每五七十九空

心鹽湯或酒送下

萹薹丸 治小便頻數

川萹薹 不拘多少為末酒糊丸如梧子大每

五十九空 心鹽湯送下

一方 治夜多小便老人虛人多有此症

白芷

一兩

粳米

五錢炒

右粳米糊丸梧子大

饅頭煎湯空心下七十九

玄兔丹 治小便多

兔系子

酒浸焙

五味子

酒浸研

白茯苓

三兩 蓮肉

為末乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮

糊為丸搗千許丸梧子大每五七十九空心

米飲下



小兔系丸

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜

夢遺精

石蓮子肉

二兩

酒浸研

白茯苓

一兩

山藥

七錢

打糊丸

梧子大每五七十

丸空心溫酒或鹽湯送下

一方

生山藥半斤

六斤先用酒熬沸入山藥

不得攪動待熟加鹽葱白更添酒空腹下二

三盞妙

益智散

治小便多

益智

三十枚

為末水一盞煎八分入鹽五

分臨卧溫服

本事方衛真湯

治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯

弱真陰不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺

來盜汗面色精彩唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛背

倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無味目


漸癯瘁外腎濕痒夜多小便腫重冷痛牽引小

腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不

調或過期不至或一月兩來赤白帶下漏分五

色子宮感寒久不成孕並皆治之 此藥大能

生氣血遇夜半子時腎水旺極之時補腎實



臧男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治

使不復為視

川歸酒浸

丁香

青皮去白

熟地黄

白朮

苓

木香

肉蓯

山藥酒洗

生地

川牛膝

各二兩

各一兩

人參

石斛

各五兩

為末每三大盞酒調下鹽湯亦得空心食前

服婦人諸病童便同酒調空心服

辰砂妙香散 方在婦人門

潮赤

諸病水液渾濁皆屬于熱小便黃者少腹中有熱

也 治小便黃無如黃柏知母効

脉經云足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯

綱目載小便黃有四

一屬肝熱經云肝熱病者小便先黃是也

二屬胃實經云胃足陽明之脉氣盛則身已前皆

熱其有餘于胃則消谷善飢溺色黃者是也

三屬肺虛經云肺手太陰之脉氣虛則肩背痛寒

少氣不足以息溺色變故耳



四屬腎虛經云冬脉者腎脉也冬脉不及則令人
三 砂清脊痛小便變是也

脫肛門

附載腸病

生生子曰脫肛之症多由腸內有積而清氣不升
如痢疾裏急後重而下脫也治當從滯下門先
推去積滯然後升補積滯去而清氣自升不復
脫下其或因下血及痢疾之後脫而不收者為
虛升補之藥看氣血孰重脫之已久當以澀劑
收之腸胃有風脫而下血者以風藥攀之脫久

亦有虛寒者當溫藥微洗內服大補之劑

丹溪曰有氣虛氣熱血虛血熱

氣熱者條芩六兩升麻一兩為末麵糊為丸服
之 其証肛脫紅腫者是也

氣虛者參耆歸升麻或加白朮訶子有熱加
條芩 其証多於勞倦房慾而發者是也

血熱者四物湯加炒黃柏 其証多於好酒及
辛辣之物而發及便血也

血虛者用四物湯加升麻荆芥 其証下血過



多面色痿黃者是也

下痢脫肛

痔門參治

截腸病 其証大腸頭出痛苦乾又落々又出腸
盡則死初出寸餘時治之以芝麻油一盞以罈
坐之飲大麻子汁數升愈

脫肛之證前人以為肺氣虛寒蓋肺與大腸為表
裏肺臟蘊熱則閉結虛寒則脫婦人有此疾者
多由產育用力過多小兒有此疾皆因久痢大
腸虛冷所為也有腸頭作痒者此係腸中有虫

黃桂峰云親見一人裏急後重肛脫紅腫百藥皆
試乃有虫在肛故也

濟世方 治男女脫肛用五倍子小便濃煎洗之
聖惠方 治脫肛不收蝸牛燒灰猪脂調敷之

砂仁湯 治大腸虛脫肛挾熱紅腫者

砂仁

黃連

木賊

等

為末每服二錢米

下飲

文蛤散 大腸虛寒肛門脫出不收或用力太過
及小兒叫呼久痢後重者

五倍子為末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤



佳後用赤石脂為末少許摻在巴蕉葉上頻用
托入或有脫出尺許者亦用此湯溫浸頻換藥
水以縮為度

倍榆散 治小兒脫肛

五倍子 地榆等分為末每五分或一錢米飲下調

治老人脫肛

防風蘆 蒼朮 黃柏 五倍子 煎湯薰洗
內服清涼大腸之藥而愈

治脫肛下血

韭菜一大握搗碎瓦礫煎熟再用生韭菜汁冲
在湯內將肛門坐在瓶口薰一二次神効

槐角丸 五種腸風下血痔漏脫肛並治

槐角三兩 地榆三兩 黃芩 當歸 防風 枳殼炒
各二兩 右酒糊丸梧子大每七十九室心米飲下

涼血清腸散

生地 當歸 芍藥各一錢 防風 升麻 荆

芥各一錢 黃芩炒 黃連 香附炒 川芎各八分 甘草

五分水煎服



三因方香荆散 大人小兒肛門脫出並治

香附 荆芥穗各等分 一方加砂仁

右為末每服三匙水一大碗煎數沸乘熱洗

秦芫湯 腸胃濕熱及有風而脫肛不止

秦芫酒洗七錢水煎當心服、後安卧一時渣再煎

補中益氣湯 治勞倦脫肛効

一方 五倍子為末每用三錢入白礬一塊水煎洗或以五倍末用紙襯之托上

一方 木賊燒存性為末 肛上按入即收

二靈散 治久痢腸胃俱虛肛門脫下

龍骨煨五錢 木賊燒存性二錢半 為末搽上托之

治男女脫肛 五倍子荆芥小便濃煎洗之

本事方 腸風下血及脫肛不收


皂角 三莖搗碎水一碗揉令皂角消盡用絹

二層濾取清汁將肛浸在汁中自收並不待手

托如大腸收了即用湯盪其肛門上下令皂角

氣行則不再作盪三次全愈

集驗方 治脫肛歷年不愈



生鉄三斤水一斗煮取五升以汁浸洗

一方用刀漿水洗亦効

肘後方 治腸頭脫肛出轉久不可收入

生括婁汁浸之猪肉汁中洗隨以手按之今煖自收

濟世方治脫肛 荆芥 龍腦 薄荷 朴硝

右煎湯一日洗數次自入

本事方治腸風脫肛及有血

蛇床子炒為末貼肛上立收

蝟皮散 治肛門或因洞泄或因用力脫出不收

蝟皮一枚燒存性 礞石煨五錢 桂心五錢 此寒而脫肛也

右為末米飲服方寸匕忌持重及房室

肘後方治女人陰脫前方加蠶頭一枚燒存性入研

黑聖散 治瀉多時脫肛疼痛

大蜘蛛一枚瓠葉重裹線札定合于內燒存性

研入黃丹少許同研凡有上件疾即先用白

礬葱椒湯洗拭乾後搽藥以手托上

千金方 治脫肛歷年不愈

蠶頭一枚燒令烟盡為末付上手按接之



丹溪方

治脫肛

葫荑燒烟薰之立入

海上方

諸般痔脫肛

死蛇一條如指大濕者掘地坑燒之以有孔板子蓋之坐其上以膠受烟薰之烟盡為止大効濟世方 治肛出

皂角薰次用鯁蚰一條入蜜浸去鯁蚰將蜜調土硃付上即入

一女子脫肛用糯米一勻濃煎飲去米洗肛溫柔先以磚一片火燒通紅用醋沃濕以青布鋪磚

上坐肛於青布上如太熱加布令厚其肛收入

又方 蓮房殼荆芥枳殼槐花黃栢防風獨活煎湯洗之 或以木賊灰或又蛤末付上立收

治肛門腫痛 木别子去殼取油四五枚研如泥入水盆中以滾湯泡之乘熱洗另用少許為末付上

肛門腫痒 杏仁搗膏敷上 亦治穀道痛蝕外臺秘要治下部虫齧 桃葉一斛蒸之令極熱

納小口器中以下部坐上受薰其虫盡死脉經云慝蝕陰脫其脉虛小者生緊急者死



一人脫肛裏急後重百方莫能收一僧教以取猪
肚一具刮下垢膩入花椒末拌勻塗肛上以青
綿布袋兜之再以溫湯入埕內坐其上薰之少
頃肝癆腸收袋上垂不計其數從
此再不
復發

前陰諸疾

前陰所過之脉有二一曰肝脉二曰督脉經云肝
足厥陰之脉入毛中透陰器抵小腹是肝脉所
過也又云督脉者起于小腹以下骨中央女子
入繫廷孔循陰器男子循莖中至纂與女子等

是督脉所過也

陰縮陰縱

陰縮謂前陰受寒縮入腹內也陰縱謂前陰受熱
挺長不收也經曰足厥陰之筋傷于寒則陰縮
入傷熱縱挺不收治在行水清陰氣是也

丹溪治鮑兄年二十五莖挺長腫而痿皮塌常潤
磨股不能行兩脇氣上手足倦弱先以小柴胡
加黃連大劑行其濕熱畧加黃柏降其逆上之
氣其挺腫漸收漸減及半但莖中有堅塊未消



遂以青皮一味為君佐以散風之劑末服外以
絲瓜汁調五倍子末敷而愈

平江王氏子年三十忽陰挺長腫而痛脉數而實
用朴硝荆芥湯浸洗又用三乙承氣湯大下之
內經曰陰縮而死者皆屬腎傷又云悲哀動中則
傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當陰縮而
攣筋兩脇骨不舉毛悴色夭死于秋又云厥陰
終者喜溺舌卷卵上縮是也

王莖腫前陰腫是也其症不一有通身水氣癩脛

俱腫者此屬水腫以治水之法治之其腎風振
搔成瘡以致腫者以治瘡毒之法治之有妬精
蝕瘡腫毒以乾瘡之藥治之此緣妬精蘊結毒
氣未散而成腫痛也有服金石秘泄之藥精氣
壅遏不能宣揚或試緊爐之方取一時之快熱
毒內蘊俱能為腫有血氣凝滯癩間竅道閉塞
致使莖腫或由忍溺致氣結不行而成腫凡此
諸症並以灯心湯調五苓散服之以荆芥木通
煎湯淋洗

此條出鈞玄

陰痿陰汗陰冷陰臭

陰痿皆耗散過度傷於肝筋所致經云足厥陰之經其病傷于內則不起是也

東垣陰痿陰汗陰臭論 一富者前陰間嘗聞臊臭又因連日飲酒腹中不和求予治之予應之曰夫前陰者足厥陰之脉絡陰器出其槌末臭者心之所主散入於五方為臭入肝為臊臭此其一也當於肝中瀉行間是治其本後於心經瀉少冲以治其標如惡針當用藥除之治法當

求其本連日飲酒夫酒者氣味俱能生濕熱是風濕熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云在下引而竭之酒者是濕熱之水亦宜決前陰以去之是合下焦二法治之龍膽瀉肝湯是也

龍膽瀉肝湯 治陰部時溼濕痒有臊臭

柴胡梢

澤瀉

車前子

木通

當歸

尾 龍膽草

生地黃

水煎空心飢時熟

服便以美膳壓之柴胡入肝為引用澤瀉車前子木通其淡滲之味利小便亦除臊臭是

名在下者引而竭之生地黃龍膽草之苦寒
瀉酒濕熱更兼車前子之類以徹肝中邪氣
肝主血用當歸以滋肝中血不足也

固真湯 治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後

有餘瀝臊氣尻臀并前陰冷惡寒而喜熱膝亦

冷 升麻 柴胡 羌活 甘草 澤瀉 各

半錢 黃柏 知母 炒 龍膽草 炒 各 水煎空心服

以美膳壓之

溫腎湯 面色痿黃身黃脚軟陰汗陰莖有天色

麻黃 分六 防風根 蒼朮 錢各半 白朮 猪苓 白

茯苓 升麻 黃柏 酒炒 各 澤瀉 錢二 柴胡梢 分六

水煎食前服之候一時辰許方食

補肝湯 前陰如冰冷并冷汗兩脚痿弱無力

黃芪 分七 人參 葛根 各三 甘草 炙 蒼朮 分各五

升麻 猪苓 分各四 知母 柴胡 羌活 當歸

身 陳皮 黃柏 炒 防風 白茯苓 澤瀉

神麩 連翹 分各三 水煎食前熱服忌酒麩

清震湯 治溺黃臊臭淋瀝兩丸如水陰汗浸兩



股陰頭亦冷正值十二月天寒凜冽寒之極矣

澤瀉 升麻 蒼朮 黃芩各五分 柴胡 當歸

身 甘草各二分 羌活 黃柏酒炒各錢 防風 麻

黃根 藁本 猪苓各三分 紅花一分 水煎服忌酒麵

柴胡勝濕湯 兩外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱

陰囊濕痒臊氣 柴胡 甘草生各三錢 升麻 羌

活 澤瀉各錢半 當歸 麻黃 龍膽草 漢防

已各錢 黃柏酒炒二錢 五味子二錢 紅花少許 白茯苓

水煎服忌酒麵房事

仲景八味丸 治陰痿不振今依前方夏減桂附

一半春秋減三之一 病去全減桂附

椒粉散 治前陰兩丸濕痒秋冬尤甚

麻黃錢一 狗脊 蛇床子各五分 斑蝥二枚 當歸梢

猪苓 小檗各三分 肉桂二分 麴粉 紅花各少許

為細末搽上避風寒濕冷處坐卧

又方 治腎囊濕痒 先以吳茱萸湯洗過後用

吳茱萸半兩寒水后三錢黃柏二錢半樟腦蛇

床子各五錢輕粉一錢白礬三錢硫黃二錢檳



柳三錢白芷三錢為末搽之

千金方云有人陰冷漸冷氣入陰囊腫滿恐虎
日夜痛悶不得眠取生枳擗之洗淨以布帛裹
着九囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取
本事云曾有人陰冷漸次冷氣入陰囊腫滿晝夜
疼悶不得眠煮大蘗汁服之瘥

陰腫陰痛陰吹

婦人陰腫腎痛枳實半斤切碎炒熟布包熨之冷即

交接勞復陰卵痛是勞復

陰陽易

仲景云胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏
髮煎導之其方猪膏半斤亂髮如鷄子大三枚
以髮入膏中煎至髮盡分再服病自從小便中
出能治諸疸症殊效

雄黃散 陰腫大如斗核痛人所不能治者

雄黃一兩 礬二兩 甘草生半兩 以水五升煎洗

荊芥散 治腎腫 荊芥穗一兩 朴硝二兩 蘿蔔

葱同煎湯洗

男子陰腫大如升罽痛甚搗馬鞭草塗之



和劑三白散

治小兒膀胱蘊熱風濕相乘陰囊

腫脹大小便不利

白牽牛一兩桑白皮 木通

白朮

橘紅各五錢

為末姜湯調二錢

癩風

俗名腎臟風

癩風之症起於下部虛熱或行路體倦及夏月久
坐冷地為風濕所襲乃發為疾其症囊濕皮厚
生水泡瘡疥作痒古方用蛇床子一味煎湯淋
洗痒甚者以姜汁入香油數滴攪勻塗上自愈
沐浴長春散 治下元陰濕久冷陰囊夜痒抓之

則喜手住則癢成瘡流水為患甚苦及治婦人
下部陰濕子胞久冷並効

牡蠣 蛇床子 破故紙 紫梢花 官桂

薄荷葉 各等分每用一兩半入葱白數莖水

煎一小鍋先薰後洗再用津調散搽之全安

津調散 治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

欵冬花等分

射香少許

為末先洗過或以地骨皮蛇床子煎湯洗帛
拭乾津調敷忌生冷生湯洗一方無射

又方 治外腎及兩腿風濕瘡

全蠲 檳榔 蛇床子 硫黃各一錢

為末麻油調入手心擦熱吸三口用手抱囊
一頃次擦藥兩腿上

疝氣門

內經四氣刺逆從篇曰厥陰脉滑則病狐風疝少
陰脉滑則病肺風疝太陰脉滑則病脾風疝陽
明脉滑則病心風疝太陽脉滑則病腎風疝少
陽脉滑則病肝風疝又骨空篇曰任脉為病男

子內結七疝女子帶下瘕聚大奇論篇曰腎脉
大急沉為腎疝肝脉大急沉為肝疝心脉搏滑
急為心疝肺脉沉搏為肺疝三陽急為瘕三陰
急為脾疝三陰脾脉也

脉經曰寸口脉弦而緊絃緊相搏則為寒疝

生生子曰內經以六經脉滑為風疝又以大急沉
為五藏疝按此六經五臟皆有疝也而以風字
加之於六經之疝者何也意者無乃以風字作
氣字者看耶或以巽為風則木之氣肝之所主



也又成疝之地乃肝部也夫滑脉主痰飲食積
是言各經之痰飲食積流傳于肝之部地乃成
疝也因肝主風故以風字加之也又夫急者緊
急之謂也緊主病為寒沉亦為寒為氣大亦為
氣是亦言五臟寒氣流於下部發為疝也蓋寒
喜傷下腎肝俱在下而肝之絡環繞陰器故以
疝屬肝也據任脉起于胞門循腹裏與衝脉厥
陰會故男為七疝女為瘕聚也其病極為難治
而諸書所言亦不一惟張戴人一主于肝蒐輯

甚博且曰非靈素銅人之論法皆不取要之欲
窮其原耳故其歷舉經義俞穴及七疝瘕固殊
為詳悉但用治諸方多是渠生平所長之三法
人或病其峻抑不知有是病用是藥醫而不善
用此是無術也則未免有過時失機之悔願其
疝積滯根固淵藪偏僻非峻劑曷能以達第不
可孟浪亂投法所當用又何畏縮在設施者消
息經權務求其當可也劉守真言此症亦有熱
者丹溪亦主于肝且又言有濕熱死血及痰積



因寒鬱而發間亦有虛者此亦深鑒前人純擬
于寒而一以剝燥為劑也今以諸賢大意述列
於後以便參治

劉守真曰癰疔小腹控卵腫急絞痛也寒主拘縮
故也寒極而生化制之故腫滿也經言丈夫癰
疔謂陰器連小腹急痛也故言婦人少腹腫皆
厥陰肝之脉也經注曰寒氣聚而為疔也又按
經言五藏皆主疔但脉急也注言脉急者寒之
象也然寒則脉當短小而遲今言急者非急數

而洪也由緊脉主痛急為痛甚病寒雖急亦短
小也所以有痛而脉緊急者脉為心之所養也
凡六氣為痛則心神不寧而緊急不得舒緩故
脉亦從之而見也欲知何氣為其病者適其緊
急相兼之脉而可知也如緊急洪數則為熱痛
之類也又經言脾傳之腎病名疔疔小腹寬熱
而痛出白蠱注言小腹痛澁出白液也一作容
熱內結銷鑠肌內如蠱之食故名白蠱也然經
復言熱為疔疔則亦不可止言為寒當以脉症



弘之

丹溪曰疝主肝經與腎經絕無相干疝痛之甚者
畢丸連小腹急痛也或有形或無形或有聲或
無聲自素問以下皆以為寒蓋經絡得寒收引
不行所以作痛世有得寒而無疝者又必有說
以通之可也予屢踢水徒涉不曾病此以予素
無熱也因而思此病始于濕熱在經鬱遏至久
又感外寒濕熱收鬱而作痛若只作寒論恐為
未備或曰此症多容厥陰一經濕熱之積何由

而致予曰大勞則火起于筋醉飽則火起于胃
房勞則火起于腎大怒則火起于肝火鬱之久
濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流于厥陰肝屬
木性速急火性暴為寒束宜其痛甚而暴也愚
見古方以烏頭梔子等分作湯用之其効亦速
後因此方隨形症加減無有不應又須分濕熱
多寡而治之但腫多為濕癰是也却有水氣而
腫又有挾虛而發者當以參朮為君而佐以疎
導診其脉沉緊而謔大者是也若不以補劑而



行决裂之法禍不旋踵

許學士曰大抵此疾因虛得之不可以虛而驟補
經云邪之所湊其氣必虛番而不去其病必實
故必先滌所畜之熱然後補是以諸方多借巴
豆氣者蓋謂此也

張戴人曰疝本肝經宜通勿塞疝有七前人論者
甚多非靈樞素問銅人之論余皆不取非余好
異也但要窮其原耳七疝者何寒水筋血氣狐
癩是也俗工不識目為膀胱又為腎冷又或為

小腸氣小兒曰偏氣立名既謬併喪其實何哉
蓋醫者既斷為膀胱腎冷小腸氣又曰虛寒所
致其藥之用也不鹿茸巴戟則杜仲菴蓉不附
子烏頭則乾姜官桂不練實茴香則金鈴補骨
脂朝吞暮餌曾無殊効三二十年牢不可去問
因微病稍似開通執此微芒浸成大錯標既不
除本必歸甚處處相傳曾無覺者豈知諸疝皆
歸肝經其奈庸流歸之小腸膀胱夫膀胱水府
專司滲泄小腸水道專主通流腎為少陰總統



二水人之小漉自胃入小腸滲入膀胱膀胱者
腠囊也氣化則水出莖端此常道也及其為疝
乃是厥陰肝經蓋環陰器而上入小腹者足厥
陰肝經也夫腎肝皆屬于下衝任督相附然靈
樞經言足厥陰肝經病則有遺溺癃閉狐疝主
腎與小腸膀胱三經則不言疝是受疝之處乃
肝之部分也且內經男子宗筋為束骨之會也
而肝主筋畢者囊中之丸雖主外腎非厥陰環
而引之與玉莖無由伸縮在女子則為纂戶其

內外為二其一曰廷孔其二曰窈漏此足厥陰
與衝任督之所會也靈樞言足厥陰之經筋聚
于陰器其病傷于寒則陰縮入傷於熱則縱挺
不收治在行卧清陰氣故陽明與太陰厥陰之
筋皆會於陰器惟厥陰主筋故為疝者必本之
厥陰靈樞又言足厥陰之別名曰蠡溝去內踝
五寸別走少陽循胫上臑結于莖其病氣逆臑
腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所別矣豈非
厥陰為受病之處耶靈樞又言邪在小腸連臑



係屬於腎貫肝絡肺系心氣盛厥逆上衝腸胃
重肝散於育結於臍故取之育原以散之刺太
陰以平之取厥陰以下之取巨虛下臚以去之
按其所過之經以調之此其初雖言邪在小腸
至其治法必曰取厥陰以下之乃知諸疝關於
厥陰可以無疑以脉考之素問云厥陰滑為狐
風疝少陰滑為肺風疝太陰滑為脾風疝云云
凡此六疝雖見于他脉中皆言風疝者足厥陰
肝經之氣也靈樞亦曰心脉微滑為心疝肝脉

滑甚為癧癧腎脉滑甚為癧癧凡此三臟脉之
疝亦以滑為疝也素問又云脉大急皆為疝心
脉滑傳為心疝肺脉沉傳為肺疝三陰急為疝
三陽急為疝王大僕云太陽受寒血凝為疝太
陰受寒氣聚為疝此言太陰受寒傳之肝經也
可以溫藥逐之不可以溫藥補之若補之者是
欲病去而強挽留之也厯考素問三陽為病發
寒熱其傳為癧疝此亦言膀胱非受病之處必
傳於厥陰部分然後為疝也又言病在少腹腹



痛不得大小便病名曰疝得之寒言脉急者曰
疝癥少腹痛凡言少腹者豈非厥陰之部分耶
又言脾氣傳胃名曰疝癥此謂非肝木不能為
風氣名曰厥疝蓋脾土虛而不能制水人為肝
木所凌也又言督脉為衝疝蓋厥陰與衝任督
俱會于前陰也豈不明哉至于運氣中又言歲
太陽在泉寒淫所勝民病少腹控舉蓋寒客于
小腸膀胱則肝木縮而不得伸行母傳之子也
陽明司天燥淫所勝丈夫癩疝婦人小腹痛此

言肝氣不得上行為金所抑鬼賊故也又言太
陰在泉土勝則寒氣逆滿食飲不下甚則為疝
此亦言寒客太陰濕土不能勝水傳之肝
經也又嘗遍閱銅人俞穴亦相表裏如背上十
三椎俞肝經言寒疝腹中行惟陰交一穴言
寒疝任脉之所發也關元一穴言暴疝小腸之
募足三陰任脉之會也曲骨一穴言癘疝任脉
足厥陰之會也其腹部第二行育俞二穴言寒
疝衝脉足少陰之會也四病上穴言疝癥衝任



脉足少陰腎之會也其腹部第三行大巨二穴
言癰疝足陽明脉氣之所發也氣衝二穴言癰
疝莖中痛兩丸寒痛亦足陽明脉氣之所發也
其腹部四行府合二穴言疝痛足六陰厥陰
維之交會也亦太陰部三陰陽明支別也衝門
二穴言陰疝足太陰厥陰之會也其在側脇者
五樞二穴言寒疝陰邪上入少腹帶脉下三寸
也其在足六經者足厥陰穴十名言疝者七謂
大敦行間大衝中封蠡溝中都曲泉足少陽穴

十四名言疝者一謂丘墟穴也足太陰穴十一
名言疝者一謂陰陵泉也足陽明穴十五名言
疝者一謂陰市穴也足少陰穴十五名言疝者
五謂然谷大谿照海交信築賓也足太陽穴十
八名言疝者二謂金門合陽也由是言之惟厥
陰言疝獨多為疝之主也其各經穴雖亦治疝
終非受疝之地但與足厥陰相連耳或在泉寒
勝木氣攣縮禁于此經或司天燥勝木氣抑鬱
于此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結于此經或藥



淋外固閉尾縮精壅于此經其病差別如此不知世間之藥多熱補從誰而受其方也信其方則素問靈樞銅人皆非也信素問靈樞銅人則俗方亦皆非也不知後之君子以孰為是嗚呼余立于醫四十餘歲使世俗之方人、可療余莫知敢廢也諳練日久因經識病然後不惑且夫遺溺閉瘵陰痿胞痺精滑白淫皆男子之疝也不可妄歸之腎冷血涸不日月罷腰膝上熱足躩噬乾癆閉少腹有塊或定或移前陰突出

後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之癥若年少而得之不計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干脬腎小腸之事乃足厥陰肝經之職也柰俗方只言脬腎小腸殊不知言肝木一句惑人甚矣且肝經乙木也木屬東方為心火之母也凡疝者非肝木邪則肝木自甚也不便言虛而補之難經所謂東方實西方虛瀉南方補北方此言瀉火木自平金自清水自旺矣昔審言為蔡之叅軍也因坐濕地疝



痛不可堪諸藥莫救余急以導水丸禹功散瀉
三十餘行腫立消痛立減又頃聞一男子病卒
疝暴痛不任倒於街衢人莫能動呼余救之余
引經証之邪氣客於足厥陰之絡令人卒疝故
病陰丸痛也余急瀉大敦二穴大痛立已夫大
敦穴者乃是厥陰之二穴也珍寇鎮一夫病瘡
瘡發渴痛飲蜜漿劇傷水水醫者莫知瀉去其
濕反雜進姜附濕為燥熱所壅三焦閉溢水道
不行陰道不興陰囊腫墜大於升斗余先以導

水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水
一斗遂失痛之所在近頰尾一夫病卒疝赤腫
大痛數日不止諸藥如水投后余以導水一伯
五十九令三次咽之繼以通經散三錢空腹淡
酒調下五更下臟腑壅積之物數行痛腫皆去
不三日平復如舊內經曰木鬱則達之達謂吐
也今條達肝之積本當吐者然觀其病之上下
以順為貴仲景所謂上宜吐下宜瀉者此也敢
列七疝圖於左以示後之君子庶幾有所憑藉



者焉

寒疝其狀囊冷結硬如后陰莖不舉或控舉丸而痛得於坐卧湿地或寒月涉水或置雨雪或卧坐礮后或風冷處使內過勞宜以溫劑下之久而無子

水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或囊痒而燥出黃水或少腹中按之作水聲得于飲水酒醉使內過勞汗出而過風寒濕之氣聚於囊中故水多令人為卒疝宜以逐水之

劑下之有漏針去水者人多不得其法

筋疝其狀陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或坐中痛極則痒或挺縱不收或白如精隨洩而下得于房失勞傷及邪術所使宜以降心之劑下之

血疝其狀如黃瓜在少腹兩傍橫骨兩端約中俗云便瘻得于重感春夏大煥勞動使內氣血流溢滲入脬囊留而不去結成瘻腫膿少血多宜以和血之劑下之



氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因踈哭忿怒則
氣鬱之而脹怒止號罷則氣散者是也有一治
法以針出氣而愈者然針有得失宜以散氣之
藥下之或小兒亦有此疾俗曰偏氣得于父年
已老或少年多病陰痿精怯強力入房因而有
子胎中病也此疝不治惟築賓一穴言之
狐疝其狀如瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊
中狐則晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出
入上下徃來正與狐相類也亦與氣疝大同小

異今人帶鈞鈴是也宜以逐氣流經之藥下之
癰疝其狀隆囊腫垂如升如斗不痒不痛者是也
得之地氣卑濕所生故江淮之間湫塘之處多
感此疾宜以去濕之藥下之 女子陰戶突出
雖亦此類乃熱則不禁固也不可便謂虛寒而
澁之燥之補之本名曰瘕宜以苦下之以苦堅
之王冰云陽氣下墜陰氣上爭上爭則寒多下
墜則筋緩故舉垂縱緩因作癰疝也已上七疝
下去其病之淺可調則調可補則補各量病勢



勿拘俗法經所謂陰盛而腹脹不通者癰瘕疝
也不可不下

統旨曰或問疝氣古方有以為小腸氣者有以為
膀胱氣者惟戴人卅溪專主肝經其說不同何
以辨之予曰小腸氣小腸之病膀胱氣膀胱之
病疝氣肝經之病三者自是不一昔人以小腸
膀胱氣為疝者誤也殊不知足厥陰之經環陰
器抵小腹人之病此者發則舉丸脹痛而連及
小腹則疝氣之係于肝經也可知矣且小腸氣

俗謂之橫絃豎絃繞臍走注少腹攻刺而膀胱
氣則在毛際之上小腹之分作痛與疝氣之有
形如瓜有声如蛙或上於腹或下於囊者不同
也但小腸膀胱因經絡並於厥陰之經所以受
病連及于肝則亦下控引舉丸為痛然只是二
經之病不可以為疝也學者惟考張朱二公之
說則庶乎其不惑矣

生生子曰按統旨此論只可以言狐疝不足以盡
經義然素問六經皆有疝故後之言疝者或名



小腸氣或名膀胱氣或名腎冷氣張戴人朱丹
溪乃獨屬之肝經要之各有所本而肝腎居多
爾按靈樞經云邪在小腸連臍系屬腎貫肝絡
肺系心氣盛厥氣上衝也大凡邪氣滲於人之
經也隨各經而名之滲於腎為腎氣滲于膀胱
為膀胱氣滲于小腸為小腸氣腎與膀胱相為
表裏其氣通于外腎系於臍九此三經與厥陰
互相聯絡而又俱在下部與衝任督諸脉會也
戴人亦曰腎之穴十而言疝者五丹溪乃言與

腎絕無相干絕之一字未細考爾實相須也凡
久立過內則傷腎勞力遠行則傷筋腎傷則膀
胱虛筋傷則肝氣弱一有所傷風寒濕邪乘虛
而滲入於腎則脬囊腫小腹痛而足冷舌本強
此腎經受病之候入於肝則先從陰器冷痛上
抵脘脇唇青足厥甚則舌卷囊縮此肝經受病
之候也膀胱乃胞之室素問骨空論篇曰任脉
起於中極之下以上毛際循腹裏上關元自胞
上過帶脉貫臍而上故任脉為病男子內結七



疝或指膀胱氣者以此也又衝脉為病逆氣裏
急督脉起少腹以下骨中央女子入系廷孔其
孔溺孔之端也其絡繞陰器合纂間繞纂後別
繞臀至少陰其男子循莖下至纂與女子等其
少腹直上者貫臍中央上貫心此生病從少腹
上衝心而痛不得前後為衝疝注曰衝任督皆
奇經一源而三岐都與腎肝會也由是考之各
有所本匪謬也惟肝腎居多腎不得無相干肝
不得獨主疝從可知矣揣戴人之意若獨屬之

肝則東方實為有餘有餘者瀉之庶可以行生
平所長之技也師者誠能體認不謬則通塞一
適其宜丹溪戴人不多讓矣

挾虛者當用參朮為君佐以疎導之藥其脉豁大
按之無力者虛也 又按之不定者亦屬虛必

用桂枝山梔

過炒

烏頭細切炒過為末以姜汁糊

為丸每服三四十九姜湯下大能却痛 食積

與死血成痛者梔子桃仁山查枳實吳茱萸並
炒以生姜汁順流水煎湯調服



一方加茴香附子

戴元禮曰木腎者心火下降則腎水不患乎不溫
真陽下行則腎水不患乎不和安有所謂木強
者哉夫惟嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交
水火不相濟而沉寒痼冷凝滯脹大作痛頑痺
結硬不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪
氣內消榮衛流轉益如寒谷春回蓋有不疾而
速不行而至之妙矣

橘核散 單止痛此蓋溫熱因寒鬱而發用梔子

仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱况二藥皆下行
之藥而烏頭又為梔子所引其行尤速不使胃
中停留也 橘核 梔仁 梔子 川烏

吳茱萸 水煎服


又方 劫痛 烏頭細切 梔子仁炒等 為末或加或

減白湯丸服亦可

積疝方 山查炒一兩 茴香炒 柴胡炒各三錢 牡丹皮一錢

酒糊丸如梧子大鹽湯下六十九

又方 治疝痛





山查

兩炒四

枳殼

炒

茴香

炒

山梔仁

炒各

牡丹皮

柴胡

兩

梔仁

炒

大茴

炒各

吳茱萸

錢五

酒糊丸鹽酒吞下五十九

又方

治疝痛

蒼朮

鹽炒

香附

鹽炒

黃柏

酒炒

青皮

玄胡索

益智

梔仁

為臣

茴香

為佐

大附子

鹽炒

甘草

為使

水煎服一痛過更不再作矣

一人有疝腹內有塊每塊痛作疝痛止疝痛作塊

痛止

三稜

莪朮

醋煮

神麩

炒

姜黃

南星

各一

兩山查

兩二

木香

沉香

香附

錢各三

黃連

錢同

炒去菜莖用

淨黃連

五錢

桃仁

蘿卜子

山梔仁

枳

枳

炒各

姜汁

餛餅糊

為丸

治小腸氣及木腎偏墜

黑丑一斤用豬尿胞裝滿以線縫口好酒米醋

各一碗於砂鍋內煮乾為度取出黑丑用青紅

娘子各十九枚於鐵鍋內炒燥去青紅娘子將

黑丑研取頭末四兩另入豬苓澤瀉細末各二

兩醋糊為丸梧子大每服三十九空心鹽酒送

下不可多服多服令人頭眩如頭眩可服黑丹
元戎加味五苓散 治疝氣卒痛小便澀

本方加川練子一分
局方三白散 治膀胱蘊熱濕熱乘陰囊腫痛大

小便不利 方見前陰門
復元通氣散

舶上茴香 川山甲 蛤粉炒各二兩 陳皮 玄胡

索 黑丑炒末 甘草炒各一兩 木香一兩

為末每一大錢食前熱酒調服

寶鑑控引畢丸 小腸病結上而不下痛引心臍

茴香炒 川練子炒 食茱萸 陳皮 馬閭花醋炒

各一兩 芫花醋炒 醋糊為丸梧子大每十九至

二十九空 心温酒下

三因大烏頭桂枝湯 治風寒疝氣腹中刺痛手


足不仁身體拘急不得轉側或致陰縮

大烏頭一枚去皮尖 桂心 白芍各三錢 甘草一錢

每服四錢姜棗煎服

局方奪命丹 遠年近日小腸疝氣偏墜搖痛臍





下撮痛悶亂外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒搔

成瘡 吳茱萸 淨一斤四兩用酒醋湯 澤瀉 二

酒糊為丸梧子大每五十九空心鹽湯下

葫蘆巴丸 小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣偏墜陰腫

小腹有形如卵上下来去痛不可忍或絞結繞

臍攻刺嘔吐者 葫蘆巴 斤炒一 巴戟 兩炒六 川練

子 炒一斤 川烏 炮去皮 茴香 炒二 吳茱萸 湯洗

兩 酒糊為丸梧子大每二十九空心酒下

戴人禹功散

黑丑 頭末 茴香 炒一 為末以生姜自然汁調

一二錢臨睡服或加白朮一兩

茴香練實丸 治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練子 炒 茴香 炒 青皮 陳皮 芫花 醋炒

山茱萸 食茱萸 吳茱萸 馬關花 各等分

醋糊丸梧子大温酒下三十九

天台烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥 木香 茴香 炒 青皮 良姜 炒各錢 檳榔

二 川練子 十 巴豆 七十

右先以巴豆微打破同川練麩皮炒黑去巴
豆殼皮不用外餘藥同為末每用一錢酒調
下甚者姜湯下亦可

濟生葵子湯 膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾

燥 赤茯苓 猪苓 葵子 枳實 瞿麥

車前子 木通 黃芩 滑石 甘草

每五錢入姜煎空心服

局方蟠葱散 治寒疝氣疝衝心疼痛

玄胡索 蒼朮 甘草 茯苓 蓬朮

三稜 青皮 丁皮 砂仁 檳榔 桂

乾姜 每服二錢入連鬚葱一莖水煎食

金櫃當歸生薑羊肉湯 寒疝腹中痛及脇痛裏

急 當歸 生薑 羊肉


水八升煮三升溫服七合日三服如寒多加

生薑嘔者加陳皮二兩白朮一兩

蜘蛛散 治陰狐疝氣偏有大小時上下

蜘蛛 肉桂

為末取八分米飲調服或蜜充服亦可



東垣丁香練實丸

男子七疝痛不可忍婦人瘕

王海藏丸用以黑大者去頭足
研如膏入藥中乃効炒黑不炒

聚帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病故治

法同 當歸 附子炮 川練子 茴香炒各二兩

好酒三升同煮盡為度焙乾作細末每一兩
入丁香木香玄胡末各五錢全蝎十三枚後
四味末入在前藥末內和勻酒糊丸梧子大
每三十九丸加至百丸空心溫酒下

熨法 鹽半斤炒極熟以舊綿包熨臍腹痛處

又方 葱白研碎一握置臍中上用熨斗熨之或

以艾於上灸之尤妙


海藻漬堅丸 治木腎如斗結硬如石

海藻 昆布 川練肉 吳茱萸湯泡各一兩 木香

青皮 小茴 荔枝核炒 玄胡索炒 肉桂各五錢

海帶 橘核炒 桃仁麩炒去皮 木通七錢

酒糊為丸梧子大每六十九空心鹽酒任下
癰疔大如升斗者是也惟大不痛丹溪謂非痛斷
房事厚味不可用藥惟促其壽若蒼朮神麩白



並半夏山查枳實皆要藥人視其為淺鄙以啓
慢心又不能斷慾以愛護其根者非徒無益而
又被其害者多矣且其藥宜隨時令寒溫更按
君臣佐使加減大抵癩屬濕多

蒼朮

神麴

白芷

散水

山查

川芎

枳實

南星

半夏

神麴糊為丸有熱加山梔一兩

堅硬加朴硝五錢秋冬加吳茱萸二錢半

又方 治癩疔

南星

山查

蒼朮

各二兩

白芷

半夏

枳核

神麴

各一兩

海藻

昆布

各五錢

玄明粉

吳茱萸

各二錢

酒糊丸

治木腎不痛方

南星

半夏

黃柏

酒洗

蒼朮

炒

枳實

山查

白芷

神麴

炒

滑石

炒

吳茱萸

昆布

酒糊丸空心益湯下一方加枸杞子

治偏墜初生

川山甲

茴香

為末酒送下乾物壓之

潔古海蛤丸

治癩疔從小便中利出惡物

海蛤

醋淬

海金沙

膩粉

硼砂

川歸

各一錢



海藻

粉霜

分各五

水蛭

條廿一

青黛

滑石

乳

香

硃砂

錢二

地龍

水去泥

條廿一

右用鹽煮麵糊為丸小豆大硃砂為衣每十

丸燈心湯空心服之小便下冷膿惡物乃効

却以黃連紫河草板藍根各二錢煎湯漱口

以固牙一方去板藍根加貫衆

王海藏地黃膏子

男子婦人臍下奔豚氣塊小

腹疼痛陰腫控臑而痛上衝心腹不可忍者

血竭

沉香

木香

人參

廣茂

地玄胡索

蛤蚧

川歸

川芎

續斷

白朮

川練子

炒全蝎

茴香

炒熟胡

沒藥

吳茱萸

已上分兩隨症加減用之 氣多者加青皮

血多者加肉桂 為末地黃膏子為丸梧子

大空心溫酒下二十九日加一九至三十九

本事方念珠丸

膀胱疝氣外腎腫痛不可忍昔

有人貨此藥治疝如神一日貨數千丸一國醫

多與金而得之用果良驗

乳香

硃砂

飛各三

黃蠟

一兩

熔化

分作

一百單



八丸以線穿之露一宿次日用蛤粉為衣旋
取用乳香湯送下

丹溪治鄭子敬酒後飲水及水菓腎偏大時作蛙
聲或作痛炒枳實一兩鹽炒茴香炒梔子各三
錢研煎湯送下保和丸 又一人膀胱氣下墜
如銚聲臭橘核炒十枚桃仁二十枚蘿卜汁下
保和圓七十九

一人年三十左腎核腫痛此飲食中濕墜下成熟
以臭橘核五枚桃仁七枚細研順流水一盞煎

沸湯熱下保和丸

丹溪治水腎以水晶蒲桃葉 野紫蘓葉 蒼耳

葉濃煎湯薰洗

一方治水癰偏大上下不定疼痛不止

牡蠣不拘多少鹽泥固濟炭三斤煨令火盡冷
取出二兩加乾姜一兩焙為細末二味和勻以
冷水調塗病處小便大利而愈

又方 玄胡索炒全蠍 為末每二錢溫酒調下

雄礬散 治陰腫大如斗核痛





雄黃一兩 白礬二兩 甘草五錢 水煎先薰後洗効

治偏墜 一人核腫痛甚二子不分大如升徧醫

不効以此治除根松江甚神此方

牡丹皮二兩 蒼朮水泔浸三日 荔枝核炒一兩

山查半一兩 橘核炒七錢 山梔仁湯炒三兩

神麴糊丸 梧子 大空心 白湯下五十九

解鉗丸 治小腸氣及膀胱氣橫絃堅絃木腎偏

墜下部諸疝氣痛

木鱉子二兩 爭去油用木通二兩 茴香二兩 用

十一枚去頭翅足 黑丑二兩 用萝卜子二兩 碾

同炒香熟去 半夏二兩 用芍藥二兩 向陽者 補骨脂二兩

同炒去猪苓 酒糊丸 梧子 大空心 服三十九 炒

姜鹽燈心酒下下午後臨睡各一服

五妙丸 治一切下部氣速効如神

黑丑 補骨脂 川練肉各一兩 用地龍一兩

半夏一兩 用猪苓一兩 茴香一兩 用班貓十四

丁香二錢 用土狗十兩 玄胡索一兩

酒糊丸 梧子 大每服十九 加至十五 丸空心

鹽酒送下

乳姜湯

治寒疝氣上衝中脘築痛

乳香末

二錢 生姜自然汁二錢 水一大盞同煎三五

沸通口服一服効

香木丸

寒濕成疝腎腫疼痛

蒼朮

半斤 米泔水浸一宿 晒乾用生薑半斤 葱白四兩 搗炒蒼朮乾去蔥薑不用

茴香

半斤 用生薑汁四兩浸 吳茱萸湯炮炒


右末搗葱白成膏為丸 梧子大每五十九空

心溫酒或鹽湯下

又方 治諸疝痛及心痛臨發時服


海后 香附 為末姜汁調下

一人患疝因服熱藥多以致小便不通後用五苓散分三帖每加連鬚葱一根射香少許鹽五分煎服連進三服其夜下黑汁二升臍下遂寬續用礪砂丸數日全愈




國立中央圖書館藏書印 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





249586 v.15



國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





赤水玄珠第十六卷目錄

霍亂門 轉筋 中惡客忤

欬逆 噫氣 下氣 漏氣

嘈雜門

眩暈門

瘖門

疸證門

厥門

吐門

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠第十六卷

新安生生子孫一奎著輯

霍亂門


霍亂者揮癘撩亂其勢急暴有似鬼祟實非邪也
乃內有所傷外有所感陰陽乖隔而成此前人
格論

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重
腹痛筋骨搖併蓋言木乘土而為病也夫霍亂
者揮霍撩亂也其症心腹卒痛嘔吐下痢發熱



增寒頭痛眩運或吐而不瀉或瀉而不吐或吐瀉並作夫邪在上焦則先心痛而吐邪在中焦則先腹痛而瀉邪客上中二焦則吐瀉俱作甚則轉筋入腹則斃蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逆治之惟宜溫煖更詳別三因以調之外因諸風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗胃濕則重著傷暑則煩熱又有內因九氣所致鬱聚痰飲痞隔不通遂致滿悶隨其勝復必作吐利或諸飽食膾炙恣食

乳駱寒漿旨酒脾胃受傷遂成吐利又有轉筋者蓋陽明胃主養宗筋今暴吐下津液頓忘宗筋失養以致牽轉甚則邪縮舌捲為不治之症又有乾霍亂者上不得吐下不得利壅閉正氣閉格陰陽躁擾喘脹命在須臾若濕霍亂則所傷之物因吐瀉而出吐瀉盡則止故猶可治大抵熱勝痰鬱則悶亂濕勝飲鬱則利下其治濕霍亂宜藿香正氣散加生姜不惟可以濕散風濕抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致者亦不



可選用香薷沉冷之劑合先用橘皮半夏生姜
之類開散結滯次則以香薷五苓溫服散暑解
煩或挾寒而手足厥逆腹中絞痛宜以四逆理
中之類溫之亦不可選用峻補兜澁之劑則邪
愈滋而變症百出治乾霍亂急以鹽湯灌之令
其大吐庶有可生切不可與穀食恐胃中和物
吐瀉不盡新穀一入脾不能化轉增危殆慎之
慎之大槩其脉浮洪者易治若脉微遲加以氣
少昏沉不語者皆難治也

丹溪曰內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳
湯加減作吐以提其氣切莫與穀食雖米飲一
呷入口即死必待吐瀉盡過二三時直至飢甚
方可與稀粥其脉多伏欲絕 又曰雖已吐瀉
不徹還用吐提其氣或用樟木煎湯吐之

大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用
五苓散亦可下者 乾霍亂最難治死在須臾
升降不通邪無從出當吐提其氣極是良法世
多用鹽湯為內有食傷外有邪遏故吐之吐中



就有發散之義

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽其乳近
兩邊此千金妙法也 轉筋入腹者死

脉訣舉要曰滑數為嘔代者霍亂微滑者生濡數
凶斷又曰滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉代
勿訝

內經曰脉伏者霍亂脉微而澁 或代而散 或
隱而伏 或大而虛 脉右關滑為霍亂吐瀉
脉結促代皆不可斷以死 脉大者生 脉

洪者為熱 絃者為飲 氣口脉絃滑膈間有
宿食留飲

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉宜沉冷

類服 草果仁_{兩四} 烏梅肉_{兩三} 甘草_{兩二}

每服五錢姜十片水煎服

藿香正氣散 中濕霍亂吐瀉

蒼朮 陳皮 半夏 藿香_{錢各二} 甘草_{錢一}

姜五片枣二枚水煎服

桂苓甘露飲 中暑霍亂吐瀉發渴引飲_{方見中}



不換金正氣散

霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼方見

五苓散 方見暑門

藿苓湯 外感風寒內傷飲食霍亂轉筋吐瀉

藿香 厚朴 白朮 茯苓各一分 甘草五分

大腹皮 紫蘇 白芷 桔梗 半夏 陳皮

各一分 肉桂六分 猪苓 澤瀉各一分 姜五片水煎服

訶子散 霍亂吐利如神又治心脾冷痛

訶子 甘草 厚朴 乾姜 草果仁 陳皮

良姜 茯苓 神曲 麥芽等分 水煎入鹽服

二香散 暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香 白朮 厚朴 陳皮 茯苓 半夏

白扁豆 紫蘇 桔梗 白芷 香薷 黃連

錢各一分 大腹皮 甘草各五分 姜五片葱白根水煎服

加味四君子湯 霍亂轉筋吐瀉腹中痛體重沉

細而 人參 白朮 茯苓各二錢 甘草炙芍藥

良姜各一錢 姜三片 棗二枚 水煎服

通脉四逆湯 霍亂多寒內冷脉絕

吳茱萸炒 附子炮 桂心 木通 白芍藥



細辛

甘草各錢五

當歸錢三

每服七錢水一鍾

酒半鍾姜七片枣一枚煎七分温服

七氣湯 七氣鬱五臟之間互相刑克陰陽不和

揮霍變亂吐利交作

半夏兩五

厚朴

桂心兩各

白芍藥

茯苓兩各

紫蘇葉兩

橘皮兩各

人參兩一

每七錢水一

盞半酒半盞姜七片枣一枚煎温服

木瓜湯 霍亂吐瀉轉筋掣悶

酸木瓜兩二

茴香錢微炒二

甘草錢二

吳茱萸錢二

炒

每服五六錢姜七片紫蘇十葉水煎服一方無

姜附湯 霍亂轉筋手足厥冷多汗嘔逆方見

加味香薷飲 伏暑吐利不止煩悶多渴

本方加檳榔黃連 每五錢水酒各半煎服

冷香湯 夏秋伏暑引飲過食生冷遂成霍亂

良姜

附子

甘草

檀香錢各一

乾姜錢炒

草

葉一錢

丁香分三

分二服水煎連瓶沉井內待冷

人參散 霍亂體痛四肢逆冷服理中四順不者効

人參


白芍

川歸炒

良姜兩各一

附子

陳皮



桂心

白木

錢各三

每五錢加紅棗三枚水煎服

活命散

霍亂吐瀉不止面色青黑垂死者

防風

羌活

獨活

乾姜

細辛

各一分

草豆

菟

肉豆菟

川芎

錢各五

官桂

半

吳茱萸

木

瓜

兩各一

每三錢濃煎木瓜湯調服

回生散

霍亂不已吐利不止但有一點胃氣存

無不効者

陳皮

藿香葉

錢各五

水煎或為末

熱酒調服

秘方

霍亂吐利轉筋神効

白扁豆葉

根

研取汁一碗入米醋同服立瘥

加減理中湯

霍亂嘔吐

白朮

人參

乾姜

錢各三

甘草

錢各一

水煎服

若為寒氣濕氣所干者加附子一錢名附子

理中湯 若霍亂吐瀉加陳皮青皮錢各一名

治中湯 若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少

許頻服候吐出令透即進此藥 若嘔吐者

加丁香半夏各一錢姜十片同煎 泄瀉者

加橘紅茯苓各一錢名補中湯 溇瀉不已



於補中湯內加附子二錢不喜飲食及米穀
不化再加砂仁一錢 霍亂吐下心腹作痛
手足逆冷于本方內去白朮加熟附子名為
四順湯 傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎
服不效者及諸吐利後胃痞欲絕心膈高起
脹痛手不可近者加枳實茯苓各一錢名枳
實理中湯 若渴者再于枳實理中湯內加
瓜蒌根一錢 霍亂轉筋者理中湯內加火
煨石膏一錢 若臍上築者乃腎間動氣也

去朮加官桂一錢半腎惡燥去朮恐作奔豚
也故加桂取辛以潤之 若悸者加茯苓錢
渴欲飲水者加白朮五分 腹滿者去白朮
加附子一錢 若寒者再加乾姜一錢 飲
酒過多及啖炮炙熱物發為鼻衄者加川芎
一錢 傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰
陽安定血脉只用本方

三因白朮散 中暑嘔吐眩暈及大病後調理失
宜勞復及脾胃虛損面色青黃飲食不思口吐



酸水滑泄腹鳴飲食所傷霍亂吐瀉並宜服之
白芷 甘草炙 青皮 白茯苓 桔梗 香附
子 山藥 各三錢 乾姜 五錢 白朮 陳皮 各一兩
每一兩姜三片枣一枚木瓜一片紫蘇三葉
水煎服 若吐瀉加白梅煎 喘加桑白皮
杏仁 傷寒勞後加薄荷 膈氣加木通入
射香少許 中暑嘔逆加香薷 霍亂加藿
香 產後泄瀉加荊芥 氣厥加鹽煎服
調中白朮散 大病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱

及酒毒嘔噦

白朮

茯苓

人參

各五錢 藿香

五錢 甘草 炙一兩

木香

錢一 葛根

為末白湯調服

二錢 煩渴加滑石二兩甚者加姜汁

經驗方人參散

止吐逆及瀉後煩渴常服調中

和氣 人參

茯苓

各五錢 葛根

一兩 藿香

木香

甘草 炙一兩

分三帖水煎服

瀉後渴甚者

加滑石一錢

止渴湯 霍亂煩渴


甘草 炙 人參

麥冬

茯苓

桔梗

瓜蒌根



澤瀉

葛根

各五錢

右末蜜湯調下二錢

姜鹽飲

霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽

一兩

生姜

五錢

同炒令色變以水一碗煎

熱溫服甚者加童便一盞

麥湯 霍亂轉筋不止

麥一大握水煎湯薰洗或以帛蘸湯慰患處

一方 每遇轉筋時即以鹽搯擦痛處三五十匝

即雖皮破亦不妨可以斷根

灸法 霍亂已死腹中尚煖猶未絕氣者

用鹽納臍中令滿大艾炷灸三五七壯甦

麥冬湯 霍亂已愈煩熱多渴小水不利

麥門冬

茯苓

半夏

陳皮

白朮

各半錢

人參 小麥 甘草 各一錢 生姜五片烏梅半箇

煎服

青金丹 霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不効者

硫黃

一兩

水銀

八錢

右二味銚子內炒柳木篋

子不住手掩勻更以柳枝蘸冷醋頻洒候結

如鐵色即成青金丹乃刮下再研如粉留小



半為散餘以粽子尖三箇醋約半盞研稀稠
得所成膏丸如雞豆子大硃砂為衣每服一
丸煎丁香湯磨化下熱服如作散服以丁香
湯調下一錢傷寒陰陽乘伏用龍腦冷水磨
下一日二三服

海葰云吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中
四君子湯平胃散建中湯 每一兩姜五片水
煎服如吐瀉轉筋自汗脉浮者四君子湯加桂
五錢 吐瀉轉筋脇下痛脉絃者宜建中加木

瓜柴胡湯平胃散加木瓜五錢亦可也

建中木瓜柴胡湯

桂枝

半兩

芍藥

三兩

甘草

一兩

大棗

六枚

木瓜

五錢

柴胡

五錢

加飴糖兩匙

吐瀉後小便不通胸中實痛者

四君子湯加大黃

一兩

吐瀉腹中痛轉筋體重

脉沉而細者宜四君子加高良姜白芍藥四君

子四味各一兩芍藥良姜各五錢同煎法服

吐瀉霍亂四肢拘急脉沉而遲者宜四君子湯



加姜附厚朴湯四君子四味各一兩生姜附子
厚朴三錢製各三錢同前煎服 吐瀉轉筋四肢厥冷
服微緩者宜建中加附子當歸湯

桂枝一兩當歸二錢芍藥二兩粉草五錢飴糖半斤生姜一兩

附子三錢大棗六枚同前煎服 吐後轉筋木

瓜一味煎服良

轉筋

尋常轉筋四時皆有不因霍亂而發者其發多于
睡中或伸欠而作丹溪謂此多屬血熱以四物

湯加蒼朮紅花酒芩南星水煎服

有筋轉于足大指轉上至大腿近腰結了乃因奉
養過厚飲冷感寒而作寒過其熱寒主收引勁
急故筋轉而疼也前方加姜汁臨時服之

足太陽之下血氣皆少則善轉筋踵下痛

丹溪曰轉筋偏身入肚不忍者作極鹹鹽湯于槽

中暖浸之 礬湯亦妙 蓼湯亦好

仲景云轉筋之為病其臂脚直脉上下行微弦轉
筋入腹者雞屎白散主之



雞屎白炒為末取方寸七以水六合和溫服

程惠方 肝虛轉筋用赤蓼莖葉切作三合水一

盞酒三合煎四合分二服

孫尚藥 脚轉筋疼痛掣急

松節二兩剉如米粒乳香一錢以瓦器內慢火炒令焦只留一分出火毒為末每一錢至二錢熟木瓜酒調下但是筋病疼痛皆妙不獨轉筋而已

外臺治轉筋取舊綿以醎醋浸甑中蒸及熟用綿

裹患脚上冷則易勿傷皮以瘡為止

秘方 脚轉筋無時甚好

雄猪陰莖一條全者薄切香油煎熟細嚼鹽酒送下空心服連進三朝奇驗

中惡客忤門

中惡客忤者無故忽然而病倒者是也多受于道途及早晚門外忽得之卒受非節之氣令人心腹絞痛脹滿叫喚氣中心胃不急治則死磨好真烟墨一盞熱湯解服之又有鹽湯探吐亦好



卒死鬼擊或先病因睡卧間忽然而絕皆是中惡之候若脉氣應指心頭仍暖者搗石菖蒲灌之立甦如口噤須灌從鼻入

中惡暴死 石菖蒲為末每用五分安舌底又吹入兩耳及鼻中則甦

中惡入心須死

阿魏末益酒調下一錢半連進二服効

中惡吐血 生桔梗取汁每服一鍾日三無生者以乾者為末仍以桔梗湯調下

中惡容悴 蘇合香丸姜湯調下妙

效逆門

內經曰歲金太過效逆金鬱之發效逆少陰二氣效逆古謂之飢逆氣上逆作聲之名也經曰諸逆衝上皆屬于火是心火刑于肺金也易老曰效逆者火熱奔急上行而肺金不納何其當哉俗以為噦者非蓋噦者出聲也噦出其氣噦聲盡然後呼也出入呼吸大有不同况噦者本于胃效逆者本于肺又豈可例論哉然是症或由

水漬于肺而心痞或喜笑過多而氣噎或噤飲
錯喉而氣噎或急食乾物而氣塞皆令作欬逆
之聲連續不絕俗謂吃忒是也人或以紙燃取
鼻嚏而止或寃以恣賊因恐而止或鼻熱聞食
香調氣而止皆抑之駭之而使氣下也又有胃
氣寒而呃元禮戴氏以雜病發呃者皆屬寒惟
有傷寒發呃屬熱蓋由陽明內實過經失下清
濁不得升降以致氣不宣通而作或又有飲食
填塞胃中而氣不得升降者或有痰閉于上火

起于下而氣不得伸越者又有吐利後胃虛膈
熱而作呃者又有氣血虛作呃者不可以不辨
傷寒陽症欬逆者蓋由陰消將盡陽火暴甚直冲
而上出于胃入於肺而作聲所以東垣用涼藥
以瀉熱降火其陰症欬逆者蓋以陰氣先消陽
火將竭浮于胃中亦欲散也故反用丁香乾姜
之屬以養胃中陽氣胃氣一和陽生則陰長也
丹溪云傷寒發呃亦有四症不同有中氣不足脉
虛微氣不相續而發呃者宜補中益氣湯加生



脈散加黃栢以降虛火或少加附子服之立愈
○有陽明內實失下而發呃宜大承氣湯下之
○有渴而飲水太過成水結胃而發呃者宜小
陷胃湯或小青龍湯去麻黃加附子治水寒相
搏發呃者妙○有傳經傷寒熱症誤用姜桂熱
藥助起火邪痰火相搏而為呃者宜用黃連解
毒白虎湯及竹瀝之類○大凡食呃便秘者大
承氣下之便軟者瀉心湯主之○久病虛者見
此症最危○心法云欬逆有痰有氣虛有陰火

視其有餘不足治之其詳在格致餘論不足者
人參白虎下大補丸○有餘并有痰者吐之人
參蘆之類○痰碍氣而吃逆者用蜜水吐此乃
燥痰不能出○痰者以陳皮半夏○氣虛人參
白朮○陰火黃連黃栢滑石○欬逆自痢者活
石甘草炒黃栢白芍藥人參白朮陳皮加竹瀝
服

戴元禮云欬逆因痰與熱及胃火者極多
橘皮竹茹湯 胃熱多渴噦飢不進飲食





赤茯苓 陳皮 枇杷葉 麥門冬 竹茹

半夏各二錢五分 甘草各一錢二分 分二服每服

姜七片水煎一方只用人參陳皮甘草竹茹

小柴胡湯 加姜三片柿蒂三枚輕服治同上

橘皮乾姜湯 胃寒欬逆

陳皮 通草 乾姜 桂心 人參 甘草各

分水煎

丁香柿蒂散 病後胃中虛寒欬逆至八九聲相

連收氣不回者難治

人參 茯苓 陳皮 半夏 良姜炒 丁香

柿蒂各一兩 生薑半兩 甘草五錢 水煎服調蘇合

香丸服尤妙一方只用良姜丁香柿蒂甘草

四味水煎服

柿蒂湯 胃滿欬逆不止

柿蒂 丁香各三錢 一方加入參姜五片水煎服

皂莢半夏湯 治欬逆欲死

半夏一兩 皂莢八錢 為末煉蜜丸梧子大

每三九束湯吞日三服夜一服

羌活附子湯

吐痢後胃寒欬逆

羌活

附子

炮上
皮臍

茴香

炒炙
半兩

乾姜

炮

丁香

各一兩 每二三錢水一鍾鹽少許煎七分服

灸欬逆法

乳下一指許與乳相直骨間陷處婦

人三壯男左女右只灸一處火至則瘥不瘥即

不治又云其穴只當取乳下骨間動脈處是

無病偶然致飢此緣逆氣而生宜小半夏茯苓湯

加枳實半夏湯或用煎湯泡蘿蔔子研取汁調

木香調氣散乘熱服逆氣用之佳

人參白朮湯

人參

黃芩

柴胡

乾姜

甘草

梔子仁

各五錢

白朮

防風

半夏

炮

五味子

五六錢加姜五片水煎服

宣明桂苓白朮散

消痰止欬逆散痞塞關堅結

痛悶進飲食和臟腑

乾生姜

官桂

各半錢

茯苓

半夏

略一

白朮

橘紅

澤瀉

各五錢

右末麵糊丸小豆大姜湯下

三十九日三服一方加黃連半兩黃栢二兩




水丸効尤速

噫門 俗作噯氣

靈樞曰寒氣客于胃厥逆從下上散復出于胃故為噫又曰心為噫胃為噦釋之者曰神不守心故噫胃精內竭故噦傷寒書上焦不至其部故為噫中焦不至其部故為噦什之曰上焦竭善噫以上焦受中焦氣中焦不和不能消穀故令噫又曰緩者胃氣有餘噫而吞酸此言有餘者謂胃中有穀物未消故使噫而吞酸由此觀之

一由于胃寒一由于胃有宿食然亦有胃火衝逆而致者也有陰虛火因上炎而致者難以槩論也治法寒者溫之熱者涼之中焦未和者則消導以通之至于病久虛憊而噫則為神不守心而為死症矣

噫與欬逆不同噫乃出氣欬逆則為入氣然治法胃寒亦宜橘皮乾姜湯胃熱宜橘皮竹茹湯中焦未和而熱壅鬱或以調胃承氣下之或以加減平胃散以消之陰虛宜以四物湯或芎歸湯



加知母甘草以滋之

靈樞註云噫象火烟隨焰出心不受邪故噫出之
宜甘草瀉心湯以生姜易乾姜若有微熱時噫
者小柴胡湯

二陽一陰發病主驚駭背痛善噫欠也

仲景旋覆代赭湯 治痞而噫

本事方枳殼散 心下蓄積痞悶或作痛多噫敗

卯氣 枳殼 白朮 各五錢 香附 一兩 檳榔 二錢

為末每二錢米飲調下日三服

丹溪云噫氣胃中有痰有火

又云曾治宣州一人氣上築心膈噫氣脉之右

關短弱左關尺洪長而大數此肝有熱宜瀉肝

補脾 青皮 錢一 白朮 二錢五分 木通 甘草 分

水煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒

清胃中痰火 鬱熱暖氣

南星製半夏 各一兩半 軟石膏 香附 各一兩 山梔子

七錢 每八錢水煎服

下氣門



下氣屬心虛經云夏脉者心也心脉不及下為氣泄者是也

河間云腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通于腸胃之外故善噫而或下氣也

診論云顛癇癆瘵若氣下泄不止者必死此真氣竭絕腸胃腠理閉塞穀氣不能宣通于腸胃之外故從腸胃中泄出也

漏氣走哺門

病者身背皆熱肘臂攣痛其氣不續膈間厭悶食

入則先吐而後下名曰漏氣此由上焦傷風開其腠理經氣失道邪氣內著麥冬湯主之

麥門冬 生蘆根 竹茹 白朮 人參 甘


草 茯苓 陳皮 萎蕤

走哺病者下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆不禁名走哺人參湯主之

人參湯即前方加知母石膏黃芩

嘈雜門

生生子曰內經云胃為水穀之海無物不受若夫



濕麵魚腥水果生冷以及烹飪粘滑難化等物
恣食無節脾胃氣受傷失其健運之常清痰稠飲
由此而生嘈雜由此而作也夫嘈雜之為症似
飢不飢似痛不痛而有懊惱不自寧之態是也
或薰爇氣痞滿惡心漸至胃脘作痛數者多挾
痰火故丹溪云嘈雜是痰因火動治法宜以南
星半夏橘紅之類以消其痰芩連知母石膏梔
子之類以降其火蒼朮白朮芍藥之類以健脾
行濕又食鬱者梔子姜炒黃連山查之類又有

濕熱鬱滯不喜食者宜三補丸加蒼朮倍香附
蔣氏云心嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下
七八十九數服而愈要在臨症加減

脉法

右寸脉緊而滑兩寸弦滑胸中有留飲 寸脉
橫者膈上有橫積也 右關弦急甚者為木乘
土位欲作胃反難治

嘈雜亦有中氣不足者以六君子湯加竹茹黃連
三補丸



黃芩 黃連 黃柏分等 蒸餅糊丸服

二聖丸

白朮兩 黃連兩 陳皮兩 神麴糊丸姜湯下

右關脉沉嘈雜 二陳湯加藿香 若吐而有物有聲者加砂仁 有聲無物加姜炒黃連

眩暈門

丹溪曰眩言其黑暈言其轉

林氏曰眩者玄也謂忽然眼見黑花昏亂少頃方定暈者運也謂頭目若坐舟車而旋轉運也甚

有至于卒倒而不知者

丹溪又曰此症屬痰者多蓋無痰不能作眩雖因于風亦必有痰痰在上火在下火炎上而動其痰則作眩也治宜二陳湯加黃芩蒼朮羌活挾氣虛者亦治痰為主兼補氣降火如東垣白朮半夏天麻湯之類傷濕者降濕湯加川芎左脉數熱多脉溢有死血右脉實有痰積脉大久病眩運不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下甚効○戴云有因虛致暈雖暈然醒時面常欲得



熱手按之蓋頭者乃諸陽之會陽氣不足故耳
有頭眩而耳中常鳴頭上如鳥雀啾啾之聲切
不可全謂耳鳴為虛此頭腦挾風所為也○原
病式曰諸風掉眩皆屬肝木風主動故也所謂
風氣甚而頭目眩暈者由金虛不能制木而復
生火風火皆屬陽陽主動兩動相掉則為之旋
轉也成無己曰傷寒頭暈與眩冒者皆發汗吐
下後所致由陽虛也○嚴用和曰眩暈之症經
雖云皆屬于肝風上攻然體虛之人外感六淫

內傷七情皆能眩暈當以脉証別之風則脉浮
有汗項強不仁寒則脉緊無汗筋掣痛暑則
脉虛煩悶濕則脉沉重則吐逆及其七情所感
遂使臟氣不平鬱而生涎結而為飲隨氣上逆
令人眩暈眉稜骨痛眼不可開寸脉多沉此為
異耳若疲勞過度下虛上實金瘡吐衄便利及
婦人崩傷產後去血過多皆令人眩暈當隨其
因治之○張子和曰頭風眩暈手足麻痺胃腕
發痛皆風寒暑濕之氣雜至合而為痺也在上



為之停飲可用獨聖散吐之吐後服清上辛涼之藥○劉宗厚曰眩暈一証人皆稱為上盛下虛所致而不明言其所以然之故所謂虛者血與氣也所謂實者痰涎風火也原病之由有氣虛者乃清氣不能上升或多汗亡陽當升陽補氣有血虛者乃因亡血過多陽無所附當益陰補血此皆不足之症也有因痰涎鬱遏者宜導痰開鬱重則吐下有因風火所動者宜清上降火又有外感而得者嚴氏雖分四氣之異皆當

散邪為主此皆有餘之症也世所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沉香降氣之法蓋香竈散氣丹藥助火其不歸之氣豈能因此而復耶內經所謂治病必求其本氣之不歸求其本而用藥則善矣○林氏曰淫慾過度腎家不能納氣歸元使清氣逆奔而上此眩暈出于氣虛也吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈生于血虛也氣虛者宜益氣補腎湯血虛者宜補肝養榮湯若專用溫熱鎮墜丹藥多致飛



越之元其害有不可勝言者矣


生生子曰按劉林二公慎丹劑戒燥熱俱為保金水二臟真陰而言也木之有餘則挾火勢而侮肺金金受火侮津液枯涸降令不行生化之源絕矣况斷喪枯燥之腎曷能為其母復仇耶由是假藥餌以相濟也既知其腎虛不能納氣歸元矣寧復更以燥熱傷其母可乎都緣滯于溫補下元之說不體認夫真陰真陽之虛實以故相循習俗而為流弊也凡物各有屬也肺出氣

腎納氣今氣不歸元是腎之真陰不足當益腎陰以全其職可也腎雖屬陰臟而用藥亦自有氣血之分焉氣虛則用補骨脂杜仲兔絲子之類如安腎丸之謂也若血虛則以山藥山茱萸熟地黃之類如六味地黃丸之謂也氣是無形者至清所以能走空竅而施精明非有形之丹石所能鎮墜二公辨之允矣或曰經云形不足者溫之以氣精不足者補之以味吾子以溫補為謬可乎子曰前人已註之矣溫是溫存之溫



非專指溫暖之藥而言也味是味之厚者乃陰中之至陰本乎天造非偏厚出于人為之味也是皆不以溫熱為補明矣前証若果屬腎虛木旺火亢金衰則當從東方實西方虛瀉南方補北方之治則其氣自平而無偏倚之患也矣眩暈一証前賢著述病因方藥可謂周且備矣原其著述各有所發明也劉河間之肝木蕪于風火之化成無已之傷寒引汗吐下後之虛嚴用和之四氣七情張子和之停飲吐法朱丹溪之

痰火濕熱氣虛血虛死血久病戴氏之陽虛劉宗厚林億公之陰虛戒溫熱香竈之丹劑各剖其表製方立論誠後學之寶鑑一展視之毫髮畢覩原其設意蓋以人之司命為重故不以研心為勞也庸是窮究精微不為成說所縛補前人所未盡開來學之蒙蔽得非仁人之心其心歟今之醫者每每檢方治疾至于經旨病機全不攷究甚至有得一僥倖之方就以足為世世傳家至寶不妄泄人噫何其鄙哉方前諸君子



吐心露膽者為何如人耶聖人未嘗以聖自期也蓋以其有公天下之心立德不衰而後人稱之也賢人未嘗以賢自待也蓋以其有同天下之志繼聖不怠而後人誦之也後之視今亦猶今之視古也學者能不以聖賢之心為心焉

鈎藤散 肝厥頭暈清目

鈎藤 陳皮 半夏 麥冬 茯苓 石膏

人參 甘菊 防風錢各五 甘草半錢

每服四錢姜七片水煎溫服

肝厥狀如癰疾不醒嘔吐醒後頭虛暈發熱

麻黃 鈎藤取皮 石膏 乾姜 半夏曲

柴胡 甘草 枳殼 甘菊

每四錢姜三片棗一枚水煎溫服

婦人患頭風眩者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風熱故耳余嘗取此方以授人比他藥捷而効速名曰芎藭散

川芎兩一 川歸兩三 羌活 旋復花 蔓荊子

細辛 石膏 藁本 荊芥穗 半夏曲炒



防風 熟地 甘草 各半

每五錢姜三片水煎溫服

天麻半夏湯 風痰內作胸膈不利頭旋眼黑兀

兀欲吐上熱下寒不得安卧

天麻 半夏 各一錢 橘紅 柴胡 各七分 酒苓

前胡 甘草 各五分 白茯苓 各五分 黃連 三分

姜三片水煎食後溫服忌生冷酒麵

益氣補腎湯 淫慾過度腎家不能納氣歸元使

諸氣逆奔而上此眩暈出于氣虛也

人參 黃芪 各一錢二分 白朮 二錢 山藥 山茱

萸 各半錢 白茯苓 一錢 甘草 五分 粳米 二錢 水煎服

補肝養榮湯 吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣使

諸血失道妄行此眩暈生于血虛也

當歸 川芎 各二錢 芍藥 熟地 陳皮 各半錢

甘菊 錢五分 甘草 五分 水煎食前服 若腎虛氣不

降者去菊花入前補腎湯

清眩化痰湯 痰火上攻作眩及氣不降胸滿者

川芎 酒苓 各半錢 天麻 半錢 半夏 二錢 白茯苓



橘紅各一分 桔梗 枳殼各一分 甘草四分

痰結眩暈甚者加南星旋覆花各一錢

六合湯 風虛頭暈及血虛或去血過多

當歸 川芎各二錢 芍藥 熟地各一錢 秦艽一錢

羌活一分 水煎食遠服

川芎散 勞倦後身體發熱眩暈神魂不安

山茱萸一兩 山藥 甘菊花 人參 茯苓

小川芎各半兩 右末每服二錢酒調下

安腎丸 腎虛頭眩牙齒疼痛腰痛

破故紙炒 胡芦巴炒 茴香炒 川練炒 續斷炒

桃仁炒 杏仁炒 山茱萸 茯苓各半兩

右末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十九丸

六味地黃丸 見虛損門

加味參夏湯 七情相干眩暈欲倒者

人參 半夏各一兩 肉桂一兩 甘草錢五 乳香三錢

每五錢姜五片水煎服 又治七情之氣鬱

於心腹痛不可忍脈沉遲一服立効

枯礬散 治痰暈



拈礬為末姜湯調下一錢吐之立愈

清上丸 安神治痰火眩暈

石菖蒲 酸棗仁 膽星 茯苓 黃連 半

夏 神曲 橘紅各一兩 姜蚕 青代 木香各五錢

錢 柴胡七錢半 竹瀝打糊為丸食後茶下一

錢五分

瘖門

瘖者邪入陰部也經云邪搏陰則為瘖然有二症
一曰舌瘖乃中風舌不轉運之類是也一曰喉

瘖乃勞嗽失音之類是也蓋舌瘖但舌本不能
轉運言語而咽喉音聲則如故也喉瘖但喉中
聲嘶而舌本則能轉運言語也

痰涎乘虛閉塞舌本之脉道令人瘖

丹溪謂一人年三十五連日勞倦發嗽發瘖醫
與瘖藥三發後變為發熱舌短言語不辯喉間
痰吼有聲脉洪數似滑遂以獨參湯加竹瀝兩
蚶殼許兩服後吐膠痰三塊舌本正而言可辯
餘症未退遂煎人參黃芪湯服半月而諸症皆



退粥食調補兩月方能起

一中年舌短言語不辯始傷寒身熱師與傷寒藥
五帖後變神昏而瘖遂作體虛有痰治以人參
五錢黃芪當歸白朮陳皮各一錢煎湯入竹瀝
姜汁飲之十二日其舌始能語得一字又服之
半月舌漸能轉運言語熱除而痊

足少陰脉挾舌本足太陰之脉連舌本手少陰別
繫舌本若此三脉虛則痰涎乘虛而閉塞其脉
道故舌不能轉運言語也若此三脉亡血則舌

無血營養而瘖

經云刺舌下中脉太過血出不止為瘖治當補氣
血

一男子年五十餘嗜酒吐血補許後不食舌不能
語但渴飲水脉畧數與四物各一兩參朮各二
兩陳皮一兩半甘草二錢入竹瀝童便姜汁至
二十餘帖乃能言凡此三脉風熱中之則其脉
弛縱故舌亦弛縱不能轉運而瘖風寒客之則
其脉縮急故舌強舌卷而瘖治在中風半身不

收求之也

脉要精微篇岐伯謂心脉搏堅而長當病舌轉不能言

丹溪治俞繼道遺精誤服參芪及升浮劑遂氣壅于上焦而音聲不出用童便浸香附為末調服而疎通上焦以治瘖又用蛤粉青黛為君黃柏知母香附佐之為丸而填補下焦以治遺十餘日良愈 本草云童便主久嗽失音故治瘖多用之由其能降火故也

出音声方

訶子炮去核木通各一兩甘草半兩用水三升

煎一升半入生姜地黃汁一合再煎數沸放溫

分六服食後日三服 訶子治逆氣破結氣木通利九竅治肺癰甚當

訶子湯 治失音不能言語

訶子 四兩半生半煨 桔梗 生一兩半炒 甘草 二十半炙半生

右末每服二錢童便一盞水一盞煎至七沸

溫服甚者不過三服愈 桔梗通利肺氣訶子泄肺單氣童便降火

甚速



又方

桔梗

兩三

大訶子

箇四

甘草

兩二

每服

三四錢水煎入砂糖一小塊不入童便時時細呷一日服盡其効甚速

發聲散

治咽喉語聲不出

枯姜皮

白姜去頭

甘草

俱炒黃等分為

末每溫酒調下三錢或生姜自然汁調下用五分綿裹化咽津亦可日二三次不拘時肘後方 咽喉卒失音不出

陳皮

兩五

水三升煮取一升頓服

玉粉丸

冬月寒痰結在咽喉語聲不出

半夏

次炮五

草烏

分炒二

桂

二分

為末生姜汁浸

餗餅糊為丸雞豆大每夜噲化一丸多年不愈皆効 黃帝針經中說寒氣客于會厭卒然而啞此藥主之

蛤蚧丸治肺間邪氣胸中積血作痛失音并治久

欬失音

蛤蚧

一對去嘴足溫水浸去膜刮了血脉用好醋炙 訶子煨

阿膠炒生地

麥門冬

北細辛

甘草各錢

為末蜜丸枣子大每食後噲化一丸

千金方 暴失音語聲不出

杏仁泥 姜汁 砂糖 白蜜各一 五味子

紫苑各三兩 通草 貝母各四兩 桑白皮兩五

右水九升煮五味紫苑通草貝母桑皮取三

升去渣納杏仁泥姜汁蜜糖微火攪煎取四

升初服三合日再服一合後稍加

通声膏 五味子 欵冬花 通草各三兩 人參

石菖蒲 細辛 桂心 竹茹各三兩 杏仁升

白蜜斤 束膏 姜汁升 酥五升

水五升微火煎三上三下去渣納姜汁束膏

酥蜜煎令調和酒服如枣大二丸

丹溪治咳嗽聲嘶者此血虛受熱也用青代蛤粉

蜜調服之

濟世方 治失音及咯血

槐花瓦上炒香出火毒三更後床上仰卧隨意

吞之

又方 治卒啞

杏仁去皮尖 桂分 研如泥和取杏核大綿裹



含細細呬之日五夜三

丹溪治失音以桂末著舌下嚙津妙

十金斗門食
忌聖惠方同

內侍曹都使新造一宅落成入居半月飲酒大醉

卧起失音不能語召孫至診曰因新宅故得此

疾耳半月當愈但服補心氣薯蕷丸治濕用川

芩細辛又十日其病漸減二十日全愈曹既安見

上問誰治曰孫兆即中上乃召問曰曹何疾也

對曰允新宅壁上皆濕地亦陰多人乍來陰氣

未散曹心氣素虛飲酒至醉毛竅皆開陰濕之

氣乘虛而容心經所以不能語臣先用薯蕷丸

使心氣壯熱然後以川芎細辛去其濕

所以能
語也

靈樞經黃帝問于少師曰人之卒然憂患而言無

音者何道之塞何氣出行使音不彰願聞其方

少師曰咽喉者水穀之道路也喉嚨者氣之所

以上下者也會厭者聲音之戶也口唇者音聲

之扇也舌者音聲之機也懸雍垂者音聲之關

也頰頰者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主

發舌者也故人之鼻洞涕出不收者頰頰不開



分氣失也是故厭小而疾薄則發氣疾其開闔利其出氣易其厭大而厚則開闔難其氣出遲故重言也人卒然無音者寒氣客于厭不能發發不能下至其開闔不至故無音黃帝曰刺之柰何岐伯曰足之少陰上繫于舌絡于橫骨終于會厭兩瀉其血脉濁氣乃辟會厭之脉上絡任脉取之天突其厭乃發也

胎前產後瘖

素問黃帝曰人有重身九月而瘖此為何也岐伯

曰胞之絡脉絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫于腎少陰之脉貫腎係舌本故不能言帝曰治之柰何岐伯曰無治也當十月復

郭氏論產後不語者何荅曰人身有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉于心竅神志不能明了心氣通于舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散

七珍散 產後敗血閉塞心竅令人不語

人參 石菖蒲 生地 川芎 各一細辛



防風 辰砂另研各半兩 為末每服一錢薄荷湯下
胡氏孤鳳丹 產後閉目不語
白礬研末每一錢熱水調服

疸門

夫疸者謂濕與熱鬱蒸于脾面目肢體為之發黃是也疸之名有五 一曰黃汗者身體俱腫汗出不渴其汗能染衣黃如藥汁此由脾胃有熱汗出為風所閉熱結于中其汗黃也 二曰黃疸食已即飢遍身俱黃但欲卧小便澀黃增寒壯熱

此酒麴燂炙蘊熱瘀滯而得也 三曰穀疸食畢即頭眩心中怫鬱不安遍身發黃此脾胃有熱因大飢過食有傷胃氣所致也 四曰酒疸身目俱黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑此由飢中飲酒大醉當風入水所致也 五曰女勞疸大勞淫慾大熱交接衽席未幾遽就浴室以致發熱惡寒小腹滿急而身目俱黃也 五者之証雖不同而其為黃則一也 原其所自未有不由濕熱而致者也 濕也熱也而豈無輕重之別乎

濕氣勝則如薰黃而晦熱氣勝則如橘黃而明
蓋脾主肌肉土色本黃濕熱內蒸或重或輕自
然見于外矣自其濕熱痰而傷血此又為血症
發黃何以明之疸症之黃小便不利血症之黃
小便自利夫脾受濕熱鬱而不行亦多有腹脹
之疾治法大要疎導濕熱于大小便之中如茵
陳五苓黃連三黃之劑皆要藥也然又單陽無
陰病熱已極疸而不渴猶為可療疸而復渴加
之腹膨則為難治矣甚者寸口無脈鼻出冷氣

與夫形如烟薰搖頭直視為心絕環口變黑紫
汗發黃為脾絕雖遇虛扁亦將不救孰謂黑疸
其可療乎

加減五苓散 飲食伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利


茵陳 豬苓 白朮 赤茯苓 澤瀉各二錢

水煎食前服 一方有桂心七分

葛根豈鼓湯 治酒疸

葛根錢三 山梔仁 枳實燒 豈鼓各二錢

炙甘草錢一 水煎服



秦艽 飲子 五疸口乾發熱微寒

秦艽 當歸 芍藥 白朮 官桂 熟地黃

茯苓 陳皮 小草 川芎 半夏 甘草各

錢一 加姜五片水煎服

山茵陳湯 疸症發熱大小便秘澀

山茵陳 梔子 赤茯苓 枳實各半 葶藶

甘草各一 姜二片水煎服

加味四君子湯 治色疸

人參 白朮 茯苓 白芍藥 黃芪 炙白扁

豆二炒各錢 甘草錢一 姜五片束二枚水煎服

茵陳湯 時行痧熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳五 梔子仁半一錢 大黃錢三 水煎服

當歸白朮湯 酒疸發黃心胸堅滿不進飲食小

便黃赤脉弦滯 當歸 黃芩 茵陳 甘草

錢各一 白朮錢一 半夏 杏仁炒去 枳實炒

前胡錢各半 茯苓錢二 姜三片水煎服

白朮湯 酒疸因下後變為黑疸目青面黑心下

如咳蒜齶狀大便黑皮膚不仁脉微而數



白朮

桂心

枳實

豈豉

葛根

杏仁

炒去
皮尖

甘草

水煎服

桂枝加黃芪湯

黃汗身腫汗出已輒輕久久必

身潤胸中痛腰已下無汗其腰弛痛如有物在

皮中劇者不能飲食煩躁小便不利

桂枝

芍藥

甘草

黃芪

姜五片束

三枚水煎服忌生冷

茵陳散

黃疸食已即飢身體面目爪甲牙齒及

小便悉黃寒熱或身體多赤多青皆由酒食過

度為風濕所搏熱氣鬱蒸而成

茵陳

木通

大黃

梔子

石膏

瓜蒌

一筒

甘草

每五錢

姜五片

葱白一莖

煎至

八分服大小便秘加枳實赤茯苓葶

又有傷寒瘀血不解鬱于表發為黃疸其脉浮緊

當以汗解獨煎麻黃湯飲之

黃芪湯

黃汗身軀腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪

赤芍

茵陳

石膏

麥門冬

淡


豆豉

甘草

竹葉

姜三片

水煎服



滑石散 治女勞疸

枯礬錢五滑石半兩為細末每二錢用大麥粥湯

調服以小便出黃水為度

嗜藥瓜蒂散 黃疸遍身如金色累効

瓜蒂錢二母丁香錢四黍米九四粒赤小豆分五

為末每夜以少許吹兩鼻內嗜入便睡明日

取下黃水次服黃連散

黃連散 黃疸大小便秘臟腑壅熱

黃連一兩醋炒各黃芩一兩甘草各

每服二錢白湯下日三

犀角散 發黃心膈煩躁目赤痛

犀角屑 黃芩 梔子仁 升麻各一兩茵陳

朴硝各二兩每五錢竹葉七片水煎服

紫金丸 脾胃食積結塊令人四肢怠惰身面俱

黃壯腹膨脹俗名黃胖病此藥能理脾胃消積

聚退黃去脹進飲食

針砂銀鍋內醋炒赤色研紫金皮酒浸香附炒京三稜煨

蒼朮米泔炒陳皮 厚朴 砂仁各一兩



麵糊丸 梧子大每三十九丸 白湯下 或酒或川椒湯亦可 忌牛肉沙魚等物

大溫中丸 食積黃腫病

蒼朮 厚朴 陳皮 三稜 蓬朮 青皮

兩香附斤一 甘草兩二 針砂醋炒紅

醋糊丸 梧子大每五十九丸 空心姜湯下午後
鹽湯下 臨卧酒下

金黃丸 食積酒積諸積面黃積塊堅硬疸症

京三稜 黑丑各二錢 巴豆四十九粒 黍米粉去油為末

香附各半 澤瀉半錢 為末 梔子煎湯和丸 菜

豆大每三五丸 食遠白湯下

穀疸丸 專治穀疸

苦參兩三 龍膽草兩一 牛膽兩一

為末 以膽汁入少 煉蜜丸 梧子大每五十九丸
空心滾水或生姜甘草煎湯下

治黃疸効方

生蘿蔔子焙為末 白湯調下 日三服 每用二錢

厥證門



內經論寒厥為手足寒熱厥為手足熱不專以厥為手足冷矣故以六經厥狀言之太陽之厥腫首頭重足不能行發為胸陽明之厥癩疾走呼腹滿不得卧面赤而熱安見妄言少陽之厥頰腫而熱暴聾脇痛肝不可以運太陰之厥腹滿臌脹後不利不欲食食則嘔不得卧少陰之厥厥口乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥少腹腫痛腹脹波不利好卧屈膝陰囊腫脬內熱此分六經之厥亦不出寒熱二證劉宗厚謂陽證至為胸

仆為癩疾為妄見陰證至為臌脹大小便不利或嘔或心痛之類皆素多痰氣因虛所乘之為病陳無擇謂攷其所因多以不勝乘其所勝氣不得行遂致厥逆如腎移寒于脾則水乘于土水既不行乃成寒厥如心移熱于腎則火乘于水火既不行乃成熱厥六經皆然可次第論也再考張仲景傷寒論陰陽二厥之證則皆指手足逆冷而言不以陽厥為手足熱也原病式謂陰厥者原病脉候皆為陰證身涼不渴脉遲而



微陽脉者原病脉候皆為陽證煩渴譫語身熱
脉數若陽厥極深或失下變為身冷脉微欲絕
反見陰證者正為熱極而然若誤作陰證而用
熱藥治之必死王安道云熱極而成厥逆者陽
極似陰也寒極而成厥逆者獨陰無陽也陽極
似陰用寒藥獨陰無陽用熱藥今詳內經所論
寒熱二厥由腎之精氣內竭而成乃常病虛損
之證寒厥當補陽熱厥當補陰王冰所謂益火
之原以消陰翳壯水之主以鎮陽光是也若仲

景河間安道所論厥證乃傷寒傳變手足厥冷
者病情不同治法亦異診察之間生死反掌醫
者當詳究焉

按傷寒陽厥者先自三陽氣分感寒起于頭痛發
熱惡寒後傳入三陰血分變出四肢厥冷大便
燥實譫語煩渴揚手擲足不惡寒反怕熱脉沉
有力等証此因大實失下使血氣壅閉不通故
手足厥冷其手冷上不過肘足冷上不過膝或
有時而乍溫是外雖厥冷內實熱邪耳如火煉



金熱極則金反化水所謂亢則害其物承乃制其極也厥微者熱微四逆散厥深者熱深大承氣湯若誤作寒証而投熱藥是抱薪救火矣傷寒陰厥者是因三陰血分自受寒邪初病無身熱頭痛就便惡寒四肢冷過肘膝引衣捲卧或腹痛吐利小便清白或戰慄面如刀刮口吐涎沫脉沉遲無力此陰証也又有病自三陽傳入三陰久而變寒者亦陰厥也輕者理中湯甚者四逆湯且夫人之手足乃胃土之末凡脾胃有

熱手足必熱有寒手足必寒此理之常至于亢極反成蕪化此又病形之變也故凡厥無脉可診未辨其為陰陽者且與理中丸加甘草一倍試之若陽厥便當見出熱証陰厥則無熱証矣此法記之

汪子良內外厥論曰素問云盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之靈樞引此以言人迎寸口經刺之法難經引此以言子母本經補瀉之方而王氏真邪相持之註尤別夫聖人之言所該



自廣固可推而無不通然此段屬之六經厥狀
病能之下而意實兼承上文寒熱之厥而著其
所以治之之法故盛則瀉之言熱厥也虛則補
之言寒厥也皆主內傷不虛以經取之言六經
厥狀此主外感按經有言熱為有餘寒為不足
寒熱感衰之別久矣而人之一身臟腑咽喉之
類屬內經脉四肢皮膚頭項之類屬外故內傷
之治在臟腑外感之治在經絡不可紊也觀上
文云熱厥之故因酒入內氣薄于脾胃酒氣慄

悍腎氣獨衰陽氣獨盛故手足為之熱矣陽挾
酒毒鬱而為熱非盛而何故其治當瀉陽氣之
有餘也又觀上文云寒厥之故因秋冬勞傷脾
胃陽虛不能滲營其經絡陽氣獨損陰氣獨存
故手足為之寒也陽為陰搏痞而為寒非虛而
何故其治當補陽氣之不足也此二治者皆主
內傷也非因內傷則臟腑之內無盛虛之分由
外感邪氣客于經脉之間須審兼某經之証則
取其經隨病盛衰而施補瀉也如腫首頭重足



不能行發為昫仆者取之太陽如旃急卒心痛引腹者取之太陰之類是知此則聖言各有所指而意亦可以觸類而通矣

有人冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守牙緊口噤昏不知人頭旋暈倒者此尸厥也凡弔死問喪入廟登塚飛尸鬼擊多有此病急以蘇合香丸灌之候稍甦省以調氣散合平胃散治之名調氣和胃散一法急用姜汁半盞酒半盞煎沸灌之灸百會四十九

壯氣海丹田二三百壯奄体暖即止後以陰毒法治之此臘氣虛寒之証也世俗不識多作中風而治鮮不斃矣靈樞云邪客于手足少陰太陽足陽明之絡此五絡皆會于耳中上絡左角若臘氣相刑或外邪相忤則氣遏不行五絡俱絕諸脉伏匿令人身脉皆動而形無所知其狀若尸故名尸厥昔扁鵲治魏太子之尸厥針三陽五會而愈正此謂也

有人七情內傷卒然氣逆身冷僵仆牙關緊急痰



涎潮壅昏不知人者此氣厥也凡忿怒太甚多有此病勿悞作中風而用疎風散之藥急以蘇合香丸灌之候省以八味順氣散或木香調氣散調降其氣自然平復有痰者以四七湯加南星木香治之然暴厥不知人有不治自愈者昔宋仁宗最寵貴妃一日食次忽仆倒遍身卒冷急召孫尚杜任至奏曰不妨此氣厥耳少頃吐即復甦御坐良久果而甦上問因何而得二人並奏曰貴妃方食因憂怒氣上與食相併故如

此吐即氣通故復甦也素問云厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者陰氣盛于上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛于上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人也又云血之與氣并走于上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死者是也厥因氣虛而得者其脉細小宜四君子湯加黃芪附子○因血虛而得者脉洪大宜四物湯加酒炒黃栢知母○因氣血兩虛而得者宜十全大



補氣血加附子○有吐衄不知人而厥者此血厥也治之無論其脉急用芎歸養榮湯十全大補湯或獨參湯以救之○厥因飲酒而得者宜二陳湯加黃連梔子乾葛青皮或葛根解醒湯加減治之

有人醉飽之後或感風寒或着惱怒忽然厥逆昏迷口不能言肢不能舉者此食厥也蓋食滯胸中陰陽痞隔升降不通故生此症若誤作中風而用祛風散氣之劑則胃氣重傷死可立待宜

煎姜鹽湯探吐其食後以平胃散加茯苓白朮麥芽半夏之類調理若有風寒尚在者以藿香正氣散解之氣滯不行者以八味順氣散調之有小兒手足搐搦而發厥者此風厥也宜加減續命湯

五色篇雷公曰人不病而卒死何以知之黃帝曰火氣入于臟腑者不病而卒死矣雷公曰病小愈而卒死者何以知之黃帝曰赤色出兩顴大如拇指者病雖小愈必卒死黑色出于天庭大



如拇指必不病而卒死

姜附湯

乾姜炮 附子 水煎涼服

星香散

南星錢四 木香五聽磨 姜三片水煎服

順元散

木香分五 川烏錢炮 南星錢二 附子錢炮 姜片三

水煎服

導痰湯

南星 半夏 枳實 橘紅 赤茯苓 甘草

姜三片水煎服

調氣和胃散

白豆蔻 木香 丁香 檀香 藿香葉

砂仁 甘草 蒼朮 厚朴 陳皮 水煎服

八味順氣散

白朮 茯苓 青皮 陳皮 人參 白芷

烏藥 甘草 水煎服

木香調氣散



木香 藿香 丁香 檀香 白芷 薤 砂仁
甘草 為末沸湯入鹽少許點服二錢
芎歸養榮湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黄 黃柏
知母 人參 枸杞子 麥門冬 甘草

水煎服

加減續命湯

防風 防己 人參 黃芩 白芍藥 川芎
甘草 炙 麻黃 杏仁 桂枝 附子 炮 生姜

水煎服

知母

有汗加葛根黃芩

右方太陽無汗去桂枝附子有汗去麻黃杏仁陽明無汗加石膏

傷寒病有胃中虛寒細虫攻胃而手足厥冷口吐
清水或吐蛇者此細厥也宜理中湯加炒川椒
檳榔煎吞烏梅丸如不止用烏梅川椒黃柏煎
服蓋細見酸則安見辛則伏見苦則不敢動也

烏梅丸

烏梅 二枚 細辛 附子 炮 人參 黃柏 桂枝
乾姜 八錢 黃連 三錢 當歸 川椒 二錢



右末以醋浸烏梅取肉蒸爛杵膏加煉蜜和
丸每十五丸食前服

四逆散

甘草炙

柴胡

芍藥

枳實

等分

為末白湯調服方寸七日三服

蘇合香丸

治厥

方見氣門

論吐法

王海巖曰病有當吐而不可吐者如尺中脉按之
有力則當吐之若尺中按之無力不可吐也有

力則陽氣下陷于陰中為陰中所遏故吐之使
陽氣得上升而復其平也

綱目論病不可吐者有六病勢劇甚老弱氣衰者
不可吐吐不止則亡陽血虛者不可吐諸吐血
嘔血咯血衄血嗽血血崩失血者皆不可吐病
人無正性妄言妄從者不可吐主病者不辨邪
正之說不可吐性行剛暴好怒喜淫之人不可吐
張子和曰凡瀉後有頓快者有徐快者有反悶者
悶者病未盡也有反熱者不可不下也大抵二

日後無不快者凡下不止者以冰水解之凡藥熱即行寒即止

生生子曰經云上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死王海藏謂尺脉按之無力不可吐非與經背也經云下部無脉者謂病人當其正吐之時氣脉皆上逆而下虛是言病勢脉勢也若其人不吐而脉不至于尺乃腎經之原氣絕矣故云下部無脉者死也海藏謂尺脉按之無力不可吐者是言治法也凡尺脉有力則腎間有

原氣當吐去其邪則安矣若尺脉無力是腎陰已虛吐則復傷其陽陰陽俱虛必致顛蹶故曰尺脉無力者不可吐也經言其病王言其治也茶調散一名二仙散

瓜蒂不以多少好茶中停 右細末每二錢蒼汁調下空心服

獨聖散

瓜蒂不以多少為細末每一二錢蒼汁調下服之脇痛加全蝎 頭痛加蔚金



碧雲散

治小兒驚風有涎

膽礬

兩

銅青

分

粉霜

錢一

輕粉

分一

右細末每一字薄荷湯下

中風以漿水調


終






國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC





國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.




Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TIFFEN Color Control Patches © The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black



國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

449547 27





赤水玄珠第十七卷目錄

素問熱病論

問桂枝湯發汗治法

三昧三昧辨証

仲景傷寒例

太陰禁忌不可犯

四時表証治法

陶節庵辨仲景傷寒論

太陰當汗不當汗

問兩感邪從何入

傷寒傳變不一

當汗而不汗生黃

傷寒雜症候下變

傷寒至捷法

發汗過多成症

辨內外傷

十勸歌



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



不當汗而汗成蓄血

狂言讖語鄭声辯

看証法則

知可解不可解

陝明禁忌不可犯

辯表裏中三証

九味羌活湯解利法

汗多亡陝下多亡陝

辨陰陽二証

當汗而下之成協熱利

五臟受病相尅訣

太陝經六傳

太陝証治

太陝一下有八變

太陝頭痛

裏傳表

赤水玄珠第十七卷

新安生生子孫一奎著輯

熱論

黃帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也不知其解願聞其故岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故為諸陽主氣也人之傷於寒也則為病熱、雖甚不死其兩感于寒而病者必不免于死帝曰願聞其狀岐伯曰傷

寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明
受之陽明主肉其脉俠鼻絡于目故身熱目疼
而鼻乾不得卧也三日少陽受之少陽主膽其
脉循脇絡于耳故胃脇痛而耳聾三陽經絡皆
受其病而未入於臟者故可汗而已四日太陰
受之太陰肺布胃中絡於嗌故腹滿而噎乾五
日少陽受之少陽脉貫腎絡于肺繫舌本故口
燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循器而
絡于肝故煩滿而囊縮三陰三陽五臟六腑皆

受病榮衛不行五臟不通則死矣其不兩感于
寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰
身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰
病衰腹減如故則思食十一日少陰病衰囊縮小腹
不滿舌乾已而噎十二日厥陰病衰囊縱小腹
微下大氣皆去病日已矣帝曰治之柰何岐伯
曰治之各通其臟脉病日衰已矣其未滿三日
可汗而已其滿三日可泄而已帝曰熱病已愈
時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食



之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏
目其穀氣相薄而熱相合故有所遺也帝曰善
治遺柰何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必
已帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉
則復多食則遺此其禁也帝曰其病兩感于寒
者其脉應與其病形何如岐伯曰兩感于寒者
病一日則巨陰與少陰俱病則頭痛口乾而煩
滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲
食讖言三日則少陰與厥陰俱病則耳聾囊縮

而厥水漿不入不知人三日死帝曰五臟已傷
六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也
岐伯曰吹明者十二經脉之長也其血氣盛故
不知人三日其氣乃尽故死矣凡病傷寒而成
瘟者先夏至為病溫後夏至日為病暑當與
汗皆出勿止




仲景傷寒例

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣
冷冽此則四時正氣之序也

冬時戾寒萬類深藏君子固密則不傷于寒觸冒
之者乃名傷寒耳

其傷於四時之氣者皆能為病以傷寒為毒者以
其最成殺厲之氣也

中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏于肌膚
至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重



於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也凡時行者春時變暖而溼大寒夏時應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此其時行之氣也

夫欲候知四時正氣為病及時行疫氣之法皆當按斗曆占之

九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而為雨水故也至數蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便涼

從霜降以後至春分以前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也

其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為治不同証如後章

從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯



熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為
溫病

成云此為溫病也內經曰冬傷於寒春必病
溫

春分以後至秋分節前又有暴寒者皆為時行
寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為
寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所
折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病
熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳

中云此時天令漸熱一時不正之寒感之包
時令熱氣在內故發為疫病非冬傷寒之謂
也故成云此疫氣也

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名
為二十四氣

成云節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日
謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲
中云節氣者如立春正月節之類也中氣者
如雨水正月中之類也



然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而不去者或有至而太過者皆成病氣也金櫃要畧曰冬至之後甲子夜半少陽起少陰之時陽始生天得溫和以未得甲子天日溫和此為未至而至也以得甲子而天未溫和此為至而不至也以得甲子天大寒不解此為至而不去也以得甲子而天溫和如盛夏五六月時此為至而太過也內經曰至而和則平生而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至者病

中云非特冬為然餘三時亦當以此法觀之但冬甲子尤一歲氣運所關耳

但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳

成云天地之氣鼓擊而生春夏秋冬寒熱溫涼各正一氣也

是以彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之怒

成云春暖為夏暑從生而至長也秋忿為冬怒從肅而至殺也

是故冬至之後一陽爻升一陰爻降也夏至之後



一陽氣下一陰氣上也斯則冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也陰陽交易人變病焉此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也小人觸冒必嬰暴疹須知毒烈之氣晉在何經而幾何病詳而取之是以春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必病瘧秋傷於濕冬必咳嗽冬傷于寒春必病溫此必然之道可不審明之成云當春之時風氣大行春傷于風氣通

於肝、以春適王風雖入之不能即發至夏肝衰然後始動風淫末疾則當發於四肢夏以陽氣外感風不能外發故攻內而為飧泄飧泄者下利米穀不化而色黃當秋之時濕氣大行秋傷於濕、則干於肺、以秋適王濕雖入之不能即發至冬肺衰然後濕始動也雨淫腹疾則當發為下利冬以陽氣固濕氣不能下行故上逆而為咳嗽當夏之時暑氣大行夏傷于暑夏以陰主內暑雖入之勢



未能動及秋阴出而陽為內主然後暑動傳
陰而為痰癰瘕者二日一發瘰癧者一日一發
當冬之時寒氣大行冬傷於寒冬以陽為主
內寒雖入之勢未能動及春陽出而陰為內
主然後寒動傳陽而為溫病是感冒四時正
氣為病必然之道

陶節庵辯仲景傷寒論

客有過予而問之曰甚矣傷寒之蘊奧桂枝麻黃
二湯之難用也服之而愈者纔一二不愈而變

重者嘗八九仲景立法之大賢也何其方之難
憑有如此哉令人畏而不用以參蘇飲和解散
等平和之劑代之然亦未見其妙也子盍與我
言之荅曰吁難言也請以經語証之經曰冬氣
嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷於寒觸冒之
者乃名傷寒耳其傷於四時皆能為病以傷寒
為毒者以其最成殺厲之氣也中而即病名曰
傷寒不即病者其寒毒藏于肌膚至春變為溫
病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也以此



言之傷寒者乃冬時感寒即病之名桂枝麻黃
二湯為當時之傷寒設與過時之溫暑有何預
焉夫受病之源則同亦可均謂之傷寒所發之
時既異治之則不可混也請畧陳之夫春溫夏
熱秋涼冬寒者四時之正氣也以成生長收藏
之用風亦因四時之氣成溫涼寒熱也若氣候
戾寒風亦凜冽天道和煦風亦溫煖冬時坎水
用事天令閉藏水冰地凍風與寒相因而成殺
厲之氣人觸冒之腠理鬱塞乃有惡風惡寒之

証其餘月時則無此証也仲景固知傷寒乃冬
時殺厲之氣所成非比他病可緩故其言特詳
於此書而畧于雜病也倘能因名以求其實則
思過半矣不幸此書傳世久遠遺帖頗多晉太
醫令王叔和得散亡之餘註次流傳其功博矣
惜乎以已論混經未免穿鑿附會成與已氏曰
之順文註釋並無闕疑正誤之言以致將冬時
傷寒之方通解溫暑遺禍至今而未已也溫暑
必別有方今皆失而無徵也我朝宋景濂學士



嘗嘆傷寒非全書得其旨哉蓋傷寒之初中人必先入表者何即足太陽寒水之經此經行身之後自頭貫脊乃有頸疼脊強惡寒之証在他經則無此証矣况此經乃一身之網維為諸陽之主氣猶四通八達之衢治之一差其變不可勝言者矣故宜此二湯糞散表中寒邪經曰辛甘糞散為陽者是也若以此湯通治春溫夏熱之病則誤之甚矣曰傷寒糞于冬時已聞命矣邪之在表為太陽經也一經而有二藥之分

又何耶曰在經雖一然則有榮衛之別焉寒則傷榮証乃惡寒發熱無肝脉浮緊為傷寒有寒則見無寒則不見也當用麻黃湯輕揚之劑發而去之寒邪退汗出表和而愈矣曰緊脉固為寒矣脉之緩者亦用桂枝湯又何耶曰風則傷衛傷則自汗綠太陽受風不能衛護腠理疎而汗泄所以脉見浮緩也脉雖浮緩其受寒則一故亦宜桂枝辛溫之藥解散寒邪腠理閉而汗止表和而愈又有榮衛俱傷者二湯又難用



也故復設大青龍湯然此藥難用非庸俗得而識也曰溫暑既無方法治之則將柰何脉証與傷寒有何分別曰溫暑雖亦冬時感受風寒而不即散在人身中伏藏歷過二三時之久天道大變寒化為熱人在氣交之中亦隨天地之氣而化現仲景以即病之傷寒與傷暑時令為病之名豈無異哉治之之方亦必隨時以辛涼苦矣安得槩用冬時治寒之方乎今無其方者蓋散亡之也經既稱變為溫變為熱則已改易冬

時之寒為溫熱矣方亦不容不隨時改更也夫溫病欲出值天時和煦自內達表脉反見于右關不浮緊而微數曰惡寒否乎曰傷寒自冬月風寒而成外則有惡風惡寒之證既名為溫則無此症矣曰然則子之言有所執乎曰執乎經耳經曰太陽病發熱不惡寒而渴者溫病也不惡寒則病非目外来渴則明其自內達表曰春夏之病亦有頭疼惡寒脉浮緊者何也曰此非冬時所受之寒乃冒非時暴寒之氣耳或溫暑



將葬又受暴寒雖有脈浮之証未若冬時之甚也宜辛涼之藥通其內熱而解之斷不可用桂枝等劑矣曰溫熱與傷寒治之不同也已聞命矣敢問傷寒之在三陽則為邪熱既傳三陰則為陰証矣以熱治固其宜也三陰篇以四逆散涼藥以治四逆大承氣湯以治少陰其故又何耶嗚呼此蓋叔和以殘闕之經作全書銓次將傳經陰証混同立論所以遺禍至今而未已也姑畧陳之蓋風寒之初中人無常或入于陰或

入於陽皆無定體非但始太陽終厥陰或自大
次始日傳一經六日至厥陰邪氣衰不傳而愈
者亦有不罷再傳者或有間經而傳者或有傳
至二三經而止者或有始終只在一經者或有
越經而傳者或有初入太陰不作鬱熱便入少
陰而成真陰証者或有直中陰經而成寒証者
緣經無明文後人有妄治之失若夫自三陽傳
次三陰之陰証外雖有厥逆內則熱邪耳若不
發熱四肢便厥冷而惡寒者此則直中陰經之



寒証也自前人立說之差使後人蒙害者多矣
太陰受邪行尽三陰氣分傳次三陰之血分則
熱入深矣熱入既深表雖厥冷真熱邪也經曰
充則害承乃制熱極反兼寒化也若先熱後厥
逆者傳經之陰証也經云厥深熱亦深厥微熱
亦微是也故宜四逆散承氣湯看微甚而治之
如其初病便厥但寒無熱此則直中陰之寒証
也急宜四逆葦以溫之經曰發熱惡寒發于陰
也無熱惡寒發于陰也尚何疑哉又有日傳二

經為兩感者傳經未終而斃矣病有標本治有
逆從豈可聚論之乎曰陰証之不同已聞命矣
嘗讀劉守真書云傷寒無陰証人傷於寒則為
熱病熱病乃汗病也造化汗液皆陽氣也徧考
內經靈樞諸篇並無寒証陰証乃雜病也叔和
悞入之耳守真高明之士亦私淑仲景者而議
論之異者何耶曰雜守真之明達蓋亦目傷寒
論以桂枝麻黃通治溫暑之悞而有是說故叮
嚀云天道溫熱之時用桂枝湯必加冷藥於其



中免致黃生斑出之患若知此湯自與冬時即病之傷寒設不與過時之溫暑設則無此論矣况其晚年悟道著病機氣宜保命集其中羌活湯辛涼之藥以治非時傷寒其妙如神足可補仲景之遺旨何其高哉夫內經言傷寒即為熱病而無寒者語其常也仲景之論有寒有熱者語其變也合常與變而無遺者也所謂道並行而不相悖而反相為用也此其所以為醫家萬世之準絕標的也歟

王執中曰傷寒雖是一病然所感不同而證亦懸絕有冬傷于風寒即時便發名曰正傷寒者有至春變為溫病至夏變為熱病名曰伏熱病傷寒者有雖伏病在身至春夏亦未發偶因暴感風寒或色慾不謹或飲食不節觸動而發者亦曰伏熱病傷寒有冬月飲食不節誤傷冷物而發者亦名冬月正傷寒此其所感之不同也若夫春夏秋本無伏病在身而偶感風寒謂之四時傷寒即雜病也非仲景節菴之所謂傷寒也



故用參蘇飲藿香正氣散等藥與仲景節菴傷寒門藥大異至於所見之證則又不同有頭痛項強腰脊痛惡寒發熱者有滿身骨節痛有不頭疼不項強無腰脊痛寒熱骨節痛俱無者有頭不疼而即腰脊痛惡寒發熱骨節疼者有只頭疼而諸症俱無者有只腰脊痛而諸症俱無者有只惡寒發熱而諸症俱無者有只骨節痛而諸症俱無者有寒熱交爭狀似瘧疾者有協熱利下利清水狀似痢疾者有白瀉腹痛狀似

水瀉者有既吐且利揮霍撩亂名曰霍亂者有傷在一經以次傳徧者有始終只在一經者有越一經而傳者有越兩經三經而傳者有傳一二經而止者有傳變六經而再傳者有從陽經傳入陽明腑中者有從陰經傳入陽明腑中者不從六經傳來直中陽腑者此其症之不同也至於用藥一差則壞症百出莫測端倪不可言紀曰衄血曰吐血曰便血曰發斑曰發黃曰發狂曰如狂曰腹痛曰譏語曰鄭聲曰噦曰嘔曰



吐曰瀉曰利曰小水不利曰大便自利曰除中
曰不寐曰自汗曰盜汗曰手足汗曰頭汗曰陰
結曰陽結曰能食曰不能食曰狐惑曰脾約曰
吐蛔曰陰陽易曰勞復曰食復曰尋衣摸牀曰
撮空曰動氣曰奔豚曰肉苛曰舌卷囊縮不能
枚牽此其壞之不同也然非愚之臆說仲景先
師分為太陽等篇每條開示其經某症某脉了
了明白東垣先師撮其大綱究其玄旨陶節菴
先師又著家秘瑣言別門分類便覽初李令具

在十二卷中醫家檢之洞然自悉何至妄投藥
劑乃有殺人之慘也

傷寒至捷法

發熱惡寒身體痛脉浮無汗怎生醫十神湯與香
蘇散有汗傷風用桂枝

四日來口舌乾發熱身疼卧不安先服人參敗
毒散小柴胡湯在後者

七八日來熱在內口渴心煩腹脹暈小便赤少大
便難大柴胡湯好通利



發熱口乾大便瀉小便赤少煩燥結小柴胡湯煎
五苓加上黃連真一絕
汗下之後病不解依然熱渴如見怪解毒湯煎小
柴胡諸般熱病皆無碍

十助歌

彭用光

一傷寒頭痛及身熱便是陽證不可服熱藥傷寒
傳三陰三陽共六經內太陰病頭不痛身不熱
少陰病有反熱而無頭疼厥陰病有頭疼而無
發熱故知頭疼身熱即是陽證若妄投熱藥決

致死七

二傷寒必須直攻毒氣不可補益邪氣在經絡中
若隨証早攻之只三四日痊安若妄謂先須正
氣却行補益使毒氣流熾多致殺人

三傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥且傷寒不思
飲食自是常事終無餓死之理如理中丸之類
不可輕服若陽病服之致熱氣增重或至不救
丁香巴豆之類尤不可服

四傷寒腹疼亦有熱證不可輕服溫煖藥難經云



疼為實故仲景論腹滿時痛之証有曰疼甚者加大黃疼甚而加大黃意可見也惟身冷厥逆而腹疼者方是陰証須消息之每見腹疼使投熱藥多致殺人

五傷寒自利常有陰陽証不可例服補藥止瀉藥自利惟身不熱手足溫者屬太陽身冷四逆者屬少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽當隨證依仲景法治之每見下利使投煖藥及止瀉藥者致多死亡

六傷寒胸脇疼及腹脹滿不可妄用艾灸常見村落間有此證無藥便用艾灸多致毒氣隨火而盛膨脹發喘以不知胸脇疼自屬少陽腹脹難屬太陰仲景以為當下之病此外惟陰証脈微弱可灸

七傷寒手足厥冷當看陰陽不可例作陰證有陰厥有陽厥醫者少能分辨陽厥而投熱藥殺人速於用刃蓋陽病不至極熱不能發厥仲景所謂熱深厥亦深熱深更與熱藥寧復得生而身



熱至三四日後熱氣已深大便秘小便赤或譫
言昏憤及別熱證而糞厥必是陽厥宜急用承
氣湯以下之若初得病身不熱大便不秘自引
衣蓋身或下利或小便數不見熱證而厥者即
是陰厥方可用四逆湯之類二厥所以使人疑
者緣為其脉皆沉然陽厥脉沉而滑數陰厥脉
沉而弱又陽厥時浸指爪却溫或有时蒸熱陰
厥則常冷此為可別

八傷寒病已在裏即不可用藥糞汗然傷寒証須

看表裏如糞熱惡寒則是在表正宜發汗如不
惡寒反惡熱即是裏證若一例糞汗則真氣已
涸死者必矣又別有半在表半在裏之證不惟
皆不可下亦皆不可汗但隨證治之

九傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度病人
大渴當與之水以消熱故仲景以飲水為欲愈
人見此說遂令病者縱飲因而為嘔為喘為咳
逆為下利為腫為悸為痞為結胃小便下利者
多矣且如病人欲飲一碗只可與半碗常令不



足為善

十傷寒病初安不可過飽及勞動或食羊肉行房及食諸肉骨汁并飲酒如病方愈不須再服藥兼脾胃尚弱食飽不能消化病即再來謂之食復病方好氣血尚虛勞動大早病即再來謂之勞復又食羊肉行房並死食諸肉骨汁并飲酒再病必重右傷寒十勸誠可為病家醫家之便益治法也

治傷寒看證法則


陶節庵

凡看傷寒先觀兩目或赤或黃陽毒六脈洪大有
力燥渴者輕則三黃石膏湯重則大承氣黃為
疸證如小水不利或赤兼小腹脹滿不痛渴而
大便實脈來沉實有力者為濕熱萎黃輕則茵
陳五苓散重則茵陳湯分利小水清白為愈黃
自退矣劫法開在殺車槌方前
次看口舌有無胎狀如見滑白色者邪未入腑
屬半表半裏證宜小柴和解舌上黃胎者胃腑
有邪熱也宜下之調胃承氣湯大燥實脈沉有

力而大渴者方可下便不實脉不沉微渴者未
可下尤宜小柴胡湯舌上黑胎生芒刺者是腎
水乾于心火十有九死急用大承氣下之無疑
矣此邪熱已極也劫法開在殺車槌方前

已後以手按其心胃至小腹有無痛處若按之
當心下鞭痛手不可近燥渴譎語大便實脉未
沉實有力為結胸證急用大陷胃湯加枳桔下
之量元氣虛實宜從緩治若按心胸雖滿悶不
痛尚為在表未入乎腑乃邪氣填乎胃中只消

小柴胡枳桔以治其悶如未効本方對小陷胃
一服如神若按之當心下脹滿而不痛者宜瀉
心湯加枳梗是痞滿也以手按之小腹若痛而
小水自來利大便黑兼或身黃譎妄燥渴脉沉
實者為畜血桃仁承氣下盡黑物則愈若按之
小腹脹滿不鞭痛小水不利即溺澀也五苓散
加木通山梔利之不可大利恐耗竭津液也若
按其小腹遠臍鞭痛渴而小水短赤大便實者
有燥屎也大承氣下之劫法備開殺車槌方前



再後問其大小便通利若何有何痛處及服過何藥方知端的務使一一明白證脉相對庶得下藥不差凡看傷寒若見吐蛔者雖有大熱忌下涼藥犯之必死蓋胃中有寒則蛔上膈大凶之凡人皆未知急用炮乾姜理中湯一服加烏梅二箇花椒十粒服後待蛔定却以小柴胡退熱蓋蛔聞酸則靜見苦則安矣凡治傷寒若煩渴欲飲水者目內水消竭欲得外水自救大渴欲飲一升止可與一杯常令不足不可太過若

恣飲過量使水停心下則為水結胃中證射于肺為喘為咳留於胃為噎為噦溢於皮膚為腫蓄于下焦為癰滲於腸間則為利下皆飲水多之過也又不可不與又不可強與經云若還不飲非其治強飲須教別病生正此謂也

凡治傷寒若經十餘日已上尚有表證宜汗者與羌活沖和湯微汗之十餘日若有裏證宜下者可與大柴胡湯下之蓋傷寒過經正氣多虛恐麻黃承氣太峻悞用麻黃令人亡陽悞用承氣



令人不禁故有此戒若表証尚未除而裏証又急不得不下者只得以大柴胡通表裏而緩治之又老弱及血氣兩虛之人有下証者亦用大柴胡下之不傷元氣如其年壯力盛者不在禁例從病制宜

凡治傷寒尺脉弱而無力者切忌汗下寸脉弱而無力者切忌發吐俱宜小柴胡和之

凡治傷寒若汗下後不可便用參耆大補宜用小柴胡加減和之若大補使邪氣得補而熱愈盛

復變生他證矣所謂治傷寒無補法也如曾經汗下後果是虛弱之甚脉見無力者方可用甘温之劑補之此為良法其勞力感寒之證不在禁補之例看消息用之凡治傷暑與傷寒俱有熱若悞治之害矣傷寒則外惡寒而脉浮緊傷暑則不惡寒而脉虛此為不同治經云脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯加石膏知母或人參白虎湯天久淫雨湿令併行蒼朮白虎湯若元氣素弱而傷重者用清



暑益氣湯治之

中云治暑不宜輕用小柴胡夾暴感風寒者
或可用一二劑蓋傷暑非傷寒至夏變熱病
之暑病也

辨表裏中三証

王好古

假令必陽証頭痛往來寒熱脉浮弦此三症但有
一者是為表也口失滋味腹中不和大小便或
閉而不通或泄而不調但有一者是為裏也如
無上下表裏餘症者皆虛熱也是在其中矣

辨陰陽二証

王好古

陰証身靜重語無聲氣難布息目睛不了：鼻中
呼不出吸不入往來口與鼻中氣冷水漿不入
大小便不禁面上惡寒有如刀割身表涼知在
陰經也名曰陰証

陽証身動輕語有聲目睛了：鼻中呼吸出入能
往而能來口與鼻中氣皆然身表熱知在陽經
也名曰陽証

太陽六傳

王好古



太陽者乃巨脈也為諸脈之首膀胱經病若渴者
自入于本也名曰傳本

太陽傳少陽明胃土者名曰巡經傳為發汗不徹利
小便餘邪不尽透入于裏也

太陽傳少陰膽木者名曰越經傳為原受病脈浮
無汗當用麻黃而不用之故也

太陽傳少陰腎水者名曰表傳裏為得病急當發
汗而反下汗不發所以傳也

太陽傳太陰脾土者名誤下傳為原受病脈緩有

汗當用桂枝而反下之所致也當時腹痛四肢
沉重

太陽傳厥陰肝木者為三陽不至于首惟厥陰與
督脈上行與太陽相接名曰巡經得度傳

太陽證

太陽証頭痛發熱自汗惡風脈當緩而反緊傷風
得傷寒脈也

太陽証頭痛發熱無汗惡寒脈當緊而反緩傷寒
得傷風脈也



王執中云冬月此二証用九味羌活湯不應仍用
桂枝麻黃各半湯蓋穩於大青龍也

二証脉不同本經大青龍湯主之易老初用桂枝
麻黃各半湯後用大青龍湯以其有厥逆筋惕
肉瞤及亡陔之失也易老後又改為九味羌活
湯而不用桂枝麻黃也

太陔証發熱惡寒自汗脉緩

太陔証發熱惡風無汗脉緩

將麻黃一桂枝二為治淺漫改用羌活湯

此二証易老原

太陔頭痛

太陔膀胱脉浮緊直至寸口所以頭痛者頭與寸
口俱高之分也兼厥陰與督脉會於巔逆太陔
之經上而不能得下故壅滯為頭痛於上也左
手浮弦胸中痛也沉弦背俞痛右手浮弦者亦
然頭痛者木也最高之分惟風可到風則溫也
治以辛涼秋尅春之意故頭痛皆以風藥治之
者總其脉之常也然各有三阴三陔之異焉故
太陔則宜川芎陔明則宜白芷少陔則宜柴胡

太陰則宜蒼朮少陰則宜細辛厥陰則宜吳茱
黃也

王執中曰此即論風而不及寒者風亦寒氣
所化初從下起後從上來風與寒本相因但
感之不同耳故治傷寒者初分有汗無汗到
傳經後則不分矣由此觀之風藥亦能散寒
其理同也

治太陰則不可越經

王好古

假令治太陰之明不可遺太陰而只用少陰藥餘
倣此用三陰經解藥後身番覆重者若煩則是
有少陰明也若不煩而番覆輕者知不傳三陰也
不傳三陰則為解也大抵三陰之躰靜重與濕
相同傷寒五日後無汗謂穀消水去形亡故下
之三日謂內有水穀故汗之

問桂枝湯發汗

發汗或云當得汗解或云當發汗更發汗并發汗
宜桂枝湯者數方是用桂枝發汗也復云無汗
不得服桂枝又曰汗家不得重發汗又曰發汗



過多者却用桂枝甘草湯是閉汗也一藥二用如何說得仲景發汗與本草之義合而為一吞曰本草云桂枝味辛甘熱無毒能為百藥長通血脈止煩出汗者是調血而汗自出也仲景云脈無他病發熱自汗者此衛氣不和也又云自汗者為榮氣和榮氣和則外不諧衛氣不與榮氣相諧和也榮氣和則愈故皆桂枝湯調和榮衛榮衛既和則汗自出矣風邪由此而解非桂枝能開腠理發出汗也以其固閉榮血衛氣自

和邪無容地而出矣其實則閉汗孔也味者不解閉汗之意凡見病者便用桂枝湯發汗若與中風自汗者合其効桴鼓曰見其取効而病愈則曰此桂枝發出汗也遂不問傷寒無汗者亦與桂枝湯悞之甚矣故仲景云無汗不得服桂枝是閉汗孔也又云發汗多又手心悻欲得按者用桂枝甘草湯是亦閉汗孔也又曰汗家不得重發汗若桂枝發汗是重發汗也凡桂枝條下言蕪字當認作出字是汗自然出也非若麻



黃能開腠理而發出汗也本草出汗二字上文有通血脈一句是非三焦衛氣皮毛中藥是為榮血中藥也如是則出汗二字當認作榮衛和自然汗出非桂開腠理而發出汗也故後人用桂治虛汗讀者當逆察其意則可矣噫神農之作於其前仲景之述於其後前聖後聖其揆一也

太陰禁忌不可犯

小便不利不可使利之利之是謂犯本以是知五苓散不可妄用大便不可易動之是謂動血此為犯禁表在不可下之尤犯禁也

太陰証亦有當汗不當汗者

咽乾淋渴鼻衄小便不利已經發汗不得重發如無已上忌証雖經發汗倘邪氣未盡亦當重發之

當汗而不汗生黃

其証為風寒所傷陰氣下陷入於內而排寒水上行于經絡之間本當發汗因以徹其邪醫失汗



之故生黃也脾主肌肉四肢寒濕與內熱相合而生黃也

當汗而發汗過多成瘰

其証因發汗太過腠理開泄汗漏不止故四肢急難以屈伸

不當汗而汗成蓄血

蓄血其証燥火也當益津液為上而反汗以亡其津液其毒擾於之極則慢陰也故燥血而蓄於胃中也

血証見血自愈

太陰病入膀胱小便利而赤蓄血証也血自下者愈也

知可解

戰而汗解者太陰也不戰有汗而解者少陰也不戰無汗而解者少陰也若先差經必不爾矣

太陰傳少陰明其中或有下証少陰明証反退而熱煎不竭却退顯少陰証是知可解也

太陰知可解者頭不痛項不強肢節不痛則知表



邪退也

陽明知可解者為無發熱惡寒知裏易解也
少陽病知可解者寒熱日不移時而作邪未退也
若用柴胡而移其時早移之於晏移之于早
氣移之於血移之于氣是邪無可容之地知
可解也

知不可解

服解藥而去沉困只頭痛目悶是知濕去而風不
去則欲解也若風去而濕不去則不解何以然

風則高濕則下而入裏也

脉知可解不可解

可解之脉浮而虛不可解之脉浮而實浮而虛者
只是在表浮而實者知已在裏也汗多不解者
轉屬少陽也傷寒不頭痛知邪不在經若頭痛
者知邪在經也

易老九味羌活湯解利法

羌活 治太陽肢節痛君主之藥也乃撥亂反正
之主故大無不通小無不入關節非此不治也



防風 治一身尽痛乃軍卒中卑下之戢一折君

令而行随所使引之而至者也

蒼朮 别有椎壯上行之氣能除濕下安太陰使

邪氣不傳于足太陰脾

細辛 治少阴腎經頭痛

川芎 治厥阴頭痛在腦

白芷 治阳明頭痛在巔

生地黄 治少阴心熱在內

黃芩 治太阴肺熱有神

甘草 能緩裏急調和諸藥

已上九味雖為一方然亦不可執之中無權

猶執一也當視其經絡前後左右之不同逆

其多少大小之不一增損用之如神

右水煎服

若欲急汗當熱服以羹粥投之若緩汗溫服之而

不用湯投之也

脉浮而不解者先急而後緩 脉沉而不解者先

緩而後急



本湯不獨解利傷寒治雜病亦有神 中風行經者加附子 中風秘澀者加大黃 中風并三氣合而成痺等症各隨十二經上下內外寒熱溫涼四時六氣加減補瀉用之煉蜜作丸尤妙當汗而下之成協熱利

太陰一下有八變

太陰病下之其脉促不結胸者此為欲解也

脉浮者必結胸 脉緊者必咽痛 脉弦者必兩脇拘急 脉細數者頭痛不止 脉緊數者必欲嘔 脉沉緩者協熱利 脉浮滑者必下血

裏傳表

太陽反下之目而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之至於大實痛者胃也桂枝加大黃湯主之已傳成婦告夫也所以為裏傳表即名誤下傳也

三陰三陽辨証用藥治法

彭用光



太仄無汗麻黃為最大仄有汗桂枝可先小柴胡
為少仄之要領大柴胡行仄明之秘堅至三阴
則難拘定法或可温而或可下宜數變以曲全
生意或可方而或可圓

傷寒表証分別治法以便四時取用

傷寒表証是如何

左手脈浮

無汗惡寒身熱多頭

項俱疼脈浮取

輕手按之脈浮大而緊

施方施劑汗之和

冬麻黃湯十神湯
春夏羌活沖和湯

傷寒裏証治法宜次第

傷寒裏証心腹疼

邪傳入裡脈重取數洪

不惡寒而惡熱蒸

其脈數沉兼自汗二便秘少下之生

輕則大柴胡湯重則

三承氣湯選用

陽証 陽証身熱及頭疼身重咽乾難卧動或有譫

語及循衣脈息弦洪宜審用

脈洪大有力

十神湯葛根湯

九味羌活湯大柴胡湯

三承氣湯

次第選用

陰証 陰証身涼二便清病初自汗也頭痛也無

煩躁也無渴脈息沉微自可明



脉沉微無力

五積散
四逆湯

理中湯
三建湯

陰毒

手足甲青至節

三建湯

此症極危

灸關元

氣海

丹田

臍中

陽証似陰

陽証身涼冷四肢小便赤少大便稀

心煩口燥脉沉數白虎湯兼竹葉奇

脉沉數有力

竹葉石膏湯
三黃解毒湯

紫胡五苓

陰証似陽 陰証如陝面赤經小便清利大便通

渾身微熱沉遲脉真武湯佳兼理中

脉沉遲弱

五積散
附子理中湯

灸服藥而脉不回宜灸 氣海 神闕 丹田

陽厥 陽厥時、指爪溫心煩便秘口乾論脉來

沉細中還疾承氣柴胡最可吞

陰厥 陰厥身涼熱不回二便通滑不煩時脉未

沉伏知端的三建湯兼四逆宜

脉沉微昏憤

先以星烏乾姜湯

隨用三建

灸 此証倉卒無藥只灸關元氣海丹田妙

血發黃 發黃恰似烟薰色小便自利大便黑唇

焦漱水血家黃堯仁承氣湯堪搽



蓄血黃

此由脾胃熱甚失于汗下以致之宜抵當湯在仁承氣選用

濕証黃疸

發黃渾似橘皮明小便不利大便行

濕熱相蒸名曰疸首陳湯共五苓平

蓄熱陰黃

頭汗出四肢沉重如瘧俱用茵陳湯加五苓煎小柴加梔子湯

發斑 發狂

陝毒發斑是如何梔子大黃黑奴科 此症甚

危紅赤白易治如黑斑則胃爛難治如陽毒五

日內可治六日七日難治 人參石膏化毒湯 玄參升麻石膏湯

大青四物湯

溫毒

葛根橘皮湯 調胃承氣湯 黃連橘皮湯 猪胆鷄子湯

黑奴丸方 治陝毒發斑煩躁大渴倍常時行熱

病六七日未得汗脉洪大或數面赤目脹身痛

大熱煩躁狂言欲走渴甚又五六日以上不解

熱在胸中口噤不能言為壞傷寒醫所不治棄

為死人精魂已竭心下絳暖撥開其口灌下即

活人凡灌藥下咽便能即時甦醒

黃芩

芒硝

麻黃

釜底煤

小麦奴

灶突墨

梁上塵各一

大黃

錢兩



右為末煉蜜為丸彈子大井水化下即當發
寒：已汗出乃差若時頃不汗再服一九頃
見微利若不大渴不可與此藥

問兩感邪從何道而入

王好古

答曰經云兩感者死不治一日太陰與少陰俱病
頭痛發熱惡寒口乾煩滿而渴太陰者腑也自
背俞而入入之所共知之少陰者臟也自鼻
息而入入所不知也鼻氣通於天故寒邪無形
之氣從鼻而入腎為水也水流濕故腎受之經

曰傷于溫者下先受之同氣相求耳又云天之
邪氣感則害人五臟以是知內外兩感臟腑俱
病欲表之則有裏欲下之則有表：裏既不能
一治故死矣故云兩感者不治然兩感有虛實
所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺
者猶或可治：之不救者有矣夫未有不治
而獲生者也予嘗用此間有生者十得二三故
立此方以待好生君子用之

大羌活湯



防風

羌活

獨活

防己

黃芩

黃連

白朮

蒼朮

炙甘草

細辛

各三錢

知母

川芎

地黃各一兩

右每服五錢水煎熟服不解再服三四次必解病愈則止若有餘証並依仲景隨經法治之


傷寒候下變有輕重

或問曰傷寒雜証一寐若候下之甚者變大痞曰非一寐也傷寒候下變無定寐雜病誤下變有

定寐何以然傷寒自外而入也坎主動雜病自內而出也陰主靜動者犯之其變無窮靜者犯之其變止痞腹脇痛而已故變無窮者為重痞與腹脇痛者為輕也

辯內外傷

傷風鼻中氣出粗合口不開肺氣通于天也傷食口無味涎不納鼻息氣勻脾氣通于地也外傷一身盡熱先太暍也從外而之內者先無形也



內傷手足不和而兩脇俱熱先少陰也從內而之外者先有形也

內外俱傷人迎氣口俱盛或卒按皆實大表發熱而惡寒腹不和而口液此內外兩傷也

凡診則必捫手心手背手心熱則內傷手背熱則外傷次以脈別之

冬傷于寒者春必溫病夏為熱病長夏為大熱病蓋目房失勞傷與辛苦之人水虧無以奉春生之令故春少陰氣長而為溫病也夏為熱病者是

火先動于火未動之時水預虧于已旺之日故邪但藏而不為病也夏令炎蒸其火既旺與前所動者客邪與主氣二火相接所以為熱病也長夏為大熱病者火之方與秋之分皆手經居之水之方與春之分皆足經居之兩傷者皆經不足故夏火旺客氣助于手經則不足者愈不足矣故所用之藥皆泄有餘而非足經藥何以然泄有餘則不足者補矣此傷寒本足經只言足經而不言手經也大意如此至于傳手經者



亦有之當作別論與夫奇經之病亦在其中矣

狂言譏語鄭聲辨

狂言者大開目與人語、所未嘗見之事即為狂言也譏語者合目自言、所用常見常行之事即為譏語也鄭聲者聲戰無力不相接續造字出于喉中即鄭聲也

陽明症不可犯禁忌

不當發汗不當利小便若發汗利小便竭其津液則生蓄血症也惟當益津液為上以其火就燥

也益津液者蓮鬚葱白湯是也汗多亡陔下多亡陰小便重利之走氣三者雜異為言少津液則一也

汗多亡陔

汗者本所以助陔也若陔受陰邪寒結無形須當發去陰邪以渡陽氣所謂益陽而除風寒客氣也陰邪已去而復汗之反傷陔經曰重陔必陰故陔氣自亡汗多亡陔此之謂也

下多傷陰



下者本所以助陰也若陰受陽邪熱結有形須當
除去已敗壞者以致新陰此所謂益陰而除火
熱邪氣也坎邪已去而復下之反亡陰也經曰
重陰必敗故陰氣自亡下多亡陰此之謂也
傷寒五臟受病脈証相尅訣

心病舌強笑面赤燥煩掌熱口乾譏臍上
動氣洪緊數反得沉微命不全

肝臟 肝家面青目痛閉筋急怒容臍左氣脈當
弦急或兼長浮瀦短弓名不治

脾臟 脾家不食面皮黃躄重肢痛喜卧床動氣
當臍脈緩大弦長而緊是凶殃

肺臟 肺家面白帶憂愁吐血寒溫喘嗽求臍右
氣弓沉細瀦大而牢者死根由

腎臟 腎家面黑爪甲青耳閉足寒泄腹疼臍下
氣弓脈沉滑緩而大者死之形
已上皆受尅之脈為賊邪故凶也



赤水玄珠第十八卷目錄

痰證

傷食

虛煩

脚氣

傷寒用藥法則

六經用藥法

傷寒看證大畧

一提金脉要

國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館



目錄終

截江綱論脉
傷寒撮要論脉
六經圖正治法
煎藥法
劫病法
製藥法

赤水玄珠第十八卷

新安生生子孫一奎著輯

痰證

外證增寒壯熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息
頭不疼項不強若涎多者亦隱：頭疼脉有寸
浮者亦有寸伏者以意叅之柴胡半夏湯金沸
草散大半夏湯氣上衝瓜蒂散吐之

此亦風痰証也如食

積痰虛損痰不用此藥

傷食



亦頭疼惡寒身熱但左手脉平和右手脉緊盛知
為食大橘皮二陳湯心腹滿脹大柴胡湯下之
胸滿嘔吐者瓜蒂散吐之

亦夾食傷寒也全傷
食者恐不可用柴胡

虛煩

諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒頭不疼身不痛
為異耳表既虛不可汗裏不實不可下叔和云
虛煩有熱不可攻

脚氣

傷寒傳足不傳手所以寒濕之氣蒸于足發則類

傷寒其証頭疼身熱肢節痛大便閉或嘔但初
病時起于脚膝屈弱不能移動為異耳感於寒
所患必冷越婢小續命湯入生姜汁最妙感于
暑所患是熱小續命去附子減桂一半脚腫木
瓜散楨柳散大便秘脾約丸

論傷寒用藥法則

標本逆從之既明五劑之藥須用識且如表汗用
麻黃無芩白不發吐痰用瓜蒂無豉不湧去實
熱用大黃無枳實不通溫經用附子無乾姜不



熱甚則以泥清水加菰白煎之竹瀝無姜汁不能行經絡蜜煎無皂角不能通秘結非半夏姜汁不能止嘔吐非人參竹葉不能止虛煩非小柴胡不能和解表裡非五苓散不能通利小便非天花粉乾葛不能消渴解肌非人參麥門冬五味不能生脉補元非犀角地黃不能止上焦之吐衄非菴仁承氣不能破下焦之瘀血非黃耆桂枝不能實表開虛汗非茯苓白朮不能去濕助脾非茵陳不能去黃疸非承氣不能制定

發狂非枳椇不能除痞滿非陷胸不能開結胸非羌活不能治四時之感冒身疼非人參敗毒不能治春溫非四逆不能治陰厥非人參白朮不能化斑非理中烏梅不能治蛇厥非桂枝麻黃不能除冬月之惡寒熱隨汗解非姜附湯不能止陰寒之泄利非大柴胡不能去實熱之妄言陰陽咳嗽上氣喘息用加減小青龍分表裡而可汗下此傷寒用藥之大法也

陰經用藥格法



太陰脾土性惡寒濕非乾姜白朮不能燥濕也
少陰腎水性惡寒燥非附子不能溫潤
厥陰肝木藏血榮筋非芍藥甘草不能滋養此經
常之道

治傷寒看證大畧

凡證有頭疼惡寒皆是傷寒無則皆否也何則蓋
傷寒則惡寒傷食則惡食理固然也但風從上
來臥先受之寒從下來則先受之風與寒常相
因而感冒之時則又不同及其証之外見者則

一也

一提金脉要

人之陰陽即為先天人之氣血即為後天脉者非
血非氣乃血氣之先即營行之道路又問曰既
知先後天之脉理須明持脉之要曰舉曰按曰
尋三字若此不明即陰陽表裡虛實何以別之
持脉者輕手循之曰舉重手取之曰按不輕不
重委曲求之曰尋

截江網論脉



雜病以絃為陽傷寒以絃為陰雜病以緩為弱傷
寒以緩為和兩手無脉曰双伏一手無脉曰单
伏必有正汗也寸口阳脉中或見沉細者但無
力者為阴中伏阴尺部阴脉中或見沉數者為
阴中伏阳寸口數大有力為重阳尺部沉細無
力為重阴寸脉浮而有力主寒邪表實宜汗浮
而無力主風邪表虛宜實尺脉沉而有力主阳
邪在裡為實宜下無力主阴邪在裡為虛宜温
寸脉弱而無力切忌發吐尺脉弱而無力切忌

汗下初按来疾去遲名曰内虛外實去疾来遲
名曰内實外虛尺寸俱同名曰緩：者和而生
也汗下後脉靜者生躁乱身熱者死乃邪氣勝
也温之後脉来歇至者正氣脱而不復生也純
絃之脉名曰負：者死按之解索名曰阴阳離
離者死阴病見阳脉者生阳病見阴脉者死

傷寒掇要論脉

左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒右手脉来空虚
左手脉来緊盛是勞力傷寒左手脉来緊右手





洪滑或寸脉沉伏身熱惡寒隱々頭痛喘咳煩
 悶胸脇痛是夾痰傷寒左手脉來緊瀯右手
 脉沉數心胸脇下小腹有痛處是血鬱內傷外
 感六經圖及傷寒撮要一提金六經正治捷法
 足太陽經委中穴在脛中央約紋動脉陷中脛中
 央即膝後相對腿灣中也目內眦在面前眼內
 边神庭在中間額上額之角也



此圖玉枕至陰二穴膀胱經穴也風府穴督脉穴也膀胱與督脉會于頂顛連於風府太陽症項強故併及之

足太陽膀胱經圖頭為諸阳之首故多傳變受病為先也其脉起于目内眦從頭下至項連風府行身之背終于足也其証頭頂痛項強腰疼骨節痛經曰太陽頭痛脉浮項背強而惡寒嘔逆身疼或已發熱或未發熱者俱宜發表不可輒下之表邪乘虛内陷傳變不可勝數又不可利

小便利之則引熱入裡其害不淺若本病煩熱小便不利者乃利之則不禁如小便自利如常則不可利也凡有汗不得再發汗多不得利小便

足太陽起于目内眦上額過神庭弯至玉枕過項夾背脊由後廉而下至小趾外側至陰穴止

太陽經見證法

假如先起惡寒者本病已後發熱者標病若有一毫頭痛惡寒身熱不拘日數多少便宜發散自



然熱退身涼有何變証

此處寒熱標本指病之先後言上文本病煩熱之本字指六經標本言不可混看

辯証法

表裏自汗者為風傷衛氣宜實表實無汗者為寒傷營血宜發表

診脈法

診脈大凡皮膚之上輕手按之便得曰浮脈浮緊有力為傷寒脈浮緩無力為傷風

用藥法

冬月正傷寒用升陽發表湯即加減麻黃湯冬月傷風用疎邪實表湯即加減桂枝湯春秋無汗用羌活沖和湯發表有汗用加減沖和湯實表腹痛小建中湯痛甚桂枝加大黃湯夏月無汗用神木湯有汗用前加減沖和湯



足陽明經



此圖神庭穴督脉穴也陽明經神庭過故載之
 足陽明胃經圖乃兩陽合明于前也一曰府者居
 中土也萬物所歸也其脉起于鼻額上頭額絡
 于目循于面行身之前終于足也經曰傷寒二
 日陽明脉大又曰尺寸俱長者陽明受病也
 足陽明起于鼻兩傍上頭維從乳中近外傍而下
 前廉梁丘穴至大趾次趾之端厲兌穴止

陽明經見証法

頭額痛目痛鼻乾不眠微惡寒是足陽明胃經受



病假如先起目痛惡寒身熱者陽明經本病已後潮熱自汗譫語發渴大便實者正陽明胃府標病夫本宜解肌標宜急下看消息用之

辯證法

目痛鼻乾微惡寒身熱病在經潮熱自汗譫語發渴便實不惡寒病在腑

診脉法

按至皮膚之下肌肉之間畧重按之乃得之脉見微洪為經病按至筋骨之間重按之乃得脉見

沉數為腑病

用藥法

微惡寒自然目眵痛鼻乾不眠者用柴葛解肌湯即加減葛根解肌湯渴而有汗不解者如神白帛湯即加減白帛湯潮熱譫語發渴揭去衣被揚手擲足斑黃狂亂不惡寒反怕熱大便實者輕則大柴胡湯重則三承氣湯選用俱在秘方六一順氣湯加減治之



足少陽膽經其脉起于目銳眦上頭角絡耳中循
 胃脇行身之側終于足也前有陽明後有太陽
 居二阳之中所以居半表裡經曰尺寸俱弦者
 足少阳受病其證頭痛目眩口苦腦滿耳聾脇
 痛或心煩喜嘔或胸中煩悶而不嘔或心下病
 鞭或寒熱往來或發熱寅申時尤盛或身微熱
 者皆少阳也凡頭角痛耳中痛耳中烘之而鳴
 耳之上前後腫痛皆少阳所主部分其火為之
 也若口苦者少阳之膽熱脇下鞭者少阳之結

足少陽經



也

足少陽起于目銳眦上頭角絡耳中過乳外傍從
兩脇由外廉而下至小指次指之端竅陰穴止

少陽經見證法

假如先起惡寒身熱耳聾脇痛者本病已後嘔而
舌乾口苦者標病緣胆無出入病在半表半裡
之間止宜小柴胡湯加減和鮮表裡治之再無
別湯本方有加減法此經有三禁不可汗下利
也若治之得法有何壞証當須識此毋致忽焉

辯證法

耳聾脇痛寒熱嘔而口苦舌乾便屬半表半裡証
不從標本從手中治

診脈法


按至皮膚之下肌肉之間畧重按之乃得脈見弦
數本經

用藥法

耳聾脇痛寒熱嘔而口苦舌乾者用柴胡雙解飲
即加減小柴胡湯若陽明少陽合病則脈弦而



長此湯加葛根芍藥
足大陰經



太白
大陰
陰白

此圖腫中穴任脉穴也太陰脉過此故載之

足太陰脾經圖脾為中榮宮之坤土也其脉始干

足太指上行至腹絡于噤連舌本行身之前也

若寒邪卒中直入本經者一時便發腹痛或吐

或利宜溫之如四日而發腹滿噤乾者此傳經

之邪也宜和之若太陽病下之早因爾腹痛者

此誤下之而傳也凡治太陰症自利不渴脉沉

細手足冷急溫之若脉浮者可發汗宜桂枝湯

主之若發熱脉數者少陽之邪未解小柴胡湯

主之如自利不渴者臟有寒也宜理中湯甚者
加附子重則回陽救急湯即加減四逆湯腹滿
嘔吐食不下者宜治中湯手足冷脉沉細者宜
四逆湯若傳經邪熱內陷腹痛者宜桂枝芍藥
湯主之

足太陰從足大趾隱白穴由內廉而上環小腹上
乳內傍臆中其別從乳外近厥陰而上至喉下
人迎止

又云凡陽經傳來之邪終是陽明腑証皆不當和
亦不可用桂枝只三承氣選用其用桂枝者中
在陰經未入陰府也

太陰經見證法


腹滿自利津不到咽手足溫者是足太陰脾經受
証假如先起腹滿咽乾者本病已後身目黃標
病內有寒熱所分不可混治臨病之際用在得
宜

辨証法

腹滿咽乾發黃者屬腑熱自利不渴或嘔吐者屬



足少陰經



用藥法
 腹滿咽乾手足溫腹痛者桂枝大黃湯即加減桂
 枝湯身目黃者茵陳大黃湯即加減茵陳湯自
 利不渴或嘔吐者加味理中飲重則回陽急救
 湯即加減四逆湯

臟寒
 診脈法
 重手按至肌肉之下筋骨之間方得脈沉而有力
 宜當下脈見沉而無力宜當溫



足少陰腎經圖為人身之根蒂也其脉始于足心上行貫脊循喉絡舌本散舌下注心中行身之前也若因慾事腎虛者寒直中之也其証一二日便發故發熱脉沉足冷或惡寒倦則宜溫細散寒若五六日而發躁舌乾者此傳經之熱邪宜急下之恐腎水乾也如其脉沉細足冷者又不可下急溫之脉沉疾有力者乃可下之凡少陰飲水而小便色白者下虛有寒引水自救非熱宜溫之蓋少陰傷寒多因勞傷腎經之所致

有緊有慢其害甚速宜溫之不可以寒涼之藥妄投之也但脉沉足冷雖發熱者急宜溫腎以扶元氣

足少陰起于足心湧泉穴由內廉而上在太陰經之後行入乳內傍近臆中至喉下人迎止

少陰經見證

假如先起舌乾口躁者本病已後譏語大便實者標病至陰經則難拘定法或可溫而或可下因分直中者寒証傳經者熱症是其發前人之所



未發也

診脈法

重手按至肌肉之下筋骨之間方得脈見沉實有力宜當下脈見沉遲無力宜當溫

用藥法

口燥咽乾渴而譫語大便實或遠脛鞭痛或下利純清水心下鞭痛者俱是邪熱燥屎使然急用六一順氣湯分輕重下之即承氣湯有加減法無熱惡寒厥冷勑卧不渴或腹痛嘔吐瀉利沉重或陰毒手指甲唇青嘔逆絞痛身如被杖面如刀刮戰慄者俱是寒邪中裡使然急用回陽救急湯溫之即四逆湯有加減法



足厥陰經



此圖一經從缺盆下乳上入裏會於頂巔
 足厥陰肝經圖厥者盡也六經之尾也其脉起於
 足大指上環阴器抵小腹循脇肋上口唇與督
 脉會于巔頂行身之前側也若本經不足寒邪
 直中之也一日便發吐利小腹痛寒甚者唇青
 厥冷囊縮急宜温之并著艾灸丹田氣海以温
 之若六七日發煩滿囊拳者此傳經熱邪厥深
 熱亦深也若脉沉疾有力者宜急下之若脉微
 細者不可下也凡傷寒傳至厥陰經則病勢極



矣然死生在於頃臾可不謹察之也大抵熱深厥亦深則舌卷囊縮閉寒冷極亦舌卷囊縮也當要仔細而辯其冷熱之治其法微矣足厥陰起足大趾大敦穴由內廉而上在太陰經之前行入小腹過脇下從乳外傍彎入乳內傍至中脘而止其入裏行者會于巔頂也圖內不載

厥陰經見證法

假如先起消渴煩滿者本病已後舌卷囊縮者標

病亦有寒熱兩端不可槩作熱治

辨證法

煩滿囊拳消渴者屬熱口涎沫不渴厥冷者屬寒似瘧不嘔清便必自愈

用藥法

消渴煩滿舌卷囊縮大便實手足乍冷乍溫者急用六乙順氣湯下之即承氣湯有加減法口吐涎沫或四肢厥冷不溫過乎肘膝不渴小腹絞痛嘔逆者急用茱萸四逆湯即回陽救急湯有



加減法

煎藥法

一 發汗藥先煎麻黃一二沸後入餘藥同煎

一 止汗藥先煎桂枝

一 和解藥先煎柴胡

一 下藥先煎滾水入枳實

一 溫藥先煎乾姜

一 行血藥先煎桃仁

一 利水藥先煎豬苓

一 止瀉藥先煎炒白朮

一 消渴藥先煎天花粉

一 止痛藥先煎白芍藥

一 發黃藥先煎茵陳

一 發斑藥先煎青黛

一 發狂藥先煎石羔

一 止嘔藥先煎半夏

一 勞力感寒先煎黃芪

一 濕証藥先煎蒼朮



一感冒傷寒先煎羌活

一暑症藥先煎香薷

一瘧病藥先煎防風

一腹如雷鳴藥先煎煨生姜

已上俱以主病者先煎餘藥俱後入同煎

劫病法

一傷寒發狂奔走人難制伏先於病人處生火一

盆用醋一碗傾於火上其烟沖入鼻內即安方

可察其陽狂陰跡親切用藥無差若初起頭疼

發熱惡寒方除已後登高而歌棄衣而走踰牆
上屋罵詈叫喊大渴欲死脉來有力乃因邪熱
傳裏陽盛發狂當用寒藥下之此為陽狂凡見
舌卷囊縮者不治若病起無頭疼身微熱面赤
戴陽煩躁脉來沉微無力欲坐卧於坭水中乃
因寒熱而發躁手指甲面色青黑冷汗不止心
腹結靛如石躁渴欲死即陰証似陽當用熱藥
溫之此為陰躁凡見厥冷下利譏語者不治煩
詳脉來有力無力此為良法

傷寒腹中痛甚將涼水一盞與病人飲之其痛
稍可者屬熱當用涼藥清之清之不已而或遠
膝鞭痛大便結實煩渴屬燥屎急用寒藥下之
若食痛同治法若小腹鞭痛小水自利大便黑
身目黃者屬蓄血亦用寒劑加行血藥下尽黑
物則愈此三者皆痛隨利減之法也若飲水愈
加作痛屬寒當用溫藥和之和之不已而或四
肢厥冷腹痛嘔吐瀉利急用熱藥救之須詳脉
來有力無力此為良法

傷寒直中陽經真寒証甚重而無脉或吐瀉脫
元而無脉用好酒姜汁各半盞與病人服之其
脉來者可治當察其脉用藥不拘脉浮沉大小
但指下出見者生如用此法脉不至者必死又
當問病人何處有痛証要知痛甚者脉必伏宜
隨病制宜方為吉兆如無痛証用此法而脉不
至者不為吉兆尤當問病人若平素原無正取
脉須用覆手取之脉必見也此屬反關脉診法
與正取法同若平素正取有脉後因病診之無



脉者亦當覆手取之而脉出者阴阳錯乱也宜
和合阴阳如覆取正取俱無脉者必死此為良
法

一傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑俱用井水浸青
布片於舌上洗淨後用生姜片子時：蘸水刮
之其胎自退凡見舌生黑胎芒刺者必死此熱
毒入深十有九死是腎水尅心火也若發黃者
用生姜粗時：週身擦之其黃退若心胸脇下
有邪氣結實滿悶鞭痛用生姜一斤搗粗去汁

炒微燥帶潤用絹包於患處款：熨之稍可又
將粗和勻前汁炒乾再熨許久豁然寬快俱為
良法

一傷寒鼻衄成流久不止者將山梔炒黑為細末
吹入鼻中外將水紙搭於鼻冲其血自止若點
滴其血不成流者其邪在經未解照後秘方用
藥不在此法

一傷寒熱邪在裏服轉藥後鹽炒麩皮一升將絹
包於病人腹上款：熨之使藥氣得熱則行大



便易通矣

一傷寒吐血不止用韭汁磨京墨呷下其血見黑必止如無韭汁用鷄子清亦可正謂赤屬火而黑屬水也

一傷寒直中陰經真寒証或陰毒証身如被杖腹中絞痛嘔逆沉重不知人事四體堅冷如石冰指甲唇青藥不得入口六脉沉細或無脉欲絕者將葱縛一握切去根葉取白三寸許如餅先用麝香半分填於臍中後放葱餅於臍上以火

熨之連換二三餅稍醒灌入生姜汁煎服回陽救急湯如不醒再灸關元氣海二三十壯使熱氣通其內逼邪出于外以復陽氣如用此法手足溫和汗出即醒者為有生也如用此法手足不溫汗出不省人事必死

一傷寒熱病熱邪傳裏亢極無解用黃連煎水一盞放井中頓冷浸青布搭于胸中徐徐換之待熱勢稍退即除不可久漬夏月用此法冬月不宜用



一傷寒服藥轉吐出不納者隨用竹管重捺內關後將生姜自然汁半盞熱飲其吐即止大凡服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫和服之如要取汗雖辛甘之劑亦宜熱服如要止汗雖辛甘溫之劑亦宜溫服此為良法

內關中掌後腕二寸厥陰心包相火之經

一中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者先用皂莢末搥紙燒烟沖入鼻有嚏可治隨用吐痰法用皂莢末五分半夏白礬各三分為細末姜汁

調服探吐後服蕤痰湯加減治之無嚏不可治此為良法

一治乾霍亂不得吐者用滾湯一碗入皂莢末三分鹽一撮調服探吐切莫與米湯與之即死是穀氣反助邪氣也

一中寒卒倒昏迷不醒者先用熱酒姜汁各半盞灌入稍醒後服加味理中為効如不飲酒人止用姜汁灌之依此法調治冬月有之餘月不多見



製藥法

一用附子去皮臍先用鹽水姜汁各半盞用砂鍋煮七沸後入黃連甘草各半兩再加童便半盞再煮七沸住火良久撈起入磁器盛貯伏地氣一晝夜取出晒乾以備後用庶無毒害頂圓臍正一兩一枚者佳

一用川大黃須錦紋者佳剉成飲片用酒拌均燥乾後用不傷陰血如年壯實熱者生用不須製用麻黃去節先滾醋湯畧浸片時撈起以備後

用庶免大發如冬月嚴寒腠理至密當生用不須製

一用吳茱萸將鹽水拌均炒燥庶無小毒

一用附子後身目紅者乃附子之過用蘿蔔搗水瀝汁二大盞入黃連甘草各半兩犀角三錢煎至八分服之以解附子毒其紅即除如解遲必血從耳口鼻出者必死無蘿蔔用蘿蔔子搗水取汁亦可如無蘿蔔子用澄清坭漿水亦可也
一用大黃後瀉利不止者用烏梅二枚炒粳米一



撮乾姜二錢人參炒白朮各半兩生附子皮一錢半甘草一錢升麻少許灯心一握水二大鍾煎之去渣後入炒陳壁土一匙調服即愈取土氣以助胃氣也

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露出外用炒糯米半升龍骨牡蠣藁朮防風各一兩為細末周身撲之隨後秘方用藥免致亡陽而死此為良法

羌活冲和湯 治太陽傷風有汗脉浮緩

羌活 白芷 黃芩 甘草各半 防風 白朮

生地各錢半 川芎五分 右如前煎法若一服汗仍

未止加黃耆一錢半芍藥一錢仍未止以小柴

胡加桂枝芍藥各一錢

葛根湯 治太陽陽明項背強急無汗惡風脉帶

弦浮而發熱又治太陽與陽明合病必自利此

湯並主之 葛根錢一 甘草 麻黃各二錢去節湯泡二次

水二鍾姜四片枣二枚煎畧微燄取汗

獨活散 治傷寒溫熱等症





羌活 獨羌 防風 枳壳 黃芩 麻黃炮

人參 細辛 茯苓 炙甘草 蔓荊子

甘菊花 石膏 水二鍾姜三片薄荷五葉

煎

敗毒散 治傷寒溫疫風溫頭目昏眩四肢疼痛

增寒壯熱項強目睛疼尋常風眩拘急

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳壳

桔梗 茯苓 人參 甘草各等分

水二鍾如常煎服

六神通解散

麻黃 黃芩 滑石各二兩 石膏一兩 甘草半兩

蒼朮四兩 治時行三日前加葱白香豉煎服而

汗之立効中病即止不可尽劑

升麻湯 治傷寒中風頭疼增寒壯熱肢麻疼痛

發熱惡寒鼻中乾不得卧兼治寒暄不時人多

疾疫及暴熱之頃忽然變寒身麻疼痛頭重如

石 升麻 甘草 芍藥 葛根各等分

每服七八錢煎如常法若老人去芍藥加柴胡

茯苓人參各一錢

五積散 治陰經傷冷脾胃不和感冒寒邪

蒼朮二十兩桔梗十二兩陳皮八兩白芷各四兩茯苓各四兩

甘草四兩枳殼炒各五兩肉桂五兩人參五兩川芎各二兩

厚朴五兩半夏五兩芍藥五兩當歸五兩麻黃五兩乾姜各三兩

右十六味除枳殼肉桂陳皮其餘共一處生搗為粗末用酒拌勻晒干分作六分大鍋內文武火炒令黃色不得焦擲冷入殼桂陳皮和勻每服五錢水二鍾姜三片煎一鍾服

婦人血風証因崩漏大脫血或前後血因而涸燥其熱未除尋衣摸床撮空閉目不省人事揚手擲足搖動不安錯語失神脉弦浮而虛內有燥熱之極氣粗鼻乾而不潤上下通燥此為難治宜服生地黃黃連湯

治男子去血多亦有此症其妙不可容言

生地黃黃連湯

川芎 生地 當歸各七赤芍藥 梔子

黃芩 黃連各三分防風



每服五錢水煎清飲徐徐呷之如脉實可加大
黃下之大承氣湯氣藥也自外而之內者用之
生地黃、連湯血藥也自內而之外者用之氣
血合病循衣撮空治同

自氣而之血、而復之氣者大承氣湯下之自血
而之氣、而復之血者生地黃、連湯注二者
俱不大便此是承氣湯對子又與三黃石膏湯
表裏皆是三焦胞絡相火之用也病既危急只
得以此湯降血中火耳不拘婦人男子去血過

多而有此症者皆宜服之無不効者

秘用三十七方就註三十七槌法

升麻發表湯 即麻黃湯附加減法

治冬月正傷寒頭疼發熱惡寒脊強脉浮緊無
汗為表症此足太陽膀胱經受邪當發汗以頭
如斧劈身如火熾者宜此湯有汗者勿用

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 升麻 川芎

防風 白芷 羌活

本經發熱惡寒頭痛無汗而喘者本方加干葛



去升麻

本經發熱惡寒身軀痛者本方加蒼木芍藥去杏仁

本經惡寒發熱身痒面赤者以其不得小便出故也本方去白芷升麻杏仁加柴胡芍藥

本經頭痛發熱惡寒胸中飽悶者本方加枳殼桔梗

本經感寒深重服湯不作汗者再宜服至二三劑而汗不出者死

本經汗後不解者宜再服量症輕重用麻黃升麻分多寡為當

水二鍾姜三片葱白二莖槌法加江西豆豉一撮煎之熟服取汗有神宜厚被覆首凡中病即止不得多服多則反加別病

踈邪實表湯 即桂枝湯附加減法

治冬月正傷風頭痛發熱惡寒脊強脉浮緩自汗為表症此足太陽膀胱經受邪當實表散邪無汗者不可服



桂枝 芍藥 甘草 防風 川芎 羌活
白朮 如汗不止加黃芪 喘加杏仁柴胡
胸中飽悶加枳殼桔梗
水二鍾姜三片枣二枚槌法加膠飴二匙溫服
羌活冲和湯 以代桂枝麻黃青龍各半等湯此
太陽經之神藥也

治春夏秋非時感冒暴寒頭痛發熱惡寒脊強
無汗脉浮緊此足太陽膀胱經受邪是表症宜
發散不與冬時正傷寒同治此湯非獨治三時

暴寒春可治溫夏可治熱秋可治溫治雜症亦
有神也冬寒亦可用惟黃芩須輕投耳

羌活 蒼朮 錢各半 防風 黃芩 川芎 白芷

甘草 生地黃 錢各一 細辛 五分不

水二鍾煎八分熱服溫被蓋取微汗濕土司
天加蒼朮一錢五分天久淫雨亦加如渴加石
膏三錢知母一錢不渴不加冬月禁之

如胸中飽悶加桔梗枳殼去生地

夏月加石膏知母名神木湯如服此湯後不作



汗本方加蘇葉喘而惡寒身熱本方加杏仁生
地汗後不解宜服要汗下兼行加大黃乃釜底
抽薪之法

其春夏秋感冒非時傷寒亦有頭疼惡寒身熱
脉浮緩自汗宜實表本方去蒼朮加白朮汗不
止加黃芪即加減冲和湯再不止以小柴胡加
桂枝芍藥一錢有神

槌法姜三片枣二枚煎至一鍾加葱白搗汁五
匙再煎一二沸如發汗熱服止汗溫服

柴葛解肌湯 即葛根湯附加減法

治足陽明胃經受邪目痛鼻乾不眠微頭疼眼
眶痛脉來微洪宜解肌屬陽明經病其正陽明
腑病別有治法

柴胡 葛根 甘草 黃芩

芍藥 羌活 白芷 桔梗

本經無汗惡寒甚者去黃芩加麻黃冬月宜加
春宜少夏秋去之加蘇葉

本經有汗而渴者治法在如神白扁湯下即白



席湯

水二鍾姜三片枣二枚槌法加石膏末一撮煎之熱服

柴胡復解散

即小柴胡湯附加減法

足少陽膽經受證耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脉來弦數屬少陽表裏宜和解此經無出入有三禁不可汗下利也止有小柴胡一湯隨病加減再無別湯

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

陳皮

芍藥

若只小柴胡湯無芍藥

本經症小便不利加茯苓

脇痛加青皮

本經嘔者入姜汁竹茹

痰多加瓜蒌貝母

寒熱似瘧加桂 渴加天花粉知母

齒燥無津液加石膏 嗽者加五味金沸草

壞症加鱉甲

本經症心下飽悶未經下者非結胸乃表邪傳至胸中未入乎腑證雖滿悶尚為在表只消小柴胡加枳梗未効就以本方對小陷胸加枳桔



一服虛煩類傷寒証本方加竹葉炒粳米
本經與陽明合病本方加葛根芍藥
婦人熱入血室加當歸紅花
男人熱入血室加生地黃
老婦人傷寒無表証其熱勝者本方加大黃甚
者加芒硝
水二鍾姜一片棗二枚搗法加生艾汁三匙煎
之溫服

小柴胡湯證註釋

治太陽病十日已去脈細而嗜卧外雖已解設胸
滿痛與服之若脈浮者麻黃湯傷寒五六日來
往寒熱胸膈若痛默：不飲食心煩喜嘔或煩
而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞壅或心悸小
便不利或不渴身有微熱者此湯主之血氣弱
腠理開邪氣因與正氣相搏結于胸下邪正分
爭往來寒熱休作有時默：不飲食臟腑相連
其痛必下邪高痛下致使嘔也此湯主之服柴
胡湯已渴者屬陽明以法治之傷寒五六日身



熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者此湯主
之傷寒陽脉濇陰脉弦腹中急痛先與小建中
湯不差者此湯主之太陽病過經十餘日發汗
吐下後四五日柴胡湯証仍在者先與小柴胡
湯嘔不止心下鬱微煩者為未解也與大柴胡
湯下之則愈婦人中風七八日續得寒熱發作
有時經水適斷者此為熱入血室其血必結致
如瘕狀此湯主之傷寒五六日頭汗出微惡寒
手足冷心下滿不欲食大便硬脉細者為陽微

結必有表復有裏脉沉亦裏也汗出為陽微假
令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在
表半在裏也脉雖沉緊不得為少陰病所以然
者陰不得有汗也今頭汗出故知非少陰可與
此湯設不了之得尿而解傷寒五六日嘔而發
熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症在者
復與小柴胡湯心下痞為逆必蒸之而振却發
熱汗出而解若心下滿而腹痛者此為結胸也
大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞氣柴胡



不中與之宜半夏瀉心湯已上屬太陰經
末後五六日嘔而發熱至太陰經一段俱太陰
證節菴併及者見太陰証柴胡亦有當與不當
與者

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇不利者
與此湯陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白
胎皆可與之上焦浮通津液得下腎氣因和澀
然汗出而解陽明中風脉弦浮大而短氣腹部
滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得卧一

身及目悉黃小便難有潮熱時、噦身前後腫
刺之少差外不解病過十日脉續浮者此湯主
之已上屬陽明經太陽病不解轉入少陽脇下
滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者
此湯主之若已吐下後發汗溫鍼譖語小柴胡
湯証罷此為壞証知犯何逆以法治之已上屬
少陽經嘔而發熱宜服此湯傷寒已後更發熱
此湯主之若脉浮者以汗解之屬陽易差後勞
復脉證



欬用先加減法

如胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蒌仁煩者
熱也嘔者逆氣也令煩而不嘔則熱聚而氣不
逆邪氣欲漸成實也參甘恐補去之無助熱夏
味辛散去之以無逆氣也瓜蒌仁苦寒用之以
通鬱發于胸中

若渴者去半夏恐燥津液加人參之甘潤瓜蒌
根之苦潤相合則津液生而渴已也

若腹中痛去黃芩加芍藥寒邪入裏氣不足

寒邪壅則腹中痛苓苦寒性堅而寒中去之則
中氣易和芍藥味酸而和中加之則裏氣得通
而腹痛自愈

如脇下痞鞭去大棗之甘溫恐令滿加牡蠣之
酸鹹則痞消而鞭軟矣

若心下悸小便不利者去黃芩之苦寒恐蓄水
浸行加茯苓之甘淡能滲利則津液通矣

若不渴外有微熱去人參微熱恐有表邪加桂
枝取汗發散表邪也



若效者去人參大棗生姜加五味子乾姜肺氣
逆則效參朮姜甘溫中則肺氣愈逆故去之用
五味子之酸收歛肺氣乾姜之辛熱以散內之
寒氣則效自止若加葛根芍藥治少陽：明合
病頭畧痛發熱耳聾脇痛或往來寒熱如瘧和
解散治之和解散即小柴胡湯加減如嘔逆加
姜九片陳皮一錢如頭痛惡寒加羌活防風各
一錢寒熱間作加桂枝一錢夏月中暑發熱頭
痛加黃連一錢春天溫病時行加生地黃川升

麻一錢瘡疾或先寒後熱加川常山尖檳榔半
錢各要末發時煎服傷寒惡寒頭項強發熱前
方冲和湯內去細辛蒼朮加白朮二錢

桂枝大黃湯 即桂枝湯加大黃附加減法

治足太陰脾經受症腹滿而痛咽乾而渴手足
溫脈來沉而有力此因邪熱從陽經傳入陰經

桂枝 芍藥 甘草 大黃 枳實 柴胡

本經腹滿不惡寒而喘者加大腹皮去甘草
水二鍾姜一片朮二枚槌法臨服入桮柳磨水



三匙熱服

中云看此証不如三承氣湯選用或一日初傳太陰乃可現仲景書或者邪中陰經而留于腹者也不然必外証未全除可也不然此方亦當用在壞証例非本經藥也直說陽症傳來者誤也加味理中飲 即理中湯附加減法

治太陰脾經受証自利不渴手足溫身無熱脉來沉而無力此屬臟寒

乾姜

白朮

人參

甘草

肉桂

陳皮

茯苓

厥陰消渴氣上衝心飢不欲食即吐枕腹痛大便實者本方加大黃蜜少許利之

本經腹濡滿時減者本方去甘草
本經嘔者入半夏姜汁

本經勸卧沉重利不止少加附子

利後身躰痛者急溫之加附子

自利腹痛者入木香磨姜汁調服和之

水一鍾姜一片棗二枚槌法臨服入炒陳壁十



一匙調服取土氣以助胃氣

茵陳將軍湯 即茵陳湯附加減法

治足太陰脾經腹滿身目發黃小水不利大便實發渴或頭汗劑頸而還脉來沉重者宜用

大黃 茵陳 山梔 甘草

厚朴 黃芩 枳實

大便自調者去大黃厚朴加大腹皮利小便清為効

水二鍾姜一片槌法加灯草一握熱服

蕪赤飲 即五苓散附加減法

治小水不利小腹滿或下焦蓄熱或引飲過多或小便短赤而渴脉沉數者以利小便為先惟汗後亡津液與阳明汗多者則以利小便為戒

茯苓 猪苓 澤瀉 桂枝 白朮

甘草 滑石 山梔

中濕身目黃者加茵陳

水結胸證加木通灯心如小水不利而見頭汗出者乃阳脫也此死證



自得病起無熱但狂言煩躁不安精采不與人相當此湯治之
此因熱結膀胱太陽經之裡症也一名太陽本病

水二鍾姜一片灯心二十莖槌法入鹽二字

六一順氣湯 以代大承氣小承氣調胃承氣大柴胡三乙承氣湯大陷胸等湯之神藥也舉世無人知此奇妙耳秘之莫與俗人言附加減法治傷寒熱邪傳裡大便結實口燥咽乾怕熱譫

語揭衣狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬遠臍疼痛等症悉皆治之

大黃

枳實

厚朴

甘草

黃芩

柴胡

芒硝

芍藥

潮熱自汗譫語發渴揚手擲足揭去衣被狂妄斑黃大便實者俱屬正陽明胃腑病依本方口燥咽乾大便實屬少陰依本方

下利純清心下鞭痛而渴者屬少陰依本方

怕熱發渴譫妄手足乍冷乍溫大便實者陽厥



証屬厥陰依本方舌卷囊縮者難治須急下之
熱病目不明謂腎水已竭不能照物病已篤矣
惟宜急下依本方目中不了了即目不明也
轉屎氣者謂下泄也有燥屎焉當下依本方如
更衣者止後服不必及劑不更衣宜再少與大
便通者愈若結胸証心下鞭痛手不可近燥渴
譎語大便實者依本方去甘草加甘遂桔梗凡
傷寒過經及老弱併血氣兩虛之人或婦人產
後有下症或有下後不解或有表症未除而裏

症又急不得不下者用此湯去芒硝下之即吉
蓋恐轉藥硝性燥急故有此戒大凡傷寒邪熱
傳裏結實須看熱氣淺深用藥令之庸俗不分
當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃
芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣余謂傷
寒之邪傳來非一治之則殊耳病有三焦俱傷
者則痞滿燥實堅全俱宜大承氣湯厚朴苦溫
以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟
堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦



則有燥實堅三証故用調胃承氣湯以甘草和中芒硝潤燥大黃泄實不用枳朴恐傷上焦虛無氤氳之元氣調胃之名自此立矣上焦受傷則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大黃之泄實去芒硝不傷下焦血分之真陰謂不伐其根本也若夫大柴胡湯則有表症尚未除而裏症又急不得不下者只得以此湯通表裏而緩治之猶有老弱及血氣兩虛之人亦宜用此故經云轉藥孰緊有芒硝者緊也大承氣最

緊小承氣次之調胃承氣又次之大柴胡又次之其大柴胡加大黃小柴胡加芒硝方為轉藥蓋為病輕者設也仲景又云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

右先將水二鍾滾三沸後入藥煎至八分槌法臨服時入鐵銹水三匙調服立効取鐵性沉重之養最能墜熱開結有神此千金不傳之秘如神白扁湯 即白扁湯附加減法

治身熱渴而有汗不解或經汗過渴不解脉未



微洪

石膏

知母

人參

甘草

山梔

麥冬

五味

心煩者加竹茹一團如大渴心煩背惡寒者依本方去山梔加天花粉無渴不可服此藥為大忌

水二鍾姜一片棗一枚槌法加淡竹葉十片

一黃石膏湯

此湯治傷寒後五心煩熱舌燥表裏皆實怫鬱

陽毒發斑黃身如塗朱眼珠如火狂叫欲走十指皮脫六脉洪大滑數燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成壞症表裏皆熱欲發其汗病熱不退又復下之大便遂頻小便不利亦有錯治溫症而成此症者又八九日已經汗下後脉洪數身壯熱拘急沉重欲治其內由表未解欲發其表則裡症又急趨起不能措手待斃而已殊不知熱在三焦閉塞經絡津液營衛不通遂成此症又治汗下後三焦生熱脉洪數譎語不



休晝夜喘息鼻時加衄身目俱黃狂叫欲走者
通用此湯治之有神

石膏

一兩半

黃芩

黃連

黃栢

各七錢

山梔

麻黃

香豉

合

每服一兩水二鍾姜三片棗二枚槌法入細茶
一撮煎之熱服未中病再服

三黃巨勝湯

此湯治陽毒發斑狂亂妄言大渴叫喊目赤脉
數大便燥實不通上氣喘急舌卷囊縮難治者

權以此湯劫之三黃石膏湯內去麻黃香豉加
大黃芒硝是也

水二鍾姜一片棗二枚槌法臨服入泥漿清水
二匙調服即安

冲和靈寶飲 治兩感傷寒起于頭痛惡寒發熱
口燥舌乾以兩先受病多者先以此湯探之中
病即愈

羌活

防風

川芎

生地

細辛

黃芩

柴胡

甘草

乾葛

白芷

石膏



水二鍾煨生姜三片棗二枚槌法入黑豆一撮煎之溫服取微汗為愈如不愈表症多而甚急者方可用麻黃葛根為解表如裏多而甚急者先以調胃承氣為攻裏是也

如以陰經自中病發熱下利身疼痛脈沉細無力不渴倦卧昏重者又當先救裏溫之回陽救急湯是分表裏寒熱而治此其權變大法古云兩感雖為死証復有可救之理乃用藥先後寒熱之劑及發表攻裡之序不用故枉死者

多矣此方良可


菴仁承氣對子 即菴仁承氣湯附加減法

治熱邪傳裏熱蓄膀胱其人如狂小水自利大便黑小腹滿痛身目黃譏語燥渴為蓄血証脈沉有力宜此湯下尽黑物即愈未服前而血自下者為欲愈不宜服

菴仁 桂枝 芒硝 大黃 芍藥 柴胡

青皮 當歸 甘草 枳實

水二鍾姜三片槌法臨服入蘇木煎汁三匙服



消毒清黛飲 治熱邪傳裡、實表虛血熱不散
熱氣乘于皮膚而為斑也輕則如疹子重則如
錦紋重甚則斑爛皮膚或本屬陽候投熱藥或
當下不下或下後未解皆能致此不可發汗重
令開泄更加斑爛也然而斑之方萌與蚊迹相
類發斑多見於胸腹蚊迹只在於手足陽脉洪
大病人昏憤先紅後赤者斑也脉不洪大病人
自靜先紅後黃者蚊也其或大便自利短氣拂
鬱氣短燥屎不通又如菓實腐者廬醫復生不

能施其巧矣凡汗下不解足冷耳聾煩悶咳便
是發斑之候

黃連 甘草 石膏 知母 柴胡 玄參

生地 山梔 犀角 青黛 人參

水二鍾姜一片棗二枚槌法臨服入苦酒一匙
大便實者去人參加大黃

生地黃連湯 治鼻衄成流久不止者或熱毒入
深吐血不止

黃芩 山梔 桔梗 甘草 生地 黃連





柴胡 川芎 芍藥 犀角如無升麻代之

水二鍾 棗二枚 煎八分 槌法 臨服入茅根搗汁 磨京墨調服如無茅根以藕搗汁亦可

外用 劫法 水紙搭于鼻冲

加味犀角地黄湯 治煩躁 漱水不下 咽者 屬上

焦有瘀血

犀角 生地 芍藥 甘草 桔梗 牡丹皮

陳皮 紅花 當歸

水二鍾 姜三片 槌法 臨服入生藕節搗汁三匙

温服

回陽救急湯 即四逆湯附加減法

治寒邪直中 陰經真寒証 初病起無身熱 無頭 疼止則惡寒 四肢厥冷 戰慄腹疼 吐瀉不渴 引 衣自蓋 蹇卧沉重 或手指甲唇青 或口吐涎沫 或至無脉 或脉來沉遲無力

熟附子 乾姜 人參 甘草 白朮 肉桂

陳皮 五味 茯苓 半夏

嘔吐涎沫 或小腹痛 加鹽炒吳茱萸

無脉者加猪胆汁一匙 嘔吐不止加姜汁

泄瀉不止加升麻黃芪

水二鍾姜三片煎之臨服加麝香三厘調服中
病以手足溫和即止不得多服多則反加別病
矣如未止可用前理中飲加減治之無妨

回陽反本湯 治陰盛格陽陰極發躁微渴面赤
欬坐卧於坭水井中脉来無力或脉全無欬絕
者 附子 乾姜 甘草 人參 麥門冬

五味 臘茶 陳皮

面戴阳者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清
泥漿水二鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取
汗為効

柴胡百合湯 治瘧後昏沉發熱渴而錯語失神
及百合勞復等證

柴胡 人參 黃芩 甘草

知母 百合 生地 陳皮

渴加天花粉 胸中煩熱加山梔 頭微疼加
羌活川芎 嘔吐加姜汁炒半夏 胸中飽悶



加枳壳桔梗 食復者加枳實黃連甚重大便
實者加大黃 胸中虛煩加竹茹竹葉 瘥後
乾嘔錯語失神呻吟睡不安者加黃連犀角
咳喘加杏仁百合甚加麻黃 心中驚惕為血
少加當歸茯神遠志 虛汗加黃芪 脾倦加
白朮 腹中雷鳴加煨生姜 勞復時熱不除
加葶藶烏梅生艾汁
水二鍾棗一枚姜三片棗法加醋炙鱉甲煎之
溫服

如聖散 治副柔二瘧頭搖口噤身反張手足攣

搐頭面赤項強急與瘰癧同此法 羌活

防風 川芎 白芷 柴胡 芍藥 甘草

當歸 烏藥 半夏 黃芩 有汗是柔瘧加

白朮桂枝 無汗是副瘧加麻黃蒼朮 口噤

咬牙者如大便實者入大黃利之

水二鍾姜三片煎之臨服入姜汁竹瀝溫服

溫經益元湯 治因汗後太虛頭眩振々然欲擗
地并肉攣筋惕及因發汗太多衛虛亡陽汗不



止或下後利不止身疼痛者併皆治之

熟地 人參 白朮 黃芪 甘草 芍藥

當歸 生地 茯苓 陳皮 肉桂 大附子

如飽悶加枳殼去地黃 如瘦人去芍藥有熱

去附子 利不止加炒白朮升麻陳壁土去當

歸地黃 嘔者加姜汁製半夏 瀉者加天花

粉 汗後惡風寒屬表虛去附子肉桂生地加

桂枝膠飴 水二鍾姜三片棗一枚加糯米一

撮槌法煎之溫服

逍遙湯 治有汗傷寒瘥後血氣未平勞動助熱

復還於經絡有因與婦人交接淫慾而復發不

易有病者謂之勞復內交接淫慾而無病人反

得病者謂之陰陽易余曾見舌出數寸而死者

多矣此証最難治必宜此湯

人參 知母 竹青 卵縮腹痛倍加黃連

甘草 滑石 生地 萆根 柴胡 犀角

水二鍾姜三片棗二枚煎之臨服入燒棍襠末

一錢半調服有粘汗出為効不粘汗出再服以



小水利頭腫則愈

升陽散火湯 治有患人又手冒胸尋衣摸牀譏語昏沉不醒人事不可呼為風証而用風藥悞死者多矣蓋汗熱乘于肺金元氣虛不能自主持名曰撮空証小便利者可治小便不利者不可治 人參 當歸 柴胡 芍藥 黃芩 甘草 白朮 麥冬 陳皮 茯苓 有痰加姜製半夏 大便燥實譏語發渴加大黃 泄漏者加升麻炒白朮

水二鍾姜三片棗一枚槌法入金首篩煎之熱服

再造飲 治有患頭疼發熱項脊強惡寒無汗用發汗藥二三劑汗不出者苟不識此不論時令遂以麻黃重藥及火劫取汗悞人死者多矣殊不知陽虛不作汗故有此証名曰無陽証

黃芪 人參 桂枝 甘草 細辛 熟附子

羌活 防風 川芎 煨生姜

夏月加黃芩石膏冬月不加



水二鍾東二枚煎至一鍾槌法加炒芍藥一撮煎三沸溫服

黃龍湯 治有患心下鞭痛下利純清水譏語發渴身熱殊不識此証但見下利便呼為漏底傷寒而便用熱藥止之就如抱薪救火悞人死者多矣殊不知此因熱邪傳裡胃中燥屎結實此利非內寒而利乃逐日自飲湯藥而利也宜急下之名曰結熱利証身有熱者宜用此湯身無熱者用前一頓氣湯

大黃 芒硝 枳實 厚朴 甘草

人參 當歸

年老氣血虛者去芒硝

水二鍾姜三片東二枚煎之後再加桔梗煎一沸熱服

調營養氣湯 即加減補中益氣湯

治有患頭疼身熱惡寒微渴澀然汗出身痛脚腿酸疼沉痠脉空浮而無力不可因見頭疼惡寒發熱便呼為正傷寒而大發其汗所以輕變



重而害人者多矣此勞力內傷氣血外感寒邪
宜少辛甘溫之劑則愈名曰勞力感寒証故經
云勞者溫之損者溫之溫能除大熱正此謂也
有下証者大柴胡湯下之則緩

人參 黃芪 當歸 生地 川芎 柴胡

陳皮 甘草 細辛 羌活 防風 白朮

元氣不足者加升麻少許須知元氣不足者至
阴之下求其升 口渴加天花粉知母 喘嗽

加杏仁去升麻 汗不止加芍藥去升麻細辛

胸中煩熱加山梔竹茹 乾嘔加姜汁炒半夏

胸中飽悶加桔梗枳殼去生地甘草黃芪白朮

少許痰盛者加瓜蒌仁貝母去防風細辛 腹

痛去芪朮加芍藥乾姜和之 有因血鬱內傷

腹有痛處或大便黑加菔仁紅花去芍辛羌防

黃芪白朮甚者加大黃下尽瘀血則愈後去大

黃調理

水二鍾姜三片枣二枚槌法入葱白二莖煎之

溫服



導赤各半湯

治患傷寒後心下不鞭腹中不滿

大小便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中
獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之
則嚙不與即不思形如醉人俗不識此而悞人
者多矣殊不知熱傳手少阴心也心火上而迫
肺所以神昏名越經証

黃連

山梔

黃芩

滑石

甘州

知母

犀角

茯神

麥冬

人參

水二鍾姜枣煎之加灯心一握煎沸熱服

益元湯

治有患身熱頭疼全無不煩便作躁悶

面赤飲水不得入口不識者呼為熱証而用涼
藥遂至悞人殊不知元氣虛弱是無根虛火泛
上名曰戴陽証

熟附子

甘草

乾姜

人參

五味

麥冬

黃連

知母

葱

艾

水二鍾姜一片枣二枚枳法臨服入童便三匙

頓冷服

桂苓飲

治有患初得病無熱狂言煩躁不安精



采不與人相當切勿呼為狂發悞用下藥死者
多矣此因熱結膀胱名如狂証

猪苓

澤瀉

桂枝

甘草

白朮

知母

黃柏

山梔

蘼葉

水二鍾姜三片煎一鍾槌法再加滑石末一錢
煎三沸溫服取微汗為効

當歸活血湯

有患無頭疼無惡寒止則身熱渴

小水利大便黑口出無倫語設如不識呼為熱
証而用涼劑則悞矣殊不知內傳心脾二經使

人昏迷沉重故名挾血如見崇

當歸

赤芍

甘草

紅花

桂心

乾姜

枳壳

生地

人參

柴胡

薤仁

服三帖後去薤仁紅花干姜桂心加白朮茯苓
水二鍾姜一片煎之槌法入酒三匙調服

加味導痰湯

有患憎寒壯熱頭疼昏沉迷悶上

氣喘急口出涎沫庸醫皆作傷寒治之多悞殊
不知此目內傷七情以致痰迷心竅神不守舍
神出舍空則痰生也名曰挾痰如見崇痰症



類傷寒與此同治法

茯苓 半夏 南星 枳實 黃芩 瓜蒌仁

白朮 陳皮 甘草 桔梗 人參 黃連

年力壯盛先用吐痰法後服此湯

水二鍾姜三片枣二枚槌法臨服入竹瀝姜汁
溫服

加減調中飲 治食積類傷寒頭疼發熱惡寒氣
口脉緊盛但身不痛此為異耳經云飲食自倍
腸胃乃傷輕則消化重即吐下此良法也

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 白朮 山查


神麩 枳實 草菓 黃連 乾姜

腹中疼加菴仁 痛甚大便實熱加大黃下之
去山查草菓神曲干姜

心中兀：欲吐者與乾霍亂同吐法用滾水一
碗入鹽一撮皂角末五分探吐

水二鍾姜一片臨服入木香磨汁調服即効

加減續命湯 治脚氣類傷寒頭疼身熱惡寒支
節痛便秘嘔逆脚軟屈弱不能轉動但起於脚



膝耳禁用補劑及淋洗

防風

芍藥

白朮

川芎

防己

桂枝

甘草

麻黃

蒼朮

羌活

暑中三陽所患必熱脉來數去附子桂枝麻黃
加黃栢黃芩柴胡 寒中三陰所患必冷脉來
遲加附子 起于濕者脉來弱加牛膝木瓜
起於風者脉來浮加獨活 元氣虛加人參少
許 大便實者加大黃

水二鍾姜一片枣二枚灯心二十莖槌法臨服

入姜汁調服

苓連消毒飲 時天行大頭病發熱惡寒頭項腫

痛脉洪取作痰症治之其喉痺者亦照此方治

柴胡

甘草

桔梗

黃芩

川芎

荊芥

黃連

防風

羌活

枳壳

連翹

射干

白芷

先加大黃利去一二次 後依本方去大黃加

人參當歸

水二鍾姜三片煎一鍾加鼠粘子一撮再煎一



沸槌法入竹瀝姜汁調服

初起不可用大黃末後不減方可量加

加味六神通解散 治時行三月後謂之晚發頭

痛身熱惡寒脉洪數先用冲和湯不愈後服此

湯

麻黃

甘草

石膏

黃芩

滑石

蒼朮

川芎

羌活

細辛

水二鍾姜三片槌法入豆豉一撮葱白二莖煎


之熱服取汁中病即止

終






國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.



67 80247



國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





赤水玄珠第十九卷目錄

藥誤傷人

病人應死証

望色

聞聲

聞音

切脉

發汗止發汗

傷寒可吐

傷寒不可吐

傷寒吐不出

探法

傷寒吐不住法

傷寒不可下

小便不通燻法

胸膈不寬熨法

妊娠護胎法

傷寒不染病法

用藥寒

溫合宜論

妊娠傷寒禁忌藥

蒸臍法

熨臍法

中寒

傷寒合病

陰毒傷

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



寒

夾陰傷寒

寒疫

大頭傷寒

食積

中濕類傷寒

痰證類傷寒

瘀血類傷寒

嗽水不欲嚥

晝夜偏劇

心下滿

遺尿

大便自利

驚惕

呃逆

譫語

鄭聲

瘖瘖不言

陰疰似陽

冷結

蛇厥

鬱胃不仁

肉瞶筋惕

肉苛

百合

瘖瘖

循衣摸床

舌捲囊縮

瘖後發腫

瘖後遺毒

瘖後發碗頭瘡

瘖後勞復

女勞復

瘖後陰陽易

瘖後虛弱

瘖後昏沉

瘖後飲酒復劇

妊娠傷寒

產後傷寒

不可水

再三汗下熱不退

四肢冷

附四肢沉重四肢不收

結陽

結陰

寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在

骨髓

太陽傳經用藥

內傷似外感始為

熱中病

內傷似外感未傳寒中病

內傷

似外感陽明中熱病

內傷似外感溫熱病

內傷似傷寒

房室傷風

房室傷寒



目錄終

瘡瘍發熱類傷寒
赤膈傷寒
黃耳傷
寒
解休類傷寒
砂病類傷寒
搖頭
身痒
未交接而作易病治
人迎氣口脉
衝陽脉
太谿脉
結脉
促脉
代脉

赤水玄珠第十九卷

新安生生子孫一奎著輯

藥誤傷人

凡應用小柴胡湯和解誤用承氣湯致身發黃者
死中暑作熱病誤用燥劑者死腎虛受寒內逼
浮陽之火泛上面赤煩躁身有微熱渴欲飲水
不能下咽大便閉或自利小水淡黃或嘔逆或
氣短或鄭聲或咽痛狀似陽證醫見面赤煩渴
便閉認作陽證誤投寒涼立死陰證身熱面赤



足冷煩躁揭去衣被脉來數大無力不急用加
減五積散冷服誤用涼藥者死傷寒汗多用利
小便藥者死陽明病潮熱汗多小便因少若利
之加喘渴者死濕病若發其汗使人耳聾不知
痛處者死病人煩躁自覺甚熱他人以手按其
肌膚殊無大熱此為無根失守之火用涼藥者
死

病人應死證

頭重視身此天柱骨倒元氣已敗死大便濁氣極

真者死目精正圓者死卵縮入腹脈見離經者死
瘡後小便澁有血名曰內外瘡皆黑靨不出膿者
死少陰下利止頭眩時々自冒者死熱盛躁急不
得汗出是陽脉極死舌上黑胎生芒刺刮不去易
生者死夏月可治鼻衄自汗者死胃寒發呃丁香
香柿蒂良姜湯調服脉不出加膽汁合生脉散其
脉又不出或暴出者皆死

望色

昔肥今瘦主痰大肉脫去主不治平人消瘦主脾



熱眼眶黑主內有痰鼻色青主腹中痛苦冷者死
鼻色微黑者有水氣鼻色黃主小便難鼻色白者
屬氣虛鼻色赤者屬肺熱鼻色鮮明者有留飲鼻
乾燥者必衄血鼻色燥如烟煤者是陽毒熱極
孔冷滑色黑者是陰毒冷極鼻流濁涕者屬風
熱鼻流清涕者是肺寒鼻孔癰脹者屬肺熱有風
唇口焦紅者吉唇口焦黑者凶唇口俱腫赤者是
熱極唇口俱青黑者是寒熱唇口舌胎斷紋者難
治唇口燥裂者是脾熱唇青舌捲者死唇吻色青

者死環口鰲黑者死口張氣直出者死齒燥無津
液者是陽明熱極前板齒燥兼脉虛者是中暑齒
如熱者難治耳色黑枯燥者是腎憊目赤唇焦舌
黑者屬陽毒目熏黃色暗者屬濕毒目黃兼小便
利大便黑小腹滿痛者屬畜血目瞑者將欲衄血
目之白睛黃兼冷無熱不渴脉沉細者屬陰黃兩
皆黃者病欲愈凡開目見人者屬陽閉目不欲見
人者屬陰睛昏不識人目反上視睛小瞪目直視
目邪視目睛正圓戴眼反折眼胞陷下此八者皆



死證目睛微定暫時稍轉動者屬痰目中不了了者
睛不和不明白者此因邪熱結實在內不了了者
謂見一半目不見一半目是也舌腫者難治舌出
者死而顴頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒
治面赤脉數無力此伏陰病其證煩躁引飲虛陽
上升面赤脉沉細此少陰病外熱內寒陰盛格陽
宜溫誤用寒涼者死面赤脉弦數此少陽病宜小
柴胡和解緣面赤乃陽氣怫鬱在表汗不徹之
故宜發汗面部通赤色此陽明表證未解不可攻

裏宜解肌而唇青是陰寒極面青兼舌捲囊縮亦
是陰寒面青兼小腹絞痛是夾陰傷寒面目身黃
兼小水短澀是濕熱面目身黃兼小腹滿硬痛小
便利是畜血傷寒面白為無神或汗多或脫血所
致面白人不宜大汗黑氣在魚尾相牽入太陽者
死黑氣自人中入口者死黑氣自入耳目鼻舌者
死面黑人在傷寒內涉虛不宜參朮大補

聞聲

聲清聲濁

病邪在表其聲清而響曉病邪入裏



其聲濁而不嘔

聲輕聲重 病在陽分其聲前輕後重病在陰分

其聲前重後輕

聲斷聲續 病邪表淺併有餘陽證其聲續病邪

入深併內傷不足其聲斷

言壯言怯 外感內病有餘出言壯厲則寒熱交

作內傷陰證不足出言懶怯則寒

熱間作

嘆 嘆是心變動之聲

欠 腎主欠陰氣積下陽氣未及陽引而上陰引

而下陰陽相引故數欠也

噫 噫是心變動之聲是胸中氣不交通寒氣客

于胃厥逆從上下復出于胃故為噫

噎 噎是腎變動之聲有病發噎是傷風或傷熱

無病發噎是陽氣和滿於心

吞 吞是脾變動之聲

呃 其聲皆從胃中至胸嗌間而為呃有胃中實

熱失下者有胃中痰飲者有服寒涼藥過多



者有胃中虛冷者

咳 咳是肺變動之聲俗呼為嗽肺為邪干氣逆
不下也有肺寒咳者有停食咳者有邪在半
表半裏咳者

唏 陰氣實陽氣虛陰氣速阻氣遲陰氣盛陽氣
絕故為唏

怒 怒是肝變動之聲

歌 歌是脾變動之聲

哭 哭是肺變動之聲

笑 笑是心變動之聲

太息 憂思則心系急則氣約氣約則不利故
太息以伸屈之

錯語 意錯言亂自知言錯邪氣尚輕自不知竟
此熱甚正氣衰

呢喃 病邪入輕則睡中發此聲也

聲嘶 肺有風熱

聲啞 聲啞唇口見生瘡是狐惑病有風熱傷心
肺而聲啞者少陰病咽中生瘡者有瘡病



口禁

口禁者有熱病三四日不得汗出者死
口禁難言見手足牽搐是風瘧口噤不言
難治陽明病渴欲飲水口噤舌乾白虎加
人參湯咽乾不可汗

舌哽舌短舌強 病邪入深主難治

口噤咬牙 是風瘧

喉中有聲 喉中嚙々 有聲者是痰也

卒然無音 寒氣客於厭會則厭不能發々不能
下至其開闔不便故無音

聲如鼻鼾 聲如鼻鼾者難治

久病耳聾 屬氣虛

咽喉不得息 寸脉微浮或沉伏胃中痞鞭氣上

衝此胃中有寒宜吐之

鼻息如鼾睡 屬風濕

耳聾兼脇痛 宜和解寒熱咽而口苦屬少陽

耳聾兼耳腫耳痛 是少陽風熱

問因

口苦口甜 口苦是膽熱口甜是肝熱



舌乾口燥

是胃家熱極

心下滿

目下早致滿為痞氣手按拍之有聲又

與此停水手按則散此虛氣手按鞭痛

此宿食

喜明喜暗

喜明屬陽元氣實喜暗屬陰元氣虛

嚙向壁向外

向壁屬陰元氣虛向外屬陽元氣

實

病起覺不舒快少情緒否有此證是夾氣傷寒

病起覺勦卧骨腿酸疼脇痛否有此證是勞力傷

寒要知病在肝經問婦人乳頭縮不縮

耳聾耳聾邪氣入深難治或兼虛證有少陽證

不可不知

切生死形狀六經六絕脈

雀啄連來三五啄屋漏半日一點落彈石鞭來尋

即散搭指散亂真解索魚翔似有亦似無鰈遊靜

中跳一躍寄語醫家仔細看六脉一見休下藥

一動一止兩日死兩動一止四日通三動一止六

日亡四動一止八日事五動一止只十日十動一



止一年去春草生時即死期二十一動二年住清明節後始傾亡三十動一止三年次立秋節後病則危四十動一止四年住小麥一熟是死期五十動一止五年試草枯水寒時死矣此為太素脉
玄秘

左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒

右手脉來空虛左手脉來緊盛是勞力傷寒

左手脉來緊盛右手洪滑或寸脉沉身熱惡寒隱頭痛喘咳煩悶胸脇体痛是夾痰傷寒

左手脉來緊澹右手脉沉數心胸脇下小腹有痛處是血鬱內傷外感

鬼脉 得病之初便譎語或發狂六部無脉大指之下寸口之上有脉動者是

反關脉 如病人六部無脉便不可言其無要在掌後切看脉來動者是

傷寒不可發汗

口燥舌乾者口苦咽乾者咽喉痛者吐血下血者淋血者小便淋瀝者大便瀉利者內傷勞勩者尺



脉微弱者房勞陰虛者夢遺泄精者風濕者濕溫者中暑者瘡漏者

傷寒發汗不出燻法

用發表藥汗不出將蘇葉燒湯以器盛之至於被內兩膝下燻之又法用姜袒綿裹周身擦之其汗自出此良法也

傷寒汗出不住止法

將病人髮披在水盆中足冷于外用炒麩皮糯米粉龍骨牡蠣煨為末和勻周身撲之其汗自止此

良法也

傷寒可吐

胸中懊惱者喉中有痰聲者胸滿鬱微煩者中風寒痰涎擁塞者乾霍亂心腹刺痛欲死者傷寒三四日邪在胃中者脉大胃滿多痰者下利日數行寸口脉滑者寸口脉沉伏或浮滑有痰者

傷寒不可吐

病人元氣虛羸者房勞陰虛者勞倦內傷者胎產崩漏者寸脉虛細弱無力者經水適斷適來者少



陽胆病者

傷寒吐不出探法

用范子豉湯大瓜蒂散不得吐隨用三山丸合解
煎服再不吐將鷲羽在喉中探吐

傷寒吐不住止法

用炒糯米一撮生姜自然汁少許水煎服凡嘔吐
止者亦用此二味入各藥中同煎服嘔吐自止如
胃實嘔吐不可用

傷寒不可下

六脉虛細者嘔吐者腹中時滿時減者不轉屎氣
者少陽膽病者腹如雷鳴者陽明面冷赤色者咽
中閉塞者血氣兩虛者內傷勞勦者陰虛勞勦者
經水適斷適來者胎前崩漏者小便清白者夾陰
面赤者心下鞭者脉雖大無力者

傷寒小便不通燻法

一切小便不利先將麝香半夏填患人臍中上用
葱白田螺各搗爛成餅封於臍上用布帶縛住良
久下用皂夾燒烟燻入阴中其水竇自通婦人亦



用皂夾煎湯洗玉戶立通

傷寒胸膈不寬熨法

一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結大小結胃痞氣結者俱用生姜搗爛如泥去汁取粗炒熱絹包漸揉熨心胸膈下其滿痛豁然自愈如姜查冷再入姜汁再炒再熨揉之以愈為効惟熱結用冷姜查揉之不可炒熱醫當慎之又有傷寒衄血將解未及或熱極及吐血不尽醫不知其證遂用涼藥之劑止住其衄血留結於心胸之分

故滿痛而成血結胸也用加味犀角地黃湯

妊娠傷寒護胎治

用井底泥青黛伏龍肝各為末調勻塗於孕婦脛中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

到傷寒家不染病法

凡入病家須避其邪氣不使染着為上以雄黃末塗鼻孔行動從客位而入男子病穢氣出於口女子病穢氣出于陰門其相對坐立之間必須識其向背



用藥寒溫合宜論

如麻黃得桂枝則能發汗芍藥得桂枝則能止汗
黃芪得白朮則止虛汗防風得羌活則治諸風蒼
朮得羌活則止身痛柴胡得黃芩則寒附子得乾
姜則熱羌活得川芎則止頭疼川芎得天麻則止
頭眩乾姜得天花粉則止消渴石膏得知母則止
渴香薷得扁豆則消暑黃芩得連翹則消毒桑皮
得蘇子則止喘杏仁得五味則止嗽丁香得柿蒂
乾姜則止呃乾姜得半夏則止嘔半夏得姜汁則

回痰貝母得瓜蒌則開結痰桔梗得升麻開提血
氣枳實得黃連則消心下痞枳殼得桔梗能使胃
中寬知母黃柏得山梔則降火豆豉得山梔治懊
懣辰砂得酸棗則安神白朮得黃芩則安胎陳皮
得白朮則補脾人參得五味交門則生腎水蒼朮
得香附開鬱結厚朴得腹皮開膨脹草果得山查
消肉積神曲得交牙能消食烏梅得乾葛則消酒
砂仁得枳殼則寬中木香得姜汁則散氣烏梅得
香附則順氣芍藥得甘草治腹痛吳茱萸得良姜



亦止腹痛乳香得沒藥大止諸痛芥子得青皮治
脇痛黃芪得大附子則補陽知母黃柏得當歸則
補陰當歸得生地則生血姜汁磨京墨則止血紅
地得當歸則活血歸尾得杏仁則破血大黃得芒
硝則潤下皂莢得麝香則通竅訶子得肉果則止
瀉木香得檳榔治後重澤瀉得猪苓則能利水殫
瀉得白朮則能收濕此用藥相得之大端也

妊娠傷寒禁忌藥

玃斑水蛭及蝨蟲

烏頭附子配天雄

野葛水銀并巴菝

牛膝薏苡與蜈蚣

三稜代赭芫花麝

大戟蛇蛻黃雌雄

礞石芒硝牡丹桂

槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草

瞿麥乾姜桃仁通

礪砂乾漆蟹甲爪

地膽茅根都不中

蒸臍法

用麝香半夏皂莢末一字填患者臍中後用生
姜薄苜貼于臍上放大艾火于姜片上蒸二七
壯灸闔元氣海二十壯熱氣通于內遍於外陰



自退而陽自復矣

熨臍法

用葱頭縛一把切去葉留白根切餅二寸許連
縛四五餅先將麝香硫黃二字填於臍中放葱
餅于臍上以熨斗熾火于餅上熨之餅爛再換
餅再熨熱氣入腹以通陽氣如大小便不利以
利則止

中寒

中寒之邪卒時直中兩經即病如中太陽脾經用

藿香正氣散合理中湯寒甚加附子如寒中少
陰腎經用五積散加茱萸寒熱足冷加附子四
逆湯寒熱手足甲唇皆青舌卷囊縮脈伏絕者
用蒸臍法及大劑姜附溫之不然則死矣

傷寒合病

三陽若與三陰合病即是兩感所以三陰無併合
例也大抵傷寒二陽經合病必用二陽經藥合治
三陽經合病必用三陽經藥合治

陰毒傷寒



咽喉不利致毒氣攻心如傷寒時氣得病一二日便結成陰毒或服藥後三四日或十餘日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心之下脹滿硬如石短氣不息嘔逆唇青面黑四体如冰身如被杖其脉沉細而疾或伏絕用陰毒甘草湯先進一服如人行十里再進一服取汗出乃愈蓋陰毒之氣隨汗而出也五六日可治七日不可治如湯藥不受面唇指甲皆青黑色或時鄭聲舌卷囊縮煩躁冷汗不止腰背眼痛此皆陰寒毒氣入

深急用蒸脐法如手足温煖即止知人事者生灌入生姜汁照前用藥不可與涼劑誤服必死

夾陰傷寒

陰極發躁用四逆湯合生脉散入辰砂細茶白蜜冷服陰利用四逆湯加人參茯苓肉桂肉果砂仁木通灯心升麻少許服之虛阳伏陰用加減五積散冷服藥服下嗝冷体既消熱性乃發熱因寒用也

寒疫



寒疫四時皆有之若初起病頭疼發熱增寒拘急
或吐逆惡心中脘痞滿或飲食停留不化或腹中
作痛未發熱者宜藿香正氣散加減治之若已發
熱者十味藳蘇散汗之若身體痛骨節疼發熱者
羌活沖和湯加蘇葱至之若有汗不得再發汗宜
加減沖和湯主之若邪熱不解傳入裏變證者宜
從正傷寒條內治之

大頭傷寒

若先發於鼻額紅腫以至兩目盛腫而不開并額


上面部皆赤而腫者此屬陽明也或壯熱氣喘口
乾舌燥咽喉腫痛不利脈來數大者用普濟消毒
飲主之內實熱盛者用通聖消毒飲若發於耳之
上下前後并頭角紅腫此屬少陽也或肌熱目瞤
熱潮熱往來寒熱口苦咽乾目疼脇下滿宜小柴
胡加天蒼粉羌活荊芥連翹苓連主之若發於頭
上并腦後項下及目後赤腫者此屬太陽也宜荊
芥敗毒散主之若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻
者以普濟消毒散外用清涼救苦散敷之治法當



先緩後急則邪伏也先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣胃虛食少者宜助胃氣候其大便內熱甚以大黃下之拔其毒根此緩之法蓋此毒先腫於鼻額次腫於目又次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止不散必膿也普濟消毒飲如無板藍根用大青或青黛虛人脈弱加人參引至毒處加皂角刺胃弱食少加白木橘紅如大便不通加酒浸大黃服後就卧使藥氣上行內熱用荊芥則毒散加酒炒黃芩熱盛加酒炒黃連口渴加天荅粉凡

頭面腫盛目不開鼻塞悶口乾舌燥內外有熱或咽喉腫痛不利或內實大便秘結脈洪數煩渴宜用通聖消毒散不消加牛蒡子玄參或生犀角水姜汁服凡時毒頭面赤腫咽喉壅堵寒水藥不受若臟腑素有積熱發為腫毒疔瘡一切惡瘡紅腫並宜漏蘆湯大便實加大黃芒硝凡雷頭風頭面疔瘡腫痛增寒壯熱四肢拘急狀似傷寒用清震湯治咽喉腫病用綠雲散以細竹管吹入喉中病處

食積



身不痛惡食噯氣作嘔欲吐不出惡心短氣痞滿
腹脹胃口痛按亦痛

中濕類傷寒

太陽病關節疼痛脈沉細者此名濕痺其人小便
不利大便反快但當利小便凡濕病頭汗出背強
欲得被覆向火胸滿小便不利舌上白胎者此丹
田有熱胸中有寒渴欲得水而不飲則口燥煩也
若誤下則噦為難治若下之額上汗出微喘小便
利者死若下利不止者亦死也

痰證類傷寒

如病人目睛微定暫時轉動目如炭煤昔肥今瘦
喘嗽轉側半難臂痛皆痰證也痰在上部寸口脈
浮滑痰在中部右關脈滑大痰在下部尺脈洪滑
或痰飲發寒熱胸滿氣粗語出無倫此夾痰如見
崇用二陳湯加蘇子枳實芩連瓜蒌貝母桔梗山
梔前胡姜汁調辰砂溫服

內傷瘀血證發熱狀類傷寒

或被踢打相撲閃肭一時不覺過至半日或一二



三日而發者有至十數日半月一月而發者胸脇
小腹滿痛手不可近者而發寒熱此有瘀血也或
一時傷重就發寒熱瘀血上冲則昏迷不省如死
之狀良久復甦輕則當歸導滯湯重則苑仁承氣
湯加蘇木紅花牛膝桔梗姜汁量其元氣下其瘀
血自愈

漱水不欲嚥

漱水不欲嚥者此屬陽明胃熱也欲飲不欲嚥是
邪熱循經裏無熱也陽明氣血俱多熱逐血妄行

作衄但欲嗽水不欲嚥口燥者用犀角地黄湯外
無寒熱喜忘如狂小便自利大便黑色口燥舌乾
但嗽水不欲嚥者此有瘀血結於下焦宜菴仁承
氣湯下尽黑物則愈少陰證脉沉細手足冷或時
煩燥渴嗽水不欲嚥者宜四逆湯下利厥逆無脉
乾嘔煩渴嗽水不欲嚥下宜白通湯加猪胆汁入
人尿煮之厥陰虵厥煩躁吐虵口燥舌乾但欲涼
水浸舌并口唇時不可離不欲嚥下宜理中湯加
烏梅花椒主之大抵陰證發躁煩渴不能飲水或



欲勉強飲下良久誠復吐出或飲水而嘔噦者皆
內寒也宜四逆湯溫之蓋無根失守之火遊於咽
噤之間假作燥渴則不能飲水也

晝夜偏劇

凡病晝靜夜劇者熱在血分宜四物湯加黃柏知
母芩連山梔丹皮栗柴胡主之若夜靜晝劇此熱
在氣分宜小柴加山梔連母地骨主之

心下滿

傷寒心下滿者當心下高起滿硬者是也不經下

後而滿者則有吐下之分若下後心滿者有結胃
痞氣之別若發熱者以小柴胡加枳實姜炒黃連
去黃芩治之若按之拍、有聲而軟者此停水五
苓散主之若按之硬痛者有宿食也輕則消導重
則用承氣下之寒在胃中心下滿而煩飢不能食
宜瓜蒂散吐之陽明病心下滿硬者不可下、之
則利不止者死脉浮大有力心下硬有燥渴譎語
大便實者此屬臟病宜攻之此言屬臟者宿屎在
臟也故下之若食在胃口未入於胃未可下也大



抵腹中滿心下滿胃中滿俱不可用甘草糖枣甘
甜之物蓋甘能補氣填實故也外用姜擦法甚良

遺尿

遺尿者小便自出而不知也大抵熱盛神昏遺尿
者可治若陰證下寒逆冷遺尿脉沉者多難治宜
回逆湯加益智仁主之厥陰囊縮逆冷脉沉遺尿
者宜四物加茱萸湯阴不回者死傷寒汗下之後
熱不解阴虛火動而遺尿者用人參三白湯加黃
栢知母麥冬五味歸地主之

大便自利

下利微熱渴脉弱自愈下利脉數微熱汗出自愈

驚惕

傷寒八九日胃滿煩驚小便不利譏語一身尽通
用柴胡龍骨牡蠣湯主之大抵傷寒汗吐下之後
虛極之人或因事驚恐遂生驚惕宜養心血安神
之劑

哕逆

橘皮半夏生姜湯加茯苓枳實陳皮桔梗凡其氣



自臍下直衝於胃噎間呃忒者此陰證呃忒也其病不在胃因下虛內有伏陰或悞服寒藥遂至冷極於下迫火上衝發為呃忒而欲盡也又病人煩躁自斃甚熱他人以手按其肌膚則冷此為無根尖守之火散亂為熱非實熱也乃水極似火陰證似陽若不識此誤用涼藥下咽則死當用羌活附子湯加官桂人參木香陳皮半夏砂仁急溫其下真陽回陰火降呃忒止也陰證及因胃寒呃忒不止者外用乳香硫黃散嗅法內用丁香柿蒂散服

之則止再灸期門中脘氣海關元此良法也但手足溫煖脉重者為有生矣灸期門穴法以婦人之乳頭向下盡處骨間動脉是穴男女乳小者以手一指為率陷中動脉是穴男左女右灸三五壯

譏語

諸譏語脉浮大者生沉小四逆者死也太陽本病邪結膀胱其人如狂與五苓散利之加辰砂末虛甚錯語柴胡三白湯加黃連麥冬五味主之

鄭聲



鄭聲者喉中鄭重而不接續如氣息不促手足頗
溫其脉沉細者急以白虎湯加人參五味麥冬助
其元氣或濃煎獨參湯徐徐呷之其脉微細大小
便自利手足冷用白通湯

瘖瘖不言

瘖瘖不言者若少陰病咽中生瘡不能言語者以
鷄子苦酒湯若狐惑上唇青瘡声啞者在本條瘖
病口噤不能言治在本條熱病瘖瘖不言三四日
不得汗出者死熱甚大腸肺金不能言者宜清肺

降火則愈風熱擁盛咳嗽聲瘖者以消風熱降痰
火則愈又有失於發散風邪伏於肺中者當以發
散為主也

陰證似陽

又云面赤目赤引飲脉來七八至按之則散者此
無根之脉用人參四逆湯治之又夾陰中寒面色
青脉沉厥冷囊縮舌卷下利清穀裏寒外熱者身
痛脉沉厥冷脉微欲絕者並用四逆湯瀉多加肉
果訶子粟殼炒陳壁土熟艾木通燈心二十莖取



土氣嘔吐不止加姜汁半夏陳皮胃氣寒嘔不止
加丁香咽喉痛不利加桔梗大腹痛加肉桂乾姜
小腹絞痛加茱萸青皮藿香腹痛甚不止加木香
乳香沒藥砂仁熟艾玄胡口食寒物身受寒氣加
砂仁草果藿葉惡寒戰慄加麻黃桂枝骨體疼痛
甚加桂枝羌活蒼朮胃寒發呃加丁香柿蒂茴香
良姜為末姜湯調服或入前湯調服立止口吐涎
沫加鹽炒茱萸名茱萸四逆有寒痰加半夏姜陳
皮候服寒涼藥過多胸腹脹滿閉格不通嘔逆不

止湯藥不受欲死者加丁沉香木香蘇子檳榔枳實
陳皮姜汁傳送去甘草凡尼姑女冠寡婦室女與
其有夫妻妾不同患陰寒證者倍加附子不必疑
乃陰多陽少故也

冷結

凡人手足厥冷脉沉細無結胸但小腹脹滿按之
痛者此冷結膀胱瀕灸關元穴也宜服茱萸當歸
四逆湯磨木香溫服外用揉熨法

厥厥

舌乾口燥常欲冷水不欲嚥蛇上煩躁昏亂欲死
兩手脉沉遲足冷至膝甚者連蛇并屎俱出大便
不行此證雖出多端可救治也加味理中安蛇湯
主之又有胃中空虛蟲無所安反食其真臟之血
病人心胸脇下有痛陣必撮眉呻吟或時下血如
豚肝色或如濕毒膿狀或鮮血下利急迫或昏沉
不省人事者一切吐蛇雖身大熱不可與涼劑服
之必死俱用理中安蛇湯加減治之待蛇定却以
小紫胡退熱又有厥陰病消渴氣上冲心飢不能

食、即吐蛇既曰胃寒復有消渴之證蓋熱在上
焦而中下焦但寒而無熱若大便實用理中湯加
大黃主之吐蛇未止加黃連苦棟樹皮細辛治蛇
不可用甘草

鬱胃不仁

四逆湯加人參歸桂枝藹著天麻主之凡頭目眩
暈非鬱胃也蓋眩暈為輕鬱胃為重

肉瞶筋惕

太陽病發汗出不解仍發汗頭身瞶動振、欲擗



地用真武湯合人參養榮湯倍用歸耆若不因汗
過多其人筋脉跳動者此人稟素血少邪熱傳干
六脉之中火動惕也用加味人參養榮湯汗後虛
煩不得眠筋惕肉瞤內有熱以加味溫膽湯

肉苛

肉苛者雖著衣絮猶尚苛也傷寒發汗過多亡其
血者乃變此證蓋榮虛而衛實則血氣不滯和通
肉失所養故頑痺不仁痛痒不知也用羌活冲和
湯加桂枝當歸木香主之治肉苛肌肉不仁路龍

吉升麻湯治榮虛衛實肌肉不仁滿身痛痒用肉
苛羌活散

百合

若惡寒嘔者病在上焦二三日愈若腹滿微喘
大便堅三四日一行微溏者病在中焦六十三日
愈若小便淋瀝難者病在下焦三十三日愈並宜
百合湯主治百合病也已經發汗後更發者用百
合知母湯已經下後更發者用百合代赭湯已經
吐後更發者用百合鷄子湯



瘰癧

不因汗所生者當平肝木降心火佐以和血之劑
用羌防荆連柴芍歸地川芎天麻參類若兼痰者
必加南星半夏竹瀝姜汁如風邪急搐瀕蕪全蠍
姜蚕若曾經汗下之後多日傳變得此證者為病
劇虛極生風用小續命湯加減凡傷寒汗出露風
則汗不流通遂變筋脉挛急手足搐搦用牛蒡根
散主之若用小續命湯有汗去麻黃無汗去黃芩
須要通變治之

循衣摸牀

凡循衣摸牀直視譏語脉弦者生脉濡者死小便
利者可治不利者不可治謂津液枯竭也大抵陰
陽二氣俱絕則妄言撮空也若大便秘結撮空譏
語燥渴者此為實熱宜承氣湯下之

舌卷囊縮

有陽證有陰證其陽證囊縮者因熱極而縮急用
大承氣湯下之陰證囊縮者因寒極而縮急用四
逆湯加吳茱萸湯溫之婦人無囊覘其乳頭縮者



即是也凡治此症先灸關元氣海丹田及蒸熨法甚効

癩後發腫

傷寒方愈後浮腫者此水氣也用牡蠣澤瀉散主之胃虛食少五苓散加蒼朮陳皮木香砂仁胃不虛者以商陸一味煮粥食之亦妙傷寒大病癩後足腫者不妨但節飲食戒酒色胃氣強腫自消

癩後遺毒

傷寒汗下不徹餘邪結在耳後一寸三分或兩耳下俱硬腫者名曰遺毒宜速消散緩之必成膿以連翹敗毒散治之項腫痛加威靈仙大便實加大黃川山甲發腫有膿不消或已破未破者但用內托消毒散加皂莢升麻金銀花甘草

癩後發碗頭瘡

碗頭瘡者亦因汗下後餘毒不盡癩後故發碗頭瘡也只以黃連甘草煨尾紅花防風苦參荆芥連翹羌活白芷煎服外用芒硝赤小豆青黛為末以鷄子清和豬膽汁調敷瘡上最効勿動待其脫落



傷寒瘥後小便澁有血者名曰內外瘡皆有靨不出膿者死亦是餘熱毒也用黃連解毒湯加生地歸翹木通滑石牛膝篇蓄琥珀甘草消

瘥後勞復

氣虛煩嘔竹葉石膏湯燥渴去半夏知母倍天花粉虛熱不止者千金麥冬湯

瘥後女勞復

其候頭重不舉目中生花腰背痛小腹裏急絞痛或增寒發熱或時陰火上衝頭面烘熱心胸煩悶者竹皮燒棍散猥鼠屎有熱加柴胡調赤衣散人虛弱者用參胡三白湯調赤衣散小腹急痛脉沉足冷用當歸四逆湯加熟附茱萸送下赤衣散若見卵縮入腹脉見離經者死

瘥後陰陽易

若傷腎經虛損真陽有寒無熱脉虛足冷者以人參四逆湯調下燒棍散若傷肝經以當歸四逆湯加茱萸熟附下燒棍散用分寒熱而治陰易熱氣上衝胸中煩悶手足挛拳搐搦如風狀用瓜蒌竹



茹湯婦人病未平復有犯房事小腸急痛連腰膝
痛四肢不仁無熱者當歸白朮散陰陽易不瘥大
便不通心神昏亂驚惕不安用妙香丸

瘥後虛弱

瘥後虛熱盜汗不止屬陰虛用當歸六黃湯陽虛
自汗無熱惡寒無力下虛用加味黃芪建中湯瘥
後心神恍惚不寧夜卧煩躁不安或亂夢虛驚不
眠因汗下過多心血虧少用硃砂安神丸加遠志
酸棗仁茯神有痰加橘紅

瘥後昏沉

若用知母麻黃取汗者但慮病後血氣兩虛豈可
再大汗之若人元氣壯實脈來有力者乃可行之
脈虛人弱者只用十味溫膽湯有寒熱潮熱日晡
發熱者參胡溫膽湯加苓連主之

瘥後飲酒復劇

緣傷寒病熱未解而飲酒者則病增劇轉加熱感
脈弦數者用小柴胡合解毒湯加烏梅乾葛砂仁
脈洪者用人參白虎湯合黃連解毒湯加乾葛烏



梅砂仁主之

妊娠傷寒

若有表證宜汗者用羌活沖和湯加柴胡當歸芍藥蘇葉芎白即四物沖和湯汗之有氣滿喘急加香附砂仁去生地外用護胎法若裏實熱證大便不通燥渴者當用大黃轉藥不必疑矣酒制用有病則病當之設患真寒脉伏厥冷用姜桂附子不必慮也附姜桂雖熱炒制無害必加黃連甘草制之沉香陸之

產後傷寒

產後傷寒不可輕易汗下恐產時傷力其發熱有去血過多有惡露不盡有三日蒸乳發熱或早起勞動或飲食停滯俱有發熱惡寒狀類傷寒不可便用發表攻裏之劑產後惡露不盡亦有發熱惡寒必脇肋脹滿連大小腹有塊作痛產後飲食停滯發熱頭痛必有噫氣作酸惡聞食臭胸膈飽悶右關脉緊用治中湯加山柎神曲砂仁炒黃連川芎當歸佐之若產後蒸乳發熱惡寒者必乳間脹



硬疼痛令產婦揉乳汁通其熱自除不藥而愈矣
若果產後不謹虛中入風者當以四物湯加防風
荆芥白芷人參香附烏梅姜蚕乾姜產後不謹感
冒傷寒發熱惡寒頭疼骨疼脉浮緊表證宜汗者
用四物湯加羌活蒼朮白朮乾姜蘇葉梔子少佐
用芎白頭水煎取微汗自汗去蒼朮蘇葉加白朮
熱甚加軟柴胡乾姜少許黃芩佐之炒用熱邪傳
裏口燥渴大便不通脉沉實或熱甚譏語宜下之
輕則蜜導法重則用四物加柴胡炒黃芩枳壳熟

大黃微下就用四物湯加乾姜少許參朮大用以
溫補其血氣若熱邪傳至半表半裏證寒熱嘔口
苦脉洪數者四物湯合小柴胡主之

不可水

水停心下微喘

汗吐下而脾胃寒
縱貪切勿與之餐

腹滿結胸蕪不食
傷寒大吐下後外氣怫鬱胃中寒也發汗後尤
不可水與之則噦嘔喘咳發熱惡寒濡弱相搏
臟氣裏微胸中苦煩非結也不可水漬青布冷



貼胸中誤下後寒氣相搏腸鳴得水令汗大出
即成餽陽明病潮熱誤下腹滿不能食或胃中
虛冷不能食皆不可水下利脉浮大不可水當
溫之傷寒結胸無熱證者宜平和藥若與水益
令熱不得出當汗而不汗則煩假令汗出後腹
中痛亦服和氣之藥
再三汗下熱不退

汗下再三熱弗休
人參白虎加蒼朮

長沙公見應心憂
解毒湯和涼膈儔

經云三下而熱不退者即死後人有四五次下
加至十數次行而生者此乃偶誤中耳活者未
一二死者已千百覩是之言後之學者切不可
以為法但當解毒合涼膈多服調之使陽熱徐
退陰脉漸生庶不失事是知權變者矣傷寒下
後自汗虛熱不已白虎湯加人參蒼朮一服如
神汗出身涼此通仙之妙法也汗下之後熱不
退不問有汗無汗皆宜白虎加蒼朮湯解之又
加人參亦妙仍服涼膈合解毒調之發汗之後



熱不解脉尚浮者白虎加蒼朮湯傷寒表解傳
裏熱而不退或有汗而未愈調和陰陽湯病在
半表半裏熱不退小柴胡湯半表半裏大便微
實小柴胡湯加大黃半表半裏大便不通者除
膈熱湯裏熱微者宜除胃熱湯熱勢未退宜六
一順氣湯兩除表裏之熱病至六七日裏熱已
甚表熱漸微脉雖浮數先用大柴胡湯不退宜
解裏熱湯病在半裏半表熱不退脉尚浮洪者
當微表小柴胡合白虎湯和之病在半表半裏

脉沉實當微利除膈熱湯輕下之汗吐下三法
之後別無異證但些微熱或無熱並小柴胡和
之口舌乾燥合解毒湯涼之汗吐下之後別無
異證大便硬結不通涼膈散病熱已去微熱者
以益元散和之無令再病熱不退發黃班涼膈
散加當歸下後熱不退或證未全退雙解散雙
和表裏大汗前後逆氣熱勢不退雙解散瘥後
遺熱不退雙解散再解之次用小柴胡和之他
人病氣汗毒傳染或食猪羊牛馬酒毒再復發



熱不退雙解散除膈熱湯風寒暑濕飢飽勞逸
憂愁思慮恚怒悲恐四時中外諸邪所傷意竟
身熱頭項拘攣強痛發熱惡寒惡風汗下後熱
不退並宜服雙解散有汗去麻黃。汗加葛根
身微熱不退表虛汗出不已或過發汗以致表
虛脉不實海藏黃耆湯。惡寒發熱不退其
人大渴飲水者其腹必滿小便不利而自汗出
其病欲解此為肝乘肺名曰縱當刺期門發熱
不退腹滿譏語寸口脉浮緊此為肝乘脾名曰

橫當刺期門男女下血發熱不退譏語者此為
熱入血室但額上汗出者當刺期門婦人經水
適來適斷者為熱入血室

四肢冷 附四肢沉重四肢不收

下利肢疼屬厥陰 欲眠嘿々風溫尋
身如被杖施真武 厥利脉沉四逆珍

四肢疼下利厥逆惡寒脉沉弱四逆湯回陽急
救湯少陰證四肢沉重疼痛欬咯小便不利或
自下利而咳真武湯溫經益元湯四肢沉重唇



黑有瘡或如傷寒四肢沉重忽々喜眠見多眠
條羌活蒼朮湯風溫証四肢不收嘿々欲眠頭
疼身熱自汗体重而喘萎薤湯羌活蒼朮湯

結陽

四肢腫滿結陽名

陽脉住停氣不行

八正五苓蕪理胃

消風退腫萬全靈

結陽者肢腫也諸陽脉不行陰府留結成熱為
四肢腫滿也萬全木通散五苓散八正散並加
蘿蔔枯酒曇根妙

結陰

血氣無宗滲入腸

致成便血可驚惶

三黃補血誠為妙

四物阿膠桂附湯

結陰者便血也陰氣內結不得通行血氣無宗
滲入腸則下血也四物阿膠湯三黃補血湯桂
附六合湯

寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在骨髓

病身大熱反欲衣

寒在骨間熱在皮

寒在皮膚熱骨髓

身寒反不用其衣



身熱惡寒而反欲得近衣者先服麻黃湯汗之
次用柴胡桂枝湯和之身寒惡熱而反不欲近
衣者先用防風通聖散人參羌活散表之次用
白虎加人參湯和之蘊要云身熱欲衣桂麻各
半湯身寒不欲衣白虎加桂枝湯劉全備云身
熱而常貪納被內虛寒而邪熱淺浮藥辛溫而
取効宜不換金正氣散八解散並加川芎白芷
頭疼加細辛羌活葱白藿香正氣散人參養胃
湯五積散臨証擇用加減得宜最為良法體寒

而欲掀衣素壯熱而感寒鬱閉飲辛涼而必痊
宜人參敗毒散防風通聖散并麻葛根湯柴葛
解肌湯參蘇飲等並加黃芩主之

太陽傳經用藥

傷寒傳病太陽始

依次傳經陽明起

若越陰經不順傳

各經引藥加減矣

太陽傳陽明而太陽證已罷陽明證已至曰傳
經餘倣此

太陽傳陽明名巡經傳葛根湯入於裏承氣涼



膈下之

太陽傳少陽名越經傳小柴胡加川芎

太陽傳少陰名表傳裏小承氣涼膈合小柴胡
或更合解毒天水

太陽傳太陰名誤下傳桂枝加芍藥湯桂枝加
大黃湯

太陽傳厥陰名巡經得度傳大承氣湯加川芎
柴胡六一順氣湯

太陽自入於本名傳本未入本為表麻黃湯自

入本為裏五苓散

內傷似外感始為熱中病

始為熱中氣難言

頭痛四肢症悶煎

氣息不調聞食惡

補中益氣正當先

頭痛大作四肢症悶氣高而喘身熱而煩上氣
氣息不調四肢困倦不收無氣以動無氣以言
或煩躁悶亂心煩不安或渴不止病久者邪氣
在血脉中有濕故不渴如病渴是心火炎上剋
肺金故渴或表虛不任風寒目不欲開口不知



味右手氣口脉大、於左手人迎三倍其氣口
脉急大而數時一代而溢是脉之本脉代者是
無氣不相接乃脾胃不足之脉是洪大而數乃
心脉刑肺急是弦急乃肝脉挾心火剋肺金也
其右關脾脉比五脉獨大而數、中顛緩時一
代此不甚勞役是飲食不節寒温失所則右關
胃脉損弱隱而不見惟內顯脾脉如此也治用
補中益氣湯

內傷似外感末傳寒中病

末傳寒中胃心疼

足弱肢寒嗑不通

脉大瀉而腰脊痛

神聖湯施豆蔻同

腹脹胃脘當心痛四肢兩脇膈咽不通或涎唾
或清涕或多溺足下痛不能任身履地骨乏無
力喜唾兩瞼丸冷陰作痛或妄見鬼狀夢亡人
腰背脾眼腰脊皆痛不渴不瀉脉盛大以瀉名
曰寒中病用神聖復氣湯白朮附子湯草薹薹
內傷似外感陽明中熱病

內傷中熱顛陽明

脾胃久虛回熱乘



清暑益氣加減用

誤施白虎恐難禁

有天氣大熱時勞役得病或路途勞役或田野
中勞役或身体怯弱食少勞役或長齋久素胃
氣久虛勞役其病肌体壯熱躁熱悶乱大惡熱
渴飲水漿與陽明傷寒熱白虎湯證相似鼻口
中氣短促上喘此乃脾胃久虛元氣不足之證
身亦疼痛至日西作必譏語熱渴悶不止脉洪
大空虛或微弱白虎湯證其脉洪大有力與此
內傷中熱不同治用清暑益氣湯

內傷似外感溫熱病

溫熱病生長夏間

精神困倦涕垂潛

氣高而喘熱煩悶

清暑湯施益氣還

長夏五六月溫熱之時人因勸四肢不收精神
短少胸滿短氣肢節疼氣高而喘身熱而煩或
大便泄利或黃或白泔色或渴或不渴或不飲
食或小便頻數而黃治用清暑益氣湯

內傷似傷寒

內傷煩躁類傷寒

伏熱蒸々總一般



昏倦不眠脉細數

補中益氣倍參安

凡似傷寒煩躁不絕聲汗後復熱脉細數五七日不睡補中益氣倍人參用竹葉同煎甚者加麥門冬五味知母

似傷寒三戰後勞乏煩躁昏倦四君子加當歸黃耆知母麥門冬五味子

似傷寒至五七日汗後煩躁喫水者補中益氣加附子

有舌黑燥大便滑泄食在大腸煩躁夜不安宜

防風當歸飲子

內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺參苓甘草少加姜汁冷服虛者用人參湯

房室傷風

房室傷風脉緊浮

頭疼發熱汗如油

解肌羌活湯尤穩

參朮芎歸白朮投

脉氣虛弱犯房室而冒傷風頭疼發熱自汗惡風脉浮緩宜羌活湯大白朮湯並加當歸人參黃耆湯血虛汗不止加桂枝白芍當歸參朮芎



婦湯

凡房室傷風挾內傷者補中益氣湯隨六經加減

頭疼惡寒羌活散身熱石膏湯腹痛合芍藥散寒熱合柴胡散自汗加白木茯苓無汗蒼朮防風氣虛合四君子血虛合四物湯

房室傷寒

房勞因感冒寒憂

無汗頭疼脉緊浮

羌活湯兼大白木

人參敗毒總宜投

夫人體氣虛弱犯房室而感傷寒頭疼發熱無汗惡寒脉浮緊宜羌活湯大白木當歸人參川芎湯加當歸蒼朮防風參朮芎歸湯頭疼發熱自汗惡風脉浮緊無汗惡寒脉浮緩黃耆湯合川芎湯汗止外證不鮮九味羌活湯加人參當歸

頭疼身體痛發熱惡寒或惡風或胸痛或咳嗽或寒熱人參敗毒散無汗加蒼朮防風當歸自汗加白木黃耆當歸參朮芎歸湯加減



血虛人四物湯頭疼惡風合羌活散腹痛合芍藥散寒熱而嘔合柴胡散上證全俱合服體氣虛甚加人參

頭疼惡風身熱自汗羌活散合石膏湯血虛者更合更合四物湯

身熱自汗腹痛石膏湯合芍藥散血虛者更合四物寒熱腹痛柴胡散合芍藥散血虛者更合四物湯

頭疼惡風身熱自汗腹中痛寒熱而嘔羌活散

石膏湯芍藥散柴胡散四藥合和血虛者更合四物湯

大抵羌活散治頭痛惡風石膏湯治身熱自汗芍藥散治腹中痛柴胡散治寒熱而嘔四物湯治血虛四君子治氣虛無汗加蒼朮川芎防風自汗加白朮黃耆茯苓有是諸證臨時選用合服不可執一而無權也

瘡瘍發熱類傷寒

瘡瘍發熱要詳看

初發防荆敗毒安



已潰還須托裏散

忌投汗劑與涼寒

經曰諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處
飲食如常畜積有膿也又曰數脉不時則生惡
瘡也所以惡瘡初生必寒熱交作不可便以傷
寒治之須視病人頭面脊背有無瘡頭若有小
紅白膿頭瘡須當仔細辨之凡發背初作只起
一小瘡也不過二三日則大發也若疔瘡初作
全與傷寒相似要當識之也若一例而發汗或
妄投寒涼之劑則誤之矣若識其瘡毒須尋瘡

科治之庶不誤也若毒氣走散則難救矣

初生在表瘡毒正發而未潰發熱惡寒宜防荆
敗毒散行涼敗毒散隨證加減服之若有涼血
止痛草藥可增入數味在內和服亦可取効速
如小薊五爪龍紫金皮金銀花之類皆可用

如瘡毒已潰宜托裏解毒湯隨證加減或有草
藥乾膿散血之劑亦可增入數味可也如小薊
川山蜈蚣紫金皮之類是也

初生未成者速塗令消散宜拔毒散已潰爛者



用鐵籜散

赤膈傷寒

赤膈傷寒胸膈上

防風敗毒宜加減

疼痛赤腫號為名

裏實防風通聖靈

夫受傷於寒变故萬狀未易默悟也然胸膈赤腫疼痛頭疼發熱惡寒身躄痛此非正傷寒乃類傷寒也名之赤膈傷寒宜防荆敗毒散加瓜蒌子黃連黃芩紫金皮玄參赤芍升麻白芷有表復有裏胸膈赤腫疼痛防風通聖散加瓜

蒌子黃連紫金皮

表證已退大便秘實胸膈腫痛涼膈解毒加瓜

蒌子枳壳桔梗紫金皮赤芍藥又宜穉鍼刺腫

處出血

半表半裏胸膈腫痛柴胡枳桔湯加瓜蒌子紫

金皮赤芍藥

黃耳傷寒

黃耳傷寒耳痛詳

要知風入腎經戕

不治卒變成危證

續命防荆敗毒良



凡耳中策々痛者皆是風入於腎經也不治流
入腎則卒然變惡寒發熱脊強背直如瘞之狀
曰黃耳傷寒也此不可作正傷寒治乃類傷寒
法也

治宜小續命去附子加白附子姜蚕天麻羌活
獨活蔓荊子細辛
次用防荊敗毒散加細辛蔓荊子白芷蟬蛻黃
芩赤芍紫金皮

又法用苦參磨冷水滴入耳中熱則去之再易

又虎耳草取汁滴入中

又猴姜根取汁滴入耳中

又苦薄苛土木香搗汁滴入耳中

解依類傷寒

解依傷寒出內經

四肢骨節若伶仃

寒如不寒熱不熱

治法通舒血氣寧

解者肌肉解散依者筋不束骨解依之證似寒
非寒似熱非熱四躰骨節解散懈惰倦怠煩疼
飲食不美食不知味俗呼為砂病內經名為解



嶺南砂病類傷寒

壯熱憎寒肢痛酸

砂病類傷寒

服蘇合香丸

依原其因或傷酒或中濕或感冒風寒或房事過多或婦人經水不調血氣不和皆能為解你證與砂病相似實非真砂病也治宜先用熱水蘸搭臂膊而以苧麻刮之甚者更以鍼刺十宣及委中出血或以香油燈照視身背有紅點處皆烙之皆能使腠理開通血氣舒暢而愈又宜

鷓鴣毛糞

酒調灰服勝金丹

夫沙病者嶺南閩廣之地多有之矣乃溪毒砂虱水弩射工蝮短狐鰕鬚之類俱能含砂射人被其毒者則憎寒壯熱百脉分解似傷寒初發之狀彼土人治法以手捫摸痛處用角筒入肉以口吸出其砂外用大蒜煨搗膏封貼瘡口即愈諸蟲惟鰕鬚最毒若不早治十死八九其毒深入於骨若鰕鬚之狀其瘡類平疔腫彼地有鷓鴣鸚鵡等鳥專食已上諸蟲以此鳥毛糞燒



灰服之及籠此鳥於被毒病者身畔吸之其砂
聞氣自出而病愈也

搖頭

真病心家已絕根

搖頭直視似煙熏

頭中痛者戰而言

瘥證反張并口噤

頭者諸陽之會陽脉有聿則頭為之搖動然有
心絕而搖頭者有風盛而搖頭者形證皆不類
焉陰根於陽、根於陰、陽互根氣血所以周
流而無間若心絕則神去而陰竭陽獨無根不

能自主是以頭搖經所謂陽毒留形体如煙熏
直視搖頭者此也至於太陽發瘥則風盛於上
風主乎動是以頭搖經所謂獨搖頭卒口噤而
背反張者此也言搖頭中有痛也言則甚痛又
云裏痛言者為虛不言為實均是搖頭析而分
之曰實邪曰虛邪曰真邪當明其減否可灸百
會上星風府其搖即定

身痒

陰陽虛弱渾身痒

未鮮桂枝各半靈



風盛防風通聖散

血虛四物入浮萍

陽明反無汗皮中如蟲行以久虛也木附湯黃

薺建中湯

風熱盛身痒發熱無汗口燥舌乾大小便秘澀

防風通聖散加羌活

風證身痒小續命去附子加白附子

血虛身痒四物湯加浮萍蒺藜防風

未交接而作易病治

新痊癢後未交接

曾與言談起慾心

思慾切心因病復

女勞易病共條尋

夫男子病新痊未與婦人交接而男子感動其

情思其慾事心切而得病者治與女勞復同

人迎氣口脉

左手關前一分為人迎之位凡脉緊盛迺傷寒也

右手關前一分為氣口之位凡脉緊盛迺傷食也

若人迎氣口俱緊盛此為夾食傷寒又曰內傷夾

外感也

衝陽脉



衝陽脉在足面去指縫陷谷三寸動脉中此陽明
胃經之脉動於此夫胃為水穀之本人之所主若
胃氣已憊水穀不進穀神以去其脉不動而死也
故傷寒胗衝陽者以察胃氣之有無也仲景又謂
之跌陽脉

太谿脉

太谿脉在足內踝後陷中動脉是也此少陰腎經
脉動於此蓋腎者乃人身之命蒂真氣之所主然
其脉動而不息者真氣在也若真氣以憊腎氣以

絕其脉不動而死雖衝陽有脉而少能進食者亦
主死也

結脉

結者間至而動緩而一止復來者曰結此陰盛之
脉凡傷寒脉結代心動悸者炙甘草湯若脉結足
冷腹中痛陽氣以微者大建中湯若雜病之脉結
者主有老痰食積死血在內為之可治若內無宿
積其脉結者此為不相應病發多難治也

促脉



促者間至而動數而一止復來曰促此陽盛之脉
允熱極發斑發喘等証皆脉促也雜病則多因怒
氣傷肝與夫畜血在於上焦者皆脉促也大抵促
脉漸退則生漸加則死矣

代脉

代者止也動而歇至不能自還曰代乃真氣以憊
不可治若結而代者可治非結而獨代者為不可
治也

或問近世多用藿香正氣散傷寒可用否然此方

宋時所制治內傷脾胃外感寒邪增寒拘急頭
痛嘔逆胸中滿悶與夫傷食傷冷傷濕中暑霍
亂山嵐瘴氣不伏水土寒熱作瘧並宜增損用
之乃良方也非正傷寒之藥若病在太陽經頭
疼發熱骨節疼痛者此方全無相干如妄用之
先虛正氣逆其經絡雖出汗亦不解此乃無益
而反有害往、誤用之遂至變逆危殆而不救
良可悲夫凡傷寒發熱脉沉與元氣虛人并夾
陰傷寒發熱者皆不可用切宜戒之



或問局方十神湯傷寒發散可用否然此湯用升
麻葛根能解利陽明經瘟疫時氣發散之藥也
蓋非正傷寒之藥若太陽經傷寒發熱用之則
引邪入陽明經傳變發斑不可勝言也易老云
太陽病服葛根是引賊破家也要當辨而用之
或問小柴胡湯近世治傷寒發熱不分陰陽而用
之何也然柴胡之苦平乃足少陽經傷寒發熱
之藥解半表半裏之熱除往來寒熱小有日晡
潮熱也佐以黃芩之苦寒以退熱半夏生姜之

辛以散寒人參大棗之甘溫以助正氣解渴生
津液則陰陽和而邪熱解矣但太陽經之表熱
陽明經之標熱皆不能解之也如誤用不無害
乎若夾陰傷寒面赤發熱脉沉足冷者服之立
至危殆可不慎哉及內虛有寒大便不實脉息
小弱及婦人新產發熱皆不可用之也

或問大青龍湯仲景治傷寒發熱惡寒煩躁者服
之可用否夫傷寒邪熱在表不得汗出其入則
躁亂不安身心無如柰何如脉浮緊或浮數者




急用此湯發汗則愈乃仲景之妙法也譬若亢熱已極一雨而涼其理可見也若不曉此理見其躁熱投以寒涼之藥為害豈勝言哉若脉不浮緊數無惡風惡寒身疼者亦不可用之也如誤用其害亦不淺也所以脉證之不明者多不敢用

或問陰證傷寒用附子湯冷服何也蓋陰極於下陽浮在上之治法也余曾治一人傷寒十餘日脉息沉細手溫而足冷大便不通面赤嘔煩渴

藥不能下惟喜凉水二三口或西瓜一二塊食下良久而復吐出此陰寒於內逼其浮陽失守之火聚於胸中上冲咽嗑故為面赤嘔煩也遂用附子一箇以生姜自然汁和白麵包裹煨熟去麩取附子去皮臍切作八片又以人參三錢乾姜炮二錢水二中煎取一鍾浸於冷水中待藥冷與之即愈此良法也

或問三陽知可解者何以辯之曰太陽知可解者頭不痛項不強肢節不痛知表已解也陽明知




可解者無發熱無惡寒無口渴不便難知裏已
解也少陽知可解者寒熱移其時早移於晚氣
移於血晚移於早血移於氣是邪無可容之地
知可解也如寒熱日作不移其時是邪未退也
或問太陽禁忌不可犯者何也曰小便不利之
是犯本犯本則邪熱入裏不能解此犯之輕也
大便不利不可利之是動血動血是犯禁此
犯之重也

或問治病必求標本治何標本耶曰假令太陽證

傷寒自外入標本有二說以主言之膀胱為本
經絡為標以客邪言之先得者為本後得者為
標此標先受之即是本也後入于膀胱本却為
標也此乃客邪之標本治當從客之標本如麻
黃桂枝治其標羌活藁本治其本也

或問陽明證禁忌不可犯者何也曰不當發汗不
當利小便犯之竭其津液則生蓄血證唯當益
津液為上以其火就燥也益津液者連鬚葱白
是也



或問半表半裏有筦曰邪在榮衛之間謂之半表
半裏太陽、明之間少陽居身之半表裏五苓
散分陰陽膀胱經之半表裏理中湯治吐瀉上
下之半表裏

或問傷寒惡寒傷風惡風理之昭然不可易也綠
麻黃湯下止言惡風桂枝湯下反言惡寒者何
也曰仲景言傷寒惡寒傷風惡風言之常也桂
枝治傷風麻黃治傷寒一定理也今桂枝湯下
反言惡寒麻黃湯下止言惡風言之變也然惡
寒者必惡風惡風者未必不惡寒也

或問傷風汗自出桂枝湯以散其邪傷寒無汗麻
黃湯以發其汗又言表證未解者用桂枝湯理
似相反耶曰傷風汗出腠理自開傷寒已汗後
腠理既開故並用桂枝湯以解肌可謂宜矣
或問病有身重不能轉側者有身疼不能轉側者
何也曰身重不能轉側者下後血虛津液不榮
於外也身疼不能轉側者風濕相搏於經而裏
無邪也經曰傷寒八九日風濕相搏身體煩疼



不能轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者桂枝附子湯主之又曰傷寒八九日下之後胸滿煩驚小便不利譏語一身尽重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之二者頗類皆係不能轉側但有差殊耳

或問發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰且如傷寒或發熱或未發熱必惡寒体痛二說皆曰惡寒如何辯之曰傷寒或發熱或未發熱必惡寒体痛嘔逆頭痛項強脉浮緊此在陽可發汗若

陰証則無頭疼無項強但惡寒而勸脉沉細此在陰可溫裏也

或問傷風自汗與中暍自汗皆相似傷寒無汗與冬溫無汗皆相類敢問如何不同曰傷風不渴中暍即渴傷寒脉浮緊冬溫脉不浮也

或問經言用藥有言可與某湯或言不可與又有言宜某湯及某湯主之凡此數節旨意不同敢問曰傷寒論中一字不苟現是書片言隻字之間當求古人之用意處輕重是非得其至理而



後始可言醫矣所問有言可與某湯或言不可與者此設法禦病也又言宜某湯者此臨證審決也言某湯主之者乃對病施藥也此三者即方法之條目也

或問時人言下不厭遲汗不厭早斯言若何曰凡汗證固宜早仲景謂不避晨夜者此也夫下證須從宜定奪當急則急當緩則緩安可一槩而論假如陽明病已有可下之理但合面赤其在後之熱尤未斂又如嘔多雖有陽明證謂熱在

上焦未全入府皆言不可攻凡此之類固宜遲也

或問傷寒論中有証同而藥異有藥同而証異皆非愚陋之可知也且如小青龍與小柴胡證皆治嘔而發熱表裏之病大槩彷彿何故二方用藥之不同誠為可疑也曰治病之要當究病源夫傷寒表不解裡熱未甚而渴欲飲水飲不能多不當與之以腹中熱尚少而不解消水飲停蓄故作諸證然水寒作病非溫熱不能解故用



小青龍湯發汗散水其水氣內漬則所搏不一
故有或為之病因隨證增損以解化之原其理
初無裏證自水寒以然也其小柴胡證係傷寒
發熱之邪傳裏在乎半裏間熱氣內感故生或
為諸證緣二證雖曰表裏俱病其中寒熱不同
故用藥有姜桂柴芩之異苟能循理以推之其
事之異同自然明矣更復何疑

或問煩躁不得眠與虛不得眠皆汗下後之餘證
夫煩躁以理言則為熱也虛煩者既言虛字非

實熱也何故煩躁反與姜附湯虛煩仍用梔子
豉湯二藥天壤之隔其理何如曰煩躁本為熱
分晝夜則知陽虛之煩不得眠無間斷故為裏
熱經曰下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而
安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱乾姜
附子湯退陰復陽其虛煩不得眠若劇者必反
覆顛倒心中懊懣梔子豉湯以吐胸中之邪雖
曰二證俱煩而不得眠却有寒熱之異故不同
然



或問經言脉浮而緊法當身痛宜用汗解之又曰
發汗後身疼痛脉沉遲新加湯主之夫身疼痛
皆係表邪不盡固宜汗解何故復加人參生姜
芍藥以益血也曰表邪感則身疼血虛則身亦
痛其脉浮緊者邪盛也其脉沉遲者血虛也盛
者宜損之則安虛者宜益之則愈

或問經言服桂枝湯或下之仍頭項強翕々發熱
無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯
苓白朮湯主之夫頭項強痛為邪氣仍在表也

雖經汗下而未解猶宜解之何故去桂加茯苓
白朮是無意於解表也曰此非桂枝證乃屬飲
家也夫頭項強痛既經汗下而不解心下滿而
微痛小便不利此為水飲內畜邪不在表故云
去桂枝加茯苓白朮若得小便利水消腹滿減
而熱自除則頭項強痛悉愈矣

或問經言結胸証其脉浮大者不可下々之則死
既不可下復作何術以治之曰夫陽沉浮聞沉
乃結胸不可下之脉浮大心下雖結其表邪尚



多未全結也若輒下之重虛其裏外邪復聚而必死矣仲景言此為箴戒使無踵其弊也其脉既不可攻當以俟其變而待其實假如小結胸證其脉浮滑按之則痛故知邪非深結亦不敢下無過解除心下之熱耳

或問病方入胃何為不傳曰經言陽明居中土萬物所歸無所復傳註曰胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳之於胃入胃則更不復傳如太陽傳之入胃則更不傳陽明陽明傳之入

胃則更不傳少陽少陽傳之入胃則更不傳三陰已上所言入胃不傳之理乃聖賢之至論也或問經言病人無表裡證發熱七八日雖脉浮數者可下之緣攻下之法須外無表邪裏有下證庶幾可攻今言無表裏証况脉更浮數何故言可下之然此證此理非僕所知敢問曰此非外感乃內傷也若外不惡寒裏無譏語七八日消燥津液乃陽盛陰虛之時苟不攻之其熱不已而變生焉故云脉雖浮數可下之言不待脉浮



而數浮則傷胃數則動脾此非本病特醫之所為也仲景之意不外是矣凡傷寒當下之證皆從太陽之明可下之邪而入於府也故下之今不言陽明病而止云病人無表裏證此非自表之裏而病也但為可下故編于陽明篇中此章之理非初學所能備悉其意也


或問六經傷寒惟少陰與厥陰有不治之證以二經較之少陰死證尤多未審其理何如曰少陰者腎也位居子正而一陽生於其中是為復卦乃天地之根宰輔之職周旋運用承上使下一動一靜莫非腎之功也病至其經已至危殆陰陽兩全雖危弗咎蓋無陽而陰獨居故言其死然子中之陽氣微弱凡病則易為消滅其言死多於厥陰也






國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.







國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



817. m31w2



國立中央圖書館, 台灣, 中華民國





赤水玄珠婦人門第二十卷

薛氏校註合宜禁忌凡例

經水或紫或黑論

月經不通

治赤白帶下

寡婦師尼寒熱如瘧

心胸嘈雜

脬轉小便不利

遺尿失禁

夢與

痰癖疔

小便數



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠婦人門第二十卷

新心

薛氏校註合宜禁忌凡例

一云丹溪謂白芍藥性寒味酸

生之氣若用之於大補湯八珍

炒用無妨凡屬脾胃虛寒虛弱面色

宜酒拌炒用

一通經丸若脾胃無虧暴怒氣逆或生冷所
血凝滯月經不通者宜暫用之若脾胃虛弱



能生血者宜用六君當歸若因脾胃鬱火內
其血者宜用歸脾湯若因脾肝鬱怒氣血
月經不通者宜加味道遙散

一艾附丸若脾胃虛寒陰血不足氣逆者

不調或胎氣不成者宜暫用之

虛發熱月經不調或崩漏帶

便淋漓或嘔熱內熱寒熱

時候熱宜用六味地黃

少思者佐以六君子湯

一四物湯若脾經血燥發熱

之若因脾經虛熱肝經如

加味道遙散若因脾經氣

用八珍湯加柴胡丹皮若因

症宜補中益氣湯

一人參橘皮湯若胎前氣痞痰滯作嘔不

暫用之若脾胃氣虛胸膈痞脹痰停作嘔

少思者宜半夏茯苓湯若因怒動肝火尅制

土而致前症者宜六君子加柴胡山梔枳殼脾



胃虛寒者六君子加木香砂仁內半夏治脾胃
虛諸症尤常用

一紫蘇順氣飲若胎動不安元氣無虧者
之若因脾氣虛弱者宜六君子加紫蘇

結傷脾者宜四君子加柴胡山梔

肝脾者六君子加柴胡黃芩

一四物膠艾湯若內熱胎痛

之若因肝經風熱而下血

因肝火血熱宜加味逍遙

味歸脾湯若因肝氣虛喘

升麻柴胡若因事下血

一黃芩白朮二味為安胎

無虧者宜暫用之凡屬脾胃

泄瀉嘔吐面色痿黃肢體倦怠者

一蓮生散若厚味安逸者宜用若葛菟勞役者不

宜用

一姪娠腹痛須驗其面赤舌青者此胎已死用平
胃散加朴硝三錢下之下後隨用八珍大補等



湯調補之若唇口俱青吐出痰沫者子母俱死也若面舌俱青者母死子活產下亦死

一 小續命湯若外中風邪腰背反傷筋脉痠癢者宜暫用之若產後失血過多陽火熾盛虛熱生風者宜八珍湯加釣藤丹皮如不應者加口舌子湯加當歸丹皮釣藤若陽氣

益氣湯如不應急加附

全大補湯如不應急加

一 澤蘭湯若產後惡露腹痛

體倦面黃食少少寐而惡露不止

湯若氣血虛損而惡露上攻先

八珍湯禁用黑神散奪命

一 產後口鼻起黑氣鼻衄者是胃血虛也急用二味參蘓飲多有生者

宮人孀婦治驗

一 婦人年三十有七早孀居兩腿骨作痛晡熱體倦月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側結核兩脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小



柴胡湯合四物數劑肝症頓愈又用加味逍遙散加澤蘭乳香沒藥三十劑血症漸痊再用加味歸脾湯年餘而安

一孀婦兩腿作痛或用除濕化痰等藥遍身作痛而無定處此血症也不信乃服流氣飲之類而痊

一放出宮人年四十餘臀肥

月經不調此係肝經血少不純

宜加味逍遙散加澤蘭葉五十片

以歸脾湯二百餘劑而痊

一放出宮人臀腿腫痛內熱

胸痞月經過期而少彼以

理氣之劑益甚此肝經瘀血停滯

上貫鬲布脇肋循喉嚨下循脘內臍

少腹主治之法但當補其所不勝而制其所勝

補者脾也制者肝也經曰虛即補之實則瀉之

此定法也彼不信仍服前藥遂致不起

婦人症與男子無以異也所異者月水胎產崩帶

等症耳今惟蒐其異與赤紫者集為一門餘雜
症治同男子當於雜症門中求之茲不重錄

調經門

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天
至任脉通太衝脉盛月事以時下天謂

氣發謂壬癸之水故云天癸也

主胞胎二脉流通經血漸

旬一見以像月盈則虧也

否則與產後症相類若經不惱怒勞

錯亂經脉不行多致癆瘵

體之間則重痛不寧若怒

嘔血而癩癧癘若經血

已然此六淫外侵而變症百出


成患重如山岳可不畏哉

褚澄遺書曰飲食五味養骨髓肌肉毛髮男子為

陽：中必有陰：中之數八故一八而陽精升

二八而陽精溢女子為陰：中必有陽：中之

數七故一七而陰血升二七而陰血溢皆飲食



五味之實透也方其升也智慮開明齒牙更始
髮黃者黑筋弱者強豈其溢也凡充身軀手足
耳目之餘雖針芥之厯無有不下凡子形肖父
母者以其精血嘗於父母之身無所不厯也是
以父一肢廢則子一肢不肖其父母一
子一目不肖其父母然唯鳥比夫
胎何也烏獸精血往來犀
以通其精則五體有不滿
疾陰已痿而思色以降其

小便澀而為淋精已耗而強

痛愈痛即愈便愈便即愈

年無男子合則不調未踰

調不調則舊血不出新血悞行

變而為腫後雖合而難子合多則瀝材

衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

夫血者水穀之精氣也和調五臟洒陳六府男子
化而為精女人上為乳汁下為經水故雖心主
血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣



凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然
王子亨方論曰經者常候也謂候其一身之陰陽
愆伏知其安危故每月一至太過不及皆為不
調陽太過則先期而至陰不及則後時而來其
有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由力衰
盛所致故曰血氣和平則樂有子口
爭月水以時下也

薛氏曰經云脾統血肝藏血
鬱結傷脾所致當從二經之

之

產寶方序論曰大率治病先

氣女人調其血氣血者人

為基本苟能謹于調護則血氣安

月水為期血凝成孕若脾胃虛弱不能

衛不足月經不行肌膚黃燥面無光澤寒熱脹
痛難於子息或帶下崩漏血不流行則成癥症

經水或紫或黑論

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色赤稟火



色也血為氣之配氣熱即熱氣寒即寒氣升則
升氣降即降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣
濁即濁往往見有成塊者氣之凝也將行而痛
者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者
亦虛也而有水濕之也錯經妄行者氣
紫者氣之熱也黑者熱之甚也令
者黑者作痛者成塊者率
之劑則禍不旋踵矣良由
曰風冷乘之宜其相習而成

水色也紫淡於黑非冷而何予曰經
承乃制熱甚者必兼水化
也况婦人性執而見鄙嗜慾
火無日不起非熱而何若曰風冷必
或有之蓋千百一二者也

治經水紫黑為熱例

海藏四物芩連湯 治經水如黑豆汁

四物湯四 黃芩 黃連各一 為末醋糊為丸

服



丹溪治月水黑口渴倦怠脉不勻似數

黃栢炒 黃芩各三錢 甘草二錢 赤芍藥 香附各半兩

右醋糊丸白湯下五六十九

一婦二十歲月水二月不行忽行小腹痛有塊血

紫色 白芍 白朮 陳皮各半兩 黃芩 川

木通各二錢 甘草五錢 右水煎服

一婦氣滯血澁脉不瀯經不調

大腿外腫麻木或時痒而

火麻仁 桃仁 芍藥各二兩 枳殼

白朮 歸頭 訶子肉 生地

大黃煨七錢 為末粥丸梧子

調經之劑

局方四物湯 治衝任虛損月水不調

當歸 川芎 白芍藥 熟地黄各一分

逍遙散 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛潮熱

咳嗽 炙甘草五分 當歸 茯苓 白芍 白朮

柴胡各一錢 右加薄荷葉生薑水煎服

膠艾湯 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝



不斷 阿膠炒 川芎 炙甘草各五分 當歸

艾葉炒各錢 熟地 白芍各二錢 水煎服

溫經湯 婦人血海虛寒月水不利逆膈疼痛

桂枝湯仁湯藥 當歸 川芎 芍藥 桂心

初九皆可用 丹皮 莪木各五分 人參 甘草 牛膝各一

水煎服

丹溪加味四物湯調經例

經候過而作痛血氣俱虛

將來而痛者血實也本方加菴仁

經水不及期者血熱也本方加黃

過期者血少也本方加參

過期紫黑有塊者血熱也必

過期而淡色者痰多也芎歸二味

紫色成塊者熱也本方加黃連柴胡

肥人不及日數而多痰者乃血虛有熱本方加

香附南星半夏黃連白朮

瘦人血枯經閉者本方加菴仁紅花或越鞠丸

四物加減調經例



經水微少漸不通手足煩痛肌漸瘦生潮熱
脉微數本方去川芎地黄加澤蘭葉三倍甘草
半分

經水過多本方去熟地加生地

經行身熱脉數頭昏本方加黃芩柴胡

經行微少或脹或疼四肢疼痛加玄

經候不調心腹疝痛只用芎歸

元戎加味四物湯

氣充經脉故月事頻併臍下多瘕

經欲行臍腹絞痛本方加玄胡實

經水過多本方加黃芩白

經水澁少本方加葵花紅花

經水適來適斷或性來寒熱宜先用

寒熱後以四物湯和之

簡易當歸散 經候不勻或三四月不行或一月

再至或天癸已過期經脉不調 川歸 白芍

川芎 黃芩 白朮 各半 山茱萸肉 一兩

右為末每服空心溫酒調二錢日三服



寶鑑生地黄丸

治婦人血實厥陰脉絃而長惡

風體倦乍寒乍熱面赤心忪或時自汗如傷寒

狀宜服抑陽藥

生地

二兩

柴胡

秦艽

黃芩

各半兩

芍藥

一兩二錢

為末蜜丸梧子大烏豆湯吞三四十丸

薑黃散

治血臟久冷月水不調臍腹

當歸

丹皮

玄胡

各二兩

芍藥

桂心

莪朮

各一兩

川姜黃

一兩

右為末每服一錢酒水同煎服

理氣之劑

澹寮煮附丸

經候不調血

暈惡心崩漏帶下並宜服之

香附子

擦去毛米醋浸一日
礮器煮醋盡炒乾

右醋糊為丸梧子大每服五十九淡醋送下

艾附丸 治同前

艾葉

四兩

川歸

二兩

香附子

一斤

照上製為丸服亦同

嚴氏抑氣散

婦人氣盛於血變生諸症頭暈膈

滿

香附

四兩


茯神

炙甘草

各一兩

陳皮

二兩



右為末每食遠沸湯調下二錢

正氣天香散 治婦人一切氣氣上湊心胸攻

築脇肋刺痛月水不調 台烏藥錢二香附錢一

陳皮 蘓葉錢各一乾薑錢半 右分二帖水煎服

丹溪治一婦年四十八因有白帶口渴月至冬
血黑色後來血淡倦怠食少臍上至

白朮錢一紅花錢一陳皮錢一木

縮砂 炙甘草各三枳殼

和丸三十九柳青丸二十九

紅水過多 黃芩炒芍藥炒黃白炒

龜板炙香附二錢椿根

白湯吞五六十九

一婦脉絃而大不數形肥初夏倦怠月

此稟受弱氣不足以攝血故行多也 黃芩

陳皮錢各一白朮錢半人參分五炙甘草分三水煎服

四物加熟地當歸湯 治經水少而色和

四物湯四熟地 當歸各一

丹溪抑氣丸 臨經之時腹痛以四物湯加玄胡



索陳皮丹皮甘草 痛甚以豆淋酒下 痛輕

以童便香附入條芩為丸

又一婦年四十月水不調行時腹痛行後又有三

四淋瀝皆穢水口渴面黃倦怠無力 白朮兩

歸身尾錢六陳皮錢十黃連錢三木通 黃芪

錢各二炙甘草錢一分帖水煎吞五靈錢

桂枝菴仁湯 經前腹痛不可下

生地錢各二菴仁錢四甘草錢六

服又方常歸錢胡索錢每月

本事方 治婦人月經壅滯每發心驚

可忍及治產後惡露不快

人事氣絕欲死者琥珀散

赤芍藥 劉寄奴 牡丹皮 熟地黃

真蒲黃 菊花 當歸各一兩右前五味用魚白

一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度

焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下空

心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索

亦佳○予家之秘方也若是尋常血氣痛只一



服產後血衝心二服便下常服尤佳予前後救

人急切不少此藥亦宜多合以救人

交加散 治營衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛

經血諸疾並皆治之 生薑 二斤 生地 二斤 二

白芍藥 當歸 桂心 各一斤 紅花 炒 無忌 沒藥

方研子 蒲黃 炒 玄胡索 醋 碎 包 用 布 去 皮 各 一

右將地黃汁炒生薑滓薑汁炒

用諸藥為細末每服三錢

不依常蘓木煎酒調下 矣

交加地黃丸 治婦人經不調

痛 生地 老薑 各一斤 玄胡

芍藥 各二兩 明沒藥 木香 各一兩

各兩 香附 斤半 右為末先以薑汁浸地


汁浸生薑渣晒乾皆以汁盡為度共十一味

一處晒乾研為末醋糊為丸空心以薑湯下

一婦患經血紫黑一月二次行不思食口苦時發

熱 麥冬 歸身 白芍 陳皮 白朮 各一兩

人參 地黃 茯苓 各半兩 木通 三錢 生甘草 一錢



右分十帖食前熱飲下抑青與點各十五丸
益母草膏 益母草未結子時採來搗汁熬膏每
用半杯和酒或薑汁調服大治汚血及月經不

調

肥人不及期而多痰者血虛有熱南星白朮蒼朮

黃連香附川芎作丸服

婦人血脈不調徃來寒熱狀如瘧

川芎

甘草

黃芪

官桂

白芍

各二錢

柴胡

阿膠

各半兩

枚水煎空心溫服為末白湯

無帶下極調血脈養子宮

薛氏曰有脾經血燥而經先期者

脾經鬱火先期者歸脾湯○肝經怒少

者加味小柴胡湯○血分有熱而先至者加味

四物湯○勞後火動補中益氣湯○有解經血

虛而後至者人參養榮湯○肝經血少而後至

者六味地黃丸○氣虛血弱者八珍湯蓋血生

于脾土故云脾統血凡血病當用苦甘之劑以



助陽氣而生陰血也

經行臍腹痛甚以菴仁桂枝湯一劑而瘥

經行腹先痛用局方七氣湯送來復丹局方積氣

丸疔瘕瘕瘕諸氣亦効

丹參丸 調經養血 金陵一家專製此與四製

丹參 淨四兩酒浸 杜仲九兩京甚重此二藥

天台烏藥 兩一香附 三兩童便浸

右為末煉蜜為丸梧子大豆

經水常止不止

婦人四十九歲已後天癸當住每月印行

不止乃血熱也宜芩心丸

米泔浸七日炙乾又浸又炙如上

九梧子大每服七十九空心温酒送下日

良方曰婦人月水不斷淋瀝腹痛或因勞損氣血

而傷衝任或因經行而合陰陽以致外邪客於

胞內滯於血海故也但調養元氣病邪自愈若

攻其邪則元氣反傷矣

薛氏曰前症若是鬱結傷脾用歸脾湯恚怒傷肝



逍遙散肝火妄動加味四物湯脾氣虛弱六君
子湯元氣下陷補中益氣湯熱傷元氣加麥冬
五味黃柏果抄

許學士云經脉過期不及腰腹疼痛或七七數盡
而月經仍下者宜用簡易當歸散治之

方見調
經氣虛
者去黃芩加
桂心一兩

黃芩湯 治經血不止 方出崩

居經

婦人月水當三旬一見今三月始一

脉經曰少陰脉微而遲微則無精是

瀦即血不來此為居經三月一

脉經曰婦人年已五十一旦而清血二

何以治之師曰此婦人前絕生經水不

清血此為居經不須治當自止經水下常五日

止者五日愈

月經不通 出婦人良方

婦人月水不通或因醉飽入房或因勞役過度或
因吐血失血傷損肝脾但滋其化源其經自通



若小便不利苦頭眩痛腰背作痛足寒時痛久而血結于內變為癥瘕若血水相併脾胃虛弱壅滯不通變為水腫若脾氣衰弱不能制水水漬肌肉變為腫滿當益其津液大補脾胃方可保生

東垣曰經閉不行有三婦人脾胃久虛形體氣血俱衰而致經水斷絕不行或病善食漸瘦津液不生夫經首血之液既絕為熱所燥肌肉漸瘦時

竭病名曰血枯經絕宜瀉胃之

經自行矣此症或經適行而有

胎病者有矣

或心包脉洪數躁作時見大便秘澀小

不利而經水閉絕不行乃血海乾枯宜調血脉

除包絡中火邪而經自行矣

或因勞心心火上行月事不來者胞脉閉也包

脉者屬心而絡于包中今氣上迫肺心氣不得

下通故月事不來宜安心補血瀉火經自行矣



察古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也內
經曰二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不
月其傳為風消王啟玄註曰大腸胃熱也心脾
受之心主血心病即血不流脾主味脾病即味
不化味不化則精不足故其病即不能隱曲脾
土已虧即風邪勝而氣愈消也又經曰
來者胞脉閉也宜先服降心火之劑後用局
五補丸後以衛生湯治脾寒血
五補丸 補諸虛安五臟堅骨節

熟地 人參 牛膝 白茯苓
右煉蜜丸梧子大每服五十九溫酒

衛生湯

當歸 白芍

各二兩

黃芪


三兩

甘草

一兩

每服五錢水煎空心服如虛者加人參一兩

按東垣潔古治血枯之法皆主於補血瀉火也
補血者四物之類瀉火者東垣分上下中故火
在中則善食消渴治以調胃承氣之類火在下
則大小便秘澁治以玉燭之類玉燭者四物與



調胃承氣等分也火在上則得干勞心治以苓
連及三和之類三和者四物涼膈當歸等分也
潔古先服降心火之劑者蓋亦苓連三和玉燭
之類後服五補衛生者亦補氣之劑也

黃帝曰有病胸脇支滿者妨于食病至則先聞腥
臊臭出清液先唾血四肢清目眩時、前後血
病名為何、以得之岐伯曰病名血枯此得之
少年時有所大脫血若醉入房中氣、
月事衰少不來也帝曰治之柰何、

鳥鰾骨一蘆茹二味并合之丸以雀卵、
豆以五丸為后飯飲以鮑魚汁利服、
也

王啟玄註云鳥鰾魚骨主血閉蘆茹主散惡
血雀卵主血痿鮑魚主瘀血河間宣明論方
鳥鰾魚骨蘆茹各等分雀卵不拘數和丸小
豆大每服五丸至十九煎鮑魚湯下食後日
三服壓以美膳

養生必用論曰女子十四天癸至任脉通月事以



時于是有子天癸者物之自然月者以月至經者有常也其來過與不及皆謂之病若榮血虧損不能滋養百骸即髮落面黃羸瘦燥熱燥氣盛則金受邪金受邪則為咳為嗽為肺癆為肺痿必矣但助胃壯氣則榮血生而經自行須慎飲食調七情保神氣庶可得生若暴怒氣逆經閉不行常用行氣破血之劑

劉宗厚曰榮者水穀之精氣和調于

六腑乃能入于脉也源而來生化于月

于心藏受于肝宣布于肺施泄于腎灌于目得之而能視耳得之而能聽手足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣注之于脉少則滿充則實常以飲食滋養則陽生陰長變化而為血諸經恃此則百脉長養耗竭則百脉空虛可不慎哉若陰氣一傷變症百出妄行于上即吐衄衰涸於下則痿閉血滲腸間則為腸風陰虛陽搏即為崩濕蒸熱瘀則為滯下熱極腐化即為膿血火極似水則血紫黑

熱勝于陰發為瘡瘍濕滯于血則為痛痒癩疹
蓄之在上則善忘蓄之在下則善狂

寇宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不
先傷其氣血者若室女童男積想在心思慮過
度多致勞損男子即神色消散女子即月水先
閉且心病即不能養脾故不嗜食脾虛即金虧
故發嗽腎水絕則木氣不榮而四肢痿故多
怒髮髮焦筋骨痠若五臟傳遍則
改易心志用藥扶持庶可保生切不可

黃虫等涼血行血宜栢子仁丸澤蘭湯

制虛火也按內經五穀入于胃其糟粕津液

氣分為三隧故宗氣積于胸中出于喉嚨以貫
心脉而行呼吸營氣者泌其津液注之于脉化
以為血以營四末內養五臟六腑若服苦寒之
劑復傷胃氣是犯生生之戒必致於不起也

薛氏曰按經水陰血也屬衝任二脉上為乳汁下
為月水其為患有因脾虛而不能生血者有因
脾鬱而血不行者有因胃火而血消燥者有因



脾胃損而血少者有因勞傷心而血少者有因怒傷肝而血少者有因腎水少不能生肝而血少者有因肺氣虛不能行血者治療之法若脾虛而不能行者調而補之脾鬱而不行者開而補之胃火而不行清而補之脾胃損而不行溫而補之勞傷心血而不行逸而補之怒傷肝而不行和而補之肺氣虛而不行補脾胃腎不行補脾肺經云損其肺者益其氣調其營衛損其脾者調其飲食適其美

肝者緩其中損其腎者益其精皆皆子

蕭氏曰經云氣上迫肺則心氣不得下

不來今用連朴之類導痰降火使氣不上肺故心氣下通而月事來也

丹溪治一婦久瘧食少經閉兩手無脉每日與三花神祐丸十餘粒津噤之月餘食進脉出又半月脉愈又一月經行亦此意也予嘗體此治陳婦二十歲形肥痞塞不食每日臥至未牌喫一盞粥粥後必吐水半碗復臥經閉三月前時忽



通黑色脉之辰時寸關滑皆有方午後關滑寸
不滑詢之因乘怒飲食而致遂以白朮一兩半
厚朴黃連枳實各一兩半夏茯苓陳皮山查人
參滑石各八錢縮砂香附菴仁各半兩紅花二
錢分十帖各入薑汁三匙日進之間三日以神
祐丸神秘沉香丸微下之至十二日吐止食漸
進四十日平復如故又汪氏年三十餘形瘦亦
痞不食吐水經不通以前方加參朮
熟入竹瀝半盞薑汁服之但不用白朮

平復若咳嗽寒熱而經閉者當于亥月

張子和曰凡月事不來用茶調散吐之

散芎歸湯三和湯桂苓白朮散之類降心少
腎水開胃進食分陰陽利水道之藥也

一婦月事不行寒熱往來口乾頰赤飲食少旦
暮間咳一二聲諸公皆用蚩蚩水蛭乾漆硃砂
芫青紅娘子沒藥血竭之類惟予不然古方雖
有此法柰病人服之臍腹必發痛飲食不進乃
命止藥飲食稍進內經曰二陽之病發心脾心



受之則血不流故不月既心受積熱宜抑火升
水流濕潤燥開胃誘食乃涌出痰一二升下泄
水五六行濕水上下皆去血氣自然湍流月事
不為水濕所隔則依期而至矣亦不用蠶虫水
蛭有毒之藥如用之則月經縱來小澗反閉他
症生矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之
藥偏勝而致天關多矣

一婦三十四歲經水不行寒熱往來

唇焦頰赤時咳二三声問其所用

烏金丸燒肝散四物湯鱉甲散建中湯寧肺散
鍼灸千百轉劇家人意倦不欲求治予憫之先
涌痰五六升午前涌畢午後食進餘症悉除後
三口復輕涌之又去痰一二升食益進不數日
又下通經散瀉訖一二升後數日去死皮數重
小者如麩片大者如葦膜不一月經水自行神
氣大康

室女月水不通 用雄鼠屎一兩燒存性為細末
空心溫酒調下一錢神効



仲景礬石丸 婦人經水閉不利臟堅癖不止中

有乾血下白物 礬石柱三錢 杏仁半二錢

二味末之蜜丸棗核大內陰中劇者再內之

琥珀散 治心膈迷悶肚腹撮痛月信不通等疾

烏藥二兩 當歸 蓬朮醋煨各一兩

右為末溫酒調下二錢

萬病丸 月經閉膈腹作痛及產後癥瘕等病

乾漆炒烟出青白為度 牛膝油浸焙各一兩

為末生地黃汁一升砂器慢火熬膏丸梧子大

每服二十九空心米飲下

紅花當歸散 經候不行腰膝重痛小腹堅硬

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝

炙甘草 蘼木各二錢 白芷 桂心各一錢半


赤芍炒一兩 劉寄奴苗五錢 為末酒調服三錢

栝子仁丸

栝子仁炒另研 牛膝酒洗 卷栢各半兩 澤蘭葉一兩

右蜜丸梧子大每服三十九空心米飲下

澤蘭湯 澤蘭葉二錢 當歸 芍藥各一錢炒



炙甘草

五分

水煎服

茯苓補心湯

治婦人心氣虛耗不能主血又不

能制乎肺金氣滯以乘乎肝木肝既虧損則血

不能藏漸致精血枯涸月事不調此方專補心

元之虛抑其肺氣調和營衛滋養血脈 前方

參蘓飲內除木香餘與四物湯對勻每服五錢

以薑棗煎溫服 此方常進用以治宮娥多効

牛膝散 治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣

攻胸膈

牛膝

桂心

赤芍炒

菴仁

玄胡索炒

川歸

丹皮

各一兩

右為末每服一錢酒煎服或每服五錢水煎服

地黃通經丸 治月經不行或產後惡露臍腹作

痛

熟地四兩

蚩蚩去頭

水經糯米同炒

菴仁

去皮尖各五十枚

右煉蜜丸梧子大每服五七丸

空心酒下

牡丹皮散 婦人月水不利臍腹疼痛

丹皮

大黃炒各一兩

赤芍

生地

菴仁

川歸

桂心

赤茯苓

白朮

各七錢半

石葦去毛

木香

各半兩

右每服五七錢薑三片水煎空心服

本事通經丸 婦人室女月水不通疼痛或成血

瘕 桂心 青皮去白 大黃炒 乾薑 川楝

川烏 乾漆 莢木 川歸 菴仁 各等分

為末先將四錢用米醋熬成膏和餘末調勻搗

千杵丸如梧子大晒乾每服二十九丸淡醋湯下

加至三十九丸溫酒亦得

厚朴湯 治月水不通屢試有驗因氣滯痞嘔結

厚朴葉汁 切細濃煎去渣空心服不過三口

劑瘕

丹溪積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子一兩 黃連錢五 吳茱萸一錢 菴仁五十枚

紅麴錢二 縮砂錢三 山查末

薑汁餗餅糊為丸

軀肥脂滿經閉者導痰湯加芩連不可服地黃如

用以薑汁炒過即二陳加枳實黃連是也

一婦年二十餘兩年經閉食少乏力

黃連二兩 白朮一錢 陳皮 滑石各一錢 黃芩半兩



木通

分三 菴仁 十二枚

炙甘草

少許

水煎服

瘀血鬱滯經閉或臨經時腰疼腹痛宜四物加紅

花菴仁 莪朮 玄胡 香附 木香 發熱加黃芩 柴胡

瘀血作痛經閉不行丸藥方

香附

醋煮

瓦楞子

煨二兩

菴仁

二兩

丹皮

大黃

蒸

川歸

各一兩

川芎

紅花

各半兩

為末 餛餅丸 梧子 大空心 溫酒下 三五十九

經水過期不行

玄胡索

錢一

香附

枳殼

各五分

為末 杜牛膝汁半鍾 空心調服

當歸散

治經脉不通

川歸

川山甲

炒

蒲黃

炒各半兩

辰砂

錢一

射香

少許

右為末 酒調服 二錢

菖蒲丸

血積心脾作痛

九節菖蒲

六兩

吳茱萸

炒

香附子

各四兩

右為末 醋

打神曲糊為丸 梧子大 每服五十九 薑湯下

沒藥散

血氣不行 心腹疼痛 或走注痛 月經不

調 發熱 晡熱 並宜用之



紅花

沒藥

川歸

玄胡炒

右各等分為末每服二錢童便酒調下

藏靈仙散 凡冷氣滯血少小腹疼痛或經行遇

怒腹脹痛宜用之

藏靈仙

一兩川歸

沒藥

木香

桂心各五錢

為末每服一錢熱酒調下

當歸散 凡血積小腹痛或因氣逆月經不行肚

腹作痛

川歸炒

赤芍

沒藥

枳殼炒

劉寄奴

玄胡

各等分為末每服一錢酒調下

加味建中湯 血海受寒小腹作痛

桂心兩半

白芍兩

炙甘草二錢半

吳茱萸

當歸

玄胡

丹皮各五錢

每服五錢加薑棗水煎食前服

滋血湯 婦人血熱氣虛經候澀滯不通肢體麻

木肌熱生瘡渾身痒倦將成癆瘵不可妄服藥

餌宜以此滋養自能通利

馬鞭草

荊芥穗各四兩

桂心

枳殼

川芎

川歸

丹皮

赤芍各一兩



每服五錢烏梅一枚水煎食前服 如有此症
服半月經脉自通百病皆愈 出適宜方

崩

生生子曰崩者謂傾陷之勢而不可遏俗曰血山
崩謂血暴下如山之崩壞也又曰血海敗蓋衝
任二脉為血之海附于陽明陽明者土也土位
乎中故又曰崩中

內經陰陽別論云陰虛陽搏謂之崩東垣曰婦人
脾胃虛損致尺部脉沉細而數或沉絃而洪大

有力寸關脉亦然皆由脾胃有虧下陷于腎與
陰火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏
腐肉之臭中有白帶者脉必絃細寒作于中中
有赤帶者其脉洪數疾熱明矣必腰痛或臍下
痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼脾胃
症出見或四肢困熱心煩不得眠心下急宜大
補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫
勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾
旺于血脉之中又致脾胃飲食失節火乘其中

形質肌肉容顏似不病者此心病不行於診故
脾胃症顯矣故經水不時而下或暴下不止治
當先說惡死之言勸諭令拒死而心不動以大
補氣血之藥補養脾胃微加鎮墜心火之藥治
其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則
胞絡絕胞絡絕則陽氣內動散則心下崩數波
血也故本病曰大經空虛散則肌痺傳為脉痿
此之謂也

方論曰婦人崩中由臟腑傷損衝任血氣俱虛
故也衝任為經脉之海血氣之行外循經絡內
營臟腑若無傷損則陰陽和平而氣調適若勞
動過多致臟腑俱傷而衝任之氣虛不能約制
其經血故忽然暴下或由陰陽相搏為熱所乘
攻傷衝任血得熱則流散甚者致于昏悶其脉
數小則為順洪大為逆大法當補脾胃為主

薛氏曰經云陽絡傷則血外溢陰絡傷則血內溢
又云脾統血肝藏血治法前症因脾胃虧損不
攝血歸元用六君子加芎歸柴胡若肝經之火



而血下行用奇効四物湯或四物加柴梔苓朮
若肝經風熱而血妄行用加味逍遙散或小柴
胡梔芍丹皮若怒動肝火而血沸騰亦用前藥
若脾經鬱結而血不歸經用歸脾加柴梔丹皮
若悲傷胞絡而血下崩用四君加柴梔升麻故
東垣先生云凡下血症須用四君以收功厥有
旨哉若大吐血母以脉論當急用獨參湯救之
若潮熱咳嗽脉數乃元氣虛弱假熱之脉尤當
用人參溫補此等症候無不由脾胃先損故脉

洪大察其有胃氣能受補則可救苟用寒涼止
血之藥復傷脾胃反不能攝血歸源是速其危
也

丹溪曰血崩亦有因涎鬱胸中清氣不升故經脉
壅遏而降下非開涎不足以行氣非氣升則血
不能歸隧道此論血泄之義甚明蓋開胸高濁
涎則清氣升清氣升則血歸隧道不崩矣故其
証或腹滿如孕或臍腹痛或血結成片或血
出即快止即悶或臍上動其治法宜開結痰行



滯氣消瘀血

又曰勞動過傷臟腑衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下當宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜之劑治其心補陰瀉陽經自止矣○急即治其標用白芷湯調百草霜末甚者棕櫚灰後用四物湯加炒乾薑調理○因勞者用參耆帶升補藥○因寒者用乾薑因熱者用黃芩○崩過多者先以五靈脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能止能行○紫色成塊

者為熱四物湯加黃連之類○崩中用香附白芷丸服氣虛血虛者皆以四物湯加參芪○漏下為熱而虛四物加黃連○崩中白帶用楸目末又用石灰炒去灰為末苦草少許粥丸服○經血逆行或血腥或唾血或吐血用韭菜汁服效

治血崩血瘕或經行產後心腹脇痛五靈脂炒烟盡為末每服一錢溫酒調或用三錢水酒童便煎服



治風熱血崩荆芥穗燈火燒焦為末每服三錢童

便調服又治產後昏暈俱妙

獨聖散 治肝經有風血崩

防風去 為末每服二錢空心食前酒煮白麵

清飲調下極驗

神應散 治血虛內熱血不歸經而崩

桂心燒存性 為末每服一二錢米飲調下

又方 陳槐花一兩百草霜半兩為末每服一二

錢燒紅鐵秤鎚淬酒調下

簡易黃芩湯 崩中下血陽乘陰經水沸溢

黃芩 為末每一二錢燒秤鎚淬酒調下或用此酒

吞茶心丸亦妙

伏龍肝散 治氣血勞傷衝任經虛血非時崩下


臍腹疼痛脉遲弱食或少或赤白帶下

伏龍肝 赤石脂 麥冬各一兩 炙甘草半兩

川芎二兩 當歸 乾薑七錢半 桂心半兩

艾葉三兩 熟地二兩 每服六錢棗一枚水煎服

羅氏備金散 治婦人血崩不止



香附子

兩

歸尾

二錢

五靈脂

兩

空心酒調服五錢立効

本事方 治下血不止或成五色崩漏

香附子春去皮毛中斷之畧炒為末每服二錢用清米飲調下○此方徐氏傳其內人有是疾徧服藥不効後服此遂愈須久服為佳亦治產後腹痛大是婦人仙藥常服益血調氣○大千方用醋煮出焙乾為末醋糊為丸梧子大每服五十九米飲送下○數墮胎者此藥尤妙前藥用乾

荷葉潔煎洋
調吞更佳

縮砂散 治血崩

縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為末米飲調

下三錢

治血崩不止 五靈脂炒加當歸酒同煎或水酒

童便各半盞同煎服

又方 水煎五靈脂半乾去渣清再熬成膏入神

曲末為丸梧子大空心溫酒下三十九便止

又方 鹿茸

醋炙

當歸

各一錢

蒲黃

炒半兩



為末酒調五錢日三

仲景桂枝茯苓丸 治婦人有癥在臍上動下血

不止 桂枝 茯苓 棗仁去皮炒

芍藥 丹皮去心各 為末煉蜜為丸梧桐子

大每服十九日三以知為度

又婦人陷經漏下色黑 膠薑湯主之即芎藭膠艾湯

芎藭 阿膠 甘草各二兩 艾葉

當歸各三兩 芍藥各四兩 熟地 右水五升清酒三

升煮取三升去渣內膠令消盡溫服一升日三

不瘥更煮一料一云加乾姜一兩

東垣益胃升陽湯 血脫益氣古人之法也先補

胃氣以助生長故曰陽生陰長諸甘藥為之先

務舉世皆以為補氣殊不知甘能生血此陽生

陰長之理也故先理胃氣人身之內穀氣為寶

黃芪二錢 人參去者 神曲炒各一錢半 升麻 柴胡各五錢

分 白木三錢 當歸身 甘草炙 陳皮一錢

生黃芩二錢 瀉益暑之伏金 肺逆秋涼不用 右每服五錢如

食添再加之如食減於五錢內減一二錢不可



多服水煎服一方有生地 如腹痛每服內加
白芍二分中桂少許如口乾渴加葛根二分先
服此益胃升陽湯不止却服後柴胡調經湯大
舉大升之也

柴胡調經湯 治經水不止下皆鮮血項筋急腦
痛脊骨強痛不思飲食

羌活 獨活 藁本 升麻 各五分 蒼朮 錢一


葛根 當歸 甘草 各三分 柴胡 七分 紅花 少許

水煎稍熱服取微汗立止

又嘗治一老婦血崩不止流流不絕滿床皆血上
床不得者三月矣腹滿如孕乃作虛挾痰積瘀
血治之用四物四兩參朮各一兩甘草半兩以
補虛香附三兩半夏兩半茯苓陳皮枳實砂仁
玄胡各一兩以破痰積汚血分二十帖每帖煎
乾加乾荷葉側柏葉湯再煎服之服盡良愈今
再不發如神

雲岐子栢黃散 療經血不止

黃芩 一兩二錢半 側柏葉 蒲黃 各一兩 伏龍肝 一兩



水二升煎取八合分為二服

又方 崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

芎藭一錢 阿膠 青竹茹各八分 續斷 地榆

小薊根各三分 當歸六分 生地 伏龍肝各一分

水九盞煎三盞分三服

一婦經漏不止四物加黃連黃柏鹿角膠童便數劑而愈緣此婦素服不得參芪後又小產血崩不止亦以前劑進之而安

大千方 崩中下血不止小腹痛

白芍藥酒炒 側柏葉微炒 右水一升煎取六

合入酒五合煎取五合空心分為二服 一方

為細末酒調二錢 一方有鹿角膠等分酒調

治白帶臍腹痛

治經血不止歌曰 婦人經血正淋漓 舊薑蓮

蓬燒作灰 熱酒一盃調八字 自然安樂更

無疑

經驗方 百草霜二錢狗胆汁拌勻分作二服以

當歸酒調下



黃芩湯 治經血不止

黃芩分五 川歸 側柏葉 蒲黃各四分

艾葉分 生地分二錢 伏龍肝錢二

生薑三片水煎服

經驗方 治血崩不止

右用黃連解毒湯加艾葉服無不効者

南岳魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子數

經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經

水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中

漏下三十六疾積癥癰臍下冷痛小便白濁以
上疾症皆令孕育不成以致絕嗣常服令人有
孕及生子充實產後百日內常服能去百病去
宿血生新血

木香煨 茯苓 京墨燒紅醋研末 菴仁去皮火炒

秦芫 炙甘草 人參 桔梗炒 藁本

石斛酒浸焙 蚕退焙 乾薑炮 牡丹皮

桂心 川歸 細辛 川芎各一兩

川椒去目炒出汗 山藥各七錢半 澤蘭葉 熟地



香附炒各大豆黃卷炒半蒼木米泔浸去皮炒八兩糯米炒一
右為末蜜丸每兩分作六丸每服一九嚼細食
前溫酒醋任下 此藥用之累効血崩服之即
止 向有經候不行者二年腹內一似懷孕時
或鼓動但脉絃疾非妊脉耳遂令服至半劑下
血塊一盃自後服盡經候竟調若經病久無子
者服之即孕且生子充實但服至有孕便當住
服或脾胃素弱不宜用蜜丸則以醋煮薄麵糊
為丸如梧子大每服五十九丸溫酒醋湯任下

赤白帶下

機要云赤者熱入小腸白者熱入大腸其本實熱
冤結於脉不散故為赤白帶下也冤屈也結也
屈滯而病熱不散先以十棗湯下之後服苦練
丸大玄胡散調下之熱去濕除病自愈也

厚曰此論有
餘之症也

劉宗

良方論云婦人帶下其名有五因經行產後風邪
入胞門傳於臟腑而致之若傷足厥陰肝經色
如青泥傷於手少陰心經色如紅津傷於手太



陰肺經形如白涕傷於足太陰脾經黃如爛瓜
傷足少陰腎經黑如衄血人有帶脉橫於腰間
如束帶之狀病生於此故名為帶

生生子曰按此論前既云傷於肝則色青傷
於心則色赤

云

是五臟皆能令人帶下也

抑何待於奇經之帶脉病而後然歟緣帶乃
有形之病如衣帶之狀所下之物亦必成條
或成片而象之也雖有赤白之殊皆濕痰瘀
血所致若局定指奇經帶脉之名而始名之


為帶下得無太泥乎哉攷之難經二十九難

曰奇經之為病何如

云

帶之為病腹滿腰


溶溶若坐水中滑伯仁註曰任脉起胞門行
張故病苦內結男為七疝女為瘕聚帶脉迴
身一週故病如是觀乎是在任脉則有男女
之分在帶脉則無男女之分據乎是則凡帶
脉所生之病乃男女均有之疾初非硬指帶
脉之名為婦人今日所謂白物淫淫而下之
帶也又按內經骨空篇曰任脉為病男子內



結七疝女子帶下癢聚亦是以任脉主帶下
而不以帶脉名帶下也故後之歷代諸公所
治亦不泥於帶脉予故辯而明之庶臨症者
而毋以名拘焉

劉宗厚曰按良方此論言風氣寒熱傷於諸臟致
症似言外邪大抵此症多有本於陰虛陽竭營
氣不升經脉凝滯衛氣下陷精氣累滯於下焦
竒經之分蘊積而成其病或醉飽房勞服食燥
劑所致也白物如涕之狀故言帶者亦病形也

經云帶脉為病而得名而白者屬氣赤屬血東
垣舉脉訣曰崩中日久為白帶漏下多時骨木
枯言崩中者始病血崩久則血少復亡其陽故
白滑之物下流不止此可見未得全拘於帶脉
矣詳病亦有濕痰流注於下焦或肝腎陰淫之
濕勝或因驚恐而水乘土位濁液下流或思慕
為筋痿內經所謂二陽之病發心脾是也或餘
經濕熱屈滯於少腹之下而病本殊則皆為氣
血虛損營衛之精氣累治而成其病標一也前



人立論殆盡病機則治法無定若戴人以帶下
得兩手脉俱滑大而有力乃上用宣去痰飲下
以導水丸泄濕熱繼以淡劑滲之此為瀉實也
如其諸脉微細或沉緊而瀋按之空虛或洪大
而瀋按之無力正為元氣不足陰虛筋痿虛極
中寒等症東垣有補陽調經固真等例乃兼其
虛也丹溪先生治因濕痰下注用海石南星椿
根皮之類較之前人下之而復吐以提其氣或
散中兼補補中兼利燥中兼升散潤中兼益氣

溫而兼收澁之例不同蓋病機有輕重淺深之
異耳

仲景曰婦人帶下六極之病脉浮則為腸鳴腹滿
緊則為腹中痛數則為陰中痒痛洪則生瘡弦
則陰疼掣痛

又曰帶下有三門一胞門二龍門三玉門已產屬
胞門未產屬龍門未嫁女屬玉門

脉經問曰未出門女有三病何謂也師曰一病者
經水初下陰中熱或有當風或有扇者二病者



或以寒水洗之三病者或見丹下驚怖得病屬帶下

又問曰婦人年五十所病下痢數十日不止暮則發熱少腹裏急痛腹滿手掌熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹中不去何以知之其症唇口乾燥故知之當與溫經湯

內經曰脾傳之腎病名疝瘕少腹冤熱而痛出白一名白蠱當此之時可按可藥 啟玄子註曰

出白洩出白液也蓋便濁白帶之類

許學士云凡婦人有白帶多致不產育速宜治之衍義治帶下并腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋敗膿血所致卒無已期須以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍藥白枯礬另為末各半兩同以蠟丸如梧桐子大空心及飯前米飲下十九或十五丸俟膿盡仍別以補藥佐之

本事方 治下元冷赤白帶下不問遠年近日盡



効 龍骨

錢五

舶上硫黃

半三錢

右為末每服

半錢無灰酒下空心調服一日三服

伏龍肝散 治赤白帶下久不瘥肌瘦瘁黃

棕櫚

燒存性

伏龍肝

屋梁上塵

懸長者炒烟盡出灰毒

右等分為末入龍腦射香各少許每服二錢酒或醋調服病十年者半年可安有人經年崩漏不止諸藥不効脉濡微與此藥兼香礬丸服之即愈

香礬丸

白礬

兩四

香附子

兩二

黃狗頭骨灰

兩四

右為末粥丸梧子大每服三十九

東垣補經固真湯 白文舉正室白帶常漏久矣

諸藥不効診得右尺極微其白帶下流不止脉經云崩中日久為白帶漏下多時骨木枯言崩中者始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本血海將枯津液復亡乾枯不能滋養筋骨以本部行經為引用為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而益津液以大辛熱之氣味補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺

而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥為
佐而益元氣名曰補經固真湯

柴胡 甘草 陳皮 郁李仁 生黃芩

人參 乾薑 白葵花 右除黃芩外

以水二大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至
一盞空心熱服以早膳壓之

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂 大附子 黃柏 知母 如少食常

飽有時似腹脹加白芍藥 如不思飲食加

五味子 如煩惱面上麻木如虫行乃胃中

元氣極虛加黃芪 人參 炙甘草 升麻

作一服水二鍾煎至一鍾食遠熱服

酒煮當歸丸 治頽疝白帶下注脚氣腰以下如

在冰雪中以火焙炕重厚綿衣蓋上猶寒不任

冷之極也面白如枯魚之象肌如刀削消瘦之

速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知

覺面白目青藍如菜色目眈眈無所見身重如

山行步歇側不能安地腿膝枯細大便秘結口



不能言無力之極食不下心下痞煩心懊懣不
任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中
下三陽真氣俱竭故噦嘔不止胃寒之極也其
脉沉緊而濡按之空虛若脉洪大而澁按之無
力猶為中寒之症况按之空虛者乎按之不鼓
是為陰寒之極也其空虛乃血氣俱虛之極也
當歸兩 茴香五錢 黑附子皮去 良薑各七錢
右四味剉以好酒一升半煎至酒盡為度炭火
焙乾為細末入後藥 炒黃鹽 丁香各半兩

全蠲三錢 柴胡二錢 升麻根 木香各一錢 苦練子

炙甘草各五分 玄胡索四錢 俱為末與前四味和

勻酒煮麵糊為丸梧子大每服二十九丸餓肚淡

醋湯下 忌油膩冷物酒麵


當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下

柴胡七分 良薑 乾薑 黑附子各一錢 升麻

蝟梢各五分 炙甘草六分 當歸二錢 炒黃鹽三分 黃栢二分

每服五錢水煎服為丸子亦可

右炒鹽例東垣回陽丹註云必用炒黃鹽無則



不効蓋寒疝之要藥也

固真丸 治白帶久下不止臍腹冷痛其寒稠之
如水陰中亦然目中溜火上壅視物眈眈無所
見齒皆惡熱飲痛須得黃連末擦之乃止惟喜
乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾
而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目溜
火腎水侵肝而上溢故目中眈眈無所見齒惡
熱飲者是少陽陽明中伏火也當大瀉寒濕以
丸藥治之故曰寒在下焦治主宜緩大忌湯散

以酒制白石脂白龍骨以枯其濕以炮薑大辛
熱瀉寒水以黃栢之大寒為因用又為鄉導治
法云古者雖重罪不絕人之後又為之伏其所
主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也以柴胡
為本經之使以芍藥半錢以導之又恐辛熱之
藥太甚損其肝經故微瀉之以當歸之辛溫大
和血脈此用藥之法備矣

白石脂

燒赤水飛研細晒乾

柴胡

各一錢 炮薑

四錢 黃栢

白芍

各五分

龍骨

酒煮水飛

當歸

酒洗三錢



右為末水煮稀糊為丸芡實子大每服三十九
空腹時滾湯送下即以美饌壓之 忌生冷硬
物酒濕麪

補真潤腸湯 治白帶陰戶中痛控心而急痛身

黃皮緩身重如山陰中如冰

陽湯一名助

即前固真湯減人參加防風高良薑

海藏香附六合湯 治赤白帶下

即四物加
曲香桂也

大千方 治赤白帶下年深月久不瘥

白芍藥二兩 乾薑二兩 各炒黃色為末米飲下二

錢日二服

丹溪治赤白帶下大法 或十棗湯神祐丸或玉

燭散皆可用之虛者不可峻攻實者可行

血虛加減四物湯 氣虛以人參白朮陳皮開

與之 主治燥濕為先 濕甚者固腸丸 陰

火動者諸藥中加炒黃柏 滑者加龍骨赤石

脂 滯者加葵花白者治白
赤者治赤 性躁者加黃連

寒月少加薑附臨機應變先須斷厚味 帶

下與夢遺同法治之 肥人有帶多是濕痰用



海石半夏南星黃栢炒青黛蒼朮川芎 瘦人

帶病少如有者多是濕熱用炒栢蛤粉滑石川

芎青黛樗皮 帶漏俱是胃中痰積流下滲入

膀胱出於大腸小腸宜升提甚者上必用吐以

提其氣下用二陳湯加白朮蒼朮 治結痰白

帶以小胃湯半飢半飽津液下數丸俟嚙行却

服補藥 白朮一兩蒼朮半兩紅白蔡花二錢

白芍藥七錢右餌餅為丸空心煎四物湯吞二十九

一婦年七十形瘦善啖白帶食前薑湯吞大補丸

五十九 一二次午饑後及臨卧時各與小胃丹

十五丸愈

乳香散 治赤白帶下 草果一枚去皮入乳香

焦存性連翅為末 每服二錢重者三錢陳皮湯調下

帶下不止用柶目白芷 治白帶以柶目為末米

飲下

樗皮丸 治赤白帶有濕熱者

白芍五錢良薑三錢黃栢炒成灰椿皮一兩

右為末粥丸每服三五十九米飲下



治白帶因濕熱而勝下者 蒼朮炒 白芍藥

滑石炒 枳殼 甘草各三錢 椿根皮炒

藜蘆炮 地榆半 為末粥丸米飲下

治帶下 椿根皮二兩 神麩炒 麩麩炒 黃柏炒

蒼朮各一兩 白芍半 滑石 枳殼各五錢

右為末糊丸梧子大空心服五十九

赤白帶皆屬於血有出於大小腸之分黃荊子炒

焦為末米飲調三錢

固腸丸 治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積

之後用此以燥下濕亦不曾單用看病作湯使
椿根白皮為末粥糊為丸此藥性涼而燥瀕炒
用 一方加滑石一半

地榆膏 治赤白帶下骨立者

地榆斤一 用水三升煎至一半去渣再煎如稠

飭空心服三合日二次

治漏下五色地榆三兩用醋一升煮十餘沸稍熱

食前服一合

治白帶因七情所傷脈數者





黃連炒

側柏酒蒸

黃柏炒各半

香附醋炒

白朮炒

白芍各一兩

白芷燒存性三錢

椿根皮炒二兩

木香炒

為末粥丸米飲下

千金方 治赤白帶下

三葉酸醬草陰乾為末空心溫酒下三錢

丹溪治赤白帶

龜板酒炙二兩 黃柏炒一兩 乾薑炒一兩

枳子二錢 右酒糊為丸每服七十九日二服

又方 治帶下脉數者 枸杞根一斤 生地一斤

右以水一斗煮取五升分五服

治帶下赤白腰痛或少腹痛有熱者

標皮二兩 玄胡索 菴仁 側柏葉 茴香

當歸 川練肉各半兩 香附八錢 官桂

烏藥各三錢 麥皮曲炒一兩

右為末酒糊為丸每服六十九神効

白芷散 治下元虛弱赤白帶下或經行不止等

症 白芷一兩 海螵蛸二枚 胎髮五九

為末每服二錢酒調下

東垣坐藥龍鹽膏 丁香 川烏炮 木香各半錢



全錫五枚

良薑

木通各一錢

枯礬五分

龍骨

茴香

歸稍

炒黃蘗

防已酒洗

紅豆

肉桂各二錢

厚朴三錢

玄胡索五錢

右為末煉蜜丸

彈子大綿裹留絲在外納陰戶內

又方勝陰丹為上藥力小再取三錢內加行性熱

藥 三賴子

川烏

大楸各五分

柴胡

羌活各二錢

全錫三枚

大蒜

破故紙與蒜同焙各一錢

升麻

枯礬各二分

射香少許

甘松三分

右為細末同前制用

又方回陽丹

全錫

升麻

甘松各二分

羌活

草烏頭各三分

水蛭焙乾三條

蜚虫三枚去翅足炒

川烏

柴胡各七分

大楸

萹撥

枯礬

三賴各五分

大蒜

破故紙各二錢

炒黃蘗一錢此必用之葉去之則不効

右為細末依前制如指尖大綿包納陰戶中覺

臍下煖為効

丹溪治胡安人白帶下月經甚多食少倦怠面黃

經中有如血塊者有如筋膜者與參朮等補血

氣調脾胃後諸症皆退惟帶未止以樗皮丸主

之

張戴人治一婦帶下連綿不絕白物或來已三載矣兩手脉俱滑大有力六七至常上熱口乾眩暈時嘔酢水乃寒痰在胸中以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹功以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈又息城李左衛之室病白帶如水窈漏中綿綿不絕穢臭之氣不可近而黃食減已三年矣諸醫

皆云積冷陽起石硫黃薑附之藥重重燥補汚水轉多戴人斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰二三升次日下沃水斗餘行三遍汗出周身至明旦病人云汚已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一男

仲景溫經湯

吳茱萸

川歸

芍藥

芍藥

人參

桂枝

阿膠

丹皮

生薑

甘草

各二兩

半夏

半升



麥冬升一 右十二味水一斗煮取三升分溫三服 亦主婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水過多及至期不來

五靈散 治赤白帶下

五靈脂半生半炒 為末酒調服

大千方 治白帶 茅花炒一握 棕櫚灰三寸

嫩蓮葉三葉 甘草節一錢 右為末空心酒調方寸匕

益母散 治帶下赤白惡露下不止

益母草開花時採搗為末空心酒服二錢日三服

又方 治白帶用白芷以石灰炒去灰黃草少許

粥糊丸服

又方 白芍藥炒黑為末每服三錢七酒調下

丹溪治赤白帶用生狗頭骨燒存性為末酒調服 或入藥服

千金方 治帶下

雲母為末溫水調服三方寸七立見神効

姪娘白帶 蒼朮三錢 白芷 黃芩炒各二錢

黃連炒 黃栢炒 樗根皮炒各一錢半 山茱萸各二錢



半錢

白芍

半錢

為末糊丸空心酒服五十九

寡婦師尼寒熱如瘧

倉公傳與褚氏論皆云師尼寡婦獨陰無陽慾心萌而未遂是以慳慳成病以致乍寒乍熱而類瘧狀久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黧瘦瘠等症皆寡婦之病診其脉獨肝部弦出寸口而上魚際皆血盛所致經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

薛氏曰前症若肝脉弦出魚際用生地黄九血虛佐以四物湯若蕪怒動肝火而寒熱佐以加味逍遙散若虧損肝經而寒熱佐以八珍湯若虧損元氣而寒熱佐以補中益氣湯若鬱傷脾氣而寒熱佐以濟生歸脾湯

治一寡婦不時寒熱脉上魚際以血盛之症用小柴胡湯加生地黃治之而愈但畏風寒以脾胃氣虛用加味歸脾湯補中益氣湯蕪服而安一婦因夫久出經商發寒熱月經旬日方止服降

火涼血藥內熱益甚自汗盜汗月經頻數予曰
內熱自汗乃脾氣虛弱也月經頻數乃血不歸
脾也用歸脾湯六味丸而愈

一室女寒熱肝脉弦長而出寸口用小柴湯加生
地烏梅治之而愈既嫁而諸症悉痊

一室女久患寒熱月經失期以小柴湯加生地治
之少愈更以生地黄丸而痊

生地黄丸 許學士云有一師尼惡風体倦乍寒
乍熱面赤心煩大小柴胡湯雜進其病益劇予

診視之曰三部脉無寒邪但肝脉弦長而上魚
際服此丸而愈

柴胡 秦艽 黃芩 生地 各五錢 二兩

赤芍藥 一兩 右為末煉蜜為丸梧子大每服

三十九丸烏梅湯下一日三服

逍遙散 治日夜虛熱脉微細

地骨皮 甘草 黃芩 川芎 各三錢

北柴胡 五錢 香附 三錢

右水煎空心服加竹葉十片



柴胡散

治寒熱往來以陰陽相勝陰勝則寒

陽勝則熱或是胎前雜病但服此湯如燒湯瀝

雪

北柴胡

黃芩

甘草各三錢

地骨皮一錢

荊芥

桂各三錢

水煎服 再仍服小柴胡湯三五帖

夢與鬼交

人稟五行秀氣而生承五臟神氣而養若調理失
節氣血虛衰則鬼邪干其正隱避而不欲見人
時獨言笑或時悲泣是其候也脉息遲伏或如

鳥啄或綿綿而來不知度數面顏不變亦其候也

薛氏曰前症多由七情虧損心血神無所護而然
也宜安神定志等藥則正氣復而神自安若脉
來乍大乍小乍短乍長亦為鬼祟也宜灸鬼哭
穴以患人兩手拇指相並用線紮扎當合縫處
半肉半甲間灼灸灸七壯若果是邪祟病者
即乞求免灸
云我自去矣

茯神散

治妄有所見言語雜亂時或昏昧痰

熱

茯神

兩半

茯苓

人參

石菖蒲



桃仁錢各一

赤小豆五分
治鬼魅交通

右水煎服

辰砂另研

檳榔

當歸

桃仁各三錢

水銀一錢

枚研令星尽

射香

阿魏麩包煨

沉香各半

右為末煉蜜為丸梧桐子大每

服十九空心桃仁湯下

辟瘟丹

虎頭骨二兩

辰砂

雄黃

雌黃

鬼臼

皂莢

蕪荑仁

鬼箭羽

藜芦各一兩

右為末蜜丸彈子大囊盛一九

男左女右繫臂上及用一九當病人戶前燒之

一切邪鬼不敢近

妙香散

治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜

汗等症

甘草炙

人參

桔梗各半

黃耆

茯神去皮

茯苓

遠志去心

山藥姜汁炙

各一兩

辰砂三錢

射香二錢

木香二錢

右為末每服二錢溫酒調服

治婦人與鬼交



松脂 雄黃 先熔松脂乃入雄黃以虎
爪不住手攪得所取如雞子黃大令患人卧以
被蓋取藥薰之惟露頭在外勿令泄氣又不可
過熱

鹿角散

男女夢與鬼交精神恍惚者

鹿角屑三指撮日二服酒下 亦治遺精 婦
人被妖魅狐猶祟迷惑不肯言鬼鹿角屑以水
服方寸匕即言實也

桃鳧

一名桃奴

一名梟景

是過年樹上不

落乾桃子味苦微溫主殺百鬼精物療中惡腹
痛殺精魅五毒不祥正月採之

熱入血室

婦人傷寒傷風發熱經水適來昼則安靜暮則譫
語有如癰狀此為熱入血室治者無犯胃氣及
上二焦宜服小柴胡湯

薛氏治一婦經行感冒風邪昼則安靜夜則譫語
此熱入血室也以小柴胡加生地治之頓安但
內熱頭暈用補中益氣湯加蔓荊子而愈後因



惱怒寒熱譫語胸肋脹痛小便頻數月經先期
此肝火血熱妄行以加味逍遙散加生地黃而
愈

一婦因怒寒熱頭痛譫言妄語至夜益甚月經暴
至以怒動肝火用加味逍遙散加生地治之神
思頓清又用補中益氣湯而痊

一婦經行感冒譫語或用發散寒涼之劑前症益
甚月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰涎自出此
熱入血室而藥復傷胃用香砂六君子歸脾湯

而安

乾姜柴胡湯

治婦人傷寒經脈方來熱入血

室寒熱如瘧或狂言見鬼

柴胡一錢

桂枝三分

牡蠣煨

乾姜炮

甘草各三分

瓜蒌根五分

水煎汗出而愈

海蛤散

治婦人傷寒血結胸膈宜服此藥及

針期門穴

海蛤

滑石煨水

甘草各二分

芒硝一兩

右為末每服二錢用雞子清調下小腸通利其



結血自散更用桂枝紅花湯發其汗則愈

桂枝紅花湯 治傷寒發熱口燥舌乾經脈不

行 桂枝 芍藥 炙甘草

紅花 二錢

右姜枣水煎服良久更進汗出可解

加味道遙散 肝脾血虛有熱遍身搔痒或口

燥咽乾發熱盜汗食少嗜卧小便澀滯等症又

治瘰癧流注虛熱等瘡熱入血室等症

炙甘草 當歸 芍藥 茯苓

白木 炒各 柴胡 丹皮 山梔 炒各

水煎服

道遙散 即前方去丹皮山梔

加味小柴胡湯 治經水適來傷寒或經水適

止傷寒昼則明了夜則發熱譫妄如狂 即小

柴胡加生地黃牡丹皮

心胸嘈雜

婦人嘈雜此脾胃鬱火痰滯血液汗而成用猪
血炒食之乃以血導血而使之歸源耳旋覆花



湯尤善

薛氏曰若因食鬱用六君子山查山梔若因胃熱
用二陳姜炒芩連若因六鬱用越鞠丸若因氣
滯用四七湯桔梗枳殼大抵此症屬病氣元氣
俱不足須用六君子為主少佐以治痰之藥若
以火治之必變吞酸中滿

一婦飲食少思胸中嘈雜頭暈吐痰中氣虛而
有熱用六君子湯加炒黑梔子桔梗而愈後因
勞後頭暈發熱吐痰不食用補中益氣加半夏

茯苓天麻而痊

一婦中脘嘈雜口中辛辣或咳嗽吐痰發喘面色
或白或赤此脾氣虛而肺中伏火也用六君子
加山梔桔梗柴胡及炒黑片芩治之愈

一婦嘈雜吞酸少食大便不結此脾氣虛寒而下
陷用補中益氣湯加茯苓半夏炮姜漸愈又常
服人參理中丸而安

一婦飲食後嘈雜吞酸此食鬱為痰用六君子送
越鞠丸漸愈又用加味歸脾湯而痊後因怒兩



脇脹痛中脘作酸四君子湯送左金丸漸安仍
用六君子湯送越鞠丸而痊

旋覆花湯 治脾胃虛寒中脘停痰汪洋嘈雜

腸鳴多唾嘔吐不食脇肋脹痛脉沉遲絃細

細辛 旋覆花 橘紅 桂心 人參

炙甘草 苦梗 白芍 半夏各五分 赤茯苓

用水加姜煎服

又心胸嘈雜茯苓補心湯最妙

茯苓補心湯 治面色黃瘁五心煩熱咳血吐

血及嘈雜潮熱等症

半夏 前胡 紫蘇 茯苓 人參

枳殼炒 桔梗炒 炙甘草 乾葛各五分

川芎 川歸 白芍 陳皮各一錢

熟地黄各一錢半 入姜枣水煎服

痲痺疝瘕

婦人痲痺因元氣虛弱而邪氣積聚蓋痲痺者在
腹內近臍左右有筋脉急痛如臂如指如痲之
狀痺者僻在兩脇之間有時而痛皆陰陽不和



經絡痞隔飲食停滯冷氣固結而成也

婦人臟腑調和經脈循環則月水以時故能生子而無病若乘外邪而合陰陽則小腹胸脇腰背皆相引而痛月事不調陰中腫脹小便淋瀝面色黃黑則疝瘕生矣疝者痛也瘕者假也脉弦急者生虛弱者死尺脉濇浮牢為血實氣虛腹痛逆氣上行以為胞中有惡血久則結成瘕也張子和曰遺溺閉瘕陰瘕瘰疬精滑白淫皆男子之疝也若血涸月事不行行後小腹有塊或時

動移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕

婦人積年血瘕由寒溫失節脾胃虛弱月水不通相結盤牢久則腹脇苦痛宜用三蘘煎主之

治瘕癖神効

以獾猪肝一具重十餘兩用巴

豆仁五十枚入肝內用醎醋三碗慢火熬乾研爛量入三稜末丸作梧子大每服五丸食前熟酒下

經行腹痛乃瘕癖瘕瘕局方積氣丸妙



蘆會丸

治疔癰肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思
口乾作渴或肝疔食積口臭生瘡牙齦蝕爛等

症

蘆會

胡黃連

黃連

炒焦

木香

白蕪荑

青皮

各五錢

當歸

茯苓

陳皮

各一兩半

炙甘草

七錢

右為末米糊丸梧子大每服七八十九米湯下

麝香丸

治痰癖冷氣心腹作痛

射香

二錢另研

五靈脂

炒

阿魏

五錢麪包煨過

桃仁

三稜

醋製各二兩

芫花

醋炒

檳榔

各一兩

莪木

醋煨

桂心

沒藥

木香

當歸

各五錢

右為末飯丸梧子大每服十九淡醋湯下

阿魏膏

治一切瘡塊更服胡連丸

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍

生地

川山甲

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

紅花

各五錢

木鱉子

去殼十枚


亂髮

五錢

槐柳桃枝

各三錢

右用香油二兩煎黑去渣入髮油內煎髮化
仍去渣徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘓



合香油乳香沒藥各五錢射香三錢調勻成膏
攤貼患處內服丸藥 凡貼膏藥先用朴硝隨
患處鋪平半指厚以紙蓋用熱熨斗熨之良久
如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥 若是肝
積加盧會末同熨

乾漆散

治疝瘕脇肋疼痛

乾漆炒烟盡

木香

羌花

醋炒

赤芍

桂心

川歸

川芎

琥珀

各五錢

大黃

炒二兩

牛膝

一兩

桃仁

去皮尖一兩另研

射香

一錢

右為末每服一錢溫酒調下

桃仁煎

治血瘕

莢仁

大黃

炒各一兩

蜚虫

炒黑五錢

朴硝

一兩

右為末以醇醋一鍾石器中煮三分下前三味
不住手攪煎至可丸下朴硝丸梧子大不吃晚
食五更初溫酒下五丸日午下穢物如未見再
服仍以調氣血藥補之此方乃峻劑也下血塊
血積甚速氣血虛者慎之

大硝石丸

治七癥八瘕當用此藥去之不令人
困

大黃

四兩

硝石

三兩

人參

一兩

甘草

八錢

右為末苦酒一升石器中先入大黃煎膏入餘藥九梧子大每服三十九米飲下三日一服宜下赤物

蟠葱散

治寒氣不散疝瘕脹痛脇肋痛甚神

効男子婦人脾胃虛冷氣滯不行

延胡索

肉桂

乾姜

炮各四分蒼朮

浸一宿

焙甘草

各二錢砂仁

檳榔

丁皮

各一錢

三稜

煨莪朮

茯苓

青皮

去白各七分

連根葱白一莖水二鍾煎至熱服

寶鑑蒺藜湯

治陰疝小腹作痛小便不利手足逆冷或脇腹悶痛

足逆冷或脇腹悶痛

蒺藜子去刺大附子炮

梔子仁各半兩

右為末每服三錢水煎食前服

川山甲散

治癥痞瘀血心腹作痛

川山甲

灰炒

鱉甲醋炙

赤芍

大黃

炒

乾漆

炒無

桂心

各一兩

川芎

芫花

醋炒

歸尾

各半兩

射香一錢

右為末每服一錢酒調下



三稜煎

治血癥血瘕食積痰滯

三稜醋浸

莪木剉水全上

青皮去白半夏

麦芽炒各

右用好醋一鍾煮乾焙為末醋糊

丸梧子大每服三四十九淡醋湯 痰積生姜

湯下

脬轉小便不利

婦人脬轉或內熱傳搏於脬或忍小便氣逆於內

以致小腹急痛不得小便甚者至死

薛氏曰前症不問男女孕婦轉筋小便不利命在

反掌非八味丸不能救

一婦因鬱怒小便滴瀝漸至小腹腫脹痰咳喘促

用八味丸料煎服小便即利而痊

葱白湯 治氣滯小便不通腹脹欲死

陳皮三兩 葵子一兩 葱白一握 水煎分三服

八味丸 治轉脬小便不通殊有神効但世所

不用以致悞人 方見虛損

滑石散 脬轉數日不通

滑石一兩 寒水石二兩 葵子一合 右研以水



一斗煮至五升每服一升即通利

又方

亂髮煨

葵子

車前子

各等分酒

調下二錢

強忍小便致脬轉尿不利困篤欲死

滑石

二兩

髮灰

一兩

為末每服三錢桃白皮

一觔細切搗熟入水三盞絞取汁調服

千金翼用杏仁去皮尖二十枚麩皮炒黃嚼細水

送下立通

一方

皂角為末吹鼻內取嚏

石葦湯

治脬轉小便不通及小便實熱氣滯

淋瀝

石葦

黃芩

炒木通

葵子

榆白皮

瞿麥

甘草

各五分

加生姜水煎服

小便數

薛氏曰小便數頻若肝經火動用逍遙散加龍膽

草車前子

膀胱火動六味地黄丸加麥門冬五味子

肝腎濕熱龍膽瀉肝湯 鬱傷肝脾加味逍遙散





加味歸脾湯 脾肺氣虛補中益氣加麥冬五味
肝經血虛加味逍遙散 腎氣虛敗鹿茸
散如不應 用八味丸

桑螵蛸散

治腎氣虛寒小便數少或時頻數

或夜間尤數

桑螵蛸

炒三枚 鹿茸

牡蛎

煨

炙甘草

炙黃耆

右為末每服二三錢食前空心用

姜湯調下日二服

縮泉丸

治脾氣虛寒小便頻數或遺尿不住

小兒丸効

烏藥

益智仁

各等分為末酒煮山藥糊為

丸梧子大每服七十九鹽酒或米飲下

鹿茸散

治腎氣虛寒便溺數甚或夜間頻數

遺溺

鹿茸

炙

烏賊魚骨

桑寄生

川歸

龍骨

煨各二兩

白芍

炒

附子

炮各三錢

桑螵蛸

炙五錢

右為末每服二錢空心并食

前溫酒調下作丸亦可

遺尿失禁


附小便出尿其名交腸病也

內經曰胞移熱於膀胱則癆溺血膀胱不利為癆
不約為遺溺註云膀胱為津液之府水注由之
然足三焦脉實約下焦而不通則不得小便足
三焦脉虛不約下焦則遺溺也靈樞曰足三焦
者太陽之別也並太陽之正入絡膀胱約下焦
實則閉癆虛則遺溺

良方曰此乃心腎之氣失其常度故有便道澀而
遺者有失禁而不知自遺者亦有傷產傷膀胱
不時而遺者有睥寒臟冷而不自知者

薛氏曰設肝腎虛熱廷孔痿痺用六味丸如不應
用加減八味丸陽氣虛憊膀胱積冷用鹿茸丸
如不應丸八味丸若脾氣虛弱不能禁止用補
中益氣湯加山藥山茱萸五味若肺氣虛寒前
湯加桂附此症屬虛熱者多真寒者少治宜審
察

一婦小便自遺或時不利日晡益甚以肝熱陰挺
不能約制用六味丸料加白朮黃柏酒炒黑七
分知母五分數劑諸症悉愈若誤用分利之藥



愈損真陰必致不起

一老婦患前症惡寒躄倦四肢逆冷余以為陽氣虛寒用補中益氣湯加附三劑不應遂以參附湯四劑稍應仍以前藥而安附子計用四枚人參三觔許

一婦病愈後小便出屎以陰陽失於傳送名大小腸交也先用五苓散二劑而愈又用補中益氣湯而安

鹿茸丸 治陽氣虛小便白濁滑數不禁或臍

腹陰冷大便不實

鹿茸灸

椒紅

桂心

石斛

附子

炮牡蛎煨

補骨脂炒

肉蓯蓉

雞肫皮

炙沉香各一兩

桑螵蛸灸三錢

右為末酒糊丸梧子大每服三十九空心溫酒下

秘元丹 治陽氣虛小便不禁或夜多小便頻

數 白龍骨煨三兩

訶子十枚去核

砂仁一兩

右為末糯粥丸梧子大空心鹽湯下五十九



酒亦可

又方

鹿角鎔屑炒為末每服三五錢空心熱

酒調下

又方

雞胫炙為末每服二三錢空心食前

酒調下日三次


又方

桑螵蛸酒炒為末每服二錢空心姜湯

調下

終







國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.




國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

619 1951



TIFFEN Color Control Patches © The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

赤水玄珠婦人門第二十一卷目錄

小便出血

陰腫

陰痒

陰挺下脫

陰瘡

交接輒血出痛

胎前惡阻痰逆

胎動不安

胎漏下血

胎氣上逼

妊娠心腹痛

妊娠腰背痛

妊娠小腹痛

妊娠心腹脹滿

妊娠數墮胎

胎不長





赤水玄珠婦人門第二十一卷

新安生生子孫一奎著輯

小便出血

良方曰心主於血通行經絡循環臟腑得寒則凝
澁得熱則妄行失其常道則溢滲於脬則小便
出血也

薛氏曰前症肝經血熱者加味逍遙散怒氣血傷
者同治調送血餘灰妙若肝經風熱用前散送
子芩丸氣血俱虛者八珍散送血餘灰膏梁積

墮胎血下不止

未足月欲產

過期不產

妊娠欬嗽

妊娠吐血衄血

子煩



熱者清胃散加槐花甘草風熱傷胃者四君子
加防風枳殼胃虛不能攝血者補中益氣鬱結
傷脾不能攝血者濟生婦脾湯
婦小便出血服四物蒲黃之類更加發熱吐痰
加芩蓮之類又飲食少思虛症婦起肝脉弦而
數脾脉弦而緩此因肝經風熱為沉陰之劑脾
傷不能統血發生諸臟而然也用補中益氣六
味地黄丸而痊
蒲黃鹿茸散 治勞損尿血發熱內熱或寒熱往

來口乾作渴

蒲黃

炒

鹿茸

炙

當歸

生地

葵子

炒

續斷

酒炒各
等分

為末每服二錢酒調日三服

髮灰散

起居所傷小便尿血或忍尿脬轉脐下

急痛小便不通又治肺疽心衄內崩吐血舌

上出血俱妙

本草云能療瘰癧血通關膈利水
瘡瘰癧轉通大小
便止咳嗽鼻衄

生地黄散

血熱尿血

生地

黃芩

炒五錢

阿膠

側柏葉

炒各錢



右水煎食前服

當歸散 血分熱尿血

川歸 羚羊角屑 赤芍各五分 刺薊葉錢一

生地錢一 右水煎服

又方 治血分有熱 生地黃搗汁每用一小盞日

又方 治血分熱 尿血用炒蒲黃末每以二錢溫

鹿角膠散 鹿角膠炒為末二兩作二服長流水

調妙

陰腫

良方曰陰腫因胞絡素虛風邪客之乘于陰部血氣相搏故也

薛氏曰氣血虛弱補中益氣湯肝經濕熱龍胆瀉

肝湯又當與陰痒陰挺陰冷相參而治

又云一婦陰中腫悶小便澀滯兩脇作腫內熱晡

熱月經不調時或寒熱此因肝經鬱怒元氣下

陷濕熱壅滯朝用扁脾湯加柴胡升麻解鬱結

補脾氣升元氣夕用加味逍遙散清肝火生肺

血除濕熱各數劑諸症悉愈又用四君芎歸丹



皮調補肝脾而經水如期

菖蒲散 治月水澁滯陰戶腫痛

菖蒲 當歸炒各一兩 秦艽二兩

右每服五錢入葱白水煎服

白礬散 治陰腫堅痛

白礬五錢 甘草五分 大黃一兩

石為末水調如棗大綿裹內陰中一日兩換以愈為度

陰痒

良方曰陰痒為三虫在腸胃之間因臟虛而餘輕則陰中痒甚則陰中痛也

生生子曰前症亦有虛者古人有用人參一兩煎湯服之而愈予曾治一宦婦年廿一疹出未彌月而犯房事熱目下陷陰中痒甚每一發神魂颯然而手抓壁口中咬物鮮血淋漓尿脫肉破而不遑顧七日肌肉如削諸洗挿方歷試無功作虫治尤劇欲懸深求死予為籌之乃虛熱陷入至陰當從引引以黃芪六錢甘草二錢防

風一錢柴胡二錢水煎食前服之其疾頓止此引金伐木之法也

薛氏曰前症屬肝經所化常用龍胆瀉肝湯逍遙散以主其內外以菴仁研膏和雄黃末或鷄肝內陰中以制其重

一婦胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中悶痒小便赤澀此鬱怒傷肝脾所致用婦脾湯加山梔而愈復日怒患處并小腹脹痛用小柴胡加芎歸山梔芍藥痛止用山梔入逍遙散

而痊又因勞役患處腫脹小便仍澀用補中益氣加山梔茯苓丹皮而瘳

一方 新菴葉搗綿裹內陰中一日三易

大黃散 治陰痒

大黃

炒微

黃芩

黃芪

炙各五兩

赤芍

玄參

蛇床子

山茱萸

為末酒調服二錢

又方 杏仁燒灰乘熱綿裹納陰中日二易之

又詩曰 玉戶生瘡時痛痒皆回房色損其元黃
葱水洗二三次杏仁燒灰油調痊加麝香尤妙

又方 鯽魚胆搽之妙

陰挺下脫

良方曰婦人陰挺下脫或曰絕絡傷損或曰子臟虛冷或因分娩用力所致

薛氏曰前症當升補元氣為主若肝脾鬱結氣虛下陷用補中益氣湯若肝火濕熱小便瀉滯龍胆瀉肝湯

一婦陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清脾火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生猪脂和藜芦末塗之而收

一婦陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澀滯夕與龍胆瀉肝湯分利濕熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾湯加山梔茯苓川芎黃柏間服調理而愈後因勞役或怒氣下部濕痒小水不利仍用前藥即愈



一方 治陰挺下脫

當歸

黃芩

牡蠣

各二兩

蝟皮

一兩

赤芍

半兩

右為末每以二錢食前溫

酒調下米飲亦可

治陰挺長出玉戶數寸者疼痛不可忍飲食不進

用前方治其內仍以 大黃 山茨姑 石羔

牡蠣 乳香 為細末水調揣熟捏作条子如

中指大陰乾插入玉戶其痛即止

陰瘡

薛氏曰此症乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下流其

外症陰中突出如蛇如菌如鷄冠或生虫濕痒

或潰爛出水或腫悶墜痛其內症体倦內熱經

候不調或飲食無味晡熱發熱或胸脇不利小

便痞脹或赤白帶下小水淋漓其治法腫痛者

四物加柴胡丹皮山梔胆草濕痒者歸脾湯加

柴胡山梔丹皮淋瀝者龍胆瀉肝湯加白木丹

皮潰腐者逍遙散山梔川芎腫悶墜痛者補中

益氣湯加山梔丹皮佐以外治之法

一婦素性急陰內痛小便赤瀉怒而益甚或發熱



或寒熱此肝經濕熱所致用芎歸炒梔柴胡苓
朮丹皮澤瀉炒芍車前炒連甘草數劑漸愈乃
去黃連澤瀉又數劑全愈

婦臍腹上下并玉戶遍生濕瘡狀如馬尻瘡他
處並無熱痒而痛大小便瀉出黃汁食減身面
微腫衆作惡瘡治反刺愈痛急令洗去乃用馬
齒莧四兩青黛一兩同搗爛敷瘡上即時痒止
痛定而熱亦退仍服八政散日三服分散客熱
每敷藥僅得一時久藥已乾燥再塗新濕藥又

安凡如此二日僅減三之一五日減三之二自
此二十日全安 緣此婦嗜酒貪啗魚蟹發風
之物而中下焦蓄風熱之毒氣當作腸癰內痔
等疾后當禁酒及發毒之物

一方 治玉戶生瘡 杏仁燒存性 雄黃 明凡各五錢

麝香一分 右為末敷之

又方 飛丹研極細生桐油調搽二三日効

交接輒血出痛

薛氏曰一婦每交接便血出作痛此肝火動脾而



不能攝血用補中益氣濟生歸脾二湯而愈若
出血過多而見他症但用前藥調補肝脾

千金方 療交接血出 伏龍肝 桂心分

為未每服一錢酒調下

胎前惡阻及痰逆不食

惡阻者謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也脉息和
順但資肢體沉重頭目昏眩好食醎酸甚者或
作寒熱心中憤悶嘔吐痰水不能支持古謂之
子病由胃氣怯弱中腕停痰之所致也

薛氏曰脾胃虛弱嘔吐不食用茯苓半夏湯蓋半
夏乃健脾化痰滯之主藥也痰涎壅滯飲食少
思胎氣不安為必用之藥須倍加白朮然半夏
白朮陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃也予嘗用
之驗甚若兼氣惱更加柴胡因風寒須用參蘇
生生子曰前症亦有因火者故丹溪用抑青丸前
人亦有用濟生竹茹湯者予歷々見為火症者
多寒者間而有之亦有愈治而愈逆者便當勿
藥待之俟胃氣和當自瘳矣



茯苓半夏湯 妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐止不

半夏泡炒 陳皮各一錢 白茯苓二錢 砂仁炒一錢

炙甘草五分 姜朶烏梅水煎服二帖后用茯苓丸

茯苓丸 妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓 人參 桂心 炮姜 半夏泡炒

橘紅各一兩 白木炒 葛根 甘草炙 枳壳炒各二兩

右蜜丸梧子大每服五十九丸米飲下日三服

白朮湯 胃虛惡阻吐水甚至十餘日粥湯不入

白朮炒一錢 人參五分 丁香 炙甘草各二分

右姜水煎服

保生湯 妊娠惡阻少食嘔吐或薰吐嘔作渴

人參一錢 炙甘草 白朮炒 香附 烏梅

橘紅各五分 右姜水煎服

仲景乾姜人參半夏丸 治妊娠嘔吐不止

乾姜 人參 半夏炒 為末姜汁糊丸梧子

大米飲下十日三服

歸原散 惡阻嘔吐不止頭痛全不入食諸藥無効

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥 丁香各五分





茯苓 白木

陳皮各一兩半 桔梗

枳壳各二兩半

半夏泡炒黃

右每服五錢加姜六片束一枚

水煎服已上五方治寒痰惡阻之劑也

竹茹湯

惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘紅各二兩

生姜

茯苓各四兩

半夏五兩

右水六升煮取

二升半分三服

人參橘皮湯

惡阻嘔吐痰水

人參

橘皮

白木

麥冬各一兩

甘草三錢

厚朴制

白茯苓各五錢

右每服五錢加青竹茹一錢生姜三片水煎服

妊娠嘔吐痰水不食

生芎根

橘紅七錢

生姜一兩

檳榔三錢

右作三次水煎服

妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

竹茹

麥冬各二兩

前胡二兩

橘紅一兩

芎根一握

水一大升煮半

升作二次食前服

已上四方治熱痰惡阻痰惡阻之劑也

羅太無半夏茯苓湯

惡阻心中憤悶頭目眩暈

四肢怠倦百節煩痛胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞

食氣好噉酸醎多卧少起全不進食先服此湯

次服前茯苓丸

半夏泡炒黃一兩二錢

赤茯苓

熟地黄

各七錢半

芍藥

旋覆花

千金方無此而有細辛紫菀

橘紅

人參各半兩

川芎

桔梗

甘草各五錢

右每服五錢姜七片水煎空心服○若有客

熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半

若腹冷下利去地黄加炒桂心五錢○若胃中

虛熱大便秘小便赤濇加大黃七錢半去地黄

加黃芩二錢半

胎動不安

妊娠胎動或飲食起居不節或衝任經虛或因過

酒房室擊觸跌撲損動臟腑或脾氣虛弱誤服藥餌或感冒風寒當各推其因而施治之有因母病而胎動者但治其母而胎自安有胎不堅固動及母疾但安其胎而母自愈面赤舌青其胎已死面青舌赤吐沫其母必死唇口色青兩邊沫出子母俱死也

薛氏曰前証胎氣鬱滯者紫蘇飲脾氣虛弱者六君子湯加紫蘇枳殼鬱結傷脾者歸脾湯加柴梔鬱怒傷肝脾者四七湯加芎歸怒動肝火者



加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加朴硝腐化之

丹溪曰產前當清熱養血因火動胎逆上喘急者以条芩香附之類為末調下墮胎乃氣虛血虛血熱所致懷妊嗜物乃一臟之虛黃芩安胎妙藥乃上中二焦之劑能降火下行加白朮為安胎聖藥也俗不知以為寒而不取用殊不知產前宜清熱令血循經而不妄行故能養胎又曰將臨月胎熱以三補丸加炒香附白芍飴餅

為丸服抑熱以三補丸以地黃膏為丸○孕至八九個月必用順氣須枳殼紫蘇梗

固胎方法 川芎 地黃 黃芩

人參 白芍 陳皮 白朮 甘草

黃栢 黃連 桑寄生 右每服五六錢

加糯米五十粒水煎服 血虛不安者加阿膠 腹痛者加砂仁能止痛安胎行氣故也

連名固孕丸

仲景云妊娠宜常服當歸散 當歸 黃芩



芍藥

芍藥各一兩

白朮半斤

右為末酒調服方

寸七日二服常服之即易產胎無苦疾產後百

病悉主之

肘後方

治胎動不安

取芎根如足大指者一

尺水煎服

一方有生薑五片○丹溪云芎根大能補陰血而行滯血

立効散

治胎動不安如重物所墜冷如冰即佛手散也

縮砂散

治胎動不安墮在須臾痛不可忍神効

砂仁

連壳炒黑為末

每服二錢酒下

釣藤湯

妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者

釣藤鈎

當歸

茯神去木

人參各一錢

苦梗半錢

桑寄生

錢一

右水煎服煩熱者加石膏

黃芪湯

氣虛胎動腹痛下水

糯米合炙黃芪

川芎

各一兩

水煎分三服

順氣飲子

產前服之安胎

紫蘇葉

木香煨

人參

草薹薺

茯苓各一兩

炙甘草

錢五

大腹子

一兩氣虛者去之


右每服三五錢加芎根三

寸糯米三十粒水煎服

安胎寄生湯

妊娠下血或胎不安或腰腹痛





桑寄生

白木

各五分

茯苓

四分

甘草

錢一

水煎服

安胎飲

躄倦惡食或胎動腹痛或下血發熱腰痛

炙甘草

茯苓

川芎

熟地

川芎

白木

黃芪

白芍

炒

夏泡

阿膠

炒

地榆

各五分

加姜棗水煎服

又方

好銀煮取水入葱白作羹食之妙

生生子曰按良方云妊娠婦人倘氣血虛弱無以

滋養其胎終不能成也宜下之以免其禍若胃

氣壯實衝任榮和如魚之處淵得其所也宜必

盡方技以補養之庶無所悞設因病而胎不能

安者不得不下之藥劑亦須謹慎

桂心散

妊娠回病而胎不能安者以此下之

桂心

瓜蒌

牛膝

藟麥

各五分

歸尾

錢一

右水煎服

又方

牛膝

兩

酒煎食前空心服下

又方

生鷄子一枚鹽三錢攪勻服之立下

佛手散更妙

凡胎死者即下生者即安


胎漏下血

附卒然下血下如莖汁

良方曰妊娠經水時下由衝任氣虛不能約制蓋
心小腸二經相為表裏上為乳汁下為月水故
妊娠經水壅以養胎蓄之以為乳若經水時下
名曰胞漏血盡則斃矣
丹溪曰胎漏有因氣虛者有因血虛者有因血熱
者不可不察也

薛氏曰前症有風熱者以防風黃芩丸若因血熱
加味逍遙散血虛二黃散血去太多八珍湯未
應補中益氣湯若因肝火用柴胡山梔散脾虛
加味歸脾湯若因事下血作痛八珍湯加阿膠
熟艾脾胃虛者補中益氣湯加五味子下陷者
倍升麻柴胡哺熱內熱用逍遙散亦有血氣盛
養胎之外而有餘者不必服藥

卒然下血良方謂冷熱不調七情失宜氣血不和
所致若傷於胎則痛血去多則墮矣 薛氏云
前症氣怒者小柴胡湯風熱用一味防風丸血
熱用一味子芩丸脾氣虛六君子湯中氣下陷
補中益氣湯



一婦妊娠六月每怒下血甚至寒熱頭痛脇脹腹痛作嘔少食予謂寒熱頭痛乃肝火上冲脇脹腹痛乃肝氣不行作嘔食少乃肝侮脾胃下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓白朮而愈 訶子能止胎漏及胎動欲生脹悶

治卒然腰痛下血

熟地 艾葉 白芍 川芎 黃芪 川歸
阿膠 甘草 地榆 加姜枣水煎服

子芩丸 治肝經有熱妄行用細条芩沉實者炒為末每服一錢以鉄秤鎚燒赤淬酒熱調服若脾胃虛者不宜用

防風丸 治肝經有風血目妄動而不歸經

防風為末每服一錢白湯調下

防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便血尿血

用条芩炒焦防風等分為末酒糊丸梧子大每服三五十九食前米飲或酒下

二黃散 治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈



煩躁作渴或脇肋脹痛等症

生地 熟地 為末每用三錢煎白朮枳壳湯

調服

二黃并膏為丸尤妙
庶不枯稿而有功也

芎歸膠艾湯 妊娠下血腹中痛為胞阻以此安

艾葉 阿膠炒 川芎 當歸各三兩 甘草一兩

右細切以水八升煎取三升內膠溶盡分三服

立聖散 治妊娠下血不止

鷄肝三枚用酒一升煮熟頓食之大効

阿膠散 妊娠無故下血不止

阿膠三兩炒為末酒一升半煎令溶一服愈

又方 治血熱下血及胎漏下血不止

阿膠二兩為末 生地黃半斤搗取汁以清酒

三升絞汁分三服


又方 治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

生地黃汁一升 陳酒五合 全煎三五沸溫三服以止為度

枳壳湯 治虛熱胎漏下血或因事下血

枳壳 黃芩各半兩 白朮一兩 水煎食前分三服

本事方 治胎下血不止



菝奴

菝樹上乾不
落菝子是也

燒存性為末水調服妙

妊娠胎漏下黃汁或如荳汁白漿或如赤荳汁予

歷見此症不早治其胎必墮

大千方 治妊娠忽然下黃汁如膠或如荳汁胎

動腹痛乃氣虛也

糯米

五升

黃芪

六兩

水七升煎取二升分四服

薛氏云若肝脾濕熱用升陽除濕湯肝脾風熱加

味逍遙散肝脾鬱怒加味婦脾湯脾胃氣虛用

錢氏白朮散若脾氣下陷補中益氣湯風入腸

胃用胃風湯

東垣升陽除濕湯 治婦人女子漏下惡血月事

不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食

失節或勞傷形骸或素患心氣不足目飲食

勞倦致令心火乘脾其脈緩而弦急按之洪

大皆脾土受邪也

柴胡

羌活

蒼朮

黃耆

炒各半

防風

升麻

甘草

炙

藜蘆

本

錢各

蔓荊子

七

獨活

當歸

右水煎食前服



胃風湯

治風邪乘虛客於腸胃水谷不化泄瀉

下注腹脹虛滿腸鳴作痛及腸胃虛熱下如
莖汁或瘀血日夜無度

人參 白朮 茯苓 川芎 川歸 白芍

桂皮 粟米 右水煎食遠服

銀芎酒

治妊娠下黃汁或如赤莖汁

芎根去黑皮 好銀各一斤 水九升煮取四升每服入

酒半升煎分二服

脈經曰婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必

倚而墮此非時孤漿預下也胎滿下水乃徐徐而下今暴下而多

故知胎墮

胎上逼子懸也

妊娠將養如法則血氣調和胎得其所而產亦易
否則胎動氣逆上逼臨產亦難甚至危矣

陳良甫云治一婦人有孕七個月遠歸忽然胎上
冲心而痛坐卧不安兩醫治之無効遂說胎已
死矣用草麻子研爛加射香貼臍中以下之命
在垂亡名陳胗視兩尺脉絕他脉平和陳問二



醫作何症治答曰死胎也陳曰何以知之曰兩尺脉絕是以知之陳曰否此子懸也若是胎死却有辯處面赤舌青子死母活面青舌赤吐沫母死子活唇口俱青母子俱死今面不赤舌青其子未死是胎上逼心宜以紫蘇飲治之至十服其胎遂不逼而下安矣

紫蘇飲

治妊娠胎氣不和逼上脹滿疼痛

謂之子懸

兼治臨產驚恐氣結連日不下

紫蘇葉

一兩

大腹皮

人參

川芎

陳皮

白芍

各五錢

當歸

三錢

甘草

一錢

右判分三服

每服加姜四片葱白七寸水煎至七分空心

服○曾有累日產不下遍服催生藥不効此

必坐草少早心存一點畏惧氣結而不行非

不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯

則上焦閉則氣還則下焦脹氣乃不行

得此藥一服便產及治妊娠六七月子懸每

用此數有驗不十服胎便近下而安

大全方 治胎上逼煩悶併治胎動困篤



葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死則安已死

即下如未効再服○若唇口青黑手足厥冷

須佐以當歸湯

○本草云葱白通陽氣安胎此方神妙脉浮滑者宜之

當歸湯

治胎動煩躁或生理不順唇口青黑手

足厥冷

人參

當歸

阿膠

炙甘草

各一錢

葱根

連白握

右水四碗煎四味減半去渣入葱

再煎至一碗分二服

薛氏云一妊婦每回恚怒其胎上逼左關脉絃洪

乃肝火內動用小柴胡加茯苓枳壳山梔而愈

但躰倦不食用六君子調養脾土加柴胡枳壳

調和肝氣乃瘥

又一妊婦胎上逼胸滿噯氣飲食少思此脾氣鬱

滯用紫蘇飲頓安又用四君子加枳壳柴胡山

梔而瘥

大聖散 治妊娠怯悸夢驚心腹脹滿理臍急痛

白茯苓

川芎

麥冬

黃芪

川歸

各一錢

人參

炙甘草

木香

各五分

加生姜水煎服

白朮湯

妊娠遍身痛或冲心欲死不能飲食



白朮

兩五

黃芩

兩二

芍藥

兩四

右水六升煮取

二升半分三服。緣胎有水致痛兼易產

妊娠心痛腹痛

妊娠心腹痛或宿有冷疾或新觸風寒或痰飲相搏若痛傷胞絡必至動胎甚則傷墮

妊娠卒心痛氣欲絕

川芎

當歸

茯苓

厚朴

制各一錢

水煎服

當歸芍藥湯

妊娠心腹急痛或去血過多而眩

暈

白芍

當歸

茯苓

白朮

炒

澤瀉

各一錢

川芎

二錢

右水煎服

阿膠散

治胎痛腹痛

白茯苓

白朮

炒

川芎

阿膠

炒各一錢

當歸

陳皮

各二錢

甘草

炒三分

右姜朮水煎服

熟艾湯

治妊娠心腹痛或吐血衄血

熟艾如拳大水煮服之効。中惡亦妙

有癥者宜去癥

凡胎動多在當臍今動在臍上故知是癥也

此症宜以

仲景桂枝茯苓丸主之

桂枝茯苓丸

妊娠腹痛不能忍或偶有所傷胎



動不安命將絕者砂仁不以多少連皮炒黑色或單用仁炒為末熱酒調下二錢不飲酒者未飲下但覺腹中熱胎已安矣懸命須臾者以砂仁湯吞桂枝茯苓丸又名奪命丸專治婦人小產下血子死腹中其婦增寒手指唇口爪甲青白面色黃黑胎上搶心悶絕欲死冷汗自出或食物或誤食草藥傷動胎氣下血不止胎或未損者服此即安胎已死者服此即下腐爛者亦能取下此方原係異傳

丹溪亦稱其神此即仲景桂枝茯苓丸但用

淡醋湯嚼下耳 桂枝 茯苓 牡丹皮

菝仁去皮尖 赤芍藥 右各等分蜜丸彈子大

淡醋湯嚼下一丸不知漸加至三丸

妊娠腰痛

腎主腰胎繫于腰痛甚者或因勞役傷損則胎墮也

薛氏曰若外邪所傷用獨活寄生湯勞傷元氣八珍湯杜仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥加白朮



補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳壳肝火
所動以小柴胡湯加白朮枳壳山梔肝脾鬱結
用歸脾湯加柴胡枳壳

一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致
用拔萃羌活湯一劑而愈又用獨活寄生湯及
八珍湯以祛邪固本而痊

通氣散 腎虛腰痛神効 破故布炒為末空心

每服二錢嚼胡菘肉半個以溫酒下

杜仲丸 治妊娠腰背痛 杜仲炒 川續斷酒浸

各等分為末煮枣肉為丸梧子大每服七十
丸酒或米飲下

膠艾湯 治腰腹疼痛胎動欲落即前妊娠下血

安胎飲是也 熟地 艾葉 白芍 川芎

黃芪 阿膠 川歸 甘草炒 各等分加

姜棗水煎服

獨活寄生湯 治足三陰虛風濕所侵腰膝歷節

獨活 桑寄生 續斷酒炒 杜仲姜汁炒 細辛

秦艽 牛膝酒炒 茯苓 白芍炒 桂心



川芎

防風

人參

熟地

川歸

粉草

各五分

右水煎服

一婦苦腰痛數年不愈用白朮一味大劑服不三月而痊乃胃氣虛閉之症白朮能利腰膈之血故安胎而治痛也

按萃羌活勝濕湯

治頭疼脊痛腰似折項似拔

羌活

獨活

各一錢

藜蘆

防風

炙甘草

各五分

川芎

蔓荊子

各二分

右水煎服如身重腰

沉之然是濕熱也加黃柏一錢附子五分

蒼朮二錢

妊娠小腹痛

薛氏曰一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍胆瀉肝湯一劑諸症頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

龍胆瀉肝湯

治肝經濕熱兩拘腫痛或小腹痛

脇痛小便澀滯等症

龍胆草

酒拌

澤瀉

各一錢



木通 生地 川歸 車前子炒 山梔炒

黃芩炒 甘草各五分 水煎服

阿膠散張氏名 不問妊娠月數深淺或顛仆或回

毒藥胎動不安腰疼腹痛捨心短氣

熟地 艾葉 白芍 川芎 黃芪 阿膠

川歸 甘草各兩 右剉每服五錢入姜枣水

煎服 金櫃方無黃芪

妊娠心腹脹滿

薛氏曰若外感風寒內傷欲食用藿香正氣散若

食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇飲
一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加
山查青皮枳壳其脹益甚其胎上攻惡心不食
右関脉浮大按之則絃此脾土不足肝木所侮
用六君子加升麻柴胡而愈後小腹痞悶用補
中益氣湯升舉脾氣乃瘥

妊娠數墮胎

夫胎乃陽施陰化榮衛調和經水完全十月而產
若血氣虛損不能養胎所以數墮也凡妊婦腰



痛多致墮胎

薛氏曰丹溪云陽施陰化胎孕乃成血氣虛乏不能榮養其胎則墜譬如枝枯則果落藤痿則花墜嘗治賈氏婦每有姪至三月前後必墜診其脉左右大而無力重則瀦知其血虛也補其中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯下黃芩末二錢與數十帖得保而生因而思之墮於內熱而虛者於理為多曰熱曰虛蓋姪至三月上屬相火所以易墜不然何以黃芩熟艾阿膠

等為安胎之妙如此也大抵治法須審某月屬某經育養而藥之

生生子曰胎猶瓜也瓜生於藤、肥而瓜壯未熟而凋者由藤稿而風搖也胎藏母腹繫于命門命門者督脉之所循也又衝任二脉為血之海姪婦而經不行者血蓄以養胎也足月而生者猶瓜熟而蒂落也苟內無所傷外無所感何墮之有衝任督三脉一宗衝脉由氣街而行足少陰任脉起於胞門子戶由會陰而行腹督脉繫




廷孔由會陰而行背歷長強循腰膂命門而上
巔驗今之墮胎者苟非衝任之不足必由色慾
之縱恣淫火一動則搖撼其督脉胞門亦由之
而不閉胎斯墮也胎墮必腰痛者腰膂命門皆
督脉之所歷胎又繫于命門故也現牝獸之護
胎則可推其所慎矣牝牡交合有節懷胎之後
牡獸近身則蹄而遠之是以交而必孕；而必
育者由交合之有節也懷妊而不遠慾即幸不
墮生子亦必脆弱多疾痘疹亦多險逆皆淫火

煅煉所致規丹溪曰虛曰熱抑豈無其所自乎
予故揭而告諸保孕者當知其所慎重至于藥
劑則虛熱二字為之本矣是以八珍阿膠杜仲
黃芪黃柏黃芩桑寄生香附為安胎之妙者得
非治其本歟

凡保胎當理脾胃脾胃為倉廩五臟六府之所稟
受胚胎由之以滋養也胃屬陽明陽明者衝任
之長也

一方 鯉魚二斤者一尾粳米一升用鹽醬和煮



食之甚善一月食三次為佳

芎藭補中湯 懷妊血氣不能榮養以致半產早

能服此預先補之不致于墮

乾姜煨 阿膠炒 芎藭 五味子各五分 黃芪炒

川芎 白朮炒 杜仲炒 白芍藥各一錢 人參

木香 甘草各五分 右水煎服虛寒所宜

千金保孕湯 氣血不足每至三四月而墮當預服之

人參 黃芪 白朮 川芎 甘草 黃芩

杜仲 桑寄生 川續斷 白芍藥 砂仁

加粳米五十粒水煎食遠服○若氣痞悶不

舒加厚朴蘇梗○若腹疼加熟艾葉香附○

見血下加升麻地榆椿根白皮阿膠

醋附丸 治數墮胎者此藥甚妙 亦治崩漏帶

下積聚癥瘕臍腹疔痛

香附子擦去毛淨 用好醋煮透焙乾為末仍以醋打

糊為丸梧子大每服三五丸米飲下

脉經曰婦人懷胎一月之時足厥陰脉養之二月

足少陽養三月手心主脉養四月手少陽脉養



五月足太陰脉養六月足陽明脉養七月手太
陰脉養八月手陽明脉養九月足少陰脉養十
月足太陽脉養諸陰陽脉各養三十日手少陰
太陽不養者上為乳汁下主月水也值養胎之
經者不可針灸犯之必墮胎

胎不長

良方曰妊娠而胎不長者因有宿疾或因失調以
致臟腑虧損氣血虛弱而胎不長也當治其疾
痰益其氣血則胎自長矣

生生子曰曾見一宦婦每妊至五六月則墮如此
者三次胎甚瘦小詢知少時患哮喘因而背駝
軀亦矮小因腹中不舒其胎不能長后治其哮
嗽再孕乃不墮竟足月而產一子此固偶然則
良方宿疾之說似不誣矣

薛氏曰一婦胎六月躄倦懶食面黃晡熱而胎不
長因勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參
朮茯苓三十餘劑脾胃漸健胎安而長矣
生生子曰昔在西吳有張氏婦年二十三孕遠三



月迎子胗之其脉兩尺皆瀯左手短弱右關不
充據脉瀯不當有姪而其夫云向已變胎者二
俱彌月而產躰皆不完始無舌次無水火門戶
產下隨死而無生氣今第三孕矣心憂之以翁
治法多竒思幸投劑而保全之也予以脉叅之
多為神志不足因處一方曰壯神益志保孕湯
即語之曰是方每月可服十帖過八月則不必
服矣彼欣然從而服之足月產一女形全而氣
壯及再有姪未服藥雖生一女完矣而頭面為

白膜遮蔽隱：僅見耳目口鼻而亦隨死也後
又孕適子婦省其婦心憂失措夫諭之曰無恐
前保孕方在向以未服乃致乖舛今可亟服也
照方服如前至期生一子而無恙舉家以此方
為神錄而置之香火堂中尸祝之此亦愚見之
偶中者人以旋服旋効而遂神之也亦其家為
富而甚不仁丘里啣之當其產而偵之其產而
怪以為作惡之報迨產子而無恙即以鄙為保
孕之神至今傳頌不衰也予因記其事并戒夫



人之為惡者

壯神益志保孕湯 茯神 當歸 酸枣仁

人參 遠志 山藥 黃芪 鹿角膠 各一錢

白朮 二錢 砂仁 三分 甘草 四分 加負眼肉五枚束二

枚水煎服

黃芪湯 治妊娠不長更安胎和氣 黃芪 炒

白朮 炒 陳皮 麥冬 白茯苓 前胡

人參 各五分 川芎 甘草 炒三分 右姜枣水煎服

集驗方 用鯉魚長尺許者如食法整理飲其汁

則胎漸大而長矣然亦須每月服數次為妙

墮胎後血下不止

墮胎後復損經脈而下血不止甚則煩悶致死皆

以調補胃氣為主

薛氏曰一姪婦墮胎昏憤不時吐痰自用養血化

痰之劑昏憤不省自汗發搐痰涎湧出彼以為

中風欲用祛風化痰予曰此屬脾氣虛寒所致

遂用十全大補湯加炮姜二十餘劑尋愈

墮胎下血煩滿寒熱狂悶鎊鹿角屑為末每服三



錢水調下日三服

墮胎下血腹痛

阿膠

兩

艾葉

五錢

水煎服

補中益氣湯

加鹿角膠一錢臨服入童便半酒杯立止

杯立止

人參黃芪湯

治小產氣虛血下不止

人參

黃芪

炒

當歸

白木

炒

白芍

艾葉

各一錢

阿膠

二錢

水煎服

未足月欲產

妊娠未足月而痛欲產者知母丸佳氣血不足者

芎歸補中湯倍加知母或八珍湯內加之

血熱兩宜

薛氏曰一妊娠八月胎欲墜如產卧久少安日晡

益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半

夏隨愈更以八珍湯調理而安

芎歸補中湯

治氣血虛而欲產

艾葉

代

阿膠

炒

川芎

五味子

炒

川歸

白木

炒

黃芪

炒

人參

芍藥

炒

各一錢

甘草

炙

五分


杜仲

一錢

水煎作二次服

知母丸

十月未足而痛如產兼治產難及子煩



知母為末蜜丸梧子大米飲下三十九或酒下
又方 月數未足而似欲產腹痛

槐子 蒲黃 等分為末蜜丸梧子大酒吞三
十九痛止為度 蒲黃味一以井水調服亦焦

千金方 治月未足而欲產

本草云菖蒲治胎動不安下血

過期不產

妊娠月足而過期不產者當補血行滯羅先生以
四物湯加香附菴仁枳壳縮砂紫蘇水煎服之

數帖即生

妊娠咳嗽

夫肺內主氣外主皮毛腠理不容寒邪乘之則咳
嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則
心受之其嗽不已則傳于臟府妊娠病久不已
則傷胎也

薛氏曰若秋間風邪傷肺用金沸草散夏火邪尅
金用人參平肺散冬寒邪傷肺用人參敗毒散
春風邪傷肺用參蘇飲若脾肺氣虛用六君子



芎歸桔梗若血虛桑皮杏仁桔梗腎火上炎用
六味丸加五味子煎服脾胃氣虛風寒所傷補
中益氣湯加桑皮杏仁桔梗

又治一妊婦氣喘痰甚諸藥不效素有帶下始于
目下有浮氣兩月其面亦然此氣虛而有痰飲
也用六味丸料數劑而愈

一妊婦嗽則小便出此肺氣不足腎氣虧損不能
司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五味
以生腎氣而安

一妊婦咳嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予
以為此水泛為痰用六味丸料及四君子湯各
一劑稍愈數帖而安

一妊婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金
以小柴胡湯加山梔枳殼白朮茯苓治之而愈
但欲作嘔此肝侮脾也六君子加柴胡升麻

桔梗散 治風寒咳嗽喘急不食 天冬

去心

赤茯苓 各錢 桑皮 桔梗 炒 紫蘇 貝母

人參 各分 麻黃 去節 炙甘草 各分 右加姜水煎服



馬兜鈴散

治咳嗽氣喘

馬兜鈴

苦梗

人參

甘草

貝母

紫蘇

橘紅

大腹皮

桑皮

五味子

川百合

紫苑

百合散

咳嗽胸膈煩悶

川百合

紫苑

麥冬

苦梗

桑皮

甘草

竹茹

加姜水煎服

妊娠傷寒涎多咳嗽

知母

杏仁

天冬

桑皮

姜水煎服

加味參蘇飲

治項背拘急鼻塞頭眩時發寒熱

咳嗽

即參蘇飲加五味子杏仁是也

妊娠吐血衄血

妊娠吐血衄血由七情臟腑所傷氣逆于上致血

上溢不止心悶甚者多死或墮胎也宜用局方


必勝散


薛氏曰若肝經怒火先用小柴胡山梔生地次用

前藥合四物後用加味逍遙散若肝經風熱防

風子芩丸心經有熱硃砂安神丸心氣不足茯

苓補心湯思慮傷心妙香散胃經有火犀角地





黃湯膏梁積熱加味清胃散肺經有火黃芩清

肺飲因氣鬱滯紫蘇飲子氣不攝血用補中益

氣湯腎經虛火六味地黃丸

紫蘇飲 治妊娠失調胎氣不安上攻作痛或氣

逆失血 方在胎上通卷中

一妊婦因怒失血兩脇脹痛小便淋瀝此怒而血

蓄于上隨火出也用小柴胡合四物四帖血止

用六君子安胎飲調理全安

必勝散 治男子婦人血妄流溢或吐衄血並

小薊連枝 人參 蒲黃炒 熟地 川歸

川芎 烏梅去核各 水煎服

黃芩清肺飲 治妊娠肺熱吐衄及治肺熱小便

不利 黃芩炒 山梔炒各 薑豉二十 水煎服

加味清胃散 治醇酒厚味唇齒作痛或齒齬潰

爛并頭面頰項疼痛及妊娠吐衄 川歸

黃連炒 生地 丹皮各一 犀角 連翹一分

升麻錢二分 甘草分五 右水煎服 便秘加大黃

子煩

良方曰妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火以養精六月受少陽相火以養氣若母心驚胆寒多有是症產寶云是心肺虛熱或痰積于胸若三月而煩者吐涎惡食大凡停痰積飲寒熱相搏吐甚則胎動不安
薛氏曰內熱子煩用竹葉湯氣滯用紫蘇飲痰滯用二陳加白朮黃芩枳殼氣鬱用分氣飲加川芎脾胃虛弱用六君子加紫蘇山梔
竹葉湯 妊娠心驚胆怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓

錢二

防風

黃芩

麥冬

各一錢

竹葉

十片

水煎服

一方有知母

人參散

熱乘心脾煩熱乾渴

人參

麥冬

赤茯苓

地骨皮

黃芩

乾葛

甘草

犀角

錢各一

水煎服

竹茹湯

妊娠煩躁或胎不安

淡竹茹一兩水煎服之

知母丸

知母一味炒為末棗肉丸如彈子大每服一九人參湯下



分氣飲 脾胃虛弱氣血不和胸膈不利或痰氣

喘嗽飲食少思 陳皮 茯苓 半夏 桔梗

大腹皮 蘇葉 白朮炒 枳壳炒 山梔炒 各一錢

甘草炙 五分 右加姜枣水煎服

治子煩口乾不得卧用黃連為末每服一錢米飲

調下

赤水玄珠婦人門第二十二卷目錄

妊娠煩躁口乾 風痙子癇

妊娠癭瘕 姙鬼胎

妊娠不語 傷寒熱病防損胎

妊娠傷寒 姙娠時氣

過時熱病 熱病胎死腹中

姙娠瘡疾 姙娠泄瀉

下痢黃水 大小便不通

小便不通名曰轉脬 子淋



分氣飲 脾胃虛弱氣血不和胸膈不利或痰氣

喘嗽飲食少思 陳皮 茯苓 半夏 桔梗

大腹皮 蘇葉 白朮炒 枳壳炒 山梔炒 各一錢

甘草炙 五分 右加姜枣水煎服

治子煩口乾不得卧用黃連為末每服一錢米飲

調下

赤水玄珠婦人門第二十二卷目錄

妊娠煩躁口乾 風痙子癇

妊娠瘕瘕 姙鬼胎

妊娠不語 傷寒熱病防損胎

妊娠傷寒 姙娠時氣

過時熱病 熱病胎死腹中

姙娠瘡疾 姙娠泄瀉

下痢黃水 大小便不通

小便不通名曰轉脬 子淋



妊娠遺尿

妊娠尿血

胎水腫滿

腹內鐘鳴

孕癰

臍躁悲傷

滑胎方法

十產論

產難方論

交骨不開產門不閉

下死胎方

產難生死脉訣

胞衣不出

產後血暈

產後顛狂

狂言譫語

產後不語

赤水玄珠婦人門第二十二卷

新安生生子孫一奎著

妊娠煩躁口乾

足太陰脾之經其氣通於口手少陰心之經其氣通於舌若臟腑不調氣血不和以致內熱乘於心脾津液消燥故心煩口乾也與子煩大同小異宜用益母丸

即前一味知母丸是也

一妊婦煩熱咽疼用知母散加山梔清肺而愈后又內熱咳嗽小便自遺用補中益氣加麥門冬



山枝以補肺氣滋腎水而痊

知母散 治煩躁悶亂口乾

知母 麥冬 黃芪炒 子苓炒

赤茯苓錢各一 甘草 水煎入竹瀝一合再煎

一沸服之

人參黃耆散 治身熱煩躁口乾

人參 黃耆炒 葛根 秦艽 赤茯苓

麥冬錢各一 知母 甘草各五分

右姜三片竹葉十四片水煎服

姪娘風癰子癰

姪娘體虛受風而傷足太陽經遇風寒相搏則口
噤背強甚則腰反張名之曰癰瀕更自醒良久
復作又名曰子胃又類子癰

生生子曰風癰乃外邪從足太陽而入有副柔之
分當從仲景法於傷寒門中求治子癰乃痰涎
所致是內臟所生治當分別

薛氏曰若心經風熱用釣藤湯肝脾血虛加味道
遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲



肝火風熱釣藤散脾鬱痰滯二陳姜汁竹瀝若
兼症相雜看所兼重輕分治
一妊婦出汗口噤腰背反張時作時止此怒動肝
火也用加味逍遙散漸愈又用釣藤散而止更
以四君加釣藤山梔柴胡而安
一妊婦因怒忽仆地良久而甦吐痰發搐口噤項
強用羚羊角散漸愈更用釣藤散始痊又用歸
脾湯全安
羚羊角散 治妊婦胃悶角弓反張及子癩子冒

風痙等症

羚羊角

獨活

酸棗仁炒

五加皮

防風

川芎

苳仁炒

川歸洗

杏仁去皮尖

茯神

各五分

炙甘草

木香

各二分

右姜水煎服

釣藤湯

方見胎動不安卷

雲箕子葛根湯

妊婦臨月因發風痙忽悶憤不

識人吐逆眩倒併治子癩

葛根

貝母

丹皮

防風

川歸

川芎

茯苓


桂心

澤瀉

甘草

各一兩

獨活



石羔 人參 各三兩 右以水九升煮取三升分
作三服 ○貝母令人易產未臨月升麻代之此
症多由風寒濕乘虛而感皆從太陽經治
活人獨活防風湯 治太陽有汗名柔痙
桂枝 獨活 防風 各一兩 芍藥 三兩 甘草 兩半
右每服乙兩水煎溫服
防風葛根湯 治太陽無汗名曰剛痙
葛根 四兩 麻黃 三兩 芍藥 二兩 桂枝 一兩
每服一兩先煮麻沸去上沫入餘藥同煎溫服

妊娠瘕瘕

瘕者筋脉急而縮也瘕者筋脉緩而伸也一縮一
伸手足相引搐搦不已大抵與嬰孩發搐相似
此症多屬風、主搖動駱龍吉云心主脉肝主
筋心屬火肝屬木、主風、火相熾則為瘕瘕
也 ○治法若因風熱用釣藤湯加柴胡山梔黃
芩白朮以平肝木降心火養血氣若風痰上壅
加竹瀝南星半夏若風邪急搐加全蝎姜蚕氣
血虧損用八珍湯倍加釣藤山枝若抽搐無力

戴眼反折汗出如珠者肝氣絕也皆不治

薛氏治一姪婦四肢不能伸服祛風燥濕之劑遺屎痰甚四肢抽搐乃肝火血燥用八珍湯倍加炒黑黃芩佐以釣藤湯而安後因怒前症復作小便下血寒熱少寐飲食少思用釣藤散加山枝柴胡而血止續用加味道遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥釣藤飲食進而漸安

釣藤散 治肝厥頭暈

釣藤鈎 陳皮 炒半夏 麥冬 茯苓

茯苓 人參 甘菊 防風 各一錢 炙甘草 三分

石膏 煨二錢 姜三片 水煎服

姪鬼胎

八由臟腑失調血氣不充營衛虛損則精神衰弱而鬼魅之類得以乘之亦如懷姪之狀故名曰鬼胎也

薛氏曰一婦經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應薛診視之曰面青脉濡寒熱往來肝經血病也面黃腹大食少体倦脾經血



病也此鬱怒傷肝脾之症非胎也不信仍用胎劑無功乃與加味歸脾湯逍遙散各二十餘劑諸症稍愈彼欲速効別服通經丸一服下血昏潰自汗惡寒手足俱冷嘔逆不食用人參炮姜二劑漸愈又用十全大補湯五十餘劑而安治此症大抵要看虛實者可攻涉虛者必於補中兼消而佐以雄黃丸之類行而散之

雄黃丸 治鬼胎瘕血腹痛

雄黃 鬼臼 土毛 莽草 丹砂 巴霜

獬肝 各黃各半兩 蝮蟻 一枚炙 蜈蚣 一條炙

右為末蜜丸梧子大每服二丸空心溫酒下日二服或下蛇螫之類

治鬼胎及血氣痛不可忍

斑猫 去頭翅足用糯米炒 延胡索 炒等分

為末溫酒下五分以去穢物為度空心服

斬邪丹 治鬼胎大如抱甕

吳茱萸 川烏 秦艽 柴胡 姜蚕
菟苓 醋炒 巴戟 巴仁 各一兩



為末蜜丸梧子大每服七丸蜜酒下取下惡物

娠娘不語此名曰瘠

黃帝曰人有重身九月而瘠此為何也岐伯對曰胞之脉絡絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

此至人旁理之言患此者當靜以慎之不久驚怖而無投劑十月分娩後當自語也

娠娘傷寒熱病防損胎

良方曰非節之氣何於娠娘熱毒侵損胞胎若不

早治多致墮胎漏血則子母之命亦不能全矣薛氏曰此亦當分六經為主相參而治

娠娘傷寒身痛壯熱

葱白升一 前胡 葛根 石膏各二兩半 青代一兩


升麻兩二 梔子枚十二 水煎分三服

娠娘傷寒大小便閉結

前胡兩二 大黃 石膏各五兩 山梔枚十 知母

黃芩 茯苓 生姜各兩二 水煎分三服

娠娘傷寒發斑忽黑小便如血其胎欲落



山梔

升麻

青代

生地

石膏

葱白

一升

黃芩

水煎

分三服

用井中泥塗心下乾則易

妊娠熱病先宜白朮散以安其胎傷寒亦然

白朮

黃芩

加姜棗水煎服

若四肢厥逆陰症也不可服

妊娠傷寒

生生子曰妊娠傷寒所干甚大治之不早及治不如法多傷胎損母古人以四物加入引經散邪

之劑可選而用之然亦不能尽其變茲錄以補之

阿膠散 治時氣傷寒先服此以安胎却以主藥

相間服

阿膠

炒

白朮

炒

桑寄生

人參

茯苓

右為末每服一錢糯米飲調下日三服

前胡湯

治傷寒頭痛壯熱肢節煩痛

石膏

錢

前胡

甜竹茹

枝子

炒

黃芩

炒

大青

知母

各五分

加葱白

水煎服



蕪木湯 傷寒時行洒淅寒振或蕪噦者

赤芍 橘紅 黃芩炒 黃連炒 甘草 蕪木

各五分水煎服汗出即瘥如胎不安更服阿膠散

黃龍湯 妊娠寒熱頭疼嘔不食胸痛嘔痰及

產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧或經水適來及

勞復熱不解散者

柴胡錢一 黃芩炒 人參 甘草各一錢 水煎服

柴胡后膏湯 頭疼惡寒身熱拘急口乾

柴胡錢一 甘草錢一 石膏錢三 姜水煎服

若氣虛加人參

枳實散 傷寒四五六日腹脹少食腰疼躄重

枳實炒三錢 陳皮錢一 麥冬半錢 姜葱水煎服

旋覆花湯 傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花 赤芍 甘草各五分 前胡 石膏各一錢

麻黃去節 白朮 人參 黃芩各三分 姜水煎

麥門冬湯 傷寒壯熱嘔逆頭疼胎氣不安

人參 石膏各一錢半 前胡 黃芩各五分 葛根

麥冬各一錢 加姜枣竹茹水煎服



梔子大青湯 發斑變黑尿便血

升麻 梔子 大青 杏仁 黃芩 各一錢

加蔥白三寸水煎服

白朮湯 傷寒煩熱頭痛胎動或時吐逆不食

白朮 橘紅 麥冬 人參 前胡 川芎

甘草 半夏 赤茯苓 各五分 姜竹茹水煎服

芍藥散 治外感風寒壯熱頭疼心胸煩悶

紫蘇葉 川芎 白朮 白芍 麥門冬

陳皮 乾葛 各五分 甘草 各三分

右姜葱白水煎服


參蘓飲 治症同上


妊娠時行病

四季之間反常如春寒夏冷秋熱冬煖乃非其時而有其氣者謂時行不正之氣也感之者少長三五相似甚至沿門闔境相類妊娠患之重者多致損胎○亦當與傷寒熱病參治

秦艽散 治時氣五六日不得汗口渴飲水狂言

嘔逆





秦艽 柴胡各五分 石膏 一錢 犀角 赤茯苓

前胡 甘草 葛根 升麻 黃芩各四分

加淡竹茹水煎服

葛根飲子 時氣煩熱口乾頭疼

乾葛 麻黃去根節 各半兩 石膏 一兩 豆豉 一合

白米半升 枝子十四粒 葱白 二莖

水煎分三服汗出為効

消熱飲子 治時氣六七日大小便不利

芒硝一兩 細研 葵子二兩 水煎分三次以利為効

人參敗毒散 治四時傷風頭痛發熱咳嗽

此方即倉廩湯減陳倉米是也

過時熱病

冬時觸冒嚴寒即病曰傷寒不即病而毒藏於肌骨之間至春發為溫病至夏發為熱病也姪娘患之多致墮胎熱病與暑病相似但熱病脉實暑病脉虛治當審察

治姪娘熱病頭痛嘔吐煩悶

人參一方 無 竹茹 葛根各一兩 芦根二兩 知母三兩

麥冬半一兩

每服五錢葱白三寸水煎服

枝子仁飲

治病發斑黑色小便如血氣喘急胎

欬墮

梔子 升麻 石膏 生地各二兩 黃芩 一兩

大青錢八 每服五錢葱白七寸豉四十九粒 水煎服

大黃飲 治熱病六七日大小便秘澀

大黃微炒 石膏各一兩 知母 前胡 赤茯苓各七錢半

梔子 甘草 黃芩各五錢 生地黃半一兩

每服七錢水煎服

芎根湯 治熱病頭痛心煩嘔吐

知母四兩 竹茹三兩 每服五錢生芎根一握同

糯米一撮水煎服

梔子五物湯 治妊婦傷寒壯熱頭痛


梔子 前胡 知母各二兩 黃芩一兩 石膏四兩

每服五六錢水煎服

升麻六物湯 治傷寒斑黑溺血

升麻 梔子各二兩 大青 杏仁 黃芩各一兩

每服五錢葱白五寸水煎服



又方

伏龍肝為末每服一錢水調下

外用水調塗臍

又方

芦根煮汁時服一盞

熱病胎死腹中

良方曰熱病以致胎死腹中不能出者但服黑神散胎自下矣

陳無擇先生曰當視其產母若面赤舌青其子已死而青舌赤母死子生唇青吐沫子母俱死若

雙胎或一死一活用黑神散

薛氏曰竊謂前症宜補助產母使其胎自下黑神散恐大熱不宣輕用果胎已死者用平胃散加

朴硝水銀下之寔為穩當庶不併傷生者

生生子曰前症妊母既因熱傷其胎矣必其母衛任熱極營衛枯槁其胎乃死猶之藤枯而瓜焦也仍以熱藥下之寧不重傷妊母乎薛公評之當也而良方每謂妊婦致疾多起於寒按其逐月所著養胎之方籍熱藥為主是亦一偏也



其間豈無挾熱者乎故丹溪曰虛曰熱謂涼血則血循經而胎得以滋養血熱則沸騰也令此症始既曰熱病胎死腹中矣又復以熱藥下之意者恐以死胎不下為急而不暇顧其母耶不然必為用寒涼治熱太過而中氣虛寒熱劑為不得已用之也否則何陳無擇之高哲寧肯從而主之

黑神散 又名烏金散

桂心 當歸 芍藥 甘草 乾姜 炮

生地 各一兩 黑豆 炒去皮 大附子 炮去皮

為末每服二錢溫酒下

又方 治胎死腹中

紅菴 酒煮汁濃飲之二三碗効

又方

伏龍肝為末溫酒下二錢白湯下亦可

又方

朴硝為末童便和熱酒調下一二錢立下

妊娠瘡疾



娠病瘡乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱作妊娠而作多傷於胎
當於瘡症門尋治
薛氏曰若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥乃參三陰三陽經而治之
即瘡症門仲景方劉守真分經治療法也
清脾飲 小柴胡湯 逍遙散 補中益氣湯
選而用之極為穩當○黃芩白朮陳皮三味煎湯服亦佳

娠泄瀉

良方論曰娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞瀉水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脈沉緊數用戊己丸和之暖腐不食胃脈沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃氣湯寒冷臍下陰冷理中湯治中湯伏暑心煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便自利

用不換金正氣散胃苓湯此四症之大略也仍
參泄瀉門互治

生生子曰前症予見之屢矣人皆以為小疾忽而
不治及生子率多虛弱子姪婦每懷妊必瀉治
亦不愈分娩後又自止也其生子也脆而白無
血色得非胎虛之故歟予因思之妊娠則月水
蓄之以養胎血亦濕類也以停濕故瀉經曰濕
勝則濡泄是也治宜健脾燥濕后孕以白朮半
夏等為丸與之而安

薛氏曰按前症若米食所傷用六君加穀蘖麵食
所傷六君加麥蘖肉食所傷六君加山查若兼
寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六君加柴胡生姜
兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加姜
桂不應用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴
肢體倦怠用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土
之真色用六君加木香肉果若作嘔不食腹痛
惡寒乃中焦虛寒用六君加木香姜桂若瀉在
五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神

九日間服白朮散如不應或愈而復發或飲食

少思急用八味丸補右腎以培脾土為善

厚朴丸 治洞泄寒中

乾姜炮 厚朴製等分

為末糊丸梧子大米飲下五十九

草果散 治虛寒泄瀉腹痛無度

厚朴姜制 肉果炮煨 草豆蔻煨

每服三錢水煎服

妊娠下痢黃水

妊娠痢疾宜搜痢疾門參治而痢黃水乃脾土虧損真氣下陷也當升補中氣看所兼何症而治之在臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類也

產寶方 治妊娠痢黃水

厚朴姜汁炒 黃連各二兩 肉果五枚

右水煎徐徐服以効為度

又方 治熱痢

黃連一升 黃栢一升 梔子二十枚

每服五錢水煎如嘔者加橘紅生姜



又方 妊娠下痢痛

糯米合

當歸炒

黃芪各一兩

水煎分四服

臨產下痢用梔子炒為末每服二錢白湯調其効
妊娠大小便不通

大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便
不通小腸熱則小便不通大小腸俱熱更推其
因而藥之

當歸散 妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作
喘大便難小便澀產門腫

當歸五分

赤茯苓

枳殼麩炒

白芍

川芎各一錢

白姜炮

木香

甘草各三分

姜一片

水煎

若氣弱者枳殼減半大便秘加蜜同煎服
妊娠大小便不通腹脇痞悶不思飲食

大黃炒

木通

檳榔各一兩

枳殼麩炒三錢

訶子


四枚去核半生半熟用

大腹子

三枚

共為末童便一盞葱白七莖煎六分調服錢二

治妊娠小便不利氣急服猪苓散不瘥用甘遂為
末蜜和服豆許微利之未利再服利後仍服猪



苓散

猪苓散

治妊娠小便澀痛及胎水

猪苓

皮去

為末白湯調下一錢加至二錢日三

服夜二服

又方

車前子 一兩

大黃 炒半兩

共為末每服三錢蜜湯調下

妊娠小便不通名曰轉脬

妊娠小便不通為小腸有熱傳於脬而不通耳若

魚心肺氣滯則致喘急陳無擇云妊娠胎滿逼胞多致小便不利若心腎氣虛清濁相干而為諸淋若胞系了戾小便不通名曰轉脬若胎滿尿出名曰遺尿

薛氏曰按丹溪云轉脬小便閉多因胎婦虛弱憂悶性躁燻灸厚味古方用滑利踈導藥鮮効若脬為胎所壓而不通但當升舉其胎俾胞系踈鬆而小便自行若脬腹作脹而小便淋閉此脾胃氣虛胎壓尿胞四物二陳參朮空心服後探



吐數次自安竊謂前症亦有脾肺氣虛不能下
輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦
有金為火燥脾土濕熱甚而不利者更當詳審
施治

一婦患此小腹腫脹幾至於殆用八味丸一服小
便淋瀝再以八味丸料加車前子一劑即利吐
腹頓宛而安

八味丸 治妊婦飲食如故煩熱不得卧反側倚
息因脘系了戾不得溺名轉脬但利小便則

愈內有茯苓故也緩則不救

其方即六味地黃丸加附子桂心

古今錄驗治妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母去心炒 苦參各三兩 滑石半兩

為末蜜丸小豆大每服三十九丸米飲下

治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂

葵子研 榆白皮各一兩 葱白七莖水煎分二服

古今錄驗妊娠不得小便者

杏仁去尖皮 炒黃搗丸豆大燈心湯吞下七丸



又用滑石末水和塗臍下

又方

車前草汁調滑石末塗臍周圍四寸熱易之

又方

杏仁 滑石末等分 飯丸豆大每白湯下廿九

又方

紫苑為末井花水調下二錢

葵子散 妊娠小便不利身重惡寒眩暈水腫

葵子 赤茯苓各五兩 為末每服二錢米飲下

生生子曰予嘗以補中益氣湯加桔梗治數婦皆
効但用滲利藥而不得通者必須升提氣升則
水自降氣虛者非大補則提亦無功

子淋

妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然姪
婦胞繫于腎之間虛熱而成斯症甚者心煩悶
乱名曰子淋也

薛氏曰前症若頸項筋挛語滯痰甚用羚羊角散
若小便澀少淋瀝用安榮散若肝經濕熱用龍



胆瀉肝湯若肝經虛熱用加味道遙散腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛膝黃柏知母五味麥冬玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥冬若陰挺痿痺而頻數用六味丸若熱結膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲若膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸若膀胱陽虛陰無所化用六味丸

地膚大黃湯

治子淋

大黃

炒

地膚草

各三兩

知母

黃芩

炒

猪苓

通草

赤芍藥

枳實

炒

升麻

甘草

各二兩

每服五錢水煎服

安榮散

治子淋甚妙

麥冬

通草

滑石

川歸

灯心

甘草

人參

細辛

各五分

水煎服

治小便淋痛心煩悶乱

藿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子

各一錢

黃芩

炒

車前子

炒

芍藥

枳壳

各五分



右水煎服

治子淋小便澀痛

冬葵子

滑石

木通

各等分

每服六錢葱白七寸水煎服

猪苓散

方見大小便不通卷

妊娠遺尿

良方曰妊娠尿出不知用白薇芍藥為末酒調下

或白礬牡蠣為末酒調下二錢或鷄毛灰末酒

服一七或炙桑蟬蛸益智仁為末米飲下

薛氏曰若脬中有熱宜加味道遙散若脾肺氣虛

宜補中益氣加益智若肝腎陰虛宜六味丸

一妊婦遺尿內熱肝脉洪數按之微弱或兩太陽

作痛脇肋作脹以為肝火血虛用加味道遙散

六味地黄丸尋愈后又寒熱或發熱或恚怒前

症仍作用八珍散逍遙散兼服以清肝火養肝

血而痊

妊娠尿血

妊娠尿血良方謂內熱乘於血分以致血熱流滲



於臍名曰血淋用葵子一升研水五升煮二升
分三服或生艾葉一斤酒五升煮二升分三服
或生地一斤酒四升煮二升分三服亦治墮胎
後下血

薛氏曰因怒動火者宜小柴胡加山梔因勞動火
者補中益氣湯因厚味積熱宜加味清胃散若
因肝經血熱宜加味道遙散因脾氣下陷補中
益氣湯若因脾虛血熱宜加味道遙散

一姪婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作

脹飲食少思肝脉弦弱此肝經血虛而熱也用
加味道遙散六味丸兼服漸愈又用八珍湯加
柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治姪娠下血及尿血


當歸 生地各一兩 續斷半兩 赤芍半兩

為末每服二錢空心葱白湯調下

治姪娠尿血

阿膠炒 熟地各四兩 同搗為丸每服八十九空

心來飲下



又方

四苓散 加炒阿膠車前子茅草根水煎服

又方

白茅根 濃煎湯吞酒蒸黃連丸

加味清胃散 方見

妊娠胎水腫滿

產乳集云妊娠三月足腫至腿出水飲食不甘似水腫謂之子氣至分娩方消者此脾胃氣虛或衝經有血風亦有脾虛水氣流溢或因瀉痢臟

府虛寒或因瘧疾飲水脾虛濕漬或因水漬於胞不能分利皆致腿足腫肚腹腫也

薛氏曰若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚

湯脾胃虛弱佐以四君子若面目虛浮肢體如

水氣用全生白朮散如未應用六君子湯脾虛

濕熱下部作腫補中益氣湯加茯苓若飲食失

宜嘔吐泄瀉六君子湯腿足發腫喘悶不安或

指縫出水天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如

未應補中益氣湯若脾肺氣滯加味歸脾湯佐



以加味逍遙散

一妊婦每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈○凡治妊婦母泥月數但見其經症即用本藥為善

天仙藤散

婦人有水氣而成胎以致兩腿足腫

天仙藤

畧洗

香附子

炒

陳皮

烏藥

軟白辣者佳

甘草

各五分

右每服五錢生姜木瓜蘓葉各三

片水煎日三服

澤瀉散

妊婦遍身浮腫上氣喘急大便不通小

便赤澀

澤瀉

桑皮

炒

木通

枳壳

炒

赤茯苓

枳郎

各五分

右姜水煎服

防已散

脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防已

錢三

桑皮

炒

紫蘓莖葉

赤茯苓

各五分

木香

二分

右姜水煎服

千金鯉魚湯

妊婦腹大胎間有水氣

白朮

五兩

茯苓

四兩

當歸

芍藥

各三兩



右咬咀先以小鯉魚一尾如食法煮取汁二
盞入藥五錢姜七片橘皮少許煎七分空心
服

腎著湯 治妊娠腰脚腫

茯苓 白木各八分 干姜炮 甘草各一錢

杏仁五分 右水煎服

五皮散 治胎水腫滿

大腹皮 桑白皮炒 生姜皮 茯苓皮

橘皮各一錢 木香二分 右水煎服

全生白朮散 妊娠面目浮腫四肢腫如水氣名

曰胎氣又名胎腫

白朮一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮 白茯苓

各五錢為末每服二錢米飲下

治妊娠脚浮腫因脾衰血化成水以生料平胃散
姜枣水煎服或為末紫蘇葉湯調下二錢日二
服以腫退為度

腹內鐘鳴

良方曰孕婦腹內鳴用鼠穴中土為末入射香酒



調服二錢立愈或黃連煎濃汁常飲之

薛氏曰兒在腹中哭產寶方亦用空房中鼠穴土或黃連煎濃汁飲之即止又云脐帶上疙瘩兒含口中因產婦登高舉臂脫出兒口以此作聲令妊婦曲腰就地如拾物狀仍復原入兒口即止然黃連性寒麝香開竅當斟酌用之

龔彥德孕癰方

治孕癰用烏蘘五錢水一鍾煎七分入牛皮膠一兩煎化溫服或薏苡仁煮汁飲之

薛氏曰按孕癰即是腹內患癰如前法治之倘不應宜用牡丹皮散或薏苡仁湯

薏苡仁湯 又名瓜子仁湯

治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便澀婦人產后虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服

薏仁 二錢 一方用冬瓜子仁無冬瓜子以栝

蒞代之姚氏去薏仁用杏仁崔氏加芒硝

薏苡仁 栝蒞仁 各三錢 牡丹皮 二錢



右作一劑水煎服

牡丹皮散 治腸癰冷症腹濡而痛時利膿

丹皮 人參 天麻 白茯苓 黃芪炒 白芷

苡仁 薏仁去皮 當歸洗 川芎各一

炙甘草 官桂各五分 木香三分 右水煎服

臟躁悲傷

許學士云一婦無故數次悲泣是為臟躁用大棗湯而愈又程虎卿內姪娘五月慘感悲傷亦投大棗湯而痊

薛氏曰或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察

一婦無故自悲用大棗湯二劑而痊後又復患用前湯佐以四君子加山梔而安

一姪婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹湯為主佐以八珍湯而安

大棗湯

甘草三兩 小麥三兩 大棗十枚

淡竹茹湯 姪娘心虛驚悸臟躁悲傷或作虛煩

麥冬 小麥 半夏湯炮各一錢半 人參 白茯苓各一錢

甘草

分五

加姜朶竹茹水煎服

又方

治臟躁悲哭

紅朶燒存性為末米飲調下二錢

娠娠十月宜服滑胎湯藥

滑胎枳壳散

入月服之令胎瘦易產昔湖陽公

主每產累日不下南山道人進此方

枳壳

二兩 炒

炙甘草

一兩

右為末每服二錢空心沸湯調下日三服

凡孕六七月宜服之溫隱居加當歸木香分

又方

治同上

兼治諸疾下氣寬膈

枳壳

五兩 炒

甘草

一兩 半

香附子

三兩 炒

右為末每服二錢白湯調下

又方

易產滑胎

車前子為末或酒或米飲調下一錢

神寢丸

臨月服之神効

通明乳香

半兩 另末

枳壳

一兩 炒 末

右蜜丸梧子大每空心酒服三十九

榆白皮散

滑胎易生



榆白皮

甘草

各二兩

葵子

一兩

右為末每以五錢水煎服

保氣散

寬氣進食瘦胎易產或居處失宜頓仆

胎動若胎痛胎漏煎服佛手散

香附

木香

各四兩

山藥

一兩

砂仁

粉草

各一兩

益智

蘇葉

各半兩

為末每服二錢白湯調下

薛氏云神寢丸枳壳散併此方入月宜常服

保產無憂散

妊娠身居安逸口厭甘肥憂樂不

常食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢入月服

之易生

當歸

川芎

白芍

枳壳

炒

乳香

各三錢

木香

甘草

血餘

即髮灰以饋猪心
和之各一錢半

右為末每服三錢水煎日二服神效

妊娠臨月以猪肚一具煮爛徐食盡令易產

一產論

一曰正產 懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛相

次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛谷

道挺併繼之漿破血出兒乃遂生此名正產



二曰傷產 懷胎未產一月已前忽然臍腹疼痛
有似欲產仍却無事是名試月非正產也又名
曰弄痛凡產母未有正產之候切不可令人抱
腰亦不可令產母妄亂用力若兒身未順終方
轉動便教產母空亂用力使子錯路忽橫忽倒
不能正生皆由產母用力於未當用力之所致
也直待兒身順適通臨產戶始可用力一送令
兒趁力生下

經曰曰右傷產一法最為切要勿輕忽也凡十

月未足臨產腹痛或作或止或痛不甚者名曰
弄痛非正產之候或腹雖痛甚而腰不甚者非
正產之候胎高未陷下者非正產之候穀道未
挺併者非正產之候水漿未破血未出者非正
產之候漿血雖出而腹不痛非正產之候凡未
有正產之候且令扶行耐忍如不能行或凭物
坐之或安臨之或且服安胎藥一二帖即安得
安即止慎勿妄服催生藥又勿愴惶致令產母
憂恐而挫其志務要產母寬心存養調停令老



誠練達穩母先說諭之如覓心中煩悶可取白
蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先困乏其
母直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道挺
逆方是正產候也此時始可用力并服催生藥
也予男婦于未產一月已前腰腹俱痛全似將
產其痛至甚但遇已時稍止如此十餘日計無
所出因閱此條遂與安胎藥加參朮數服間與
肉味春之由是平復不痛又二十餘日始產一
男設若此際亂動亂用力并服催生等藥則立

見其危矣

三曰催產 若婦欲產漿破血下已見是為正產
之候但却未生即可服催生藥催之忽有經及
數日產母困苦亦可服藥以助產母之正氣令
兒速生也

四曰凍產 凡冬月天冷產母經血得冷則凝以
致兒子不能生下此害最深但冬月產者下身
不可脫去綿衣尤不可坐卧寒處當滿房著火
常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常
煖血得熱則流動使兒易生此名凍產



五曰熱產 凡盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不令房中人多恐熱逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏如醉乃至不知人事此名熱產

六曰橫產 凡兒先或露手或先露臂此乃產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰卧後令看生之人先推其手令入直上漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須

是產母仰卧然後推兒徐正之候其身正煎催生藥一盞飲之方可用力令送兒下此名橫產

七曰倒產 凡產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰卧令看生之人推其足入不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順去

八曰偏產 兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不



能生下當令產母仰卧次令看生之人輕：推
兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產
母用力一送即便生下若是小兒頭腦後骨偏
柱穀道只露其額當令看生之人以綿衣灸溫
裹手於穀道外方輕：推兒頭令正便令產母
用力送兒生也此名偏產

九曰礙產 兒身已順而露正頂不能生下盖因
兒身迴轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生
下當令產母仰卧令看生之人輕：推兒近上

徐：引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候
兒身正順方令產母用力一送使兒生下此名
礙產

右橫產倒產偏產礙產四法若看生之人非
精良妙手不可依用此法恐恣其愚以誤人
命也按倒產者令時往：隨其倒足生下並
無後患子母双全不必依推足復上之法亦
可又礙產者往：有肚帶纏在兒頂上而兒
頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶



從兒頭頂過而下之者又有肚帶纏在頂上一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必以此礙產法復入產門內撥下也

十曰坐產 臨產時高處繫一手中令產母以手攀之輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也此名坐產

十一曰盤腸產 趙都運恭人每產則大腸先出然後產子既產之後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能料偶在建昌得一坐婆施一法

而收之其法以醋半盞新汲水七分和勻喫產母面每喫一縮三喫收尽此良法也

丹溪治產後腸不收香油五斤煎熱盆盛俟溫令產母坐油盆中約一頓食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上

又方 草麻子十四粒去壳研如膏貼產母頭頂心上其腸上即指去

又方 腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之即收



催生

催生柞木飲子 難產或胎爛腹中腹悶神効

生柞木一尺

甘草大者五寸

右水三鍾封罐口煎一鍾半候胎順產門徐

溫服即時分娩更無諸苦

催生如神散 治橫生逆產其功甚大

百草霜 白芷不見火

右為末每服三錢至胎順產門以童便米醋和

為膏加沸湯調下或童便酒煎進二服然血

得黑即止此藥大能固血而免血乾甚妙

如聖散 黃蜀葵花焙為末熱酒調下二錢○若

漏血胎乾胞澁難產併進三服即產如無花

用子半合末之溫酒服尤妙○若打撲胎死

紅花酒調下

順生丹 治同上 兔腦髓去皮膜

明乳香一兩 母丁香二兩 麝香一錢

右以兔腦子丸鷄頭子大陰乾每服一丸溫水

下



又方 透明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用

冷水醋少許調服扶立令兩手握大石熯二

枚口念醫靈藥聖三遍行數步用坐產法便

生更無痛楚神效薛氏曰其法士人視之似迂然用之者稱驗甚

治逆產

蛇退

一名全者

蚕退帛一

右共入新瓦罐內益泥固濟煨存性為末煎

榆白皮湯下一錢三服竟痛便生

又方

伏龍肝

研末

每服一錢酒調下兒戴土而下

又方

魚膠

一尺

新瓦上煨灰陳醋調服立下

胞漿先乾胎溢不下急服大料四物湯滋其血氣

并濃煎葱湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却

眼前藥

神妙乳砂丹

明乳香為末以猪心血丸梧桐

子大硃砂為衣陰乾每服二丸嚼碎冷酒下良

久未生再服或以蓮葉蒂七個水煎化服二丸

尤妙良久未生再服

交骨不開產門不開

交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調



攝以致血氣不能運達而然交骨不開陰氣虛也
用加味芎歸湯補中益氣湯產門不開氣血俱虛也
用十全大補湯

一婦交骨不開兩日未生服加味芎歸湯一劑即時而產
彼後以此方傳與人服應手而効

一婦生平分媿最易至四十歲妊娠下血甚多產門不開
與前湯一劑又以無憂散斤許煎熟時時飲之以助其血而生

一產婦玉門不開發熱惡寒十全大補加五味子

數劑而寒熱退又以補中益氣加五味子數劑而玉門歛
○若初產腫脹或焮痛而不閉者用加味道遙散若腫既消而不閉者用補中益氣湯切忌寒涼之劑

一婦脾胃素弱兼有肝火產後玉戶腫痛寒熱作渴嘔吐不食
敷大黃等藥服驅利之劑腫及於臂虛症蜂起此真氣虛也
先用六君子以固脾胃乃以補中益氣湯升舉而消

一產婦失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒




暮熱自汗盜汗半年矣予用補中益氣加茯苓
半夏以健脾胃膿水漸少飲食漸進用歸脾湯
以解脾鬱共五十餘劑元氣復而瘡亦愈矣
一產婦玉門不閉小便淋瀝腹中一物攻動脇下
或脹或痛用加味道遙散加車前子而安
一產婦子宮腫大二日方收損落一片殊類猪肝
面黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十
全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生育
加味芎歸湯 治交骨不開不能生產

川芎 川歸各一兩 龜板一 婦人頭髮燒存性
右為散每服一兩水煎服約人行五里即生繼
死胎亦下

產難方論

郭稽中曰產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與
胞中敗血壅滯兒身不能便利是以難產急以
勝金散消散其血使兒易生陳無擇云多因兒
未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而
血水軋產路澁而難下宜先服催生如神散以



固其血設或逆生橫產當按法施治

勝金散

催生如神

麝香錢

豆豉兩

為末秤錢燒赤淬酒下

下死胎方

一 德婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中其穢子意其胎已死令視其舌青黑與朴硝一兩許服之化下穢水而安

一 婦胎死腹中服朴硝下穢水肢体倦怠氣息奄奄用四君子為主佐以四物姜桂調補而安

又方 以利斧燒紅置酒中待溫飲之其胎便下

又方 錫粉 水銀各一錢 東肉為丸豆許大水吞

立下

又方 平胃散錢五 酒水各一盞煎至一盞投朴硝

五錢再煎三五沸溫服其胎即化水而去

寶慶方云凡欲斷臍帶先以繫物墜下後可斷之

否則胞衣上即冲心而死

產難生死脉訣

欲產之婦脉離經沉細而滑也同名夜半竟痛應



分誕來日下午定知生身重休熱寒又頻舌
之脉黑復青反舌上冷定知死腹中須遣子冥婦
面赤舌青細尋看母活子死定應難唇口俱青沫
又出子母俱死總高判面青舌青沫出頻母死
子活是知真不信若能看應驗尋之賢哲不陳虛
新產之脉緩活吉實大弦急死來侵若得沉重小
者吉忽若堅牢命不停
寸口澁疾不調死沉細附骨不絕生審看此候分
明記長湏念此向心經

胞衣不出

郭稽中曰胎衣不下者因氣疲憊不能努出或血
入衣中脹大而不能下以致心胸脹痛喘急速
服奪命丹血散脹消其衣自下牛膝散亦効
一婦胎衣不出胸腹脹痛手不敢近用滾酒下失
笑散一帖惡露胞衣並下

一婦胞衣不出腹痛手按之稍緩此氣虛不能送
出也用無憂散而下○前症常詢諸穩婆云宜
服益母丸或就以產婦頭髮入口作嘔其衣自



出不出者必死然前法甚効

奪命丹

大附子

炮半兩

牡丹皮

一兩

乾漆

炒烟尽

大黃

兩

為末醋煎大黃成膏九梧子大温酒

吞七丸

花蓋石散

治產后敗血不尽血迷血暈胎衣不

下至死心頭煖者急用一服即化水而出其効

如神

花蓋石

斤

上色硫黃

兩

右和勻以紙泥封固瓦礫內炭火煨赤次日取出細研每服一錢童便熱酒下

牛膝散

治胎衣不出腹中脹痛急服此藥腐化

而下緩則不救

川芎

朴硝

牛膝

蒲黃

各三兩

川芎

半兩

桂心

五錢

右每服五錢姜三片生地

一錢水煎服

又方

紅花一兩酒煮濃汁服

又方


鹿角鎊三錢為末葱湯調服

又方

取產母鞋底烘熱熨小腹上下二七次

產後血暈

良方曰產後血暈乃血入肝經甚至眼花昏悶用



黑神散主之下血過多用清魂散補之或以醋
湯細飲或預燒秤錠以醋沃之或醱醋塗口鼻
或燒漆器薰之使產母鼻吸其氣庶無此患
薛氏曰若惡露上行用失笑散血下過多芎歸湯
若過勞所傷補中益氣湯血虛極用清魂散大
凡產後口眼喎斜等症當大補氣血為主而兼
以治痰若脾胃虛弱用六君子湯苟於七月之
前服安胎散至八九月間加大腹皮黃楊頭元
氣虛弱八珍湯臨產用無憂散則無前患

一婦八月胎下墜或動面黃躄倦飲食少思此脾
氣虛弱用補中益氣湯倍白朮加蘇梗三十餘
劑而安產後眩暈胸滿咳嗽用四物加茯苓半
夏桔梗而愈

一婦因飲酒惡露甚多患血暈口出酒氣此血得
酒熱而妄行虛而作暈也以佛手散加煨甘葛
二錢一劑而痊酒性慄悍入月及產後不宜飲
恐致前症

奪命丹 治血暈腹痛 沒藥 血竭 為末等



分每服二錢熱童便沖酒下

清魂散 產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以

致心神昏亂口噤眼花甚至悶絕而甦

澤蘭葉 人參各錢一 荊芥錢三 川芎錢一 右各

另為末每服一二錢熱湯和酒調灌之

一方 五靈脂半生半炒 為末每服二錢溫酒灌入

即甦

一方 荊芥為末童便調服

一方 神麴末每服二錢熱水調服

一方 韭菜切入瓶內注熱醋以瓶口對鼻薰之

一方 半夏為末丸豈大入鼻中即醒亦治五絕

佛手散 治產後去血眩暈欲絕又治血崩不止

又能治胎痛安生胎而落死胎神效

川芎酒洗 當歸酒浸各五錢

酒水各一鍾煎至一鍾服

產後顛狂

產後顛狂乃敗血上沖用大聖澤蘭散加砂仁末三分煎酸棗仁湯調下或硃砂為末二錢乳汁



調和入紫項活地龍一條滾二三沸去之入酒
再用重湯煮溫分三服

薛氏曰乃血虛神不守舍非補養元氣不可

一產婦患前症或用大聖澤蘭湯而愈後又怔忡
妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用

八珍湯加遠志茯苓神養其氣血而瘥

一產婦亦患此用化痰安神等藥病益甚神思消

爍余以為心脾血氣不足用大劑參朮芎歸茯

神酸棗仁四斤餘而安乃以歸脾湯五斗餘劑

而愈

茯苓散 治產後心虛忪悸言語錯亂健忘少睡

或自汗盜汗

人參 炙甘草 芍藥 炒 當歸 生姜 各八

遠志 茯苓 錢各一 桂心 分六 麥冬 分五 大棗 二

水煎溫服

抱膽丸 治產後遇驚發狂或遇經行發狂

水銀 二兩 黑鉛 五錢 硃砂 乳香 各一

右將黑鉛入銚內火熔化俟稍冷下水銀擾成



砂子再入乳香硃砂乘熱用柳木槌研勻丸
鷄頭子大每服一九薄荷湯下得睡勿驚
來即安○妙香散亦善

此症屬火者多不可槩視為瘀血及虛治也童
便極好或沖入涼血藥中用之屢見効

產後狂言譫語

產後狂言譫語乃心血虛也用硃砂末酒調下龍
虎丹參九琥珀地黃丸亦可如驚悸歌哭顛狂
等症當參治之

一產婦形體甚倦時發譫語用栝子仁散稍愈又
用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛小便
下血用加味道遙散以清肝火養肝血頓瘥又
佐以加味歸脾湯而安

治敗血上衝發熱狂走脉虛大者

乳荷葉

生地

丹皮

各半

濃煎湯調生蒲

黃二錢服之即止

妙香散 治產後語言錯亂用生地當歸煎湯調
服立効



炙甘草 人參 桔梗各五錢 茯苓 茯神
山藥姜汁炒 黃芪 遠志各一兩 辰砂三錢 射香二錢
木香二錢 右為末每服二錢溫酒調服
○又能治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗
夢與鬼交等症
產後不語

產後不語因心氣虛而不能通津於舌則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之可也

七珍散

人參 石菖蒲 生地 川芎各一兩 細辛一錢

防風 辰砂另研各五錢

為末每一錢薄奇湯調服

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語用之即効

生白礬為末每服一錢熱酒調下

產後不語


人參 石蓮肉 石菖蒲等分


每以五錢水煎服





國立中央圖書館





44/9351 v. 20



產後寒疝腹痛

產後腰痛

四肢筋痛

女

產後兩脇脹痛

產後腹痛見紅崩

過身疼痛

味

產後中

汗多

產後生

產後

產後

中風恍惚

虛汗

口燥



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





赤水玄珠婦人門第二十三卷目錄

產後乍見鬼神

心神驚悸

中風恍惚

虛極生風

虛汗不止

汗多變癍

口噤腰背反張

產後中風

四肢筋掣

遍身疼痛

產後腰痛

產後腹痛兒枕痛



產後寒疝腹痛

產後兩脇脹痛

產後血癍

虛煩發熱

女科



產後血渴

產後乍寒乍熱

產後癰疾

嘔吐腹脹

氣急喘促

口鼻黑臭

月水不通

四肢浮腫

腹痛泄瀉

赤白痢

大便秘澀

大小便不通

產後遺糞

產後諸淋

小便不禁

小便出血

玉門不閉 乳少或止

婦人齒唇

赤水玄珠婦人門第二十三卷

新安生生子孫一奎著輯

產後乍見鬼神

產後如見鬼神或言語譫妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之

薛氏曰若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮姜若心血虛損用栝子仁散大抵此証皆由心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神



自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其

或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散
益甚痰涎上湧朝寒暮熱乃早用八珍散夕用
加味歸脾湯各五十餘劑而愈

調經散 治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時

見怪 沒藥 琥珀 桂心 白芍

當歸各七分 細辛五分 麝香少許 右為末每服半錢

姜湯酒各少許調服

栢子仁散 治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

栢子仁 遠志 人參 桑寄生 防風

當歸炒 生地 甘草炙 各等分用白羊心壹

個水三盞煮清汁七分入藥五錢煎服

產後心神驚悸

薛氏曰人之所主者心之所主者血心血一虛
神氣不守此驚悸所由作也當補血氣為主

一產婦患前症二度服琥珀地黄丸局方妙香散
隨效再患服之其症益甚而脉浮大按之如無



發熱惡寒此血氣俱虛乃以十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黄丸 治產婦惡露未盡胸腹作痛或小

便不利 琥珀 延胡索 糯米同炒去米 川歸 各一

兩 生薑 各二斤 研取汁留

內妙地黄滓以地黃汁 右為末蜜丸如彈子大

每服一九當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂 琥珀 沒藥 當歸 分時 右為末每服

二錢空心日午臨卧白湯調下

治產後驚悸亂語精神不定用好硃砂為細末每

以酒調下一錢

產後中風恍惚

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以

致心神恍惚怔忡不寧

薛氏曰當大補氣血為主而佐以後方為善蓋風乃虛極之假象也固其本元諸病自退若專治



其風則速其危矣

一產後患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味婦脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽動小便自遺作肝火熾盛用十全大補加釣藤山梔而安再用辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸 產後中風驚狂起卧不安或痰涎

上湧 石菖蒲 遠志去心芦用甘草湯煮 人參 茯神

辰砂

各三錢

川芎

山藥

鉄粉

麥冬

細辛

天麻

半夏

南星

白附子

各一兩

為末

姜汁糊為丸菴葢大別以硃砂為衣每服三十丸姜湯送下

產後極虛生風

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出目眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣

薛氏曰若心脾氣血虛用十全大補湯如不應加



附子釣藤鈎若肝經血虛用逍遙散加釣藤經云脾之榮在唇心之液為汗乃心脾二臟虛極急用參附湯救之

一婦患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹疼以為陽氣虛寒用六君子姜附各加至五錢不應以參附加至一兩始應良久不服仍前腸鳴腹痛後灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方効

濟危上丹 乳香 五靈脂 硫黃 玄精石

阿膠 卷栢 桑寄生 陳皮各等分 將上四味

入石器微火炒再研入餘末用生地黃汁丸梧子大每服二十九食前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯 治產後腹痛拘急痛連腰背自汗

少食 當歸 桂心各三兩 白芍六兩 炙甘草二兩

每服五錢姜枣水煎入飴糖一匙以効為止

獨參湯 一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰鳴自汗盜汗氣虛脉脫手足逆冷蓋血生於氣補氣者乃陽生而陰長也

產後虛汗不止

產後汗不止者皆陽氣頓虛腠理不密而津液妄
洩也若遇風則交瘕縱虛之短氣則身體消瘦
唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰若血氣俱虛急用十全大補湯如不應參
附著附湯恐汗多亡陽發瘕尤當用之王好古
曰頭汗出至頸而還額上偏多蓋額為六陽之
所會也由虛熱薰蒸而出竊謂前症當以部位
分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬

心治者審之

一產婦略聞音响其汗如水而昏瞶諸藥到口即
嘔作脾氣虛憊用參附末為細丸時含三五粒
液下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引飲
乃血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸
六黃湯內黃芩黃柏炒黑倍加人參五味子二
劑而愈

麻黃根湯

產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安





當歸 黃芪炒 麻黃根 牡蠣煨 炙甘草

人參 各等分水煎服

產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸

炙甘草兩 附子炮五錢 桂心 白芍各一兩五錢

每服三五錢加姜枣水煎服以効為止

止汗散 牡蠣煨五錢 小麥麩兩 右為細末

每服三五錢猪油汁調下

人參湯 產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等

症 人參 當歸 等分為末猪腰子一枚切

片水二鍾糯米半合葱白二根煮取汁八分入

藥三錢煎服

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止如不應加

人參 白朮 心木 不足加炒酸棗仁

當歸 熟地 黃芪各二錢 生地 黃栢炒黑

黃苓炒黑 黃連炒黑 各一錢 水煎服

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒手足逆冷大便

自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發瘧等症

人參兩 大附子炮五錢 作一服加姜枣水煎徐飲下

當歸補血湯

治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲

晝夜不息脉洪大而虛重按全無者 當歸

錢三

黃芪

炙兩

水煎服

芪附湯

治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰湧四

肢逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等

症

黃芪

兩一

附子

炮五錢

作一服加姜棗水

煎如不應倍加附子乃得全濟

汗多變痲

產後汗多變痲因氣血虧損肉理不密風邪所乘

口噤背強如癰或搖頭馬嘶不時舉發氣息如
絕宜速灌小續命湯若汗出兩手拭不及者不

治

薛氏曰此因去血過多元氣虧損或外邪相搏以
致牙關緊急四肢痲強或陰火內動或腰背反
張肢體抽搐若有汗而不惡寒者曰柔痲若無
汗而惡寒者曰剛痲由亡血過多筋無所養故
傷寒汗下過多及潰瘍而膿血大泄者多患此
乃敗症也急以十全大補湯治之如不應急加

大附子多有復甦者

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮姜二劑而甦數劑而安

小續命湯

治副瘕或脚氣痺弱不能轉舒行步

欬側或口眼喎邪牙關緊急角弓反張

麻黃 桂心 甘草 防風 白芍

白朮 人參 川芎 大附子 防已

黃芩 每用五錢水煎入姜汁少許溫服

若自汗為柔痙者去麻黃有熱去附子減桂一半盛冬初春去黃芩

產後口噤腰背反張

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手三陽經也蓋手三陽之筋循結于頷得風冷則筋急故致口噤腰背孳急角弓反張者是風邪入於諸陽之經也

薛氏曰若因血氣耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血為主佐以本方丹溪



謂產後當大補氣血為先雖有它証以未治之
如惡寒發熱等症乃氣血虛甚之極也宜大劑
參芪歸朮肉桂以培養之如不應急用炮附子
再不應用人參一兩附子二三錢名參附湯倘
猶不應乃藥力未能及也宜多用之

婦人產後不省人事吐涎癱瘓

當歸 荆芥穗 等分三錢水一盞酒少許煎
灌之下即甦倘未應者當改用大補氣血藥

張文仲治前症用白朮四兩以酒濃煎頓服

產後中風

產後中風或氣血未復風寒所感以致筋掣拘急
口眼歪斜或肢體緩弱入臟則恍惚驚悸郭稽
中云產後強力下床或悞入房或憂怒內傷臟
腑陳無擇曰當以脉辯而治之若努力下床月
內入房憂怒者著艾非中風類乃蓐勞火邪之
症

薛氏曰若果外邪所屬形氣不足病氣有餘當補
元氣為主稍佐以治病之藥若強力下床月內



入房屬形氣病氣俱不足當純補元氣多有復
甦者若悞投風藥乃促其危也

治產後身背拘急妄言發熱四肢拘攣不時驚悸

川芎 羌活 羚羊角 酸棗仁 芍藥

桑白皮 一兩 防風 一兩 每服六七錢水煎服

治產後中風唇青鼻黑用小續命湯連進三服

產後中風煩渴用紅蒼子 五合 水煎徐之

產後四肢筋牽

產後中風四肢筋脉牽急乃氣血俱虛或風邪客

於皮膚則頑痺羸乏若入於筋脉則四肢牽急
皆由大經空虛風寒乘虛而漸入也

薛氏謂肝屬木而主筋若肝經風熱血燥用加味
逍遙散如不應當用六味丸以補腎水

一產婦筋牽臂軟筋肉掣動此氣血俱虛而自熱
也用十全大補湯而安

一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻神思倦怠乃氣
血虛弱以十全大補湯加炮姜數劑漸愈去姜

繼服而安



產後遍身疼痛

產後遍身疼痛者由氣虛百節開張血流骨節以致肢體沉重不利筋脉引急發熱頭痛宜用趁痛散治之陳無擇云若惡感寒傷食宜用五積散若誤作傷寒發汗則筋脉抽搐手足厥冷則變為瘕當補氣血為主

薛氏曰若以手按而痛益甚是血瘀滯也用四物炮姜紅芍仁澤蘭補而散之若按而痛稍緩此是血虛也用四物炮姜人參白朮補而養之

趁痛散

產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝

炒酒

甘草

後

薤白

各一兩

當歸

各半兩

桂心

白朮

炒

黃芪

炒

獨活

生姜

各半兩

每用五錢水煎服

五積散

治風寒所傷遍身疼痛脚氣疼痛或寒

熱拘急嘔吐不食等症

當歸

浸 白芍 川芎

桔梗

各炒

厚朴

姜炒

乾姜

人參

茯苓 陳皮

白芷

蒼朮

半夏

姜制

肉桂

麻黃

炙甘草

各五分

入姜朮水煎服

產後腰痛

腎主腰脚產後腰痛者蓋腎為胞胎所繫此因產勞傷腎以致風冷客之若連背脊痛久未已後遇有孕必至損動

薛氏曰若真氣虛而邪乘之者當歸黃芪湯或十全大補為主佐以寄生湯如不應須十全大補加附子

一產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔乃脾虛血弱用白朮一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲一匙四

劑後漸安服百劑全愈

如神湯

即生料五積散

加菴仁逐敗血去風濕

產後惡露不盡腰重痛或兩股痛如錐刺宜服菴仁湯若作癰用五香連翹湯

菴仁湯 治產後惡露不盡腹中作痛或流注腿股作痛急用此湯治之如未應多變作癰須用

五香連翹湯

菴仁

去皮尖

蘇木

生地

各半兩

蠶虫

去足翅炒

水蛭

炒

各十枚

每服五錢姜

水煎空心熱服以惡露下為度



五香連翹湯 木香 丁香 沉香 射香

升麻 獨活 連翹 木通 桑寄生 各二兩

每劑五錢水煎入竹瀝少許服

當歸黃芪湯 治腰痛不可轉側或汗出壯熱氣

短 黃芪 炒 白芍藥 炒 當歸 三兩

每劑五錢水煎服

產後腰痛兒枕痛


產後腰痛或因外感內傷瘀血壅滯晒致瘀血以
失笑散風寒外感以五積散內傷飲食以養胃

湯加山查治之

產後兒枕痛者乃母胎中宿血也其痛在小腹大
抵小腹痛多由惡露凝滯或外寒相搏若久而
不散必成血瘕月水因之而不調也

生生子曰設以手按之痛甚者瘀血也按之而痛
緩者或喜熱物熨之者此虛中有寒也當補而
溫之

山查濃煎汁入砂糖少許服之極治兒枕痛以其
能消瘀血故痛止也



隱居澤蘭湯

產後惡露腹痛或胸滿少氣

澤蘭

生地

當歸

芍藥炒

生姜各一錢

甘草

炙五分

大棗四枚

水煎服

失笑散

治心腹痛產後瘀血上攻心腹疼痛而

牙關緊急一服而愈

五靈脂

蒲黃各一錢

醋水煎服五靈脂一味尤妙

大岩密湯

治陽氣虛寒心腹作痛不食四肢厥

冷

生地

當歸

獨活

吳茱萸

炮姜

白芍藥炒

甘草炙

桂心

小草各一兩

細辛半兩

每帖五錢水煎服

延胡索散

產後惡血凝滯臍下作痛或作寒熱

延胡索

桂心

各半兩

當歸一兩

為末食前熱酒

調下二錢

失笑散尤佳

當歸養血丸

產後瘀血心腹脹痛或腰脚疼痛

當歸

赤芍

丹皮

延胡索

各二兩

桂心一兩

為末蜜丸梧子大每服五十九溫酒下

金黃散

治惡露上冲肚腹作痛或發熱口渴

延胡索

蒲黃

各一錢

桂心二分

為末酒調下



產後寒疝腹痛

良方曰產後臍腹作痛乃冷氣乘虛也用當歸建中湯治之陳無擇云若產當寒月人門臍下脹痛手不可近者用羊肉湯治之

主生子曰若驗其無瘀血而果為寒氣所侵蟠葱散亦佳如小水短濇口渴內熱以龍胆瀉肝湯加青蒿徹其熱從小便出也亦有陽氣下陷者以補中益氣湯加芍藥桂心荔枝核

羊肉湯 產後脾虛寒邪所乘以致腹痛或頭眩

脇臍急痛

精羊肉

兩四

當歸

川芎

各半兩

生姜

兩一

水十盞煎四盞分四次服

蟠葱散 方見

產後兩脇脹痛

良方曰此因惡露不盡或肝經血虛或肝經氣滯當分而治之宜與脇痛門參治

一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛乃氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮姜而血頓止又用十全大補湯而寒熱退

此症為非姜桂辛溫



助脾胃以行藥勢不惟無
以施其功而反助其脹耳

經効方

治產後肝經氣滯不平脇肋腹痛或寒

熱往來內熱晡熱

當歸

半一錢

芍藥

苦梗

炒

檳榔

枳殼

炒各八分

桂心

青木香

柴胡

各六分

水煎服

當歸散

治產後陰血虛弱或氣滯血凝以致發

熱腹痛或腹脇脹滿以當歸干姜各分每服三

錢水煎服

產後血瘕

良方曰產後瘀血與氣相搏名曰瘕謂其痛而無
定處此因風有風冷而輕則否澁重則不通
薛氏曰前症乃寒邪乘客氣血壅滯此因氣病而
血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜養為善
難經云任脉為病男子內結七疝女子為瘕聚
然當與瘕聚門參治

治血瘕作痛臍下脹滿或月經不行發熱体倦

當歸

八分桂心

芍藥

炒血竭

蒲黃

炒各六分

延胡索

炒四分

為末空心酒調分二次服

葛氏方 治前症桂心為末每服一錢空心酒下
產後發熱

大全人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

人參 當歸 等分為末以猪腰子一具去脂
膜切小片子以水三升粳米半合葱白二條煮
米熟取清汁一盞入藥末二錢煎至八分不拘
時溫服

羅氏犀角飲子 治產後亡津液虛損時自汗出

發熱困倦唇口乾燥 犀角 麥冬 白木

各半兩

柴胡一兩 枳殼炒 生地 地骨皮 炙甘草

當歸 人參 茯苓 黃芩 黃芪

各七錢

右每服六錢入浮小麥七十粒姜三片水煎服
產後發熱多屬不足虛中有寒丹溪每以乾姜加
入補藥中取効不可不知

產後虛煩發熱

薛氏曰虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒
發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急
加桂附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認



為火症投以涼劑禍在反掌王冰先生云大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也 治法前症無水者六味丸無火者八味丸氣血俱虛者八珍湯或十全大補湯

人參當歸湯 治產後虛煩短氣發熱

人參 當歸 麥冬 桂心 生地

大棗四枚 粳米一合 淡竹葉二錢 芍藥一錢 水煎服

產後血弱虛煩四物加茯神遠志服之

產後餘血不盡奔心煩悶生藕汁飲一二盞甚効

竹瀝亦佳

竹葉湯 產後短氣欲絕心中煩悶以此補之

竹葉 麥冬 小麥各一升 甘草一兩 生姜二兩

大棗十四枚 水一斗煮小麥竹葉至八升去渣納



餘藥煮取三升去渣溫服 虛悸加人參二兩
氣力少加糯米五合

產後血渴

薛氏曰若出血過多虛火上炎用童子小便或四
物白朮麥冬丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸
芩湯若血虛發熱用八珍加麥冬五味若心脫
發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用中
益氣湯或七味白朮散

七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴

或因吐瀉所致 人參 白朮炒 白茯苓

木香 炙甘草 藿香 葛根各一錢 水煎服

竹葉歸芩湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食

竹葉一錢 當歸一錢 黃芪二錢 白朮 人參

錢各一 麥冬七分 炙甘草五分 水煎服

產後乍寒乍熱

產後乍寒乍熱由血氣虛損陰陽不和若陰勝則
乍寒陽勝則乍熱宜用增損四物湯若因敗血
不散腹內作痛宜用奪命丹後用增損四物湯



隨病加減陳無擇云敗血流閉諸陰則寒流閉
諸陽則熱用大調經散五積散

薛氏謂陽氣不足陰氣上入於陽中而惡寒者用
補中益氣湯若因陰氣不足陽氣下陷於陰中
而發熱者用六味丸若氣血不足而惡寒發熱
者用八珍湯若病後寒熱倦怠者用補中益氣
湯若肌熱大渴目赤面紅者用當歸補血湯
一產婦惡寒發熱此血氣虛寒用十全大補加炮
姜而寒熱愈繼以補中益氣而肢體安

增損四物湯

人參

當歸

芍藥

川芎

乾姜

炒各
一兩

甘草

四錢

每劑五錢姜水煎服

大調經散

治產後惡露未消寒熱自汗或肚腹

作痛

大莖

炒去皮
一兩

茯神

一兩

真琥珀

錢一

為末每服二錢空心濃煎烏荳紫蘇湯調下

產後癰疾

郭稽中曰產後乍寒乍熱者多是敗血為害或陰
陽不和若槩作癰疾治之誤矣

陳無擇曰產後寒熱或一二日或二三日一發或



先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多或純寒純熱者皆是瘧疾最難治療可用草果飲生熟飲四獸飲選而用之

薛氏曰此症當以補胃氣為主佐以草果飲之類若胃氣稍充以草果飲為主佐以補胃之劑大抵產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君子加桔梗蒼木藿香如外邪多而飲少用藿香正氣散如外邪少而飲食多人參養胃湯勞

後所傷用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮姜中氣虛寒用六君加姜桂元氣脫陷急加附子蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百症但溫補脾胃其病自退

增損柴胡湯 產後虛熱寒熱如瘧食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮 川芎

白芍 炒 各等分每帖七錢入姜枣水煎



白茯苓散

產後蓐勞頭目四肢疼痛寒熱如瘧

白茯苓

當歸

川芎

桂心

白芍

黃芪

人參

熟地

右先以水三

盞入猪腎一雙姜朶各三煎至二盞入前藥半兩再煎至一盞許服之

猪腰子粥

產後蓐勞發熱用猪腰子一枚去膜

切片用鹽酒拌先用粳米一合入葱豉煮粥鹽醋和將腰子鋪在碗底以熱粥傾蓋之如作盒生狀空心服

黃芪建中湯

產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪

白芍

甘草

芎藭

每服五錢姜朶水煎日二三服虛甚者須加附子為要

藿香正氣散

治外感風寒內傷飲食頭痛寒熱

或霍亂泄瀉或作瘧疾 藿香一錢 桔梗炒

大腹皮 紫蘇 半夏曲 茯苓 白芷

陳皮 白朮炒 厚朴制各一錢 炙甘草五分

加姜朶水煎服

人參當歸散

治去血過多內熱短氣頭痛悶亂



骨節作痛或虛煩咽燥有似瘧者 人參
當歸 生地 桂心 麥冬 白芍 酒 各等
分粳米一合竹葉十片水三鍾煎二鍾納前藥
五錢束二枚煎至八分服虛甚者用熟地
生生子曰按病机之要云治胎產之病從厥陰經
論之無犯胃氣及上中二焦謂之三禁不可汗
不可下不可利小便發汗者同傷寒下之早証
利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津
液胃中枯燥治之方法能無犯此二禁則營衛

自和而寒熱自釋六

又有惡露不盡或風寒乘虛隔入血室者則晝日
清明夜則譫語寒熱或只發熱如見鬼狀此為
熱入血室用小柴胡湯加生地丹皮或四物加
柴胡菴仁

嘔吐腹脹及嘔逆不食

產後腹脹滿悶嘔吐者曰敗血散於脾胃不能運
化而致宜用抵聖湯治之

薛氏謂若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷



於胃宜用六君子湯或加砂仁神曲之類大凡損其脾者當節其飲食為善

抵聖湯

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮

炙甘草

各一錢

生姜

焙乾

水煎極効

胃為水穀之海以養臟府產後胃氣虛弱飲食所傷必致嘔逆不食也治法不過溫養脾胃審其所傷之物而推治之或有陽氣衰微火不生土者八味丸若嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃虛寒極矣急用理中湯加附子桂心而甦者

一產婦朝吐痰夜發熱日夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前症愈甚詎思早吐痰脾氣虛夜發熱肝血虛晝夜無寐脾血耗也遂用六君子加逍遙散歸脾湯以次調補而痊

開胃散

治產後胃虛嘔吐胸滿不食

訶子肉

一兩

人參

一兩

炙甘草

半兩

每劑五錢姜水煎服

產後胃虛嘔逆

橘紅

一兩

半夏

炙甘草

各半兩

藿香

三兩

每劑五錢姜水煎服



治產後嘔逆不食

白朮

錢五

生姜

錢六

水煎徐服

石蓮散

產後胃寒咳逆嘔吐不食或腹作脹

石蓮肉

半一兩

茯苓

兩一

丁香

兩半

為末每二錢姜湯或米飲調下日三次

錢氏益黃散

脾土虛寒水反來侮以致嘔吐不

食或肚腹作痛或大便不時手足逆冷等証

陳皮

兩一

青皮

訶子肉

炙甘草

丁香各三錢

每服四五錢水煎服

人參養胃湯

治外感風寒內傷飲食寒熱頭痛

或變瘡疾

半夏

厚朴

制

橘紅

各八分

藿香葉

草果

茯苓

人參

各五分

蒼朮

錢一

炙甘草十三分

右姜七片烏梅一箇水煎服

產後喉中氣急喘促

產後喉中氣急喘促因營血暴竭衛氣無主初聚

於肺名曰孤陽竅為難治若因敗血停凝照奪

命丹若因營血暴絕服芎藭湯若因風寒惡傷

服旋覆花湯因氣鬱結小調經散若傷飲合服

見現丸



薛氏曰若脾胃氣虛用六君桔梗若兼外邪更加
紫蘇中氣虛寒補中益氣加炮姜肉桂若陽氣
虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲
一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽
氣虛脫用參附湯四劑而愈
二味參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲死
人參一兩 蘇木二兩 水煎頓服
旋覆花湯 治傷風寒暑濕喘嗽太盛坐卧不寧
旋覆花 赤芍藥 半夏曲 前胡 甘草

荊芥穗 五味子 茯苓 麻黃 杏仁
各等分每以五錢姜枣水煎服有汗者勿服
五味子湯 治產後喘促脉伏而厥 五味子炒

人參 杏仁各二錢 麥冬 陳皮各一錢
右姜三片枣二枚水煎服

芎藭湯 芎藭 當歸 白芍等分每五錢水煎服
產後口鼻黑臭衄

產後口鼻起黑氣及鼻衄者蓋陽明經脉之海起
於鼻交頰中還出頰口交人中左之右之左



此產後氣虛營血散亂胃絕肺敗之症也急取
緋線一條并產婦頂心髮二根緊繫中指節更
無可療

薛氏曰按胃脉俠口繞承漿蓋鼻準屬脾土鼻孔
屬肺金誠胃虛肺損氣脫血死之症急用二味
參蘇飲加附子五錢亦有獲生者

產後月水不通
產後乳子周歲而經不行是其常也若半歲而經
行此血有餘也若一二歲不行而無疾不必服

藥若肢体倦怠食少內熱是血少也宜健脾胃
若以藥通之則誤矣

薛氏曰脾胃虛弱用六君子若兼鬱火傷脾用歸
脾湯加丹皮山梔若怒火傷血宜四物合小柴
胡氣血俱虛八珍湯加丹皮

產後四肢浮腫

產後四肢浮腫者乃敗血乘虛流注宜用小調經
散陳無擇云若風邪乘於氣分皮膚腫而浮虛
乃氣也若皮膚腫如熟李乃水也蓋氣腫者宜



發汗水腫者宜利小便

薛氏謂若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣仍參水分血分治而一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫乃中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君子而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金櫃加減腎氣丸而愈

小調經散

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

各一錢

為末每服五分姜汁溫酒調

大調經散

最治腫滿喘急煩渴小便不利

方具乍寒乍熱卷

治血虛氣腫水腫

澤蘭葉

防已

分

為末每

以二錢溫酒調下或醋湯亦可

金櫃加減腎氣丸

治脾腎虛寒腰重脚腫濕飲

留積小便不利或肚腹脹腫四肢浮腫氣喘痰

甚或已成水症其効如神

白茯苓

牛膝

附子

桂心

車前子

山茱萸

肉

丹皮



山藥 澤瀉各一兩 熟地黄四兩 為末煉蜜丸梧
子大每服七八十九丸空心米飲下

產後腹痛瀉利

產後腹痛瀉利因腸胃虛弱寒邪乘襲或水穀不
化洞泄腸鳴或手足逆冷用調中湯治之陳無
擇謂若六淫七情而致者當隨所感而治之
若胸膈飽脹或惡食吞酸此飲食停滯用六君
枳實山查以消導若食既消而仍痛更或頭痛
熱渴惡寒欬嘔此中氣被傷用補中益氣半夏

茯苓以益脾胃

調中湯 良姜 當歸 桂心 芍藥 附子炮

川芎各一兩 甘草五錢 每服五錢水煎

五味子散 產後泄瀉或腎泄在五更侵晨作瀉
飲食不進或大便不實登廁無時

五味子妙三兩 吳茱萸妙五錢 共為末每以二錢白

湯調下為丸尤妙

四神丸 治脾腎虛弱侵晨五更作瀉或全不思
食或食而不化大便不實 破紙故妙四兩



肉苳寇二兩 五味子二兩 吳茱萸兩 為末
用大紅枣四十九枚生姜四兩以水共煮爛去
姜以枣肉和藥搗為丸梧子大空心鹽湯下
神丸 治同即前四神丸減去五味子吳茱萸

產後赤白痢

產後痢疾因飲食六淫七情傷於脾胃或滲大腸
皆為難治若飲食不進謂之虛痢氣字不順謂
之氣痢寒熱溫良升降調補各隨所宜而施治
之○白屬氣分而赤屬血分也若米食所傷用

六君加穀蘖若麩食所傷加麥蘖若肉食所傷
加山查神曲凡蕪嘔吐俱加藿香若蕪噯酸或
嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木尅脾土用六君
加柴胡炮姜若寒水反來侮土用錢氏益黃散
若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽
氣若瀉痢色黃乃脾土真色宜加木香肉苳寇
若屬脾土虛寒六君加木香姜桂若脾腎虛寒
用補中益氣湯及四神丸若下元虛寒用八味
丸以補土母若以小便澀滯肢體漸腫或蕪喘

咳用金櫃腎氣丸以補脾腎利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫須補胃為主若久而不愈是氣虧損也必用四神丸六味丸八味丸三方以補足三陰若用分利導水之劑是虛其虛也

產後痢疾作渴者乃內亡津液或胃氣虛不生津液但止其渴其痢自瘥○若渴而不喜冷飲屬胃氣虛故無津液宜用七味白朮散或錢氏白朮散如夜間發熱口渴屬腎氣虛而不能潤宜六味丸並佐以益氣湯以滋化源

一產婦瀉痢發熱作渴吐痰肌躰消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣乃脾腎之瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘而痊

一產婦患前症形躰倦怠飲食不進與死為鄰此脾胃俱虛也用四神丸十全大補湯而愈

產後大便秘澀

產後大便秘澀因腸胃虛弱津液不足若小腹悶脹宜服麻仁丸潤之若用寒藥則促其危矣

薛氏曰若計其日期飲食數多即用藥通之禍在



反掌之間必待腹滿覺脹欲去不能者乃結在直腸宜用猪胆汁導而潤之若服苦寒疏通反傷中氣通而不止或成痞症若去血過多宜用十全大補血虛火燥用加味四物氣血兩虛用八珍湯雜數日不通飲食如常腹中如故仍用八珍加杏仁薤仁治之若泥其日期飲食而強通之則誤矣

一產婦大便七日不通飲食如常腹中如故此腹未滿也用八珍加薤杏仁至二十一日腹滿欲

行用猪胆汁潤去而安

一婦大便秘澁諸藥不應苦不可言飲人乳而安

麻仁丸 火麻仁研如泥 枳殼 人參各四分

大黃二分右為末入麻仁煉蜜丸如梧子大每服

二十九丸空心溫酒下未通漸加不可過服

阿膠枳殼丸 治產後大便秘澁以阿膠枳殼二

味等分為末蜜丸梧子大滑石末為衣白湯送

下二十九丸未行再服

產後大小便不通



良方曰此因腸胃虛弱津液枯竭故也宜參前秘
一產婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳
一日稍通三日而痊人乳尤善

菀花散 治膀胱氣滯血澁大小便秘

菀仁 葵子 滑石 楨即 各等分為末每
以三錢空心葱白煎湯調下

產後遺糞

良方取故燕窠中草燒為末或枯礬牡礪或白歛
芍藥各等分為末俱用酒調服或用固腸亦可

薛氏曰若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯
為主虛寒加肉苳慈補骨脂或四神丸若脾腎
虛寒兼八味丸仍佐前二方

一產婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行
常道先用六君子湯二劑又用五苓散一劑而
痊循常腸交亦可做治

還少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精

白濁又治真氣虧損肌體瘦弱等症 肉苳蓉

遠志去心 茴香 巴戟 山藥 牛膝 熟地



枸杞子 石菖蒲 山茱萸肉 楮寔子
五味子 杜仲去皮 白茯苓各二兩 各另為末
枣肉百枚加煉蜜為丸如梧子大每服五七十
丸空心酒下

產後諸淋

良方謂乃熱客於脬虛則頻數熱則澀痛氣虛兼
熱血入胞中則血隨小便出而為血淋也
薛氏云若膀胱虛熱用六味丸若陰虛而陽無以
化用滋陰腎氣丸蓋土生金金生水當滋化源

也與小便淋瀝頻數卷參治

滑石散治熱淋 滑石五分 通草 車前子

葵子各四分 右為細末漿水調服

治小腸有熱小便澀痛或為血淋

薤麥 黃芩 冬葵子各二兩 通草二兩 大棗十二枚

右水六升煎二升半分二服

治脾氣不利小便不通

橘紅為末以二錢空心溫酒下

治肺氣不利小便不通 杏仁十四枚 去皮尖炒之食



治脬轉小便不利 滑石一錢 寒水石一錢 煎服
一產婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二
年不愈此肺腎氣虛用補中益氣湯六味地黃
丸而痊

凡產婦小便頻數者乃氣虛不能制故也
小便不禁

廣濟方治產后小便不禁用雞毛燒灰千金翼用
白薇芍藥為末俱用溫酒下日三服或桑螵蛸
半兩龍骨一兩為末每二錢粥飲調下

薛氏謂若脾肺氣虛用補中益氣湯若肝腎陰虛

六味地黃丸若肝腎虛寒用八味丸

補脬飲 治胞破小便淋瀝 生絹黃色者一尺

白牡丹用根皮 白芨各一錢 水一碗煎至絹爛溫

服服後忌言語否則無功

雞內金散 治氣虛溺床用雄雞肫脰并腸燒為

末以溫酒調下

產後小便出血

此因虛熱血滲於脬也以亂髮洗淨燒為末米飲



調服或滑石末一錢生地黄汁調下
一產婦尿血面黃脇脹少食此肝木乘脾土也用
加味道遙補中益氣煎服而愈後為懷抱不禁
食少躄倦驚悸無寐便血復出用加味歸脾湯
二十餘劑將愈惑于衆論服犀角地黄湯諸症
復作仍守前湯而愈
產後陰脫玉門不閉
此因坐產努力舉動房勞所致或脫肛陰挺逼迫
腫痛小便淋瀝

薛氏謂氣血虛弱宜用十全大補湯若腫脹焮痛
肝經虛熱也加味道遙散若暴怒肝脾氣血傷
也加味歸脾湯若暴怒肝火血傷也龍胆瀉散
一產婦玉門不閉發熱惡寒用十全大補湯加五
味子數劑而寒熱退用補中益氣加五味子數
劑而玉門閉矣

硫黃散 產後陝氣虛寒 硫黃 烏賊魚骨

五味子

各半

為末摻患處

一方蛇床子亦

炒熱帛包熨患處亦治陰腫

產後乳少或止

乳汁乃氣血所化若元氣虛弱則乳汁短少初產
乳房焮脹此乳未通若暴怒乳出肝經風熱若
累產無乳此內亡津液蓋乳汁資於衝任若婦
人疾在衝任乳少而色黃生子則怯弱而多疾
薛氏云此氣血虛弱而不能化生宜壯脾胃怒動
肝胆而乳腫汁出宜清肝火屢產無乳或大便
澀滯當滋化源氣血旺則乳汁溢
一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴

此氣血虛以玉露散補之而愈

湧泉散 能通乳 王不留行 麥門冬 瞿麥

龍骨

各二錢

右用猪蹄汁一碗酒一杯煎服良

父以木梳于乳房上梳下忌姜椒辛辣

玉露散 乳脉不通身軀壯熱頭目昏痛大便澀

滯 人參 茯苓 桔梗 妙芍藥各一錢 甘草 各一分

右咬咀水煎服愈

凡未產而乳先出謂之乳泣生子多不育

產婦氣血方盛乳房作脹或無兒飲因而脹痛增



寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服之立消
一產婦勞役或乳汁來如湧泉昏昧吐痰此陽氣
虛而厥也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯
數劑而安矣

一婦乳頭裂破以秋茄子裂開者陰乾燒存性為
末水調塗之而愈

婦人繭唇

內經曰脾氣開於口又曰脾之榮在唇蓋燥則乾
熱則裂風則瞶寒則揭若腫起白皮皴裂如蚕

繭名曰繭唇有腫重出如繭者有本細末大如
繭如瘤者其因或胎產經行而陰血損或七情
動火而榮血虧或心火傳授脾經或厚味積熱
傷脾大要審本症察兼症補腎水生脾血則燥
自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者
不察內用清熱消毒之藥外用追蝕線結之法
反為敗症慎哉

一婦懷抱久鬱或時胃口嘈辣胸膈不利月水不
調晡熱食少躰倦唇腫已年餘矣此脾經鬱火



傷血用歸脾湯加姜汁炒黃連山梔少佐吳茱萸
萸嘈辣頓去飲食少進乃去黃連加貝母遠志
胸膈通利飲食如常又用加味逍遙散歸脾湯
間服百餘劑月水調而唇瘡愈

一婦月經不調而足發熱至年餘而身亦熱勞則
足腿痠疼又年餘唇腫裂痛又半年唇裂出血
形躄瘦倦飲食無味月水不通唇下腫如黑棗
此肝脾血虛火症也彼不信用通經藥而致

一婦口若腸脹此肝火之症也用小柴胡加山梔

黃連少愈更以四君子加芍藥當歸柴胡調補

脾胃而瘥

一婦每怒口苦發熱晡熱此肝火盛而血傷也以
小柴胡合四物二劑以清火而生血更以四物
加柴胡白朮茯苓丹皮生血健脾而安

一婦因怒齒痛寒熱作嘔用清胃芍藥益甚乃肝
火傷胃寒涼復傷故也用六君子加芍藥柴胡
山梔而安

一婦胃中嘈辣甚則熱痛後患齒痛此胃中痰火



也。以二陳加芩連吞越鞠丸而瘳。

一婦因怒牙疼寒熱此肝火侮脾土用小柴胡加芎歸苓朮山梔而疼痛止用加味逍遙散而寒熱退。

清胃散

治醇酒厚味唇齒作痛或齒齲潰爛或

暈頭面頸項作痛

黃連錢炒半 川歸 生地

丹皮錢各一 升麻錢二

右水煎服如寔熱便秘加

大黃

加味清胃散

即前方加犀角甘草連翹

涼膈散

治積熱煩渴面赤內熱頭昏咽痛便溺

赤澁狂言譫語睡卧不安

大黃 朴硝錢各一

甘草錢一 連翹錢二 梔子

黃芩 薄荷錢各三 水煎服

補黃散

治脾胃虛熱口舌生瘡畏冷飲食

人參 白朮錢各一

白芍炒 陳皮 甘草錢各五分

右姜東水煎服

四順清涼飲

加山梔大力子名加味清涼飲

治臟腑寔熱秘結口舌生瘡

當歸 赤芍

甘草

大黃錢各一 右水煎服



人參安胃散

治服峻劑損脾胃口舌生瘡

人參

茯苓

錢各一

黃耆

錢二

生甘草

炙甘草

黃連

錢各五分

白芍

錢七分

水煎服

溫中丸

一名人參理中丸

治中氣虛熱口舌

生瘡不喜飲冷肢躄倦怠少思飲食

人參

炙甘草

白朮

錢各五分

為末姜汁糊為

丸梧子大每服五十九白湯送下

柳華散

治熱毒口瘡

黃柏

炒

蒲黃

青黛

人中白

煨

右等分為細末敷之

四物湯

治血熱口舌生瘡或牙齦腫潰發熱煩

躁不安

加味四物湯

即四物加丹皮柴胡山梔

四物二連湯

治血熱口舌生瘡或夜發寒熱

當歸

熟地

白芍

炒

川芎

胡黃連

川連

炒

錢各一

水煎服之

甘桔湯

治咽喉腫痛

甘草

錢六

苦梗

錢三

右水煎服



赤水玄珠婦人門第二十四卷

耳

結核方論

赤白遊風

婦人瘰癧

鶴膝風

足跟瘡腫

肺癰

腸癰

乳癰乳岩



赤水玄珠婦人門第二十四卷

耳

結核方論

赤白遊風

婦人瘰癧

鶴膝風

足跟瘡腫

肺癰

腸癰

乳癰乳岩



赤水玄珠婦人門第二十四卷

新安生生子孫一奎著輯

耳

立齋曰耳瘡屬手少陽三焦及足厥陰肝經血虛
風熱或怒動肝火而致若發熱焮痛屬三焦厥
陰風熱用柴胡清肝散若寒熱作痛或作嘔吐
乃肝火傷脾用益脾清肝散若口乾足熱為肝
腎陰虛用益陰腎氣丸若月經先期為血熱用
加味逍遙散過期為血虛用八珍湯食少躰倦



為鬱火加味歸脾湯惡寒發熱肢躄倦怠為氣血俱虛用十全大補湯慎不可專治其外復傷氣血也

一婦耳內外腫痛胸膈不利寒熱往來小便不調此肝火傷血先用龍胆瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味道遙散而痊又因怒復作用柴胡而安

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間

結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味道遙散調補肝脾而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

小柴胡湯 治肝胆經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咬嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉痢咳嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之





柴胡 二錢 黃芩 錢 一人參 半夏 各七分

炙甘草 五分 姜三片 水煎服

加味小柴胡湯 治肝胆經風熱前後腫痛或

結核焮痛或寒熱晡熱或經候不調等症

即前小柴胡湯加山梔丹皮

益脾清肝散 治肝經之症寒熱躄痛脾胃虛

弱 人參 白朮 茯苓 各一錢

炙甘草 柴胡 各五分 川芎 川歸

黃耆 各一錢 丹皮 七分 水煎服

梔子清肝散 治三焦及肝胆經風熱耳內作

痒或生瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往來

柴胡 山梔 炒 丹皮 各一錢 茯苓 川芎

芍藥 當歸 牛旁子 炒 各七分 白朮 炒

甘草 各五分 水煎服

柴胡清肝散 治肝胆三焦風熱怒火以致項

胸作痛或頭目不清或耳前後腫痛或寒熱躄

痛 柴胡 黃芩 炒 甘草 各五分 人參

山梔 炒 川芎 各一錢 連翹 桔梗 各八分 水煎服

犀角地黄湯

治上焦有熱口舌生瘡發熱或

血妄行或吐衄或下血

犀角

生地

白芍藥

黃芩

炒

牡丹皮

黃連

炒各一錢

水煎服

因怒而患者

加柴胡山梔

犀角升麻湯

治陽明經風熱牙疼或唇頰腫

痛或手足少呎經風熱連耳作痛

犀角

升麻

防風

羌活

各一錢

白附子五分川芎

白芷

黃芩

炒各七錢

甘草五分

水煎服

當歸川芎散

治手足少陽經血虛瘡症或風

熱耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食

或經水不調胸膈不利腹脇痞痛小便不調

當歸

川芎

柴胡

白朮

炒

芍藥

炒各一錢

山梔

炒二分

錢

丹皮

茯苓

各八分

蔓荊子

甘草


各五分

水煎服

雜方

加味地黄丸

治肝腎陰虛諸症或耳內痒痛



出水或眼昏痰喘或熱渴便澀等症

乾山藥 山茱萸 牡丹皮 澤瀉 柴胡

白茯苓 熟地黃 生地 五味子 各等分 為末

右將煉蜜為丸梧子大每服百丸空心白湯下如不應加減八味丸

人參養榮湯 治潰瘍寒熱四肢倦怠瘦少

食面黃氣短不能收斂大瘡愈後多服之庶不變他症也

白芍藥 一分 人參 陳皮 黃耆 炒

桂心 川歸 白朮 炒 炙甘草 各一分

熟地 五味 炒 茯苓 各七分 遠志 去心炒 五分

入姜枣水煎服

瀉青丸 治肝經實火脇乳作痛或惡寒發熱

大便秘結

川歸 龍胆草 炒焦 川芎 山梔 炒 大黃

羌活 防風 各等分

右為末蜜丸梧子大每服三四丸白湯下○若陰血不足肝火血燥用四物加山梔柴胡或逍



遙散加丹皮山梔○若腎水虧損不能生肝木而筋挛結核或肢節挛搐或似中風涎痰上湧用六味丸料煎服

生地黄丸 治師尼寡婦室女乍寒乍熱或頸

間結核肝脉弦長直出魚際

生地 秦元 黃芩 硬柴胡各五分

赤芍藥一兩 右煉蜜為丸梧子大每服三十

丸烏梅湯下

連翹飲子 治肝胆經氣滯癭癧結核或乳內

結核者 連翹 川芎 瓜蒌仁

橘葉 皂角刺炒 青皮 甘草節

桃仁各一錢 水煎服

散腫潰堅湯 治療癭堅硬氣血熱虧者

升麻 連翹 川歸尾 白芍

葛根 三稜酒拌炒 廣木各三分 龍胆草

桔梗炒 昆布 知母酒炒 瓜蒌仁各五分

柴胡四分 黃芩酒炒五分 炙甘草二分

右水煎服



必効散

治癰癤未成者消已潰者斂須元氣

無虧者可服孕婦勿服

南蓬砂二錢

輕粉一錢

斑貓白十枚去頭

去米

射香五分

巴豆五粒去

白換榔一枚

右為末每服一錢五更用滾湯調下如小水

滯滯或微疼此癰毒欲下也進益元散一服

即下此方斑貓巴豆似為峻厲然用巴豆

乃解斑貓巴豆用者勿畏也

益元散

滑石飛六錢

甘草

各為末每服一二錢白湯調下

琥珀膏

治頭項或腋下初結小核漸如連珠

潰而膿水不絕或漏症者

琥珀一兩

丁香

桂心

硃砂

木香

松香俱為末

白芷

防風

當歸

木通

木別子肉各五錢

麻油二斤

將后五味入油煎熬藥焦濾去渣徐徐入黃丹

再熬軟硬得所入前末藥即成膏矣

針頭散

治一切頑瘡內有瘀肉或癰核不化



瘡口不合宜以藥腐之

赤石脂

五錢

乳香

白丁香

砒霜

生用

黃丹

各一錢

輕粉

射香

各五錢

蜈蚣

一條

為末搽瘡肉上其肉自化若瘡口小用糊和作細條陰乾經之凡瘡久不合者內有膿管必須用之

結核方論

婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾或因胎產經行失於調護或因暴怒觸動肝火若結於項側耳前

後或胸脇腫痛或發寒熱屬胆經風熱怒火宜用柴胡清肝散加釣藤山梔以養血氣清肝火若結于肉理其色不變晡熱內熱屬肝火血虛宜加味逍遙散加龍胆草以養肝血清肝火或結于肢節或累如貫珠其色不變亦肝火血燥而筋挛宜用柴芍參苓散加釣藤以養血氣佐以六味丸以生腎水若時消時作此氣滯而痰結也用歸脾六君二湯以調和脾肺之氣並佐以海藻丸若潰而核不腐或肉不生或膿水

清稀肌寒肉冷自汗盜汗寒熱內熱面色痿黃
食少躰倦便利不調者五臟皆虛也但用補中
益氣加味六君子二湯調補脾胃以滋諸臟則
各症自退故經云形傷則痛氣傷則腫慎不可
輕用行氣破血而洩傷也

一婦項結核寒熱頭痛脇脹乳痛內熱口苦小便
頻數屬肝火血虛用加味四物而愈又用加味
逍遙散調補肝脾而安

一婦耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不
調與肝胆經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮
及六味丸而愈

一婦項患五核時常寒熱肝脈弦長而出寸口與
血盛無偶之症也用小柴胡湯加生地烏梅而
愈

加味逍遙散

治肝脾血虛有熱遍身搔痒或

口燥咽乾發熱盜汗食少嗜卧小便澀滯等症
又治瘰癧流注虛熱等瘡

炙甘草

當歸炒

芍藥酒炒

茯苓





白木

炒各錢

柴胡

牡丹皮

山梔

炒五分

水煎服

逍遙散

即前方減丹皮山梔

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮

傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不

寐或心脾傷痛嗜卧少食或憂思傷脾血虛發

熱或肢體作痛大便不調或經候不准疇熱內

熱或瘰癧流注不能消散潰欬

人參

白木

黃耆

茯苓

當歸

遠志

酸棗仁

炒各錢

木香

炙甘草

各五分

龍眼肉 三枚

姜棗水煎服

加味歸脾湯

即前方加山梔柴胡

柴朮參苓湯

治肝火血熱適身搔癢或起赤

暈或筋孿結核

白木

人參

茯苓

各一錢

柴胡

川芎

山梔

芍藥

甘草

炒各五分

熟地

當歸

各八分

水煎服

柴芍參苓散

治肝胆經部分結核瘰癧瘰癧

等症或肝血燥脾氣虛弱發熱少食

柴胡炒 芍藥炒 人參 茯苓 白木炒

山梔炒 陳皮 當歸各一錢 丹皮 甘草

各五分 姜枣水煎服

清肝益榮湯 治肝胆經風熱血燥筋挛結核

或作癩子 柴胡 薏苡仁 茯苓

木瓜 燕地各一錢 山梔 龍胆草

白木各五分 川芎 川芎 芍藥各一錢

甘草三分 水煎服

清熱涼血飲 治風熱血燥丹毒等症大便秘

結 當歸 川芎 大黃炒 芍藥炒

生地各一錢 水煎服

神効開校散 消癭塊甚効

沉香 木香各二錢 橘紅四兩 珍珠四十九粒

封固煨 猪鬃子四十九枚 豚脰生

赤存性出火毒 為末每服一錢臨卧酒調徐徐嚥下輕者三

五服重者十服可愈切忌酸鹹油膩滯氣之

物須用除日子靜室修合



海藻散堅丸

治肝經癭瘤

海藻

昆布

各二兩

小麦

四兩醋煮

柴胡

二兩

龍胆

酒拌炒焦二兩

為末蜜丸梧子大每服三十

丸臨卧白湯送下噲化嚙之尤妙○凡患癭

癭服調治之藥未應宜佐以前二藥

益氣養榮湯

懷抱抑鬱癭癭流注或四肢患

腫肉色不變或日晡發熱或潰而不斂

人參

茯苓

陳皮

貝母

香附

川芎

川芎

黃耆

鹽水拌炒熟地

芍藥

炒各一錢

炙甘草

桔梗

炒各五分

白朮

炒二錢

入姜水煎服

木香餅

治氣滯結腫悶胸風寒所傷作痛

木香

為末五錢

生地

一兩

搗地黃膏和勻量患

大小作餅子置患處以熱熨斗熨之腫痛悉

退

當歸飲

治熱血癭疹痒痛膿水淋漓發熱等

症

當歸

白芍藥

川芎

生地

白芨黎

炒

黃耆

各一錢

防風

荆芥

何首



烏呂鉄

甘草各五分

水煎服

赤白遊風

婦人赤白遊風屬肝經鬱火血燥生風或脾經鬱結血虛生熱或腠理不密風邪外襲其症或疙疹癢痺或膿水淋漓白屬氣而赤屬血因得風而遊行也若肝經血燥用柴胡清肝散肝經怒火用梔子清肝散肝經血熱用加味四物湯肝火血虛六味丸脾經鬱熱加味歸脾湯肝脾血虛風熱加味道遙散若因風邪鬱熱所致用荆

防敗毒散或專用祛風之劑肝血愈燥則血隨火化反為敗症矣

一婦身如丹毒搔破膿水淋漓熱濕頭暈晡時益甚用加味道遙散而愈

一女赤暈如霞作痒發熱用加味小柴胡加生地連翹丹皮而愈○大凡女子天葵未至婦人月經不調受驚着惱多有此症

消風散


治風寒癢疹痒痛或膿水淋漓頭皮

腫痒

荆芥穗

炙甘草

陳皮



人參

茯苓

白姜蚕

炒

防風

芎藭

藿香

羌活

蟬蛻

各一錢

厚朴

姜制五分

水煎服

大連翹飲

治風熱熱毒赤白遊風表裏皆受

患者

連翹

瞿麥

荆芥

木通

蟬蛻

甘草

赤芍

防風

柴胡

滑石

山梔

黃芩

炒

川歸

錢

水煎服

婦人痲瘋

一名便瘰 俗名瘰子

一名便毒

婦人痲瘋或肝經濕熱下注或鬱怒傷損脾肝其

外症或拘小腹腫痛或玉門爛腫作痛或寒熱

往來增寒壯熱其內症或小便澀滯或腹內急

痛或小腹痞悶或上攻兩脇或晡熱重墜若兩

拘小腹腫痛肝經濕熱壅滯也用龍胆瀉肝湯

玉門腫脹肝火血虛也用加味逍遙散及龍胆

瀉肝湯加木香若槩投散血攻毒之劑則誤甚

矣

一婦人拘中赤腫脹痛以膿內作用托裏消毒散



加此數劑潰而膿清寒熱乃氣血復虛用托裏散而寒熱止用十全大補湯百餘劑而斂

一婦人腹拘腫痛寒熱口苦或時帶下以肝經濕熱不利也用龍胆瀉肝湯而腫痛消用加味道遙散而寒熱退

一婦人腹拘腫痛小水不利時或胸乳作痛脇腹作脹以肝火氣滯用四物柴胡青皮玄胡木香而愈

一婦人兩拘腫痛腹內一塊不時上攻月經不調

小便不利余以為肝脾氣滯而血傷以四君子加芎歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前症復作兼胸滿腹脹盜汗以肝木甚而傷脾土也用加味歸脾湯下蘆薈丸而痊

一婦人陰中如梗兩拘腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜余以為肝脾鬱怒所致先以補中益氣加茯苓山梔車前子青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱而愈

龍胆瀉肝湯

治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中



疼痛或小水澀滯等症

龍胆草

酒拌炒黃

澤瀉

各一錢 車前子

炒

生地黄

酒拌木通

山梔

炒 黃芩

甘草

各五分

右水煎服

九味柴胡湯

治肝經濕熱下注便毒腫痛或

小腹脇肋結核凡肝胆經部分一切瘡瘍或風

熱結核瘰癧

柴胡

黃芩

炒名一錢 人參

山梔

炒 半夏

龍胆草

炒焦 川歸

芍藥

甘草

各五分

右水煎服

蘆薈丸

治肝氣不和剋侮脾胃而患諸症或

三焦肝胆經風熱目生雲翳或疔熱瘰癧耳內

生瘡寒熱作痛肌腠消瘦發熱作渴飲食少思

肚腹不調或牙齦蝕落頰腮腐爛下部生瘡等

疔

蘆薈

五錢

胡黃連

當歸

芍藥

炒龍胆草

酒浸炒焦 川芎

蕪荑


各一兩

木香

甘草

炒各三錢

右為末用米糊丸麻子大每服五十九滾湯



下

鶴膝風

婦人鶴膝風症因胎產經行失調或鬱怒虧損用脾而為外邪所傷或先腿脚牽痛先或肢躄筋挛既而膝漸大腿漸細如鶴膝之狀而名之也若高腫赤痛者易治若漫腫不赤痛者難治二三月潰而膿稠者易治半載後潰而膿清者難治設先攻伐虧損元氣尤為難治也大要當固元氣為主而佐以大防風湯若食少躄倦者六

君子湯為主補熱內執者逍遙散為主寒熱往來者八珍湯發熱惡寒者十全大補湯不寐而驚悸者歸脾湯月經過期者補中益氣為主月經先期者加味逍遙散為主凡潰後當大補脾胃若膿出反痛或寒熱煩渴等症皆屬氣血虧損一切主于補培庶保終吉

一婦患鶴膝兩拗中腿筋牽作痛內熱寒熱此肝火氣滯之症先用加味小柴胡湯四劑後以加味逍遙為主佐以大防風湯而消又患痢後



兩膝腫痛寒熱往來用十全大補湯為主佐以

大防風湯而全消

大防風湯

治陰虛邪襲腿膝腫痛等症

防風

附子炮牛膝

白朮炒

羌活 人參

各一錢

川芎一分

桂心

黃耆炒各一錢

芍藥

杜仲姜制各一錢

甘草五分

熟地半一錢

水煎服

黑丸子

一名和風定痛丸

治跌撲墜墮筋骨疼痛或癩

血壅腫或外感風寒肢體作痛若流注膝風初

結服之自消若潰而膿清與補氣血藥自斂孕

婦勿服

百草霜

白芍各一兩

南星

川烏各炮三錢

白蘇

赤小豆各二兩半

白芨

川歸

骨碎補

炒各八錢

牛膝六錢

右為末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯溫

酒任下

聖愈湯

治血虛心煩睡卧不寧或五心發熱


熟地黄

生地黄

黃耆炒

人參

川芎



川歸錢

水煎服

治火衰不能生土以致脾胃虛寒而
患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思
或食而不化或臍腹疼痛夜多漩溺益火之原
以消陰翳即安方也

熟地黄

自製乃佳八兩

山茱萸肉

山藥

各四兩

茯苓

牡丹皮

澤瀉

桂心

去粗皮能補腎而引虛火下行歸原一兩

大附子

用一兩五錢重者切四塊用童便浸數日火煨切看無白星為度

右為末蜜丸桐子大每服七八十九滾湯下

婦人足跟瘡腫

足跟足指腫痛足心發熱者皆因胎產經行失于
調攝虧損足三陰經虛熱所致若腫痛或出膿
用六味丸為主佐以八珍湯胃虛懶食佐以六
君子湯寒熱內熱佐以逍遙散晡熱益甚頭目
不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生瘡
亦用前三藥以滋化源大凡發熱內熱晡熱自
汗盜汗等症皆因虛假熱也故丹溪謂火起九
泉陰虛之極也蓋足跟乃督脉發源之所腎一



經所過之地若不求其屬而泛用寒涼則悞甚矣然俗謂為兔噬瘡者蓋獵人被兔咬足跟久而不飲氣血滙盡其人必死男子酒色過度者亦多患此症

一婦兩足發熱足跟作痛日晡熱甚此腎肝血虛用逍遙散六味丸五十餘劑諸症悉退

六味丸 此壯水制火之劑治腎虛發熱作渴小便淋瀝痰壅失音咳嗽吐血頭目暈眩眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟

五臟虧損自汗盜汗便血諸血凡肝經不足之症尤當用之蓋水能生木故也此水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑又治肝腎精血不足虛熱不能起床即仲景八味丸去附子桂心

肺癰

婦人肺癰因外內蘊熱或七情鬱火誤行汗下重亡津液以致肺氣受傷而惡風咳嗽鼻塞項強胸脇脹滿呼吸不利吐痰臭濁膿血腥穢若咳嗽喘急寒邪在表也小青龍湯咳嗽胸脹寒邪



內壅也葶藶大棗瀉肺湯脇脹咳唾腥臭膿已
成也桔梗湯咳喘短氣或小便短少肺氣虛也
佐以參耆補肺湯躰倦少食或喘嗽短氣脾肺
虛也佐以參朮補脾湯作渴飲冷午前嗽甚胃
火盛也竹葉石膏湯作渴內熱午後嗽甚陰血
虛也六味丸四物湯口乾飲湯躰倦少食胃氣
虛也補中益氣湯加五味麥冬口乾內熱咳嗽
痰涎腎水虛也六味丸益氣湯黃昏熱或嗽甚
陰火熾也六味丸四物湯加五味麥冬五更嗽

或痰甚脾肺虛也六君子湯嗽而不得眠及兩
脇疼肝火血虛也六味丸益氣湯大凡前症因
外淫所侵當祛邪而實上因心火太過當伐木
而補金若肺氣虛弱當補脾土而生肺金若陰
火上炎當補脾肺以滋腎水然而發熱喘嗽咳
唾膿血飲食不入皆脾土不能生肺金肺金不
能生腎水之敗症苟能純補脾土而生諸臟多
有復生者若用寒涼脾胃復傷則肺金失養腎
水益涸虛火上炎薰蒸于肺吾未見其能生之



者其唾膿血脈浮大面色赤者俱難治若陰火妄動或勞嗽吐膿血者尤難治若膿自止脈浮短瀉及始萌者易治

一婦素血氣發熱咳嗽服痰火之劑後吐膿血面赤脈數其勢甚危此膿成而氣血虛也用八珍湯補元氣桔梗湯治肺癰而愈

青龍湯 肺受風邪咳嗽喘急

半夏 乾姜 細辛 麻黃去根

肉桂 芍藥 炙甘草各一錢 五味子炒五分

大附子炮五分 水煎服

葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰胸膈脹滿上氣喘

急或身面浮腫鼻塞聲重用葶藶炒黃研末每

服三錢先用棗十枚水煎入藥再煎食後服


桔梗湯 治肺癰咳而胸膈隱痛胸次腫滿咽

乾口燥煩悶作渴濁唾腥臭

桔梗 枳殼 以仁 棗皮各炒 當歸

貝母 瓜蒌仁 甘草節 防已去皮各一錢 黃耆

鹽水炒 百合蒸各一錢半 五味子炒 甜葶藶炒



地骨皮 知母炒 杏仁各五分 姜水煎服

人參補肺湯 治肺癆腎水不足虛火上炎咳

唾膿血發熱作渴小便不調

人參 黃芪炒 白朮 茯苓 陳皮

川歸各一錢 山茱萸 山藥各二錢 五味子 麥冬

炙甘草各七分 丹皮一錢 熟地一錢半 姜水煎服

參芪補脾湯 治肺症因脾氣虛弱咳唾膿涎

中滿不食宜蒸服以藥以補脾土生肺金

人參 白朮各二錢 黃芪各二錢半 茯苓

川歸 陳皮各一錢 升麻三分 五味子四分

炙甘草 姜水煎服

人參平肺散 治心火尅肺金患肺痿咳嗽喘

嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽噎不利方見嗽門

腸癰

婦人腸癰因經行產後瘀血或七情飲食所致其

証小便如淋發熱惡風身皮甲錯腹皮腫急按

之軟如腫狀或腹脹大轉側有水聲或繞臍生

瘡或大便出膿其脉遲緊者膿未成用活命飲



以解其毒脉滑数者膿已成用雲母膏以下其膿若二年間遍身微腫大便與臍出膿其息積之症也多致不救內經云腸癰為病不可驚；則腸斷而死其坐卧轉側宜徐緩時常少飲稀粥靜養調理庶可保生

一婦人小腹腫痛小便如淋此毒結于內用神効瓜萎散二劑少愈又以薏仁湯二劑乃痊

一婦小腹痛而有塊脉芤而瀉此瘀血為患以四物加玄胡索紅花菀仁牛膝木香二劑血下而

愈

一婦小腹脹痛大便秘瀉轉側有水聲脉洪數用薏苡梅仁湯一帖下去瘀血諸症頓退以薏以

仁湯二帖而瘥

一婦小腹脹痛小便不利脉滑數此膿已成服太

乙膏五錢膿大下脹痛悉退以瓜萎散蠟丸丸托裏藥而安

一婦因經水多服藥止之致腹作痛以失笑散二帖而瘥又用加味逍遙散數劑而經調



一產婦惡露停滯小腹作痛服瓜仁湯下瘀血而
痊凡瘀血停滯急宜行之緩則腐化為膿最為
難治若流注閼節則患骨疽多為敗症

瓜子仁湯

治惡露未盡或經行瘀血停滯小

腹作疼或成腸癰等症

方在孕癰卷

敗醬散

治脉数身無熱腹無積聚按之軟濡

此為腸癰乃久積陰冷所成

以仁

二兩

附子

兩半

敗醬草

一兩二錢半

每服四錢水煎服以小便利為度

牡丹湯

即牡丹皮散

治腸癰腹軟而痛時下膿

血

方在孕癰卷

千金大黃牡丹湯

治腸癰小腹堅腫按之則

痛肉色如故或焮赤微腫小便頻数汗多增寒
脉遲緊未成膿者宜服之

梅仁湯

治腸癰壅痛大便秘澀

二方在外科腸癰門

神仙蠟礬丸


最解毒止痛

方在癰疽門

失笑散

產後心腹絞痛或血迷心竅不知

人事及尋常腹內瘀血積血作痛



五灵脂

炒

蒲黃

炒等

為末每服二錢酒調下

乳癰乳岩

經云乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足少陰胃經若
乳房忽墜腫痛結核色赤數日之外焮痛脹潰
稠膿湧出膿盡而愈此屬胆胃熱毒氣血壅滯
名曰乳癰為易治若初起內結小核或如鰲棋
子不赤不痛積之歲月漸大巉岩崩破如熟榴
或內潰深洞血水滴瀝此屬肝脾鬱怒氣血虧

損名曰乳岩為難療治法焮痛寒熱宜發表散

邪腫焮痛甚宜踈肝清胃或不作膿成不潰宜

用托裏或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃或膿

出反痛惡寒發熱宜補氣血或腫焮作痛補熱

內熱宜補陰血或飲食少思時作嘔吐宜補胃

氣或飲食難化泄瀉腹痛宜補脾氣或勞碌腫

痛宜補氣血怒氣痛腫宜養肝血甚不可用剋

伐之劑復傷脾胃也乳岩初患用益氣養榮湯

加味逍遙加味歸脾可以內消若用行氣破血



之劑則速其亡

一婦內熱脇脹兩乳不時作痛口內不時辛辣若
卧而起急則臍下牽痛此帶脉病也小柴胡加
青皮黃連山梔二劑而安

一婦先熱渴至夜尤甚後兩乳忽腫肝脉洪數乃
熱入血分用加味小柴胡湯而愈

一婦膿清腫硬面黃少食內熱晡熱自汗盜汗月
經不行此肝脾氣血俱虛也用十全大補加遠
志貝母及補中益氣各三十餘劑外用葱熨法

而消

一婦久鬱左乳內結核如杏三月不消心脉滯脾
脉大按之無力此肝脾氣血虧損以八珍加貝
母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘帖而消

一婦右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不
甘此肝脾氣血虧損內服益氣養榮湯外以木
香餅熨之年餘血氣復而消

一婦乳內結核年餘晡熱食少此血氣不足欲用
益氣養榮湯彼欲効速另服行破之劑潰出清



膿而歿

一婦乳內結核如粟亦服前藥大如覆碗堅硬如石出血水而歿

神効瓜蒞散 治乳癰及一切癰疽初起腫痛

即消膿成即潰膿出則愈

瓜蒞

一箇 爛研

生粉草

當歸

酒洗各半兩

乳香

錢各一

用酒煎服良久再服若

肝經血虛結核久而不消佐以四物柴胡升麻

白朮茯苓甘草若肝脾氣血虛弱佐以四君芩

湯 煇柴胡升麻若憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸脾

玉露散

治產後乳脉不行或身軀壯熱頭目

昏痛大便澀滯等症

人參

茯苓

桔梗

川芎

白芷

當歸

芍藥

甘草


五分

右水煎服

乳癰初發

貝母為末每服二錢熱酒下即以二手覆按





國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.



Handwritten Chinese characters in blue ink, possibly a title or author's name, located on the left page of the book.

100/1522 v. 21



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





赤水玄珠第二十五卷幼科目錄

初誕門

甘草法

硃蜜法

秘法

斷臍法

回氣法

戒灸

浴兒法

下地不啼哭

初生大小便不通

胎毒宜下

穀道不通

週身無皮

遍身發泡

陰囊入腹不下

噤風

幼

科

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



目錄終

項軟

斷乳法

腫齦

木舌

口瘡

丹毒

客忤

滯頤

行遲

語遲

腫腭

重舌

赤遊風毒

軀帝

慢驚

明驚風篇

入門看証歌

診脉歌

風熱

鼻風傷顙

腸癰

夜啼

急驚風

變蒸

看顙顙要畧

看形色声音脉息

潮熱

鷺口白屑

臍汁不乾

臍風

撮口

臍突光腫



赤水玄珠幼科第二十五卷

新安生生子孫一奎著輯

小兒門

諸雜症大方脉可以槩治者茲不復錄所
錄惟異於大方脉者省繁瑣便應治也顧
余不文然幼科但當闡明証候選擇良方
俾婦人女子皆可通曉庶為法旨

初誕門

小兒初誕猶如嫩蕊嬌花切當調護得宜庶無不



測之症古謂初離母體口有液毒啼聲未出急
用絲綿裹指拭去口中濁穢為妙此固良法然
倉卒多不暇及且亦多有拭之而不見物古人
有落地解毒法回氣法將護法種、森立蒐輯
于左以為保生良式

甘草法 臨月預備甘草少許以綿裹之臨產時
用沸湯浸盞內俟兒落地未出聲時急取綿裹
指頭蘸甘草汁拭其口次用硃蜜法

硃蜜法 用甘草湯飛過硃砂末三五分以蜂蜜

拌勻旋抹口中使其嚥下不獨鎮心安神能解
一切胎熱惡物之毒免痘熱之患

又秘法 用本兒落下臍帶瓦上焙燥為末入辰
砂黃連甘草各末五分和勻蜜拌做三五次塗
乳母乳上俟兒吞之必使一日夜吞盡次日惡
毒皆從大便而出日後不但痘疹稀疎竟有不
出痘者俟臍帶落下即便製服在六七八日之
間為妙其辰砂必須研極細末以甘草湯飛過
任服無害此方一以解毒一以補養蓋臍帶乃



有生初之河車也繫於母之命門兩腎之所主
乃以腎補腎腎既充足即不受邪故無他日多
黑歸腎之症亦無顛門不合之疾生一兒即得
一兒真保生最上一乘良法

斷臍法 千金論云凡結束所留臍帶大約六寸
長則傷肌又斷臍切不可用刀割蓋鉄器寒冷
恐傷生氣只須隔單衣咬斷後將暖氣呵七口
庶無內吊之疾必先用熱湯浴過方斷臍若斷
後浴之恐水氣入內令兒腹疼

回氣法 初生氣欲絕不能啼者必是難產或冒
寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍且置
炭火上燒之仍作大帟撚蘸芝麻油點着于臍
帶上徃來遍燎之使火氣入臍則腹中溫暖更
用熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可
浴洗斷臍切記

戒灸 北方誕後三日每用艾灸顛門以免驚風
緣北方地土嚴寒故俗灸之以禦寒善調護者
何必令兒受此一翻痛苦也今南方每亦倣效



予屢見灸後發熱大小便秘因而驚搐遂致不
救良切憫焉殆無事生事也詎思南方地熱孰
孕者又不斷慾食淡厚味是貪恣情肆意胎已
受毒加之以灸是以油濟火也曷克當之

浴兒法 第三日浴兒予每用五枝湯極妙五枝
者桑槐榆桃柳是也各取嫩枝三寸長者二
三十節煎湯看冷熱入豬膽汁二箇浴之周歲
內可免瘡疥丹毒又可以避邪惡 蓋三日浴
兒俗禮也倘見生脆弱遲十數日或半月亦無

害擇晴明吉日於無風房內浴之

兒生下地即不啼哭不融吞乳奄奄如死者急看
喉間懸癭前膊上有一泡用指搗破以帛拭去
惡血勿令嚙下即能通聲吞乳

初生大小便不通腹脹欲絕者急令人溫湯漱淨
口吸啞兒之前後心臍下兩手足心共七處每
處吸啞五七口取紅赤色氣透為度氣透則便
自通

輕号散 初生大便不通

輕粉錢 生蜜拌熱湯調點兒口中一二次立通



初生六七日不小便 葱白三四寸搗爛人乳拌入兒口內再與乳吮嚙下即通

楊氏曰小兒在胎受病非一六抵裏氣蘊結壅閉不通宜早取下胎毒

千金論曰小兒始生其氣尚盛若遇疾病即須下之不及時必成別症

凡下胎毒只宜用淡豆豉濃煎汁與三五口其毒自下又能助養脾氣消化乳食

初出胞胎而不吮乳者或由產母過度胎中受寒

則令兒腹痛故不吮乳亦有口中惡物拭之不及嚙下腹中致令嘔吐茯苓丸木香散治之

茯苓丸 治惡血入腹、脹氣短不能吮乳

赤茯苓 黃連 枳殼炒各等分 右為末煉蜜丸

梧子大每一丸乳汁磨下 冷者去黃連

木香散 治惡穢入腹嘔吐不止

木香 乾姜 茯苓 木瓜 甘草炙 丁香各

分 右為末每服一錢生姜一片水煎綿蘸捏入

口中効



奇方 治初生不乳及不小便葱號散

葱白打四界破之以乳汁砂礮內煎灌之立効
小兒初生穀道不通多致不救非藥后可治曾有
人以銀筋頭燒紅穿通其竅大便始出亦有
用玉簪穿通者

初生下週身無皮俱是紅肉宜速取白和米粉遍
身撲之其皮漸生一日撲三四次以皮遍為度
初生下週身如魚泡或如水晶擦破則水滲流以
蜜佗僧研極細炒過乾摻仍服蘓合香丸

初生六七日後陰囊收縮入腹啼哭不止者受寒
所致蓋寒則收引也


硫黃 吳茱萸 各五錢 為細末研大蒜調塗臍下
仍以蛇床子微炒帛包慰其囊即下

初生受風鼻塞不能吮乳不可輕易發散惟大天
南星為末生姜自然汁調成膏貼於顛門即愈
又方 草烏皂莢為末葱汁搗膏貼於顛門効

噤風撮口臍風

三種病也

噤風者眼閉口噤啼聲漸少舌上聚肉如粟米狀



吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感
受熱氣毒流心脾故形現於喉舌也或下復為
風邪搏擊所致一百二十日已前見此皆名_風撮口者
面目黃赤氣自喘急啼聲不出蓋由胎氣
挾熱薰之風邪入臍流毒心脾之經故令舌強
唇青撮口撮而妨於吮乳若口出白沫四肢冷
者不可救也其或肚脹青筋吊腸卵疝內氣引
痛皆腸胃結滯不通治宜疎利蓋撮口最為惡
候月內見之尤急候也

臍風者非獨謂斷臍之時為水濕風邪所乘多因
胎中受熱薰之風濕所激遂令肚脹臍腫身體
重而四肢柔直啼而不乳甚則發為風搐若臍
邊青黑薰之撮口乃是內搐不治瓜甲黑者即
死其或熱在胸堂伸引努氣亦令臍腫可與千
金龍膽湯

此三症受病之源皆緣胎毒大槩稟氣壅滯
總宜取下胎毒為好不可因循畏手畏足姑
息悞事古方天麻丸定命丹朱銀丸可量與



之瀕危多活每見臍風撮口七日內見之百

難一生

凡見此三症急看口中齒齦上有小白點如粟米大即宜以溫水蘸帛裹指揩去或用銀簪挑去即能開口吮乳不必服藥此感之淺者也感之重者照後方按治

安臍散 治臍中汁出或赤腫

白石脂 研極細一日三度傳之 或用油頭

髮燒灰傳 或當歸末傳亦佳

千金龍膽湯 治胎驚月內氣盛發熱臍風撮口

壯熱四肢搐掣發熱大吐及變蒸不解中惡客忤鬼氣并諸驚癇悉皆治之十歲已下皆可服有魁氣者加人參當歸兒大者一歲加五錢

龍胆草 釣藤 柴胡 黃芩 桔梗 芍藥

茯苓 甘草 各五錢 蟬螂 二枚去翅灸 大黃 煨二錢半

右每服二錢水煎去半服之以漸加之俟大便行即止 直指方加防風麥門冬以導心熱黃芩減半加北棗無蟬螂亦可

控痰散

治噤風先用此吐風涎次與益脾散和

蝎尾

銅青各五分 硃砂錢一 膩粉字一 射香分一 為細末每服字一 茶清調下或用甘草湯吐痰亦可

甘草湯

治撮口取吐風痰

甘草

錢三

水煎服令吐出痰涎却以猪乳點入口中即愈

益脾散

和胃進乳

白茯苓

人參

草果

煨

木香

濕帝包煨

甘草

陳皮

厚朴

姜製

蘓子

炒各一分

右每服二三錢看大小水煎服

辰砂膏

治眼閉口噤啼声不出吮乳不得口吐

白沫大小便皆通

辰砂

錢三

硼砂

牙硝

錢半

玄明粉

錢二

射香

字一

全蝎

珍珠

錢各一

右為細末

厚油帛包封自

成膏

每服一莛許粒薄荷金銀湯下

天麻丸

斷臍後為水濕風冷所乘入臍流於心

脾遂令肚脹臍腫四肢柔直日夜多啼不能吮



乳此藥利驚化痰凡釣腸鎖肚撮口並効

南星錢二白附子炮牙硝 天麻 五灵脂

全蝎錢一輕粉分五巴霜字一 右為稀糊丸麻子

大每服三丸薄荷生姜湯送下

定命丹 治急驚天釣撮口通利痰熱水一方無

射香各五分冰片字一 右為末

青黛錢各半輕粉 射香各五分冰片字一 右為末

粟米糊為丸菜豆大每服一九荆芥薄荷湯

化下先研半分次入鼻中

僵蚕散 治撮口

僵蚕諸水者二條去為末用蜜調傅唇口中立効

蝎梢散 治胎風撮口臍風及百日内急驚風并

諸痰症


蝎梢四十箇姜蚕去嘴洗去系冰片 射各一

右蝎梢每一個用薄荷葉包線扎定砒礞內

炒至薄荷乾為度全姜蚕研細入冰射和勻

用赤雄鷄肝二片煎湯調下一二分

牛黃散 治初生七日内口噤



牛黃錢錢 為末以竹瀝調一字灌之更以猪乳

點入口中

撮風散 治撮口

蜈蚣赤足者 鈞藤 硃砂 蝎梢 僵蚕似各

射香字 右為末每服一字用竹瀝調下

立聖散 治噤口

蝎梢個 乾蜘蛛一個去嘴足以竹瀝粉

為末研勻每服一字乳汁調時時滴入口中

蜈蚣散 治口噤不開不能吮乳

赤脚蜈蚣多焦去頭足半條 為末入射香少許以猪乳

一合分三服

盖猪乳治小兒口噤最良凡取猪乳須令小豬
兒吮喫方其吃時將小豬後脚提起其口即開
急將取之即得乳也非此法不能得

蜘蛛散多焦去鬚足一效 為末猪乳調灌神効 右亦治

牙疳加射香神効

硃銀丸 治疇風壯熱痰盛翻眼口禁取下胎中

蘊受之毒亦治驚積量病用之



全錫

錢一

白附子

錢半

南星

炮

硃砂

字一

牛黃

芡會

各五分

天漿子

射香

各五分

冰片

字一

僵蚕

條水銀

錢一 肉研如泥

鉛霜

五分 水銀研

右為末粟米糊為丸如芥子大每一丸薄荷

湯下如未利加至二三丸

射香散

治臍風撮口

赤脚蜈蚣

酒炙 半條

川烏頭尖

三個

射香

少許

右為末每服半字金銀湯調下

立聖散

治臍風撮口

赤蜈蚣

一條 酒炙

蝎梢

七個

瞿麥

五分

姜蚕

七個

右為末先用鷲毛管吹少許入鼻啼哭則可

治仍用薄荷湯調服三五分

臍突光腫

臍汁不乾

附腸癰

生生子曰小兒月內旬日臍突光腫如吹捻動微

响赤腫虛大可畏此由初生先斷其帶束縛不

緊浴洗之時濕入所致用外消散敷之臍汁不

乾者內有濕熱及血熱而然宜涼血收濕之藥

搽之無不効者惟腸癰一症亦令臍中汁出小



腹腫硬按之則痛小便澀以淋時汗出惡寒
身皮甲錯肚皮紫如腫之狀按之濡或發熱無
汗洒浙惡寒皆其候也甚者腹皮脹大轉側腹
有水声或遠臍生瘡或膿從臍出或大便膿血
必有一足不能步皆為惡候

山梔五苓散 治小兒臍突

梔子仁炒 白朮炒 茯苓 猪苓 澤瀉各一錢

肉桂五分為細末每五七分參湯或灯心湯調下

二莖散 治臍突

赤小莖 豆豉 天南星製 白欬各等分

為細末每以五分芭蕉自然汁調敷臍四傍
一日一次三日三次但得小便下白物即消


外消散 臍突光腫如泡

大黃 牡蠣煨各五錢 朴硝一錢

右末多用田螺浸水調一二錢敷臍上其水
從小便而下即消

封臍散 臍中汁出

紅綿灰 龍骨煨 髮灰 面粉炒各一錢 胭脂一分



右末乾揅濕處

丹礬散 治同上

黃丹 枯礬 等分為細末敷上即乾

又方 蜜佗僧抄貝母 桑螵蛸焙為末揅之妙

又方 墻上多年白螺殼燒為末揅之佳

消癰蒼耳湯 但小腹作痛惡寒肚皮緊急一脚

不能舉步即是腸癰

蒼耳子錢二甘草分五杏仁 薄荷 瓜蒌各一

水酒各一鍾煎服其渣包敷臍上二服見効

有膿者加木香當歸各五分

四聖散 治腸癰乳癰一切癰疽便毒神効

黃瓜姜枚甘草錢四沒藥錢三乳香錢二

酒煎分二次服大便微澹瀉下惡物為妙

薏以仁湯 腸癰腹中疼小便澀

薏仁 瓜蒌仁 丹皮 桃仁各三錢

水煎食前服

神仙蠶礬丸 治腸癰有膿者極効空心酒吞五

六十九



太乙膏為丸梧子大每空心酒下六七十九腸癰
頰瘰

鷓口白屑

初生百日口中生白點不計其數拭之則去少刺
瘰有口角流涎水日夜啼哭不乳是也亦由胎
熱或乳母嗜食煖炙酒麵胎熱於兒用甘草黃
連各一錢煎湯以帛裹指口中拭去再不發
又方 桑樹枝條如煎竹瀝法煎汁洗之亦佳
又方 黃丹為極細末用竹瀝調塗口中洗之其

白點即落一日洗二三次再以辰砂益元散灯
心湯調下則不再作神妙

鼻風傷顛

凡乳母夜睡鼻孔切不可與兒頭相近恐呼吸鼻
風吹其顛門疾變百出慎之慎之

通關散 治鼻風吹顛令見鼻塞不能吮乳

香附子

炒

白姜蚕

炒

川芎

七分

荊芥

四分

細辛


二分

牙皂

分一

右末生葱白去鬚搗碎調藥塗顛上佳

潮熱



潮熱者今日發過明日復來如潮水之有信也有一日一發二日一發三日一發或一日兩發似瘧非瘧皆由調護失宜或冒風寒或傷乳食或發瘡疥或陰陽不和或虛熱骨蒸皆當認証速治亦有外感內傷以致臟腑壅滯而成實証當從權下之

一傷寒之後餘熱不解者宜脫甲散兼小柴胡湯

一內傷癖塊不消脾胃不和而成潮熱先服脫甲散次搗氣下之後調胃氣

一營衛有熱陰陽不和發為潮熱

一瘡疹後餘毒不解蘊成潮熱宜大連翹飲更與助胃氣則安

梨漿飲子 治潮熱及甚熱衛熱兩日一發三日

一發五臟蘊熱瘧熱夜發瘧瘧獨熱

青蒿苗

童便浸三次洗淨晒乾

柴胡 人參 前胡

黃芩 秦艽 甘草 或加生地黃 右看大

小三五錢水煎入生藕生梨薄苛葉煎服

脫甲散 治傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚



夾食寒熱大小便閉煩躁作渴冷汗妄流高滿
腹急日夜大熱并傷風傷暑驚癇客忤疴熱
柴胡 當歸 龍胆草 茯苓 知母 甘草
川芎各三錢 人參二錢 右看大小每服三五錢加
連鬚葱白三根水煎服此方散熱扶表救裏
表虛者汗不妄出裏熱令不閉結外則通關
內則開渠經絡踈通臟腑無滯熱在表裡之
間施無不可積傳驚癇之候用攻必効
地骨皮散 治虛熱潮熱傷寒壯熱

知母 柴胡 人參 甘草 茯苓 半夏
地骨皮 右水煎加姜 有驚熱加蟬蛻天麻
黃芩

秦艽飲子 治疰如前
即上方加秦艽

驚甲飲 治潮熱骨蒸盜汗咳嗽多渴心躁多驚
面色黃瘦 驚甲炙 地骨皮 秦艽 柴胡
枳殼炒 知母 當歸各等分 每服三五錢加桃
柳枝各三寸烏梅一枚水煎服



犀角飲 治骨蒸潮熱盜汗肌瘦

犀角屑 鱉甲炙 柴胡 知母 地骨皮 胡

黃連各五分 大黃 桃枝各二錢半 右水煎服

靈犀飲 治小兒骨蒸潮熱盜汗咳嗽不食多渴

面黃消瘦 犀角 秦艽 甘草 羌活

柴胡 地骨皮 胡黃連各五錢 茯苓 人參各

兩 右每服三五錢加烏梅竹葉煎服

紫胡散 骨蒸潮熱面黃瘦弱

紫胡 地骨皮 甘草各等分 水煎服

青蒿散 肌熱潮熱

青蒿三錢 甘草一錢 烏梅一枚 小麥五十粒

右水煎分三次服

大連翹飲 治胎熱大小便不利諸般瘡癩丹毒

臍風瘡疹壯熱 連翹 瞿麥 荊芥 木通

當歸 赤芍藥 防風 柴胡 滑石 炙甘

草 蟬蛻各一錢 山梔 黃芩各五分

右看大小每加紫草煎服熱甚加大黃

風熱



內素有熱或又冒風發熱咳嗽面赤氣粗大便秘

結者但宜平；和解使表裏踈通其熱即退踈

風枳殼湯極効

踈風枳殼湯

紫蘊

枳壳

各三錢

杏仁

去皮尖二錢

水煎類；與服以大便秘通利熱退為度

熱甚者加黃芩 若大便仍不行用葱煎湯

洗其腰腹取熟葱以臍上下揩之使其氣透

則通利矣 或用生葱尖紐入穀道立通

清上散

治胎熱眼睛腫赤薰色稠黃肚熱啼哭

及身上紅腫或頭頂瘡癩耳出膿汁皆胎毒也

此方神驗

川鬱金

甘草

北桔梗

天花粉

乾葛

薄荷葉

各等分為末入蜜拌勻白湯下三五

七分或一錢仍用艾葉煎膿湯溫浸足底以

引其熱下行

看小兒外証形色音声脉息

經云五臟有五色皆見於面素問曰神之變也其

華在面又云視其五色黃赤為熱白為寒青黑



為痛此所謂視而可見者也錢仲陽云左頰為
肝右頰為肺額上為心鼻上為脾下頰為腎赤
者熱隨証治之

眼上赤脉下貫瞳人顙門腫起兼及作坑鼻乾黑
燥壯大筋青目多直視覩不轉睛指甲黑色口
作鷓聲虛舌出口齧齒咬人魚口氣急啼不作
声蛔虫既出必是死形用藥速救十無一生
此吐蛔乃傷寒症故言凶若傷食吐蛔乃是常
要知兒病生與死總观面上色音声唇青耳黑入

難救哭声不响赴陰君

声輕者氣清弱也重濁者痛也風也高喊者熱將
狂声急者神驚也声塞者痰也声戰者寒也声
噎者氣不順也喘者氣促也噴嚏者知其風呵
欠者知其倦亦主風陰陽相雜也

診脉詞

小兒有病須憑脉一指三關定真息浮洪風熱數
多驚虛冷沉遲實有積

左手浮洪風邪所感右手滑大乳食過傷救焚遲



寒以意推詳浮表沉裏看症投湯

看顛顛要畧

凡看嬰孩百日已後周歲已前視其顛而對其症則補瀉用藥調治可斷其吉凶矣

顛門青筋脉虛不榮顛門常陷滑泄便：顛門腫起風痰不止顛門久冷吐利青：顛門虛軟顛廂不免顛門扁濶暴泄易脫顛門歪長風作即亡顛門連額驚風易得顛顛未克怕熱怕寒顛顛緩收胎氣不用顛顛動數神氣昏弱顛顛寬

大受疾恐害顛顛未合筋骨柔弱

顛顛陷者始因臟腑有熱渴飲水漿致成泄痢久則氣虛用狗頭骨炙黃為末鷄子清調敷之顛腫者乳哺不當致寒熱乘於脾家其氣上衝顛為之脹高如堆燥若寒氣上衝則堅硬熱氣上衝則柔軟寒則溫之熱則涼之

封顛散

防風

栢子仁

白芨

各一兩

右末乳汁調塗顛上十日愈

凡解顛之症乃腎氣虛弱腦髓不實不能收斂急

用地黃丸補之 外用大天南星微炮為末米醋調敷于絹帛上貼之

三辛散 治解顛

此細辛 桂心 各五錢 乾姜 七錢 為末乳汁調敷

顛上乾則再塗俟兒面赤則愈

烏附膏 治顛門陷

川烏 大附子 各半斤 皮脂 錢 椎黃 水飛 二錢

右極細末生葱搗爛調成膏貼顛上

地黃丸 治顛解不合腎元不充

人參 錢二 懷熟地黃 錢四 鹿茸 酒炙 懷山藥 茯苓

丹皮 山茱萸 肉各 三錢

右末煉蜜丸芡實大每用人參湯化下一丸傷乳

小兒吮乳過飽腹脹不乳者不必他藥只用大麥

芽炒煎湯服之如惡吐加陳皮 發熱者加枳

實 如大便不通加枳柳 蓋氣下則乳自消

也不必用大黃巴豆霜之類

入門看証歌



五指梢頭冷驚來不可當若還中指熱必定是傷
寒中指獨自冷麻痘症相傳女右男分左叮嚀
仔細看

變蒸

生生子曰古謂三十一日一變生一臟六十四日
一蒸生一腑三百二十日十變五蒸畢則臟腑
完而人始全也大意謂人有三百六十五骨度
而合周天之數以期歲諛之云、也愚謂嬰孩
離母則腑臟已自具足豈待變蒸完而後始生

哉觀其下地罔然一声便能呼吸飲乳大小便
一如大人設臟不完啼聲安出又安能飲乳而
成大小便哉由是推之所謂變蒸者乃氣血按
月交會煅煉使臟腑之精神志意魂魄迺長靈
覺漸生爾氣血有太過有不及故寒熱之發有
輕重有晏早不然觀今之嬰孩未嘗月、如其
所云三十二日必一變六十四日又一蒸也發
寒熱者百中僅一二耳間或有之亦不過將息
失宜或傷風傷乳而偶與時會耳雖不服藥隨



亦自愈茲姑採什數方以備參用若謂生臟生
腑之助則其謬也不辯自知

清解湯 變蒸熱多寒少面赤息粗有似傷風表

裏無汗或發癩疹咳嗽並皆治之

柴胡分五前胡分四酒苓分五甘草分三葛根分三杏仁

分四枳殼分三白芍藥分七水煎服

柴胡湯 治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參 甘草分三麥門冬去心各二錢防風 龍胆草

錢各柴胡錢三每服三錢水煎服

惺、散 治變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞声重瘡

疹發熱 人參 白朮 茯苓 甘草 芍藥

桔梗 細辛 麦芽各一分每服一錢加姜煎服

當歸散 治變蒸有寒無熱


當歸錢二木香 桂心 人參 甘草各一錢

每服二三錢姜棗水煎服

調氣散 變蒸吐瀉不乳多啼

木香 香附酒製人參 橘紅 藿香 甘草

各等分每服三錢姜二片棗一枚水煎服



明驚風篇

孫仲子泰來曰驚者病之名風者病之象言其抽搐有似於風之動而為名也

生生子曰小兒之症莫大於驚風以其疾顧盼間暴若雷迅而電逝也緣其致疾之由有二極湏體認不可循俗只曰驚風驚風云耳何言之夫驚有因外因內外至者或耳聞異声目擊異物暮然仆地者是也内生者由痰生熱、生風也所得之由既殊療治之法必異治外須當養神

治內自宜清降予慨今之專門偶獲一方便大言曰治急慢驚風如神急慢二字漫無分別視之得無太易乎不思急屬陽陽為熱為實慢屬陰陰為虛為寒預治法實熱即當清當瀉虛寒即宜溫宜補蓋治寒之劑不能治熱治熱之劑不能治寒聖哲莫能越其矩也世無大丹曷能以一藥槩能治其寒熱虛實者乎急慢二字間有能言之者至於內外之因鮮有知之者矣予故揭而論之以補其畧



急驚風

生生子曰急驚風者乃有數種之殊須當細察現
古人治法有云鎮驚者有云利驕者有云涼驚
定驚截驚者究其法明是教人要知邪之入於
何經識投劑有此數等之緩急也蓋邪之入心
則面紅頰赤惕、夜啼邪之入肝則面目俱青
眼竄上視邪之入腎則面黑惡叫啞齒咬牙和
之入肺面色淡白喘息氣乏邪之入脾面色淡
黃嘔吐不食此亦大約言之耳仍當審其兼症

蓋此疾之發其始末有不由於痰熱者雖有五
臟之殊尤重在心肝二臟內積痰熱外挾風邪
風火交爭血亂氣併呼吸貴鬱閉竅壅塞面赤
努氣百脉凝滯總由痰涎膠固而肝風心火無
所踈泄故頭搖眉掣目斜上視搐掣不休名曰
急驚症固暴烈乃為陽症陽盛則多動而症實
熱故列已上數法非若慢驚陰症者所可比也
急驚須當急治先宜通關通關後且與截風定
搐設仍不定乃議下之痰熱既降又當養胃安



神若搖定而仍有微邪但用輕劑消痰清熱則
破竹之勢自當迎刃而解也

孫季子朋來曰夫治急驚當下即下第不可過
用寒涼及巴霜水銀芫蕪蕩滌太驟蓋已上
諸劑與腦射等藥醫家有疇急而用之殆亦不
得已也疾去即止若不當用而用或當用而過
用慢驚之成率多由此可不慎哉凡欲下之際
須當細問前師已下未下或曾經吐瀉否也設
已經下及曾吐瀉者不敢再擬下劑只須驅風

化痰清熱令其自己不可峻攻重傷胃氣若休
認未明不可孟浪施治先與通關驚散以開
其竅次用人參羌活散定搖散在意選擇下劑
亦有三等輕則利驚丸稍重則用疎風散柴胡
加大黃湯重則用天麻丸牛黃涼膈丸下後和
胃補氣用生氣散茯苓二陳湯蘓合香丸之類
寧心定志丸全蝎散溫膽湯此等不寒不熱祛
風鎮驚之餘酌而繼之以防再發庶稱良師
凡急驚鼻衄者乃吹明經中熱壅將散從血而解



此易治口中吐血者乃心血為熱迫妄行難治
犀角湯加滑石牡丹皮黃連山梔

凡急驚抽搐聽其自發自止切不可令人緊抱束
繫之恐他日有痼疾以氣不得通故也

通關散 治驚風搐搦閉竅不通

南星 炮一錢 射牙皂 二錢 赤蜈蚣 一錢 僵蚕 一錢

右為末生姜汁拌擦牙或筋引澆入藥二三
點吐出涎開自開

嚏驚散

半夏 一錢 猪牙皂角 末五分

右為末每用少許吹入鼻中嚏出立甦

全蝎散 治驚風不語通竅豁痰

全蝎 七枚各用紫蘇葉包炒

右棗每服一字姜汁入蜜少許拌勻灌入口中

開牙散

細辛 南星 朴硝 各一錢 全蝎 五枚 麝香 五分

右為末以少許用烏梅肉揉和擦牙外用細
辛皂角荆芥為末吹入鼻中



人參羌活散 治驚風熱涎潮牙關緊急或中風

柴胡去芦 地骨皮 天麻酒炙 人參 芎藭

獨活 枳壳 茯苓 羌活 桔梗各五錢 甘草

分三右每服三五錢 生姜薄切湯調服 加蟬退

治驚熱躄硬加麻黃乾葛苡仁

釣藤飲 治一切驚風潮搐神思昏迷目瞪上視

但是驚風變易皆効

麻黃去節 甘草 蟬退五枚去翅足 升麻 川芎 龍

膽草各一錢 天竺黃 釣藤 羌活 獨活

防風各三錢 右每三五錢加竹葉七片薄荷葉

五片水煎服

琥珀散 急慢驚風涎潮昏冒目瞪抽搐內釣肚

疼及和順痘瘡小可驚哭眠卧不安入口立効

又治驚癇常服安心定志

辰砂 琥珀 牛黃 僵蚕炒 全蝎去毒 天麻

南星牛胆製 白附子 炮蟬退 代赭石 乳香各一錢

射香一字 右為末三歲半字薄荷金銀湯下

慢驚加附子



天麻防風丸 治一切驚風壯熱痰盛恐怖

僵蚕炒五錢 天麻酒浸 防風 人參各一兩 牛黃一錢

全蝎五錢 辰砂 雄黃各二錢半 炙甘草一兩 射香一錢

右末煉蜜丸桐子大每三五丸薄荷湯下

金箔鎮心丸 治風痰壅盛發熱心神恍惚急驚搦

雄黃 辰砂 天竺黃各一錢 茯苓 膽南星

人參各二錢 山桑一錢半 牛黃 射香各五分 金箔五片

右末煉蜜為丸梧桐子大金箔為衣每服一

丸灯心釣藤薄荷湯下常服定志安心

涼驚丸 治驚疳有熱發搐心神恍惚牙關緊急

目作上視潮熱手足動搖

黃連 龍胆草 釣藤各二錢 牛黃 射香各一錢

右細末麩糊丸粟米大每服五七丸至十五

丸次大者三十九丸金銀薄荷湯下

定心丸 溫驚用此

茯神 白附子 南星炮各三錢 人參 全蝎

僵蚕炒十枚 乳香三錢 遠志去心各一錢 右為末牛膽

汁丸梧桐子大每一二丸金銀薄荷湯化下



鎮心丸 治驚常服安心鎮驚

桔梗 山藥 山梔 甘草 各等分為末煉

蜜丸櫻桃大金銀箔為衣每一丸薄荷湯下

利驚丸 治急驚身熱面赤引飲口中氣熱大小

便黃赤

青黛 輕粉各一兩 黑豆 生末 天竺黃 錢二 右末蜜

丸小荳大一歲一丸薄荷湯下麩糊丸亦可

硃砂膏 驚風痰盛

硃砂 牙硝各二錢 五靈脂 芎藭 各一錢半 射香 分五

冰片 字一 右細末甘草膏丸菜荳大金箔為衣

每一丸薄荷湯下

疎風散 驚風痰熱俱盛

煨柳 陳皮 黑丑 大黃 煨

各等分為末每服五七分生蜜少許調下

牛黃涼膈丸 治熱盛涎潮

牙硝 石膏 甘草 各五錢 胆星 二錢 牛黃 紫

石英 射香 冰片 各五分 寒水石 錢五

右為末甘草膏丸菜荳大每一丸陳皮湯下



柴胡加大黃湯 最利痰熱

柴胡兩一 黃芩 人參 半夏 生姜各三錢半 大黃

量虛用右為粗末每服一錢加棗子煎服

金星丸 風熱結聚喉內痰鳴喘粗咳嗽兩頰紅

頰頰赤腫咽馬壅塞目閉不開狂言發熱煩躁

多渴欲作驚風或大便不通小便如血

鬱金 雄黃各一分 輕粉五分 巴霜七粒 南星一個 蝎梢

錢一右為末醋糊丸麻子大薄荷湯下三丸小者一丸

揭風湯 專利驚熱下痰

青黛 芎藭 全蝎各一分 南星末五錢水調成餅包前三味煨

熟研末入后藥 硃砂一錢半 輕粉 牙硝各三錢

右俱為細末每服一字薄荷湯下

奇方 鎮驚定搐安神

雄黃 大辰砂各一錢 為細末猪心血拌水調下

溫膽湯 積痰驚悸

半夏 枳實 酸棗仁各一錢半 陳皮 甘草各一錢半

茯苓錢五右每服三錢竹茹五分姜棗煎服

全蝎散 治驚搖



僵蚕

炒三錢

全蝎

薄切葉灸七枚

射香

許

右為末石榴皮湯下

和中湯

和胃氣止吐瀉

茯苓

蓮肉

各二錢

藿香

天麻

人參

扁莖

炒木香

白朮

甘草

各一錢

每服二三錢姜棗煎服

定志丸

驚風已退神志未定

琥珀

茯神

遠志

人參

天麻

甘草

天門冬

白附子

酸棗仁

右末煉蜜丸皂

子大辰砂為衣灯心薄荷湯化下一二丸

酸棗仁散

驚心不寧恐怖恍惚

人參

麥冬

各二錢

茯神

五錢

粉艸

一錢

辰砂

五分射分

遠志

酸棗仁

各三錢

右末鈞藤湯調下如內鈞加木香

防風散

風熱痰壅大便不通

羌活

防風

枳實

川芎

粉草

大黃

赤芍

各等分

右每服二錢姜棗煎服

青金丹

疎風利痰





笋會

牙硝

青黛

錢各一

史君子

枚三

輕

粉各五

錫梢十四

右末磨香墨拌丸麻子大

每一二丸薄苛湯下

京墨丸

驚積痰熱

楚地王監以此藥而著名大利痰熱疳積

青黛

史君子

笋會

京墨

胆星各二

輕粉

射香

各五分

冰片

一字

右為末麵糊丸梧子大每服一丸薄苛湯下

鎮心丸

化痰鎮心治急驚

又一方魚牛黃有胆星

硃砂

龍齒

牛黃

錢各一

鉄筆粉

琥珀

人參

防風

錢各三

全錫

錢七

右末蜜丸梧子大每一丸薄苛湯化下

珍珠丸

急驚熱盛涎潮

滑石

飛五錢

白附子

錢一

輕粉

巴霜

十五粒

右末麵糊丸菜豆大三歲者一丸二丸葱白

湯下 一方有南星全錫

犀角湯

心驚熱盛

犀角

防風

木通

甘草

桑白皮

茯苓

各等分 右每服三錢水煎服

清心丸 驚熱煩躁

人參 茯苓 防風 柴胡 辰砂 錢各二 金箔

廿右末蜜丸梧子大竹瀝湯磨下一丸

五仙丹 身熱面赤口噤息粗抽搐易作易止

天麻 酒浸 錢全 錫 洗去頭足筋 乾四錢 白附子 辰砂

珍珠 青礞石 三服各 錢 巴霜 二十 金銀箔 各十

右為末姜三片蜜一匙煎湯調服一字

珍珠天麻丸 治急驚風請量用之以通為度此

方仍治吊腸鎖肚撮口至為妙絕功效無比丸

如麻子大每服一歲五丸二歲十丸隨大小加

減薄苛湯點茶送下 丸治驚風先瀕截風定

搐次以此劑下之切不可過利 初生患者三

日三丸五日五丸七日七丸加青黛名青黛丸

天南星 炮 天麻 白附子 各一錢 巴霜 字一臟粉 分五

蕪荑 炒 全蝎 炒 滑石 錢各一 右末水煮麵糊為丸

慢驚

慢驚屬陰為寒為虛多發于大病之後或先有吐瀉不善調理或尅伐過度損傷脾胃夫脾屬土



主四肢虛則四肢冷手指微動或口角掣動面
色青二便利是其候也與急驚大不相同蓋急
驚乃初病之症元氣未虛邪氣正盛故抽搐大
作症雖急乃有餘之症治可攻擊使二便通利
痰降熱散而愈也慢驚乃病後虛弱無氣以言
無氣以動無力抽搐元氣大虛故也有似於風
俗云慢脾風症雖緩實惡候也治惟溫補使胃
氣漸回大便結實其風自定切不可攻擊症
雖有痰只以六君子湯加天麻炮姜或烏蝎四

君子湯所重只在保護脾胃上着工夫餘不

及暇

孫季子朋來曰慢驚須要審問前症根由按

輕重而施治之不可藥稱慢候而遽投大溫

大熱之劑又不可不識緩急泛泛然夾雜他

藥失時候事如從吐瀉後者即以理中湯治

中湯甚者加大附子若水瀉輕者五苓散益

黃散木附湯之類如從急驚漸轉致於慢

者全蝎觀音散風邪而得者桂枝湯若面青

額汗舌短頭低眼合不開搖頭吐舌俗曰慢



脾風此土極似木之候逐風則無風可逐療
驚則無驚可療乃脾間虛痰虛熱往來作祟
眼合者係脾虛之極不能展開神志昏迷治
之早者十全二三大要只在助胃回陽若眼
半合半開手足不冷此雖屬慢驚而陽氣尚
未全脫不必用硫黃附子輩只與截風調胃
可冷可熱和調陰陽太乙保生丹聚寶丹蟬
蝎散皆可選用所重只在保脾故所治無失
理中湯 吐瀉後脾胃虛弱四肢漸冷或面有浮

氣四肢虛腫眼合不開

人參 白朮 甘草 炮姜

水煎服甚者加大附子

治中湯 即前方減炮姜加陳皮

太乙保生丹 治慢驚尚有陽症

防風 全蝎 白附子 僵蚕 胆星

蟬退 琥珀 辰砂 射香 右末粟米

糊為丸梧子大金箔為衣每一丸薄荷湯下
蟬蝎散 急未盡而慢將來



全蝎

去毒七枚 蟬退廿一

甘草

炙二錢半

大南星

炮一枚

右末每服五分姜棗煎服

聚寶丹

初傳慢而未脫陽者

人參

茯神

琥珀

天麻

僵蚕

炒防風

南星

白附子

生

全蝎

炒烏蛇肉

酒浸焙各一錢

五分

射香

一右末

蜜丸

梧子大每丸

一石菖蒲湯下

神寶既濟丹

分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃

火硝

五靈脂

青皮

陳皮

半夏

右將硫黃火硝用磁罐熔化攪勻冷

定取下全諸藥各等分為末粟米糊為丸

子大每服五丸米飲下

惺惺散 吐瀉後脾弱內虛

人參

茯苓

木香

天麻

扁豆

炒全蝎

陳米

炒

各等分

每服三錢

姜棗煎服

大醒脾散

治吐瀉脾困不食

南星

茯苓

橘紅

全蝎

炙粉草

蓮肉

白附子

人參

木香

陳米

炒

右每服三錢姜棗煎服

醒脾散 吐瀉脾困不思乳食

人參 全蝎 天麻 茯苓 木香 菖蒲

蓮肉 白木 甘草 白附子

右每服二三錢姜棗煎服

木附湯 風濕相搏身軀煩痛不能轉側不嘔不

渴大便實小便利虛風頭目眩重煖四肢補中

助陽氣止自汗

白木四兩 甘草炙二兩 大附子炮去皮臍

右每服三錢水姜棗煎服

烏沉湯 驅風助胃治慢驚

天麻 人參 川芎 全蝎炙 南星炮 木香

沉香各一錢 甘草炙 右每服一錢水姜煎服

星香全蝎散 治慢驚風昏迷痰搐

南星 木香 人參 橘紅各一錢 全蝎炙 甘草

各五分 有熱加防風 每二錢紫蘇姜棗煎服

定命飲 慢驚吐瀉困沉欲傳慢脾通用

半夏 茯苓 木香 生姜末 天麻各三錢

白木 甘艸各一錢 右末姜棗湯調下五分



温白丸 驅風豁痰

人參 防風 白附子 僵蚕 全蝎各一錢

南星炮 天麻各二錢

右末麵糊為丸梧子大每姜湯送下一丸

釣藤散 吐利脾胃氣虛生慢風

釣藤七錢 蝉退 天麻 防風 蝎尾 人參

各五錢 麻黃去節 僵蚕炒 甘草 川芎各二錢 射香少許

右水煎寒多加白附子五分可與後蝉退釣

藤飲魚看對症用

蝉退釣藤飲 肚痛驚啼

釣藤 天麻 茯苓 川芎 芍藥各二錢

甘草 蝉退各一錢 右加灯心水煎服

礞石散又名奪命散 大能利痰不問陰陽慢脾風涎潮


壅盛塞於咽間其嚮如潮百藥不能過其咽命

在須臾但先用此藥入喉痰即墜下功有萬全

起危薦之疾布幹旋之功

青礞石火煅過者 右為極細末若急驚風痰上

壅身熱如火用薄苛自然汁入蜜調微温服



之良久其藥裹痰墜下痰涎與藥雜和稠粘而墜下也次服退風祛熱截驚等藥
又方 以稀糊丸菜豆大每服二丸急風薄荷荊芥湯下慢脾風木香湯磨下
慢驚慢脾虛風亦痰涎潮上塞住咽喉藥石俱不能下用此以青州白丸子再研為末稀糊為丸入熟蜜湯調下其涎即墜入腹次服治慢驚藥其痰立下不動臟腑不傷真氣惟見其藥裹痰而下始知此劑之神

烏錫四君子湯 右即四君子湯加川烏全蝎為

末每服五七分姜枣調下再服去川烏

星蘇散 慢脾風口噤不語痰熱及治諸驚風

大南星一枚 為末每服三字姜四片紫蘇五

葉同煎入雄猪胆汁少許溫和服

凡不語者大小便須要調導

慢脾風不語只用南星以人參后葛蒲為佐

異功散 溫中和氣吐瀉不思飲食

即治中湯加木香 姜棗煎服



陰癩散

祛風豁痰回陽正胃

白附子生

黑附子生

南星生

半夏生

各等分剉散井水浸七日逐日換水浸去水
乾入全蠋末錢二同研為末每服錢三生姜湯下

至聖保命丹

驚風內釣肚腹堅硬夜多啼哭眼

目上視手足抽掣不省人事

全蠋

去毒十枚

防風

胆星

蟬退

僵蚕

炒

天麻

錢各二

白附子

炒

辰砂

錢各一

射香

分五

右末糯米飲丸艾實大金箔十片為衣每一

丸釣藤灯心湯下 有熱加牛黃冰片硼砂

一方有羌活錢二此藥常服鎮心化痰

夜啼


客忤

無啼

夜啼者臟寒也陰盛于夜則冷動而痛故夜啼不
休釣藤散主之

又有心熱煩啼必面色赤舌胎小便赤澁釣藤散
去木香當歸加辰砂末木通煎湯調下

客忤者嬰兒神氣脆嫩外邪易而觸之或眼見犬
畜異物耳聽異声或入神庙而見凶惡神像或



入暴喪之家觸而忤之故夜多驚悸睡卧中驚
跳啼哭因晝之所觸而有夜之所感也其候驚
啼口出青白黃沫面色變易喘急腹痛反側瘳
瘳有似驚癇但目不上窻耳視其口中懸癭左
右有小、腫核即以竹鍼刺破治惟辟邪散驚
安神為上 凡客忤中惡急作醋炭或焚降香
皂角等薰之速服蘓合香丸立甦蓋心藏神神
安則五臟和而愈也
艱啼者兒在胎時母失將養傷於風冷既生之後

冷氣停留復因乳哺不節邪與正搏故腹痛艱
張盛氣而啼也牛黃丸主之冷甚者理中丸_溫
釣藤散

釣藤

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

各一錢

甘草

五分

右每三錢姜棗煎服

乳頭散

夜啼不止腹中疼痛

黃芪

當歸

甘草

赤芍

木香

各一分

右為末每塗少許乳頭上令兒吮之

火花膏

治夜啼臟冷而痛也



燈花

三類

礪砂

辰砂

各少許

右為末熟蜜調成膏塗乳上令兒吮

蟬退膏

蟬退

二十七枚去毒

辰砂

少許

右為末煉蜜丸令兒吮

六神散

面青腹疼啼哭口中冷氣四肢冷曲腰

而啼大便泄瀉及不吃乳

人參

山藥

白木

各五錢

甘草

炙二錢

茯苓

扁豆

炒各一兩

右末每服二錢姜棗煎服

又方

當歸

白芍

人參

各二錢

甘草

桔梗

陳皮

各一錢

每二三錢水煎時服之

雄射散

治客忤腹痛危急

雄黃

一錢

乳香

五分

射字

右末

每一字

刺鷄冠血調灌

黃土散

治小兒客忤

伏龍肝

蛭蚓

各等分

右水調塗兒頭上及五心上為良

龍齒散

治物哭肚疼驚熱

龍齒

蟬退

鈞藤

羌活

茯苓

人參

天麻

防風

全蝎

各等分

右末

灯心湯調下



雄黃散 中惡客忤

雄黃 研水飛細末用桃樹枝煎湯調灌

又方 治全上

蘓合香丸 詳雄黃射香末用降真香煎湯

化下立甦

丹毒赤遊風腫

孫仲子泰來曰小兒丹毒赤遊風者書謂半周一歲之間不宜頻洗浴恐濕熱之氣鬱蒸不散發為丹毒愚謂此固一說也總由姪母血熱漬流于胎受熱毒蘊于膝理或乳母好食酒麪

煎炙辛熱等物皆能致之發于四肢者易為調治發于頭面胸背令兒煩躁脹悶身如火灼古謂入心者死以其毒劇火盛故也亦有濕熱滯于皮膚搏擊氣血發為丹毒入腹入囊總成凶兆良由包裹失宜復為風邪所襲發為白丹遊腫壯熱增寒鼻塞胸悶息氣喘急咳嗽吐逆種種之緣一受于母之血熱為內因一為頻洗脫着失宜為外因知內外之因明合治之法庶幾有藉手焉



大連翹湯

治胎毒丹毒赤遊

方見潮熱

清上散加升麻

治胎毒丹毒遊赤腫

方見風熱

防已散

丹毒赤遊風入腹入腎防其殺人

漢防已

錢五朴硝

犀角

黃芩

黃芪

升麻

各七錢

右每服二三錢加竹葉五片煎服

一方無朴硝有澤瀉

葛根白朮散

治一切赤白丹毒

白朮

茯苓

各二錢

木香

甘草

各一錢

赤芍藥

葛根

各三錢

枳殼

二錢半

每三錢水煎服

惺弓散

治赤遊腫中氣弱不可服寒涼者

即四君子湯加桔梗

水煎服

冰黃散

赤遊腫毒

朴硝

大黃

各一錢

為末新汲水調敷毒上

白玉散

赤遊丹毒

滑石

寒水石

各一兩

右末醋調塗腫處或遊

又方 赤遊丹毒

青黛

并水入蜜調塗無青黛以散塗之





又方 治赤白丹毒或用寒涼塗之不効者用此良愈

伏龍肝為極細末以熟鷄子黃熬為油調塗

升麻湯 治外因洗浴脫着失宜增寒壯熱丹毒

遊腫并時行熱毒發斑疔症

升麻 乾葛 白芍 各三錢 甘草 一錢半

每服三四錢水煎服 熱盛加黃芩 咽痛

加桔梗 發斑加玄參

敗毒散 治時行熱毒胃虛冷丹 治禁口痢加

陳倉米一撮 羌活 獨活 前胡 柴胡

人參 茯苓 川芎 甘草 桔梗 枳殼

右每三四錢生姜薄荷煎服

心紅散 治赤遊丹毒

心紅 即水銀昇之銀珠也 用馬齒莧搗汁調塗 乾則以汁潤之極妙

又方 治一切胎毒赤丹

芭蕉根大塊者搗汁塗之乾則再塗畏寒者或

冬月則類稍溫塗之

口瘡

孫季子朋來曰口瘡或宿稟胎毒或乳母過食燥

灸熱蘊心脾不能發泄而然凡用服藥雖知是

熱亦不可過用寒涼恐上熱未除中寒復生也

惟輕清味薄之劑緩之治之如權衡重自如

加減瀉黃散 治心脾熱盛口瘡

山梔子兩一 防風兩一 藿香錢七 石膏錢五 連翹 甘草

七錢 升麻錢三 右蜜酒微炒水煎服小便短澀

加滑石木通

青黛散 治瘡口、瘡重腫不能吮乳及治咽

黃連 黃栢各五錢 青黛二錢 牙硝 辰砂各一錢

雄黃 牛黃 蓬砂各五分 冰片少許 右為極細

末先以薄荷汁拭口後搽此末一二分

如搽寒涼藥不効口中一片白漫者此中焦虛

而熱不得下降內服四君子加炮姜葛根外以

熟雞子黃全亂髮熬油用綿纏筋頭蘸油洗之

立能止痛取効

重舌 木舌 腫脞 弄舌 腫齦

重舌亦為心脾蘊熱所致蓋脾脉絡于舌底舌為

心苗心脾有熱則血氣沸騰火性炎上如風潮



之上壅故熱毒附于舌根而肉壅腫叠出短小如舌者是也

着頰裏及上腭而腫者名腫腭

齒斷上腫者為腫斷此二者皆宜針破出血即愈也

木舌者臟腑壅滯挾心脾之熱上衝故令舌尖腫大塞滿口中或僵硬如木不能轉掉不能言語若不急治必致殞命古方用草麻子肉搗研以綿帛取油將帛抄成條點火復吹滅以烟薰之即消

弄舌者脾虛微熱津液不足時舒舌此不可用涼藥宜補中氣使生津液則愈矣

青黛散 治口瘡重舌不能吮乳重唇口方見口瘡

蓬砂散 舌上白胎舌上乾黑

蓬砂為末冰片少許搽之或用生蜜調塗舌上

千金方 治重舌

黃柏 用竹漚浸一宿點舌上

瀉黃散 治心脾熱盛重舌重腭等症 方見口瘡



菜萸膏

心脾熱唇口生瘡重舌木舌等症用此

以引其熱下行或煎服連翹飲子仍與金絲膏

刷口內古上立効 吳菜萸 為末米醋調塗

脚心更以厚帛貼之繫定

金絲膏

小兒口瘡大効

黃丹錢一生蜜兩一

右和勻深甌盛甌內蒸黑為

度每用少許刷口內

語遲

小兒四五歲不能言者蓋心之聲為言皆由在胎

時其母卒有驚怖內動母之心氣不足則見之

心氣不充故語遲也法當養心菖蒲丸佳

菖蒲丸

石菖蒲錢二人參錢五麥門冬 丹參

遠志

去心姜汁炒

天門冬去心石脂各三錢直指方有

當歸川芎硃砂

右末煉蜜丸麻子大每服三十丸

又方

酸棗仁錢五遠志去心甘草三錢乾山藥錢五


人參

白茯苓去心歸身錢五石菖蒲錢二丹參

三石斛去根

右末員眼肉煎湯調下每服錢

斷乳法



畫眉膏

梔子

三枚炒存性

雌黃

辰砂

各少許

右為末入輕粉少許麻油調勻候兒睡濃時塗其兩眉上醒來自然不吃乳未効再塗則効

行遲

內經云足得血而能步設未經跌撲損傷及發驚搐強被束縛者乃下元不足也蓋腎主骨肝主筋下元不足則筋骨痿弱不能行動宜當峻補下元有疝弱而不能行者當從疝治腎氣丸治下元不足行遲

懷地黄

酒蒸熟四兩

乾山藥

山茱萸

肉各二兩 茯苓

澤瀉

牡丹皮

去心各一兩半

右末煉蜜丸空心淡鹽湯下五十九

地黄丸

峻補下元

方見顧鯉

虎骨丸

脚軟行遲

虎脰骨

好酒炙

熟地

酸棗仁

酒炒

茯苓

桂心

防風

川芎

牛膝

各等分為末蜜丸麻子

大木瓜湯下三十九

牛膝散

三歲不能行走



五加皮 牛膝

木瓜 各五錢

右末每一錢酒調下

項軟

項軟者乃督脉虛而筋骨不收斂也督脉係足太陽膀胱經所主古方多從風治以其頭重頸軟頭不得正而墜前墜後也愚謂但補督脉則其氣血充盛自能收持也前虎骨丸地黄丸皆可天柱丸治項風氣起頸軟頭不得正或去前或去後

蛇含石

醋煨七次一兩

川欒金

三錢射香

許少

搗飯為丸芡實大每一丸荊芥湯化下


五皮散 治項軟

五加皮 為末酒調塗敷頸骨上再酒調服亦

治行遲

滯頤

滯頤者涎自口角流出而滯于頤間也此由脾冷涎多脾虛不能攝其津液泛而溢出清滯頤間溫淫紅赤惟當溫脾益黃散溫脾散皆治之亦有脾熱者但清其熱則涎自不泛上寒熱二字在人看其面色審其兼症問其二便庶治不偏



溫脾丹

治滯願

半夏

丁香

木香

各一兩 姜炮

白朮

青皮

陳皮

各五錢

右末麴糊丸黍米大一歲十米湯下

溫脾丹

治全上

半夏

人參

肉果

白朮

炮姜

甘草

各五錢

丁香

一兩

右二三錢水煎服

清脾散

治全上

白朮

白滑石

飛各五錢

甘草

一錢

黃連

酒炒二錢

扁豆

炒

茯苓

各三錢

葛根


半一錢


石斛

三錢

右末每服一錢灯心湯調下


二十五卷終







國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






國立圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC





國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.



Inches

Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue

Cyan

Green

Yellow


Red

Magenta

White

3/Color

Black



2017003 v. 22





赤水玄珠幼科二十六卷目錄

脫肛門

哮喘門

痰嗽門

吐瀉門

癰門

淋門

遺尿門

外腎光腫門

外腎光腫門

外腎光腫門

國立中央圖書館 臺中分館



痢門

瘡門

吃坭

吃生米門

耳門

龜胸龜背門

虫門

疳門

癩門

赤水玄珠幼科二十六卷

新安生生子孫一奎著輯

脫肛門

脫肛乃腸胃有積滯以致濕熱之氣下流蘊於肛門而然也法當推逐其積又或貪坐冷地熱為寒凝結為內痔致每登廁肛即脫下此當從痔而治痔消而肛自收也有泄利日久中氣虛而下陷者宜大補中氣兼為升提從推從補從升皆當看症又有肛上生虫者予友黃桂峯丈治



一人肛出百方不應乃以生猪肚子一具刮下垢物用紗囊盛之卷於肛上一夜次早細虫不計其數盡叢於囊垢上肛即收入此亦濕熱之所生也

致新湯 治食積腸胃脫肛不時用此消而推之

木香分二 檳榔分五 京三稜煨 山查 枳壳

菝葜仁分七 滑石分一錢 黃連吳茱萸製三分 右水

煎食前服 積甚者遇仙丹下之方見

丹石散 治外痔脫肛如神 黃丹 滑石分

為細末新汲水調塗日三五次愈

澁腸散 久痢大腸脫出不收 訶子肉煨

赤石脂 龍骨各等分 右末用茶調肛上納帛

揉入 治痢久不止米飲調服

勝雪膏 翻花等痔熱痛不可忍或已成瘡

冰片 鉛霜 右末好酒研成膏塗上即愈

僧礬散 蜜陀僧錢二 枯礬錢一 冰片許少

為末敷上先用苦參湯或防風荆芥湯洗

苦參湯 脫肛并痔 枳壳 黃連 大黃



甘草 荊芥 苦參 芍藥 黃芩 各等分

右每五七錢加車前子茅草同煎薰洗

凡腸頭作癢多是有虫 用生艾 川棟根煎湯

薰洗

赤石脂散 瀉痢後肛門不收 赤石脂

伏龍肝 等分 為細末敷肛上

蒲黃散 蒲黃 五錢 熬猪脂一兩全拌成膏塗 肛上

五倍子湯 五倍子 一兩 煎湯入皮硝薰洗

桶中益氣湯加防風桔梗水煎食前服

蜘蛛散 大蜘蛛 鹽泥包裹煨存性為末一錢 鐵銹末 三分

猪胆汁調敷肛妙

又方 驚頭燒灰敷上

哮喘門

哮喘辯

孫仲子泰來曰哮之與喘極須分別疑似之間虛實攸繫非細務也夫哮以聲响名喉中痰盛膠塞肺竅氣道寒滯呼吸不暢喉中如水雞之聲故氣高而喘心熱而煩擡其肩顛其項不能屈



體而拾物貼席而伏枕也原其痰火內鬱外被風寒束其皮腠肺氣為之不利皆上壅胸喉斯乃有餘之疾雖多日不食亦不死治惟調氣豁痰解表蓋痰出而聲自寢也頑喘以氣息言喉中無痰氣促不相接續有虛有實仲景云汗出如油喘而不休者死故前人治法有補有瀉是故不可與哮喘同日而語也

明治哮喘

哮喘之原有三有因驚風之後而得者由治驚不

調氣故痰不盡徹去有感風寒而得者有食鹹酸撿喉而得者然皆不外乎利肺調氣豁痰六字也

麻黃杏子草膏湯 治傷寒發汗後不可更行桂

枝湯汗出而喘無大熱者及下後而喘

麻黃二兩 杏仁去皮尖二 石膏四兩 甘草二兩

右每三四錢水煎服

蘇合香丸 治哮喘調氣豁痰極効治驚風後而得者尤佳



大効雄硃化痰丸 治因驚後哮喘逆觸心肺氣
急口張虛煩神困

雄黃 硃砂 蟬退 全蠍焙 姜蚕炒 南星

白附子炒各錢 輕粉五分 右末麵糊為丸麻子

大每服二十九薄荷茶清任下

九寶湯 大人小兒素有喘急遇寒暄不常發則

連綿不已哮喘咳嗽夜不得卧

桑白皮 橘紅 大腹皮 紫蘇 杏仁

薄荷 甘草 麻黃 官桂各五分 姜三片烏

梅一枚水煎服

明治喘

喘之原有六有風寒傷肺而得者有厚味傷脾積
痰上迫於肺之氣為之不利而得者有大病後
被剋伐太過傷其脾胃而中氣虛弱者有火逼
肺金之為火侮而氣不得下降者有水腫之疾
水溢迫肺而喘者有破躰太早腎未完固而洩
其真陰以致腎虛不能納氣歸原者故治法有
踈風解表有清火保肺有清中化痰有利水滲

濕有峻補腎元有單補中氣較之於哮大不相
侔茲特揭而明之俾認証循方不啻駕輕車就
熟徑即夜行亦無顛躓之慮也矣

九寶湯 風寒哮喘咳嗽不能伏枕 方見哮

黃苓半夏湯 寒包熱哮喘咳嗽

半夏 枳壳 酒苓 桔梗 紫蘇 麻黃

杏仁 甘草 右姜枣水煎服 天寒加桂枝

桑白皮湯 肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮 半夏 蘇子 杏仁 貝母 山梔

黃苓 黃連 右姜水煎服

定喘湯 諸喘久不愈

白菓 廿一枚去壳切炒 款冬花 桑白皮 炒 麻黃

法製半夏 各三錢 蘇子 二錢 杏仁 酒苓 錢半

水煎作二次服

生脉湯 肺氣大虛氣促上喘汗出而息不續命

在須臾 麥門冬 去心五錢 人參 三錢 五味子 三十粒

水煎服

星半瓜蒌丸 清中化痰





南星

半夏

瓜蒌仁

香附子

橘紅

蘿蔔子

炒

杏仁

皂角灰

右末神麴糊丸

梧子大每服二三十丸姜湯下

又方

治食積痰喘壅滯不利

半夏

製

瓜蒌仁

山查

神麴

海石

蘿蔔子

青黛

右末用瓜蒌穰搗為丸竹瀝

生姜湯下每服三十九

參朮調中湯

補中清熱定喘除嗽

人參

白朮

各五分

棗白皮

炒

炙甘草

各三分

麥門冬

陳皮

茯苓

各一錢

青皮

分三

五味子

粒二十

水煎服

雙玉丸

治胃火刑肺氣高而喘每至夏月必一

發者

軟石膏

寒水石

各煨姜汁

右等分為

細末用甘草煎濃膏為丸荒荳大每夜白湯或

淡姜湯送下一錢

神祕湯

水氣作喘

橘紅

桔梗

紫蘇

各五分

人參

分三

五味子

粒七

棗白皮

錢一

半夏

分七

枳櫛

分五

炙甘草

分二

姜三片水煎服

椒目散 水泛於肺，得水而浮，故喘不得卧

川椒目 沉水者略炒為末，每一錢姜湯調下

葶藶大棗瀉肺湯 上氣喘急身與面俱浮，鼻

塞聲重不聞香臭，胸滿脹滿將成肺癰

葶藶 以研末 大棗 十枚 水二盞先煎大

棗至一盞去棗入葶藶煎八分食後服 先服

仲景小青龍湯二帖再服此

八味丸 治下元真氣不足，腎虛不能納氣，歸原

而喘 懷熟地 四錢 山藥 山茱萸肉 各一錢

茯苓 澤瀉 各一錢 大附子 童便 桂心 各五分

右蜜丸赤豈大每服二三十九丸白湯下

加減八味丸 治全上 即前方去大附子加五

味子

人參胡菹湯 治下元不足喘不得卧

人參 一錢五分 胡菹肉 三枚 姜一片水煎服

杏仁煎 治喘嗽 杏仁 去皮 胡菹肉 去皮

等分研為膏加煉蜜丸彈子大臨卧嚼下



一方 胡菘肉

三枚

姜三片 臨卧嚼吃 飲湯三四

口再嚼再飲 止嗽化痰

千縉湯

治痰飲喘急不能卧 人扶而坐 一服

安即

半夏

泡七箇

炙甘草

皂角

炙

各一寸

生姜一片 水煎服

煎服

治哮喘欲成 龜胸龜背者

甜葶藶

四兩

五味子

一兩

紫蘇子

一兩

杏仁

二兩

葉白皮

蜜炒 二兩

右蜜丸黍米大 每三五十九丸 淡豆豉湯下

銅壁山人加靈三分神効

嗽門

有傷風嗽有傷乳食嗽有痰嗽有火嗽有虛嗽

風者鼻塞或流清涕

乳食者胸腹飽悶發熱

日輕夜重

痰者一咳便有痰喉中常有痰聲

火者發熱面赤小水短澁

虛者呼吸力微

大小便利躄倦而面色青白

三拗湯

治感冒風邪鼻塞聲重語音不出頭痛

目眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿氣短

麻黃

杏仁

不去皮尖

甘草

姜葱白煎溫服取汁

有



熱加前胡 有痰加半夏

華蓋散 肺感寒邪咳嗽上氣胸滿煩悶項背拘

急聲重鼻塞頭目昏眩痰氣不利

麻黃去節 蘇子炒 桑白皮蜜炒 杏仁 茯苓

陳皮各五錢 甘草二錢 右每三五錢水煎服

金佛草散 治傷風頭目昏痛往來寒熱肢疼煩

悶痰涎不利咳嗽喘涕唾稠粘壯熱惡風

金佛草 荆芥各一兩 前胡 麻黃去節各

甘草五錢 赤芍藥 半夏各七錢 每三錢姜東

煎服 嗽甚加杏仁五味子

茯苓厚朴湯 治傷乳食停痰咳嗽或吐白沫氣

喘 白茯苓 半夏各一錢半 厚朴制五分 甘草二分

姜三片煎服

白餅子 傷乳食停痰咳嗽氣粗喘急及冷痰腹

痛 滑石 輕粉 半夏 南星各一錢 巴豆

十四粒去殼水煮熟 右研勻巴豆後入糯米飯搗為丸

荒荳大捏作餅子三歲已上三五餅已下一二

餅煎葱湯下 傷食麥芽湯下



新傷乳食咳嗽用二陳湯加蘿蔔子杏仁枳壳麥

芽山查厚朴之類服之食消而嗽自止

瀉白散 化痰止嗽下氣進食瀉肺火

桑白皮炒蜜 地骨皮各一兩 甘草二錢 每三錢

加粳米煎服

雙玉丸 胃火食積痰火面赤氣粗喘嗽方見喘門

清化丸 火刑肺金咳嗽喘急 貝母 知母各二兩

巴菝二十粒 全炒去巴豆只用二母為末煉蜜

為丸菝菝大每服一二十九白湯下

久嗽脾肺之氣不足用前諸劑不効者以六君子

湯加改仁桑白皮五味子服之即安

夏月咳嗽多汗喘咳無力生脉湯佳

雄黃丸 治癖積痰嗽嘔吐 雄黃五錢 半夏

神麴 白麴各一兩 巴霜四十九粒另研 右末滴水

為丸菝菝大用米糠拌炒赤色每服七丸加至

十丸嘔吐姜湯下痰嗽齏菜汁下

咳久連聲不已口鼻出血者茅根湯主之

陳皮去白 半夏麴 茯苓 甘草 天門冬



片苓 梔仁 貝母 知母 石膏 生地
杏仁 桔梗 瓜蒌根 水煎臨服加茅根汁
一小酒盞全服

吐瀉門

小兒吐瀉不異大人當於大人門擇治故不再論
茲採數方以備不時之急但審諦寒熱躰認傷
積証明則百投百効矣

凡吐乳直出而不停留者古謂之覘乳但以炒麥
芽三錢橘紅一錢丁香三分水煎服之立止

藿香散 治冷吐瀉臍不調瀉下青黃黑白色

或如雞子清或腹疼微熱

橘紅 藿香 枳壳 厚朴 製 炙甘草

右為末每服一錢米飲下 治瀉寒瀉下

凡熱吐者面赤氣粗唇紅吐出之勢射而遠乳已

化色黃小水短少二陳湯加姜汁炒黃連黃芩

枇杷葉

濟生竹茹湯 治熱吐口渴煩躁

橘紅 乾葛 甘草 麥門冬 竹茹 生姜



右水煎服 熱甚者加姜連

益元散 治熱吐面赤氣粗小水短少 傷暑作

吐尤佳 滑石六錢 甘草一錢 為末姜汁調一燈

心湯下吐甚者并花水下

凡食傷而吐者吐出之物有餽餒氣眼胞浮面色黃足冷肚熱日輕夜重麦芽枳實青皮檳榔厚朴陳皮之類消而降之

治瀉之劑

凡冷瀉者面色青白小水清腸鳴漉漉腹中作疼

凡霍亂吐不止者用蘆稷米炒黃煎湯飲之立止又方 白扁荳嫩苗煎湯飲之立止如無嫩苗時月即用白扁荳炒過煎湯與之亦安

二香散 止吐如神 真藿香二分 丁香一分

白滑石五錢 右為末每服五七分米飲下

凡冷吐者乳不消化多吐而少出而白眼慢神昏額上汗出急宜溫中理中湯參香散若將傳慢脾者可用全蝎觀音散

參香散 治寒吐胃虛投諸劑不効者



人參 沉香 丁香 藿香 木香 各等分

為末每三五分米飲調下

全蠲觀音散 治吐瀉截風定志庶免傳變慢驚

黃耆 炙 人參 各二分 木香 炙甘草 蓮肉

扁豆 炒 茯苓 白芷 全蠲 羌活 防風

天麻 各二分 右每服三五錢姜枣煎服

六神湯 脾胃虛吐瀉不進飲食

黃耆 扁豆 人參 白朮 茯苓 炙甘草

藿香 各等分 每三四錢姜枣煎服

口不渴益黃散理中湯挾風邪者藿香正氣散

挾暑氣者六和湯

胃苓湯 治冷瀉小水不利

蒼朮 厚朴 姜汁炒 陳皮 炙甘草 白朮

茯苓 猪苓 澤瀉 桂皮 姜三片水煎服

凡熱瀉者面赤唇紅小水短少口乾六一散燈心

湯調下立止

清六益元湯 治熱瀉小水短少口乾

白朮 炒 滑石 炙甘草 黃連 酒炒 麦芽 炒



水煎服

四苓湯

治熱瀉小水短少腹中作疼

白朮

炒

赤茯苓

澤瀉

猪苓白芍藥

酒炒

酒苓

酒連

水煎服

凡食傷而瀉者腹中或疼或脹噯氣如敗卵詳其所傷以對証之劑消而磨之如傷乳食以麥芽糯米食以酒麴肉以山查豆腐以蘿蔔子豈粉以杏仁諸菓子以射香肉桂傷魚以橄欖每於理脾中倍加所以之藥為君則效也凡諸內傷

初未下藹之時只宜吐之如瓜蒂散或蘿蔔子播滾水取汁多飲之即吐若食已下藹入胃則不可吐以香橘餅之類消之若腹中飽硬日數已久而痛在臍腹則宜備急丸等下之然後調補瀉始止也若補之太早恐食積不消久而變為痢疾或為脾洩或為痞滿皆由執衡者失先後次第之宜盲對証之劑之兩致也又投已上諸劑不止者乃重瀉也當從痲治

瓜蒂散

治食傷胸滿脹疼元々欲吐煩悶不安



瓜蒂三枚

赤小豆錢一

為末白湯調下五七分

少刻用鵝翎於喉中探之即吐

香橘餅 食積瀉冷瀉腹中脹疼

丁香 青皮 陳皮各錢半 厚朴 神麩炒

麦芽此各五錢 右為末煉蜜為餅紫蘇湯下米

飲亦可

消積丸 吐瀉大便酸臭

丁香粒九 砂仁粒十二 巴豆粒二 烏梅肉粒二

右為末麵糊為丸菴苳大溫水送下一二丸

保安丸 傷食瀉

香附子炒 砂仁炒各一兩 白姜煨 青皮炒

陳皮 京三稜 蓬朮俱煨 炙甘草各五錢

右為末麦芽麵糊為丸菴苳大每一二十九姜湯下

夏月作瀉或傷暑吐瀉以六和湯治之名六和者

以其能和六腑也

六和湯 治吐瀉霍亂

砂仁 半夏 杏仁 人參 炙甘草各一兩



赤茯苓 藿香 扁豆 木瓜 每三

五錢姜枣煎服

香橘膏 治吐瀉

砂仁 二錢 白苳仁 一錢 蓮肉 山藥 木香

青皮 五錢 陳皮 厚朴 一兩 麥芽 炒

神麴 二兩 右為末蜜丸雞豆大每服一九吐

用紫蘇湯下瀉荆芥湯下

保安四聖餅 治吐瀉驚痺吐瀉日久恐傳慢驚

人參 白朮 茯苓 各一兩 炙甘草 南星 炮

白附子 各五錢 代赭石 煨醋淬 蛇含石 煨三

右為末端陽日粽搗為餅計重一錢每服一餅

吐姜湯 瀉米飲 驚薄荷 痺米泔水下

荳蔻散 腹痛腸胃虛冷滑洩不禁

肉荳蔻一枚剉一小孔入乳香一塊濕麴包裹

煨熟為末每服三五分米飲下

睡驚太乙丹 治瀉後糞青鎮驚安神止夜啼

白朮 茯苓 桔梗 藿香 川芎

白芷 各三錢 扁豆 炒五錢 白芍藥 酒炒五錢 右為



末煉蜜為丸櫻桃大辰砂射香為衣每服半丸
薄荷湯或棗湯化下 夜啼燈心鈎藤湯化下

癖門

癖者血膜包水癖於脇傍時時作痛也惟癖能發
潮熱能生寒熱故瘡家中腕多蓄黃水日久而
後成癖此蓋小兒臟腑不和營衛不暢津液不
得流通冷氣搏之則結聚而成癖矣進食丸消
食丸可選而用之其者白餅子下之治之不早
恐成疰積羸瘦肚脹則難治也

取癖丸 治腹脇痞結氣滿不得宣通

甘遂

炒

芫花

炒

黑丑

半

炒

研末

辣桂

蓬朮

青皮

木香

菝仁

去皮

五靈脂

各錢

巴霜 右為末飛麵糊為丸麻子大每服一二
丸姜蜜煎湯灌下泄後用冷粥補之

燒丹

乳癖

食癖

午後寒熱

咳嗽

脇下結硬

玄精石

煨

輕粉

各一

粉霜

各五

礞石

各五

右為末入寒食麵一錢水和成餅外再用溫麵
包裹慢火煨黃色取出去麵將藥再研為細末

滴水為丸米粒大一歲五丸二歲十九夜卧白湯送下至天明取下惡物如不下漸加丸數如妳癖未消尽隔三兩日再一服以癖消尽為度紫丸子 嬰兒乳食失節宿食不化胸腹痞滿嘔吐惡心便利不調乳食減少不消內挾冷痰大便酸臭或變蒸發熱多日不解因食成癩先寒後熱

代赭石醋一服

赤石脂煨各一兩

杏仁去皮尖炒皮

巴霜錢一

右為末餽餅丸如黍米大月外兒

只服一丸米飲下微利即瘥

千金方云此方之妙無所不治雖為下藥並不虛人

七聖丸 能令黃瘦子頓作化生兒

三稜 莪朮 芫花各醋浸同炒 青皮 橘紅

川練子去皮 杏仁去尖 右為末醋糊為丸

黍米大食遠白湯服日間所食之食物盡行消化永無積滯

消積丸 消積聚寬腹脹退面腫進飲食化滯物





木香

人參

各一錢半

黃連

炒

莪木

醋煨各三錢

橘紅

青皮

炒

煥榔

枝二

右為末麵糊為丸

黍米大食後米飲下

萬金丸

磨積塊去黃胖神効

平胃散

加夜明沙

炒

針砂

醋炒

皂礬

醋煮乾

紅各一分

為末紅束肉為丸葦莖大空心米飲下

忌一切血及蕎麥麵

靈仙丸

消一切癖

歲靈仙為末煉蜜丸彈子大紅絹袋盛葉一丸

用精猪肉四兩煮極爛去藥聽喫其積化從大便而下以知為度

過癖散 治癖立効

海蛤粉

黃丹

硫黃

各一分

初伏日修合為

細末用好米醋調成膏於新烏盆中晒乾為細末一歲兒服一分空心米飲調下取下癖積如藍汁為驗

鱉甲猪肚丸

小兒痞積發熱

柴胡

黃連

鱉甲

醋炙各七錢

枳實

炒

木香



青皮 錢各五

青蒿 錢七

右為末入猪肚內蒸極

爛同搗為丸梧子大每服二十九人參湯送下

赤茯苓 錢六

赤芍藥

山梔子 錢各三

當歸

甘草 錢各五

每五錢燈心煎服

導赤散 血淋

生乾地黄

木通 錢各二

黃芩

甘草 錢各一

右為末每服一錢井水入燈心煎湯服仍以米

飲調油髮灰空心灌下

車前子散 小便不利

茯苓 猪苓 香薷 車前子 人參 各一分

右為末每服五錢燈心湯下

金砂益元散 小便淋瀝不通

麝香

海金砂

滑石

甘草 各一分

右為末

每服三錢木通燈心煎湯下或冬瓜仁湯亦可

茯苓散 治白尿

京三稜

蓬朮 各一分

砂仁

赤茯苓 各一分

青皮

陳皮

滑石

炙甘草

右為末每服一錢燈

心煎湯調下

三稜散
化積

小兒尿白久而成疝此藥實脾土消食

三稜

蓬朮

益智仁

甘草

神麩

麦芽

陳皮

錢各五

右水煎服痰嗽加製半夏口腥氣

加鹽調理諸痰加枣子

淋門

淋淋瀝也尿竅澁滯小便點滴而出艰澁而疼頻而數起也由結膀胱不能滲洩下焦之氣壅滯而然其血淋者熱自小腸而來小腸與心為

表裏心主血熱則妄行滲於膀胱而致之也

小兒尿出少頃如米泔狀者由乳哺失節傷於脾胃以致清白不分久則成疝而濁也尿初出時微赤良久變白乃熱疝之邪初出黃白良久變米泔者乃冷疝之候也冷者益黃散主之熱者牛黃丸冷而復挾熱者大蘆薈丸純白濁者厚朴丸諸失津液欲成疝而小便白濁者茯苓散

葵子散

小兒諸淋



葵子 車前子 木通 桑白皮炒蜜 藿麥

赤茯苓 山梔子 炙甘草各等分 水煎服

八正散 心經蘊熱口燥咽乾五淋小便澀眼目

赤脉赤瘡

滑石 瞿麥 木通 大黃 扁蓄 車前子

梔子各五分 甘草稍半錢 每二三錢加燈心

煎服

木通散 上焦熱小便閉煩躁生嗔及淋瀝諸瘡

丹毒

八正散 加赤茯苓 黃芩

五淋散 膀胱有熱水道不通或尿如荳汁或如

沙石或膏或血

血餘散 治血淋

髮灰二錢 生蒲黃 生地黄 赤茯苓 甘草

各一錢 煎調髮灰空心服

分清飲 通心氣補漏精小便餘瀝赤白濁

益智仁 川草薢 石菖蒲 烏藥 灯心水

煎服 一方加白芍藥茯苓

君朴丸

治諸疢小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子肉

煨

厚朴

制

黃連

各一兩

木香

二錢同炒

右為末麵糊丸赤豈大米飲下三十丸

胃苓丸

治小便如米泔甚効分陰陽退潮熱消

浮腫退黃疸調脾胃

此銅壁山人改湯

為丸

即胃苓湯加草薹米糊丸米飲下

嘔吐姜湯

下泄瀉車前子湯下

浮腫長流水五加皮

燈心湯下

黃疸本方一料加茵陳五錢燈心

湯下

白濁鹽湯下

疝氣茴香湯下

遺尿門

尿床附

遺尿者謂小便日夜時出多而不禁尿床者謂夜
入床睡去乃小便出而不知也良由下元不足
腎與膀胱虛冷所致故古方多用溫補下元之
劑腎氣實則氣固而溺有統攝則不致遺失也
劉守真又謂有熱客於腎部干於足厥陰之經乃
廷孔鬱結極甚而氣血不得宣通則痿痺而神
無所用故夜滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁
也此又不可不知



孫仲子泰來曰夫謂不禁者乃小便出多不計其
遍數為下元大虛之症由陽氣虛憊不能收持
此急症也不急治則死矣非大溫大升大補則
莫能濟其虛而固其原彼尿床者嬰孩童稚常
有之蓋男子十六而精通腎氣固即不為治至
其時亦自止若治之早者則早止也亦有至老
而不止者余目擊十數人矣余族且三人皆乏
嗣總由下元虛冷良可徵矣劉守真謂有熱客
腎部干於厥陰廷孔鬱結極甚不能宣通故遺

失不能收禁愚謂既鬱結極甚不能宣通則小
便所出者僅點滴而已所出必短澁疼痛色必
黃赤安能直遂長清不收不禁哉內經謂膀胱
約而為瘠不約為遺溺不禁由是察之守真之
論只可言淋乃暫有之疾非遺失日久者可擬
余不佞僭為辯

鷄腸散

小兒尿床遺溺不自知覺

鷄腸

燒

牡蠣

煨

白茯苓

真桑螵蛸

各
五錢

桂心

龍骨

各二
錢半

每服三錢姜枣煎服



雞脬脰散 治遺尿

雞脬脰具一 雞腸燒 猪胞炙

右為末男用雌女用雄每服一二錢酒調下

破故紙散 下元虛冷遺尿

破故紙炒 為末一二錢白湯調服

益智仁散 治全上亦治白濁

益智仁 白茯苓分 為末每服一錢空心米

飲下

又方 五倍子一半生用一半燒存性 為末雪糕為丸白湯下

補原丸 治下元虛憊小水不禁或如脂膏

桑螵蛸 益智仁 人參 仙茅 山茱萸肉

兔絲子 乾山藥 已戟 右為末各照常製

芡實粉為丸蓮肉湯送下七八十九

遺尿方 破故紙 益智仁 烏藥各三錢 白茯苓

茯神各一錢 右為末空心米飲下一錢

外腎光腫門

小兒陰腫多由甘肥不節濕熱下流或啼哭怒氣不順或失坐冷地皆能致之



丹溪謂脫囊腫大陸下不收以紫蘇莖葉為末水調荷葉包之又謂一人傳此方用野白紫蘇為末濕則乾摻乾則香油調敷雖皮潰而核欲墜悉有神功

菀仁丸

治怒氣不順啼哭鬱氣結於肝經發為

陰腫或為偏墜或水竇不通亦能發腫此方主

之 菀仁去皮 桂心 黑莖微 白蒺藜去刺

牡丹皮 大黃各等分 右為末煉蜜丸麻子大

每服五丸或七九丸青皮木香葱白煎湯入鹽

少許送下 或煎大流氣飲研青木香送下亦可

丹溪 用木通甘草黃連當歸黃芩煎服

牡蠣散 小兒外腎腫大莖物光明

牡蠣煨 為細末以津唾調塗腫處即消

又方 加地龍末一分 如外腎熱者以鷄子清調敷

又方 治小兒外腫 菀仁研如泥津唾調敷

青木香丸 寬中快高腹脇疼痛心下堅痞腸中

水聲陰腫偏墜

黑莖一兩 青木香 補骨脂炒 萆澄茄



檳榔

谷田

先將檳榔用粟米包外再以濕紙裹煨令焦去飯取檳榔全前葉為末滴水丸荒荳大每服二十九白湯下

又方

治偏墜

防風

牡丹皮

為末酒調服一二錢立効 或白湯入鹽下

又方

治偏墜

五苓散內加防風牡丹皮極効

有熱者服三黃丸

三白散

膀胱蘊熱風濕相承發為陰腫小便

不利

白荳

兩炒二

紫白皮

白朮

木通

陳皮

錢

右為末每二錢姜湯調服

蟬退散

陰囊忽腫或坐地多時感受風濕或為

虫蟻所吹

用蟬退五錢水一碗煎湯薰洗腫處腫消痛止

須洗二三次後服五苓散以燈心湯調服

又方 葱地上蚯蚓糞為末煎甘草汁調敷腫上

或薄荷汁調亦妙

痢門

小兒痢疾外感少而內傷多故曰無積不成痢也



但當審諦新久虛實若新起而腹痛手不可近
後重裏急日夜頻送小水短少稠粘之物若膿
若血不計遍數者急宜下之下後看輕重再為
調補噤口者審其從時令之氣而來躰必發熱
用人參敗毒散加陳倉米有熱毒薰蒸胃口虛
而不納穀或乾噦嘔惡者以辰砂益元散用生
姜汁調燈心湯送下若痢久而腸胃虛弱者但
當補養氣血蓋虛而痢自止也脾胃健飲食
進痢自旋止日數雖多而無誤於事也小便不

利者當利之清六九佳

人參敗毒散 治四時不正之氣發為寒熱瘧痢

或遍身作痛嘔噦惡心噤口 方見丹毒赤遊

加陳皮姜棗

香脯 小兒刮腸下痢噤口不食閉口合眼至重

危困 精猪肉一兩批 膩粉 將猪肉於炭

火上慢炙旋鋪膩粉令勻成脯每以少許與吃

如未知吃且放鼻邊自然要吃此方治胃口有

毒食之神効



百一選方 治噤口痢

蓮肉去壳留心碾為末每服半錢陳米飲調下
此是毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食

山藥散 噤口痢

乾山藥一兩半炒熟為末白湯調二錢服之

嘔噦立止

茅花湯 吐血下血鼻衄血痢黑痢

茅花一大把水煎服 無花用根代之

枳殼寬腸散 順氣治痢

甘草錢六 枳殼錢四 為末每服一錢空

心白湯調下

烏梅湯 治下痢津液少臟腑虛燥煩渴引飲及

諸病後煩渴引飲無度

烏梅肉錢五 白茯苓 木瓜錢一 右每三

錢姜一片水煎服

清六丸 治血痢小水短少及洩瀉 此方專清

六府濕熱故名清六內用紅麴者以其能消食
積而化淤血也





桂府白滑石

飛過六兩

炙甘草

一兩

紅麴

炒五錢

右滴水為丸灯心湯下二十九

芍藥湯

治赤白膿血裏急後重腹中疼痛刘守

真云行血則便膿自愈調氣而後重自除此方

是也

白芍藥

二錢

當歸

錢一

酒連

酒苓

錢五分

木香

檳榔

各五分

肉桂

四分

甘草

二分煎服

小水短少日夜後重者加只壳升麻桃仁各一

錢滑石三錢 若積滯重而熱盛者加大黃一

錢

保和丸

食積痢腹疼不知餓用此消之

山查

神麴

各二兩

陳皮

半夏

各一兩

蘿蔔子

連翹

炒各五錢

右末仍以神麴糊為丸荒荳大每

服一錢白湯下

小香連丸

裏急後重腹疼赤白痢

黃連

吳茱萸各一兩全炒只用連

木香

二錢

訶子

煨去核五錢

右為丸麴糊為丸荒荳大每三十九米飲下

地榆散

治赤痢無糞鮮紅點滴而下

地榆

炒蜜

訶肉

煨

甘草

各一分

為末每服一錢米飲調下

地榆飲 熱痢腹痛赤白頻併

地榆錢二 甘草 白芍藥 當歸各一錢 枳殼一炒

錢半 黃連吳茱萸炒一錢 水煎服

茯苓白朮散 治寒痢兩下清白如魚凍者脾弱

不思飲食

茯苓錢三 白朮 人參 木通 只壳 甘草

一炒各錢 肉果煨 桂心各一錢半 訶肉二錢 陳皮

每三五錢燈心煎服

朴附丸 治寒痢滑洩不禁

厚朴制 大附子炮 乾姜炮 陳皮各等分

為末粟米糊為丸每服五七分或一錢米飲下

又木香一錢 黃連吳茱萸炒三錢 粟壳去蒂萼蜜炒二錢

薑蚕錢炒一 甘草二錢 右剉以生姜三錢全炒

爆乾為末米飲調下 赤生地黃湯下 白烏

梅湯下 如有熱小柴胡湯解之

養臟湯 治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦

裏急後重腹臍疝痛脫肛 如臟腑滑洩夜起



及日久虛寒加大附子三片

粟壳

蜜炒
三錢

人參

當歸

肉桂

肉果

煨

白朮

訶肉

炙甘草

各一錢

木香

芍藥

各一錢半

每三五錢水煎服忌酒麪生冷

胃風湯

風冷乘虛干於腸胃水穀不化泄瀉腹

脇虛滿腸鳴痾痛下如荳汁或純瘀血

白朮

芍藥

川芎

人參

當歸

肉桂

茯苓

各等分

每服三錢入粟米一錢水煎服

芍藥栢皮丸

一切膿血惡痢窘痛

白芍藥

黃栢

各一兩

當歸

黃連

枳壳

各五錢

為末滴水丸荳豉大白湯下

三黃熱艾湯

積熱下痢赤色及治傷寒四五日

大下熱利諸藥不効者

黃連

黃芩

黃栢

熟艾

羊鷄子木

每服三錢水煎服

禁口痢

人參

黃連

石蓮子

三分

為末擦牙關二三次即能食

右丹溪用人參

黃連二味煎濃服之但得一呷入腹即愈此加



石蓮子亦有埋

芫蕤散

嬰孩腸胃脆弱糟粕不聚瀉痢不止或

赤或白冷熱不調日夜頻併愈而又發神効

但忌葷腥生冷

肉苳蔻

煨

胡粉

錢

龍骨

生

枯礬

錢

為末每服一錢米飲調下或以薄糊丸麻子大
每服五六十丸 謙曰胡粉即真鉛粉也出韶
州者名韶粉出定州者名定粉摠名光粉其性
喘故用以喘其腸令不虛滑芫蕤溫臟之蕪安

和腸胃龍骨白礬澁腸止痢凡虛滑日夜無度
者服之隨時痊愈

神効雞青丸

嬰孩一切痢疾不拘冷熱皆効

木香

錢

生黃連

分

肉苳蔻

生

一個

右為粗末取雞子青搜和作餅慢火炙黃色變
紅者稍乾擘破碾為末白麵糊為丸麻子大每
三五十九米飲下 此方功在雞子青

大効至聖千金飲子

治先吐後瀉後又變痢臍

腹痠痛脇肋脹滿受濕虛鳴膿血五色相雜或



如豆汁或如瘀血日夜無度食少肌羸

黃芪蜜炙

甘草

陳皮

粟壳蜜炙

木香

白芍藥

地榆蜜炙

黑荳炒

當歸

枳壳炒

烏梅

淮東

白朮

訶肉煨

黃連分

各等

每三五錢水煎服

大艾煎丸

小兒虛痢大渴不止

艾葉燒存性

乾葛粉

胡粉炒

海螵蛸

龍齒各等分

為末煉蜜為丸雞頭子大每服一

丸至二丸米飲下

木菹麵

噤口痢一粒飯不食宜此効

白朮錢五

肉果炮二枚

木香錢二

右為末白麵

一兩水搜作餅切作條子水煮熟用葱白生姜鹽各少許和汁與吃看所入多少仍用雞青丸

調理

炒鷄子

治休息痢及疴瀉日久不愈

鷄子一枚先用黃臍如指大一塊銚內溶化入

鷄子拌炒熟空心食之大効

剪紅丸

治痢鮮血



側栢葉 槐花 枳壳炒 荊芥穗各等分
醋糊丸糯米湯下

瘧門

小兒瘧痢治同大人惟劑輕小耳當於大人科茶治茲但收集數方以備緩急不重論也緣其症不外於外感內傷二者而已外感有六經之形症用和解六經之劑治之內傷有胸腹胞滿昏聩夜重之標準只以二陳湯加健脾消導之劑治之蓋無痰不作瘧也數發之後乃為截之虛

弱者補之然初發二三日之間必須導痰運脾和解為主切不可遽投補截設汗不週頭疼未徹則表邪未盡解也苟痰不清胸腹不暢則內傷未盡鎔也補之截之是閉其邪而塞其去路其變也曷勝言哉

和解六經之劑詳於大人科第八卷中

清脾飲 治瘧瘧熱而不寒或熱多寒少膈滿不能食口苦舌乾煩渴小便黃赤大便不利

青皮 厚朴制 白朮 草果煨 柴胡

茯苓 半夏 黃芩 甘草各等分 生姜三片



水煎服

養胃湯

外感風寒內傷生冷溫中快菖山嵐瘴

氣寒癰嘔逆

人參

蒼朮

厚朴

半夏

藿香

草果

煨去殼

茯苓

各五分

陳皮

七分

甘草

二分

姜三

片棗一枚烏梅一枚煎服

香葛飲

嬰孩夾食夾驚傷寒四時瘟疫瘧疾

香附子

炒

紫蘇葉

各一兩

橘紅

青皮

葛根

各五錢

炙甘草

二分

每三五錢姜葱白煎服

露星飲

治久癰成癆以此截之

秦朮

柴胡

白朮

茯苓

檳榔

常山

酒炒

一次

黃芩

甘草

半夏

麴

官桂

各一分

右用酒醋水各半碗煎七

分露一宿臨發五更服之

鬼哭飲

截瘡

常山

制

大腹皮

白茯苓

鱉甲

醋炙

甘草

菴柳枝各七條水煎臨發空心五更

服



南斗散 痰瘡

常山制

白芷

南星

生各
芽分

酒煎臨

發五更服

白朮截瘡飲

虛弱久瘡脾虛嘔吐不思飲食不

拘寒熱極効

白朮

一半生用一
半炒用四錢

橘紅

麦芽

各二
錢

烏梅

一
枝

姜五片

水煎臨發日五更服

何首烏丸

治久瘡陰虛熱多寒少以此補而截

之

何首烏

為末鱉血為丸黃芩大辰砂為衣臨

發五更白湯送下二丸

截法 不拘寒熱瘡端陽日製

菴葉尖

東南方者
四十九片

半夏

四十九
粒為末

搗桃葉

尖為丸雄黃為衣晒乾貯瓶中封固臨用取一

丸綿裹塞鼻中男左女右

鱉甲飲子

瘡久不愈腹左有塊名曰瘡母

鱉甲

醋
炙

白朮

黃芩

草果

煨即

芎藭


橘紅

甘草

厚朴

白芍藥

各等
分



姜朮煎服

青黃散

消瘡母如神

青黛

澄去灰土

雄黃

研細

各等分

為極細末每一歲用一分空心及夜淡

醋湯調下塊消其八即止屢驗屢効

銅壁山人治瘡母用月蟾丸

木香

人參

黃芪

當歸

桔梗

黃連

三稜

醋煨

莪朮

上全

鱉甲

醋炙

乾蟾

煨

史君子

苦棟根皮

訶子肉

夜明沙

枳實

綠礬

醋煨各等分

為末

醋糊丸陳米飲下

又截法

寒多熱少者俱以平胃散加常山草果

截之此內傷瘡

熱多寒少者俱以白虎湯加

常山草果截之

寒熱相半者俱以小柴胡湯

加常山草果截之 此外感瘡

吃坭門

小兒吃坭乃胃中熱丹溪用石膏黃芩陳皮茯苓

白朮煎服而愈徐氏用宣治一兒食泥土困睡

洩瀉遍身如疥此脾經內外疳也以六君子湯



肥兒丸而愈

吃生米門

吃生米者此胃中有虫亦宜健脾清熱肥兒丸佳
蓋吃泥吃米皆疳之漸當於疳門尋治大蘆蒼
丸等方酌而用之毋使臨期缺掌也

蒼朮丸

治吃生米

蒼朮

未泔浸一日為末

餛餅糊為丸梧子大每服五十九米飲下一日
三服

耳門

生生子曰小兒耳疾多屬風熱上壅亦有因於沫
浴水入耳中水濕停久搏於氣血醞而為熱化
為膿汁

湯氏云耳有五般常出黃膿者為停耳出紅膿者
為膿耳出白膿者為纏耳疳臭者為伍耳內
虛鳴出青膿者為震耳症雖五般病源一也皆
由風水入耳而因有積熱上壅而成若不早治
久則成聾宜胆脂膏治之仍服化痰退熱等劑
即愈也

孫季子朋來曰此五者不可謂全無分別詳其名
觀其色其間必有說也愚僭剖之停耳者為水
濕之氣久停耳中與氣血搏擊醞為熱膿蓋脾
主濕又脾之色黃以始為停濕所致故曰停耳
膿耳者心主血脉血熱化為紅膿心之色赤故
曰膿耳纏耳者肺主氣肺之色白肺氣不利纏
壅上焦化為白膿故曰纏耳伍耳者耳內疳臭
蓋耳為腎之外候小兒腎未充足偶為氣忤逆
於經隧心主臭心氣不得下降腎氣不得上通

故醞而為疳臭也震耳者易曰震為雷或為雷
聲震動故耳中虛鳴肝之色青故出青膿也此
因五臟有所感觸隨臟為名故有此五色之相
應也既有此五臟之因須推五臟之治庶為治
本若謂症雖五般病源一也則予未敢首肯
蔓荊子湯 治內熱耳出膿汁

升麻

木通

麥門冬

赤芍藥

生地黃

前胡

甘菊

甘草

梔白

皮

赤茯苓

蔓荊子

各等分

姜枣煎



食後服

清上散 治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡癩

方見風熱門

當歸龍會丸 治肝膽風熱耳中鳴出青膿名曰

震耳大便秘小便黃常服宣通血氣調順陰陽

當歸 龍胆草 柴胡 青黛錢五

梔子各一兩 胆星 射香分五 大黃 蘆會

錢各五 酒苓 黃栢 酒連各一兩 木香

錢五分 右煉蜜丸小豈大每二十九姜湯送下

清黃散 治耳出黃膿名曰聾耳內有風熱外為

水濕所干醞久而成

防風 滑石錢飛五 甘草錢灸一 梔子酒炒三錢

藿香錢二 酒連錢二 右為末白湯調二錢食後服

清心丹 治耳出紅膿名曰膿耳及舌上生瘡如

楊梅狀者

黃連酒炒三錢 滑石錢飛六 甘草 辰砂飛各一錢

薄荷分六 犀角屑錢二 右為末每用一錢五分

蜜拌薄荷湯下夜再服



清白散 治肺熱痰火上壅耳出白膿名曰纏耳

煎治咳嗽

素白皮炒

地骨皮各三錢

甘草一錢

貝母二錢

寒水石煨三錢

天花粉

酒苓

天門冬各一錢五分

右為末以蜜水

調食後服或白通草煎湯下尤妙

交感丹 治耳中瘖臭名曰伍耳或怒氣上逆上

下不得宣通遂成聾瞶

香附子童便浸透

茯神

黃連各二錢

桂心一錢

甘菊花一錢

右為末每一錢五分

燈心湯調下

禹糧丸 治疇耳出膿水

禹餘糧煨醋淬七次

海螵蛸去背上硬骨

百草霜

伏龍肝各二錢五分

大附子去皮臍生用一枚

右末

以綿裹如負眼挾大安耳內日再易之如不瘥乃有虫也

龍骨散 治諸膿耳

枯礬

龍骨

胭脂各一錢

射香少許



為細末先以棉裹杖子拭去耳中膿再吹一字
入耳中日再加海鹽蛸一錢尤妙

羊角散 治耳內膿汁不乾

山羊角燒存性為末每吹二三分入內一日二
次三日全瘳

滋陰地黄丸 治耳虛鳴膿汁不乾腎陰不足

熟地黄兩一 白茯苓錢四 山茱萸錢五 甘菊錢四

牡丹皮錢四 何首烏黑壹蒸三次 黃柏各四錢

煉蜜丸梧子大每三五十九

龜胸龜背門

古方皆屬之於肺謂受邪喘久所致又乳母多食
辛熱貽毒於兒感之於肺由肺脹大而胸高滿
如龜狀也蓋胸膈之上乃肺之分野又肺主皮
毛若背受風邪客於脊骨故背高而倮偃又或
兒坐太早亦能致之然此多成癩疾攷之古法
惟有百合丹枳壳防風丸及灸肺俞膈俞二穴
而已別無治法

百合丹 胸高脹滿其狀如龜





川大黃煨

天門冬

杏仁

百合

木通

桑白皮

甜葶藶

軟石膏

右為末煉蜜丸菴荳大每服五丸白湯臨睡服
枳壳防風丸 治客風入背如龜高聳

枳壳

防風

獨活

前胡

麻黃

當歸

大黃煨各錢

麵糊丸黍米大米飲下

松蓋丹 初生不暇護背為客風吹脊入於骨內

或坐早所致

松花

枳壳

防風

獨活各一兩

麻黃

前胡

川大黃

桂枝各五錢

右末煉蜜丸黍米大每十九丸米飲

下

灸法 肺俞穴 第三椎下兩傍各一寸半

蒿俞穴 第七椎下兩傍各一寸半 以小兒

中指量中節為一寸 每灸艾炷如小麥粒大

各灸三五壯

龜尿法 點背腫高處節間

取烏龜置於新荷葉上用鏡照之其尿自出鍼
點脊俞中若龜尿不出用猪毛挿入鼻中其尿

即出

虫門

小兒好食肥甘生冷傷於脾胃脾胃既傷則不能
運化精微而生溫熱溫熱久則生虫也發則腹
中疼痛上下往來無有休止或亦攻心則合眼
啼哭撲手仰身神思悶亂嘔噦涎沫或吐清水
四肢羸困面色青黃欲食難進不生肌膚或寒
或熱沉沉嘿嘿不的知其病之所在不早療則
腹中子母轉轉相生虫長一尺足能殺人觀周

歲已前小兒鮮有此苦者良由飲乳不食肥甘
生冷虫無從而生也即是觀之虫之生於溫熱
肥甘也不亦明乎予故述此生虫之源以為令
之為乳母者姑息之戒

化虫丸 虫咬心痛來去不定不思飲食

鶴虱

檳榔

胡粉

苦楝根

取東行
小枝各

五錢

明礬

半拈半生
三錢五分

右末麵糊丸菴豈大

三歲者服三十丸白湯入香油二滴吞下食前
服如有小虫皆化為水大虫即從大便而下初



服甚効

史君子丸

小兒五疳脾胃不和心腹脹時或疔

痛不進飲食漸至羸瘦

厚朴

陳皮

史君子肉

湯浸去黑衣各一兩

甘草

川芎

各二分五分

白芍藥

錢五

右為末煉蜜丸

皂子大三歲已上一丸米飲下

烏梅丸

治蛔厥當吐令反靜而復煩此為臟寒

蛔上入其鬲須臾復上得食而嘔又煩蛔聞食

當自吐及治久痢

烏梅 三十個

乾姜

炮一兩二錢

黃連

二兩

川椒

當歸

各四錢

細辛

人參

大附子

炮去皮臍

桂枝

黃柏 各七錢

右末用酒浸烏梅肉一

宿蒸飯搗為丸麻子大每十九日二次忌生冷

楨榔丸

楨榔

鶴虱

貫衆

乾漆

炒焦存性

蕪荑

雷丸

雄黃 飛

史君

子肉

川練子肉

木香

黃丹

錫灰

輕粉 少許

巴霜 二兩

右為末酒

煮麵糊為丸黍米大五更早用猪肉葱油煎將



肉細嚼勿吞下但只引虫頭向上便將肉汁調
化虫散或吞檳榔丸至巳時取下虫方進飲食
化虫散 先將豬肝油炙令兒聞其香味引虫頭
向上則葉可行 雷丸 鶴虱 甘草
大黃土各錢 史君子肉十枚 右末用猪肉煮
汁調五更服

疳門

生生子曰小兒疳症最為重候願疳字從甘明其
嗜貪甘肥成積生虫損傷脾胃脾胃一虛百病


蜂起古稱五疳言五臟之疳也五疳之外其名
甚都如曰疳氣曰疳虛曰疳熱曰疳癆曰疳露
曰腦疳曰脊疳曰無辜之類不勝枚舉蓋脾胃
虛則停積則生熱或瀉或痢或風或癰生疳
生虫二十已下其病為疳二十已上其病為癆
症雖多種源一而派殊也而治總在脾胃為重
五臟皆受氣於脾胃賴坤元以資生也又有乳
母未斷乳時先躄身孕兒飲孕乳久為魃病以
其疳成肉消顛大髮穗腿枯形肖傀儡若魃然



也又有母躄虛弱氣血不足乳汁不充強餵粥飯耗傷形氣皆成疳兆楊錢二公治論極正採錄於左以為法眼

楊氏俊子曰疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷積者虛中之積治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補治積不可用霸峻取錢氏仲陽曰小兒初病為肥熱疳熱則涼之久病為冷瘦疳冷則溫之小兒易虛易實過寒則生冷過溫則生熱峻取則重傷脾胃上醫處其消

積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶持之病家調節乳食以裨養之使營衛調和臟腑充實若或過焉君子未保其往也積者疳之母由積而虛謂之疳極凡有積者無不壯熱腳冷若積而虛甚則先扶胃使胃氣充實方與微利急以和胃之藥扶虛救裏如白苳菟蘿蔔子砂仁蓬朮消積等劑疎利之藥也脇腹癢痛亦虛中之積先寒後熱飲水不食或飲水而致喘嗽凡熱疳以胡黃連丸冷疳以木香丸冷熱疳以通神丸主



之疳在外耳鼻生瘡者以蘭香散諸瘡白粉散
主之

銅壁山人曰凡治疳不必細分五疳但虛則補之
熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治利積則
治積虫則治虫不出集聖丸一方加減用之屢
試屢驗矧此方收聚藥品極為工緻誠醫中之
王道疳門之火東也業幼科者則亦當知其所
自哉

生熟地黃丸 治肝疳白膜遮睛合面而卧肉色

青黃髮穗筋青腦熱羸瘦生地黃 熟地黃

川芎 赤茯苓 黃連 杏仁

半夏 天麻 甘草 當歸 枳殼

地骨皮 各二錢 右每三五錢姜三片黑荳

二十粒水煎服

地黃丸 腎疳極瘦遍身瘡疥發寒熱時頭熱脚

冷 熟地黃 山藥 山茱萸

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 右末蜜

丸梧子大每服十五丸白湯下



又方 治全上 無山茱萸茯苓澤瀉加史君子

川練子

茯苓丸 茯苓神 蘆會 琥珀 黃連

赤茯苓 各三錢 釣藤鈎 遠志 姜煮 乾蟾

煨 射香 少許 石菖蒲 各一錢 右粟米糊丸

麻子大每一二十九薄荷湯下

神効換肌丸 脾疝肌瘦潮熱盜汗飲食易傷臟

腑糟粕飲食不化頭大腹急

黃連 炒 驚甲 醋炙 肉果 煨 訶肉 煨二分

射香 一分五厘 麦芽 炒 神麴 史君子肉 煨各五錢

右末麵糊丸麻子大米飲下看大小服

靈脂丸 脾疝食疝

白苳蔻 麦芽 五靈脂 砂仁

蓬木 煨 青皮 陳皮 史君子 各一錢


乾蟾 煨三錢 右末米糊丸麻子大米湯下

清肺湯 肺疝咳嗽氣逆多喘壯熱惡寒

桑白皮 蜜炒五錢 紫蘇 前胡 黃芩

當歸 麥門冬 連翹 防風 桔梗





茯苓

生地

甘草

各二分五分

每五錢水

煎服

黃連肥兒丸

治一切疳及疳眼赤腫昏暗雀盲

或經月眼合不開

黃連

兩

燕莢

麦芽

神麩

各五分

青皮

史君子肉

各二分五分

右各炒為末

豬胆汁丸每十五丸米湯下

大蘆會丸

治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

白燕莢

蘆會

木香

青皮

雷丸

白者

鶴虱

炒各五錢

射香

二錢

右末粟米飯丸荒荳大米飲下二三

十九

香薷丸

疳瀉

黃連

姜汁炒三錢

肉果

煨

木香

訶肉

砂仁

茯苓

右末飯丸

麻子大每二三十九丸米飲下

加味肥兒丸

治諸疳身黃肚急痞塊洩瀉瘦弱

胡黃連

史君子肉

三稜

莪朮

各煨

木香

香附

青皮

炒

陳皮

檳榔

麦芽炒 神麴炒各一兩 川黃連 蘆會各五錢
右末神麴糊為丸 荒荳大米飲空心下三五丸
小兒無熱去胡黃連 泄瀉加人參茯苓
肉果

加味胡黃連丸 治疴疾一切虛痢諸藥無功此

方極効

胡黃連 蘆會 川黃連 肉果 桂心

人參 辰砂 史君子 木香 釣藤

龍齒 茯苓各一分 射香少許 右末用獾猪

胆汁二枚取汁和藥令勻却裝入胆袋內以繩
扎之更入菘荳子二錢微炒黃丹一錢二味研
末入前藥和勻搗五百杵丸荒荳大米飲吞下
五七丸治一切十二種疴痢無毒疴亦佳


蚶蚱丸 治無毒諸疴一服虛熱退二服渴止三


服瀉利住 蟾蜍一隻打死置桶中取糞虫入

桶一日一夜將虫取起以布袋盛安急流水中

一宿取出瓦上焙為末入射香一字飯為丸麻

子大每三五七丸米飲下 此方極驗





木香丸 治疝痢冷熱不調五色雜下裏急後重

黃連錢二 木香 厚朴制 砂仁 夜明

沙 訶肉各一錢 右末粳米飯丸麻子大每

服二三十丸艾姜湯下

十全丹 治丁奚哺露

青皮 陳皮 莪木煨 川芎 五靈脂

白豆仁 檳榔 蘆會各五錢 木香 史君

子 乾蟾灰各錢二 右末猪胆汁浸糕糊丸

麻子每服二三十丸米飲下有熱薄荷湯下

五疝良方 治疝

黃連 蕪荑 神麩 麥芽 陳皮

木香 乾蟾煨存性各一兩 檳榔二枚 史君子

肉果二枚 射香一字 右末以猪胆汁二枚入好

酒打糊為丸芥子大米飲下二三十丸

天麻丸 治肝疝風疝疝眼

青黛 黃連 天麻 五靈脂 川芎

夜明沙炒 蘆會各二錢 龍胆草 防風

蟬退各一錢五分去足嘴 全蠲各二枚 射香許少

乾蟾頭錢灸二

右末猪胆汁浸糕丸麻子大每

二十九薄荷湯下

地黃清肺飲 肺熱疳積蝕為穿孔鼻或生瘰肉

或鼻生瘡

親白皮蜜炒

紫蘇 前胡 防風

赤茯苓 片苓

當歸 連翹 桔梗

天門冬 生地 甘草各二錢

水煎食後

服次服化蠶丸

化蠶丸 蕪荑 蘆會 青黛 川芎

蝦蟆灰 白芷 胡黃連各等分 右末猪

胆汁浸糕糊丸麻子大每服二三十丸食後卧

服以杏仁湯吞下其鼻常用熊胆泡湯小筆蘸

洗俟前藥各進數服却用青黛川歸赤小荳瓜

蒂地榆黃連蘆會各等分雄黃少許為細末吹

入收功

下虫丸 治疳蛔諸虫

木香 飛仁去皮 蕪荑炒 楨柳各一錢

鶴虱炒一錢 輕粉五錢 乾蟾灰三錢 史君子肉五十枚





白若練根皮酒浸貫衆各二錢右末麵糊丸

麻子大每三十九空心清肉汁下治疔勞脊

勞加川歸黃連各二錢五分

龍胆丸 治腦疔熱餅瘡

龍胆草 升麻 苦練根皮 防風

赤茯苓 蘆會 油髮灰各三錢青黛

黃連各三錢右末豬胆汁浸糕丸麻子大每二

十九薄荷湯下食後仍以蘆會末吹入鼻中

驚血煎 治疔勞

蕪荑 柴胡 川芎各一兩人參五錢胡連

川連各二錢史君子廿一枚右用驚血一盞吳茱

萸一兩拌二連淹一宿次早炒乾去茱萸只用

二連俱為末粟米糊丸麻子大每二三十丸白

湯下

驚甲丸 治無辜疔腹中毒起四肢瘦削

驚甲醋炙黃連 枳殼 夜明沙各炒五錢

訶肉一枚生一熟射香二分蝟虎錢一右末

蜜丸荒荳大每服五丸米湯下日三服

梅肉丸 諸疳煩渴飲水不休

定粉

龍胆草

烏梅肉

黃連

炒各分

煉蜜丸黍米大每二三十九白湯下

五疳消食丸

治五疳八痢殺腹臟虫療疳勞及

走馬牙疳唇爛肚大青筋此藥大能健脾進食

華顏色長肌肉

麦芽

史君子

黃連

蕪荑

炒各

陳皮

龍胆草

各等分

右末粟米糊丸如粟

米大每服二三十九空心米飲下不拘時

蘭香散

治小兒走馬疳牙齧潰爛以至崩砂出

血齧落者

輕粉

蘭香子

各一錢

蜜陀僧

炒醋淨五錢

右末傳齒及齧立効

傳齒立効散

鴨嘴胆礬

匙上一煨一錢

射香

少許

右研極細末以少許傳牙齒齧上

又方 用礬酥一字加射香傳之

地骨皮散

治腎疳齧牙齒肉腐臭鮮血常出

生乾地黄

錢五

真地骨皮

比細辛

各二錢半



五倍子二炒焦
亦可服

右末每以少許傳之頻用効

大効史君栴榔丸 嬰孩食肉太早損傷脾胃水穀不分積滯不化傳為疳候

肉果 栴榔生

宣連 胡連

陳皮 青皮

川練肉炒 神麴

蕪荑皮炒去 麥芽炒

水香 夜明沙炒

蘆薈 川芎各錢

射香一 右末雄猪胆

汁薄荷汁為丸麻子大每三五十九米飲下

肥肌丸 一切疳氣肌瘦躄弱神困乏力常服殺

虫消疳開胃進食

黃連 香附酒炒 陳皮各二錢半 川練子肉炒

川芎各五錢 木香二錢 右末紅麴糊為丸麻子


大每服三五十九米飲下

通神丸 治冷熱疳

胡連 川連各二錢 木香 蕪荑炒

丁香 肉果生 史君子肉煨各錢 大膽餘

一隻 鈞水 煮爛研膏 右末膏和丸麻子大每十五丸米



飲下

取交妳一切疔毒

夜明沙

錢五精猪肉三兩碎切全入瓶水煮爛與

兒食之汁亦飲之取下腹中胎毒 次用生姜

四兩和皮切炒黃色再用黃連一兩二味為細

末煮麵糊為丸黍米大米飲下三十九

布袋丸 諸疔面黃腹大飲食不潤肌膚 此方

予平日用加阿魏五錢極効

夜明沙

蕪荑

史君子肉

各二兩 白朮

甘草

各炒

茯苓

人參

蘆會

各五錢

右末餗餅為丸彈子大每一丸以生絹袋盛用

精猪肉二兩全入瓦甌煮極爛聽兒食肉飲汁

其藥取起懸於風處次日再用

如聖丸 冷熱疔瀉極神効

胡連

川連

蕪荑

史君子肉

各一兩

射香

五分

蟾蜍

五隻酒煮成膏

右末以膏和為丸麻

子大每三十九人參湯下

肉束散 肉疔而瘡侵入口鼻



束肉二枚入青礬如椀大火煨存性為末入射

香少許香油調塗

煮肝散 疳眼翳膜羞明不見物

夜明沙

蛤粉

穀精草

各一兩

右末每

服一錢五七歲二錢用雄豬肝如匙大一塊批開摻藥在內攤勻麻扎定米泔水半碗煮肝熟撈肝將汁傾在碗內將目薰之其肝分作三次食之即將肝汁送下三次不拘時如大人省目空心食之至夜便能見物如患久不効再製服

即見効

黛連蘆會丸

小兒食甘甜味食、則生虫生疳

以此治之

胡連

蘆會

川連

史君子

各五錢

神麴

炒一兩

阿魏

青黛

各一錢

射香

許

右末糊丸黍米大米飲下

四味肥兒丸

嘔吐不食腹脹成疳作瀉不止或

食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱瘦怯遍身生瘡小便澄白腹大青筋一切疳候



川連

蕪荑

神麴

麦芽

各一分

右末糊丸桐子大每二三十丸白湯下

銅壁山人黃公集聖丸 治一切疳症附加戒法

於後屢試屢驗

蘆薈

五靈脂

夜明砂

砂仁

橘紅

木香

莪朮

史君子肉

川連

川芎

乾膽

當歸

青皮

各一錢半

因於虛者加人參二錢白朮三錢去

莪朮青皮 因於熱者加龍胆草三錢去砂仁

莪朮 因於吐瀉下痢者加白朮二錢肉果煨

訶肉各一錢五分去青皮莪朮 因於積痛者

加煨三稜川練子肉小茴香各二錢去當歸川

芎 因於癥者加鱉甲醋炙三錢 因於重者


加白蕪荑一錢五分川練子肉二錢去當歸川

芎 因於渴者加人參白朮各二錢去莪朮砂

仁 右為細末用雄猪胆汁二個和麵糊為丸

看大小服米飲送下 予按此方乃十全丹去

換御白荳仁加黃連夜明砂仁尤為有理方



名十全功收十全也茲改集聖者集治瘡之聖品也此方不熱不寒補不致滯消不致耗至穩至妥故有屢試屢驗之語云

又猪肝散

治疔積癩而躰羸弱不經下者用此補而下之下後再以參苓白朮散之類調理

雄猪肝不見水者四兩用竹刀批開將新荷葉晒乾為末二錢摻入肝內重湯煮熟以肝與見食之空心服至巳午時取下惡物從大便而出不動臟腑經佳極佳

癩門

錢仲陽云凡治五癩皆隨臟治之每臟各有一獸之形証並用五色丸治之此治小病者發而重者死病甚者亦死若反折上竄其声如犬症屬肝也目瞪吐舌其声如羊症屬心也目直腹痛其声如牛症屬脾也驚跳反折手縱其声如鷄症屬肺也肢躄如尸口吐涎沫其声如猪症屬腎也

生生子曰叅前論雖以五獸配屬五臟亦是以意



測之耳現其症用五色丸槩治之且謂發重者及病甚者皆死再無別治法豈謂一五色丸悉能之耶抑謂此病為不治之症殆無可柰何耶將為畧之耶攷之上古未有五獸之分惟朱丹溪乃曰癇症大率屬痰與驚不必分五等尋火尋痰分多少而治無有不愈有熱者以涼藥清其心有痰者可用吐法吐後以東垣安神丸及平肝之藥青黛柴胡川芎之類丹溪此論亦極當理

癇病與急慢多相似而實非癇發時驀然仆地作声作搐或目上視醒吐涎沫急慢症則不然也蓋驚發後即止癇發或一年一度或一季一度或一月一度或三五日再發或受驚而再發或勞心勞力而再發驚則無此之類也

癇有陰陽若病初作時先身熱開目瘈瘲驚啼叫喊而後發脉浮者為陽癇仆地多仰內在六腑外在皮膚故易治若病先身冷目半開不驚瘈不啼叫而作脉沉者為陰癇驀然墜伏此內



在五臟骨髓故難治

夫陽癇不因吐下由其內有痰熱客於心胸之間因聞大驚而作若熱盛雖不聞驚亦自作也陰癇其始也亦本於痰熱醫以寒涼藥攻下太過損傷脾胃乃變而為陰非癇本有陰寒症也戴原禮曰癇有五無非痰涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引背僵直叫吼吐沫食頃乃甦宜星香散加全蝎

孫季子朋來曰凡治驚風顛癇之症而辰砂雄

黃金泊水銀鉛粉等劑不可以久服也緣此皆治有餘之症驚搐初發胃氣尚壯痰邪方盛非此慄悍踈利之劑為之先鋒不可以祛去也稍久則不宜用蓋小兒臟腑脆弱易致虛耳前劑皆傷脾者丹溪云氣虛之人有痰胃氣亦賴所養卒不可便攻攻反易生而多惟健脾胃以全運化之職則新痰不生兼佐之以消痰之劑則風自定故不專以鎮心攻痰為仗且心者一身之主神明出焉智慧之所由生也鎮心之劑



過多則神志奪而聰明窒塞內經曰主不明則十二官危余徃々見多服驚風鎮心之藥者驚定之後痴呆愚鈍寡言寡笑靈覺寂無愀然可憫詎思前藥之所誤哉幼々之心當知所慎又有食癩原從飲食過傷而得後復傷飲食則發其外症嘔吐酸氣或大便餽臭治法先當吐其食俟定後宜以下積藥看輕重下之積去則不復發

五色丸 又名五癩丸

硃砂五錢

雄黃

珍珠各一兩

各為細末

再以鉛二兩入銚熔化投汞二錢五分攪硬研

末和勻煉蜜為丸麻子大每服三四丸薄荷湯下

牛黃丸 治風癩因汗出解脫風邪乘虛迷悶搐

掣涎潮屈指如箕數

胆星

全蠍焙

蟬退

各二錢半

防風

白附子

天麻

射香

姜蚕

各一錢五分

右末枣肉

為丸水銀五分研細入藥丸如蕞荳大每服二

丸荊芥生薑湯下



消風丸

治風癩先宜用此

胆星

羌活

獨活

防風

天麻

人參

荆芥

川芎

細辛

錢各一

右末蜜丸梧子大每二九薄荷紫蘇湯化下

比金丸

治驚癩先宜用此

人參

琥珀

茯苓

遠志

去心姜汁炒

硃砂

天麻

石菖蒲

川芎

南星

青黛

錢各一

射香

右末蜜丸梧子大每二九薄荷湯下

化風丹

涼風化痰退熱定搐

胆星

羌活

獨活

防風

天麻

人參

川芎

荆芥

粉草

錢各一

全蝎

一枚

右末蜜丸皂角子大每二九薄荷湯化下

妙聖丸

治食癩因驚而傷食吐乳發熱大便臭

代赭石

煨醋淬二錢半

巴霜

錢三

雄黃

全蝎

辰砂

輕粉

射香

錢各一


杏仁


炒二錢

為末束肉為丸梧子大每二九木賊湯下

斷癩丹

治癩瘡後復發症候多端連綿不止





黃芪

灸蜜

釣藤

細辛

甘草

各五錢

蛇退

酒炙二寸

蟬退

個四

牛黃

錢一

右末末肉為

九麻子大人參湯下每服十數丸看兒大小

茯神湯 治胆氣虛寒頭疼目眩心神恐懼不能

獨處或是驚癇

茯神

酸棗仁

炒

黃芪

栢子仁

白芍藥

炒

五味子

各一兩

桂心

熟地

人參

炙甘草

各五錢

右每五錢水煎服

養心湯 治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無

寐發熱煩躁

黃芪

茯苓

茯神

半夏麩

當歸

川芎

官桂

栢子仁

酸棗仁

五味

子

人參

各三錢

炙甘草

一錢五分

姜朮煎服

妙香散 治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少

寐盜汗等症

辰砂

錢三

射香

錢一

木香

錢半

茯苓

山藥

茯神

遠志

黃芪

炒各一兩

桔梗

炙甘草

人參

各五錢

右末每服一錢溫酒

或白湯下

五癩丸得効方

露蜂房焙

石綠各一兩 桂心

遠志肉

人參各五錢

硃砂一錢

右末粥丸梧

桐子大每二三十九白湯下

參星湯 虛而癩久不愈者

人參五錢

南星炮二兩

為末每服一錢看大小姜枣湯下日二次

銅壁山人治諸癩發歇無時

乾地龍錢五

煅醋

虎睛一對

人參 天竺黃

代赭石煅醋

辰砂

鐵粉各二錢半

輕粉五分

雄黃一錢五分

金銀箔各三十片

牛黃一錢

琥珀三錢

腥星 遠志


石菖蒲

白附子各三錢

姜蚕一錢

右末蒸餅糊為丸菴豈大菖蒲紫蘇湯下


終






NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

十二卷







國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.




國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC



Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black



國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.




1004

1004

10704 4.23



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





赤水玄珠第二十七卷痘疹

新安生生子孫一奎著輯

痘疹心印小引

生生子曰余考痘之為症上古軒岐秦越人淳于公輩皆未之論列也自東漢建武中南陽征虜染流中國時謂之虜瘡醫著以蜜煎升麻數數拭之然則痘蓋肇于東漢也已顧柰何張仲景華元化王叔和皇甫謐褚澄孫真人王冰許學士諸名公亦未之置喙至宋錢仲陽而下陳文

痘

疹

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



中李東垣王好古朱彥脩乃始言之迨劉昉之
幼幼新書王賓湖之幼科類萃徐用宣之袖珍
寇衡之全幼心鑑湯衡之嬰童寶鑑高武痘疹
正宗汪石山痘疹理辨魏直博愛心鑑李言聞
痘疹証治痘疹要訣聞人規胡大卿八十一論
李實痘疹淵源翁仲仁金鏡錄萬菊軒痘疹心
要俞東臯痘疹危言皆特以痘疹為言者不下
數十家各相發明似無遺漏宜乎今之嬰童可
無虞矣何邇年來痘疹一臨殤輒相踵十不保

五局故哉屈教前書不為不多吐心露膽不為
不悉豈多岐而亡羊耶抑真術猶有未臻者耶
嗟嗟書不盡言言不盡意明者當心得之已古
謂用藥如用兵岳武穆云諱而後戰兵法之常
運用之妙存乎一心書安能使人人必克勝哉
矧今之業專門者以痘為秘術為禁方固不道
其道心其心久師其見各顯其法而不思融洽
繁理以契所歸故乃宗張喙李是甲非乙殆派
紛而不合其源曷能齊其治哉余燭斯弊每為



痛心故節錄各家成法參以鄙意會而全之名
一瘡疹心印庶好生君子得以窺其竅妙云爾
原痘

痘疹曰上古之世未聞瘡痘之瘡素難之文鮮
及者豈無人一應於野積精全神虛和苛毒
莫之能古歟或云晉建武擊虜遂染其毒流布
中國謂之虜瘡或曰聖瘡言其變化莫測也或
曰天瘡言為天行疫癘也或曰百歲瘡言人自
少至老必作一番也或云蛇豕瘡言其形之相

似也故患此者如蛇蛻皮如龍蛻骨死生存
呼吸之間夫上古所無而季世有之抑時世
耶抑人將失之耶余思其繇天地之氣春夏生
養之紀也其物熙熙秋冬殺戮之紀也其物黜
黜時逮末世已非泰和之景不可謂非時世之
異然人日習偽不知持滿御神之道七損八益
之數務快其心以散其真不可謂非人自失之
也有論穢毒者有論淫火者有論時行正病者
靡有定論將謂穢毒淫火耶則一歲之中大而



安得一生只發一次哉矧人之出疹出痘正如
蚕之蛻殼一眠二眠三眠也若謂純是胎毒不
假天行何臨作之年郡縣村鎮沿鄉接境莫不
皆然即卵生如雞鴨胎生若猪犬且皆不免又
際可見至於生者死者實由所感天行之輕重
非干所稟之厚薄也觀今之童稚躰盛神壯宜
其稟氣之厚亦多死者形羸色瘁豈非所稟之
薄且多生者迹此驗之死生輕重乃臨時所感
天行之輕重也為父母者慎加保惜以膺天和

不可純委於命而尤天也特筆此以告

萬菊軒曰昔人謂在胞中饑則飡母之血渴則飲
母之血余獨謂其不然蓋見始受氣之時一月
胚二月胎不過一點精血凝結中涵生意也至
三月以後其形漸成在胞之中譬諸禽鳥之雖
在卵殼中渾渾然薰蒸滋養惟所受太和之氣
漸自生長日月既足乃破其胎卵而出矣何以
能飲食耶必謂有所飲食則胚胎之初形象未
具何飲何食耶且血者渣滓之物有入必有出



十月之前所飲所食之血又從何道出耶若生
下口含惡血乃母臨蓐之時血穢流溢入兒口
中未必便是先在腹中所食之血也但云兒在
胞中滋養形骸長育變化培植根蒂者則在母
之血液也

或有問曰兒在胞中饑則食母之血渴則飲母之
血萬菊軒以為必無此事驗今之初產之孩口
有穢血少頃就有黑糞從便而下是其徵也安
可遽謂必無之耶孫季子朋來對曰以物理格

之似無此事也兒之胞胎在腹猶瓜菓然瓜菓
賴藤樹滋灌汁從蒂入日漸肥大成熟兒在胞
胎混沌沌懵然無知焉有穢氣蓋藉母之漚
從胞蒂而灌入臍中十月充是胞分而出口中
之穢間或有之實分娩時胞中之餘穢惡露也
大便黑糞如瓜菓中之汁水耳此必有之物殆
平時灌滲積於其中出懷之後各自立極陽升
陰降陽升者啼聲上出也陰降者大便下行也
此必然之勢亦必然之理也出懷之後始有出



有入在腹胞中安有出入之徑竇者乎格物者
自能辯之母致疑也

痘不宜毒物醇發

生子曰痘本火毒尤因天行故發熱之初看其
熱盛便知毒重即宜解散使表裏踈通俾熱毒
有門路出也全在頭着工夫胡大卿曰小熱宜
解毒大熱宜利小便觀此可見前人慎重之意
不輕易用大寒大毒之劑動其大便恐傷冲和
壞脾胃也緣痘全藉脾胃尤賴冲和始能灌漿

結靨所謂冲和者即胃中坤元之氣人賴之以
養臟府而灌溉周身者也近觀西吳治痘罔用
頭着工夫動輒便以鱖魚桑虫雞冠血虺蛇等
毒物謂之醇痘習俗為常不思痘本火毒二因
宜發但當先門路未清小毒蘊成大毒茲又以
毒攻毒不啻火熾添油則脾胃冲和若燎毛矣
故毒發之後痘粒粗大膿何得滿或潰而爛或
噦而嘔或發癰毒或成外剝或致泄瀉種種之
禍變難悉舉豈知門路踈通則痘縱不起發不



過補助氣血而或以大成散佐之自能行漿灌
膿蓋痘粒小則漿易滿亦無變疔是曲突徙薪
之法也舍此不為而徼彼焦頭爛額之功殆亦
危矣戒之戒之

戒用天靈蓋

生生子曰醫本仁術夫仁者無大無小無貴無賤
無見無隱無處不然故啟蟄不殺方長不折皆
所以体天地而愛物存仁也醫之治痘逆者不
治險者宜治前人方法林林種種何莫非藥何

物非劑何適非宜故乃取人之骸骨而煨煉之
嗟嗟其忍心亦劇矣乎不思痘之無膿者由氣
虛而血不充也補氣以氣補血以味合取其氣
味之純厚者以補之則得矣如人乳紫河車鹿
角膠之類皆氣純味厚者庶可以補氣血而資
精神彼遺久死骸迨氣血竭絕枯朽之物猶稿
木死灰已且不能延生而又能資他人乎此必
無之理也且痘古稱天花貴清潔而厭腥臭其
不可用一也膿少由於血虛喜潤而惡燥茲犯




煨煉枯燥其不可用二也况律有禁條以無可
取効之物而戕人之遺躰犯律之禁傷天之和
噫操殺術也焉得仁

或曰有用之而痘立發者何謂也生生子對曰
余非謂此物不能發特慨其發之後燥毒交扇
烈若燎原正如灯庖油盡而又益之以灯心立
見焦枯良可悼夫

腎無痘辯

生生子曰諸書皆言四臟俱有痘獨腎無痘故發

熱之初單頭四臟之症驗耳之冷則知腎無痘
也余謂此皆臆度之言非見道之語也緣痘稟
於有生之初父母之淫火伏于子之命門為天
行癘氣感觸而發觀銅人圖命門穴在兩腎俞
之中與臍相對秦越人謂兩腎中間動氣者五
臟六腑之本十二經脉之根呼吸之門三焦之
原臟府從此而生故人之所以得不死者賴此
動氣以為生生不息之根有是動則生無是動
則呼吸絕而物化矣夫以耳之冷熱驗痘出之



輕重則可若以耳之冷而遽謂腎之無痘則不可腎既曰無痘何前人又有變黑歸腎之說由其有出斯有歸也詳古人用四牙散一方亦可見矣蓋牙者骨之餘腎之標是亦以腎補腎之意惟腎之元氣充足則其痘始能盡出且又能制伏其火而使其氣血相依故化膿結痂而愈也腎虛則不能化漿而使之盡出結痂則色變黑馴至焦枯而告殂矣故曰歸腎者猶言痘本出於腎而仍還於腎也是為辯

首尾不可汗下辯

萬菊軒曰今之治痘者悉云首尾不可汗下听者和之曰痘宜溫補汗下不可也此亦喜補惡攻之遺弊殊不知治痘之法莫要於解毒或攻或補務使毒氣得解而已如其氣血和暢營衛流通表裏無邪其出則盡其發則透其收則時非但不可汗下雖溫補亦不可用也設使外感風寒約束皮膚腠理痘出不快此當汗之令陰陽和營衛通而痘易出毒得解散可也苟不汗之



則毒無從得出留伏于內未免閉門留寇之禍
矣如大熱不退煩渴轉增譫妄昏沉便溺阻塞
此毒留于腸胃之間與穀氣併宜急下之使臟
腑踈通陳莖滌去可也苟不下之則藏壅畜毒
煎熬于中寧無養虎遺患之悔乎故大要曰謹
守病機各司其屬有者求之無者求之必先五
勝踈其血氣令其條達而致和平此之謂也

審証

孫季子朋來曰治痘先須審証痘因胎毒必假天

行令氣或內傷飲食激而發也發熱之初預當
明其輕重蓋熱輕毒輕熱重毒重也設熱既重
便宜察其表裏外感內傷內傷為裏夫痘全藉
脾土以為依歸脾為倉廩五臟皆仰給於脾外
主肌肉行漿灌膿結痂皆在肌肉脾既受傷則
內熱蘊悶或腹疼嘔惡急宜消之重者下之使
裏無壅遏則熱自退神自清也內傷不急治六
七日後痘既外出腹中虛矣內傷之物因而瀉
痢則不能灌膿而成內陷外感風邪即宜清解



若頭項痛腰脊強便知為太陽經表症若鼻乾
不得眠口渴便知為陽明經太陽以防風羌活
寒月麻黃桂枝陽明升麻葛根之類古人云必
使一晝一夜汗出熱退為佳蓋腠理疎通則痘
易出易壯遲則熱燒地盤腠理緻密熱無從出
出必稠密或蘊成癰由解散不清縱然發出日
後灌漿必咳嗽聲啞嗆喉外剝可不謹之於始
哉觀乎古人呼為痘瘡以其形圓而肖痘也豈
喜土鬆滋潤則易出易成熟初出最嫌土燥成

熱尤怕濕淫燥則難出濕則潰爛故治痘亦如
之若熱盛毒重神昏足冷者即於前解散內消
之中大加解毒故曰六日以前解毒為主六日
以後補托為主過六日則大事已定救無及矣
是以貴在審証勿失時也 右審症

總驗部位

內經曰諸瘡皆屬心火心之華在面痘瘡之候但
以面之部位占之思過半矣痘本火毒火性上
炎諸陽皆上聚於面吉凶善惡尤易見也額屬



心火如印堂以上髮際以下橫兩日月角部位
先見紅點先作漿先結痂者此惡候也蓋心為
君主毒發於心故先見於其位君危則十二官
皆危死殆速矣左臉屬肝木右臉屬肺金如兩
臉先見紅點磊落者吉如相聚作塊其肉腫硬
者死蓋肝藏魂肺藏魄生意既絕魂魄相離故
不治也頰屬腎承漿橫抵兩頤先見紅點先發
先痂者吉其位雖屬腎然三陰三陽之脉皆聚
於此陰陽和故無虞也鼻雖為肺竅而準頭則
屬脾土若準頭先出无痂者凶蓋四臟皆稟受
於脾毒發於脾則四臟皆失所資殆土敗則四
臟皆相隨而敗故延綿日久而後斃也腎之竅
在耳又心之用亦在耳心者少陰君火也而少
陽相火之脉行乎耳之前後凡在耳輪前後先
見紅點者凶蓋君相二火互發燔灼之勢難以
撲滅惟口唇四圍先出先起先痂者大吉緣陽
明之脉俠口環唇胃與大腸主之無物不受殆
猶海也乃多血多氣之經故曰大吉也

心火如印堂以上髮際以下橫兩日月角部位
先見紅點先作漿先結痂者此惡候也蓋心為
君主毒發於心故先見於其位君危則十二官
皆危死殆速矣左臉屬肝木右臉屬肺金如兩
臉先見紅點磊落者吉如相聚作塊其肉腫硬
者死蓋肝藏魂肺藏魄生意既絕魂魄相離故
不治也頰屬腎承漿橫抵兩頤先見紅點先發
先痂者吉其位雖屬腎然三陰三陽之脉皆聚
於此陰陽和故無虞也鼻雖為肺竅而準頭則



驗面

發熱之時面色明瑩者吉赤若塗胭脂者凶此邪氣拂鬱於陽明胃與大腸也陽明經上循於面熱盛故赤也宜清涼解毒稍通利之面垢慘黯者凶面垢者少陽候見也邪熱拂於少陽甚則面微壅宜表裏雙解蓋少陽從中治也


驗耳

腎通竅於耳故耳以候腎也腎臟屬北方天一所生之水受氣之初先生兩腎如莖子离坭兩邊

分開之辨也痘疹發熱耳獨涼者瘡疹屬火外和不干於腎故也如耳熱是邪干於腎毒不發越則反有歸腎之變凡觀痘瘡先看耳後有紅縷者蓋少陽三焦之脉從臙中上出缺盆繫耳後直上出耳角紅者火色也此瘡疹之火發後少陽故色先見於其經也凡痘自耳先出未及成漿耳輪先靨者此漸萌歸腎之勢多凶

驗目

目者心之使也神所寓焉發熱之初觀其兩目神



倦不欲開者痘也目中汪汪若水者疹也諸瘡皆發於心故候見于目也目赤者熱甚也心惡熱急解之經云肝開竅于目瘡疹發熱目連劄者肝有風也風入于目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄也目直視者肝有熱也熱入于目牽其筋脉兩眦俱緊不能轉盼故目直也得心熱則搐者風火相搏也痘疹發搐此其常候但瀉心肝二經之火搐止則吉不止則凶五臟精華皆上注于目痘瘡之毒發于五

臟毒之甚者目必受之故前人註有護眼之法良有深意凡兩眼常出淚者肝熱也此時眼中無痘宜服瀉肝火之藥蓋眼中之毒常在收靨不齊之後方有如痘入目成膚翳者切不可用點藥恐損睛破瞳成廢人矣痘瘡收後目不開者肝熱則目溢不敢開明暗皆然心熱見明則合見暗則開謂之羞明此有餘熱在心肝也如瘡未成膿腫消目開者瘡已過期收靨不齊目閉不開者瘡壞欲變目上竄者心絕也直視不




轉者腎絕也非泣而淚自出者肝絕也微瞋者
氣脫也血貫瞳子者火勝水竭皆死候也

驗鼻

鼻為肺之竅痘疹發熱之初噴嚏者火邪上干於
肺外應於鼻而痒則嚏鼻乾黑燥者火刑於金
金肺本燥得火反甚急宜清金瀉火以解其毒
鼻衄者血得熱而妄行故衄出於鼻急以涼血
瀉火以解其毒鼻流清涕者疹也疹發於心心
肺相連以火煉金熱極而反化為水也痘出之

後鼻塞不通者熱也痘已成漿收靨之時鼻塞
不得息者此鼻內有瘡膿涕粘結可用金銀小
簪子以通之如痘未成漿鼻端先乾者凶內經
曰臟真高於肺以行營衛陰陽也邪火刑肺肺
敗不能輸精於皮毛故皮毛焦枯先見於鼻營
衛不行陰陽不續以漸遍身皆乾枯而死矣凡
瘡變壞鼻中血出者鼻孔開張喘急者肺絕之
候皆死証也

驗唇口



脾之竅開於口其華在唇四白發熱之初口中和唇色紅潤者吉如口燥唇裂其毒必甚急解之痘出稠密唇口痘子相粘諸痘未發此處先已戴漿諸痘未收此處先已焦黑者凶面痘腫灌唇上痘裂成塊乾澀者重如痘出太密口中氣臭者臟腑敗壞故臭出於口也痘欬變壞唇上縮者脾絕也唇下自呷者魚口也口中涎如膠粘者脾津竭也皆不可治

驗手足

四肢者諸陽之本痘出欬踈其發欬透其靨欬瘳如應出不出應發不發應收不收此脾胃氣虛不能旁達四肢也發熱手尋衣領亂捻物者肝熱也手插眉目鼻口者肺熱也手足搖擗者心肝風火相搏也各隨其臟而瀉之是涼者此常候也足冷手亦冷者脾臟虛也四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃能至也脾虛不能為胃行其津液故冷耳宜溫之痘已出手足多水泡者此肝勝脾衰為鬼賊宜急治之不久便



生痒癩也如遍身皆發手足不透是空殼者此
脾胃虛弱津液耗竭營衛凝滯故其毒亦鬱而
不發也不能食者死能食者必發癩疽瘡勢太
甚手足冷者不治瘡未成漿手足皮脫者必死
瘡已正靨惟足不收者足為純陰無陽相濟所
以收遲如瘡始成漿他處未收手足心先靨者
其後必生惟疾也瘡靨之後手足關節腫痛者
必發癩也瘡痒手足搔亂者凶

夾班

班者血之餘有色點而無頭粒隨出隨沒者也丹
則成片赤如雲頭而突皆血太過而氣不及營
衛失護致血任三焦浮遊之火散漫於皮膚之
間耳宜以輕劑散其火和蒸活血解毒之藥治
之並用玄參升麻湯加石膏黃芩荊芥芍藥芎
歸或升麻湯加紫草蟬退多磨犀角汁化下烏
金丸又或結痂之後而發者餘熱煎熬肉分其
斑必爛宜解毒湯加歸芍黃芩石膏甚則大連
翹飲爛處以生肌散敷之無不瘳矣至若青黑



紫斑乃毒氣不能發泄之故死生一反掌間耳
急與四順清涼飲利之其斑既退即以四君子
湯加黃耆姜朮煎服如不止再加肉果須要預
煎候之俟斑退血附即服庶可免其內陷也大
抵斑在發熱放標起脹時多用表散在灌膿收
靨時多用解利適身通紅者治同

發斑有二陽毒發斑者壯熱渴躁兩目如火脉洪
有力其色紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則
下之早故熱乘虛入胃一則下之晚故胃熱不

得泄皆內外挾熱而發斑也當服玄參升麻白
虎等湯陰疔發斑者身無大熱手足指甲俱青
脉沉細而急其色微紅或暗晦此無根失守之
火聚于胃薰于肺傳于皮膚而為斑也若妄投
以涼劑則誤矣當與升麻鱉甲湯調中溫胃而
斑自退

夾疹 疹即麻也

痘毒出於陰疹毒出於陽陰主血故痘有形而灌
膿結痂陽主氣故疹有色而不膿痂此皆有生



初之淫火伏於命門之間本非尋常並發者惟
痘出之時或天行所激觸動其毒故並出耳以
亦不順之症也故急宜清散先服升麻葛根湯
如不解則犀角地黃湯內既清涼則疹亦隨之
而解矣

錢氏云痘疹只出一樣者善凡痘已見形其間碎
密若瘡子者此夾疹也由火毒薰灼於中故使
疹挾出於外也急宜解毒使疹消散痘得單成
可也宜荆防解毒湯主之若服後而疹不退者

凶之兆也夾斑治同

膚疹者熱毒之氣發越而然也暴出之時點如麻
狀但色鮮赤成片耳用敗毒散毒當隨散越數
日而痘出痘反稀踈

劉宗厚云癰疹多屬脾隱然皮膚間而名之
也發則多痒或麻木不仁者是兼痰兼濕之殊
也色紅者兼火化也用解毒防風湯若內傷外
感而發者用調中湯

夾沙

亦麻類粒頭瑣碎吳地呼為沙子
其狀如夏月膚膝之癩子



沙之形如粟一般尖員而硬中含清水夾瘡而出者亦熱毒之所發也用四苓散加防風黃芩分利陰陽而痧自退矣

夾疥瘡

瘡夾疥瘡而出則血氣為瘡所奪瘡多不能起發成漿須連服內托散庶無坐陷之患也

乾枯黑陷紫陷

朋來曰凡黑如烏羽者生以

血解毒可愈也黑如焦燥者死無生氣也故不治

痘色初見深紅者必變紫紫必變黑紫黑必至於

乾枯皆血熱乾滯而氣不能運行一定之理固如此也治須以涼血清熱為主看其微甚或利大便或利小便或為解散頂雖平陷不可以氣虛而例用參芪補劑蓋補氣則熱愈甚而血愈涸也宜以絲瓜化毒湯加當歸紅花連翹牛旁更以麻黃解毒湯發散其毒或以紫草湯化下小靈丹或灯心湯化下大靈丹有黑疔者針挑破去其毒血兼用扶脾實土之藥古方有燒人屎者有用四聖散者有用人牙散獨聖散者有



用雞冠血酒漿灌之者有用胡荽酒塗其遍身
并衣服薰之者有用壁間蟾蛛如豈大者研爛
入雄黃每歲一厘同研勻酒調服者有用黃連
犀角清心火者已上皆可擇用如宣風散百祥
丸牛李膏內有大戟等牽牛峻利之藥元氣盛
尚可虧損况痘後之兒尤當慎之

黑陷二種因氣虛而毒不能盡出者酒炒黃耆紫
草人參黑陷甚者亦用燒人屎

白陷灰陷

朋來曰察其乳食少進二便
清利者為寒法從溫補

痘色白者必變為灰慘灰慘者必變為平伏倒塌
此雖氣虛而血不華色血亦虛也故當氣血蒸
補使血活氣行則白色可變為紅庶或可救若
單用補氣之藥則氣燥血虛必致發痒抓破灰
慘平伏倒塌為不治之症矣治宜補中益氣湯
合四物湯有內熱者加解毒藥白陷抓破皮薄
乾燥而極痒者皆由失於補血以致氣虛則燥
然也

內潰

心鑑曰內潰者胃爛也蓋因風寒所中腠理固密
陰陽二分壅塞不通其毒內攻而臟腑之間毒
火炮熾則潰而成膿口舌皆白是其驗也識者
於痘未出之時或有風寒阻隔氣粗熱甚身必
戰動肚腹急痛謹防此患以敗毒散或升麻葛
根湯逐散寒和開泄腠理縱毒外出必無是症

痒塌

痘瘡痒塌今人總歸之氣血虛寒殊不知亦有氣
盛血熱而然者須從形色及他証辯之如痘色

淡白精神虛怯小便利大便頻至夜痒甚者此
脾氣弱而氣血均虛也參芪肉托散及四君子
湯加黃芪肉果官桂白芷蟬退主之甚則陳氏
木香散佐之如瘡色紅紫煩躁大小便不利
渴飲飲湯水甚至抓破血流者此氣虛血熱毒
盛血行氣分血味醜醜蟄皮肉而痒也四物湯
加參耆連翹蟬退白芷甘草及三味消毒飲加
紫草連翹主之血流者敗草散蕎麥麵炒黃土
摻之又遍身痒甚抓破者不問前後皆服蟬



花散外以乳香或敗荷葉茵陳燒烟薰之 若
穢氣衝觸作痒抓破者宜服內托散外以碎穢
散薰之然發痒精神清爽自知其悞欲人拊摸
者吉若悶亂不寧者搖頭扭項手足舞亂言不
所禁不止者凶也

群玉曰痘疹發痒如能食而大便堅結者此和氣
內實正氣外虛也加味四聖解毒湯治之外用
升麻蒼朮麻黃槐柳桑皮煎熱拭之 如泄瀉
者此正氣內虛和氣外實調元托裏治之外用

山茵陳白艾二味為末燃火薰之如用上二法
而痒即止者吉痒不止而反甚者凶也

心書曰痘瘡作痒者火和傳於肌膚之間不能即
出或血方流行而為風寒外束故鬱滯而作痒
與傷寒汗不出而作痒相同法以荆芥穗束之
以紙而刺痒痘之項以散鬱和其痒即止驗之
如神內服消風火化毒湯以解之 以上痒症
痘家之惡候茲錄各家治法驗甚者以備緩急
參用



目睛露白

人之一身必元氣固則精血為之凝聚而瞻視有常也若元氣虛損則衛氣受虧是以督脉縮促致睛上吊而露白也若謂之風則謬矣遇以候別無他証者可以保元湯加陳黃米主之無魂失志不省人事者不治雖無他証而或見於七日之前則毒尚未解而氣血已離必不可治之症也

声哑

心之氣舉擊於肺而為音肺清則音清肺熱則音哑此必氣喉有痘熱毒閉塞肺竅而然也須分順逆為治如七日之後失音者乃內痘先熟而先靨則咽喉漸寬毒氣漸消声音自亮為順症也若七日之前失音者此毒氣薰蒸失於調解致肺竅不通閉塞管簫毒無從洩內痘糜爛舌齧成坑咽門腐壞馴至呼吸俱廢為不治之症矣或有內本無痘因食辛熱之物或多服熱藥所致者急用甘桔湯射干牛旁湯加玄參連翹

犀角治之或能言声不清者焮火乘於肺也瀉
白散加天花粉桔梗石膏片苓茯苓麥冬山梔
治之或感風寒閉塞而声不清者參蘇飲加桑
白皮杏仁石膏主之如法治之而効者吉否則
凶

水噎

喉之竅若管籥然瘧之初出細小不竟及肌表之
瘧成漿則內瘧亦成漿而其毒壅於會厭然是
乃飲食所進之處故飲湯水不易進納則溢入

氣喉而發噎也若穀食有渣自能咽之從食喉
而下非如水溢以犯氣道矣七日後見者不藥
而愈何也外瘧靨而內自瘳矣若七日前見則
為逆症由熱毒壅塞不能發於肌表故耳治用
甘桔湯合解毒湯加牛子玄參荊芥麥冬若預
以甘桔湯清其氣道安致有此患哉

驚搐

附癩癩

心者神之舍也瘧毒本熱氣擊動心神肝不能
制故神不安而發驚搐治宜瀉肝利小便蓋瀉



肝則風去利小便則熱除風熱既退則痘出而驚自愈矣故痘未出而見此症者則升麻湯合消毒飲主之或紫草膏或蟬酥丸不可竟投涼劑蓋心一涼則氣血隨斂毒無從出也痘既見而有此症由熱毒之未解耳四苓散合消毒飲或紫苓湯或導赤散若風火相搏喉中痰鳴目睛上視面赤引飲喜居冷處者紫苓湯或抱龍丸若痘後胃弱飲食不化謂之食蒸發搖必面黃潮熱大便酸臭秘泄不調或吐利腹痛宜紫

霜丸下之大便秘者四順飲痘後毒當盡解而又發驚則心氣已絕神無所依必不可治 發癩癩者粉紅丸治之

痘後手足麻木無汗者參附湯若手足難動常出汗者芪附湯 卒然驚仆不着人事者用皂角為末吹入鼻中即甦古謂先痘後驚者不治痘正發而有此症能不為之可悼哉

又痘未出毒氣內逼目上竄驚叫如驚風者乃痘欲出之候也若誤認為驚而治之則毒氣內蓄



和熱不洩而反危矣

煩躁

心經有熱則煩躁蓋痘毒之熱擊動心火脾少津液不能濟之矣所以發為煩躁不寧悶亂狂言等症也治當觀其虛實何如痰實壯熱者梔子仁湯或解毒湯或辰砂益元散二便秘則通利之虛煩而渴者保元湯加麥冬五味或麥門冬湯夏月暑甚煩渴而痘出不快宜辰砂五苓散瀝後發熱煩渴麥門冬飲子此症似輕而重苟

服藥而久不愈則心脾二經皆為熱毒所傷矣煩則必渴、則必瀉、則必咬牙寒戰而瘁塌之患立至也慎之慎之

秘傳曰痘瘡以安靜為貴但有煩躁者必毒氣壅併表裏不寧宜審諦之如搔爬不停者痘痒也不寧者裏熱也呻唵者痛也非折肱之妙手安能識其病而起其症哉

發渴

渴者胃中熱也胃中津液為熱所耗故渴而飲水



也始終固有用白虎湯加天花粉乾葛甘草然
有汗加人參或辰砂六一散小水不利者四苓
散氣虛保元湯加麥冬五味至於陰虛火動而
發渴者固為難治之症理辯則謂六味地黃丸
加桂心五味子乃治虛渴之聖藥也不可不知
痘疹心書曰毒氣萃于陽明此時多發熱渴熱滯
于內而外不得宣通故發渴也宜神功散服後
猶渴者宜紅花子一味煎湯飲之如無子即用
紅花湯加牛旁子服之以藥神妙能散胃口之


痰血故也切不可荔枝黑棗椒姜等湯以助陽
經之熱

暖氣

熱毒鬱於胃中欲發而不得發故暖氣治用半夏
生姜湯加陳皮黃芩或四苓散加陳皮竹茹以
利之

不食

痘瘡始終以脾胃為主若飲食如常者此臟府充
實脾胃完固不消服藥若不喜飲食者必須辯



別而治之如泄瀉瘧色灰白而不食者此脾胃
虛而元氣弱也宜四君子湯或人參養胃湯七
珍散治之如大便秘澀瘧腫不食者以毒盛而
血熱也宜四物湯加解毒藥熱甚者加姜炒苓
連便秘者下之萬氏云瘧瘡不怕稠密只要能
食

汗多

汗乃心之液由熱氣內蒸腠理開泄故液隨氣而
出也自汗盜汗俱能虛人未漿之時恐不能灌

既灌恐不能靨既靨恐血脫陽虛變為他症最
宜調理自汗宜保元湯加桂枝白芍浮小麥以
斂之有熱加酒苓盜汗宜當歸六黃湯或當歸
湯丹溪曰自汗不妨蓋濕熱薰蒸而然也此特
為汗少出者言耳若汗大出身冷惡寒寧不早
為之治乎此宜異功散救之寒不已者死汗
綴如珠者死汗而昏沉者死汗流煩渴者
死不可不察
諸失血



夫血熱則妄行蓋熱毒之氣淫佚無歸則血亦隨之而走泄也始終用犀角地黄湯加芩連梔子白芍但血之妄行或吐或下或從陽瘡痘毒而出者悉皆不治何謂也吐便者有傷于內也瀉膿血如死肝莖汁者胃爛也從瘡毒而出者肉分空虛而元氣為之走泄也鼻衄者生蓋血隨毒行傳注督脉斬關而出不犯其內故耳至于女人失血不止尤當急治嘗有一男子口鼻出血數碗以韭菜汁半碗頓服而愈

陰囊發腫

痘症陰囊腫痛如瓠瓜者乃膀胱熱甚毒氣流於小腸而然也急宜清利退火滑石木通車前牛膝梔子瞿麥灯心甘草水煎服或紫草飲子小便不利者加木通外以石燕子醋磨濃汁敷之

痘後浮腫

痘靨之後失於調理或傷飲食或感風濕致傷脾土濕勝而為腫也傷於食以健脾加山查麥芽平胃之類虛者加人參俱以淡滲之劑佐之傷



風濕者平胃散加防風羌活汗之水腫者以五皮飲消之一方用蘿蔔子殼蒲蘆煎湯洗之立消又法柏樹葉桑樹葉煎湯洗亦消

驗動靜

凡痘以靜為貴內有不和則動凡靜屬陰而動屬陽痘之為症陰陽俱病但息歇其勻語歇其少寐歇其安寤歇其寧觸其瘡則吟拂其歇則鳴飲食二便如時此平人之候是謂靜而吉也如呻者身有苦也自語者神不清也喘粗者內熱

也腸鳴者泄也坐卧不寧者心煩也啼叫不止者痛也搖頭者風也指歇搔者痒也嚙物難者咽痛也咬牙者心肝熱也若悶亂躁擾譫妄昏眩如見鬼狀搖頭扭項手舞足擲目睛上視寒戰咬牙語音不出皆為死候如病向靜忽然擾動者異也須細察之痘色變而無他候者戾氣觸之也痘色不變又無他症此必有因但俟自定其有目瞑息微四肢僵直口噤痘壞昏睡不省者此真氣將脫魂魄欲離之兆又不可作靜

看也

稀痘仙方

牛黃

錢一

蟾酥

分三

辰砂

分七

絲瓜蒂

近蒂取五寸

燒存性

五錢

為末每一歲服一分砂糖湯調下

兔紅丸

服以可免出痘

辰砂

甘草

六安茶

各等分臈八日午時

取生兔子血為丸梧桐子大逢三六九與兒

食之

鼠肉方

取雄鼠肥大者去皮毛腸穢用鹽醋爛煮與兒食之痘出稀少切不可使兒聞見亦不可對他言知但只可自設法取用不可用他人取討者恐防毒藥死的慎之或只用砂仁白水煮不用椒蔥蒜薑并油煎等辛辣熱物若未食葷兒與食尤妙屢試屢驗者

四脫丹

蟬退

蛇退

鳳凰退

即哺出

神仙退

即父母

辰甲

右各等分焙為末每服一錢煉蜜為丸菜豆



大每年除夜服服三年永不出痘

玄兔丹

玄參

酒洗五兩 兔絲子

水淘淨酒煮研爛為末

右二味俱不

犯鉄器為末黑砂糖為丸彈子大每日與兒服三丸沙糖湯下

葫芦花湯

八月採葫芦花不拘多少陰乾入除夜蒸籠湯浴兒或不出痘縵出亦稀少

苦棟子湯

苦棟子不拘多少煎湯浴兒或痘瘡不出出亦

稀少

三花丹

將出之出用之能稀少

梅花 桃花 梨花 取已開未開盛開者陰

乾為末等分取兔腦為丸雄黃為衣用赤小
荳菜荳黑大荳三荳湯下

六味稀痘飲

將發痘預服之

山查 紫草 牛旁子各一錢 防風 荆芥各一錢

甘草五分 姜三片水煎服



輕斑散

治痘未見點時服之

絲瓜

近蒂三寸連皮
子燒存性為末

硃砂五分
二味和勻沙糖

調下痘出必稀多者少少者無

稀痘如神散

絲瓜

升麻

芍藥

酒炒

甘草

山查

黑豆

赤荳

犀角

磨用

各等分每服三錢水煎服不

拘時看大小加減

預服萬靈丹

初發者一服即輕
百發百中

六麻

小者三錢

葛根

三錢

甘草

三分

紫草茸

一兩
蟬退

姜蚕

洗連翹

白附子

炒各三錢

山荳根

五錢

全蝎

十枚雄黃

一錢半

射香

一錢

琥珀


一錢
酒煮化

右十二味和拌為丸皂角子大每服一九茶

草湯下

發熱有數種

生生子曰凡痘疹發熱與傷寒傷風傷食驚風等
相似先當辨明傷寒之熱手足稍微冷無汗惡
寒面色青慘不舒左額有青紋傷風熱手足
稍微溫自汗惡風面赤而光二者皆太陽症俱




頭項痛腰脊強 傷食熱目胞腫右額有青紋
身熱而額腹最甚夜熱晝涼面色黃或吐利腹
痛 驚風熱面色青紅額正中有青紋手心有
汗時發驚悸 痘子之熱必顛四臟之症耳孰
冷中指冷尻冷面燥腮赤呵欠頓悶乍涼乍熱
多睡咳嗽噴嚏嘔吐利○夫發熱者瘡疹常
候也但熱微毒微熱甚毒甚微者勿藥甚者必
宜及早清解原痘無逆險只在發熱之初調治
之早觀其熱重神昏即以清解之劑投之或發

表或攻裏法在不避必便一晝一夜表裏通和
熱退為佳蓋毒解則熱始退熱退痘出自然稀
疎明朗若不早為疏通表裏則毒無出路雖小
毒穰成大毒迨及出齊則順逆險已定順者幸
而無虞逆者無所措手矣古無順逆險之名稱
順逆險者自魏桂岩始也

初發熱三朝証治活法

凡發熱疑似之間宜投人參敗毒散一劑發之是
與不是一發便見萬菊軒曰大抵痘疹只宜發



盡勿使留伏于中

凡用發表之劑務察天時不可固執只宜平和之說極為誤事設遇冬寒及春行冬令之候腠理緻密血氣凝澁痘必出遲遲則蘊熱熱不得汗毒莫能洩必多壅遏之變急宜辛熱之劑發之桂枝葛根湯或五積散去乾姜

如天時熱則腠理疎豁氣血淖澤防其發洩太急恐罹潰爛之變必以辛涼之劑解之宜升麻葛根湯雙解散之類如春秋天時溫和不寒

不熱只以人參敗毒散最佳

保嬰丹 熱甚者用之捷効或就於前解散藥化下一丸能令重者輕輕者少以其極能解毒也初發熱時飲食二便如常精神清爽痘必稀少不須藥

初發熱時渾身壯熱熇熇然不渴清便自調與邪鬱在肌膚之間宜輕揚之劑發之升麻葛根湯甚者羌活湯

初發熱時其熱烙手目赤鼻乾唇燥小便赤大便



秘煩悶不安以表裏俱熱毒氣壅遏宜發表通裏
裏獲解散主之

初發熱時表不甚熱煩躁不安口渴小便赤澁熱
在裏用紫草膏保嬰丹辰砂六一散犀角山豆
根之類清解之甚者三黃丸微利之

初發熱時腹中痛者以痘毒與穀氣相併急以麥
芽山查紫蘓枳實砂仁陳皮溫而消之若腹脹
硬痛大便秘者俗急丸下之

初發熱時咳嗽鼻流清涕參蘓飲主之

初發熱大便秘結急宜潤之恐熱毒內蓄宜紫草
飲必使大便通利為好

初發熱嘔吐者要明外感內傷外感者二陳加
紫胡藿香生姜枳壳和而解之內傷者二陳
加藿香砂仁麥芽山查枳實蘓梗白芷消之
胃弱而吐者六君子湯有毒氣上衝大吐不止
者辰砂六一散甚者加石膏芦根湯亦佳

初發熱作瀉腹中不痛原無內傷者以痘內動與
外邪搏激所致不必治瀉但以輕揚之劑升發



之痘出而瀉自止

初發熱自汗自吐自瀉者乃毒從上中下而出皆為吉兆但只在三日內裏不可多日恐元氣虛脫也

瀉有冷熱熱瀉者口渴小水少而身大熱四苓散加木通若乾嘔加姜炒黃連或六一散冷瀉口不渴小水清重者理中湯輕者參苓白朮散久瀉者豆蔻丸

初發熱二三日間有驚搖者導赤散羌活湯辰砂

散○大便秘者三黃丸微利之小便赤澀者

導赤散渴甚者葛根解毒湯腹中痛者桂

枝大黃湯腰痛者人參敗毒散自利者黃

芩湯吐利者黃芩加半夏湯如脾胃素弱

自利清白者理中湯九或四君子湯豆蔻丸合

而服之

凡發熱及初見標時須問咽喉疼否但有微疼急清解之甘桔湯加牛旁子大抵痘要解咽喉為急務不早防以致失聲乾嘔水穀不入搶喉



噴吐治無及矣

管氏曰發熱之初痘之吉凶皆兆於此故急宜表汗使臟腑胎毒及感不正之氣盡從汗散則痘出自然稀少蓋熱甚毒甚熱微毒微不必治妄汗則表氣一虛痘不能起發反為害也盛者汗之要在身熱盡退為佳其有一切雜症皆由毒氣欲出不能故耳一表散則毒氣盡洩諸症自退矣或有當解者解之當下者下之切不可執一也胡氏曰表熱壅盛非微汗則表不解裏熱

壅盛非微利則裏不解正此之謂耳失此不治則毒氣漸盛而逆症隨見世人多忽於此及見逆症而後治之將何及哉

大抵治痘之訣妙在三法曰發表曰和中曰解毒知此三者於發熱見標之際預為之地則多可少重可輕自無以後變症故發表最先蓋痘疹只要發得毒盡不使留伏于內凡發表必兼解毒非發表之外另行解毒也痘既已出不渴不熱表裏不和須服藥如痘多毒盛裏實能食



者其逆用解毒如裏氣不和或吐或利於和中
法內畧蕪解毒若毒輕痘少惟裏不和胃氣虛
者用和中則不必解毒也每發表須辛甘清
陽之劑羌活防風升麻白芷桂枝之類和中須
甘溫之品如人參當歸甘草芍藥之俦蓋中不
足甘以補之解毒須苦寒之輩如牛旁連翹葛
根芩連梔栝蒌草之類蓋毒者火也凡用苦寒
之劑必要酒炒可以活血達表且不犯胃氣切
宜識之

痘宜依期施治治貴通變

翁仲仁曰夫痘由中以達外用藥因期而變通以
其尚未見標必發熱三日然後見標出齊三日
而後起脹蒸發三日而後灌膿漿滿三日而後
收靨發熱之初耳尻中指俱冷耳後起紅絲呵
欠噴嚏眼目困倦兩顙之間有花紋見者預知
其為痘也發熱三日當托裏解表使其易出亦
有氣弱而不能出者當微補其氣氣和則出快
初不可用芪恐腠理密而難出也四五六日以



清涼解毒為主清涼則無血熱燥毒之患解毒則無壅滯黑陷之害七八九日以貫膿為主治法當溫補氣血氣血流行而成漿自易也十與十一二日以收斂為主大和氣血補脾利水則自然結靨此特語其常也蓋常者可必而變者不可必當隨候參詳安可執藥以應無窮之變哉言見紅點之時如莖輕少不可過表在後恐成班爛或乾紅紫色急宜踈利不然在後必成黑陷四五日之內痘出至足心為齊苟未盡出

於解毒之中宜兼發散若專於寒涼則痘遲滯不出七八日之間毒未盡解於溫補之中又兼解毒若偏於燥劑則毒盛不能化漿也十一二日之間漿未滿足必大補氣血畧兼解餘毒不然恐有癘毒溫疤之患以變通之妙要在隨時制宜也

人參敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼
桔梗 白茯苓 人參 各等分 甘草 減半 生姜



三片水煎服 一方加薄荷少許

參蘓飲

人參分三 紫蘓葉 桔梗 乾葛 前胡各四分

陳皮 茯苓各五分 枳殼分三 半夏分二 木香分一

生姜三片水煎服

升麻葛根湯

葛根 升麻 白芍藥 甘草各等分 水煎服

雙解散 即防風通聖散益元散二方也

防風 川芎 當歸 白芍藥 薄荷葉

大黃 連翹各五分 石膏 桔梗 黃芩各八分

白朮 桂枝 荆芥穗各二分 滑石二錢半 甘草一錢

生姜三片水煎服

桂枝葛根湯

葛根 桂枝 赤芍藥 升麻 防風 甘草

各一錢 生姜三片淡豉一錢水煎服

保嬰冊

紫草茸酒洗忌鉄 經荳藤燒存性 荆芥穗 防

風 升麻 大力子炒各二兩 天竺黃一錢二分如



黃一錢二分
分代之
自取真正者
一錢二分
草梢去皮二兩
碗前藥俱製淨末和為丸
過為衣未出之先濃煎甘草湯每服一九大
兒加一九凡遇發熱之時生姜葱白湯化下
厚蓋表汗乃解毒之神藥
心要羗活湯
羗活 川芎 防風 山梔子 龍胆草

當歸各半 甘草半 薄荷葉片 淡竹葉片 水煎服
紫草膏 治紅紫黑陷熱毒

紫草茸 白附子 麻黃去節 甘草各五錢 全蝎八枚
右為細末用蜂蜜一兩酒半煮
熬成膏旋入各藥丸如皂角子大每服一九
仍用紫草湯化下 如治驚搐用金銀酒為
薄奇湯下

六一散

桂府滑石飛淨 大甘草去皮 每用一錢灯心



薄奇湯下 內加制辰砂三錢名辰砂六一散 治狂言妄語驚搐用防風荆芥薄奇天麻煎湯候冷調下 本方加鬱金名牛黃六一治痘後瘡癩毒及天行瘟疫冷水調下多服大効

退火丹 治痘初出標大熱不退或稠密成片者神効

六一散 一料加雄黃飛過三錢 經煙荳藤燒存性一錢外用紫草木通蟬退地骨皮紅花大力子

羌活片苓灯心煎湯既冷調下極能解毒稀痘

四苓散

白朮 赤茯苓 澤瀉 猪苓

右為細末每服一錢

三黃丸

黃芩錢五 黃連 大黃各二錢半 為細末雪水搗丸

葉荳大辰砂為衣每服五七十九灯心湯下 備急丸



木香二錢半

大黃

黑丑頭末

各五錢

為細末神麩

糊丸棗莖大每服五七丸山查湯下

甘桔湯

甘草二錢

桔梗一錢

水煎服

三莖湯

赤小莖

黑莖

棗莖

各一升

甘草三兩

三莖用水

淘淨用水八升入甘草同煮莖熟為度逐日

空心面東任意食莖飲汁服七日未不出

代天宣化丸 即韓氏五瘟丹也

甘草

甲巳年君土

黃芩

乙庚年君金

黃柏

丙辛年君水

山梔

丁壬年君火

黃連

戊癸年君火

連翹

山莖根

牛旁子

佐

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥加

一倍臣減半佐又減半共為末冬至日修合

取雪水煮升麻汁打麩糊為丸辰砂為衣竹

葉湯下

五積散

白芷

川芎

各三分

桔梗

一分

芍藥

茯苓

炙甘草

當歸

桂枝

半夏

各二分

陳皮



枳壳 麻黃各五分 蒼朮錢一 厚朴分四 右除桂枳
壳二味為粗末外十二味為末慢火炒令轉
色攤冷次入二味末令勻水一盞半生姜三
片煎一盞溫服

辰砂散

辰砂錢一

絲瓜近蒂三寸連子燒灰存性為末

蜜水調服多者可少少者全無絲瓜解痘最

妙 紫草甘草湯調服尤佳

連翹湯

總解諸毒散風清熱痘後一切發熱癘

毒赤腫 連翹 防風 瞿麥 荊芥穗 木

通 車前子 當歸 柴胡 赤芍 滑石

蟬退 黃芩 山梔子 甘草各五分 紫草分五

水煎服

連翹升麻湯

連翹錢一 升麻 葛根 桔梗 甘草各七分 木通

分八 牛旁子錢一 白芍藥分五 薄荷葉許少 淡竹葉灯心

水煎服

消毒飲 治咽喉腫痛上膈熱盛 一方加升麻



牛旁子

錢炒

荆芥錢一甘草

防風

各五分

水煎服

翁仲仁十神解毒湯

專治身發壯熱腮紅臉赤

毛焦色枯已出未出三日已前痘點煩紅燥渴

欲飲睡卧不寧小便赤澁此熱盛也並皆治之

歸尾

生地

紅花

丹皮

赤芍

桔梗

木通

大腹皮

連翹

川芎

此方治血熱

痘疹以涼血活血為主佐以桔梗川芎有開

提發散之功引以大腹皮木通有疎利熱毒

之効臣以連翹丹皮有解毒之良用此以治

血熱痘疹則能內外分消熱毒雖盛庶幾解

散表裏自然和平矣古人用黃連解毒湯恐

驟用寒涼不惟冰伏熱毒及出不快抑且熱

毒為其所抑則鬱於臟腑或肚痛腹脹內潰

而死者有之豈若此方用之為穩當若不得

已而用黃連芩柏亦須酒炒一以製其寒涼

之性二以助其上行之勢借連柏以解毒耳

加減法

身熱壯盛加

葛根前胡

毒盛綿密加

芩





鼠粘子 渴加 天花粉 竹葉滑石 小便血加 犀角 山梔
 大便黑加 犀角 黃連 或杏仁 吐血乾嘔加 犀角 黃連
 發紅斑加 犀角 黃連 參 黃 小便赤加 山梔
 小便短澁加 猪苓 澤瀉 小便秘加 滑石 瞿麥
 大便秘加 前胡 枳殼 嘔加 橘紅 泄瀉加 猪苓 澤瀉 防風
 大便秘喘加 枳殼 前胡 胡大黃 煩躁加 麥門冬 天花粉
 煩渴狂亂謔語加 知母 門冬 石膏 嘔吐加 猪苓 澤瀉 黃連
 咽喉痛加 甘草 犀角 粘刺芥
 以上並用灯心十四根水煎服

羌活散鬱湯 專治實熱擁盛鬱遏不得達表氣
 粗喘滿腹脹煩躁狂言謔語睡卧不寧大小便
 秘毛豎面浮眼張若怒並有神効并為風寒外
 搏出不快者同治

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮
 川芎 連翹 甘草 紫草 大腹皮 鼠粘子
 右為粗散水一鍾燈心十四根煎六分温


服

身初發熱及見點之際毒氣壯盛外為風寒所

抑或肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞
使清氣不得引毒達表循竅而出則熱毒擁遏
於內為腹脹為喘急為秘結為狂煩為驚搐為
失血皮燥毛直而急眼脹睡卧不寧驚啼多哭
此熱毒擁遏之症辨認不差急宜用發散開提
之劑佐以和解透肌之法則熱毒不擁而其出
自易矣羌活白芷防風有升提發散解毒之長
桔梗有開提勻氣之能荆芥連翹鼠粘善解鬱
熱地骨皮消擁熱於筋骨之間且能肅清臟腑

蠶草滑肌通竅大腹皮引熱下行使內外有所
分消用此以治熱擁之症效大而功用極妙若
驟用寒涼如芩連升麻之類則熱為寒氣所抑
不得伸越遲遲經絡為疽為癰者有之冰伏硬
閉者有之至於人參黃芪白木茯苓溫補之劑
誤用則其擁盛禍不旋踵他如丁香桂木香姜附
之類以熱攻熱殺人立至尤宜戒慎故發熱之
初至見點之後並宜以本方處治依後法而加
減之





加減法 初發熱壯熱腮赤面赤毛焦皮燥咳嗽

喘急加升煩渴加天花粉腹脹喘急鼻塞面赤

若怒毛直加麻便秘加當歸甚則加大嘔吐加

猪苓津瀉禁用生薑丁香洞瀉加升禁用白木

陳皮骨等劑喘嗽惡風加紫蘇失血加犀角地搐加

青發斑加黃連黃鼻衄加犀角小便赤澀加石

山掩地驚悸加木通不思食加山傷食加神

黃芩藥煩紅赤色加生地防風

見標二三日間出不快利加大力子山查散

皮急肉緊身壯熱甚加葛根

見標三日之內並依本方加減及三日後痘

瘡出齊血包已成而前症悉平不得復用矣

方恐發散太過難於行漿另有方藥在後其

禁用藥劑並從血熱痘症法而裁治之

太乙保和湯 又名紫草 透肌湯 專治血熱痘症服十

神解毒湯後熱症悉去內外和平見點三日之

後不易長大粗肥者用之則能保和元氣活血

解毒助痘成漿易痂易落也

桔梗 紫草 川芎 山查 木通 人參

紅花 生地 甘草 糯米五十粒

右用燈心七根姜一片水一鍾煎至六分温

服

便澁腹脹加大腹皮 繁紅不潤加 當歸 蟬

出不快者加鼠黏子 陷塌加 黃芪

痛加白芷 不勻加 防風 水泡加 白朮 嗽加 五味子 麥

門冬 渴加冬 麥門 痺加 芍藥

七八日後漿足身復壯熱便秘煩渴腹脹喘急

前胡枳殼湯漿足禁用此方另立湯飲在後

益元透肌散 專治擁熱痘症服羌活散鬱湯後

擁症悉開氣血和平見點三四日後不肥大者

不成漿者用之則能勻氣解毒透肌達表領出

元陽助痘成漿而易結膿窠也加減以保和湯

同論漿足之後另有保嬰百補湯在後 按此

即太乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠粘陳皮

水一鍾加燈心十四根棗二枚煎六分温服

血熱痘症禁忌



血熱痘症熱毒彌盛然毒氣無所分消只宜重用
升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄
使熱得以潤下而從內消佐以清涼消毒行血
涼血之劑則痘雖稠密亦能消散而易出易化
漿也所謂輕其表而涼其內十神解毒湯蓋得
安表和中解毒三法盡善誠痘科之神方也丹
溪曰熱者清之實者平之其此方之謂歟是故
發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內
外彌盛血熱之症悉具辯症不差並只以本方

處治之切不得用參芪白朮茯苓補氣之藥於
熱症未漿之前如誤而用之是謂實其實腹脹
氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌生瘡變症百出
所謂和得補而愈盛也嘔吐泄瀉慎不得用半
夏丁桂乾姜木香藿香訶子肉果如誤而用之
則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥症必至咽
疼狂亂失血便秘無所不至矣至於龍骨枯礬
澀滯之物且能使氣道阻塞是欲其出而反閉
其門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒



之及至血包已成氣血定位頭頂白光勢將行
漿又宜易方另行別議

三仁膏 治痘疹大便堅實不宜下者服以潤通

火麻仁

炒去壳

松子

去壳去皮七錢

桃仁

去皮炒

右研爛加芝麻一合微炒研細入蜜水研極
爛以帛濾去殼同前三仁蜜湯調下看大小
用之

見標三日証治活法

發熱三日後退涼見標飲食二便如常形色淡紅

疎朗抹過碍手者上吉不須藥

發熱一日便出者凶乃表虛毒盛也急用羌活散

加紫草牛旁蟬退煎調紫草膏或保嬰丹若治

之早十救二三 若服後熱盛不退宜羌活散

調退火丹

若無保嬰丹用經莖藤葉加辰砂者大
小一歲三至十歲三分逐歲增加代

之矣

報痘時煩躁不寧腰腹痛不止口氣大臭痘見紫
色者死

標色白皮薄而光根窠全無紅色或根帶一線紅



三五日即長如菘葢大此痘決不能灌漿久後
成一包清水擦破而死不可因其好看妄與下
藥

標出全不起頂如湯泡灯火燒者一樣十日後痒
癩而死

標出時一片紅斑如錦紋者六日死遍身如蛇皮
者死黑斑如痣狀肌肉成塊黑者立時死

凡見標疎少則毒輕不必妄治密則毒盛但要磊
落大小分明不相粘連成片可用前藥進之或

托裏解毒之劑快斑湯消毒飲主之使其易發
易靨 如出太密粘連模糊其毒尤甚托裏解
毒之劑宜多飲之以防痒癩黑陷之變更察外
症可治則治不可治則勿治

凡痘子初出最要唇口潤澤其毒則輕如唇焦裂
舌燥有芒為毒火熾盛表裏鬱遏急宜解之黃
連解毒湯加大力子 標後身熱未退清地退
火湯

凡見標先要頭面稀疎磊落頸項胸前稀少其毒



則輕如面上一片糝糊未發壅腫蒙頭纏項胸
前布密以毒盛也慎勿治之

凡頭面未見標而手足先出他處未起而手足先
起他處未收而手足先收者以陽火太旺宜早
解毒抑陽扶陰之劑四物湯合黃連解毒湯主
之如他處俱起而手足起遲他處俱收而手
足不收者以脾胃虛弱不能行其氣血達於手
足宜補脾胃十全大補湯桂枝芍藥湯

凡初見標之時磊磊落落似稀疎之狀其後漸加

日多一日以毒伏於裏氣虛弱不能使之即
出頃大補而兼解毒庶可十救二三也十宣散
加無價散

石谷程氏曰凡發熱見標密無毫縫空地稠若蚕
種者急用三元秘方救之每一歲兒用茜根芫
荇子各三錢荔枝四枚若不起加葡萄一錢半
好酒一鍾煎至五分候冷每用半盞挽熟水半
盞時々慢々喂之一日服盡次日再用水煎如
前慢々喂之但服此藥之後不可雜食他物以




傷胃氣小者只許食乳大者只吃粥若口渴即以此藥水飲之一以止渴又能清熱解毒切忌油膩煎炒恐滯腸作瀉。則悞矣或十歲二十歲藥從一歲加起依數增加作一劑服之如年多劑大不能盡煎可分作二三確煎之。按前藥用酒煎者活血也後用水者清熱也熱盛必作渴代茶飲之足可解毒蓋前症不可補補則助毒又不得不補不補則不起發宜當解毒解毒又作瀉不解毒又攻內茲用三味代之既能

解毒又可溫脾活血誠為千金良劑

凡痘發熱一二日便出或一齊擁出密如蚕種紅紫無縫急宜服之此時切忌保元恐溫補助毒以其血未活而漿不能化故用此三元解之俟其色淡血活熱勢已退然後進補庶為萬全

凡皮肉間纍然紅點稠密急用纏荳藤加製過辰砂末連進二三服或薄苛湯調退火丹仍以牛旁為末敷顛門上以散熱毒非惟能使痘踈又且免使侵眼 又方生地黃牛旁子搗成膏



貼面頰額角能退痘毒

一已出未出之時口鼻出血此血熱錯經妄行不可妄投熱劑宜用生犀薄酒磨服如鼻血不止胎髮灰吹入鼻中即止口鼻既血又大小便下血恐胃為熱毒所傷腐壞而然不可不知一出與地皮相平無突起之意乃是紅斑急用涼血解毒羌活散加酒炒芍藥紅花紫草蟬退木通占米連進二三劑退之夾疹同此治治之遲則紅變黑黑則逆而難治

大凡用紫草必用占米以制其冷性俾不損胃無洩瀉之患惟大熱大便燥者不必占米

一標出他處未見獨出數粒於山根之上為毒盛氣虛犯上或發三五粒一塊者皆不吉之兆也急宜涼血解毒以防危急若腮頰地角之間踈踈朗、淡紅潤澤三四次出者為氣正道尊上吉症也

一出皮膚乾燥枯澁必難起壯用溪中白色石子



數枚燒紅以井水淬之使薰蒸瘡上或置被下薰之頃刻潤澤瘡即起發又能解穢

一色淡不紅活者血虛也以四物湯加減服之但地黃大能滯血不可輕用不得已須姜汁炒過人乳補血甚捷加酒少許佐之且血非氣不行又加四物於保元之中為陽生陰長之義

一瘡正出好飲水者此乃脾胃虛弱津液枯涸故也如恣飲則必傷脾洩瀉及發泡難靨之患保元湯加麥冬五味子止之

一瘡未起壯而頭面先腫者乃陰虛陽盛大下四物湯加人乳好酒服之以補陰與陽齊然陽易補陰難補宜急、勿遲否則悞事

一出即變黑者此為惡候如有起具急用托裏解毒之劑少用保元大加紫草紅花服之外用四聖散點之然早能涼血解毒必無此患亦多因脾胃衰弱血熱所致凡紅變白白變黃者生紅變紫紫變黑者死

一瘡全藉氣勻血活腠理疎通則出快而稀疎亦



無餘症倘遇寒凍及勞役瘦弱之人血凝氣滯
出則不快蓄於皮膚之間肌肉之上進退兩難
日久變成黑紫爛不旋踵凡有此候當按令急
與和劑如羌活湯以疎利之其毒氣隨痘而出庶
無變症保合太和之兆也 如頭面出不快以
太陽經常用荊芥甘草羌活防風天麻湯 如
胸腹出不快以少陽經常用升麻紫草木通紫
蘇羌活湯 如四肢出不快常用芍藥紫蘓葛
根甘草葱白連鬚羌活湯各加生姜連進二服

痘即出快

賦痘

凡賦痘與好痘一般但擬先起壯皮嫩嬌軟內係
淡膿當用保元湯加苦茶煎服亦能回漿

一出其色嫩赤抹過皮軟不得指與係賦痘過三
日變成水泡甚至紫泡黑泡者危症也若未成
紫黑宜少進保元大加紫草蟬退紅花鮮之或
灯草木通湯調六一散利去心經蘊熱而紅紫
自退如已成水泡白泡或灰白色則保元中大

下四卷利之與千金妙法也不然則適身孤破
黑爛而死

起壯三日記治活法

凡四五日來起壯活動一線紅暈而有根窠此為
上吉蓋有根窠方見氣勻血活血活則毒化成
漿收功結痂全藉此也若無根窠必是氣凝血
滯按捺速治

凡起壯肥滿乳食如常不必服藥

一四五日來起壯肥大中有一小孔自頂直下至

脚不黑不白與痘色相並與名蛇痘由表虛膝
踈而然若不早治大洩元氣不能起發灌膿急
用保元湯大加占米川芎肉桂提起內膿以實
其孔度為佳兆三二刻後孔自塞滿若孔色黑
乃疔也以疔法治之

一頂陷色白皮薄光潤者氣虛也

火點內外
光明者是

大進

保元倍加酒炒黃芪肉桂川芎丁香人乳酒漿
和服

一根窠淡枯澁不澤血虛也宜保元加酒炒紅花



川芎當歸為藥加山查以消參芪之滯再加木香一二分調氣氣調而血自活矣

四五日痘色不宜紅紫乃熱毒不化若血熱仍當涼血解毒兼氣虛者保元加紫草木通紅花生地之類解之

地紅血散乃血不附氣保元加當歸大加白芍藥以收斂之蓋芍藥味酸用之為君使血得以附氣且又能活血化漿安最上一乘之法切記切記

一洩瀉按寒熱急治至安再不宜瀉

若起壯遲緩根脚不紅活者以無價散一歲看大

小用之好酒調服或保元加人乳好酒丁香占米山查血虛者加當歸鹿角膠

一黑陷及痘疔外用四聖散以油胭脂調點之內以涼血解毒如紫草紅花木通茜根少加保元進之其疔自退疔退看其虛實仍以保元補之一煩躁者內必有熱可用木通以引其火下行或以六一散灯心湯調俟冷服之 謔語者加三



制辰砂夏月井泉水服

如飲食不進者痘色何如未可輕投藥劑蓋其間
有毒氣未盡者且山查紅花子熬草等藥清而
解之如脾胃虛弱痘色淡白宜保元加山查
扁豆神麩 嘔吐加藿香

一倒痘頭面上未出從足底出起逆而上之縱起
壯灌膿回至心窩下則毒攻入內大叫一聲昏
迷而死雖疎快亦不免死乃逆症也候其出齊
至頭面遂早丟去下身不治只將保元大加川

芎以升提之漸：使其自上而下起壯灌膿自
上而下收斂結痂如常痘一般此鮮有知其妙
者宜謹誌之 此逆痘若治之早以黃連解毒
湯一帖以護其心可十全三五遲則百無二三
矣

翁仲仁曰三日四日痘當出齊點至足心勢方安
定猶有陸續不出之狀或隱：於皮膚之內不
見不起者古名不快若非風寒鬱遏之因必有
氣虛不振之過是以四日已前痘毒方出身表



宜涼四日已後毒出已定身宜溫涼則氣血和平瘡色必然潤澤溫則腠理開通其毒易以成漿故至此而身不微熱雖未必至於冰伏而瘡瘡斷手不長四五日來血包已成候當肥大而粗頂宜發光而白故根紅而頂白者已具行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅可愛延綿六日依然到頭空殼虛花皮薄而光亮如灯內含是水頂尖而根脚不紅行漿勿實是以毒熱盛而未解則為紫為黑壅而不起則為陷為癩滯而

不榮則為乾為枯為青為灰怯而不振則為不快為停漿或有肉先腫脹而瘡反不起者漿則滯而不行面已虛浮而瘡反退伏者毒則遏而不進故身不熱而瘡不起已成冰硬之形赤色若還不變溫之可與氣血弱而不振遂成不快之狀紅潤依然如舊補之可生紫色乾枯切忌溫中帶補只宜活血鬆肌為壅為滯烈藥雖然可發透肌尤是良方溘洩惟於溫補瀉甚佐以升提



凡起壯時痘之根脚全然不起其頭面皮肉紅腫如瓜之狀者死。起壯時腰腹或疼或止遍身紫點如蚊蚤咬全不起發者死。起壯時痘伏陷不起腹中膨脹不能飲食氣促神昏者死。畧能飲食用消膨藥治之。起壯時遍身黑陷悶亂不寧神昏氣潰者死。起壯時根窠紫色乾燥不活全然不起發者死。頂陷不起須看年壽上痘起則不必憂如年壽上不起急與升天散一二服。

痘半起忽然平陷而色白者急與內托散或補中益氣湯

痘色紅鮮反乾燥而不充肥者以火盛而血不足也宜退火涼血輕清之劑四物快斑湯主之。痘充肥而帶濕者以脾中有濕而氣不足也宜瀉濕補氣兼風藥治之。蓋風能勝濕也。四君快斑湯主之。

一痘不起發不拘五陷用獨聖散或胡荽酒。若黑陷腹脹用猪尾膏。



一痘乾尅不起者外用水楊湯洗之內服補中益氣湯

一起脹時手足見而復隱起而復塌者死此根本

已摧枝葉先萎之象也

九假壯之痘

其中有數粒起壯者是也

至十二三日決不能回

漿結靨內攻而死矣 白痘者可急進保元加

川芎丁香生占米提氣灌膿而愈此內托法也

內托散即保元加川芎便是不必千金內托散 正壯之時痘雖起發而

皮膚不碍手按之水漿就出內色不暗是也

灌膿三朝症治活法

灌膿時根窠紅潤肥滿如黃蠟色飲食二便如常者上吉不須服藥

灌膿時皮白而薄純是清水與水泡相似者三四日後遍身拆破而死

灌膿時吐利不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者死若二便不下血猶可用止瀉及消食之藥

灌膿時二便閉目合声啞腹中脹滿肌肉黑者死



一頂陷無膿為逆

大照之內外光洞手按之軟陷者無膿也大照之內暗不光洞

按之如鼓者有膿也

急用保元加歸芍肉桂木香占米煎

成入人乳好酒溫服

有一等肥白痘其色白不作膿俗名木痘以其人原有痰也用二陳四物湯合而服之一消一補仍將小麥粉作麵調與食之立時膿起紅活但不可妄投人參占米而助胃中痰火恐防口疳寒戰咬牙乃陰盛陽虛也大用保元加川芎肉桂丁香主之甚者加鹿茸

痘灌膿痛不止者氣滯也少用保元加山查木香以行滯氣如膿血已滿可大用四苓以利之而痛自止

凡灌膿三朝之內身涼痘灰白色或不進飲食寒氣逆上嘔吐或腹脹或瀉清水手足厥冷無陽症也急用二神加入保元連進數服溫而補之痒塌不止者血盛也少用保元大加何首烏牛蒡子蟬退芍藥木香紅花若將靨時微痒者不必治有氣血虛而痒者十全大補湯加何首



烏虜甚者加鹿角膠

一發白泡如彈子大者用專針挑破去水以活石末敷之仍服保元加白朮留皮茯苓以利皮膚之水如前後發紫泡是毒盛溢於皮膚之上必死

夫膿者血之化也有血方有膿無血則無膿痘至灌膿大勢已定故此時必有膿為主有膿則生無膿則死痘至七日若頂陷不能灌膿者必由先失調治故也急看根窠血聚別無雜症速

宜大補氣血以充其頂頂滿膿足猶可回生若頂陷而色灰白此氣血俱離無能為矣

一頂陷無膿服內托藥而暫起不久又陷者膿未充足故也宜內托散倍加參芪當歸煎和人乳占米好酒服 若色灰白欲成倒塌皮薄易破者用淫羊補漿湯保元湯加芎歸升麻人乳好酒

一痘色紅紫漿不滿足欲成乾枯黑陷者當歸活血散合解毒湯加升麻石膏乾葛



一 遍身灌膿忽然一日變白變紅變紫者不可不
察白者為虛宜內托散 變紅紫為熱宜當歸
活血散合解毒湯

一 瘡起壯灌膿俱好至八日大便忽秘常欲去而
不能去急用梔尾枳殼芝蔴各三錢紫草生地
黃芩各一錢煎服即通若失治至靨時忽然發
熱而死 翁仲仁三仁膏尤妙


一 頂平脚潤漿不滿足十全大補湯加木香乾姜
一 遍身無皮膿水流沾衣蓆不能轉動者用秘傳

茶葉方或敗草散內服內托散去桂加荊芥穗
一 瘡發痒滿面抓去而面上瘡痕隱然點點有起
發之勢以猶可治急以托裏發毒止痒之藥用
內托散加蟬退立驗

一 瘡抓破而出血者以陽瘡出血也宜當歸涼血
湯主之

一 灰白慘黯皮薄擦破無膿血者不治

二 便不通目閉声啞腹中脹滿肌肉黎黑者不治
一 瘡爛無膿吐利不止二便下血乳食不化者不



治

一痘未起頂但脚漸潤至七八日乾枯瘡皮皺起
誤認結痂收靨者多不可救急與補血解毒之
劑庶可回生

一灌膿時眉心鼻準耳輪唇口及兩頰先有焦枯
黑靨者以名倒陷不治

收靨三朝証治活法

凡收靨自上而下者順自下而上者逆

痘至收靨大勢已定亦有膿不滿足似靨而非真

靨者以時極宜明辯若七日之間面目腫惟覺
退痘雖似乾而痂薄如帛或有內症未除以痘
極險時也失治則凶變立至急以補血涼解之
劑庶或轉移

一痘至十日血盡毒解其膿漸乾如蒼蠅色或如
葡萄色從口鼻兩傍或面部收起至胸腹而下
然後領上與脚背一齊結靨逐漸剝落內症全
無身漸輕快飲食二便如常者吉或手足心或
手指尖或陰上先收者俱吉



一人中者任督二脉交會之衢也凡痘自初出至收靨俱要在其部位先見者佳謂陰陽和暢也一痘收靨自人中平分上下髮際以上陽中之陽也謂之孤陽足膝以下陰中之陰也謂之孤陰孤陽寡陰所以痘瘡之收至此二處每遲番而後靨也不必施治

一鼻梁上痘先焦者任是凶逆亦不死

一痘當靨而流漿不已者因表散太過則斑爛流水或飲水多則漂蕩流水俱服保元湯加防風

白芷白朮或除濕湯外以敗草散敷之

一當靨不靨而膿充足服回漿散或象牙散

一痘有靨至頸或至腰而下身數日不靨者此乃熱毒太盛不能收靨故也治當有熱則清之若小便不利者四苓散加苓連滑石木通大便秘結者當歸解毒湯利之

一痘當靨不靨忽然變動灰白頂陷吐瀉腹脹寒戰咬牙者急與內助丹 若痒塌氣促足冷者加附子有水泡者大加白朮行去惡水而膿自



乾矣

一血盡漿足溫潤不斂者內虛也保元加苓朮以助收斂結痂或六君子湯


一當靨不靨發熱譫語目閉口喘手足大亂小水不利者以熱毒乘於肺經無陰氣以收之然也急用清金導赤飲主之

一漿未稠濃頂未飽滿面腫忽退目閉忽開瘡腳散潤色白皮皺乾燥似靨非靨此因津液枯竭血氣虛少內証未除之故此症之極險者也急

用四君子加麥門冬牛蒡子荊芥連翹桔梗救之若誤認作結痂無事致成危殆悲哉

一膿後不能結痂反成腐爛和皮脫去者以倒靨也係中氣不足急用保元湯加當歸牛子連翹薄桂木香治之其頭面瘡已破者復加腫灌手足遍身原無瘡處又復出一層謂之補空若治之頭面不腫空處不補不旋踵而告變矣

一收靨時忽泄膿血痂皮者以亦倒靨之症乃脾強腎弱為順利盡自愈不必施治如利下水穀



不分者以腎強脾弱也急用陳氏木香散送下
荳蔻丸

一痘因冬月嚴寒被寒氣鬱遏而不能靨者以桂
枝解毒湯治之

一痘因夏月炎暑熱氣薰蒸而不能靨者甘露解
毒湯微利之

一遍身俱收惟頭與足不收者以陰陽不和故也
以四物湯去地黃加牛膝升麻牛旁紅花荆芥
之類

一多服熱藥以致熱毒猖狂痘爛不靨者小荊胡
湯合回漿散或天水散或豬尾膏外以黃連輕
粉為末相油調敷或用豬胆汁研芒硝如膏塗
之 古人用豬尾膏獲効神速者蓋以熱毒蘊
併於心經致熱毒內外灌注而不結痂用此方
者以血滯心引龍腦以涼之而行營衛况營衛
得香則行遇臭則止也

一收靨時有臭氣帶腥者佳全無氣息尚有餘毒
未發也若臭氣如爛肉不可近雖似結痂未可



為真急以清熱活血緩則無濟

一瘡欲收而唇口乾紫連結查滓頰紅者將成肺癆也宜解毒湯麥冬知母百合甚則大連翹飲凡痘係危症氣血本虛多服補劑而漸有膿色將收靨雖有熱者只可於補劑中加涼藥可也若謂將靨而去補劑竟與涼藥更加下利藥欲令速靨是速其斃也蓋虛者復虛毒反內攻而死矣必然之理又已然之驗也

逆症不治 痘當靨遍身未見青膿黃色之漿而

口唇上下痘先黃熟者毒氣內攻於脾也不治一痘收靨時不喫飲食口唇常如食物而動不止者不治

落痂症及靨後餘症


一痘瘡收後痂厚落遲離肉不粘者吉

一痂落疤帶紅色而不凹凸更無他症飲食二便

如常者吉

一自食痘痂者雖有他症不死

一痘已結痂而不焦落者餘熱為害也大連翹飲



去紫草加地骨皮

一痘痂至半月或一月不落或發痒者因表發太過致肌肉不密無力收斂故也宜人參固肌湯

一痂不落反見昏迷沉睡不省人事者以脾胃大虛也宜人參清神湯

一痂雖乾好但半邊掀起半邊粘着不能脫落者以過用辛熱之藥熱留肌表也宜升麻葛根湯加防風荆芥蟬退連翹以去肌表之熱即落矣


一痂紅紫者乃血熱毒盛也當涼血解毒

一痂白者血不足也不治雖過四十日還死以因漿水淡故痂白急用保元湯合四物湯加白朮陳皮紅花老米

一痂後身熱不退或寒熱往來用小柴胡湯虛則補中益氣湯俱加黃芩

一痂後唇乾口渴熱甚不解者大連翹飲主之

一痂後虛煩不眠者竹葉石膏湯 煩渴譫語者辰砂益元散



一痂後口噤僵直腹痛透臍冷汗如雨痛定汗止而脉弦緊者因痂受風寒也宜散風養血用釣藤湯加紅花木香川芎芍藥當歸甘草白木青皮官桂生姜

一痂落肌肉尚嫩出見風早遂成癩癬有膿汁出者燒牛糞灰敷之 痂不落搗搗抵搔致成痘風瘡者宜消毒飲加苦參當歸外用金華散或乳香韶粉散 遺毒生瘡不已者活血當歸湯宜灸風池曲池三里則永不發

一痂後遍身青紫癩癧口噤痰响者由氣血虛弱而受不正之氣也用蟬退一錢姜汁薄奇汁入酒一盞調服得汗即愈

一痂後手足忽然拘攣不能屈伸轉動者由血少不能養筋或因風寒濕三氣使之然耳不可輕用發散反耗其血只補脾養血則瘳當歸桂枝湯治之


一痂後赤火丹毒惡候也從頭上起者過心即死從足下起者過心腎即死內服玄參化毒湯



一痲後牙齦生瘡時二出血謂之牙宣呼吸息謂之息露矣走馬疳也由熱在陽明急用蚕退散敷之如唇腫面浮穿鼻破頰潰喉腐肉飲食不入者死

一痲後發癰者皮膚間隱二起成疔瘡由毒氣未得發盡藏於皮膚或發痒搔之而成者或因受風二火相持而成者此吉兆也欲發出無使停留以變他疾如發太甚不已者內服防風葛根湯外用蜆子水洗之如無用六一散拂拭之


一痲後兩目不開惡見明者謂之羞明惟向暗處敢開也涼肝明目散主之若暗中亦不敢開者此即防目中有瘡以望月沙散治之





NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.




國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

24



Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/Color	Black
[Blue patch]	[Cyan patch]	[Green patch]	[Yellow patch]	[Red patch]	[Magenta patch]	[White patch]	[3/Color patch]	[Black patch]

4419555 v. 24



國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





赤水玄珠第二十八卷痘疹心印

新安生生子孫一奎著輯

異痘須知

夫痘有似凶而吉有似吉而凶者不可不知

天根痘 諸痘不起壯而天庭或曉星起灌者

乃精氣外生故曰天根十有九生

天空痘 諸痘壯氣而天庭或曉星不壯者乃

血不灌頂也故曰天空十無一生

明朗痘 諸痘不起而太陽獨起者吉日

明蝕痘 諸痘起壯而太陽

海溢痘 諸痘不起而耳後方員一寸獨起



海枯痘

諸痘起而耳後方員一寸獨不起泛者腎敗也名曰星宿海枯不治

又云

頭而遍身四肢耳上俱已起灌膿惟左耳下外有二三粒不起灌日後唇裂齒乾如不急救必然內攻而死

有根痘

凡痘出頭面多四肢密者十分危險若地角方員畧有數粒國如珠者十有十

無根痘

諸痘俱好而地角方員陷伏乾枯或灰白不起者腎水絕也不治

抱鼻痘

面印俱稀而鼻梁左右悉如蚕種者此毒聚於脾胃也名曰抱鼻痘其危矣

單瓚口

諸痘獨大者名曰單瓚口

雙瓚口

若口角兩邊各有一粒者名曰雙瓚口皆惡候也

瓚項托

痘出遍身稀疎惟項下稠密一片以項至於項名瓚項托項亦為不治之症

猪頭痘

出而頭項窩太多者急用山豆根玄參楮梗甘草生地芩煇山查木通荆芥牛

逆痘

上少下多者名曰逆痘與無大害

兩頭痘


初標時看自曾而上自臍而下俱有而中間一截全無者是也七日內急用人

鬼捏痘

傷痕一痕故名鬼捏不治

鬼痘

痘標既定手足背俱多而頭面全無者名曰鬼痘又曰無頭痘五日之內可





賊痘

救五日之外難救蓋氣血下行不能上
升急用升麻川芎白芷藥業前胡甘草
桔梗防風當歸芎藭尖姜水煎服如不治
回池生毒一月見骨而死若身上四肢
稀少者不可
遂作鬼痘看
痘初出便如綠蓋過一日便如黃蓋大
再一日又如員眼大名曰賊痘其痘根
裏與頂全無血色形雖起服按至虛軟
至四五日上下出血而死但此諸痘
獨大其大甚速者就是
不必大如員眼也
頭面遍身再無空地平塌而色白者俗
名蛇皮痘
皮必乾枯不能作漿至十一二
死日必
初標紅潤至四五日忽變暗伏不起將
至裏處以名為藥患急用扶表裏為上

蛇皮痘

藥患痘

九焦痘

當額地閣顛骨背耳後手足皆有
二箇黑陷者名曰九焦痘不治

伏陰痘

痘不冒膿而瀉膿血
故名伏陰急宜溫裏

空倉痘

痘雖肥滿而內實乾枯全無血水
乃空倉也決死之症

石臼痘

痘中有凹而四弦特起明亮好看內實
漿板不化以手摸之其硬如石因形純
石臼故名之矣

茱萸痘

痘不甚起而中亦有凹四弦皆有縐紋
以其形似茱萸故名之也若得根窠紅


活者服內托散去防風白芷頂中發黑
點者保元湯加芎藭身壯熱者入酒炒

虫痘

瘡癩痒甚者不必夏月中蠅生蛆雖寒
月亦有用簪挑去而愈或謂用柳條鋪

卷八

三



血疱痘

下令兒財於上則粗自出其蓋毒留於皮膚延綿日久臍腐熱腐故耳唇之腐草為黃朽木生

血疱痘者血協熱毒而自漿也刺胞血

疥以刺血解毒血黑者不治身熱者小

煎胡湯加生地血漿不能收斂者蒸草

龍腦膏下

血靨痘

痘出稀少四五日時如豌豆六七日血

靨毒乾亦似冊砂九日而痧落其血

充足毒少故隨出隨而不及膿

膿也其痘極佳百無一二

白漿痘

痘初起發癢頭便帶白漿者其度癩痘

也但有以便不可治主七日死

若瘡起發根窠四畔又旋出小痘攢簇

本瘡或發似粟米不待養漿即加搔痒

四圍痘

瘡出頭有孔膿水漏出堆聚乾結其色

如天疱瘡及癩頭之形者或清水非膿

漏瘡痘

無事自破水去而乾黑者其皆屬氣所

為傳染相似俗名漏瘡未有能治者矣

起腫時瘡上有小孔不黑不白名曰蛇

瘡皆瘰癧理不密而有是瘡大泄元氣急

用保元湯加丁香肉桂

其孔一密而瘡自起矣

隱血斑

其形如豆壳灰白全無血色擦破而後

赤萍瘡

瘡已出齊或未齊如赤萍萍微高起

若爬出有血急以解毒升發藥救之如

成爛瘡則

紫萍瘡

瘡已出齊紫色不起不灌漿如

浮萍貼在肉上者不治

白薄瘡

同上

草尾珠

其瘡通身俱陷惟腕骨一團飽滿如珠狀症可治補托灌膿即痊矣

黑瘡

腐瘡夫曰黑瘡多屬血熱黑瘡本為惡証世醫恒棄而不治然形狀多端猶可解救須當辨而治之但血不活者則難救矣

- 一瘡紫黑或黑點子隱在皮膚之間者無比散或人牙散用猪尾血三五滴酒調下小兒
- 三分六
人五分
- 一初出便是黑點急用紫草茸二三錢醇酒半盞煎至三分濾渣與服為妙

一其形如痣皮膚發青紫紋者服透肌散或加防風荆芥

一形如牽牛而色瘀敗又黑痕併黑腐者並用蟬退二十五箇紫草茸一錢水煎服

一瘡黑如煤炭血不紅活者用活血散一錢酒煎紫草湯下

一瘡黑而皮膚皆黑成片者化毒湯加蟬退地骨皮酒炒黃芩

一瘡黑大而軟者氣弱而熱毒盛也用保元



加菘草

一瘡焦黑潮熱煩躁者小無比散井水磨犀

角調下一錢

氣血兩敗瘡

近看猶如水蓼花 遠望胭脂
蒸可誇 臨漿清水不成膿
古聖神農 無治法

復出瘡

先見標一二點于面部或口唇上下如
常起脹貫漿收靨不知者以為瘡本稀
少故也然以火照之紅點隱然藏于
皮膚之內急用內托解散則瘡復出不
然順下決發一毒不急散
其毒而發其瘡即死

雲翼子二十八般異瘡姑錄于后以備參看

一彤雲繞頂

遍身瘡好但頭頂一片紅赤者
乃熱毒盛于膀胱也須清利之

一紫雲灌頂

遍身瘡好但頭頂紫黯伏不
起者不治

一烏紗覆頂

其症必咽喉啞寒臭氣大難乃
血衰氣敗而元陽脫也不治

一梨花漫頂

用保元湯加天樞
枕或可救

一雲掩天庭

遍身磊落光澤惟額上一片血
瘡如雲者乃心家客熱甚也急

一紫萍鋪額

其症熱甚咽喉痛悶亂發狂用小
無比散加玄參升麻犀角

一烏紗落額

不治

一灰撲印堂

此症心家少血也若薰腹脹咽
乾用保元湯加白芍涼血解毒



一 葡萄落地 <small>腎間紅紫一片若葡萄者兩日命終</small>	一 白梨墮腹 <small>氣血衰敗也半月之間發驚而死</small>	一 黑段纏腹 <small>與症必肚內膨脹聲音</small>	一 赤鱗穿腹 <small>與症甚大便秘小便淋瀝乃胃家熱也</small>	一 雪鋪魚背 <small>與血已枯也</small>	一 黑砂落背 <small>不治</small>	一 紫洋浮背 <small>不治</small>	一 桃花映背 <small>與症清火解毒可生</small>	一 柳絮飛胃 <small>與乃血氣枯弱也歸元海加考帶附主之</small>
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---

一 黑棋排胃 <small>三朝決死</small>	一 紫雲佈胃 <small>與症必咬牙漱掉口唇焦裂頃刻</small>	一 霞錦穿胃 <small>與因火毒淫盛不治之症</small>	一 烏飯沾唇 <small>與証必聲啞神昏目精不轉四肢厥冷喉响如鋸三朝七日乃死</small>	一 赤珠繞唇 <small>小此散加推黃</small>	一 楊花撲面 <small>用內托散</small>
-------------------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------





一爛粟居臀

遍身俱好惟臀上一片如粟壳臭爛者托補下元可轉

一榴花散野

諸痘俱好惟四肢紅赤而唇口崩裂者乃心脾肺三經熱也須

涼血清火解毒

一黑珠遍牀

四肢枯黑如火燒狀頭口中涎出氣冷朝夕死矣

一楊花墮枝

手足獨灰白者氣凝血滯也八珍湯加附子治之

婦女痘

童女出痘與童男相同無以議也但天癸通者則

治法不能不異且夫發熱之初適遇經水如期

而至則熱隨血解痘出亦輕不須服藥若過三

四日而熱不止痘不出者此熱入血室血必妄

行為內動中虛之患宜涼血地黄湯加人參治

之

一非經行之期於發熱之際而經忽至者此毒火

內熾逼血妄行之故必痘多而毒盛急用涼血

解毒湯倍加連翹牛旁使熱得清毒得解痘得

出經得止始無他變遲則內虛痘必陷矣柳花

散佳

一正當起發灌漿之時適遇經行過三日不止痘

應起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌
或灰白或黑陷此為經血去多陰血虧耗必為
陷伏壞疔矣急以八物湯去地黃加黃耆木香
熟附子以調元氣或葫荑酒噴之使痘起發灌
漿或出增痘者為吉若寒戰咬牙喘急腫滿手
足厥冷者為內脫不治之症矣

一起發灌漿之時經水適來忽口瘡而不能言者
乃血入少陰不能上榮於口也宜先以當歸養
心湯主之俟其能言後以大補湯治之或猪心

血調服亦可

一經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神思昏沉
言語狂妄如見鬼神尋衣撮空此行經之後血
室空虛天行邪熱乘虛而入犯於衝脉蓋肝藏
血開竅於目神思昏者魂亂也目妄見者視亂
也妄言者肝移熱于心也宜瀉肝散或小柴胡
湯加生地丹皮

一正直崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘此必
不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯八物



湯加木香黃芪官桂主之使裏氣充足毒無留
停更能飲食則可保全否則倒塌不治矣
一向來經閉不通血海乾涸遠逢出痘毒氣拂鬱
於衝任之間二陽之併發其熱必甚若攻擊之
則血妄行不止痘亦不出為喘急為腫脹為陷
伏矣須調其心脾使毒得發洩庶可以保其生
以歸脾湯逍遙散治之脾和食進然亦方可收
功

一痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如

常若當此時忽然行經者人但知厭穢以觸正
痘殊不知此乃本身之血不為之厭但恐血去
裏虛防生陷伏之變急宜救裏解毒大補湯主
之

一妊婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則血氣衰敗
痘必不能起發灌漿命其危矣故孕婦出痘深
為可慮蓋痘之用藥多主溫補如半夏肉桂之
類皆妊婦所忌而烏附又非痘家所宜凡遇此
症者不問輕重悉以清熱安胎為主不可觸動



其胎宜安胎散加黃芩芍藥主之血動者四物湯加芩連治之及單胎散佐之身熱足冷腹脹者八物湯加木香脾氣虛不進飲食毒發不出者四君子湯加木香糯米紫草胎動不安者安胎散加砂仁痘出稠密者參芪內托散加紫草芍藥當歸單身熱有外邪無內疔者參蘓飲加木香更以如聖散為主隨疔加減如初發熱加升麻葛根連翹痘出太甚加酒炒黃芩大力子山查連翹不起發加大力子白芍藥口渴加麥

冬知母天花粉痰多加半夏所謂可擾而擾似乎無擾故雖有胎不忌半夏也

一痘正在起發灌漿之時忽遇坐草分娩之期以補氣血俱虛之候宜大補湯加熟附子主之以補氣血固表裏若產後小腹急痛者此血未盡也黑神散畧與行之不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者以脾胃內虛外作假熱也大補湯加熟附一二劑更用四君子湯加黃芪當歸陳皮木香多服止者吉不止者凶



一疹後十日或半月之間適逢出痘以無胎孕繫累只以大補氣血為主以大補湯或八物湯去芍藥痘出多加連翹大力子大便自利者加肉荳蔻只照常一躰用藥施治不必妄為而多疑之反致誤事

一痘疹要訣曰姪婦出痘收醫之時胎落者多無事若發熱初出之時胎落者猶或可救若時當起脹灌膿而有犯以者多死蓋血氣衰敗無以逐其毒也

一痘已出未出不起不發隱在皮膚并治麻症斑症用梅花一兩桃仁二錢絲瓜五錢辰砂二錢甘草二錢為末每服五分參蘓湯下

一痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢川山甲一兩仙靈脾五錢射香一錢為末每服三五分咬牙寒戰加人牙二三厘內托散送下

快斑散

貫衆

赤芍藥


甘草

升麻

枳殼

炒各

右為末每服一錢水一盞竹葉七片煎至五



分溫服看大小與之按貫衆主腹中諸熱邪
毒其性微寒凡痘瘡煩渴咽燥喘急大便秘
小便赤澁目赤皆裏熱也急宜服之

西來甘露飲

清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不
退痘色紅紫口渴大便結燥服之即能紅潤
亦治疹家煩熱口乾咳嗽疹色枯燥或譫語喘
急睡卧不安

絲瓜藤 霜降後三日近根二尺剪斷將根頭

一節倒插入新瓦瓶中上以物掩之勿使灰塵
飛入次日以好新罈一隻將瓶中之汁傾在罈
中仍將藤照前插入瓶內三日後汁收盡將罈
封固收藏听後取用○若發熱煩躁口渴未見
紅點將茜根一兩水煎濃汁二酒盃搥絲瓜藤
汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕○若已見
標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯冲服便
見紅潤○若夾斑者犀角紫草茜根煎湯冲服
寒月用酒煎冲服○蓋此汁極能解毒清熱尤

治天行時疫每以生姜汁少許加蜂蜜調勻服之有神功

渾元汁 即紫河車不拘男女初胎者尤妙入新瓦罐內封固其口上以碗覆埋於土中久則化而為水是也

專治氣虛血熱痘色紅紫乾枯黑陷等症以此汁清而補之其効立見氣虛甚者人參紫草煎濃湯沖入服之 已上二方有力之家可多收貯愈久愈佳臨症極便勝如積金寶造浮屠也

王氏敗毒散 治初熱壯盛等症

即前敗毒散加升麻荆芥牛旁子蟬退山查地骨皮薄芎紫蘓紫草 減獨活柴胡茯苓人參

右姜一片水煎臨服加葱白汁五茶匙 如熱甚加戩胡黃芩 夏加香薷 冬加麻黃

瀉加猪苓澤瀉

蘓解散

治痘初壯熱頭疼腰疼腹疼作服一切熱毒甚者

紫蘓 葛根 防風 荆芥 白芷 蟬退

紫草 升麻 牛子 木通 甘草 各等分



加灯心葱白各七根水煎热服

升麻葛根湯 治初热壮盛疑似未明服此或痘已出而表热甚不退 李氏加紫蘇五分笋尖山查牛子各一錢冬月加麻黄一錢令痘易出易斂

和解湯

解表和中

升麻

乾葛

各一錢半

白芍

一錢

人參

防風

各七分

川芎

八分

甘草

五分

姜一片水煎服

解毒疎痘湯

預服解熱去毒

已出解熱毒斑疹

又治紅紫口乾壯熱語

防風

荆芥

羌活

柴胡

川芎

白芷

當歸

連翹

黃芩

黃連

麻黃

紫草

蟬退

右姜葱水煎服

加味葛根湯 治痘失表發熱譫語

升麻

葛根

赤芍

甘草

桔梗

柴胡

荆芥

防風

連翹


牛旁子

木通

右水煎服

大灵丹 治壯熱顛狂驚搐譫語紅紫斑焦乾陷

一切惡症



白滑石

飛過
三兩

雄黃

飛過

犀角

各三錢

辰砂

飛過
三錢

半牛黃

冰片

各一分

射香

五分

右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷灯草
牛子紅花紫草黃連各三錢水二碗煎至半
碗細絹濾去渣加蜜四兩同熬滴水成珠和
前藥丸如小龍眼大金箔為衣每用一九灯
心湯下暑月冷水化下
無比散 初熱服之甚能稀痘 又治痘夾黑點
子 及黑陷黑痘等症

辰砂

錢一

冰片

射香

牛黃

各五分

如無牛

黃用牛胆南星

代

臘粉

錢二

一方有蟾酥

右研細末一歲兒服一字大者五分刺猪尾
血三兩點新汲水調和送下取下惡毒如爛
魚腸葡萄穗狀即愈

小無比散

治痘壯熱口渴小水澀大便秘口氣

熱煩躁不寧或焦紫或紅斑自發熱至起壯時
有熱者皆可用痘後餘熱亦可用

桂府滑石

飛過
六兩

石膏

飛過
一兩

粉草

寒水石

各五錢 欝金

蟬肚小者甘草湯煮乾為末一錢

右俱製淨末和

勻每五歲者服二錢大人再加 冬月灯心

湯下 夏月井水調下 熱甚不解者井水

磨犀角汁調下 若紅紫頂陷不起加川山

甲末一分射香半分紫草煎湯加酒一二匙

調下即起

大無比散 治熱毒大甚驚狂譫語引飲痘瘡紅

紫黑陷

桂府滑石

飛過

粉草

一辰

砂

飛三

雄黃

飛一

右末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之初用敗毒散調下亦能稀痘 若報痘後用

灯心湯下

退火回生散 治痘熱甚發渴紅紫黑陷

滑石

錢一

辰砂

分一

冰片

厘三

右末冷水調下

得睡少時神安氣靜痘轉紅活

龍腦膏 痘毒出不透心煩狂亂如見鬼神或已

出未出晉伏黑惡毒等症

冰片 研末新宰猪心血和丸員眼核大小



兒服半丸 大人服一丸 凡狂妄煩躁者
心經毒盛也紫草湯下 昏瞶不醒者伏熱
在心經也井花水下 血疱漿不圓者紫草
湯下 漿坐疱陷者溫酒化下

天真膏 治黑陷乾枯紅紫及斑不退用此救之
十全四五

初生小兒解下黑糞用砂罐收貯加水銀二兩
射香一錢黃蠟封口埋於土中愈久愈妙久
則化而為水每遇前症看兒大小熱毒盛者

量與二三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之
立時紅潤活澤真秘方也較之天靈蓋枯臭
無益之物萬々矣緣此糞原係母之真血所
化蓋以血補血且入土日久又得陰氣多故
能解毒 百日內小兒熱而煩躁啼哭不止
用少許點入眼角二三次便能神安氣和而
睡蓋又能清心熱也

豬尾膏 治全龍腦膏但此二方俱以龍腦為劑
虛寒者不可用惟實熱則有功



凡痘過服熱藥昏昧不知人事者取猪尾血以
龍腦和為丸負眼校大溫酒化下

按猪尾乃動物取其血用

之使毒活動化漿而達於外也

一凡痘倒靨心神不安者片腦五分辰砂一錢猪尾血爛研膏用木香磨湯化下

一凡痘不化漿倒靨者片腦一分猪尾血一錢同研新汲水調下

歲靈龍腦散 治痘黑陷

歲靈仙一錢炒片腦一分 右用溫水調下取下

瘡痂為効

獨聖散 痘不起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅

活起發有起死回生之功又名奪命丹

川山甲酒炒成珠一錢取麝香一分

前足及嘴角者佳

右末每小兒三分大者五分用木香煎湯入少酒調下 熱甚者葱草湯下

宋杏庄方內加炒紅麴川烏炒焦各五分名曰一七金葱湯下

大成散 治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切



不起發之症俱可用之

川山甲

酒炒一兩

甘草末

錢三

雄黃

硃砂

各一錢半

紫草

錢三分

射香

分二 右每五歲兒用二分冷症熱

酒調下

熱症紫草湯下

寒者加入治中

散內用

熱症加入小無比散內

人牙散

治痘不起發黑陷或紅紫黑斑咬牙寒

戰

人牙自落者不拘多少火煨存性津入韭菜汁內大牙二次小牙二次研極細

未入射香一分

或加紅麴二分

右用雞冠血調成膏好酒半

盞入乳半盞入葱白一撮煎湯送下

凡服牙齒不可過多每服止三分多則陽氣盡出

於表恐痘斑爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡

泄急以四君子加芎歸服之

無憂散

治臨危痘症寒戰咬牙

人牙

如上製一錢

椎黃

珍珠

各五分

一方有牛黃五

分 右末每服三五分多則一錢荔枝煎湯下

無價散

治黑陷欲死者

一方加射香冰片

少許

用無病小兒糞臘月將傾銀確二箇上下合定

塩泥固濟火煨通紅取出為末蜜水調服一錢



烏金膏 治發熱至七日已前或因風寒痘不起

發或紅紫或驚搐俱可用

姜蚕酒洗 全蝎去足尾 甘草 紫草 白附子

味苦肉白 麻黃各五錢 川山甲炒末二錢 蟬退去頭

洗淨 右為末將紅花紫草各一兩好酒二鍾

熬去大半去渣入蜜五兩慢火同熬滴水成

珠為度丸如龍眼核大每服一丸灯心湯化

下

紫金散 治出不快及倒靨 亦治遠年不愈惡

瘡 紫草 蛇退炒 牛旁子炒各五錢

右為細末每服一錢水半鍾煎減半温服

連翹升麻湯 治痘一發密如針頭形勢重者當

輕其表而涼其內 連翹 升麻 黃芩

葛根各一錢 麥門冬去心二錢 右水煎服

清地退火湯 治痘帶熱而出名為火裏苗急用

候之 地骨皮 地膚子各一錢 牛旁子 紫草

葛根各八分 連翹六分 當歸五分 木通三分 蟬退二分

右加姜一片水煎服 如熱不退再服一劑



或為末灯心湯服

紫草透肌湯 治痘熱而出不快及頂陷者

紫草錢一升麻分五防風 荆芥 黃耆各八

甘草分三木香分五右姜水煎服 如色紫腹

痛加蟬退一錢

化毒湯 治痘已出而熱毒未解宜清熱涼血毒

一解不致黑陷血一涼不致紅紫

紫草 升麻 甘草 蟬退 地骨皮 黃芩

酒炒木通 各等分水煎服

解毒散 治毒先發腫者名為痘母後發者十有

九死先發者吉 金銀花兩五甘草兩一木通

防風 荆芥 連翹 牛子各三錢

右用酒水各一鍾煎服 如泄加訶子荳蔻


痘紅者加炒黃芩為藥 瘡痒者加歸身生

地或加何首烏尤佳 疼痛者加赤藥

透骨解毒湯 治寒戰咬牙

紫草 甘草 當歸 防風 陳皮 赤芍

右等分水煎服



消毒飲 痘已出上焦熱胸膈不快及痘後癩毒

麻疹熱毒 荆芥 牛子各二錢 甘草一錢

右姜二片水煎服

如聖湯 痘已出身熱如火

紫草 升麻 葛根 白芍 甘草 木通

猴梨 各等分加姜一片葱白三莖水煎熱服

心煩加麥冬赤茯苓煩渴加生脉散 七八

九日身如火者加酒炒黃芩地骨皮

四聖散 黑陷倒靨不起發不紅活小便不利

紫草 黃耆 甘草 木通 右水煎服 熱

甚色紫倍加紫草芩連紅花大便秘加枳殼

如常加糯米

加味四聖散 痘出不快及變陷倒靨小便赤身

熱未退或復冒風者

紫草 黃耆 人參 甘草 川芎 蟬退

木通 木香 大便秘加枳殼 不秘加糯米

百粒水煎服

涼血解毒湯

痘出熱不退紅不分地或痘苗乾
結黑陷急用此方可起非灌漿





藜草 錢 生地 分各八 熟胡 分各七 牡丹皮 分各三 赤芍

蕪木 防風 荆芥 黃連 木通 分各三 牛子

分四 天麻 紅花 甘草 分各二 姜一片 灯心二十

根糯米百粒水煎服

惺、散 治痘頭痛壯熱喘急此攻毒散熱之劑

人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗 細辛

川芎 分各五 薄荷 一方無川芎加天花粉

姜三片 枣一枚 水煎服

阿托散 痘不起發喉窠不紅或灰白色
交牙寒戰等症

人參 黃耆 甘草 川芎 當歸 防風

白芷 桔梗 白芍 厚朴 木香 肉桂

右姜一片 枣一枚 水煎服 色紅熟者去肉

桂木香加藜草 蟬退 漿不滿水酒各半煎

服 色淡白者去防風 白芷加糯米 大便

燥加人乳

蟬退膏

蟬退 酒洗去 當歸 防風 甘草 川芎

荆芥穗 升麻 白芍 分各等 右為末 煉蜜丸

芡實大每服一九薄奇湯化下

粉紅丸 又名溫驚丸 治痘後癩痢症

牛膽南星四兩辰砂一錢天竺黃五錢冰片五分

胭脂一錢 右為末牛膽汁和為丸雞豈子大

每服一九小者半九沙糖溫水化下

大保元湯 治頂陷根窠雖紅而皮軟薄血有餘

而氣不足 黃芪三錢人參一錢甘草 川芎各一錢

官桂一分 加姜枣水煎服 如氣不行加水

香減去桂 若不食加人乳半鐘 又方加

白何首烏黑薑蒸過用

生脉健脾湯 治漿既成皮軟色白乃氣不足也

脾則血生是 氣不足當補氣血不足宜養脾脾

同其本也 黃芪半錢人參一錢炙甘草 官

桂各三分當歸 川芎 白芍 白朮各八分茯苓

五分 紫草四分 姜一片紅枣一枚糯米五十粒或

加酒洗紅花三分 通天散 治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參 陳皮 桂枝各八分川芎 熟地 芍藥

錢各一分當歸 紫草各一分紅花 木香各三分甘草



六分知母八分荔枝殼筒右用鷄汁一鍾粳米三枚
糯米一撮煎服初服到頭再服到臍三服到
脚神効

升天散 即灌膿起頂散治痘灰白或紅紫黑陷

乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

人參六分黃芪六分山查各八分白朮五錢當歸五錢川芎五錢

橘紅各五分甘草三分淫羊藿五分川山甲北炒黃二分

肉桂三厘引經之木香二分姜一片枣一枚

水煎服 或為末服亦可 如嘔吐生姜湯

下 瀉米飲下 肚痛神麩煎湯下 煩躁

麥門冬湯下 渴用麥冬五味煎湯下 吐

瀉藿香陳皮湯下 痘不成漿多服數帖無

妨

補漿湯 痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿三分人參八分川山甲北炒三分黃芪一錢

枸杞子錢一川芎五分當歸八分甘草五分木香半錢

白朮六分山查八分陳皮五分官桂三厘

黃荳三十粒筍尖三箇加姜枣糯米水煎服 一



方有白芷防風

補元湯 治痘頂充滿而根盤不聚色不紅活乃

氣有餘而血不足也

川芎 當歸 白芍 熟地 紫草

紅花 陳皮 甘草 白朮

酒水各半盞糯米五十粒棗二枚煎服

活血散 治痘色淡白

當歸 赤芍 紫草 川芎 紅花

血竭 木香 右為末每五歲者服一錢

十歲已上者服二錢好酒調下 熱極血焦

不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散 治氣血俱虛灰白色不灌膿回漿者

紫河車 龜板 一方有鹿茸五錢

右末每服五七分或一錢氣虛者保元湯下

血虛芎歸紫草煎湯下

渾元散 治全上

紫河車 用白糯米三合水淘淨入

無油銚內同炒以米黃色為度同為末每用



五七分兒大者一錢極補氣血能助灌漿如神緣糯米性溫得紫河車之氣純化為河車故其補功最速譬之造酒米從麴化意也極妙絕

異功散

此方調順陰陽充實表裏凡痘灰白瘵

癩寒戰泄瀉腹脹並宜服之非虛寒者不可輕

用 人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮

半夏 厚朴 木香 丁香 肉果 大附

子 官桂 右姜 煎服

內助丹

黃耆

酒炒

人參

酒炒

白朮

茯苓

當歸

陳皮

半夏

厚朴

肉桂

山查

姜三片 棗一枚

糯米五十粒水煎服 如不食加人乳一盃

瘵甚加大附子 寒戰不止加附子防風

渴加麥冬 瀉加澤瀉猪苓不止加訶子肉

果

助陽丹

瘵塌不起根窠不紅

黃耆

人參

白芍

各酒炒 一錢

甘草

分三 川芎



當歸

各一錢

紅花

五分

陳皮

八分

官桂

二分

姜枣水煎

服

如食少加山查厚朴各五分餘加全煎

回生起死丹 治痘灰白寒氣逆上不食腹脹嘔

吐肚痛泄瀉清水手足俱冷

丁香

九枚

乾姜

一錢

水煎熟服被蓋片時令脾胃

溫暖陰退陽回痘自紅活

治中散 虛寒瀉利不進飲食

黃芪

人參

茯苓

白朮

川芎

當歸

肉桂

各五錢

肉果

麪包

煨熟

丁香

一錢半

木香

三錢

右末每五歲用五分好熱酒調下衣被蓋煖

少頃痘變紅活而起

和中湯 虛吐不止即鎮胃止吐湯加人參

人參

茯苓

甘草

各五分

白朮

半夏

各八分

陳皮

藿香

砂仁

各一錢

生姜水煎服

藿香正氣散 治初熱乾嘔

藿香

薏蘓

大腹皮

陳皮

桔梗

甘草

茯苓

半夏

厚朴

白芷

右姜枣煎服

定痛散 傷寒肚痛及冷氣痛

神麩 香附各一錢 山查二錢 良姜 當歸

甘草各五分 姜三束二水煎服 手足逆冷加

大附子二分

桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝 炙甘草各一錢 白芍藥酒炒二錢 姜三片束

二枚水煎服

黃連湯 治熱毒在胃腹痛時或欲吐此藥能升

降陰陽 黃連 炙甘草 乾姜 桂枝各二錢

半夏 人參各八分 粳米二枚水煎服

益黃散 胃冷嘔吐而利

陳皮 青皮各二錢 丁香五分 木香三分 訶子七分

右水煎服 一方無木香有荳蔻一錢

聖腸湯 治痘泄瀉不止

黃芪 白朮 肉果炮去油各一錢 山查七分 川芎

陳皮各五分 升麻三分

加牙棗三枚水煎服

豆蔻丸 治痘灰白泄瀉清水不止 又方止用



龍骨訶子肉蔻三味治同

木香 砂仁 龍骨 訶子肉 肉果麩煨各五錢

赤石脂 枯礬各七錢半 右末麩糊丸黍米大每

服三十九米飲下

加味犀角飲 痘已出不勻心煩壯熱口舌生瘡

犀角 牛子 荊芥 甘草 防風 升麻

桔梗 麥冬 水煎服

犀角地黄湯 治諸失血

犀角磨汁 赤芍藥 生地 丹皮 各等分水

煎服

二寶散 治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴亂

語 犀角 玳瑁 二味磨汁頓服即愈

斬關散 痘紫發熱鼻紅不止


地黃 丹皮 黃芩各五分 升麻三分 藕節

茅根各一錢 萊菔四十粒 水煎服

梔子仁湯 煩躁譫語驚狂發斑

梔仁 黃芩 石膏各二錢 知母 杏仁各一錢半

大青 柴胡 荳豉 赤芍各一錢 升麻八分



甘草五分 水煎服

人參白虎湯 暑盛煩渴痘出不快又解麻痘斑

痘等熱毒 人參五分 石膏四分 知母一錢 炙甘

草三分 加粳米一撮水煎服

竹葉石膏湯 治痘不惡寒壯熱煩渴小水赤澀

石膏 知母 甘草 麥冬 竹葉

右水煎服

麥門冬湯 治斑疹煩渴吐瀉及痧後餘熱

麥冬 人參 甘菊 赤芍 赤茯苓 升麻

各一錢 甘草五分 石膏三錢 水煎服

生脉散 止煩渴首尾通用

人參 五味子 麥冬 水煎當茶飲

參苓白朮散 治痘已痂未痂身熱不退煩渴不

止此藥極能清神生津乃治脾虛之聖藥也

人參 白朮 茯苓 甘草 乾葛 木香

麥冬 藿香 各等分水煎服

柴胡麥門冬湯 治痘壯熱經日不退

柴胡 麥門冬 甘草 人參 玄參 龍胆



草 水煎服熱退即止 一方無人參

涼膈散 上兩積熱口舌生瘡煩渴

連翹 薄荷 黃芩 梔子 甘草 大黃

朴硝 各等分水煎服 如痰火嗽加桔梗竹

葉蜜一匙

四順飲 治大便秘

大黃 當歸 芍藥 甘草 各等分水煎服

通幽湯 大便秘結

當歸 紅花 生地 熟地 桃仁 升麻

甘草 火麻子 水煎服

通腸散 大便秘結

枳殼 當歸 大黃各二錢 芝麻三錢 牛膝分

水煎服

葱白湯 治頭疼

連鬚葱白 生姜不拘多少水煎帶溫服

當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 黃芪 黃芩 黃連 黃柏 生地

熟地 各等分水煎服



甘露飲

治牙根腫痛腐爛口臭牙疳出血喉舌

生瘡

天冬 麥冬 生地 熟地 黃芩

枳殼

石斛 茵陳 枇杷葉炙去毛 甘草

各等分水煎服

吹口冊

治口疳

黃連

青黛 孩兒茶 冰片 為末吹之

赴蓮散

口瘡神効

薄荷

黃柏 等分為末入青黛少許搽之

牙疳方

痘後餘毒攻牙根疳腐內宜服甘露飲

人中白

服三錢

枯礬

二錢

鹽梅

七箇 射香

白氈子灰

一錢

五穀重

焙乾二錢

為細末先將葱

茶洗去腐肉須見鮮血然後搽藥

鈎藤湯

痘後口噤僵直遠臍腹痛

鈎藤

紅花 木香 川芎 當歸 白芍

甘草

白朮 青皮 黃連 官桂 生姜

各等分水煎不拘時服


消風散

治痰盛驚搐語狂急口張目作上視

羌活

獨活 姜蚕 藿香 枳壳 防風





天麻 地骨皮 蝉退各八分 前胡一錢 柴胡

黃芩 天花粉 桔梗 茯苓 荊芥 紫草

牛子各一人錢 人參 川芎各七分 甘草四分

姜枣水煎服

瓜蒌散 治痘熱極生風發搐

瓜蒌根二錢 白姜蚕一錢 慢火全炒老黃色為

末每服二三分薄芎湯下

保命丹 一切驚風發熱

天麻 欖金 全蝎去尾各五分 防風 甘草三錢

青黛三錢 白附子炒 姜蚕姜汁炒 薄芎五錢 大半夏

炒深湯浸晒乾又用 南星製全上一兩 辰砂飛五錢

射香五分 鈎藤 牛黃二錢 蝉退 茯神

桔梗各五錢 右末煉蜜為丸芡實大每服一九

灯心湯下

蟬花散 治痘發熱發痒抓破

蟬退 地骨皮各一兩 為末每服二三匙白酒

服二三次

回漿散 治痘不收漿結痂

何首烏

白芍

黃耆

人參

甘草

白朮

白茯苓

姜水煎服

象牙散

治同上

人參

黃芪

白朮

各一錢

甘草

七分

茯苓

一錢半

何首烏

二錢

右加糯米二錢 枣二枚 水煎調下

象牙末一錢

玄參升麻湯

治溫毒發斑

玄參

升麻

甘草

水煎服

陽毒升麻湯

面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮

喉痛

升麻

五錢

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

各二錢半

右水煎服

陰毒升麻湯

治陰斑

升麻

當歸

川椒

鱉甲

雄黃

甘草

右水煎服

四聖膏

治痘疔挑破以點之

七粒珍珠火上燒

碗荳七七鍋內炒


男髮

不拘灰多少

加入胭脂真箇好

二聖散

治同上





雄黃

二錢

葶草

三錢

右研末用油脂調下

敷方

痂後痘疔潰爛成坑內見筋骨以蜈敷之

赤石脂

膩粉

黃柏

抗粉

血竭

各一錢

飛丹

炒八分

髮灰

五分

乳香

沒藥

各三分

冰片

三厘

伏龍肝

錢一

蜜陀僧

飛過

有臭氣加阿魏

三

四分

右為細末綿帛篩過敷之外用膏藥貼

內服人參敗毒散加川山甲蟬退連翹

人參敗毒散

治餘毒癰腫

人參

赤茯苓

羌活

獨活

前胡

薄荷

柴胡

枳殼

川芎

桔梗

各一分

甘草

或半

牛旁子

防風

荆芥

連翹

金銀花

即荆防敗

毒散

頭上加白芷升麻

上身倍加桔梗

手加薄桂

腰加杜仲

腿足加牛膝木瓜

金花散

痘後肥疔疥癬等瘡以能收水解毒

黃丹

黃栢

黃芪

黃連

大黃

輕粉

射香

右為細末濕瘡乾摻燥用臘猪油熬化

調敷

必勝膏

治腫毒

馬齒莧搗汁 猪脂膏 石蜜 三味熬膏塗
之即消

三莖散

瘡後癰毒初起紅腫 黑豆 赤莖 莖莖用
醋浸研漿時時以鷄翎刷上隨手可消
敗草散 治斑爛不止

爛茅草 不拘多少用尋年蓋牆屋者經露風

霜年久感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不
能盡述取來晒乾或焙乾為極細末敷瘡上

或攤在蓆上令兒坐卧於上即愈

又方 荔枝殼微燒存性 草紙燒灰存性 多

年敗茅 三味共為細末或搽或摻自能收水

結痂


又方 黃莖壳燒白灰為末摻之 如痘風癬以

莖殼煎湯洗

綿繭散 治爛瘡 治身及肢節疔蝕瘡膿水不

絕 繭子不拘多少將生明礬末裝入滿火上

燒令汁乾枯為末摻之



秘傳茶葉方 痘爛遍身無皮膿水流 出粘拈衣

被 茶葉要多揀去粗梗入滾水一沸即撈起

再揀去梗濕鋪床上用草帛隔一層令兒睡

上一夜則膿皆乾

乳香韶粉散 痂欲落不落用此薄塗當減癩痕

又治熱痘瘋遍身膿水不絕

乳香錢三 韶粉兩一 輕粉錢一 右末猪油拌鵝

翎敷上

地黃散 痘毒入眼腫痛赤縷或白膜遮睛

熟地 當歸 防風 蟬退 羌活 白芍

炒去刺 穀精草 木賊各一錢 玄參五分 犀角末一錢

黃連 大黃 炙甘草 木通各一錢半 為細末

小兒每服一字大人二字羊肝湯食後調服

日三夜一忌口將息

蜜蒙花散 治痘入目翳膜遮睛

蜜蒙花 菊花 石決明 白蒺藜 木賊

羌活 右末每服二三錢茶清調下

兔糞散 治痘入眼 亦可煉蜜為丸酒送下三



五十丸

兔糞炒黃為末用蟬退木通甘草煎

湯頓服

兔糞丸

治瘧入眼或生翳障

兔糞

炒四兩

石決明

煨

草決明

木賊

去節

白芍

防風

各一兩

當歸

錢五

穀精草

錢二

右末蜜丸粟豆大每服三五丸荆芥湯送

下

吹耳丹

輕粉

飛丹

為細末左眼翳吹右耳右眼吹

左耳只吹一二次

又方 加雄黃射香少許 外用石燕子一對煇

即一對二味磨水常服

單胎散 治妊婦出痘 一方有陳皮枳殼大熱


加欝金

川芎 川歸 芍藥 人參 白朮 茯苓

甘草 柴胡 條芩 防風 荆芥 白芷

葛根 砂仁 紫草 阿膠 桔梗 糯米

水煎服



安胎散

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 白茯苓

甘草 條芩 陳皮 紫蘓 砂仁 阿膠

香附 艾葉 紫草

各等分加姜枣水煎服

安胎飲

大腹皮 人參 白朮 白芍

紫蘓 砂仁 香附 甘草 加糯米水煎服

胎漏加阿膠百草霜

柳花散 室女發熱經行

柳花 紫草 升麻 歸身

右末每服七錢葡萄酒煎湯調下

鐵籬散 治痘後癩毒

鳳凰 退燒 灰醋調圍四畔 雷頭出毒氣甚佳

蕎麥粉法 痘瘡破者用此敷之潰爛者以此遍

撲之極佳 蕎麥粉以絹袋盛撲於瘡上或以

此觀於床褥上

溫粉撲法 治汗出不止



黃連

牡礪粉

貝母

各末
五錢

粳米粉一升和勻

絹袋盛周身撲之

蟬花散

治爛痘生疽虫及夏月諸虫咬傷臭惡

不可近者服之虫皆化而為水蒼蝇亦不敢近

蟬退

洗淨
焙

青黛

澄去灰土
各五錢

此細辛

二錢

蛇退一兩

燒存性

右為細末每服三錢酒調下仍以生寒

水石細末摻之

青黛散

治痘未作膿痛甚心膈煩躁睡卧不安

並宜服之

真青黛如枣核大水調服之即安

樺皮散

治痘瘡及乳癰并一切腫毒

樺皮木剉煎溫服以藥味苦平無毒 若治乳

癰取樺皮燒存性為末酒調服之立消

獨勝散

治早晨微熱晚發大熱目黃脇動身熱

手冷發甚如驚者又名牛旁姜蚕散

牛旁子

五錢

白姜蚕

二錢

紫草

二七

水煎服速

進三四服其痘便出蓋姜蚕治遍身癰疹疼

痛牛旁發痘透肌紫草利竅要知痘疹無虛

寒証者服此痘立出也



蘿蔔湯 治痘疹出不快者

右用開花蘿蔔煎汁時時飲之蓋痘疹氣勻即出快蘿蔔治嗽定喘下氣消脹解毒

紫河車散 治小兒痘瘡毒氣不解上攻咽喉聲

音不出舌頰生瘡遇逆煩悶潮熱面赤

紫河車即全線 茜根 貫衆各三錢 白芍藥

甘草炙各五錢 右每服三錢生姜一片水煎服

一方有牛旁子

野通散 治痘瘡出不快及傷寒不語

乾野人糞即知狼糞 冰片 真麝香各半分

右為細末每服五分看大小用新汲水入蜜

調下十歲以上者服一錢 按野人糞治蜘蛛

咬瘡與治痘出不快大効蓋蜘蛛咬瘡久

而不愈其絲生皮膚延蔓遍身不愈者加雄

黃青黛水調以蜘蛛試之立化為水屢驗蓋

此三味是治瘡疹當用之藥取山中者若人

家所養之猴食物味雜即不効失其本真也

南金散 治痘已出而復斵其勢甚危諸藥不効



者萬無一失本家印貼此方施人全活甚衆

紫背荷葉

霜後搭水
紫背者

白姜蚕

洗去系
炒乾

右為末等分每服看大小大者一錢小者五分
分研羌萎汁和酒下米飲亦可 治此症多
有用龍腦人牙者卒難措辦惟此無毒而効
且速但紫背者甚難得可於鹽舖內尋之

橄欖飲 治倒屨

橄欖從中截斷水服少許服之立發

乳香猪血膏 治痘不起發

乳香

研末

猪心血搗為丸櫻桃大每服一九水

磨化下


鈎藤紫草散 治痘疹不快

鈎藤鈎子 紫草茸 等分為細末每服三五

分溫酒調下蓋紫草滑竅利小便散十二經
毒氣鈎藤治小兒寒熱十二驚癇綠驚癇出
於心肝瘡疹亦心所主也

鴉片散 治痘當起脹灌膿時泄瀉不止諸藥不

効者如神 真鴉片錢一 蓮肉錢一



右每服半分或一分米飲調下立止

葛根黃芩湯 治喘有汗發熱咳嗽

乾葛 黃芩 各二錢 黃連 芍藥 石膏 各一錢

五味子 十一粒 甘草 五分 水煎服

五味子湯 治喘促而厥

五味子 一錢 人參 一錢 麥冬 杏仁 各二錢

右姜三片束三枚水煎服

清肺飲 治咽乾声啞

麻黃 一錢 麥冬 二錢 知母 天花粉 荊芥

訶子 菖蒲 各八分 桔梗 二錢

水煎入竹瀝姜汁服

天花散 治痘後失音

天花粉 桔梗 茯苓 訶子 石菖蒲


甘草 各等分竹葉七片黃荊一寸水煎服

補肺散 治痘未出声啞

阿膠 蛤粉炒成珠 牛子 炒三 杏仁 去皮尖

甘草 二分 馬兜鈴 黃芪 各五分 糯米 炒

水煎食後時時嚥之



利咽解毒湯

治痘咽喉痛首尾皆可用

山苳根

麥冬

牛子炒

玄參

桔梗各七

甘草二分

防風五分

藜蘆四分九粒

右水煎服

三黃熟艾湯

痘後咽喉寒喉痺

黃連

黃芩

黃栢

艾葉

各等分水煎服

上鎖匙

咽喉腫痛或帝鍾拖下不收及喉舌強

硬 硼砂錢一

朴硝五分

姜蚕條一

冰片分半

為末吹入

羌活當歸湯

治腰背痛初發熱時便宜服之

羌活

當歸

獨活各一錢

羌胡五分

桂枝分七

防風

川芎

黃栢各一錢

桃仁

紅花各八分

酒水各半煎服

又方治腰痛有蒼朮漢防

巴

如神湯

治腰痛

當歸

桂皮


玄胡索

各等分為末酒下二

三錢

活血解毒湯

治餘毒



防風 荆芥 生地 赤芍 當歸 連翹

牛子 黃連 紫草 甘草 蒼朮 薄荷

川芎 木通 各等分水煎服

胎元散 痘不起發不紅潤是血氣俱虛

胎元焙乾為末加射香少許酒調服三五分

水楊湯 治痘乾尅不起者

水楊柳 春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細葉紅

梅 右以枝葉切碎水煎七八沸先將一分

置盆內手拭不寒不熱令痘兒先服內托之

劑然後浴洗漸漸添湯不致太冷浴洗久許
乃以帛拭火照之纒然有起勢起處竟有
暈暈有系乃漿影也如漿不滿再浴若弱者
只浴頭面手足可也既不赤躰不厭多洗灯
照如無起勢乃氣血敗無生意矣

溫膽湯 治痘血寒顏色灰慘血凝不活腹脇脹

滿面青筋縮嘔清水或瀉青菜色

白茯苓 橘紅 半夏 甘草 枳實 炒

各等分竹茹一錢姜朮水煎服

陳氏木香散

治痘氣寒鼻流清涕咳嗽惡風自

汗身軀寒戰瘡色慘白

木香

臨時磨服

大腹皮

黑豆汁洗淨

人參

各三錢 赤茯苓

前胡

青皮

去穢炒

半夏

炮七次

丁香

訶子肉

炙甘草

各二錢半

灯心

一錢半

每服三錢姜枣水

煎服看大小加減

中和湯

治全上

人參

黃耆

厚朴

姜汁炒

白芷

川芎

當歸

粉草

桔梗

白芍

酒炒

肉桂

去粗皮

防風

霍香

各等分酒水各半姜枣煎服

瀉肺散

治痘氣熱鼻乾燥皮毛枯槁咳嗽瘡色

焦紫即瀉白散

桑白皮

蜜炙

地骨皮

甘草

各等分加竹葉二

十片灯心水煎服

清肺飲

治症全前

麥冬

桔梗

各二錢

知母

荆芥

天花粉

錢石菖蒲

訶子肉

各八分

水煎服

清金湯

治口氣臭



知母 黃芩 石膏 桔梗 甘草 天門冬
麥冬 馬兜鈴 木通 山梔 天花粉 各
等分水煎服

解毒托裏散 治痘稠密

桔梗 牛旁子 人中黃 防風 荊芥穗

酒紅花 歸尾 蟬退 升麻 乾葛 赤芍

連翹_心 各等分水煎入燒人屎調服

四物快斑湯 治痘火盛乾燥

當歸 川芎 赤芍 生地 荊芥穗 牛子

升麻 葛根 連翹 紫草 地骨皮 水煎

入燒人屎服

四君快斑湯 治痘氣虛滯濕

人參 黃耆 白朮_土 茯苓 甘草 桂心


白芷 荊芥穗 防風 陳皮 白芍_{酒炒}

各等分水煎服

大補保命湯 治痘皮嫩易破者

人參 黃耆 當歸 生地 川芎 赤芍

甘草 牛旁子 防風 荊芥穗 連翹



官桂 水煎入燒人尿服

清金導赤飲 治痘熱乘肺金當痂不痂作喘煩躁譫語小水不利垂危

當歸 白芍 陳皮 貝母 軟石膏 白朮

苓 甘草 黃芩 黃連 杏仁 桑白

皮 蜜炒 枳殼 炒 木通 滑石 麥冬 車前子

人參 玄參 各等分水煎服

人參固肌湯 治痘表發太過致肌肉不密痘痂粘肉久不落者

人參 黃耆 甘草 當歸 蟬退

各等分入糯米一撮水煎服

人參清神湯 治痘痂不落昏迷沉睡者

人參 黃耆 甘草 當歸 白朮 土炒 麥冬

陳皮 酸棗仁 黃連 酒炒 茯苓 各等分加

棗、糯米水煎服

馬齒莧散 治痘痂不落成斑痕者

馬齒莧搗汁猪脂膏石蜜共熬膏塗腫處

當歸桂枝湯 治痘後手足不能屈伸



當歸 川芎 黃耆 甘草 薄桂 黃柏

蒼朮炒 各等分水煎 如氣虛少加川烏以

行經加人參為主 如感風寒以致骨節疼
痛加羌活防風

玄參化毒湯 治痘後赤遊丹毒

玄參 歸尾 紅花 連翹 軟石膏 赤芍

防風 地骨皮 木通 荆芥穗

各等分加竹葉水煎服

蚤退散 敷牙疳

枯礬 塗即尿桶中垢也 五倍子各二錢 蚤退燒

性 為細末先以米泔水用蟬蟪虫翻轉煎

水洗淨瘀血以藥敷之

黃連陰憲丸 治狐惑瘡

黃連二錢 芩薈 乾蟾各一錢二分 史君子肉二錢

半 蕪荑一錢五分 川棟子肉一錢

右末烏梅洗淨去核搗膏和丸米飲下

蜆子湯 治痘後發癩

蜆子不拘多少活者以水養五七日旋取其水



洗之規衣煮湯亦佳

十三味敗毒散 治癰毒

當歸 白芷 川山甲炒土 金銀花 防風

乳香製 甘草 陳皮 赤芍 皂角刺

貝母 沒藥製 天花粉 各等分酒水各半

煎服

涼肝明目散 痘後羞明

當歸 龍胆草 密蒙花 川芎 羌胡

防風 酒連 各等分雄猪肝煮湯煎服

望月沙散 痘後暗室中不能開者

穀精草 密蒙花酒洗 蟬退去翅足 望月沙兩一

右為末雄猪肝一兩竹刀批破用藥一錢摻

入肝內水煮熟飲汁食肝効

羊鬮骨髓 治痘痂欲落不落癩痕

羊鬮骨髓兩一 煉入輕粉一錢研成膏塗之

小靈丹 解毒發痘之聖藥治紅斑黑陷不起一

切危惡如服此而不見効者次無可生之理矣

硃砂 雄黃各二錢 乳香 沒藥各製一錢半



大蟾蜍

取心肝尾上
倍乾五錢

射香

三分

為細末取猪心

血雞冠血丸皂子大每服一丸

身無大熱

生酒化下

熱甚不飲酒熟草灯心湯下即

時紅活而起

神功散 治痘作渴

人參 黃芪 甘草 牛旁子 紅花 生地

前胡 紫草 白芍 水煎服

紅花湯 治全上

紅花或子隨意煎湯飲其渴即止縱口中如烟

飲之即止 加牛旁子尤妙

加味鼠粘子 治咽中有瘡作嘔

桔梗 射干 山荳根 防風 乾葛 陳皮

荆芥 連翹 水煎細細呷之

灯心竹葉湯 治乾嘔

竹葉三十片 灯心三十根 水煎服

潤腸湯 治虛秘

歸精 甘草 生地 火麻仁 桃仁泥

水煎服



拔毒膏 治瘡疔

雄黃 研

胭脂重浸水令濃調雄黃點疔瘡上

立時紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒胭脂能活血也

涼血地黃湯 室女出痘遇經不止熱入血室

當歸 川芎 白芍 生地 白朮 升麻

黃連 甘草 人參 山梔仁 玄參

水煎服

涼血解毒湯 治女人出痘非經期於發熱時而

血忽至

當歸 一錢二分 白芷 五分 升麻 四分 紫草 一錢半

紅花 一錢 赤芍 一錢 桔梗 八分 連翹 三分

燈心二十根水煎服


當歸養心湯 治女人出血口瘡不能言者

人參 當歸 麥冬 甘草 升麻 生地

各等分加燈心水煎服

瀉肝散 女人經水不斷適逢出痘發熱昏沉言

語狂妄 羌活 川芎 防風 各八分 當歸 一錢



山梔仁

龍胆草各五分

大黃酒蒸三錢

水煎服 一方有木通 裁胡黃芩

歸脾湯 女人經閉不通 血海乾涸 適逢出痘 以

此調其心脾 不使血妄行 加裁胡山梔名加味

歸脾湯 人參 白朮 茯神 黃耆 遠志

地骨皮各一錢二分 甘草三分 木香五分 酸棗仁一錢

姜棗煎服

逍遙散 女人出痘 寒熱不時 經水不調 服以其

血不致妄動 白朮 茯苓 當歸 芍藥

甘草 柴胡 各等分 加棗一枚 水煎服 加

丹皮 山梔 名加味 逍遙散

如聖散 妊婦出痘 安胎

白朮 黃芩 當歸 枳殼 黑豈 大腹皮


砂仁 甘草 桑上羊兒藤 即桑寄生 各等

分水煎服

黑神散 婦人出痘 分脫後 痂血作痛

當歸 川芎 熟地 炮姜 桂心 蒲黃炒

香附童便炒 木香 青皮 黑豈 酒水各半



煎服

原疹

生生子曰麻疹浙地呼為瘡子又曰沙子吳地呼為疹子新安呼為麻總由有生初之淫火伏於命門之間命門具太極之理而陰陽五行繫焉臟腑之所由生也蓋五行一陰陽陰陽一太極也天之與人咸相感通由其通故天寒而人身寒天熱而人身熱也天之癘氣一動則所稟之毒隨感而發陽感之則疹出焉陰感之則痘出

焉陽浮而淺故疹易出易斂陰凝而深故痘難出難痂陰陽二劫之毒盡出則向安矣余故曰人之出疹出痘猶蚕之一眠二眠三眠也痘雖出於陰而實成於陽以氣為之固也疹雖出於陽而實藉於陰以血為之資也何見之痘非氣行則血不附安得結痂疹非血濟則氣失依焉能收斂斯陰陽升降之理一開必一闔血之附氣氣之依血陰根於陽陽根於陰陰陽互為其根也前人謂痘出於臟不知指何臟疹出於腑

不知指何腑而云之也又謂疹出心肺故鼻涕而咳嗽余謂此皆臆度套詞而非有真知一定之見也既曰疹出於肺心肺獨非臟乎按內經鼻為肺之門戶通天氣陽毒上發熱毒薰蒸蓋心肺位尊鬲上又肺主毛竅毒從竅出是干於肺而非出於肺也要知痘之與疹皆出於命門之陰陽也 右釋麻疹

一發熱之初多似傷寒惟疹則咳嗽噴嚏鼻流清涕眼泡腫其淚汪汪面浮腮赤惡心乾嘔為異

耳但見此候便宜謹避風寒戒葷腥厚味急表散之使皮膚通暢腠理開豁而疹毒易出也

一疹痘之發雖曰胎毒未有不由天行疔氣故用藥必先明歲氣兼之時令如溫暖時月以辛涼發之如防風解毒湯暄熱時月以辛寒發之黃連解毒湯大寒月以辛溫熱劑發之桂枝解毒湯時寒時煖以辛平之藥發之升麻葛根湯以因時投劑不可悞作傷寒妄施汗下而伐天和也又須看人虛實如大便秘結煩熱甚而發不



出者以酒大黃微利之吐利不止以參芍之類
補之

一用前藥發散而疹隨見為美若發不出再加發
之如加味麻黃散之類外以芫荽酒糟蒸熱擦
之看其疹自頭至足為之出齊頭面愈多為佳
若遲延日久而不出則腹脹氣喘昏眩悶亂煩
躁而死矣

一看疹之法尋於耳後項上腰腿先見其頂尖而
不長其形小而均淨淡紅為吉若色紅甚兼火
化也化斑湯主之人參白虎湯佐之如色白者
此血不足也養榮湯如色紫赤乾燥暗晦乃火
盛毒熾宜六一散解之四物湯加柴胡黃芩乾
葛紅花牛蒡子連翹之類滋陰涼血而熱自除
所謂養陰退陽之義也此亦五死一生之症外
大青湯玄參解毒湯皆可選而用之若黑色者
則熱毒尤甚為十死一生之症須明察之勿妄
施治


一表後看疹隱々然見於肌膚成片切忌風寒生

冷如一犯之則皮膚閉塞毒氣壅滯遂變為渾身青紫而毒反內攻煩躁腹痛氣喘悶亂諸症作矣欲出不出危亡立至

一疹已出而忽沒者乃風寒所遏而然也若不早治毒成內攻必致痒癩而死急用消毒飲合升麻湯熱服則復出而安矣

一發熱之時遍身汗出者此毒從汗散玄府開疹易出也有鼻中血出者此毒從血解也俱不可遽止之若汗出太多血出不止者此又火甚逼迫太過致液妄流妄行矣急宜當歸六黃湯加浮小麥以止汗茅花湯加玄參百草霜以止血遲則汗出多而元氣虛血出多而精神散為不治之症矣

一發熱之時或嘔吐或自利或滯下者此火和內逼毒氣上行則吐下行則利毒甚則裏急後重而為滯下也吐者竹茹石膏湯利者升麻澤瀉湯滯下黃芩為藥湯加黃連生地木通人參枳殼或少加大黃微下之



一發熱之時未有不口渴者但宜以葦葶灯心炒米湯飲之人參白虎湯佐之取生津解毒而已若恣飲冷水恐生水畜之疴故水入於肺為喘為咳宜用葶藶子以洩肺中之水水入於脾為腫為脹為自利水入於胃為嘔為利宜用猪苓澤瀉茯苓以瀉脾胃之水水入於心為悸為驚宜赤茯苓灯心湯以洩心下之水水入於肝為脇痛用芫花以洩之水入腎與膀胱為小便不利為陰囊腫用車前子木通以洩之皆當隨症

而治

一疹出之時咽喉腫痛不能飲食者以毒火拂鬱上薰也宜甘桔湯加玄參牛旁連翹更以十全散玉鎖匙吹之不可妄用鍼出血也

一疹出之際咳嗽口渴心煩者以毒在心肺發未盡也瀉白散加天花粉連翹玄參黃連以瀉之或黃連杏仁湯

一疹出之時自利不止或瀉稀水頻數者有吉有凶但要審其疹若遍身稠密太盛或紫色或紅



色此則為吉蓋毒在大腸非瀉則毒不解惟用
平胃散加葛根連翹以解之而已疹一發透依
期而收瀉自止也若疹已收而瀉尤未止者驗
其躰熱疹必未盡再用前藥加連翹黃連牛旁
木通澤瀉以分利之六一散亦妙絕若用訶子
肉果等澁滯之劑則變喘急腹滿痞脹不治之
症矣若疹色淡而躰不熱口不渴大小便利飲
食少進以爲凶乃虛寒之症方可溫補或兼收
澁

一疹出常以六時辰即收為率如子時為陽午後
收午後為陰子後即收乃陽生陰成陰生陽成
造化自然之妙也故漸出而漸收者其勢輕可
若一出之後熱不退連綿三四日而不收者以
毒火太盛外發未盡內有餘邪所致須以化斑
湯三味消毒飲加玄參石膏桔梗為治

一疹出後自然熱退若遍身既出而猶拂拂煩熱
頻作嘔吐者以毒尚未盡番連於肺胃之間宜
化斑湯如大便秘少加大黃微利之



一疹已收去渾身反發熱日夜不退此毒未盡解
邪火鬱於肌肉之間久則毛髮焦乾皮膚枯槁
肌肉消瘦為骨蒸癆瘵之症宜芦會肥兒丸加
龍胆草當歸連翹等治之遲則有變睡則露睛
口鼻氣冷手足厥逆癩癧慢脾風為不治之症
矣

一疹收之後身雖不見羸瘦但時發壯熱煩躁不
寧搐掣驚悸神昏悶亂者以陰血衰耗致餘毒
入肝而傳於心也宜養血安神四物湯加麥門
冬酸棗仁淡竹葉灯心甘草石菖蒲龍胆草茯
神黃連辰砂為治或以前藥為末用餛餅猪心
血為丸服亦可

一疹毒入胃久而不散致成牙齦黑爛血出為走
馬疳傳於兩頰浮腫久而穿頰破腮缺唇破鼻
為崩砂狐惑等危症矣外用文蛤散雄黃散搽
之內用人中白芦會史君子龍胆草黃連五靈
脂餛餅為丸滾水服之以清胃火亦或有得生
者但不尋見也



一疹出之時曾作瀉痢未經清解至疹退之後變
為休息痢不問赤白裏急後重日夜無度以餘
毒在大腸也須分虛實治之實者三黃丸利之
或香連丸和之後用黃芩湯虛者從補

一疹退之後微々咳嗽者以餘毒未盡也用清肺
飲加消毒飲主之若咳甚氣喘連聲不住名為
頓嗽甚至飲食湯水俱噎出或咳出血者以熟
毒乘肺而然也宜多服麥門清肺飲加連翹若
見胸高如龜背作喘血從口鼻出搖首插頭面

色或白或青或紅或枯黯者乃不治之症然亦
有肺氣為毒所遏而發喘連聲不已但無嗽咳
血出噎食之症者宜用清肺飲倍加人參治之
尤不可拘於肺熱之一端而純用清肺解毒之
藥

一疹退之餘声啞不出或咳或喘或身熱不退以
致日久而不愈者以熱毒未盡肺金受尅故也
宜清金降火湯加竹瀝姜汁主之

一疹退之後飲食如常動止如故而卒然心腹絞



痛遍身汗出如水者以因元氣虛弱失於補養
外雖無病稟實虛損偶然為惡氣所中謂之中
惡以朝發夕死之疔間有用蘓合香丸而甦者
一疹退之後有餘熱未盡或發癩毒肢節疼痛者
以羗活散微汗微利

一疹退之後有餘熱未盡或熱甚而失血者犀角
地黃湯合解毒湯或四物湯加茵陳木通犀角
之類以利小便使熱氣下行而愈

一疹收之後餘熱未盡日夜煩躁譫語狂亂者辰

砂益元散灯心湯下或辰砂五苓散加苓連治
之若初起煩躁譫語者升麻葛根湯調辰砂益
元散主之

一麻疹一疔比之出痘似輕然調治失宜其禍反
不旋踵蓋痘由胎毒而發其形勢多少輕重吉
凶自可預斷至疹之出則雖由感受邪氣而發
然其輕者可重重者可輕皆在於調治有方故
其飲食禁忌比痘尤甚若誤食雞魚則終身皮
膚粟起如雞皮之狀但遇天行出疹之時又令

重出誤食猪肉則每歲出疹之月必然下痢膿
血誤食鹽醋致令咳嗽則每臨出疹之月必復
咳嗽誤食五辛之物則生驚熱不時必待四十
九日或百日後方無禁忌也

一孕婦麻疹但當以四物湯倍加白朮條芩艾葉
安胎清熱為主使胎無虞而疹易沒也如胎氣
上衝急用苧麻根艾葉煎湯磨檳榔并服之更
易服上藥為妙

一熱毒薰胎胎受傷而母實無恙也蓋疹與痘
不同痘宜內實故胎落而母亡疹宜內虛故胎
下而母安雖與其胎去而母存孰若子母而全
之為愈也

麻疹輕重不治三症要訣

或熱或退五六日而後出輕 發透三日而暫沒
者輕 頭面多而勻者輕 頭面不出
者重 紅紫暗燥者重 咽喉腫痛不食者重
冒風沒早者重 移熱大腸變痢者重 黑暗
乾枯一出即沒者不治 鼻扇口張目無神者



不治 鼻清糞黑者不治 心前吸氣喘者不

治

水痘疔

夫水痘亦類傷寒之狀身熱二三日而出或咳嗽
面赤眼光如或噴嚏或唾涕與正痘不同易出
易靨不宜燥濕苟或燥之恐結痂多變成瘡之
疔

麥湯散 古本只以一方或作湯服亦可

地骨皮 活石 甘草各五分 甜葶藶 麻黃

大黃 知母 羌活 人參各一錢 右為末每服

五分用小麥七粒煎湯調下

防風葛根湯治痘發癢疹 及疹麻發熱


防風 葛根 升麻 赤芍 甘草

各等分水煎服

防風解毒湯 治麻痘初發熱如時令溫煖用此

辛涼之藥發之

防風 薄荷 荆芥 石膏 知母 桔梗
牛子 甘草 連翹 木通 枳殼 竹葉



灯心各等分水煎服

黃連解毒湯 治麻痘初發熱如時令暄熱用此

辛寒之劑發之

黃連 黃芩 黃柏 山梔 牛旁子 甘草

防風 荆芥 知母 石膏 桔梗 玄參

木通 姜三片水煎服

桂枝解毒湯 治麻痘初熱如時令大寒用此辛

溫熱之劑發之

桂枝 麻黃酒炒 赤芍 防風 荆芥 羌活

甘草 桔梗 人參 川芎 牛子

生薑水煎服

升麻解毒湯 治麻痘初熱如時煖時寒用此辛

平之劑發之

升麻 葛根 羌活 人參 柴胡 前胡

甘草 桔梗 防風 荆芥 牛旁子 赤芍

連翹 竹葉 水煎服

加味麻黃散 麻痘發不出以熨發之

升麻酒洗 麻黃酒炒 人中黃 牛旁子 蟬退



各等分水煎服

化班湯 治麻痘色紅

人參 知母 石膏 甘草 牛蒡子 連翹

升麻 地骨皮 竹葉 糯米 水煎服

養榮湯 治麻痘色白

人參 當歸 紅花 赤芍 桂水炒 甘草

水煎服

大青湯 麻痘熱赤暗晦乾燥

玄參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻

石膏 水通 梔子仁 水煎入燒人屎服

如大便秘加酒大黃

茅花湯 治麻痘鼻衄

茅花 歸頭 丹皮 生地 甘草 各等分

水煎服

竹茹石膏湯 治麻痘嘔吐

橘紅 半夏 石膏 白茯苓 竹茹 甘草

右水煎服

升麻澤瀉湯 治麻痘自利



猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草 黃連

酒炒 升麻 各等分水煎服

黃芩芍藥湯 治麻痘滯下

條芩三錢 白芍 升麻各二錢 甘草一錢

水煎服

十全散 麻疔咽喉腫痛

黃芩 黃連 黃柏 苦參各酒炒 玄胡索

三分 礪砂 乳香製各二分 孩兒茶 雄黃各五分

共為細末每用少許吹入

芎藭肥兒丸 麻後發熱日夜不退肌肉消瘦骨

蒸癆瘵

芎藭 龍胆草 木香 蚰皮 人參 麦芽

炒 使君子肉各二錢 檳榔 黃連酒炒 白燕蕒


各三錢 胡黃連五錢

右末猪胆汁糊為丸黍米大每服五六十丸

米飲下

文蛤散 麻毒入胃牙肉黑爛出血走馬疔疔

雄黃五錢 五倍子二錢 枯丸五分 蚕退帛燒存性一



錢 右細末米泔水洗淨以藥搽之

雄黃散 治全上

雄黃錢一 黃栢錢二 射香分一 先用艾湯淨洗

後搽藥

麥冬清肺飲 麻後咳嗽出血或噎湯水

知母 貝母 天門冬 桔梗 甘草 杏仁

牛旁 石膏煨 馬兜鈴蜜水炒 糯米 右水

煎服

清火降火湯 麻後熱乘肺金声啞不出或咳或

喘 當歸 白芍 生地 陳皮 貝母

瓜蒌仁 甘草 白苓 枯苓酒炒 山梔炒

玄參 天冬 麥冬 杏仁 桑白皮 石膏

紫蘓梗 酒連 右各等分姜一片水煎服


生生子曰麻疹咳嗽喘急每用痘門中大小無比

散每服五七分大者一錢即刻喘定而睡醒後


神安氣和而愈屢用屢驗乃熱毒從小便出也


加減四味升麻湯 此升發之劑但一二帖則止

不可過表 升麻 葛根 赤芍 甘草




防風 桔梗 紫蘊 蒼朮 陳皮 枳殼
柴胡 姜朮煎服
水痘赤痘即此一服而愈不必他方雜治







國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.




國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館 國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





赤水玄珠第二十九卷目錄

外科小引

五發癰疽論

背疽其源有五

疔瘡

雜瘡

癰

瘡科總論

華佗癰疽瘡腫論



五發癰疽通治方

反花瘡

婦人陰瘡


臙瘡

赤水玄珠第二十九卷

外科門小引

新安生生子孫一奎著輯

生生子曰外科最重者莫如癰疽最急者莫如喉
風疔腫患之者生死立見其餘瘡癬皆可緩圖
非若上三証急若風火也究其受病之源經曰
營氣不從逆于肉理乃生癰腫又曰膏粱之變
足生大疔又曰六腑不從番結為瘡又曰諸痛
瘡瘍皆屬心火大抵皆氣血虛弱蘊鬱熱毒



調養失宜之所致也予固非專門外科蓋常咨訪推究頗知治法大躡茲採前人所論癰疽証治載列卷首疔瘡腫瘍次之陶節庵癰疽經薛立齋外科精要二書實外科權輿業是者不可不使之隨囊檢視能熟此二書鮮有敗事予固特舉歷試有功者揭出以告同志云

瘡科總論

夫癰疽瘡癤者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣怫鬱于內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而為癰疽也夫癰疽之疾多生於膏粱富貴之人以其平昔所食肥膩炙燂安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰者壅也大而高起屬乎陽其脉浮數疽者沮也平而內發屬乎陰其脉沉數瘡者總名也癤者有頭小瘡也經云諸痛痒瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯挾心火之熱而生癰疽之類也然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六

府積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚皮腫光軟
侵袤廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於肌骨其
發猛惡初生一頭如痞瘤白色焦枯觸之而痛應
心者疽也熱發於皮膚之間浮腫根小不過二三
寸者癰也夫癰發於六府若燎原之火外潰肌肉
疽生於五臟沉澁難療若陶室之燧內消骨髓癰
則易療惟難將息而遲瘥疽則難療而易痊夫諸
瘡之中惟背疽疔瘡最為急症其次莫如腦疽腸
癰喉癰之類亦其急者也至若癰癰懸癰痔漏諸

瘡之類其証可緩而治也又有疥癬癰瘡風疔之
類雖云俱屬瘡類而其輕重緩急自有不同也夫
癰疽之疾要須察其是虛是實是冷是熱或重或
輕對証用藥無失先後次序凡人年四十以上頭
項髮頤背脊腰脅或筋骨之上所視不見之處稍
有瘡癰便不可輕易待之若視之怠慢以為常疾
每見至微至著喪命者多矣便宜速急治之庶幾
得救譬之救火初起則易救至于燎原之勢不可
撲滅矣其理亦由是也凡瘡未破毒攻臟腑一毫




熱藥斷不可用此是先後次第之妙訣也夫瘡有五善七惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語声清亮四善也躰氣和平五善也如煩躁時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄焮痛尤甚臭惡難近二惡也喘粗短氣恍惚嗜卧三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便汚者四惡也有項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也声嘶色脫唇鼻青黑

面目四肢浮腫七惡也更有氣噫痞塞欬逆身冷自汗無時目瞪耳聾恍惚驚悸語言頻錯皆惡証也五善見三則差七惡見四必危若五善并至則吉而安七惡全見必危而死矣已上所論大綱其諸証候治法列論于後


五發癰疽論

夫五發癰疽者謂發背發腦發鬚發眉發頤是也人之一身血氣周流而無間稍有壅聚莫不隨所至而發焉又豈特五者哉夫發背者乃五臟風熱



六府邪毒灌于筋骨之間發于經絡之內榮衛虛損氣血衰殘所致也其發初如粟米大最不可輕忽後必大發也若初起紅腫高起者後必不為害故曰外形如粟中可容谷外貌如錢裏可着拳如惡毒深滿膿血交粘用藥可痊若膿臭穢無絲此血敗氣衰陽絕陰盛必難療理治初起或陰塌不起便可用艾多多或隔蒜灸之如痛灸至痒如痒灸至痛此最妙法也若疔瘡已成亦可用火針烙開瘡口則易治也若瘡高起為癰則難治平陷為

疽則難治癰疽形症已具前總論中茲不復論至如發腦發眉發鬚發鬚發頤地位不同然皆由內臟伏陽結滯邪毒上壅隨其經絡地分而發也其諸發癰初起皆宜宣散熱毒要須看人元氣虛實而治之庶不悞矣若元氣實者亦可用大黃之劑泄去毒氣或用漏芦五香連翹之類皆可用內托十宣之類補之亦有陰瘡寒塌不起雖云用灸然亦不可服寒涼之劑亦宜以煖藥溫之全在活法不可執一也其敷貼洗藥具方于下隨症用焉



外科精要曰癰疽既灸即服藥以護臟腑如護心
散凡有疽疾早進數服使毒氣外出而無嘔吐之
患否則咽喉口舌生瘡或黑爛如菌若瘡發四五
日之後宜間用別藥治之

又曰護心散乃解金石發疽之藥若發熱燉腫作
渴飲冷而嘔者宜之若發熱燉腫作渴飲湯而嘔
者不宜用之蓋脾虛停痰或寒邪內侵或痛傷脾
胃宜用六君子湯若喉舌生瘡或口乾作渴或小
便頻數宜用六味丸大凡諸瘡作嘔若飲冷便秘

是熱毒也黃連消毒散解之飲冷便和是胃火也
竹葉石膏湯清之懶食飲湯是胃虛也補中益氣
湯補之大便不實喜飲熱湯是脾胃虛寒也六君
子加炮姜以溫之常見脾胃虛弱者用護心散反
致胃寒嘔惡其喉舌生瘡乃腎水枯涸虛火炎上
其証甚惡急用加減八味丸多有得生者

又曰癰疽嘔逆是毒氣沖心非脾胃之冷當服內
托散楊氏云鼻衄初愈不曾表汗毒在經絡則背
大疽自肩下連腰脇腫硬如石其色紫黑以涼藥



投之終夜大嘔連進托裏散嘔止瘡潰赤水淋漓
四十日而愈又有患瘰者痛過輒嘔服托裏即止
今有疽病不服此藥者故引楊氏之言以解世人
之惑

華佗瘰疽瘡腫論

夫瘰疽瘡腫之作皆五臟六腑蓄毒不流非獨因
榮衛壅塞而發也其行也有處其止也有歸假令
發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌
肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於下者阴中

之毒發於上者阳中之毒發於外者六腑之毒發
於內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰
逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六腑
則易治感於五臟則難瘰又近骨者多冷近膚者
多熱近骨者久不愈則化成血蟲近膚者久不愈
則傳氣成漏成虫則多痒少痛或先痒後痛成漏
則多痛少痒或不痛不痒內虛外實者多痛少痒
血不止則多死潰膿則多生或嘔逆無度飲食無
時皆瘰疽使然症候多端要當詳治



薛立齋曰瘡瘍生虫乃肝經風熱其成漏乃元氣
虛弱其出血乃脾虛有火其潰膿乃元氣充實至
於嘔逆等証屬脾胃虧損所致當調補元氣庶保
無虞

背疽其源有五

一天行二瘦弱氣滯三怒氣四腎氣虛五飲冷酒
食炙燻服丹藥

治癰疽用藥大綱

一初患癰疽便服內托散以免後來口舌生瘡仍

用騎竹馬或隔蒜灸

一服五香連翹湯如大便踈快即止仍量人虛實

一癰疽潰後宜服排膿內補散若嘔逆木香湯下

一癰疽初作便宜灼艾及麥飯石膏塗四圍中留
口出毒如瘡小通傳之既潰用神異膏帖之

一癰疽已潰日用猪蹄湯淋洗將愈之際三日一
次

一癰疽將斂宜用神異膏如毒未盡不可遽用生
肌之劑



一癰疽將安宜用加味十全湯補其氣血庶肌肉易生

一背疽多先渴而後發或先疽而後渴不救者多矣若服加減八味丸非特杜絕渴疾抑亦大滋氣血生長肌肉

一癰疽嘔逆有二一因初發不服內托散伏熱在心一因脾氣不正伏熱在心者則心煩身熱焮腫作痛宜用內托散三兩服之脾氣不正者則不煩熱或聞穢氣作嘔宜用嘉禾散如有寒熱

用不換金正氣散五更初煎服山藥丸以補腎

癰疽用香藥調治論

伍氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡瘍多因營氣不從逆於肉理鬱結為膿得香則氣血流行故服五香連翹湯萬金散金粉散凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚若盡入胃則咳逆古人用之可謂有理且如飲食調令香美以益脾土養其真元可保無虞矣

五發癰疽通治方

漏芦湯

治一切惡瘡毒腫丹瘤癰癧疔腫魚臍

五發癰疽初覺一二日便如傷寒頭疼煩渴拘

急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不

寧皮膚壯熱大便閉瀆小便赤黃並皆服之

婦人勿服

漏芦

白欬

黃芩

麻黃

去節

枳實炒去白

升麻

芍藥

炙甘草

朴硝

各兩

大黃二兩

右每服三五錢看虛實用水煎空心

熱服

五香連翹湯

治諸瘡腫初覺一二日便厥喉咽

塞發寒熱

乳香

木香

木通

大黃

各半錢

連翹

沉香

獨活

葉寄生

丁香

射干

升麻

射香

另研各一錢

甘草

五分

姜三片水煎

不拘時服

托裏護心散

治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻

心迷悶嘔吐而痛可服二三服

乳香

一兩

葶苈粉


四兩

和勻每服三錢甘草湯調服

神仙蠟礬丸

此藥不問老幼皆可服之服至一

兩已上無不取効最止疼痛不動臟腑委是神



効活人不可勝數 白礬明亮者 黃蠟七錢
撰起待少冷入礬末不住手攪勻 右衆手丸如梧桐子大倘
蠟冷不能丸以滾湯頓之便軟每服二十九漸
加至三四十九白湯或酒吞下 如未破即內
消已破即便合如服金石發動致疾更用白礬
末一兩匙頭溫酒調下亦三五服見効有人遍
身生瘡狀如蛇頭服此亦効諸書皆稱神奇但
一日之中服近百粒則方有功此藥能防毒氣
內攻蓋能護膜也切不可欺其淺近而忽之始

終服過半斤必能萬全瘡愈後服之尤佳

一方治蛇咬只融化白礬乘熱滴傷處痛即止毒
氣即趕出立見効驗要知白礬大能解毒也

千金托裏散 治一切瘡腫發背疔毒若氣血虛
而不能作膿或潰後膿清痛仍不減最宜服此

便能排膿止痛 黃耆一兩 厚朴 防風

桔梗各二兩 連翹二兩 木香 沒藥各三錢

乳香二錢 當歸五錢 川芎 白芷 芍藥

官桂 人參 甘草各一兩 右為細末每服三



錢酒一大盞煎三二沸溫服

十六味流氣飲 治無名惡瘡癰疽等症 川芎

當歸 芍藥 防風 人參 木香 黃芪

官桂 桔梗 白芷 枳殼 厚朴 烏藥

紫蘇 只壳 甘草各一錢 右作一帖水煎食遠服

內托羌活湯 治尻臀生癰堅硬腫痛大作

羌活 黃柏酒製各二錢 防風 歸尾 藁本

連翹 蒼朮 陳皮 炙甘草各一錢 肉桂三分

黃芪一錢半 水一鍾酒半鍾煎八分食前服

清心內固金粉散 一名金花散 專治惡瘡熱

盛焮痛煩躁作渴此藥解毒 辰砂另研 白茯苓

人參 甘草各三錢 葶苈粉四兩 雄黃一錢 冰片

白芷仁 朴硝各五錢 射香與冰片各一錢另研 右以參

苓豈菟為末入研藥和勻每服一錢半蜜湯調

麥飯石膏方又名鹿角膏 白麥飯石其石類色黃白像麥

飯團者研細末听用 鹿角要生者自解者不用截作二三寸長炭火內煨令烟尽為度研末

為細末 白歛為細末 右將麥飯石用炭火煨紅以好

米醋淬之如此煨淬十次研為極細末每用二



兩白欵末二兩鹿角灰末四兩同入乳鉢乳令
無声方有效驗若研不細敷上作痛若研得極
細如眼藥一般極能止痛排膿收口量藥末多
寡用經年好米醋入銀石器內煎令魚眼沸却
旋入前三味藥末在內用竹篦子不住手攪
熬一二時久令稀稠得所傾出磁盆候冷以帛
蓋密勿惹塵灰每用時先用猪蹄湯洗去癰瘡
上膿血至淨以故帛挹乾以鴛翎拂藥膏塗敷
四圍凡有赤處盡塗之但番中心一竅如錢大

以出毒氣膿血如瘡未潰能令內消如已潰則
排膿如湍水逐日見瘡口收欵如患瘡久肌肉
腐爛筋骨出露用舊布片塗藥以貼瘡上但肉
膜絲穿亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍忌
口氣及有腋氣之人并月婦皆令忌之 此方
但得好帶蓋鹿角好麥飯石精虔修合勝用他
藥多矣仍可熬取好米醋一大碗候逐日用藥
於瘡上俟乾便以鴛毛蘸醋拂潤勿令緊也初
用須一日一洗換十日後兩日一換



排膿內補十宣散

一名十奇散
一名內補散

治癰疽瘡癤未成

者速散已成速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不用刀針服藥後其痛頓減効驗如神

人參 當歸 黃耆各二兩 甘草 川芎 防風

厚朴姜汁炒 苦梗 白芷 薄桂各一兩 右為末每

服三錢酒調下日夜各數服以多為妙服至瘡口潰更服為嘉不飲酒人濃煎木香湯調下然終不若酒力之勝或飲酒不多能勉強以木香湯煎酒調下亦可

乳香黃耆散

治一切惡瘡癰疽發背疔瘡痛疼

不可忍者或未成者速散已成者速潰不假刀砭其惡自下 又打撲傷損筋骨疼痛並皆治之

黃耆 當歸 川芎 麻黃去根節 甘草 人參

芍藥各一兩 嬰粟壳蜜炙 陳皮各一兩 乳香 沒藥

錢各五 每服五六錢水煎服

黃耆湯 治一切瘡腫癰疽並宜服之

黃耆 川歸酒洗各一兩 大黃 芍藥 陳皮

炙甘草各五錢 右加生姜三片水煎服

