

卷四



傅氏眼科審視瑤函卷之四

御集目錄

實熱生瘡症

加味四物湯

芎歸湯

搭藥二方

椒瘡症

歸芍紅花散

粟瘡症

除風清脾飲

脾生痰疔症

防風散結湯

清胃湯

疔症

羚羊角飲子

平肝清火湯

火疔症

洗心散

土疔症

清脾散

敷藥方

金疔症

瀉肺湯

水疔症

蠲毒飲

大眚漏症

燥濕湯

五花丸

小眚漏症

瀉濕湯

白薇丸

陰漏症

黃芪湯

陽漏症

保光散

補漏生肌散

小牛黃丸

倒睫拳毛症

石膏羌活散

流氣飲

緊皮膏

五灰膏

起睫膏

灰眼法

皮急緊小症

神効黃芪湯

更眼撥雲湯

脾翻粘臉症

排風散

龍膽丸

脾輪振跳症

當歸活血飲

脾虛如毬症

調皮清毒飲

兼胎症

保胎清火湯

簡易知母飲

天門冬飲子
消風散

芎蘇散
天冬飲子

為產症

熟地黃湯

四物補肝湯

四製香附丸

濁害清和症

穀精草湯

退翳散

望月丸

疎風湯

通竅散

胎兒丸
清解散

補元散

加味地黃丸

退雲散

固木丸

附治小兒疳疹疔傷并暴赤疼痛翳膜諸方

消毒化癍湯

丸味蘆薈丸

生熟地黃丸

鷄肝散

龍膽蘆薈丸

消疔散

天麻丸

寶鑑灸雀目疔眼法

升麻乾葛湯

車前子散

養肝丸

轉轉關症

鈎藤飲子

雙目睛逼症

牛黃丸

附小兒目閉不開暗目直視目仰視目睛瞶動目劓諸症

驗方

人參湯

生地黃散

瀉清丸

和太師牛黃丸

碧霞丹

九龍控涎散

四味肥兒丸

柴胡清肝飲

傅氏眼科審視瑤函卷之四目錄終

傅氏眼科審視瑤函卷之四

秣陵傅仁宇允科纂輯

增張文凱廷獻泰閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷 掄 全次

大梁周靖公亮節較梓

體仁 顓 全次

運氣原證

按內經運氣目眚瘍有二一曰熱經云少陰司天之政三之氣
大火行寒氣時至民病目赤眚瘍治以寒劑是也二曰燥經
云氣金太過民病目赤眚瘍又云陽明司天燥氣所勝民病
目眚眚瘍治以溫劑是也

目瘍

內經曰諸瘍瘡瘍皆屬心火火鬱內發致有斯疾蓋
心主乎血血熱生風鬱內甚遞相傳襲故火能生土血

注陽明主肌肉風熱與血熱相搏發見皮膚其名不一
有黃膿而自者土生金母歸子也始生微瘡而熱輕腫

痛爛爲熱極血凝多水氣滯成膿甚至寒熱作而飲食
減尤爲慮宜宜泄風毒清心經解胃熱按目瘡疣皆因
君火司令燥火熱邪所致
宜溫宜冷隨症施治可也

實熱生瘡症

實熱生瘡症瘡生各有經泪如湯樣注澀急目蓋明眸或弦多
潰胞中椒粟成瘡生於背上心火熾盈盈臉外脾家燥唇邊方
土形肺腦形於鼻週身旺六經耳邊尤腎燥滿面六陽莖三焦
炎頂上下部六陰乘先治應須變援睛目次明

此症謂目病生瘡之故輕重不等痛癢不同重則有推積高
厚紫血濃爛而腥臭者乃血氣不和火實之邪血分之熱尤
重如瘀滯之症膏混水濁每每流於脾背成瘡瘡血散而瘡
自除勤勞濕熱之人每患脾背成瘡別無腫痛症者亦輕而
無妨若火盛瘡生惟重帶腫痛者又當急治恐濁氣沿於目

而病及於珠若先目病後生瘡必是熱沿他症凡見瘡生
當驗部分以別內之何源而來因其輕重而治之宜服

加減四物湯

生地黃

苦參

蘇薄荷

川芎

黍粘子

天花粉

連翹

赤芍藥

防風

當歸

荆芥穗

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分食後服

芎歸湯

川芎

當歸

赤芍藥

防風

羌活

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓頻洗則血活風亦去矣

搭藥方

治眼皮外滿臉生瘡潰爛痛疼

血蝸

乳香

沒藥

輕粉

佗僧各等

右研爲細末厭之瘡處

又方

治眼胞上下或臉生瘡破流血黃水陰開者

青黛一錢 二分黃柏末

潮腦

輕粉各一錢

松香半錢

右爲細末用舊青布捲藥在內麻油濕透燒灰俟油灰滴於

茶鍾內蒸搽

椒瘡症

血滯脾家火胞上起熱瘡泪多並赤腫沙搽最難當或疼兼又
癢甚不使開張可惡愚頑者全憑出血良自睛惟仗血血損目
無光輕時頂善逐重開過則傷脾間紅癩癩風熱是椒瘡

此症生於脾內紅而堅者是有則沙搽難開多泪而痛久皆
稱粟瘡悞矣夫粟瘡亦生在脾但色黃軟而易散此是堅而
難散者俗皆以龍鬚燈心等物出血取効殊不知目以血爲

血損而光華有衰弱之患輕者只宜善治至於癭瘰連片
跣踏高低不乎及血瘀滯者不得已而導之中病即止不可
大過過則血損恐傷真水時養神膏大概用乎熨之法退而
復來乃內有淤滯方可量病漸導若初治不可輕為開導過
治恐有損也不如謹始為妙宜服

歸芍紅花散 治服胞腫硬
內生疾瘡

當歸 大黃 梔子仁 黃芩 紅花 以土俱酒
洗激炒

甘草 白芷 赤芍藥 防風 生地黃

連翹 各等分

右為細末每服三錢食遠白水煎服

粟瘡症

脾經多濕熱氣滯血行遲粟瘡胞內起粒粒似金珠似膿膿不

出沙搽痛無時脾急開張澀澆防病變之病來如軟急散亦不多時

此症生於兩脾之內細顆黃而軟者是今人皆稱椒瘡爲粟瘡者悞矣夫椒瘡紅而堅有則硬睛沙澀不便未至於急若粟瘡一見目疼頭痛者必有變症粟瘡是濕熱鬱於上分極重但椒瘡以風熱爲重二症雖皆生於脾內屬於血分椒瘡紅堅易散粟瘡黃軟不易散故治於不同豈可概論哉宜服除風清脾飲

廣陳皮

連翹

防風

知母

黃芩

玄明粉

玄參

黃連

大黃

桔梗

荆芥穗

生地

各等分

右剉剉白水二鍾煎八分去滓食遠服

目疔

此症或眼皮上下生出一小核是也乃脾胃痰氣所致

十

血愈若堅白不破久則如歪如拳而成癰矣若初起小核時即先用細艾如粟木壯放患上令患口者臥榻紫朗目隔蒜片灸三四壯外將一膏藥貼之用紫背天葵子速藥二兩煮酒醉一壺半皂角子二三粒炮熱研細

飲酒時樓
疔上自消

脾生痰核症

若問脾生痰核痰火結滯所成脾如覺腫如豆脾內堅實有形
或有不治自愈或有壅結為癭甚則流膿出血治之各不同名
此火土之燥母向外求情若能知却治頃刻便清平

此症乃脾內皮外生顆如豆堅而不疼火重於痰者其色紅
紫乃痰因火滯而結此生於上脾者多屢有不治自愈有恣
辛辣熱毒酒色斲喪之人久而變為癭漏重疾者治亦不同
若初起知却治之法則頃刻而平復矣宜服

防風散結湯

玄參 一錢

前胡

赤芍藥

黃芩

桔梗

防風

蒼米朮

土貝母

白芷

陳皮

天花粉 各八

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後熱服

清胃湯

治眼胞紅硬此陽明經積熱可皆飲酒過多而好食辛辣炙煇之味所致也

山梔仁

炒黑枳殼

蘇子 各六

石膏 煨

陳皮

川黃連

炒連翹

歸尾

黃芩

荆芥穗

防風

各八甘草 生三

右剉劑白水二鍾煎至一鍾去滓熱服

木疔症

木疔上有九風輪碧綠青藍似豆形如是昏沉應不痛若然泪

目多疼莫教變症侵眸子不散瞳神便破睛

此症生於風輪者多其色藍綠青碧有虛實二症虛者大而昏花實者小而痛澀非此蟹睛因破而出乃自然生出者大小不一亦隨其症或變尖長也宜服

羚羊角飲子

羚羊角粗細

細辛

大黃

知母

五味子

芒硝各一兩

防風二兩

右剉劑以上六味各一錢防風二錢白水二鍾煎至八分去滓食遠服為末每服五錢煎服亦可

平肝清火湯

治黑睛脹大虛者服

車前子

連翹各一錢

枸杞子

柴胡

夏枯草

生地黃

白芍

當歸各錢半

右爲一劑，白水三鍾煎至八分，去滓溫服。

火疔症

火疔生如紅豆形，熱毒應知，患不輕，兩眦目家猶可，緩氣輪犯，尅急難停，重則破淚成血，滿輕時亦有十分疼，清涼調治無疑，感免致終身目不明。

此症生於脾眦氣輪也，在氣輪爲害尤急，蓋火之實邪，今在全部火尅金鬼賊相侵，故害最急，初起如粟，瘡穠子一顆小，而圓或帶橫長而圓狀如豆，次後漸大，痛者多，不痛者少，不可誤認爲輪上一顆如赤豆症，因瘀積在外，易消之，比此則從內而生也，宜服

洗心散

大黃

赤芍藥

桔梗

玄參

黃連

知母

荆芥穗

防風

黃芩

當歸尾各等分

右為細末每服三錢食後茶清調下

土疳症

土疳之病俗號偷鍼脾家燥熱瘀滯難行微則自然消散甚則出血流膿若風熱乘虛而入則腦脹痛而眸子俱紅有為漏之患有漏敗之虞

此症謂脾上生毒也俗號為偷鍼有一目生而傳兩目者有止生一目者有微邪不出膿血而愈者有犯觸辛熱燥膩風沙烟火為漏為疳者有竅未實因風乘虛而入頭腦俱腫目亦赤痛者所病不一因其病而治之宜服敷

青脾散

薄荷葉

升麻

甘草喊冲山梔仁炒

枳殼等

赤芍藥

黃芩

石膏

藿香葉

防風各等

右爲細末每服二錢五分白水煎服

敷藥方

生南星

三錢
研末

生地黄

五錢

古共搗爛爲膏貼太陽穴其腫卽消矣

金疔症

金疔起如玉粒脾生必礙睛疼沙擦澀緊醫障生若在氣輪目
病珠痛淚流不爽陽分最苦氣升時走陰降畧清寧目小澀而
堅硬

此症初起與玉粒相似至大方變出禍患生於脾內必礙珠
澀痛以生障翳生於氣輪者則有珠痛淚流之苦子後午前
陽分氣升之時病尤甚午後時入陰分則病畧清寧人而失

戒反觸有變漏之患矣宜服

肺湯

桑白皮

黃芩

地骨皮

知母

麥門冬

去心

桔梗

各等分

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓食後服

水疳症

水疳眼忽一珠生或在胞中或在睛或是痛如鍼樣刺連眶帶腦赤烘疼或然不疼形多大不散睛瞳便漏睛

此症生於脾腎氣輪之間者多若在風輪目必破損有虛實大小二症實者小而痛甚虛者大而痛緩狀如黑豆亦有橫長而圓者與木疳相似但部分稍異色亦不同黑者屬水青綠碧藍者屬木久而失治變為漏頭風人每有此患風屬木

肝部何以病反屬水蓋風行水動理之自然頭風病目每傷
瞳神睛神之精膏被風氣攻鬱久則火勝其精液為火擊散
是隨其所傷之絡滯結為疳也疳因火滯火兼水化水因邪
勝不為之清潤而反為之濕熱相搏變為漏矣故水疳屬腎
與膽也宜服

蠲毒飲

防風 一錢 赤芍藥 川芎 連翹 甘草

牛旁子 妙研各八分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服此乃治實症小而痛
甚者服若治虛症大而痛緩者減去防風連翹牛旁子以四
物治之加熟地黃當歸身各八分煎服

漏睛 按此症由管頭結聚生瘡流出膿汁或如涎水粘睛上
下不痛仍無翳膜此因心氣不寧乃小腸邪熱逆行之

故并風熱停留在眼中膿水或出於瘡口
或在大小營孔竅者出多流出不止是也

歌曰

原因風熱眼中停凝結如膿似淚傾驅毒除風無別病黃連膏
子點雙睛

大眚漏症

大眚漏兮真火毒時流血水脹而疼初起未損終須損腎要盈
分心要清

此症大眚之間生一漏時流血而色紫暈病在心部火之實
毒故補腎以瀉心也宜服

燥濕湯

川黃連

炒一錢

蒼朮

泔水製

白朮

土炒

陳皮

各八分

白茯苓

半夏

枳殼

梔仁

炒黑各七分

細甘草

三分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服

五花丸

治漏睛膿出目停風熱在胞中結聚膿汁和泪相雜常流涎水久而不治至烏珠墜

金沸草

二兩

砂仁

炒

川椒皮

錢七

甘草

錢四

白菊花

黃蘗

酒製

枸杞子

各兩半

巴戟

八錢

右爲細末煉密爲丸如桐子大每服二十九空心或鹽湯或

溫酒送下

小背漏症

相火經行小背傷不時流血脹難當休教血少神膏損致使終

身不見光

此症小背之間生一漏時流血水其色鮮紅是病由心絡而

來下焦火橫行之疾當於腎中補而抑之宜服

瀉濕湯

草薢子
黃芩
木通
陳皮各一錢
茯苓

淡竹葉二十片
枳殼
梔仁炒黑
荊芥穗
蒼朮各八分

甘草三分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服

白薇丸

白薇五錢
石榴皮
防風
白蒺藜杵去刺
羌活各三分

右為細末米粉糊為丸如桐子大每服二十九丸白滾湯送下

益陰腎氣丸見二卷加羌活防風以補肝腎下足

陰漏症

陰漏黃昏清黑水或然腥臭不堪聞幽陰隱處升陽火治用清

溫莫禱神

此症不論何部生漏但漏從黃昏時並天曉則漏脹而流青

醫見

卷之四

九

黑水也日間病尤難可非若他症之長流乃幽陰中有伏隱之火隨氣升降來故夜間陰分而病重治當以溫而清之宜

服

黃芪湯

治眼環漏不止

黃芪

麥門冬

去心

白茯苓

防風

人參

漏蘆

地骨皮

知母

遠智

去心

熟地

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服

陽漏症

陽漏陽升黃赤流水腥目脹痛堪憂也知金火為災害溫補清

原弗外求

此症不論何部分生漏但日間流水色黃赤者非若他症漏液長流病在陽部隨其氣而來治當補正氣而清涼其燥濕

以上二症專言其有時而發有時而止若長時流者各有正名彼此不同宜服

保光散

龍膽草酒炒 白芷 白芍藥 防風 黃芩

牛旁子炒研 川芎 山梔仁炒 大黃炒減半 羌活

生地黃 當歸身 荆芥穗 甘草減半餘各等分

右為細末每服四錢白水煎食後服或剉劑煎服亦可

補漏生肌散以上諸症可皆治之

枯礬 輕粉 血竭 乳香各等分

右共研極細膩對漏處吹點外用鹽花明礬少許煎水洗之

小牛黃丸治一切眼漏及諸惡毒瘡等漏皆可治之大有神效

牛黃 珍珠 硃砂要透 明母丁香 乳香去油

沒藥去油沉香剉末明雄黃要透明者佳人參各一錢琥珀入分要真

麝香三分白芷二錢滴乳石一錢半真者煨歸尾二錢半

右各製為細末老米飯為丸如粟米大每服一分空心并臨睡各一服用淡淡土茯苓湯送下

此丸以牛黃硃砂雄黃解其毒以珍珠琥珀滴乳生其肌以乳香沒藥解毒生肌兼之止痛以麝香沉香丁香通竅更引諸藥入於毒所血凝氣之始結成毒故以當歸尾消其血之凝白芷稍散其氣之滯又以人參扶其正氣所謂正人進而邪人退矣如此為治厥疾寧有弗瘳者哉

按脾喜燥惡濕若內多濕熱外傷風邪津液耗濕膏血粘乾或內急外弛以致生諸病陽虛則為倒睫等症陰虛則為散大等症火要濕熱所侵者以稍解為要陰陽偏勝者滋茶調衛為先

倒睫拳手症

人掃翳漸慢瞳既成難用藥夾敷少安寧調理如少缺必定失光明

此症皆由目病妄稱火眼不以爲事或酒或慾或風霜勞若全不禁忌致受風邪皮鬆弦緊毛漸倒睫未免淚出頻頻拭擦不已便自羞明故毛漸侵睛掃成雲翳以藥治最難不得已用法夾之如夾定以敷藥爲主俟夾將落卽敷其痕可保不然依然復舊其功費矣宜服敷

石膏羌活散

治火痛患日不觀光明遠年近日內外氣障風熱上攻昏暗拳毛倒睫之症

蒼朮

米泔炒羌活

蜜蒙花

白芷

石膏
煨

麻子

藁本

木賊草

黃連

酒製細辛

荆芥

川芎

家菊花

甘草

各等分

右為細末每服二錢食後臨睡蜜湯或清茶調服

流氣飲治兩目怕日羞明眩暈難開睛赤疼痛或生翳障眼稜緊急以致倒睫拳毛眼弦赤爛等症

荆芥 山柎 牛旁子 蔓荆子 細辛

防風 玄參 白蒺藜 木賊草 人參

真川芎各等分

右劉劑白水二鍾煎至八分去滓食後服

緊皮膏

石燕一對 石榴皮 五倍子各三錢 黃連 明礬各一錢

刮銅綠五分 真阿膠 魚膠 水膠各二錢

以上除膠六味共為末用水三五碗入大桐杓內文火煎熬

以槐柳枝不住手攪為濃糊將成膏方入水麝各三分研細

攪均用磁器內收貯將新筆塗上下眼皮每日塗三五次乾

出重者五十日向外矣
復塗毛自出矣涼天可行此法三日見効輕者三十日

五痰膏

蕎麥

燒灰一升
淋水

石灰

風化者
佳二兩

青桑柴

燒灰一升各淋水一碗
同風化灰同熬乾為末

聽用

白砒

三錢
研末

白明礬

一兩
研末

右共研一處水十碗熬末至一碗方入風化石灰攪均用新筆掃眼弦睫上數次毛即落勿入眼內

起睫膏

木驚子

去殼
一錢

自然銅

製五
分

右研爛為條子噉鼻又以石燕末入片腦少許研木調敷眼

弦上

東垣云眼生倒睫卷毛而兩目緊急皮縮之所致也蓋內伏熱攻陰氣外行賞去其內熱并火邪眼皮緩則眼毛立

出翳膜立退用手攀出內臉向外速以三稜鍼出熱血以
左手手指甲迎右鍼鋒立愈山居方云眼毛倒時去拳毛
用風子血點
數次即愈

按倒睫之症係脾腫肝絡凝滯不能相生以致眼皮寬縱
使毛內刺令目不爽病目者未免不類類指拭屢治未罷
除根不能已必用夾治毛向外生方妥然今人豈無房慾
勞沉調攝失宜等情眼內必生翳障痰瘀紅筋眼弦上下

赤爛羞澀淚等症依次
點服施治再無不愈者也

夾眼法

用者脆篋筆管竹破開做夾寸許將當歸汁侵一週時
候在用龜板一個開了連皮裹之煮夾皮爛取出陰乾

以麝香拌之夾眼則靈易好夾時先翻轉上眼看過倘有
瘀滯即導平血盡方可行夾然夾不可高大只在重絃存
細看定睫毛毫無倒入者方着力扯緊其夾外之內用小
丈圍灸二壯不可灸多恐潰候乾夾脫下用光粉調有油
逐早擦抹痕處
久則肉色如舊

脾急緊小症

脾急緊小膏血損了筋脈不舒視膽亦渺

此症謂目脾緊急縮小之患若不會治而漸自縮小者乃膏

血津液澀耗筋脈縮急之故若治急而小者治之之故患者
多因脾寬倒曉或只夾外脾失於內治則旋復復倒復夾遂
致精液損而脈不舒脾內壞而血不足目故急小有不當割
而頻數開導又不能滋其內以致液耗而急小者凡因治而
損者若不乘時滋返則絡定氣滯雖治不復愈宜服

神効黃芪湯

治兩目蓄急縮小羞明畏日或癰澀難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少睛光或目中熱

如火服五六次神効

蔓荊子

八分

黃芪

一錢

人參

甘草

炙

白芍藥

各一錢

陳皮

五分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓再煎臨睡溫服如小便淋
澀加澤瀉五分如有大熱症加黃蘗七分酒炒四次如麻木
不仁雖有熱不用黃蘗再加黃芪五分如眼緊小去芍藥忌

酒醋濕麪大料物葱蒜韭忌食生冷硬物

東垣撥雲湯

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳

累按之紅大無力知足太陽勝眈為命門相火煎熬逆行作呵水霧及寒膜遮睛與撥雲湯一服神効外症呵欠善悲健忘恍惚噴時自泪下面赤而白能食不便小便短數而少氣上而喘

黃芪

密炙

柴胡

各七分

細辛

乾葛根

川芎

各五分

藁本

知母

當歸身

荆芥穗

升麻

各一錢

甘草

稍三分

黃蘗

鹽水炒

川羌活

防風

各一錢五分

右剉劑白水二鍾生薑三片煎至八分去滓再煎食後温服

脾翻粘臉症

脾翻粘臉血瘀脾經脾翻皮縮風熱所承有自病翻轉有攀翻而成若不調治變症來

此症乃脾反轉帖在外臉之上如舌舐唇之狀乃氣滯血凝

於內皮急牽弔於外故不能復轉自有病壅翻而轉有因
脾看病風熱搏滯不能復返而轉大抵多風濕之滯故風疾
人患者多治亦難愈非風者則易治用剗割之法導之宜服
搏風散

桔梗

明天麻

防風

各五錢

五味子

焙乾

乾蠍

去鈎焙乾

細辛

烏風蛇

焙乾

赤芍藥

各一兩

右為細末每服錢半食遠米飲調下

龍膽丸

油兩胞粘臉眼皮赤爛成瘡疾

苦參

龍膽草

牛旁子

炒各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服二十九食後米飲送下

脾輪振跳症

脾輪振跳豈是純風氣不和順血亦欠隆牽拽振驚心不覺要

知乎病寬良功

此症謂脾胃不待人之開合而自率拽振跳也乃氣分之病屬脾肝二經絡之患人皆呼為風殊不知血虛而氣不和順非純風也若赤爛及頭風病者方是邪風之故久而不治為牽弔甚則為敗壞之病也宜服

當歸活血飲

蒼朮製

當歸身

川芎

蘇薄荷

黃芪

防風

熟地黃

川羌活

甘草

白芍

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後服

驅風散熱飲子

見三

脾虛如秘症

兩脚浮泛其狀如秘微有濕熱重則淚流非於赤腫宜以清虛

此症謂目脾浮腫如毬而虛起也目上無別病久則始有赤
絲亂脈之患火甚重皮或紅目不痛濕痰與火夾搏者則有
淚有眵爛之疾乃火在氣分之虛症不可悞認爲腫脹如極
血分之實病以兩手掌擦熱拭之少平頃復如故可見其血
不足而虛火壅於氣也宜服洗

調脾清毒飲

天花粉 連翹 荊芥穗 黍粘子 甘草

白茯苓 白朮 蘇薄荷 廣陳皮 防風各

右判劑白水二鍾煎至八分去滓食前溫服

廣大重明湯見三卷

妊娠按胎前產後多因血氣失和以致燥火上攻陰陽澀滯
或風邪乘虛邪火侵淫淫情抑鬱六氣引邪不必拘泥
其翳膜紅痛胎前惟用安胎清火產後惟用養榮散鬱

二症須分有餘不足在氣分者宜調之散之在血分者

醫見

五

宜補之行之
自無變症矣

兼胎症

婦人有孕號兼胎都是三陽否寒來只有有餘無不足要分血氣兩家災

此症專言婦人有孕而目病也其病多有餘要分在血在氣分之不同在氣分則有如旋螺泛起瞳神散大等症在血分則有如瘀血凝脂等症蓋其否隔陰陽澀滯與常人病眼不同為病每多危急人不知慮屢見歸重而措手不及內伐又恐傷胎洩氣不伐又源不清事在兩難善用內護外劫之治則百發百中矣如治胎前目病不厭疎利但避硝黃等峻藥破血及泄小腸之劑勿用經云有故無損故無損也或以白朮黃芩固胎之藥並製之藥佐之則無礙矣宜服

保胎清火湯

黃芩二錢 砂仁

荆芥穗

當歸身

白芍

連翹 生地

廣陳皮 各一錢 川芎 八分

甘草 三分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後服

簡易知母飲 治雄娠心脾壅熱目赤咽膈渴苦煩問多驚

赤茯苓

黃芩

麥冬肉

知母

黃芪

桑白皮

甘草 各等分

右剉劑白水二鍾煎熟去滓再入竹瀝一小鍾碗內沖服

天門冬飲子 溫熱忽然兩目失明內熱煩燥一應熱症

羌活

白茯苓

人參 各八分

天門冬 去心

知母 鹽水製

羌蔚子 各錢二分

防風

五味子 各五分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服

芎蘇散 治孕婦外感風寒 渾身壯熱 眼花頭昏 如旋此蓋為寒

增寒發熱甚至心胸煩悶 大抵產前二命所係不可輕 易妄投湯劑 減胃之初止宜芎蘇表其邪氣其病自愈

紫蘇 川芎 麥冬肉 陳皮 乾薑 炒黑

白芍藥 各一兩 甘草 五錢

右為末每服五錢姜三片葱頭三段水煎溫服

消風散 治孕婦頭旋目昏視物不見顛項腫核蓋因胎氣有傷 加痰壅危在片 刻急宜服之

石膏 防風 甘菊花 羌活 川芎

荆芥 當歸 羚羊角 白芷 甘草

大豆黃卷 炒各 等分

右為細末每服三錢細茶調後服

天冬飲子 治孕婦將臨月兩目忽然不明燈火不見頭痛昏目

顛項腫滿不能轉頭此症為懷孕多居暖閣致

過熱衣煖臥褥伏熱在內或服補後
及熱太過肝臟壅極致令胎熱

天門冬

知母

羌蔚子

防風

遼五味

熟地黃

茯苓

荆芥穗

羌活

川芎

白芍藥

當歸

右等分剉劑生薑三片白水二鍾煎食後服

爲產症

爲產血不足肝虛多損目莫勞膽莫悲哭流泪昏沉內不睦寤
虛引入風邪來爛濕赤垢久成篤或食燥膩五辛多或有濕痰
與勞碌幾般能致外生災早治免教多反覆

此症專言爲產後而目病也蓋產則百脈皆動氣血損傷大
虛而不足故邪得以易乘肝部癸生之氣甚弱少血而膽失

滋養精汁少則目中精膏氣液皆失化源以所目病者多然

輕重內外不同有勞膽竭思悲傷哭泣而為無時冷熱淚流
 內障昏渺等症有竅不密引入風邪為濕爛頭風者有因虛
 濕熱濕氣歸腦而為內障諸病者有因虛勞碌反恣辛嗜熟
 患熱病而傷目血為外障者皆內不足所致若知愛護者疾
 微而不變不知愛養反縱斷喪則變症不一大抵產後病宜
 早治莫待其久久則氣血定而病深入治亦不易其外症之
 顯而易知者人皆知害而早治其內症之害隱緩而人不知
 慮屢遭其患而悔亦遲矣若治產後無有餘之血須護肝氣
 不可輕用薄肝之劑當以四物湯養血之劑為至藥也服

熟地黃湯

治產後婦人眼昏頭暈
虛渴口乾氣少脚弱

熟地黃

酒洗晒
乾八分

糯米一撮

人參一錢

麥門冬

去心一分
錢五分

甘草五分

花粉二錢

右劉劑水二鐘薑一片棗二枚去核煎至八分去滓溫服

四物補肝散 治婦人產後午後至夜昏花不明

熟地黃 焙乾二兩 香附子 酒製 川芎 白芍 酒洗

當歸身 酒洗 夏枯草 錢八 甘草 四分

右共為細末每服二三錢食後滾白湯送下

右方以熟地黃補血當歸養血為君夏枯草入厥陰補養血

厥為臣甘草益元氣補脾胃白芍補皮和血為佐川芎助清

陽之氣上升香附理血氣散鬱為使耳

四製香附丸 治婦人產後崩漏亡血過多致睛珠疼痛經水不調等症

香附子 件去皮毛淨子八兩分作四分酒醃童便鹽水煮晒乾

熟地黃 各一兩酒水 澤蘭葉 淨葉

白芍藥 酒洗 當歸 炒各兩半 益母草 四兩勿犯鐵器

川芎 酒洗 黃蘗 酒炒

昏見... 卷之四 六

熟地黃膏另入除共為細末鋪地一宿去其火性煉密為丸
如梧桐子大每服二三錢空心滾白湯送下或食遠亦可

右方以四製香附為君益氣血之藥也熟地川芎當歸白朮

為臣補血養血和血之藥也黃蘗為佐補腎滋陰之藥也澤

蘭葉益母草為使療產後百病行血逐積血生心血之藥也

痘疹痘疹害眼多因胎毒或前或後積血蘊深或餘毒攻侵
已活血不致於熱解毒不致於涼俟屬後活之雖有目
翳切不可用點藥則非徒無益而反害之即用在散須小劑
去若候點藥則非徒無益而反害之即用在散須小劑

調服如眼無光過目日後血氣完復則目自明矣海藏
云東垣先生治症後風熱毒翳膜氣障遮睛以瀉青丸
治之大効初覺易治保命集云非症後翳膜亦能治之
瀉青丸減大

黃一半用之

濁害清和症

濁害清和重輕非一有病於前有病於未有外閉而不開有腫

膏而赤爛有積熱而內症昏朦或乘虛而中風內濕有陰邪結
星而爲翳有陽邪燥膏而成疾當因症而謂源母偏泥而物執
此症專治痘疹以致目疾之謂天痘疹爲毒最重自稟受以
來蘊積惡毒深久之故若痘疹發則諸經百脈清純太和之
氣皆破攪擾正氣大虛則邪乘虛而入名因其犯而爲病目
竅於肝胆肝胆乃清涼之府邪正理不並立今受濁邪薰灼
失發生長養之源故病亦易侵皆由乎人不能救而且害之
之故也或於病中食物發之太過懷藏大煖悞投熱藥多食
甘醋而致病者或於病後之虛弱未復恣食辛辣燥膩竭視
勞瞻炙衣烘火中冒風沙烟障而致病者有爲朦昏流泪成
內障者有爲赤爛星障成外症者有餘邪蘊積蒸燥肝胆熱
鬱之極清氣受陽延及瞳神而成凝脂黃膜花翳蟹睛等症

之重而目厥凸者有餘邪流爲赤絲羞明微星薄翳等症之輕而病自消者輕重深淺各隨人之所受所患亦不一業斯道者宜治思明辨以免不用刃而殺人取罪冥冥禍延子孫之報當細驗其症審其經而投治之不可執泥概治恐有激變之禍蓋痘疹之後正氣虛而血脈傷邪得易乘非常人可比大凡痘疹目疾惟瞳神未損亦有可治之理但宜蚤治則易退而無變亂之患遲則氣血凝定雖無變亂其退亦甚遲矣宜服

穀精草湯

穀精草 六分

白芍

荆芥穗

玄參

牛旁子

草決明

連翹

龍膽草

菊花

各五分

桔梗

三分

右剉劑白水二鍾燈心十段煎至六分去滓不拘時服

治後餘毒不散

黃蛤粉另研

穀精草生研為末 各一兩

右研勻每服二錢用猪肝三指大一片批開摻藥在上捲定
再用麻線扎之濃米泔水一碗煮肝熟為度取去放冷食後
臨睡細嚼却用原汁送下忌一切毒物如齋素用白桶同煎

令乾去藥食柿

孫盈重云凡痘瘡不可食雞鴨子必生翳膜錢子華之女
年數歲瘡痘後兩目皆生翳只服此藥各退白膜三重瞳
子方脫

望月丸

治痘入眼
致生翳膜

望月砂四兩
焙乾

石決明

醋煨

防風

白芍

刺楸殼精草

草決明

木賊各一兩

當歸五錢

右共為細末煉蜜為丸小兒量其大小或用一錢或用五分

一丸荆芥湯化下

疎風湯

治痘後患眼其珠不紅眼皮生一小顆數目有膿俗謂狗翳發後又發甚至眼毛上發一白泡服此

荆芥穗

蟬退

桔梗

歸尾

甘草

稍分各五

防風

白芷

各四分

石膏

煨錢二分

白芍藥 芡 苡 苓

連翹

蒼朮

泔水製各六分

共為劑葱白一段大米一撮白水二鍾煎至七分去滓食後

執服

通竅散

治痘後服生星翳

辰砂 三錢 珍珠

琥珀

各二錢

麝香

二錢

瑪瑙

一分五分

水片 五分

右研如細粉若翳在右目吹左耳翳在左目吹右耳若兩目有翳即吹兩耳蓋以吹耳錢通心脈二竅之故也

胎兒丸 治小兒痘後餘毒攻或一目或兩目黑珠翳

胎兒 去毛洗淨用陰陽互焙 蔓荊子 去膜晒乾為夫

菊花 去根葉晒乾為末各加一兩

右末共為一處煉真川蜜為丸量孩童大小不俱錢分俱白

滾湯化下

愚按免禮記謂之明眇言其目不瞬而瞭然也且得金氣之

全性寒而解胎中熱毒能瀉肝熱蓋肝開竅於目熱甚則昏

矇生翳熱極則珠脹突出今痘後生翳睛珠盲出者皆胎毒

盛極之所致也方用胎兒為君者取二獸之精血所成可以

解治毒也草木之性難以取効故借血氣之屬耳臣以蔓荊

微寒取其能涼諸經之血且能撥治肝風及太陽頭疼目痛

目赤淚出利九竅而明目性又輕浮上行而散更佐之以菊

花者取菊得金水之精英補益金水二臟也夫補水可以制火益精可以平木木平則風自息火降則熱自除其藥雖簡用意最深是方於嬰兒也安有不愈者乎

此方乃廣陵甘棠鎮王海明子痘後睛珠突出偶一客見之告曰此目有一藥可治但不知能得否詢之乃胎禿也其父遍覓得之按方炮製藥盡而目收余推幼幼之心故廣其傳

按痘後近視畧言小兒受胎毒感風寒而發痘疹痘發則正氣虛邪氣乘虛而入調理失宜則胎爲害邪氣入于肝膽二經兼真元未復則發目疾蓋目竅于肝專仗腎水經云目得血而能視肝藏血邪熱餘毒蒸灼肝經肝屬木木被火尅而灼損膽汁又腎屬肝之母肝被火尅而膽汁涸以致障生神光不清水不能其滋子也經云不能遠視者責其有火是也目漸深者嗜欲日開食物過辛真元日不足耳治法宜先清

解肝經積熱之毒次補真元水升而火自降火降而邪氣自

除自自明矣

清解散 早服

穀精草 一兩

石決明

煨入錢

白菊花

去蒂酒洗七錢

菘荳殼

六錢

共為細末每服二錢用大陳柿餅一箇去蒂核米泔水鍾半

煎半乾空心食柿餅原汁湯並服

補元散 晚服

夜明砂

淘淨一兩為末

真蛤粉

五錢為末

右共研為細末每服三錢用公猪肝一大片將肝破開搽藥

在內米泔水煮熟任意食之以原汁湯嚙下每日早晚服過

七再服

加味地黃丸

懷生地

竹刀切焙乾四兩

山萸肉

酒洗焙

山藥

白茯苓

各一兩

澤瀉

牡丹皮各兩半

菊花

去梗

麥冬肉

焙乾

當歸

焙各一兩

五味子

一錢

右共為細末煉蜜為丸空心淡鹽湯化下量小兒大小為丸如少年火旺加黃柏知母各五錢俱用鹽水製如目生翳服前藥不退可用點藥

退雲散

紅珊瑚

珍珠

辰砂

硼砂

各等分

俱生用共研極細無聲每日點二次

按痘後餘毒則必見雲翳遮睛外障等症者多如兩目赤白外無翳障止於視者皆稟受天真虛弱肝腎二經不足故神光淡白色瞳神或開大不必用點丹不必服退翳等藥

服固本之劑則精生氣氣生神非獨益於目更綿綿延壽集

犀角 剉細末一錢

前八味共為一劑白水二鍾煎至七分去滓淨再煎滾先將

犀角生末入在碗內後人滾藥于角末內攪均溫服

疳傷 疳症皆因飲食失節飽失調以致腹大面黃重則傷命輕則傷目息此勿治其目竟治其疳目病自愈切忌

油此物

按小兒疳眼無論眼邊但見白珠先帶黃兼白色皺起後微紅生眵怕亮不

上有白膜成如此樣○圍推起口暈暈內一黑一白赤有肥瘦不同疳眼無屍也但肥疳大便如豆腐渣糟粕

相似瘦疳大便小便硬結燥乃疳積入眼攻致肝經亦難治矣小兒患疳眼聲啞者命將終也

疳眼傷 牌濕熱薰木盛土衰風毒生渴瀉肚大青筋露目劄澀

癢且羞明時時操鼻常擣髮濕熱生蟲莫看輕急宜先服消疳

散瞬息延緩成突睛蘆薈九子依序治肝平脾健保嬰童

消疔退雲飲

陳皮

厚樸

姜汁炒

萊服子

炒研碎

蒼朮

米泔製

柴胡

黃連

酒炒

枳殼

麸炒

桔梗

炒

草決明

炒研

青皮

甘草

炙

梔子

炒黑

黃芩

酒炒

蜜蒙花

炒

神麩

炒

家菊花

各等分

共剉薑皮燈心為引水二鍾煎服滓再煎服

雞腫散

治疔疾眼生白膜白翳自然潛消其效如神

雄雞

一隻

即各雞

將肺

同後藥共研爛

一塊

辰砂

三分

研細

冰片

三釐

研細

三共研細如膏用無灰炮滾攪勻食之即愈

九味蘆薈丸

治

毒成疔

肝經積熱

眼目生翳

齒鈍

爛

或

或

或

或

津拘中

結核

或大便

不

調肢體

消瘦

症并

服

服

服

服

蘆薈

木通

胡黃連

宣黃連

炒

青皮

鶴虱

白雷丸

白蕪荑

炒各二錢

麝香

三錢揀去皮毛另研細入未為丸

共為細末神麩糊為丸麻子大每服五分空心米湯送下量

其病者大小用之忌一切生冷油麩炙博等物

生熟地黃丸

治肝疝眼

色青黃髮堅筋青壯熱羸瘦

生地黃

熟地黃

各五錢

川芎

杏仁

炮去皮尖

赤茯苓

胡黃連

微炒

地骨皮

半夏

炮製

天麻

當歸身

枳殼

炒

甘草

各二錢半

大黑豆

四十五粒煮熟去皮再煮爛同汁搗膏和前藥末後加蜜煉

右為細末煉蜜為丸如龍眼大空心滾湯化下

雞肝散

治小兒疳眼赤腫不治之症但畏明此藥治之

審視

卷之四

二

川烏

大者一放去皮生用

好懷子

一個

右為細末五歲一錢雄雞肝一具洗淨去筋膜竹刀薄切開
搽藥在內箬葉包裹麻皮扎定用米泔水半盞磁器中煮熟
切作片空心臨臥冷食之將煮肝湯送下如腦熱閉目鼻中
乾燥吹通頂散

龍膽蘆薈丸

治三焦及肝膽二經積染風熱以致目生雲翳或
結瘰癧耳內生瘡發寒作痛或虛少內燒肌體羸
瘦發熱作渴飲食少進肚腹不調皮脫腹脹口內有
瘡牙齦潰爛或牙齒蝕落頰頰腐爛下部生瘡等症

蘆薈

胡黃連

炒

龍膽草

各一兩

川芎

蕪荑

六錢

當歸身

白芍藥

各一兩

木香

八錢

甘草

錢五

右為細末煉蜜為丸每兩勻作十九量其大小而服用
是方以白芍藥和血補脾胃當歸養血脈為君盧廉橫紋頭
白肉際茨壹性如小麥六

小兒疳眼痰合谷貳穴各一壯炷如小麥大在手大指次指

兩骨間陷者中是

升麻乾葛湯

治暴發兩目紅腫疼痛寒熱相爭河間云暴發者屬腑表散是也一二服即止

升麻

桔梗各五分

羌活

川芎

防風各二錢

乾葛

一錢五分

大黃

白芷各三錢

蟬退

七個

陳皮

甘草

各四分

右剉劑生薑一片葱白一椀白水二鍾煎至一鍾去滓食後

熱服取汗為度

車前子散

治小兒肝經積熱上攻眼中逆順生翳血灌瞳神萎明多眵

蜜蒙花

羌活

車前子

炒

粉草

炒

白蒺藜

草決明

黃芩

炒

龍膽草

洗淨炒

菊花

各等分

右為末每服二錢食後飯湯送下

霍亂吐瀉

養肝丸 治小兒肝血不足眼目昏花或生眩泪久視無力

防風 酒製 白芍藥 酒洗 楮實子 去膜陰乾

川芎 酒煮 熟地 酒蒸 萎蕤仁 去殼皮尖油

蒼去疔清熱胡黃連療骨蒸勞熱為臣龍膽草治諸目疾蕪

荑殺疔虫遂五內痛氣川芎提清氣上升為佐木香調氣甘

草和諸藥為使

消疔散 治疔積眼生翳膜遮睛

史君子 用白者去油 雷丸 去皮甲白者殺人勿用以米泔水浸蒼朮少許將雷丸全蒼朮肝火

溫之用雷丸去蒼朮炮乾各等分研為細末

每一歲用一分異用雌女用雄雞肝勿犯鐵器淨去筋膜血

水炖半熟離藥食重不過三四服見效若翳厚加水賊燒灰

雄黃珍珠各一錢 另研入前藥服

天麻 疳積眼

青黛

天麻

夜明砂

微炒

五靈脂

川芎

蘆薈

川黃連

炒各二錢

龍膽草

蟬退

去頭足

防風

各一錢

乾膽頭

火焦二錢

全蝎

二枚焙

麝香

少許

右為細末猪膽汁浸糕成丸如麻子大每服十九薄荷湯送下或化下亦可

寶鑑灸雀目疳眼法

小兒雀目夜不見物灸手大拇指甲後一寸內除熱地膏糝霜另入餘為細末煉蜜為丸或一錢或五分一丸量嬰孩大小每服一丸滾白湯不拘時服若治大人仍做小丸每服三錢滾湯送下

通頂散

治小兒腦熱腦枕骨疼閉目不開或頭風痛攢眉啼哭并赤目

川芎

薄荷

各五錢

因陳

甘草

各四錢

朴硝

三錢甜硝亦可

右為細末用少許吹鼻中即效如要嚏噴加躑躅花一錢只

用朴硝吹鼻亦止

驚搐

子和曰諸風掉眩皆屬肝木掉搖眩暈目嚼筋急手搐
冥窳皆厥陰肝木之用也經曰風淫所勝平以辛涼世

何以執藥
治風邪乎

輓轡轉關症

輓轡轉關人所罕聞瞳睛勿正那肯中存上垂下際或顧或頻
氣所使動人所不能筋脈振惕緊急難伸急宜調治免致傷深

此症謂病目六氣不和或因風邪所擊腦筋如拽神珠不待
人轉而自驀然察上驀然察下下之不能上上之不能下或
左或右倏易無時蓋轉動搏擊不定筋脈振陽緩急無常被
其牽拽而為害輕則氣定脈偏而珠歪如神珠將反之狀甚

則翻轉而為睡神反皆矣宜服

鈎藤飲子

治辛然驚悸
眼目翳騰

鈎藤

各五分

麻黃

去節

甘草

各三分

天麻

炒一錢

川芎

防風

人參

各七分

全蝎

炒去毒
一錢

僵蚕

炒二分

右剉劑白水二鍾姜三片煎至八分不拘時服

雙目睛通症

雙目睛通庸翳窄識此幼時所傷非壯年所得欲看東而反顧其西彼有出而反顧其入為腦筋帶轉幼因風熱所逼患即醫之庶無終失至長求醫徒勞心力

此症謂幼時目珠偏邪而視亦不正至長不能愈矣患非一端有脆嫩之時目病風熱攻損腦筋急縮者看因驚風天吊帶轉筋絡失於散治風熱遂致凝結經絡而定者有因小兒

眠於牖下亮處側視既久遂致筋脈滯定而偏者凡有此症急宜乘其目近血氣未定治之若至久筋絡氣血已定不復

愈矣宜服

牛黃丸

治小兒通睛皆因天候策打觸着頭而額角兼倒撲令兒肝受驚風遂使兩目關睛各目通睛宜服此丸

牛黃

珍珠

天竺黃

琥珀

青黛

殭蚕

地龍

白附子

炮各麝香少許金箔量加等分為衣

香油

蘇合油

以上前九味各另研極細共為一處用細甘草稍煎汁三分之二次入蘇香二油三分之一兌均共和為丸金箔為衣量其大小薄荷湯化下乳母及小兒忌一切酒麪猪肉辛熱三痰等物

附小兒目閉不開睛目直視目仰視目睛動目劄諸症驗

目閉不開

足太陽經為目上綱易陽明之經為目下綱熱則筋從目不開者由產母過食辛熱等物致成斯疾傷

初生下眼不開者由產母過食辛熱等物致成斯疾傷法當以熊胆少許蒸水洗眼十一日七次如二日不開用生地黄散服凡小兒不洗淨則極汁浸漬於目皆中使眼赤爛至長不瘡

人參湯

治風頭眩但覺地屋俱轉目閉不敢開

人參

麥冬

去心

當歸

酒製

白朮

防風

各八分

獨活

白芍藥

黃芪

各一錢二分

官桂

古皮七分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠服

生地黄散

乾地黄

赤芍藥

川芎

甘草

當歸身

天花粉

各等分

右為細末量其大小燈心湯調搽入口內

睛目直視集或直視者視物而目睛不轉動者是也若目睛

使神氣不慧藏腑之氣不上榮於目則目為之直視

寒至於直視為邪氣已極證候已逆多難治經自動

不可發汗發汗則額上陷脈繫急直視不能瞬不能眠

以肝受血而能視亡血肝家氣已虛目氣已弱又發汗

亡陽則陰陽虛俱所致此虛錯逆猶未甚也遠狂言反

目直視又為腎經直視搖頭又為心絕皆臟腑氣脫絕

也直視嚴語喘滿者視下逆者亦死又劇者發狂則不

識人循衣摸朕惕而不安微喘直視廊弦濇者死皆邪

氣盛而正氣脫也素問曰少陽逆者其百節絡目震

絕系王註曰環謂直視如驚貌曰糸絕故曰不動直視

瀉青丸兼治小兒肝熱實熱手循頰亂捻物目直視不搐得心

目直視

經曰瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已

昌久虛眼瞤發赤腫疼疼痛並治

龍膽草

當歸

川芎

羌活

山梔仁

防風

大黃

濕滯裹服

右共為細末煉蜜為丸如雞頭子大每服一丸煎竹葉湯化

下或沙糖湯化下亦可若治大人每服二三錢量服

肝至風少陽膽則其腑也少陽之經行乎兩脇風熱相于故不能安臥此方名曰瀉青瀉肝膽也龍膽草味苦而厚故入厥陰而瀉肝少陽火實者頭角必痛故佐以川芎少陽火鬱者必生煩燥故佐以梔子肝者將軍之官風淫火熾勢不容以易治故又用以大黃用歸身者培養乎血而不使其為風熱所燥也復用平羌活防風者二物皆升散之品此火鬱發之木鬱達之之意乃上下分消其風熱皆所以瀉之也

和太師牛黃丸

治大小男婦卒暴中風眩暈倒仆精神昏寒不省人事牙關緊急目睛直視胸膈喉中痰涎疝

塞乃清癩潮發手足痲痲口眼相引項背強直蓋治之

石燕火煨醋淬

雄黃研飛

蛇黃火煨醋淬

辰砂研飛

磁石火煨醋淬

石綠研飛

牛黃細研

香見... 卷之四... 五

粉霜細研麝香細研各

金箔

銀箔各一百張為衣

以上前十味各另研極細共為一處用酒煮麪糊和丸如雞頭大每服一九前薄荷湯並酒磨下老可服半丸小兒十歲以下分為四服蜜水磨下四歲以下分為五服未滿一歲可分為七服如牙關緊急以物榦開灌之

目邱視

小兒痙瘓不定翻眼擡睛狀若神崇頭目仰視各為天釣亦驚風之症宜服九龍空涎散

碧霞丹

治大小男婦卒中急風眩運僵仆痰涎壅塞心神迷悶五種癰病涎朝搐搦牙關緊急目睛上視等症

石綠

火煨醋淬九遍研飛十兩

附子尖

去皮

烏頭尖

去皮

蝎稍

各七箇

右將三味為末入石綠令勻麪糊為丸如雞頭大每服宜用

薄荷汁半盞化下一丸更入酒少許溫暖服之須要吐出涎

痰然後隨證治之如牙關緊急幹開灌之効

九龍控涎散

赤脚蜈蚣一條去頭足

荆芥穗炒

白礬服各一錢

滴乳石另研

天竺黃另研各一錢

甘草炙一錢半

雄黃二錢

雄黃二錢

臘茶葉二錢五分

肥綠豆生半炒

右件共為細末每服五分量其大小用之人參薄荷湯調下

目睛瞶動則風火內生故目睛為之瞶動經曰典直動搖風

之象也宜用四物益具血加柴胡山梔清其肝陰血內榮則虛風自息矣

目劄按目劄者肝有風也風火於目上下左右如風吹不輕

赤或時拭肩不能在此故目連劄也此恙有兩目重劄或色加龍胆草而癢有雀目眼劄屬肝膽經風熱先用柴胡

清用散治兼六味地黃丸湯加蕪黃連以清

肝熱兼六味地黃丸以滋腎生肝而愈

四味肥兒丸治嘔吐不食腹脹或疳作瀉不止或食積脾症

瘡又治小兒一切疳症

黃連炒 蕪荊炒 神麩 麥牙炒各等分

右為細末水糊成丸如桐子大每服一二十丸空心白滾湯

送下

柴胡清肝飲治肝明三焦風熱怒氣或乍寒乍熱往來寒熱發熱或頭發瘡毒等並治之

柴胡一錢五分 黃芩 人參 川芎錢 一梔仁炒

連翹 甘草各五分 桔根八分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服

割攀睛努肉手法

按努肉之症或大小皆間生出者乃活肉也若用點藥服藥不能退者必至侵遮黑睛恐凝腫神須用割法施治為妙或未侵及黑珠者亦無傷也只宜點服丸散緩以退之不可輕易鈎割慎之慎之


凡害之際先用明礬不俱多少熱水泡化以新羊毛筆蘸藥水于努肉上其肉始能皺起然後易于下手先用鋒利之針穿入肉中上下露針挑起橫于上下眼胞擔定方用鋤刀從中鋤至近黑珠邊微微輕浮搜撥下切不可礙動黑珠要緊復又從針處接撥自睛至大小眼眥盡處或用刀割或用小花前剪斷亦可不可礙動大小眥頭紅肉一塊此乃眼竅通于心之血英也若一出血則必傷之多至成漏爲害非淺如努肉自者不烙無妨如割努肉有出血者用綿緝揉軟蘸水濕拭之卽止



以針挑
起搜之

以針挑
起搜之

樣 刀 割 鉤 烙 鍼



凡用割眼之日須擇不犯鬼神在目施治如犯者恐胎害矣
 努肉紅者不烙有變成雞冠蜆肉者亦宜割之割後要戒色
 慾腦怒冲風昌日辛苦勞碌靜養三七日可也禁食魚腥煎
 炒酒麪雞鴨驢馬猪頭大肉葱蒜茱芥胡椒辛辣等物割後
 宜服清熱活血疏風劑十餘貼始妙