

孫真人千金方卷之五

投七

孫真人備急千金要方卷之五

投七

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

婦人方

惡露第五方

乾地黄湯治產後惡露不盡除諸疾補不足

之方

乾地黄 兩三

芎藭

桂心

黃耆

當歸 各二兩

人參

防風

茯苓

細辛

芍藥

甘草 各一兩

右十一味呶咀以水一斗煮取三升去滓
分三服日再夜一

桃人湯治產後往來寒熱惡露不盡方

桃仁五兩 吳茱萸二升 黃耆

當歸 芍藥各三兩 生薑

醍醐百鍊投七 柴胡各八兩

右八味呶咀以酒一斗水二升合煮取三

升去滓適寒温先食服一升日三

澤蘭湯治產後惡露不盡腹痛不除小腹急

痛痛引腰背少氣力方

澤蘭

當歸

生地黄

各二兩

甘草

一兩半

生薑

三兩

芍藥

一兩

大棗

十枚

右七味以水九升煮取三升去滓分
三服日三墮身欲死服亦瘥

甘草湯治產乳餘血不盡逆搶心胃手足逆
冷脈乾腹脹短氣方

血甘草

芍藥

桂心

阿膠

各三兩

大黃

四兩

右五味以東流水一斗煮取三升去

滓內阿膠令烊分三服一服入腹中面即
有顏色一日一夜盡此三升即下腹中惡
血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯治產後惡露不盡方

大黃

當歸

甘草

投七

二

生薑

牡丹

芍藥

各三兩

吳茱萸

一升

右七味呖咀以水一斗煮取四升去滓分
四服一日令盡加人參二兩名人參大黃

湯

柴胡湯治產後往來寒熱惡露不盡方

柴胡

生薑

桃仁

各八兩

五十一枚

當歸

黃耆

芍藥

各三兩

三兩

吳茱萸

二升

右七味以水一斗三升煮取三升去

滓先食服一升日三

千金翼以清酒一斗煮

蒲黃湯治產後餘疾有積血不去腹大短氣

不得飲食上衝胃脅時時煩憤逆滿手足惰

疼胃中結熱方

蒲黃

兩半

大黃

磁石

甘草

黃芩各一兩

大棗三十枚

右六味以水五升煮取一升清朝服

至日中下若不止進冷粥半盞即止若不

下與少熱飲自下人羸者半之千金翼名大黃湯而

不用芒硝

投

三

銅鏡鼻湯治產後餘疾惡露不除積聚作病
血氣結搏心腹疼痛方

銅鏡鼻十八銖

大黃二兩

為藥乾地黃 芎藭

乾漆

磁硝各二兩

亂髮雞子大燒

大棗

三十枚

右九味呔咀以水七升煮取二升二合去

滓內髮灰鏡鼻末分三服

小銅鏡鼻湯治如前狀方

銅鏡鼻

十銖燒末

大黃

甘草

黃芩

磁硝

乾地黄

各二兩

桃仁

五十枚

右七味呔咀以酒六升煮取三升去滓內

鏡鼻末分三服亦治遁尸心腹痛及三十

六尸疾

梔子湯治產後兒生處空流血不盡小腹絞痛方

梔子三十枚以水一斗煮取六升內當歸芍藥各二兩蜜五合生薑五兩羊脂一兩於梔子汁中煎取二升分三服日三

生地黄湯治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛強滿氣息不通方

生地黄

五兩

生薑

三兩

大黃

芍藥

茯苓

細辛

桂心

當歸

甘草

黃芩各一兩半

大棗二十枚

右十一味㕮咀以水八升煮取二升半去

滓分三服日三

大黃乾漆湯治新產後有血腹中切痛方

大黃

乾漆

乾地黄

投七

四

桂心

乾薑各二兩

右五味㕮咀以水三升清酒五升煮取三

升去滓温服一升血當下若不瘥明日服

一升滿三服病無不瘥

麻子酒治產後血不去方

麻子五升搗以酒一斗漬一宿明旦去滓
溫服一升先食服不瘥夜服一升不吐下
忌房事一月將養如初產法不盡即旦服
升麻湯治產後惡物不盡或經一月半歲二
歲方

升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分
再服當吐下惡物勿怪良

治產後惡血不盡腹中絞刺痛不可忍方

大黃

黃芩

桃仁

各三兩

桂心

甘草

當歸

各二兩

芍藥

兩四

生地黄

兩六

右八味以水九升煮取二升半去滓

食前分三服

治產後漏血不止方

露蜂房

敗船茹

投七

五

右二味等分作灰取酪若漿服方寸匕日

三

又方

大黃

兩三

磁硝

兩一

桃仁

煮取三

水蛭

蠱蟲

各三枚

甘草

當歸各二兩

麤蟲四十枚

右八味咬咀以水三升酒二升合煮取三

升去滓分三服當下血

又方

桂心

蟻螯各二兩

枯萋根以日

牡丹各三兩

豉升一

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓分

三服

治產後血不可止者方

乾菖蒲三兩以清酒五升漬煮取三升分

再服即止

治產後惡血不除四體並惡方

續骨木二十兩破如算子大以水一斗煮

取三升分三服相去如人行十里久間食

粥或小便數或惡血下即瘥此本得三遍

煮

治產後下血不盡煩悶腹痛方

羚羊角燒成灰刮取三兩

芍藥二兩

枳實一兩細切

黃

右三味治下篩煮水作湯服方寸七日再

夜一稍加至二七

又方鹿角燒成夾擣篩煮豉汁服方寸七日
三夜再稍加至二七不能用豉清煮水作湯

服之

又方擣生藕取汁飲二升甚驗

又方生地黃汁一升酒三合和按七温頓服之六

又方赤小豆擣散取東流水和服方寸七不

瘥更服

治產後血瘀痛方

古鐵一斤秤鎚斧頭鐵杵亦得炭火燒令

赤內酒五升中稍稍服之神妙

治婦人血瘕心腹積聚乳餘疾絕生小腹堅

滿貫臍中熱腰背痛小便不利大便難不下

食有伏蟲臚脹癰疽腫久寒留熱胃管有邪

氣方

半夏 一兩
六銖

石膏

藜蘆

牡蒙

菝蓉 八銖
十銖

桂心

乾薑 各一
兩

烏喙 半
兩

巴豆 六十枚
研如膏

右九味為末蜜丸如小豆服二丸日三及

治男子疝病

治婦人血瘕痛方

乾薑

烏賊魚骨

各一兩

右二味治下篩酒服方寸七日三

又方末桂心温酒服方寸七日三

下痢第六方

投七

七

膠蠟湯治產後三日內下諸雜五色痢方

阿膠

黃蘗

各一兩

蠟

如棊子三箇

當歸

一兩半

黃連

二兩

陳廩米

一

右六味以水八升煮米蠶目沸去米

內藥煮取二升去滓內膠蠟令烊分四服

一日令盡

桂蜜湯治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血方

桂心

甘草

各二兩

乾薑

二兩

附子

一兩

蜜升

當歸

三兩

赤石脂

十兩

右七味呔咀以水六升煮取三升去滓內

蜜煎一兩沸分三服日三

治產後下赤白腹中絞痛湯方

芍藥

乾地黄

各五兩

甘草

阿膠

艾葉

當歸 各二兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半去滓
內膠令烊分三服

治產後赤白下久不斷身面悉腫方

大豆 微

小麥

蒲黃 各一升

吳茱萸 半升

右四味以水九升煮取三升去滓分三服
此方神驗亦可以水五升酒一斗煎取四
升分四服

治產後痢赤白心腹刺痛方

薤白兩一

當歸兩二

酸石榴皮兩三

地榆根兩四

粳米合五

右五味㕮咀以水六升煮取二升半去滓

分三服必効方加厚朴一兩阿膠人參甘草黃連各一兩半

當歸湯治產後下痢赤白腹痛方投七

當歸

龍骨兩各三

乾薑八

白朮兩各二

芎藭兩各二

甘草

白艾者熟

附子兩各一

右八味㕮咀以水六升煮取二升去滓分

三服一日令盡

白頭翁湯治產後下痢兼虛極方

白頭翁

阿膠

秦皮

黃連

甘草

黃蘗

鼈甲湯治產後早起中風冷泄痢及帶下方

鼈甲

如手大

當歸

黃連

乾薑

各二兩

黃蘗

長一尺廣三寸

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓分

三服日三

千金翼加白頭翁一兩

龍骨圓治產後虛冷下血及穀下晝夜無數
兼治產後惡露不斷方

龍骨

四兩

乾薑

甘草

桂心

各二兩

右四味為末蜜和暖酒服二十九丸如梧子

按七

九

日三一方用人參地黃各二兩

阿膠圓治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉
不止方

阿膠

四兩

人參

甘草

龍骨

桂心

乾地黃

白朮

黃連

當歸

附子

各二兩

右十味為末蜜丸如梧子温酒服二十九

日三

澤蘭湯治產後餘疾寒下凍膿裏急胸脇滿

痛効噉嘔血寒熱小便赤黃大便不利方

澤蘭

石膏

各二十

當歸

甘草

厚朴

各十

遠志

三十

藁本

芎藭

各十

乾薑

人參

桔梗

乾地黄

各十

白朮

蜀椒

白芷

栝子仁

防風

山茱萸

細辛

各九銖

桑白皮

麻子仁

各半升

右二十一味㕮咀以水一斗五升先內桑白皮煮取七升半去之內諸藥煮取三升

五合去滓分三服

乾地黄湯治產後下痢方

乾地黄

二兩

白頭翁

黃連

各一兩

蜜臘

一方寸

阿膠

如手掌一枚

右五味㕮咀以水五升煮取二升半去滓

內膠蠟令烱分三服日三千金翼用乾薑一兩

生地黄湯治產後忽著寒熱下痢方

生地黄五兩 甘草 黃連

桂心各一兩 大棗二十枚 赤石脂二兩

淡竹葉二升一作竹皮

右七味以水一斗煮竹葉取七升去

滓內藥煮取二升半分三服日三

藍青圓治產後下痢方

藍青藜 附子 鬼臼

蜀椒各一兩半 厚朴 阿膠

甘草

兩二

艾葉

龍骨

黃連

當歸

兩各三

黃蘗

茯苓

人參

兩各一

右十四味為末蜜和丸如梧子每服二十

丸空腹飲下一方用赤石脂四兩

赤石脂圓治產後虛冷下痢方

赤石脂

兩三

當歸

白朮

黃連

乾薑

秦皮

甘草

兩各二

蜀椒

附子

兩各一

左九味為末蜜丸如梧子酒服二十九日

三千金翼作散空
腹飲服方寸七

赤散治產後下痢方

赤石脂

代赭各三兩

桂心一兩

右三味治下篩酒服方寸七日三十日愈

黑散治產後下痢方

投七

麻黃

貫衆

十二

桂心各一兩

甘草

乾漆各三兩

細辛二兩

右六味治下篩酒服五撮日再五日愈麥

粥下尤佳

黃散治產後下痢方

黃連 二兩

黃芩

麤蟲

乾地黄 各一兩

右四味治下篩酒服方寸七日三十日愈

龍骨散治產後痢方

五色龍骨 代赭

赤石脂

黃蘗根皮 蜜炙令焦

艾 各一兩半

黃連 二兩

右六味治下篩飲服方寸七日三

淋渴第七方

栝蒌湯治產後小便數兼渴方

栝蔞根

麥門冬

甘草

黃連各二兩

人參

生薑各三兩

大棗十五枚

桑螵蛸二十枚

服 右八味呿咀以水七升煮取二升半分三

又方治產後渴不止方

栝蔞根四兩

人參

麥門冬各三兩

甘草崔氏不用

乾地黄各二兩

大棗二十枚

土瓜根五兩崔氏用蘆根

右七味呿咀以水一斗二升煮取六升分

六服

雞胍脰湯治產後小便數方

雞胍脰

具二三

雞腸

洗三具

乾地黄

當歸

甘草

兩各二

麻黃

兩四

厚朴

人參

兩各三

生薑

兩五

大棗

枚二十枚

右十味呔咀以水一斗煮胍脰及腸大棗

取七升去滓內諸藥煎取三升半分三服

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時

溺血或如豆汁或如膠飴每發欲死食不生

肌面目萎黃師所不能治方

具齒

四枚燒作末

葵子外一

石膏

五兩碎

滑石

二兩末

右四味以水七升煮二物取二升去滓內

二末及猪脂一合更煎三沸分三服日三

不瘥再合服

石韋湯治產後卒淋氣淋血淋石淋方

石韋

黃芩

通草

甘草

各二兩

榆皮

五兩

大棗

三十枚

葵子

外二

白朮

產寶用芍藥

生薑

各三兩

右丸味呔咀以水八升煮取一升半分三

服集驗無甘草生薑雀氏同產實不用薑棗

葵根湯治產後淋澀方

葵根二兩 車前子一升

亂髮燒灰

大黃 桂心 滑石各一兩

通草三兩 生薑六兩 冬瓜練七合一作汁

右丸味呔咀以水七升煮取二升半分三

服千金翼不用冬瓜練

茅根湯治產後淋方

白茅根一斤 瞿麥 茯苓各四兩

地脉

人參 各二兩

生薑 三兩

桃膠

甘草 各一兩

鯉魚齒 一百枚

服 右九味 咬咀 以水一斗 煮取二升半 分三

滑石散治產後淋方

滑石 五兩

通草

車前子

葵子 各四兩

右四味 治下篩 酢漿水服方寸七 稍加至

二七

竹葉湯治產後虛渴少氣力方

竹葉升三

生薑

半夏各三兩

大棗十四枚

小麥五合

甘草

茯苓

人參各一兩

麥門冬五兩

右九味呔咀以水九升煮竹葉小麥取七升去滓內諸藥更煎取二升半一服五合

日三夜一

雜治第八方灸法

治婦人勞氣食氣胃滿吐逆其病頭重結痛小便赤黃大下氣方

烏頭

黃芩

巴豆各半兩

半夏三兩

大黃八兩

戎鹽一兩半

麤蟲

桂心

苦參各十銖

人參

消石各一兩

右十一味為末以蜜青牛膽拌和搗三萬杵丸如梧子宿不食酒服五丸安卧須臾

投七

十四

當下下黃者小腹積也青者疝也白者內風也如水者留飲也青如粥汁膈上邪氣也血如腐肉者傷也赤如血者乳餘疾也如蟲刺者蠱也既下必渴渴飲粥飢食酥糜三日後當溫食食必肥濃三十日平復

亦名破積烏頭丸主心腹積聚氣悶脹疝

瘕內傷瘀血產乳餘疾及諸不足

竹茹湯治婦人汗血吐血尿血下血方

竹茹二升

人參

芍藥

桔梗

芎藭

當歸

甘草

桂心各一兩

乾地黄四兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治婦人自少患風頭疼眼眩方

石南

一方用石韋

細辛

天雄

茵芋

各二兩

薯蕷

防風

貫衆

獨活

蕨蕪各四兩

乾薑

山茱萸各三兩

右十一味以酒三斗漬五日初飲二

合日三服後稍稍加之

治婦人經服硫黃丸忽患頭痛項冷冷歇又

投七

十五

心胃煩熱眉骨眼背癢痛有時生瘡喉中乾燥四體痛癢方

栝蒌根

麥門冬

龍膽各三兩

大黃二兩

杏仁半斤

土瓜根八兩

右六味為末蜜丸如梧子大飲服十枚日

三後漸加之

治婦人患癰按時如有三五箇而作水聲殊不得寢食常心悶方

牽牛子三升治下篩飲服方寸七日一服三十服後可服好硫黃一兩

治婦人忽與鬼交通方

松脂

二兩

雄黃

一兩末

右二味先烱松脂乃內雄黃末以虎爪攪令相得藥成取如雞子中黃夜卧以著燻籠中燒令病人取自昇其上以被自覆惟

出頭勿令過熱及令氣得泄也
厚朴湯治婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白
汁小便俱出

厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去
滓取桂一尺為末內汁中調和一宿勿食

旦頓服之

溫經湯治婦人小腹痛方

茯苓

六兩

土瓜根

芍藥

各三兩

薏苡仁

半斤

右四味㕮咀以酒三升漬一宿旦加水七

升煎取二升分再服

半夏厚朴湯治婦人胃滿心下堅咽中帖帖
如有炙肉嚙吐之不出咽之不下方

半夏升一

厚朴兩三

茯苓兩四

生薑兩五

蘇葉兩二

投七

十六

右五味以水七升煮取四升分四服

日三夜一不瘥頓服一方無蘇葉生薑

治婦人氣方

平旦服烏牛尿日一止

昆布圓治婦人胃中伏氣方

昆布

海藻

芍藥

桂心

白石英

欵冬花

桑白皮

人參 各二兩

栝子仁

茯苓

鍾乳 各二兩半

紫苑

甘草

各一兩

乾薑 一兩六銖

吳茱萸

五味子

細辛 各一兩半

杏仁 百枚

橘皮

蘇子 各五合

右二十味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸日再加至四十九

治婦人無故憂恚胃中迫塞氣不下方

芍藥

滑石

黃連

石膏

山茱萸

前胡

各一兩
六銖

大黃

麥門冬

細辛

生薑

各二兩

半夏

十八銖

桂心

半兩

右十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九投七

加至三十九日三服

治婦人斷產方

蠶子故紙方一尺燒為末酒服之終身不

產

又方油煎水銀一日勿息空肚服棗一枚永

斷不損人

治勞損產後無子陰中冷溢子門閉積年
不瘥身體寒冷方

防風半一兩

桔梗三十

人參一兩

菖蒲

半夏

丹參

厚朴

乾薑

紫苑

杜蘅各十
八銖

秦艽

白斂

牛膝

沙參各半
兩

右十四味為末白蜜和丸如小豆食後服
十五丸日三服不知增至二十九有娠止

夫不在勿服之服藥後七日方合陰陽

五加酒治產後癱瘦玉門冷方

五加皮

枸杞子一升

蛇牀子一升

杜仲一升

乳牀半斤

乾地黄

丹參各二兩

乾薑三兩

天門冬四兩

右九味咬咀以絹袋子盛酒三斗漬三宿

一服五合日再稍加至十合佳

治子門閉血聚腹中生肉癥瘕寒所致方

乾漆半斤

生地黄汁三升 生牛膝汁一斤

右三味先搗漆為散內汁中攪微火煎為

丸如梧子大酒服三丸日再若覺腹中痛
食後服之

治產後勞玉門開而不閉方

硫黃四兩

吳茱萸一兩

菟絲子一兩
六銖

蛇牀子一兩

投七

右四味為散以水一升煎二方寸七洗玉

門日再洗

治產後陰道開而不閉方

石灰一斗燂令燒草以水二斗投之適寒
溫入汁中坐漬之須臾復易坐如常法此

方已効千金不傳

黃芩散治婦人陰脫方

黃芩

蝟皮

當歸

各半兩

芍藥

牡蠣

竹皮

各二兩半

狐莖

一具千金翼用松皮

右七味治下篩飲服方寸七日三禁舉重

房勞冷食

硫黃散治同前

硫黃

烏澤魚骨

各半兩

五味子

三銖

右三味治下篩以粉其上良日再三粉之
當歸散治同前

當歸

黃芩

各二兩

蝟皮

兩半

牡蠣

二兩半

芍藥

一兩六銖

右五味治下篩酒服方寸七日三服禁舉

重良

治產後陰下脫方

蛇床子一升布裏炙熨之亦治產後陰中

又痛... 又方燒人屎為末酒服方寸七日三

又方燒人屎為末酒服方寸七日三

七

十九

又方燒弊篋頭為灰酒服方寸七

又方鼈頭五枚燒末以共花水服方寸七日

三

又方

皂莢兩半

半夏

大黃

細辛

各十
八銖

蛇床子

三銖

右五味治下篩用薄絹囊盛大如指內陰

中日二易即瘥

又方

吳茱萸

蜀椒各一升

戎鹽

如雞
子大

右三味皆熬令變色為末以綿裹如半雞

子大內陰中日一易二十日瘥

治婦人陰下脫若脫肛方

羊脂煎訖適冷暖取塗上以鐵精傅脂上
多少令調以火炙布令暖熨肛上漸推內

之然後末磁石酒服方寸七日三

治陰下挺出方

蜀椒 廣濟方不用 烏頭

白芨 各半兩

右三味治末以方寸七綿裹內陰中入三

寸腹中熱易之日一度明旦乃復著七日

愈

當歸湯治產後臍中風冷陰腫痛方

當歸

獨活

白芷

地榆

各三兩

敗醬

金不用

礬石

各二兩

右六味以水一斗半夏取五升通冷暖稍

稍洗陰日三

又方熟搗桃人傳之良日三度

灸法月水不利賁豚上下并無子灸四滿三

十壯穴在丹田兩邊相去各二湯升半丹田在

臍下二寸是也

婦人胞落頽灸臍中三百壯 又灸身交五
十壯三報在臍下橫文中 又灸背脊當臍
五十壯 又灸五泉五十壯三報 又灸龍
門二十壯三報在玉泉下女入陰內外之際
此穴早令廢不針灸

婦人胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三寸隨年
壯三報 婦人陰冷腫痛灸歸來三十壯三
報俠玉泉五寸是其穴

又人欲斷產灸右踝上一寸二壯即斷

孫真人備急千金要方卷之五



