



丹溪心法附餘卷之二十三

休寧東山古庵方廣約之類集

小兒門

下

痘瘡

一百

丹溪心法

○痘瘡分氣虛血虛用補 氣虛者人參白朮加解毒藥

血氣者四物湯中加解毒藥 酒炒黃芩黃連名解毒

藥

凡痘瘡初出之時色白者使用大補氣血人參白朮黃芪
川芎升麻乾葛甘草木香丁香酒洗當歸白芍藥 若
大便瀉加訶子肉豆蔻 但見紅點便忌葛根湯恐發
得表虛也

吐瀉食少為裏虛 不吐瀉能食為裏實裏實而補則結
癰毒 陷伏倒靨為裏虛灰白者亦表虛或用燒人屎
紅活綻凸為表實裏實而更復用實表之藥則要潰
爛不結痂

吐瀉陷伏二者俱見為表裏俱虛
黑陷甚者亦用燒人屎密求調服 出子和方

痘瘡初出時或未見時有患者宜預服此藥多者令少重
者令輕方以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙
糖拌乾喫入硃砂末尤妙

痘瘡分人清濁就形氣上取勇怯

黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芪酒洗紫草
人參

顏色正者如上治將欲成就却色淡者宜助血藥用當歸
川芎酒洗芍藥之類或加紅花

將成就之際却紫色者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根黃
連黃芩桂枝連翹之類甚者犀角大解痘毒

鼠粘子即牛旁子

爐灰色白靜者怯者作寒者

勇者燥者熾發者作熱者

痘瘡鼠粘子連翹山查甘早此四味始終必用之藥

全白色將靨時如豆殼者蓋因初起時飲水多其靨不齊

俗呼倒靨不好但服實表之劑消息他大小便如大便

秘通大便小便秘通小便

有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以

涼藥解其標如益元散之類亦可服

暍塌者於形色脉上分虛實實則脉有力氣壯虛則脉無

力氣怯輕者用淡蜜水調滑石末以羽潤瘡上

虛痒者以實表之劑加涼血藥

實痒如大便不通者以大寒寒涼之藥少許與之下其結

糞

疎則無毒密則有毒宜早以藥解之雖數十點亦不妨無害

眼之患

瘡乾者宜退火濕者用瀉濕退火只用輕劑荆芥升麻葛

根之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥白芷防風之類

如痘瘡傷眼必用山梔決明赤芍藥當歸尾黃連防風連

翹升麻桔梗作小劑末調服如眼無光過百日後血氣

復自明

痘癰多是實毒血熱成癰分上下用藥一日不可緩已成
膿必用涼藥為主赤芍甘草節連翹桔梗 上引用升麻
葛根 下引用煥御牛膝助以貝母忍冬草白芷瓜蒌
之類 大便秘用大黃發寒熱用黃芩黃柏
痘瘡黑屬血熱涼血為主 白屬氣虛補氣為主 中黑
陷而外白起得遲者則相兼而治

初起時自汗不妨蓋濕薰蒸而然故也
痘風分氣血虛實以日子守之多帶氣血不足 虛則黃
芪生血活血之劑助之畧佐以風藥 實則白芍為君
黃芩亦為君佐以白芷連翹續斷之類

若屬寒陳氏方亦可用

入方 解痘瘡毒

絲瓜

升麻

酒芍藥

生甘草

黑豆

山查

赤小豆

犀角等分

右吹咀每服三錢水一盞煎六分溫服

又方 治痘瘡已出未出皆可服

硃砂

右為細末蜜不調服多者可減少者可無

痘瘡敷藥

貝母

南星

殭蚕

天花粉

痘瘡

痘瘡

四

痘瘡

白芷 寒水石 最多 草烏 大黃

猪牙皂角 各等分

右為末醋調傅之

附諸方

○補虛

黃芪紫草人參湯 治痘瘡表虛黑陷 即前丹溪方

黃芪 酒炒 紫草 酒炒 人參 各等分

右為粗末每服五錢水一大盞煎六分加酒服

小異功散 治痘瘡裏虛吐瀉及和胃助氣 楊氏方

人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮 木香 各等分

右為末每服五錢水一大盞煎六分服

白朮散 治裏虛吐瀉煩渴除身熱清神生津痘無顏色

首尾可服

人參 白朮 茯苓 甘草

木香 藿香 各七 分 藜蘆 一錢 一方作乾姜 止泄瀉用

右為粗末水一大盞姜棗同煎至六分溫服

大補湯 實表裏補氣血治痘瘡陷伏不紅者

當歸 川芎 白芍藥 生地黃

人參 白朮 甘草 白茯苓

黃芪

官桂各等

右咬咀大小兒每服五錢小小兒三錢水煎服

痘瘡治例

心法附錄曰小兒凡覺身熱証似傷寒若未經瘡痘疑似

未明且先與惺惺散參蘇飲或人參羌活散

熱甚者則與升麻葛根湯人參敗毒散

痘瘡已出則少與化毒湯

出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯紫草木通

湯或快斑散絲瓜湯

出太甚者人參敗毒散犀角地黃湯

小便赤澀者大連翹湯甘露飲麥門冬五苓散

大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最當或少與四

順清涼飲

若咽喉痛者大如聖湯鼠粘子湯

喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

胃腹脹滿者枳殼桔梗湯二陳加枳殼湯

煩渴者甘草散烏梅湯

若下利嘔逆者木香理中湯甘草乾姜湯

若陷入者加味四聖散更以胡荽酒薄傳其身厚傳其足

噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也獨聖散入射香陳

痘瘡

心法附錄卷之三十三

六

痘瘡

酒調劑或不用酒則木香煎湯若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散加青皮主之

然而瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其有大便秘利所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用化毒湯可也或不用亦可若大小二便一或閉焉則腸胃壅塞脉絡凝滯毒氣無從而發泄眼閉聲啞肌肉焦然不旋踵而告變矣

○發熱

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓

細辛

桔梗

瓜蒌根

人參

甘草

白木

川芎

各等分

右為末每二錢水煎入薄荷三葉同煎服

參蘇飲 治小兒時氣傷風傷寒發熱惡寒咳嗽未明痘

症是與不是疑似之間此藥甚為穩當

楊氏調解散即是此方

前胡

人參

紫蘇葉

乾葛

半夏 湯泡七次
姜汁製

茯苓 各二

枳殼

陳皮

甘草

桔梗 各二

右吹咀姜棗煎微熱服

人參羌活散

羌活

獨活

柴胡

人參

川芎

枳殼

茯苓

前胡

北梗

天麻

地骨皮

甘草

加麻黃薄荷葱白煎服

汗後尚熱宜服此去麻黃加

紫草如已見三五點如紫草陳皮赤芍使熱退瘡出

亦輕更調辰砂末半錢以制胎毒

消毒救苦散拔萃方治癰疹悉具消化便令不出如已出

稀者再生癰

麻黃

羌活

防風

川芎

藁本

葛根

蒼朮

酒黃芩

生黃芩

柴胡

細辛

橘皮

紅花

蘇木

生地黄

酒黃柏

連翹

黃連

生甘草

吳茱萸

右剉如麻豆大每服五錢水一盞煎去粗熟服

三豆子湯治天行豆瘡但覺有此證即服之

赤小豆

黑豆

菘豆

甘草節

右淘淨水煮熟任意食豆飲湯十七日自不發

惡實膏

用惡實子為末蜜調貼顙門上免有患眼之疾

○熱甚者

升麻葛根湯 加山查大力子其瘡稀疎而易愈

川升麻 甘草 白芍藥各一錢 葛根半一錢

右咬咀作一服水一盞半煎八分溫服

人參敗毒散 方見前

涼膈散 治小兒瘡疹未出三焦積熱煩躁多渴及面赤

面熱頭昏咽燥喉咽腫痛口瘡便溺赤澁狂言譫妄睡

卧不安並宜服之

大黃 朴硝 甘草 梔子仁

黃芩 薄荷葉各兩 連翹兩四

右為末每服二錢竹葉五片蜜此多少水一盞煎六分溫

服

若瘡疹已出發熱作渴脈實悶亂便實者亦宜服此便
不實者切不可服恐內虛而毒氣不能發外也

謹按瘡疹已發有寒熱溫涼不同形氣盛衰之異虛寒
者用異功散實熱者用涼膈散有起死迴生之効若以

實熱為虛寒用異功散虛寒為實熱用涼膈散死生在
反掌之間慎之慎之

○已出

化毒湯 治瘡痘已發以此消毒

紫草茸半兩 升麻 甘草各二錢半

右剉散每服二錢粳米五十粒同煎服

○出不快者

四聖散簡易方治小兒瘡疹出不快透及倒靨一切惡候

紫草茸

木通節去

甘草

枳殼去白麩炒各等分

右吹咀每服二錢水一盞煎服

加味四聖散

紫草

木通

黃芪

川芎

木香等分

甘草炙

右為粗末水煎服 大便秘加枳殼 大便如常加糯

米百粒 楊氏曰糯米能解毒發瘡

紫草木香湯 治瘡出不快大便泄利

紫草

木香

茯苓

白朮等分

甘草多少許

入糯米煎服 楊氏云紫草能利大便白朮木香佐之

紫草木通湯

紫草

人參

木通

茯苓

糯米等分

甘草炙

右剉煎二錢溫服 內虛大便利者可入南木香紫

草

快斑散

紫草

蟬殼

人參

白芍各二錢半

木通錢

甘草錢半

右剉散煎二錢溫服

又方

紫草錢五

陳皮錢

黃芪錢三

赤芍錢五

右剉加糯米百粒煎三歲已上服三錢已下一錢服後

瘡徧勻四肢住服

絲瓜湯

絲瓜連皮燒存性為末湯調楊氏云發痘瘡最妙或

加甘草紫草

消毒散和神方治毒飲聖遺壯熱心煩瘡疹難出未能勻

透

牛蒡子炒六兩

荆芥穗兩一

甘草錢二

防風

升麻各一兩半

右咬咀每服二錢水一盞煎服如大便利者不宜服

○出太甚者

人參敗毒散方見前

犀角地黄湯

犀角兩一

生石膏兩二

赤芍錢七

牡丹皮兩一

右咬咀三歲兒三錢水煎

○稠密者

加味犀角消毒散

惡實四兩

甘草兩

防風兩

荆芥穗兩

宜加山查酒苦參酒洗紫草減食加人參

右為末煎紫草煙米芫荽湯調服食後臨卧日三

鼠粘子湯按萃方治癰子已出稠密身表熱急與此藥以

防已後青乾黑陷

鼠粘子香炒

當歸身酒洗

甘草各一錢

柴胡

連翹

黃芩

黃耆各一錢半

地骨皮錢

右為粗末每服二錢水煎去滓溫服空心藥進且休與

乳食

○小便赤澀者

大連翹湯

連翹

瞿麥

荆芥

木通

車前

當歸

防風

柴胡

赤芍

滑石

蟬蛻

甘草各一錢

黃芩

山梔子各半錢

右吹咀作一服用姜三片水一鍾煎五分不拘時服

甘露飲子

生芩

熟芩

天門冬去心

麥門冬去心

枇杷葉去毛

枳殼去穢

黃芩

石斛

重刊 卷之三十三 二頁十五

瘦物
心法附錄卷之三十三
五

山茵陳
甘草炙各等分

右剉每二錢水一盞煎八分食後服

五苓散

加麥門冬煎服方見中暑

○大便閉結內煩外熱者

小柴胡湯

加枳殼同煎服方見傷寒類

四順清涼飲子

當歸
赤芍
大黃虛者煨實者生
甘草各等分

一方加陳皮粳米煎

○咽喉痛者

如聖飲子

桔梗
甘草生
鼠粘子炒各二錢
麥門冬三錢

右為末竹葉同煎二三錢

一方加荆芥防風重者竹瀝同煎

鼠粘子湯

鼠粘子炒四錢
荆芥穗一錢
甘草一錢
防風半錢

右為細末沸湯點服
去防風名消毒散

○喘滿氣壅者

麻黃薑苓湯
麻黃錢三
赤芍
黃芩各二錢半

豆倉
心法附錄卷之三十三
五

桂枝各半

右咬咀作一服用姜三片水一鐘煎五分不拘時服

○胃腹脹滿者

桔梗枳殼湯

枳殼

桔梗各二兩

甘草炙半兩

右剉姜煎

二陳加枳殼湯

半夏

橘紅

茯苓

甘草

加枳殼各等分

右剉姜煎

○煩渴者

甘草湯

甘草

瓜蒌根等分

右為末每一錢煎服

烏梅湯

小黑豆

菴豆各一合

烏梅二箇

右咬咀新汲水一碗煎取清汁旋服

人參麥門冬散

集驗方

治發熱煩渴

麥門冬去心

人參去蘆

甘草炙

陳皮

白朮

厚朴姜製各半兩

白朮

厚朴姜製各半兩

白朮

厚朴姜製各半兩

右吹咀每服二錢水一盞煎六分去粗溫服不拘時

○下利嘔逆者

木香理中湯

本方中加木香甘草乾姜方見中寒

○陷入者

加味四聖散方見前

胡蔓酒

以荒蔓煎酒薄傳其牙厚傳其足噴其衣服併以厚

綿蓋之

獨聖散

牛旁子錢炒五白殭蚕錢半

右末入紫草三莖同煎連進三服前條云獨聖散入

射香陳酒調劑如不用酒則不香煎湯調服

又方

穿山甲湯洗淨炒焦黃為末每服半錢入射香少許木

香煎湯調下或紫草煎湯入紅酒少許調下

○黑陷者

宣風散

檳榔二

陳皮八

甘草各半

黑丑四兩半

二右為末每一錢量七小與服蜜湯調下

無價散

御藥院方

治癰瘡不出黑陷欲死者

人猫猪犬膈晨燒

少許微將蜜水調

百者救生無一死

黃金萬錠也難消

右將前四物於臘日丁辰日未出時貯於銀鍋內用炭

火煨令烟盡白色為度但是瘡發不快倒壓黑陷者及

一切惡瘡每用一字空湯調服其効如神

一說人糞用九歲以下無疾童子者猪猫犬糞用未破

陽雄者先於重九日各置且於淨處飼之以飯勿令雜食

過旬日換盡腸之宿垢去收其糞陰乾候臘八日日未

出時燒

百祥丸

紅葉大戟不以多山陰乾漿水煮極軟去骨日中暴

乾復納元汁中煮汁盡焙為末水丸如粟米大每服

一二十九丸研赤芝蘇湯下

又湯氏方 治小兒疳疹黑陷者

羌活

川山甲

醋炒生人骨

火煨存性各

半兩即人牙

射香

右四味為細末麻黃薄苜煎湯調一錢只用一服便起

萬不失一

乳香散

治痘瘡既收心痛不可忍者餘毒歸心急煎乳

香散服之

乳香半錢或一錢

右用水一盞煎服

一方加沒藥赤芍藥當歸同煎

○疔毒

四聖丹 治痘瘡中有長大紫色者為疔毒把住痘瘡不

起發急用簪尖挑破紙入此丹

玳瑁三五粒 犀角尖 磁器

豌豆四十九粒 燒灰存性

頭髮燒灰存性

右為細末用搽面油臘脂調成膏子將兒在溫暖處

存忌風寒穢氣先用簪尖平撥開疔口將藥紙入疔內

即時變為紅白色餘瘡皆起 又嘗見有疔痘者但挑

破出其黑血即愈或挑開用口啞去黑血或用綿裹指

甲指出黑血展去亦可蓋自疔痘破而毒氣得散也

○愈後諸疾

五福化毒散 湯氏方 治疹痘餘毒未解并上焦熱壅口齒

出血

玄參一兩

桔梗去蘆八錢

赤茯苓

人參

牙硝別研各半兩

青黛二錢

甘草一錢

射香別研

右為末入青黛和勻煉蜜為丸如芡實大金銀箔為衣

磨生犀水化下 齒血臭氣用生地黄汁化下

人參白朮散 錢氏方 治痘已靨身熱不退此藥清神生津

除煩止渴

人參 白朮 藿香葉 木香

甘草 白茯苓 各一兩 乾葛 二兩

右改咀每服三錢水一盞煎六分溫服不拘時

雄黃散 集驗方 治小兒因痘瘡牙齦生疳蝕瘡

右同研極細末量瘡大小乾糝其上

綿蛋散 陳氏方 治因豆瘡身體肢節上有疔蝕瘡膿水不

絕

用出蛾綿蛋不拘多少以生白礬槌碎置其內炭火

燒令礬汁盡取細研乾糝瘡上

穀精草散 陳氏方 治豆已靨眼目翳膜或癭澁多淚

穀精草 一兩 生蛤粉 二兩

右為末積豬肝一葉以竹刀批作片子糝藥在內用

繩縛定於磁瓦器內貯水慢火煮熟令兒食之

一方 治癩瘡入眼 張子和方

麩炒蒺藜炙甘草 羌活防風等分搗

每服二錢將水下 撲雲見日直到老

又方 張子和方

硃砂

腦子

水銀

麝香各等分

右四味研為細末用水銀調滴耳中

一方 治小兒出瘡疹眼內有雲翳瑞竹堂方

輕粉

黃丹各等分

右為末竹筒吹入耳內左眼有翳吹右耳右眼有翳吹

左耳即退

麥湯散 治水痘陳氏方

地骨皮半分

麻黃一分

甘草炙半

人參一分

滑石半

大黃紙裹一分

羌活各一分

龍亭蘆紙隔一分

右為末每服半錢水一盞小麥七粒同煎十數沸服

○陳氏痘疹證治

凡小兒瘡疹未出已出之間有類傷寒之狀其瘡疹病證

自然憎寒狀熱身體疼痛大便黃稠此乃是正病也若

無他疾不宜服藥

凡瘡疹先分表裏虛實若虛實不分則無所治如表裏

俱實者其瘡易出易靨也如表實裏虛者其瘡易出難

靨也

凡初覺豆瘡可用胡荽酒透房噴之以辟穢濁之氣則豆

瘡易收又急乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則豆瘡不入

眼內

若痘疹已出未出之時或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛速與十一味木香散治之以和五臟之氣

若痘疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛也速與十二味異攻散治之以表六腑之氣

若瘡疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或腹脹或瀉渴或氣促是表裏俱虛也速與十二味異攻散送下七味豆蔻丸治之以助五臟六腑表裏之氣若纔覺傷風身熱未明是與不是瘡疹便宜發散可服四味升麻葛根湯

若瘡疹始出一日至五七日之間雖身熱或腹脹足稍冷者或身熱泄渴者或身熱驚悸腹脹者或身熱汗出者皆不宜服升麻葛根湯已上四證宜服十一味木香散治之

若瘡疹始出一日至十日渾身壯熱大便黃稠是表裏俱實也其瘡必光澤起發肥滿易壓而不致損傷也

若痘瘡已出發熱口乾煩渴不止者切不可飲冷水亦不可食蜜及红柿西瓜等冷物又不可妄投清涼飲消毒散等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙則難治咬牙者齒橋也乃血氣不榮不可妄作熱治之

痘疹 心法附錄卷之三十三 二十一 癩
若痘瘡雖出不快皆言毒氣壅盛妄謂其熱以藥宣利解
散致令臟腑受冷榮衛澁滯則氣血不能衝貫皮膚肌
肉其瘡不得起發不得充滿不得結實不能成痂故多
痒塌煩躁喘渴而死皆因宣利解散之過也縱得其生
而必罕矣

若瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者煎十一味木香散送
下七味肉豆蔻丸治之如瀉止住服不止者多服

若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能靨
也如身溫腹脹咬牙喘渴者難治綠水穀去多津液枯
竭而欲飲水不止者蕩散真氣故多死矣速與十一味

木香散救之

若四五日不大便者可用肥嫩猪胰一塊以淡白水浸火
煮軟熟取出切如豆大或皂子大與小兒食之令臟腑
滋潤使瘡痂易落百無滯礙切不可妄投宣藥恐內虛
瘡毒入於裏傷兒真氣

若六七日身壯熱不大便其脉緊盛與三味消毒散微得
利即住

若小兒神氣軟弱瘡疹自初出兩日至十三日當忌外
人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡疹

若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不

愈者只服七味人參白朮散

若痘瘡欲靨已靨之間或不能靨腹脹煩渴者不可與水
蜜若飲者轉渴而死急煎十一味木香散救之

若痘瘡欲靨已靨之間頭溫足指冷或腹脹瀉渴氣促者
不可與水蜜若飲者即死急煎十二味異攻散救之

若十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧卧則
噎氣煩渴咬牙急煎十二味異攻散更加木香當歸以

救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物食之速死

若十二日十三日瘡痂已落其瘡癩猶黯或凹或凸肌肉
尚嫩不可澡浴亦不宜食炙煖物又不宜食五辛五味

并有毒之物恐熱毒薰干肝膈眼目多生翳障若不依
此禁忌必為小兒終身之患用兩味穀精草散治之

若痘瘡已靨其痂欲落不落煩渴不止均不可與水蜜西

瓜红柿等冷物食之若食之轉生焦渴或頭溫足冷或
腹脹或時瀉或咬牙以致難愈速與十一味木香散救
之即瘥

若身壯熱經日不除別無他證以六味柴胡麥門冬散治
之熱退住服如不愈只服七味人參白朮散治之

若身壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡氣餘
毒未盡以四味射干梔子湯治之如不愈者以七味

人參白朮散主之

若風熱咳嗽咽膈不利三味桔梗甘草防風湯治之如不愈者以七味人參白朮散主之

若涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤以十六味人

參清膈散治之如不愈只服七味人參白朮散立効

若痰實壯熱胸中煩悶大便堅實臥則喘急以五味前胡

枳殼湯治之

凡痘瘡首尾不宜與水喫少與冷熱湯則可若候與之瘡

靨之後其痂遲落或身生癰腫若鍼之成瘡蝕瘡血水

不絕甚則面黃唇白以致難愈者何也蓋脾胃屬土外

主身之肌肉祗緣飲水過多濕損脾胃搏於肌肉其脾

胃飢肉虛則津液衰少津液衰少則榮衛滯滯榮衛滯

滯氣血不能周流凝結不散故瘡痂遲落而生癰腫也

若微作渴者以六味人參麥門冬散治之如不愈者只服

七味人參白朮散治之

若身熱大渴以七味人參白朮散治之如不愈者只服十

一味木香散治之

若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身

溫渴者或身熱面銹白色渴者或寒戰渴不止者或氣

急咬牙渴者或飲水轉渴不止者以上九證即非熱也

乃脾胃肌肉虛津液衰少故也宜服十一味木香散治之如不愈者更加丁香官桂多煎服丁香或裏官桂發表其表裏俱實而瘡不致於瘳塌喘渴死矣

若痘疹已靨未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪搏於膚腠之間則津液澁滯故成疔蝕瘡也宜用雄黃散綿繭散等藥治之久而不愈者潰骨傷筋以致殺人

九斑駁疹毒之病俗呼疹子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤斑通體也九發赤斑者十生一死發黑斑者十死一生

難治葛根麥門冬散生地黃散主之

○廣按丹溪癩疹豆瘡各立病目所治不同而陳氏瘡疹混同立論豈不誤哉夫豆瘡出於脾其間有熱燥者有寒濕者而癩疹出於心肺心肺屬陽多是風熱兼痰而作宜於通聖散中消息之陳氏此篇却言斑疹乃是肺胃蘊積熱毒每因時氣所觸而作用葛根麥門冬散生地黃散治之乃合病情可見瘡疹不可一途而治也明矣

九豆瘡或悞抓成瘡膿血淋漓緣血氣衰肌肉虛故也切不可用新牛糞燒灰貼之其臭穢反觸其瘡宜用敗草

散治之仍服十一味木香散加丁香肉桂煎服

黃帝問曰飲有陰陽何也好飲冷者冰雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陰虛用木香當歸每一兩藥共加一錢異攻散能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血使豆瘡易出易靨不致痒塌木香散性溫平能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽之藥也蓋治小兒腹脹瀉渴其効如神不能盡述大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生長者也今瘡疹之病臟腑調和則血氣充實自然易出易靨蓋因外常和煖內無冷氣之所由也

凡痘疹五不治一痒塌寒戰不止者二紫黑色喘渴不寧者三灰白色陷頂腹脹喘渴者四頭溫足冷悶亂飲水者五咬牙氣促泄瀉煩渴者皆難治

若痘瘡已出七日之間其瘡不光澤不起發根窠不紅痒塌抓搔謂之表虛也可隨證服藥蓋脾主身之肌肉肺主身之皮毛今豆瘡出是肌肉皮毛受其證也治法先當調和臟腑滋養血氣使脾不虛而肺不寒表裏沖和其瘡自然易出易靨也故經云表病裏和不治而自愈也

今將豆疹輕重開具于后

輕者 作三次出 大小不一等 頭面稀少

眼中無 根窠紅 肥滿光澤

重者 一齊并出 如蚕種 稠密

瀉渴 灰白色 頭溫足冷

身溫腹脹

輕變重 犯房事 不思食 先曾瀉

飲冷水 餌涼藥

重變輕 避風寒 常和 大便稠

今將豆疹方開列于后

胡荽酒

以荽煎酒送房噴之以避穢濁之氣

胭脂膏

以乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則豆瘡不入眼內

升麻葛根湯 四味 方見前

木香散 十一味

木香 大腹皮 人參 去蘆 桂心

青皮 去穢 赤茯苓 去皮 前胡 去蘆 訶梨勒 去核

半夏 姜製 丁香 甘草 銜三

右咬咀每服二錢水一盞姜三片同煎空心溫服量兒

大小加減

一方去桂心丁香加桂枝藿香

異攻散 十二味

木香

當歸 各三

官桂 去粗皮

茯苓 去皮

白朮 各二

人參

厚朴 姜炒

肉豆蔻

丁香

陳皮 各二

半夏 姜製

附子 炮去皮 各錢半

右咬咀每服二錢水一盞姜五片肥棗三枚同煎空心

溫服量大小加減

一方去丁香附子加藿香乾姜

肉豆蔻 七味

木香

縮砂仁 各三

白龍骨

訶子肉

肉豆蔻 各半

赤白脂

枯白蘇 各七

右為細末麵糊為丸如黍米大一歲服三五丸三歲

服百丸米飲湯下瀉甚者煎異攻散吞下瀉不止多服

或瀉水穀白色淡黃色木香散送下

消毒散 出後身壯熱不大便其脉緊盛用此微利

牛旁子 四兩

荆芥穗

甘草 各一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

人參 麥門冬 散 六味

出後身反發熱煩渴者 方見前

人參 白朮 散 七味 出後身壯熱大渴嘔吐泄瀉 方見前

人參 白朮 散 七味 出後身壯熱大渴嘔吐泄瀉 方見前

柴胡麥門冬散 六味 出後身壯熱經日不除

柴胡 炙 甘草 炙 人參 去蘆 黑參 各二錢半

龍膽草 半錢 麥門冬 三錢

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

射干鼠粘子湯 四味 壯熱便實口舌生瘡咽喉腫痛

鼠粘子 炒香 甘草 炙 升麻 射干 各一兩

右每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

桔梗甘草防風湯 三味 治風熱咳嗽咽膈不利

桔梗 甘草 炙 防風 各等分

右每服一錢水一盞煎溫服量大小加減

人參清膈散 十六味 口湧唾稠粘身熱鼻乾

人參 柴胡 當歸 芍藥

知母 桑白皮 白木 黃芪

紫苑 地骨皮 茯苓 甘草

桔梗 略 黃芩 今兩 石膏 滑石 各一兩半

右每服二錢水一盞薑二片同煎溫服量大小加減

前胡枳殼湯 五味 疾實壯熱胸中煩悶大便堅實

前胡 兩 枳殼 赤茯苓 大黃

甘草 炙 各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減如身溫

脉微并瀉者不可服

雄黃散 因痘瘡牙齦生疔蝕瘡 方見前

綿繭散 因痘瘡身體肢節上有疔蝕瘡膿水不絕者 方見前

敗草散 用蓋房多年爛草或蓋墻爛草亦可甘草經霜

露感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取草不

以多少晒乾或焙乾為末乾貼瘡上若渾身瘡破膿水

不絕粘貼衣裳難以坐卧可用二三升攤於蓆上令兒

坐卧其効如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

韶粉散 痘瘡纔愈而毒氣尚未全散瘡痂雖落其痕猶

黧或凹凸內起當用此藥塗之

韶粉兩 輕粉錢

右和研勻入煉過猪脂油調和如膏薄付瘡上如痘瘡

欲落不落當滅癍痕

又方

用羊髓骨髓一兩入輕粉一錢研成白膏以篋盒盛之

塗瘡上如痘瘡痒甚俱搔成瘡及瘡痂欲落不落用上

等白蜜塗之其痂落亦無紫黑癍痕

穀精草散 治熱毒薰於肝膈眼目多生翳障 方見前

蒼朮散 治痘瘡入眼

蒼朮

乾葛各一兩

槐花

藁本

蛇蛻

防風

枸杞

白茯苓各二錢

黃芩

川芎各半兩

白菊花

木賊

甘草各二兩

蟬蛻四錢

乳香

沒藥各半錢

硬石膏兩

穀精草三錢

右為末每服二錢白水煎食後服

菊花散 治瘡入眼

白菊花三兩

景豆殼

蜜蒙花

旋覆花

穀精草

甘草各一兩

右為末每服二錢用乾柿一枚粟米泔一盞煎乾為度

取乾柿食後服之

蟬菊散

豆瘡入目或病後生翳障

蟬蛻淨洗

白菊花各等分

右為末每服二錢水一鍾入蜜少許同煎乳食後溫服

量兒大小加減

葛根麥門冬散

治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根三錢

麥門冬去心二錢

石膏兩

川升麻二錢

甘草

茯苓各一錢

赤芍藥一錢

右每服二錢水一盞煎溫服看兒大小加減

生地黃散

治斑駁毒身熱口乾咳嗽心煩

痘疹

心法附錄卷之三

三十一

方思智

生地黄兩

麥門冬去心

杏仁湯泡

款冬花錢

陳皮錢

甘草半錢

石每服二錢水一盞煎服量兒大小加減

麥湯散 治水痘 方見前

○廣按瘡疹之源蓋由母妊娠之時飲食煎炒炙煿厚味醇酒見在腹中浸漬食母血穢蘊而成毒伏於五臟之間及生之後或因外感風寒內傷生冷跌撲驚恐時氣流行觸動鬱火發於肌膚之間心臟之毒為癩肺之毒為疹肝臟之毒為水泡瘡脾臟之毒為膿泡瘡小兒稟厚毒少氣血調勻表裏充實則易發易

壓局或稟弱毒盛表裏虛氣血弱必須醫藥調治庶幾有生前輩明醫錢仲陽氏出究其病源是熱是燥故用辛涼之藥以清熱潤燥及陳文中氏出又見病源之中有寒濕者故用辛溫之劑以溫寒散濕此二先生兩得之後之宗錢氏者惟知辛涼之是務而寒濕者不宜宗陳氏者惟以辛溫之是從而熱燥者不可小兒罹此禍患可勝計哉苟能用二子之長而無二家之弊斯可也故丹溪朱先生曰痘瘡看氣血虛表裏虛用補又曰瘡乾者是火宜退火瘡濕者是濕宜瀉濕又曰爐灰白色靜者怯者作寒看勇者燥者

痘疹

心法附錄卷之三

三十一

方思智

歛發者作熱看先生之言可謂活潑潑地矣以此觀之小兒痘瘡表裏充實者固不必於藥而虛中有寒濕者與夫虛中有熱燥者必須於藥也今將附方補虛及痘瘡治例具之於前使小兒痘瘡屬熱燥者宗之又以陳氏痘疹證治附之於後使小兒痘瘡屬寒濕者宗之後之業是科者必以補虛為主視其形色脉證寒濕熱燥及天時寒暄而分治之嬰孩之幸也又按王節齋論曰丹溪痘瘡治法最為明備近世通用陳文中木香異攻等方乃一偏之術若痘瘡陷伏淡白色及內瀉渴腹脹者此屬虛寒宜用陳文中方若裏盛稠密紅紫者及大便燥結者此屬熱毒急宜涼血解毒自陳文中一方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救痘是胎毒古人治法只解毒然吐瀉裏虛則使毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊必須詳究丹溪陳文中二法通用斯無弊也○痘瘡屬虛寒者直可延至十數日後方死屬毒盛轉紫色者不過七八日蓋痘是胎毒自內出外一二三日方出齊毒氣尚在內出至六日則當盡發於表七八日成膿而結

痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反內入臟腑故
須於六日以前毒氣該出之時急服涼血解毒之藥
以驅出之六日以後醫無及矣故其死最急若虛弱
毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日
久而後死此虛實輕重之分也○痘瘡多者是毒氣
多便先宜解毒然多則恐氣血周貫不足故隨後亦
宜兼補藥以助成膿血

丹溪心法附餘卷之二十三終

丹溪心法附餘卷之二十四

休寧東山古庵方 廣勳之類集

雜治門

論倒倉

百有

丹溪心法

○倒倉法治癰毒盡癩等證推陳致新扶虛補損可也
下用黃色肥壯牛腰肉二斤或十五斤順取長流
急水於大鍋內煮候水耗少再添湯不可用冷水以肉

