

感
死
噴
後



感心寶筏卷之二終

救逆述古

逆者汗吐下三法与病相逆也救逆者救其誤治之變症也仲景
一百十三方每每因救誤而設茲特彙集救誤諸條分汗下兩門
以便查閱

誤汗例

傷寒脈症當服麻黃湯發汗若尺中脈遲是營氣不足不可發汗若
誤汗之遂漏不止（亡陽）惡風小使難四肢微急難以屈伸（汗多
陽虛津液表不固而液亡）此津脫陽虛也當以桂枝加附子湯回
陽止汗（和營衛而散邪加附子以回陽補虛）

即汗尺遲滯拘不可發汗誤汗而津脫亡陽外風復起此勢所
必然也

傷寒發汗過多至人叉手自冒心（汗多則心軍虛故叉手外散也）
心下悸眩白按其（液）心軍餒而心跳眩白按虛則甚實也（桂枝
甘州湯主之）三味辛甘相合補助心陽生陽化軍之良劑也（蓋汗
為心液過多則心軍虛桂枝甘州能扶陽以補心軍也若至振（
地）陽虛飲邪上逆水軍凌心（則當用真武矣）壯腎陽而鎮水逆（
邪汗妄汗傷心液）心軍餒而心悸与心下有水軍而悸者迥別
傷寒汗出惡風脈浮緩微弱桂枝症也誤以大黃乾汗之致至人厥
冷筋惕心下悸（誤汗而坎陽外亡腎火上炎挾骨水凌心故心下

悸与上條心靈而悸者不同一於眩熱仍不退身肉跳動振之則擗地者一擗據也眩動之極心体不安思則據地以自固也一云武湯主之一此湯降火利水壯骨陽而益水逆為少陰治水而設一內德少陰水逆外救太陽亡陽

邵評後汗過多亡骨陽而水筆上侵凌心作悸与上條心靈而悸者不同

按此二條同是汗後心悸至因各異若條心靈筆拘液亏而悸見症义手外赤脈明者按純是虛象故用桂枝甘竹辛甘扶陽而補心筆後條心悸乃發泄而於眩筋惕跳動振之擗地等症是過汗而骨陽外亡虛火上炎水筆凌心為患故用去武湯壯骨陽而益

水逆此与陽虛外亡又有分別陽虛外亡者但頭回逆湯以回陽
此則兼有水飲故必用三武湯降火而飲水也辨症之際毫釐千
里可不慎歟

傷寒脈浮臣以火迫劫至汗致亡陽驚狂起臥不安一火迫劫汗心
陽外亡故驚狂起臥不安一宜桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆
湯主之斂攝心陽至狂自定矣

邵評陽虛心之陽即神明也亡陽者火氣通於心神被火迫而
不守則外亡也故用桂枝救逆牡蠣取至補心鎡逆而用脫故曰
救逆去芍藥者邪至急復心陽耳

脈浮宜以汗解誤以火灸之邪急從出因火而感病從腰以下必重

而痺火逆也（陽邪因火逆而虛感入于陰分故腰以下重痺也邪因火迫而在陰故曰火逆）火逆又誤下之以虛至陰後因燒針以益至陽致煩躁者桂枝甘草乾骨牡蠣湯主之

邵評火逆燒針又復下之三番誤治陰陽俱已虛竭煩躁者驚狂之漸也心陽內傷故用桂甘以復心陽之氣乾牡以安煩亂之神的是正法

後汗多致亡陽譫語（汗為血之液汗多亡陽亡則陰亡津血耗竭胃燥而有譫語也）此能胃實不可下柴於桂枝湯和至毫刺以通津液後自愈

邵評少陽不可發汗汗則津液越出必胃燥而譫語故用柴於

桂枝湯和五苓散上其得通津液以下胃和則愈

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解（白虎主症）脈洪大者（白虎主

脈）胃中津液乾而火獨盛也白虎加人參湯主之

邵評服桂枝汗大出而大煩渴脈見洪大至邪已去太陰之表

而入陽明之裡矣陽明為津液之府熱邪內入津傷火盛故

用白虎加人參湯清熱存陰為治的甚正法

下之後復發汗晝日煩躁夜而安靜（晝煩夜靜者邪未盡而陽已

虛陰者不傷也）不嘔不渴（裡無邪也）無表症（無惡寒於痛之

表症）身微熱脈沉微者此邪已退而陽氣衰也乾姜附子湯主

邵評此條下及復汗晝煩夜靜無表裡症而脈沉微是純陰無
陽之象陽將去矣幸此微熱未除煩躁不寧之際獨任干姜
附子以急回至陽為治也

傷寒若吐若下及心下逆滿（飲停於中則滿）膈上衝胸起則眩
（逆於上則奪冲而眩）脈沉澀沉澀者支飲之脈也（復發汗動
經身為振之搖也）一發汗則擾動至經而飲入於經則身振之而
動搖也）茯苓桂枝白朮甘草湯主之此示陽虛陰蓄（此飲邪內
蓄之症）而致於身振搖即其武死之經也

邵評尤在淫曰此傷寒邪解飲蓄之症逆滿奪冲寒飲上揚於
膈也故令於眩脈沉為在裡且既經吐下復發至汗則陽益

虛而津液耗故身振搖也。与此湯導飲和中益陽固表柯
韻伯注此症是木邪侮胃吐下之心陽等內擾故心下逆滿
裡虛等逆則等上冲胸起則邪眩表陽虛也脈沉緊為邪肝
木犯胃則邪在裡而反發汗以攻表經絡更虛寒邪由經
而入裡陽等外虛不能主持治脈故一身振搖也。此湯和
經散寒益陽補陰此說與尤說不同錄存以備合參然當從
尤注為是

傷寒脈浮自汗（陽明自汗生）小便數（陽明裡症）舌紅微惡
寒（陽明表症）以上俱似桂枝症（病在陽明之表）表裏宜和脚
掣急（陽明裏症）此一症與桂枝症獨異乃陰虛之象反與桂枝湯

於攻其表此誤也（一誤表損陽之故）
一為之便厥咽中乾煩躁吐逆
也（一陽傷陽越虛陽躁擾見此假熱之象）
有陽越之象作甘竹乾姜
湯（先復陽散寒）
予之以復其陽（此胃陽也）
若厥愈足溫者更作
芍藥甘草湯（復和其營血與之）
其脚即伸（此湯純陰以復其陰
陰陽兩和至脚即伸矣）
若胃氣不和澹語者（為若此者用桂枝
干姜之辛熱傷耗胃液耳因中焦有留邪也）
少與潤胃承氣湯（微
滌痰涎所結之邪則澹語自止）

邵評此症既陰虛於下而又陽逆於上則必先復陽氣而後
至陰氣故用甘草干姜辛甘以復其陽之復則厥止而足溫
矣更作芍藥甘草酸以復其陰之生則兩脚即伸矣或胃

不和而澹語少與潤胃承寧和胃則愈

發汗後腹脹滿者汗（汗多陽傷寧不行也）一虛邪入裏也（至人本

虛）厚朴生姜半夏人參湯主之

邵評此汗後寧虛寧不行而腹脹滿至人內雖作脹外無脹形故湯中用人參甘州甘溫補中而益元寧然陰補則愈寧涕故用厚朴姜夏竹寧而除脹滿此補泄兼行之法也

誤下例

傷寒誤下之續為下利澹者不止（妄下而亡胃陽之從內脫中下二焦無火不能腐化水也）身疼痛者（裏有未盡之毒凝泣則骨節不利而痛）急當救裏宜四逆湯（扶陽抑陰此下利不止陽寧

下脫雖有身痛表症當以救裏為急（下利清谷而身疼痛表裏皆
困然幸此表邪未除裏邪有可救之機用此先裏後表是救急法）
救裏之後身疼痛法使自調其急當救表宜桂枝湯（和營散邪）此
因法未已止而身痛不除故也（溫裏之心裏和而表不解救表亦
不可後矣仍從表治也）

即詳寒邪在裏而誤下脫虛內寒而下利法在胃陽已亡矣身
疼痛邪在表也雖表裏皆困然脫爭內虛妄以為散邪之地
故必先溫其裏之第固而身痛未除表未解也再當治表不
然表邪內入而為患矣

傷寒方下後復發汗心下痞（下後裏虛）惡寒者（汗後表未解）表

未解也不可攻痞當先解表之解乃可攻痞一裏實表虛內外皆病
表裏持交裏強於表仍當用先表之裏先汗後下之法與上條救急
之法不同也 解表宜桂枝湯攻痞宜大黃之連瀉心湯

邪汗大下後汗正虛邪入心下痞而惡寒邪入裏而表未罷當
先解表而後攻痞之或能解表邪必復入裏為患況痞亦未
必能解可

太陽病下之成厥位一脈數而時一止為促此脈促是陽虛無力必
也一胸滿者桂枝去芍藥湯主之一芍藥益陰犯陽虛者所宜故去
之 益中氣虛而表邪仍在故用桂枝而去芍藥若微兼惡寒者陽
虛尤重也桂枝去芍藥加附子湯主之（溫經助陽）

邵評此治妄下陽虛寒結之正法

又評風寒在經本氣下注謬下而陽氣大傷至脈必虛而無力
胸中虛滿按之必軟而不痛乃邪客胸中而無實熱在邪仍
在陽分胃陽因下而傷寒邪將結而聚故用辛甘溫藥以陽
引而奪之微惡寒者陽虛而陰氣凝聚者方恐不勝任故加
附子以通陽而逐陰邪也

太陽病下之微喘者一誤下邪未入裏而表不解胸中之氣不利乃
寒喘也一表未解也桂枝加厚朴杏仁湯一用此湯解表散邪下氣
定喘一

邵評此是寒喘誤下而表氣不固故不用麻黃而用桂枝加厚

杏若熱邪淫肺作喘多用麻黃石甘湯誤用桂枝湯感則斃
耳

服桂枝湯或下之（妄下水結中焦病根在心下而病机在膀胱沈
法只可利而不可散）仍取痛項強翕之發熱無汗心下滿微痛（
表邪未解與心下之水相搏不解故無汗而心下滿痛也）小便不
利者（着眼此症為病在裏）桂枝去桂（病不在表故去桂）加茯苓
白朮湯主之（水飲內蓄故加苓朮利小便燥停飲也）此心下雖滿
不硬而痛當微乃心下有水象故也（凡表未解而內有水象之症
不可攻表必先治飲而心下可解此小便不利表邪挾心下水飲為
患一若小便利邪仍在太陽之表須發汗今小便不利病在太陽之

府能桂枝未罷也。但當利之。小便一。是太陽傷府之本病。用逐飲以利小便。飲去則滿痛自除。但以膀胱水利則太陽之表裏悉悉平耳。

邵評太陽經病挾水治以小便。府病挾水治以五苓散。臨症時務須細辨。

本太陽病。反下之。因而腹滿。時痛。此引邪入陰也。桂枝加芍藥湯主之。一。妄下而轉屬太陰。能太陰本病。乃誤下傷也。表病未罷。故仍用桂枝以解外。滿痛既見。倍加芍藥以和裏。病本於陽而入陰。故用陰以和陽。一。大實痛。邪等結於太陰之裏。桂枝加大黃湯主之。一。太陽轉屬陽明。而胃實。尚未離乎太陽。有此表裏。悉仍用桂枝加大黃。

以除寒痛乃双解表裏法也

邪汗因誤下必引太陽之邪入裏其邪未盡離乎太陽自表而入似明自表而生用桂枝以去太陽未盡之邪加芍藥以和裏靈之腹痛加大黃下裡實之痛也

太陽病桂枝症反下之熱邪下陷利遂不止一證在腸胃熱邪乘虛入裏下迫而利不止一脈促者一證而有力為陽盛也今為促而身大異也表未解也喘而汗出者一陽邪內擾裏熱傳逆一葛根黃芩芍藥連湯至之一解陽之表邪清胃府裏熱一因表未解故用葛根因喘汗而利故用芍藥之苦以洩之望之

即評本太陽桂枝症法宜解表而反下之裏虛邪入陽重起利

表裏俱熱症似虛而脈實勿踏虛下之咎用葛根之經法以
解肌苓連苦寒以清裏甘竹和中喘除利止表裏俱解矣
又評脈位出數而肘一止也為條胸滿脈位是陽虛寒用桂枝
去芍藥其則加附子辛溫系扶陽散寒此條脈促喘而汗出
是陽感熱入用葛根苓連辛寒系解肌清熱同是促脈辨在
陽虛陽感皆邪熱邪全在有力無力中分生用藥之寒溫如
同冰炭學者可不細心辨認乎

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔此少陽的症以湯藥下之不應又
以丸藥下之（少陽柴枳症不當有下利症今反利其知醫以丸藥
下之邪併陽明而胃實為匠之誤也）因日晡潮熱（陽明胃實也）

已而微利一誤下所致潮熱者胃實也然發少陽之邪宜先用小柴
於以解外（先解少陽之表邪加芒硝以除陽明之裏實）後以柴枳
加芒硝主之（先表後裏之法）

邵評此少陽經邪因誤下而成胃實之症為少陽之併病胃
實者可下而症兼少陽則不可下故用小柴枳以解外加芒
硝以治裏實

太陽病過經十餘日反二三下之後二三日寒熱而嘔柴枳症仍在
者先与小柴於湯（太陽病半日餘有柴枳症者太陽之邪遽至少
陽不可下反屢下之至人寒熱而嘔柴枳症仍在者因至人不靈故
樞机有主而不為壞病當先与小柴於湯以和之）嘔不止心下急

鬱、微煩者，狂有裏症未解也。與大柴於湯下之，則愈。

邵評服小柴於後而嘔不止，心下滿痞而鬱、微煩者，此邪氣鬱滯於裏，胸膈窒分之熱，邪出不出，邪結不結，裏未解也。當大柴於下至熱，則愈。亦先表後裏法也。

傷寒八九日下之，胸滿煩鬱，小便不利，譫語，一身盡重，不能轉側者，柴於加龍骨牡蠣湯主之。此是太陽少陽之邪，因誤下入裡，以致正氣虛而擾動少陰之手經，現症錯雜，亦隨症施治。

邵評下之，若邪內攻而胸滿，邪痺於上也。小便不利，火盛水乏，邪痺於下也。煩鬱者，邪劫於心而神明內亂也。譫語者，邪結於胃，此病之在裏也。一身盡重，難以轉側，此是陽內而陰

及外少陽之樞机不利筋脈骨肉並受之邪此病之在表也

也夫合表裏上下而為病者必兼陰陽補瀉之劑以施治俾
內表裏虛實治應曲當而錯雜之邪庶可盡能耳此是下
亡陰之症與火逆亡陽之症不同

又評此太陽病併以少陽因下而兼入胃府之症與此湯外以
解熱邪內以除火泄兼鎔浮越之象而補益中州之虛也

邪位太少未故仍用柴於桂枝柴今半反治胸滿也乾骨鉛丹牡蠣
治驚煩也人參甘州補正氣也小便不利茯苓澹語大黃勿重不能
轉側桂枝散也

傷寒五日已發汗而復下之胸脇滿微結一此內已痞結而表邪

未罷乃邪聚於上也。心下痞病在胸膈也。小便不利渴而不嘔。一
熱勝於內也。但於汗出往來寒熱。心下煩也。此為未解也。柴胡桂
枝干姜湯主之。一但於汗而身無汗。又有往來寒熱。心煩之症。邪
未解。夫邪聚於上。熱勝於內。而表又未解。是必合表裏以為治。故用
柴胡以解外邪。干姜牡蠣以散結。芩芍除心煩。而解熱渴。炙州
佐合諸藥以散邪和裏。為三表七裏之治法也。一此本少陽症。而誤
汗下之。柴胡症仍在。故仍用柴胡。加減心煩不嘔而渴。故去芍。及加
枳實根。胸膈滿而微結。故大棗加牡蠣。小便雖不利。而心下不悸。故
不去芩芍。不加茯苓。雖渴而表未解。故不用參。而加桂枝。以干姜易
生薑。考散胸中之滿結也。初服煩即微。其芩芍枳實之功。健服汗出。

便愈其桂枝柴於之力也

即評此亦太陽轉入少陽之症此微結是指心下痞結病在胸脇與陽微結不同也

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者一妄下之凶也邪結於胸中邪未盡入於胃也乃邪結心胸而痛者在上焦一未明解也抱子致湯主之此病發於陽而誤下之凶也未除而內熱又結於心中故結痛抱子致湯所以宣通其邪也

即評心中結痛身熱不盡其邪未盡入裏與結胸症之心痛而身不熱者不同抱子致湯散邪微其輕於小陷胸湯之瀉實除其是火鬱發之之法也

傷寒醫以九葉下之方熱不去（表熱內寒）微煩者梔子干姜湯主之（心微煩而不懊懷他實利所宜故去豆豉而加干姜取其散散不取在上越耳）此以九葉之下則寒爭為中可知可用梔子以解微煩干姜以逐內寒而散表熱寒因熱用熱用寒用也

邵評九葉妄下熱陷寒為分熱不去內無結痛而見微煩知正氣虛不能與邪相爭為外熱內寒之症故用梔子以微胸中陷入之邪干姜以復下業損傷之氣也

傷寒下之心煩後滿一邪已入胃滿而不燥一越臥不出者梔子厚朴湯主之此因誤下移邪於心胃故用梔子以治心煩枳朴以洩後滿一表邪未解而誤下之邪入而壅於高兮心下之爭不為宣越因

而腹滿心煩起臥不安邪入較深矣所謂邪爭壅於心腹之間者也
故用枳子陳煩熱去致之上升而易枳朴之下泄以去滿也（是兩
解心腹之物用也邪雖在胃飲未燥硬則不可下此為小承氣之先
着

邵評此痞邪已入胃則不可吐飲未燥硬則不可下此枳子厚

朴湯重於枳致而輕於承氣也

大陽病（痞本利標）外症未除（是表不解）而數下之（誤下而邪
入裏正爭屢傷）遂協熱而利（下不止）是裏不解正爭益虛矣
心下痞硬（正爭虛而失運至痞硬為虛）表裏不解（陽虛而表甚
裏寒故謂之有表裏症也）桂枝人參湯主之此因數下之心雖初

因腸熱而裏必虛寒故用溫補

邵評此症表裏俱虛至病根在心下此平熱何能化痞而致硬
此甘瀉氣以止利解表用理中加桂枝以解表裏之法此條
雖不言脈至脈微約可知

又評喻嘉言白設利止則至邪可化裏解乃下痢不止是裏解
無邪設結開則至邪可化表解乃心下痞硬是表解無邪此
際明解表裏之邪全賴中氣為之敷布否則上下交征中氣
立虧至能解耶理中湯加桂枝一法握樞而運玄無為之上
理矣

傷寒服湯藥以下藥妄下傷下焦不利不止此利至病在胃 心

下痞攻瀉心湯已（宜服瀉心湯開痞是已）此言已服瀉心湯而
痞開也（復以他藥下之利不止）此利病在大腸（一誤再誤以
理中與之利益甚）理中湯泥送中焦治犯不善但病在下焦故服
之而利益甚（理中則理中焦也）此利在下焦（大傷消脫）未下脂
膏悍糧湯主之（此因下藥太過手陽心大腸受傷開閉不圓二味瀉
以固脫也）復利不止當利至小使蓋分其瀉濁則使自安（屢下之
而愈也）益虛下利不止以理中湯甘泥之藥補之利難益甚而治不
為逆此利不止乃下焦不納而滑脫故用石脂禹糧饒澁下焦以固
脫乃服之而利猶不止其以胃主下焦為胃之關之門不利分主之
所瀉濁不別故也當利小使以分消之

柳許服清心湯已心下之痞奪既除而中焦脾胃之爭亦豁然
矣後与下系大腸滑脫利遂不止以理中溫補而利益甚此
利在下焦次用瀉利以收之復利不止者下焦當勝脫上口
利在小便以分導之則無餘治至愈自可必也

厥陰寒格（寒熱格拒上中二焦） 醫後吐下之致食入即吐干姜
黃連蒼朮人參湯至之（醫不於至寒熱虛寒而後吐之下之遂至
兩寒格拒食入即吐与此湯用至寒格而清中焦之熱以兼補裏虛
也） 此陰格於下拒陽於上而為吐故用芩連之若寒以此熱干姜
之辛溫以通寒格誤吐誤下中氣必虛故用人參安胃和中（寒格
而後吐下之裡事虛而陰寒益甚胃中之陽被格而上逆脾中之陽

被抑而下注洵不堪堪吐下爭至食入即吐逆之極矣若用寒治逆則寒益凝結或僅投泄利必枳拒不入故用芩連干姜之苦辛寒熱並行以開寒極人參以扶正也）至吐自止

即詳寒熱相阻則為極危寒熱相結則為極危此病難於愈故用清心之半

後汗吐下交虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心下懊懣枳子豉湯法宜之一汗吐下交正氣既虛邪氣亦衰未盡之邪方入裏而未集已虛之氣邪勝邪而未散故煩亂而不得眠甚則反覆顛倒心中懊懣不安也與枳豉湯以散胸中之邪為除煩止躁之良劑耳）此因三法後正氣虛實邪雜去而正餘邪因虛為於上焦結於脾胃之間

汗下所能除也惟清定之一汗吐下後邪熱未解客於胸中因生
煩躁陽擾亂不以與眼內經云至高者越之故用枳子豉湯以清胸
中之煩一則得邪結氣不出矣

即汗陽明之虛煩與太陽不同心胸居胃上即陽明之表凡心
胸有病者陽明表邪在治法亦與太陽大異太陽之表當汗
而不當清定陽明之表當清定而不當汗太陽之裏當利小
便而不當下陽明之裏當下而不當利小便今人但知汗為
解表故於仲景大法中但知汗下而遺至清定之法耳枳豉
湯本為煩躁設又可以清定陽明之虛煩乃陽明之表劑也
廉按仲景之於吐但瓜蒂散一方前人以枳子豉湯為吐劑也

謬矣惟隱菴惟令韶所辨甚當閱之自知其誤

救逆新法

故人云汗多亡陽者因差汗太過力之陽氣隨汗而走泄也（陽
虛不守隨汗而外亡也）下多亡陰者因屢下而重傷陰血也（液
傷陰竭目下而脫絕也）桂枝下咽陽盛則斃者（表實陽盛誤
用辛熱傷陰而敗壞也）因表實無汗陽氣內盛誤投桂枝如抱
薪救火也承氣下咽陰盛則亡者（症犯陽而不可攻下誤用硝黃
陽氣滅絕也）內無實熱誤用苦寒陽傷而絕滅也（要知汗多亡
陽（衛陽虛者多汗犯宜）是兩事本虛之人陽盛則斃（陰亏陽
盛忌用辛熱）是陰液本亏之症也下多亡陽由在陽氣本盛止

傷陰分（陽邪奪盛本恐傷陰）用下法邪不去而津液銷亡也
陰盛則亡由（陽奪本衰不禁陰系也）陰寒邪盛本慮傷陽誤
用苦寒陰益盛而陽爭衰弱也（故論症於今當以汗多亡陽下
多亡陰為戒）蓋汗本津液所化而風系尤能燥去津血胃中本無
熱邪而承氣即能銷滅（至陽用鍼救誤治條以佐古法所未逮
傷寒如經發表多者則津液內竭血不榮筋以致手足攣瘳二便艱
澀（此二症津傷所致）當以加味逍遙散（逍遙方中有柴胡可以
散邪）加生地柏杞鉤藤

邵評過表汗多陰液傷耗而筋脈失養則手足攣瘳津枯熱結
則二便艱澀也養血營筋兼以疏利的是正法

傷寒過表二候三候不解大汗不止（元氣外泄）舌卷而黑（熱灼津枯）身位似喘（陰傷氣竭）六脈洪數無根者（正虛而邪盛未化故脈洪數而無根此陰竭陽浮邪散之脈也）已成敗症也當以大劑左歸（壯水以救陰）合生脈（保肺扶元）挽之汗止喘定間有身生者（表汗過多灼陰傷津氣液兩脫也）

傷寒過經不解舌燥口渴小便不利者（病久津液受傷熱伏未化肺之化源失机故燥而小便不利）此發表風氣太過津液源竭也宜左歸飲（救陰）去茯苓加芍藥（保肺）歸芍以救津液自然行矣（病久津耗肺傷陰竭）

傷寒過經不解（病久正虛）發表攻裏不當以致表陰耗竭二候燥

結不出(陰傷其結則二便不通)胃陰大傷不納不飢(胃津亏乏
拿不寬行故不納不飢)宜一味養正滋陰(忌消伐之劑)使胃陰
充足自能納食知飢(陰液充而邪自化)宿垢自下左中飲合生服
(壯水生津)或甘露飲加人參

邵評病久元氣已虛復誤表誤攻陰液耗而胃氣受傷致使閉
不納治當滋陰養胃大忌消導攻伐

傷寒如過表大汗不止(陽虛而陰液外泄)身肉瞤動於眩不起
振之於擗也考(腎陰亏而虛陽上越故瞤動而於眩)動之極神
不安而擗地也(此陽浮陰液俱脫也急以左中壯水補腎)合參
麥(保肺扶元)五味挽之

即汗表汗過多陰傷而虛陽浮越陰陽兩脫之候也用左水合
參麥救陰扶元固是但當參用和陽轉運之品水就蠔龜板
白芍之類更妥

傷寒誤表大汗不止津液外泄胃陰虛餒以致嘔思不已一汗多津
傷胃陰虛而有疫熱一食入即吐者胃氣上逆宜金水六君煎加
麥冬沙參和中以復津液自然嘔止而愈矣

即評此誤表汗多陰液耗而有疫熱胃氣上逆之誤救法

水過表大汗胃陰虛以致乾嘔呃逆不止一陰液耗而氣逆一水
漿不進一虛火上升而格拒胃氣不降疫熱內阻亦宜金水六君
合生脈（金水同流）加丁香柿蒂枳實代赭石（溫胃鎮逆）之

類以止之如不應宜都犀角（納犀溫胃）加人參於梅肉紫石英
（納骨而銜氣）之類以納之不用磁石者因過表傷脾恐吸至掌
也

邵評此過表汗多脾胃傷犀逆不降之救誤法

有陰虛挾感之症誤用柴葛犀角升提之藥發表以致霍陽上冒膈
悶嘔噎（犀火上升）烦躁不寧（陰虛陽冒）六脈洪大按之無力者
（陰傷陽不戀陰而上越故脈不斂也）亦宜金水六君合參麥加
代枳（育陰理肺以銜逆）和中以益少陰則陰陽和熱睡而解矣
邵評陰虛受邪誤用升散陰傷而陽不附陰嘔噎烦躁肌大無
根當加育陰潛陽為是

有芤虛散拍之人挾感惡寒發熱腰疼骨痛（芤血虛也）不可峻
汗誤用表藥汗大泄反加惡寒身痛（散拍芤衰發熱不止）（虛熱
也）當以歸著建中湯和芤散則診症自解矣

邵評芤虛而挾邪當調和芤散治之

凡遇外感表症診內兩手脈寸微（陽弱）尺遲（陰虛）舌潤無苔者
（虛症舌也）芤散兩虛之症也當以歸著建中湯加防此汗之

邵評此憑脈用藥調和芤散兼以散邪之良法

如經攻裏不當以散下利不止（妄用攻下元氣大傷脾陽之故
下利）百骸解散無氣以動（陽氣虛而不能營養百脈也）用大劑
補中益氣加炮姜（扶正化邪）溫之提之如兼汗生而喘急（肺腎

奪逆陽虛脫一用參附湯加熟地大溫大補之

邵評此誤攻中氣大傷脾胃陽虛之救誤法

水經攻裏太過以致下焦受傷腸胃併連直漏直泄一脾胃陽奪大
虛命火衰微滑泄無度一利無閉閉考陽明閉已激也一胃為胃
關胃火衰不能蒸化則陽明之關閉無權故滑脫不止一急用梅花
湯(溫胃澀腸)重加人參主之

邵評此通用攻下胃命火衰胃腸乏滑脫不守用梅花湯澀
以固脫極是

有胃中未食未化誤下之一食在上脘未及消化治宜消導大忌攻
下—食為寒凝以致胸膈高起不可逆考一誤下則寒凝與食凝

结不开故见症如此 治宜温胃和中一温中则寒散食消三陈汤
加炮姜枳实厚朴查肉之類温以化之

邵译此下早傷中寒系与之食涕物结治以温中开化亦原救
误之正法凡停食症初起所停之物未化糟粕在胃之上脘
大忌早下宜送中导涕溪下则寒系与食互结愈不能化症
似结胸必待至已化糟粕停在胃之下脘近膈府者力可攻
下切记切记 宿食在胃之上脘可用吐法

虛後泄病述古

大病後泄腰以下有水象牡蠣澤瀉散主之
一利小便而泄下止之
水)

此脾胃虛土不能攝水故溢下其腰以下為腫也宜利小便

卻汗病後脾胃虛土不利水之溢下其而腰以下發腫古法云

以上腫者當發汗腰以下腫者宜利小便

大病瘥後身重久不了胃上有寒者以朮朮湯之宜理中丸一泄
中湯以攝水)

卻汗雖延注也中土陽虛不能收攝津液而冷涎上泛也宜理
中丸加益智仁溫納之

胃中虛寒則津液不能收攝故吞唾宜溫胃

傷寒後復虛羸少氣（津少氣短）每逆吐者（胃有虛熱氣不下降）竹叶石膏湯主之（養脾胃而清降虛火）

此津液不足故虛羸少氣虛火上炎故每逆吐宜養脾胃之陰則津液復流痰自除矣

抑汗脾胃津少每饑餒者挾胃火上升竹叶石膏湯却是正法
惟竹叶宜易竹茹

病人脈已解而入暮微煩以病新瘥人強與去脾胃氣者不能漸去故令人微煩損去則愈（脾胃氣者宿食未消）

陽明旺於申酉戌宿食在胃故日暮微煩（此三時陽明主時即

日晡也故日暮微炊）當小下之以損宿食枳實枳子豉湯主之
邵評中壘強發脾不健運宿食由為此即食後之難也

大病瘥後勞復者枳實枳子豉湯主之（一病心中壘勞倦更受外邪
而復病曰勞復先散在上焦邪為治）若有宿食者加大黃如博
枳子大五六枚（勞復而兼內有宿食者內外俱病也稍加大黃以
治裏）

此勞復因病後中壘邪氣又結於上焦其症不一故不著其病形
惟散在上焦之邪是矣

邵評正虛而復受外邪病之變見不一故不定症形當隨症治

有宿加大黃此指勞後之有宿食在腸中故可下（若宿食未入腸中不可下）此治食後也若宿食在胃脘當消導在上脫吐三亦可（此二法當切記）

產後諸病新法

產後浮腫

感症瘡及肢體浮腫者（土壅不能制水）溢於皮膚脈絡間（脾虛有水故也）須實脾利水宜冬朮枳朮芍藥白扁豆山藥木瓜車前澤瀉之類治之或以米仁糯米煮粥食佳

那詳有不因於水而亦浮腫者此元氣大虛肝木侮土名為筆腫與水腫見象不同須分別治之

產後昏沉

感症瘧疾十餘日或半月漸至昏沉其皆緣於汗未盡餘邪在於心胞故也或兼潮熱或兼寒熱似瘧宜連翹梔子豆豉枳實茵陳波竹葉鉤藤丹參之類清之解之

仰許邪在心包症見昏沉然有度熱內伏者亦見昏沉宜分辯之

汗後形瘧

傷寒發汗後惡勞略減形瘧仍在也邪未盡也宜再汗之若汗後反劇而煩擾者必挾火挾度或挾斑疹未透宜細審之

仰許形瘧雖是表危然有所陽度火渴熱上攻內因且有虛

實之不同當審因治之若凡大汗反熱不是脈不靜者作危
症數之或誤發溫病泄泄之汗亦反劇

解心額熱

水熱退心額熱未除目神^似覺呆鈍此胃中停滯未清額帶陽明故
濁熱宜清之^二陳加連翹蒼朮山查神麩之類清之^和之

即詳胃中食邪熱逆逆故額熱未除陽明行身之熱額為陽
位陽盛則熱也清和的甚正治

解心腹熱

水身已涼獨腹熱未除一腹系太陽得有火內伏故腹獨熱也此脾
火內甚也養陰中加生白芍白朮

感症身涼及者不可鳴耳聾等症乃解邪為於少陽也宜養陰藥
中加柴於芫蒲鉤藤也菊通竹為叶之類以清解少陽之熱

邪汗耳聾一症非熱少陽然其因不一有虛寒之不同皆聞竅
於耳骨虛熱脫則耳聾也度火上升阻閉清竅耳可亦聾又
溫其熱病之耳聾由于陰邪感不聞少陽藥用柴於升提
桂之各因虛寒不同當分別施治

產後語蹇

感症熱退之後舌舌粘動不靈語言蹇澀不清其亦係邪為肝脾所
攻宜加味消遙散去白朮加生薑鉤藤芫蒲夕對天虫之類

邵評心脾皆三經之脈者縈繞於舌心腎虛則舌不靈動度且
脾經肝風內擾則語言蹇澀症不流總是虛風度大為病以分
因治之

產後不寐

感寒熱退之後夜不眠竊共胃不和也溫胆湯知之驚悸不寐苦心
爭壘也（心爭壘而神不斂當安神以斂心陽加事仁遠志

解後效救

水熱退之後尚有熱救未除一病後效救是抑胃津少而有存邪戀
肺也（此存熱在肺也宜滋養肺胃之陰至救自止如南沙參麥冬
骨皮知母川貝以解花粉散杏仁桑皮蔗汁梨汁之類或加生地

玉竹之類

邵評凡感外邪而有病者症見效救至病為輕以至邪傷入肺
肺主皮毛邪從外達也內傷虛症見效則重五臟傷乘師受
火刑水源涸竭每每死症故效救一症虛實病因當細細分
辨而治焉

產後盜汗

感症瘡後餘熱盜汗不止者陰虛有火也當歸六黃湯加減

邵評陰方火盛內蒸燔灼津液外泄也育陰湯火圍表為治
無患惡寒而盜汗不止者陽虛也黃耆建中湯加減一陽虛營衛不
和而汗出也調和營衛治之自汗不止者亦陽虛也玉屏風散加

牡蠣龍骨以之

邵評兩陽靈均不能固護腠理表靈而自汗出也矣表固藩之
法此方極驗

產後妄言

凡傷寒惡病必有身涼熱退之後其人水癡言語謬妄此心神靈
散不復所致但當調養寧血兼治其心故也神復妄言自止

邵評病退而妄言人癡自是心神靈散但度火燥邪內伏包絡
汗坦諸症亦有此症當辨別論治

產後吐涎沫

吐涎沫此土靈不能攝水也六君加益智仁攝之若其稠飲自下其

漾、而起溢出口中者此謂奪不納濁陰上泛也宜多等飲加胡椒
補骨脂以納之或少佐熟附以收之或佐白朮以制之

邵評涎沫者寒飲也吾人胃有寒飲病由脾虛土不制水、飲
上逆而吐也病源脾胃者在中焦治以溫胃和脾條飲之法
若尾下其泛上而生者是胃陽大虛陰濁上干是腎水上泛
之危急者泥納胃陽能逆制水主治

解後下血

感症解後復有下血者乃失汗之候邪也當漬之生地丹皮地榆川
斷槐朮白芍苳仁黑荆芥之類治之自愈

邵評病得下血由於初起失汗邪不外達而內入陽邪甚感熱

傷陰而血下溢也治以清熱涼血和血之法

產後頭暈

遺毒（惟邪當涕洟中而成毒）因汗下法解未盡至邪結於少陽
於二經遂於兩頭其陽明部位也（陽明行身之前故兩頭屬陽明）
遂於耳之左右者少陽部位也（少陽行身之側故耳之左右屬少
陽）宜連翹敗毒散消散之如二活荆防連翹赤芍牛蒡桔梗土貝
夕菊薄荷銀花甘竹之類少陽加柴胡此症初起速宜消散後則成
膿（熱毒邪爭壅阻爭血不即消散腐化為膿最速）如元等症其後
兼歸著補托潰膿法宜大補爭血為主（不用補托恐正虛而邪內
陷故宜大補爭血）然遂於陽明者易治遂於少陽者難治

邵評陽明多爭多血且為中土之物所歸氣所傳變故易流少
陽為胆之為潔淨之府受邪則難治

癩^瘧後酒復

感症勿涼後因飲酒復熱以臣性熱有大能助解邪故也必兼煩悶
乾嘔口燥不納等症急用以連葛花連翹生枳椇烏梅銀花等解
之

邵評解邪未盡內忌以助其熱火胃熱爭升而後病也宜清熱
和胃治之

瘧後食後

感症起退之後胃氣未復解邪未盡若納食太驟則運化不及解邪

假食滯而後作也一者退胃虛停邪未盡又後傷食引初停邪而後
病也一名曰食復至症仍發熱於痛煩悶不納宜枳實枳子豉湯加
生查肉麥芽連翹萊菔子一邪食上蒸故發熱於痛此傷食而兼有
外邪故用枳實消滯枳子瀉熱豉以散外邪加味俱消食之品
等源治之無火舌潤不渴其調中湯亦可一無火者無邪熱也舌
潤不渴中陽虛也只有食滯故用溫化

瘧後勞復

感症瘧後元氣未復停邪未盡稍加勞動至熱復作即多澀梳於洗
面及衣之類皆能致復既經後熱必有停火停邪結於中所以仲景
主以枳實枳子豉湯蓋豉散表邪枳子瀉裏熱枳實開胸中停邪

之結凡治勞後當以此方為主（治虛而有邪之主方）如兼嘔惡痞
滿（度伏陽於）加半夏竹茹如見舌苔口渴（陽的胃熱）如苔蒼連
細如兼飽悶（食滯中宮）挾食加查肉麥芽如兼形癆惡寒（復受
表邪）加蒼術葱白如兼寒熱寒多加桂枝紫葳熱多加柴苓一二
劑必復汗而解此屢試屢驗不可妄投補中以致閉邪均病（
虛而有邪純補則閉病加

邪汗病由元靈解邪解火為結於中又加勞初復受外邪而病
故名勞後此虛而有邪用表裡並治之法此與但虛無邪之
勞後自是兩種

軍寇勞後

亦有瘧疾作火解邪已盡止因正年大寒因勞後熱微兼惡寒四肢
倦怠無筆以初服靈石大(中靈之脈)長潤無芒(靈症舌苔胸膈
寬暢考(無邪之徵)此立筆靈勞後也(此勞後是勞倦內傷之症)
宜補中益氣湯(甘溫補中)甘溫補之升柴以蜜炙汗多惡寒(陽
虛筆約)歸著建中湯最妙

邵評病退邪去勞而後作見症俱是靈象與上條扶邪勞後之
症不同

陰虛勞後

熱病傷陰腎氣已亏稍加勞動微挾風寒至病後作(熱傷陰液腎
精虧乏勞動而後受邪外亦是勞後)症似於痛發熱惡風(表邪

見症) 舌燥(陰傷于虛) 口渴六脈浮數者(表熱) 此陰虛勞傷也
凡後症必挾風寒外邪仍宜枳子豉湯加蔥白芍藥鮮生地沒竹叶
麥冬骨皮之類微汗之(撤表而清裏熱) 如見太陽加羌活湯的加
葛根少陽加柴胡(三陽經加法)

瘧疾色後

感症瘧疾身血未充早犯房事則內損去氣外縮邪氣復作也
症形重不舉目中生花(陰傷邪伏) 腰脇痛小腹裏急後痛皆寒後
患(邪深入裏) 或陰火上衝於面烘熱胸中煩悶(虛火上炎) 是也
若卵縮入股脈離經者死舌伸出數寸者亦死宜六味飲加麥冬豆
豉乾子蒸湯潤下燒裨散若小腹急痛脈沉位冷(腎陽亦傷邪深

入陰) 改用當歸四逆加吳茱萸湯(此厥陰經之表劑) 蒸成潤下
燒裨散

邵評病後等陰內虛早犯房事三元大傷而後看外邪、入下
其陰分銷鍊陰核為病極重臨危極宜知辨

瘧後調理

如至人中等虛者病退後必納去少遲化遲(脾虛不運) 或大便不
實或惡心吐涎(見症是脾胃中虛) 宜六君子加減以和中(調胃
和脾) 形寒畏冷(陽虛者) 宜黃耆建中湯(補中扶陽) 溫補
之(以上中虛故用陽藥) 凡此症脈皆緩大(脾虛之脈) 舌皆白嫩
(陽病中虛之舌) 可辨如至人陰分虛者必有解邪未盡(一掃胃陰

傷伏熱未盡一長燥口渴二飲艱澀（津亏有熱陰液不充）脈兼微
數（虛熱脈象）等症宜生金滋水飲或甘露飲加減養之（滋養脾
胃陰液清化伏熱此是陰靈治法）

邵評感症熱退之後有宜和中有宜養陰者調理之法須分
等靈陰靈

瘡後禁忌

大病後正氣未復凡飲食起居俱不可不慎也如忌有甘脆（助火
生濕）肥鮮生冷（肥甘生冷最傷脾胃）等物皆不可犯只宜糜粥
自養少食而頻則易消化不可過飽（傷中）及他有所食雜思之勿
食也（此飲食中之宜忌）

新瘧後當靜臥犯但體動勞後即梳頭洗面濯足多言皆能令人勞
後（此起居之當慎）若新瘧未滿百日而犯房事共不洗一邪乘虛
而深入難難醫治

陰陽易

男女新愈交接病男傳不病之女曰陽易病女傳不病之男曰陰易
此感五情邪而生疾也（此是爭感轉移之病邪入至深陰傷氣耗
氣石難救）至症多至卒之百節解散於至不舉目中生死（一見症
年色改於心者上衝胸一虛火上升）惶急忙起於面大熱在男子
則陰腫痛引小腹（邪入下焦至陰之地）在婦人則裏急痛連腰膝
甚者手足冷而拳拳男子卵陷入腹婦人痛引陰中皆難治也若久

舌吐出其死治法用竹茹半升益湯調下燒裨散（此是移精變氣
之方法）有粘汗出陰於微腫（邪爭外出）為效或用菲白根一握
兩取夫十の枚（用濁味入於至陰以通陽連下）水益候冷服取粘
汗為效亦可調下燒裨散

感症宝筏

云經古方 分量參用古方通今

麻黃湯一

麻黃 一銖二分

桂枝 八分

杏仁 一石二分

炙甘草 四分

右四味以水二盞四分煮取八分

桂枝湯二

桂枝 一石

白芍 七分半

炙甘草 五分

生姜 七分

大枣 二枚

右五味以水一盞の分煮取八分

大青龙湯三

麻黄

一石二分

桂枝

一分

甘草

一分

杏仁

五十

石膏

二斤

生姜

一斤

大枣

一枚

右七味以水一盞八分煮取二分

小青龙湯の

麻黄

一分

生白芍

一分

炙甘草

一分

乾姜

一分

桂枝

一分

北细辛

一分

姜半夏

一分

五味子

一分

右八味以水二盞煮取一分

葛根湯五

葛根

一斤

麻黃

一斤

桂枝

一斤

白芍

一斤

甘草

四兩

大棗

十二枚

生姜

半斤

右七味以水二盞煮取一斤

麻杏石甘湯八

麻黃

一斤

杏仁

一斤

石膏

一斤

甘草

四兩

右四味以水二盞煮取一斤

桂枝加厚朴杏仁湯九

桂枝

一斤

白芍

一斤

大棗

十二枚

生姜

半斤

甘竹 〇
厚朴 〇
杏仁 〇

右七味以水一盞煮取二分

桂枝麻黃各半湯八

桂枝 〇
芍藥 〇
白芍 〇
生姜 〇
甘草 〇

麻黃 〇
大棗 〇
杏仁 〇

右七味以水一盞煮取二分

五苓散九

澤瀉 〇
茯苓 〇
白朮 〇
桂枝 〇
猪苓 〇

白朮 〇

右五味為散開水送服三錢

桂枝二麻黃一湯十

桂枝 八分半 白芍 八分 大棗 八分半

麻黃 五分半 甘草 五分半 杏仁 三分半

右七味以水一盞半煮取分

桂枝二越婢一湯十一

桂枝 八分半 白芍 八分半 甘草 八分半 麻黃 八分半

大棗 八分半 石膏 八分 生姜 八分

右煮法同前

麻黃連軀赤少豆湯十二

麻黃 八分半 連軀 八分半 赤少豆 八分半

杏仁 平 梓白皮 為 生薑 切

甘州 切 大棗 二枚

右八味以潦水二碗先煮麻黃沸去上沫內諸藥煮取一碗分

服二服一日服盡

以上皆太陽門古方

瓜蒂散 十三

瓜蒂 切 赤小豆 切

右二味為散先以香豉二盞煮湯七分煮倍稀糜去滓取汁和

散溫頓服之

白虎湯 方

石羔 五小 知母 九卜 粳米 乙下

甘州 三下

右四味以水二盞煮取一盞二分去滓内粳米煮取二分

独苓汤十五

独苓 乙下 泽泻 乙下 茯苓 乙下

滑石 乙下 阿膠 乙下

右五味上四味以水一盞二分煮取二分内膠令消

大承气汤 十二

大黄 乙下 厚朴 乙下 枳实 乙下

芒硝 乙下

右四味以水三盞煮二物取一盞半去滓內大黃煮取八分內

芒硝令消

小承氣湯 十一

大黃 下 厚朴 下 枳實 九下

右三味以水二盞煮取八分

大黃 下 甘草 下 芒硝 下

右三味以水一盞八分煮取八分內硝令消

茵陳蒿湯 十九

茵陳蒿 下 枳子 七分 大黃 下

右三味以水二盞煮茵陳蒿取一盞二分內二味煮取二分
以上皆湯的門古方

小柴胡湯 二十

柴胡 八分 黃芩 一分 人參 一分 甘草 一分
生姜 二片 大棗 十二 半夏 一分

右七味以水二盞四分煮取半去滓再煮取二分
黃芩湯 廿一

黃芩 九分 大棗 二枚 甘草 一分 白芍 一分
右四味以二盞煮取二分

大柴胡湯 廿二

柴胡 八分 芍药 二两 白芍 二两 大枣 二两

半夏 一升 枳实 四两 大黄 一升 生姜 一升

右八味以水二盏四分煮减半去滓再煎取二分

小建中汤 廿三

白芍 一斤 桂枝 六两 甘草 二两

大枣 十二枚 生姜 一两 胶饴 一斤

右五味以水一斗四分煮取六分去滓内胶饴更上微

火消解

柴胡去芍药加桂枝姜根汤 廿四

柴胡 二斤 芍药 二斤 枳实 四两 甘草 二两

大枣 三下 桂枝 半 生姜 三下

右七味以水二盞四分煮取半去滓再煎取二分

煮連湯廿五

黃連 一分 甘草 一分 乾姜 一分

桂枝 一分 人參 三下 半夏 九下

大枣 一分

右七味以水二盞煮取一盞二分

以上皆少陽門古方

理中湯 廿六

人參 二 白芍 二 乾姜 二 炙甘草 二

右四味以水二碗煮成一碗每服一碗一日兩服

四逆湯 廿七

甘草 子下 乾姜 九下 附子 九下

右三味以水一盞半煮取二分

四逆加人參湯 廿八

甘草 子 乾姜 七分半 附子 二下半 人參 半

右煮法同前

三物白散

巴霜 下 桔梗 下 川貝 示

右三味研勻每服一分開水調下

桂枝加大芍藥湯 三二

桂枝 芍 大枣 芍 芍 芍 芍 芍

甘草 芍 生姜 芍 芍

右八味以水二碗煮成一碗食遠溫服

桂枝加大芍藥湯 三二

桂枝 芍 生姜 芍 芍 芍 芍 芍

大枣 芍 甘草 芍 芍

右八味以水一盞四分煮取二分

以上皆太陽門古方

麻黃附子細辛湯 三二

麻黄 匕

细辛 匕

附子

七卜半

右三味以水三盞煮取二分

麻黄附子甘竹湯 三三

甘竹 匕

麻黄 匕

匕

附子

七分半

右三味以水一盞四分煮取二分

附子湯 三四

茯苓 匕

白芍 匕

芍药 匕

附子

匕

白朮 匕

匕

人参 匕

右煮法同前

通服四逆加人参湯三五

甘州 子 附子 七分半 乾姜 切 人參 切

右四味以水一盞煮取二分

玄武湯 三六

茯苓 九分 白芍 九下 生薑 九下

附子 外半 白朮 下下

右五味以水一盞下下煮取下下

猪苓湯 三七

猪苓 下下 澤瀉 下下 茯苓 下下

滑石 下下 阿膠 下下

右五味上四味以水一盞二分煮取二分內膠令消

若連阿膠湯 三六

若連 子下 芩芩 三下 白芍 下

鴉子黃 一枚 阿膠 九下

右五味以水一盞半先煮三物取二分去滓內膠烱盡小冷內

鴉子黃攪令於得溫服

四逆散 三九

柴胡 八下 枳實 七 白芍 七 生甘草 七

右四味為散以水碗半為成一碗一日兩服

以上皆少陰門古方

當歸四逆湯 四〇

当归 芍药 桂枝 萝卜 白芍

甘草 干姜 北细辛 示通州

生姜 二片 大枣 二枚

右八味以水二碗煮成一碗分二时服

白朮翁湯 四一

白朮翁 升 苦柏 七分半 苦連 七分半

秦皮 七分半

右四味以水二盞煮取八分

乾姜 苦連 苦芥 人參湯 四二

乳姜 七分半 苦連 七分半 苦芥 七分半

人參 七分半

右四味以水一盞八分煮取二分

烏梅丸の三

烏梅

三百個

細辛

五分

乾姜

一分

黃連

一斤

当归

のり

附子

五分炮

蜀椒

四分

桂枝

五分

人參

五分

黃柏

五分

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米

一下飯熟搗成泥和藥令於肉内白中与密杵之隼下因水核

桐子大先食飲服十因日三服稍加至二十因禁生冷滑物

復食等

以上皆厥陰門古方

不經新方

大安煎の五

陈皮

芍

半夏

芩

茯苓

芩

甘草

芍

杏仁

芩

白茯苓

芩

老年常物不用

右六味以水一碗半加生姜三片煎二分食遠服

大泄中飲の六

熟地

三五七

冬白朮

三

当归三五

人参

二三

甘草

柴胡

三三四分

麻黄

一二三

肉桂

炒乳姜

二三

右九味以水二碗先煮麻黄去浮沫再纳诸药煮至五分温服

助盖取微汗

凉膈散

此汤分量の也

生大黄 寸

芒硝 个

个

炙子苓 寸

寸

其山柅 寸

连翘 寸

寸

苏薄荷 寸

寸

鲜竹叶 三十片

生甘草 寸

白蜜 四匙

白蜜 四匙

右八味以水二碗煮成一碗纳蜜四匙搅令消

甘露饮の八

生地 寸

寸

熟地 寸

寸

天冬 寸

寸

麦冬 寸

寸

霍石斛 寸

寸

生甘草 寸

寸

西茵陈 ㄣ 麦冬 ㄣ 生石膏 ㄣ

枇杷叶 三大片 去毛

右十味以水二碗半煎成一碗食远温服渣再煎服

小甘露饮 の丸

霍石斛 ㄣ 西茵陈 ㄣ 鲜生地 ㄣ

麦冬 ㄣ 桔梗 ㄣ 升麻 ㄣ

真栝子 ㄣ

右七味以水二碗煎成一碗食远温服渣再煎服

玉女煎 ㄣ

生石膏 ㄣ 熟地 ㄣ 麦冬 ㄣ

白知母 芍 牛 芍

右五味以水一碗半煮七分温服或冷服

六味地菴湯五二

熟地 芍 山萸肉 芍 淮山藥 芍

丹皮 芍 澤瀉 芍 浙芩冬 芍

右六味以水二碗煮成一碗温服

温胆湯五二

法研菴 芍 生枳壳 芍 仙露五 芍

新合皮 芍 浙芩冬 芍 生甘竹 芍

右六味以水二碗煮成一碗温服

導赤散 五三

鮮生地 〇

細木通 〇

〇

生甘稍 〇

八卜

沒竹汁 〇

右四味以水碗半為成一碗溫服

一陰煎 五〇

生地 〇

〇

熟地 〇

〇

白芍 〇

〇

麥冬 〇

〇

甘州 〇

〇

牛兒 〇

〇

丹皮 〇

〇

右又末以水二碗煎五分食遠溫服

香砂理中湯 五五

廣木 〇

八卜

春砂仁 〇

〇

高麗參 〇

〇

江西朮 芍 乳姜 卜 炙甘州 卜

右六味以水兩碗煮成一碗溫服

二陳湯五入

姜半反 三 新合皮 芍 浙茯苓 〇

炙甘州 卜

右四味以水碗半煮成一碗食遠溫服

太無神朮散 五已

藿香 〇 石菖蒲 牙 蒼朮 五〇

厚朴 三〇 廣皮 三〇 炙甘州 三〇

右八味為散每服三錢用生姜七分大棗二枚煮湯調服

金水六君煎 五八

当归 子 熟地 子 陈皮 子

半夏 子 茯苓 子 甘草 子

右六味以水二碗生薑三片葱二分食遠服之

左归饮 五九

熟地 二三子 山茱 子 枸杞 子 鹹水炒

甘州 一子 茯苓 子 山茱萸 一二子

右六味以水二碗葱二分食遠服

桂附八味湯 六〇

肉桂 子 附子 子 熟地 子 山萸肉 子

山茱 二 丹皮 另 泽泻 另 白茯苓 二

右八味以水二碗半煮成一碗食遠溫服

參附湯六一

別直參 二 黑附塊 二

右二味以水一碗煮成七分溫服

右归飲 六一

熟地 二 三 山茱 炒 二 山茱萸 二

枸杞 二 甘草 一 二 杜仲 姜製 二

肉桂 一 二 製附子 二

右八味以水二碗煮七分食遠溫服

白虎加犀角紫雪湯 六三

生石膏 八匕 知母 六匕 犀角 一匕 羚羊 一匕

紫雪 一匕 牛沖 生甘草 一匕 生粳米 一匕

右六味以水三碗煮成碗半去渣調紫雪分三服

竹叶石膏加牛黃清心湯 六の

鮮竹汁 四十片 生石膏 一匕 麥冬 一匕

生甘草 一匕 仙露 五 西洋參 一匕

牛黃清心丸一顆研細菜湯調服

右六味以水二碗煮成一碗去渣調服牛黃清心丸

犀連承氣湯 六五

犀角 匕 小川連 匕 元明粉 匕

四朴 匕 生大黃 匕 小枳實 匕

生甘竹 匕

右七味以水二碗先煮犀角再煮餘味成一碗溫服

瓜霜紫雪丹 不火

菱金 一百粒 磁石 五匕 磁石 五匕 踏煨 石羔 五匕 白滑石 五匕

右四石共搗碎用水一升連金煮至五合去滓入下藥

犀角屑 匕 羚羊屑 匕 杏木屑切 匕

沉香研 匕 丁香 下 元參切 下 五分

升麻 上 下 生甘竹 上 下

此八味入前藥汁中煮取一合五抄去滓入下藥

活命金丹 六七

黃仲 上 生甘竹 上 板藍根 上

牙硝 上 川大黃 為 西牛黃 末 研

玳瑁 末 舊荷 末 石砂 末 研

麝香 上 研 肉桂 上 麝香 上 下

梅冰 研 上

右為末與研藥和勻蜜水浸蒸餅為刺每兩作十丸硃砂為衣
就濕時用金箔四十張為衣臘月修合瓷器收貯多年不

壞水療風毒渣茶花下解毒藥新汲水化下汗及解熱勞病
 及小兒驚風並用薄荷湯化下以上並量大小加減服之
 阿膠鴉子黃湯六八

陳阿膠

少

牡蠣

〇

生地

〇

甘菊

〇

士白芍

〇

鴉子黃

一枚

女貞子

〇

童便一盞鐘沖

右八味以水二碗煮成一碗阿膠燉炸沖服

葉氏神犀丹六九

犀角

六兩磨汁

石菖蒲

六分

茯苓

六分

生地汁

八兩

銀花

一斤

金汁

十升

連翹 十兩 板籃板 九兩 桑枝 八兩

元參 五兩 花粉 四兩 紫州 四兩

如生晒研細切勿見火以各汁和搗為丸切勿加密如難丸可

將生煎煮爛每丸重三錢涼開水調服小兒減半

三甲服脈湯七。

炙甘草 二兩 乾地黄 二兩 生白芍 二兩

原麥冬 二兩 陳阿膠 二兩 大麻仁 二兩

生牡蠣 二兩 生鱉甲 二兩 生龜板 二兩

右九味以水八升煮取八分之二三枚分三次服

大定風珠 上

生白芍 一斤

阿膠

三

生龜板

斤

乳地黃 一斤

麻仁

三

五味子

斤

生杜蠟 一斤

原麥冬

斤

炙甘草

斤

鴉子黃 二枚

生鱉甲

斤

右十一味以水八杯煮取三杯去滓再入鴉子黃攪令於湯分

三次服

壽翁大生膏 七十二

人參 二斤

茯苓

二斤

龜板

一斤

烏骨鴉 一對

鱉甲

一斤

杜蠟

一斤

鮑魚 二斤

海參

二斤

白芍

二斤

五味子 半斤 原麥冬 二斤 羊腰子 八對

狗脊髓 一斤 鴉子黃 二十圓 何膠 二斤

蓮子 二斤 芡實 三斤 熟地黄 三斤

沙苑蒺藜 一斤 白蜜 一斤 枸杞子 一斤 炒黑

右藥分銅鍋忌鐵器攪用銅勺以有情化有情之二是情化無

情共二文火細煉三晝夜去滓再燉六晝夜陸續合為一鍋

意煉成膏末下三膠合蜜和勻以方中有刺無汁之粉為白

苜蓮子芡實為細末合膏為丸每服二錢漸加至三錢日三

服的一日一兩期年為度每殞胎必三月肝虛而熱者加天

冬一斤桑寄生一斤同燉膏再加鹿茸二十四兩為末

瘰癧古今良方

牡蠣澤瀉散 又三

牡蠣

澤瀉

栝蒌根

蜀漆

葶藶

海藻

商陸各等分

右又味若末白吹和服二日三服

理中凡 又の

乳姜

子

人參

三

白朮

之

炙甘草

乙

右四味蜜丸彈子大沸湯研和滓日三夜二服

竹叶石膏湯 又五

鮮竹叶 三十斤

石膏

乙

仙茅 乙

乙

人參 乙 生甘竹 乙 麥冬 乙

板末 乙

右三味以水兩碗煮取一碗去滓納板末煮米泔湯成泥服

枳實 枳殼 湯 乙 乙

枳實 乙 枳子 乙 豆豉 乙 乙

右三味以水一盞下分先煮二味取八分下豉煮取八分

加味逍遙散 乙 乙

柴胡 乙 當歸 乙 白芍 乙 白朮 乙

茯苓 乙 炙甘草 乙 煨姜 乙 芍藥 乙

丹皮 乙 枳子 乙

右十味為散每服三錢開水調服

當歸 芍藥 湯 上八

鮮生地 芍 熟地 之 蒼朮 升 蒼冬 芍

蒼連 芍 當歸 芍 蒼朮 芍

右七味以水二碗半煮成一碗食遠泔服

蒼朮連中湯 上九

蒼朮 芍 白芍 之 桂枝 芍

炙甘草 芍 生薑 芍 大棗 四顆

饴糖 之 (若加歸芍錢半名曰蒼朮連中湯)

右八味以水兩碗煮成一碗去滓納饴糖更上微火消解

玉屏風散 八。

黃耆 芍 白朮 芎 防風 二升

右三味為散每服の五錢加生姜二分大棗四枚加水煮服

都氣飲 八二

熟地 芍 茯苓 之 萸肉 二

山茱 二 丹皮 二 澤瀉 二

五味子 升

右七味以水二碗煮成一碗去滓溫服

補中益氣湯 八二

黃耆 芍 人參 二 炙甘草 二

白朮 乙 陳皮 升 歸身 升

升麻 示 紫柏 示 生姜 升

大棗 兩枚

右十味以水二碗煮成一碗食遠溫服

燒裨散 八三

右取婦人中裨近隱處煮燒灰以水和服方寸匕日三服小食便

即利陰於微腫則愈婦人病取男子中裨燒散

生薑泥水飲 八

生地 乙 附身 升 白芍 升

丹皮 升 人參 升 麥冬 乙

白朮

芍

炙甘草

木

右八味以水二碗煮成一碗去滓溫服