

072497

卷十一之十三

外臺秘要



唐王隱先生外臺祕要方卷十一目錄

消渴消中十八門

消渴方一十七首

近效極要消渴方二首

近效極要熱中小便多漸瘦方四首

渴利虛經脈澀成癰膿方二十一首

消渴口乾燥方三首

消中消渴腎消方八首

睡中尿牀不自覺方六首

渴後小便多恐生諸瘡方二首

渴後恐成水病方三首

虛勞小便白濁如脂方四首

強中生諸病方六首

消渴不宜鍼灸方一十首

卒消渴小便多太數方八首

近效祠部李郎中消渴方二首

將息禁忌論一首

敘魚肉等一十五件

敘茶等二十二件

敘米豆等九件

茶酒附

尙德接今有業等二十六件尙德接附字下疑脫之字

尙德接今有方九首

尙德接今有方五首

尙德接今有方五首尙德接今有方五首

唐王壽先生外臺祕要方卷十一

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

消渴方一十七首

病源夫消渴者渴而不小便是也由少服五石諸丸散積久經年石勢結於腎中使人下焦虛熱及至年衰血氣減少不能制于石石勢獨盛則腎爲之燥故引水而不小便也其病變者多發癰疽此坐熱氣留於經絡經絡不利血氣壅澀故成癰腫也診其脈數大者生細小浮者死又沉小者生實牢大者死有病口甘者名爲何何以得之此五氣之溢也名曰脾痺夫五味入於口藏於胃脾爲之行其精氣溢在於脾令人口甘此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥肥令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢爲消渴也厥陰之爲病消渴氣上衝心中疼熱肌不欲食甚者則欲吐下之不肯止養生法云人睡臥勿張口久成消渴及失血也赤松子云臥閉目不息十二通治飲食不消其湯熨鍼石別有正方補養宣導令附於後法云解衣俛臥伸腰腹少腹五息止引腎去消渴利陰陽解衣者使無罣礙俛臥者無外想使氣易行伸腰者使腎無逼感腹者大努使氣滿少腹者攝腹牽氣使五息卽止之引腎者引水來咽喉潤上部去

通接候音
談禪二音
安也靜也
宋本五作
止止作爲

消渴枯槁病利陰陽者饒氣力也

出第五卷

通按後條古人喜石宜消渴今服石者少何有此症緣酒三焦蒸騰膈燥亦致消渴不必皆由服石也但治法頗同

通接近效
渴後飲
嘔逆虛
恐成癰
水病亦用
此方
尙德按千
金無地
皮用枸杞
子十分
又按得字
下千金有
飲字
尙德按千
金生麥門
冬汁二升
尙德按千
金茯神二
兩

千金論曰夫消渴者凡積久飲酒無有不成消渴病者然則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無

加脯炙鹽鹹此味酒客多嗜不離其口三觴之後制不由已飲噉無度咀嚼鮮醬不擇酸鹹積年長夜酣

興不懈遂使三焦猛熱五藏乾燥木石猶且焦枯在人何能不渴療之愈否屬在病者若能如方節慎旬

月而膠不自愛惜死不旋踵方書醫藥實多有效其如不慎者何其所慎者有三一飲酒二房室三鹹食

及麪能慎此者雖不服藥而自可無他不知此者縱有金丹亦不可救深思慎之深思慎之凡消渴之人

愈與未愈常須慮患大癰何者消渴之人必於大骨節間忽發癰疽而卒所以戒在大癰也當預備癰藥

以防之宜服麥門冬丸除腸胃熱實兼消渴方 麥門冬去心茯苓堅白黃連 石膏碎 麥麩各八分 人參

龍膽 黃芩各六分 升麻四分 栝蘘十分 枳實五分 生薑十分 地骨皮六分 茅根切一升 粟米三合 右五味以水

六升煮茅根及粟米令爛餘十三味搗末蜜和丸如梧子以前茅根粟米汁作飲服十九日二若渴則

與此飲至足大麻亦得忌猪肉酢物

又栝蘘湯方 栝蘘五兩 麥門冬汁三升 生薑五兩 茅根切三升 蘆根切二升 右五味以水一斗煮取三升分

爲三服忌如藥法

又胃腑實熱引飲常渴茯苓湯淺熱止渴方 茯苓一作茯神 栝蘘各五兩 知母四兩 小麥二升 麥門冬五兩 大棗十二

枚去核 生地黃六兩 麥麩四兩 淡竹葉三升 右九味切以水三斗先煮小麥竹葉取九升去滓內諸藥煮取四

升分四服不問早晚隨渴卽進非但正治胃渴通治渴病熱卽服之忌蕪莢酢物

又猪肚丸療消渴方

猪肚一枚治黃連五兩栝蘘麥門冬去心知母

茯苓各四兩粳米五兩 右七味搗

爲散內肚中線經安置甌中蒸之極爛然後接熱及藥水白中搗可堪丸若硬加少蜜和丸如梧子飲汁

下三十九日再服漸加至四五十丸渴盡服之同

又栝蘘散方

栝蘘八麥門冬心甘草各六分 鉛丹八分

右四味搗爲散以漿水服方寸匕日三服忌海藻

菘菜一方有茯苓六分

又黃耆湯方

黃耆 茯苓 栝蘘 甘草炙 麥門冬去心各三兩 乾地黄五兩

右六味切以水八升煮取二

升半分三服忌蕪莢酢物海藻菘菜日進一劑服十劑訖服丸藥後腎消門中宜補丸是

又方 取七家井索近桶口結繩燒作灰 右一味以井華水服之不過三服

又方 飲豉汁任性多少差止

又方 濃煮竹根汁飲之取差止時後同

又方 煮青梁米汁飲之差止時後同

又消渴陰脈絕胃反吐食方

茯苓八兩 澤瀉四兩 白朮

生薑 桂心各三兩 甘草炙一兩

右六味切以水一

斗煮小麥三升取五升去滓內茯苓等煮取二升半一服八合日再服

尙德按千
金麥門冬
二兩知母
三兩
又按及千
金作八
尙德按千
金麥門冬
八分

尙德按千金石葦人參性心各四兩附子三兩無遺志有礎蓉四兩石斛作石葦白蜜二升作三升

又方 取屋上瓦三十年者破如雀頭三大升以東流水兩石煮取二斗 乾地黄 生薑各八兩 橘皮

甘草炙人參 黃耆各三兩 桂心二兩 遠志三兩 去心當歸 芍藥各二兩 大棗二十枚 擘白朮八兩 右十二味切內瓦

汁中煮取三升分溫四服單瓦汁亦佳一方無甘草

又療熱病後虛熱渴四肢煩疼方 葛根一斤 人參 甘草炙各一兩 竹葉一把 右四味切以水一斗五升煮取

五升渴則飲一升日三夜二忌海藻菘菜

又虛熱渴無不效填骨煎方 茯苓 兔絲子 山茱萸 當歸各三兩 大豆黃卷一斤 石葦二兩 去毛牛膝 巴

戟天 麥門冬去心各三兩 天門冬五兩 去心五味子三兩 人參二兩 遠志三兩 去心桂心 附子炮各二兩 石斛三兩 右十六

味先搗篩別取生地黃十斤生栝蠹十斤舂絞取汁於火上煎之減半便作數分內藥并下白蜜二升

牛髓一升微火煎之令如糜食如雞子黃大日三亦可飲服之佳忌酢物鯉魚生葱猪肉冷水一方有肉菘蓉

兩四

又方 桃膠如彈丸含之咽津甚佳本方瘕渴小便利復非淋

又方 蠟如雞子大酢一升煮兩沸適寒溫頓服之本方瘕渴小便利復非淋 通按小便利而且長不比淋症之澀澀也故曰復非淋

又方 水和栝蠹散服方寸匕亦可蜜丸如梧子服三十九日再服無所忌並出第二十一卷中

近效極要消渴方二首

近效極要論消渴齋來以爲難療百方有黃連湯牛膽丸爲勝亦不能好差自作此方以來服者皆差服多者卽吐水豈有更渴之理

又療消渴麥門冬丸方 麥門冬五兩 乾地黃三兩 升麻 黃芩各五兩 栝蘘七兩 苦參八兩 人參三兩 黃連 黃

柏各五兩 右九味末之以牛乳和衆手捻作丸子暴乾以飲服二十九日二加至五六十丸忌煎葷豬

肉冷水

又方 黃連五兩 苦參一斤 知母五兩 栝蘘二兩 麥門冬去心 牡蠣粉熬 人參 黃耆 乾地黃各五兩 右九味末之

以牛乳丸清漿服二十九日二服加至五十丸忌豬肉冷水煎葷

近效極要熱中小便多漸瘦方四首

近效極要論熱中雖能食多小便多漸消瘦方 地骨皮切一升 麥門冬三兩 黃連二兩 小麥八兩 人參一兩 右

五味切以水九升煮取三升八合去滓分爲三服間食服之如不能多服分作四五服亦得忌豬肉

又方 人參五兩 麥門冬去心 牡蠣粉各八兩 乾地黃十兩 知母八兩 苦參二十兩 黃連 栝蘘各八兩 右八味末之以

生牛乳爲丸如梧子清漿服十五丸日再加至四十丸食後服忌煎葷豬肉冷水

又療小便多或不禁方 兔絲子二兩 蒲黃 黃連 硝石各三兩 肉蓯蓉二兩 右五味兼雞臙臙中黃皮三

兩爲散服方寸匕日三服如行五里久又一服末有不差者忌豬肉千金名丸房散

背德接服 服千金作 飲服 又按丸房

補骨皮宋 本作生拘 杞根

黃連上宋 本有宜州 二字

千金作九
方字上宋
本有祕字

又療小便數多不足日便一二斗或如血色方

麥門冬

八兩

去心葵藿子

三兩

甘草

一兩

乾薑

四兩

桂心

二兩

地黃

八兩續斷二兩

右七味切以水一斗煮取二升五合分爲三服忌海藻菘菜生葱薤菜

古今錄驗療腎消渴瘦細

小便數赤色似血虛冷者

渴利虛經脈澀成癰腫方一十一首

病源夫渴利者隨飲小便是也由少服乳石石熱盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥腎燥則渴然腎虛又不能傳制水液故隨飲小便也其病變多發癰疽以其內熱而小便利故也小便利則

津液竭津液竭則經絡澀經絡澀則榮衛不行榮衛不行則熱氣留滯故成癰腫也

出第五卷中

千金療下焦虛熱注脾胃從脾注肺好渴利方

小麥

一升

竹葉

三升

麥門冬

去心

茯苓

各四兩

甘草

三兩

大棗

二十枚

枚去核

生薑

各五兩

栝蘘

各五兩

地骨皮

一升

右九味切先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清取八升去上沫

取七升煮藥取三升分三服忌海藻菘菜酢物

又療渴利虛熱引飲不止消熱止渴茯神湯方

茯神

四兩

石膏

八兩

地骨皮

一升

竹葉

三升

栝蘘

五兩

葵藿

四兩

門冬

二升

知母

四兩

生地黃

一宿

去心

右十味切以水一斗二升下大棗三十枚擘并藥煮取四升分

爲四服忌蕪菜

又消渴利方

生栝蘘根

三十斤

右一味切以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒

佛德按千

金無後字

佛德按千

金盤作盆

以水五斗

煮取三斗

佛德按日

三升

佛德按日

暴二字千

金作臘字

佛德按右

斛上千金

有生字宋

本同

又按小麥

千金作麥

苦參下宋

本有粉字

宋本云右

先食後服如雞子大日三服

又方 葵根五升盤六兩束切 右一味以水五升煮取三升宿不食平旦一服三升

又療渴小便利復非淋方 榆白皮二斤去黑皮切右一味以水一斗煮取五升一服三合日三服

又方 小豆糝一把搗取汁頓服日三時後文

又渴利方 栝蔞粉和雞子日暴乾更搗水服方寸匕日三丸服亦得

又療盛熱四體羸瘦渴熱不止茯苓消渴補虛煮散方 茯苓四兩石斛八兩栝蔞五兩甘草炙五昧子各三兩菴

蓉四兩母三兩黃連八兩丹參五兩人參當歸各三兩小麥三升麥藁四兩右十三味搗篩為散取三寸匕以水

三升煮取一升絹袋貯煮之日再一煮為一服忌猪肉醋物海藻菘菜出第二卷中

崔氏療消渴瘦中焦熱渴方 苦參一大斤黃連六分栝蔞 知母 牡蠣粉 麥門冬去心各五兩 右六味各

搗篩為散以牛乳和併手捻為丸如梧子大暴乾日再服飽食訖以漿水下之服二十九丸如微利減十

丸如食麩酒等即加服五丸忌猪肉出第三卷中

廣濟療脾胃中虛熱消渴小便數骨肉日漸消瘦方 麥門冬十二分 苦參 栝蔞 知母 茯苓 土

瓜根各八分 甘草炙 人參各六分 右八味搗篩蜜和丸每食少時煮蔥根大麥飲服如梧子二十九日再

漸加至三十丸忌海藻菘菜猪肉一方有黃連十一分出第一卷中

云

肘後療消渴肌廬羸瘦或虛熱轉筋不能自止小便數方 栝葉 黃連 漢防己 鉛丹各六分研 右四

味擣篩為散每食後取酢一合水二合和服方寸七日三服當強飲水須臾惡水不復飲矣陶氏廣濟文仲千金

翼同分兩小別 出第十卷中

消渴口乾燥方三首

廣濟療口乾數飲水腰脚弱膝冷小便數用心力即煩悶健忘方 麥門冬十二分去心 牛膝六分 龍骨 土瓜

根各八分 狗脊 茯神 人參各六分 黃連十分 牡蠣六分 山茱萸八分 兔絲子十二分酒漬一宿 鹿茸八分炙 右十二

味擣篩為末蜜和丸每服食後煮麥飲服如梧子二十九日二服漸加至三十丸忌生菜麪猪肉蒜

粘食陳臭酢物等

又療消渴口苦舌乾方 麥門冬五兩 茅根一升 栝葉三兩 烏梅十顆 小麥三升 竹筍一升 右六味以水九

升煮取三升去滓細細含咽分為四五服忌麪炙肉並出第 一卷中

千金口含酸棗丸療口乾方 酸棗一升 石榴子五合 葛根二兩 烏梅五十顆 麥門冬四兩 茯苓三兩

盤子三兩 桂心三兩 石寶四兩 栝葉三兩 右十味擣篩蜜和為丸含如酸棗許大不限晝夜常令口中

有津液出為佳忌大酢生葱異同出第二 十一卷中

消中消渴腎消方八首

倚德按千 金烏梅十 枚桂心一 兩六錢 又按盤千 金作盤 倚德按今 兩方九首

忌字上宋 本有不和 二字

病源內消病者不渴而小便多是也。由少服五石熱結於腎內熱之所作也。所以服石之人小便利者石

性歸腎。得石則實。實則消水。漿故利。利多則不得潤養。五藏藏衰則生諸病。焉由腎盛之時。不惜真氣

恣意快情。數使虛耗。石熱孤盛。則作消中。故不渴而小便多也。

出第五卷中

千金論曰。夫內消之爲病。當由熱中所作也。小便多於所飲。令人虛極短氣。又內消者。食物皆消。作小便

而又不渴。正觀十年梓州刺史李文博。先服白石英。久忽然房道強盛。經月餘。漸患渴。經數日。小便大利

尚德按。惚恍。于金作。

日夜百行。以來百方療之。漸以增劇。四體羸惚。不能起。止精神惚恍。口舌焦乾。而卒此病。雖稀甚。可畏也。

利時脈沉細。微弱。服枸杞湯。卽效。若恐不能長愈。服鉛丹散。立效。其間將服除熱宣補丸。枸杞湯方。 枸

尚德按。于金甘草三兩。

杞枝葉一斤。栝蘘根 石膏 黃連各三兩。甘草二兩。右五味切以水一斗。煮取三升。去滓。分溫五服。日

三夜。二服困重者。多合渴卽飲之。忌海藻。菘菜。豬肉。

尚德按。于金八味各五分。

又鉛丹散。主消渴。止小便。數兼消中。悉主之方。 鉛丹二分。熬別研入。栝蘘根 甘草各十分。澤瀉五分。胡粉二分。熬研入。

石膏研入。白石脂研入。赤石脂各五分。右八味。搗研爲散。水服。方寸匕。日三服。少壯人。一匕。半患。一年者。服

之一日。差。二年者。二日。差。渴甚者。夜二服。若腹中痛者。減之。丸服亦佳。一服十丸。以差爲度。不要傷多。

令人腹痛。此方用之。如神。已用經今三十餘載矣。忌海藻。菘菜。文仲云。腹中痛者。宜漿水飲。汁下之。亦

得。又備急云。不宜酒。下用麥汁下之。亦得。丸服者。服十九日。再服。合一劑。救數人。得愈。古今錄驗云。服

此藥了經三兩日宜爛煮羊肝肚空腹喫之或作羹亦得宜湯淡食之候小便得鹹苦即宜服後花菴

蓉丸兼煮散將息

又療腎消渴小便數宜補丸方

黃耆

栝蘘

麥門冬去心 茯苓

人參

甘草

黃連

知母

各三兩

地黃 石膏

研各六兩 各三兩 各二兩 各二兩

右十二味末之以牛膽汁三合共蜜和丸梧子大以茅根汁服

三十丸日漸加至五十丸一名茯苓丸

同

又療腎氣不足虛損消渴小便數腰痛宜服腎瀝湯方

羊腎一具

去脂

澤瀉

乾地黄

去心

桂心 當歸 龍骨 甘草

炙各二兩

麥門冬

去心

五味子

合茯苓

芎藭

黃芩

生薑

六兩 大棗二十枚

右十六味切以水一斗五升煮羊腎取一斗二升內藥取三升分三服忌海藻菘菜生葱酢物蕪荑

同

又阿膠湯療久虛熱小便利而多或服石散人虛熱多由汗出當風取冷患脚氣喜發動兼消渴腎消脈

細弱服此即立減方

阿膠

乾薑

麻子

升連志

去心

附子

人參

甘草

炙

右七味切以水

七升煮取二升半去滓內膠令烱分三服說云小便利多白日夜數十行至一石令五日服之甚良忌

海藻菘菜豬肉冷水

海藻菘菜豬肉冷水

鹿角

合焦

右一味

搗篩酒服方寸匕

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

尚德按千
金阿膠二
挺
又按千金
無人參甘
草止五味

又腎消夜尿七八升方

鹿角

合焦

右一味

搗篩酒服方寸匕

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

漸漸加至一匕半

尚德按千
金菟絲子
三合 茯苓
六兩 茅根
汁作 葑根
湯日字下
有二服二
字
尚德按千
金茯苓黃
芩各二兩

七日三湯
加至方寸
七

通按無脂
當作有脂

尙德按盤
疑當作盆

又黃耆湯主消中虛勞少氣小便數方 黃耆 芍藥 生薑 當歸 桂心 甘草各二兩 大棗三十枚

門冬去心 乾地黄 黃芩各一兩 右十味切以水一斗煮取三升去滓空腹溫分三服忌海藻菘菜生葱

蕪莢

古今錄驗論消渴病有三一渴而飲水多小便數無脂似麩片甜者皆是消渴病也二喫食多不甚渴小

便少似有油而數者此是消中病也三渴飲水不能多但腿腫脚先瘦小陰痿弱數小便者此是腎消病

也特忌房勞若消渴者倍黃連消中者倍栝蘗腎消者加芒硝六分服前件鉛丹丸得小便鹹苦如常後

恐虛憊者並宜服此花菴蓉丸方 花菴蓉八兩 澤瀉 五味子 紫巴戟天去心 地骨皮各四分 磁石研水淘去赤汁

煎之 研入人參 赤石脂研入各六分 韭子熬 龍骨研入 甘草 牡丹皮各五分 乾地黄十兩 餘糧三分 桑螵蛸三十枚

栝蘗四分 右十六味搗篩蜜和丸如梧子以牛乳空腹下二十九日再服忌海藻菘菜胡荽蕪莢等物

又服前丸渴多者不問食前後服煮散方 桑根白皮 薏苡仁各六分 通草 紫蘇莖葉各四分 五味子六分

覆盤子 枸杞子各八分 乾地黄九分 茯苓 菝葜各十分 黃耆二分 右十一味搗以馬尾雞篩之分爲五貼

每貼用水一升八合煎取七合去滓溫服忌酢物蕪莢出第二十卷中

睡中尿床不自覺方六首

病源夫人有於眠睡中不覺尿出者是其稟質陰氣偏盛陽氣偏虛則膀胱腎氣俱冷不能溫制於水則

小便多或不禁而遺尿膀胱足太陽也爲腎之腑腎者足少陰也爲藏與膀胱合俱主水凡人之陰陽日

入陽氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則臥睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞爲小便夜臥則

陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於睡眠而不覺尿床也

出第十卷中

肘後療少小睡中遺尿不自覺方 取鵲巢中葶燒水服一錢匕即差

文仲方千金同

又方 雄雞肝 桂心 右二味等分搗丸服如小豆一枚日三服

又方 雄雞屎白 熬 桂心 右二味等分末酒服方寸匕日二亦可除桂心

又方 礬石 燒令壯蠟 熬 右二味等分末之以粟米粥飲服方寸匕日三

又方 雄雞喉嚨及矢白腥腥裏黃皮燒末麥粥清瀉服之亦可以赤雞翅燒末酒服三指撮日三

又方 薔薇根隨多少對搗以酒飲之

並出第二卷中

渴後小便多恐生諸瘡方二首

病源渴利之病隨飲小便也此謂服石之人房室過度腎氣虛耗故也下焦生熱熱則腎燥腎燥則渴然

腎虛又不能制水故小便利也其渴利雖差熱猶未盡發於皮膚皮膚先有風濕濕熱相搏所以生瘡也

續第五

卷中

近效恐腎虛熱渴小便多除風濕理石毒止小便去皮膚瘡調中方 升麻四分 玄參五分 甘草四分 知母五分

何德按裏
疑當作裏

茯苓三分 牡蠣六分 漏蘆五分 枳實六分 援莖四分 黃連一分 右十味搗篩飲汁服方寸七日再服以差爲度忌

豬肉海藻菘菜酢物

又方 栝蘘

茯苓各八分

玄參四分

枳實六分

苦參

甘草

橘皮各三分

右七味搗篩

每空腹以漿水服

方寸七日再服忌海藻大酢菘菜

渴後恐成水病方三首

病源五藏六腑皆有津液若臍藏因虛實而生熱者熱氣在內則津液竭少故渴也夫渴數飲其人必眩

背寒而嘔者因利虛故也診其脈心脈滑甚爲善渴其久病變或發癰疽或爲水病出第五卷中

近效渴後數飲嘔逆虛羸恐成癰疽水病方 茯苓五分 栝蘘六分 升麻四分 麥門冬六分 桑根白皮八分 橘皮三分

右六味搗爲散清水服一方寸七日再服忌酢物

又方 人參

猪苓各三分

通草五分

黃連六分

麥門冬

去心栝蘘

各八分

右六味搗爲散漿水送方寸七日再服

以差爲度忌猪肉冷水生冷等物

又若已覺津液竭身浮氣如水病者方

漢防己

猪苓各六分

栝蘘八分

茯苓四分

桑根白皮十二分

白朮三分

杏

仁去皮 郁李仁各六分

葶藶子十二分

煎紫色

右九味搗篩

蜜和丸如梧子空腹漿水服三十九丸日一服腫消

小便快下爲度忌酢物桃李蜜肉等

宋本無此
以下二方

又葶藶丸療消渴成水病浮腫方

甜葶藶隔紙炒

栝蔞仁

杏仁

去皮尖雙仁炒黃

漢切各一兩

右四味為末

蜜丸搗二三百杵如梧子大服三十丸食前茯苓煎湯送下日三四服

又瞿麥湯療消渴欲成水氣面目并足脰浮腫小便不利方

瞿麥穗

澤瀉

滑石各兩半

防己三分

黃芩

大黃各一分

各一分

麥蠹炒十枚

右七味切每服三錢匕水三升煮一升去滓空心溫服良久再服

虛勞小便白濁如脂方四首

病源此由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而關竅在陰陰為尿便之道胞冷腎損故小便白而如脂或如麩片也出第四卷中

崔氏飲水不知休小便中如脂舌乾渴方

黃連

栝蔞各五兩

右二味搗末以生地黄汁和丸併手丸

每食後牛乳下五十丸日再服之忌豬肉

近效消渴肝肺熱枯消瘦或寒熱口乾日夜飲水小便如脂不止欲死方

水飛鐵粉三兩

雞髓者別研入

脰五枚

牡蠣二兩

別研如粉入黃連三兩右四味搗篩三五度鍊蜜和丸飲汁下如梧子大五十丸重者不過

食時輕著手下差勿傳忌豬肉

又主消渴口乾方

黃連

乾暴令乾

右二味一處搗令成丸食後飲服四十九丸日再丸稍大如常藥丸常

服有效忌豬肉

宋本黃連上有兩字下有為末二字時字

栝蔞五兩宋本作五兩

可也按今有方五首

如麩片也

上有好字

微字上有

宋本黃連

上有蜀字

十兩下有

擗爲末三

字和字下

有丸字

宋本無此

方

尙德按今

有方五首

尙德按癩

千金作交

尙德按千

金人參三

又消渴能飲水小便甜有如脂麩片日夜六七十起方 冬瓜一枚黃連十兩 右截瓜頭去穢入黃連末火

中煨之候黃連熟布絞取汁一服一大盞日再服但服兩三枚瓜以差爲度一方云以瓜汁和黃連末

和如梧子大以瓜汁空肚下三十九日再服不差增丸數忌豬肉冷水

經驗用大牡蠣不計多少以臘日端午日將黃泥裹煨通赤放冷取出爲末用活鯽魚煎湯調下一錢

強中生諸病方六首

病源夫強中病者莖長興盛不痿精液自出是也由少服五石石熱住於腎中下焦虛熱少壯之時血氣

尙豐能制於石及至年衰血氣減少腎虛不能制精液也若精液竭則諸病生矣出第五卷中

千金論曰夫人生放恣者衆盛壯之時不自慎惜快情縱慾極意房中稍至年長腎氣虛竭百病滋生又

年少慮不能房多服石散真氣既盡石氣孤立唯有虛耗腎口乾焦精液自洩或小便赤黃大便乾實或

渴而且利日夜一石以來或渴而不利或不渴而利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也又

強中之病者莖長興盛不痿精液自出也消渴之後卽作癰疽皆由石熱凡如此等宜服豬腎薺苳湯制

腎中石熱又將服白鴨通丸便差

豬腎薺苳湯方 豬腎一具去脂 大豆升薺苳兩 人參 茯神 磁石碎 知母 葛根 黃芩 栝萔

兩各 石薺三兩 右十二味切以水一斗五升先煮豬腎大豆取一斗以下去滓內諸藥煎取三

兩各 石薺三兩 右十二味切以水一斗五升先煮豬腎大豆取一斗以下去滓內諸藥煎取三

兩各 石薺三兩 右十二味切以水一斗五升先煮豬腎大豆取一斗以下去滓內諸藥煎取三

兩各 石薺三兩 右十二味切以水一斗五升先煮豬腎大豆取一斗以下去滓內諸藥煎取三

鈔製二字

尙德按紙

字上千金
有夜字

尙德按仲
款無此論

尙德按千
金無大麥

二字麥款
作小麥粥
飲

尙德按千
金無麥字

升去滓分溫三服湯乃飲之下焦熱者輒合一劑病勢漸歇即停息海藻菘菜酢物

又平人夏月喜渴者由心王也心王便汗出汗則腎中虛燥故令渴而小便少也冬月不汗出故小便多而數也此皆是平人之候名曰腎渴但小便利而不飲水者名腎實也經曰腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人其於小便利者石性歸腎腎得石則實實則能消水漿故利利多則不得潤養五藏藏衰則生諸病也張仲景曰若熱結中焦則為堅熱也熱結下焦則為瀉血亦令人淋閉不通明知不必悉患小便利信矣內有熱氣者則喜渴也除其熱則止渴兼虛者須除熱而兼宜補虛則病愈

又療嶺南山瘴氣兼風熱毒氣入腎中變成寒熱脚弱虛滿而渴方 黃連不限多少生栝蘘汁生地黃汁羊

乳無即用牛乳及人乳亦得右四味取三般汁乳和黃連末任多少衆手捻為丸如梧子大麥飲服三十丸漸加

至四十丸五十丸日三服輕者三日愈重者五日愈若藥苦難服即煮麥飲汁下亦得文仲云黃連丸

一名羊乳丸肘後同忌豬肉蕪菜

又療消渴浮萍丸方 浮萍 栝蘘根等分 右二味搗篩以人乳汁和為丸如梧子麥飲服二十丸日三

服三年病三日差肘後文仲同主虛熱甚佳

又療面黃咽中乾燥手足俱黃短氣脈如連珠除熱止渴利補養地黃丸方 生地黃汁 生栝蘘汁各

升生羊脂三升牛脂亦得好蜜升黃連末一斤右五味搗合銀鍋中熬成煎可丸如梧子飲汁送五丸日三服加

至十丸若苦冷而渴差卽令別服溫藥忌豬肉蕪蕪

肘後同

又療渴小便數散方

知母六分 栝藿一斤 茯苓四分 鉛丹一分 雞臍脰中黃皮十四枚

右五味爲散飲服方寸匕

日三禁酒生菜肉差後去鉛丹以蜜和之以麥飲長服勿絕良忌酢物

肘後同

消渴不宜鍼灸方一十首

千金論曰凡消渴病經百日以上者不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水不歇遂成癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷皮肉若作鍼孔許大瘡者所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水出不止者必死慎之慎之初得消渴者可依後方灸刺之爲佳孫氏云消渴病百日外旣不許鍼刺所飲之水皆化爲膿水不止者皆死特須慎之又云仍不得誤傷皮肉若有小瘡亦云致死旣今亦得消渴且未免飲水水入瘡卽損人今初得日豈得令其灸刺致此誤傷之禍輒將未順其理且取百日以上爲能末悟初灸之說故不錄灸刺凡灸刺則外脫其氣消渴皆是宜疾灸刺特不相宜唯脚氣宜卽灸之是以不取灸穴者耳又有人患消渴小便多而數發在於春經一夏專服栝藿及豉汁得其力渴漸差然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極差不減一升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦唇口乾燥吸吸少氣不得多語心煩熱兩脚酸食乃兼倍於常而不爲氣力者然此病皆由虛熱所爲耳療法栝藿汁可長服以除熱牛乳杏酪善於補

此法最有益

出第二十卷中

文仲療消渴熱中加減六物丸方

栝蘘根

八分

麥門冬

六分

知母

五分

人參

苦參

土瓜根

各四分

搗篩以牛膽和爲丸如小豆服二十九日三服麥粥汁下未知稍加至三十九咽乾者加麥門冬百乾

加知母每下滿加人參小便難加苦參小便數加土瓜根隨患加之一分

時後同

又黃連丸主消渴方

黃連

一斤

生地黃

十斤

右二味搗殺地黃取汁漬黃連出暴之燥復內之令汁盡

乾搗之下篩蜜和丸如梧子服二十九日三服亦可散以酒服方寸匕日三服盡更令作卽差止忌猪

肉燕莢

時後集驗千金廣濟同並出第八卷中

千金栝蘘粉散療消渴祕方 深掘大栝蘘根厚削皮至白處 右一味寸切以水浸一日一易經五日

取出爛搗破之以絹袋盛攤之一如出粉法水服方寸匕日三四亦可作粉粥乳酪中食之不限多少

取差止

出第二十卷中

肘後主消渴方 秋麻子一升以水三升煮三四沸取汁飲之無限不遇五升差

文仲同出第二卷中

廣濟療消渴兼氣散方 栝蘘 石膏 研 甘草 各三兩 甘皮 二兩 右四味搗篩爲散食後煮大麥飲服方寸

匕日二夜一服漸加至二匕忌麪海藻稔菜

又療消渴麥門冬湯方

蘆根

各切

石膏

六分

生薑

栝蘘

各五兩

小麥

生麥門冬

去心各二升

七味切以水二升煮取六升去滓一服一升渴卽任意飲未差更作

出第一卷中

七字下宋
本有不刊
二字
作字下宋
本有不刊
二字

尙德核亦
字上千金
有食前後
無拘五字
宋本同但
拘作在誤

宋本黃連
上有吳字
日再作每

崔氏療患熱消渴常服有驗方

豉心

以酸醋拌蒸乾如
此者三熬令微黃黃連各三兩

右二味搗篩訖以蜜和爲丸日再

空腹服二十五丸食後又服二十丸又取烏梅十顆以水二小升煎之數沸取湯下前件丸藥如無烏梅以小麥子二升煮取汁亦得

又方

黃連一升下宋
本有吳者
二字去毛麥門冬五兩
去心

右二味搗篩以生地黃汁栝蒌根汁牛乳各三合和頓爲丸如梧子一

服二十五丸飲下日再服漸漸加至三十九丸若不頓爲丸經宿即不相著也消渴及小便多並是虛熱

但冷將息即差前件三方崔氏本方中此處更有一方用
栝蒌黃連者故云前件三方並是冷補空腹服恐少腹下冷常喫少許食

服之大好忌豬肉蕪蕪

又療消渴無比方

土瓜根八兩
兩苦參粉三兩
兩黃連五兩
去毛鹿茸炙
各三兩栝蒌各三兩雄雞腸三兩
具牡蠣五兩
熬白石脂研甘

草炙黃耆各三兩桑螵蛸三七枚
炙白龍骨五兩
研雞胍黃皮
具右一十三味搗篩爲散一服六方寸匕

日再服夜一服以後藥下之

竹根十兩
兩麥門冬去心
各四兩甘李根白皮
三兩右四味切以水一斗二升煮取三升五合以下前件散

藥如雜服可取此藥汁和丸一服六十丸仍還用此藥汁下之忌豬肉海藻菘菜出第四
卷中

千金加減巴郡太守奏三黃丸療男子五勞七傷酒渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方

尙德接酒
千金作消
宋本同
又按此方

春三月黃芩

兩四兩
炒大黃三兩
炒黃連四兩

夏三月黃芩

兩六兩
炒大黃一兩
炒黃連七兩
炒

又見第三

十一卷中

分兩不同

尙德按千

金云不知

稍加至七

丸取下而

已一月云

云

七丸下朱

本有食上

飲下四字

尙德按取

性飲之者

謂隨酒量

飲之也

秋三月黃芩六兩 大黃二兩 黃連三兩

冬三月黃芩三兩 大黃五兩 黃連二兩

右三味隨時合搗下篩以蜜和爲丸如大豆服五丸日三不知稍增七丸服一月病愈久服走及奔馬

近常試驗忌猪肉

出第二十卷中

平消渴小便多太數方八首

肘後卒消渴小便多方 多作竹瀝飲之恣口數日差忌麪炙肉

通按恣口者謂多飲竹瀝非恣食也

又方 酒煎黃柏汁取性飲之

通接性飲者若人性畏冷卽少飲也

又方 熬胡麻合變色研淘取汁飲半合日可三四服不過五升卽差

又療日飲水一斛者方 桑根白皮新掘入地三尺者佳炙令黃黑色切以水煮之無多少但令濃隨意

飲之無多少亦可內少粟米勿與鹽

藥驗云宜熱飲之

又小便卒太數復非淋一日數十過令人瘦方 未中水豬脂如雞子一枚炙承取肥汁盡服之不過三

劑差

又方 羊肺一具作羹內少肉和鹽豉如食法任意進之不過三具差

千金同

又方 豉一升內於鹽中綿裹之以白礬好者半斤置綿上令蒸之三斗米許時卽下白礬得消入豉中

出暴乾搗末服方寸匕

又小便數豬肚黃連丸方

豬肚一枚洗去脂膜

黃連末三斤

內豬肚中蒸之一石米熟即出之暴乾搗丸如梧子

服三十丸日再服漸漸加之以差爲度忌豬肉

出第一卷中

近效祠部李郎中消渴方二首

論曰消渴者原其發動此則腎虛所致每發即小便至甜醫者多不知其疾所以古方論亦闕而不言今略陳其要按洪範稼穡作甘以物理推之淋湯醋酒作脯法須臾即皆能甜也足明人食之後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸精氣氣則下入骨髓其次以爲脂膏其次爲血肉也其餘別爲小便故小便色黃血之餘也曬氣者五藏之氣鹹潤者則下味也腰腎既虛冷則不能蒸於上穀氣則盡下爲小便者也故甘味不變其色清冷則肌膚枯燥也猶如乳母穀氣上洩皆爲乳汁消渴疾者下洩爲小便此皆精氣不實於內則便羸瘦也又肺爲五藏之華蓋若下有暖氣蒸即肺潤若下冷極即陽氣不能昇故肺乾則熱故周易有否卦乾上坤下陽阻陰而不降陰無陽而不昇上下不交故成否也譬如釜中有水以火煖之其釜若以板蓋之則煖氣上騰故板能潤也若無火力水氣則不上此板終不可得潤也火力者則爲腰腎強盛也常須煖將息其水氣卽爲食氣食氣若得暖氣即潤上而易消下亦免乾渴也是故張仲景云宜服此八味腎氣丸並不食冷物及飲冷水今亦不復渴比頓得效故錄正方於後耳凡此疾與腳氣雖同爲腎虛所致其腳氣始發於二三月盛於五六月衰於七八月凡消渴始發於七八月盛於十

一月十二月衰於二月三月其故何也夫脚氣者擁疾也消渴者宣疾也春夏陽氣上故擁疾發即宣

愈也秋冬陽氣下故宣疾發即擁疾愈也審此二者疾可理也又宜食者每間五六日空腹一食餅以精

羊肉及黃雌雞爲臠此可溫也若取下氣不食肉菜食者宜煮牛膝韭蔓菁又宜食雞子馬肉此物微擁

亦可療宣疾也擁之過度便發脚氣猶如善爲政者寬以濟猛猛以濟寬隨事制度使寬猛得所定之於

心口不能言也又扁鵲或令喫栝蓂粉往往經服之都無一效又每至堪熱之時取爛美者水淘去浮者

瀘之下候心胸間氣爲度此亦甚佳生牛乳煖如人體渴卽細細呷之亦佳張仲景云足太陽者是膀胱

之經也膀胱者是腎之腑也而小便數此爲氣盛氣盛則消穀大便硬衰則爲消渴也男子消渴飲一斗

水小便亦得一斗宜八味腎氣丸主之

神方消渴人宜常服之 乾地黄八兩薯蕷四兩茯苓三兩山茱萸五兩澤瀉四兩牡丹皮 附子炮桂心各三兩 右

藥搗篩蜜和丸如梧子大酒下十九丸少加以知爲度忌豬肉冷水蕪蕪胡荽酢物生葱范在小品深師古今錄驗

必效文仲方等並同

先服八味腎氣丸訖後服此藥壓之方 黃連二十分 苦參粉 乾地黄各十分 知母七分 牡蠣八分 麥門冬二十

分去 栝蓂七分 一方 右七味搗篩牛乳和爲丸如梧子大併手作丸暴乾油袋盛用漿水或牛乳下

日再服二十九一方服十五丸患重者渴差後更服一年以來此病特慎麋鹿肉須慎酒炙肉鹹物喫

宋本無下字

尙德按尼

太以下至

渴也仲景

無此論

尙德按要

略山茱萸

四兩深瀉

三兩桂枝

附子各一兩

宋本知母

十分麥門

冬二十分

上有吳字

餘字下有

及數分三

字

索餅五日一頓細切精羊肉勿著脂飽食喫羊肉須著桑根白皮食一方云差後須服此丸一載以上
卽承絕根源此病特忌房室麪并乾脯一切肉粳米飯李子等著覺熱渴加至二十五丸亦得定後還
依前減其方神效無比餘並準前方忌豬肉燕羹

將息禁忌論一首

宋本作
醫

夫人雖嘗服餌而不知養性之術亦難以長生養性之道不欲飽食便臥亦不宜終日久坐皆損壽也人
欲小勞但莫久勞疲極也亦不可強所不能堪耳人不得每夜食食畢卽須行步令稍暢而坐臥若食氣
未消而傷風或醉臥當成積聚百疾或多霍亂令人暴吐又食欲得少而數不欲頓而多多卽難消也能
善養性者皆先候腹空積饑乃食先渴後飲不欲觸熱而飲飲酒傷多卽連吐之爲佳亦不可當風臥及
得扇之皆令人病也才不逮而思之傷也悲哀憔悴傷也力所不勝而舉之傷也凡人冬不欲極溫夏不
欲窮涼亦不欲霧露星月下臥大寒大熱大風皆不用觸冒之五味入口不欲偏多偏多則損人腑臟故
曰酸多卽傷脾苦多卽傷肺辛多卽傷肝鹹多卽傷心甘多卽傷腎此是五行自然之理又傷初卽不覺
久乃損壽耳夫喫生肉鱸必須日午前卽良二味中其鱸尤腥而冷也午後陰陽交錯人腹中亦順天時
不成癥積亦能霍亂夫人至酉戌時後不要喫飯若冬月夜長性熱者須少食仍須溫軟喫訖須搖動令
食消散卽不能成脚氣凡衝熱有汗不用洗手面及漱口令人五藏乾枯少津液又冬夏月不用枕冷物

石鐵尤損人木枕亦損人縱不損人及少年之時即眼暗也

通按此條雖附消渴後不單言消渴也凡與不病人俱宜遵之後魚肉菜米豆等做

叙魚肉等一十五件

羊肉甚補虛患風及腳氣不用喫偶食即生薑和煮又猪肉兔肉鷄肉牛肉鱧馬肉大鯉鮎魚河鮪等並禁不可食之鹿肉微冷少喫麋肉温不可炙喫令人消渴久喫炙肉令人血不行野雞春月以後不堪喫鯽魚長六七寸以上並益人仍不要生喫生乾脯不可喫不消化爲蟲

叙菜等二十二件

凡冬瓜食之下氣唯脚氣相宜令人寒中不可多喫能下積年藥力甚損人久服令人虛瘦筋骨高莖令人寒中久食節骨頭生冷令人髮鬢白蘭香胡荽芸薹三物不益人也甘菊枸杞茶發丹石少喫即温多即冷紫蘇薄荷萑菜水蘇温中益人苜蓿白蒿牛蒡地黃苗甚益人長喫苜蓿雖微冷益人堪久服凡菜皆取熟喫不可生喫損人薤雖鞏不同五辛温中補筋骨可食葱調諸候但少喫無妨多食令人虛冷韭從二月以後青稍長煮喫甚補至四月上旬止不可食從七月二十日後即漸堪喫至九月後冷兼有土氣蘿蔔消食下痰澀甚宜人生熟喫俱善斜蒿不甚益人亦無損蔓菁作羹令黃堪喫并發熱動風傷筋骨蒜傷血損藥不可食葵性滑夏不堪食冬暴乾熟時煮用蘿蔔作羹下之利大小腸醋鹹並傷筋骨

尙德接今
有菜等二
十六件

便朱本作
咽

尤須節之不可縱性

叙米豆等九件

茶酒附子 通按少喫
任意猶云稍任意喫也

白米甚益人小豆菘豆白豆並動氣仍下津液少喫任意大豆甚下氣益人久服令人身重蕎麥不可食
小麥麩喫之令人動熱不可類澆之大麥麩甚益人性小冷發癖氣粳米性寒南中溫茶不可多喫熱溫
煮桑代之酒有熱毒漬地黃丹參大豆卽得飲之以上遠是桐部方
法亦一家祕寶也

唐王癩先生外臺祕要方卷十二目錄癩及疔氣積聚癩腹
胸癩奔豚三十八門

療癩方五首

癩結方三首

寒癩方五首

久癩方二首

癩羸瘠方二首

癩癧方四首

癩氣方三首

癩及癩不能食方一十四首

癩癧等一切病方四首

癩硬如石腹滿方二首

食不消成癩積方四首

心下如杯結癩方二首

癩癧瘰癧灸法四首

積聚方五首

積聚心腹痛方三首

積聚心腹脹滿方一首

積聚宿食寒熱方四首

療癩方三首

暴癩方六首

蠶癩方四首

米癩方三首

食癩及魚肉成癩方二首

髮癩方二首

蝨癩方一首

癩瘰方一首

癩瘰方一首

尙德按今
有方一十
五首

尙德按今
字下疑脫
大字

蛟龍病方一首

胸痹方二首

胸痹短氣方三首

胸痹心下堅痞緩急方四首

胸痹噎塞方二首

胸痹欬唾短氣方四首

胸痹心痛方四首

胸痛方二首

奔豚氣方三首

奔豚氣衝心胸方四首

雜療奔豚及結氣方六首

灸奔豚法六首

穿儘接續
下疑脫
數字

唐王素先生外臺祕要方卷十二

宋朝散大夫守光祿卿直祿開判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

療癖方五首

病源夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則澁液通流雖復多飲水漿亦不能為病若攝養乖方則三焦痞隔三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更遇寒氣積聚而成癖癖者謂癖側在於兩脇之間有時而痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生云臥覺勿飲水更眠令人作水癖又云飲水勿急咽久成水癖又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐故久之愈伏梁伏梁者宿食不消成癖腹中如杯如盤宿癰者宿水宿氣癖數生癰久則腸化為筋骨變為實出第二卷中

廣濟療腹中癖氣方 牛膝八分 桔梗 芍藥各六分 枳實八分 白朮六分 鼈甲炙 茯苓各八分 人參 厚朴炙 大

黃 桂心 檳榔各六分 右十二味搗篩蜜和丸空肚溫酒服如梧子二十九日二服漸加至三十丸

老小微利忌生冷油膩小豆粘食菟菜醋生葱豬肉出第二卷中

千金翼江甯衍法師破癖方 白朮 枳實炙 柴胡各三分 右三味切以水五升煮取二升分溫三服服

三十劑承差忌桃李雀肉出第十卷中

必效療癖方 取車下李人微湯退去皮及並人與乾麵相半擣之為餅如猶乾和淡水如常漫麵大小一如病人手寧為二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁即利以快利為度至午後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不效但病重者李人與麵相半輕者以意減病減之後服者亦任量力類試差神效

又方 大黃十兩 右一味擣篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十九丸以利為度小者減之

減之

又方 牛黃三大 麝香一常門 硃砂準麝 生犀角小囊許別擣末 以上四味並研令極細湯成後內之 大黃 芎藭 升麻各一

甘草炙各 鼈甲炙各 丁香五十枚 右十味切以水三升先煮大黃等六味取強半升絞去滓內牛黃等四

味和絞分為三服每服如人行十里久忌如藥法若利出如桃膠肉醬等物是病出之候特忌牛馬肉

其藥及水並是大兩大升此藥分兩是十五以上人服若十歲以下斟量病減之忌菹菜海藻蔞菜生

血物等並出第 三卷中

癖結方三首

病源此由飲水聚停不散復因飲食相搏致使結積在於臍下有時眩且起或脹痛或喘息短氣故云癖

結脈緊實者癖結也

出第二卷中

廣濟療癖結心下硬痛巴豆丸方

巴豆

三枚去心皮熬

杏仁

七枚去尖

大黃

如雞子大

右三味搗篩大黃取巴豆杏仁

別搗如膏和大黃入蜜和丸空腹以飲服如梧子七丸日一服漸加以微利下病爲度忌生冷油膩

出第二卷中

千金狼毒丸主堅癰方

狼毒

五兩塗薑汁炙

半夏

洗杏仁

各三兩

桂心

四兩

附子

炮細辛

各二兩

椒

右七味搗齏別搗杏仁蜜和飲服如大豆二丸

出第十卷中

救急中候黑丸療諸癖結痰飲等大良方

桔梗

桂心

各四分

巴豆

八分

芫花

十二分熬

杏仁

五分

右五味先搗三藥成末別搗巴豆杏仁如膏合和又搗一千杵下蜜又搗二千杵丸如胡豆漿服一丸取利可至二

三丸兒生十日欲癩發可與一二丸如黍米諸腹不快體中覺患便服之得一兩行利卽好

時後千金同服四神

丸下之亦得

出第三卷中

寒癖方五首

病源寒癖之爲病是飲水停積脇下疝強是也因遇寒卽痛所以謂之寒癖脈弦而大者寒癖也

出第二卷中

肘後療腹中冷癖水穀凝滯結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食方

大蟾蜍

一頭去皮及腹中物支解之

芒硝

大者

大人用一升中人

七合小五合

右三味以水七升煮取四升溫服一升一時頓服一升若未下更服一升中人七

合羸小五合得下者止後九日十日一遍作之

又方 大黃三兩甘草二兩蜜一升二十二合棗七枚右四味切以水四升先煮三物取二升一合去滓內蜜再上

火煎令烱分再服忌海藻菘菜

又方 巴豆三十枚杏仁二十枚桔梗六分藜蘆四分皂莢三分去皮右五味搗蜜和丸如胡豆末食服一丸日三

欲下病者服二丸長將服百日都好差忌猪肉蘆笋狸肉古今錄驗同並出第三卷中

深師主久寒癖胸滿短氣心腹堅嘔吐手足逆冷時來時去痛不欲食食即爲患心冷引腰背強急吳茱

萸丸方 吳茱萸八分附子三分厚朴半半夏洗桂心 人參 礬石熬枳實炙乾薑各五分右九味下篩

蜜和酒服如梧子二十九日三不知增之出第十卷中

延年白朮丸主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下冷上熱不能食飲頓頭風旋暈嘔吐方 白朮六分

厚朴四分人參五分白芷三分橘皮四分防風五分吳茱萸 芎藭 薯蕷各四分茯苓五分桂心 大麥蘖熬乾薑

防葵炙各四分甘草五分右十五味搗篩蜜和丸如梧桐子酒服十五丸日再加至二十九出第十卷中

久癖方二首

病源久癖謂因飲水過多水氣擁滯遇寒熱氣相搏便成癖在於兩脇下經久不差乃結聚成形段而起

按之乃水臈積有歲年故云久癖出第二卷中

通按實不
能下常是

此食不能

下

尙德按能

字下千金

有飲食心

三字外臺

蓋脫之

集驗療冷熱久癖竇不能下虛滿如水狀方 前胡 生薑各四兩 枳實三兩 半夏四兩 白朮三兩 茯苓四兩 甘草

草炙 桂心各二兩 右八味切以水八升煮取三升分三服千金同出 第六卷中

古今錄驗曾青丸療久寒積聚留飲宿食天行傷寒者服之二十日愈久服令人延年益壽股仲堪云扁

鵲曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消渴隨病所在久病羸瘦老小宜服藥或吐或下或汗

出方 曾青二分 寒水石三分 朴硝二分 茯苓 大黃 附子炮各三分 巴豆二分 右七味各異擣下篩巴豆消相合

擣六千杵次內附子擣相得次內茯苓擣相得次內大黃擣相得次內曾青擣相得次內寒水石擣相

得次內蜜和擣千杵大人服大豆二丸小兒五歲以下如麻子一丸二三歲兒如黍米一丸如服藥以

薄粉粥清下當覆臥令汗出吐下氣發作服二丸霍亂服三丸泄痢不止服一丸可至二丸一方用曾

青三分忌豬肉冷水蘆筍大酢崔氏同出 第十卷中

癖羸瘡方二首

刪繁療癖羸瘡膏髓酒方 猪肪膏三升 牛髓二升 薑汁 生地黃汁各三升 當歸 蜀椒汗各四分 吳茱萸五合

桂心 人參各五分 五味子七分 芎藭五分 乾地黃七分 遠志皮五分 右十四味切擣九味下篩爲散取膏髓等

五種汁加水一斗同汁煎取水并藥汁俱盡但餘膏在停小冷下散攪令調火上煎三上三下燥器貯

凝冷爲餅方寸以清酒一升煖下膏取服之晝兩服夜一服非但療癖亦主百病忌生葱燕菜

又枸杞子散方 枸杞子五升 乾薑 白朮各五兩 吳茱萸一升 蜀椒三合 橘皮五兩 右六味切搗五味三篩

爲散取枸杞子燥瓷器貯研暴如作米粉法七日暴之一暴一研取前藥散和之又研隨飲酒食等即便服一方寸匕和酒食進之如此能三年服非但療百病亦長陽氣並出第 五卷中

痲癖方四首

廣濟療痲氣兩脇妨滿方 牛膝十斤 桔梗 芍藥 枳實各八分 人參六分 白朮 鼈甲 茯苓 訶梨勒

皮各八分 柴胡六分 大黃十分 桂心六分 右十二味搗篩蜜和丸如梧子空肚酒飲及薑湯任服二十九日二

服漸加至三十丸利多卽以意減之常取微通洩爲度忌生硬難消油膩等物及菟菜一方用五加皮 無人參出第二

中卷

千金翼療十年痲癖方 桃仁 豉各六升 蜀椒 乾薑各三兩 右四味先搗桃仁如脂令搗千杵如乾可

下少許蜜和搗令可丸空肚酒服三丸如酸漿大日三本方下有數法此不 載出第十九卷中

崔氏療痲積冷發如錐刀所刺鬼疰往來者方 烏頭炮 人參 桂心 附子炮 乾薑 赤石脂各八分

硃砂三分 右七味搗篩蜜和爲丸如梧子以煖酒服七丸稍稍加之至十丸

又療痲癖方 鼠屎一合炒 右一味以水二升煮五六沸及熱濾取汁置樽中急內硃砂一小兩乃蓋

頭經宿明日平旦溫爲兩服稍晚食無所忌一方硃砂作硃砂 並出第七卷中

尙德按字
看欄無字
夏當作欄

疔氣方三首

廣濟療疔氣方

牛膝

芍藥各六分

桔梗八分

枳實三分

厚朴六分

橘皮四分

茯苓六分

人參

藜蘆子各五分

梨勒六分

柴胡八分

檳榔四分

大黃六分

右十三味搗篩蜜和丸空肚煮大棗飲服如梧子二十九日再漸

漸加至三十丸如利多以意減之忌生硬難消物及油膩豬肉醋物

出第二卷中

延年療兩肋脹急疔滿不能食兼頭痛壯熱身體痛方

枳實三兩

桔梗

龜甲炙

人參

前胡各二兩

薑四兩

檳榔七枚

桂心二兩

右八味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服如人行七八里久禁生葱

菟菜

出第十卷中

救急療腹中疔氣連心以來相引痛緊急方

白朮

枳實炙各三兩

柴胡四兩

龜甲二兩

右四味切以水七

升煮取二升五合去滓空肚分三服相去七八里久能連服三四劑始知驗禁生冷猪肉并毒魚大須

慎之頓服有效忌菟菜生葱

出第七卷中

癰及疔瘰不能食方一十四首

廣濟療癰疔瘰氣不能食兼虛羸瘦四時常服方

牛膝六兩

生地黃九兩

當歸三兩

桂心四兩

肉苁蓉六兩

遠志三兩

去五味子五兩

麴末五合

炒令黃

白朮

人參各三兩

茯苓六兩

大麥蘖末一升

合一升

右十二味搗篩為散空

腹溫酒服方寸匕二服漸加至一匕半夏中煮生薑及檳榔飲下加麥門冬六兩此方甚宜久服令

有方十五

人輕健忌牛肉生葱蘿蔔等

出第二卷中

崔氏療宿癖時腹微滿不能食調中五參丸方 人參 沙參 玄參 丹參 苦參各一兩 大黃四兩 附子

一兩 炮 巴豆四十枚 蜀椒一合 乾薑半兩 防風一兩 廬蟲十五枚 葶藶一合 右十三味搗下篩蜜和為丸如梧子

先食服一丸日三忌猪肉蘆笋生血等物

又療癖飲并醋咽吐水及沫食飲不消氣逆脹滿方 檳榔十兩 高良薑三兩 桃仁一升 右三味和搗細篩以

白蜜和丸酒服如彈丸二枚日再服漸加至四五丸加減任意自量

並出第七卷中

延年人參丸主疔癖氣不能食方 人參八分 白朮 枳實各六分 橘皮四分 桂心七分 甘草 桔梗各五分 右七

味搗篩蜜和為丸如梧子大一服十五丸酒下日二服加至三十九

又療冷氣兩肋脹滿疔氣不能食方 白朮三兩 人參二兩 茯苓 枳實 生薑各三兩 桔梗二兩 桂心一兩 右

七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服如人行七八里久

又桃仁丸主疔癖氣漫心脹滿不下食發即更脹連乳滿頭面閉悶欬氣急者方 桃仁八分 鱉甲 枳實

白朮各六分 桔梗 吳茱萸各五分 烏頭七分 檳榔 防葵各五分 芍藥四分 乾薑五分 紫菀 細辛各四分 皂莢

二分去 皮子 人參 橘皮 甘草各四分 右十七味搗篩蜜和丸如梧子服十丸日再服加至二十丸忌豬

交浸藥酒用下前藥方 紫蘇 牛膝 丹參 生薑 生地黃 香豉 紫苑 防風 橘皮

大麻仁一升 右十味細切絹袋盛以清酒二斗五升浸三宿後溫一盞用下桃仁丸酒盡更添忌燕

美

又檳榔子丸主腹內疝癖氣滿胸背痛不能食日漸羸瘦四肢無力時時心驚方 檳榔子六分 桔梗當

歸各四分 人參五分 桂心前胡各四分 橘皮厚朴各三分 白朮四分 甘草五分 烏頭炮 乾薑茯苓各四分 鼈甲五分

大黃四分 龍齒六分 右十六味搗篩蜜和為丸如梧子大服十丸飲汁下日二服加至二十九酒

下亦得忌醋菟茶生葱等

又療疝癖胸背痛時時欬嗽不能食方 桂心細辛各四分 白朮六分 厚朴三分 附子炮 乾薑各五分 橘皮三分

鼈甲四分 防葵炙 吳茱萸各三分 右十味搗篩蜜和為丸如梧子大服十五丸酒下日二服加至二三

十九丸忌菟茶醋物生葱等

又療疝癖發即兩肋弦急滿不能食方 檳榔子 枳實各六分 桔梗 鼈甲各四分 人參 白朮各六分 桂心

三分 龍膽草五分 前胡四分 萎蕤 大黃各五分 甘草六分 右十二味搗篩蜜和為丸如梧子大服十丸酒下

日二服加至二十九丸忌菟茶生葱猪肉等

又半夏湯主腹內左肋疝癖硬急氣滿不能食胸背痛者方 半夏三兩 生薑四兩 桔梗 吳茱萸各二兩 前

服極效禁菟菜

並出第
二卷中

癰癖等一切病方四首

千金翼療癰癖乃至臃脹滿方 烏牛尿升 右一味微火煎如稠糖空肚服大棗許一枚當鳴轉病出

隔日更服慎口味等

又三稜草煎主癰癖方 三稜草切一石 右一味水五石煮取一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎

如稠糖出內密器中旦以酒一盞服一七日二服每服常令酒氣相續並出第十
九卷中

崔氏療腹中癰癖兼虛熱者不可用純冷專瀉藥宜驅糜攻之方 鱧甲炙 龜甲炙 桑耳金色者炙 大黃 吳

茱萸 防葵各八分 附子四分 右七味下篩蜜和為丸如梧子飲苦酒服十九日再服漸漸加一丸以

微洩為度無所忌日晚服馬莧汁三四合以差為期亦是單煮煖此汁服前藥更佳馬齒菜即馬莧也

忌猪肉冷水詳前方用鱧甲不宜服菟菜云日晚服
馬莧汁并服藥此必誤也出第七卷中

又溫白丸療癰癖塊等一切病方 紫苑 吳茱萸各三分 菖蒲 柴胡 厚朴炙 桔梗各二分 皂莢三分去
皮子炙

烏頭十分 茯苓 桂心 乾薑 黃連 蜀椒汗各二分 巴豆一分 人參二分 右十五味合搗下篩和以白

蜜更搗二千杵丸如梧子一服二丸不知稍增至五丸以知為度心腹積聚久癰癖塊大如杯椀黃疽

宿食朝起嘔變支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脇微青連胸膈無常處癰變高犬

尙德按此
方又見第
三十一卷
中分兩不
同文亦小
異

尙德按苦
菟當作若

如蟲咬又療十種水病八種痞塞反胃吐逆飯食噎塞或五淋五痔或九種心痛積年食不消化或婦人不產或斷緒多年帶下淋瀝或瘡癩連年不差又療一切諸風身體頑癩不知痛癢或半身疼痛或肩髮墮落又療七十二種風亦療三十六種遺注或癩或痼或婦人五邪夢與鬼交通四肢沉重不能飲食昏昏默默只欲取死終日憂愁情中不樂或恐或懼或悲或啼飲食無味月水不調真似懷孕連年累月羸瘦困弊遂至於死或歌或哭爲鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣知方驗便合藥與婦人服之十日下出癥癖蟲長二尺五寸三十餘枚下膿三升黑血一斗青黃汁五升所苦悉除當月有子臣兄墮馬被傷腹中有積血天陰卽發羸瘦異常久著在牀命在旦夕臣與藥服之下卽雞肝黑血手大一百片白膿二升赤黃水一升許其病卽差臣知方驗謹上禁生冷餲醢羊魚雞犬牛馬鵝肉五辛葱麩油膩豆及糯米粘滑鬱臭之屬

出第一卷中

癖硬如石腹滿方二首

廣濟療腹中疰氣癖硬兩脇臍下硬如石按之痛腹滿不下食心悶欬逆積年不差鱘甲丸方 鱘甲八分

炙牛膝五分 芎藭

防葵各四分

大黃六分 當歸

乾薑

桂心

細辛

附子炮

甘草各四分

巴豆二枚

右

十二味搗篩蜜和丸平旦空腹溫酒下如梧子四丸日三服漸加以微利一兩行爲度忌生葱薑菜

必效療腹滿痛如石積年不損方 取白楊木東南枝去蒼皮細切五升熬令黃酒五升淋訖即以絹

袋盛浮置內酒中密封再宿每服一合日二出第三卷中

食不消成癥積方四首

胃德搜類
千金作類

集驗療凡所食不消方 取其餘頻煨作末酒服方寸匕便吐去宿食即差張文仲謂急同臨光遠說存人食排不消化作病時無桃

就林間得稿桃子煨服之登時吐病即差千金同出第六卷中

商德按隔
疑當作隔

備急食魚鱸及生肉住胸膈中不消化吐之不出多成癥病方 朴硝如半雞一枚大黃二兩 右二味以酒二

升煮取一升去滓盡服之立消無朴硝用芒硝硝石亦佳時後同

又宿食不消大便難練中丸方 大黃八兩 慈 杏仁去皮尖 芒硝各四兩 右四味搗篩蜜和丸如梧子服

七丸日三不知稍加至十丸姚方並出第三卷中

古今錄驗療卒食不消欲成癥積艾煎丸方 白艾一束 薏苡根一把 右二味合煮汁成如飴取半升一服

之使刺吐去宿食神驗出第十卷中

心下大如杯結癥方二首

病源積聚癥結者是五臟六腑之氣已積聚於內重因飲食不節寒溫不調邪氣重沓牢癥盤結者也久

即成癥出第十卷中

肘後療心下有物大如杯不得食者方

琴瑟

大黃

各二兩 澤漆四兩

右三味搗篩蜜和搗千杵服如

梧子二丸日三不知稍加

千金文仲集驗古今錄驗同云療瘰癧心下大如杯食則腹滿心腹絞痛

又瘰癧方

甕中黃土

生葫各一升

右二味生搗葫熟內土復搗以好苦酒澆令浥浥先以塗布一

仍搗病上又塗布上乾復易之取令消止

並出第 一卷中

瘰癧疔氣灸法四首

崔氏療瘰癧閃瘰方

令病人平坐取麻線一條繞項向前垂線頭至鳩尾橫截斷即迴線向後當脊取

線窮頭即點記乃別橫度口吻吻外截却即取度吻線中摺於脊骨點處中心上下分之各點小兩頭

通前合灸三處其所灸處日別灸七壯以上十壯以下滿十日即停看病人食稍得味即取線還度口

吻於脊中點處橫分灸之其數一準前法仍看脊節穴去線一二分亦可就節穴下火如相去遠者不

須就節穴若病人未損可停二十日外還依前灸之仍灸季肋頭二百壯其灸季肋早晚與灸脊上同

時下火也

又灸閃瘰法

其瘰有根其根有著背者有著膊上者遣所患人平坐熟看瘰癧頭仍將手從瘰癧頭向上尋

之當有脈築築然向上細細尋至膊上至築築頭當膊即下火還與前壯數無別王云背上恐不得

過多下火只可細細日別七炷以來

又療癰左右相隨病灸法 第一屈肋頭近第二肋下卽是灸處第二肋頭近第三肋下亦是灸處左右

各灸五十壯一時使了

千金云灸癰癰方患左灸左患右灸右脊屈肋數第二肋上第三肋下向肉翹前初日灸三次日五周而後始至五十止忌大毒餘不忌

又灸疝氣法 從乳下卽數至第三肋下共乳上下相當稍似近肉接腰骨外取穴孔卽是灸處兩相俱

灸初下火各灸三壯明日四壯每日加一壯至七壯從三壯起至三十日卽罷 右前兩種灸法若

點時拳脚點卽拳脚灸若舒脚點時還舒脚灸

並出第七卷中

積聚方五首

病源積聚者由陰陽不和腑臟虛弱受於風邪搏於腑臟之氣所爲也腑者陽也臟者陰也陽浮而動陰沉而伏積者陰氣五臟所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無有常處諸藏受邪初未能爲積聚留滯不去乃成積聚

肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發癆瘵連歲月不已以季夏戊巳日得之何以謂之肺病當傳肝肝當傳脾季夏適王王者不受邪肝欲復還肺肺不肯受留結爲積故知肝之積以季夏戊巳日得之也

心之積名曰伏梁起膈上大如臂上至心下以秋庚辛日得之何以言之腎病當傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結爲積故知伏梁以秋庚辛日得之也

脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病當傳脾脾當傳腎腎以冬適壬王者不受邪脾欲復還肝肝不肯受故留結爲積以知痞氣以冬壬癸日得之也

肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不愈令人洒淅寒熱喘欬發肺癰以春甲乙日得之何以言之心病當傳肺肺當傳肝肝以春適壬王者不受邪肺欲復還心心不肯受故留結爲積以知息賁以春甲乙日得之也

腎之積名曰瘕發於少腹上至心下若瘕賁走之狀上下無時久不愈令人喘逆骨癢少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病當傳腎腎當傳心心以夏適壬王者不受邪腎欲復還脾脾不肯受故留結爲積以知瘕以夏丙丁日得之也此爲五積診其脈缺而緊積於脈浮而牢積聚脈橫者脇下有積聚脈來小沉實者胃中有積聚不下食食即吐出脈來細而附骨者積也脈出在左積在左脈出在右積在右脈兩出積在中央以部處之診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛少氣善忘目瞑皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蟲緣狀其甚如鍼刺之狀時癢白色也診得心積脈沉而芤時上下無常處病悸腹中熱面赤咽乾煩掌中熱甚口唾血主身癢癢主血厥夏蒼冬劇色赤也診得脾積脈浮大長饑則減飽則見腹起與穀爭累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重手足脛腫厥不能臥是主肌肉損

色黃也診得肝積脈弦而細兩脇下痛邪走心下足脛寒臈痛引少腹男子積疝也女子病淋也身無膏
澤喜轉筋爪甲枯黑春羞秋劇色青也診得腎積脈沉而急苦脊與腰相引饑則見飽則減病腰痛少腹
裏急口乾咽腫傷爛目眩瞋骨中寒主髓厥喜忘色黑也診得心腹積聚其脈牢強急者生脈虛弱急者
死又積聚之脈實強者生沉者死其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以左足
踐右足上除心下積又云病心下積聚端坐柱腰向日仰頭徐以口內氣因而咽之三十過而止閉目又
云左脇側臥伸臂直脚以口內氣鼻吐之通而後始除積聚心下不便又云以左手按右脇舉右手極形
除積及老血又云閉口微息正坐向王氣張鼻取氣逼置臍下小口微出十二通氣以除結聚低頭不息
十二通以消飲食令人輕強行之冬月令人不寒又雲端坐柱腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻內氣閉之
自極七息名曰蜀王橋除脇下積聚又云向晨去枕正偃臥伸臂脛瞑目閉口不息極張腹兩足再息頃
間吸腹仰兩足偃拳欲息微定復爲春夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑所病皆愈腹有病積聚者
張吸其腹熱乃止癥瘕散破卽愈矣

出第十
九卷中

范汪破積丸療積聚堅癥方 大黃一斤牡蠣三兩凝水石 石膏 石鍾乳 理石各一兩 右六味搗合下

篩和以蜜丸如梧子先食服酒飲任下三丸日三不知稍增以知爲度

又順逆丸主久寒積聚氣逆不能食方 大黃十分黃芩 厚朴炙 乾地黄 桂心 滑石各四分 杏子二分黃

連 麥門冬

去心各四分

右九味搗合下篩和以蜜丸如梧子服十九日再服後食不知稍增以知爲度

忌蕪蕪生葱豬肉

又捶鑿丸療腹中積聚邪氣寒熱消穀方

甘遂

薤花

芫花

桂心

巴豆

杏仁

桔梗

各一分

右七味薤花芫花熬令香巴豆杏仁去皮熬令變色已各異搗下細篩搗合丸以白蜜搗萬杵服如小

豆一丸日三行長將服之傷寒增服膈上吐膈下利小兒亦服婦人兼身亦服名曰捶鑿以消息之忌

豬肉蘆笋生葱

並出第十卷中

延年療腹內積聚癖氣衝心肋急滿時吐水不能食兼惡寒方

鼈甲

六分

防葵

人參

前胡

桔梗

各四分

檳榔

白朮

大黃

各八分

枳實

四分

厚朴

三分

當歸

附子

炮乾薑

各四分

甘草

五分

吳茱萸

三分

右十五味搗篩蜜和爲丸梧子大一服十五丸酒下日再服加至三十丸忌蕪菜豬肉生冷魚蒜

又白朮丸主積聚癖氣不能食心肋下滿四肢骨節酸疼盜汗不絕方

白朮

黃耆

各六分

牡蠣

四分

人參

參 茯苓

烏頭

炮乾薑

各六分

芍藥

四分

當歸

六分

細辛

麥門冬

去心各四分

桂心

五分

前胡

四分

甘草

六分

防葵

三分

鼈甲

四分

紫苑

三分

檳榔

六分

桔梗

三分

右十九味搗篩蜜和爲丸空肚酒下二十九日再加至三十

丸忌蕪菜桃李大醋豬肉生葱

並出第十卷中

積聚心腹痛方三首

病源積者陰氣五藏所生其痛不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無有常處此皆由寒氣搏於藏腑與陰陽氣相擊下上故心腹痛也診其寸口之脈沉而橫脇下有積腹中有橫積聚痛又寸口脈細沉滑者有積聚在脇下左右皆滿與背相引痛又云寸口脈緊而牢者脇下腹中有橫積結痛而泄痢脈微細者生浮者死出第十卷中

范汪通命丸療心腹積聚寒中疔痛又心胸滿脇下急繞臍痛方 大黃 遠志去心黃耆 麻黃去節甘遂

鹿茸炙各四分杏仁六十枚 欬合巴豆五十枚 芒硝三分 右十味搗合下篩和以蜜丸如小豆先食服三丸日再

忌蘆筍野豬肉一方無鹿茸黃耆用黃芩出第十四卷中

又療心腹積聚食苦不消胸脇滿除去五藏邪氣四物丸方 大戟五分豉咀芫花四分 杏仁一分巴豆一分

枚去皮 右藥搗合下細篩以雞子中黃亦可以蜜和丸如小豆日三日增一丸覺勿復益欲下頓服

七丸下如清漆陳宿水婦人乳有餘疾留飲者下水之後養之勿飲冷水長壯者服五丸先食忌野豬

肉蘆筍出第十卷中

古今錄驗匈奴露宿丸療心腹積聚膈上下有宿食留飲神方出僧深 甘草三分 大黃 甘遂 芫花熬大

戟炙葶藶子熬各二分 苦參 硝石各一分 巴豆半分去心皮熬 右九味細搗合蜜和丸如小豆服三丸當吐下不

吐下稍益至五六丸以知爲度先少起忌海藻蘆筍菘菜野豬肉范汪同出第十卷中

積聚心腹脹滿方一首

病源積聚成病蘊結在內則氣行不宣通滯於腑藏故心腹脹滿則煩悶而短氣也

出第十卷中

深師烏頭丸療心腹積聚脹滿少食多厭繞臍痛按之排手寒中有水上氣女人產後餘疾大人風癩少小風驚癩百病者元嘉中用療數人皆良有一人服五服藥即出蟲長一尺餘三枚復出如牛膽黑堅四枚中皆有飯食病即愈方

烏頭七枚

乾薑

皂莢

炙兼皮子各五分

藹蒲

三分

桂心

四分

柴胡

附子

炮

人參

厚

朴炙黃連

茯苓各三分

蜀椒五分

吳茱萸四分

桔梗三分

右十四味搗篩蜜和爲丸服如梧子二丸日三

稍加至十五丸忌豬肉冷水醋物生葱羊肉餠

出第二卷中

積聚宿食寒熱方四首

病滯積聚而宿食不消者由腑藏爲寒氣所乘脾胃虛冷故不能消化留爲宿食也診其脈來實心腹積

聚飲食不消胃中冷故也

出第十卷中

千金翼三台丸療五藏寒熱積聚臌脹腸鳴而噫食不作肌膚甚著嘔逆若傷寒瘧已愈令不復發食後服五丸飲多者吞十九丸服令人大小便調和長肌肉方

大黃二兩

熟硝石

葶藶

各一升前胡二兩厚

朴炙附子炮各一兩茯苓半兩夏一兩杏仁一升去尖皮熬細辛一兩

右十味搗篩蜜和搗五千杵酒服如梧子五

丸稍加以知爲度忌豬羊肉錫生菜酢物

深師同出第二卷中

通按方內
甘草疑卽
通草甘草
疑是甘草
尙德按甘
皮卽柑皮
說見第十
卷中

古今錢喻氣痞丸療寒氣痞積聚結不通繞臍切痛腹中脹滿胸遍滿風入藏憂慮所積用力不節筋脈
傷羸瘦不能食飲此藥令人強嗜食益氣力方 烏頭 炮甘草 炙葶藶子 熬大黃 芎藭 芍藥 甘皮

炙各二分 右七味下篩蜜和丸如梧子一服三丸日再不知漸至五丸七丸一方桂心二分去甘皮忌海

藻 菘菜猪肉冷水等一方有通草無甘皮

又小烏頭丸療久寒積聚心腹繞臍切痛食飲不下方 烏頭 炮甘草 炙各三兩 柴萸 兩 細辛 半夏 附子

炮藟本各二兩 右七味下篩蜜和丸如梧子大先食服五丸日再不知稍增之忌羊猪肉冷水

又五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方 椒目 附子 炮厚朴 炙各三兩 杏仁 三兩 半夏 一兩 羣

慈三兩 芒硝五兩 大黃九兩 右八味擣葶藶子杏仁使熟和諸藥末和以蜜擣五千杵吞如梧子二丸忌

猪羊肉鴆冷水 出第十卷中

療癥方三首

病源癥者由寒溫失節致腑藏之氣虛弱而食飲不消聚結在內漸染生長塊段盤牢不移動者是癥也
言其形狀可微驗也若積引歲月人則柴瘦腹轉大遂至於死診其脈弦而伏其癥不轉動者必死 出第十九

卷中

范汪療癥病丸方 射罔 二兩 蜀椒 三百粒 汗 右二味擣末下細篩以雞子白和丸半如麻子半如赤小豆

卷十一

十一

先服如麻子漸服如赤小豆二丸不知稍增之以知爲度

出第十卷中

集驗療心腹宿癥及卒得癥方 取雞雞一頭飼之令肥肥後餓二日以好赤朱漫飯極令朱多以飼雞

安雞著板上取糞暴燥永溫清酒服五分匕可至方寸匕日三若病困急者晝夜可五六服一雞少更

飼餘雞取足

出第六卷中

備急熨癥方 吳茱萸三升 右一味以酒和煮熱布裹以熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨都消乃

止也肘後方云亦可用射罔五兩茱萸末以雞子白和塗癥上

出第三卷中

暴癥方六首

病源暴癥者由藏氣虛弱食生冷之物藏既本弱不能消之結聚成塊卒然而起其生無漸名之暴癥也

本由藏弱其癥暴生至於成病斃人則速

出第十卷中

肘後療卒暴癥腹中有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不療之百日死方 取牛膝根二斤咬咀 右一味

暴令極乾

酒一斗浸之密器中封口舉著熱灰中溫之令味出先食服五六合至一升以意量多少又用葫蘆根

亦準此大夏

千金集驗經心錄張文仲同

又凡癥堅之起多以漸生而有覺便牢大者自難療也腹中微有結積便害飲食轉羸瘦療多用陷冰玉壺八密諸大藥今上取小小易得者方 取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘淨洗乾之搗作末以秫

米五斗炊飯內攪之好酒五斗漬封藥消飯浮可飲一升半勿食鮭鹽癥當出亦可但取其根一升

癯千杵酒漬飲之從少起日三亦佳此酒療癯乃勝諸大藥

張文仲同

又方 大黃半斤朴硝三兩蜜一斤 右三味合於湯上煎可丸如梧子服十九日三

備急文仲崔氏同惟崔氏用朴硝半斤蜜一升半服

二十九日再服餘依時後並出第一卷中

千金翼療卒暴癥方

蒜十片去皮五月 伏龍肝鴨卵大 桂心二寸

右三味合搗以清苦酒和之如泥

塗著布上掩病處三日消

時後千金同凡蒜或無桂心亦得用也

又方 高陸根搗蒸之以新布藉腹上以藥鋪布上以衣覆冷即易取差止數日之中晨夕勿息

千金集驗時後

同並出第十九卷中

古今錄驗療暴得癥方 取蒟藳根一小束淨洗瀝去水細切以醇酒浸之取淹根三宿服五合至一升

日三若欲速得可於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作將服之

出第十卷中

癯癥方四首

病源癯癥者謂腹內癥結如蠶之形狀也有食蠶觸冷不消而生癥者有食雜冷物不消變化而作者此皆脾胃氣弱而遇冷不能尅消故也癯者其病結成推之不動移是也

出第十卷中

廣濟療蠶癯服白馬尿方 白馬尿一升五合溫服之令盡差

又方 白馬尿升雞子三枚破右二味於鑊中煎取三合空腹服之不移時當吐出病無所忌千金同

又療蠶癩蟹爪丸方 蟹爪三分附子六分麝香三分半夏六分生薑四分鼈甲炙防葵各六分郁李仁八合右

八味擣篩蜜和為丸如梧子空肚以酒下二十九日再服以知為度忌生冷豬肉菹菜並出第 二卷中

集驗療蠶癩伏在心下手揣見頭足時時轉者并心腹宿癩及卒得癩方 白雌雞一隻絕食一宿明旦

以膏熬飯飼之取其屎無問多少以小便和之於銅器中火上熬令燥擣篩服方寸匕日四五服消盡

乃止常飼雞取屎差畢殺雞單食之時後同出 第六卷中

米癩方二首

病源人有好啞米啞謹按說文於革切笑也集韻無此字但有飢轉久彌嗜啞之若不得米則胸中清水

出得米便止米不消化遂生癩結其人常思米而不能飲食久則斃人出第十 九卷中

廣濟療米癩其疾常欲食米若不得米則胸中清水出方 雞屎升白米五合 右二味合炒取米焦擣篩

為散用水一升頓服取盡少時即吐吐出癩如研米汁碎若無癩即吐白沫痰水乃憎米不復食之無

所忌千金 同

又療米癩久不療羸瘦以至死方 葱白兩虎烏梅三十枚 右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨

嗽葱白隨飲烏梅汁令盡頃之心腹煩欲吐即令出之三晨療之當吐去米癩差無所忌並出第 三卷中

街德按康 照字典 廣 字下云 廣 韻鳥格切 切韻會正 韻乙革切 並音說 文笑也又 餽字下云 唐韻於 切集韻正 韻乙革切 並音厄玉

癥音成相
通注謂癥
類無啞字
者恐誤且
有賦之說
癥當作飽

病源有人卒大能食乖其常分因饑值生慙便大食之乃吐一肉塊繞畔有口其病則愈故謂食癥特由

不乖致此妖異成癥非飲食生冷過度之病也

出第十
九卷中

廣濟療食癥病食熱差方 有一人食飯七升并羊脂餅番不論數因於道中過饑急食生熱須臾吐出

一實薄而圓繞畔有口無數以食投之立消盡飯七升乃止吐此物後其人食病便愈此名食癥無

忌 出第二
卷中

千金療食魚肉等成癥結在腹內并諸毒氣方 狗糞五升 右一味燒灰末之綿裹以酒一斗漬再宿

取清分十服日三服三日令盡隨所食癥結即便出矣

出第十
一卷中

髮癥方二首

病源有人因食飲內誤有頭髮隨食而入胃成癥胸喉間如有蟲上下來去者是也

出第十
九卷中

廣濟療髮癥乃由人因食而入久即胸間如有蟲上下來唯欲得飲油方 油一升 右一味以香澤煎

之大鑊鑄貯之安病人頭邊以口鼻臨油上勿令得飲及傳之鼻面並令有香氣當叫喚取飲不得與

之必疲極眠睡其髮癥當從口出飲油人專守視之并石灰一裹見癥出以灰粉手捉癥抽出須臾抽

盡即是髮也初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌

千金
同

尙德接并
字下千金
有備字

又療胸喉間覺有癢蟲上下偏開葱豉食香此是髮蟲故也方 油煎葱豉令香二日不食張口而臥將

油葱豉置口邊蟲當漸出徐徐以物引去之無所忌

出第二卷中

蝨癩方一首

病源人有多蝨性好齧之所齧既多而臍臟虛弱不能消之不幸變化生癩而患之者亦少俗云患蝨癩

人見蝨必齧之不能禁止蝨生長在腹內時有從下部出亦斃人

出第十卷中

千金療蝨癩由嚙蝨在腹生長為蝨癩方 故篋子 故梳子 各一枚 右二味各破為兩分各取一分燒

作灰末之又取一分以水五升煮取一升用頓服前末盡少時當病出無所忌

廣濟同出第二卷中

蠶癩方一首

病源蠶癩者謂腹內瘕結如蠶狀是也有食蠶觸冷不消而生者亦有食諸雜冷物變化而作者皆由脾

胃氣弱而遇冷即不能剋消所致瘕胃假也謂其形假而推移也昔曾有人共奴俱患蠶癩奴在前死遂

破其腹得一白蠶仍故活有人乘白馬來看此蠶白馬忽尿墮落蠶上即縮頭及腳尋以馬尿灌之即化

為水其主曰吾將愈矣即服之果如其言得差故養生云六月勿食澤中水令人成蠶癩

出第十卷中

崔氏療蠶癩方 大黃六乾薑半附子炮人參各九側子半兩桂心六貝母半兩白朮兩細辛十八麝香一

衛德接生
字下病源
有方字

寸者七 枚煎 右十味擣下篩以酒服半方寸日三忌豬肉冷水

出第九卷中

蛇瘕方一首

病源人有食蛇不消因腹內生蛇瘕也亦有蛇之津液誤入飲食內亦令人病瘕其狀常苦饑而食則不

下噤噎塞食至胸內即吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇瘕也

出第十卷中

崔氏療蛇瘕大黃湯方

大黃半斤 苦硝如雞子一枚 烏鯽魚骨三枚 黃芩半斤 甘草如人指一尺炙 皂莢六枚如落牙者炙去皮子 右

六味咬咀以水六升煮之三沸下絞去滓內苦硝適寒溫盡服之十日一劑煮作如上法欲服之宿無

食平旦服當下病也

千金同出第九卷中

蛟龍病方一首

病源蛟龍病者云三月八月蛟龍子生芹菜上人食芹菜不幸隨入人腹變成蛟龍其病之狀發則如癩

出第十卷中

廣濟療蛟龍病三月八月近海及水邊因食生芹菜為蛟龍子生在芹菜上食入人腹變成龍子須慎之

其病發似癩面色青黃少腹脹狀如懷妊宜食寒食餒方 寒食粥能三升日三服之吐出蛟龍有兩頭

及尾開皇六年又賈橋有人喫餒吐出蛟龍大驗無所忌

千金方同出第二卷中

胸痹方二首

病源寒氣客於五藏六腑因虛而發上衝胸間則胸痹胸痹之候胸中怫怫如滿噎塞不利習習如癢喉

何德按病
源無地字

何德按要
略名人參

裏澀唾燥甚者心裏強痞急痛肌肉苦癢絞急如刺不得俯仰胸前皮皆痛手不能犯胸滿短氣欬唾引
痛煩悶白汗出或微背脊其脈浮而微者是也不治數日殺人其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於
後養生方云以右足踐地左足上除胸癆食熱嘔出第三
十卷中

仲景傷寒論療胸癆理中湯方

人參

甘草

白朮

乾薑

各三兩

右四味切以水八升煮取三升去

滓溫服一升日三夜一頓服三劑愈

張仲景云胸脾心中痞堅留氣結於胸胸滿膈下
逆氣搶心理中湯亦主之千金同出第十六卷中

深師療胸癆麝香散方

麝香

四分

牛黃

二分

生犀角

一分

右三味研服五分七日三忌生冷物葱蒜

出第
十六

中卷

胸癆短氣方三首

千金論曰夫脈當取太過與不及陽微陰弦即胸癆而痛所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所
以胸癆心痛者以其脈陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也仲景傷寒論同胸癆之病喘息欬
唾胸背痛短氣其脈沉而遲關上小緊數者栝實湯主之方 栝實一枚 薤白一斤 半夏半升 生薑四兩 枳實二兩

炙

右五味切以白飯漿一斗煮取四升服一升日三劑後仲景傷寒論無生薑枳實半夏等三味同

小品云用水一斗忌羊肉鴿

又胸中氣壅短氣茯苓湯主之方

茯苓三兩 甘草一兩

杏仁五十枚

右三味咬咀以水一斗煮取五升溫

服一升日三服不差更合仲景傷寒論並出第十卷中

深師療胸辨連背痛短氣細辛散方 細辛 乾地黄 甘草各二兩 桂心 茯苓各五兩 枳實炙 白朮 生

薑 栝蘘實各三兩 右九味搗篩酒服方寸匕日三古今錄驗千金出第十三卷中

胸痹心下堅痞緩急方四首

千金論胸痹之病令人心下堅痞急痛肌中苦痹絞急如刺不得俯仰其胸前皮皆痛乎不得犯胸中悞悞如滿咽塞習習癢喉中乾燥時欲嘔吐胸滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或微引背腹痛不即療之數

日殺人出第十卷中

范汪療胸痹心中痞堅留氣結於胸中胸滿脇下逆氣搶心枳實湯方 陳板實四枚 厚朴四兩 薤白八兩

桂心一兩 栝蘘實一枚 右五味先以水五升煮枳實厚朴取二升半去滓內餘藥又煎三兩沸去滓分溫

三服除心氣良古今錄驗千金同此本仲景傷寒論方

古今錄驗療胸中隱然而痛脊膺痛方 桂心 乾薑各一分 人參 細辛各三分 烏頭一分 山茱萸 貝

母各三分 右七味搗下篩和以蜜丸如小豆大酒若粥汁吞二丸稍稍益以胸中痛止溫溫為度息生

葱生菜豬肉冷水

又療胸痹偏緩急薏苡仁散方 薏苡仁五百枚 附子十枚 甘草三兩 右三味搗下篩服方寸匕日三

衛德按要 略名栝實 薤白 桂枝

忌海藻菘菜豬肉冷水

又療胸痹偏緩急薤仁散方

薤仁一千五百枚

附子大者十枚炮

右二味擣下篩服方寸匕日三不知稍

增之忌豬肉冷水

此方出僧深范注同仲景方用

薤仁十五兩並出第八卷中

胸痹噎塞方二首

仲景傷寒論胸痹之病胸中愠愠如滿噎塞習習如癢喉中澀唾燥沫是也橘皮枳實湯主之方

橘皮

半斤枳實四枚生薑半斤

右三味切以水五升煮取二升分再服

射後小品文仲深師范汪古今錄

驗經心錄千金同出第十五卷中

千金通氣湯療胸滿短氣噎塞方

半夏八兩生薑六兩桂心三兩棗葉四十枚

右四味切以水八升煮取

三升去滓分溫三服忌羊肉鴿生葱一方無桂心用橘皮出第十三卷中

胸痹欬唾短氣方四首

仲景傷寒論胸痹之病喘欬唾胸背痛短氣寸脈沉而遲關脈小緊數者栝蘘薤白白酒湯主之方

栝蘘實一枚薤白切半升右二味以白酒七升煮取二升去滓溫分再服深師范汪同出第十五卷中

射後論胸痹之病令人心中心堅痞急痛肌中苦痹絞急如刺不得俛仰其胸前及背皆痛手不得犯胸滿

短氣欬唾引痛煩悶自汗出或微引背脊不即療數日殺人療卒患胸痹方

雄黃 巴豆去皮心竅 右二

味擣雄黃細篩內巴豆熟搗之相和丸如小豆服一丸不覺稍益忌野豬肉蘆筍

通接鐵音 再酢藥也 轉米汁也 何德按要 略止曰白 謂無數字

尙德按此 千金之文 仲景無此 論此方要 略名橘枳 薑湯與上 扶苓杏仁 甘草湯同 治橘皮一 斤枳實五 枚

又或已差復更發方 取薤白五斤 右一味搗絞取汁飲之立愈

並出第
一卷中

胸痹心痛方四首

何德按白
載要等
作白酒下
詞

仲景傷寒論胸痹不得臥心痛徹背者栝蘘薤白半夏白朮漿湯主之方

大栝蘘一枚薤白兩

切三
半夏升

洗

右三味以白朮漿一斗煮取四升去滓溫服一升日三忌羊肉

古今錄驗同范汪
同出第十五卷中

千金療胸痹心痛方

灸臚中百壯穴在鳩尾上一寸

一云臚膈中行直
兩乳內間是忌錄

又療胸膈滿心痛方

灸期門隨年壯穴在第二肋端乳直下不容旁一寸半是

並出第十
三卷中

何德按千
金無不容
旁三字

古今錄驗小草丸療胸痹心痛逆氣膈中飲不下方

小草 桂心

蜀椒許各三分乾薑二分細辛三分

附子二分

炮

右六味搗合下篩和以蜜丸如梧子大先食米汁服三丸日三不知稍增以知為度忌豬肉冷水

生葱生菜

范汪同出
第八卷中

胸痛方二首

范汪療胸痛枳實散方

枳實八分 桂心五分

右二味搗下篩酒服方寸匕日三忌生葱

深師
同

深師療胸痛枳實散方

枳實四枚 神麴蒸

白朮各一兩

右三味搗篩酒服方寸匕日三忌桃李雀肉等

出第十
六卷中

賣純氣方四首

病源夫賣純者腎之積氣也起於驚恐憂思所生也若驚恐則傷心神藏神也憂思則傷志腎藏志也神志動傷氣積於腎而氣下上游走如純之賣故曰賣純其氣乘心若心中踊踊如車所驚如人所恐五藏不定食飲輒嘔氣滿胸中狂癡不定妄言妄見此驚恐奔純之狀也若氣滿支心心下煩亂不欲聞人聲休作有時乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛温温欲嘔此憂思賣純之狀也診其脈來祝祝一云觸祝

者病賣純也腎脈微急沉厥賣純也其足不收不得前後

出第十
三卷中

小品黃帝問金冶子曰驚為病如奔純其病奈何金冶子對曰驚為奔純心中踊踊如事所驚如人所恐五藏不定食飲輒嘔氣滿胸中狂癡欲走閉眼謬言開眼妄語或張面目不相取與眾師不知呼有所賣賣純湯主之黃帝曰善黃帝問金冶子曰憂思賣純何以別之金冶子對曰憂思賣純者氣滿支心心下煩亂不欲聞人之聲發作有時乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛温温欲嘔眾師不知呼有觸忤奔純湯主之黃帝曰善

師曰病如奔純者氣從少腹起上衝喉咽發作欲死復還生皆從驚恐得之腎間有膿故也

范注
同

師曰病有奔純有吐膿有驚怖有火邪此四部病者皆從驚發得之火邪者桂枝加龍骨牡蠣湯主之若新亡財為縣官所捕迫從驚恐者療用鴟頭鉛

千金翼有飛鴟鉛丹丸主贖痲癩癩此意相近鉛糞一云角為馬桃末即羚羊角

復餘物未定

服字
尚德接湯
字下疑脫
洗字

尚德按
字下疑有
脫字

又療真脈氣在胸心迫滿支脇方

生薑一斤半夏四兩 桂心三兩 人參

甘草炙各二兩 吳茱萸一兩

右六味切

以水一斗煮取三升絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生葱麵羊肉餒粘食海藻菘菜范

同並出第
四卷中

集驗黃連茯苓湯療短氣五藏不足寒氣厥逆腹脹滿氣賁走衝胸膈發作氣欲絕不識人氣力羸瘦少

腹起臃踊如狃子走上走下馳往馳來寒熱拘引陰器手足逆冷或煩熱者方 茯苓四兩 生薑八兩 甘草二兩

炙生薑五兩半夏一升 人參三兩 當歸各二兩 芎藭各二兩 李根白皮升

右九味切以水一斗二升煮取五升服

一升日三夜二服忌羊肉餒海藻菘菜酢物等

又療賁氣上衝胸腹痛往來寒熱賁純湯方 甘草炙 芎藭 當歸各二兩 半夏四兩 黃芩三兩 生薑五兩

藥三兩 生薑四兩 甘李根白皮切一升 右九味切以水二斗煮取五升去滓溫服一升日三夜二服忌海藻菘

菜羊肉餒等並盡第
四卷中

雜療奔氣及結氣方六首

深師療勞寒熱愁思及飲食隔塞虛勞內傷五藏絕傷奔氣不能還下心中悸動不安七氣湯方 桔

梗二兩 人參三兩 芍藥三兩 萊菔七兩 合黃芩二兩 乾地黄三兩 枳實五枚 桂心二兩 乾薑三兩 一甘

薑二兩 枳皮三兩 半夏三兩 洗一 右十二味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜羊

肉生葱豬肉燕羹等千金無桂心極虛
梗有厚朴枯薑蜀椒

集驗療賣純氣從下上者湯方

生葛

半夏洗各五兩

黃芩

桂心各二兩

芍藥各二兩

人參各二兩

皮切各五兩

右八味切以水一斗五升煮取五升去滓溫分爲五服日三夜二服

羊肉餵生葱出第四卷中

小品牡蠣賣黃湯療賣脈氣從少腹起慳胸手足逆冷方

牡蠣三兩

桂心八兩

李根白皮一斤

甘草三兩

右四味切以水一斗七升煮取李根皮得七升去滓內餘藥再煮取三升分服五合日三夜再服生葱

海藻菘菜范注同

又療手足逆冷胸滿氣促從臍左右起鬱冒者奔湯方

甘草四兩

李根白皮切

葛根各一斤

黃芩三兩

心 栝蘘 人參各二兩

芎藭一兩

右八味切以水一斗五升煮取五升去滓溫服一升日三夜再服海

藻菘菜生葱范注同

又方桐君說 伏出雞卵殼中白皮 梨木灰

麻黃去節 紫菀各等分

右四味擣下篩作丸散隨宜酒服

十丸如梧子散者方寸匕療三十年喉中結氣欬逆立差也亦可水煮爲湯以意分之經心錄同並出第一卷中

千金奔氣湯主火氣上奔胸膈中諸病每發時迫滿短氣不得臥劇者便情欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐

成結氣方 桂心五兩 生薑一斤 人參二兩 半夏洗 吳茱萸各一升 甘草三兩

右六味切以水一斗煮取三升去

滓分爲四服忌羊肉餵生葱海藻菘菜出第十卷中

偽德按法
字下疑脫
六首二字

竇德按息
字下疑脫
務字

灸奔豚法

千金療奔豚腹腫法 灸章門一名長平二穴在大橫外直臍季肋端百壯

又主奔豚衝心不得息 灸中極一名玉泉在臍下四寸五十壯

又主奔豚上下腹中與腰相引痛者法 灸中府二穴在雲門下一寸乳上三肋間動脈是百壯一云百

五十壯

又主奔豚上下者法 灸四滿夾丹田旁相去三寸七壯

又主奔豚法 灸氣海在臍下一寸半百壯

又法 灸關元在臍下三寸五十壯亦可百壯

並出第十
七卷中

虛勞骨蒸方七首

骨蒸方一十七首

灸骨蒸法圖四首

疰氣骨蒸方三首

虛損慘賴作骨蒸方四首

瘦病方五首

傳屍方四首

伏連方五首

飛尸方三首

遁尸方三首

五尸方一十一首

尸疰方四首

五疰方四首

江南九十九疰方二首

江南三十六疰方三首

疰病相染易方三首

鬼疰方二首

鬼疰心腹痛方一首

鬼疰羸瘦方二首

鬼氣方三首

鬼魅精魅方八首

鬼神交通方四首


白虎方五首

無辜方二首

除骨熱方四首

盜汗方七首

骨德接今
有方二首



虞王巖先生外臺祕要方卷十三

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

虛勞骨蒸方七首

病源夫蒸病有五一曰骨蒸其根在腎旦起體涼日晚卽熱煩躁寢不能安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力腰疼兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內卽變爲疔食人五藏二曰脈蒸其根在心日增煩悶擲手足翕翕思水口唾白沫臥卽浪言或驚恐不定脈數蒸盛之時或變爲疔膈下悶或暴痢不止三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胸滿或自稱得瘧熱兩脇下脹大欬徹背連脾疼眠寐不安或蒸毒傷藏口內唾血四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食卽欲嘔小便如血大便秘澀蒸盛之時或體腫目赤寢臥不安五曰內蒸亦名血蒸所以名內蒸者必外寒而內熱把手附骨而熱是其根在五藏六腑其人必因患後得之骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起又有二十三蒸一胞蒸小便黃赤二玉房蒸男子則遺瀝漏精女則月候不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱五骨蒸齒黑六筋蒸甲焦七血蒸髮焦八脈蒸脈不調或急或緩九肝蒸眼黑十心蒸舌乾十一脾蒸唇焦十二肺蒸鼻乾十三腎蒸兩耳焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五

臍蒸眼白失色十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下唇焦十八大腸蒸鼻右孔乾痛十九三焦蒸亦雜病
熱乍寒二十肉蒸二十一膚蒸二十二皮蒸二十三氣蒸遍身氣熱凡諸蒸患多因熱病患愈後食牛羊
肉及肥膩或酒或房觸犯而成此疾久蒸不除多變成疔必須先防下部不得輕妄療之出第四卷中
崔氏療五蒸夫蒸者是附骨熱毒之氣皆是死之端漸庸醫及田野之夫不識熱蒸體形狀妄注神祟以
相疑或蒸盛怒變爲疔而致死者不可勝記其蒸有五請略陳之

一曰骨蒸早起體涼日晚便熱煩躁不安食都無味小便赤黃忽煩亂細喘無力或時腰痛兩足逆冷
手心常熱蒸盛傷內乃變成疔食人五藏若大便澀方 可服芒硝一服一方寸匕日再服亦可擣苦參
蜜和爲丸如梧子大一服七丸日再以飲送之無忌以體輕涼爲度

二曰脈蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫臥便浪語或驚恐不安其脈又數此蒸若
盛亦變爲疔傍臍時悶或痢不止方 苦參 青稍各二兩 艾葉 甘草各一兩 右四味切以水四升煮取
一升半分爲三分用羊胞盛之以葦灌下部中若不利取芒硝一方寸匕和冷水合和服之日再服忌

海藻菘菜

三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胸中滿悶或自稱得疔手掩
兩脇不得大效菘背連脾疼眠寐不安此蒸毒傷五藏口便唾血方 急與芒硝一兩以水一升半和分

爲三服三日服止訖以冷水浸手以熨脇間及腋下并胸上及痛處亦可舉臂指灸腋下第三肋間腋下空中七壯立止

四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食飲無味食訖便嘔小便如血大便祕澀蒸盛之時或體腫目赤不得安寐方 大黃一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明旦絞取汁一服五合許微利卽止若熱不定亦可服芒硝一方寸匕日三以體涼爲度

五曰內蒸所以言內蒸者必外寒內熱把手附骨而熱也其根在五藏六腑之中其人必因患後得之骨肉自消食飲無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起方 石膏十兩研如乳粉法水和服方

寸匕日再以體涼爲度

出第七卷中

古今錄驗解五蒸湯方

甘草一兩

茯苓三兩

人參二兩

竹葉二兩

葛根

乾地黄各三兩

知母

黃芩各二兩

石膏

五兩 碎 粳米一合

右十味切以水九升煮取二升半分爲三服亦可以水三升煮小麥一升乃煮藥息海

藻菘菜煎蕪火

醋范注同一方無甘草茯苓人參竹葉止六味

又五蒸丸方

烏梅

雞骨一本是鷄骨

紫苑

芍藥

大黃

黃芩

細辛各五分

知母四分

礬石鍊

栝蘘各一分

桂心二分

右十一味末之蜜和丸如梧子飲服十九日二息生葱生菜並出第五卷中一方無桂心

骨蒸方一十七首

阿德按火疑當作大

廣濟療骨蒸肺氣每至日晚即惡寒壯熱頰色微赤不能下食日漸羸瘦方

生地黄

三兩

切細切葱白細切香豉

甘草

炙各二兩

童子小便

二升

右五味切以地黄等於小便中浸一宿平晨煎兩沸絞去滓澄取一升二合

分溫二服服別相去如人行七八里服一劑差止不服息海藻菘菜蕪莢麩猪肉油膩黏食等

出第四卷中

崔氏療骨蒸以骨汁淋方

取枯朽骨碎

五大升一切骨皆堪用唯洗刷刮不得遺微有土氣但似有土氣即不差病

柳枝 剉棘針

桃枝對各

三大斗

右四味以清水五大石煮之減半乃濾出汁別取清漿兩大石投釜中和骨重煮三兩沸然後

攪濾出淨拭釜取此前後湯相和更報煖隨次取用使患者解髮令散以此湯潑頂淋之其湯令熱但

不破肉為準一舉淋湯遺盡若覺心悶即喫三兩口冷飯如不能坐即臥淋淋湯之時自當大汗汗出

少處仍偏淋之務取汗勻以祛惡氣淋訖可食一大椀熱蔥粥仍暖覆取汗汗解以粉摩身連手足

使周遍患重者不過再淋欲重淋時量氣力淋此湯若飲之尤佳

出第七卷中

文仲療骨蒸方

生地黄一升搗絞取汁三度搗絞始汁盡分再服若利即減之以身輕涼為度忌蕪莢

又療骨蒸苦熱瘦羸面目痿黃嘔逆上氣煩悶短氣喘急日晚便劇不能飲食若服生地黄汁即便服此

方 龍膽 黃連 栝蘂 苦參 青箱 芍藥

各一兩

梔子仁

十枚

芒硝

大黃

各二分

黃芩

三分 右十味搗

篩為散飲服一錢匕加至方寸匕日再大須慎生食若不禁生食不須服之忌豬肉冷水千金經心錄並作丸服之

又療骨蒸口燥欲得飲水止渴竹葉飲方 竹葉一升 麥門冬一升 大棗二十枚 甘草三兩 半夏一升 湯洗令滑

粳米五合 生薑三兩 右七味切以水五升煮取二升半分溫三服忌羊肉海藻蔥菜

又方 麥門冬一升 小麥二升 枸杞根切三升 右三味以水一斗煮取三升煮小麥熟去滓分溫日三服

又方 大烏梅二十枚 石膏六兩 碎 綿裹 右二味以水七升煮取四升去滓以蜜三合稍稍飲之佳

又方 患癱瘓上於刻切下同 等病必瘦脊骨自出以壯丈夫屈手頭指及中指夾患人脊骨從大椎向下

盡骨極指復向上來去十二三迴然以中指於兩畔極極彈之若是此病應彈處起作頭多可三十餘

頭卽以墨點上記之取三指大青竹筒長寸半一頭留節無節頭削令薄似劍煮此筒子數沸及熱出

筒籠墨點處按之良久以刀彈破所角處又煮筒子重角之當出黃白赤水次有膿出亦有蟲出者數

數如此角之令惡物出盡乃卽除當目明身輕也

又療骨蒸消渴消中熱中渴痢心熱心忪風虛熱傳屍等方 苦參一大斤 黃連去毛 知母 栝蘂 麥門冬

去心牡蠣各五大兩熬 右六味擣篩以生牛乳和併手捻爲丸如梧子大暴乾一服二十九丸稍稍加至三十

丸日再服飽食訖以漿水下如食麵酒加至五十丸忌豬肉冷水救急

又療骨蒸蒼梧道士方 紫苑 桔梗 續斷 青竹筍 五味子各三兩 桑根白皮五兩 甘草二兩 乾地黄

五兩熟赤小豆一多者用 升 右九味切以水九升煮取三升五合分溫三服服五六劑十年者亦差每隔五日

一劑初發卽服大驗勿輕之可頓服立驗蘇遊玄感論云主肺氣欬者相當餘同忌海藻蔞菜豬肉類
芫

又療骨蒸欬出膿病重者方

皂莢

一兩炙去皮綿裹

白錫

一枚兩乾棗

七枚生薑二分

右四味以酒一大升煮取

半升去滓先食飯然後服二合如人行三四里不吐更服二合又如人行三里不吐搗服盡方便令

吐卽膿出

並出第一卷中

救急骨蒸之候男子因五勞七傷或因肺癰之後或爲瘰癧之後宿患疰癘婦人因產後虛勞漏汗寒熱或爲月閉不通無問男子婦人因天行已後餘熱不除或爲頓頓勞復小兒閃癘其病並緣此十候所致因茲漸漸瘦損初著盜汗盜汗以後卽寒熱往來寒熱往來以後卽漸加欬欬後面色白兩頰見赤如臙脂色團團如錢許大左臥卽右出唇口非常鮮赤若至鮮赤卽極重十則七死三活若此以後加吐吐後痢百無一生不過一月死服此丸仍得不著後人此病人急多是冤鬼病治之方 青精苗 六月六日採 知母

黃連

去毛 大黃

梔子仁

栝蘆

常山

葶藶

各八分 苦參皮

十二分 甘草

炙 蜀漆

洗各五分

右十一味搗篩

蜜和爲丸如梧子大飲服五丸漸加至十五丸日再以知爲度因至利忌豬肉麵葱蒜生菜海藻蔞菜

又療骨蒸方

毛桃仁

一百二十枚去皮及雙仁留尖

右一味搗令可丸平旦以并藥水頓服使盡服訖量性飲酒使

醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又療骨蒸極熱方

非其人莫漢傳

取乾人糞燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄晚後服小便一小升以

差爲限既常服不可朝朝取作大坑燒二升夜以水三升漬之稍稍減服小便勿用自身者小兒者佳

又方 用雄黃一大兩和小便一大升研令爲粉乃取黃理石一枚方圓可一尺左側以炭火燒之三食

頃極熱灌雄黃汁於石上恐太熱不可近宜著一片薄覆置石上令患人脫衣坐上石冷傳以衣被圍

遶身勿令藥氣洩出莫辭衣物臭也凡經三五度如此必差

又療骨蒸傳屍方

皂莢

長一尺者無相續取炙令微焦去黑皮碎之綿裹

黑錫

大如鷄子 羊肉

大如拳煮如常法

右三味取一升無灰清

酒貯銅鑑內卽著綿裹煎三五沸卽漉去綿裹卽內黑錫使融液盡煎取三合令病者先啜肉汁卽服

一合如變吐困不須起次以銅盆貯水令病人坐上有蟲蠶如馬尾赤色頭黑卽效如無以服三合盡

爲度一服相去如人行十里必是得驗其禁食一如藥法

並出第二卷中

必效骨蒸病小方便 取三歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜和爲兩服中間如人行二十里服

此以後每自小便卽取服之仍去前後取中央者病輕者二十日病重者五十日二十日以後當有蟲

蚰蜒兒其蟲在身當處出俱令人五步十步聞病人小便臭者無不差台州丹仙觀張道士自服非

常神驗

出第二卷中

灸骨蒸法圖四首

崔氏別錄灸骨蒸方圖并序中書侍郎崔知拂撰

夫含靈受氣聚之於五常攝生乖理降之以大疾至若岐黃廣記抑有舊經攻灸單行罕取今術骨蒸病者亦名傳屍亦謂殮殍亦稱伏連亦曰無辜丈夫以癖氣爲根婦人以血氣爲本無問少長多染此疾嬰孺之流傳注更苦其爲狀也髮乾而聳或聚或分或腹中有塊或腦後近下兩邊有小結多者乃至五六或夜臥盜汗夢與鬼交通雖目視分明而四肢無力或上氣食少漸就沈羸縱延時日終於溘盡余昔忝洛州司馬常三十日灸活一十三人前後差者數過二百至如狸頭獼肝徒聞曩說金牙銅鼻罕見其能未若此方扶危拯急非止單攻骨蒸又別療氣療風或瘵或勞或邪或癖患狀既廣救愈亦多不可具錄略陳梗概又恐傳授謬訛以誤將來今故具圖形狀庶令覽者易悉使所在流布頗用家藏未暇外請名醫傍求上藥遣魂反魄何難之有通斯疾者可不務乎

灸骨蒸及邪但夢與鬼神交通無不差之法

使患者平身正立取一細繩令於脚下緊踏

男左女右

其繩前

頭使與大拇指端齊後頭令當腳根後即引向上至曲膈中大橫文便截繩使斷又使患者解髮分兩邊使見分頭路仍平身正坐乃取向所截繩一頭與鼻端齊引向上路頭通過逐脊骨引繩向下盡繩頭即點著又別取小繩一頭與唇端齊合口處一頭向上至鼻底便截斷將此短小繩於前所點處中攪橫分兩邊兩頭各點記使與中央初點處正橫相當此小繩兩頭是灸處當脊初點者非灸處只借爲度其點

拭却

又法 使病人平身正坐稍縮膊取一繩繞其項向前雙垂共鳩尾齊卽截斷鳩尾是心岐骨人有無心

岐骨者可從胸前兩岐骨下量取一寸卽當鳩尾仍一倍翻繩向後取中屈處恰當喉骨其繩兩頭還雙

垂當脊骨向下盡繩頭點著又別取一小繩令病人合口橫度兩吻便割斷還於脊上所點處橫分點如

前其小繩兩頭是灸處長繩頭非灸處拭却以前摠通灸四處日別各灸七壯以上二七以下其四處並

須滿二十壯未覺效可至百壯乃停候瘡欲差又取度兩吻小繩子當前雙垂繩頭所點處逐脊骨上下

中分點兩頭如橫點法謂之四花此後點兩頭亦各灸百壯此灸法欲得取離日量度度訖卽下火唯須

三月三日艾爲佳療差百日以來不用雜食灸後一月許日患者若未好差便須報灸一如前法當卽承

差出第七
卷中

張文仲說荊州人王元禮嘗家患骨蒸傳尸死盡有一道士忽教灸卽斷兼更教人無有不差者欲識此

病其病先乍寒乍熱有時唇赤或頰赤并有時痢血多睡有時欲得食有時不欲食兩脊脈常急患兒多

欬盜汗以指按捻脊脊四邊肉有時心胸氣滿急黃瘦脊中肉盡遂卽著床如著床胸前自動脊脊兩邊

肉盡灸療卽難如灸候胸前肉動非事灸法如看病兒是病更不須選離日卽預將艾去卽將病兒於王

道頭日午時灸灸七壯若先知其病又緩卽取離日午時大吉欲灸覆病兒面向下著地取撮肋頭以病

兒大拇指自捻著展中指直向脊骨指頭脊脊中肉少肋上點記從點記處向上至耳下尖頭卽中央屈

尚德按有
勝以下七
字疑當在
上文汗字
下

通接種字
可疑
尚德按種
猶標也遠
近一種者
謂無廣狹
也

尚德按兩
字疑當
作腦
尚德按三
方疑當作
方三首

繩從初點處向上還當脊骨點繩所到記之又更再屈繩從元點記處向上還進前點記又以杖量取患

兒中指頭兩節折斷還從元點記向下當脊骨點記一邊點四處兩邊俱點摠八處各須去脊骨遠近一

種並須上下相當下從腋肋上至耳根取直其八處一時下火艾炷如棗核豎實作之灸了卽以灰三匝

圍坐處便歸家不須迴顧禁肉麵生冷特忌色及雜食平復後任依常未平復有犯重發卽不可復療

神素師灸骨蒸灸法 當頭耳孔橫量相離三寸許相當灸有穴日灸三壯至第八日灸二七了第三椎

上第二椎下男取左手女取右手頭指依兩指頭東西灸日上七壯至第八日各灸五十壯復五日日灸

各十五壯脛取繫鞋橫大文量至膝脣口亞切下中分當脛骨外日灸一七壯滿第八日日灸滿三十五日

了當脛上皆男左女右取頭指從腕文當指當頭灸日七壯至第八日滿百壯婦人肚脹月節不通取右

手頭指當臍量至下腹當指頭灸日七滿三百壯隔上午後灸隔下午前灸出第一卷中

疰氣骨蒸三方

廣濟療疰氣心忪骨蒸熱闔風躄甲丸方 躄甲炙芍藥 蝮蛇脯炙 大黃各八分 人參 訶梨勒皮熬 枳

實炙 防風各六分 右八味搗篩爲末蜜和丸如梧子以酒飲下二十九漸漸加至三十九日再服不利

忌菟菜生棗麵齋麥稬粘食出第二卷中

備急療疰癰鬼氣瘧忤骨蒸祕驗方 大黃別漬湯欲成 躄甲炙 鈞藤 升麻 甘草炙 丁香各二兩 湯欲成

下 右六味切以水七升煮取二升八合去滓分作三服又用牛黃犀角到末硃砂麝香各一細研分爲

三分每服以一分內湯中服經用多效特忌豬肉粘食生冷菟茶海藻松茶蘇遊同出第三卷中一方有黃芩二兩

必效療疔癰氣壯熱兼欬久爲骨蒸驗方 柴胡四兩茯苓 白朮 枳實各三兩 右四味切以水七升煮

取二升半分爲三服積熱不歇卽加芒硝六分取利熱除之後每三日服一劑差後每月一劑肥白終

身永除忌桃李雀肉大醋出第二卷中

虛損慘額作骨蒸方四首

張文仲療虛損慘額不食四體勞強時翕翕熱無氣力作骨蒸候方 童子小便一大升淡者去前後 葱切

合杏仁四十枚去尖皮碎 右四味合煎取三分中之二服使盡日別一劑服之至十劑愈若服經三四劑

覺四體益熱卽服後方

又方 小便一大升淡者去前後 葱一合 豉一抄 生薑一大兩切 生地黄一握碎 右五味合煎六七沸絞取汁半升許分

爲兩服或三服每服空腹服至二七日必差差後停三四日將息更服二七日神驗每服五六劑覺內

少冷卽服前方二方以意斟酌間服常夜合浸頃久便卽煎服至五更半令服了至欲明更服後丸服

訖至日出時不妨食至晚間未食更一服忌蕪莢

又方 人頭骨三大兩炙 麝香一兩 右二味搗篩和蜜搗一千杵丸如梧子一服七丸日再服以粥飲送藥

若胸前有青脈出者以針刺看血色未變黑者服藥七日必差每日午時能更服後丸一服亦好藥既無毒於事不妨

蘇遊療骨蒸肺痿煩躁不能食蘆根飲子方

蘆根切訖

麥門冬去心地骨白皮

生薑

合皮切橘皮

茯苓

各五兩

右六味切以水二斗煮取八升絞去滓分溫五服服別相去八九里晝三服夜二服覆取汗

此酢物未好差更作若兼服其人或胸中寒或面惡寒及虛脹并痛者加吳茱萸八兩

瘦病方五首

病源夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血氣虛弱不能充盈肌膚故羸瘦也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有顏色去蟲而牢齒也玉泉口中唾也朝未起空漱口吞之輒琢齒二七過如此者三乃止名曰練精又云咽之三過乃止補養虛勞令人強壯

卷第三

廣濟療瘦病每日西即亦色脚手酸疼口乾壯熱癩肝丸方

癩肝六分

天靈蓋

生犀角

前胡

麻各四分

松脂五分枳實四分

甘草五分

右八味搗篩蜜和丸如梧子空腹以小便浸鼓汁下二十九日

再不利忌海藻稔茶生葱薑炙肉魚蒜粘食陳吳等物

又療瘦病方

天靈蓋

一大麝香半兩

桃仁一大抄

硃砂一兩半

好鼓一大升

右五味各別搗篩訖然後

據利令謂每晨空腹以小便半升和散方寸匕一服差止不利息生血物

又療腹脹瘦病不下食方 柴胡 茯苓各十分枳實炙 白朮 人參 麥門冬去心 生薑合皮切 右七味

切以水六升煮取一升八合絞去滓分溫三服服別相去七八里喫一服不利息生油膩小豆粘食

桃李醋物雀肉等

又知母丸主瘦病及久癯黃等方 知母 常山各三兩 甘草炙 大黃 麻黃去節 黃芩 杏仁各二兩 蜀

漆洗 牡蠣各一兩 右九味搗篩蜜和丸如梧子空心服飲下七丸忌豬肉及葱酒麵服後心悶即吐是

此病出候不唾更漸加兩丸日與諸人服神驗非一忌海藻蔞菜生葱生菜等此方云是張文仲去英公處傳

救急療瘦疾方 甘草三兩 右每旦以小便煮甘草三數沸頓服甚良忌海藻蔞菜並第二卷中

傳屍方四首

蘇遊論曰大都男女傳屍之候心胸滿悶背膈煩疼兩目精明四肢無力雖知欲臥睡常不著脊脊急痛

膝脛酸疼多臥少起狀如佯病每至旦起即精神尚好欲似無病從日午以後即四體微熱面好顏色喜

見人過常懷忿怒纒不稱意即欲噴嚏行立脚弱夜臥盜汗夢與鬼交通或見先亡或多驚悸有時氣急

有時欬嗽雖思想飲食而不能多食死在須臾而精神尚好或兩肋虛脹或時微利鼻乾口燥常多粘唾

有時唇赤有時欲睡漸就沈羸猶如水濁不覺其死矣

尙德按睡
疑當作吐
尙德按並
疑當作出

又論曰此病若脊肉消及兩臂飽肉消盡胸前骨出入即難療也若痢赤黑汁兼上氣擡眉喘息皆爲欲死之證也此是藏壞故爾

又論曰童女年未至十三以上月經未通與之交接其女日就消瘦面色痿黃不悟之者將爲骨蒸因錯療之屢有死者有此輩者慎勿療之待月事通自當差矣

又論曰或有人偶得一方云療骨蒸不解尋究根本遂即輕用之主療既不相當病愈未知何日了不求諸鑿者唯知獨任己功若此之人寓目皆是至如以主肺痿骨蒸方將療痿癰傳屍者斯乃更增其病豈有得瘥之理何者主肺痿方中多是冷藥冷藥非痿癰之所宜若用以療痿癰此乃欲益反損非直病仍未差兼復更損其脾脾唯宜溫不合取冷如其傷冷脾氣即衰脾衰之證兩肋虛滿食既不消兼之下利如斯穿鑿欲益反損終莫能悟良可悲哉夫略舉一隅他皆倣此

又論曰凡患骨蒸之人坐臥居處不宜傷冷亦不得過熱冷甚則藥氣難通兼之脹滿食不消化或復氣上熱甚則血脈擁塞頭眩目疼唇乾口燥心胸煩悶渴欲飲水此等並是將息過度之狀深可誠也將養之法須寒溫得所先熱而脫先寒而著若背傷冷即令咳嗽若手足傷熱即令心煩若覆衣傷厚即眠臥盜汗若覆衣過薄即心腹脹滿所是食飲不限時節甯可少食保無宿疰數數進之助藥勢也必須傷軟易消故也不宜

傷硬恐損胃氣致不消也此皆以意消息之爲佳

又論曰主療之法先須究其根本考其患狀診其三部決其輕重量其可不與其湯藥指期取差若能如此方可措手先療其根次其末針灸湯散必須相應無容病根深遠少服卽望痊愈未及得瘳便復罷藥乃言藥病乖越似不相當如此懷疑余所不取亦有因瘵後作亦有因病後爲此病根其源非一略舉綱紀比類而取療之方法如後所言

又論曰骨蒸之病無問男女特忌房室舉動勞作尤所不宜陳奧酸鹹粘食不消牛馬驢羊大小二豆猪魚油膩酒麵瓜菓野豬之屬葵筍蒜蕨及生冷等並不得餐自非平復一月以後乃漸開也大略如此觸類而長之此病宜食煮飯鹽豉豆醬燒薑葱韭枸杞苜蓿苦菜地黃牛膝葉並須煮爛食之候病稍退恐肌膚虛弱者可時食乾鹿脯爲味中間所有得食之者按其條下具言之

廣濟婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食無顏色狀如傳尸病方張文仲方翻末大麥蘖末

各二升 生地黃肥大者切三升 白朮八兩 牛膝切 桑耳劉金色者各三升 薑黃兩 當歸十四分 生薑合皮切 桃仁 杏仁去皮尖及雙仁

者蒸各二升 近用加橘皮八兩 右十二味並細切於臼中以木杵搗之如泥內瓶中以物蓋口封之勿令洩

氣蒸於一大石米中飯熟出之停屋下三日開出暴乾搗爲散酒飲服方寸匕日二服漸加至一匕半

不利初服十日內忌生冷難消之物以助藥勢過十日外卽百無所忌任意恣口食之唯忌桃李若須

桃李宜去朮若不能散蜜丸服之亦得一服三十九日二服去病令人能食肥健好顏色忌桃李雀肉

俞德按希
疑當作合

次仲論傳屍病亦名瘰癧通骨蒸伏連瘰癧此病多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年三年有能食不作肌膚或二日五日若微勞即發大都頭額頸骨間尋常微熱翕然死復家中更染一人如此乃至滅門療之方 獺肝一具破 鼈甲炙 野狸頭炙各一枚 紫苑分 漢防己一兩 蜀漆洗 麥門冬去心 甘草炙各一兩 右八味搗篩以成鍊羊腎脂二分合蜜一分烱冷和丸藥如梧子大服十九丸加至十五丸日再以飲下之其藥合和訖分一分頭邊著一分懸門額上一分繫臂上先服頭邊次服臂上次服門上著大驗忌海藻菘菜莧菜

又灸法 立脚於繫鞋處橫文以手四指於文上量脛骨外遍脛當四指中節按之有小穴取一縷麻割

令薄以此麻緩繫上灸令麻縷斷男左女右患多減

又方 青羚羊肺一具破於布上乾之 苳蓉子絹袋盛各一 同漬經三日出各於布上暴之令至乾微火熬苳蓉

子各搗篩和以蜜丸如梧子服三丸加至四丸

又方 地骨皮 白薇 芍藥 甘草 犀角 升麻 茯神 麥門冬 黃芩 桔梗 枳實 大黃

前胡 茯苓 天門冬 生薑 桑根白皮 羚羊角 當歸 柴胡 硃砂 芎藭 鼈甲 蜀漆

知母 石膏 常山 烏梅 香豉 黃耆 地黃 橘皮 以上並可詳度病狀用之並出第一卷中

伏連方五首

廣濟療瘦病伏連傳屍鬼氣忤惡氣方

斑貓

去頭射千根各四分

石膽

七分別研桂心

牛黃

各二分別研

犀角

廣德按寸
疑當作寸

三分生

人參

二分

石蜥蜴

一枚紫石七分

蜈蚣

四十麝香少許

右十一味

擣篩為散

研相和

每日空腹

服一寸七日三服用并華水二合溫即頓服勿臨嗅與白米粥喫好覺小便澀好如合藥勿使婦人小

兒雞狗見忌麵菓子五辛酒肉生血生葱

又療瘦病伏連辟諸鬼氣惡瘧砂丸方

光明砂

一大枚去皮尖

桃仁

十枚去皮尖

麝香

三分

右三味研砂

砂麝香令細末別擣桃仁如脂合和為丸如梧子其和不合以蜜少許合成訖清飲服一七丸日二服

不利忌生血物

並出第十
四卷中

崔氏斷伏連解法

先覓一不開口葫蘆埋入地取上離日開之煮取三匙脂粥內其中又翦紙錢財將

向新塚上使病兒面向遺道背塚坐以紙錢及新絲園塚及病人使匪別將少許紙錢園外與五道將

軍使人一手捉葫蘆一手於坐傍以一刀穿地即以葫蘆坐所穿地及坐葫蘆了使一不病人捉兩個

鑲拍病人背咒曰伏連伏連解伏連伏連解刀鑲解又咒曰生人持地上死鬼持地下生人死鬼即

各異路呪訖令不病人即擲兩鑲於病人後必取二鑲相背不肯更取擲取相背止乃並還勿反顧又

取離日令病人騎城外車轍面向城門以水三升灰三重圍病人又作七個不翻餅與五道將軍咒曰

通按新錄
一作新錄

天門開地戶閉生人死鬼各異路今五離之日放捨卽歸咒詔乃還莫回頭此法大良

出第七卷中

文仲療伏連病本緣極熱氣相連水斷遂名伏連亦名骨蒸傳屍比用此方甚驗

人屎五大升人濕者

小便一升新炊粟飲五大

六月六日齋半煎

右四味取一瓷瓶盛密封置一室中二七日並消一無惡

氣每旦服一大合盡二服無不差者合藥時潔淨燒香勿令婦人小兒女子雞犬孝子見之

出第一卷中

延年桃奴湯主伏連鬼氣發卽四肢無力日漸黃瘦仁好仁惡不能方

桃奴 茯苓各三兩 鬼箭羽 芍

藥 人參 橘皮各二兩 生薑四兩 檳榔七枚 麝香一分

右九味切以水九升煮取二升七合去滓內麝香

溫分爲三服如行八九里久忌大醋生冷五辛

出第七卷中

飛尸方三首

病源飛尸者發無由漸忽然而至若飛走之急疾故謂之飛尸其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胸

出第二十卷中

集驗療飛尸瓜蒂散方 瓜蒂 赤小豆各一分 雄黃二分

右三味擣下細篩一服五分七稍增至半錢

七以酪服藥

廣濟療卒中惡心腹絞刺氣急服在在欲絕 廣濟同出第七卷中

備急張仲景療飛尸走馬湯方

巴豆去心皮 杏仁去尖皮

右二物綿纏槌令極碎投熱湯二合指捻取

白汁便飲之食頃當下老小量服之通療鬼擊病忌野豬肉蘆筍

此已見卒中疝中正瘰飛尸故不刪也 文仲同出第一卷中

古今錄驗附蓄散療飛尸在人皮中又名惡脹又名賊風發時急頭痛不在一處鍼灸則移發時一日半

日乃微差須臾復發皆療之方 細辛 天雄 炮 莽草 各一分 桂心 三分 附子 四分 雄黃 二分 烏頭 炮 乾薑 各

分 真珠 二分 右九味擣下篩服五分匕不知稍增當以好酒服之忌豬肉冷水生葱生菜 出第六卷中

遁尸方三首

病源遁尸者言其停遁在人肌肉血脈之間若卒有犯觸則發動亦令人心腹脹滿刺痛氣息喘急傍攻

兩脇上衝心胸差後復發停遁不消故謂之遁尸也 出第二十卷中

廣濟療初得遁尸及五尸經年不差心腹短氣方 鶴骨 三寸 羚羊 二枚 炙 乾薑 一兩 麝香 二分 蜥蜴 一

炙 斑貓 十四枚 去翅足 雞屎白 三兩 巴豆 五枚 去心 芫青 二十枚 去翅足 藜蘆 一兩 去蘆 右十味擣篩蜜和丸

空腹以飲服如小豆三丸日二服稍加至六七丸以知爲度至吐利息生冷油膩豬肉蒜粘食陳臭蘆

第一方 無斑貓 雞屎 白巴豆 芫青 藜蘆

又初得遁尸鬼疰心腹中刺痛不可忍方 青木香 丁香 各六分 鬼箭羽 桔梗 紫蘇 橘皮 當歸

各八分 生薑 十二分 檳榔 十四分 桃子 十四枚 右十味切以水九升煮取三升絞去滓分爲三服日晚再

以快利爲度忌如藥法 一方無檳榔 桃子 並出第四卷中

集驗療遁尸心腹刺痛不可忍方 桂心 一兩 乾薑 三分 巴豆 二枚 去心 右三味合擣下篩以好苦酒和

之如流以轉痛極難則易之忌野豬肉蘆笋而出一卷中

五尸方一十一首

肘後療卒中五尸五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸淫也其狀背腹痛脹急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇或礮塊踊起或攣引腰脊今取一方而兼療之 掃瘻藜子蜜丸如胡豆服二九日三

又方 掃商陸根熬以囊盛之更番熨之冷復易

又方 粳米二升水六升煎二沸服之

又方 掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之 並出第一卷中

刪驚療五尸蠱疰中惡客忤心腹刺痛丹砂丸方 丹砂研 乾薑 芎藭 芫花熬 烏頭炮各四分 芍藥 桂

心各八分 野葛皮二分 吳茱萸一分 右九味掃篩蜜和為丸如大豆服三九日三清飲進之忌生血物豬

肉生葱一方無巴豆棍子出第十卷中

備急療卒中五尸遁尸風尸飛尸尸淫沈尸其狀背腹痛脹急衝心攻脇或礮塊踊起或牽腰脊方 破

雞子一枚取白生吞之困者搖頭令下 文仲肘後同

又方葛氏法 雄黃 大蒜各一兩 右二味掃和取如彈丸內二合熱酒中服之須臾未差更服有尸疹者常

畜此藥用之驗 文仲肘後同

又方 乾薑 附子各一兩 桂心二分 巴豆三十枚去皮心生用 右四味擣篩蜜和又內臼中擣萬杵服如小豆二丸

此藥無所不療忌野豬肉蘆筍生葱時後同並出第一卷中

文仲療卒中五尸方 取屋四角茅內銅器中以三尺布覆腹著器布上燒茅令熱隨痛追逐躡下癢便

差若瓦屋削四角柱燒用之神驗時後同出第一卷中

古今錄驗八毒赤丸療五尸癩積及惡心痛蠱疰鬼氣無所不療即是李子豫赤丸方出胡錄 雄黃研真

珠研 礬石泥裏燒半日 牡丹皮 巴豆去皮心熬附子炮 藜蘆炙各一兩蜈蚣一枚炙去尾 右八味擣篩蜜和丸服如小

豆二丸日一極得吐下欲長將服者可減一丸忌豬肉狸肉蘆筍生血等物

又五尸丸療諸尸疰方 芍藥 桂心各八分 吳茱萸合丹砂 芎藭 烏頭炮 乾薑各四分 蜀椒一兩去 梔

子仁五分 巴豆四分 心皮熬 右十味擣下篩蜜和丸如大豆一服三丸日三忌豬肉生葱蘆筍生血等物

並出第七卷中胡洽有芫花四分野葛皮二分爲十二味

尸疰方四首

病源尸疰者卽是五尸內之尸疰而挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋瀝沈沈默默不的知所苦而

無處不惡或腹痛脹滿喘急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇或塊踊起或擊引腰脊或舉身沈重精神

雜錯常覺昏謬每節氣改變輒致大患積月累年漸就頓滯以至於死死後復易傍人乃至滅門以其尸

尙德按裏 疑當作裏

翻繁療尸疔損鼻或聞哭聲或見尸常發死人席湯方 取死人眠席前棺內餘藥踏者一虎口長三寸

止一物以水三升煮取一升為一服立效

出第十卷中

文仲療尸疔方 取新布裏椒薄處上以熨斗火熨椒令汗出立驗

又姚氏方 燒髮灰 杏仁

熬令盡色等分

右二味搗如脂以猪膏和酒服如梧子三丸日三神真

千金同

又鷓鴣丸療尸疔惡氣兼療百病方

鷓鴣炙桂心各三寸黃蟲十四枚去翅足熬

巴豆三十枚去心皮熬斑蝥十四枚去翅足熬

右五味搗篩蜜和為丸如小豆一服二丸日三服清飲進之為野猪肉蘆筍生葱

並出第一卷中

五疔方四首

病源注者住也謂其速滯停住死又注易傷人也注病之狀或乍寒乍熱或皮膚淫躁或心腹脹刺痛或支節沉重變狀多端而方云三十六種九十九種及此等五注病皆不顯出其名大體與諸注皆同

出第二卷中

刪繁華佗錄缺五疔丸療中惡五疔入腹胸脇急痛鬼擊客忤停尸垂死者入喉即愈若已噤將物強發開若不可發扣齒折以灌下藥湯酒隨進之即效方 丹砂研雄黃研附子炮各一兩甘遂半兩豉六十粒

巴豆六十枚去心皮熬令變色

右六味搗下篩巴豆別研令如脂乃更合搗取調白蜜和之藏以密器若有急疾

服胡豆二丸不覺更益以飲投之此藥多有所療殺鬼辟毒破積去水夏驗忌生血物豬肉麩等

古今錄驗

同出第
九卷中

小品五疰湯主卒中賊風遍尸鬼邪心腹刺痛大脹急方 大黃三兩甘草二兩烏頭十枚炮生薑半斤桂

心四兩芍藥當歸各二兩蜜一斤右八味切以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升投著湯中

去滓分服三合如人行三十里又一服日三不知可至四合王尹威數用之忌海藻菘菜豬肉生葱

同出第
四卷中

古今錄驗五疰丸一名神仙丸一名千金丸一名轉疰丸一名司命丸一名殺鬼丸療萬病邪鬼疰忤心

痛上氣厥夢蠱毒傷寒時疫疫癘方 丹砂研礬石泥裏燒雄黃研巴豆去心蘇蘆煮附子炮各二分蜈蚣一枚

足去右七味搗篩蜜和丸如小豆服一丸日一即差不解夜半更服一丸定止帶一丸辟惡忌豬肉

冷水生血物狸肉

出第七卷中

又五野丸療五疰尸疰哭疰冷疰寒疰熱疰在身體寒熱短氣兩脇下痛引背腰脊吸少氣不能行飲

食少面目痿黃小便難項強不得俯仰腹堅癰臍左右下雷鳴脹手足煩疼目不明喜忘久風濕痺腰脊

不隨喜夢驚百病皆療之方 牛黃研麝香研蜀椒去目雄黃研大黃 當歸 蜀烏頭炮天雄炮硝

石熬一方用芒人參 桂心 硃砂 細辛 乾薑各二分石蠃一枚巴豆五十枚去鬼臼二分右十

七味壽歸靈和丸如梧子服三九日再不知稍增以知爲度忌猪肉蘆笋生葱生菜生血物

出第六卷中

江南九十九症方二首

築驗療江南瘧病凡有九十九種寒熱尸疰此病隨月盛衰人有三百六十脈走入皮中或左或右或裏或表如刀錐所刺乍寒乍熱喉咽如鯁食如噎胸中痛繞臍苦痛食不知味腰中難以俛仰兩膝屈伸面或黃或青或白或黑至死更相注易方 取桑根白皮切三升暴燥作湯淋取汁浸小豆二升如此取汁

蠶蒸豆熟作羊鹿肉羹噉此豆

出第一卷中

崔氏金牙散主邪魅心腹刺痛病狀與前方同

金牙別雄黃研 丹砂研 礬石泥裏燒半日 寒水石 芫青熬

巴豆去心皮熬朴硝 桔梗 茯苓 人參 貫衆 附子 炮蜀椒去汗 露蜂房炙 龍骨 乾薑 牡桂

烏頭炮 石膏研 莽草炙 菴菴 大戟 芫花熬 防風 狸骨炙 商陸根 大黃 細辛 蛇蛻炙 玉支

一作貝母 一作牙子 玉泉貝母 卽牙也 右三十二味等分下篩酒服五分七日三忌猪肉冷水生菜生血肉大醋蘆笋

集驗同出 第七卷中

江南三十六症方三首

崔氏金牙散療江南三十六症人病經年羸瘦垂死服之皆差并帶之能殺鬼氣逐尸疰諸惡癘不祥悉

主之方出胡洽 金牙研 曾青研 硝石研 礬石泥裏燒半日 石膏研 莽草 玉支一作雄黃研 硃砂研 寒水石

通按本草 無玉支一

尙德按汗 目癢當作 目汗

作玉泉或

是尚德接五

文即羊脚

脚異名細

目作枝者

談別錄主

治邪氣鬼

瘴毒玉

泉即玉漿

不瘴邪魅

下同

尙德接沈

千金作就

龍骨 蛇蛻皮 芫青 熬 當歸 龍膽 大黃 細辛 防風 大戟 芫花 熬 野葛 天 從蓉 天雄

炮茯苓 附子 炮 烏喙 炮 乾薑 人參 桔梗 桂心 椒 去目 貫眾 巴豆 去心 熬 狸骨 炙 蜂房 炙 蠶

骨 炙各 一兩 右三十六味搗篩為散以酒服一錢匕漸增五分匕日三并以三角絳囊貯散方寸匕以繫

頭及心上大良一方加蜈蚣蜥蜴黃鑑鼻麝香毒公合四十二味息猪肉生血物生茶冷水大醋釐

筭 出第七 卷中

備急療尸瘡鬼者葛氏云卽是五尸之中尸瘡又挾諸鬼邪為害也其病變動乃有三十六種至九十

九種大略令人寒熱沈沈嚙嚙不的知其所苦而無處不惡累年積月漸沈頓滯以至於死後復注劫傍

人乃至滅門覺如此候者宜急療之方 賴肝 具 右一味陰乾搗末水服一方寸以日三如一具不差

更作姚氏云神良 時後崔氏 千金同

又方 桑根白皮灰二升蒸令氣出下以釜湯三四升三遍 重淋取二升漬赤小豆二升一宿出風乾復

漬汁盡止乃濕蒸令熟以羊肉或鹿肉作羹進此豆飯食一升漸至二三升重者七八升乃愈病去時

體中覺疼癢淫淫或若根本不除重為之 時後同並出 第一卷中

瘡病相染易方三首

深師療鬼物前亡轉相染夢寤紛紜羸瘦往來寒熱嚙嚙煩悶欲寢復不能手足熱不能食或欲向壁懸

涕或喜笑無常牛黃散方 牛黃研 鬼箭羽 王不留行 徐長卿一名鬼督郵 遠志去心 乾薑 附子炮 五味

子 石擊刮去黃皮 黃芩 茯苓各二分 桂心一分 代赭三分 葛蒲四分 麥門冬六分 右十五味搗下篩以蜜生地

黃汁相拌合復令相得以酒服方寸七日三忌豬肉冷水生葱羊肉錫醋物出第九卷中

崔氏療江南三十六疰丸療轉疰滅門絕族盡轉逐中外滅盡復易親友方 雄黃研二分 麥門冬去心三分

一方用天門冬皂莢去皮炙 莽草炙各二分 鬼臼三分 巴豆去心皮一分 右六味搗篩蜜和爲丸如小豆服二九日一服忌

鯉魚野豬肉蘆筍

又赤丸療人久疰室家相傳乃至滅族方 雄黃研 馬目毒公鬼臼也 丹砂研 莽草炙 藜蘆熬各二兩 巴豆八枚去

心皮 皂莢去皮炙 真珠研各一兩 右八味搗篩蜜和丸如小豆一服二九吐下惡蟲數十枚忌野豬肉蘆筍

生血物並出第七卷中

鬼疰方二首

病源注之言住也言其連滯住住也人有先無他病忽被鬼排擊時或心腹刺痛或悶絕倒地如中惡之

類其得差之後餘氣不歇停住積久有時發動連滯住住乃至於死死後注易傍人故謂之鬼疰也出第二十

四卷中

古今錄驗神祕丸療鬼疰邪忤飛尸疰擊犬馬螭蜂蛇毒螫盡皆消除方 大黃四兩 硝石三兩 巴豆熬

雄黃研各二兩

右四味搗篩蜜和丸如小豆先食服二九日一服忌野豬肉蘆筍

世第七卷中

崔氏蜀金牙散療鬼疰風邪鬼語尸疰或在脊脅流無常處不喜見人意志不定面目脫色目赤鼻張唇

焦爪甲黃方

金牙一分

蜈蚣炙

蝮蛇石上

附子炮各一枚

人參四分

蛻蝦七枚

徐長卿

芫青炙

斑蝥去翅足

各十

四枚雄黃一分

桂心四分

鬼臼二分

野葛一分

毒公三分

芎藭二分

石長生

椒去汗

大黃

甘草炙

蛇蛻皮

露蜂

房炙

曾青無毒青

真珠別研

丹砂

鬼督郵

烏頭炮

狼毒各二分

石膏五分

蘭茹一分

蕪莢

鬼箭

藜蘆

鵝骨炙

雷丸

乾漆熬

龜甲炙各二分

狼牙四分

亭長七枚

貝母二分

凝水石五分

牛黃別研

胡鷲屎各四分

桔梗三分

鐵精一分

硝石二分

右四十五味

搗篩為散

先食酒服

一刀圭

日再不知

稍增之

有蠱隨大小便出

也忌猪肉冷水生葱海藻菘菜生血物狸肉

深師千金同出第七卷中

鬼疰心腹痛方一首

古今錄驗選命千金丸療萬病心腹積聚壅結胸脅逆滿欬吐宿食不消中風鬼疰入腹面目青黑不知

人方

雄黃研

鬼臼

徐長卿

礬石泥裏燒

瓜丁

雌黃研

乾薑各四分

野葛七分

斑猫二十枚

去

蜀椒

四分去

地膽十五枚

射肉二分

參四分

右十三味

搗篩蜜和

搗三千杵

丸如小豆

先食服

一丸

日三不

知漸增以知為度若百毒所螫牛觸踐馬所躡嚙癰腫瘰癧以一丸於掌中唾和塗痛上立愈正月旦

尚德按肉
疑當作肉
發同

尚德按汗
目疑當作
目汗

以椒酒率家中大小各服一丸終歲無病神夏有驗祕不傳

出第六卷中

鬼疰羸瘦方二首

古今錄驗黃帝護命千金丸療羸瘦歷年胸滿結疹飲食變吐宿食不下中風鬼疰疾瘦方 野葛七寸

斑猫 二十枚去翅去足翅蒸 雄黃 研 雌黃 鬼臼 瓜丁 丹砂 研 礬石 泥裏燒半日 沙參 莽草 炙去目汗 椒 各一兩地膽十五

枚去足翅蒸 右十二味搗下篩蜜和搗三千杵丸如梧子服五丸日二卒中惡氣絕不知人服如小豆二

丸老小半之牛馬所觸踐癰腫若蟲毒所嚙取一丸著掌中唾和塗瘡中毒上立愈正月旦以酒率家

中大小各一丸一歲不病若傷寒身熱服一丸若欲視病服一丸病者共臥不恐鬼生血物

又犀角丸療百病鬼疰惡風入人皮膚淫淫液液流無常處四肢不仁牽引腰背腹脹滿心痛逆氣填胸

不得飲食噎噎短氣寒熱羸瘦喜惡夢與鬼神交通熱欬唾膿血皆療之方 犀角 屑桂心各三分 羚羊角

屑牛黃 鬼臼 附子 炮 獺肝 炙各二分 巴豆 三十枚去心皮熬 蜈蚣 四枚去足炙 麝香 研 真珠 雄黃 研 丹砂 研各四分

肉 一分貝齒十個燒 右十五味搗篩蜜和搗五千杵平旦服如胡豆二丸日三慎生葱猪肉冷水蘆筍生

血等物 並出第六卷中

鬼氣方三首

崔氏療鬼氣辟邪惡阿魏藥安息香方 阿魏藥即涅盤經云央匱是也服法旦取棗許大研之為末

取牛乳一大升煎之五六沸停令熱定取鴨子許大和攪服之更以餘乳盪盪飲之取盡至暮又

息香亦如棗許大分如梧子還以熟牛乳服之令盡每日旦暮常然若無乳者即以煮肉汁服之患久者不過十日近者不過五日如過三十日不愈便停只得食脯肉之屬但是一切菜不得近口特忌特

忌禮部孫侍郎家中有此病所在訪問有人從梁漢來云官人百姓服此得效者十餘家孫侍郎即令依方進服七八日即效便以此法傳授親知得驗者非一余時任度支郎中欲廣其效故錄之出第七卷中

延年療鬼氣骨蒸氣日漸羸方 獺肝十六人參 沙參 丹參各二分 鬼臼 苦參各二分 右六味搗篩

蜜和丸如梧子大一服十丸飲汁下日三服加至十丸禁生冷豬魚肉生血等物

又五香丸主天行癘疫惡氣熱毒心肋氣滿脹急及瘧鬼氣等方 青木香 犀角 犀升麻 羚羊角屑

黃芩 梔子仁各六分 沈香 丁香 薰陸香各四分 麝香 鬼臼各二分 大黃 芒硝各八分 右十三味搗

篩蜜和丸如梧子一服三丸飲下日三服加至七丸以差止禁蒜麪豬魚並出第十卷中

鬼魅精魅方八首

病源凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寐喜壓或與鬼神交通

病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能食此魅之所持也出第二卷中

廣濟療傳屍骨蒸癩肺痿狂悖鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘴赤白暴痢痰血月閉瘰癧丁腫

驚癩鬼忤中人吐乳狐魅吃力迦丸方 吃力迦即白虎是 光明砂 研 麝香當門子 訶黎勒皮 香附子中沈香

者重青木香 丁子香 安息香 白檀香 畢撥上 犀角各一兩 薰陸香 蘇合香 龍腦香各半兩

右十五味搗篩極細白蜜煎去沫和爲丸每朝取井華水服如梧子四丸於淨器中研破服老小每碎

一丸服之仍取一丸如彈丸蠟紙裹緋袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時斟

量忌生血肉臘月合之有神藏於密器中勿令洩氣出祕之忌生血物桃李雀肉青魚酢等

又療精魅病方 水銀一兩 右取水銀內漿水一升炭火上煎三分減二卽去火取水銀如熟豆大取當

日神符裏水銀空腹吞之晚又吞一服三日止無所忌並出第

肘後療卒中邪魅恍惚振噤之方 灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾丸半在爪上半在肉上各

七壯不止至十四壯便愈集驗同出 第三卷中

深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此爲鬼魅當得殺鬼丸方 丹砂研 雄黃研 龍骨 馬

目毒公 鬼箭各五兩 鬼臼二兩 赤小豆三兩 芫青一枚 桃仁百枚去皮尖熬別研 右九味搗下篩別研雄黃丹砂細網

篩合諸藥拌令和調後內蠟和之大如彈丸絳囊盛之繫臂男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人雞犬

見之所服蜜和丸如梧子一服三丸日三忌五辛生血物出第 九卷中

小品療鬼魅四物齋頭散方 東海齋頭是由 跋根 黃牙石又名 金牙 葶藶 防葵各一 右藥搗下篩以酒服方

寸匕欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵葶藶並令人迷惑恍惚如狂

不可多服

備急千金
出第五卷中

集驗療男子得鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休止皆邪氣所爲不能自絕九物牛黃丸方

荆實也

曾青

蒼龍精也研

玉屑

白虎精也研

牛黃

土精也研

雄黃

地精也研

空青

天精也研

赤石脂

朱雀精也

元參

眞武精也

龍骨

各一兩 凡九物名曰九精上通九天下通九地 右擣下篩蜜和丸如小豆先食吞一丸日三稍加以知爲度忌羊

血

文仲千金并翼
同出第三卷中

必效辟鬼魅方

虎爪 赤珠

雄黃 蟹爪

右四味擣令碎以松脂融及煖和爲丸不然硬正朝旦

及有孤鬼處焚之甚效以熏巫人卽神去王三師云奇效息生血物

出第四卷中

近效大麝香丸療積年心痛尸疰蟲毒癩癖氣乘心兩肋下有塊溫療精魅邪氣或悲或哭蛇蠍蜂等所

螫並療之方

麝香 牛黃

藜蘆

去足

硃砂

蜀當歸

茯苓

桔梗

鬼箭羽

金牙

烏頭

吳茱萸

貫衆

丹參

各一分

蜈蚣

去足

乾薑

人參

虎骨

各二分

鬼臼

半斤

芍藥

心皮

蝮蛇

半枚

右二十三味擣篩蜜和丸如梧子以飲下三丸至辰時下利若不利熱飲投之卽利

三兩行後冷醋飲止之卽定然後煮葱食之勿食冷水明日依前服之永差忌麵生菜柿子梨等蛇蠍

蜂螫取一丸研破和醋塗之便差精鬼狐狸之屬拋磚瓦或如兵馬行夜發者是鬼魅無早晚每日服

前藥兩丸只三兩日服卽差仍每日燒一丸熏身體及衣裳宅中燒之亦好無患人以三五丸緋絹袋

盛繫左臂上辟虎毒蛇諸精鬼魅等忌裡肉生血物豬肉生葱蘆笋

鬼神交通方四首

崔氏療夢與鬼神交通及狐狸精魅等方 野狐腦炙各 豹鼻炙各 狐頭骨炙一具 雄黃 腥膈臍 鬼箭羽

露蜂房炙 白朮 虎頭骨炙各 阿魏藥二兩 驢馬狗驢牛等毛各四分燒作灰若骨蒸如死人腦骨一兩炙 右十五味並

大秤兩擣篩爲散攪使調勻又先以水煮松脂候烱接取以和散和散之時勿以手攪將虎爪攪和爲

丸如彈丸以熏患者欲熏之時蓋覆衣被勿令藥煙洩外別擣雄黃爲末以藉藥燒藥節度一如熏香

法其藥欲分於牀下燒熏彌菩忌桃李雀肉等出第七卷中

備急陶氏療女人與鬼物交通獨言笑或悲思恍惚方 松脂三兩 內雄黃末一兩 右二味用虎爪攪令

調丸如彈丸夜內籠中燒之令女裸坐籠上被急自蒙唯出頭耳過三熏即斷深師同

又方 雄黃 人參 防風各二兩 五味子一升 右四味爲散早以井華水服方寸匕日三服

又若男女喜夢鬼通致恍惚者方 鹿角屑酒服三撮日三並出第二卷中

白虎方五首

近效論白虎病者大都是風寒暑濕之毒因虛所致將攝失理受此風邪經脈結滯血氣不行畜於骨節之間或在四肢肉色不變其疾晝靜而夜發發即徹髓酸疼乍歇其病如虎之嚙故名曰白虎之病也

尙德按廣濟以下六字疑當屬書

濟療白虎方 犀角屑當歸 芍藥各六分 牛膝 沉香 青木香 虎頭骨各八分 麝香一分 檳榔一 葉脈一

右九味切以水六升煮取二升六合去滓分溫三服如人行四五里進一服別加麝香末服之不利忌

生菜麵蕎麥蒜出第四卷中

蘇孝澄療白虎病云婦人丈夫皆有此病婦人因產犯之丈夫眠臥犯之為犯白虎爾其病口噤手拳氣

不出方 灸臍中七壯一云灸臍中七壯

近效療白虎方 炭灰五升無炭灰桑灰亦得紗羅羅之一過 蚯蚓糞一升 紅藍花七 右三味一處攪和熬令熟取好醲

醋煖之拌令溼溼以故布三四重裹分作四分更番當所患痛處熨之數數轉勿住手按之冷熱得所

甯令小熱不得作冷冷即復熬令熱又熨之並用後咒法曰青儼皮青毛出黃儼皮黃毛出赤儼皮赤

毛出白儼皮白毛出黑儼皮黑毛出急出吾口神吾口聖唾山崩唾石石裂得汝字汝不去斫頭斫

頭急急如律令其咒法先令人唾痛處以手按之不佳手便即誦此咒不限遍數以差即停當誦咒不

得令病人及傍人誦咒須先淨漱口潔淨良效無比千金勿傳

又療風毒腫一切惡腫白虎病並差方 取三年醞醋五升熱煎三五沸切葱白三三升煮一沸許即瓜

蘆漉出布帛熱裹當病上熨之以差為度

尙德按瓜疑當作漿 笮籬竹杓

又療白虎方 猪肉三 大麻子一 酒半 右三味和麻子口含嚼上將猪肉三串手壁向痛處來去咒曰

相州張如意張得興是汝白虎本師急出咒詔將肉安牀下差送路頭神驗

無辜方二首

崔氏無辜閃癖或頭乾癩頭髮黃聾分去或乍痢乍差諸狀既多不可備說大黃煎丸方

大黃九兩
錦文

新實者若微朽卽不堪用削去蒼皮乃秤

右一味搗篩爲散以上好米醋三升和之置銅椀內於大鑪中浮湯上炭火煮

之火不用猛又以竹木筥攪藥候堪丸乃停於小瓷器中密貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤臘爲度若不下臘或下臘少者稍稍加丸下臘若多丸又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒不等以意量之此藥唯下臘及宿結不令兒痢禁牛馬驢雞猪魚兔肉生冷粘滑油膩小豆蕎麥乳母亦同此忌

又療無辜腦後兩畔有小結者方 無辜之病此結爲根欲療者先看結之大小然後取細竹斟酌籠得此結便截竹使斷狀如指環形仍將此竹籠結自然不得轉動以火針針結子中央作兩下去針訖乃塗少許膏藥無者雜油亦得須待三兩日又如前報針更經一兩日當膿水自出若不出復如前針候膿潰盡結便自散俗法多用刀子頭割者謂之割無辜比來參詳殊不如針之以絕根本恐患者不悉故復重說之並出第七卷中

除骨熱方四首

范汪療骨蒸狸骨丸方 狸骨 連翹各五分 土瓜 山茱萸 元參 胡薹屎 黃芩 丹砂 馬目毒

公 薦尾各二分 黃連 芍藥 雄黃 青葙子 龍膽 栝蔞各三分 右十六味搗篩蜜和丸如梧子

先食服三丸日三不知稍稍增之以知爲度禁食生魚菜猪肉黃黍米生血物古今錄驗同

古今錄驗除熱三黃丸療骨熱身多瘡癩癰腫者方 大黃 黃芩 黃連 當歸 茯苓 桂心

乾薑 芍藥各二分 梔子一十四枚擘 柴胡三分 右十味搗篩蜜和丸先食服如小豆三丸不知增至十丸欲

取微利以意增之久服益良忌生葱醋物猪肉冷水

又方 大黃 黃連 黃芩各一兩 芒硝二兩 右四味搗篩蜜和爲丸一服五丸漸加以知爲度忌猪肉冷

水並出第四卷中

盜汗方七首

病源盜汗者因眠睡而身體流汗也此由陽虛所致久不已令人羸瘠枯瘦心氣不足亡津液故也診其脈男子平人脈虛弱細微皆爲盜汗脈也出第三卷中

崔氏療盜汗夜睡中卽汗汗不休必得風方 麻黃根細切 小麥各二升 右二味以水一斗二升煮小麥得

九升內麻黃根煮之得三升去滓分爲三服常夜服之不過兩劑卽止

又方 甘皮 薤各一兩 杏仁三兩去尖皮熬 當歸四兩 右四味搗合蜜和丸服如梧子五丸漸增之

又方 取死人席緣燒作灰淋汁熱洗從頭至足愈

又止汗粉方

朱規選

麻黃根

牡蠣粉

敗扇灰

栝蔞

各二兩

白朮

二兩

米粉

三升

右六味搗諸藥下篩爲

散和粉攪令調以生絹袋盛用粉身體日三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷日灸二七五七任

意不能日別灸亦得汗卽漸止

並出第 三卷中

延年主盜汗夜臥床席衣被並濕方

麻黃根

牡蠣

碎之綿裹 各三兩

黃耆

人參

各二兩

枸杞根白皮

龍骨

打碎各 四兩

大棗

七枚

右七味切以水六升煮取二升五合去滓分温六服如人行八九里久中間任食

一日令蠶禁蒜麵等物

又療夜臥盜汗方

左顧牡蠣

黃耆

各三兩

麻黃根

五兩

杜仲

二兩

右四味搗篩爲散一服方寸匕日三夜

一服用敗蒲扇煮取汁下藥禁蒜麵

並出第 一卷中

古今錄驗療盜汗麻黃散方

麻黃根

三兩

扇

燒屑 一分

右二味

下篩

以乳服三分

仍日三天

方寸匕

日三不知益之又以乾薑三分粉三分搗合以粉粉之大

出第十 卷中

尙德按李時珍本草麻黃根附方治小兒盜汗引之燕仍日之仍字又以作仍以

