

常山方

漢書門	一	三	八	一
類	二	七	八	一
函	三	九	八	一
架	二	七	八	一
冊	一	三	八	一

內閣文庫	和	書
三七八二	一	二
二	二	二
函	一	二
九	五	二
冊	一	二
架	一	二

共十二

內閣文庫	番號	和	37822
	冊數	12	(7)
	函號	195	9



常山方卷八目錄

頭痛

灸法

心痛

灸法

腹痛

灸法

腰痛

灸法

脇痛

灸法

脚氣

灸法

癩癩

灸法


中惡

灸法





Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '常山' and '卷八'.



海帶山方卷八

賜紫袞裳

延壽院

玄朔

東井父

撰

曾孫

太醫令賜紫

玄淵

靜然父

增

武陵隱醫

我青山

阿中子

衍義

頭痛

頭痛之因有風寒有濕熱有氣虛有血虛有痰

風寒所傷鼻塞聲濁惡風寒脈浮緊而頭痛者宜散

風寒

羌活香附子川芎

大各

白芷蒼朮菊

花荊芥

中各

薄荷

大

細辛

小

耳草

少

右為末食後茶清下或姜水煎服亦可

鼻氣通于天清陽往來之竅也風盛則氣壅故令
鼻塞風邪者天之陽氣也人身六陽之氣皆聚於頭
後感風是重陽而實矣內經曰清陽出上竅又曰
氣薄則發池香附子川芎羌活薄荷細辛荊芥皆
清陽氣薄之品也故可以透氣竅蒼朮苦溫可以
去風寒濕菊苳散八風上注之頭眩耳聾所以調
和諸藥茶茗體輕而氣浮芽萌得春生之氣味雖
苦而氣則薄故湯液以清頭目為主○頭項強痛
者太陽經加獨活大獨活入手足太陽經按太陽
頭痛惡風脈浮緊一說太陽川芎羌活獨活麻黃
之類羌活麻黃太陽經之藥川芎辛散之品也○

頭額痛鼻乾發熱脈長者陽明經按陽明頭痛自
汗發熱惡寒脈浮緩長實者也升麻葛根白芷陽
明經主之○熱甚脈有力石膏邪熱有陽明者主
之一說升麻葛根湯石膏白芷主之皆陽明經之
藥也按太陽頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖脈
沉緩蒼朮半夏南星為主少陰頭痛三陰三陽經
不流行而足寒氣逆為寒厥脈沉細附子麻黃辛
為主厥陰頭頂痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩吳茱
萸湯主之○頭及耳邊痛寒熱往來脈絃者少陽
經柴胡前胡足少陽經之藥也按少陽經頭痛寒
熱往來脈絃細○熱甚按黃芩當歸黃柏為主○

頭巔痛藁本苦頭痛流於巔頂主之并麻酒炒主
上達○風熱濕熱頭痛身熱頭目昏眩脈弦數者

柴胡大黃芩酒炒防風各羌活中黃連酒炒

茯苓小甘草少

右姜煎或為末茶清調如膏臨卧口中含白湯

下

風者天之陽氣也人身六陽之氣皆聚頭後感於
風是重陽而實矣故令熱痛辛耳發散為陽故用
防風羌活柴胡耳草也黃芩黃連者苦寒之品也
以羌活之屬君之則能去熱於高巔之上矣茯苓
淡滲濕以上風藥又勝姜散風邪茶茗見上

川芎茶調散

治風邪上攻頭目昏痛鼻塞聲重

川芎各荆芥各

薄荷二白芷冬耳各

草各羌活各細辛一防風二

右為末食後茶清調下

川芎羌活防風荆芥薄荷細辛皆能除太陽經之
風白芷香烈亦能除陽明經之風耳草和之偏頭
痛痛在額陽明也正頭痛痛在中間太陽經也風
邪在太陽陽明二經為諸證者此方主之局方曰
此方調和脾胃養飲食亦因去風邪也

痰厥頭痛眼黑惡心煩悶或嘔吐或心神昏塞卒倒
目不得開四肢厥冷

日不攝紅羊芩 大各 白朮 中 人參 天麻 川

芩 細辛 小各

右姜煎

痰厥者濕痰厥逆而上也痰氣逆則上實故令頭
痛目眩者目前如見黑色也惡心煩悶或嘔吐或
心神昏塞卒倒因不得開四肢厥冷東垣云頭痛
苦甚謂之足太陰痰厥非羊芩不能除眼黑頭旋
風虛內作非天麻不能療人參耳溫可以瀉火亦
可以補中白朮之耳苦可以去濕亦可以健脾扶
苓能利濕滯之邪陳皮利滯氣川芎細辛散滯氣
川可令至高巔姜去痰○食飽腹中滿神麩麥芽化

食開胃枳殼利滯氣

氣虛頭痛耳鳴目不明因思慮過甚多在肥白人脈
小弱

黃芪 大 人參 白朮 川芎 各 陳皮

蔓荊子 柴胡 小各 炙耳草 細辛 大各

右姜棗

過憂愁思慮傷其氣失面色痿白則望之而知其
氣虛矣脈來虛弱則切之而知其氣虛矣如是則
宜補氣人參黃芪耳溫者也故能補氣白朮耳溫
健脾補五臟之耳耳草耳溫而平能調五臟愆和
之氣陳皮利氣辛香發散為陽故用川芎細辛蔓

荆子白芷柴胡可令至高巔也生姜正胃大棗補脾取以補五臟之母氣也

血虛頭痛形瘦色弊脉濡弱

當歸川芎芍藥中各黃栢酒炒熟地黄

白芷陳皮小各

右姜煎

血榮色血虛則色弊氣血人身之陰陽也相得則治一有失則病故陰血虛則陽氣獨治陽氣親上故令頭痛眩暈當歸川芎芍藥熟地黄味厚養血之品也陳皮生姜行血藥之滯亦可以流氣耳草耳温以養氣夫太極之妙陰生陽故兼用耳温以

益氣黃栢苦而潤故能瀉潤故能就下也白芷療頭風目疾

左屬風邪與血虛也左脉浮弦者風邪

二陳湯加荆芥防風羌活中各薄荷大

二陳湯和裏藥也裏和則痰氣行蓋氣血者人身之陰陽也故氣行則裏和而血亦調荆芥薄荷防風羌活皆治風之品也高巔之上惟風可到是故用之○左脉濡弱者血虛

四物湯加柴胡酒炒黃栢酒炒

四物湯所以養血黃栢見前柴胡在臟主血○血虛兼風者二方和勻服之四物湯養血之劑陳皮

半夏茯苓耳草薄荷荆芥陽風羌活柴胡黃柏治
風熱之品也

右屬痰與熱也脉滑者痰

二陳湯加白朮中枳實小

脉滑者痰故也痰之生也厚於濕故用半夏燥濕

用茯苓滲濕用白朮去濕用陳皮利氣用枳實破

氣

脉弦數者二陳湯加黃芩酒炒防風焙柴胡酒炒

二陳湯去痰柴胡防風主發散

偏頭連暗痛者

石膏牛蒡子小川芎中香附子大

為末茶清調下妙但脉弱者不可用

足陽明之脉抵目挾鼻故目痛鼻乾前證陽明經

之頭痛也石膏之大寒清胃牛蒡子散氣解毒川

芎香附子可以透氣竅脉弱者屬虛恐石膏之大

寒傷胃

平常有頭痛風雨天陰之時必頭重蒙蒙不爽者頭

風也治宜去風濕噴痰氣

羌活陳皮半夏防風蒼朮薄荷中

茯苓川芎荆芥小炙耳草中

右姜煎

陳皮半夏茯苓耳草乃二陳湯也可以利痰氣蒼

未可以燥湿恙活防風川芎薄荷荆芥可以散風
邪况風藥勝湿牛生姜去痰

脉弱眩暈

加人參中柴胡少

脉弱氣虛人參益氣柴胡在經主氣

平身熱脉有力

加黃芩少脉有力者熱故黃芩去熱酒炒則

主上行

大便秘

加大黃酒炒大黃主通泄

頭風感風湿而發者

宜川芎茶調散見上

凡此病服藥之間時喫好茶為佳

茶茗所以明頭目

頭風熱痛甚者

朴硝大黃各等分為末用深井底泥和捏為餅

子貼兩大陰穴

朴硝之鹹寒以攻蘊熱大黃泄臟腑結熱之薰蒸

井底泥散下熱氣

灸法風熱頭痛不可灸熱退頭痛不止者宜灸及

平素頭風虛勞頭痛痰厥氣厥者皆宜灸

百會七壯入髮際五分上星七壯入髮際一寸

顛會 八髮際 前頂 八髮際

後頂 六寸半 強間 八髮際

腦空 二穴 目上直入髮際五分

卒谷 二穴 耳上如前三分入髮際一寸半

兩眼 小骨上髮際各一壯 治頭痛引眼中

大推 治第一推上

俠谿 治足小指次指歧骨間本節前足少陽經

凡頭不可多灸以七壯為率但大推可至十壯

壯又不用數處盡灸口傳

新增

菊花茶調散 治諸風頭目昏重偏正頭痛頭風鼻塞

菊花川芎荊芥羌活耳草白芷 各二兩

細辛 洗淨 防風 去蘆 蟬退 疆蠶

薄荷 各五錢 右為末每服二錢食後用茶清調

藥下

即川芎茶調散加蟬脫疆蠶而二味可以散風菊

蒼散八風上注之頭眩

秘藏清空膏

治偏頭痛年深不愈者及痛風濕熱頭痛上壅損目

羌活 蘼木 各一兩 柴胡 七錢 川芎 五錢

炙耳草 一兩 黃連 炒 細梃子

黃芩 炒 右為末每服二錢匙熱茶調如膏抄在口內少

用白湯送下

風者天之陽氣也人身六陽之氣皆聚於頭後感於風是重陽而實矣故令熱痛辛耳發散為陽故用羌活防風川芎柴胡耳草細挺子乃芩連者苦寒之品也以羌活為君則能去熱於高巔之上○如頭痛細辛味辛辛散氣可令至高巔○如太陰脈緩有痰羌活防風耳草太陽之藥川芎厥陰之藥故減去也半夏可以燥脾濕去痰即益脾胃入太陰○如偏頭痛服之不愈此少陰經之頭痛左額充痛羌活防風太陽經之藥故減之川芎獨活主乾散故減之柴胡少陽經之藥故倍之○如陽

明頭痛白虎湯白芷皆陽明胃經之藥

按此是三陽經藥三陽者足少陽膽足太陽膀胱足陽明胃

元戎方治三陽頭痛

羌活防風荊芥升麻葛根白芷石

膏柴胡川芎芍藥細辛葱白連鬚

若陰症頭痛只用溫中藥足矣如理中湯姜附

草此則專治三陽頭痛

羌活防風太陽經主之升麻葛根白芷石膏陽明

經主之柴胡川芎之辛入少陽經其辛溫能去頭

面風痛不可缺○頭項強痛者屬太陽經頭額痛

鼻乾者屬陽明經發熱脈長頭及耳邊痛寒熱往

來脈絃者屬少陽經

理中散^陽耳溫之劑可以伸陽氣邪之所湊其氣必

虛故用人參白朮耳草之補葱白通陽氣姜附取

以能散陰而通陽

加味四物湯頭痛偏左者屬血虛火盛也

即去熟地黃加生地酒炒黃柏酒

炒知母蔓荊子酒黃芩山梔子炒

右剉水煎溫服

左屬血陰虛則陽獨治當歸芍藥川芎養血知母

黃柏山梔子黃芩生地清陰虛之熱蔓荊子可以

使至高巔○風盛防風荊芥散風邪按此方補血

清陰虛之火之劑也不宜于一應之風邪及氣虛

症

黃芪益氣湯治頭痛偏左者屬痰與氣虛也

半芩當歸洗酒川芎藁本炙耳草黃

芪一錢人參白朮陳皮各五分升麻

黃柏炒酒細辛各三分

右剉一劑姜棗煎服

參芪耳草可以補氣白朮半芩可以燥痰夫氣血

人身之陰陽也兩相得則治一有失則病故陰血

虛損則陽氣獨治陽氣親上故令頭痛當歸川芎

可以補血陳皮可利氣黃柏苦療少火在泉發燥

也升麻引參芪於上連細辛藁本可使至高巔生
姜可以消痰

按偏右痛者多氣虛朝重夕輕此方主之。此
方去半夏藁本黃柏加芍藥柴胡蔓荊子則寶
鑑順氣和中湯也治年高氣弱清氣不能上升
頭面昏悶本無表症因發汗數清陽之氣愈虛
故苦頭痛惡風不善飲食氣短脈弱弦細而微
宜升陽氣劉純曰按此方即補中益氣湯加減
法也內傷頭痛本方加蔓荊子分三項痛加藁本
分三若苦頭痛加細辛分三諸頭痛併用此四味足
矣若頭上有熱則此不能治當以清空之劑。

又偏右痛有因濕痰者其症發則痛密無間二
陳湯加天南星蒼朮川芎及細辛分六或有因風
濕者其症腫痛連脊或遇陰而甚羌活勝濕
湯主之

調中益氣湯

頭左右俱痛者
氣血兩虛也

黃芪炒 人參炒 甘草炒 蒼朮炒 川芎各六分

升麻炒 柴胡炒 陳皮炒 黃柏炒 蔓荊子各三分

當歸分六 細辛分二

右剉水煎溫服

左右俱痛者氣血兩虛。氣血人身之陰陽也兩
相得則治一有失則病故陰血虛損則陽氣獨治

陽氣親上故令頭痛眩暈此方也人參黃芪當歸
升麻柴胡蒼朮耳草即補中益氣湯可以補氣有
川芎當歸則可以養血蔓荊子細辛去頭痛於高
巔黃柏可以下高巔熱

按原方調中益氣湯黃二錢人參耳草各半蒼朮
四分升麻木香柴胡陳皮各二也今此方乃至加
味調中益氣湯也虞搏曰一方有木香二分無黃
柏如大便壅坐不得或了而不了腹中逼迫此
血虛血澁加當歸五分愚按東垣謂此方治氣血
俱虛頭痛本方加當歸一味雖無已上諸症亦
恐不可缺也

選奇湯

治眉稜
骨痛

黃芩

酒炒一錢冬不用如
能食熱痛者加之

防風

活耳草

各三錢夏
生冬灸用

水煎食後溫服

眉稜骨痛不可忍者屬痰與風熱辛散熱散為陽
故用羌活防風散滯及風邪黃芩苦寒輕薄者也
羌活防風氣薄之品也為君則去熱於高巔之上

清震湯

治雷頭風頭面
寒拘急發熱狀如瘡增

真升麻

各四錢

薄荷

一筒

用水二鐘煎八分食後服

藥之為性辛者可使達表輕者可去實升麻薄
荷辛輕者也故用之達高巔而可使去滯蒼朮辛

烈故發散甚速除上焦濕

心痛 虫痛 附

丹溪曰心痛即胃脘痛須分新久

真心痛者心藏病也且發夕死急證也

倭俗謂心痛為胸虫曰皆是虫痛大誤也大抵心

痛是胃脘痛也

身犯寒氣口得寒物而忽痛者宜用溫散溫利之

劑

木附湯 治中寒心下痛四肢逆

附子 冷汗出脉微氣弱 白朮 二兩 甘草 一兩 生姜 一兩

大棗 六個 右

四肢逆冷脉弱則知寒用附子生姜之辛溫者主

之辛可以破滯溫可以散寒耳可以補中故佐以

白朮耳草大棗不滯不寒痛斯失矣

燒脾散 治啖生冷瓜菓

乾姜厚朴草菓縮砂神麩 炒 麥芽 炒

陳皮良姜 炒各灸耳草分六

右入鹽 許 水煎○右宜分內因外因以二方治

之如不愈久則寒變為熱須用寒藥

冷物食之過其分量則寒氣凝于中焦故心下痛

乾姜良姜之辛熱所以溫中散寒邪縮砂草菓神

麩麥芽化其食厚朴陳皮可以利氣耳草之耳取

以益胃於破傷之後鹽所以緩急
常食煎燂飲熱酒又傷生冷日久漸漸心下痛者熟
也

山梔子 大者四十九枚連皮碎炒 附子 一枚炮

右酒煎或山梔子末入姜汁服

之可

山梔子苦寒下熱附子辛溫散滯姜汁散滯

痛處手按之痛定者虛證也

二陳湯加炒生姜

辛可以散氣用半夏陳皮茯苓之淡滲可使平水

相干之氣生姜可使益胃散滯

心悸者用妙香散 見怔忡

虫痛者面上有白癍唇紅時作時止能食飢則痛也

二陳湯加苦練根

腸胃為市故無物不包無物不容而所以生諸蟲

者猶腐草為螢之意乃濕熱之所生也此方也二

陳湯燥濕痰之劑可以燥腸胃之熱苦練根殺蟲

山之品也

化虫丸 面色青黃口出涎沫或吐清亦虫痛也

鶴虱檳榔胡分炒苦練根 去廉皮各一兩

右麩糊為丸米飲下

前方皆殺虫之品也

熊膽 殺虫

濕痰痛

白螺螯壳 煨 為末 溫酒下 方寸匙 妙

螺螯海螺田螺用同性寒消痰去卒心痛

心氣鬱滯而痛

牡蠣粉加塩溫酒下 妙

牡蠣軟積痞塩能軟堅酒性熱溫則散滯

濕痰氣滯鬱心痛

香附子 大烏藥 山梔子 各陳皮

紫蘊 羊芩 肉桂 延胡索

姜煎婦人加川芎 中青小

紫蘊香附子開鬱陳皮利氣烏藥散氣羊芩生薑

消痰肉桂散滯延胡索治心腹小腹痛山梔子加

姜汁則治心腹久痛 婦人川芎開鬱氣活滯血

青皮利氣滯 氣痛海粉主上氣煩滿膈寒熱香

附子散滯氣川芎行滯血山梔子開鬱

灸法

治卒心痛

中衝二穴各三壯 半中指端外側去爪甲如韭葉是穴禁灸然亦可灸三壯

小衝二穴各五壯 半小指端內側去爪甲如韭葉

足大指次指內橫紋中左右各三壯

治厥冷心痛

豐隆二穴各七壯外蹠上八寸

治久心痛足陽明胃絡

膻中三壯兩乳間婦人乳垂取

上腕三七壯鳩尾下二寸

膈俞二穴各七壯各一推下兩傍

秘灸將裨心繞項向前雙垂至兩乳中間齊截

斷却翻其裨心向後雙垂下脊其盡處以墨記之

灸五十壯心痛永不發其乳房垂者以天突下六

寸八分膻中處為兩乳中間

新增清熱解鬱湯

治胃脘積有鬱熱刺痛不可忍者此治心胃痛之主方

山梔子炒黑枳殼炒一川芎

黃連炒香附子各一錢蒼朮七分陳

皮乾姜五分耳草三分

右生姜三片水煎熟服服後戒飲食大半月再

服一劑神效如痛甚加姜汁二三匙入藥同服

山梔子黃連苦寒散鬱熱川芎香附子陳皮辛開

胃枳殼苦下滯氣蒼朮耳草之耳助胃乾姜之辛

溫能散滯氣生薑開胃又散滯口痛甚姜汁消痰

止嘔吐緩胃辛以散之

按丹溪云心痛須分新久若明知身犯寒氣口

傷寒物於初病之時宜用溫散溫利之藥若病

久則成爵熱若欲行溫散寧無助火為病乎由是古方多以山梔子為主或加川芎或二陳加蒼木痛甚者加乾姜反佐云此西國公製此方之張本平

加減小柴胡湯

治實熱嘔工心腹刺痛或寒熱不止

柴胡赤芍

枳殼

各二錢

黃芩半夏

各一錢半

山梔子

去壳半生半炒四錢

右剉生姜煎服

小柴胡湯可退實熱赤芍芩可下熱又芍芩治血虛腹痛枳殼可以利滯氣山梔子可以解爵熱用微炒或生則去熱按梔子加姜汁治心腹久痛又皮治胸心熱留皮去肌表熱又

能開爵

清上飲

治心胃刺痛並兩脇助痛嘔吐胸痞大便堅六脈數或寒熱口乾

柴胡黃芩赤芍芩厚朴枳實山梔

子爵金黃連半夏青皮大黃芒硝

甘草

右剉生姜三片水煎熱服

少陽膽經行于兩脇作痛責之少陽柴胡辛而氣溫辛者金之味故足以平木溫者春之氣故足以入少陽佐以黃芩瀉其實也佐以半夏破其滯也黃連山梔子之苦寒以清熱枳殼朴破以其氣青皮利其氣爵金涼心熱開爵過大黃瀉其實芒硝除

積熱有峻泄之勇耳草取和緩之氣緩急可以和平生薑可以益胃

金鈴子散 治熱厥心痛或發或止久不愈者

金鈴子延胡索 各一兩 右為末每服三錢酒調下痛止與枳朮丸

金鈴子涼熱止痛延胡索破結血治男子心腹小腹痛枳朮丸 見內

濟生愈痛散 治急心痛

五靈脂延胡索 炒 枳朮良姜當歸 各等分 為末每服二錢熱醋湯調下不拘時

五靈脂止諸痛更有速愈之妙故主心腹冷痛玄

胡索治心腹小腹痛枳朮破堅積散諸氣之固結良姜之辛者可以散滯熱者止腹痛經曰足則痛立止當歸其味由帶辛耳氣暢而流通無定

勝金散 治心下痛

桂枝玄胡索 炒 五靈脂當歸 各等分 為末每服三錢水一盞酒三分同煎食前服

五靈脂見前方玄胡索 同 當歸入少陰散滯血桂枝入血脉有通利之妙佐百藥有宜導之寄

失笑散 治心腹痛百藥不効

五靈脂蒲黃 等分 石為末先以醞醋調一錢熬成膏入水一盞食

前温服

五靈脂見前方蒲黃生用則行

元戎立應散 治心腹急痛

香附子 炒良姜等分

右為細末每二錢湯點服

香附子良姜之辛香行滯氣

烏藥沉香圓

治一切氣除一切冷調中補五藏益精壯陽緩腰膝治一切冷瀉療癥瘕痺痛疾風水

毒腫冷風麻痺及中惡心腹痛蟲毒氣宿食不消天行瘴疫膀胱腎冷氣攻衝皆脅俛仰不利及婦人血氣攻心胃腹撰痛

烏藥一兩 沉香五錢 人參三分 耳草四分

為末每五分入塩少許姜煎服

烏藥疏風寒又治腹痛辛散滯氣疏散宜通也

沉香上而至天下而至泉之藥也行滯氣邪之

湊其氣必虛用人參以補其氣耳味補中緩急用

耳草塩緩堅生薑益胃○或香附子縮砂陳皮辛

散之品半夏止嘔厥辛行滯○或神麴麥芽化食

滯枳殼下氣莪朮破堅積青皮利氣木香行滯氣

大沉香圓

治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香乾姜 炮 姜黃 洗 辣桂 栢香 各四分

白豆蔻 二兩 白芷 耳草 塩 耳松 焙 烏茶

各半香附子 焙 右末煉蜜圓如彈子

子大每一圓食前姜湯嚼下或姜三片略煎服

沉香行滯氣乾姜散寒邪姜黃辛溫能散結氣故
主心腹結積白豆蔻散滯氣白檀白芷耳松香附
子烏茶之辛香以行氣肉桂引諸藥而至痛既耳
草補中緩急

濟生加味七氣湯

治七氣為病及外感風寒為心痛

半夏

五兩

肉桂

廷胡索

炒各一人參

一兩

耳草

各五錢

乳香

三錢

右收咀每四錢入姜煎

寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣也七氣相干
爵及外感風寒升降有妨則攻衝而痛半夏之辛
溫可平七氣之逆肉桂之辛熱可行七氣之滯玄

胡索破結血治心腹小腹痛人參耳草補中緩急

乳香止諸痛

統旨

加味七氣湯

治七情鬱結心痛或因氣而攻痛

莪朮青皮香附子

俱半錢炒玄胡

索姜黃

各一錢

草豆蔻

八分三稜炮七分

肉桂

五分

益知

七分陳皮

八分藿香二分

耳草

四分

水二鐘煎八分食前服

七氣之義見上莪朮三稜破堅積香附子青皮行

滯氣延胡索姜黃見前方草豆蔻益知辛熱之品也

用之取以扶陽扶陽則氣行陳皮藿香之辛香行

氣耳草調和諸藥

九氣湯

膈氣積聚痞氣寒氣憂氣驚氣喜氣怒氣山嵐瘴

攻則欲死並治神效

香附子之辛行氣爵金兼開爵耳草緩急

家秘虛痛散

治諸般心氣疼痛及膀胱小腸吊疝及婦人血

氣刺痛立有神效

青皮五靈脂研飛去川練子川山甲

各二錢良姜炒香油廷胡索沒藥各一錢

沉香一錢八角懷香二錢檳榔子一錢

木香二錢縮砂許

右件改咀為粗末用木鱉子去壳一錢二分剉

片同煎藥炒令香焦去木鱉子木香用共為細

末每服一錢加塩一星用酒或滾水送下此方

累用無不應驗故附於後與好生君子共之

青皮行滯氣破下焦肝氣治脇痛五靈脂止諸痛

川練子止腹痛川山甲止痛良姜縮砂散滯氣沉

香木香檳榔子促止痛茴香除疝氣急氣木鱉子

止腰痛木鱉子

蟠葱散治男子婦人脾胃虛寒氣滯不行攻刺心腹

玄胡索肉桂乾姜炮各灸耳草縮皮去

蒼朮製各丁香皮檳榔子各義木炮

三稜炮 茯苓青皮去白各六兩

右為末每服二錢水一盞葱白一莖煎七分空

心服

寒氣入經澁而稽遲故令腹痛經云得炆則痛立止故用乾姜肉桂丁香皮之辛熱者佐以耳者和中氣於痛損之餘玄胡索味苦辛能降氣辛能散血故婦人氣血攻刺痛痛連於脇膈者主之蒼朮耳辛苦溫又用耳草之耳溫之品以助胃用檳榔子青皮以利滯氣三稜莪朮破堅積行諸氣結滯縮砂溫中開胃行凝滯之結氣茯苓之淡可使滲水穀相干之寒容犯胃多是飲食寒冷或因食

後呼吸冷氣取致葱主發散通陽氣

麻黃桂枝湯

治外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不得轉側

麻黃去節湯桂心芍藥細辛去苗乾

姜灸耳草各七錢半芩附子各五錢

每服五錢水一盞半生姜五片煎七分去查食

前服大便秘入大黃量虛實加減

外感風寒則惡寒發熱內攻五臟麻黃桂枝耳草香附子辛散外邪芩芩乾姜之辛攻內邪然恐其走泄陰氣故用芍藥之醋以收之又和陰血

桂枝四七湯治風寒冷邪客搏心腹作痛

桂枝芍藥羊芩製各一兩茯苓厚朴製

枳殼灸耳草各半人參紫蘓各一

右剉每服四錢姜七片棗二枚食前煎服桂枝

紫蘓耳草解表半夏茯苓厚朴枳殼和裏和裏

則痛止芍藥和陰氣于疏散之中邪所聚其氣

必故用人參

枳縮二陳湯治洗在心膈上攻

枳殼縮砂半夏陳皮香附子各二錢

草豆蔻乾姜炒各五分厚朴茴香耳草

二分玄胡索八分

右剉一劑姜三片水煎入竹瀝磨木香同服

陳皮半夏化痰涎止嘔逆香附子行滯氣枳殼厚

朴利滯氣經曰得吳則痛立止故用草豆蔻乾姜

茴香之辛吳者延胡索味苦辛苦降氣辛散滯氣

耳草調中諸和諸藥竹瀝止嘔逆化痰涎木香行

氣止痛

按此方除濕痰行滯氣之劑也壯夫宜與之也

錢觀文方治心

當歸八兩白木八兩

右為末沸湯點服一二錢

當歸入少陰心經血約言云當歸獨非主血

味兼辛散乃為血中之氣藥也白木強脾胃然

脾胃運痛止矣一說若氣滯氣閉腹痛等候宜禁

用之

補中益氣湯

治心腹疼痛每作心胸滿嘔吐厥冷面赤唇麻咽乾口燥寒熱不時而脈洪大

屢服寒冷損真之故內真寒而外假熱也且脈強洪而有怪狀乃脾胃氣虧損肝脈乘之而然當暖補其胃

本方加半夏茯苓吳茱萸

原方見內傷半夏止嘔逆茯苓平水穀相干之邪

吳茱萸之辛熱散冷氣

腹痛

傷寒腹痛詳見傷寒門不依他病但腹痛者辨寒

熱虛實治之

身傷寒邪口食寒物忽腹痛者治同心腹痛痛久不

止者多榮血凝滯不行也

白芍藥

酒炒因桂中耳草少

此為主藥宜隨證加減

白芍藥補榮血治血虛腹痛經曰得炅則痛止故

用因桂辛溫者能行血通凝滯耳草之耳緩急凡

用純寒純熱之藥緩其力

按之痛甚倍者實也

加檳榔子枳殼

各茯苓小

檳榔子枳殼降實茯苓滲滯氣

大便不通脈實者

加大黃

大黃通利大便衆人之取知也
按之痛止者虛也

加白木中乾姜十

白木補中益氣乾姜補脾辛以濕散止痛
久不得食氣弱脉微者

加人參小黃芪中

參芪取以益脾胃補氣

腹痛甚大便通後痛少減者食積也

河間木香檳榔丸

木香檳榔子各三分青皮陳皮白木各五錢

麥芽炒七錢枳實炒六錢厚朴四錢

右米糊原作湯為丸白湯下

木香檳榔子可以攻滯氣青皮陳皮可以利氣厚

朴枳實推陳之品也白木可以燥水飲之濕麥芽

可以化水穀之滯

枳實導滯丸治傷濕熱之

大黃一兩枳實神麴炒各兩黃芩黃連

茯苓白木各三錢澤瀉

右米糊原作為餅為丸或加木香檳榔

濕熱之物酒麪之類也燥以制濕故用白木茯苓

澤瀉若以下熱寒以勝熱故用芩連枳實大黃益

造變化者可以推陳而致新故用神麴○木香檳

柳子破滯

大便通後

以芍藥大白肉桂中耳草少為主藥加減和

中

芍藥取其味酸以能瀉土中之木肉桂之辛熟取

以扶陽耳草之耳取以助胃

忽心腹痛欲吐不吐欲瀉不瀉唇青者乾霍亂

灌塩探吐而愈 義見霍亂

脾胃虛弱人飲食難消腹痛綿綿不止者不可用利

藥

二陳湯加白木神麴炒麥芽炒

人參川芎

各

熱則痛止半夏之辛熟用之陳皮川芎以利腹中

之氣人參白木之耳温以助胃神麴麥芽以化水

穀之滯茯苓之淡耳以調中耳草之耳調中

痛甚雖虛人先下之而後調和脾胃 按急則

治其標緩則治其本

痛不移熱按之堅者死血也

沒藥小義木中當歸尾各肉桂馬鞭草

紅苓川芎

各桃仁大

沒藥止痛義木川芎利滯氣桃仁紅苓當歸尾潤

物也能澤腸而滑血肉桂辛物也能利血而行滯

馬鞭草活血行血消膨脹又曰血寒則血熱則行
因桂之辛熱君以桃仁則入血而行助下行之性
矣斯其製方之意乎

小腹硬滿尿不利者宜通小便

小麥澤瀉大各茯苓猪苓中各木通

肉桂小各熱加山梔子中滑石小

此方可考淋閉門

虫痛見心痛門

灸法

巨關七壯鳩尾下一寸灸中腕五十壯臍上四寸

天樞二穴各七壯臍兩傍二寸命門二七壯推十四下

石關二穴各二七壯鳩尾下四分

不容二穴各七壯巨關傍二寸

章門二穴各七壯直臍季

帶脉二穴各七壯章門下一

脾俞二穴各五十壯十一推半傍

新增

開胃導痰湯治肚腹疼痛

蒼朮香附子炒川芎白芷茯苓滑石

山梔子炒神麴各一陳皮乾姜各五

耳草少

右剉一劑水煎服

濕痰腹痛是土實也經曰土欲實木當平之蒼木
風木勝濕之品也故治濕痰腹痛陳皮香附子川
芎白芷利滯氣之痰乾姜辛熱止痛茯苓滑石滲
濕痰神麴化飲食之痰山梔子治心腹久痛加姜汁炒

神品芍藥湯

芍藥白三錢 肉桂一錢 耳草一錢

右剉一劑水煎服 香蘓散義見

義見此條之初痛久不止之方

五積散治一切肚腹疼痛有寒有熱有食有氣

義見中寒

姜桂散治寒腹痛

乾姜肉桂良姜各七分 枳殼陳皮厚朴

吳茱萸炒 縮砂各一錢 香附子一錢

耳草二分 木香五分 研入服

右剉一劑姜一片水煎服

肉桂乾姜良姜吳茱萸辛熱之品可以去寒邪又
曰熱能治腹痛香附子陳皮木香可以利滯氣枳
殼厚朴可以下氣縮砂理氣止腹痛耳草協諸藥
之力口痛不止茴香延胡索乳香止痛之品也○
寒極手足冷香附子辛散之品可以去寒邪之滯
也如今香附子辛散與吳茱萸良姜辛熱相用則

恐氣耗散而去吳茱萸良姜也。瀉枳殼下氣故
去。此方溫胃通行爵滯之劑也。初起者宜用
之。若夫心痛稍久而不止。胃中有爵熱者。清熱解
爵湯之內。黃連不可不佐用也。回春腹痛門。姜桂
湯外有吳茱萸。無藿香。蒼朮。茴香。治寒腹痛綿綿
無增減。脈沉遲者。

散火湯

治熱痛乍痛乍止
脈數者火痛也

黃連

炒芍藥

炒山梔子

枳殼

權

陳皮厚朴香附子川芎

各一木香

別研縮砂茴香

各五分耳草

三分

右剉一劑。姜一片。水煎服。

若能瀉火。故用山梔子。黃連。芍藥。和陰血。止腹通
陳皮。香附子。川芎。木香。縮砂。辛香。可以行滯氣。枳
殼。厚朴。可以下其急。茴香。治腹痛。耳草。和諸藥。
痛甚不止。延胡索。乳香。主諸藥。

按因熱痛者。此方或二陳湯加黃連。山梔子。黃
芩。痛甚者。加炒乾姜。從治之。亦可也。又丹溪曰
如腹中常覺有熱。而暴止者。此為積熱。宜調胃
承氣湯之類。下之。

凡腹中痛甚。飲凉水一盞。其痛稍可者。屬熱痛。
當用涼藥。清之。清之不已。而或遠臍硬痛。大便
閉實。煩渴。用涼藥下之。利氣丸之類。若飲水愈。

加作痛属寒痛用温藥和之和不已而或四
肢逆冷腹痛嘔吐瀉痢急服熱藥救之附子理
中湯之類須詳脈力有熱

四逆散 治寒邪變熱傳裏小便不利腹中痛或泄痢

炙甘草枳殼 炒柴胡芍藥

右等分每五錢水煎

耳草之耳温緩急温以治熱從治也柴胡治熱枳

殼下滯氣芍藥和裏止血虛腹痛

黃連湯 治胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欬嘔吐者用此并降陰陽

黃連炙甘草乾姜桂枝 各三人參二錢

右半芩合半 右 炙甘草乾姜桂枝 各三人參二錢 水煎入大棗二枚

黃連苦可以瀉火故用黃連瀉胸中熱半芩止嘔

逆乾姜桂枝散痛人參耳草大棗益胃益胃則去

胸中熱胸中熱去則陰陽得升降

活血湯 治血痛併治血結痛

當歸尾赤芍藥桃仁 去牡丹皮 延

胡索烏藥香附子枳殼 各一錢 川芎 七分

耳草 一分 紅朮肉桂木香 別研各五分

右判一劑姜一片水煎服

此方逐瘀通血理之劑也用而不愈者又桃仁養

氣湯

枳實大黃湯 治肚腹滿硬痛久不止大便實脈數煩渴者積熱也

枳實 枳實 大黃 檳榔子 川厚朴 各一錢

草 三分 木香 五分 別研

右一劑水煎溫服

枳實大黃下實檳榔子厚朴木香破滯氣耳緩急
以上諸品下實行滯故積熱從利而解故煩渴止
又曰苦以下熱寒以勝熱故用枳實大黃厚朴苦
溫破其痞檳榔子木香攻滯耳草協諸藥之力

溫中湯 以手按之腹軟痛
止者是虛痛也

良姜 肉桂 益知 縮砂 木香 別研 香附

子厚 朴陳皮 小茴香 酒炒 當歸 玄胡

黃索 耳草 各等分

右到一劑生薑煎服

良姜乾姜肉桂益知縮砂木香行滯氣香附子陳
皮理氣厚朴破痞茴香延胡索止腹痛當歸和血
下氣

按此方溫胃行壅滯之劑也若逢此證用此方
者可也豈宜干其脾胃虛損人哉時師咸謂痛
無補法不思之甚也○薛已醫案曰愚按腹痛
苦脾胃虛弱飲食不化或間腹中作痛用六君
子湯若飲食過多停滯未化或兼腹痛用人參
養胃湯若飲食既化脾胃復傷或兼腹中作痛
用六君子加當歸若胃中有熱心腹中腕作痛

嘔吐用二陳湯加黃連山梔子若脾胃虛弱少
食心腹作痛用六君子湯脾胃虛寒亦用六君
子湯加炮姜大凡腹滿痛按之不痛為虛痛者
為實餘當臨證制宜

加味平胃散

食積腹痛其脈弦其痛在上以手重按愈痛甚欲大便利後其痛減者是也

蒼朮末一河陳皮一錢厚朴八分半夏

姜炒川芎五分香附子一錢枳實一錢

木香三分神麴山查子一錢乾姜七分

耳草三分

右剉一劑生姜三片水煎溫服

食經宿而不化則令人腹疼痛治之者宜寬中下氣

健脾胃消食辛者可寬中故用蒼朮陳皮半夏乾姜
辛香者行滯氣故用川芎香附子木香若者下氣
故用厚朴枳實山查開胃消食積神麴化飲食滯
耳草協諸藥力

椒梅湯治時痛時止面白唇紅者是蟲痛也

烏梅去核蒼椒去核檳榔子去核枳實去核木香去核香附去核

子川去核練子去核肉桂去核厚朴去核乾姜去核

耳草各等分

右剉一劑生姜一片煎服

烏梅味酸虫得之而軟檳榔子川練子木香味苦
蛔得之而伏香附子縮砂理氣肉桂乾姜蒼椒辛

温蛔得之而死又曰卒則散滯温則止痛耳以調和諸藥之力

按因蛇作痛者攻齧心痛有休止其人吐蛇或與此湯飲藥餌轉入轉吐蓋綠物入則蛇動蛇動則令人惡心而吐又必面上白斑唇紅又痛後便能食或曰痛而久卧不安自按心腹時大呼或黃或青唇緩目無精光者虫痛也以上證用此方攻蟲温胃則愈若不愈者又別用殺虫毒藥處治之

草豆蔻湯

治臍腹虛脹作痛

澤瀉 一木香 分三 神麴 分四 羊棗 枳實

草豆蔻 黃芪

春莖不用

益知 炙耳草

各半錢

青皮 陳皮

各六分

當歸 茯苓

各七分

右 咀 一劑 生姜煎服

寒氣入經澁而稽遲故令腹痛經曰得炆則立止故用草豆蔻益知木香青皮行滯氣半莖茯苓陳皮耳草乃二陳湯也脾喜燥惡湿故用二陳湯燥湿調脾而培諸氣之源澤瀉滲湿神麴益造變化之物消飲食之滯推陳之品也黃芪補氣益中當歸味兼辛散為血中之氣藥

按此方除食爵氣實兼通利小便之藥也宜壯實人虛弱人甚禁之治腹中虛脹

木香順氣散 治氣滯腹痛

木香香附子檳榔青皮 醋炒 陳皮厚

朴蒼木枳殼縮砂 各一錢 耳草 五分

右姜煎服

辛以破滯香以行氣氣行滯散則痛止焉故用木香香附子陳皮縮砂苦以降氣氣降則痛止焉故用厚朴枳殼檳榔子也蒼木益胃耳草和中於痛損之餘

神效定痛湯

治腹中惡氣積冷氣攻痛胸膈嘔吐心腹大痛氣塊攻作痛一切虛冷之證

廷胡索肉桂縮砂檳榔子三稜莪

木茯苓香附子蒲黃五靈脂茴香

良姜 油炒各三錢 乾姜丁香青皮 香油炒

檀香木香藿香草豆蔻仁 各二錢 沉

香 一分 乳香沒藥 各三錢五分

右為末每服二錢溫酒調服

廷胡索治心腹小腹痛寒氣入經澁而稽遲故令

腹痛經曰得熱則痛止故用肉桂乾姜茴香良香

丁香草豆蔻縮砂辛香者行腹中滯氣故用木香

陳皮白檀香附子藿香沉香苦者下氣故用青皮

檳榔子三稜莪木可以破積滯五靈脂止諸痛有

速愈之妙蒲黃生用則行氣此方也不寒不滯則

腹痛沒藥乳香止諸痛

腰痛

腰痛者腎之所在也腎氣虛憊外傷寒濕腰重痛值天陰及久坐痛彌甚者濕邪也

敗毒散方見感冒

加蒼朮防己

此方也辛散之劑也以風柔而治濕如畢濕之地風行其上不終日而濕去矣經曰風能勝濕此之謂也蒼朮辛能燥濕防己為下濕治

虛甚挾濕邪者

加續斷當歸杜仲熟地黃各干膝小

續斷益氣力續筋止痛當歸熟地黃杜仲干膝補

腎之品也腎著於濕故用之

熱者加黃柏黃柏走下部主下濕

痛處微腫者

加木通黃柏澤瀉各防己小

腫屬濕木通澤瀉利水滲下濕防己黃柏治下濕

腰痛綿綿無增減者虛證也形體憔悴者血虛腎虛

也

四物湯加黃柏杜仲各五味子干

膝酒木瓜各

四物湯養陰之品也可以滋補肝腎之陰補則腰痛去也杜仲味厚而溫黃柏干膝味厚而寒溫者

可使養陽寒者可養陰均之味厚則均之能走下部矣五味子在下則補腎木瓜驅濕滋脾入肝利筋骨

墜墮打撲瘀血凝滯腰痛者

四物湯加桃仁中紅芍藥木牡丹

皮肉桂小各

四物湯可以滋補肝腎之陰桃仁紅芍藥木牡丹皮逐瘀血肉桂性溫行血能通凝滯

獨活寄生湯

治腎虛坐臥冷濕也或傷風腰痛

獨活錢一桑寄生杜仲炒細辛干膝

白芍藥秦艽茯苓肉桂耳草灸川

芎防風人參熟地黃當歸各半

右水煎

腎氣虛弱脾肝之氣襲之令人腰膝作痛屈伸不便冷痺無力者此方主之。○腎水臟也虛則肝脾之氣湊之故令腰膝實而作痛屈伸不便者筋骨俱病也靈樞經曰能屈而不能伸者病在筋能伸而不能屈者病在骨故知屈伸不便為筋骨俱病也冷痺者陰邪實也無力者氣血虛也此方也獨活桑寄生細辛秦艽防風桂心辛溫之品也可升舉肝脾之氣肝脾之氣升則腰膝弗痛矣當歸熟地黃芍藥川芎杜仲午膝者養陰之品也可以滋

補肝腎之陰肝腎之陰補則足得血而能步矣人參茯苓耳草者益氣之品可以長養諸臟之陽諸臟之陽生則冷痺去而有力矣

按此方除風消濕之劑也一方加續斷為十六味肘後方有附子一枚無桑寄生人參當歸耳草王宇泰曰風傷腎而腰痛其脈必帶浮或左或右痛無常處牽引兩足宜五積散加防風全蝎或獨活寄生湯又治風濕腰痛然證有虛實宜能分補瀉

腎虛腰冷痛尿數及有餘瀝者

八味丸加續斷當歸

中各

木瓜五味子

小各

腎主水脾主濕濕勝則流當歸於坎者勢也曰腎著腰為腎之腑濕為陰之氣故令腰冷如水腎具水火主二便而司開闔腎間之水竭則火獨治能開闔而不能開令人病小便不出腎間之火熄則水獨治能開而不能闔令人小便不禁八味丸以附子肉桂之溫熱益其火以熟地黃山茱萸之濡潤壯其水火欲實則牡丹皮澤瀉之鹹酸者可以收而瀉之水欲實則茯苓山藥之耳冷者可以製而滲之水火既濟則開闔治矣當歸五味子滋陰之品續斷益氣力續筋止痛木瓜驅濕滋脾入肝利

筋骨

中寒邪脉遲腰痛厥冷

生科五積散加生姜葱白

五積散治寒邪生姜葱白散寒邪

腰痛有瘀血者

肉桂為末醋和塗之

肉桂行血散滯氣

婦人腰痛治男子同法但有倭俗云腰氣病是室女

寡婦僧尼等因絕陰陽之合致衝任經血瘀滯月水

不來或為赤白滯為腰痛漸至腿膝枯痿方其取謂

筋痿也證類本草第二卷有女人血氣歷腰痛之名

此蓋俗所謂腰氣病也治方

四物湯加桃仁午膝馬鞭草

紅花

四物湯可以滋補陰血桃仁紅花可以逐瘀血午

膝馬鞭草主痛

血海虛冷腰痛月水不來者

四物湯倍當歸熟地黃加肉桂

四物湯義見上當取血中之氣藥也熟地黃養陰

入血故倍之肉桂溫溫血行滯

氣虛汗出食少

加人參黃芪白朮

參芪可以補氣又黃芪實表白朮益脾胃進食

月水不斷腰痛者詳于婦人門月水不調帶下條交
考治之而可又有家婦人月水不調腰痛者宜分血
氣虛實寒熱治之屢歷生產或素瘦弱平生少食之
人月水不來或帶下者多是虛

不可泥女病多氣爵之論專用破氣行血之劑
灸法 腰脊痛者風熱邪則用敗毒散之類散之而

後宜灸

命門二七壯令患人正立以竹杖拄地度至臍

腎俞二穴各五十壯傍十四椎下兩

膀胱俞二穴各三十壯傍十九椎下兩

志室二穴各三十壯傍十四椎下兩

胞育二穴各三十壯傍十九椎三寸

腰俞二穴各三十壯傍十一椎下兩 長強壯尾端

中膂俞二穴各七壯傍十一椎下兩

崑崙二穴各七壯傍十一椎下兩

閃挫腰痛

腫下白肉際各七壯 腰眼二穴各七壯傳口

婦人月水不調腰痛

帶脉二穴各七壯章門下一

交儀二穴各二七壯內髀上五寸少近後

腎俞胞育腰俞各多灸之宜

新增

小續命湯 治風腰痛

方見中風三因方加桃仁

柳仁潤下親下之藥也下行者亦可以用之又去

血中瘀

川芎肉桂湯

治冬月露卧感寒濕腰痛用此代針

羌活半錢柴胡肉桂桃仁當歸尾

防己各三分蒼朮耳草各一錢獨活神麴炒各五分

右咬咀作一服好酒三盞至一盞食前暖處溫

服 羌活獨活柴胡防風川芎辛散之品可以散寒濕

肉桂溫可以去寒邪桃仁當歸尾可以去血中瘀

蒼朮之辛可以發寒濕神麴消胃中飲食滯防己

為下濕治耳草調和諸藥緩急

人參噴氣散 治氣滯腰痛

人參川芎桔梗白芷陳皮枳殼麻白朮

黃鳥藥炮姜耳草各一錢

水煎或為末食前用耳草湯調服

參朮可以調氣川芎白芷陳皮辛香可以理氣麻

烏藥可散滯枳殼苦可以下氣桔梗利氣舟楫之

藥也炮姜辛溫可以行滯氣耳草取以調和諸藥

○一方五加皮利周身之血氣去固結之風濕療

日久之痛痺本草治心腹腰膝痛

調肝散治肝怒傷肝發為腰痛

半芩三錢肉桂木丸當歸川芎午膝

細辛各二分菖蒲酸棗仁微炒皮耳

草一分

右剉細每三錢姜五片棗二枚煎

肝為盡陰膽無別竅怒則氣無所泄爵則火無所入越也腰脇者肝之所在也取以痛者木氣實也木欲實金當平之酸棗仁秋成者也生則全得金氣而能制肝木當取入足厥陰經散血滯川芎入足厥陰經開爵氣活滯血柴胡入足少陽經厥陰經

治左右兩傍脇下痛半芩入足少陽經以辛燥能

逐寒而散結因桂溫散滯午膝引諸藥性能下行

治腰腿又治血滯細辛味辛以破結滯菖蒲導滯

利四肢能除濕痺用耳草者恐木病傳脾而先實

其基也木丸入肝利筋骨姜棗調其榮衛不令經

氣壅滯也

清溫散治濕熱腰痛

黃柏一搗水拌炒澤瀉一錢蒼木一米耳半

牡丹皮白芍藥煨午膝酒木丸歲

靈仙陳皮各一錢耳草三分

右水二鐘姜三片剪八分

牡丹皮芍藥午膝羶陰之品也補肝腎之陰肝腎
陰補則腰痛止澤瀉滲利濕葳靈仙驅風之在手
陳皮可以利氣木瓜為下濕治耳草調和諸藥蒼
木燥諸經濕黃柏去下部濕加羌活名清熱勝濕
湯
羌活燥濕利痛黃柏退濕熱
如神湯 一名舒筋湯 治男婦腰痛閉血滯腹
中疴痛產後服之更妙
廷胡索 微炒 當歸 桂心 各等分
右細末每服二錢不拘時溫服調服
廷胡索活血除風濕理氣當歸帶辛耳賜氣活血
桂心調榮衛去邪

按直指方曰治風淫血刺身體疼痛四肢拘攣
廷胡索活血除風濕理氣或曰三味苦溫劑能
去風寒養血入厥陰經治筋骨病楊仁劑特主
藥言其能餘佐使也

加味如神散 治男婦一切腰痛

破故紙 酒炒 茴香 鹽炒 廷胡索 當歸 酒洗

午膝 酒洗 杜仲 酒炒 黃柏 酒炒 知母 肉桂 少許

右剉生姜煎服

破故紙杜仲當歸味厚而溫黃柏知母午膝味厚
而寒溫者可使養陽寒者可使養陰均之味厚則
能走下部矣廷胡索味苦辛苦降氣辛散血茴香

治疝氣腰腎虛痛肉桂茴香辛溫理氣止痛經曰
痛得熱則立止

按腎坎象也水火並焉水衰則陽光獨治而令
腎熱火衰則陰翳襲之而令腎寒水火俱衰則
土氣乘之而邪實於腎均之令人腰痛也

氣惱木香行滯氣○瘀血桃仁紅花行瘀血滯

養血湯 治腰痛腿痛

當歸生地黃蒼朮肉桂杜仲 炒 鹽酒

扶苓防己午膝 酒洗 各川芎 五分 耳 三分

山皷來 一錢 半

右對一劑水煎臨熟入酒少許同服

當歸川芎地黃杜仲午膝者養陰之品也可以滋

補肝腎之陰肝腎之陰補則腰得力防己蒼朮肉

桂辛溫之品也可以升舉肝脾之氣肝脾之氣升

則腰膝弗痛矣

按大抵腰痛新久總屬腎虛新痛宜疎外邪清

濕熱久則補腎兼補氣血而可也

伶飯團足以利水土之邪而平其氣也

三因安腎丸 治腎虛腰痛

破故紙 炒 胡蘆巴 炒 小茴香 炒 川

練子 炒 續斷 炒 桃仁 炒 杏仁 炒

山藥 扶苓 各二兩

右為末蜜丸梧子大每服五十九丸空心鹽湯下
破故紙少陰腎經之溫茶治腰膝之冷痛茴香治
疝氣腰腎虛痛川練子理氣止痛續斷入腎膀胱
止腰痛桃仁杏仁破瘀血山藥茯苓甘淡者也耳
能制濕淡能滲濕故足以去腎虛之陰濕

脇痛

足少陽膽經自頭降足足厥陰肝經自足升至乳
下此二經歷於兩脇腋故脇痛多是肝木有餘之
愆也脈弦實者

柴胡 大川芎 青皮 芍藥 龍膽草

當歸 草 小 各 生薑 三片

柴胡味辛而氣溫辛者金之味故足以平木溫者
春之氣故足以入少陽川芎入手足厥陰行滯氣
青皮肝經引經藥也破肝氣使之下行故柴胡疏
金上焦之肝氣青理下焦之肝氣龍膽草破肝氣芍
藥入足厥陰抑肝邪而緩中生薑調其榮衛不令
經氣壅滯也加肉桂者肉桂有通利之妙佐百藥
有宣導之寄

右脇痛者宜順肺氣矣兩脇固肝膽經而左脇專肝
膽右脇肺臟所在故右脇痛者之肺也

枳殼 姜黃 肉桂 各 耳草 少 為主

加減 咳嗽 加陳皮 茯苓 各 半夏

桑白皮各 生姜各

右脇痛責之肺肺苦氣上逆故用枳殼下氣利膈

姜黃辛溫能散治心腹脹滿散氣為最肉桂之辛

溫辛屬肺能通凝滯耳草調和諸藥○肺主氣喜

利故用陳皮姜快之桑白皮瀉咳又陳皮桑白皮

保肺之藥也茯苓調脾胃益金之母半夏消痰止嘔

逆入胃氣通肺利脾而致新矣

食積脇痛右寸關緊實者

厚朴神麩麥芽各半

厚朴之苦可以下氣半夏之辛可以行滯神麩麥

芽喜消則可以推陳而致新矣

氣弱之人因勞後脇痛者

八物湯加桂枝中木香青皮小

八物湯補氣血之劑木香青皮可以理氣桂枝之

溫行血通凝滯

瘀血痛

柴胡大川芎當歸桃仁中紅苓芍藥

沒藥小

左脇肝之所在柴胡之辛金之味以制木當歸芍

藥川芎養血桃仁紅苓逐瘀血沒藥止痛

咳嗽脇甚痛

二陳湯加青皮香附子川芎芍藥

氣行則痰不滯氣利痰行胡咳嗽之有二陳湯以
治痰青皮香附子行滯氣赤芍藥酸瀉壅川芎開

爵行滯血

肝氣不足脉弱脇痛

枳殼炒芍藥炒川芎各人參桂枝各

薑

肝藏血故用川芎芍藥調肝血枳殼下滯氣人參

味耳耳以生血桂枝之温行血通凝滯生薑利氣

婦人脇痛

香附子醋白芍藥肉桂延胡索炒

生薑

婦人爵多故香附子之辛開爵利氣芍藥酸瀉壅

肉桂行血通凝滯延胡索辛苦辛散氣苦下氣兼

治心腹小腹痛生薑辛散滯氣

灸法

章門三十壯或五十壯左右隨

天地二穴各二十七壯腋中三寸

肝俞二穴各二十七壯 膽俞二穴各三七壯志

室二穴

新增

當歸龍會丸

治內有濕熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處却以生薑汁吞此丸痛甚須炒令

草龍膽當歸山梔子黃連黃芩黃

柏各一兩大黃蘆薈各半兩白朮二錢半

麝香兩半

右十二味為末麵糊丸

一方此等川芎各半兩○又方加青黛兩半蜜丸治

天脇痛麵丸降火

咳嗽而兩肋痛多怒脈弦者病原於肝也肝者將

受軍之官氣常有餘氣有餘便是火故宜瀉之是方

也黃芩黃連山梔子黃柏龍膽青黛大黃皆能瀉

火而未必入肝肝氣燥諸藥得蘆薈麝香之燥同

氣相求可以入肝而平肝矣然肝木為生火之本

而諸臟之火不無相扇諸藥雖固蘆薈麝香之引

而入肝然其性各有所屬則能兼五火而治之用

當歸為君者以其能和五臟之陰以蜜為佐者以

其能行諸藥之滯也琥珀消瘀血破癥結即治榮

也屬陽與金柴胡川芎治肝

平肝流氣飲治脇痛及小腹至遠

當歸洗酒枳殼洗酒陳皮各一錢白芍藥酒炒

黃連酒炒山梔子鹽水炒香附子童便浸炒

青皮醋炒川芎各六分厚朴各七分柴胡各七分

耳草各四分吳茱萸各四分水煎空心服

右剉姜三片水煎空心服

肝藏血而主怒故病則氣血俱病故用川芎當歸芍藥以補血柴胡味辛而氣溫辛者金之味故足平肝木越人云東方常實實則可以瀉矣故用青皮厚朴黃連山梔子破氣香附子半夏破氣滯吳茱萸折肝木之性治疝氣痛茯苓耳淡耳益土淡平利竅

按此方瀉藥也肝實脇痛宜症撰用焉○若夫肝血虛痛則悠悠不止耳目眩曠善恐如人將捕四物湯加柴胡或五積散去麻黃加木香青皮虛甚或損脇下常一點痛不止者名乾脇痛甚危八物湯加木香青皮心有火去肉桂加山

梔子或吳茱萸水炒黃連

枳殼煮散治因悲憂傷肝兩腋骨痛筋脈拘急腰脚重滯股脇牽痛四肢不漸至背脅急大治

枳殼川芎防風細辛桔梗各八分

耳草四分芍藥三分姜煎溫服

枳殼下氣川芎入手厥陰經少陽經本藥開鬱氣活滯血芍藥入足厥陰經抑肝邪細辛防風辛溫之品也可以升舉肝脾之氣肝脾之氣舉則脇痛止也桔梗開提氣血與耳草同為舟楫

加減二陳湯治痰飲

依本方加枳殼縮砂木香川芎

青皮蒼朮香附子茴香去耳草

痰飲變生諸病氣血壅滯不得宜通也濕土生痰

故用二陳湯可考枳殼去痰如倒壁蒼朮燥濕香

附子青皮木香縮砂之利能行氣滯之痰川芎血

中之氣藥也茴香主腰腎之疝痛此方也燥

濕氣行則痰滯去胡脇痛之有

沉香導氣散治一切氣不升

沉香各二錢檀榔子各二錢人參五分白朮烏

藥麥芽神麴紫蘊大腹厚朴各一兩

訶子兩炮半姜黃陳皮耳草莪朮炮

紅苓益知三稜各二兩香附子兩炮一

右為細末每服二錢食前沸湯點服

氣陽也升降出入法乾之行健不息使氣無留滯

斯無痛苦也留滯則痞悶痛禁之疾楚生雨氣膏則

不流矣故用香附子沉香之屬利而開之氣積則

不流故用陳皮莪朮三稜益知大腹皮之屬快而利

之氣沉則不流矣故用紫蘊烏藥之屬升而浮之

氣逆則不流矣故用檀榔子厚朴之屬抑而下之

氣緩則不流矣故用人參白朮耳草之屬補而益

之姜黃散結氣破瘀血訶子之澁恐氣泄干利氣

之間神麴麥芽開食爵其盒造變化者推陳致新

之品也

活血湯 治左脇下有塊作痛

不後者是死血也

依本方加青皮去烏藥

芍藥湯 治婦人

白芍藥 延胡索 炒 肉桂 各一 香附子

二兩醋一

升鹽浸炒 右為末每服二錢不拘時白湯調下

芍藥治血虛腹痛則脇痛病主之按左脇肝之所

在也芍藥入足厥陰經延胡索破結血治男子心

腹小腹痛亦主脇痛香附子利氣肉桂行滯氣

按婦人心性偏仇每多鬱滯取謂多氣少血者此

也香附子為能疏氣散鬱氣疏鬱散則無痛楚之

患或用醋或用塩此藥專主發散是以收斂其氣

也

白木丸 治息橫病腹下滿逆妨悶喘息不便

白木 枳實 肉桂 各一 人參 二 陳皮

桔梗 醋炙耳草 各一

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九不拘

時溫酒送下日三服

人參白木耳草調氣陳皮理氣桔梗行胸膈之氣

舟揖之品也枳實下氣肉桂行滯氣

脚氣

脚氣之發有不因他病者有因他病生者先小腹
股內硬痛及腿脚赤腫或惡寒發熱狀若傷寒但
筋牽脚痛是其候也或有足膝不仁痺如虫行者
或有足指頭至脛膝冷者或有足膝熱痛筋牽急
者或有足膝筋牽急甚則轉筋者或有脛脇邊如
針刺衝上心胸者或有惡聞食氣見食嘔逆者或
有心悸惡見明好暗處者

脚氣有外得於濕者內得於飲食勞役者又得於
七情鬱滯者病目雖有內外之異齊屬於濕熱也
然有虛實寒熱之別宜詳脉症
脉絃者風濡弱者濕洪數者熱遲澁者寒微滑者

虛牢堅者實結者氣○脚氣入心恍惚忘言嘔吐
眠卧不安左寸脉乍大乍小或伏者死○入腎腰
脚腫小便不通額與眼胞黑攻胸喘息左尺脉絕
者死

濕熱脚氣足膝赤腫痛者

蒼朮防己枳殼炒香附子羌活芍藥

黃柏炒鹽酒木通澤瀉檳榔子紫蘘木

此右等分水煎

經曰濕氣勝者為著痺血不得行則腫此脚氣取
以為壅疾蒼朮之燥劑可以燥濕疏通腠理而散
結腫於皮膚佐以黃柏健行下焦治股足濕熱之

妙劑也紫蘘香附子羌活辛香利氣之品可以泄
越壅塞之脚氣檳榔子木通通劑也可以通塞黃
栢若寒可以去熱澤瀉淡滲之物能導利下焦之
濕防已可以下濕枳殼可以利壅塞之氣芍藥取
以養血干敗壞之餘木瓜可以去濕脚氣濕腫得
之能安

寒熱頭痛狀如傷寒脚膝腫痛者

敗毒散 此方也辛散之劑可以散邪毒取

加之蒼朮散濕防已下濕大黃池濕

右二方加減治之腫痛漸退用

川芎茯苓芍藥常歸陳皮白朮

白芷桂枝黃栢木香各耳草之類

孫真人曰脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以

服藥致虛而殞故脚氣之人皆不得大補亦不得

大瀉川芎能散血中之氣然芍藥當歸川芎可以

調血白芷陳皮桂枝木香辛香可以行壅散滯白

朮制濕黃栢去熱茯苓耳草益脾制濕

加減治之筋牽

加木瓜薏苡仁

薏苡仁療筋急拘攣屈伸不便木瓜安筋病轉急

○便結

加桃仁檳榔子

栲仁檳榔子皆潤利之品也

筋拘攣足膝難伸

加地黃當歸中木瓜桂枝紅苓各小

血不得行則為前症當歸地黃可以養血紅苓可

以活血木瓜可以舒筋桂枝之辛溫可以行壅

腫未去黃餅去熱升麻升氣麻黃散寒

加防己木通大腹皮各等分以行壅大

腫者脚氣內壅防己木通者通劑也用之行壅大

腹皮行氣而散寒也

痛未退白朮厚朴去積白芍和血甘草和中

加木通中木香小茴香各等分

氣不得通則痛木通通壅塞之氣木香行滯氣

感干寒濕脚膝痺痛或腫足下冷惡寒

生科五積散加減治之見中

內因濕熱無外邪脉沉實數脚膝腫痛者

蒼朮浸鹽水黃柏酒炒生地黃木通

防己各川芎各檳榔子各

黃柏生地黃寒可以去熱木通防己檳榔子通劑

也可以去壅蒼朮燥劑也可以去濕川芎能散血

中氣

熱甚

加黃連

黃連苦寒可以去熱

大便不通

加大黃

大黃下大便

小便不利

加午膝

午膝治淋症結腫而藥性能下行

脚氣入腹胸腹滿悶大便不通者

羗活紫蘘沉香檀榔子川芎陳皮

海浮大腹皮黃柏各木瓜木香白木各

廣芍藥中耳草火

右煎服又用生姜研調貼湧泉穴就其上灸二

湯藥三十壯

前症內壅故也羗活紫蘘陳皮辛散之品也可以
池越壅塞之脚氣木瓜可以舒筋沉香木香可以
行滯氣換榔子可以通滯川芎行血中之氣黃柏
可以去熱白朮可以燥濕大腹皮可以快氣赤芍
藥可行結氣耳草可以緩急調和諸藥
婦人中年後血海虛乏有此症

四物湯加減治之

四物湯補血之劑也

足熱脈數

加黃栢 黃栢可去熱

足冷脈微

加肉桂木香

肉桂可以去寒木香温温之行

杉木節

下杉木節質重而氣芳質重則能達下氣芳則能

源本云

外邪風濕盛者禁洗潔入內則為害邪退

後腫痛不止者洗潔而可杉木節橘葉水煎洗

敷藥

小豆南星為末姜汁調塗

小豆治脚氣水腫天南星破氣結姜汁之辛散氣

灸法 有外邪不可灸熱退脈不數者可灸凡痛處

按之灸其處自上以次灸下灸穴有數處取中於

痛處者灸之

風市

在膝外兩筋間立舒下兩

委中

在膝內中央三寸下

陽陵泉

在膝下三寸後一寸半上七

地機

在膝下五寸經漏谷寸內踝上六

承山

在腓腸間絕骨寸外踝上三

三陰交

在內踝上

附陽

在外踝上

僕參

在內踝下

陽驕

在內踝下

白

在內踝下

京骨 足跗外側大骨下白肉間

新增

加減檳榔子湯 治一切脚氣脚弱各日壅疾

檳榔子 陳皮 紫蘓 各一灸耳草兩

每服五錢水一盞半生姜五片煎至八分去渣温

服不拘時

脚氣喜通惡壅紫蘓陳皮辛苦可以疏邪氣而正

氣檳榔子之通劑可以去壅耳草和中而補正生

姜辛所以行滯氣散邪氣

如脚氣痛不已者

小加木朮五加皮

木朮舒筋五加皮利周身之血氣去固結之風濕

治心腹腰膝痛舒筋

婦人脚痛

加當歸

婦人主血而爵多當歸養血疏通而無定味帶辛

耳而氣暢

室女脚痛多是肝血盈實

大宜加赤芍藥

赤芍藥除肝經邪行滯血散結氣

然 師尼寡婦亦

甲滿不食者

加枳殼

枳殼池腹中壅寒氣

痰厥成嘔者加半夏半夏燥濕痰止嘔逆腹痛

大便不通者用此湯下青木香丸如便不通加大

黃黃大黃通大便如取眾人知也

青木香丸潤利之劑

小便不利加木通

木通通利之劑也

轉筋者加吳茱萸

吳茱萸之辛能行壅熱能壯氣故轉筋止

脚腫者加大腹皮木瓜

氣不得通則痛血不得行則腫此脚氣所以為壅

疾也大腹皮快氣木瓜活血主筋病轉急

足痛熱加地骨皮地骨皮除熱

三因紫蘊飲

治脚弱上氣陰陽交錯清濁不分上重下虛中滿喘急嘔吐自汗無復紀律

紫蘊微炒半夏各五兩前胡厚朴炙耳草

當歸各二兩肉桂陳皮各三兩

右以咀每四錢入姜棗煎服

按此出少陽例血虛氣逆者可用

紫蘊陳皮辛芬可以疏氣半夏止嘔逆厚朴可以

下氣治中滿當歸可以養血前胡可以治喘急療

胸腹痞滿肉桂辛熱可以行壅滯耳草大棗姜可

以和榮衛調中

杉節湯 治脚攻心痛悶

青皮陳皮烏藥雞心槿榔子木瓜

乾杉節半夏枳殼製縮砂茯苓 赤各半兩

下子茴香 微炒 大腹皮紫蘘子 微炒 蘿菔

子 微炒 北梗炙耳草 各一分

右剉每三錢姜五片煎

三陳皮烏藥辛散之品可以泄越壅塞脚氣青皮槿

榔枳殼可以下氣木瓜舒筋杉節 見前 半夏縮砂止

脹悶茯苓耳草脾家之藥丁香茴香辛香散壅塞

脚氣大腹皮快氣紫蘘子蘿菔子下胸中氣桔梗

可以利氣舟楫之劑也生姜辛散壅

東垣導痰湯 治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便

湯

羌活獨活 各五分 防已當歸 各三錢 大

黃 酒濕煨 枳殼 二錢

右吹咀每服五錢或七錢水煎 按此方出

陽明例治風熱之藥也

二活辛散之品可以泄越壅塞之風熱 按本經原

色二活後人為獨活羌活氣雄獨活氣細 防已木通

通劑也可以去壅枳殼可以下氣大黃下實當歸

疏散不定故養血行結

東垣當歸粘痛湯 治濕熱為病肢節煩痛有背沉重

可眩腫痛不

羌活五錢 人參酒製 升麻葛根 蒼

木各二錢 灸耳草茵陳 葉酒炒 各防

風當歸知母 澤瀉猪苓 各白

木一錢五分 右咬咀每服一兩水煎空心服臨

睡再服之

按此出太陽例治濕熱之藥也

脚氣內壅故令疼腫濕熱不得泄越故令發黃

越壅塞之脚氣若參黃芩茵陳知母皆苦寒之

品可以解除內壅之濕熱乃澤瀉猪苓白朮滲物

也耳能導利下焦之濕當歸人參耳草者取以養

血干敗壞之餘益氣干池越之後也

加味二妙丸 治兩足濕痺疼痛或如火燎之熱從足

為病皆致然耳 蒼木四兩 黃柏酒浸 干膝一當

歸尾酒浸 草薢一兩 防風一兩 龜板醋

一兩或去龜板加 熟地黃二兩亦可

右為細末好酒打糊為丸如梧桐子大每服七

十九空心塩姜湯下

蒼木可以燥濕黃柏可以去濕熱草薢若燥之品

足以利水土之邪而平其氣午膝味厚能走下部
矣當歸尾以午膝下行足膝而治血榮筋龜板主
腰背痠痛防已通劑也可以去壅塞

癩

中惡附

癩謂之失心氣精神恍惚言語錯亂喜怒不常病
久不愈多是心血不足也
癩者卒然而發發則暈倒不知人手足搐搦腰脊
強直或口眼牽引目睛上搖口吐痰沫或作六畜
之聲食頃乃甦又有時而發癩有陽症先身熱搐
搦呻喚脈浮者陽癩易治先身冷不驚掣不啼呼
頭目昏眩脈沉者陰癩難治

狂者猖狂剛暴陽氣有餘棄衣登高拔劍妄走罵
詈不避親疏是痰火上炎也

癩多難治四物湯下平補鎮心丹

癩有五種之別總是痰火所為也痰熱盛者先以

二百丸下痰後以硃砂安神丸去心熱

狂以金露圓或烏巴丸下之後用安神丸

中惡之症或暮夜登廁或人所不至之地忽然眼
視鬼物吸著惡氣卒然倒地四肢厥冷兩手握拳
頭面青黑口噤不知人或錯語妄言是也或曰卒
啞又曰鬼擊先灌蘓合香圓即令人圍繞聞人聲
不得點燈火如初有之則不妨又不可大聲驚喚

但痛咬足跟並大拇頭甲邊未醒則灌雄硃散或
皂角末或羊隻末吹鼻醒後以調氣散平胃散合
勻服之

平補鎮心丹 補心不足

白茯苓 五味子 茯神 麥門冬 肉桂

車前子 各一分 遠志 天門冬 熟地

黃山藥 各一錢 龍齒 二錢 酸棗

仁 去殼炒 人參 半錢

右煉蜜丸辰砂為衣半飲下

源本曰癩多難治四物湯下平補鎮心丸

心者神明之臟過於憂愁思慮久久則成心勞心

勞則神明傷矣心主血血濡則大便潤血燥則大
便燥茯苓能補虛五味子酸棗仁取以收心二冬
取以益心津遠志取以養心神癩疾表邪之餅干
肝癩病表邪之餅干心車前子治肝中風熱潤以
益血故用山藥熟地黃潤以補心肺假姜汁則去
痰通閉龍齒可以安魂酸欽辰砂能鎮心安神酸
棗仁可快收引人參能寧心爾五味子潤燥取以
養血養氣取以養心茯神肉桂茯苓取以益風四
物湯取以養血也

朱砂安心丸 去心熱

黃連 酒洗 一辰砂 錢一 生地黃 酒當飯酒

灸耳草 各半

右蒸餅為丸津唾吞下

硃砂之重可使安神黃連之苦可使瀉火生地黃之涼可使清熱當歸之辛可使養血乃耳者可以緩其炎炎之焰一可以養氣而生神○心虛而火襲之心神不安夢中驚悸者主之

金露圓 下氣

生地黃 焙 貝母 川芎 肉桂 耳松鱉甲

米醋 灸耳草 白茯苓 人參 枳殼 炒 厚朴 蜀椒 去目炒 乾姜 炮 菖蒲 米泔浸

防風 吳茱萸 紫苑 柴胡 桔梗 各一

黃連 焙 草烏 豆 炮 巴豆 去心膜醋

右為末麪糊丸姜湯下

生地黄可以清心肺之熱貝母散結氣利痰氣行則痰行氣滯則痰滯故用蘿菴子川芎行滯氣之痰茯苓之用滲痰濕枳殼厚朴所以攻痰積痰之滯也本於寒故用肉桂蜀椒吳茱萸乾姜草烏豆人參以補之防風柴胡可以行在經之邪黃連可以涼痰熱紫苑治嗽消痰桔梗可以利胸膈舟楫之劑香可以利竅故用耳松菖蒲又曰菖蒲味辛氣清味辛則利竅氣清則通神巴豆可以通閉塞甲除腹中癥

烏巴丸下痰

巴豆五粒烏梅五個右同研水丸硃砂為衣姜

湯下瀉後以白粥補之

巴豆通閉塞利水穀道路烏梅之用可收斂

元戎二百丸去痰

白礬一兩輕粉一字或半錢

蒸餅裹白礬蒸熟入輕粉為丸姜湯下

白礬鹹寒可以軟頑痰佐以輕粉者取其無竅不

入且逐風痰積熱

雄硃丸去痰涎

辰砂雄黃各半白附子一錢

右米糊丸人參湯下一作人參

雄黃可以消痰硃砂可以安神白附子之辛可以

行滯

寶鑑沉香天麻湯癩疾愈後發

沉香益知川烏豆各二錢天麻防風

羊芩附子炮各五錢耳草當歸

白僵蠶各一錢獨活四錢

右生姜

嚴用和曰小兒神氣尚弱因而被驚神志無依又

動於肝肝主筋故癩癩筋牽肝脉小急經曰恐氣

下精眩而上焦閉以二活若濕引氣上行又入太

陽為為引用故以為君天麻防風辛温以散之當
歸耳辛耳草温則以補氣血之不足又養胃氣故
以為臣附子川烏豆豉大辛温行陽陰又治客
寒傷胃腎主五液入脾為涎以半姜姜燥湿化痰
沉香辛温體重氣清去怯安神故以為佐
按此慄悍之劑可以劫風痰頑痰若彼五臟齊
損氣血衰乏者唯於歸脾湯六君子湯補中益
氣湯十全大補湯六味丸八味丸等之劑可斟
酌療養此劑非輕可投者

灸法

間使二穴各二十壯掌後三寸兩節間手厥陰經治癲狂中惡鬼

人中穴五壯兩手足大指左右併縛之因與死之

足後灸手

尸厥臍中二十壯或三十壯尸厥即

在病或反張神庭五壯八髮際五分

癩晝發者申脉二穴各七壯外踝夜發者照海二

穴各二十七壯內踝

新增

驅風豁痰湯治癲在五癩眩暈時作時止痰涎壅盛也
心神昏憤此屬氣血虛而挾風痰毒火

人參白朮茯苓半夏陳皮枳實炒

當歸酒洗川芎白芍藥炒生地黃桔

換天南星括蕪仁白附子白疆蠶

天麻遠志耳炒水黃芩酒炒黃連炒

耳草

右剉一劑生姜五片水煎溫服

陳皮半夏茯苓即二陳湯枳實可以攻痰積人參

白朮耳草可以補氣當歸芍藥川芎生地黃可以

養血桔梗舟楫之劑天南星可以燥濕痰括蕪仁

可以下氣利痰白附子可以行痰滯白疆蠶可以

散痰氣結聚天麻可以散之遠志可以潤燥益津

黃芩黃連之苦可以下火耳草可以調和調藥

滋陰寧神湯治不時暈倒

當歸川芎白芍熟地黃人參茯神

白朮遠志各一錢酸棗仁耳草各五分

黃連酒炒四分姜煎溫服

心主血心傷則神不安血亦不足當歸芍藥川芎

熟地黃可以養血白朮益脾則可以消痰茯神酸

棗仁可以安心黃連之苦涼痰熱耳草可以調和

諸藥生姜可以解痰○有痰天南星治風痰

四七湯有病癩人專服之而瘡蓋方見氣門

靈芫辰砂散治風痰諸癩在言妄走精神恍惚思慮

沫戴目意

辰砂一兩有一兩須光明酸棗仁半兩

乳香 羊兩光

右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作一服溫酒調作一盞調之令頓飲如飲酒索少人但以隨量取醉服藥訖便安置床枕令卧病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之氣息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒即神魂定矣萬一驚寤不可復治吳正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥○孫兆治相國寺僧克忽患癩疾半年名醫皆不効召孫療之孫曰但有穢物儘與食之但待云竭可來取藥今夜睡著明日便愈也至夜僧果渴孫乃與酒一觴調藥一服與之有頃再索酒與之半觴其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故僧謝之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏待睡此乃靈苑方中殊砂酸棗仁乳香散也人不敢用耳

吳晁云重可以去怯故殊砂能鎮心安神酸可以使收引故棗仁能斂神歸心香可使利竅故乳香能豁達心志必調酒盡醉者欲其行藥力而成莫太之功也許學士加人參者亦謂人參能寧心爾清心湯 治心經蓄熱發作不常或時煩燥鼻眼覺有熱氣不能自由有類心風稍定後作

即涼膈散加黃連麥門冬再加石菖

涼膈散涼火黃連之苦可使瀉火麥門冬之耳可

使生心津石菖可使生神

防風通聖散治一切大風方見中風

依本方加牡丹皮生地黃桃仁

牡丹皮生地黃涼血熱桃仁療諸經久畜之血結

但用滋血補血之劑則自濡潤而無閉結之患矣

黃連解毒湯方見傷寒

半夏竹瀝薑汁皆治痰之劑也

瀉心湯治心受積熱滯

大黃黃芩黃連各五錢

右剉為散每服四錢水一盞半煎服

芩連之苦可以解積熱大黃可以下實

清心瀉痰丸治癩在疔疔皆痰火實盛一切

大黃酒蒸黃芩各四兩青蒙石煨五錢沉

香二錢牙皂五錢麝香五分朱砂五錢

右為末水丸每服四十九丸滾水送下

氣寒則痰滯故用皂角以利痰麝香可以通臟竅

硃砂可以安神實證宜瀉而不可補故用大黃以

瀉之取其苦寒無物不降可以瀉實黃芩能去熱

青礞石能墜痰

按是方乃攻擊之劑必有實熱者始可用之若

與虛寒之人則非宜矣又礞石由焰硝煨煉必

陳久為妙若新煨火毒未除則不可服
加味道遙散 治婦人癩疾歌唱無時踰垣上

當歸白芍藥 炒 白朮 白茯苓 柴胡
生地黃 遠志 桃仁 去皮 蘘方木 紅

石剉一劑煨姜一片水煎服

逍遙者疏散之意柴胡能升所以達其逆芍藥能

收所以損其過生地黃涼心白朮耳草益脾則補

五臟之母當歸養心益神安心蘘木紅苓逐於血

○有熱小柴胡湯退熱辰砂鎮心安神

清心抑膽湯 治癩屬氣血虛而兼痰火者此攻補兼施平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癩之

症

當歸 酒洗 芍藥 酒炒 白朮 炒 白茯苓

陳皮 半夏 枳實 炒 竹茹 石菖蒲 黃

連 姜炒 香附子 炒 麥門冬 川芎 人

參 遠耳 各四分

右剉一劑生姜煎服

當歸芍藥川芎調血加酒則益藥力白朮茯苓人

參補氣陳皮香附子通滯氣半夏之辛散逆消痰

枳實破實麥門冬涼心黃連竹茹清熱遠志安神

耳草緩逆石菖蒲利竅生神

加減導痰湯 主方神效

天南星製 半夏 陳皮 白茯苓 枳實 仁

枳實炒 桔梗 山梔子 黃芩 黃連一 姜炒 各各

耳草三 木香五 辰砂五 為末末

右剉一劑 生姜煎入竹瀝 姜汁磨木香 調辰砂

末同服

陳半苓耳草乃二陳湯治痰之聖藥 天南星治風

痰 枳實 仁下氣 利痰 枳實 破痰 積桔梗 舟楫之劑

山梔子 黃芩 黃連 去痰 熟木香 通臟氣 辰砂 安心

去痰 熟竹瀝 生姜汁皆消痰之品也

定神至寶丹治諸癩神智不寧時發狂

生地黃五 姜汁五 焙 陳皮 貝母 白茯苓

黃連 遠志 石菖蒲 酸棗仁 枳實炒 各各

枳實 仁 天荳粉 耳草許

右剉 生姜三片 水煎服

生地黃 涼心 熟陳皮 行滯 貝母 散結 氣利痰 氣生

神所以用 茯苓 黃連 下心火 遠志 酸棗仁 安神 石

菖蒲 利竅 生神 枳實 破痰 滯 枳實 仁 天荳粉 下氣

利痰 耳草 所以調和 諸藥

清神湯治心熱痰

茯神木 黃連各 二 酸棗仁炒 菖

蒲 栢子 仁去 遠志各 一 鐵耳草 耳

草五 水二鐘煎八分 食遠服

氣可以生神故用茯神仁可使歸心故用栝子仁
酸棗仁酸可使養津故用遠志香可以利竅故用
菖蒲耳者一可以緩其炎火之焰一可以養氣而
生神南星半夏陳皮蔓仁竹瀝姜汁皆消痰滯之
劑也

三聖散

或治風癩搐搦心志昏在棄衣而走登高而歌
或數日不愈踰垣上屋妄言罵詈不避親疎
妄見鬼神一切潮熱及中
風厥逆牙關緊並可吐之

防風三兩瓜蒂炒二兩藜蘆或半兩或二兩準繩

云聖
兩或一方減用之或半
兩或一兩或三錢

右為粗末每服五錢用蘘汁二盞煎三沸瀝於
大碗中再用蘘一盞煎渣三沸却入先煎藥同

熬三沸澄清候溫徐徐投下不必盡劑吐如吐
不止煎葱白湯嚥三五口立解不吐再加服之
○如服藥多不吐出涎再飲蘘汁塩湯各一兩
盞投之如出以夫釵喚中深引即出矣須用白
盆一個黑盆不見涎形狀吐出青黃涎沫二三
升為効吐罷之後吃微溫白粥一二頓此三聖
散汗吐下三法俱行防風發汗瓜蒂下泄藜蘆
湧吐凡用法則禁忌證候小者勿服病久雖合
吐勿服○主病不正勿服○衆口不能正勿服
○先正病人心神居淨室中善侍病者一二人
溫克和柔善誘患人則效矣隄防吐後眩暈持

撲碎叫病人諸在必損吐瀉罷可與水水及新
水降心火勿食熱物世壽○子和法癩病不至目
瞪如愚者用三聖散投之更用火盆於暖室中
令汗吐下三法並行次服防風通聖散百餘日
愈

按葱蘢汁通陽氣辛散之謂也

控涎丹

見痺症。治痰迷心竅在言
譚語如有所見

再按耳遂直達涎結之處大戟能攻胸脇之涎芥
子能散支痛之飲此攻痰之勵劑也

李南

和尚五生丸

治癩有神經治陰脈
弦細緩諸癩在

天南星 羊葦川 烏豆 白附子 各一兩

大豆

去皮一兩

右為細末滴水為丸每服三丸至五丸不過七
丸姜湯下

天南星可豁風痰川烏豆白附子可正元陽羊葦
可化痰大豆補五臟益中助經脈

