

大學東
校典藉
局之印

江戶
醫學

醫林繩墨大全卷之二

明

錢塘方

穀著

江

周京輯

松

江陳

熙重刊

氣

內經曰人以氣為本一息不運則機緘窮一毫不續則窮壤判陰陽之所以升降者氣也血脉之所以流行者氣也腑臟之所以相生相養者亦氣也盛則盈衰則虛順則平逆則病此氣之所以為然也是則氣也者人身之根本也然而氣也者又人身疾病之所由也子和云諸痛皆生於氣諸病皆因於氣誠哉斯言也丹溪曰是

醫林繩墨

卷之二

氣

一

向山堂

氣滯則痰
生氣鬱則
火結所以
有此等之
病態

氣也導引血脉升降三焦周流四體而為生生之元若
血液稽留則為積為聚為腫為毒為瘡瘍膿潰若鬱於
腑臟溢於經絡膠於咽膈則為嘔為噎為關為格為脹
滿為淋瀝癰閉疼痛但局方治氣率用香熱辛燥之藥
不分乎寒熱表裏虛實真大失乎軒岐先師之旨矣吾
今專為發之本經曰寒則當溫熱則當清虛則當補實
則當瀉在表者當發散在裏者當分利此治病之法而
要皆即治氣之法也即謂氣病當動作之初非辛溫之
劑不可散然要知又非苦寒之劑不可平必辛溫之中

濟以苦寒之味而後用當而治效如喜動心火也氣也
黃連犀角主焉怒動肝火也氣也黃連青皮主焉悲動
肺火也氣也黃芩山梔主焉恐動腎火也氣也黃柏知
母主焉思動脾火也氣也黃連山藥主焉驚動膽火也
氣也黃連膽星主焉食動胃火也氣也黃連山查主焉
又如秘結而動大腸之火也亦氣也黃連枳實主焉溺
澁而動小腸之火也亦氣也山梔木通主焉凡此者皆
治氣病之因於火者則然若氣病之不因於火者又豈
可少補瀉溫清表利之調濟也哉是以欲破滯氣須用

枳殼焉欲開鬱氣須用陳皮焉欲行痞滿氣須用枳實
焉欲解腹脹氣須用青皮焉又考三稜蓬朮能破結氣
者焉香附烏藥能行血氣者焉木香砂仁能和中氣者
焉蒼朮厚樸能理脾氣者焉肉桂茴香能溫腎氣者焉
杏仁桑皮能瀉肺氣者焉生地門冬能養心氣者焉白
朮茯苓能健胃氣者焉紫蘇麻黃能散表氣者焉乾薑
吳萸能溫中氣者焉人參黃芪能補虛氣者焉芒硝大
黃能通結氣者焉此皆治氣之神藥也而一以二陳爲
主各審其宜加減用之則治之自無不應手而驗者也

又俗云氣無補法以其痞滿壅塞似難於補不思正氣
虛而不能運行邪氣着而不能外出於斯時也其何以
乎經云氣虛不補何由而行是氣虛之人必用參芪以
補之者也若用參芪而不去病氣反急滿不順此乃邪
經正位必死之兆也脈經曰下手脈沉便知是氣沉極
則伏瀆弱難治其或沉滑氣兼痰飲沉緊痛盛痛極又
伏濡細則濕濕伏又見瀆者味之

愚按內經曰根於內者命曰神機根於外者命曰氣立
蓋機無神不動立無氣不生氣也者天地萬物之所由

其者也如善養者自臟腑和榮衛行一身可無疾病之憂非惟無病且可延生若戕賊者臟腑不和榮衛不行一身必有疾病之患非惟多疾亦且損壽

治法主意氣莫貴於善養鬱莫貴於善開

氣至方

二陳湯

見中風

加減藥詳本証

血

經曰嘔吐咯衄氣脈虛洪火載血上錯經妄行溺血便血病同所因又曰心主血肝藏血脾裹血脾無所裹則肝無所藏心無所主也又曰目得血而能視足得血而能步掌得血而能握指得血而能攝此脾有所裹肝有所藏心有所主也又曰心主血肝納血肺主氣腎生氣夫人身之血氣精神之所依附者並行不悖循環無端庶成生生不息之運用也苟或暴喜傷心則氣緩而心不主血故肝無所受暴怒傷肝則氣逆而肝不納血故

血無所依又有房勞太過鬱怒相加以致陰火沸騰而
血從火起錯經妄行是以從肺而溢於鼻者爲衄血從
胃而逆於口者爲嘔血從腎而出於唾者爲咯血從嗽
而來於肺者爲欬血又謂痰涎血出於脾暴怒血出於
肝嘔吐血出於胃房勞血出於腎憂思血出於心勞力
血出於三焦悲喜血出於心包絡淋止血出於小腸溺
帶血出於膀胱腸風痔漏血出於大腸若謂留結於腸
胃之間而成積者爲血痢留積於胞絡之中而成塊者
爲血瘕留積於經絡之中而不行者爲瘀血留滯於肌

肉之間而作痛者爲腫毒此皆血之爲病也丹溪曰血
從下流者爲順則易治血從上溢者爲逆則難治子和
云口鼻出血是皆陽盛陰虛蓋因有升而無降也東垣
曰血從氣上越出上竅法當補陰以抑陽使其氣降則
血歸於經大抵用治之法俱宜四物爲主當去川芎熟
地用生地玄參天花粉童便爲要然後佐以各經瀉火
之藥如因於心火者加黃連因於肺火者加山梔因於
腎火者加知母因於脾火者加黃連甘草因於肝火者
加黃連羚羊角因於小腸火者加木通山梔因於大腸

川芎上升
故去之

次則宜温

火者加條芩枳殼此治諸血奔逆之大法也大率血之
 妄行不可正治一於寒涼之藥血雖稍止有傷胃氣非
 惟治血不下抑且鬱遏火邪而不出致使譫妄發狂反
 為送死之道故丹溪曰吐血久而不愈者乃服涼藥過
 多也當用温補健脾胃使脾和而能裹血則症自可
 也用四物湯去川芎加人參白朮炒黑乾薑之劑戴氏
 亦云凡血久不愈者因病久而體弱宜用温劑是知温
 劑乃養血之根本也

愚按血者依附氣之所行也氣行則血行氣止則血止
 周於身而循環無端者氣也呼吸間往來相統相承者
 血也氣與血附之而不移陰與陽合之而既濟否則氣
 離其血則氣出而不返有為大脫之症血離其氣則血
 瘀積而不流有為癰疽潰爛之症此吾人橐籥之間貴
 得陰陽之升降以成氣血之流行也設若陰不升而陽
 不降因以致血或溢於上或散於下遇此病者總當先
 於氣而平之蓋血為氣之子氣不妄動則血自歸於經
 也次於血而和之蓋氣為血之母血不妄行自附氣而
 周流無滯也治血之法不外於此

血虛者亦宜補氣

治法主意血由氣所依氣由血所附治血之症必先治

四物湯見中風 加減藥詳本症

蘇子降氣湯 虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛并吐

血蘇子炒研半夏湯各前胡去芦甘草厚

二鍾生薑三片煎一鍾服虛寒者加桂五分黃芪

養正丹 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身

羸及婦人血海久冷 水銀 黑錫 磁石 硃砂 研

硫黃研硃砂研各 右用黑蓋一隻火上鎔黑

鉛成汁次下水銀以柳條攪次硃砂攪令不見星

子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有酸

以醋酒之候令取出研細煮糯米糊丸菜豆大每

服三十丸鹽湯棗湯任下

人參飲子 治脾胃虛弱氣促氣虛精神短少衄血

吐血 人參 去心 白芍藥 當歸身 錢半 甘草 錢一 右作一

服水二鍾煎八分食遠服

圓參丸 治吐血咳嗽服涼藥不得者 人參 黃

芪 飛羅麩 各一 百合 五錢 右為細末滴水

丸如桐子大每服三五丸用茅根湯下食遠服

百花膏 治咳嗽血 欵冬花 百合 等分 各 右

為末蜜丸如龍眼大每服一丸臨臥嚼薑湯下

五味子黃芪散 治因嗽咯血成勞眼晴疼四肢困

倦脚膝無力 黃芪 麥門冬 熟地黃 栝梗

各兩 甘草 仁 錢 白芍藥 五味子 錢 各 二 人參 三 錢

劫勞散

治肺痿咳嗽痰中有紅線盜汗發熱熱過

即冷飲食減少 白芍藥 六兩 黃芪 甘草 人

參 當歸 半夏 白茯苓 熟地黃 五味子

阿膠 二炒 各兩 每服三錢水一鍾半生薑二片棗三

錢水一鍾半生薑二片棗三

枚煎丸分無時溫服日三
 噲化丸治咳嗽血香附
 山梔仁炒青黛海粉瓜蒌仁訶子肉馬
 兜鈴右為細末入白礪砂少許煉蜜少加薑汁
 為丸每噲化一九白湯下
 白芨枇杷丸治咯血白芨一兩枇杷葉蜜炙毛藕
 節錢各五右為細末另以阿膠五錢到如豆大蛤
 粉炒成珠生地黃自然汁調之火上頓化入前件
 為丸如龍眼大每服一九噲化
 白芨蓮鬚散白芨一兩蓮花鬚金飽側栢葉沙
 參各五右為細末入藕節汁地黃汁磨京墨今
 黑調藥二錢如稀糊噉服

燥

內經曰枯涸乾勁皺揭皆屬於燥乃陽明大腸太陰肺
 之症也夫金為水源而受燥熱竭絕於上則津液不能
 榮養百脉或患大病後多服尅伐之藥或汗下重亡津
 液或因養生誤服金石之劑或恣用酒麪熾燻偏助火
 邪致使真陰有損血液耗散在外則皮膚皴揭在內則
 腸胃乾涸在上則口燥咽乾煩渴不已在下則閉結不
 便腹中作脹故脉見洪數結代治法宜壯水之至以制
 陽光則金無所尅而得其肅清之令養脾之精以滋肺

治法彙註
 燥脈澁而
 緊或浮而
 弦或細而

瀉或乳而
虛大都因
血虛有少
變為燥病
易曰燥萬
物莫震乎
火是也

液則金有所資而起其生化之源惟以養血滋陰清熱
潤燥施治斯獲全功矣況七情所起火自內生不急探
本內而消渴外而疽癰從此伏矣故古人定有生津甘
露飲生血潤燥飲通幽湯潤腸丸當歸潤燥丸皆治燥
之良方也若其氣之實者即與以承氣通泄亦可而年
高之人惟宜與以當歸地黃桃仁黃芩之劑
愚按燥之一症有口舌乾燥而亡津液者此自熱之甚
水不能勝火也宜當清熱降火如知母門冬之屬有皮
膚痛癢而乾燥者此因血虛生風血不能勝氣也宜當

丹溪曰皮
膚皺揭折
裂或血出
大腸或肌
膚燥癢皆
火燥肺金
燥之甚也
宜四物湯
去川芎加
麥冬人參
天花粉黃
栝五陰子
之類治之
此即下諸

涼血潤燥如生地連翹之屬有大腸乾燥而不行者此
金因熱勝糞由燥結宜當清熱潤燥如大黃麻仁之屬
有肌肉乾燥而形脫者此則內熱消燥氣血耗散宜以
清熱養血如歸芍芩連之屬又或氣虛而致燥者宜當
補氣生津如人參五味麥冬之屬血虛而致燥者當以
養血滋陰如生地歸芍之屬又有汗下亡津液而致燥
者宜生脈散之屬產後去血過多而致燥者宜四物湯
之屬設或風勝而致燥者宜以降火涼血如連翹生地
之屬火盛而致燥者宜以降火清熱如芩連山梔之屬

屬用治之意也

有痰盛而致燥者宜降火清痰如杏仁瓜蒌仁之屬誠能因其所動而治其所發又何患氣液之不宣通元本之不和暢內神外色之不潤澤也哉

治法主意治燥不可太寒開結不可太峻燥必潤之隨下而行結欲開之隨氣而順

燥主方

生津甘露飲	升麻	防風	甘草	防己	生地
歸身	柴胡	羌活	炙甘草	黃芪	知母
黃芩	石膏	龍胆草	黃栢	紅花	桃仁
杏仁	水煎加酒	一小鍾	稍熱服		
生血潤燥飲	當歸	生地	熟地	黃芪	麥冬
天冬	五味	片苓	瓜蒌	桃仁	紅花
麻	水煎服	如大便燥結	加麻仁郁李仁		

通幽湯

治大便燥結治在幽門以辛潤之
熟地黃 各五 當歸 升

潤腸丸

此藥通其大便則氣得以下行也此方原
主治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥不通
麻仁 去壳 各當歸 稍大黃 羌活 各五 煉蜜

當歸潤燥丸

治乾燥小便秘 知母 石膏 桃
甘草 熟地 柴胡 黃栢 荆芥穗 升麻 紅

承氣湯

見中風 小椒 煉蜚為丸如桐子大 升麻 紅

生脈散

生津止渴夏月攝生者不可少 人參
麥冬 各一 五味子 九粒 水煎服 孫真人曰夏

月必服

五味甘草以補五臟之氣東垣曰夏月服生
脈散加黃芪甘草令人多氣力

四物湯

見中風

四時易見中風

和精吐黃莖甘草令人冬寐伏

且必期正未午以備五瀾之尿東曰日夏民期主

寒冬瀾一正未午水煎期紙真入日夏

主瀾黃主津土器夏日濕主香下下

承瀾甚見中風刺益為水破酥干大

芥杏甘甘草煎良之瀾小瀾刺益為水破酥干大

甘草煎良之瀾小瀾刺益為水破酥干大

當融融火煎酥干大寒瀾主補補藥志

魚火吹舒酥干大寒瀾主補補藥志

氣二去類各當融融火煎酥干大寒瀾主補補藥志

主白膠胃中火大煎研細煎藥不並

煎藥煎其大煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎

煎藥煎其大煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎

煎藥煎其大煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎

煎藥煎其大煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎

煎藥煎其大煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎

火

天王生物
故恒于動
人有此生
亦恒于動
其所以恒
于動者皆
相火之為
也見于天
者出于龍
雷則木之
氣出于海
則水之氣
也具於人
者寄于肝

丹溪曰人稟五行各一其性惟火有二名分君相蓋火
內陰而外陽主乎動故凡動皆屬火其曰君者為以名
而言形質相生配於五行故謂之君其曰相者為以位
而言生於虛無守位稟命因動而見故謂之相然而腎
肝之陰悉具相火故東垣曰相火元氣之賊火與元氣
不兩相立相火一起五性厥陽之火相扇妄動火起於
妄變化莫測煎熬真陰陰虛則病陰絕則死是以君火
之氣經以暑與熱言之惟相火之氣經以火言之蓋表



腎二部肝
屬木而腎
屬水也

養生至論
不意發露
於此

其悍暴酷烈有甚於君火也又經曰相火無君火不動
必須靜養其心心以靜攝火從何生故前賢有曰必使
道心常爲一身之主而人心每聽命焉此善處乎火者
也夫使人心聽命於道心則五火寂然不動則相火反
以裨補造化而爲生生不息之運用又何賊之有雖然
人何能靜一有所動火卽隨之是火証之脈不可不知
者也故見於脈而浮短數者爲虛火見於脈而洪實大
者爲實火洪大見於左寸者爲心火洪大見於右寸者
爲肺火洪大見於左關者爲肝火洪大見於右關者爲

脾火洪大見於兩尺者爲腎經命門三焦膀胱之火蓋
氣有餘卽是火火不可見卽於脈之洪大而見之也又
見陰火也則於臍下起肺火也則於膈上起胃火也則
於膈下起濕火也則於足上起至陰之火也則於湧泉
起若夫治療之法如火在肌表者爲清之火在筋骨間
者爲拔之火在臟腑內者爲瀉之又曰君火從其心相
火從其腎虛者從其補實者從其瀉陰者亦從補陽者
亦從瀉不可治以一味寒苦之藥致使元本不足俾火
愈甚而譫妄作故脈經曰陰虛火動亦發熱勿驟涼治

虛熱勿以寒涼藥為用輕可降散實則可瀉重者難療
從治可施

其名龍少者如龍性惡寒而喜煖惡陰而喜陽也故龍性之現藏全就陽氣之升降故欲引相火歸元有用桂附之法也

愚按君火者心火也可以濕伏可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水濕折之當伏從其性惟黃栢之屬可以降之又黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火石膏瀉胃火柴胡瀉肝火膽草瀉膽火木通瀉小腸火大黃瀉大腸火玄參瀉三焦火山梔瀉膀胱火此皆苦寒之味能瀉諸經有餘之火者也若飲食勞倦內傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘溫之劑除之如參芪甘

人間之火可以濕伏可以水滅龍雷之火逢濕則焰遇水益熾太陽一照火即尋滅桂附制相火是也此所謂益火之原以消陰翳壯水之主以制陽光耳

草之屬若陰微陽強相火熾盛乘於陰位為血虛之病以甘寒之劑除之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實為陽弦之病以酸冷之劑折之如大黃芒硝之屬若真水受傷真陰失守無根之火妄動為陰虛之病以壯水之劑制之如地黃玄參之屬若右腎命門火衰為陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾胃為火鬱之症以升散之劑發之如升麻乾葛柴胡防風之屬此治火之良法也在醫者審其虛實施其補瀉量而度之自無不去之沉疴

也矣

治法主意陽火從其瀉陰火從其補實火從其瀉虛火從其補

八症主方

補陰丸 治人精血既虧相火必旺其陰不補則勞
 瘵咳嗽咯血吐血等症作矣此丸專補左尺腎水
 水升則火降水火相平諸症不起 黃柏 去
 色知母 拌炒皮毛酒 敗龜板 酥炙 各三錢
 子 各二錢 熟地 酒蒸 兩錢 五味子 一兩
 門冬 去心 乾薑 炒 兩錢 紫河車 三錢
 春髓 三條 和藥 杵勻 丸如 五錢 右為末 煉蜜及猪
 空 心淡鹽湯下 寒月可用 溫酒下 夢遺精滑加
 牡蠣 煨 便 白朮 兩錢 山茱萸 肉 椿根 白皮 炒 各
 赤白濁 加白朮 白茯苓 兩錢 山茱萸 肉 椿根 白皮 炒 各
 軟弱無力 加牛膝 三兩 虎脛骨 兩錢 黃連 炒 各
 已酒洗

向山堂

木瓜 各五錢 疝氣加蒼朮 兩錢 黃連 炒 各
 六錢 川芎 兩錢 吳茱萸 炒 青皮 去穢 各
 畏寒易泄者 加白朮 三兩 陳皮 一兩 乾薑 炒 各
 如氣虛之人 加人參 黃芪 二兩 蜜炙 各
 右尺亦微命門火衰 陽事不舉 加黑附子 泡 童便浸
 肉桂 七錢 沉香 五錢

六味地黃丸

動者服此使陰旺則陽化 乾山藥 山茱萸 略
 兩澤瀉 牡丹皮 白茯苓 略 三熟地 黃 入兩
 右為末 煉蜜 丸 桐子 每服 七丸 空心白湯下
 入味地黃丸 治腎經陽氣燥熱陰無所生 虛火內
 動者服此使陽旺則陰生 即六味丸加附子炮
 肉桂 略 丸服同前

向山堂

肉卦補
火眼同前

大刺世黃氏
命習醫眼藥無視生蠶火肉

吞魚末寒凝火味干每刺士人十女空小自馬下

兩膏藥
日芥芥細三燕此黃大兩

博昏眼北刺急却眼眼小
六刺世黃氏
可習醫眼藥無視生蠶火肉

肉卦補
火眼同前

吞魚末寒凝火味干每刺士人十女空小自馬下

兩膏藥
日芥芥細三燕此黃大兩

博昏眼北刺急却眼眼小
六刺世黃氏
可習醫眼藥無視生蠶火肉

肉卦補
火眼同前

吞魚末寒凝火味干每刺士人十女空小自馬下

痰

稠濁者為痰清稀者為飲

經曰太陰在泉濕淫所勝民病飲積又曰

歲土太過雨濕流行甚則飲發皆因土鬱之發太陰之復也

痰者人身之痰飲也人之氣道清順則痰不生室塞則痰壅盛或因風寒暑濕之外感或因七情飲食之內傷以致氣逆而液濁則痰症成焉是以聚於肺者則名氣

痰其痰喘嗽上出留於胃者則名食痰其痰積利下行

在肝經者名為風痰其痰青而多疱在心經者名為熱

痰其痰堅而成塊在腎經者名為寒痰其痰有黑點而

多稀若夫痰滯於經絡則為腫為毒痰存於四肢則麻

痺不仁痰迷於心竅則譫語恍惚驚悸健忘痰壅于中

膈則爲痞爲滿開格喉閉脇痛乳癰乃其所因則又不可不知蓋痰因於風則眩暈動搖痰因於火則吐嘔酸苦痰因於濕則肢節重痛不能轉移痰因於寒則吞酸惡心呃逆涎沫痰因於情鬱感動則勞瘵生虫肌膚羸瘦痰因於飲食內傷則中氣迷悶腹中不利見食惡食不食不飢此皆痰之見於內而證於外者也治療之法總宜豁痰爲要清氣主之蓋氣順則痰清痰行則病去何也氣升痰亦升氣降痰亦降氣行痰亦行也如專治其痰而不善理其氣則氣滯痰愈生矣又有或爲寒熱

或爲腫痛或爲狂越或胸中輾轉有聲或爲背膊綁緊冰冷或爲咽隘不利咯之不出嚔之不下狀如粉絮梅核亦皆痰之所致也醫者必先揣其得病之由後可施其調治之理蓋痰有新久輕重之分形色臭味之辨新而輕者形色青白痰薄而稀滋味亦淡久而重者黃濁稠粘如膏糊凝結欬之難出漸成惡味酸腥鹹苦氣臊臭穢甚至帶血而出昔人曰痰因火動又因滯堅其謂是歟夫痰因火動則宜治火爲急痰由滯堅則宜行滯爲先卽曰熱痰在知清之濕痰在知燥之風痰在知散

脾爲生痰之源若治痰不理脾胃非其治也何也脾土虛濕故食飲在胃清者難升濁者難降留滯中膈淤而成痰如脾復健運之常則痰又何不

之氣痰在知順之寒痰在知溫之鬱痰在知開之頑痰在知軟之食痰在知消之在上者在知吐之在中者在知下之在下者在知提之然總不外痰生於脾胃者宜實脾以行濕痰生於肺肝者宜開鬱以行氣而已而藥則惟以二陳爲主審其病而隨症加減焉若其脾氣虛者又宜固其元氣而兼運其痰近見世俗惡半夏之燥喜貝母之潤一遇有痰便以貝母投之若是脾疾則土氣益傷飲食頓減其何生焉此非知醫者也蓋貝母施於肺金則可以肺金喜潤而脾土喜燥也即使治肺亦

此之有

勿過於涼潤以其能傷中州必稍用脾藥以生肺金方爲善治者耳


愚按痰之爲症多端痰之用治不一考治痰之藥在丹溪則惟以二陳爲主蓋二陳者健脾理氣之藥也氣清則痰亦清脾健則痰亦運健運有常而生化之機得矣故痰爲生病之物而亦人身之不可無凡人之肥厚者痰也機關通利者痰也氣血百脉流行而升降者亦痰也行則爲液聚則爲痰流則爲津止則爲涎順於氣則安逆於氣則殃運化調治當知其源而藥之熱寒當知

其性其性重輕載之藥經藥經云何日南星治痰因風
 痰之可治也貝母治痰因虛痰之可行也膽星治痰因
 驚痰之可去也玄明粉治痰因實痰之可下也瓜蒌仁
 治痰因老痰之可潤也天花粉治痰因熱痰之可清也
 黃連治痰因火痰之可施也石羔治痰因有餘之火痰
 可通也又曰黃芩降火而清痰山梔開鬱而行痰前胡
 通表而解痰杏仁清肺而利痰桑皮瀉肺而除痰厚樸
 寬中而散痰陳皮行氣而理痰白朮健脾而運痰竹瀝
 清熱而墜痰白芥子引氣而開痰萊菔子破氣而降痰

瓜蒂行積而吐痰常山開結而導痰枳殼下氣而清痰
 蘇子降氣而下痰蒼朮去濕而化痰山查導氣而消痰
 此治諸痰之妙藥也誠於臨症再能辨脈之虛實病之
 新久症之寒熱藥之補瀉則病未有不除者矣
 治法主意治痰以清氣為先氣順則痰清氣降則痰下
 久病必須理脾清氣兼須降火

痰主方
 二陳湯見中風 加減藥詳本証

醫林綱目 卷之二 痰四 向山堂



痰火

陽常有餘
陰常不足
所以三十
之外補陰
之藥一日
不可缺也

嘗謂人受天地之氣以生天之陽氣為氣地之陰氣為血故氣常有餘血常不足何以言之天地為萬物父母天為陽而運於地之外地為陰而居於天之中是地非天之大氣無以舉之也日屬陽也而常實不借月之形以為運月屬陰也而易缺必稟日之光以為明故人身之陰氣其消長每視月之盈虧也且人之生也無不下地而有聲聲氣也若其精血則男子必待十六而後精通女子必待十四而後經行是有形後猶待乳哺水穀

凡人十病
由痰火者
內有七八
故立論立
方不可不
詳言正言
變不得不
簡

以養而陰氣方可與陽為配以能成人古之為人父母者定三十二十而後娶嫁可見陰氣之難於成而古人之善於攝養也今人弱冠蚤婚不知節慾故當其壯年便有痰火之病未愈半百已有老態仰事俯育一切墮壞雖氣運之寢薄而亦生人之自取耳然而痰火之成患固日多端要其治法不外攻補緩急留除六者而已而其先首重審候蓋水不足則火勝火勝則氣傷氣傷則不能運化水穀而停濕濕生痰痰生熱以致形瘦口乾舌苦二便秘澀或遺精或不禁或淋甚者為喘為哮

南星半夏
其性太燥
豈宜用乎
亦言其痰
火病中此
二者可為
燥之藥
耳

惡心膈噎瘕癩顛狂邪祟怔忡喉痺上中下三消等病治者須要細辨病因方可投藥其藥南星半夏以燥之也橘紅枳殼以散之也茯苓猪澤以滲之也芩連梔子以降之也連翹桔梗香附以開行之也芒硝青黛以軟解之也貝母知母天冬麥冬以潤之也歸芍地黃以滋益之也竹瀝薑汁以導引之也其中分別內傷不得用燥藥外因不得用滯潤藥又要分新舊虛實實而新者為病淺若虛而老者稠粘於胸臆之間依附盤薄於腸胃之處須要平和緩治不可太猛蓋人身受病未有不

由飲食房慾及起居不節日積月累以漸受傷者也若驟用攻擊太過病未卽除而臟腑先受其害後雖遇和扁難責效矣故初宜治標順氣爲先分導次之氣升卽屬火順氣在於降火又中氣虛者宜固中氣以運痰若胃氣有虛則痰必愈盛次則治本夫水虧則火盛火盛則痰起故端木之要全在腎水須宜補腎逐去邪水今人但知利氣降火不知本原不固徒治其標縱得暫安愈後復發然而痰火難愈之脈又不可不辨也凡脈滑疾帶洪且數者爲實症易治者也若沉濇大小不勻爲

虛症此難愈者也六法之中何名攻法以人之初病痰火者皆由外因四氣內因七情而作在上焦則眩暈喘咳在中焦則脇肋脹疼在下焦則遺精便赤治上必用枝苓瓜萋貝母甘桔橘紅等藥治中必用枳實黃連連翹香附花粉蒼苓白朮星半之類治下必用黃栢猪苓澤瀉硝黃木通防己青皮海石牽牛山查之屬峻以治之輕則五七劑重則一二十劑治上食後服治中半空心服治下空心服藥力一到病患卽解蓋人之初病氣血尙實雖峻攻猛治不傷元氣若藥力緩慢病邪傳流

監制之法
要緊
有本體原
弱偶有時
而旺一用
壯伐而弱
體即現矣
故冠夜中
兼補纒妥

難為力矣何名補法凡人氣體虛弱偶患痰火其症雖
實其本則弱若概行瀉火攻痰利藥則正氣虛而不運
邪氣着而不出矣故先賢有曰氣虛不補邪何由行但
補藥須要識得監製之法如氣虛合用參朮必監以青
陳皮血虛合用芎歸必佐以香附砂仁痰盛則貝母瓜
蒌海粉枳梗竹瀝薑汁白芥子赤白苓陳皮甚則薑桂
以溫之火盛則花粉天麥冬炒梔子乾葛木通生地赤
芍竹茹燈心之類又有冷痰上溢昏暈氣喘者必救本
壯水腎氣丸加桂附有脾氣虛弱不能運化者必補中

燥溫用六君子加竹瀝薑汁如痰喘聲高脈散油汗身
如水者此真氣憊又非補可施可救者矣何名緩法痰
火纏身為病日久病不在表而在裏或流入經絡或誤
藥雜亂非卒然可除其根必也緩以治之投以輕劑需
以日月合用參連枝子以降火必熟炒炙合用枳實陳
半瓜蒌星蘇貝母海粉芒硝以消痰必精製後用今日
輕劑明日稍重今日投藥明日暫止漸以與之庶病者
不苦於吞納而痰勢亦可漸解特節戒不可不謹耳何
名急法病者一旦火起痰壅變生不測或口眼蠕動或

咽喉乾燥或失志顛狂或嘔吐綠水黑汁或腸癰便血
無度此等病作必也急以治之在上則行吐法用皂角
末五分半夏末三分白礬末三分其一劑薑汁調服探
吐後服加減導痰湯星半苓陳瓜萸枳甘桔梔苓等劑
在中必用芩連瓜萸貝母枳實陳半蘇子玄明粉木香
杏仁竹瀝薑汁甚則大黃石膏在下則用芒硝黃柏防
己牽牛橘子滑石青皮赤芍兵榔甚則桃仁承氣利藥
一投不解再投必降譬之兵家賊鋒熾盛必殺戮盡種
而後平定且於正氣亦無傷也何名除法人多忽畧方

其痰火洶湧則求藥如不及俟病勢稍退遂厭藥不服
不知痰閉火伏變生諸症爲患莫大故治者須要悉心
體察見微思著如見燥實痞滿者必用硝黃以除之如
見中虛下留者必用參芪升柴以提之如見胃火痰盛
者必用知母石膏以降之如見陰虛火盛者必用知母
黃柏以滋之如見脾虛不運者必用朮苓以補之如見
下焦閉塞者必用木通大黃以利之伐之又伐根株不
留庶乎萌孽不復也何名留法世之病痰火者往往氣
血不足之人而壯實者未之有也故治者不可太過古

云祛邪如追寇盜殲魁而恕脅從正若待小人正己而無過察也如見痰上湧可吐矣而慮中虛不可盡吐如見火上炎可降矣而慮傷脾不可盡降如見血可清矣而慮傷榮不可過清見濕可滲矣而慮及亡津不可過利如用黃柏知母以滋陰是也但滋降過則損真陽之氣中氣反虛如用黃連枳實以消心下痞是也但驅除過則心氣損而虛脹反甚如用枳梗以寬胸是也但疎泄過則損至高之氣而反下陷矣此六法者不可不知是在高明之士臨症酌中而善用之耳此傳心之妙訣也

也

分少年中
年老年病
態詳悉正
見實虛勞
傷治宜分
別也

愚再按世人之病痰火者始為實痰火中為虛痰火未為勞傷痰火其原則一其治不同實症虛症前論已明惟有勞傷最宜斟酌蓋少年痰火因為人引破陽太早根本受傷致元氣虛憊或遺精盜汗神疲力怯飲食少進五心煩熱此只宜調養腎氣切忌太補亦忌太瀉蒸雖受傷太早而陰氣方生而未足如木方向榮外似憔悴內實茂發只要斷酒色一年兼以茹淡初服腎氣丸後服參苓白朮丸無弗愈者中年三十前後患痰火者

或得之房勞或加之煎炒或兼之思慮又勞役之過以致真陰虧損相火隨旺火旺則陰愈燥爲喘爲嗽爲痰爲熱爲吐衄爲手足心熱小便赤四肢倦怠脉來數大或虛細弦急甚則瀆疾此則必用滋陰降火湯加減但脉來大數而軟者加入參苓脉來弦急有力者加入柴苓脉來瀆疾而短者禁用川芎白朮但用知栢生地歸芍貝桔麥冬石蓮等藥治之若至虛損之甚潮汗咳血瀉遺喉痛生瘡聲啞者不可治矣晚年一旦酒色所傷者如止是發熱咳嗽吐痰喘急者清肺飲參歸芍地苓

麥五味陳皮知栢甘草服蓋老年陰陽兩虛兼以受傷難以行涼故此不當同少壯一例治也凡司命者其知所以重輕先後調攝之

治法主意痰火初起可急攻痰火病久宜緩治

附錄痰火變生諸症神效捷方治痰火內鬱喘息有音乍進乍退乃胃中有實火膈上有稠痰宜降火清金用陳皮四分半夏六分白苓八分甘草四分南星四分枳實六分黃芩八分黃連六分瓜蒌八分杏仁六分生薑煎服治憂驚氣鬱呼吸急促而外無痰聲者乃七情所

傷之故宜分開心胸間之結氣用桔梗八分陳皮六分
白茯苓一錢甘草四分紫蘇四分腹皮六分桑皮六分五
味子六粒白果六箇生薑煎服治真陰虛損火升痰壅
一時上冲此不可作實治用當歸八分川芎三分白芍
一錢熟地一錢陳皮三分貝母六分知母六分黃栢三
分枳殼六分白茯苓八分甘草四分白水煎服治腎虛已
極氣逆上冲擡肩擷肚冷痰流出胸高足冷等症用人
參一錢五味十粒麥冬一錢白朮錢半陳皮三分乾薑
四分杏仁五分大棗煎服治胃口宿有冷痰時或惡逆

欲食不下宜溫胃行痰陳皮六分製半夏八分白苓一
錢甘草四分白蔻四分香附六分砂仁四分白水煎服
治氣鬱生痰久留清道以致食入卽返以和中安胃爲
主用人參一錢乾薑八分陳皮六分木香六分炙草六
分棗子煎服治痰火熾盛遍身戰掉此火能燥物而使
氣液不足之故用當歸八分川芎六分生地一錢白芍
一錢黃芩八分黃連六分知母六分竹瀝三薑汁一童
便二服或痰盛加陳皮貝母治痰結中焦食不消化嘔
逆不止陳皮八分海粉錢半枳實八分白朮八分香附

一錢半夏八分生薑煎服治痰火閉心恍惚不時跳躍
 如見鬼狀以清心為主硃砂安神丸最好次服滋陰寧
 神之劑用當歸八分川芎六分白芍八分熟地一錢人
 參六分茯苓一錢白朮六分遠志四分棗仁六分甘草
 四分黃連四分南星四分龍眼肉煎服治昏忘因驚而
 得則神出舍空而痰生以行痰為主治用天麻八分鬱
 金六分南星八分川芎八分遠志八分黃連六分花粉
 四分甘草三分生薑煎服治心火獨盛陽氣有餘痰逆
 上冲以降火為主兼行痰藥用黃連一錢黃芩錢半大

黃八分石膏八分枳實八分竹茹四分陳皮三分白水
 煎服治勞役太過致心虛跳動以益氣安神為主治痰
 火藥少用用白朮一錢黃芪錢半茯苓八分棗仁八分
 人參六分木香一錢當歸八分甘草四分龍眼肉煎服
 治相火燥肺舌上赤裂大渴引飲謂之高消治痰火藥
 少用用蓮鬚一錢花粉八分黃芩六分烏梅四分赤苓
 八分生地一錢黃栢三分桔梗六分甘草四分燈心煎
 服再附秘傳內傷痰火一十八症至方赤茯苓一錢橘紅
 四分貝母錢半知母七分黃芩五分甘草四分症如周

以下內傷
 痰火一十
 八症

身刺痛禁用風藥乃血澁不足加當歸八分桂皮二分
症如精神短少語言乏力懶倦嗜臥加人參一錢蘇合
十粒症如咳嗽聲多痰少乃火炎於肺倍加知母麥冬
一錢黃芩三分症如陰虛火動寒熱盜汗加當芍地各
八分黃柏四分症如乾咳無痰夜分尤甚乃腎水枯竭
虛火上炎加桔梗八分天麥冬各一錢百部八分症如
咳則引動左脇小腹疼痛乃疲極傷肝加白芍八分川
芎四分當歸八分青皮四分柴胡八分膽草二分症如
勞神傷心面時帶陽咳嗽有時加五味子八粒棗仁一

錢茯神一錢遠志六分當歸一錢龍眼肉六枚症如勞
倦傷脾怠倦嗜臥四肢無力語言輕低此乃虛痰火也
加人參一錢黃芪八分當歸一錢炙草四分減黃芩知
母症如食積面黃肚脹堅硬胃口時痛加山查八分麥
芽八分神麩六分厚樸八分砂仁三分症如火來薄金
喉間常有腥氣時咳帶紅如生地八分山梔仁六分丹
皮八分桔梗六分薄荷三分症如久患痰火動則喘急
或左或右眠一邊不得乃痰血碍氣合四物湯再加人
參四分蘇木二分桃仁四分症如咳引百骸從臍下逆

奔而上者乃腎氣久虛氣不歸元加故紙一錢五味十粒症如痰結胸膈氣不舒暢咯之不上嚥之不下加瓜蒌一錢桔梗一錢花粉八分枳殼六分梔子仁六分海粉八分症如飲食厚味煎炒過多牙齦出血腫痛口舌糜爛此乃胃熱之甚加石膏黃連各八分滑石一錢丹皮六分生地八分症如憂思鬱結氣滯不行以致心腹飽悶胸膈脹結痰盛氣粗加梔子仁一錢香附一錢蒼朮六分川芎六分樸硝六分木香二分沉香二分症如脚膝痿軟行步艱難乃濕火下注加黃栢防己各六分

苡仁八分蒼朮六分木通四分羌活三分症如痰滯於上火起於下頭目昏暈招搖不定加半夏八分青陳皮各六分黃連四分入竹瀝薑汁童便服症如頭旋眼黑言亂肢冷唾痰稠粘加白朮半夏各一錢白芥子南星各八分黃栢澤瀉各四分凡此痰火變症十三條痰火內傷十八種皆經驗屢效之秘方近今世人十病九痰火而諸病無不生於痰火故特為詳列之以為沉痾者之一助云

痰火主方

腎氣丸

即六味地黃丸方見火症

六君子湯

茯苓 益氣 補脾 和中 人參 白朮 陳皮

導痰湯

治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通 半夏 天南星 枳實 蘇合 蘇合 蘇合 蘇合

桃仁承氣湯

能去汚血而推蕩邪熱 此方原治 傷寒外症已解小腹急大便黑小便利其人如狂

此蓄血之症也

大黃 三錢 桃仁 十個 桂心 芒硝 五分 甘草 一錢

參苓白朮丸

水煎服 以魚鱗為度 茯苓 白扁豆 白朮 甘草 蓮肉 砂仁 薏苡仁 桔梗 山藥 白朮

滋陰降火湯

熟地 當歸 白芍 川芎 陳皮 白朮 知母 白芍

清肺飲

治發熱咳嗽痰喘 人參 當歸 白芍 黃柏 水煎服

熟地 茯苓 麥冬 五味子 陳皮 知母

黃栢 甘草 水煎服

痰火十三變症捷方

加減藥詳本症 殊砂 安神丸 治心亂煩熱怔忡心神顛倒

吐胸中氣亂而熱有似懊懣之狀

殊砂 黃連 酒炒 甘草 炙 五生 地黃 當歸 頭

右為極細末蒸餅為丸如黃米大每服十丸

又內傷痰火主方 詳本症 內傷痰火十八症 加減方詳本症

四物湯 見中風

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

痰火十二

向山堂

四時熱火十人並 吹藥式精本並
 又內熱火主式 精本並
 本式熱火主式 精本並
 黃聖藥餅一甘其絲五土味黃 當歸煎
 也餅中除腐而燕存以與對之此 煎餅
 煎餅安煎式 餅心煎餅煎餅煎餅煎餅
 煎火十三變煎餅式 吹藥藥精本並

濕

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰濕勝則濡泄蓋謂地
 之濕氣感而害人皮肉筋脉則為痿痺原病式曰諸瘧
 強直積飲痞隔中滿皆屬於濕有自外得者有自內得
 者東垣曰因于濕首如裹蓋首者諸陽之會位高氣清
 為濕氣薰蒸而沉重似有物以蒙之也腑臟亦然失而
 不治則鬱而為熱熱傷其氣則氣不能舒暢其筋故大
 筋綏短而為拘攣濕傷其血血不養筋則筋不束骨故
 小筋弛張而為痿弱矣又云或為黃疸中氣不清而逆

濕久則成熱

醫林補璧 卷之十一 濕 四

害飲食或為腫滿小水不利而四肢浮腫者焉大槩宜
 清熱利水實脾之劑可也又當審其方土之宜從標本
 而施治如東南地卑其氣多濕凡受之病必從外入故
 體重脚氣多白下起治宜汗散久則疎通滲泄也西北
 地高其氣大燥其人多食生冷濕麪或飲酒食肉露臥
 風霜寒氣拂鬱濕不能越以致胸腹疼脹甚則水鼓痞
 滿或週身浮腫按之不起此皆自內而出者也當以健
 脾胃消腫脹利小便為要宜服葶藶木香散五子五皮
 飲審其元氣虛實而通利之用二陳湯加沉香木香之

劑虛則可散實則可利用五皮飲加葶藶車前之類全
 在活法不可一途而論也脉經云或濇或細或濡或緩
 是皆中濕可得而斷

治濕不外
 此三法

愚再按丹溪云六氣之中濕熱為病十常八九濕在上
 焦宜發汗而解表此疎泄其濕也濕在中焦宜寬中順
 氣通暢脾胃此滲泄其濕也濕在下焦宜利小便不使
 水逆上行此開導其濕也故曰治濕不利小便非其治
 也吾嘗考之茯苓淡滲而利小便此行其濕也澤瀉甘
 鹹而利水道此散其濕也防風辛溫以散脾氣此勝其

濕也車前滑石以行小水此導其濕也山梔黃連以清邪熱此利其濕也白朮苡仁以實脾土此逐其濕也凡治濕之藥能如此分則濕無不治之症矣

治法主意濕之為症吐瀉水腫膨脹脚氣自汗盜汗積飲停痰陰汗陰癢木疝癩疝皆屬于濕宜從上下而分利之濕在上焦宜從汗泄濕在中焦宜行燥濕濕在下焦宜利小便設若濕化為熱當從熱治不可又言其濕也

濕主方

葶藶朮香散

葶藶子

茯苓

猪苓

白朮

木

香

澤瀉

木通

甘草

梔子

滑石

原方

為末湯調不若煎服妙

五子五皮飲

五子能定喘急

五皮能消皮膚水腫

紫蘇子

蘿卜子

葶藶子

香附子

車前子

陳皮

茯苓皮

大腹皮

桑白皮

薑皮

二陳湯

見中風

加有藥詳本症

五皮飲

大腹皮

桑白皮

茯苓皮

陳皮

薑

皮各等分水煎服

丸 各等分水煎別
 五史丸 大史丸 桑白史 蒼苔史 刺史 在道
 二刺史 具中風 吡苪藥精本藥
 刺史 蒼苔史 桑白史 薑史 其
 紫葳干 蘇小干 草葱干 香桐干 車前干
 正干正史丸 正干非史丸 正史非史丸 水煎
 食末藥丸不苦煎服也
 香 藥丸 木麻 甘草 餅干 散可 煎水

濕熱

濕熱之症諸書載濕而不載熱者有之載熱而不載濕
 者有之未嘗為此一症合而立方著論今余特出之非
 多為此臆說也聞之丹溪曰東南之人濕熱之症十居
 八九腰以下症皆作濕熱治之東垣曰為痰為滿為體
 重痛為濁為淋為帶下赤白為腫為癰為膿潰瘡瘍為
 積為聚為痢下後重為疸為黃為嘔湧逆食總皆濕熱
 之所成也用當分而治之其分治之法濕勝者當清其
 濕熱勝者當清其熱濕勝其熱不可以熱治使濕愈重

人身一有
 濕熱則百
 病叢生

熱勝其濕不可以濕治使熱愈大也如初謂其濕當以清濕爲要使濕不得以成其熱或久濕化爲熱亦不得再理其濕使熱反助其勝也有如小便渾濁大便溏泄此濕勝其熱也瘡瘍膿潰痢下赤白此熱勝其濕也熱勝其濕下之自可濕勝其熱利之便宜蓋治濕不利小便非其治也治熱不利大腸亦非其治也設或痿唯濕熱氣弱少榮是則熱傷其氣宜清熱也泄瀉多濕或本脾虛又當實脾燥濕也中暑吐瀉此濕化其熱也濕化其熱黃連香茹飲中噦吐瀉此熱化其濕也熱化其濕

苓連二陳湯是雖治之不等亦各從其類也又聞用藥之法五苓散而利小便濕勝熱者用之四苓散而利小便熱勝濕者用之小陷胸而利大便濕勝熱者用之三黃石膏湯而利大便熱勝濕者用之傷暑而用黃連香茹飲熱欲化其濕也泄瀉而用益元散濕欲化其熱也至若胃苓湯爲燥脾利濕之藥柴苓湯爲清熱利濕之劑其正不足者分而利之也其邪有餘者開而導之也分而利之者利小水也開而導之者導大腸也苟能得其利之導之之用則濕自無不去之濕而熱自無不清

之熱矣又見近世黃疸一症如禽麴相似始生於濕繼而濕化爲熱則竟不見其有濕俱當與黃疸沙白火丹等病用荷包草平地木草藥利小便而治無不痊此猶之痰火而用雪裏青痢疾而用黃連苗也蓋取其有鮮利之性生寒之味行之甚速故其效反過於本經之用猪苓澤瀉茵陳木通山梔之類此利小便之一徵也然非治過者未之知也而導大腸之功亦於此可逆觀矣愚再按濕熱者因濕而生其熱也脾土之爲病也何也脾屬土而土嘗尅水濕者水之象也鬱於中宮化而爲

熱故曰濕熱其症頭眩體倦四肢無力中氣不清飲食不進小便黃濁大便溏泄此腑臟因濕之所傷也其脈濡而緩甚者發熱惡寒自汗時出其脈濡而數治宜二陳湯加黃芩枳殼如一身盡痛者加羌活腿足痛者加防己脚氣起者加獨活濕在上焦加防風濕在中焦加香附乾葛濕在下焦加澤瀉黃柏因於寒者加紫蘇因於熱者加黃連因於風者亦加防風因於火者加山梔因於食者加山楂神麴因於氣者加枳桔因於勞者加歸朮因於大便不利者亦加黃連與枳實總之濕熱之

症初宜發散次當清利要先當於利小便後之凡利小便而小便清者宜以濕治之利小便而小便濁者宜以熱治之也

治法主意凡治熱者不用燥濕之藥凡治濕者不用清熱之藥

濕熱主方

黃連香茹飲 見中風

苓連二陳湯 見中風

五苓散 見傷寒

四苓散 見霍亂

小陷胸湯

三黃石膏湯 俱見傷寒

益元散 即天水散見中暑

胃苓湯

治四時濕熱為瀉以分利之 陳皮 厚

樸 甘草 蒼朮 澤瀉 猪苓 白朮 茯苓

桂小許 水煎服若渴而脈微小腹不痛悶者去

桂 柴苓湯 治風濕濕熱小便難微熱腹滿 柴胡

黃芩 炒 人參 去芦 半夏 製 甘草 茯苓 水煎服

華陀云肺氣盛為喘王海藏云肺氣果盛則清肅下行豈復為喘言火燦真氣氣衰而喘所謂盛者非肺氣也肺中之火也斯言高出前古

黃芩 入參 半夏 茯苓 柴胡
柴胡 枳實 芍藥 甘草 芩朮 澤瀉 白朮 茯苓
小柴胡湯 水煎服 每日服三次 每次服一匙
柴胡 枳實 芍藥 甘草 芩朮 澤瀉 白朮 茯苓
小柴胡湯 水煎服 每日服三次 每次服一匙

喘

丹溪曰喘急者氣為火所鬱而生痰在於肺胃也又曰非特痰火使然有陰虛有氣虛有水氣有食積等症陰虛者氣從小腹起而上逆於肺則作喘也氣虛者喘動氣促不得息也有火喘者火炎上行氣粗大而喘盛也有寒喘者因風寒閉肺無汗氣逆而生喘也有食喘者因飲食過多脾胃不能運化至生氣急而喘塞也戴氏曰凡喘有聲便是痰痰壅氣盛便成喘大抵喘之為病胃中有鬱火膈上有稠痰河間曰得食墜下稠痰而喘

醫林通串

卷之二 喘

三

丹溪

前人醫案
火入肺者
氣虛用六
君子湯補
中益氣湯
火乘金者
陰虛六味
地黃丸肺
熱者二冬
二母甘桔
梔芩火實
者白虎加
瓜藹仁枳
殼黃芩神
效肺癆者
保金化毒
改仁甘草
節桔梗貝

母防風金
銀花橘紅
門冬肺脹
利水散邪
越脾加半
夏湯腎虛
火不歸經
逆龍入海
久味九腎
虛水邪泛
濫逐水下
流金匱腎
氣丸

少止稍久食已入胃反助其痰痰又升上喘反大發俗
不知此而以胃虛治之有用燥熱之藥是則以火濟火
矣丹溪曰虛火可補實火當瀉宜用二陳湯加參連白
朮山查厚樸等藥先運其痰次降其火兼理脾氣而喘
自定也又有氣虛喘促者呼吸不利短氣不續宜以養
正和氣如二陳參麥五味之屬有胃虛轉盛擡肩擷肚
喘而不休宜以調中養胃如二陳參麥桑杏之屬若內
傷於七情外感於六氣其症似傷風而喘作者宜以發
散驅風如二陳湯加枳桔桑杏或參蘇飲而用治若久

病氣虛作喘者用人參阿膠麥冬五味君而補之若新
病氣實作喘者用桑皮葶藶枳殼黃芩主而瀉之金匱
云無寒熱短氣不足以息者虛也脉來弦緊而有力者
實也實則可治虛不可為症虛而脉實兼緩者可治症
實而脉虛兼數者不可為或有脾之虛者必先補其脾
肺之虛者必先理其肺使土實可以生金不為脹助喘
金清可以生水不為氣助其急否則土愈滯氣愈脹則
喘愈急矣金愈虛氣愈急則促愈加矣氣虛氣促喘必
太盛冷汗自出四肢逆冷呼吸不能順利者必死之兆

喘二

也司命者其熟記之

愚再按氣之壅盛而不接續者謂之喘氣之壅盛而不能均息者謂之氣急喘者有聲而氣上冲喉則連頭動氣急者無聲呼吸動作而氣動不平氣急當和其氣而氣自不急喘盛當平其氣而自定其喘其中分虛實緩急可治不可治前已明言之矣又言喘氣雖急而脉勢和緩者猶可治喘勢不急而脉勢急促者必難治喘氣又急而脉勢虛促者即不治脉散亂者不治脉歇上者不治頭汗者不治汗出如油者不治譫狂者不治痰盛

者不治痰不出而喉中作聲者亦不治

治法主意有汗而喘為虛無汗而喘為實實則可施虛

不可為

喘症主方

二陳湯 見中風

參蘇飲 見傷風

附效方

定喘湯 治有餘痰火遇寒即發哮喘 麻黃 桑

皮蜜炙杏仁 蘇子 甘草 陳白果 欬冬

花 黃芩 熟半夏 水煎服

神授湯 治久喘氣弱食少不得臥 用連皮胡桃

肉 二個人參 二錢 煎湯食後徐服即定

善定肺湯 治肺虛作喘身汗如油 麥冬 二

人參 三錢 五味子 一錢 水煎服

六君子湯 見痰火

補中益氣湯 見中風

六味地黃丸 見火症 石膏 錢麻黃 甘草 牡半夏 後水

越脈 半夏 薑煎 服先煮麻黃去沫後內諸藥

入味地黃丸 見火症 治肺腎虛腫重脚腫小便不利或肚

金匱腎氣丸 治肺腎虛腫重脚腫小便不利或肚

腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱證其效如神

此證多因脾胃虛弱治失其宜元氣後傷而變此

證非此藥不能救又薛新甫曰每見用尅伐傷損

脾胃瀉喘腫脹已不可救往往用此轉危為安妙

在桂附以補脾之母也損庵公亦屢稱其神奇常


加參朮活人殊衆後人毋得忽畧 白茯苓 三兩 附

子玉錢川牛膝 官桂 澤瀉 車前 山藥

山茱萸 丹皮 各一熟地 石為末 和地黃蜜

丸如桐子大每服七八十九空 心白湯下

醫林繩墨大全卷之三 終



翻

