

新刊婦人良方補遺大全卷之五

養集

勞瘵類

勞瘵叙論第一 凡二十一方

夫骨蒸殭痲復連尸症勞症虫症毒症熱症冷症食症邪症皆曰傳尸以症者注也病自上注下与前人相似故曰注其變有二十一種或

二十六種或九十九種大畧令人寒熱盜汗夢与鬼交遺泄白濁髮乾

而聳或腹中有塊或腸後兩邊有小結核連復數箇或聚或散沉七默

七咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下利羸瘦困乏不自勝持

積月累年以至於死後乃症易傍人乃至滅門者是也更有蜚尸遁

尸寒尸喪尸尸症等謂之五尸及大小附着等證不的知其所舌无處

不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因故之內非七情所忤外非四氣所襲

雖若麗乎不内外因奈其證多端傳變遷移難以推測故自古及今愈

此病者十不得一所謂狸骨懶肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見效

唯膏肓俞崔氏穴能治。若聞早灸之，可否幾半晚亦不濟也。病者憎寒發熱，自汗面白，目乾口苦，精神不守，恐畏不能獨卧，其傳在肝。病者憎寒發熱，面黑鼻燥，忽上喜忘大便，苦難或復泄瀉，口瘡，其傳在心。病者憎寒發熱，面青唇黃，舌本強不能嚥，飲食无味，四肢羸瘦，吐涎沫，其傳在脾。病者憎寒發熱，面赤鼻白，乾燥毛拆，咯嗽喘急，時吐白涎，或有血線，其傳在肺。病者憎寒發熱，面黃耳倫，焦枯筋骨疼痛，小便白濁，遺瀝胸痛，其傳在腎。

○二十四種蒸病論

所謂勞蒸者二十四種，隨訂皆可考尋。毛拆髮焦，肌膚甲錯，其蒸在皮。外人竟熱，自反惡寒，身振，胸刺，其蒸在肉。髮焦鼻衄，或復尿血，其蒸在血。身熱煩躁，痛如針刺，其蒸在脉。爪甲焦枯，眼昏兩脇急痛，其蒸在筋。版齒黑，尿大杼酸，其蒸在骨。背脊疼痛，筋骨酸，其蒸在髓。頭眩熱，悶口吐，涎涎眼多眵，淚其蒸在腦。男子失精，女子白

淫，其蒸在玉房。乍寒乍熱，中腕與臍中煩悶，其蒸在三焦。小便赤黃，凝濁如膏，其蒸在膀胱。傳道不均，或秘或泄，腹中雷鳴，其蒸在小腸。大腹隱痛，口鼻乾疼，其蒸在大腸。口鼻乾燥，腹脹目卧不安，自汗出，其蒸在胃。口苦耳聾，脇下痛，其蒸在膽。暴急後重，肛門澀秘，其蒸在廣腸。小腹疝痛，筋脉縱緩，陰器自強，其蒸在宗筋。眼昏淚下，時復眩暈，躁怒不常，其蒸在肝。舌焦黑，氣短煩悶，洒淅其蒸在心。唇乾口瘡，胸腹脹悶，畏寒不食，其蒸在脾。咳嗽喘滿，咯痰吐血，嘶音遠，其蒸在肺。耳輪焦枯，脚氣酸疼，起居不得，其蒸在腎。情相不寧，无故泄精，白物綿綿，而下其蒸在右腎。心主胞絡，心膈一塞，攻繫疼痛，俛仰煩冤，其蒸在膈。諸訂雖曰不同，其根多有，垂醫其心，肺治之，不可不絕其根也。

神效秘法

取傳屍勞虫服此藥，須先擇良日，焚香禱祝，令病人設榻面向福德方，服即有神效，不可使病人知其藥味及子細。

青桑皮 揚柳枝 梅枝 桃枝已上都要取東引者葱白七莖

青蒿以子代 真安息香一分研去石 阿魏一分

右八味除阿魏外用童子小便一升半煮取藥耗及一半去滓將藥汁化阿魏再煮十數沸去滓候溫作二次調下件藥末

朱砂半兩 小檳榔半兩 麝香半分

右三味研令極細分為二服用前湯使調下五更初一服三點再一服辰時間取下虫遂絕根本若見虫色白者此病必差若黑色則已傳入腎經不可救也服藥後只以淡粥補之並不動元氣効驗无比切須秘之世傳劳虫有灵輕易傳之則傷医者此說殆医者秘惜其方不可以授人耳要須密重之則无洩慢天機乃起死还生功同造化鬼神護助自有灵効大凡傳屍劳者必須先服此一藥后拾五方隨訂治不可以槩用藥調治三五月再服此取虫藥則永除根本如取下虫色已黑縱后服藥亦无補也然則能便

○治心胸積氣作胸痺引兩脇痛昏悶不收音聲不清虛熱上雍

蚬方 桑白皮三分 秋殼 木通 子苓

生乾地黄 白芍藥 甘草各半兩

右為粗末每服三文重水煮畢煎至七分去滓溫服食後

○治伏瘀血在心肺時作衄心胸徹背痛方

白芍藥 牡丹皮各一兩 生犀屑半兩 生地黄各兩別搗碎

右攻咀每服半兩水一大盞煎至七分去滓溫服

○調榮衛消瘀血出声音治痰嗽消瘀血方

川當歸 半升皮 白芍藥 子苓 木通 麥門冬

甘草 華陰細辛各半兩 生乾地黄一兩

右攻咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

○治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉半兩 耳草 川芎各一分 防風一兩 舌梗半兩

荆芥穗 一升

甘菊花 分真腦子 鮮時 生乾地黄 半升

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一九用麥門冬去心煎湯嚼下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘嗽痰涎飲食不美或勞傷熱小便赤澀加車前子一分每服一九煎桑枝湯嚼下日可六七服桑枝劉炒香每用水三盞煎至一盞去滓下藥

小兒疳積

治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此病因失血榮衛損也

黃老 一升 白芍藥 防風 各三分 甘草 半升 當歸 生乾地黄 各三分

右咬咀每服三錢水三盞麥三片棗一個煎至七分去滓溫服食前服

溫金散

治勞嗽

甘草 黃芩 桑白皮 防風 各一升 杏仁 二十七粒制

人參 去言 茯苓 各半升 麥門冬 一分

以前五味用米泔浸一宿曬乾次入人參茯苓麥門冬三味同為細末每服二錢水一盞煎一豆大煎至八分食後溫服

○治勞嗽有**四神丸**極妙方見勞嗽門

法便飲子

治心氣不 解勞倦血

若櫻 甘草 黃耆 人參 去芦 麥門冬 各一 青皮 半升

右為末每服二錢水一盞煎至七分溫服

瓜集湯

治胸痺 枳殼 四個 厚朴 薤白 各一 瓜樓 一個 桂枝 一升 有熱除此味

右咬咀水七升煎取四升去滓溫服

子令散

治心肺解勞除熱使榮衛順血不絕

黃耆 一升 白芍藥 子苓 人參 白茯苓 麥門冬 苦梗 生乾地黄 各半升

右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞麥三片煎至一盞半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

○治積氣堅硬作氣噎胸脇引背痛方

白芍藥 一斤半

鱉甲 醋炙

枳殼 去穢 北柴胡 各一斤

甘草

赤茯苓 各半斤

右吹咀每服三錢水一大盞姜三片棗一个煎至七分去滓溫服

治伏連傳注腹中有堅硬積氣壅心胸作痺痛引脇背痛腕膈滿悶方

鬼白

天門冬 去心 各三分 巴豆 一分去皮心炒

莽草

不蛙皂角

各半斤

葉子雄黃 一二分

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服一九漸加至二二三九空心湯水

吞下臨卧一服常宜斟酌勿令泄瀉忌鯉魚山猪蘆薈

出声音方

訶子 炮去核 木通 各一分

甘草 半斤

右吹咀用水三升煎至升半入生地黄汁一合再煎數沸散溫分六

服食後日作半料

○治咽喉痛方

百藥煎 去黑皮

鵬砂

甘草

生白礬 等分一

○治肺間邪氣胸中積血作痛失音含化丸方

○治肺間邪氣胸中積血作痛失音含化丸方

蛤蚧 口足炙訶子 去核 阿膠 粉炒 麥門冬 去心

北細辛

甘草

生乾地黄 各半兩

右為細末煉蜜為丸如鷄頭子大食後含化一九○已上諸方辰州

李倅 各景遺 錄示云傳之於五羊大帥方侍郎下德

治瘵疾得效方

河車 煮以手擊成小片焙乾須在長流水中瀉洗盡血淨入鍋內

乾薑 不成人勞損面黃皮黑腹內諸疾漸上瘦悴者以五味和之

如能化流與水澄清如真水南方之人以甘草并麻和諸藥灌盛

之此為藥服 望白茯苓 半兩 揀參 一兩 乾山藥 二兩

右為細末麥糊為丸如梧桐子大以少麝香末為衣每服三五十九

米飲溫酒鹽湯送下空心服嗽甚者五味子湯下

又方

治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧浸一宿全者酒 知母 批把葉去毛炒

杏仁去皮尖炒 具母去心 人參去芦

鹿角膠粉炒 甘草

右各一两依方事治淨秤為末每服三錢水一盞入桑白皮煎至八分温服日三夜二

治勞嗽

桑白皮 熟地黄各二 人參去芦 紫苑

黃耆 川五味子各一

又四君子湯

加秦苑黃蠟煎服心妙 辰陽李梓云已上藥方乃補世

傳之仲第要教人甚難服藥止可食淡煮猪蹄肉仍須先煮熱肉去元汁膏以白湯熟煮仍忌房勞 產愈修合藥及煎藥時忌生人 插畜見仍勿令病人知用藥味 大有功效矣

養正膏

治傳尸出汗取虫辟

鼈甲一兩 青蒿一握 淡豉七 葱白二握 安息香一分研

桃柳桑枝各七握 桃仁如 天鹽蓋用比頭大

右十味隔夜以水一升浸至五

四合又用檳榔一箇為末麝香一錢七將所煎藥去滓調下至日高

二交時放温頓服以衣覆出汗坐者十指汗出如藕絲五色臭穢汗

出後仍瀉下虫狀惡物及甚者旬日再服亦效

治骨蒸勞瘵

治骨蒸勞瘵赤氣粗口乾通身狀熱或多虛汗大腸泄秘

小便赤黃飲食全少

青蒿 鼈甲時炙北柴胡 木香 生乾地黄各一两

青皮半兩 宣黃連二兩

右為末以猪肚一箇洗淨入藥在內繫定蒸令極軟研如泥為丸如綠豆大湯下十五丸空心日三服忌温麪毒物

補遺

治勞嗽并嗽血唾血咯血

阿膠炒 生地黃 卷柏葉 山藥炒 大薊根 五味子

雞蘇各一 柏子仁 炒 人參

防風

麥門冬 去心各半兩

右為末煉蜜丸如彈子大每瓦細嚼麥門冬湯或小麦濃煎湯嚥下

川椒二斤去核并合口者炒為末每一錢空心米飲調下雖痺悶少頃如不能禁以酒糊丸梧子大空心日服三五丸米飲下服及見効

治傳尸骨蒸勞方論第二十九方

婦人骨蒸勞方論第二十九方

夫骨蒸勞者由熱毒三時骨故謂之骨蒸也亦曰付尸亦謂殘喘亦稱復連亦名無辜丈夫以玄癖為根女人以血氣為本無問少長多染此病內既傷於臟腑外則損於肌膚日久不痊遂致羸瘦因服冷藥過度則傷於脾上氣既衰而付五臟脾初受病或脹或妨遂加洩痢肌肉瘦瘠轉增痿黃四肢無力飲食少味脾既受已次付於腎上既受病時上盜汗腰膝冷疼夢鬼交侵小便赤黃腎既受已次付於心上既受病往

注松林或喜或嗔兩頰常赤唇色如朱下熱下寒神氣不守心既受已

次傳於肺上既受病胸滿短氣咳嗽多唾皮膚甲錯狀如髮片肺既受

已次傳於肝上既受病兩目昏暗脇下妨痛不欲見人常懷忿怒五臟

既病漸上羸瘦即難療也

天靈蓋散治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即熱兩頰紅色食飲不下心神煩躁

天靈蓋 安息香 地骨皮 當歸 山梔子仁 人參

具母 去心 黃耆 桃仁 去皮尖 雙下 檳榔 各一兩 鼈甲 醋炙

北柴胡 生乾地黄 赤茯苓 麥門冬 各半 阿魏

右為粗末以童子小便一大盞桃柳枝各七寸姜五片葱白五寸藥

四斗煎至七分去滓溫服

治婦人骨蒸勞熱躰瘦煩疼不欲飲食

鼈甲 醋炙 北柴胡 各半 朱砂 桃仁 去皮尖 雙下

川升麻 天靈蓋麋犀角屑 梔子仁 地骨皮 知母各一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大溫水下三十九無時

黃耆 麥門冬去心 茯神 北柴胡 甘草 生乾地黃各一分

酸棗仁炒 郁李仁 杏仁去皮尖 枳殼去穢 赤芍藥 知母各半 人參去芦

黃苓各二 百合 枳殼去穢 赤芍藥 知母各半 人參去芦

石為細末煉蜜為丸如梧桐子大清粥吞下三十九無時候

滋補丸 治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連已上出聖惠方

麝香三分 犀角屑 木香 白木各一分 鬼箭羽 虎頭骨酥炙

天靈蓋酥炙 辰砂 桃仁去皮尖 雄黃各一分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大溫水下二十九此藥辟瘟疫亦可帶之

治勞 見專治婦人方

雄鷄一个重一斤者 杏仁去皮尖 北柴胡 具母去心 知母各一分

右除鷄外諸藥細剉以好酒五升入鍋內將活鷄在中以藥和停圍

定上用板子石壓定令鷄在藥內喫酒藥候來口却以慢火煮候酒

盡為度却取鷄令患人喫盡次將鷄甲用醋炙黃入在前項諸藥內

焙乾為細末用酒煮麩糊丸如梧桐子大用米飲吞下三十九無時

候日伍服

麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胸煩壅又

赤茯苓 當歸 乾漆炒研 鱉醋炙 常山 大黃煨

北柴胡 白朮 生乾地黃 石膏各一分

右為細末每服二錢水一盞小麥五十粒煎至六分食後臨卧時溫

服有虛汗加麻黃根一兩蘇東坡云此黃州吳判官方療骨蒸黃瘦

口臭肌熱盜汗極効麥煎散甚多此方吳君宝之如希世之珍其効

可知也

治諸虛勞疾羸瘦乏力腰背引痛心煩喘嗽唾膿嘔血頑涎
傷骨蒸等候並皆療治 許元故先生方

地骨皮

粉草

北柴胡

前胡

烏藥

麻黃不云

乾葛

青蒿

苦梗

知母

天仙藤

小黃苓

各一

人參

生乾地黄

秦羌

鼈甲

黃耆各半

右咬咀每服三錢水一盞酒一分猪筒骨一莖炙焦分為四服桃柳

枝各七寸杏仁五粒去皮尖搥碎煎至七分去滓溫服加烏枝半斤

尤妙。一方加當歸白芍藥

○**華佗方大靈治傳尸** **明月世方**

雄黃

木香

各半

天靈蓋

炙一丸

輕粉

一分

鼈甲

各一

兔屎 二丸

右為末用法酒一大升大者半兩為末熬膏入前藥為丸如彈子大
朱砂為衣傳尸勞肌瘦面黃嘔吐咳嗽不定先燒安息香令煙出吸
之不嗽非傳尸也不可用此藥若煙入口咳不能禁止乃傳尸也宜
用此藥五更初服勿令人知以童便共酒一盞化一丸服如人行十
里久必吐出虫狀如燈心細長及寸或如爛瓜李又如蝦蟇狀各不
同未効次日再服以應為度

明月世方 治諸勞

蘇沈良方

兔屎

四十枚

硃砂

如兔屎大

四十九

丸

右細研生蜜丸如梧桐子大以甘草半兩碎之水浸一宿取汁五更

初下七丸勿令病人知勞藥下後頻省若有虫急打殺以桑火油煎

便焦棄急水中三日不下更服須在月望前日服忌見喪服色衣婦

人猶大之類後服治勞補氣藥取差

沈內翰云孫元規歲北方能

用一皮夢人腹壅一月如人盤明下不可正視通人心骨皆寒已而

始悟向之所夢大體此藥最治熱

寒煩躁骨熱亦能治之一方有

地黃丸 解勞主肌進食法血養心

生地黄汁 杏仁汁 生姜汁 藕汁各五升 薄荷汁 鵝梨汁各二升
法酒 二升 沙蜜 四升 右慢火煮成膏入後藥

北柴胡去心 木香 人參 茯苓 山藥 栝子仁去皮

遠志 枳實去穢 呆木各一兩 秦光 苦梗並去芦 二兩

麝香 半兩 熟地黄 石酒蒸四兩

右為末以前膏子和丸如梧桐子大食後甘草湯下二十九

○治骨蒸寒熱名醫錄云目州揚寺丞有文事鄭迪功女有骨蒸肉熱之病時發外寒過內熱時骨蒸盛之時四肢羸瘦足跌腫者其病在五臟六腑之中衆醫不瘥因遇慶州吳醫者曰請為治之只單用石膏

散服之體微涼如故

石膏散 方見靈苑方

真石膏不以多以研令極細

右新汲水和服方寸匕身无熱為度外臺秘要本草同

治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱 靈苑方

青蒿八九月間成实时採去枝梗以蒿用童子小便浸三日照乾為末每服二錢烏枚一个煎至七分温

青蒿散 治骨蒸勞退熱解肌進食

九肋鱉甲个 北柴胡二 甘草 杏仁 桔梗 當歸

人參 地骨皮 赤芍藥各一 胡黃連 宣連各一

官桂 木香各半 麝香 一字 酥 蜜各三兩

右十四味同為細末用青蒿一片童子小便五升好酒一升熬青蒿汁約二升已來攙去青蒿不用入酥蜜再熬成膏冷後入藥末搜和為丸如梧桐子大每服十五丸温酒下米飲亦得日進三服如秋後

合時更入桃柳枝七莖此藥甚妙

補遺 崔氏灸骨蒸勞瘵若人初得此疾即便如法灸之無不効者用細

繩一條約五六尺躡之勿令展縮以病人順脚底貼肉量男左足從

大拇指頭齊起從脚板底當脚跟中心向后引繩循脚肚貼肉直上
至曲脊中文橫紋截斷又令患人解髮分兩邊令見頭縫自顙門平
分至腦后乃平身正坐取前所截繩子一頭從鼻端齊引繩向上正
循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩尺處當脊骨以墨
點記此墨點不別取一繩子令患人合口將繩子按於口上兩頭至
吻却鈎起繩子中心至鼻端根下如人樣齊兩吻截斷將此繩展直
於前在脊骨上墨點處取中橫量勿令高下於繩子兩頭以白圈記
之此白圈兩穴名患門穴乃是灸穴患此名患門穴初灸此訖次令
其人平身正坐稍縮臂膊取一繩遠項向前双垂与鳩尾齊鳩尾即
骨人无心岐骨者即前兩岐即截斷却背翻繩頭向項後以繩子中
骨間量取一寸即是鳩尾也
停取心正令當喉嚨結骨上其繩兩頭夾項双垂循脊骨中双繩頭
齊會處以墨點記不是別取一繩子令其人合口橫量齊兩吻截斷
還於脊骨上第二次墨點處指中橫量繩子兩頭以白圈記之此是

初灸七壯又將第二次量口繩子摺中當脊直上下豎停中心在脊
累至百壯此是灸穴初灸七二次墨記上下繩頭盡處以白圈記之此是灸穴初灸七此縱橫四
方凡四穴是名曰四花穴初灸各七壯迨瘡愈其疾未効依前法復
灸故云累灸至百壯凡灸時可用灸足三若婦人或有經帛裹足以
至短小所有灸法第一次患門穴難為量度不若只取膏肓膈灸之
在第四椎下从傍各三寸是膏肓穴次灸四花穴亦可道軒嘗見人初有此疾即為如
法灸之无有不効者

地仙散治骨蒸肌熱一切熱勞煩燥能生津液

地骨皮二防風去芦麥門冬各一甘草炙半

右剉散每三錢姜四片水煎温服

十全大補湯治虛勞發熱加此柴胡地骨皮秦艽見局

五心煩熱赤宜局方消遙散

秦艽散方見第六卷

通淋散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調脘腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓 白朮 當歸去芦酒浸半 日芍藥 此柴胡去苗 甘草炙及半

方吹咀每服三升水一盞煨生姜一塊切片薄荷三葉同煎至七分去滓抵服无時候

枳殼散 治婦人手足煩熱夜臥多汗肌肉黃瘦今候不調四肢煩倦心胸滿悶狀如勞氣

枳殼去穢 半夏 赤芍藥 各一月 柴胡 黃芩各一月

右于紀禾每服二升水一盞生姜一塊擘破棗二枚煎至八分去滓温服候五心煩熱及身體壯熱潮熱退方續服

三心散 治五心煩熱 見局方 吳蘇散 加苜蓿麥門冬 見中並治五心

煩熱手足掌心熱甚者

婦人血風勞氣方論第三 凡十四方

夫婦人血風勞者由氣血虛損今候不調或外傷風邪或內挾宿冷致史陰改不和今絡否溢腹中空痛四肢酸疼月水或斷或來面色痿黃羸瘦又有因產后未滿百日不謹將護臟腑虛損百脉枯竭遂致勞損之疾也

人參散 治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目眩心忪煩倦寒熱

盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調脘腹疼痛痲痺塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節滯延瘦瘁下起下臥甚即着床

荊芥穗 人參 桂心 生乾地黄 此柴胡 蟹甲醋炙 酸棗仁炒 枳殼製 羚羊角屑 別于末 白朮各半

川芎 當歸 防風 甘草各半

此末每服三升水一盞半生姜三片煎至八分去滓抵服无時

服常服除一切風虛勞令宿疾孕婦休服

醫甲丸

治婦人血風勞氣四服羸瘦疼痛今脉不利飲食无味渐加

虛困

鼈甲

紫苑

桂心

川芎

防風

川牛膝

當歸

秦艽

人參

桃仁

琥珀

麝香

一分

赤芍藥

蝨虫製

水蛭製

鬼箭羽

白朮

羌活各三分

熟乾地黄

刀半

右于細末煉蜜丸如梧桐子大食前酒吞下三十九

琥珀丸

治血風虛勞上熱下冷或發動即心中煩燥困乏无力不美

飲食醋心口瘡月水不調肌肉黃瘁腹痛腸鳴或有氣塊攻衝或時作寒熱頭旋痰逆手足麻痺大宜常服出博濟方

琥珀

當歸

木香

川芎

防風

檳榔各四分

三棱炮

乾姜炮

桂心各五分

吳白朮洗

柴胡

人參各一分

青皮

吳茱萸洗炮

全蝎炒

附子炮

草豆蔻

赤芍藥

預藥

白芷各二分

桃仁去皮炒

敗龜

鼈甲

各六分

天麻

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每日空心酒下二十九午前近晚更進一服如菴暖近晚不須服如腹內塊積攻藥不鼈甲桃仁檳榔三稜各加一倍為妙已生冷葱見菜毒魚等物

香甲散

治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃瘁多因減食遍身痠疼

真邪相繫心腹撮疼

木香

乾姜各三分

鼈甲二片炙

牡丹皮

赤芍藥

橘紅

桂心

人參

茯苓

熟地黄

秦艽

柴胡

白朮

當歸炒

附子炮

去皮各一分

甘草半片

右為粗末每服二錢水一錢生姜三片棗二枚煎至七分去滓稍熟服如煩渴心躁入烏梅一两同杵為末
地黄煎治婦人血風勞心忪發熱不退出經驗方

生乾地黄

熟乾地黄

右二味等分為細末用生姜自然汁入水相和打糊為丸如梧桐子大每服三十丸用地黃湯下或只茶酒醋湯下亦可食後日三服竟

八味丸 治血風諸般疾產後並宜服食久服諸疾除去

臟腑虛冷早間先服

服不可用地黃性令溫滋燥脾大藥陰虛則發熱蓋地黃大能補陰精血也

荆芥 雀腦各三升 當歸 人參各半升 桂心

壯丹皮 羌活 防風 苦梗 大腹子 甘草

蒲黃 白茯苓 枳殼 厚朴 半夏 杏仁

疑冬花 各三升 附子 乾地黃 鼈甲 白芍藥

北柴胡 黃耆 乾葛 木香 沉香 一分

右為細末每服二錢姜三片棗二枚水一盞煎至七分溫服

荆芥散 治婦人血海虛冷手足煩疼頰赤口乾背甲勞倦寒熱往來咳嗽痰涎飲食進退血經不調多致盜汗胃膈不快但是風勞氣並皆治之

荆芥穗 北柴胡 秦艽 白芷 黃耆 當歸

義茂 川芎 麥門冬 白茯苓 人參 白芍藥

沉香 海桐皮 枳殼 熟地黃 甘草 酸棗仁

木香 檳榔 各一 鼈甲 白豆蔻 桂心 苦梗 各二升

右為細末每服二錢姜錢三片烏梅一箇煎至七分無時溫服如極濕去檳榔每一日二服睡臥服尤佳忌生冷動風甜物腹有顆塊服之便消

治婦人新稟血氣不足不耐寒暑易冒疾傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢怠倦筋骨少力盜汗易發或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏飲食無味胸膈不利或產前產後受病並可服之

北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黃 人參 當歸 各一

鼈甲 胡黃連 沉香 知母 各半 桑寄生 乾葛 各二

右為細末每服二錢水一錢烏梅一箇棗二枚麥門冬數粒煎至八

婦人良方五
分無時候

方如散 治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱羸瘦不能飲食

白木 白茯苓 白芍藥 各一升 甘草 半升

右為細末姜棗煎二錢服

油煎散 治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘁不進飲食日三服

川烏 海桐皮 地骨皮 五加皮 桂心 牡丹皮
陳橘皮 白芍藥 川芎 當歸 烏藥 白芷
莪茂 各等分

右為末每服二錢水二盞入生麻油三四點煎至七分溫服無時候

天效油煎散 治血風勞氣攻症四肢腰背疼痛嘔逆醋心不思飲食
日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷敗服此神効

五加皮 川烏炮 芍藥 海桐皮 牡丹皮 各一升
桂心 乾姜 川芎 各半升

右為細末每服二錢水一盞油浸錢一文同煎至六分溫服常服以

油浸二錢煎藥時不可撓動藥時不可吹

方亦有**四散子** 亦妙見四卷第九命

○治血風勞方

牡丹皮 地骨皮 防風 甘草 黑豆 白芷
白芍藥 各一升 荆芥穗 二升 川芎 一分

右為細末每服二錢水一盞姜三片棗一個葱白一寸煎至八分溫服無時候

香甲散 治熱病後虛勞或四肢倦怠脚手疼痛飲食無味肌膚黃瘦
或熱瘡盜汗頭暈虛煩此藥久服駐顏其妙不可具述

鼈甲 三升 醋浸去骨炙黃 當歸 木香 人參
又入醋煎炙七次 羌活 川芎 沉香 肉豆蔻 酸棗仁 附子

大腹子 各半升 北柴胡 半升 厚朴 川牛膝

婦人良方五

白茯苓 秦元各一 桂心半斤

右咬咀每服五錢水一盞生姜三片烏梅一箇煎至八分去滓溫服日三服空心忌生冷麪食鷄肉酢醬之類

馬鞭草散 治血風攻透肢體疼痛或疥癩痒或疥痺麻作寒作熱飲食減味並皆治之 乙上出專治婦人方

馬鞭草 去荊芥穗 北柴胡 烏梅肉 各二升 枳殼

白朮 羌活 白芍藥 各一升 秦元 天台烏藥

麻黃 各一升 木香 半升 當歸 川烏 并草 各一升

右為細末每服二錢水一盞生姜二片棗一枚葱白二寸煎至七分日午臨卧溫服常服無忌有孕莫服

補遺 養羊角散 治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯

四肢無力時發潮熱少思食物漸至勞虛 二方並見第四卷

○婦人風虛勞冷方論第四 凡二方

夫婦人風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷氣血便致虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹內其經絡得於冷則氣血凝滯不能自溫於肌膚也腹內得於風冷則脾胃氣弱不能消於飲食也隨其所傷變成疾病若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則令臟冷致令無子若搏於血則澁壅亦令經水不利斷絕不通也

養血散 治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘急體瘦無力經候不調飲食減少

牡丹皮 赤芍藥 栢子仁 續斷 各半 麝香 一分 澤蘭葉 二

當歸 延胡索 桂心 附子 炮 川牛膝 川芎

桃仁 乾漆 炒 琥珀 沒藥 木香 各三分

右十七味為細末每服二錢溫酒調下

紫石末散 治婦人風虛勞冷經候不調四肢羸弱不能飲食

紫石英 熟乾地黄 白石英各續斷 白芍藥 桂心

木香 當歸 白木 乾姜 白薇各半 川牛膝 川芎

北五味子 人參各三分 椒紅 附子 黃耆各一

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九溫酒吞下空心服

補遺 **溫經湯** 治婦人風虛勞冷血海虛寒月候不調羸瘦減食方在崩中帶下

○婦人冷勞方論第五 凡七方

夫婦人冷勞者由血氣不足表裏俱虛臟腑久挾宿冷致令飲食不消腹內積聚臍下冷痛月候不調骨節疼痛手足無力肌膚羸瘦面色痿黃故曰冷勞也

桃仁散 治婦人冷勞氣滯經脈不通腹脇妨悶四肢羸瘦不思飲食

木香 呵子 白薑 桃仁 人參各半 陳皮

琥珀 桂心各一 赤芍藥 延胡索 赤茯苓 川牛膝

當歸 白木各三分

右略咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓空心溫服

木香散 治婦人冷勞經脈不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸加

羸瘦 木香 琥珀 吳弟黃炮 當歸 牡丹皮

赤芍藥 三稜 附子炮 延胡索 川芎各三分 乾姜

人參 桂心各半 北柴胡 白木 鼈甲醋煮去 厚朴

熟地黄 陳橘皮各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下

熟乾地黃丸 治婦人冷勞虛損肌體消瘦顏色痿黃四肢無力月候

不調少思飲食 乾熟地黄 鼈甲 陳皮各一

北五味子 當歸 川芎 桂心各半 川牛膝 人參

白芍藥 白木 附子 白茯苓 黃耆各三分 甘草一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下三十九

白芍藥丸 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸瘦不食

婦人良方之五卷

鼈甲 醋炙 桃仁 去皮火焚炒 木香 五靈脂 去土當歸 各一兩 砂 二兩 醋一升 熬成膏

右為細末用硃砂膏為丸如梧桐子大空心溫酒下二十九

養肝散 治婦人冷勞脾胃虛之大腸轉洩水穀不化四肢羸瘦口内生瘡不思飲食漸加無力宜服此藥

北柴胡 縮砂仁 葶藶 葶藶 各三分 白朮 白芷

胡椒 白薑 陳皮 山茵陳 人參 蕪荑仁

木香 紫苑 白芍藥 北細辛 桂心 各半兩

右為細末以豬猪肝一具去脂膜切如柳葉片以新汲水洗過入葱白三寸細切入藥末半兩於鉢內以新水二大錢入鹽醋少許以塗碗合煮令水盡空心以意食之喫前食下食後良久飲暖酒一盞為妙晚食前熱服

肝散 治婦人冷勞面色痿黃不多思食或時腹痛四肢少力積漸

羸瘦 白芍藥 川芎 苦梗 厚朴 桂心 各三分

陳皮 半兩 白薑 當歸 荆芥穗 葶藶 胡椒

蕪荑仁 藁本 柴胡 紫苑 各半兩

右為細末每服半兩以豬猪肝一具用鹽醋葱白各少許相和如桑常煮熱空心任意食之然後喫溫酒二錢尤佳

大香膏 治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃瘦飲食進退經候不調

心腹多脹漸變如勞補血海調氣

鼈甲 醋炙 沉香 柴胡 人參 川芎 羌活

當歸 附子 炮去 木香 安息香 桔梗 茯苓

藿香葉 陳橘皮 牡丹皮 三稜 厚朴 姜汁炙 桂心

桃仁 尖皮 牛膝 去苗各半兩 檳榔 和皮大腹子 各一分

右為細末每服二錢水一盞生薑烏梅各少許煎至八分溫服餘一半更加乾漆一分 阿魏 半分 赤芍藥 一分 同為末煉蜜丸如梧桐子

婦人良方王卷

大空心煎烏梅地黃湯下二三十丸與散子相間服博濟方

十全大補湯治婦人冷勞最妙見前方

新刊婦人良方補遺大全卷之五畢

新刊婦人良方補遺大全卷之六

聖集

勞瘵寒熱類

婦人熱勞方論第一凡四方

夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血上不調臟腑壅滯熱毒積蓄在內不得宣通之所致也其候心神煩躁頰赤頭疼眼澁唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思昏沉多卧少起飲食無味舉身痠疼或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

黃耆散治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參 黃耆 當歸各三 北柴胡去皮 黃耆 地骨皮

赤茯苓 麥門冬 生地黄 赤芍藥各一 甘草

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎六分去滓溫服無時

半夏散治婦人熱勞煩渴口乾躰瘦無力四肢疼痛或時寒熱痰逆

嘔吐不思飲食 半夏 知母 若梗 人參

赤茯苓

秦元

赤芍藥

麥門冬

烏梅肉

各半兩

驚甲

炙北柴胡

黃耆

大腹皮

三分

甘草

一分

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑二片煎至七分去滓溫服無時候服

猪肚丸

治婦人熱勞羸瘦

北柴胡

赤茯苓

人參

黃耆

各一兩

黃連

三兩

木香

各半

桃仁

驚甲

各一兩半

右為細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內以線縫合蒸令爛熟於砂盆內研如膏丸如梧子大食前粥飲下三十九午食前服

秦元散

治血經有熱月脉凝滯五心煩倦

此婦人經驗方

麥門冬

秦元

各一兩

生地黃

當歸

各半兩

地骨皮

鬱金

蘇木

各一分

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎至七分溫服若經期調不用紅花忌酒與熱物此方可服一年

補遺

地仙散

治婦人熱勞煩躁月假不調口若舌乾四肢怠倦方在

五卷第二論補遺

驚甲地黃湯

治熱勞手足煩心怔忡悸悶婦人血室有乾血身體羸瘦食不為肌肉

驚甲

醋炙

石斛

白朮

熟地黃

酒浸

茯苓

人參

肉桂

不見火

甘草

炙各半兩

秦元

去芦各一兩

瘦食不為肌肉

柴胡

去芦

當歸

去芦酒浸

麥門冬

右判每四錢姜四片烏梅半箇煎溫服此藥專治熱勞其性差寒脾胃快者方可服虛甚汗多者不可服

○婦人客熱方論第二凡三方

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛實七則生熱虛則受邪七熱加人陰陽冷熱自相乘也今云客熱者是體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胸膈之間虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

麥門冬散

治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

麥門冬 北柴胡 赤茯苓 各一兩

桑白皮 黃耆 各三分 生乾地黄

羚羊角屑 赤芍藥 甘草 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎六分去滓溫服無時候

犀角散

治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑 赤芍藥 地骨皮 紅花

甘草 各半兩 北柴胡 一兩

黃耆 半兩 麥門冬 人參 枳殼

赤茯苓 各三分

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片煎七分去滓無時溫服

黃耆散

治婦人客熱心胸壅悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黄

黃耆 各

犀角屑 甘草

瓜蒌子仁

黃耆 各半兩

人參

茯苓 各三分

右為細末每服二錢水一中盞麥冬行葉五片煎至七分溫服無時候

補遺

敗毒散

治婦人客熱四肢煩悶疼痛不思飲食甚者可加地骨

皮黃冬

見局方

○婦人寒熱方證第三

凡四方

經云陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫婦人勞傷氣血虛弱令陰陽交爭虛實不調故令寒熱如瘧也

地骨皮散

治婦人血風氣體虛發歇寒熱

北柴胡 地骨皮 桑白皮 枳殼

前胡 黃耆 各三分

白茯苓 五加皮 人參 甘草

桂心 白芍藥 各半兩

右咬咀每服三錢水一盞生姜三片煎至七分去滓溫服無時候

生地黃散

治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思飲食

生乾地黄 一兩

北柴胡 芍藥

木香 桂心

防風 各半兩

酸棗仁

羚羊角屑

白芍藥

白朮

黃耆

川牛膝

白茯苓

當歸

枳殼 各三分

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分去滓空心溫服

婦人長方六卷 寒熱類

柴胡散 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮 各一兩 人參 地骨皮

枳殼 炒 生乾地黄 苦梗 桑白皮 赤芍藥 各

驚甲 兩二 麥門冬 三兩 甘草 半兩

右咬咀每服四錢水盞半薑三片煎七分去滓溫服無時候

荆芥散 療時氣風溫寒熱瘧瘧往來潮熱並宜服之

陳皮 麻黃 香附子 甘草 各一兩 荆芥穗 厚朴 各二

草菓仁 三個 川白芷 桂心 各半兩

右咬咀每服二錢水一火盞薑三片棗一枚煎七分去滓溫服無時候

初遺 婦人寒熱或如瘧証若不因胎產可如傷寒方法治之此不重附

○寡婦寒熱如瘧方論第四九一方

論曰寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄畧而論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得

是以嶽上成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽

獨陰可乎夫既處閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久則為勞又有經閉白淫痰涎頭風膈氣痞悶而野瘦瘠等證比皆寡

婦之病診其脉獨肝脉弦出寸口而上魚際究其脉原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

牛心散 許孝士云有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或

時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部无寒邪脉但厥陰肝脉弦長而上魚際宜服柳

陰等藥予製此方治之愈

北柴胡 秦艽 黃芩 略半 生地黃 二兩 赤芍藥 一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大烏梅煎湯下三十九无時候日三

服許孝士云嘗讀史記倉公傳載齊光王侍人蕭女病瘧昔者年三
服許孝士云嘗讀史記倉公傳載齊光王侍人蕭女病瘧昔者年三
可以知欲男子而不可得診其脉肝脉弦出寸口是以知
之又有婦人熱入血室寒熱如瘧一証在本卷第十論

補遺 予嘗治一寡婦寒熱如瘧諸藥未效後但以參蘇飲加黃芩服之愈
方在中風門

○婦人惡寒方論第五 凡一方

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也无熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脉必浮數發於陰者宜温裏脉必沈細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上疾證方治並載百問不復繁引僕嘗治一婦人但惡寒别无他證六脉平靜遂用敗毒散而安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可過但去彼微火兼以和表之藥自然不思寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能治矣

敗毒散

見眉方

補遺

桂枝麻黃各半湯

甚効

方見活人書

○婦人血風煩悶方論第六 凡四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之搏於血使氣鬱置而否溢則生於熱或肢節煩疼口乾少卧皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也

川烏頭丸

治婦人血風虛冷月候不調或即脚手心煩熱或即頭面

浮腫頑麻

川烏頭

一斤用好清油益各四兩一處於鉢內炭火炒不住手攪候裂者乃須如桑根色為度遂旋取出子於新瓦上或不

裂者不用裂者則去皮失脉

五靈脂淨去土石棟

右為細末更入白中或乳鉢內研令俾後將蒸餅水浸後却漚去水漸七入白中和杵直待圓得即丸如梧桐子大空心温酒或鹽湯下二十九忌動風物丈夫風疾亦治

赤芍藥散

治婦人氣血不和心胸煩悶不思飲食四肢少力頭目昏

眩身體疼痛

牡丹皮

白茯苓

赤芍藥

白芷

甘草

各二兩

柴胡

月半

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分溫服食後臨卧

酸棗仁散 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁喫食減少

酸棗仁 赤芍藥 當歸 羚羊角屑 赤茯苓 紅花

生地黃 各三分 防風 羌活 川牛膝 麥門冬

桂心 川芎 地骨皮 甘草 各半兩

右咬咀每服四錢水盞半姜三片薄荷少許煎七分溫服

當歸散 治婦人血風潮熱 當歸 芍藥 延胡索

不灰木 熟地黃 各一兩 大黃 二分 桂心 半兩 甘草 二分

右為細末每服二錢水一盞胭脂一小角子煎至六分去滓如躁時放冷服細呷清者

補遺 前五卷婦人血風發氣方論內可與化條通用

○婦人血風攻脾不能食方論第七 凡四方

夫脾象於土脾為中州意智之藏也其肝心肺腎皆受脾之精氣以養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人血氣不調臟腑勞損風邪冷氣積蓄在內攻於脾胃脾胃既盡為邪所乘則不能摧伏五穀故令不能食也

白芍藥散 治婦人血風冷氣攻脾胃噎逆不納飲食

人參 一兩 草豆蔻仁 麩裹煨 白茯苓 半夏 各一分 良姜

白朮 縮砂仁 枇杷葉 去毛 桂心 木香 青皮 甘草 各半

右為粗末每服三錢水一大盞姜三片煎至七分去滓溫服無時候

神效丸 治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲食

白朮 附子 炮 枳殼 剉 訶子 桂心 人參

木香 食茱萸 陳皮 各一 枳殼 剉 乾姜 各半兩

右為細末以酒煮神麩末二兩作糊為丸如梧桐子大每服二十比空心姜湯吞下

婦人良方卷之六

蘇江丸 治婦人血風攻脾胃臟腑虛冷全不思食臍腹多痛體瘦無

力 蘇紅 沉香 附子 莪茂 訶子 當歸

白朮 良薑 白豆蔻仁 丁香 藜香

右為細末酒煮麪糊丸如梧桐子大空心溫酒下三十丸

進食散 李潛云治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾胃虛全不入食

者只兩服能食 良方 據愚見此方既有川烏治血風攻脾不食豈元

良驗 青皮 陳皮 粉草 良姜 桂心

川烏 炮去皮尖 草豆蔻仁 各二斤 訶子 五箇

右為細末每服一錢水一盞姜二片煎至七分溫服

補遺桂枝散 治婦人血風脾胃虛弱脾血久冷全不思食

草豆蔻 蘇甘草 良姜 白朮 砂仁 青皮

訶子 內半 肉桂 二寸 生姜 厚朴 去皮 姜 棗肉 各二味 各一 凡水一 碗

為末每二錢鹽湯點服及療腰痛又治冷濕溫補脾胃無他之藥

又可平胃散 四君子湯 嘉木散 參苓白朮散皆效 並見局方

○婦人夢與鬼交方論第八 九三方

夫人稟五行秀氣而生承五臟神杰而養若陰陽調和則臟腑強盛風邪鬼魅不能傷之若攝理失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼邪干其正然婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病也其狀不欲見人如有對候時獨言笑或時悲泣是也脉息遲伏或為鳥喙皆鬼邪為病也又脉來綿綿不知度數而顏色不赤此亦是此候也

安神散 治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

茯神 半 又 茯苓 人參 石菖蒲 各 又 赤豆 半 又

右以咀每服三大錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

桃仁丸 治婦人與鬼魅交通

辰砂 枳榔 當歸 桃仁 各三分 水銀 一分 棗肉 研

麝香 阿魏 麝 各半 又 沉香 各半 又

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心挑仁湯吞下十九

又方

似辟瘟丹

虎頭骨二朱砂

雄黃

雌黃

鬼白

皂莢

蕪荑仁 鬼箭

梨荑 各一又

右件生為末煉蜜為丸為彈子大囊盛一丸男左女右繫臂上及用一丸當病人戶前燒之一切邪鬼不敢進

大乙神精丹

蘇合香丸

皆可用也

補遺

以香散

治男子婦人心氣不足精神恍惚夜夢顛倒與鬼交通語言錯亂先宜服此補養氣血安鎮心神然後以前方治之 見局方

○婦人傷寒傷風方論第九凡八方

論曰古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣口緊盛即宜下人迎緊盛即宜下婦人左關浮緊不可下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通液

然汗出而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語如見鬼

狀此為熱入血室无犯胃氣及上二焦无犯胃氣者言不可下也宜服

小胡湯

主之若行湯遲則熱入胃令津燥中焦上焦不榮成血結

育狀須當針期門也五行相尅以生相扶以出平居之日水常養於木

水木相生則榮養血室之蓄則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生

剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小腹滿小便利屬抵當湯証也

傷寒胃實譫語宜下之婦人熱入血室譫語者不可下也雖然婦人傷寒與男子治法不同男子先

調氣婦人先調血此大畧之詞耳要知脉緊無汗名傷寒脉緩有汗為

傷風熱病脉洪大中暑脉細弱其証一也假如中暈用白虎胃實用承

氣豈必調血而後行湯邪仲景傷寒論所以不分婦人者良亦在孝者

皆可隨病於男子藥証中以意選用也○若妊婦傷寒藥須涼慎不

可行桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為妊婦而去也

大抵產前先安胎產後先補益次服傷寒藥若病稍退則止藥不可盡

婦人良方六卷
劑此為大法。○黃帝問婦人重身毒之柰何岐伯曰有故無殞亦無損也。大積大聚其可犯，衰其大半過其厄。○男子婦人傷寒仲景治法別無異議，比見民間有婦人傷寒方書，稱仲景所撰而王叔和為之序，以法者之間有可取疑，非古方特假聖人之名以信其說於天下，令取金櫃玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列為一卷，雖不足以及婦人傷寒之詳，並可以百問中參用也。

桂枝紅花湯 治婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不得往來

桂枝

芍藥

甘草

紅花

右以咀每服五錢水一盞半姜四片棗二個煎至七分去滓溫服良又再服汗出而解

○婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食**黃芩芍藥湯** 療之

黃芩

芍藥

白朮

生乾地黄

右各一兩以咀每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生薑

當歸湯 治婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下服之

柴胡

白朮

人參

甘草

赤芍藥

當歸

五味子

木通

各半兩

右以咀每服半兩水一盞半生薑四片棗二枚煎至八分去滓稍熱服婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩譫語目赤毒氣閉塞不得通

宜

川大黃

鼠尾黃芩

蘆瓜黃連

等分

右為粗末每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服取微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉肝之餘氣

乾地黃湯 治婦人傷寒差後猶有餘氣不去謂之遺熱宜服

乾地黃

大黃

黃連

黃芩

柴胡

白芍藥

甘草

右以咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服取利汗出解

婦人良方六卷
婦人良方六卷
婦人良方六卷

瘧疾 男子病新瘧婦人與之交合得病名曰陽易其証里急腰膝及腹內痛身重服之効

青白湯 治婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胸手足拘急搐搦如中風狀

括樓根 二刀
淡青竹茹 半升
右以水二升半煮取一升二合去滓分作三服

當歸白木湯 治婦人病未平復因有所動小腹急痛腰膝疼四肢不任辛勤無力發熱者

桂枝 白朮 當歸 甘草
黃耆 各一 生附子 一个破作八片各一分 生薑 半刀

右以水三升煮取一升半去滓通口服一湯盞食頃再服溫覆微汗

神清 凡婦人傷寒傷風不干胎前產後者治法一如男子自有仲景傷寒專科此方特率大槩故不贅補遺

○婦人熱入血室方論第十凡五方
婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦宜小柴胡湯

小柴胡湯 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀

柴胡 八分 黃芩 人參 生乾地黄 甘草 各三分 半夏 二升

右以水一斗五升煮取六升分三服
補遺 小柴胡湯活人書不用生乾地黃亦不可得者除半夏各黃蘗湯

局方四物湯 不用熟地黄只用生乾地黄加北柴胡各等分煎服亦療此證

乾姜赤胡湯 婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼

婦人良方六卷

寒熱類

柴胡四兩 桂枝半兩 括樓根一兩 牡蛎 乾姜 甘草各一

右咬咀每服五錢水盞半煎七分去滓溫服初服微煩再服汗出愈

○婦人傷寒血結胸膈柔而痛不可撫近宜海蛤散婦人血結胸法當針期門仲景無藥方此方疑非仲景然其言有理姑存焉

海蛤 滑石 甘草各二兩 芒硝一兩

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胸膈血散膈中血聚則小腸壅小腸既壅則膈中血不流行宜此方小便利血數行更宜

桂枝紅花湯發其汗則愈

○婦人傷風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼和胸脇下滿結胸狀謔語者此為熱入血室也當刺期門穴隨其穴而取之期門穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當刺期門不用行子午法恐纏藏膜引氣上但下針令病人吸五吸得針良久徐上出針此是平瀉法也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘕人寸半深也

期門穴 活人書云婦人乳頭向下盡處骨間丈夫及乳小

者以一指為率陷中有動脈是穴咳逆灸之良文炷如小豆大灸三壯或五壯婦人熱入血室謔語者刺之下針令病人吸五吸停針良久出針

期門穴法



○婦人咳嗽方論第十一 凡九方

夫婦人咳嗽者由肌腠虛外受於寒熱風濕所得也肺為四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛若為寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於

肺中外皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩治當以脉息辨之其脉浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而流者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不妥者也

○咳嗽用溫藥方論第十二 初真世

經曰微寒為嗽寒甚為腸癖古人立方治嗽未有不本於溫藥如乾姜桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發散以此準之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬為肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脉數發熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如建中之屬今人但見寒熱咳嗽率用柴胡龍甲門冬葶藶等藥旋踵受弊而不知非可為深戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯丸委曲調治無為鹵莽致傷人命

黃耆散 治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾

黃耆 四兩

甘草 二兩

右為細末湯點一二錢服日三服。一方甘草一兩黃耆具兩名黃耆六一湯只啖咀水煎服

蛤蚧丸 治婦人咳嗽不止漸成勞氣

蛤蚧 一對酥炙

紫葳

欵冬花

鱉甲 炙

貝母 去心

皂莢子仁 各一兩炒 杏仁 炒去皮尖一兩半

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸淡姜湯吞下

合身丸 昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞服此安寇宗

頭方

枇杷葉 去毛

桑白皮

欵冬花

木通

紫葳

杏仁 各等分

大黃 煨半

右為細末煉蜜丸如櫻桃大食後夜卧含化一丸

貝母湯

治諸嗽久不瘥 本事方

貝母 生薑 附子 北五味子

黃耆

乾姜 煨者

陳皮

各一半夏

婦人良方六卷

桑白皮 桂心 北柴胡熱者加一半 木香 甘草各

右為粗末每服五錢水一盞半杏仁七箇去皮尖碎之生薑二片煎

至也分去滓熱服黃師文云戊申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而瘥以此治諸嗽悉皆愈

定喘湯 治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸滿

氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭

昏並皆治之 半夏炒 明阿膠炒 甘草各錢半

鷓鴣粟殼半兩製 北五味子 桑白皮 麻黃去節 人參各一

右咬咀每服三大錢姜三片烏梅半個煎至七分去滓漸七溫服食

後臨卧服 方同和劑分兩加減不同有效

○滄州李官人宅**補肺湯** 治狀同前 又各清金湯

瞿粟殼二兩製 人參 粉草各半 陳皮 茯苓 杏仁製

白木 明阿膠炒 北五味子 桑白皮 薏苡仁 紫蘇各

右咬咀為末每服三大錢水盞半姜三片棗二枚烏梅半個煎至一

盞臨卧溫服僕每用則無效遂加百合貝母去心半夏麩疑又花各

一兩服之良驗

金不換散 治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳嗽涎盛腹

脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠年日近一切喘咳疾諸

藥不效者並治之

瞿粟殼半兩製 杏仁製 甘草各三錢 枳殼四錢

右咬咀每服三錢水一盞半姜三片烏梅半箇煎至八分食後臨卧漸

熱服許元林先生方乙卯年七月僕嘗治一婦人咳嗽不已服諸藥

無效漸成勞瘵求余診之六脉懦弱以愚考之此是血弱又因

○又治一婦人時行感熱咳嗽遂用小柴胡湯去人參姜棗只加北五

味子煎服愈

○古今錄驗**橘皮湯** 療春冬傷寒秋夏冷溫咳嗽喉中作聲上氣不

得下頭扁方 陳皮 紫苑 麻黃去根 杏仁製

當歸

桂心

甘草

黃芩

各等分

右咬咀每服五錢水五升煎至一盞去滓熱服

補道

五散

治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩滿頭目昏眩

金沸草散

治肺感寒鼻塞聲重咳嗽不已痰濃壅盛

小青龙湯

治感寒咳嗽喘息加杏仁煎有汗去麻黃

細辛五味子湯

治肺經感胃風邪咳嗽已上四方並是和劑

參蘇飲

治上膈有痰聲重咳嗽加杏仁五味子煎方見中風門

○勞嗽方論第十三 凡二方

經曰人感於寒則受病微則為咳甚則為泄為痛凡咳嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故咳為肺病五臟則各以治時受邪六腑則又為五臟所移古人言肺病難愈而善卒死者肺為驕藏怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以其湯散遲過針灸不及故也十種咳嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒咳支飲

咳膾咳厥陰咳華佗所謂五嗽者冷嗽氣嗽燥嗽飲嗽邪嗽孫真人亦
有方治寒毒注嗽者歷代方論著之甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經
見意其華佗所謂邪嗽真入所謂注嗽者是也此病蓋酒色過度勞極
傷肺損動經絡其重者咯唾膿血輕者時發時瘥又有因虛感邪惡之
氣且傳注得之或先嘔血而後嗽或先咳嗽漸成沉羸此則非特內損
肺經又挾邪惡傳注之氣所以特其病之毒害無過此也真人治注嗽
通氣丸方用蜈蚣四節又云虵與鬼交通及飲食者全用蜈蚣外臺方
四滿丸治五嗽亦用蜈蚣遇世名公能推原其旨意率用蛤蚧天靈蓋
批柳枝麝香丹砂雄黃安息香之類以通神明之藥療之高出古人之
意矣又肺中有虫如蚕令人喉痒而咳嗽湯嗽經過針灸不及以藥含
化虫死即嗽止 見張翁方

深師療五嗽

一上氣嗽二飲嗽三緜嗽四冷嗽五邪嗽

乾姜

桂心

躑躅花

苦勞

紫苑

芫花根皮

婦人良方六卷

蜈蚣一枚去細辛

甘草炙

鬼督郵

人參

半夏一分

右十二味為細末煉蜜丸如大豆許每服五丸米飲下日三服未知

古今錄驗

四時通

氣五嗽一氣嗽二痺嗽三鯁嗽四邪嗽五冷嗽悉

療之方

蜈蚣各一枚

元花根五分

乾薑

芎勞

桂心各四分

人參

細辛各二分

乾薑

芎勞

桂心各四分

人參

細辛各二分

右為末煉蜜丸如梧桐子大米飲下一十九日三服加至十五丸忌

生葱生菜

補遺

金散

治勞嗽喘悶咯痰中有血方見前勞瘵類一

何膠丸

治勞嗽并嗽血咯血方見前勞瘵類下補遺

團魚散

治骨蒸勞嗽累効

貝母

前胡

知母

杏仁

北柴胡等分

團魚仁

右藥與魚同煮熟提起去頭取肉連汁食之却將前藥焙乾為末就

用團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥為丸梧桐子大每服二十九粒

黃芩六一湯空心吞下病安仍服黃芩六一湯補理

○喘滿方論第十四凡六方

夫喘之為病黃帝問岐伯岐伯對曰夜行則喘出於腎淫氣病肺有所

隨恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘

出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則着而為病也原疾之由

雖曰皆本於肺與氣然感外邪則有太陽證脉浮無汗而喘者宜麻黃

湯陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜承氣湯若表邪未解誤

服下利藥不止脉促喘而汗出者宜葛根黃連黃芩湯若微喘者桂枝

厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯若表邪

未解心下停水發熱而喘或嘔者小青龍湯去麻黃加杏仁主之若陰

證喘促者四肢逆冷脉息沉細或寸大尺小或六脉促疾或心下脹滿

結硬或冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是本氣極

虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜返陰丹主之犯此
見白問不復錄僕且以大槩而言之諸臟相乘而喘者以杏子散如感寒伏熱
而喘者以華蓋散九寶湯若暴寒向火覆衣彼過當傷熱肺實而喘促
者其狀多有熱證宜洗心散冷水調服若因氣字不調痰盛喘促者宜
四七湯兼官局桔梗湯姜煎服若涎多而喘者宜千縉湯橘皮半夏湯
若不得卧上即喘者此由水氣逆行上乘於肺上得水則浮而開使氣
不得通流其脉沉大宜神秘湯肺之積名曰息責在右脇下大如杯令
人洒浙寒熱喘咳發癰疽宜棗膏元若上氣喘者神授湯若上盛下弱
而喘促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若尊年之人素來稟賦太厚不任
熱藥者不可輕投丹劑又諸熱藥但以秘傳降氣湯分心氣飲論之梗
槩不出於此矣若素有脚氣而喘者當作脚氣治之又骨蒸勞喘自
有專門不敢濫及

神心湯

治水氣乘肺而喘煎療支飲而喘

陳橘皮炒去白

紫蘇葉 人參

桑白皮

生姜炒

右咬咀每服半兩水煎去滓溫服

杏子散

治諸藏相乘喘急

杏仁去皮尖雙仁

麻黃根為細末等分

右和煎橘皮湯調下貳錢無時候

千縉湯

齊州半夏

七枚炮裂四片破之

皂角去皮炙一寸

甘草炙一寸

生薑如前大

右同以水一碗煮去半頓服沈興宗待制嘗病痰喘不能卧人扶而
坐數日客有見之曰我曾如此得良藥一服瘥我以千縉酬之謂之
千縉湯可試為之興宗得湯一服而瘥

棗膏丸

療息責

葶藶研細 陳皮

苦楝各等分

右後二味為末入葶藶令停葶肥棗肉研為膏和丸如梧子大每服
五七丸飲下。許學士云予嘗患停飲水積肺經食已必噎漸喘菴

肺系急服此良驗

神效湯 治上氣喘急不得卧

橘紅 苦梗 紫蘇 人參 北五味子等分

右次咀每服四錢水一盞煎至六分去滓食後服

九寶湯 治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小兒室女產前產後

皆可服惟虛勞自汗不可服

薄荷葉 紫蘇 大腹皮洗 麻黃去根節各四錢 桑白皮

桂心 杏仁去皮 陳橘皮 甘草各二兩

右次咀每服半兩水一盞半姜十片烏梅一箇煎至六分去滓溫服

食後○有兩浙張大夫病喘二十年每至秋冬輒劇不可坐卧百方

不差後得臨平僧法本方服之遂差法本丸病三十年服此藥半年

乃絕根本永不復發凡服此藥須久乃瘥

良方神效湯 橘皮半夏湯 洗心散 華蓋散並見局方四七湯

見二十 僕嘗見羅安人年近六十遇秋冬之交上氣喘促不能坐卧六

脉洪實服諸藥無效問疾之原少年自川中任所服餌丹砂又恐是丹

毒為害遂服洗心散皆無効僕以華蓋散數服而愈謾記之

補遺 治肺感風邪喘呼不已方見和劑

人參定喘湯 治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸滿咳嗽聲重方見和劑

本方前咳嗽類亦有定喘湯但分兩不同

四磨湯 治七情鬱結上氣喘急滿悶

人參 檳榔 沉香 烏藥

右四味各濃磨白沸湯取七分盞溫服

五味子湯 治喘促脉伏而厥見活人書

○婦人風痰積飲方論第十五 凡八方

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成也人皆有痰少

者不能為妨多者成患但胸膈有痰飲積於五臟則令眼暈亦令頭眩

頭痛也

○評曰夫痰之為害多因外感五邪五邪者寒暑燥濕風內傷七氣七氣者喜怒憂思心驚因五邪而得者得風為風痰得寒為寒痰得冷為冷痰得熱為熱痰得暑為暑痰因七氣所傷者多因婦人情性執者不能容忍而有此證豈特只因風冷而成哉所以內感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗涕唾身中濕者敗濁變而成痰乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎飲沫四種相類宜子細辨詳調治因風而生痰者宜服三生飲星香飲青州白丸子化痰丸方見因寒冷而得者宜降氣湯黑錫丹養正丹並見因熱而得者宜服金沸草散柴胡半夏湯因暑而得者消暑丸並見因氣字不調鬱結而成者宜參蘇飲四七湯二陳湯痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹利之雖口可吐可下亦要觀人之勇怯察脈之虛實方可投之切記不宜痛擊暴下所以初虞世有金虎符雷之戒者此也

星香飲

參蘇飲

方並見第一論

養正丹

方見第四卷

養正丹

方見第四卷

痰化湯

治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花

去蒂

枇杷葉

去毛炙

川芎

北細辛

藿香

桂心

枳殼去穢炒前胡

人參

去芦羌活

半夏

各半兩

甘草

羚羊角屑

赤茯苓

各三分

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

天南星丸

治婦人風痰心膈壅滯

天南星

白附子

並炮

皂莢仁

炒

半夏

麩

各一兩

晉礬

右為細末以酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十丸生姜薄荷湯吞下

又方

半夏

天南星

各二兩

肥皂

炙

生薑

三兩

右以水五升一同煮令水尽去皂莢生薑只用半夏南星焙乾為末

以酒煮麩糊丸如梧桐子大生姜薄荷湯下七丸

治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱榮衛不調肢節拘
倦身軀疼痛嗜卧少力飲食無味兼治五嗽痰癆

柴胡八分 半夏三兩 人參去芦 甘草 黃芩 麥門冬各二
白朮 二兩

右咬咀每服五錢水盞半姜五片棗一枚煎至八分去滓服

金沸草散 治傷寒中脘有痰令人吐熱頭痛筋緊急時發寒熱皆類

傷風 荆芥穗 四兩 半夏 甘草 北細辛 各一

赤茯苓 二兩 前胡 旋覆花 各三兩

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗一枚煎至六分熱服未知

再服 無細辛并茯苓

瓜蒂散 療病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝

喉咽不得息者此為胸中有痰也當吐之宜服此

瓜蒂 炒黃 赤小豆 各半兩

右為細末取壹錢七豉壹合湯柒合先清之須臾煮作稀糜去滓取汁和散溫頓
服不吐少加得狀吐乃止諸亡血虛家不可與之 脉微大忌令人吐

大半夏湯 治痰飲及脾胃不和 半夏 白茯苓 生薑 各一分

右咬咀作壹服每遇滯間有寒痰以水貳錢煎至壹錢去滓臨卧温呷如有
熱痰加炙月草壹分加脾胃不和去月草加陳橘皮壹分同煎此即二
陳湯加減得理

四七湯 治喜怒哀思憂恐驚馬之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間
中膈痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之
婦人情性執着不能寬解多祓七氣所傷遂致氣填胃臆或如梅核上寒咽喉甚
者病悶欲絕產婦尤多此證宜服此劑間以香附子藥丸服取効切不可謂此藥
蘇耗氣且謂新產氣血但虛不肯多服用之効驗不可具述

紫蘇葉 貳兩 厚朴 三兩 茯苓 四兩 半夏 五兩

右咬咀每服肆錢水壹錢半薑七片棗一箇煎至六分去滓熱服無時候若因

思夏過當小便白濁用此藥至青州白元子極妙

補遺 道寸痰湯治而痰涎壅盛胸膈留飲痞寒不通

半夏湯泡七 南星 枳實麩炒 伏苓

橘紅各一兩 月草五錢

右取咀每四錢薑十片煎 食後服

新法半夏湯 溫中化痰負 治痰飲皆妙 見和劑 伏苓

佳 見第三卷臂痛類

婦人心育嘈雜方論第十六 凡二方

夫心育嘈雜婦人多有此證原疾之由多是痰也皆血液液汁變成或云是血嘈令人多用指餘血炒而食之則愈詳其此理是以血道寸血歸原爾恰加以鹽梅下涎之義不若用許學士 覆花湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多脛口中清水自出脇肋急脹滿痛不欲

食此胃氣虛冷所致其脉沉遲弦細是其證也

婦人良方

旋覆花 北細辛 橘紅 桂心 人參 甘草

苦梗 白芍藥 半夏各半 赤茯苓三分

右咬咀每服四錢水盞半姜七片煎至八分去滓溫服

局方 治惡阻半夏茯苓湯亦妙方見惡阻論中

補遺 予嘗以參蘇飲二分四物湯一分和每四錢姜七片煎服治一

婦人心胸嘈雜而愈亦名茯苓補心湯方見煎

新刊婦人良方補遺大全卷之六畢

新刊婦人良方補遺大全卷之七

醫集

嘔吐類

婦人嘔吐方論第一片六方

夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所為也胃為水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃胃氣逆則令嘔吐也 愚詳曰夫嘔吐之疾非特脾胃虛冷而嘔吐也亦有胃熱而嘔者亦有胃中冷胃口熱而吐者亦有痰盛而嘔者亦有血弱而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥。如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中丸及許仁則半夏丸人參七味丸。如胃熱而嘔吐者宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯槐花散。如胃中冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香正氣散主薑棗子煎沉冷服即止如痰盛嘔吐者宜局方半夏茯苓湯二陳湯。如惡阻兼服茯苓丸自有專門見十卷第二論如血不歸原而嘔吐者宜用十全大補湯加陳皮半夏藿香姜棗煎服。或有脚氣而嘔吐者自有專門不

散瀝及

益智散 治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不下食四肢無力

益智 一兩 附子 炮 縮砂仁 丁香 厚朴 黃耆

白朮 白茯苓 陳皮 川芎 良姜 藿香葉

當歸 各三分 人參 桂心 各半兩

右咬咀每服三錢姜三片棗一枚水一盞煎至七分去滓無時溫服

丁香散 治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱便則嘔吐水穀不消

丁香 白朮 縮砂仁 草果仁 各三分 人參 一兩 當歸

白豆寇 藿香葉 甘草 略半 橘皮 三分 神麴 訶子 各半兩

右為細末每服二半錢煎姜棗湯調下

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾葛 二兩 半夏 湯洗七次姜汁半盞漿水一 甘草 三分

右咬咀每服五錢水二盞姜三片竹茹一彈大棗二枚煎至一盞去

滓溫服 許仁則 亦相類方

良方 槐花散

皂莢 白礬 槐花 以令黃黑色 甘草 等分

右為細末白湯調二錢

許仁則 半夏丸 療積冷在胃嘔逆不下食方

半夏 一升 其煎用者洗去滑 小麥 麩 一升

右擣半夏為散以水搜麩丸如彈子大以水煮令麩熟則是藥成初

吞四五丸日二服稍加至十四五丸旋煮旋服服此愈病減欲更重

合服亦佳忌羊肉飴救急用

又依前**半夏丸** 雖愈漸損然病根不除欲多合前丸又慮藥毒不可

久服欲不服又恐病滋蔓宜合**人參七叶丸** 服

人參 白朮 各五兩 厚朴 細辛 各四兩 生薑 八兩 未 橘皮 三兩

桂心 二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大飲下十九漸加至二十九與半夏丸間服亦可忘桃李雀肉生葱生菜與同

補治男子婦人一切嘔吐 **五苓散**內除桂加半夏末如桂重數每服

一錢以生姜自然汁調搜和如麵候半時久再以白沸湯一小盞調

用溫服

青金丹治一切嘔吐不已

硫黃 二兩

水銀 一兩

入銚內慢火熬化以不飽子撥炒成砂再入乳碗研黑不見星以姜汁糊丸如菉豆大每服二三十丸米飲下

○婦人霍亂方論第二 凡六方

論曰嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆因腸胃虛冷飲食過度觸冒風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍多亂也或先心痛而吐者或先

腹痛而利者或吐利俱作者或頭痛身熱吐熱而脈浮洪者或陽氣暴絕而手足逆冷而脈息微絕者治之當分陰陽察其虛實辨其冷熱觀其脈息熱者涼之冷者溫之以平為期百問云凡霍亂吐利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸吐利已汗出而脈四肢拘急不能脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯○夏月中暑霍亂大煩渴四肢逆冷冷汗出胸轉筋者香薷散濃煎沉冷服即効凡霍亂之脈得浮洪者易治微遲者并氣短者難治

人參

白朮

乾姜

甘草 各一兩

右為細末煉蜜為丸每兩作五丸取湯和一九服之日十服吐多利少者取枳實三枚炙去穢四破水三升煮取一升和一丸服之○吐少利多者加乾姜一累○吐利乾嘔者取半夏半兩泡洗去滑水二升煮取一升和一丸服○若辨疼痛不可堪者水三升煮棗三枚取一升和一丸服○若吐利大極轉筋者以韭汁洗腹腎從胸至足踝

勿逆即止。若脉冷微汗腹中寒取附子一枚炮去皮四破以水二升煎取一升和一丸服。吐利悉止脉不出脉尤冷者可服諸湯補之。

四順湯

治霍亂吐利腹痛手足逆冷脉微欲絕千金翼方

附子 一个破八片 乾姜 三兩人參 甘草 各一兩

右咬咀水煎服

四逆加猪膽汁湯

治吐已下断汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者服之

甘草 二兩 乾姜 三兩 附子 一枚生猪膽汁 半合

右三味咬咀每服五錢水三盞覆至二盞去滓内猪膽汁分作兩次温服其脉即來

未日需散

治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧湿地或當風取凉而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃上得

冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便至吐利心腹疼痛霍亂氣逆有先心痛而吐者或先腹痛而吐者

吐利俱發者有發熱頭痛眩暈而得吐利者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷脉微欲絕者或煩悶昏塞欲死者姓婦霍亂吐利此藥悉能主之

香薷葉 四兩 白扁豆 厚朴 各二兩

右咬咀每服半兩水一大盞酒一分慢火濃煎至六分去滓并中浸令冰冷頓服無時候連併二三服立見神效蘇沈良方中名香薷散百問同有黃連無扁豆

呵子散

治老幼霍亂吐利一服取效又治九種心痛及心脾冷痛不可忍其功如神

呵子 甘草 厚朴 乾姜 草菓仁 陳皮 良姜 茯苓 神麴 麥牙 各等分

右為細末每服二錢候發刺痛不可忍用水一盞煎七分入鹽服急則蓋點

胡麻湯

治霍亂吐利甚妙

胡椒 四十九粒

綠豆 一百四十九粒

右為細末木瓜煎湯調下二錢

補遺

凡霍亂身熱脉浮洪而渴者此必胃有熱宜竹茹湯服之吐止

然後以五苓散不換金正氣散六和湯等治之或若陽氣暴絕四肢

逆冷脉微欲絕可用理中湯理中丸治中湯之類甚者加附子如中

暑霍亂吐利予嘗以香薷散入半夏少許以生姜自然汁搜藥劑入

銅銚內炒乾再入好紅麴酒又搜潤藥又炒乾却入水一盞半煎至

七分去查并中浸令極冷服之甚效

○婦人翻胃吐食方論第三 凡二方

白礬散

治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人男子亦可服一斤

以上為妙

白礬土

以米泔一升淘白礬土今赤入醋內浸乾姜

右為細末研停每服一錢飯飲調下甚者二錢

白芷散

治婦人翻胃吐食

右用白芷一兩切作片於瓦上炒令黃為細末用猪血二十文切片

以沸湯泡七次將血離藥喫七片如剩藥末留後次用

補遺

大倉丸

治脾胃虛弱不進飲食翻胃嘔吐

白豆寇

砂仁 各二

丁香 一兩

陳倉米 一升

用黃土炒米

為末姜汁法丸梧子大每服六七十丸食後淡姜湯下

丁香黃散

治証同上 見和劑局方

青金丹

每服三十九生薑陳皮煎湯送下 方見前嘔吐類

五苓散

加半夏每四錢生薑五片煎溫服治翻胃發渴

○婦人血膈方論第四 凡一方

牡丹煎

治婦人血膈

牡丹

苦參

具母 去心

玄胡索

白芍藥

婦人鼻衄者不可治
治婦人血風血氣血膈等候
時候服

補遺 油丹散 治婦人血風血氣血膈等候
五靈脂 炒一兩
莪朮
桂心
芸薹子 炒各半兩

為末每服二錢酒半盞水一盞煎八分疾作時熱服

○婦人鼻衄方論第五 凡七方

夫婦人鼻衄者由傷動血氣所致也凡血氣調和則循環表裏經絡遊
則不散若勞傷損動因而生熱氣逆流溢入於鼻者則成鼻衄也只有
產後見衄者不可治
評曰凡鼻衄雖多因熱而得此疾亦有因怒氣而
得之者曾補茶人鼻衄不止諸治不差召子治之
先用蘇合香丸四粒次用五苓散濃煎白茅花湯調服即止次用芍藥
湯調理又有一富室男子鼻血不止六脉洪數究竟云服丹藥太過遂
用黃連黃芩大黃為末
水煎服愈調服亦可

刺散 治婦人鼻衄血流不止
刺薊 二兩
桑耳
亂髮灰
艾葉 各一兩
生地黄 二兩
蒲黃 兩半

右為細末每服二錢無時粥飲調下

伏龍肝散 治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆治之

伏龍肝 生地黄 各一斤
竹茹 一升
芍藥
黃芩 川芎 桂心 甘草 各二兩
當歸

右咬咀水一斗三升煮竹茹減三升內藥煮取三升分為三服千金
方無桂心

百問有**茅花湯**以白茅花濃煎飲之立止

一方 搗生白茅根取汁一合飲之止

又方 取生葱心塞鼻中即定若因刺著并刀斧所傷血不止並用之立定

又方 取釜底墨細研入鼻中 **又方** 取亂髮灰細研以竹管吹入鼻
中立止 **又方** 取龍骨末吹入鼻中立止

補遺 犀角地黃湯 **鷄蘇散** **四生丸** 治鼻衄皆効 方並見後

四物湯 加側柏葉生地黄根煎治衄亦効

效人良方吐衄
又方山梔子燒存性為末搐鼻。又方烏賊魚骨槐花等分為末搐鼻。又方川鬱金末井水調服。又方赤芍藥為末井水調服。又方百草霜為末每一錢糯米飲調下仍以少許搐鼻。又方蘿蔔汁滴鼻中効。又方五倍子為末吹鼻中仍將新綿燒灰與五倍子末等分米飲下。

○婦人吐血方論第六 凡十三方

夫婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經絡內榮於臟腑若傷損氣血經絡則虛血行失於常理氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷氣逆上者皆吐血也

雞蘇散 治婦人吐血心煩昏悶

雞蘇葉 阿服 刺薊 生地黄 各一
茜根 甘草 各半 麥門冬 黃苓 當歸 伏龍肝 各三
右為粗末每服四錢水一盞姜三片竹茹半雞子大煎至六分去滓

溫服効

雞蘇散 治婦人虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉 黃苓 各一 當歸 赤芍藥 各半 伏龍肝 阿膠 各三
右為粗末每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服
○治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁 刺薊汁 生地黄汁 各三兩 生姜汁 半合 白蜜 一合
右和煎三兩沸無時以一小盞調炒麩塵一錢服

千金翼治吐血百方不差療十差神驗不傳方詳此藥性治熱毒吐血有効
地黄汁 半升 生大黃末 一方寸匕

右煎地黄汁三兩沸調大黃末令分為三服

又方 以伏龍肝研令極細每服二錢新汲水調下頻服取効

又方 白茅根 六寸長 以水一大盞煎取七分去滓溫服

又方 治吐血 荏苳心末

右水調方寸七日夜可二十服

又方

生地黃 三升切

阿膠 二兩炒 蒲黃 六合

右水五升煮取三升分三服。口濡此因怒極而得之遂用蘇合香丸和雞蘇丸服即效養生必用方云凡吐血須煎乾姜甘草湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者服生地黃竹茹藕汁去生便速

柔脾湯

治虛勞吐血衄血下白汗出方

出養生必用

甘草

白芍藥

黃耆各一

熟地黃 三兩

右為末每服肆錢水酒各一盞已上煎至七分去滓取六分清汁温

服食前

辛嘗治一女人年十九歲月經不行遂妄行而嘔血諸藥无一男子因飽低頭負重吐血諸藥无效亦投四生丸及青餅子即安更不發僕觀初虞世治吐血不喜用竹茹生地黃藕汁然亦不可押

泥此說如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢宜服涼藥以解之黃犀角生地黄生文藕汁等豈能无效如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰宜服温藥以暖之乾姜肉桂豈能无功寧者更宜思之

療吐血

凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉

生艾葉

生栢葉

生地黃

右等分爛研圓如雞子大每服一九水三盞煎至一盞去滓温服無

時候陳日華云先公紹興初遊福澤靈石寺主僧雷級食將竟持食飽拘破肺也明年再到寺因問去年嘔血者无恙否具主僧答云得四生丸服之遂愈自得此方屢救人有効

療熱甚嘔血者

以犀角地黄湯局方小三黃湯

以白茅根煎濃湯吞

之極妙

犀角地黄湯

治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑

芍藥 三分

生地黃 半斤

牡丹皮 去心 一兩

犀角屑 一兩如禾赤麻川者代

右以咀每服五錢水煎服有熱如狂者加黃芩二兩

青餅子

治咯血

青黛

杏仁

各一兩華佗方以牡蠣粉炒杏仁去皮尖牡蠣不用

右一處同研成膏燔黃蠟和作三十餅子每服一餅子用乾柿半箇夾定以温紙裹煨令香同嚼粥飲下無時候

若陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜服乾姜甘草湯

婦人良方七卷

甘草 乾姜 各半兩

右以咀水煎頓服。局方理中湯亦妙

補遺 花蕊石散 予嘗見一婦人苦此疾百藥不効以童子小便和酒

調下真花蕊石散不數服而愈

烏金散 治吐血不已每服二錢米飲下 卽十七卷催生如神散

○婦人疾癖諸氣方論第七 凡四方

夫婦人疾癖者本因邪氣積聚而生也疾者在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰疾氣也癖者為僻側在兩肋之間有時而痛故曰癖也夫疾之與癖皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則發作疼痛故曰疾癖者也

麝香丸 治婦人疾癖冷氣兼疰氣心腹痛不河忍

麝香 半兩 阿魏 一分 麩 裹 漿 人 麩 熟 五靈脂 桃仁

三稜 各三 芫花 醋炒 檳榔 各一 莪茂 桂心 沒藥

木香 當歸 各半兩

右為細末入麝香令停用粳米軟飯為丸如梧桐子大每服十九無時淡醋湯下

○治婦人疾癖及血氣等神效方

右以獺猪肝一具可及十兩者用巴豆五十枚去大皮剉在肝內用醞醋三碗慢火熬令肝爛熟入砂鉢內研令極爛入京三稜末和就得所為丸如梧桐子大每服五丸食前熱酒下想熟後去巴不用。夫疾癖一婦人血氣壅硬發厥刺痛甚則欲死究而二日方省血之所為僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍甚而死一婦人血氣作楚如小盤樣走注刺痛要一人伏定方少止亦用此二藥而愈尋常小人有奇效故獨于后

烏雞丸 方見二十四卷拾遺門

白散 專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛大治婦人聲

前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血藏宿冷百節倦痛肌體怯弱勞傷帶癖久服盡除但婦人一切疾病最宜服此

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾姜

芍藥 舶上茴香 青皮 苦練子 木香 熟地黄

麥牙 三稜 莪茂 茯苓 神麴 人參各等分

右為細末每服三平錢水一盞連根葱白二寸拍破益半錢煎至七

分溫服內大黃呵子宜相度病狀如大便不利入大黃同煎却不入

益如大便自利入呵子煎朱先生云此藥大治心氣脾疾用之見効

作楚痛不可忍服諸藥無効召僕診之兩關脈沉弱為肝脾沈差緊此血氣凝成痰癖也只以此二藥安愈○西明馬朝奉後院亦病此藥愈

羅安人每過經脈行時則臍與小腹下痛不可忍服藥無効僕以桂

枝桃仁湯愈自後再發一投而差桂枝桃仁湯方見第一卷十二論

治經候來時先腹痛男大德弓方七氣湯吞下來復丹

補遺局方續氣丸 **丁香散** 並治婦人痰癖癥瘕諸氣甚妙

婦人疝瘕方論第八 凡四方

夫婦人疝瘕之病者由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟腑虛弱受於風冷七入腹內與血相結所生疝者痛也瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動也婦人之病有異於丈夫者或因產後血虛受寒或因經水往來取冷過度非獨因飲食失節多挾於血氣所成也診婦人疝瘕其脈弦急者生虛弱小者死又瀦脈瀦如浮牢為血實氣虛也其發腹痛逆氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血久則結成瘕也

乾漆散 治婦人疝瘕久不消令人黃瘦羸兩脇妨悶心腹疼痛

乾漆炒令木香 芫花醉炒 赤芍藥 桂心 當歸

川芎 琥珀各半 大黃二兩 牛膝三分 桃仁一兩 麝香一八

右為細末無時溫酒調下一錢

綱目丸 治婦人疝瘕及積瘀血在臍時攻腹脇疼痛

婦人產後七種

川芒硝 硃砂各一 當歸 雄黃 桂心各半 大黃 炮三稜各二

右為細末用米醋一椀熬大黃末為膏次入餘藥末和丸如梧桐子
大空心溫酒吞十九漸七加至二十九以利下惡物為度

巴豆丸 治婦人疝瘕及血氣疼痛

巴豆 去皮心斷黃 硃砂 大黃各一兩五靈脂

桃仁 各三分 木香 半兩

右為末煉蜜丸如菜豆大淡醋湯空心下五丸熱酒亦可

良方集神丸

神麴 茴香各四兩 木香 椒炒香出

丁香 各半 檳榔 四枚 漆 六兩 半生半用重湯煮半日令香

右除漆五物皆半生半炒為細末用前生熟漆和丸如彈子大筒
香末十二兩鋪陰地陰乾候外乾并茴香取器中極乾去茴香留餘
育腸膀胱疝瘕及疝墜五隔血崩產後諸血漏下赤白並一九分四
服死胎一九皆綿灰酒下難產炒葵子四十九枚搗碎酒煎下一九

諸疾不過三服痰氣十服膈氣癥瘕五服血瘕二九當瘥予婦子婦

大塊如杯每發痛不可忍時子婦已貴京下善醫者悉常服藥
莫愈陳應之曰此血瘕也投黑神丸三九杯氣及消終身不作

神道探丸散 治婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸膈脇間

膀胱小腸疝氣及婦人血氣癥瘕痛

延胡索 肉桂 乾姜各二 甘草 蒼朮 米泔浸 縮砂

丁皮 檳榔各四 莪木 三稜 茯苓 青皮各六

右為末每服三錢水一盞連根葱白一莖煎空心熱服

○婦人八瘕方論第九 凡一方

夫婦人八瘕者皆由胞胎生產月水往來血脉精氣不調之所生也賢

為陰主開閉左為胞門右為子戶主定月水生子之道胞門主於子精

精神氣所出入合於中黃門玉門四邊主持閉子精臍下三寸各

曰關元主藏魂魄婦人之胞三焦之腑常所從止然婦人經脈俞絡合

調則月水以時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通邪氣

便得往入合於其臟若生血未盡而合陰陽即令婦人血脈變急小腹
重疼支滿胸脇腰背相引四肢疼痛飲食不調結牢惡血月事不時或
前或後因生聚如懷胎狀邪氣盛甚令人恍惚多夢寒熱四肢不舉陰
中生氣腫肉生風甚者害於小便小腹築痛淋瀝面色黃黑則不復生
子其八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕蠶瘕是也千金外臺
言之詳矣

桃仁煎

治婦人血瘕血積經候不通

出本事方

桃仁

大黃

各一

兩

川朴

各一

右四味為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大黃
蠱虫桃仁等不住手攪欲下手負下朴硝煮不住手攪良久出之丸
如梧桐子大前一日不用喫晚食五更初用溫酒吞下五九日午取
下如赤豆汁或如雞肝蠟痲衣狀未下再作如鮮血來即止續以調
血氣藥補之此方出千金

用此藥更初服至日午大痛不可忍遂計少頃下血塊如拳者效驗
小便如黑豆汁一二升痛止得愈此藥治病的
切然猛烈太峻氣虛血弱者更宜斟酌與之

天大石丸

治七瘕八瘕聚結杯塊及婦人帶下絕產腹中有瘕

瘕者當先下此藥但去瘕瘕不令人困

消石

三兩

大黃

四兩

人參

各一

升

甘草

各一

右為末以三年苦酒三升置銅石器中先納大黃微火熬微沸常攪
不息至七分內餘藥復熬成膏至可食即食如梧桐子大每服三十
丸米飲下三日一服婦人服之或下如雞肝或如米泔赤黑等物二
三升後忌風冷

○婦人腹中瘕血方論第十凡二方

夫婦人腹中瘕血者由月經不澁不通或產後餘穢未盡因而乘風取
涼為風冷所乘血得冷則成瘕血也血瘕在內則時上躄熱面黃瘕久
不消則變成積聚瘕瘕也

桃仁散

蠹虫 水蛭 烏賊骨 鯉魚鱗燒灰 芫花醋炒
枳殼 當歸炒 牛膝 赤芍藥 礪砂 桂心各半

桃仁 三分

右為細末食前溫酒調下一錢

桃仁丸

治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來心腹滿急

桃仁 大黃各三兩 蠹虫炒去翅足 水蛭各四十枚炒焦

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五丸熱酒吞下未知加至八九

補遺

桃仁氣湯

治婦人腹中瘀血小腹急大便黑讖語口乾漱水

遍身黃色小便自利方見活人書

危氏得効方雜錄亦佳

○婦人癥瘕方論第十一 凡三方

夫婦人癥瘕者由冷熱不調飲食不節積在腹內或腸胃之間與藏氣結搏其牢雖推之不移者名曰癥言其病形微可驗也氣壅塞為瘕言其氣痞澁不宣暢也皆得冷則發動刺痛癥瘕之病其形冷結若冷氣

入於手臟則使無子若冷氣入於胞絡搏於血血得冷則澁亦令月水不通也

川山甲散

治婦人癥瘕及惡血氣攻心腹疼痛面無顏色四肢瘦弱

川山甲灰炒燥 鼈甲醋炙 赤芍藥 大黃炒 乾漆炒令

桂心兩 川芎 芫花醋炙 當歸各半兩 麝香一分

右為細末入麝香令停每服一錢無時熱酒調下

蓬莪朮丸

治婦人癥瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

莪朮三分 當歸炒 桂心 赤芍藥 檳榔 枳殼

木香 昆布 琥珀各半兩 桃仁 鼈甲 大黃各一

右為末煉蜜丸如梧桐子大食前粥飲下二十九

丁香丸

治婦人癥瘕結塊不散心腹疼痛

雄雀糞炒 鼈甲各一兩 礪砂 當歸炒 芫花醋炒乾各半兩

巴豆一分 去皮心油

右為末同研令停醋煮麪糊丸如小豆大當歸酒下三元

補遺 局方**丁香丸** **積氣丸** 並治瘕瘕痞癖氣塊有驗

○婦人食瘕方論第十二 凡二方

夫婦人食瘕者由臟腑虛弱月候來時食生冷之物脾胃既虛不能消化與藏氣相搏結聚成塊日漸生長盤牢不移故謂之食瘕也

綱目 治婦人食瘕久不消令人瘦弱食少

硃砂 穿山甲 各三稜炒 乾漆炒令烟尽

硫黃 各半 巴豆 三十枚去皮心炒不出油

右為末用軟飯丸如小豆大每服五丸生薑橘皮湯下

家石丸 治婦人食瘕塊久不消攻刺心腹疼痛

青礬石 赤 巴豆 去皮心炒 朱砂 粉霜 並研 木香末 各一 硃砂 半兩

右研令停以糯米軟飯和丸如綠豆大每服二丸空心温酒下取下

惡物為度

補遺 **小三稜丸** 治食瘕酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及一切積滯不消心腹堅脹痰咳嘔噎酸脇肋刺痛并脾氣橫泄

三稜 莪朮 各四兩 芫花 一兩

右入甕器中用米醋五升浸滿封器口以灰火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦焙乾為末醋糊丸如菉豆大每服十五丸生薑湯下婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水桑白皮煎湯下

○婦人積年血瘕塊方論第十三 凡七分

夫婦人積年血瘕塊者由寒温失節臟腑氣虛風冷在內飲食不消血氣相結漸生顆塊盤牢不移動者是也皆因血氣勞傷月水往來經絡否澁惡血不除結聚所生也久而不差則心腹兩脇苦痛室於飲食肌膚羸瘦

綱目 治婦人積年血瘕塊或攻心腹疼痛四肢不和面少血色飲

食全少 乾漆炒令烟尽 大黃 各一 琥珀 硃砂 研

硝石研 莪朮各三分 紛花 延胡索 桂心各半兩
 膩粉一分 巴豆三七粒去皮心研去油用漿水二盞煎如湯

右為細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五丸於日未出時煎蘇木湯吞下量患人輕重加減服之

琥珀丸

治婦人積年血瘕塊不消狀若鬼胎之候宜此藥

琥珀研 桂心 牛膝 芫花製 檳榔 桃仁炒各三分
 生地黃 延胡索 當歸各半兩 鼈甲 三稜 乾漆炒
 硃砂各一兩 大黃二兩 蠹虫四十九枚去翅足 水蛭四十九枚炒

右為末醋煮硃砂為膏入藥末和搗二三百杵丸如梧桐子大每服十九空溫酒下

硃砂丸

治婦人積年瘕塊不消

硃砂研 乾漆 雄黃 水銀以少煎研 雄雀糞各一兩 巴豆封油
 右研停用棗肉丸如棗豆大空心當歸酒下三九臨卧再服取下惡

物為度

五積氣瘕

理五積氣瘕及驚悸血積瘕瘕血瘕發歇攻刺疼痛嘔逆噎

塞心中迷悶不醒人事及血鼓瘕瘕脹滿經脉不行者靈苑方

芫花去枝葉取二兩用酒好米醋三升煮至一升至去滓不用只將芫花醋入石器內入剉碎霜一及已豆肉七粒搗研入醋內煎成膏用 木香 沒藥 當歸 桂心 華撥各一兩
 檳榔一分 肉豆蔻二枚炮 班猫三枚去頭足用糯米炒令焦黃去米研細附子一分生

右二十二味除班猫沒藥餘為細末与班猫沒藥一處合研令停入

前膏子內和搗千百杵丸如赤豆大初服一九用醋炒羅白子令焦黑以酒浸同煎一二沸放溫吞下漸加至五九七九止如急卒血氣

攻心脾以酒醋共一銀盞煎沸吞下婦人血瘕瘕瘕結塊攻心疼痛悶絕久醫不効者入禹餘糧一兩火煨醋煨七次研細和藥為丸每

服五丸用蘇木煎二兩細剉酒三升煎至七合去滓分為二服吞藥併進三服當汗出則瘕隨大小腸逐下其病立差人弱者每服只三

婦人良方七卷
九如是丈夫九臟小腸氣脾積氣癥塊等疾即入丹砂一兩細研和
停以生姜鹽湯吞下三丸

五靈脂丸 治婦人積年癥塊及惡血氣久不除

五靈脂 乾漆炒用 川烏各一丸炒 麝香 硫黃
硃砂並研各半丸 巴豆三十枚去皮醋煮赤

右為末研停醋煮麪糊丸如綠豆大每服五丸空心溫酒下

三稜丸 治婦人血癥血瘕食積痰滯出黃音后集

三稜 義茂各二 青橘皮去白 半夏 麥牙炒各
右用好醋六升煮乾焙為末醋糊丸如梧桐子大每服三四十九淡

醋湯下痰積多姜湯下

水府丹 治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹中卒暴疼痛而有

野雞梨黑羸瘠百病方
經煨花藥石研 石砂研 桂心別為末 木香

乾姜各一 縮砂仁 紅豆半丸 班豬百个 臘月狗膽七枚

生地黄汁 童子小便各二 玃青三百个 玃青二物並去

右九味為末同三汁熬為膏和上末丸如雞頭大朱砂為衣每服一
丸溫酒嚼破食前服米飲亦可孕婦莫服

補遺危氏得効方 **三聖丸** 及前**山白** 最治婦人積年血癥

血癥塊氣痛至効

婦人血氣心痛方論第十四 凡五方

夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪氣乘於心也其痛發
有死者有不死者成疔者心為諸臟之主而主於神其正經不可傷上
之而痛者名為真心痛朝發夕死夕發旦死心之支別絡為風冷所乘
而痛者故痛發乍輕乍甚而成疔者也

烏藥散 治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥 義茂 桂心 當歸 桃仁 青皮

木香各等分 為末每服二升熱酒調下

阿魏丸 治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸炒 桂心 青皮 附子炮

白木 川芎各一 吳茱萸 木香

肉豆蔻 延胡索 莪朮各一 朱砂 細研半丸

右為末先以醋一升煎阿魏成膏和藥末搗二百杵丸如梧桐子大

每服二十九食前熱酒下

雞舌香散 治男子婦人九種心痛一切冷氣

良姜 細麻油炒 桂心 赤芍藥 等分

右為細末每服二升水一盞入鹽木瓜三片同煎七分溫服鹽湯點

亦可血氣凝痙痛用熱醋湯調下忌生冷

又一方名**應痛散** 治心脾痛不可忍者婦人脾血氣作心脾痛尤效

方同只无桂心用醋煎醋湯點亦可乙丑年春初少友年十五登時

此散治心脾痛以蘇合香丸沉香丸神保丸理中丸阿膠散等散皆能治之此証非出即欲作疾此局方九痛丸則不可遂合

真蒲黃 炒 治婦人血氣不和作痛不止及下血無時月水不調

真蒲黃 炒 蘇合香丸

右等分為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒吞下如

不能飲米飲下兩服即止

東 治婦人血風血氣等疾武具戎司機宜俟愷云見一

道人用此方療病不一而足遂以為歎真是奇妙

五靈脂 炒一丸 莪朮 桂心 臺子 炒各半兩

右為末每服二大升酒半盞水半盞煎至八分疾作熱服

心痛散 治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂為細末每服一錢酒一

盞煎沸熱服

盞煎沸熱服

五靈脂 炒一丸

補遺局方四七湯

加良姜又沉香降氣湯

分心氣飲

皆治心痛良

婦人血氣心腹疼痛方論第十五

凡二十方

夫婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘於其間與真氣相擊而痛其痛隨氣上下或上衝於心或下攻於腹故云血氣攻心腹疼痛也

延胡索散治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索 當歸 川芎 桂心各三分 木香 枳殼

赤芍藥 桃仁各半 熟地黄 一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分去滓熱服

琥珀散治婦人血氣攻心腹煩燥悶亂疼痛不止

琥珀 沒藥 當歸 赤芍藥 牡丹皮 延胡索

蒲黃 莪茂 桂心各半分

右為末每服一錢溫酒調下

艾葉散治一切血氣膈腹燥痛及產後惡露不行兒扶塊痛出至驗

血竭 沒藥並細研 桂心 當歸 蒲黃 紅花

木香 延胡索 乾漆炒 赤芍藥各等分

右為細末每服二錢熱酒調下食前服

○治血塊衝心叫噉其痛至危者如喫不得可灌下

右用真大順散三錢熱酒調服立止

婦人血氣散治婦人血氣燥痛月經不行預先嘔吐疼痛及月信不通

片子姜黃四兩 牡丹皮 莪茂 紅花 當歸

赤芍藥 川芎 桂心 延胡索各兩半

右為末每服二錢水一盞酒三分煎七分溫服日三次

八寶散治血氣心腹疼痛立驗

枳殼炙 人參各四 甘草 當歸 厚朴 茯苓各五 肉豆蔻二

右為末水二升煎取八合空心分三服

八寶散治婦人血氣心腹疼痛立驗出靈苑方

棕櫚二升 當歸一兩 並剉碎一處燒我炭細研麝香一升 細研

右同研令停每服一升 温酒調下

不換金散 治婦人血刺痛不可忍者 靈苑方

三稜 莪茂 並剉 巴豆 去皮各二兩

右三味以醞醋一椀 麩醋成膏為度 先將糠固濟一罐子 陰乾後將藥并醋膏一處置罐子中外用泥裹以平瓦子一片 蓋之用炭火五七斤 煨常看守 絕候煙急出即取出看通黑則止 不得燒過了便入乳鉢內細研為末 有患者炒生姜酒調一服

定命散 治婦人急血氣 靈苑方

大生烏頭 去皮尖 牡丹皮 桂心 各一兩

右為細末每服一升 酒半盞 童子小便半盞 煎至七分 温服如婦人血瘦血氣胎血積聚上衝心膈須臾欲絕者用酒一盞 生姜一片煎至七分 夫穿通口服

靈苑方 治婦人心膈迷悶腹藏指撮疼痛氣急氣悶月信不調

等疾 靈苑方 烏藥 莪茂 各二兩 當歸 一兩

右並生為細末 温酒調二錢 服後以食壓之 忌生冷油膩等物 如是產後諸疾 炒生姜酒調下

○ 治血氣不調 膈下痛

桑耳 菴藷子 桂心 土瓜根 川芎 各四分 甘草 二分 牛膝 赤茯苓 各五分 大黃 白芍藥 各六分 乾地黄 八分

右為末 煉蜜丸 如梧桐子大 醋湯吞下二十丸

觸痛散 治婦人血氣刺痛

荔枝核 燒存性 半兩 香附子 去毛 炒 一兩

右為細鹽湯米飲調下 二錢 不拘時候服

沒藥散 治婦人血氣疼痛不可忍 出傳濟方

紅花 沒藥 當歸 延胡索 炒

右等分為末每服二錢童子小便酒各半錢同煎至六分熱服只用
秤鍾滓過調亦可常服只用溫酒

牡丹散

治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛不思飲食衛生方

牡丹皮 桂心 當歸 延胡索 各一錢 義茂 牛膝

赤芍藥 各二兩 荆三稜 一兩半

右為粗末每服三錢水一錢酒半錢煎七分溫服

至聖湯

治婦人血氣產前產後百疾 出同前

當歸 芍藥 乾姜 義茂 桂心 地黄 蒲黃 炒各半兩

黑豆 炒去皮一兩 右為細末空心熱酒調下二錢

天仙散

治婦人腹脇刺痛以局方 **心氣湯** 加延胡索少許同煎服

若胸膈不快惡心更間服局方 **心氣湯** 兼治月水不調或前或後

芎藭丸

治婦人脾血積氣及心脾疼 另六德續添

芎藭 九節者六兩 吳茱萸 炮 香附子 炒去毛各四兩

石三味並剉細以醞醋五升煮乾為度焙乾為細末以好神麩打糊

為丸如梧桐子大空心食前以淡姜湯吞下四五十九日三服橘皮

湯下亦好

延胡索散

治婦人血氣走作疼痛不可忍者及月水不調面色痿黃

延胡索 生三稜 生 當歸 去芦酒浸 義木 醋浸少時各等分

契食減少及產後諸疾並皆治之

右為末每服二錢空心溫酒調如血氣發甚者及月水不調並皆童

子小便酒紅花同煎調下

當歸煎丸

治婦人久積血氣時發刺痛肌瘦乏力月候不調

當歸 別二兩 檳榔 赤芍藥 牡丹皮 延胡索 各一兩

右除當歸末用米醋熬成膏入衆藥末和丸如梧桐子大空心溫酒

下二十丸午食前再服

神聖地黃丸 治婦人積年血氣攻刺心腹疼痛不可忍者及多方醫
療未差宜此方 出靈苑方

木香

當歸 各一

羌活

北亭 去砂石研

義茂 各半兩

巴豆 去皮膜心

沒藥 各等分

右先研北亭沒藥巴豆如粉用好米醋三升同煮為稀膏然後將餘
四味為細末入於膏內搜合成塊用新瓦合盛之臨時加減丸數用
酒醋各半盞煎數沸通口服不得嚼破仍須喫盡酒醋立差或男子
无氣亦依前方服食如急候閉者男左女右以一丸鼻中嗅之立愈
。其中云臨時加減丸數皆不云大小數目詳之古人亦鹵莽也既
有北亭羌活巴豆合當歸如綠豆大每服只五丸

虎甲散

治產前產後血氣不和及一切疾

當歸 炒

川芎 炒

赤芍藥 二兩

義茂 一兩

右為末每服二錢空心温酒調下如腰腹痛加陳皮去白半兩乾薑
炮半兩為末同和停如不喫酒以水一盞煎至七分温服

艾胡索湯

治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心腹作痛也

連腰脇或引背脊上下攻刺經候不調但一塊血氣心腹疼痛並可服
之

片子姜黃

乳香

沒藥

木香 不見火

甘草 炙

赤芍藥 一官桂

手拈散

治血氣心腹疼痛

草菓

艾胡索

五靈脂

沒藥 各等分

為末每二錢温酒調下

局方七氣湯

治婦人血氣小腹痛方論第十六 凡四方

婦人血氣小腹痛方論第十六 凡四方
夫婦人小腹疼痛者此由胞絡之間風有風冷搏於血氣停結小腹周
風虛勞動與血相繫故痛也

養靈散

治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

歲靈仙

當歸

沒藥

木香

桂心各半

右為細末無時熱酒調下一錢服忌茶

當歸散

治婦人久積血氣疔刺小腹疼痛四肢無力不能飲食

當歸

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳殼

延胡索

右為細末熱酒調下一錢無時候

追氣散

治婦人血刺小腹疼痛不可忍

芸臺子

桂心

良姜

半斤

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服五丸無時淡醋湯下常服補血

虛破氣塊甚有效

石灰散

治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方

出經驗方

右取猪貼膏血半盞於湯上煖用杖子撿停後用石灰於火上燒令黃為末羅過入灰一錢同血攪停放溫服立愈

補遺

予嘗用紫金皮為細末醋糊丸如櫻桃大又治婦人血氣小腹疼

痛以溫酒送下一丸及有心腹痛者亦良

婦人兩脇脹痛方論第十七 凡六方

夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪正交爭衝擊故令兩脇脹痛也

豆蔻散

治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛方

草豆蔻

呵子肉

桂心

苦梗

厚朴各三

甘草一分

川芎

當歸

乾薑

檳榔

各半斤

右為粗末每服四錢水一盞煎七分去滓熱服食前

養胃子散

治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻兩脇脹痛坐卧不安

養胃子

延胡索

桃仁

桂心

琥珀

當歸各一

赤芍藥

木香

沒藥

各半斤

右為末每服二錢溫酒調下無時候

人參散

治婦人榮衛不和心腹刺痛胸膈脹滿不進飲食

紫金皮 蒼木 石菖蒲各一 香附子二人參半及 木香 三升

右為末米糊和丸如梧桐子大每服三十九丸食後姜湯下

氣痛丸 治久積風墜疎利氣滯空胸膈止刺痛

木香 青皮 夫白 大黃 炮 檳榔 各一兩 黑牽牛 二兩半生半

右為末煉蜜丸如梧桐子大溫水下三十九丸

日再痛再服神保丸六七粒大痛不通其痰轉甚亦有要兩沉香
木香姜桂芍藥而末敢投痛其則藥心驚皆皆藥之兩脇以有兩沉香
字神定心胸呼聲徹天召喚診之六脈沉伏下來去無問僕診脈
吉必何如答曰夫九痛之脈亦可準也但必証辨用藥勸其人質既
偉問其大痛數日不通曰實痛也其不必脹但少人按之痛甚手
不可向迹此大實地經云大痛大實有可下之用氣針九五六百粒
是返即愈。又曰未在金咬有家撰幹上之類病甚召僕診之六脈
眾醫投木香沉香實地大腹芍藥姜桂之類病甚召僕診之六脈
何治療僕曰大凡心腹刺痛不可便作虛冷治之有其實痛也衆問如
即何熱即生風冷生氣是也僕曰不然難經云虛則齊實則痛又仲
景只腹痛者註枝加芍藥湯痛甚者佳枝加大黃湯卒提幹云荆布
素來質弱僕曰有可辨屬遇痛時使一婢按之若痛止是虛寒証也
若按之轉甚手不可近也實痛出即令一婢按之手不可近也與
常僕曰此實也先可疑者當用大柴胡湯
治之衆皆不許僕責狀而投之八服愈

論脇肋疼痛服**木通散**亦可 治男子出明理方

心下脇肋少腹疼痛皆素有積寒而溫煖湯散亦可主治甚者以溫藥
下之心下與小腹痛諸書並有效方而脇肋下痛鮮獲治法此

木通散 治脇肋舌痛偏効併心下脇肋并少腹牽引痛者皆主之

木通去皮 青皮去白 川練子去皮核各一及已上三味用
薤蔔子炒 舶上茴香一及炒 義茂 木香 滑石各半

右為細末煎葱白酒調三升一服愈甚者不過再服

三胸散 治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大便秘澀善治脚氣

大腹皮 紫蘇 沉香 乾木瓜 獨活各一 白朮
川芎 木香 甘草 陳皮 檳榔各三分

右咬咀每服三升水一盞煎至七分去滓空心熱服日中服戊午秋

有一婦人中焦虛痞腹脹痛大便秘結六脈
虛弱更數服藥無效僕投此藥不終劑而愈

補遺局方**青木香丸** 治久積風墜小烏沉湯 四磨湯 皆可用

婦人腹脹方論第十八 凡三方

○婦人心腹脹滿者由臟腑久冷氣血虛損而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脉起於小指之下斜趣足心入跟中上股內后廉貫脊絡膀胱從脊上貫肝膈入肺中其支者從肺出絡於心臟虛邪氣客於三經與正氣相搏積聚在內氣併於脾上虛有脹故令心腹煩滿而脹也診其脉遲而滑者脹滿也

白朮散

治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲食四肢無力

白朮 草菓仁 呵子肉 各三分 赤茯苓 檳榔

桂心 各半 陳皮 厚朴 人參 各一分 甘草 一分

右為粗末每服四升姜三片棗一枚煎至七分去滓食前熱服

檳榔散

治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

檳榔 前胡 川芎 青皮 三分 赤芍藥 桂心

大黃 一 苦梗 木香 枳殼 各半 干一分

右以咀每服四升姜三片煎至七分去滓溫服無時

局方之氣飲亦妙方見

三脫散亦妙方見本卷

木香散治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

木香 桂心 白朮 乾姜 炮 陳皮 去白 草菓仁

訶梨勒 人參 各一分 神麴 炒黃三分 甘草 炙半

右為細末每服一升如茶點熱服

補遺治心腹脹滿予嘗獨用厚朴姜汁炒過每服五升姜七片煎溫服不拘時候間服沉香降氣湯得効見資生經

新刊婦人良方補遺 大全卷之七 畢