

大德重校聖濟總錄卷第一百二十四

咽喉門

咽喉中如有物妨悶

咽乾

咽喉諸疾

骨鯁

誤吞諸物



咽喉中如有物妨悶

論曰咽者胃之系故咽主嚥物天氣通於肺故喉主通氣咽喉中妨悶如有物者乃肺胃壅滯風熱客搏結於咽喉使然故聖惠謂憂愁思慮氣逆痰結皆生是疾

治咽喉中如有物妨悶桔梗湯方

桔梗兩 炒 貳

半夏湯洗 柴編 人參

甘草炙 到各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞入生薑五片

同煎至六分去滓溫服食後臨臥

治咽喉中如有物妨悶噎塞胸膈痰滯防風散方

防風去

人參

白朮

獨活去頭去蘆

草豆蔻去皮各分

天麻

芎藭

白芷

赤茯苓去黑皮各壹兩

細辛去苗葉

高良薑

青橘皮湯浸去白焙

甘草炙各兩

京三稜炮剉壹兩半

厚朴去麤皮生薑汁炙參錢

右一十五味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下棗湯

亦得日三不拘時

治咽喉噎滯如有物妨悶木香湯方

木香

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去麤皮生薑汁炙

半夏生薑汁浸壹宿湯洗參偏切焙

白朮

甘草炙各半

桂去皮麤

大腹皮各兩半

黃耆剉

人參

桔梗炒

治咽喉噎滯如有物妨悶木香湯方

右一十二味搗篩每服三錢匕水二盞入生薑一

棗大拍碎煎至六分去滓食後熱服日三小許一棗

治咽喉如有物噎塞人參湯方

人參

訶梨勒皮各壹兩

甘草炙

射干去皮麤

陳橘皮湯浸去白焙

桂去皮麤

烏梅去核各兩陳麴炒參不供羊日試衣

右八味搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時候

治咽喉如有物妨悶食即噎塞不下羚羊角湯方

羚羊角屑

赤茯苓去黑皮

半夏湯洗柴燻去滑炒

木通剉

射干各半兩

倉粟米炒貳合

桔梗炒壹分

蘆根剉壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎煎至八分去滓食後溫服日三盞入小薑一

治咽喉中如有物噎塞不下射干湯方

射干

升麻

紫苑去苗

百合各半兩

木通剉壹兩

桔梗炒

赤茯苓去黑皮各參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後溫服如要通利每服加朴消末一錢匕去滓後

入攪勻服之

治咽喉如有物噎塞黃芩射干湯方

黃芩去黑心

射干各壹兩

枳實去瓢麩炒

半夏湯洗柴燻去滑焙

甘草炙剉各參分

升麻壹兩

桂去麤皮壹兩壹分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

同煎至八分去滓溫服日三

治咽喉中如有物噎塞絡石湯方

絡石

紫苑去苗土各半兩

升麻

射干各半分

桔梗炒

木通剉

赤茯苓去黑皮各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服如要通利卽湯成加芒消末一錢匕攪勻服之

治咽喉如有物噎塞飲食妨悶半夏木通湯方去黃連

半夏

湯洗米泔去清焙

木通剉

乾薑炮各半兩

芍藥

桑根白皮炙各剉壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入鹽少許煎至六分去滓熱服一方搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸食後生薑湯下漸加至二十九丸黑丸治咽喉似有物噎胸中滿脇下氣上衝飲食減少黃者

甘草湯方

黃耆

甘草炙各壹兩半

桂去麤皮半兩

人參壹兩

芍藥

赤茯苓去黑皮各貳兩

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片大棗二枚去核同煎至八分去滓內飴餈少許煎化熱服良久以稀粥投之

治咽喉如有物妨塞氣噎飲食不下人參丸方

人參壹兩

桂皮去麤皮

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後生薑湯下漸加至三十九日再

治咽喉中如有物噉吐不利四味湯方

半夏生薑汁浸一宿湯洗切焙

厚朴去麤皮生薑汁炙

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

赤茯苓去黑皮

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎煎至六分去滓食後溫服

治咽喉中如有物厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙

赤茯苓去黑皮半夏湯洗米泔切

紫蘇葉焙壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至六分去滓食後服日三

治咽喉食即噎塞如有物不下杏人丸方

杏人湯浸去皮尖雙人

桂皮去麤皮

人參

枇杷葉拭去毛炙

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一九含化嚥津以差為度

治咽喉如有物噎塞飲食不下石蓮湯方

石蓮子炒取肉 人參 杵頭糠各壹分

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服食後日三

治咽喉中如有多癆食即噎塞杵糠丸方

確杵頭細糠貳合

右一味搗羅為末鍊蜜和丸如彈丸大空腹含化

丸微微嚥津

治肺胃壅滯咽喉中如有物妨悶杏仁煎方

杏仁湯浸去皮尖雙入炒黃 桑根白皮剉炒

貝母去心各壹兩半 生薑汁壹合 地黃汁貳合

酥兩 大棗陸拾枚去核 紫苑去苗參分

甘草炙 桔梗炒 五味子炒

赤茯苓去黑皮 地骨皮各壹兩 人參參

右一十四味先研杏仁以水五升濾取汁將草藥細

剉同煎至二升以綿濾去滓續下酥及地黃汁慢火

煎成膏每食後含一匙頭細細嚥津

治風熱搏於咽喉如有物妨悶桔梗湯方

桔梗炒 半夏湯洗去滑拾偏焙

右二味等分剉如麻豆每服五錢匕水二盞生薑七

片同煎至七分去滓溫服

治肺胃氣壅風熱客搏咽喉妨悶麥門冬湯方

麥門冬去心焙 半夏湯洗焙乾 人參

甘草炙各壹兩 倉粳米炒壹合

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入棗一枚擘

破煎至五分去滓溫服日三不計時候

治喉咽中如有物妨悶半夏湯方

半夏湯洗柒遍切焙壹兩 人參 甘草炙

栝樓根剉 桂去麤皮各參分 石膏壹兩壹分

小麥 吳茱萸湯洗焙乾各壹兩半

赤小豆壹分

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

三片大棗二枚擘破同煎至八分去滓溫服

咽乾

論曰脾肺不利上焦有熱則津液枯燥搏於咽喉故令

乾痛甚則生瘡

治上膈虛熱咽乾龍腦雞蘇丸方

龍腦研壹分 雞蘇 甘草炙

烏梅肉用 紫蘇葉各壹兩 麥門冬去心

白梅肉用 人參各半兩 天門冬去心焙

麝香 研

甜消 研各壹錢

右一十一味搗研為細末再同研勻鍊沙糖和丸如雞頭實大每服一九食後人參湯嚙下

治咽乾涕唾如膠或腎氣不足心中悒悒目視眈眈少氣耳聾消渴黃疸一身悉痒骨中疼痛小腸拘急甘草

湯方

甘草 炙半兩

磁石 煨醋淬參兩 玄參

防風 去叉各壹兩半

五味子 牡丹皮

桂 去麤皮各壹兩

附子 炮裂去皮臍半兩 黑豆 合半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

治咽乾口瘡牙癰心肺熱盛射干膏方

射干 去麤皮末 升麻 麻仁 杏仁 梔子 人參 射干

玄參

小豆卷 各壹兩半

黃蘗 去麤皮貳兩

赤蜜

地黃汁 各參

大棗 去核拾枚

右九味除蜜并地黃汁外細剉如麻豆以水五升煎

至一升半去滓下蜜與地黃汁慢火煎成膏細細含

化嚙津

治咽乾口燥上焦虛熱欬嗽氣促痰壅貝母湯方

貝母 去心炒

百合 各參

紫苑 去苗

貝母

百合

紫苑

桑根白皮

剉

桔梗

剉炒各

麥門冬

去心焙

大黃

炒剉

甘草

剉

麥門冬

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓分溫三服食後

治咽喉乾痛風氣不能食乾地黃丸方

生乾地黃

焙

人參

赤茯苓

去黑皮各參分

天門冬

去心焙

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸

米飲下日三

治咽喉乾痛心腹滿悶不能飲食厚朴湯方

厚朴

去薑皮生

赤茯苓

去黑皮各

陳橘皮

湯浸去白焙

人參

各壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍破煎至一盞去滓分溫三服

治膈熱咽乾風毒攻心狂悶如雪湯方

朴消

根

黑豆皮

青兩

木香

檀香

大黃

半兩

右四味除朴消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至一盞去滓下朴消一錢攪令勻不計時溫服以微

利為度

治咽喉乾痛吐噤不利桔梗湯方

桔梗剉

甘草生

惡實妙各

右三味麤搗篩每服二錢匕水一盞入竹筴一彈凡大煎至六分去滓溫服不計時候

治咽喉中乾肺熱欬嗽多痰貝母丸方

貝母去心壹兩半

甘草炙分

杏仁湯浸去皮尖炒壹兩半

右三味搗羅爲末鍊蜜丸如彈子大含化嚥津

治咽喉乾肺壅欬胸中滿而振寒脉數時時涕唾膿

涎如聖湯方

桔梗剉

甘草兩半

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

溫服日二不拘時

治上焦有熱津液燥少喉咽乾痛雞蘇人參湯方

雞蘇葉

惡實炒

玄參炙

甘草炙

防風去

人參炙

天門冬去心兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入梨二片同煎

至六分食後去滓溫呷

治咽熱乾燥津液不足龍腦散方

龍腦研壹

雞蘇去梗焙乾

荆芥穗壹兩

白豆蔻去皮 甘草炙

右五味搗羅爲細散每用半錢匕溫水調下合時且各自貼之臨用旋合和取半錢匕服氣味尤全

喉咽諸痰

論曰喉嚨者氣之所上下若府藏和平陰陽升降則呼吸去來無所滯礙一或不調病有寒熱之證熱則喉腫閉塞或連頰焮痛妨害飲食寒則語聲嘶啞或喉中哽哽如有物狀其候甚衆不可不察  
治咽喉腫痛語聲不出痰唾稠濁苦參丸方

苦參壹分 白礬燒枯 山梔子人

木通剉 杏仁湯浸去皮尖雙

甘菊花分 大黃生 防風去

射干分 玄參分 甘草炙

惡實炒 白藥各壹分 馬勃貳分

右二十一味搗羅爲末鍊蜜丸如酸棗大每服綿裹一丸夜後含化嚥津如喉不閉者去白礬

治咽喉不利肺藏風熱涕唾稠黏犀角湯方

犀角鎔 玄參三 枳殼去

人參壹分 木通剉 麥門冬去

射干壹分 馬兜零壹分 防風去

防已各參

升麻兩壹

桃人湯浸去皮

甘草炙

馬牙消別研各

右一十四味麤搗篩十三味每服三錢匕以水一盞

煎至五分去滓入牙消少許再煎沸臨臥食後溫服

日再

治咽喉腫塞天門冬煎丸方

天門冬去心焙

麥門冬去心焙各壹兩半

款冬花兩半

貝母去心炒

紫苑去蒂土各壹兩

赤茯苓去黑皮壹兩半

升麻兩壹

生地黄汁升壹

白蜜伍兩

酥壹人抄各半兩

右一十味將前七味細剉以水三升煎取一升絞去

滓內地黃汁再煎至一升內酥蜜於銀器中重湯上

煎成膏丸如彈丸大每服一丸含化嚥津

治咽喉痒欬嗽紫苑湯方

紫苑去土

貝母去心炒

桑根白皮剉

桔梗炒

菟胡去苗

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮

百部各參

杏人湯浸去皮尖雙入炒壹兩

甘草炙剉壹分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓食後溫服日三

治咽喉凝唾不出如膠塞喉茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 桂去蟲皮 人參

甘草炙 生乾地黄焙 芍藥

前胡去蘆頭 麥門冬去心 焙

石八味蠱瘡篩每服三錢匕水一盞入棗二枚擘破

同煎至七分去滓食後溫服日三

治喉中有血肺痿欬嗽氣喘宜服犀角湯方

犀角鎊半 桔梗炒 此胡去苗各分

竹筴兩半 天門冬去心 焙 黃芩去黑心

右六味蠱瘡篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

下朴消末一錢匕攪令勻溫服食後

治咽喉中痒嗽狀如傷寒調中人參丸方

人參 青木香 桂去麋皮

羌活去頭 大麻人 酸棗人去皮各分

右六味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸食後生薑湯下日二

治喉中熱塞及舌上腭生瘡大青煎方

大青 黃蘗去鹽皮 升麻

射干 薔薇根兩 苦竹葉細切

生地黃兩半 玄參壹兩 天門冬去心 焙

白蜜貳兩

右一十味除蜜外細剉用水三升煎取一升去滓下蜜再煎成膏每服半匙頭含化嚙津不計時

治咽喉痛多痰涼膈甘露丸方

蓬砂研半錢

丹砂研壹分

百藥煎推碎焙乾研壹兩

龍腦研壹字

甘草炙壹兩半為細末

右五味再研勻用糯米粥清和如梧桐子大非時含化一丸

治咽喉痛桃紅散方

龍腦研壹錢

丹砂研

寒水石煨研如粉各半兩

蓬砂研壹錢

馬牙消研半錢

右五味再同細研為末每用一字摻咽喉中嚙津

治咽喉唇腫口舌糜爛口甘面熱寫脾大青湯方

大青

升麻

大黃剉炒各貳兩

生乾地黄切焙參兩

右四味麤搗篩每服二錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服利即愈

治咽喉中如有物妨悶咯唾膿血肺氣上喘桔梗湯方

桔梗剉炒壹兩半

甘草炙剉半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分食

後去滓溫服

治喉痺口噤水漿不下風邪恍惚如有神鬼身體強直

面目變色菖蒲湯方

菖蒲

秦艽去苗土

桂去蟲皮

禹餘糧煨醋

人參

當歸切焙

甘草炙

附子炮裂去皮臍

黃芩去黑心

遠志去心

防風又去心

龍骨各半

赤石脂

芎藭

赤芍藥

赤茯苓去黑皮

防已各壹兩半

右一十七味剉如麻豆每服三錢匕以水一盞煎至

七分去滓空腹服日再

治喉痺腫塞不通赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

木通剉各壹兩

升麻

羚羊角燒

前胡去蘆頭各參分

馬蘭根剉

桑根白皮剉各壹兩

大黃剉炒

右八味麤擣篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去

滓入芒消一錢匕食後分溫二服晚再服

治喉痺腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒發動射干湯

方

射干

當歸切焙

升麻半

升麻半

總金一百二十四

白芷

兩

甘草

剉

犀角

鎊

杏人湯浸去皮尖雙

炒各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服日三

治喉痺若胃中虛飢狀少氣不足以息四逆泄注腹脹

喜噫食則欲嘔泄癖澹下口乾四肢重好怒不欲聞人

聲診其脉右手關上陰陽俱虛者脾胃虛也宜服禹餘

糧湯方

禹餘糧

大麻人

乾薑

黃連

白朮

棗

桑根白皮

白朮

白朮

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

溫服食後日三

治喉痺胸滿噎塞不通黃芩湯方

黃芩

升麻

射干

木通

甘草

犀角

右六味麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去

滓下芒消一錢匕細細溫呷

治喉痺氣隔胸滿咽腫生膿通氣湯方

犀角

射干

桔梗

德錄一百二十四

十七

馬蘭切名

甘草炙兩

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入竹葉七片煎至七分去滓下馬牙消一錢匕攪令勻細細溫啣

治纏喉風龍腦丸方

龍腦壹分

丹砂壹錢

芒消兩半

麝香半錢

右四味細研爲末用鯉魚膽汁和丸如菘豆大鼻兩孔各內一九夏久牙關開涎出差

治纏喉風玄參丸方

玄參

白蘆薹

白礬生用各壹分

甘草生用半分

右四味搗研爲細散用鯉魚膽汁和丸如赤小豆大每服十丸食後溫生薑湯下日三服

骨鯁

論曰用藥之法有不取於氣味特以意爲用者若魚網虎骨之治骨鯁是也然網能制魚乃魚之所畏虎能伏獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用之亦異矣

治物鯁寬喉靈砂散方

靈砂

丹砂

附子生去皮曬

鉛丹

雄黃各壹分

芎藭兩半

金薄片

巴豆

壹粒去皮心取肉擘為恰或  
段每擘以口吹之研去油盡

右八味同研如粉若懸錢及魚骨等在喉咽內每服一字先取芫麻子三枚去皮研以湯半盞攪漚取汁調藥服之便下

治一切骨鯁或竹木刺喉中不下鯁磨煎方

鯁魚膽

右一味臘月取掛於北簷下陰乾每有魚鯁即取一皂子許以酒一合煎化啞若得逆便吐骨隨涎出未吐更飲溫酒以吐為度又未出更煎一服無不出者此藥應是鯁在藏府中日久疼痛黃瘦甚者服之皆

出若卒無鯁魚蠶魚鮓魚鯽魚亦可惟臘月收者最佳

治骨鯁在喉中附子丸方

附子壹枚炮裂桂去皮去

細辛去苗

陳橘皮湯浸去白焙消石

青橘皮湯浸去白焙各壹分

右六味搗羅為末鍊蜜丸如小皂子大每含壹丸嚥津如兩茶久未應即用桂末煎湯助之其骨立出

治骨鯁在喉中不出磁石丸方

磁石煨研醋陳橘皮湯浸去白焙麝灰

惡實炒漿水脚多年者曬乾炒紫色各壹分

右五味搗研為散別用漿水脚和丸如芡實大每含

一丸噤津

治骨鯁在喉中不出礬灰散方

白礬灰

烏賊魚骨甲去

桂去皮

陳橘皮湯浸去白

漿水脚多年者曝乾炒紫色各壹分

右五味搗研同炒黑色候冷細研為散每服一錢匕

溫酒調下仍益酒令醉又以綿裹一錢匕含噤蓋覆

絛鼻嚏噴即出

治喉咽諸鯁輒骨散方

赤茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白

甘草炙

縮沙人各壹分

右四味搗羅為散每用二錢匕先搽口中次用新水

一盞燕下

治骨鯁在喉中不出馬勃丸方

馬勃

白礬灰

惡實炒

陳橘皮湯浸去白

右四味搗研為末漿水和丸如櫻桃大含化噤津又

一方無陳橘皮

治骨鯁在喉中不出象牙丸方

象牙屑

烏賊魚骨甲去

陳橘皮湯浸去白

右三味搗羅為末用寒食稠餈和丸如雞頭實大含

化嚙津

治骨鯁在喉中不出橘糖丸方

陳橘皮

湯浸去白  
焙半兩

烏賊魚骨去甲

沙糖

各壹分

右三味搗羅爲末鍊蜜和丸如皂子大綿裹含嚙

治諸骨鯁在喉不出栗皮丸方

栗子肉上皮

半兩爲末

乳香研

鮎魚肝

各壹分

右三味同研爲丸如梧桐子大看骨遠近綿裹一丸水潤外留綿線吞之卽斂出

治一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下玉錯散方

蓖麻

去殼  
青兩

凝水石

研細粉  
兩

右二味先研蓖麻爲膏旋入石末同研成散卽止每取一捻置舌根深處以冷水嚙之其鯁自然不見

治一切鯁蓖麻丸方

蓖麻人

紅麴

右二味等分研細用沙糖和丸如皂子大以綿裹含之痰出立効

治諸魚骨鯁在喉中

蜜

不拘  
多少

右一味煎化乘熱用綿一兩蘸熨鯁處又以瓠炙熱熨綿上未出再作仍取皂莢末少許吹鼻中卽出

治諸魚骨鯁在喉中笱須散方

笱須已捕魚者

右一味燒灰研細每服一錢匕粥飲調下

治諸魚骨鯁在喉中獺骨方

獺骨片

右一味含之嚥津立下一方燒灰水調服

治諸魚骨鯁在喉中魚鱗散方

鯉魚皮鱗不拘多少

右一味燒灰研細每服二錢匕新汲水調下未出更

服

治諸魚骨鯁在喉中飴糖丸方

飴糖不拘多少

右一味爲丸如雞子黃大吞之又漸作大丸再吞卽

効

治諸魚骨鯁在喉中魚網散方

捕魚網壹片

右一味燒灰研細每服一錢匕新水調下一方以魚網覆鯁人頭上卽下

治諸魚骨鯁在喉中魚骨引方

魚骨壹片

右一味潛令人將置鯁人被頭勿令覺之卽下

治諸魚骨鯁在喉中獺爪爬方

獺爪壹杖

右一物將於喉嚨外爬之卽下

治諸魚骨鯁在喉中鷓鴣散方

鷓鴣毛翅拾片

右一味燒灰研細每服一錢匕濃煎橘皮湯調下或

以綿裹含嚙卽下

治諸魚骨鯁在喉中薤白嚼方

薤白

右六味嚼令柔取蠶線繫之持線十端吞薤到鯁處

引之隨出

治諸魚鯁在喉中雞足散方

雞足貳杖

右一味研爲散每服一錢匕酒調下立出

治諸魚骨鯁在喉中艾蒿酒方

艾蒿壹握

右一味以水酒各一盞煎至八分去滓分溫二服

治諸魚骨鯁在喉中揉筋引方入水去毒去風二藥

鹿筋不拘多少

右一味漬之令軟索如彈丸持一端吞之至鯁處徐

徐引出大效

治諸魚骨鯁在喉中蕃薇散方

蕃薇根不拘多少

右一味搗爲散每服一錢匕水調下日三亦瘥折箭

刺入膜囊不出及鼠瘻等患服之十日皆瘥皮肉鼠

治諸魚骨鯁在喉中百合散方

百合伍兩

右一味搗羅爲散用蜜水調塗帛上匝項繫之甚者

不過三五上

治諸魚骨鯁在喉中魚尾引方

魚尾壹枚

右一味取置衣領中即差

治諸魚骨鯁在喉中立竹湯方

右取立死竹從地高二尺以上刮去皮細劈如算子

三七莖用水二盞煎七分去滓頓服

治鴛鴨及雞骨鯁在喉中桂香散方

桂去鹽皮 陳橘皮湯浸去白

右二味搗羅為散每用一錢匕綿裹含嚙十度其骨  
軟漸消

治食肉鯁鷹灰散方

鷹糞燒  
灰燒

右一味細研為散每服一錢匕水調下虎狼鵬糞皆  
可服之

治諸獸骨鯁虎骨散方

虎骨

右一味搗研細每服一錢匕水調下狸骨亦得

治食鯁咽不下雞關散方

白雄雞左右翅大毛各壹

右一味就銅器中燒作灰每服一錢匕米飲調下

治食中髮鯁不下遠喉血餘散方

管諸亂髮壹團  
燒灰壹

右三味研為細散每服一錢匕粥飲調下

治鐵棘竹木諸鯁在喉中不下及刺在肉中折不出半

夏散方半夏白芷

半夏湯洗  
白欬各貳

右二味搗羅為散每服半錢匕酒調下日三半夏乾

人喉以生薑汁解之

治諸般二白散方

小白芷 湯洗 白欬 各壹分

右二味搗羅為散每服一錢匕水調下

治諸般半夏白芷散方

半夏 湯洗 白芷 各半兩

右二味搗羅為散每服一錢匕水調下即嘔出

治諸般豬膏吞方

豬膏 水丁

右一味吞如杏核大未下再吞

治諸般燕窩方

右以好蜜一匙稍稍嚥下

治諸般并刺不出螻蛄散方

螻蛄頭 乾

右一物為散以綿裹嚥津勿令覷人知若刺不出者

以塗刺瘡上自出耳

治諸般在喉不出紅椹嚥方

椹子 將紅者不

右一味臨時細嚼先只嚥津後盡嚥津用新水吞下

如無新者只欲紅陰乾為未用之

治諸般方

右以木炭皮爲末研令極細如無炭皮但堅炭亦可  
粥飲調下二錢匕日四五服以鯁下爲度

治魚骨鯁方

象牙兩

右一味不以多少搗羅爲末沙糖丸如雞頭實大每

會化一丸嚥津

誤吞諸物

論曰誤吞諸物若金銀鐵鈎之類雖非病之自內然無  
術以出之久則害人若舊梳治髮磁石出針皆意爲之  
主不特取其性味治瘰之工可謂用心精微者矣

治咽物誤置喉中不出如聖散方

栝樓用事

杏人去皮尖雙入

甘草炙分

皂莢炙壹寸與甘

右四味先研栝樓杏人爛次以甘草皂莢末如爲餅

子鎔中煇令乾重搗爲細末每服一錢匕臘茶一錢

匕調下黃蠟少許水一盞同煎七分熱服亦得未効

再服

治誤吞金銀物或錢在腹內不下方

石炭光明者壹

硫黃壹皂

右二味同研爲末酒調下不拘時

治誤吞鈎繩在喉中不出方

若鈎繩在手者莫引之但益以珠璫薏苡子等就貫著繩稍稍推至鈎處小引之卽出也

治誤吞珠或銅錢鯁在喉中不下方

弩銅牙

右一味燒令通赤內酒中飲酒立下

治誤吞針及箭鏃等方

肥豬脂肪

不以多少

右一味煮令熟軟恣意飽食卽下

治誤吞針方

大

磁石

壹斤

右一味口含之卽出

治誤吞錢不出方

葵菜

不以多少

右一味絞取汁冷飲之卽出

大德重校聖濟總錄卷第一百二十四

大德重校聖濟總錄卷第一百二十五

瘰癧門

氣瘰

五瘰

瘰癧病咽喉噎塞

瘰

諸瘰統論

論曰憂恚勞氣鬱而不散若或嬰之此瘰所爲作也亦有因飲沙水隨氣入脉留連頸下而成又山居多瘰頸處險而瘰也其始作咽喉噎塞遊氣往來漸至停止其證則有垂核椎椎而無脉者亦有有核無根浮動皮中者治療方劑雖已條具然有可破可割可鍼之法則如血瘰息肉瘰氣瘰不可不辨又此疾婦人多有之緣憂恚有甚於男子也

氣瘰

論曰瘰之初結胸膈滿悶氣築咽喉噎塞不通頸項漸

癰囊結不解若此之類皆癰初結之證也

治氣癰初作白前湯方

白前

昆布洗去鹹

厚朴去鹽皮生

陳橘皮

湯浸去白切炒去附子炮裂去

海藻洗去鹹

半夏湯洗

杏仁湯浸去皮尖雙人炒

甘草各

小麥

醋浸炒宿暴乾參合

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑共

煮大拍碎煎至八分去滓食後溫服日三服

治氣癰初作海藻散方

海藻洗去鹹

龍膽

海蛤研

木通

昆布洗去鹹

礞石研

松蘿各半兩

小麥麩兩

半夏湯洗半兩

右九味搗羅爲散每服一錢匕溫酒調下日三不拘

治氣癰初結昆布散方

昆布

洗去鹹

海藻洗去鹹松蘿兩

海蛤

木通

白欬

桂去鹽皮

木香

右七味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下日三不拘

治瘰氣二膈散方

豬羊膈各曾治對煖水洗去脂膜切碎

海藻洗去鹹炙乾

海帶各壹兩

丁香

木香

琥珀

麝香研各壹兩

真珠半分研

右九味搗羅為散每服一錢匕熱酒一盞調下垂頭

臥少時

治咽喉不利項頸漸癭將成瘰瘤羊膈丸方

羊膈貳柒枚黃切

人參壹兩

昆布洗去鹹炙

木通劉

海藻洗去鹹炙

海蛤研各壹兩

杏仁湯浸去皮皮惡實

雙人炒惡實貳兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸至二十九米飲下日再

治咽喉氣悶胸膈滿塞項頸漸癭通氣丸方

木通劉

海藻洗去鹹炙

海蛤研各壹兩

昆布先去鹹炙乾參兩

羊膈貳柒枚炙黃切

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸含

化

治咽喉噎塞冷氣上築妨悶漸成瘰氣昆布丸方

昆布洗去鹹炙乾

杏人去皮尖雙犀角鑿

吳茱萸湯洗焙乾炒海藻洗去鹹炙人參貳兩

乾薑炮

葶藶子

紙土炒  
各壹兩

右八味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸米飲下日三

治咽喉中噎悶成癭海藻丸方

海藻洗去鹹  
炙乾

檳榔剉

昆布洗去鹹  
炙乾

訶梨勒皮

文蛤研各  
參兩

海蛤研

半夏湯洗  
米泔

生薑切焙各  
貳兩

小麥米醋浸三宿  
暴乾參合

右九味搗研爲末鍊蜜和丸如彈子大每服一九含

化日三

治咽喉氣噎塞成氣癭紫蘇膏方

紫蘇子炒

桂去麩

大黃剉  
炒

當歸切  
焙

乾薑炮各  
半兩

陳橘皮湯浸去白  
焙壹兩

蜀椒去目并閉口  
炒出汗壹分

豬脂臘月者煎  
去滓半斤

右八味咬咀七味如麻豆大先以水六升煎至二升

綿濾去滓內豬脂再煎成膏取塗癭上日二夜一以

差爲度

治咽喉噎塞冷氣妨悶結成癭氣海藻酒方

海藻洗去鹹  
貳兩

右一味細剉以清酒四升浸兩宿漉去滓每取半盞

細細含嚙日三不拘時以差爲度

治瘰氣初結喉中壅悶漸腫大琥珀丸方

琥珀研 大黃剉炒各壹兩 昆布洗去鹹燂半兩

右三味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空  
心及晚食後以溫酒下二十九

治瘰氣胸膈壅塞咽喉漸癰宜服大効羚羊角丸方

羚羊角屑壹兩 昆布壹兩洗去鹹味 桂心壹兩

川大黃壹兩剉碎微炒 木通壹兩剉

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計  
時候以粥飲下二十九

又方

羊靨壹兩剉去脂炙 大棗貳拾枚去皮核

右二味同杵作丸桐子大每服水下七丸

瘰癧咽喉噎塞

論曰瘰癧咽喉噎塞者由憂恚之氣在於胸膈不能消  
散搏於肺脾故也咽喉者胃氣之道路喉嚨者肺氣之  
往來合二經為邪氣所乘致經絡否澀氣不宣通結聚  
成瘰在於咽下壹鬱滯留則為之出納者噎塞而不通  
病瘰者以是為急也

治瘰氣咽喉腫塞桂心散方

桂去毒 昆布洗去鹹燂 海藻洗去鹹燂

甘草

白麩微炒各

龍膽

海蛤

土瓜根

半夏為末生薑汁和作餅暴乾

吳茱萸

湯洗去牡蠣燒各壹兩半

右一十一味搗羅為散每服二錢匕酸漿水調下食

後臨臥

治瘰癧咽喉噎塞連翹散方

連翹微炒木通剉乾薑炮

半夏

為末生薑汁和作餅暴乾各壹兩

羊膈炙

昆布

洗去鹹杏仁炒拾柒枚

車前子微炒

大猪

炙

右八味搗羅為散每服二錢匕米飲調下日二服食

後臨臥

治年深瘰癧氣噎塞訶梨勒丸方

訶梨勒煨去檳榔剉海藻洗去鹹焙

根殼去

白茯苓去黑皮

乾薑炮

熊膽

桂去

昆布洗去鹹

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如酸棗大每服一九含

化不拘時

治瘰癧氣腫塞蛤蚧丸方

蛤蚧全

琥珀研

真珠末

小

小

小

小

小

小

海藻

洗去鹹焙各壹分

肉豆蔻

去殼壹枚

大黃

剉碎壹分

昆布

洗去鹹焙半兩

右七味搗羅為末棗肉為丸如梧桐子大每服二十

丸水通湯下

治瘰癧悶麥門冬丸方

麥門冬

去心焙

昆布

洗去鹹焙各參分

黃耆

焙

大黃

剉蒸

陳橘皮

湯浸去白焙

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒

甘草

炙到各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一九合

化

治瘰氣咽喉腫塞瘰氣壅悶不通通氣丸方

木通

剉

射干

洗去

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒

惡實

微炒

昆布

洗去鹹焙

訶梨勒

根去核

海藻

洗去鹹焙

黃耆

剉各壹兩

白茯苓

去黑賊

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一九合

化日晚再服

治瘰氣咽喉腫塞茯苓湯方

白茯苓

去黑賊

人參

各壹兩

海藻

洗去鹹焙

海蛤

洗去鹹

半夏

為末生薑汁和作餅

甘草

剉

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一九合

右七味癰瘡每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

半夏

治瘰癧咽喉腫塞海藻散方

海藻洗去鹹

龍膽洗去

昆布洗去鹹

土瓜根

半夏 為末生薑汁和作餅暴乾

小麥麩

微炒各半兩 散酒調下日三服

右六味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下日三服

治瘰癧咽喉腫塞檳榔丸方

檳榔

海藻洗去鹹

昆布洗去鹹

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一九含

化毒

五瘰

論曰石瘰泥瘰勞瘰憂瘰氣瘰是為五瘰石與泥則因

山水飲食而得之憂勞氣則本於七情情之所感氣則

隨之或土而不下或結而不散是也

治五瘰海藻湯方

海藻

洗去鹹汁 小麥麩

特生礬石

右三味以經年陳醋一升拌小麥麩焙乾再蘸醋焙

以醋盡為度入二藥搗篩每服二錢匕水一盞煎

至七分去滓溫服日再不拘時候

治五癭海藻散方

海藻洗去鹹焙

海蛤各參

昆布洗去鹹

半夏湯洗柴

細辛去苗葉

土瓜根

松蘿各壹兩

木通剉

白欬

龍膽各貳兩

右一十味搗羅為細散每服一錢匕酒調服日再不

得作勞用力

治五癭昆布散方

昆布洗去鹹

木通剉

白欬

海蛤研

松蘿各貳兩

桂去麤皮

海藻洗去鹹焙

右七味搗羅為細散每服溫酒調下二錢匕日二服

不拘時候

治諸癭瘤海藻丸方

海藻洗去鹹焙

乾薑炮裂各貳兩

昆布洗去鹹焙

桂心

逆流水柳髮各壹兩

羊廌柴乾

右六味搗羅為細末鍊蜜和丸如小彈子大每含一丸咽津不拘時候但服藥時須忌五辛濕麪熱物之

類

又方

菖蒲兩

海蛤

白欬

續斷

海藻

松蘿

桂心

蜀椒

倒掛草各壹兩

齊州半夏

壹兩湯浸柒次焙乾取末

神麴兩

羊驚

壹佰枚焙乾

右十二味搗羅為細末以羊牛髓和為丸如梧桐子

大每服三十丸酒下不拘時候

治氣瘰方

羊驚

右一味去脂生合汁盡去日十枚七日差

五癭丸方

鹿脂

不拘多少

右一味以酒浸炙乾再內酒中更浸炙令香合嚙汁

盡更易盡十枚愈

治五癭昆布方

昆布

洗去鹹焙乾兩

右一味切如指面大醋漬合嚙汁盡為度

治癭瘤海藻散方

海藻

洗去鹹焙壹兩壹分

昆布

洗去鹹焙壹兩半

海蛤研

木通 剉

桂 去皮

白茯苓 去黑皮 半兩

羊廔 拾枚 去脂

右七味搗研爲散 非時溫酒下三錢 七夜再一服

治癭瘤海蛤散方

海蛤 研

人參

海藻 馬尾者 湯洗去鹹 焙

白茯苓 去黑皮

半夏 水煮壹兩 沸去滑切 焙各半兩

右五味搗羅爲散 每服一錢匕 入豬廔子末一錢匕

甜藤一尺 去根五寸 取之甘草一寸 水五蒸 同煎取

一盞 半分三次 每次調散二錢匕 臨臥服 女人四服

婦人八服 永除 次用丸藥宜下 淋 小 日 甚

治積年癭瘤 骨瘤 石瘤 肉瘤 膿瘤 血瘤 大如杯 孟或漏潰 骨消肉盡 或堅或軟 驚惕不安 身體羸縮者 陷脉散方

烏賊魚骨 去甲

琥珀

石硫黃 各壹分

白石脂

紫石英

鍾乳 各半兩

丹參 參

大黃

乾薑

附子 各壹兩

右一十味 搗羅爲散 貯以韋囊 勿令泄氣 若瘡濕日

三四 傅無汁 以豬膏和 傅之以乾爲度 若汁不盡者

至五劑 著藥不令人疼痛 若不消 加芫消二兩

治氣結喉中蓄聚不散成癭茯苓丸方

白茯苓去黑皮半夏湯洗生薑切焙各

昆布洗去鹹焙海藻洗去鹹焙桂皮去蟲

陳橘皮去白焙

右七味搗羅為末鍊蜜丸如杏人大常含化一粒細

細嚥津令藥氣不絕

治氣結頸項蓄聚不散成癭杏仁丸方

杏仁去皮尖雙仁連翹各壹兩半

海藻洗去鹹焙昆布洗去鹹焙木香各貳兩

蔓荊實採去皮羊靨各壹兩訶梨勒煨去核

右十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

丸空心米飲下仍常含化一丸

論曰瘡之為義留滯而不去也氣血流行不失其常則

形體和平無或餘贅及鬱結壅塞則乘虛投隙瘡所以

生初為小核寔以長大若益孟然不痒不痛亦不結強

方劑所治與治癭法同但癭有可鍼割而瘡慎不可破

爾

治瘰癧闊昆布黃耆湯方

爾

治瘰癧闊昆布黃耆湯方

黃耆劉市黃耆昆布洗去鹹炙麥門冬去心焙

大黃剉炒各壹兩陳橘皮湯浸去白焙甘草炙

杏仁去皮尖雙人炒各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

紙溫服不拘時新舊及癰瘡瘰癧乘虛對酒飲以

治氣瘕龍膽丸方新補不吐吐津血脈行不式其常服

龍膽去蘆頭炙壹兩昆布洗去鹹炙海藻洗去鹹炙各貳兩

馬刀研海蛤研一香草各半兩

大黃剉炒末鍊蜜丸如梧桐子大用破日除日

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大用破日除日

綿裹一九朝暮含嚥之

治氣瘕白頭翁丸方

白頭翁洗去鹹炙玄參連翹微炒

海藻洗去鹹炙桂皮去蘆白欬合人不寒

木通剉各壹分昆布洗去鹹炙各壹分

右八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸

食後米飲下日三加至三十九酒服亦得

治骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤大如盃孟升斗者二三十

年不差致有膿潰令人骨消肉盡或堅或軟或潰令人

驚惕寐寤不安體中掣縮陷腫散方

烏賊魚骨甲去

硫黃研各壹分

白石英研

紫石英研

鍾乳研各半兩

乾薑炮

琥珀研

大黃剉

附子炮裂去皮臍

胡燕屎各壹兩

丹參參

右一十一味搗研為散貯以韋囊勿令氣泄若瘡濕即傳之若瘡乾無汁者以豬膏和傅日三四易之以乾為度若汁不盡者至五劑十劑止著藥令人不疼痛若不消加芒消二兩

治氣瘡或癭連翹丸方

連翹微炒

醋石榴皮焙

乾薑炮各壹分

枳殼麩炒去

右四味搗羅為末更入百草霜一兩麝香少許各細

研醋麵糊為丸如小豆大每日空心用胡椒米飲湯

下三十九至五十九

治氣瘡癭豬廐散方

豬廐貳枚

半夏湯洗去滑 人參壹兩

右三味搗羅為散每服溫酒調一錢匕臨臥垂頭喫

治瘡蔓荆實丸方

蔓荆實去白皮

甘草炙剉壹兩

羊鬚貳拾枚去脂

白欬中

椒目分壹兩

小麥麩微炒

右六味將五味搗羅爲末與羊脂末相和以好醬更搗丸如梧桐子大每服酒下五丸稍稍加之

治頭面及皮膚生瘡大者如拳小者如粟或輾或鞭不疼不痛不可輒用鍼灸天南星膏方

生天南星

壹枚洗切如無生者以乾者爲末

右一味滴醋研細如膏先將小鍼刺病處令氣透將

膏攤紙上如瘡大小貼之覺痒卽易日三五上

治毒氣項下結核或爲瘡者消毒散方

皂莢子

伍佰枚慢火炒裂

薄荷

乾者精合

檳榔

剉半兩

甘草

炙

連翹

各壹兩

右五味搗羅爲散每服二錢匕食後臨臥米飲調下

臘茶調亦得

治大人小兒項下結核漸成瘡病蓖麻子方

蓖麻子

炒黃風中吹乾

右一味每服溫湯下一枚不拘時候日服三五枚服

之五日後搗玄參爲散食後溫米飲調下一錢匕與

蓖麻相間服三日後依前只服蓖麻五日後却與玄

參同服三日周而後始

治頸下卒結核漸大欲成瘡癭海藻酒方

海藻

洗去鹹壹斤

右一味用酒二升漬一宿取酒一二合飲之酒盡將  
海藻暴乾搗末酒調一錢匕日三

治瘡癭柳根酒方

柳根參斤須水所  
經露出者到

右一味用水一斗煮取五升用米三升釀之酒成每  
服飲半升空心日午夜臥各一服

治諸瘡血出黃芩散貼方

黃芩去黑  
心 黃蘗去鹽  
皮到

黃連去  
須

鬱金各半  
兩

右四味搗羅爲散入寒食麵五錢匕水調貼之

治一切腫赤皮膚毒氣及瘡子三色丸方  
心合藥不

天南星 半夏

甘遂去  
心

大戟各參  
錢 乾薑去  
皮 胡椒

桂 車撥各貳  
錢 代赭石壹  
兩

大黃生  
用

右一十味取前四味以漿水一升煮水盡爲度曬乾  
餘六味同搗爲末每用一錢用巴豆三枚燒得焰起

蓋合却候冷與一錢藥一處研更用醋一盞煎成膏

共藥末同丸如菉豆大分兩處一用丹砂爲衣二用

膩粉爲白衣此兩等顏色白者或捏作  
餅子亦可 用治瘡子每

服一九嚙生薑酒下早晚各一九如小腸氣二九切  
生薑三錢炒焦酒下如傷酒二九飛白礬生薑自然

汁調下婦人心氣痛醋湯下二九

治項氣瘤結附贅日漸增長神効散方

豬羊廝

各參拾枚旋入鹽膽內陳橘皮炒壹兩  
燕過合乾只用鹽亦得

右三味搗羅爲散每服二錢匕空心米飲調下初結

不過數服覺消不用久服

治癭瘤服海蛤散後宜除毒丸方

巴豆

鐵串穿燈上  
燒了去心

大黃末

各半兩

右二味研端午日粽子丸如菘豆大空心冷茶下三

丸良久熱茶投之下多以冷粥止之

繫瘤法

右取稻上花蜘蛛十餘枚置桃李枝上候絲垂下取

東邊者捩爲線子繫定瘤子七日候換瘤子自落昔

有人病瘤如拳大以此法繫之至三換瘤子遂乾一

夜忽失所在天明於枕邊得之如一乾栗

治項氣成瘤紫蘇子膏方

紫蘇子炒半兩

豬膏臘月者壹斤

桂去蘊皮

大黃剉炒

當歸切焙

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白焙

蜀椒去目及閉口炒出升各半兩

石八味搗羅爲末都用水六升煮取二升去滓內豬膏煎盡水每傳之取膏盡差

大德重校聖濟總錄卷第一百二十五

大德重校聖濟總錄卷第一百二十六

瘰癧門

瘰癧結核

風毒氣毒熱毒瘰癧

瘰癧寒熱

瘰癧有膿

瘰癧久不差

入下送

癩癧

癩癧百韻

癩癧

風毒瘰癧癧毒癧癧

大醫心方卷一百二十六

癩癧統論

論曰癩癧者其本多因恚怒氣逆憂思恐懼或飲食有蟲鼠餘毒或風熱邪氣客於肌肉隨虛處停結或在頸項或在胸腋累累相連是也詳攷方論有風毒氣毒熱毒之異有寒熱結核膿潰之殊然癩癧又謂之鼠瘦者蓋甲乙經云寒熱癩癧皆鼠瘦寒熱之氣所生是也癩癧又通謂之九瘦者蓋孫思邈云九瘦之爲病皆寒熱癩癧在於頸腋是也其治法大要古人皆曰浮於脉中未著肌肉而外爲膿血者急刺去之已潰者治如癰法內服五香連翹湯以蕩滌之外以火鍼攻結核中及飲

食動作悉能忌慎則鮮不差者

瘰癧結核

論曰瘰癧結核者由風熱毒氣蘊積肝經攻注筋脉毒氣鬱而不散故項腋之間瘰癧結聚成核或如梅毒核狀累累相連其證令人乍寒乍熱頭項強痛心神煩躁蓋毒氣與血氣相搏則榮衛不和使之然也

治男女長幼瘰癧結核在項腋下項強背痛連翹湯方

連翹

玄參

木香

昆布

洗去鹹焙

枳殼

麩炒

犀角

鑊各壹兩半

此胡

去苗

甘草

炙

木通

剉

芍藥

黃芩

去黑心

沉香

剉

當歸

切焙

升麻

兩各壹

右一十四味蠶絲篩每服五錢匕水二盞入生薑一棗大拍碎柳枝二寸長一握細剉煎至一盞去滓溫服空心日午夜臥各一服

治瘰癧腫毒結成惡核三黃丸方

大黃

炒

當歸

切焙各壹兩

梔子

人壹分

此胡

去苗

黃連

須

黃芩

去黑心

赤茯苓

去黑皮

桂

去麩皮

乾薑

炮

芍藥

各半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服十九空

心溫酒下日三取微利更以意增減

治初患瘰癧項邊磊磊如石皮肉寒熱赤腫烏犀湯方

犀角 錢

惡實 炒各 參兩

沉香 分 參

麝香 研半 錢

丁香 兩半

玄參 分 參

大黃 炒 兩

木通 剉

射干

連翹 各壹 兩

右一十味搗羅每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓空心溫服至晚再服利下為度

治惡核犀角丸方

犀角 錢

木香 分 壹

硝砂 研水飛 壹錢

硫磺 白茯苓 去黑皮皂莢酥炙 各兩

乾白薄荷

大黃 剉炒各 壹兩

原蠶 蛾

何首烏

右一十味搗羅為細末用生羊肉精者細切研成膏

和凡如黍米大每服七丸茶清下不拘時

治瘰癧毒腫沉香湯方

沉香 剉 壹兩 丁香 壹兩 木香 壹兩

麝香 研各 壹兩 連翹 各 壹兩 黃芩 去黑心 各半兩

水犀角 剉 兩半 升麻 壹兩 木 一盞半煎至八合去

犀角 剉 兩半 升麻 壹兩 木 一盞半煎至八合去

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服空心日午夜臥各一眼

黃芩各半兩  
去黑心

治惡核腫痛連翹散方

木香

連翹

何首烏

朱泚浸  
壹宿焙乾白薄荷各壹兩

麝香

研半錢

升麻

惡實

赤白茯苓

去黑皮酒浸兩

蛇蛻皮各兩

右八味搗羅為細散每服一錢匕食前溫酒調下日

三六黃

東

何首烏

治氣癰結核未破者四香飲方

薄白

丁香

木香

沉香

乳香

青橘皮湯浸去白

陳橘皮

湯浸去白

枳實

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎三四沸去滓

食後溫服日三

治瀉癰肝中有根桑白皮湯方

白桑白皮湯浸去白

桑根白皮

剉

消石

紫葛

芍藥

各分

犀角

角

虎杖

右六味將前五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓入消石半錢匕打勻空心晚後溫服利

根本似筋膜蝦蟇衣之類

治丈夫婦人瘰癧結實在項上腋下磊磊如彈丸相連  
犀角散方

犀角鱗

人參

鹿角鱗 一盞半煎

赤茯苓

男用白女用赤各去黑皮

白欬各壹

斑蝥

參拾枚糯米炒熟去米

糯米壹合

右七味搗羅為細散合研令勻看大小斟酌與服每服二十以上二錢七十歲一錢七並以蜜二匙水二盞同煎至一盞先調滑石末二錢七後調此散子夜臥時服至明小便內取下惡物三五日一服取差為度

治項上瘰癧如棗李核者先服紫威散方

紫威

凌雪花是也

海藻洗去鹹性

瞿麥穗 於人頭食

牡蠣

煨研成粉左顧者與甘草

壹兩

右五味搗羅為細散每服一錢半匕食後白湯調下  
日二

治瘰癧腫痛成瘡神妙散方

牽牛子

炒半生半熟

青橘皮湯浸去白

梔子人

地骨皮

玄參

右五味等分搗羅為細散每服二錢匕空心糯米飲調下次日服後生犀丸

消毒化結聚生犀丸方

犀角錢半

龍腦

麝香研各半

紅娘子貳拾枚

斑貓貳拾壹枚去頭翅足同紅娘子着豆麪炒焦

右五味搗羅爲細末用豆麪糊丸如菉豆大每服一

九空心日午夜臥臘茶放溫下服至十日加至二九

治風熱毒氣項下結核及欲作癰疽瘡癤發背等癰水

散方

菉豆粉

乳香研各壹兩

右二味合研爲散實人分作四服虛人分作八服食

後米飲調下就有核處一邊臥盡劑必差大消腫痛

治瘰癧腫痛不問大人小兒皆能療之不二散方

牡蠣煨赤

蝟皮背枚生剉焙乾

右二味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下

治瘰癧一切結核大效丸方

斑貓壹枚

黑豆柒粒生芽者

右二味同研爲丸如菉豆大每服五九茶清下小兒

一九

治瘰癧滿項不破及結核腫痛者皂子丸方

不艸皂子參佰粒

右一味用酒一升半化礪砂一兩同浸七日以慢火

熬酒盪爲度每服三粒臨臥含化半月必差  
治瘰癧腫結內消方

海藻壹斤

右一味用酒五升浸數日食後少少飲酒

又方

蝸牛殼不拘多少

右一味搗爲細散每服二錢匕空心米飲調下日再  
至四十九日自消

又方

檲白皮切貳合

右一味以水四盞煎至一盞去滓頓服當吐惡物

治惡肉惡核瘰癧初腫丹參膏方

丹參炙

白及各兩

升麻

蒴藿根各壹兩

獨活去蘆

防已

連翹

白欬

玄參

杏人去皮尖雙

各壹兩

右一十味細切以生地黃汁一升淹浸一宿入鑊內

微煎十沸入豬膏四升微煎二炊飯久膏成去滓用

摩病處日二三度

治瘰癧息肉結韃白欬膏方

白欬

莽草

玄參

木香

芍藥

大黃

生用各兩

右六味搗羅爲末旋取以醋和如膏塗帛上貼之乾極卽易

治風熱結靛腫赤疼痛及腮頰下忽結成核消毒塗方

大黃

兩貳 景天 伍兩 護火 草是也

右一味同搗爛塗於患處卽再傳

治癰癧結聚不散靛如石大蒜膏方

大蒜

參枚 搗爛 麝香 研半 錢匕

右二味和勻傅於帛上貼之一日三易旋搗最好

治癰癧發腫及結惡核皆不可鍼及癰未潰方

莽草

右一味搗末和雞子白塗貼之一日二易

治癰癧已成漏瘡歲久不愈千治千愈紫紅散方

信砒

錢壹 礬石 錢貳

鉛丹 錢參

右三味用瓷罐子先入砒次入礬次入鉛丹勻蓋之

鹽泥固濟炭火煨烟盡至紫色取出以紙襯於地上

一時辰出火毒研細先以溫水淨洗瘡挹乾取藥少

許以生蜜調塗日夜五六次塗至五七日瘡漸斂紫

黑色卽用桃紅散傳之

桃紅散方

血竭須真好者如無以深  
色烟脂代之

右一味爲細末以自津唾調日夜頻塗候瘡成靨卽

用浴毒湯洗之

浴毒湯方

黃蘗

去鹽皮

黃連

去須

甘草

剉

黃芩

去黑心各壹兩

拍枝

壹把截如  
筍子長

大豆

合壹  
升

右六味麤搗篩每用三四匙以水二升煎至一升乘

熱淋洗日三四次候洗下靨子卽用平肌散傅之

平肌散方

黃狗頭骨

燒灰

鮫鱗甲

燒灰各  
壹錢

亂髮

壹團指  
大燒灰

右三味研勻如瘡口已乾用自津唾調濕傅之日三

四次瘡卽平愈

治瘰癧在項上結成顆塊及觸處但有結凝似作瘰癧

急灸法

獨頭蒜

壹  
顆

右一味截兩頭去心作艾炷大與蒜稱貼瘰癧子灸之

勿令破肉但取氣而已覺熱勿畏每七壯易蒜可至

七易取消

治瘰癧白蠶散方

白殭蠶壹

麒麟竭

沒藥各半

右三味搗研為散每服一錢半匕麝香溫酒調下

治瘰癧已破未破蝸牛丸方

蝸牛半

雞蘇半

右二味同研極細水浸宿蒸餅丸如梧桐子大每服

十五丸瘡未破漿水下已破薄荷湯下日三

治瘰癧瘡口膿血不止罐灰散方

糞堆裏破瓦罐耳

右一物淨洗於竈心掘坑安在坑中燒三日令捨得

碎細研乾搽瘡上

治瘰癧蛇犀散方

白花蛇肉酒浸焙

犀角鎊壹

青橘皮半兩白焙壹兩半牽牛子壹兩半內壹兩雙蓮壹兩內

石四味搗羅為散每服二錢匕別入膩粉二錢匕糯

米飲調下五更初服至午前取下惡物如取未盡經

半月後再服沫成瘡者內消成瘡者瘡自乾合

治五種瘰癧牡蠣散方

牡蠣煨

連翹瓦上炒搗

右二味為細散每服一錢匕臨臥無灰酒調下差後

更服一兩永不發

治瘰癧結核犀角丸方

犀角

屑

吳藍

黃芩

去黑心

山梔子

巴豆

去心皮炒研出油各半兩

升麻

黃耆

剉

防風

又去

甘草

炙剉各參分

大黃

生剉壹兩半

連珠草

壹合

右一十一味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三丸米飲下未利加至六七丸取利爲度

治瘰癧初結累累如梅李核日漸不消則破壞頸腋內

消丸方

人參

玄參

丹參

苦參

何首烏

各壹兩並細剉

黃芩去黑心骨炙一兩

右五味搗羅爲末別用皂莢一十挺以麻繩接續穿

留索子頭盛在餅內掘地埋餅子留口用童子小便

浸三七日如值雨下卽蓋之勿令著水候日足取出

以水淋洗掛陰處令乾用薄荷四兩酒一升童子小

便半升共前皂莢同浸一宿取出煎五七沸傾出以

手掇取汁細布絞去滓入藥末一分在汁內用文武

火熬成膏將二分末入龍腦麝香各半錢同研勻丸

如梧桐子大每服二十九空心日午臨臥時薄荷茶

下

風毒氣毒熱毒瘰癧

論曰瘰癧之候大槩有三一曰風毒得之於風二曰氣毒得之於氣三曰熱毒得之於熱蓋風熱氣蘊蓄經脈否澁皆能結於頭項胸腋成瘰癧鞭核狀如連珠腫潰生瘡不瘳則變久瘰癧之證令人寒熱羸瘦

香九方

木香

犀角 麝香 芍藥 川芎 小動

連翹

兩壹

白欬

壹兩

射干

兩壹

射干

兩壹

射干

海藻

洗去鹹味焙乾

昆布

洗去鹹味焙乾

烏蛇

酒浸壹宿

去皮骨炙

玄參

兩壹

大黃

兩壹

射干

兩壹

射干

兩壹

射干

右一十一味檮羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服十丸

空心溫酒下至夜再服

治熱毒氣毒風毒結成瘰癧連翹丸方

連翹

兩壹

芍藥

兩壹

射干

兩壹

射干

兩壹

射干

大黃

兩壹

犀角

兩壹

射干

兩壹

射干

兩壹

射干

羌活

去蘆頭

木香

兩壹

射干

兩壹

射干

兩壹

射干

右九味檮羅為末鍊蜜丸如梧桐子大食後米飲下

二十九日再服

治風熱氣毒結成瘰癧木通九方

木通剉

車前子酒浸

大黃剉

連翹去核

玄參

知母各壹兩

右六味搗羅爲末鍊蜜丸梧桐子大每服十九丸臘茶

下

治項下并腋下熱毒氣毒結成瘰癧斑貓散方

斑貓

去頭翅足糯米炒黃色半兩

炒豆黃末

炒糯米末各壹兩

甘草壹中指節大半生半炙

膩粉壹分

右五味搗羅爲散一處重研勻空心米飲調下二錢  
匕當吐瀉下惡物卽煮糯米粥補之如吐不止以炒

豆黃末煎湯止之如吐甚不止磨少許雄黃麝香止  
之將息後再服取吐瀉惡物盡爲度

治風毒久不解搏於筋脉因成瘰癧結核生頸腋下秦  
苳湯方

秦苳

去苗土

連翹

青橘皮去白

檳榔

煨各半兩

犀角鎔分

右五味搗篩每服三錢匕水一盞入木通少許同

煎至七分去滓溫服

治風毒氣毒熱毒瘰癧不破者大黃散方

大黃

濕紙裏煨微焦色 甘草炮

白蠶去土帶乾各壹兩

檳榔 根壹分

右四味搗羅為散每服二錢七用蜜熱水調下日可三五服取下惡物如魚腦即愈

治氣癰疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者雞鳴散方

牽牛子末 兩壹

胡粉 錢壹

大黃 蒸末貳錢

朴消 鍊成粉參錢

右四味搗羅為散雞鳴時以井華水調服三錢七以  
利為度不利再服

治風熱氣毒癩癰胡粉丸方

胡粉 錢壹

雄黃 研壹錢

雌黃 研壹錢

右三味研令勻用烏雞子三枚取白調藥入淨瓷蓋  
內於飯上炊令鞭軟得所丸如梧桐子大每服三十  
九至四十九丸溫熱水下轉下惡物為驗

治風熱毒氣結癩癰內消羌活散方

羌活

去蘆頭壹兩半

白殭蠶 炙壹兩

右二味搗羅為散每日空心以蜜酒調下四錢七夜  
再服

治風毒氣毒不順結聚成癰或破或不破內消膏方

蝟皮

生剉壹枚

右一味用瓷合盛泥固濟木炭燒爲灰酒調頓服之  
治風毒氣毒癩癰白梅丸方

白殭蠶

直者不拘多  
少炒令黃色

右一昧擣羅爲末用陳白梅肉擣和爲丸梧桐子大  
每服三十九熟水下空心午後各一

治熱毒氣毒結爲癩癰蜂房膏方

露蜂房

炙 蛇蛻皮

炙 玄參

黃耆

細切

蛇牀子

各一分

杏仁鹽兩 三十

亂髮

雞子  
許大

鉛丹

兩

水蠟兩 藥入藥

右九味先將前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿

令酒多用油半斤內杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡

卽用綿濾更下錯中然後下鉛丹蠟又煎五六沸卽  
瀉出於瓷器中盛取貼瘡上一日換

治熱毒風毒氣毒癩癰內消赤豆散方

赤小豆

炒

黃藥子

消石

研如  
粉

大黃

生各  
一分

木鼈子

參枚  
去殼

豬牙皂莢伍挺  
酥炙

右六味擣羅爲散以不語津調塗之乾卽易

癩癰寒熱

論曰甲乙經論癩癰寒熱皆鼠瘦寒熱之毒氣留於脉  
而不去上攻於頸腋之間風熱毒氣與氣血相搏則榮

備不和故瘰癧而發寒熱也

治瘰癧寒熱射干連翹湯方

射干

連翹

玄參

赤芍藥

木香

升麻

山梔子人

前胡去蘆頭

當歸切

甘草炙剉各壹兩

大黃剉碎參兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓入芒消少許食後溫服日再服

治寒熱瘰癧會青散方

會青研

附子炮裂去皮臍

礬石熟令汁

荏子各半兩

當歸切

狸骨炙

甘草炙剉各貳兩

細辛去苗葉

乾薑炮

露蜂房炙各壹兩

斑猫同羌妙

芫青各伍枚去頭翅足用糯米

炒去朱不用

右一十二味搗研爲散每服一錢匕空心溫酒調下

治療瘰癧初結成寒熱漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

連翹

木通剉

桂去蟲皮

犀角屑

黃芩去黑心

茈胡去苗

玄參

大黃剉

知母剉各壹兩

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓下朴消半錢匕攪動空心臨臥温服以快利爲度  
治毒氣攻肌肉腫痛結脉寒熱如瘰癧急者數日殺人  
大五香湯方

木香

雞舌香

沉香劉

乳香各壹兩

藿香葉

犀角屑各參分

升麻壹兩

吳茱萸湯浸焙乾炒半兩

桂皮去麤

麻黃節去

甘草炙

細辛去苗葉各參分

右一十二味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓温服空心近晚各一服若惡寒加附子一枚  
炮裂去皮臍同煎餘滓卽傳腫上脈七六論雖十正  
治瘰癧乍寒乍熱知母湯方

知母精

連翹兩

木通劉去

桂皮去麤

芫胡苗去

玄參

漏蘆去蘆頭

大黃劉下犀角屑

右九味等分麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓下朴消少許攪動空心温服以利爲度

治寒熱瘰癧土瓜根散方

土瓜根去

連翹

龍膽實

黃連去

苦參

栝樓實微

大黃微

芍藥

木香

右九味等分搗羅為散食後臨臥以溫酒調下一錢

匕日三服

治瘰癧寒熱結核在頸腋之下堅痛連翹丸方

連翹

玄參

木香

升麻各壹兩半

大黃蒸半兩

昆布洗去鹹結

大麻子微炒別搗研各貳兩

枳殼去瓢炒兩半

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸食前米飲下加至二十九

治瘰癧連連大小寒熱煩悶木香消毒湯方

木香

大黃生各半兩

竹葉乾者壹分

連翹壹兩

獨活去蘆頭半兩

梔子人壹分

右六味麩搗篩每服三錢匕小酒童子小便共一盞

煎至七分去滓溫服

治瘰癧寒熱先從頸腋諸處起者玄參酒方

玄參參斤細切

磁石參斤燒令赤醋泔七徧細研水飛

右二味以生絹袋盛酒三斛浸六七日每服一盞空

心臨臥溫服

治寒熱瘰癧方

狸頭壹枚

右一味搗羅爲散每服一錢匕空心米飲調下

又方

白殭蠶兩妙壹

右一味搗羅爲散水調服一錢匕日再服

治瘰癧惡寒壯熱久不差成瘦射干丸方

射干

昆布洗

海藻各壹兩洗

木香

黃芩去黑心

犀角屑各

芍藥

連翹

白欬各半

大黃壹兩

玄參壹兩

烏蛇肉酒浸去皮骨炙貳兩

字

右一十二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

四十九煎皂莢子湯下食後服日三

瘰癧有膿

論曰內經謂管氣不從逆於肉理乃生癰腫蓋營氣逆則血鬱血鬱則熱聚而爲膿瘰癧之疾亦猶是也熱氣內結搏聚在肝肝主筋肝藏血久不差故熱聚於血血腐而爲膿在於頸腋腫結相連有如梅李實者是也治瘰癧結核於頸腋下外生癰脹連翹丸方

連翹

玄參

木香

枳殼去頭 炒 昆布洗去鹹 焙 大黃炒

大麻子人熟各貳 兩別搗 升麻炒 兩壹

右八味搗羅爲末鍊蜜和爲丸如梧桐子大食前以棗湯或米飲下二十九亦可作散空心米飲調服

治燥癢熱毒風結成腫疼及破出膿水者散腫毒紫參

丸方

紫參 連翹 丹參

苦參 滑石各壹兩 輕粉

麝香各壹分 右七味搗羅爲末又用玄參半斤杵碎以好酒二升

浸三日却採取汁去滓又以不蛭皂莢子三百枚炮

熱杵末入前玄參酒內同熬成膏和藥末勻爲丸如

小豆大每服一丸煎黃耆湯下每日加一丸直候加

到患人同歲便住卽愈

治諸種癩癩不限年久日近或已破或未膿及諸癰腫

瘡癩皆治惡實丸方

惡實炒 麝香兩 牽牛子壹兩半壹

薄蘆去蘆頭 大黃

薄荷葉各貳

右六味搗羅爲末用羊脛骨髓打破煎濃汁作大麥

麴糊爲丸如梧桐子大每服十五丸日午臨臥膏薄

荷以湯下

治癩癧成瘡有膿貼藥後服此地膽丸方

地膽

去頭足翅糯香  
米炒今米黃

斑貓

去頭足翅糯  
米炒今米黃

牛黃

別研各  
壹分

芫青

拾枚糯米炒今  
米黃去頭翅足

生大豆黃

拾  
枚

入日並與水煎水煎又搗

右五味搗羅四味爲末入牛黃再研勻鍊蜜爲丸如

梧桐子大每服一九空心茶下後更服尋常補益丸

散末入前立愈因用然其味甘藥末已爲水

治癩癧腫核結靨不消及膿汁傍穿久不差者水紅花

飲方

水紅花

不以多少壹半  
妙用壹半生用

右一味爛搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食後臨臥日三

治癩癧已破瘡口浸引膿水不絕及治一切惡瘡貼之

去惡肉好肉自生神應膏方

白及

白欬

當歸

桂去蟲皮

各壹分  
附子壹枚半兩者去皮臍乳香纏半兩

東南槐枝

柳枝各貳條各長  
柒寸到細

鉛丹

參  
兩  
巴豆參分去  
皮研

清油

兩

右一十一味並各剉細於石器內先下油與白及等  
 煎令焦黑以綿濾去滓入鉛丹巴豆慢火熬藥成膏  
 先以水一椀投藥入水其藥直入水中如珠為度後  
 刮下入瓷器內收貯每用少許量核大小塗貼

治瘰癧已破膿血不止紫金膏方

柳枝參拾條各長肆寸 槐枝參拾條各長肆寸 麻黃陸兩青者

乳香別研 沒藥研 松脂各壹分

右六味燒羅四味為末先熬油令沸入槐柳枝煎令  
 黑色去枝不用次入麻黃等熬成膏每用油紙攤塗  
 之

治瘰癧貼瘡蜂房散方

露蜂房蜜塗文火炙令青色半兩 羊屎肆拾枚白者

皂莢壹挺燒燼

右三味同研和勻洗乾瘡口用此藥貼之後可服血

竭散

治瘰癧已破膿水不止者血竭散方

血竭妙研壹分 大棗貳拾枝青州者燒為灰

生乾地黃等兩別拌為末

右三味都細研如粉以津唾調貼瘡上

治瘰癧方破比金散方

檳榔不以多

右一味端正者為細末先以溫漿洗瘡以軟帛拭乾

油調塗日三上用時看多少

治瘰癧毒氣鬱結成膿發泄不止去毒散方

巴豆毒兩去殼

薄荷木貳

皂莢末貳

麝香研壹錢

鮑魚壹頭去腸肚

右五味研勻四味入在魚腹內用泥固濟以炭火五

七斤燒存性候冷取出細研每服一錢匕用荆芥臘

茶調下日三服

瘰癧久不差

論曰風熱毒氣蘊積府藏攻於筋膜則結為瘰癧其毒氣所感深者則衝發肌肉而久不差此疾尤忌憂思怒氣血勞傷飲食寒冷

治瘰癧久不差六神散方

皂莢刺

薄荷

昆布洗去

海藻洗去

連翹各半兩

皂莢子伍枚炒

右六味搗羅為細散每服三錢匕茶調下食後臨臥

服

治風熱毒瘰癧久不差惡寒壯熱勞動轉甚漸成瘦者

射干丸方

射干 昆布洗去鹹 海藻洗去鹹

木香 黃芩去黑心 犀角各壹兩 知母

芍藥 連翹 白飲各半兩

大黃炒 烏蛇酒浸去皮骨各貳兩 玄參壹兩 黃連壹兩

右十二味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大食後溫酒

下十五九日三夜一風寒表走

治瘰癧久不差或已破膿血甚者丁香丸方

丁香母生半兩 蒼耳苗炒壹兩 青箱子生

皂子人各半兩 甜葶藶半炒半生壹兩 厚朴去蘊皮壹兩

丹砂研半兩壹分 為文氣滑煎頂謀食煎無其毒

右七味搗研為末聚肉為丸如菽豆大丹砂為衣每

服十九至十五丸粟米飲下日三服

治瘰癧久不差將欲破者漏蘆湯方

漏蘆洗焙半兩 海藻洗焙半兩 連翹壹兩

沉香剉半兩 山梔子人壹分 玄參壹兩

丹參各壹兩

右七味搗搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治瘰癧久不差何首烏丸方

何首烏去黑皮壹兩 黃耆細剉半兩 皂莢去皮子

薄荷各壹兩

蛇蛻皮燒灰半兩

龍腦研壹錢

麝香研壹錢

右七味搗研爲細末鍊蜜和九梧桐子大每服十丸薄荷茶下不計時候

治療瘧久不差犀角散方

犀角鎊屑

燕薹生

斑貓炒各壹兩

牽牛子炒

黑豆生各壹分

麝香研

龍腦研壹錢

右七味除龍腦麝香外搗羅爲細散再入研藥拌勻每服一錢匕熱酒調下空心服服藥後再飲酒不盡

投之下惡物爲效

治療瘧久不差烏雞丸方餘藥上珠虛碎二兩半剉草

烏雞卵擘

錦貝子兩半

白豆壹

右二味將錦貝子在鷄卵內用濕紙裹頭七重再用壘固濟火煨過後入地坑內出火毒一宿取出研細入大黃末半兩麝香一錢同研細鍊蜜丸菜豆大空心蜜水下五丸不過五服效

治療瘧必效逐邪散方

皂莢子不限多少以絹袋盛則中浸參柴日取出淨洗安地坑中掩蓋出毒者宿焙乾爲末

斑貓伍拾枚去頭翅麩炒令黃爲末

右二味每服用皂子末二錢匕斑貓末一錢匕水銀粉二錢生鷄卵一枚取白傾盞內更入飯飲半盞

藥同攪勻四更初服至五更取下毒物或從小便中下如有些小澁痛不妨或患及五年只三服三年只二服二年只一服

治療癩瘡久不差勝金膏灰內出火毒一幣取出

黃連去須 龍骨各半 白及分

黃蜀葵花 龍骨各半 白及分

右六味搗羅爲細末取榆窠上紅蠱秤三兩半候乾同爲末更入粉霜三錢同研勻每用藥三錢匕入膩

粉少許取雞清調攤帛上先以口溫漿水洗淨搵乾

貼之隔日易

治頸生癩癩已鍼瘡尙不差者買衆湯方

買衆壹兩 烏蛇酒浸炙去連龜皮骨壹兩

生乾地黄焙各兩 鶴蝮炒壹兩 杏仁湯浸去皮尖雙入炒

桑根白皮剉各兩 白欬壹兩 威靈仙去苗土壹兩半

白及壹兩 大腹貳兩 延胡索壹兩

黃耆細剉壹兩半 木占斯壹兩 甘草炙壹兩半

黃連去須壹兩

右一十六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

五片煎至八分去滓食後溫服

治瘰癧不差敗肉生膿連翹湯方

連翹

犀角壹兩各

玄參

木通剉

黃耆剉

蒲蘆去蘆頭

杏仁

去皮尖雙入炒黃各壹兩半

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服日三

治瘰癧結核久不差異效散方

芫青

肆拾枚

麒麟竭壹兩

右二味同於藏餅中存性燒過地上出火毒研細每

服半錢匕米飲調下加至一錢匕

大德重校聖濟總錄卷第一百二十六

續金匱要略卷之六

三十八