

洗冤錄全纂



洗冤錄全纂卷四

目錄

急救方

救縊死

治刃傷

救中暈

救魘

救驚斃

救跌壓傷

治癩狗傷

救溺死

救湯火傷

救凍死

救中惡

救撲打猝死

治蛇蟲傷

救服毒中毒方

解砒霜

解鼠莽毒

解巴豆毒

解葭蓉毒



解苦杏仁毒

治菌毒

解毒草

解射岡毒

救服瀉

解藥蠱金石毒

解煤薰毒

解斷腸草方

解斑猫茺青毒

解胡蔓草

解草烏頭毒

解輕粉冰片毒

治吞金

解水銀入耳

解飲饌毒

治蠱毒及金蠶蠱

辟穢方

三神湯

蘇合丸方

辟穢丹



洗冤錄全纂卷四

急救方

救縊死



不絕其繩而從容放
解則氣不驟泄踏肩
提髮而撚整喉嚨使
氣得舒貫磨擦其胸
腹臂足使氣得運行
尤須棉軟裹繫大小
便則氣無他溢自從
口內出又用官桂湯
粥飲并筆吹耳以通
順其氣自得救活當
與下數節參合行之

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至早稍難若心不
温一日以上猶可救不得截繩但緩緩抱解放臥令
一人踏其兩肩以手提其髮常令緊不可使頭垂下
一人微微撚整喉嚨以手擦胸上散動之一人磨擦
臂足屈伸之若已僵但漸漸強屈之又按其腹如此
一飯久卽氣從口出得呼吸眼開甦醒後又以官桂

湯及粥飲與之令潤咽嚙更令二人以筆管吹其耳內若依此救無不活者

官桂湯

廣陳皮 八分

厚朴 一錢

肉桂 五分

製半夏 一錢

乾薑 五分

甘草 三分

又法緊用手罨其口勿令通氣兩時許氣急即活

又法用皂角細辛等分為末如大豆許吹兩鼻孔

又法用真野山羊血二三分研極細以好酒灌下立

活



與首節參合行之

雞冠血滴入喉鼻之
內凡跌打溢瀉心頭
熱者俱可用

又法凡男女縊死身雖僵定尙可救活不可割斷繩
索抱起解下安放平坦處所仰面朝上頭要扶正先
將手足慢慢曲灣然後將大小便用棉軟之物裹塞
不令泄氣用一人坐於頭前兩腳踏其肩揪住頭髮
將縊人之手拉直令喉項通順再用二人將細筆筒
或葦筒入耳內不住口吹氣不住手撫摸其胸前用
活雞冠血滴入喉鼻之中男左女右男用公雞女用
母雞刻下卽能甦活如氣絕時久照前救法務要多
吹多摸勿謂已冷忽畧不救

附考

乾隆四十八年五月二十九日浙江富陽縣民何盛榮妻蔣氏自縊解救因不如法捏咽喉上氣管仍是閉塞不通又不磨擦屈伸手足仍然血脉凝滯延至六月初二日身死

救溺死

救溺水諸方總以出水為主緣氣被水閉水漸出則氣漸通矣

水溺一宿者尙可救搗皂角以綿裹納下部內須與出水卽活或屈死人兩足著人肩上以死人背貼生人背擔走吐出水卽活
又法先打壁泥一堵置地上却以死者仰卧其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣噏入泥間其人遂



熱字疑卽熱字之訛

甦雖身僵氣絕用此法亦可救

又法炒熟砂覆死人面上下著砂只留出口鼻砂冷濕又換數易卽甦

又醋半盞灌鼻中

又綿裹石灰納下部中水出卽活

又倒懸以好酒灌鼻中及下部

又倒懸解去衣去臍中垢令兩人以筆管吹其耳

又急解死人衣服於臍上灸百壯

又撈起時急急將口撬音開橫啣筋一隻使可出水



以竹管吹其兩耳碾生半夏末吹其鼻孔皂角末置
管中吹其穀道如係夏月將溺人肚皮橫覆牛背之
上兩邊使人扶住牽牛緩緩行走腹中之水自然從
口中並大小便流出再用生薑湯化蘇合丸灌之或
生薑汁灌之若無牛以活人覆臥躬腰令溺人如前
將肚腹橫覆於活人身上令活人微微動搖水亦可
出若一時無牛兼活人不肯拯救或鍋一口將溺人
覆於鍋上亦可如係冬月急將濕衣解去爲之更換
一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取竈內不著

草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆臥於上臍下墊以綿枕一個乃以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰暎於眼內其撬口啣筋灌蘇合死生膏湯吹耳鼻穀道等事俱照夏天法冬天甦醒後宜少吹溫酒夏天宜少飲粥湯按灰性煖而能拔水凡蠅溺水死者以灰埋之少頃卽活此明驗也

又以酒罈一個紙片一把燒於罈內急以罈口覆臍上冷卽再燒紙片放罈內覆臍去水卽活

又初救起之時尙有微氣或胸前尙煖速令生人脫



刃傷透膜則難救

貼身裏衣爲之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流出若水往外流卽有生機一面用粗紙燎灼取烟薰其鼻竅稍薰片時卽用皂角研細吹入鼻竅但得微有一嚏噴卽可得生

浴刃傷

凡殺傷不透膜者乳香沒藥各一皂角子大研爛以小便半盞好酒半盞同煎半温服然後用花蕊石散或烏賊魚骨或龍骨爲末敷瘡口上卽止音推官宋瑑定驗兩處殺傷氣偶未絕亟令保甲取葱白熟鍋

炒熟遍敷傷處繼而呻吟再易葱白傷者無痛矣

花蕊石散

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

草烏

蛇含石

童便煨
三次

厚樸

白芷

細辛

降香

當歸

南星

輕粉

蘇木

檀香

龍骨

各二錢

麝香

三分

花蕊石

五錢童便煨
七次

右共研極細罐收聽用葱湯洗淨用此糝之軟綿



血流不止用千年石
灰或生半夏研末敷
上或用乾麵和白糖
撒傷處皆效

紙蓋札一日一換神效

又被刃傷血出不止用紫藤香

即降香
佳者

瓦鑱刮下

石碾碾細敷之血即止又無癥痕

又刀刃傷痛不可止用好雞骨炭擲地上鏗然有聲

者與松香明透者等分捶成一塊再多用老韭菜搗

汁拌入陰乾如此拌捶三四遍後為細末收貯上已

端午七夕等日製之敷患處痛立止完好如常

金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升綿濾淨汁

待極冷令病人臥席上一人含汁啜其背則腸漸入



治箭鏃木器傷用艾絨攤成餅子將火硝細末鋪上再用大蠟螂搗成末鋪火硝上包傷處一日夜即出

如一時藥不便先飲童便一碗再將生大

喫時勿令病人知之及多人在旁言語如未入拾簪

四角輕搖則自入既入者須用麻油潤線縫緊勿

潤帛紮束慎勿驚動使瘡口復迸

被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活美好者用其肥

細切剉濃將象牙末及人所退爪甲為末共研極細

拌入所剉醃肉內再為勻剉令其合一厚敷箭鏃週

圍一飯頃其鏃即自為迸脫

救湯火傷

湯潑受傷急覓水中大蚌置磁盤中將其口向上置

先寬錄全纂 救湯火傷



黃細末用香油或桐油調敷爛至肌肉者用山野人家百草霜三錢輕粉錢半研末調香油敷之

火氣總不可驟遏使熱毒內攻必須四面漸漸掃入

又方用大麥以淨砂鍋炒之漆黑為度取出隔紙攤土上出火氣研末爛者乾擦末破者以香油或生桐油調擦

無人處俟其口自開時預將冰片二三分真當門磨

即香樟子腎內小子如菘豆大

二三分同研細末以匙挑一二分傾入蚌口內其

即合而蚌內之肉即化為漿然後再入冰麝少許用

雞翎粘掃傷處先從四面邊沿層層掃入痛楚自減

如無大蚌小者亦可此急救最驗之第一方也及其

火氣已退將用下蚌殼燒灰存性碾細末入冰麝少

許從邊圍掃如無蚌處用冰片從四面摩起漸及於

中亦可漸瘥

凡被湯火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥激之其

熱氣遇冷則入之愈深輕者攣縮重則直逼火毒攻心則速之死矣

一法用好杭粉爲細末同婦女所用好頭油調塗之如無或柏子油亦可

又法用多年陳醬寬寬塗之但愈後有黑癩

又法用劉寄奴爲末先以糯米漿雞翎掃傷著處後糝藥末並不痛亦並無痕大約湯火著急以鹽末糝之護內不壞然後用藥敷之至妙

又用生大黃以米醋調敷二日卽愈



救中暈

暈音諷傷暑
漢元封四年大旱民

多暈死

冷水激之暑毒攻內
死之必速

氣海在臍下一寸半

暈死於行路上旋以刀器掘開一穴入水擣之取爛漿以灌死者即活

中暈不省人事者與冷水吃即死但且急取竈間灰熱灰壅之復以稍熱湯蘸手巾熨腹脇間良久甦醒不宜便與冷物喫

暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以布巾衣服等蘸熱湯覆臍下及氣海間續以湯淋布巾上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉卒無湯處搗道上



以葱解渴之法夏日出門不可不知新汲水乃初出井水調麻末便無妨不可單飲水

熱土於臍端以多為佳冷則頻換後與解暑毒藥或道塗無湯處即掬熱土於臍上仍撥開作窩子令人旋溺於其中以代熱湯亦可取效

凡中暑如已迷悶嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼即用水研灌之立醒路中倉卒無水渴甚急嚼生葱二寸許和津同嚥可抵飲水二升

中暑暴死以胡麻一升炒黑攤冷為末新汲水調下

救凍死

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖袋盛



冷氣凝結二人相對
以足推滾使血活氣
舒自得復醒

寒氣遇火逼入內臟
則笑而無救中寒之
不可驟近火猶中暑
之不可驟飲冷水其
理一也

灸心上冷卽換之候目開以溫酒及清粥稍稍與之
若不先溫其心便以火炙則冷氣與火爭必死
又用氈或藁薦捲之以索繫定放在平穩處令
相對踏令滾轉往來如扞氈法候四肢溫卽活
冬月溺水之人及被凍極之人雖纖毫人事不知但
胸前有微溫皆可救倘或微笑必爲急掩其口鼻如
不掩則笑而不止不可救矣切救麗驟令近火但一
見火則必大笑不可救藥

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮搗碎陳皮槌碎用水三

碗煎一碗温服

救魘

魘死不得用燈火照并不得近前急喚但痛咬其足
跟脊足大拇趾頻頻呼其名及唾其面再灌以薑湯必
活

魘不醒者移動些小臥處徐徐喚之卽醒夜間魘者
原有燈卽存燈無燈者不可用燈照

又用筆管吹兩耳及取病人頭髮二七莖撚繩刺入
鼻中○又鹽湯灌之

先電錄全書
冬日救魘



救卒死者亦用皂角法

又研葦菜汁半盞灌鼻中冬用根亦可得嚏

又灸兩足大拇趾聚毛中三七壯聚毛乃腳趾向上生毛處

又方皂角末如豆許吹兩鼻內得嚏則氣通三四日

者尙可救

斃死者若身未冷急以酒調蘇合丸灌之即活

救中惡

凡中惡客忤猝死者或先病及睡臥間忽然而絕皆是中惡也用葦黃心於男左女右鼻內刺入六七寸

令目開血出即活

此與斃死均不可用火照但痛咬腳跟即甦

此與中藥毒及河魴毒均須急取鴨熱血



灌救下喉即活

凡猝中惡死用馬糞
一枚絞汁灌之乾者
水煮亦可

總以通關利竅為主

灸則艾氣攻達吹則
皂角通竅灌則葦汁
散邪自有奇驗

中惡猝死邪閉腎臟並能提
舒散使惡血出則邪毒消矣

視上唇內沿有如粟米粒以針挑破

又用皂角或生半夏末如大豆許吹入兩鼻

又用羊屎燒烟薰鼻

又綿浸好醋半盞手按令汁入鼻中及捉其兩手勿

令驚須臾即活

又灸臍中百壯鼻中吹皂角末或研葦汁灌耳中

又用生薑蒲研取汁一盞灌之

救驚癇

七
卷四
救驚癇



北京中醫藥大學圖書館版權所有

驚怖死者以温酒一兩盃灌之即活

救撲打猝死

五絕者全在通靈使其氣得展舒此方止用生半夏
五絕及撲打猝死等但須心頭温煖雖經日亦可救

一味以其能走散發音聲作噴嚏也
先將死人盤屈在地上如僧打坐狀令一人將死人

頭髮控放低用生半夏末以竹筒筆管或紙筒吹在

鼻內如活即以生薑自然汁灌之可解半夏毒五絕者謂

產魅縊魘溺治法單用半夏一味○生薑自然汁用生薑搗爛取汁不用水者是

卒暴墮擗築倒及鬼魘死若肉未冷急以酒調蘇合

香丸灌入口若下喉去可活

撲打暈倒在地者用血管鴉毛煖存性一錢乳香沒藥百草霜各一錢共為末老酒調服即醒凡救五絕之法急於人中穴及兩足大指甲離一韭菜葉各灸三五壯即活

凡跌打損傷者用男女屎桶人中白煉紅投好醋七次研末已死者勿移動將藥末二錢好酒送下吐出



惡血卽可救矣但移動者不治

又方用活蟹搗爛熱酒沖服極醉一夜卽安

救跌壓傷

凡跌壓傷重之人口耳出血一時昏暈但視面色尙有生氣身體尙爲綿軟則皆可救但不可多火環繞嘈雜驚慌致令驚魂不復急令親人呼而扶之坐於地上先拳其兩足兩手緊爲抱定少頃再輕移於相呼之人懷中以膝抵其穀道不令洩氣若稍有知覺卽移于素所寢處將室內窗櫺遮蔽令暗仍拳手足緊抱不可令臥急取童便乘熱灌之馬溺更妙如一時不可得卽人溺亦可要去其頭尾但須未食葱蒜

用急流水取其性速而趨下也在旁煎藥欲其藥氣漸漸薰入患處也藥乘鼻下先透藥氣後投藥汁緩以受之反有速效也藥先通氣非至緊時仍係氣動豈可驟解以洩之及動而有聲往來數遍則氣得藥力而攻惡血矣故所下盡屬淤毒切勿急

而清利者強灌一二盃下得喉去便好一面用四物湯照原方加三四倍再入桃仁去皮尖及好紅花各一兩全當歸及南山查搗碎各二兩生大黃二兩童便一大鍾如係夏月加黃連四五分多用急流水煎在旁用急火煎半熱傾入碗內承於傷者鼻下使藥氣透入腹內則不致入口惡逆乘熱用小鍾強令頓服如其不受則姑緩少刻又進只要陸續灌盡不可使臥服藥之後其穀道尤須用力抵緊不可令其洩氣如藥已行動非至緊不可卽解恐其氣從下洩以



急反致有損而無益

致不救也必俟腹中動而有聲上下往來數遍急索能待方可翼之以解所下盡屬淤紫毒已解半方令睡至所下盡為糞即停止前藥否則再用亦不得然後次第調理不可輕用補藥

四物湯

當歸 一錢

川芎 七分

熟地黃 三錢

炒白芍 一錢

治蛇虫傷

毒蛇能斃人惟急以利刀割去所嚙之死肉可以漸

遲則毒行上攻及心即死

先施錄全纂 卷四 治蛇虫傷



治蛇毒莫妙於斑蘭
 根先令人口嚼卽以
 嚼細之滓敷患處此
 物出自閩廣花有斑
 點葉有花紋根雖與
 蘭花根相似而較細
 蛇遇此蘭卽化爲膿
 并非希罕之物閩廣
 販藥材者常有帶來
 但勿以藥店中板蘭
 誤認此物爲要

解

蛇傷虫咬倉卒無藥以大藍汁一碗雄黃末三錢調

勻點在所傷處併令細細服其汁如無藍以靛花青

黛代之

虺蝮傷人其毒內攻卽死立將傷處用繩絹紮定勿

緊紮傷處兩頭

使毒入心腹令人口含米醋或燒酒吮傷以吸拔其

毒隨吮隨吐隨換酒醋再吮似紅淡腫消爲度吮者

不可誤嚙中毒又急飲蒜油一二盞護心解毒以薑

末敷之



被蝮嚙死用香白芷一味以麥冬湯調服急以水代之飲之即活

又方用五靈脂一兩雄黃五錢以酒調灌每服三錢再以滓塗咬處

治癩狗傷

用防風獨莖者一兩
天南星一兩共泡七
次晒乾共為末每服
一錢白湯下半日再
進一服出汗即愈

乘毒未發用斑猫七個去頭足翅淨用雞蛋二枚同蒸去斑猫淡食雞蛋於小便內取下血塊痛脹不解則血塊未淨仍再食塊盡乃止

斑猫奔走下竅直至精溺之處能下敗物用此以毒攻毒但初愈後忌聞鐘鼓聲復發則不可治又

先施錄全錄
卷四
治癩狗傷

三



畏巴豆丹參惡甘
草荳花不可不慎

又法用斑猫同米炒俟米老黃去斑猫將米研末蒸
雞蛋食如前法血塊下盡為度

又法受咬後立至溪河將傷處洗擠血淨盡多飲生
薑汁則毒可解仍封紫瘡口勿使受風

救服毒中毒方

解砒毒

砒霜服下未久者取雞蛋

雞蛋鎮心安藏明礬防毒內攻

二十個打入碗內攪勻

故服砒

未久者

急用此方

若已

經入腹

則用

鈴水

入明礬末

三錢灌之吐則再灌吐盡便愈但服久砒

凡中砒毒心腹絞痛
欲吐不吐面青肢冷
用防風四兩煎湯服
之即解又方桐樹葉

搗爛沖生白酒飲之
卽解又方楊梅樹皮
煎湯二三碗飲之卽
愈又方用生桐油灌
之得吐卽解又方用
紫蝴蝶花根搗汁灌
之立愈

冷粥一碗吃下卽解

緣鉛性重能墜下

解毒去毒安神多磨多

已入腹則不能吐出急用黑鉛四兩重一塊用井水

灌或者者有濟然終不如後方用糞清之爲第一也

於石上磨出黑汁旋磨旋灌盡則愈卽先吐出之後

亦宜再用鉛水服之以盡餘毒方無後患

中砒霜毒急用熱鴨血灌之立解又糞清灌之亦解

又方以豆豉濃煎湯飲之可解

又用甘草汁同藍汁飲之卽愈

又用熟豆腐漿灌之亦效

解巴豆毒

中巴豆毒痢不止以大豆一升煮汁飲之

莽草以黑豆汁澆其
根卽爛

又巴豆畏大黃黃連蘆筍菰筍黎蘆各煎冷服皆能
止泄

又用芭蕉葉搗自然汁服之卽止

解鼠莽毒

黑豆汁可解。又方用枯蓮房殼帶蒂根陰乾咬咀
煎水二三碗灌之如無用荷葉中心蒂或用藕節煎
湯一碗溫冷灌之毒卽散

解萇毒

用甘草汁或藍青汁飲之卽愈若服藥卽劇



解苦杏仁毒

用杏樹皮煎湯飲之雖迷亂將死者亦可救

解斑猫茺青毒

茺音官

用猪膏大豆汁戎鹽藍汁服之或用鹽湯煮猪膏巴豆飲之又或用大小黑豆汁服之並瘥用肥皂水灌下再以鶩翎絞喉數次令吐卽活

又方用生雞鴨卵開孔灌入口中連灌五六枚得吐卽活倘閉以箸抉開灌入

治菌毒

治菌毒全書
救服毒中毒方
三



凡菌蕈如夜中有光者欲爛無虫者煮不熟者煮汁照入無影者上有毛下無紋者仰卷赤色者俱毒殺人飲以地漿及糞汁俱可解
中笑菌毒飲冬瓜蔓汁解之或苦菜白菘勻新汲水併咽

涉野錄卷四

四明温台間山谷多產菌然種類不一食之聞有中毒往往至殺人蓋蛇虺毒氣所薰蒸也有僧教掘地以冷水攪之令濁少頃取飲皆得全活其方自見本草楓樹菌食之笑不止俗言笑菌居山間不可不知此法也

誤食毒菌隨便掘地以冷水擾之令濁少頃取飲即愈及採生金銀花嚼之亦解○嘉慶四年三月十六日護江撫萬批新建詳温昭豫等三命誤食鮮菌各身死案通飭遵照

解胡蔓草
胡蔓草即鈎吻

中胡蔓草毒將糞汁灌之可解或飲浸草毒水百竅



治菌毒卽用此法

潰血急取抱卵不出之雞蛋研細和麻油開口灌之
吐出可救

解毒葶

誤食毒葶至吐卽採生金銀花嚼之可解

解草烏頭毒

用飴糖黑豆冷水解

解射罔毒

射罔卽草烏頭之汁煎成詳見諸毒條內

用甘草汁或小豆葉浮萍薺苳汁冷水解之薺苳又名甜桔

梗河南人呼爲杏葉沙參能解百藥毒

先覓錄

救服毒中毒方

六



解輕粉冰片毒

用黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲數盃湯時以瓦盆接之當有粉出服至筋骨不痛乃已。冰片毒飲以新汲冷水可解

救服瀉

服鹽瀉將常用擦桌布洗水灌之使吐即解

治吞金

中黃金毒者食鷓鴣肉中白銀毒者以黃連甘草解

救服瀉方用黃豆入水搗汁灌之或生羊血灌之立愈或用生豆腐漿灌之或用生大黃一兩搗碎再用生豆腐漿一碗同搗



數十下服後瀉數遍
俱效

金銀光潤者能柔而
下若箭碎而有尖角
者勾住腸胃易致斷
腸恐未必能出

本草載荷葉松葉松
脂穀精脂萱草瓦松
夏枯草水茨菇雁來
紅馬蹄香煎湯服皆
解

之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能柔金羊脂

獲子皆能柔銀吞金銀入腹中當服食前品柔則易

出

又服金者用真輕粉細水調下能令金從大便出

解藥蠱金石毒

治一切藥毒蠱毒金石毒用石蟬以熱水磨服

解水銀入耳

以黃金枕耳邊自出若水銀入肉令人筋攣以金物

熨之水銀乃出蝕金其病即瘥

先聖錄全纂
卷四 救服毒中毒方
三



解煤薰毒

飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向風吹便能醒

解飲饅毒

凡中飲饅毒不知何物即煎甘草薺芫湯飲之便治

附解斷腸草方

飲酒中毒經日不醒者用黑豆一升煮取汁温服一小盃不過二次即愈

先用鴨蛋三個將服毒人扶正撬開牙關剝開蛋殼成個灌下三個待蛋入胃裏住毒草次用猪膏溶化温和灌下一飯碗後又用黃豆一小升笋雞一隻不論雌雄連毛帶腸同豆搗爛用清水一碗泡入雞內布袋濾去渣取汁灌下其毒即吐如不吐即用芋苗探喉或用女人頭髮髮子探喉驚翎亦可毒吐即愈其毒在胃者可治入腸者難治



治蠱毒用芫荽根搗
汁半升和酒飲之立
下

治蠱毒及金蠶蠱

泉州一僧能治金蠶蠱毒如中毒者先以白礬末合
嘗不澁覺味甘次食黑豆不腥乃中毒也卽濃煎石
榴皮根飲之下卽吐出蟲皆活無不愈者李晦之云
凡中毒以白礬芽茶搗爲末冷水飲之卽愈

保靈丹 治蠱毒諸毒
一切藥毒

大山豆根 半兩

雄黃

硃砂

淨細研
一兩

黃藥子

黃丹 麝香

斑猫

三錢半
去頭足

糯米

半生
半炒

赤蜈

蚣 二條一
生一炙

川巴豆

肥者取肉不
去油二錢半 續隨子

生杵末
二錢半

生芫荽全葉

生芫荽

治蠱毒及

六



此方當照開時日度
合預備以防急需可
治諸毒非僅止治蠱
也

常山馬兜鈴皆係吐
藥而馬兜鈴更能吐
血服之必有吐逆

治諸蠱毒

右藥入乳鉢研和於端午重陽臘日修合宜避婦
人及雞犬用糯米湯和丸如龍眼核大陰乾磁合
收每一丸好茶清吞下不得嚼破須臾毒物下藥
丸凝血並下以水淨收可救三人

治諸蠱毒

用鰻鱧魚乾末空心服之魚或燒炙令香食之其魚
有五色文者佳

誌云嶺南俚人解蠱毒畏人知其方乃詭言三百
頭牛藥或云三百兩銀藥久與親狎始得其實所
云三百頭牛藥者土常山也三百兩
銀藥者馬兜鈴也俱用水煎服即愈



福清縣有訟遭金蠶毒者縣令治之不得蹤或獻
謀取兩刺蝟入捕必獲蝟獸類遍身有刺如栗房
蓋卽山中之刺鼠也金蠶畏蝟蝟入其家金蠶
不敢動雖匿榻下墻罅盡爲兩刺蝟擒出之

辟穢方

三神湯

蒼朮

二兩米泔浸
兩宿焙乾

白朮

半兩

甘草

半兩
炙

右爲細末每服二錢入鹽少許點白湯服

辟穢丹能辟穢氣

麝香

少許

細辛

半兩

甘松

一兩

川芎

二兩

右爲細末蜜圓如彈子大久窰爲妙每用一圓燒



之

蘇合丸每一丸含化尤能辟惡

犀角尖 丁香 香附 安息香 白豆蔻肉

沈香 白木 檀香 木香 畢撥 胡天麻

硃砂 訶子肉 麝香 蘇合油 台烏 各二兩

大片腦 乳香 各二兩 或一兩 黃蠟 三十斤 蜜 六斤 或五斤

金箔 一百帖

右藥一十八味各取淨末煉蜜搗和為丸金箔為

衣用蠟作丸裹之 或不用蜜丸別以糯米糊搗和印成香佩亦妙 終



洗冤錄全纂卷五

目錄

洗冤錄補遺三則

勒死分自勒人勒并檢咽喉腐化骨法
溺死辨自投人搵并檢榼死骨法
投水屍內受傷檢骨法

洗冤錄備考十一則

檢腰肋虛慳致傷骨法
用蛇入腹致死驗屍檢骨法
檢煙燻致死骨法
檢毆後用爆竹插入糞門點放致死骨死
僅存零星碎骨數塊檢地法
辨紅赤色



馬驢踏傷痕

自縊檢驗法

三次檢自縊骨法

濶布自縊耳根八字痕不現

奔跑忿激氣逆血湧死

檢驗雜說

檢驗雜說歌訣



洗冤錄全纂卷五

洗冤錄補遺三則

雍正十一年勒水令
江世孫詳請咨部

勒死分自勒人勒并檢咽喉腐化骨法

勒有自勒人勒之分自勒者頸間繩索雖圍纏然在咽喉軟骨內其氣猶可出納是以十活一死人勒者於咽喉軟骨間圍圓纏緊軟骨盡行碎裂其氣無可出納是以十無一活獨是被人勒死週身及頭肩手足胸背定有網縛指擦癰疔傷痕又檢驗軟骨碎裂如日久咽喉軟骨脆碎風化如石灰無可檢驗者但



檢顙門骨必浮出腦殼骨縫之外少許骨色淡紅或

微青

溺死辨自投人搵并檢搵死骨法

被人搵死者多是週身綁縛將頭倒置水中假作自

投水死口鼻耳內俱有泥沙若信為自投彼搵死之

冤奚伸此等檢骨法專在檢驗肚腹內脊脊節骨處

確有泥沙粘搭骨裡更檢鼻孔骨初起邊處有一小

線許紅色如錦文兩耳骨初起邊處有一小線許紅

色如錦文後頭腦骨處接頸脊骨盡邊處有一大線

被人搵水死者面紫
胸赤
塞口鼻死者眼開面
脛舌破又年老人用
木罨氣絕無痕亦無
傷



許紅色如錦文

投水屍內受傷檢骨法

自行投水者先在水內受傷或觸水底銳石或木漂
邊堯杆多有重傷但一經副驗皮肉內裡俱是木漂
黃白色無紅赤血凝堅結色倘逢此等傷痕當細諦
之毋誤作打傷

洗冤錄備考十一則

乾隆四十二年山東
國中承拙拙齊發

檢腰肋虛慳致傷骨法

腰肋虛慳致傷腐爛無傷可檢從肋骨上至耳根頭

洗冤錄全纂 卷五 投水 檢腰用蛇



腦各骨俱有紅赤色傷左在左傷右在右未受傷諸骨俱黃白色此檢骨係康熙十六年蘄水行人廖章奉關至陝西檢鄭宦女被本省巡撫妻兄王元鎗傷左脇身死案

用蛇入腹致死驗屍檢骨法

虎咬死者有瓜齒舌
舐傷痕衣服有破亂
亦有男婦鞋襪脚布
整雙褪下衣服裙褲
整套脫下綳帶完整
並不破亂者
釘死無痕驗頭頂糞
門產尸

廣濟縣黃五兒用蛇入腹毒命初相驗日毫無傷痕
卽用金釵探毒亦無毒色惟檢骨一法可以得之此
蛇毒骨殖從頂至足週身四旁凡一尺一寸之骨俱
是紅赤色如紅花鮮潤明亮用刀刮入內裏愈刮愈



自加痕口紅皮肉裂
執刀之手柔軟如生
傷浪起重收輕左手
右起右手左起前食
系後氣系俱傷立死
食系傷氣系不傷緩
死可醫救

紅愈現紅赤明亮是由五內臟腑擾亂其週身血髓
悉行透溢各處骨道故耳

檢煙燻致死骨法

煙燻死者其在外間皮肉或黑或黃不一色檢骨殖
之法凡身具一尺一寸之骨俱是白雪色又如白金
色又似白粉色又若白石膏色毫無他色相雜其間
蓋由煙燻透骨火極變金夫金者白色也不見今之
燻金者火燄閃閃白鍊白光者乎此五行化氣道理
存之以備參考



檢毆後用爆竹桶入糞門點放致死骨法

檢驗左右臀骨穀道蛆尾骨各有爆竹火冲傷俱微
紅色有瘡

僅存零星碎骨數塊檢地法

刨開土坑僅存零星碎骨數塊用猛火燒紅土坑將

胡麻即芝

鋪蓋半時用箒除去已成人形屍身仰直

量驗臍肚上胡麻結聚成團餘未粘戀又將臍肚上

所粘之胡麻除去復用猛火再燒加糟水洗又猛火

燒極熱烹之以醋將新金漆桌覆上少頃取驗桌面



全具人形據報臍肚上戮傷一處斜圓一寸三分委
係生前被木器戳傷身死

辨紅赤色

赤色者今之大紅色
紅色者今之桃紅色

傷痕之紅赤色紅赤俱有辨赤色過於紅蓋赤色者
紅之皦皦象也紅色殺於赤蓋紅色者赤之紋紋象
也

馬驢踏傷痕

馬蹄踏傷左肋腹心胸小肚間長寬三四寸不等月
牙痕樣半邊重紫青半邊輕紅色驢蹄踏傷亦半邊

辨紅赤
馬驢踏



青紫半邊紅色青似月牙紅絲浸一蹄卻中肋三根
中根損折有芒刺外面向內內向外左右旁根微斜
橫

〔自縊檢驗法〕

自縊凡低處自縊身死臥下或側或覆不同側臥則
痕斜起橫在喉下覆臥則痕正起在喉下要皆起於
耳邊不至腦後髮際○屍首日久壞爛頭吊在上屍
側在地肉潰見骨但驗所吊頭其繩若入槽謂兩耳
連頰下
深回骨
本者
及驗兩手腕骨頭腦骨皆赤色者是二云齒



赤色及十指尖骨赤色者是又檢骨左右耳後骨俱有提繩痕頸骨節上左右骨尖凸處必有青紅色痕

三次檢自縊骨法

初檢先將衣袖并胸前用刀割開抱起頭骨看腦後髮際下左右有小釵骨三根分男女男長一寸五分女長一寸繩痕八字偏左則右釵骨斷偏右則左釵骨斷單繫活套頭則左右髮際骨相連釵骨縫有紫紅微紅色頭骨當空照看頂心骨縫內有青紫雲斑左右髮際骨根內縫亦有青紫色係血凝聚故有此



痕咽喉腐爛止有結骨一塊若初驗屍口閉喉結骨
白色口開舌出喉結骨有紫紅色微紅色若兩人不
解週身骨節兩相交連縫內有血墜浸痕左若手指
尖骨亦有紫紅微紅色若左右手指骨中節面有淡
紅色係怒氣捏拳自打痕實是自縊死

覆檢必調前檢人役同驗官封眼同開棺看骨上霉
色青紅俱有將點過骨殖數目檢看腦後下左右耳
孔眼後及髮際骨根內縫就有前項顏色腦下圓眼
左右隔四分處係載釵骨之所若繩弔斷卽有痕迹

欵骨未斷細看項骨三四五節骨尖上左右應有淡紅暈色喉結與指尖骨無色係氣微絕溫和移用其屍身昏暈頭埋上下不能直伸故痕迹現於項骨三檢將溫熱酒醋并葱白浸屍骨一兩時加熱復浸其骨還本色生前死後各有分別

弔痕係蔴繩寬四分 竹篾索寬五分 布帶寬

四五分 線索寬五六分 弔痕有單活頭 死

套頭 十字纏繞 雙股纏繞 草繩死套頭

以上看骨痕定器物





喉 髑 骨 骨 結 骨



有 九 片 者



有 八 片 者

潤布自縊耳根八字痕不現

湖撫方 題叅安仁縣知縣張照黎檢鄧氏屍骨上

下牙齒左右手腕骨十指尖骨俱赤色血瘡係自縊

身死其左右耳根八字痕不現係用潤幅布所縊故

無痕迹 乾隆三十二年

奔跑忿激氣逆血湧死



面色黃瘦口鼻有血係生前奔跑忿激氣血湧逆身

死
乾隆十六年

檢驗雜說

開檢事宜一監驗官臨廠原差帶齊屍親兇犯保隣
証佐人等分付原差同屍親去看屍墳上土色如是
舊土未動分付屍親出具土色未動甘結分付原差
押令保隣開土將棺移出分付屍親看棺木既是原
棺分付原差押令開棺將屍骸移至平明地方官臨
屍所親看又到鍋竈前看分付要新鍋又到水缸前



看分付屍親自挑水或分付屍親押令甲隣挑水
水色要清淨明亮分付伴作開手分付屍親跟隨着
守伴作洗檢骨殖洗檢畢官親臨屍骨看視分付屍
親自備淡醋淋炕將屍首移至炕上用淡醋煎藥物
水淋骨殖上炕畢將骨殖移至厰前分付伴作喝報
仰面官親臨細看分付原被証佐等同看再喝報合
面官仍親臨細看又分付原被証佐等同看或紅紫
青黑各傷不同或破裂損折不等打傷器械不一當
場取具屍親兇犯証佐保隣人等眼同檢驗各甘結

分付原差將骨殖擡在棺內用布將骨殖掩蓋四圍
俱用灰印將棺蓋釘交保看守取看守結狀附卷
中煤毒身死 腹脹週身紫色釵探色亦同用清
水一碗鼻屍令側臥枕置屍鼻嘴間用手按屍肚肚內
氣入水中枕面毒氣浮綠色煙霧起

救縊死法 要三人努力一人將縊者緊抱穩坐以

自己膝頭緊頂縊者穀道一人扶正縊者頭頸莫令
仰上畧作低垂式一人以綿紙揉軟塞兩耳兩鼻勿
令氣出旋以自己口唇接縊者口唇急呼吸數十回



必甦倘若不應只揭去兩鼻所塞之紙仍留兩耳所
塞之紙切莫揭去立取皂角研末先吹右鼻次吹左
鼻作嚏必甦倘又不應急用溫鹽一椀炒紅色乘熱
盛入綉袋以尺布用酒噴畧溫攤貼臙中穴處將熱
鹽不住手揉熨鹽冷再炒再熨揉熨十數回必甦倘
再不應急將救者中指第二節于縊者乳頭向下比
之盡處是穴用艾珠大荳大左右各灸二壯又將救
者中指第二節平縊者之臍肚以救者中指橫比之
向下盡處是穴用艾珠大荳大連灸二壯又在缺盆

間兩分骨道穴中用艾珠小綠荳大只炙一壯必甦
故凡縊死者臚中穴有熱氣蒸之無不可救

檢驗雜說歌訣

隨死隨驗 隨驗氣絕血正停血浸向裏外無痕打

中臍下寸三尿臍上寸三尿出行胃口吐食因內弱

皮肉微黃血未侵碎葱貼肚還掩紙燒熱酒潑現諸

痕

死後十日半月相驗 屍至十日半月期必起水泡

白浮皮醋酒葱白因時用熱酒冲淋潰爛屍死血凝

此書錄全真 卷五 檢驗雜說歌訣 七



聚雲斑色閒斷堅腫定傷痕受傷貼骨肉低陷水拭
徹散不差移

死後停屍顏色

仰臥停放屍色赤更查日久報官

遲項後背後脇腰眼兩腿腠脚肚底血脉墜下微
赤色仰面停屍不用疑人死氣血雖然正温和血浸
紫赤依

驗壞爛屍

屍身壞爛水衝浸衝云蛆污看打痕有

傷貼骨蟲不食刀齊木緊見分明

覆檢證弊

開檢作弊本無良必調前件並臨場當



衆開棺同數骨細微大小要周詳骨上生毛青紅色
前蒸有弊不須商溫水洗淨親看明有痕瓦鉢男盛
裝大熱水潑又酒水葱皂甘草洗溫湯復原本色傷
痕現死後生前宛始張

辨換骨 骸骨倒亂多不整繫口不對奸弊生端詳

新舊究假真換骨弊難行新舊不相因頭顱頂圈對

肋骨拐骨承脊骨繫口錯大小不相稱舊骨枯黃色

新骨白且明

辨人畜骨 人畜骨自殊大小形不一惟有肋相似

先寬錄全集 卷五 檢驗雜說歌訣



亦各有分別人肋寬平匾畜肋長圓窄勿比人骨空
外堅而內實頸脊繫口差顏色不符合細驗見分明
不必費周折

身首異處

先令屍親辨認真再量相離若干尺提

奏不爽分毫釐生前死後須明白皮肉捲縮肩井聳
方斷生前被人礮若無捲聳血淡清定是死後用刀
劈

檢驗鳥鎗傷

先看衣上焦眼痕次驗受傷進出門

火藥燒處皆黑色鉛鐵彈子方圓分檢骨先須論遠

近着傷眼孔要數清進刺向裡出向外傷眼青黑血
瘡明鏹鎗方眼彈沙圓皮骨血浸眼青玄遠則子散
難透骨近則子聚透骨穿

檢驗藥箭傷 前傷皮口三五分藥氣入骨絲路存

若是藥毒蓄積久團圍圓大青黑痕

檢驗弩弓傷 鐵箭痕口兩頭尖寬長八九寸分間

圓眼竹箭如葯烈遇血封喉命不全痕口青紫絲一

路骨眼青黑衣亦然

坐築致死 與踢傷相似

坐築穀道與臀尖大腸莖物腎

三
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百



相連陰陽內腎須臾死門牙中節紫紅顏腿畔紫紅
青且赤平埂木石地頭堅若論婦女有坐筭驗法須
看傷脞篇

醉飽跌死 推跌失足死道旁高低痕物要相當青

紫雲斑燒酒傷紫紅雲斑是米酒跌痕推戳一般詳
上吐穢物下便溺總因醉飽僦傷腸

強捉人自縊 強捉生人去上弔洗冤錄上無此條

遇此須看掙挫擦抓揪拖搯跡難消若是橫擡有瘡
疔驗出情形理法昭



白撞人撞

撞撒賴額肩前油皮微失痕長圓人

撞多在心中左圓大肋脇痕相連

邪崇迷顛自打身死

迷顛自打週身死打中肋脇

腹胸心口合眼閉珠不正手腳拳舒聽其因手指中

節紅雲樣死地草木兩人形

受刑後行房穢觸死

受刑雲雨定非祥切勿同衾

共枕床不但臥房污穢處園圍茅廁也須防若死房

事紅青色廁坑糞氣紫黑樣倘染臥房穢臭息微紅

赤色是真傷並看睡臥鋪蓋物恐有草蓆棉絮殃

先察錄全真卷二 檢驗雜說歌訣

三



急症死 急症紫紅癍不蛆亦不皴釵探紫青黃封

藏比較備血裹心不爛可經六七年檢骨赤紅白打

後症不然

絞腸痧死 週身青腫紫赤加九竅血出是腸痧骨

縫髓內咸凝血大小便下血成洼腹死內存隔子皮

死血浸疑不朽化縱然年久如蒸檢開棺知症難虛

假

烏痧症死 一名樸心痧又號烏痧症心窩掌大痕

隔久青紫凝痕處蛆不生眼白如黃杏檢骨色皆黃



肋稍有血癢

斑痧死

遍身紫赤黃紅點如豆大其點時時增陽

毒將人害釵探色若身檢骨斑仍在

痘症死

麻豆現頭身隱黧症不善入腸即便紅身

死黑青現皮外有圓顆骨間斑亦顯

寒症死

皮黃肚陷前胸高皮肉緊貼不漲泡前脇

色變不一樣金黃紫赤現釵梢五臟不爛寒入裡年

久皮乾血聚牢此症寒氣入心骨骨亦週身紫赤交

禁口痢症死

禁口漏痢是傷寒鼻閒起止糞門閒



橫寬二寸五分黑釵探青紫現釵端此名啞口底漏
病莫作人間服毒看

咽喉腫塞死 風火上纏喉不救頃刻死鼻尖至心

窩橫寬二寸紫遍體現雲斑釵探亦如此

縮腎死 無傷形色不改常手腳輕軟胸口脹似此

疑難憑凭報細捏週身並腎囊惟怕腎縮囊無子須

用醋酒葱白湯當衆聲明根底事掌底刮下是良方

有刮痧痕跡 此乃氣急結胸症心疼掩氣命消亡皮肉微

青紫色樣急症縮腎不須詳



刀痕火燒醋淬色現
如蓋斃刀蝦馬血燒
澄痕亦青但黯而無
色

致死移弔 致死移弔頭骨中三四骨節色微紅些

微肉貼休教失釵骨定全是假踪槓子穿擡應有痕

紫白微傷淡不濃

驗兇器 立法認刀盆貯醋燒紅刀攪迹形彰人身

油血屬鹹性蝕鐵如繡不能裝若將牲血塗刀上火

煨酒漬並如常

驗血衣 紬緞布匹白青藍一入人血漆同堅血新

味存可嘗試禽獸血淡人血鹹血舊用水洗不去酒

浸更洗並昭然即將牲血來浸染澣濯一加血即完

先寬錄全纂 卷五 檢驗雜說歌訣 古



人血再經用火煨氣臭不比畜腥然有血青黑無血
白血浸痕處灰不湔

洗冤錄全纂卷五終



洗冤錄全纂卷六

目錄

檢骨圖

檢骨格

檢骨應用物件

洗冤錄全纂目錄



金匱要略

金匱要略

金匱要略

金匱要略

目錄

金匱要略



南京中醫藥大學圖書館版權所有

項頸骨壽

琵琶骨亦名髀骨

腕骨

脊骨節

方骨

額角後

額角後

右耳根

左耳根

後腦

乘枕
乘枕

琵琶骨

脊骨六節

肋骨即斂骨左
右共二十四條

腰腿骨五節

左臂下
俱報前

右臂下
俱報前

左膝後

右膝後

左腿骨下
俱報前

右腿骨下
俱報前

尾蛆骨

足外踝



檢骨格

正犯

干證

隣佑
右左

屍親

房主

仵作

如法檢得髑髏骨一具問生年

歲

仰面

元

檢骨格



南京中醫藥大學圖書館藏

洗冤錄表云自頂及耳并腦後男子骨八片婦人六片即男女不同處也再查疑難雜說以顛門骨為天靈蓋又查醫宗金鑑顛頂骨男子三又縫女子十字縫一名天靈蓋位居至高內函腦髓以統全體是天靈蓋即頂心骨非顛門骨也

致頂心骨

致顛門骨

致兩額角
左

致額顛骨

致兩太陽穴
左

致兩眉稜骨
左

致兩眼眶骨
左

致鼻梁骨

致兩顴骨
左



俗名下巴骨上載齒牙

頰車即下牙床骨承載諸齒能阻食物有運動之象故名曰頰車其骨尾形如鋤上控于曲頰之環

胸膛下有護心便骨醫宗金鑑作蔽心骨

不致命 兩頤頰骨 左

不致命 口骨 上

不致命 齒 上

不致命 頷頰骨

不致命 頰車骨 左

致命 兩耳竅 左

致命 嚙喉結喉骨 共四層係脆骨如日甚久亦腐不可檢

致命 龜子骨 即胸前三骨係排連有左右

致命 心坎骨



鳩尾骨即心坎骨也
兩肩并兩臆骨檢骨
條內並分為二

輔臂之髌骨非府髌
腿跨之髌骨也

不致命 兩肩并臆骨
左 右

致命 兩血盆骨
左 右

不致命 兩橫髑骨
左 右

不致命 兩飯匙骨
左 右

不致命 兩胎膊骨
左 右

不致命 兩肘骨
左 右

不致命 兩臂骨
左 右

不致命 兩髌骨
左 右

不致命 兩手踝
左 右

婦人無



兩肩兩胯兩腕各有
蓋骨經打損傷方又
眾骨數內。金鑑云
腕骨即掌骨乃五指
之本節其骨大小六
枚奏以成掌非塊然
一骨也上接臂輔兩
骨其外側之骨名高
骨亦名踝骨

膝蓋骨中間有顛骨
一塊如大指大

脛骨旁生者斷骨亦
名髀骨見驗骨及論

命致不
兩手外踝
右左

命致不
兩腕骨
右左

命致不
兩手掌骨十塊
右左

命致不
兩手指骨二十八節
右左

命致不
兩胯骨前
右左

命致不
兩腿骨
右左

命致不
兩膝蓋骨
右左

命致不
兩脛骨
右左

命致不
兩髀骨
右左
婦人無



浴身骨脉條下

肢骨在脛骨之下本節之上

醫宗金鑑云乘枕骨形狀不同式如品字

命致不兩足踝右左

命致不兩足外踝右左

命致不兩肢骨右左

命致不兩足掌骨跖骨十塊右左

命致不十趾共二十六節右左

命致不兩脚根骨共八塊右左

谷面

命致腦後骨

命致乘枕骨右左
婦人無左右



或如山字或如川字
或圓尖或月芽形或
俱月形或雞子形或
耳門骨上即曲頰下
即頰車兩骨之合錯
也耳門內上通腦髓
亦關靈明

醫宗金鑑云脰骨即
髑骨此云脊背第二

致兩耳根骨

左
右

致項頸骨第一節

致二節

致三節

致四節

致五節

致琵琶骨亦名髀骨

致脊背骨第一節

致二節兩旁橫出者髑骨



節兩旁橫出者髌骨
說本論浴身骨脉條
內

命致不
三節

命致不
四節

命致不
五節

命致不
六節

命致
脊脊骨第一節

命致不
二節

命致不
三節

命致不
四節

命致不
五節



腰眼骨即圖之腰門
骨疑難雜說之命門
骨也另有架骨一塊
與尾蛆骨相連橫環
小腹之下

命致不
六節

命致不
七節

命致不
兩肋骨共二十四條
即釵骨婦人多四條

命致不
腰眼骨第一節

命致不
二節

命致不
三節

命致不
四節

命致不
五節

命致不
方骨

先定錄全集
卷六 檢骨格



不致命 胯骨後

左

不致命 尾蛆骨

男子九竅
婦人六竅

右仰面合面週身骨節男子婦女各別者共

四處俱詳註骨格本條下再婦女產門之上

多羞秘骨一塊傷者致命

附考

論浴身骨脈內稱輔臂者髌骨又橫髌骨之前者髌骨脛骨旁生者筋骨檢骨條內亦名髌骨又檢骨格內註琵琶骨亦名髌骨所云婦人無髌骨者即輔臂之髌骨脛骨旁之髌骨非橫髌前之髌骨琵琶骨之髌骨也



男婦周身骨節不同者骨格所註有兩髀骨
 兩骭骨男子有婦人無乘枕骨婦人無左
 又有兩肋骨婦人多四條尾蛆骨男子
 婦人六竅又驗骨條云自頂及耳並
 人骨八片婦人六片醫宗金鑑云顛
 子三叉縫女子十字縫據此是男婦
 有七處並羞秘
 骨共八處也

附檢骨應用物件

官廠一座 要朝南標定風旗

洗骨廠一座 離官廠半箭地下風

土工四名開火坑一道 長五尺寬三尺五寸深三尺

地窖一穴 長六尺深二尺四寸濶三尺



竈廠一座

新金八仙桌二張

葉桌二張

椅橈足用

新明黃雨傘二把

小竹簽一百枝

長一寸五分標骨用

大桶二隻

水缸二隻

水木杓二把

大浴盆二個

洗竹箒四個

竹撈籬二個

撈骨用

大鍋二口

地竈就鍋

大蒸籠一架

鐵條六根

鐵鉗二把

火鏃二把

鐵鈹三把

箕斗一副

即拘



鞋刷二把

篾簾四張

草席四張

草苫二條

浸濕蒸骨蓋用

剪刀四把

大小

小刺刀二把

鐵寸金鎖一把

鎖骨桶用

闊長板三塊

新漆澗大門一扇

沙盆麤

鐵絲半筋

銅絲四兩

絲綿四兩

紅綠線四兩

粗蔴繩六兩

小白布二疋

包蒸骨

紅布一疋

包骨入桶

圍身布二丈



燒酒 酒糟 米醋 陳酒 香油 白梅

蒼朮 甘草 皂莢 麻黃 松柴 白炭

桑皮紙 大油紙 粗毛紙 白綿紙

荆川紙 筆 墨 硯 香爐 燭臺

白鹽 芝蔴 薑 木賊草 雞鴨 肉

細辛 艾葱 炭灰 灰印 金釵 銅盆

湯壺 被絮 石灰 速香 檀香 線香

粘米 糯米

