

會稽 張介賓 會卿著

會稽 曾 超 謙菴訂

外科鈴

下

發背 四十二

發背屬督脉膀胱經凡陰虛火盛或醇酒厚味或鬱怒房勞或
丹石熱毒皆能致之若腫赤痛甚脉洪數而有力者執毒之
證也為易治若漫腫微痛色黯作渴脉雖洪數而無力者陰

虛之證也爲難治若不腫不痛或漫腫色黯脉微細者陽氣
虛甚也尤爲難治大抵發背之證其名雖多總惟陰陽二證
爲要若發一頭或二頭其形焮赤腫高發熱疼痛頭起者爲
癰屬陽易治若初起一頭如粟不腫不赤悶痛煩躁大渴便
秘唾語咬牙四五日間瘡頭不計其數瘡口各含如粟形如
蓮蓬故名蓮蓬發積日不潰按之流血至數日或八九日其
頭成片所含之物俱出通結一衣揭去又結其口共爛爲一
瘡其膿內攻其色紫黯者爲疽屬陰難治且此證不可大痛
又不可痛若見煩悶者多不治總之瘡瘍雖云屬火然未有

不由陰虛而致者故經云督脉經虛從腦而出膀胱經虛從背而出故不可專泥于火

陳良甫曰背疽之源有五一天行二瘦弱氣滯三怒氣四腎氣虛五飲冷酒食炙燂服丹藥

立齋曰大抵發背之證雖發熱疼痛形勢高大煩渴不寧但得脉息有力飲食頗進可保無虞其膿一潰諸證悉退多有因膿不得外泄以致疼痛若用敗毒寒藥攻之反致誤事若有膿急針之膿一出苦楚卽止膿未成而熱毒作痛者可用解毒之藥亦有腐潰尺餘者若無惡證則投以大補之劑肉最

易生亦無所妨惟忌腫不高色不赤不掀痛脉無力不飲食
腫不潰腐不爛膿水清或膿多不止皆屬元氣虛也爲難治
宜峻補之其或膿血旣泄腫痛尤甚濃水臭敗煩躁時嗽腹
痛渴甚瀉利無度小便如淋乃惡證也皆不可治

又灸法曰子常治發背不問日期陰陽腫痛或不痛或痛甚
但未成膿或不潰者卽與灸之隨手取效或麻木者明灸之
毒氣自然隨火而散或瘡頭如黍者灸之不效亦有數日色
尚微赤腫尚不起痛不甚膿不作者尤宜多灸勿拘日期更
服甘溫托裏藥切忌寒涼之劑其有勢未定者或先用箍藥

圍之若用烏金膏點患處尤妙凡人初覺發背赤熱腫痛莫辨其頭者但以濕紙覆其上立候視之其紙有先乾處卽是結癰頭也取大蒜切成片如二三錢厚薄安於頭上用大艾炷灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方止最要早覺早灸爲上一日二日十灸十活三日四日六七活五日六日三四活過七日則難爲力矣若有十數頭作一處生者卽用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也若背^上初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚者正安于瘡上灸十四

壯多至四十九壯蓋如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有效
又治法曰腫硬痛深脉實者邪在內也可下之○腫高焮痛
脉浮者邪在表也宜托之○焮痛煩躁或咽乾火在上也宜
瀉之○腫高或不作膿者邪氣凝結也宜解之○腫痛飲冷
發熱睡語者火也宜清之○不作膿或不潰不斂者陽氣虛
也宜補之○瘡肉不腐或積毒不解者陽氣虛也宜助陽氣
○膿多或清者氣血俱虛也宜峻補之○脉浮大或濇而肌
肉遲生者氣血俱虛也宜補之○右關脉弱而肌肉遲生者

又諸毒治法曰如頭痛有表證者宜先服人參敗毒散一二劑○如焮痛發熱脉數者用金銀花散槐花酒神功托裏散○如疼痛腫硬脉實者以清涼飲仙方活命飲苦參丸○腫硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷便秘脉沉實者內疎黃連湯或清涼飲○大便已通欲其作膿宜仙方活命飲托裏散蠟礬丸外用神異膏○如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑更用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗瘡口處俟有瘡口卽用紙作撚蘸烏金膏紐入瘡內○若有膿爲脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之腐肉堵塞者

去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗之○如膿稠或痛飲食如常
瘀肉自腐用消毒與托裏藥相兼服之仍用前一膏塗貼○
若腐肉已離好肉者宜速去之○如膿不稠不稀微有疼痛
飲食不甘瘀肉腐遲更用桑柴灸之亦用托裏藥○若瘀肉
不腐或膿清稀不焮痛者急服大補之劑亦用桑木灸之以
補接陽氣解散鬱毒○常觀患疽稍重未成膿者不用蒜灸
之法及膿熟不開或待腐肉自去則多致不救○大抵氣血
壯實或毒少輕者可假藥力或自腐潰若怯弱之人執毒中
隔內外不通不行針灸藥無全功矣○此證若膿已成急宜

開之否則重者潰通臟腑腐爛筋骨若使透膈則不可治輕者延潰良肉難於收功因而不斂者多矣

又諸補治法曰若腫焮作痛寒熱作渴飲食如常此形氣並氣俱有餘也先用仙方活命飲後用托裏消毒散解之○漫腫微痛或色不赤飲食少思此形氣病氣俱不足也用托裏散調補之○不作膿或膿成不潰陽氣虛也托裏散倍加肉桂參芪○膿出而反痛或膿清稀氣血俱虛也八珍湯○惡寒形寒或不收斂陽氣虛也十全大補湯○晡熱內熱或不收斂陰血虛也四物加參朮○作嘔欲嘔或不收斂胃氣虛

也六君加炮薑○食少體倦或不收斂脾氣虛也補中益氣湯加茯苓半夏○肉赤而不斂血熱也四物加山梔連翹○肉白而不斂脾虛也四君加酒炒芍藥木香○小便頻數者腎陰虧損也加減八味丸○大抵瘡毒執甚若妄用攻劑怯弱之人必損元氣因而變證者衆矣

又三證治法曰若初患未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內蘊也仙方活命飲若口乾飲熱漫腫微痛此元氣內虛也托裏消毒散若飲食少思肢體倦怠此脾胃虛弱也六君子湯如未應加薑桂其有死者乃邪氣盛真氣虛而不能發

出也在於旬餘之間見之○若已發出用托裏消毒散不腐
潰用托裏消毒散如不應急宜溫補脾胃其有死者乃直氣
虛而不能腐潰也在於二旬之間見之○若已腐潰用托裏
散以生肌如不應急溫補脾胃其有死者乃脾氣虛而不能
收斂也在於月餘見之此三證雖不見於經籍余嘗治而歷

驗者

千金方灸法治發背已潰未潰者用淡荳豉以水和搗成硬泥
依腫大小作餅三四分厚如已有瘡孔勿置瘡孔上但四布
一豆餅列艾其上灸之使微熱勿令破肉如熱痛急少起之日

灸二度如先有瘡孔孔出汗卽瘥

一驗透膈法凡背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用皂角散噓法但以紙封患處令病者用意呼吸如紙不動者未穿透也倘用取噓法鼓動內膜則反致穿透慎之慎之

都憲周弘圖背患疽腫而不潰脉大而浮此陽氣虛弱而邪氣壅滯也用托裏散倍加參芩及肉桂作渴脉洪大鼓指此虛火也用前散急加肉桂脉證頓退仍用托裏而愈若以爲熱毒而用寒藥則誤矣○上舍張克恭患此內服外敷皆寒涼敗毒遍身作痛欲嘔少食晡熱內熱惡寒畏寒余曰遍身作

疔營衛虛而不能營於肉裏也欲嘔少食脾胃虛寒而不能
消化飲食也內熱晡熱陰血內虛而陽氣陷於陰分也惡寒
畏寒陽氣虛弱而不能衛於肌肉也此皆由脾胃之氣不足
所致遂用補中益氣湯諸證漸退更以十全大補湯腐肉漸
潰又以六君子湯加芎歸肌肉頓生而愈○府痒彭碧溪患
腰疽服寒涼敗毒之藥色黯不痛瘡頭如鋪黍背重不能安
寢耳聾目白面色無神小便頻澀作渴逆悶氣粗短促脉浮
數重按如無余先用滋水之藥一劑少頃便利渴止背卽輕
爽乃砭出瘀血以艾半筋許明灸患處外敷烏金膏內服參

芪歸朮肉桂等藥至數劑元氣稍復自疑肉桂辛熱一日不用手足並冷大便不禁仍用肉桂及補骨脂二錢肉豆蔻一錢大便復常其肉漸潰更用當歸膏以生肌肉八珍湯以補氣血而愈○上舍蔡東之患此余川托裏之藥而潰瘡口尚未全斂時值仲冬且兼咳嗽余曰瘡口未斂脾氣虛也咳嗽不止肺氣虛也法當補其母一日與之全宴見忌羊肉余曰補可以去弱人參羊肉之類是也最宜食之遂每日不徹旬餘而瘡斂嗽亦頓愈矣○一男子年踰五十患發背色紫腫痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴灸患處出黑血卽

鼾睡覺而諸證如失服仙方活命飲二劑又灸一次膿血皆
出更進二劑腫痛大退又服托裏消毒散數劑而斂夫瘡勢
熾甚本宜峻劑攻之但年老血氣衰弱况又發在肌表若專
於攻毒則胃氣先損必反誤事

俱薛按

予長男於二週患背疽治按在腫瘍條中

新按

一論外通用方

神仙薰照法 外一二三

腦疽 四十三

立齋曰腦疽屬膀胱經積熱或濕毒上壅或陰虛火熾或腎水

虧損陰精消涸所致○若腫痛未作膿者宜除濕消毒○大
痛或不痛或麻木者毒甚也隔蒜灸之更用解毒藥○腫痛
便秘者邪在內也宜泄之○不甚痛或不作膿者虛也托裏
爲主○膿成脹痛者針之更以托裏○上部脈數實而痛者
宜降火○上部脈數虛而痛者宜滋陰降火爲主○尺部脈
數而作渴者滋陰降火○脈數而虛細無力或膿清或不斂
或膿多者大補血氣○不作膿或不潰者托裏藥主之○煩
躁飲冷脈實而痛者宜瀉火

又治法曰初起腫赤痛甚煩渴飲冷脈洪數而有力乃濕熱

上壅當用黃連消毒散並隔蒜灸以除濕熱○若漫腫微痛
渴不飲冷脉洪數而無力乃陰虛火熾當用六味丸及補中
益氣湯以滋化源○若口舌乾燥小便頻數或淋漓作痛乃
腎水虧損急用加減八味丸及前湯以固根本而引火歸經
○若不成膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪○若不生肌不
收斂脾氣虛也十全大補湯○若色黯不潰或潰而不斂乃
陰精消涸名曰腦爍爲不治若攻補得宜亦有可愈○大凡
腫焮痛甚宜活命飲隔蒜灸之以解散瘀血拔引鬱毒但艾
炷宜小而少若欲其成膿腐潰生肌收斂並用托裏爲主

李氏曰腦疽及頸項有疽不可用隔蒜灸恐引毒上攻宜灸足三里穴五壯氣海穴三七壯仍服涼血化毒之藥或以騎馬穴法灸之九頭項咽喉生疽古法皆為不治若用此法多有生者如五香連翹漏蘆等湯國老膏萬金散皆可選用

見外科精

要

一老人患此色赤腫痛脉數而有力與黃蓮消毒散二劑少退更與清心蓮子飲四劑而消○一男子腫痛脉數以荆防敗毒散二劑而痛止更以托裏消毒藥而消○一男子焮腫疼痛發熱飲冷脉洪數與涼膈散二劑而痛止以金銀花散四

劑而潰更以托裏藥而愈○一老婦稟壯實潰而痛不止脉
實便秘以清涼飲二劑而痛止更以托裏消毒藥而愈○一
婦人冬間患此腫痛熱渴余用清熱消毒潰之而愈次年三
月其舌腫大遍身發疔如葡萄不計其數手足尤多乃脾胃
受毒也先各刺出黑血隨服奪命丹七粒出鼻汗瘡熱益甚
便秘二日與大黃芩連各三錢升麻白芷山梔薄荷連翹各
二錢生甘草一錢水煎三五沸服之大小便出臭血甚多下
體稍退乃磨入犀角汁再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消
更以犀角地黃湯而愈○一婦人患前證口乾舌燥內服清

熱外敷寒涼色黯不覺胸中氣噎此內真寒而外假熱也彼
疑素有痰火不欲溫補余以參芪各五錢薑桂各二錢一劑
頓潰又用大補藥而愈○一男子頭項俱腫雖大潰腫痛益
甚兼作瀉煩躁不睡飲食少思其勢可畏診其脉則毒尚在
與仙方活命飲二劑腫痛退半與二神丸及六君子湯加五
味子酸棗仁四劑諸證少退飲食少進睡亦少得又與參苓
白朮散數服飲食頓進再與十全大補湯加金銀花白芷月
餘而瘥

薛按

立齋曰耳瘡屬少陽三焦經或足厥陰肝經血虛風熱或肝經
燥火風熱或腎經虛火等因○若發熱欬痛屬少陽厥陰風
熱用柴胡清肝散○若內熱痒痛屬二經血虛用當歸川芎
散○若寒熱作痛屬肝經風熱用小柴胡湯加山梔川芎○
若內熱口乾屬腎經虛火用加味地黃丸如不應用加減八
味丸餘當隨證治之

愚按薛氏所治耳證凡氣虛者以補中益氣湯加山梔黃芩血
虛者用八珍湯加柴胡丹皮肝火血虛者用梔子清肝散怒
動肝火者用加味道遙散肝脾受傷者朝用加味歸脾湯暮

用加味逍遙散此其治之大約也○予嘗治一儒者年近三旬素有耳病每年常發發必腫潰至乙亥二月其發則甚自耳根下連頸項上連頭角耳前耳後莫不腫痛諸醫之治無非散風降火至一月後稠膿鮮血自耳迭出每二三日必出一酒鐘許然膿出而腫全不消痛全不減枕不可近食不可加氣體俱困自分其危延余治之察其形氣已大不足察其病體則腫痛如舊仍若有餘察其脉息則或見弦急或見緩弱此非實熱可知然脉不甚緊而或時緩弱亦得潰瘍之體尚屬可治遂先以六味湯二三劑而元氣稍振繼以一陰煎

加牛旁子茯苓澤瀉仍倍加白蒺藜爲君服五十餘劑外用
降癰散晝夜敷治兩月而後愈蓋此證雖似潰瘍有餘而實
以肝腎不足上實下虛一奇證也故存識之

新按

鬢疽 四十五

立齋曰鬢疽屬肝膽二經怒火或風熱血虛所致○若焮痛或
發熱者宜祛風清熱○焮痛發寒熱或拘急者發散表邪○
作膿焮痛托裏消毒○膿已成作痛者針之○不作膿或膿
成而不潰者俱宜托裏○不斂或膿清者宜峻補之
又治法曰若發熱作渴者用柴胡清肝散○腫譽痛甚者仙

方活命飲○若大勢已退餘毒未散用參苓歸朮爲主佐以
川芎白芷金銀花以速其膿膿成仍用參苓之類托而潰之
○若欲其生肌收斂腎虛者六味丸血虛者四物加參芪或
血燥者四物湯或水不能生木者六味地黃丸氣虛者用補
中益氣湯皆當滋其化源爲善

疔腮 四十六

立齋曰疔腮屬足陽明胃經或外因風熱所乘或內因積熱所
致若腫痛寒熱者白芷胃風湯○內熱腫痛者升麻黃蓮湯
○外腫作痛內熱口乾者犀角升麻湯○內傷寒涼不能消

潰者補中益氣湯○發熱作痛大便秘結清涼飲○表裏俱解而仍腫痛者欲作膿也托裏散○若飲食少思胃氣虛弱者六君子湯○肢體倦怠陽氣虛弱也補中益氣湯○膿毒既潰腫痛不減熱毒未解也托裏消毒散○膿出而反痛氣血虛也參芪內托散○發熱晡熱陰血虛也八珍湯○惡寒發熱氣血俱虛也十全大補湯○若焮腫痛連耳下者屬手足少陽經當清肝火○若連頤及耳後者屬足少陰經虛火當補腎水○此證而有不治者多泥風熱執用尅伐之劑耳

瘰癧之病屬三焦肝膽等經風熱血燥或肝腎二經精血虧損
虛火內動或恚怒憂思氣逆于肝膽二經二經常多氣少血
故怒傷肝則木火動而血躁腎陰虛則水不生木而血燥血
燥則筋病肝主筋也故累累然結若貫珠其候多生於耳前
後連及頤頷下至缺盆及胸腋之側又謂之馬刀其初起如
豆粒漸如梅李核或一粒或三五粒按之則動而微痛不甚
熱久之則日以益甚或頸項強痛或午後微熱或夜間口乾
飲食少思四肢倦怠或堅而不潰或潰而不合皆由氣血不
足故往往變爲癆瘵外臺秘要云肝腎虛熱則生瘰癧病機云

瘰癧不係膏梁丹毒火熱之變總因虛勞氣鬱所致止宜以
益氣養營之藥調而治之其瘡自消蓋不待汗之下之而已
也若不詳脉證虛實之異而槩用追蝕攻下及流氣飲十宣
散之屬則必犯經禁病禁以致血氣愈損必反爲敗證矣若
脉洪大以元氣虛敗爲不治若面色晄白爲金尅木亦不治
若眼內赤脉貫瞳人見幾條則幾年死使不求本而妄用伐
肝之劑則誤矣蓋伐肝則脾土先傷脾傷則損五臟之源矣
可不慎哉

齊氏曰瘰癧結核初覺時宜內消之如經久不除氣血漸衰肌

寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證所以宜用也

丹溪曰瘰癧必起於足少陽一經不守禁忌延及足陽明經食味之厚鬱氣之久曰毒曰風曰熱皆此三端拓引變換須分虛實實者易治虛者可慮此經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月水不調寒熱變生稍久轉爲潮熱自非斷慾食淡神醫不能療也

立齋曰焮腫脉沉數者邪氣實也宜泄之○腫痛憎寒發熱或拘急者邪在表也宜發散○因怒結核或腫痛或發熱者宜疎肝行氣○腫痛脉浮數者祛風清熱○脉濡者補血為主○脉弱者補氣為主○腫硬不潰者補氣血為主○抑鬱所致者解鬱結調氣血○潰後不斂者屬氣血俱虛宜大補○虛勞所致者補之○因有核而不斂者腐而補之○脉實而不斂或不消者下之

又治法曰若寒熱焮痛者此肝火風熱而氣病也用小柴胡湯以清肝火並服加味四物湯以養肝血○若寒熱既止而

核不消散者此肝經火燥而血病也用加味逍遙散以清肝
火六味地黃丸以生腎水○若腫高而稍軟面色痿黃皮膚
壯熱膿已成也可用針以決之及服托裏之劑○若經久不
愈或愈而復發膿水淋漓肌肉羸瘦者必純補之劑庶可收
斂否則變成九癰內經曰陷脈爲癰留連肉腠卽此病也外
用豆豉節琥珀膏以驅散寒邪補接陽氣內服補中益氣湯
六味丸以滋腎水培肝木健脾土亦有可愈者

又治法曰大抵此證原屬虛損若不審虛實而犯經禁病禁
則鮮有不誤○常治此證先以調經解鬱更以隔蒜灸之多

自消如不消卽以琥珀膏貼之○俟看膿卽針之否則變生
他處設若兼痰兼陰虛等證只宜加兼證之劑不可干擾餘
經○若氣血已復而核不消却服散堅之劑至月餘不應氣
血亦不覺損方進必效散或遇仙無比丸其毒一下卽止二
藥更服益氣養營湯以調理之○若瘡口不斂宜用豆豉餅
灸之用琥珀膏貼之○若氣血俱虛或不慎飲食起居七情
者俱不治○然此證以氣血爲主氣血壯實者不用追蝕之
劑彼亦能自腐但取去之亦使易於收斂○若氣血虛者不
先用補劑而數用追蝕之藥適足以敗之矣○若發寒熱眼

內有赤脉貫瞳人者不治

灸瘰癧法取肩尖肘尖骨縫交接處各一穴卽手陽明經肩顛
曲池二穴也各灸七壯在左灸左在右灸右左右俱病者俱
灸之余常用之甚效薛氏以曲池云肘髆似亦未的也

又薛氏經驗方云治瘰癧已成未成已潰未潰者以手仰置
肩上微舉起則肘骨尖自見卽是灸處灸以三四十壯爲度
更服益氣養營湯灸三次瘡自除如患三四年不愈者辰時
灸至申時三灸卽愈更服補劑按此法乃單灸曲池以多爲
貴也然但用前法則已妙矣倘有未應者又當以此法治之

○又曰此治瘰癧之秘法凡男子婦人若因悲怒傷肝氣血
壅遏而不愈者宜灸此穴以疎通經絡如取此穴當以指甲
掐兩肘兩肩四所患處覺有酸麻方是其穴

又法灸瘰癧未成膿者用大蒜切片三錢厚安患處用艾壯
於蒜上灸之每三五壯卽換蒜再灸每日灸十數蒜片以拔
鬱毒如破久不合更用江西豆豉爲末以唾津和作餅如前
灸之以助陽氣內服補藥外貼琥珀膏或太乙膏瘡口自合
○又或瘡口已破核不腐則瘡口不能斂或貼琥珀膏不應
須用針頭散傅之以去腐肉再以如神散傅之更服益氣養

營湯若氣血虛者先服益氣養營湯待血氣稍克方用針頭散仍服前湯

一男子患而腫硬久不消亦不作膿服散堅敗毒藥不應令灸肩尖肘尖二穴更服益氣養營湯月餘而愈○一婦人久潰發熱月經每過期且少用逍遙散兼前湯兩月餘氣血復而瘡亦愈但一口不收敷針頭散更灸前穴而痊常治二三年不愈者連灸三次兼用托裏藥必愈○一婦人因怒結核腫痛察其氣血俱實先以必效散下之更以益氣養營湯三十餘劑而消常治此證虛者先用益氣養營湯待其氣血稍克

乃用必效散取去其毒仍進前藥無不效者○田氏婦年踰三十瘰癧已潰不愈與八珍湯加柴胡地骨皮夏枯草香附貝母五十餘劑形氣漸轉更與必效散二服瘡口遂合惟氣血未平再與前藥三十餘劑而愈後田生執此方不問虛實槩以治人殊不知散中班貓性毒雖治瘰癧多服則損元氣若氣血實者先用此下之而投補劑或可愈若虛而用下藥或用追蝕藥瘡肉雖去而瘡口不合反致難治

俱薛按

治瘰癧痰核方

凡瘰癧初起未甚者卽宜服此或加夏枯草

更佳

用忍冬花蒲公英各四五錢以水二碗同煎湯朝夕代茶飲
之十餘日漸消然此藥但可治標若欲除根必須灸肩髃曲
池二穴

疔瘡 四十八

齊氏曰夫疔瘡者以其瘡形如丁蓋之狀者是也古方之論凡
有十種華元化之論有五色疔千金方說疔有十三種以至
外臺秘要神巧萬全其論頗同然皆不離毒氣客於經絡及
五臟內蘊熱毒凡初生一頭凹而腫痛青黃赤黑無復定色
令人煩躁悶亂或憎寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛無

血是其候也多因肥甘過度不慎房酒以致邪毒蓄結遂生
疔瘡內經曰膏粱之變足生大疔此之謂也其治之法恣以
艾炷灸之若不覺痛者針疔四邊皆令血出以奪命丹或回
生丹從針孔經之上用膏藥貼之仍服五香連翹湯漏蘆湯
等劑疎下之爲效○若或針之不痛無血者以猛火燒鐵針
通紅於瘡上烙之令如焦炭取痛爲效亦經前藥用膏藥貼
之經一二日膿潰根出服托裏湯散依常療之以取平復○
如針之不痛其人眼黑或見火光者不可治也此邪毒之氣
入于臟腑故也○養生方云人汗入肉食食之則生疔瘡不

可不慎也

立齋曰此證多由膏粱厚味之所致或因卒中飲食之毒或感
四時不正之氣或感蛇虫之毒或感死畜之穢各宜審而治
之其毒多生於頭面四肢形色不一或如小瘡或如水泡或
疼痛或麻木或寒熱作痛或嘔吐惡心或肢體拘急並宜隔
蒜灸之痛則灸至不痛不痛灸至痛若灸而不痛則明灸之
及針疔四畔去惡血以奪命丹一粒入瘡頭孔內仍以膏藥
貼之並服解毒之劑或用荆防敗毒散○若針之不痛無血
者宜用燒針治如前齊氏之法○若不省人事或牙關緊急

者以奪命丹爲末葱酒調灌之候醒更服敗毒散或奪命丹甚效○若生兩足者多有紅絲至臍生兩手者多有紅絲至心腹生唇面口內者多有紅絲入喉皆爲難治急宜用針於血絲盡處挑破使出惡血若紅絲近心腹者更挑破瘡頭去惡水以泄其毒亦以膏藥貼之多有生者○若患於偏僻下部之處藥力所難到者若專假藥力則緩不及事惟灸之則大有回生之功○疔之名狀雖有十三種之不同而治法但當審其元氣虛實邪之表裏庶不誤人於天札也若專泥於疎利表散非爲無益而反害之○凡人暴死者多是疔毒急

取燈遍照其身若有小瘡卽是其毒宜急灸之并服奪命丹等藥亦有復甦者

又曰脉浮數者散之○脉沉實者下之○表裏俱實者解表攻裏○麻木或大痛及不痛者並灸之更兼攻毒

操江張恒山左足次指患之痛不可忍急隔蒜灸三十餘壯卽能舉步彼欲速愈自敷涼藥遂致血凝肉死毒氣復熾再灸百壯服活命飲出紫血其毒方解脚底通潰腐筋爛肉甚多及將愈予因考續北上又誤用生肌藥反助其毒使元氣虧損瘡口難斂予回用托裏藥補之喜其稟實且客處至三月

餘方瘥○表甥居富右手小指患之或用針出血敷以涼藥
掌指腫三四陪六脉洪大此真氣奪則虛邪氣勝則實也先
以奪命丹一服活命飲二劑勢稍緩余因他往或又遍刺出
血腫延臂腕如大瓠手指腫大數倍不能消潰乃真氣愈虛
而邪氣愈盛也余回用大劑參芪歸朮之類及頻灸遍手腫
勢漸消後大便不實時常泄氣此元氣下陷以補中益氣湯
加補骨脂肉豆蔻吳茱萸五味子又以生脉散代茶飲大便
漸實手背漸潰又用大補藥五十餘劑漸愈

薛按

齊氏曰時毒者爲四時邪毒之氣而感之於人也其候發于鼻
面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人憎寒發熱頭疼肢
體甚痛恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將謂傷寒原夫此疾
古無方論世俗通謂丹瘤病家惡言時毒切恐傳染經曰人
身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所爲自與時
毒不同蓋時毒者感四時不正之氣初發狀如傷寒五七日
之間乃能殺人若至十日之外則不治自愈也治宜辨之先
診其脈凡滑數浮洪沉緊弦濡皆其候也但浮數者邪在表
也沉濡者邪氣深也察其毒之甚者急服化毒丹以攻之實

熱便秘者大黃湯下之其有表證者犀角升麻湯以發之或
年高氣鬱者五香連翹湯主之○又於鼻內噓通氣散取十
餘噓作效若噓藥不噓者不可治之如噓出膿血者治之必
愈凡左右看病之人日日用噓藥噓之必不傳染切須記之
其病人每日用噓藥三五次以泄熱毒此治時證之良法也
○凡經三四日不解者不可太下猶宜和解之以犀角散芩
連消毒飲甚者連翹湯之類至七八日大小便通利而頭面
腫起高赤者可服托裏散托裏黃芪湯如腫甚者宜砭患處
出惡血以泄其毒氣○此病若五日已前精神昏亂咽喉閉

塞語言不出頭面赤腫食不知者必死之候治之無功矣然
而此疾有陰有陽有可汗者有可下者嘗見粗工但云熱毒
只用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

羅謙甫云泰和二年先師監濟源稅時四月民多疫癘初覺憎
寒體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽痰不利舌乾口燥
俗云大頭天行親戚不相訪問染之多不救張縣令姪亦得
此病至五六日鑿以承氣加板藍根下之稍緩翌日其病如
故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可

請治之遂請診視具說其由先師曰夫身半已上天之氣也

身半已下地之氣也此邪熱客於心肺之間土攻頭目而爲
腫盛用承氣下之以瀉胃中之實執是誅伐無過也殊不知
適其所至爲故遂處一方用黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱
以爲君橘紅苦平玄參苦寒生甘草甘寒人參甘平瀉火補
氣以爲臣連翹鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味苦寒馬勃
白殭蠶味苦平行少陽陽明二經氣不得伸枯梗味辛溫爲
舟楫不令下行升麻柴胡苦辛以散表邪共爲細末半用湯
調時時服之半蜜爲丸噲化之服盡良愈因嘆曰往者不可
追來者猶可及凡他所有病者皆書方以貽之全活甚衆時

人皆曰此方天人所製遂刊於石以傳永久命曰普濟消毒
飲

薛立齋曰此感四時不正之氣邪客心肺之間上攻頭目而爲
患與膏梁積熱之證不同硝黃之劑非大便秘實者不可用
若不審其因不辨其表裏虛實而槩用攻之必致有誤○裏
實而不利者下之○表實而不解者散之○表裏俱實而不
解者解表攻裏○表裏俱解而不消者和之○腫甚焮痛者
砭去惡血更用消毒之劑○不作膿或不潰者托之○飢年
普患者不宜用峻利藥當審而治之

又治法曰若脉浮者邪在表也用葛根牛旁湯犀角升麻湯
人參敗毒散之類以發之○脉沉瀦者邪在裏也用梔子仁
湯五利大黃湯之類以下之○表裏俱病而腫不退者用犀
角升麻湯甚者砭出惡血并用通關散搐鼻內取嚏以泄其
毒○表裏俱不解而內外俱實者防風通聖散○欲其作膿
者用托裏消毒散欲其收斂者用托裏散此法最爲穩當○
常見饑饉之際芻蕘之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之
爲患也故凡以凶荒勞役而患此者多宜安裏爲主或用普

濟消毒飲最善

一老人冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脉實此表裏俱實病也
與防風通聖散不應遂斫患處出黑血仍按前藥卽應又以
荆防敗毒散而瘳蓋前藥不應者毒血凝聚上部經絡藥力
難達故也惡血旣去其藥自效或拘用寒遠寒及年高畏用
硝黃而用托裏與夫尋常消毒之劑或不斫泄其毒專假藥
力鮮不危矣○一男子頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診
之脉浮數其邪在表尚未解散用荆防敗毒散加玄參牛旁
子二劑勢退大半以葛根牛旁子湯四劑面痊

薛按

此證初起邪結在肺者惟桔梗杏仁煎爲治此之第一方在新
因三三

齊德之曰肺者五臟之華蓋也處於胸中主於氣候於皮毛勞
傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺也故汗出惡風咳嗽
短氣鼻塞項強胸脇脹滿久久不瘥已成肺痿也○風中於
衛呼氣不入熱至於營則吸而不出所以風傷皮毛熱傷血
脈風熱相搏氣血稽留蘊結於肺變成瘡疽○診其脈候寸
口脈數而虛者肺痿也數而實者肺癰也若欲知其有膿但
脈見微緊而數者未有膿也緊甚而數者已有膿也○肺痿

之候久嗽不已汗出過度重亡津液便如爛瓜下如豕膏小便數而不渴渴者自愈欲飲者將瘥此由肺多唾涎而無膿者肺痿也○肺瘡之候口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫欬唾膿血或腥臭濁沫胸中隱隱微痛者肺疽也又聖惠曰中府隱隱微痛者肺疽也上肉微起者肺瘡也中府者穴名也是以候始萌則可救膿成則多死○又內經曰血熱則肉敗營衛不行必將爲膿大凡肺瘡當咳嗽短氣胸滿時唾膿血久久如粳米粥者難治若嘔膿而不止者亦不可治其嘔膿而自止者將自愈其脉短而濡者自痊浮洪而大者難治

其面色當白而反面赤者此火之尅金皆不可治○仲景曰
上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚

馬益卿曰肺癰治法要畧先以小青龍湯一貼以解其風寒邪

氣然後

以葶藶大棗瀉肺湯桔梗湯葦莖湯

見金匱要畧

隨證用

之以取膿此治腫瘍之例也終以內補黃芪湯以補裏之陰
氣此治潰瘍之例也○又曰肺癰已破入風者不治或用太
乙膏丸服以搜風湯吐之若吐膿血狀如肺癰口臭他方不
應者宜消風散入男子髮灰清米飲調下兩服可除

立齋曰凡勞傷血氣腠理不密外邪所乘內感於肺或入房過

全書卷四十七
久禾
度腎水虧損虛火上炎或醇酒炙燻辛辣厚味薰蒸於肺或
欬唾痰涎汗下過度重亡津液皆能致之其候惡風欬嗽鼻
塞項強胸脇脹滿呼吸不利咽燥作渴甚則四肢微腫欬唾
膿血若吐痰臭濁膿血腥穢胸中隱隱微痛右手寸口脈數
而實者爲肺疽若唾涎沫而無膿脈數而虛者爲肺痿也

又治法曰大抵勞傷血氣則腠理不密風邪乘肺風熱相搏
蘊結不散必致欬嗽若誤用汗下過度則津液重亡遂成斯
證○凡喘嗽氣急胸滿者表散之○欬嗽發熱者和解之○
欬而胸膈隱痛唾痰腥臭者宜排膿散○喘急恍惚痰盛者

宜平肺○唾膿脉短瀯者宜補之

又治法曰若欬嗽喘急者小青龍湯○欬嗽胸脹者葶藶大
棗瀉肺湯○欬膿腥濁者桔梗湯○欬喘短氣或小便短少
者佐以參芪補肺湯○體倦食少者佐以參朮補脾湯○欬
唾痰壅者腎虛水泛也六味地黄丸○口乾咽燥者虛火上
炎也加減八味丸○此證皆因脾土虧損不能生肺金肺金
不能生腎水故始成則可救膿成則多死苟能補脾肺滋腎
水庶有生者若專攻其瘡則脾胃益虛鮮有不誤者矣

陸司廳子春間欬嗽唾痰腥穢胸滿氣促皮膚不澤項強脉數

此肺疽也蓋肺系在頂肺傷則系傷故牽引不能轉側肺者氣之本其華在毛其克在皮治以黃芪當歸川芎白芷貝母知母麥冬瓜蒌仁桔梗防風甘草兼以蠟礬丸及太乙膏治之膿盡脉澁而愈○一男子面白神勞欬而胸膈隱痛其脉滑數予以爲肺癰欲用桔梗湯不信仍服表藥致欬嗽愈甚唾痰腥臭始悟乃服前湯四劑欬嗽少定又以四順散四劑而脉靜更以托裏藥數劑而愈○一男子欬嗽喘急發熱煩躁面赤咽痛脉洪大用黃連解毒湯二劑少退更以梔子湯四劑而安○一男子患肺痿欬嗽喘急吐痰腥臭胸滿咽乾

脈洪數用人參平肺散六劑及飲童便諸證悉退更以紫苑
茸湯而愈童便雖云專治虛火常治瘡瘍焮腫疼痛發熱作
渴及肺痿肺癰發熱口渴者尤效○一男子面赤吐膿發熱
作渴煩躁引飲脈洪數而無倫次先用加減八味丸加麥冬
大劑一服熱渴頓止卽熟睡良久覺而神爽索食再劑諸證
頓減仍用前藥更以人參五錢麥冬二錢五分五味二錢水
煎代茶日飲一劑月餘而安此證面赤者當補肺腎面白者
當補脾肺治者審之○一婦人素血虛發熱欬嗽或用痰火
之劑後吐膿血而赤脈數其勢甚危此膿成而氣血虛也余

用八珍湯以補元氣用桔梗湯以治肺證因得漸愈○一儒
者患肺癰鼻流清涕欬吐膿血胸膈作脹此風邪外傷也先
用消風散加亂髮灰二服而鼻利又用四君加芎歸及桔梗
湯而愈後因勞役欬嗽吐膿小便滴瀝面色黃白此脾土不
能生肺金肺金不能生腎水也用補中益氣湯六味地黃丸
而愈○一僕年踰三十嗽久不愈氣壅不利睡臥不寧咯吐
膿血甚虛可畏其主已棄矣余以寧肺散一服少愈又服而
止大半乃以寧肺湯數劑而痊所謂有是病必用是藥若泥
前散性瀉而不用何以得愈

薛按