

素治服

鹽蠱

女

新藥

方方法





服鹽藥法

擦星衍錄

叢書集 成 初 編

(本印補)

服鹽藥及他其二種

一九三七年六月初版
一九五九年十月補印

商務印書館出版

上海大众文化印刷廠印刷

服鹽藥法

無藥州土。則須服之大益。

成州鹽官第一。

次縣州封井。

次鹽州富因井。

次益州貴平井。

上四井鹽可服之。

右服法先以大豆許鹽置口中勿咽之。須臾津液滿口。令近齒。以方寸匕鹽內口。和津液一時咽之。日一服。

凡瘧新患者。一服得快利卽愈。百日以上者。五服差。若一月服之。終身不發。

諸下痢。初患一兩服卽差。赤白久痢經年者。一七二七服差。

諸心腹痛結。宿癖積聚。吐逆食不化者。一年以上。二三十年。不過三月服之。其痢及諸病皆愈。初服時。痢益極者勿怪。

諸氣滿喘逆。不能食者。一服卽散。日服之。則根本皆除。

大氣熱疾。頭痛目眩。四肢煩熱者。一服得吐利差。

諸頭面皮膚百節皆風。一月服之差。若初服十日內。眉間益悶。勿怪。

諸痰飲欬逆。不能思食者。一服差。

諸虛勞傷損骨節疼痛起止失聲者二七日服之少氣乏力而無顏色十日服佳也常以平旦空腹服之率以三七爲節須得吐利者須一度多服三七以上令人大吐利終不傷人若覺煩熱數飲冷水若至他方異域不伏水土到卽服之得一升百事不懼鹽能補虛去冷熱若有宿食不消變成霍亂一服卽差

肘後備急方卷八服鹽方


服鹽方療得熱病頭痛目眩并卒心腹痛及欲霍亂痰飲宿食及氣滿喘息久下赤白及積聚吐逆乏氣少力顏色痿黃瘧瘧諸風其服法

取上好鹽先以大豆許口中含勿咽須臾水當滿口水近齒更用方寸匕抄鹽內口中與水一時咽不爾或令消盡喉若久病長服者至二三月每旦先服或吐或安擊卒病可服三方寸匕取卽吐痢不吐痢病更加服新患瘧者卽差心腹痛及滿得吐下亦佳久病每以心中熱爲善三五日亦服佳加服取吐痢不損人久服大補補腎氣五石無不差之病但恨人不服不能久取此療方一小品云卒心痛鬼氣宿食不消霍亂氣滿中毒鹹作湯服一二升剗便吐之良按肘後備急方後人增附不盡出于葛氏故列于金匱後

右孫氏云成州鹽官者成州今甘肅成縣宋書氏胡傳仇池地方百頃四面斗絕高平方二十餘里羊腸盤道二十六回上豐水泉煮土成鹽今在成縣西一名瞿堆又名仇池山也又寰宇記階州出石鹽未知孰是云次縣州封井者縣州卽今州治隋書地里志巴西有鹽井唐地里志巴西魏城羅

江鹽泉有鹽。巴西等縣皆在今州境。元和郡縣志。陽下鹽井在鹽泉縣西一里。今在州界。有中井十所。下井十所。云次鹽州富因井者。漢地理志。安定三水有鹽官。水經河水注。縣東有溫泉。溫泉東有鹽池。城北有三泉。疑卽縣之鹽官也。今甘肅寧夏花馬池鹽也。云次益州貴平井者。華陽國志。牛鞚縣有陽明鹽井。牛鞚卽今簡州。西魏置貴平縣。在州境。井以爲名也。元和郡縣志。陽明鹽井在陽安縣北十四里。又有牛鞚等四井。又上軍井。下軍井。並鹽井也。在平泉縣北二十里。今州鹽井共九十三陽。安平泉皆在今州境。然則此四井二在四川。二在甘肅也。按神農本經。有戎鹽、大鹽、鹵鹽三種。云戎鹽味鹹。寒無毒。主明目目痛。益氣堅肌骨。去毒蠱心腹痛。溺血吐血。齒舌血出。一名胡鹽。生胡鹽山及西羌北地。酒泉福祿城東南角。北海青南海赤大鹽。主腸胃結熱喘逆。胸中病。生邯鄲及河東治澤鹵鹽。主大熱消渴。狂煩除邪。及下蠱毒。去五臟腸胃留熱。結氣心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛。生河東鹽池。說文鹵。西方鹹地也。安定有鹵縣。天生曰鹵。人生曰鹽。鹽在正東方。鹵在正西方。此據一切經音 卷二引。東方謂之斥。西方謂之鹵。故禹貢兗州海濱廣斥。鄭康成注斥謂地鹹鹵。是本經鹵鹽卽東海之鹽。名醫以生河東鹽池注鹵鹽。與古義違失。陶宏景別錄云。東海北海鹽及河東鹽池。梁益鹽井交廣有南海鹽。西羌有山鹽。胡中有樹鹽。而色類不同。以河東者爲勝。又云黑鹽主腹脹氣滿。胡鹽主耳聾目痛。又云黑鹽疑鹵鹽。孫真人所云四井鹽。雖皆指涼益之鹽。然考之名醫所注鹵鹽。亦云去五臟腸胃留熱。結氣心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛。則知東海鹽主治各病。亦與涼

益井鹽同功矣。此服鹽藥法最爲簡易。時俗庸醫爲人治疾。不按古書。不知脈理。但用俗書所謂本草綱目。不知李時珍妄改神農經藥物次序藥性。臆爲增加。其謬實甚。或遇富貴人先投人參。停食。阻氣。以致殞命。故古人有不服藥爲中醫之說。謹案漢時知醫者。有淳于意。張仲景。華陀諸人。猶以不服藥爲中醫。今則妄人爲醫。當以不服藥爲上醫矣。鹽既治諸心腹病痛。遠方鄉鄰貧戶。一時不能卒致醫藥。可以如法服之。亦必無所損。千金翼方。世不多見。四庫書亦未及載。故摘錄此條刊布。以廣其傳云。辛未年三月十五日五松居士記。



治 疊 新 方

路順德
繆福照重
纂訂

序

昔大禹鑄鼎象物。使民知神姦而爲之備。後世賴焉。然此皆有形有質。故得按圖而稽之。未若近世蠱之害人。其爲毒也無形。其中人也至烈。而其來也一發不可復制。嗚呼豈不痛哉。蓋南方地氣卑下。溼氣薰蒸。秉其氣者。毒每倍于他方。加以猺苗雜處。俗尚巫鬼。凡諸幻術。皆非意計所及。蓋蠱之由來久矣。余中年爲親負米。浮湘之粵。渡彭蠡以歸。凡洞庭南北。象郡西東。及滇閩邊界。足跡幾遍。計自戊寅迄甲午十七年。往來蠻烟瘴雨中。無日不臨深履薄。予雖幸免斯毒。而竊悲染此毒者。思有以治之而未得也。壬午春道出南寧。於旅肆中得鈔本治蠱新方一書。其言半雜融縣土音。其所抄錄亦魯魚殆半。猝卒未暇訂正也。乙酉丙戌間。客博白之大嶺埠。埠介山澤間。莠民之以蠱流毒者。指不勝屈。其地荒僻鮮醫藥。余心憫焉。爲之按方施藥。應手輒愈。乃取是書通其語言。訂其譌舛。郵寄同人。廣爲流布。今已倦歸故里。桑梓熙恬。民淳物阜。無復中蠱之患。然回思前此求治諸人。呼號匍匐。如在目前。痛定思痛。愈滋疚焉。因復取而校之。而誌其緣起如此。嗚呼。毒之生于天者。吾無如何矣。安得良有司者。取人之所爲蠱。而禁之。而化之哉。是則所謂功不在禹下者矣。道光乙未花朝後三日。澄江漁者繆福照介夫氏序。

治蠱新方

清 路順德纂

繆福照重訂
順德字應侯融縣人
福照字介夫江陰人

蘇荷湯

能治一切蠱症。凡蛇蠍瘧。腫脹癲狂癇症。以及一切感冒咳嗽氣逆沖上。肚皮緊急。審係內伏實火。小便黃赤。或服補藥而病加重者。用此湯方加減治之。百發百中。

紫蘇一兩

南薄荷一兩

條參八錢

連翹八錢

生黃芪七錢

當歸一兩

生首烏一兩

白芷一兩

川芎五錢

決明子五錢

槐花一兩

生白芍五錢

柴胡六錢

青蒿一兩

生元版八錢

右十五味爲一劑。水煨服。服三四劑後。病漸減者。加燒酒二兩。同水久煨服。取效更速。又此方每劑加田州三七二錢。更驗。又初服藥不可太急。急則內毒翻跳。病人不安。或大吐大瀉。病愈固速。而病人頗畏。至服藥五六劑。則無妨也。

右服藥一二劑後。內火炎上。大便結祕。口舌熱爛者。去當歸。白芷。川芎。紫蘇。薄荷。加黃柏。黃芩。茯苓。元參。天門冬。澤瀉。石膏。各五錢。酒一茶杯。同水久煨服。小便赤火盛者。加元參。梔子。茯苓。各五錢。帶熱嗽。或咳血者。審係內有實火。紫蘇。薄荷。暫停不用。並除當歸。白芷。川芎。加三七。百合。麥門冬。各一兩。

水煨服。時而傷寒帶寒嗽者，仍用焦薑陳皮洋參丁香當歸川芎杏仁半夏炙黃耆首烏炙甘草。寒在裏則加肉桂等藥一二劑以治其標。嗽漸愈復用蘇荷湯加減以治其本。或人弱帶痢者去條參連翹槐花柴胡生芪青蒿生地紫蘇薄荷決明子加百合附子扁豆淮山藥砂仁白朮乾薑各三錢洋參丁香木香各一錢水煨服。又服蘇荷湯已久，蠱毒將淨，火退腰痛者去條參連翹生黃芪槐花柴胡青蒿生地決明子生芍藥紫蘇薄荷加廣陳皮五錢或加熟地五錢肉桂二錢焦薑五錢丁香三錢炙甘草三錢杜仲二錢炒白朮三錢酒炒芍藥三錢茯苓一錢水煨服。或病人脾胃虛寒後復中蠱或服蘇荷湯已久，蠱毒既淨，五臟虛寒則蘇荷湯不可用，宜用溫補行氣之藥詳見後篇。

忌喫諸物

狗肉雞鴨雉雞魚蚌螺蝦等物愈後尙要戒一二年。川山甲有鱗等物愈後要戒四年。蛤戒十年蛇終身不可吃。糖甘蔗紅棗黑棗一切生蟲招瘧之物服藥時宜戒。愈後可喫。又蘿蔔菜惟中瘧者宜戒。愈後可喫。

以上宜戒之物務要嚴爲戒口。服藥方驗稍不謹慎病必復翻。

宜喫諸物

筍	豆腐	莧菜	青菜	白菜	菠菜	蒜	蓮藕	紫蘇	薄荷	芥藍	帶葉	苦瓜	細粉
木耳	薑	茨菇	芋苗	豆角	筍水	每餐放一茶杯	同菜煮吃妙	夏月田內有之殺蛇	解毒	滯脾胃之火	龍眼	宜成類	

元眼肉恐有糖
參戒之

荔枝 治重時惟此
二味可喫

柑 柚 橙 橘 李 藕

棠梨 石榴 葛薯

西瓜 醋 茶

水內之物
服藥後可喫若未服
惟此可喫鵝

羊肉 猪肉 馬肉
藥前喫恐作渴

以上可吃之物或一吃此物則病翻者必在此物內中毒暫戒之愈後可喫

浸筍水法

凡筍皆可浸惟味苦而豔者尤妙筍用淨刀淨砧板切片放瓦罐內用午後水浸之不可吃葷犯嫩糠水將浸過筍不可多後添生筍則添生水

巴豆驅毒散

凡中蛇蠱者肚內或皮內既變蛇或變肉蟹肉龜或變蠍蟲凡遇肚痛時大便結祕少出治方用巴豆一味八歲以上小兒用二粒十二歲以上用三粒大人用六粒將巴豆研末水煨菖蒲滾斟其湯着茶杯內俟其湯將涼帶溫放巴豆末入湯內攪開令病人連湯並末吞喫靜坐片刻作瀉俟其肚內之物瀉盡方可飲食但此藥至奇喫後有瀉十餘次者最後屙出如雞蛋清則不瀉矣若未屙出雞蛋清遽飲茶水瀉即止則毒未淨後必復作但服此藥恐太虧人先買真葵豆細粉四兩煮熟待瀉後即將葵豆粉喫此粉能解巴豆毒或用滾水開蜂蜜喫更妙若喫後又作吐再調稀粥喫必愈服此後仍將蘇荷湯等方加減服數劑洗淨餘毒可也愈後仍戒喫雞鴨魚蝦等物數年

按巴豆一個剝開有三粒兩頭尖者能殺人不可用此方楊生光熊世傳醫愈蛇蠱者數十人藥少價

廉收效又速。又試蛇蠱法。一凡身上皮肉刺痛。或腹內刺痛。喫筍水即暫愈者。或將馬兜鈴一兩。水煨湯服。而病即減者。定是中蠱。血氣健旺者用巴豆方治之。頗捷。人弱者忌用。孕婦忌用此方。

加減蘇荷湯

紫蘇五錢 南薄荷五錢 當歸七錢 川芎五錢 甘草五錢 澤蘭二錢 白芷五錢 首烏五錢
生芪五錢 百合五錢 陳皮二錢 三稜二錢 菟朮二錢 麝金一錢 木香一錢 丁香一錢

五茄皮五錢

以上十七味爲一劑。生薑三片爲引。水煨服。

凡中一切蠱者。血氣平和。不受得生地。元參。黃柏。連翹。槐花。青蒿。生芍藥。柴胡等寒涼之劑。又不受得桂附等溫熱之味。用此方服驗。若服此湯後。大便祕結者。仍服蘇荷湯較妥。

蛇蠱

蛇蠱者。方書謂之桃生毒。傳聞山谷間。獵婦或歹人。於端午日。取毒蛇。蜈蚣。蝦蟇。同放一器內。令其自相吞嚥。用其生者研末。同黃泥作丸。包放竹筒內。其泥極腥。放出竹筒外。則見生蛇無數。能少能多。能短能長。能小能巨。能有形能無形。常用生雞蛋飼之。收入則成泥。或將少許蛇泥放路上。人踏過則蛇上人身。或放於茶酒內。與人喫。若酒醉甚。中毒者。戒鹽。服藥可愈。

一曰生蛇蠱

有初中蛇蠱如外感症。面帶青色。氣逆氣短。肚皮緊急。兼之咳嗽。小便黃赤。內伏實熱。大便祕結。夜不得臥者。有初中不覺。至數月後。或一年後。時而在兩脅皮內痛。時而在兩肩下皮內痛。或數月痛一次。或一月痛一次。或一月痛數次。永不出汗。怕寒。服蘇荷湯後。如有聲走入肚內者。

有在肚內痛。會動會移。痛時則氣欲絕者。

有遍身如風走竄。臥則手脚跳起。靜聽身上有如蟲行者。

有初積爲氣鬱。不順。久而結爲血塊。久而成形。或爲蟻蟲。或爲肉蛇。肉鱉。肉龜。或爲有鱗有腳小蛇。或聚散無常。亦有終身止爲痞積。血積。食積。有常處者。

有夜臥忽然皮內。或背。或腹。或肩。時有一處微痛。會吸人氣。靜聽之。氣行至其處。則欲絕者。

有吐蟻蟲者。按此症亦有因溼熱食積而生者。與蛇蠱同治。

有在心上脹。口涎出。痛而不移。常屬蟻蟲者。

有在路上踏著者。或卽時肚痛極。或打冷顫。至數月後。小便常黃赤。人漸瘦弱。肚常作痛。凡遇肚痛時。行動則皮內或肚內。有物堅實。夜臥以手按之。肚皮有物擁起。長二三寸。微覺跳動。心煩涎溢。得喫肉則稍止。或移入左脅右脅。則飯食減少。或痛上心。則心脹欲作吐。又此毒在身時。有時無。至年餘。或四五年。則變成肉鱉。肉龜。肉蛇。以作咬者。至蛇老時。或在皮內肚內行咬。有日咬一二十次者。命在頃刻。此時內蛇翻動作咬。則額焦頭痛。通身發熱。如有髮刺蟻咬。夜則更甚。此乃蠱家之外蛇從風而至也。內蛇咬入臟

腑外蛇入毛孔。其蛇無形亦無數。急用雄黃四觔。分作四包。安於病人牀上四角。病人臥則開此四包雄黃。以禦外蛇。服藥方應。

一曰陰蛇蠱

初中時或吐或瀉。以後則肚腹膨脹。不想飲食。口極腥。頭面上筋起。如蟲行。蚓行。鼻內如有一二蟲欲不出。乃毒氣沖上。非蟲也。或耳內如有一蟲。亦毒氣也。或肚內如蛇翻有聲。甚則額熱面紅。大便結祕。若酒醉後在酒中受毒者。不獨腸臟青黑。卽肺肝心脾俱染黑氣。急服解毒發毒之藥。受毒重則屎黑輕則屎藍。若不知解藥。則因黑氣而變成黑星。黑星有十顆。則肚內跳動如針刺。有十餘顆。便開成蛇口。如蛇咬狀。咬上心。出恭瀉血。命在旦夕。聞蠱醫云。中此毒者。若不知醫。不出一月必死。又加以癩藥。則人多昏暗。又加以腫藥。則一耳常滿。塞一耳朵。頭少紅厚。如有蟲行狀。服解藥。則黑氣隨屎出。但看食物全不變。如喫菜則屙菜。甚至喫飯則屙成顆飯。則毒淨矣。自此後食物仍變。出恭轉黃。則全愈矣。又毒重頭眩頭痛者。戒葷鹽半月。每殼用茶油清水煮豆腐加筍水一茶杯同煮熟。淘飯喫乃驗。

病人有實火。俱用蘇荷湯治之。屢驗至服藥病愈後。忽變內寒。須用十全大補湯。加減治之。

炙黃耆三錢 杜仲三錢

當歸五錢

炙甘草五錢

大熟地三錢 乾薑三錢

茯苓一錢

川芎五錢

丁香一錢

製首烏三錢 陳皮三錢

生芍藥二錢 白芷五錢

蘇子三錢 炒白朮三錢

木香一錢

附子二錢

肉桂一錢

右十八味爲一劑水煨服。

經驗

同姓某年二十餘中蠱。初中時常在心口皮肉刺痛。繼又移上兩胸上兩肩下。皮肉刺痛。繼又移下右脅腰間。皮肉刺痛。初則數月痛一次。後則一月痛一次。歹人謂之剪刀蠱也。病處其皮擁起約四五寸長。痛甚時則兼肚脹。不出恭時而愈。則如無病。常怕寒。永不出汗。越三年餘。因喫雞鴨魚蛤等物。遂大痛。右邊半身刺痛。腰間皮內痛更甚。氣逆欲絕。予令其家人取筍水一碗。煮熱與之吃。吃後痛即止。予曰此中蠱也。彼疑而不信。予用蘇荷湯加酒一兩。同水久煨服。服藥後通身發汗。其病如失。予復用雄黃五錢研末。蒜子二三兩。菖蒲二三兩。搗爛放滾水盆內。令病人用手巾自頭至腳。通身處處洗過。以防外蛇。是夜其人臥靜聽如有蛇頭近身。伸舌覩之以手摸之。則無所得。遂大驚而哭。次日變成瘧疾。身上又略痛。復用前藥煨服。則如有物會叫。自右脅腰間痛處走入肚內。痛漸減。瘧疾亦愈。連服藥數日。小便鉢內每夜洗淨。次早倒尿。則鉢底有小珠八九顆。大如粟。研開。珠內有血。再服藥。越二三日。則鉢內血珠止有三四顆。再照前方服藥。越數日。則血珠全無。此乃毒氣積成惡血。服解藥。則毒隨小便出也。每兩日一劑。服藥一月而愈。後因同人歹人買肉釀飲。其病忽翻。肚內脹滿。通身刺痛。比前更甚。命在頃刻。照蘇荷湯取服。亦不見效。予思其故。或受歹人陰害。復中蠱也。因大加薄荷二兩。蘇子二兩。白芷二兩。田州三七二錢。當歸一兩。青蒿二兩。生地。生黃耆。柴胡。元參。川芎。槐花。條參。連翹。天門冬。天花粉。黃柏各五錢。丁香一錢。木香

一錢。共十九味爲一劑。酒一茶杯同水煨服。一服而愈。此人年二十餘。血氣頗健。故用此重劑。後又將此十九味浸酒。加減兩數。令其人每早晚飲藥酒三四小杯。病遂全愈。

按若在酒內中蟲。則宜喫水藥。斷不可用酒。犯酒必翻。

族子某年十六。肚內左脅常痛。忽又移過肚內右脅痛。或五六日痛一次。或二三日痛一次。或一日痛二次。或走上心痛。則心脹頭熱。滿身發熱。痛時則並不出汗。得喫肉則暫停半日。身上常有蟲行。以手捉之。則無所得。予用蘇荷湯加三七一錢。酒一兩。同水煨服。兼服馬兜鈴二兩爲一劑。水煨服。服一月。吐出黑星十餘顆。次日屙下蛇蟲數條。自後肚亦不痛。但身上之蟲行仍然。予曰。此蛇蟲已愈。瘕蟲未盡淨也。此後但服蘇荷湯。一年全愈。

張某中陰蛇蟲。初時如感冒風寒。四肢有蚓行蟻咬氣逆沖上。誤聽俗醫教其喫蛇一條。于是遍身有蟲走竄。肉大跳。臥則手脚大跳。夜不得臥。危極。肚鳴肚痛。予授以蘇荷湯。酒水煨服。夜即得睡。連服二劑。次夜病翻。不得臥。彼疑藥味寒涼。不肯服。因取洋烟屎泡水喫。夜暫得睡。而病仍未愈。窮於治術。復將蘇荷湯。每劑加田州三七一錢。三日一劑。服藥兩月而愈。

李某子年八九歲。吐蛇蟲不止。夜不得睡。用南薄荷。紫蘇。白芷。當歸。川芎。連翹。青蒿。槐花。生黃耆。柴胡。元參。各二錢。丁香一錢。三七一錢。水煨服數劑而愈。按凡老人幼兒中蟲。常將三七一味切碎。蒸猪肺成猪肉喫。甚妙。

潘某妻年三十餘中蛇蠱肚痛極頃刻難忍其戚授以三七白芷菖蒲蒜子等生咬爛滾水送喫得吐與瀉而愈但毒未淨後仍常常肚痛人漸瘦黑積三四年肚內如有物會動會移時跳上心則心脹口涎出得喫肉則稍止予以紫蘇南薄荷元參生黃耆當歸白芷柴胡川芎青蒿槐花連翹條參等各三錢服藥二劑其毒如拳大走在左脅下跳動肛門如有蠱咬又服藥三劑其蟲亦化不見但其毒仍在左脅下跳動而通身四肢以及手足指盡皆脹痛此乃蘇荷二味藥氣到處追其惡血瀉下大腸將換新血故脹痛也又照前方服三劑痛愈而下身及兩腳浮腫其夫疑之予曰無妨也蘇荷湯大半皆消腫之藥但彼之受病已久通身皆受毒氣侵染變爲惡血今藥力追到通身之血瀉下再換新血其脹痛浮腫者乃惡血初瀉新血初生故也再服前藥三劑每劑加田州三七一錢而浮腫亦消但左脅之毒仍然跳動再照前方服藥其毒亦漸小漸化服藥十餘劑而愈愈後不戒口因吃鷄魚復變心口痛頭痛脹滿不思飲食予復用生甘草元參紫蘇南薄荷當歸川芎生黃耆連翹白芷白芍條參青蒿槐花各五錢三七生地各一錢二服而愈後因喫狗肉病翻復用前方治之愈

李某妻年四十餘中蛇蠱初中蠱時常在左邊脅下腰間皮內痛痛時其處擁起略跳動日間則捲如螺大夜則伸長約二三寸時而此物不見則其病如失時而痛移上心則心脹得喫肉則稍止至五六年變成一物有頭尾足在肚皮內日咬三四十次咬時則頭痛遍身發熱如有蟻咬皮內如有髮刺夜不得臥予用紫蘇南薄荷生首烏柴胡槐花白芷當歸生黃耆連翹生芍川芎各一兩加燒酒二兩同水久煨服

服藥後此物走入肚跳入喉嚨不能吐出後復下肚皮內走竄病人垂危之極夜不得臥常思自盡因用雄黃如法放于床上四角以禦邪氣病人得睡內服前方兩日一劑每殼用筍水一茶杯煮菜喫其物咬亦漸少時而忽翻復用巴豆驅毒散治之其蛇漸縮小再用前方加鬱金木香各三錢服藥十餘劑其蛇遂化不見矣愈後不肯戒口肚腹復痛又服前方一二劑而愈越一年因喫蛤其夜病大翻肚脹身上刺痛不得臥肚內如有蛤叫聲復依前方加田州三七二錢酒水煨服二劑而愈

龍某妻年三十餘肚常痛誤服川山甲肚遂大痛吐出蟻蟲十餘條不止其鄉無藥予急用紫蘇薄荷陳皮槐花田州三七等味水煨服蟲止不吐令其家人出縣市藥方用紫蘇南薄荷白芷當歸川芎槐花青蒿連翹生黃耆柴胡條參元參決明子白芍各五錢木香二錢酒同水煨服數劑而愈

女子及笄後常得肚痛症痛甚則吐予用田州三七五錢洋參一錢甘草一兩紫蘇一兩南薄荷一兩酒一小杯同水久煨服卽愈再用生首烏一兩白芷一兩當歸一兩川芎一兩紫蘇一兩南薄荷一兩三七二錢槐花五錢連翹五錢條參五錢生甘草一兩水煨服十餘劑而病愈永不復作

楊某者年四十餘得外感症面帶青色臥則氣逆沖上肚皮緊急兼之咳嗽內有實熱小便黃赤夜不得臥誤服補藥肚愈脹氣愈逆嗽愈不止予曰此初中生蛇蠱也用蘇荷湯服數劑病大減予囑其常用田州三七切碎煨豬肺或豬肉喫並常用蘇荷加減服服藥二月餘全愈又凡中蠱氣急氣喘脅痛用洋參一味生咬喫亦驗

老嫗年七旬餘。先有氣弱咳嗽之症。忽加中蠱。年餘肚常痛。會動會走。腹內翻攬。脹痛。上心氣逆。欲絕。不想飲食。夜不得眠。靜聽面上。如有蟲行。治方用百合五錢。蘇子三錢。南荷三錢。當歸三錢。茯苓三錢。白芷三錢。白芍三錢。麥冬三錢。連翹二錢。水煨服。照方服二劑。毒漸墜下。心上不脹痛。仍然在下部腹內走竄。如錐刺狀。再服藥四劑。瀉下黃泥水。次日瀉止。痛頗減。飲食稍加。再服藥三劑。變成痢疾。但此嫗血氣雖虛。不可用寒涼峻利之藥。亦不得十分溫補。予用百合五錢。蘇子。南荷。茯苓。白芍。麥冬。各三錢。砂仁。白朮。各二錢。乾薑一錢。水煨服。服至七八劑。毒漸墜下。病大減。但飢時。則其毒仍在內走竄。因停藥五六日。毒忽跳起。心上脹痛。如有蟲咬。方用百合四錢。蘇子。南薄荷。當歸。茯苓。麥冬。連翹。白芷。白芍。川芎。各二錢。水煨服。服後。即大瀉數次。病亟如前。予思老人血氣太弱。服藥宜緩。此方錢分太重。兼過於寒涼。改用蘇子三錢。當歸三七。扁豆。川芎。廣陳皮。小茴香。蘿蔔子。各一錢。水煨服。服後得吐。而病退。是夜得臥。蓋毒在上部。則吐。毒在下。則瀉也。次日復病。用蘇子五錢。百合四錢。赤芍。陳皮。各二錢。決明子。升麻。各一錢。水煨服。服後刺痛頗減。但一至飢時。吐內如有物咬。但照前方加白芷五錢。當歸二錢。服藥數劑。復變咳嗽。乃其常病也。依前方加減。蘇子五錢。百合四錢。升麻一錢。赤芍二錢。決明子一錢。白芷五錢。當歸二錢。麥冬一錢。去心水煨服。一劑後。喉頗涼。仍然咳嗽。前方除麥冬。服二劑後。用前方去升麻。赤芍。麥冬。加白芍二錢。陳皮二錢。芫花五錢。當歸五錢。用水煨服五六劑。病大減。人頗康健。若停藥數日。則肚內如蛇微翻狀。但不能跳上耳。新年誤犯雞湯。兼停藥數日。病復翻。氣逆沖上。咳嗽喉苦極辣。肚脹翻攬。用蘇子三錢。廣陳

皮二錢。生首烏三錢。生甘草二錢。水煨服一劑。病略減。再服不甚效。轉用蘇子五錢。百合四錢。白芍二錢。廣陳皮二錢。決明子一錢。白芷五錢。當歸四錢。芫花二錢。常服此方。病大減而仍未全愈。蓋老人血氣既衰。而中蠱又久。通身之血皆爲毒氣侵染。又不能受得蘇荷槐耆等重劑。故難全愈也。四月內停藥不服。通身脹痛。肚內復有物動攪。方用蘇子五錢。廣陳皮三錢。生甘草三錢。川芎一錢。白芷五錢。羌活三錢。鬱金一錢。三七一錢。水煨服。病減。服二劑。牙跟口脣熱爛。如蟲蝕狀。以蘇子川芎性太發陽故也。改用三七一錢。百合三錢。當歸二錢。生甘草五錢。白芷三錢。桔梗三錢。麥冬三錢。水煨服四五劑。又常食三七豬肺。而病減後停藥。復氣逆咳嗽。再加三七。照前方而不效。改用半夏三錢。當歸三錢。茯苓二錢。木香一錢。五味子二錢。廣陳皮三錢。生首烏三錢。生棗仁三錢。洋參一錢。服藥三劑。頗效。復加蘇子三錢。百合五錢。南荷一錢。服二劑。忽變白痢。且兼咳嗽。想此時蠱毒已淨。受得補藥矣。因買鴨一隻。苡米煨喫。病略減。改用炙黃耆五錢。炙甘草一錢。熟地三錢。小茴香一錢。白朮二錢。杏仁四錢。去皮尖。洋參一錢。薑汁炒首烏一錢。杜仲三錢。當歸二錢。升麻五分。服藥一劑。病大減。再將此方加減服。而全愈矣。

男子年四十餘。脾胃虛寒。常服桂附歸朮。地黃杞等藥。忽又中蠱。肚痛。身上如蚤咬。予用溫補兼行氣散氣之藥治之。大熟地五錢。當歸五錢。川芎三錢。炒白朮五錢。炙黃耆五錢。杜仲三錢。枸杞三錢。乾薑三錢。附子五錢。炙甘草五錢。陳皮二錢。丁香一錢。木香一錢。蘇子五錢。肉桂一錢。水煨服數劑而愈。
按若心肝二經有伏火。照方加生芍三錢。茯苓三錢。又凡虛弱之人。中蠱審係內寒無火。即用此方。

加減可也。若非脾胃虛寒，則附子肉桂二味，必不可用。孕婦忌用附子。

似蠱非蠱辨

有氣不順而非蠱者

童子十一歲，因先年冬染感冒，病愈後，次年得氣脫症，肚內氣走動不痛，行急則略痛，氣不順，氣少不接，飲食減少，口不渴。審係氣血兩虛。其父疑爲蠱病。服蘇荷湯不愈，忽變通身皮熱如火，肚腹脹滿，不思飲食。予用大懷熟五錢，製首烏五錢，炙黃耆五錢，製白朮五錢，北五味一錢，廣陳皮二錢，炙甘草二錢，全當歸三錢，炒山藥五錢，北枸杞五錢，杜仲五錢，附子五錢，乾薑五錢，水煨滾，加邊桂一錢，研末入湯調勻服，十餘劑而愈。

男子年四十餘，命門無火，寒極作嗽，口鼻流血，臥則肚內有物，隱隱升上，稍脹上心，此乃血脫氣脫之候，前方加杏仁一錢，服數十劑而愈。

童子十五歲，先得蠱症，既愈後，時而背心忽寒，或頂心忽寒，口不渴而口脣起泡，右手食指將指及無名指生疥瘡，經年腐爛不愈，亦服上方，附子加至七錢，數劑疥瘡暫愈，後又復翻，仍然手指腐爛，兼之氣短促不順，此氣血兩虛，兼之蠱病餘毒不盡，前方加田州三七一錢，白芷三錢，丁香一錢，數劑而愈。按果係脾胃虛寒，方用得此方。

有肚痛而非蠱者

近日有酒頂病。七日必愈。雙頂十四日愈。將起病前二三日。手腳酸脹。次則在肚臍下痛。痛在一處。不移。大便氣絕不通。小便黃赤。飲食百物皆不下。氣力如常。行動則稍快。日夜不得臥。至七日。則必愈。不用服藥。愈後二三日。不可下水。下水則病復翻。亦有病後寒積食積。作脹作痛。亦非蟲。按酒頂病。大便不通。用槐花四兩研末。同水熬酒。燙熱泡藥末。喫得瀉即愈。若係病後寒積。則槐花決不可用。

有心口痛而非蟲者

男子李某。先數日生一癰於腎囊下。谷道前並不發起。忽然身體沉重。欲作吐。四肢皆麻。兼之冷顫。神昏譖語。心頭有一塊。大如碗口。作痛。先日好喫滾熱之茶。次日茶亦不喜吃。予曰此必內寒也。用大熟地。當歸。炙黃耆。川芎。各五錢。乾薑。炙甘草。各四錢。肉桂一錢。研末。水燙服。服藥後。即不冷顫。心頭亦不痛。忽然谷道前之癰發起。一炷香久。即穿膿。再服數劑。前病全愈矣。

有肚鳴叫而非蟲者

童子年十三。手脚常酸脹。脚底常冷。肚常鳴叫。叫時則肚痛。大便溏泄。易飢。一喫茶則肚作叫。予診其六脈無力。乃血氣也。大熟地六錢。生甘草三錢。生山藥三錢。丹皮二錢。杜仲四錢。山萸肉三錢。炒白朮三錢。

木瓜二錢澤瀉二錢當歸二錢生首烏三錢廣陳皮二錢茯苓一錢懷牛膝三錢附子二錢水煨滾入肉桂末一錢和勻服每月服二三劑數月而愈

一婦人年四旬餘腰常酸痛肚常鳴大便溏泄此乃脾腎虛寒血虛氣脫之症方用熟地枸杞當歸炙黃耆白朮炙甘草乾薑山藥首烏附子肉桂巴戟各五錢水煨服數劑而愈

有腹寒作痛而非蠱者

男子某腹常痛口不渴大便時或溏泄雖夏月必穿夾祫用布帶緊繫其腹或以炒熱嫩糠放布袋內熨之而痛愈後仍復作用大熟地製首烏當歸乾薑焦朮各五錢川芎炙甘草各二錢肉桂一錢水煨服數劑痛愈永不復作按亦有肚寒痛而兼蠱者照方加丁香木香蘇子各一錢水煨服驗

癲狂蠱論

聞蠭俗埋蛇土中俟其出菌取菌毒人受其毒者或癲或狂或癇有心昏頭眩笑罵無常肚常鳴叫大便結祕者有赤身出外持器械毆打人者有毒甚則額必焦口必腥神昏性躁目見邪鬼形耳聞邪鬼聲如犯大辟如見惡役持練鎖至如有刀兵健卒追趕常思自盡者有初中毒肚內作痛者有輕而時發羊癇豬癇者以上諸病皆用蘇荷湯治之服藥時宜戒葷鹽每殮用茶油或芝麻油清水煮豆腐加筍水一杯煮飯滾泡數日服藥方效

經驗

某生得癲症時發時止。發則眼赤不出恭。狠不能制。自脚腫上腎囊時而毒氣至於手。則一手腫時而一腳腫時而兩脚皆腫。時而忽消。肚內常叫。如在臟外皮內叫。服蘇荷湯。追其毒入臟內叫。從大便化下。再專用蘇荷湯酒一茶杯。同水久煨服。數劑而愈。仍戒葷鹽數日。每殼用茶油清水煮豆腐。加筍水一杯。泡飯喫。

藍姓婦。身有胎孕。兼得癲症。發則面赤喜笑無常。亦身出外人不能阻。用蘇荷湯去柴胡。生元板。決明。加生甘草。元參各一兩。田州三七二錢。一劑而愈。

莫姓婦。得羊癇症。作則連發一二日。眼白涎出。不省人事。兼之身有孕胎。用前方一劑而愈。

有癲狂而非蠱者

按大傷寒一症。實則火邪內鬱。脈強色厲。登高罵詈。狂呼躁擾。用蘇荷湯加減治之。亦可取效。若脈細無力。譖語撮空。尋衣摸席。此陽虛神脫之症。宜用附子肉桂熟地當歸川芎。山藥炙黃耆。炙甘草。首烏乾薑。枸杞。杜仲等味。加減治之。

中悶香癲蠱症

有頭熱如火。頭眩頭痛。心神煩躁。起坐一用心。則目昏暗。手軟。頸軟。嗜睡。臥時靜聽。其頭如一把火炎上。人昏嗜睡。得臥則暫愈者。又或頭不昏眩。並無別病。惟遍身發熱。口渴欲作吐。嗜睡。得臥則愈者。有頭痛。腦內有聲。口欲作吐者。三症俱宜戒葷鹽三四日。每殼用筍水一杯。沖清水同茶油。或芝麻油。煮

豆腐喫或煮菜喫必愈不用喫別藥屢驗。中毒輕者卽喫橙子。橄子。橘。柚。棠梨。李。一切水果隨喫隨愈。

經驗

宦家子得感冒症頭痛欲作吐。服蘇子。荆芥。陳皮。半夏。白芍。川芎。桔梗。茯苓。炙甘草。當歸。蒼朮。枳殼。蠶棗等藥加減不愈。延余治之。余診其兩尺脈微細無力。疑其寒邪伏於腎與命門。改用白朮。杜仲。炙黃耆。乾蠶首烏。當歸。川芎。茯苓。附子。炙甘草。肉桂。服藥一劑而口渴作躁。因用大熟地。連翹。生芍。條參。柴胡。生甘草。茯苓。桔梗。麥冬。服藥一劑而病略減。口不作嘔。並無別病。惟頭痛如故。腦內繫繫有聲。窮於治術。因囑其戒葷鹽。用茶油。清水。煮豆腐。加筍水一杯。煮滾。泡飯喫。次早卽愈。又如法喫二三日。遂全愈。

按感冒頭痛。則四肢必沉重。若中悶香毒。則氣力如常。只是頭痛頭眩。毒重則欲吐。又按有感冒頭痛欲作吐者。臥床上轉身不得。轉身則吐。方用陳皮一兩。蠶一塊。搗碎。水煨。滾服。卽愈。

腫蠱

腫蠱者。蠱俗謂之放腫。其病一也。有會走會移者。毒氣至手則手腫。至腳則腳腫。至頭則頭腫。肚內鳴叫。如在臟外叫。服解藥後。則追其毒入臟內叫。小便黃赤。大便祕結。有通身浮腫刺痛。肚大如鼓。火鬱於內。口出熱氣。小便黃赤。大便祕結者。有頭面浮腫。一耳常塞。大便祕結者。

一切腫症。果係中蠱。用蘇荷湯治之。一服病必大減。久服必愈。又凡腫與癲狂二蠱。病人夜不得安臥者。必用雄黃如前法。以禦外邪。服藥方效。

經 驥

同姓某通身浮腫。刺痛口出熱氣。腹大如鼓。肚臟外肚皮內叫。用蘇荷湯重劑加茯苓陳皮三七。用燒酒二兩。同水久煨服。服後皮內不叫。走入肚內鳴。俄而瀉下惡水數鉢。通身腫脹皆消。再服一劑即全愈。某氏年近六旬。得腫症。自腳腫上到頭。約三四個月。其戚囑伊喫煨蜈蚣一條。腫益甚。遍身冷極。口亦不渴。其子問予。予曰病者大便結祕否。內火盛否。其子答曰無也。予曰大便不結。內火不盛。則寒涼勿用也。方用紫蘇南荷。生首烏。川芎各五錢。白芷當歸各七錢。廣陳皮三錢。三七一錢。酒五錢。同水煨服。服藥後。即從脚消起。數劑自脚消至頭。復自頭趕下脚。惟脚膝下尚腫。冷極。後聽一女醫取草藥湯洗。停藥不服。未獲全功。若依此方加減。去紫蘇南荷。重加三七三錢。五茄皮。炙黃耆附子各五錢。木瓜。杜仲。白朮。炙甘草。熟地各三錢。懷牛膝肉桂木香各一錢。必可愈也。

有浮腫而非蠱者

盧生祖年七旬餘。手足頭面遍身浮腫。腹大如鼓。生亦知醫道。審係脾胃虛寒。氣血兩虛之症。方用大熟地當歸製首烏。炙黃耆。杜仲各一兩。炒山藥。焦朮。乾薑。枸杞各七錢。木瓜。五加皮各五錢。川芎。陳皮各三錢。炙甘草。肉桂各二錢。附子一兩五錢。鹿茸一錢。虎骨一錢。水煨服。十餘劑而愈。

按附子不可妄用。必要辨得果係命門無火方可。又或附子太多。咽乾無涎。煩躁不安。用生甘草五錢。水煨服。毒即解。或用生甘草一節。放入口嚼爛嚥之亦可。

疳蟲論

疳蟲者。又人謂之放蛋。又謂之放蜂。方書所謂金蠶蟲。大麻風。癩風者。卽疳蟲也。此千古不破之術。傳聞蠶俗於端午日。取蜈蚣與各小蛇。馬蟻。蟬。蝴蝶。頭髮等研末。其人常刻一小五蠶神像。在房內或箱內奉之。常將毒藥置於神前。若將蛇蟲等末放肉菜酒飯內。與人喫。則藥末粘於腸臟之上。初喫輕則肚略脹。肚微叫。乃藥未化也。如粥滾狀。如欲瀉狀。乃藥氣行也。而出恭仍結實。若受毒重。則肚痛。肚常鳴。毒氣沖上。或鼻內。如有一二蟲。或耳內。如有一蟲。臥則肚大鳴。如蛇翻狀。出恭漸少。或一日一次。或二日一次。出亦不多。人必瘦黑。久或靜坐。頭髮內如有蟻咬。以手搓之。則無。或夜臥靜聽。面上如蟲行。如髮纏。如蚤咬。或肉忽跳。或身上如蟻咬。搓之則無。或肛門如有小蟲。小蛆三四隻動。或身上如蝶行。或口旁如有涎。蚰蟲粘上。拭之又無跡可尋。或忽然一手麻極。一脚麻極。或半手麻極。半脚麻極。此皆蟲毒到處。則然。或初受毒不知。至一二月後。或因出外動作。或因洗身。或因靜坐於外。如有蜂飛來咬。靜聽片刻。身上如有數十蟻咬着。搓之則氣散不見。或受蟲毒重者。卽時肚痛。身上如有蚤咬。蟻咬。蝶行。此必喫着。又人蠶藥。但此蠶藥在內。治不得方。斷不瀉出。其藥化一點。染在臟腑之上。則藥氣行於週身。氣到處。卽如蟲咬。非真蟲也。氣降於肛門。則如蟲動。蛆動。氣隨屎出。非黑卽藍。亦有不黑藍而黃者。皆非真蟲也。至七八月。藥未化盡。肚鳴不歇。其氣沖上。如蛇翻狀。週身如蟲行。蟻咬。頂心髮極涼。如有蟲出入肉內。如有蟲行。蟻行。髮刺。蟬飛。小蜈蚣行。而蠶家平日所毒死之冤鬼。與其陰蛇陰蟲陰附之病者。如聞有飛。

集之聲。而旁人不聞者。一見風則更甚。如蟲出入毛孔鼻門。如有數十蟲均飛來集。甚則下陰脚底如蟻咬者。此皆藥氣行走於週身。非真蟲也。至此時則手脚麻木。週身如麻布通風。腠理毛孔皆開。或手指脚指扯開。或脣掀。或身上肉跳。或面起紫泡。又加以腫藥。則一耳常滿。一耳朵頭少焦紅厚。乃藥氣冲上也。又加以癩藥。則頭眩心昏。肚脹。凡中此蠱者。必要戒口。戒色。若不知戒色。小便一見白濁。則穢毒引入膀胱。變成五疳。則疳蟲先生於下部。兩內腎中。此時則實有蟲矣。早則數月。遲則兩三年。通身皮肉皆有崩塌。必死。若止知戒色。而不知藥方治服。小便雖未見白濁。終死於腫。此皆得之蠱醫之言。屢經驗者。

一疳蠱有在路上踏着者。或在山谷間感着者。踏着感着時。或打一冷顫。或昏迷倒地。或鼻血忽出。因而

上身者。究之外感者易治。惟喫着人蠱藥。則難愈。然踏着者十中一二。

一疳蠱身上如蟲行蟻咬。髮刺。或身上作癢。以手搔之。則皮爛出汁者。

一疳蠱有遍身如癬。腐爛塌損。面紅腳腫。眉毛脫落者。

一疳蠼有手指脚指腐爛塌損者。有毒在脚面脚底。腐爛塌損如蟲噬成窟者。

一疳蠼重時。有日發一次。夜發一次者。有日發二次。夜發二次者。發時則遍身如有蟲行走。或有蜂數百飛集者。

一疳蠼重時。毒氣走在頭。則如失其頭。走在手。則如失其手。走在脚。則如失其脚。毒氣在腦。則腦內有聲。

一疳蟲初服蘇荷湯方一二劑而頭面或通身發紅紫疹塊者多服十餘劑自愈。

一疳蟲有通身麻木肉大跳者。

一疳蟲有頭面上血忽開忽合者血開時其頭面如失去一半狀。

一疳蟲行時如有蜘蛛纏於空中或如有芭蕉絲纏於空中視之不見身行至其處靜聽其絲自斷者。

一疳蟲有通身生皮癬久而腐爛變疳者。

一疳蟲服解藥後病必大減或時而其病如失時而病忽翻者無妨但照方服藥戒口自然病退。

一疳蟲之症怪異多般不可盡述總之輕則蟲行蚤咬重則蛇行髮刺蟻咬蜂咬此則斷不可素者以
上諸症但審病人小便未曾見白濁用蘇荷湯治之或用加減蘇荷湯治之必愈若大便結祕者槐花加
至三兩。

一疳蟲或身上腐爛或下部玉莖旁溼爛外用槐花一兩白礬胆草各二錢煎水洗之週身雖如蟻蚤行
咬乃藥氣行走不必疑懼凡飲食起居同室之人斷不傳染。

一疳蟲甚時則心肺肝脾皆受傷帶黑氣週身之血皆被毒藥染黑故宜靜養服藥先瀉大腸脾胃之毒
氣後瀉肺肝心上之毒氣最後則週身血液瀝入肺肝心脾由肺肝心脾瀝入胃與大腸隨尿而出于是
臟腑復生惡血瀉盡新血充滿自愈而紫蘇薄荷尤爲要品二味皆殺蛇且表其毒氣出於外筍水亦殺
蛇但筍水止及腸胃而紫蘇殺荷二味追及心肺肝脾要之三味皆不可缺一者無力者每殮菜用茶油

或芝麻油煎開水放生紫蘇薄荷葉及筍水一茶杯同各品菜煮喫即是藥無生葉即取根梗煎水同筍水茶油煮菜喫亦妙若無紫蘇薄荷即用筍水煮菜喫亦驗又廣西田州三七尤爲治蠱要藥若無三七卽重用澤蘭鬱金各一兩代之

一紫蘇薄荷二味固治蠱要藥但性太發揚專服此二味因而實火炎上口舌牙根熱爛大便結祕則此二味暫停可用生地石膏連翹生芍條參茯苓天花粉生黃耆酒炒黃芩黃柏各五錢槐花二兩加燒酒一兩同水久煨服屢驗

一痈蠱服解毒敗毒發毒之藥則大便結祕者蓋蠱毒在身逢解藥則降下大腸毒甚者初出恭黑次出恭青次出恭藍或出恭有惡物如爛木耳者此乃身上之惡血隨腸臟瀝出也亦有服藥二三劑而瀉血二三日者病愈更速蓋蠱毒在身其毒氣週流通身之血皆黑服藥之後舊血瀉盡新血自生不足畏也亦有服藥月餘毒氣大減時而尿黃時而尿轉黑或藍者蓋惡血不瀉則尿黃惡血一瀉則尿藍惡血一點未淨則出恭尙時帶藍色然受毒雖極重依方持戒服藥至四五個月後尿雖不淨黃開驗近色無妨仍要服藥一二年無力者常將紫蘇薄荷茨菇菜三味煨水當茶喫可也又按亦有蠱毒雖極重而出恭仍黃者

一服藥將愈之時一遇飯殼通身發癢此乃飯氣到處新血與舊血戰也食畢氣靜如常此時齋戒鹽葷則然

一將愈之時。凡所食之物。出恭半不變。或肛門常脹者。此乃蟲毒將淨。不用服補藥。俟至食物全不變。則毒淨。或用補藥收功。以後出恭必黃。而病愈矣。

一凡出恭如有蟲三五隻隨恭出。視之不見者。其尿不黑則藍。否則必帶血絲。此乃毒藥之氣。非真蟲也。不必疑懼。

一凡蟲毒既淨。脾胃虛寒。宜服補藥。然既服補藥之後。時而大便結祕。蟲毒復翻。身上復有蚤蟻咬者。此乃餘毒未淨。仍取蘇荷湯。隨時加減。煨服可也。

一瘡蠱脚腫腐爛。照蘇荷湯。加鬱金。澤蘭各一兩。服藥後。惡血從爛處流出者。無妨。

一酒醉後。在酒中喫著蠶毒。肺肝心腫受毒太重。照方服藥。月餘。蠶毒既退。酒毒忽發。口舌熱爛。則筍水與蘇荷等暫停半月。宜用連翹。生黃耆。甘草。生地。柴胡。槐花。黃柏。黃連。元參。石膏等藥。加酒同水煨服。俟火退後。仍照前方調治。

一凡老幼喫着人瘡蠱多次。或因喫魚蛤腥物。而毒發於身。成癬者。或毒發於腳。成膿瘡者。或毒發于下部。溼熱潰爛者。或毒發於手背虎口。手指間。如疥瘡出汁。經年不愈者。或因喫馬肉發毒之品。表其毒出于鼻門。出汁者。或時而脚麻。時而肚痛。時而脚酸者。但果中其毒。人多瘦黑。身上必有如蚤咬蟲行。

一婦有中瘡蠱者。識者即爲提醒。彼亦不信。不知小人詭計百出。其包藏禍心。誠非易測。亦有付其藥與人以毒人者。又受此毒者。每有蠶家之冤鬼附之。故與之言別事。了然不迷。一語及其病。則偏疑爲天災。

又似得之數年前或十餘年者世有受此毒者但看與某編內之論病相合請照方戒口暫醫一月若病不減不信也可。

一中疳或一二三人或三五人同在一處受蠱藥或各在一處受蠱藥其一人受毒重者先發先發作二月或先發作半年諸人漸此方知者人或疑爲傳染此決不可信予蓋得之蠱醫之言兼歷試之于中蠱之人者至一切方書之論蠱論病者皆不得其詳不足信也。

一疳蠱受毒重時夜則身熱頭痛不得眠用雄黃安床四角又用雄黃研末二兩蒜子四斤生菖蒲一斤切碎三味同搗爛分作四大碗涼水泡之用粗碗蓋住兩碗安於病人床上內邊兩碗用獨凳兩隻放於病人床旁外邊將碗安凳上病人臥時則揭開上四粗碗其氣沖上邪不能侵但水浸藥味易敗或六日一換或十日一換所換之藥聚放一器留着病人房內時時用柴攪之其氣升騰邪不能侵。

一疳服藥後病必大減或時而如無病或時而病忽翻者無妨但照方服藥自然病退。

一中疳之人脾胃虛寒時常作泄作瀉則用溫補而兼行氣散血等藥熟地製首烏枸杞炙黃耆炙甘草生白芍白朮乾薑當歸附子茯苓蘇子川芎各五錢陳皮丁香木香肉桂三七各一錢水煨服亦可取效。

一中疳之人內有實火兼之咳血咳嗽則宜用滋陰而兼散血之藥連翹條參生白芍百合槐花青蒿生黃耆生首烏生甘草茯苓生元版麥門冬各三錢田州三七二錢西洋參一錢水煨服。

經驗

某生年近四旬中疳約一年手足常麻頂心髮涼如蟲出入肚常痛叫遍身如蟻咬或如蛇行頃刻不安面上常有髮纏夜臥靜聽其惡血所至肢體如失時而頭腦內有聲或如蜂飛來咬者出恭瀉血予詢其小便尙未白濁因授以蘇荷湯去決明生元板加五加皮大生地元參黃柏各五錢酒一兩同水久煨服每二日一劑服月餘並戒鹽病大減但時止時作至六個月忽然小便帶綠色予曰此腎經濁氣瀉下也照蘇荷湯加減服小便轉清踰年忽大瀉問補藥可喫否予曰服藥至十八個月甚毒已淨可補矣用大熟地製首烏杜仲當歸乾薑炒山藥白朮炒扁豆各五錢炙甘草丁香各二錢木香一錢水煨服方數劑驗但脾胃二經忽變虛寒之極以後每劑必加附子五錢肉桂二錢方收全功而蘇荷翹芍等發表寒涼之味毫不可犯矣

甘某夜往別村回半路忽然打一冷顫遍身麻木畏風怕寒通身肉跳時而如有蜂飛來咬以手搓之則無予舍親用蘇荷湯加燒酒一兩同水煨服初作吐再服遂大瀉其家人大驚欲打壞藥罐予舍親令其上床靜臥至次早其病十減七八舍親曰昨所服藥錢數太重一日兩劑服藥太急故吐瀉並作耳復如前方每日一劑一月而愈

按凡各蠱放在路上者人踏過則上身又聞蠱醫云放在路上之蠱秀才道士鬼師斷不能染惟放在茶酒菜肉內喫着則無可避耳

西鄉某人中瘡。身上如蟻咬。先用草藥煎水洗。而血聚成癥。如雲片者。但小便尙未白濁。後遇謝某。令服蘇荷湯數劑。其血癥移走無定處。疑而問予。予曰此乃蘇荷湯之藥力。追其毒降下大腸也。但照方多服。惡血瀉淨自愈。囑其依法戒口。復服十餘劑。血癥盡消。再服三個月而愈。

粟某年三十餘。遍身生牛皮癬。約二十年。遇夏秋則發。交冬則漸愈。其癬發痒時。如有百餘蚤蟲。聚於癬處。後因嗜飲酒。並喫鱠魚等物太多。至冬亦不愈。身上與兩手兩腿。皆腐爛變癩。大便結祕。少出。小便黃赤。通身發熱。夜臥不可蓋被。因而感冒作嗽。予詢其小便。尙未見白濁。則毒未曾傳至腎經也。蘇荷湯去首烏。決明。生元板。加茯苓七錢。生地一兩。每二日一劑。燒酒二兩。同水久煨。服七八劑。而爛平。囑其戒口。照方加減。數月而愈。

謝某中瘡數年。因喫馬肉。毒發于外。左右手指皮俱起小微泡。發痒。抓去微泡。則皮破。皮肉損傷。兩脚亦然。身上如蚤蟻咬。時而如有蜂飛集肚內。鳴叫。出恭結實。頭痛頸極熱。小便黃赤。用蘇荷湯加酒一兩。同水煨服。二劑。皮破處結疤矣。兩月而愈。

羅某年六旬餘。中瘡。惟左手有蚤蟻咬極多。頭上身上亦有。醫令喫狗肉。病愈重。夜不得臥。小便尙未白濁。授以蘇荷湯一劑。毒表于手背上。如紅雲片。大小十餘朵。再服二劑。通身皆發紅雲塊。而蚤咬蟻咬頗少。於是每二日一劑。復十餘劑。而紅血塊盡消。復三十餘劑。而蚤蟻咬俱無。但覺頭眩腰痛。此身上毒。將淨服涼藥太多。故腎寒腰痛耳。製用首烏。當歸。白芷。各一兩。乾薑。大熟地。炙黃耆。杜仲。炙甘草。川芎。百

合各五錢。丁香一錢。水煨服。二劑而愈。

章某年三十餘中。疳數年。身上如蚤蟻咬。俗醫用草藥湯淨洗。盡不愈。左脚指崩塌。落去二指。其脚腫皮厚。筋縮如蛇鱗。如雲片。舉步維艱。耳厚面紅。眉毛盡落。後遇舍親秦集大。詢其小便尙未白濁。用蘇荷湯治之。服藥一劑。其夜即得睡。次夜病翻重。不得睡。用雄黃蒜子二斤。如法安放。仍服前方。令戒口。戒色。自三月起至十月。全愈。脚筋復伸。眉毛復出。

按世必無癆風不可醫之證。其所云癆風者。卽中歹人之疳蟲耳。喫着蠭毒者。則從肚痛起。踏著蠭毒者。則從肉跳起。世之受毒者。果照此篇內服藥戒口。無有不愈。

覃某年三十餘中。疳數年。時醫用草藥湯洗。並針砭各法。皆不愈。又令將硫黃泡酒喫。日甚一日。面紅耳厚。遍身如癬。如紅雲朵。甚多。毒墜於下。左右兩脚青腫。每脚落一指。縮一指。時時流汁。身上如蟻咬。蚓行兩脚。更甚。後遇秦某。詢伊小便。未曾白濁。令戒色。戒鹽。戒口。用雄黃如法。以禦外邪。先用蘇荷湯。加三七二錢。酒水煨服。二劑。瀉下惡血。病漸輕。再服二劑。大便結祕。病翻重。蟻咬更多。夜不得臥。予謂恐火伏于內。宜純靜清涼之藥。改用生地。生芪。茯苓。生芍。連翹。條參。柴胡。元參。生甘草。茜草。各六錢。槐花。青蒿。決明子。各一兩。加燒酒二兩。同水久煨滾入田州三七末五錢。調勻服。每二日一劑。二劑頭面眼與下身發腫。而蚤蟻咬漸少。再服二三劑。腫消病減。又服藥四月而愈。

按脚爛處。用紫蘇。薄荷。茨菇。菜三味。煎水湯洗。後用此三味。烘乾研末。撒上爛處。亦不痛癢作咬。而汁

乾結疤矣。

潘某背心兩腿各生牛皮癬一塊。夏秋則發。冬則消。發時身如蚤蟻咬。背間更甚。予用蘇荷湯重加蘇荷二味各一兩五錢。燒酒二兩同水久煨服。其背上患處反痛極不癢。此藥氣追至受毒處也。再服十餘劑而愈。

閩客林某女。約八歲。兩臂兩腳身上皆生疳。皮膚塌損。如銅錢大者數十處。予視其必係胎毒。幸未傳至腎經。用蘇子。南荷。柴胡。白芷。槐花。青蒿。連翹。條參。白芍。當歸。生地各二錢。元參。金銀花。田州三七。各一錢。加燒酒五錢。同水久煨空心服十餘劑而愈。

一小孩纔一歲。左耳根常腐爛出汁。脚生一瘡。既結疤復爛出汁。口舌蝕爛似屬胎毒。用蘇子。南薄荷。生黃耆。川芎。白芷。百合。桔梗。槐花。青蒿。澤蘭。鬱金。生甘草。生首烏。五加皮。連翹。當歸。各一錢。燒酒一錢。同水煨服。二劑而愈。乳母仍戒口十日。凡小孩頭面生瘡毒似瘡出汁服此方經驗。

陳某夫妻皆生疥瘡。兩年餘纏綿不愈。其妻兩脚已腐爛變瘡。其夫通身及手足亦皆似疥非疥似瘡非瘡。難於舉步。詢小便尙未白濁。用紫蘇。薄荷。生黃耆。青蒿。當歸。川芎。槐花。白芷。連翹。條參。白芍。生地。各五錢。元參。茯苓。各三錢。黃柏二錢。加燒酒一兩。同水煨服。各五劑而愈。

有先中蠭而後兼咳血者。

龔某中瘡數月。通身蟲行蟻咬。手脚時而麻極。有楚人授以黑藥末。用雞蛋同豬油炒熟。研生韭菜汁。和

勻夜搽身上。晨起皮內出蟲如蠶大脚多如百脚蟲形。每早床上得蟲數百。有吳某者。不問其詳。概以平日酒風病醫之。治以炙黃耆桂枝補血去風之藥。遂變爲咳血咳嗽神昏。狂言謔語。大便少出。危極。予詢其小便尙未白濁。但旣吐血。則蘇荷自宜暫停。囑伊飲食間宜親自檢點。防左右有歹人暗加蠶毒。則藥難取效。方用槐花決明子百合青蒿各一兩。生地六錢。元參一條。參連翹白芍貝母黃柏生甘草各五錢。三七三錢。水煨服。一劑卽得出恭。狂言咳血俱止。再服四劑。則如無病矣。但身上癢尙未全愈。又兼兩脚風痛。蓋此人平時亦有脚痛病。予改用殺蛇解蠶去風止痛等味。方紫蘇南薄荷各七錢。生黃耆柴胡各六錢。白芍一條。參連翹各五錢。生地元參黃柏各三錢。田州三七二錢。茜草三錢。加燒酒一兩。同水久煨服。數月而愈。

有先咳血而後中蠶者

某生年二十餘。先得陰虛咳嗽之症。內有實火。服藥年餘。忽得蠶症。腹內痛。身上如蚤蟻咬。用紫蘇薄荷等發表藥以治蠶。則實火愈盛。仍然咳血。兼之遺精。欲專用純靜清涼之藥。以治陰虛火盛之病。則蠶毒復作。予診其脈。惟腎與命門肝經有實火。囑伊戒口。用大生地一兩。女貞子槐花地骨皮天門冬各五錢。知母六錢。元參青蒿決明子田州三七各一兩。茜草桑白皮柴胡生黃耆各三錢。連翹麥門冬去心各二錢。黃柏六錢。水煨服。蠶毒仍不退。後每劑加田州三七一兩。此味乃殺蛇解蠶之藥。數服而病大減。但藥重價昂。五日服一劑。服五個月。而蠶病愈。忽又變通身發熱。如火嗜臥。恐又中別毒。囑伊戒葷鹽五六日。

每殮用茶油或芝麻油同清水煮菜加筍水一茶杯煮熟飯喫數日愈仍照原方服藥月餘而蟲毒已淨虛火未退因用清補之味大生地元參條參枸杞白朮生首烏當歸桑白皮生白芍各三錢服十餘劑全愈越半年忽變脾胃虛寒後用十全大補湯加減服大熟地製首烏杜仲炒白朮炒山藥炙黃耆枸杞當歸附子茯苓生白芍各五錢炙甘草陳皮丁香川芎肉桂各一錢服十餘劑遂收全功

有內寒無火而兼中蟲者

有婦人年四十餘脾胃虛寒常服桂附參茸歸耆地朮蘆棗木瓜虎骨等藥酒忽中疳身上如有蚤咬蟻行夜臥不安肚常痛而大便仍溏泄予用十全大補湯加減治之大熟地製首烏炙黃耆乾薑陳皮炒白朮各三錢杜仲當歸川芎白芷炙甘草各五錢茯苓白芍木香丁香各二錢蘇子附子各五錢水煨滾入肉桂末一錢攪勻服之二劑而愈

有內有實火蟲毒雖退實火炎上者

某生素患陰虛常服滋陰清涼之藥後因飲酒中毒酒醉已極蟲毒甚重生蛇陰蛇顛腫疳五毒兼受遍請蠶醫服藥不效命在頃刻夜不得臥垂危之至予令買雄黃四斤如法掛床四維復研雄黃末四兩同蒜子四斤生菖蒲一斤碓爛分作四碗用涼水泡之安置於床之四角上用四粗碗蓋住病人臥則揭開上四粗碗其氣沖上邪不能染每十日一換夜得安臥復囑戒葷戒鹽戒色用茶油或芝麻油同清水煮豆腐加筍水一茶杯無筍水則將筍同豆腐清水煮滾泡飯喫詢其小便尙未見白濁毒未傳至腎經

因授以蘇荷湯去生元版加生地元參各六錢水煨服月餘蠱毒大退酒毒忽發實火炎上口舌熱爛大便祕結改用槐花二兩青蒿生黃耆柴胡生首烏連翹生白芍生地各七錢元參黃柏條參天門冬決明子知母生甘草酒炒黃芩茯苓各五錢加酒二兩同水久煨服藥十餘劑而病愈越四個月方開葷鹽以後不得犯酒一飲酒則病翻惟煨藥必用酒同水煨服收效更捷一遇病翻實火炎上大便祕結口舌熱爛必用後一方加減服十餘劑方驗

有脾土虛而兼中蠱者

某生年二十餘中瘧蠱惟下半身如蚓行蚤咬脾土素屬虛寒兼有心痛症不受寒涼之劑而心肝肺三經又有微火亦不受熱劑予用加減蘇荷湯不用生薑水煨服十餘劑蠱症及心痛俱愈惟脾胃虛寒常常作瀉而心與肝仍有微火因改用熟地附子炙黃耆酒炒白芍焦朮炙甘草製首烏炒山藥各五錢乾薑一兩廣陳皮白芷各二錢當歸三錢丁香木香各一錢水煨服數十劑而愈

有中蠱餘毒未淨忽變瀉痢者

某生中瘧蠱愈後餘毒未盡實火炎上口舌熱爛常服槐花生白芍連翹生黃耆柴胡茯苓黃柏知母元參條參生地等味酒水同煨服一二年忽變瀉痢下部寒甚上部有火口舌熱爛兩尺脈無力脾胃虛寒扁豆炒山藥杜仲各三錢豆蔻丁香木香各一錢水煨服數劑而愈前十味逐脾腎命門之寒生白芍

茯苓清心肝之火。丁香木香溫中散寒。止瀉痢殺蟲。

按凡中蠱愈餘毒未淨犯一切寒痢症。有全用桂附。薑朮。烏芎歸甘陳。丁木香等味者。有肉桂不可用。止用附子。薑朮。烏甘陳。丁香。茯苓。白芍者。有附子不可用。止用肉桂。甘陳。薑朮。烏芎歸丁香。吳萸。茯苓。白芍者。有桂附不可用。止用甘薑。朮。烏山藥。白芷。陳皮。丁香。川芎者。有用桂附不用茯苓白芍者。總之因人隨時加減。原不可泥。又按中蠱餘毒未淨。感冒頭痛。四肢沉重。作嘔作吐。口不渴者。多係虛寒。照前方加當歸五錢。川芎二錢服。經驗。若先感暑而後感寒。服前方一劑。既去其寒。即宜服清熱之藥。

按疳蠱一證。有七八年小便未白濁者。有終身小便未白濁。並不服藥戒口。亦無妨者。有一二年小便白濁者。其受毒必重。

按凡中疳。喫著人蠱毒者居多。出外踏著者十中一二。但蠱毒在路上踏著。何以上身蓋蠱家。平日所毒死之人。人死則其鬼受役於蠱家。其蠱毒放在路上。必有冤鬼守之人。踏過則重者必昏迷一刻。輕者亦打一冷顫。乃冤鬼與惡蛇之邪氣附於其人身上。所以通身麻木肉跳。或如蚤蟻咬。或如蜂咬。或如風走竄。不知持戒服藥。則邪氣日進。正氣日減。故受毒者。小便未白濁。必宜服發散藥。如紫蘇。薄荷。川芎。柴胡。生薑等味。是也。必宜服解毒藥。如連翹。甘草等是也。必宜服殺蠱藥。如槐花。青蒿等是也。必宜服殺蛇藥。如三七。白芷。丁香。木香。紫蘇。薄荷等是也。必宜服清熱藥。如生地。天門冬。元參。連翹。條參。槐花。青蒿。決明。

子生黃耆黃柏知母茯苓生芍等是也必宜服降氣藥如紫蘇薄荷木香陳皮藿香等是也必宜服滲降藥如茯苓澤瀉等是也必宜服消腫藥如紫蘇薄荷生白芍條參連翹等是也必宜服散血行血藥如蘇木生首烏當歸茜草鬱金三稜莪朮澤蘭五加皮等是也斷不可喫補藥恐補其邪氣深入而不出然亦有不可泥者或其人脾胃虛寒大便溏泄或腹寒作痛命門無火宜大補氣血如熟地炙黃耆製首烏炒山藥當歸杜仲焦朮乾薑附子肉桂等以治其本兼用蘇子丁香木香三七澤蘭五加皮鬱金三稜莪朮陳皮白芷茯苓生白芍等味以治其標可也。

又按凡被蛇咬毒復入內照蘇荷湯加木香丁香各二錢燒酒一兩同水煨空心服必愈。

一中疳身癩外用苦棟樹皮椿樹皮搗爛同浮萍加鹽一撮煎水洗甚驗。

變疳論

按中疳蟲受毒既重不知持戒小便一見白濁遂變五疳先從下部左右兩內腎腐蝕生蟲後至皮外場損腐爛生蟲而蟲毒在身一見風來如有羣蟲飛集通身如髮刺蟲咬到此時則五臟受傷一切發表之藥斷不可喫一切發毒之物斷不可喫亦不可服補藥然亦難挽回矣。

擬中疳既變疳後所用藥品

大生地 槐花 元參 條參 連翹 百合 白芍 青蒿 茜草 決明子 澤瀉 茯苓 花粉
黃連 麥門冬 桔子 黃柏 丹參 川貝母 知母 三稜 天門冬 龍胆草 莪朮 犀角

茯神 黃芩 羚羊角 生洋參 生首烏 地骨皮 大熟地 金銀花 車前子 廣西田州三
七 大黃大便祕結者一錢加此味一錢

以上諸品皆可酌用。倘若病人脾胃虛寒，不能受寒涼等味，在用藥者，因人隨時變通斟酌，加減，神而明之可也。

經驗

有婦人年四十餘，中疳，受病既重，不知持戒，小便已見白濁。予徒不問其詳，令單用紫蘇薄荷二味，煨湯服。伊又誤燒狗骨泡酒喫，忽然病大翻重，通身如有蟲咬，兩鼻孔內如有兩蛇出，伸舌皓面顫，手指腳指，如有蟲出入，兩肩兩脅腰間足膝處處皆有蟲行，蝴蝶夜臥床上，如有千萬蟲驚懼昏迷，眼自想，如有火星閃躍，自思其頭如腳盆大，其身如穀圓大，身常冷顫，喜近火，頃刻難安。予曰：小便已見白濁，腎經必生疳蟲，不得復用蘇荷等發表之物，仍要戒鹽戒色戒口，或可醫也。用槐花、青蒿、決明子各一兩，生白芍、生地、元參、連翹條參各八錢，茯苓、黃柏、知母各六錢，田州三七二錢，加燒酒一兩，同水久煨，空心服，服十餘劑，病遂大減。月餘變紅白痢，此乃惡血瀉下也。已無蚤蟻咬，但肚常痛，肚內心頭常有物翻攪，時而作咬。予照原方加三七、三稜、莪朮各三錢，酒同水煨服。至九月，腎經疳毒已盡，惟蠭毒未愈。十月，內喫發表等藥，照前方加紫蘇、薄荷、五加皮，當歸、川芎、生首烏、甘草各七錢，木香二錢，服數月而病全愈。

聞蠱家用竹葉放水中。同蠱藥浸之。卽變泥鰌魚。煮與客喫。食畢肚內脹滿。如有泥鰌三五條行走。痛不可忍。時而冲上喉嚨。時而走下肛門。大便不通。不知治必死。

附石頭蠱論

聞蠱俗將石頭一塊。放於路上。結茅標一二个人行過。則石跳上人身。或入肚內。初中肚內。硬實作痛。至三四个月。則會動。肚鳴。大便結祕。人漸瘦黑。時而此石飛入兩手。時而飛入兩脚。痛不可忍。不出三五年。其人必死。

附篾片蠱論

聞蠱俗將竹篾一片。約四五寸。放於路上。人行過。則此篾跳上脚腿。痛不可忍。久則此篾入于膝蓋。脚漸小如鶴膝。不出四五年。其人必死。又或篾跳上身。肚內作痛。如蛻蟲在肚內翻攪。痛不可忍。走下肛門。則作服欲出。恭亦不出。如有小刀在肛門。不上不下。不知醫。數日卽死。

以上三症得之風聞。未及親見。或用加減蘇荷治之必愈。

附鴉片烟四耗論

一鴉片烟耗神。凡人夜喫鴉片烟。則通宵不寐。乃神散也。夫晝作夜息。人之常情。然或先天稟賦健旺。夜亦少眠者。神足也。或良朋聚談。通宵不眠者。神喜也。或事變之來。寢不安枕者。神驚也。或氣血虛寒。心腎不交。或火熾痰鬱。陽亢於陰。夜不得寢者。神脫也。乃本倦而欲眠。竟強以鴉片烟提升之。使其神散而不

聚不得成寢。此乃助長之病。其初似亦無損。至其浸久。神愈散。則人愈弱。以夜爲晝。而躁動不安。俾晝作夜。而長寢不起。百事廢弛。職由此乎。

一鴉片烟耗氣。凡人之生。皆陰陽二氣周流於一身。無時或息。乃喫鴉片烟者。烟之氣增一分于身上。則我身之元氣減一分。烟之氣增五分于身上。則我身之元氣減五分。久之則烟氣勝。元氣少。遂變烟痢。故半日不得喫烟。則淚流涕出。腰間如雞啄。如針刺。頃刻不安。三日不得喫烟。則臘癩不止。百藥不效。得喫烟。則稍止。其所以瀉痢者。元氣脫也。元氣既脫。惟借烟氣以提升之。薰灼之。得喫烟。則稍止也。然雖稍止。究之客氣日勝。正氣揩亡。欲求如不喫烟者之自適也。得乎。

一鴉片烟耗精。凡喫鴉片烟之人。精液消耗多。不育子。至上癰既久。變成烟痢。停一日不得烟喫。夜臥則精液從小便流出。不止。得烟喫。則稍愈。除烟。則百藥不效。此非烟之能把持乎。精液也。蓋得烟之氣。則提其精液上行。而精液內耗。猶可暫延。不得烟之氣。則元氣已經剝削。精液自脫。下流而不止也。夫至於精液日涸。不亦危矣乎。

一鴉片烟耗血。凡人一身血脈健旺。則顏色光潤。若喫鴉片烟之人。漸久。則陽縮。而顏色青血虧也。再久。則痺作。而顏色黑。血枯也。又久。則四肢筋縮。如龜鱉形。血消已盡。不能養筋也。至於四肢筋縮。則精亡。血涸。雖生如死矣。況血既消耗。肺枯蟲生。多變勞瘵。咳嗽。至其甚時。喉內蟲欲出不出。終日咳嗽不止。此時一日不得烟喫。則命在頃刻。卽時時不斷烟。亦不過苟延旦夕耳。尙忍言哉。尙可問哉。

按鴉片烟既有四耗。則壽必不長。而喫烟之人。亦未見遽死者何也。蓋既上癮之後。惟以烟爲命。祖宗財產皆不顧恤。至家產既盡。不顧品行。凡可以得烟者。無不爲之。或計窮智屈。烟無所出。不得已而勉強戒烟。任其淚流涕出。瀉痢遺精。或間日以生烟少許。泡水喫。以稍止其癮。或以烟屎泡水喫。以止其癮。從此忍烟。至年餘。雖我身之元精正氣。漸漸復充。而烟癮之發。瀕死者已數十次矣。外人不知。遂以爲吸烟無害。亦安知此中之閱歷苦楚乎。況戒烟一方。惟強壯之年。方能行之。若老年血氣既衰。烟癮又深。卽重用人參。白朮。炙黃耆。懷山藥。肉桂。附子等味。以補其氣。鹿茸。鹿膠。當歸。首烏。龜膠等味。以補其血。熟地。枸杞。菟絲子。牛膝。蒺藜等味。以補其精。虎骨。五加皮。杜仲等味。以壯其筋肉。蔻扁豆。吳萸等味。以止其痢。麥冬。連翹。條參。白芍。甘草。茯苓。犀角。玉竹。百合等味。以殺蟲降火。解毒而止嗽。亦難挽回也。戒之哉。凜之哉。

又鴉片烟對日對時。連喫三日。則上癮者何也。凡人之元氣。周流於一身者。若日月之行於天焉。晝夜不息。如本日亥時。其氣行至尾閭。此時喫烟。則提其氣上行。而尾閭之真氣減一分。明日亥時。其氣復行至尾閭。此時又喫烟。則尾閭之真氣又減一分。又明日亥時復喫烟。則尾閭之真氣又減一分。於是真氣已虧。至其時不得喫烟。則尾閭酸脹。坐臥不安。蓋真氣已空。又無烟氣以充之也。舉一時言。其餘可以類推。

今世俗之吸烟。昉自明天啓間。其時守邊士卒多中寒死。非烟不治。故嚴禁之亦不止。今則三尺童

子皆視吸烟爲常事矣。然未有如鴉片之流毒深也。凡私販鴉片之人曰賣土。曰買土。吸食鴉片之具曰烟鎗。曰墩。曰炮。語已不經。至吸食有一定時刻。稍遲即性命懸于呼吸。一似暗設機械。以束縛吾民之肢體。豈不痛哉。夫時俗之好尚。人心係焉。凡今日果刀布幣器皿顏色之屬。無一不以稱洋者爲居奇。卽鴉片亦美之曰洋烟。吾不知再閱數百年後。鴉片亦如今世之吸烟。竟不足爲怪耶。抑天不惠此民。將耗盡其脂膏骨髓而後已耶。布衣野老。蓋有不敢言不忍言者矣。姑就見聞所及。作鴉片四耗論。以附路氏治蠱新方後。俾天下知鴉片之毒。不異于蠱。而鄙人所論。亦庶幾治蠱之新方焉。此則區區所厚望者矣。道光乙未九日澄江漁者書。



素女方

撰人不詳

本館據平津館叢書本排印初編各叢書僅有此本

素女方

素女方序

素女方一卷見隋書經籍志其名不載漢藝文志然卽神仙家黃帝雜子十九家方二十卷之一也其書自宋不傳鄭樵通志藝文略載其目亦僅蹈襲前志隋唐猶有傳本王贊取入外臺祕要卷十七中云出古今錄驗真古書也書稱黃帝與素女高陽負問答述交接之禁忌敍四時之藥物以爲房中却病之術云凡經方神仙所造蓋古人方藥傳授有本配合君臣佐使皆按陰陽五行若遇俗醫加減用之卽有偏重之弊治疾所宜慎擇且文句有韻以逆爲迎以知爲愈皆古字古義審非後人僞作恐傳寫既久或有脫誤及鄙俗字悉仍舊文不敢更改房中之術古有傳書容成務成堯舜陰道俱一家之學班氏所云樂而有節則和平壽考迷者弗顧以生疾而隕性命誠哉斯言予旣刊黃帝古書又刊此以備亡佚古書之一種不獨後之志藝文者可增其目亦足資養生之助云千金翼方卷五云行房法一依素女經婦人月信斷一日爲男二日爲女三日爲男四日爲女以外無子每日午時夜半後行事发生子吉餘時生子不吉亦此書佚文并附于序嘉慶十五年九月廿八日孫星衍撰于安德道署之平津館

素女方

黃帝問素女曰。男子受氣陰陽俱等。男子行陽常先病耳。目本其所好。陰痿不起。氣力衰弱。不能強健。敢問療之道。素女曰。帝之所問。衆人同有陰陽爲身。各皆由婦人。天年損壽。男性節操故不能專心貪女色。犯之竭力。七傷之情。不可不思。常能審慎。長生之道也。其爲疾病。宜以藥療之。今所說犯者七。第一之忌。日月晦朔。上下弦望。六丁之日。以合陰陽。傷子之精。令人臨敵不戰。時時獨起。小便赤黃。精空自出。天壽喪身。第二之忌。雷電風雨。陰陽晦暝。振動天地。日月無精光。以合陰陽。生子令狂癲。或有聾盲瘡瘍。失神或多忘誤。心意不安。忽常喜驚悲憂不樂。第三之忌。新飽飲食。穀力未行。太倉內實。五藏防響。以合陰陽。六腑損傷。小便當赤。或白或黃。腰脊疼痛。頭項寄彊。或身體浮腫。心腹脹滿。毀形夭壽。天道之常。第四之忌。新小便精氣微弱。榮衛不固。衛氣未散。以合陰陽。令人虛乏。陰陽氣閉。絕食無味。腹脹滿結。怫鬱不安。忘誤或喜怒無常。狀如癲發。第五之忌。作事步行。身體勞。榮氣不定。衛氣未散。以合陰陽。藏氣相干。令人氣乏。喘息爲難。唇口乾燥。身體流汗。穀不消化。心腹脹滿。百處酸疼。起臥不安。第六之忌。新息沐浴。頭身髮溼。舉重作事。流汗如雨。以合陰陽。風冷必傷。少腹急痛。腰脊疼痛。四肢酸疼。五藏防響。上攻頭面。或生漏瀝。第七之忌。共女語話。玉莖盛彊。以合陰陽。不將禮防。氣腠理開。莖中痛傷。外動肌體。內損腑藏。結髮塞耳。目視眊眊。心中怵惕。恍惚喜忘。如杵春膈。欬逆上氣。內絕傷中。女絕痿弱。身可不防。犯此七篇。形

證已彰。天生神藥療之有方。

黃帝問高陽負曰。吾知素女明知經脈藏腑虛盈。男子五勞七傷。婦人陰陽隔閉。漏下赤白。或絕產無子。男子受氣陰陽同等。其病緣由。因何而起。故欲問之。請爲具說。對曰。深哉問也。男子五勞六極七傷。病皆有元本由狀。帝曰善哉。七傷之病。幸願悉說。對曰。一曰陰汗。二曰陰衰。三曰精清。四曰精少。五曰陰下濕癢。六曰小便數少。七曰陰瘻。行事不遂。病形如是。此謂七傷。黃帝曰。七傷如是。療之柰何。對曰。有四時神藥。名曰茯苓。更生者茯苓也。春秋冬夏。療隨病形。冷加熱藥。溫以冷漿。風加風藥。色脈胗評。隨病加藥。悉如本經。春三月宜以更生丸。疗男子五勞七傷。陰衰消小囊。下生瘻。腰背疼痛。不得俛仰。兩膝臍冷。時時熱癢。或時浮腫。難以行步。目風淚出。遠視眊眊。欬逆上氣。身體痿黃。遶臍弦急。痛及膀胱。小便尿血。莖痛損傷。時有遺瀝。汗衣赤黃。或夢驚恐。口乾舌彊。渴欲飲水。得食不常。或氣力不足。時時氣逆。坐犯七忌。以成勞傷。

此藥主之。甚驗方。

茯苓	四分。若不消食。	菖蒲	四分。若耳聾。	山茱萸	四分。若身瘻。	括樓根	四分。若熱渴。
兔絲子	三分加一。若瘻洩。	牛膝	四分。若機闕不利。	赤石脂	三分加一。若內傷。	續斷	四分。若有痔。
細辛	四分。三分加一。若目眊眊。	防風	四分。三分加一。若風邪。	署預	四分。三分加一。若陰濕。	巴戟天	四分。三分加一。若痿弱。
蛇床子	四分。三分加一。若少氣。	柏實	四分。加倍。若少力。	天地黃	七分。三分加一。若頑熱。	天雄風	四分。炮。若有冷癧。
遠志皮	四分。三分加一。驚恐不安。	石斛	四分。加倍。若體疼。	續斷	四分。加倍。若有痔。	杜仲	四分。三分加一。若絕陽腰。
						蕤蓉	四分。加倍。若冷癧。

右二十味搗篩蜜和丸如梧桐子大先食服三丸日三不知漸增以知爲度亦可散服以清粥飲方寸匕七日知十日愈三十日餘氣平長服老而更少忌豬羊肉鴟冷水生菜蕪荑等物又黃帝問曰夏三月以何方藥幸得具聞對曰宜以補腎茯苓丸療男子內虛不能飲食忽喜忘悲憂不樂恚怒無常或身體浮腫小便赤黃精泄淋瀝痛絞膀胱脛疼冷痺伸不得行渴欲飲水心腹脹滿皆犯七忌上已具記當療之法隨病度量方用如左

茯苓食不消
加倍 附子炮
加一
各二兩 山茱萸三分加一
身癢 杜仲腰痛
分加一
牡丹腹中游氣
加一
各二兩 澤瀉有水氣
分加一
三分 罂預頭風
加一倍
細辛目視暗曠
加一
各三兩 石斛二兩
陰溼癰
三分加一 桂心顏色不足
三分加一
桂心三分加一
身癢 黃耆四兩
體疼
三分加一

右十二味搗篩蜜和丸如梧桐子先食服七丸日二服忌生葱生菜豬肉冷水大酢胡荽等物又黃帝問曰春夏之療已聞良驗秋三月以何方藥對曰宜以補腎茯苓丸療男子腎虛冷五藏內傷風冷所苦令人身體濕痒足行失顧不自覺省或飲食失味目視暗曠身偏拘急腰脊痛強不能飲食日漸羸瘦胸心懊悶欬逆上氣轉側須人起則扶昇鍼灸服藥療之小折或乘馬觸風因房室不自將護飲食不量用力過度或口乾舌燥或流涎出口或夢寤精便自出或尿血尿有淋瀝陰下痒濕心驚動悸少腹偏急四肢酸疼氣息噓吸身體浮腫氣支胸脅醫不能識妄加餘療方用如左

茯苓三

防風

桂心

白朮

細辛

山茱萸

署預

澤瀉

附子炮

紫苑各二兩

牛膝三兩

芍藥

丹參

黃蓍

沙參

蓴蓉乾薑

元參

人參

苦參

獨活各二兩

右二十二味搗篩蜜和丸如梧子食前服五丸臨時以酒飲下之忌酢物生葱桃李雀肉生菜豬肉薰
荑等

又黃帝問曰春夏秋皆有良方冬三月復以何方治之對曰宜以垂命茯苓丸療男子五勞七傷兩目眩
暎得風淚出頭項等彊不得迴戾心腹脹滿上支胸脅下引腰脊表裏疼痛不得喘息飲食欬逆面目痿
黃小便淋瀝清精自出陰痿不起臨事不對足脛酸疼或五心煩熱身體浮腫盜汗流離四肢拘攣或緩
或急夢寤驚恐呼吸短氣口乾舌燥狀如消渴忽忽喜忘或悲憂嗚咽此藥主之補諸絕令人肥壯彊健
氣倍常飲食百病除愈方

茯苓

白朮炮

澤瀉

牡蒙

桂心

牡蠣熬

牡荆子

署預

杜仲

天雄炮

人參

石長生

附子

乾薑

菟絲子

巴戟天

蓴蓉

山茱萸

甘草炙

天門冬各二兩去心

右二十味搗篩以蜜和丸如梧子先食服五丸酒飲皆得忌海藻菘菜鯉魚生葱豬肉酢物等
又黃帝問曰四時之藥具已聞之此藥四時通服得不對曰有四時之散名茯苓散不避寒暑但能久服
長生延年老而更壯方用如左

茯苓

鍾乳

研

雲母粉

石斛

菖蒲

柏子人

菟絲子

續斷

杜仲

天門冬

心去

五味子

牛膝

澤瀉

遠志心

甘菊花

蛇床子

署預

天雄

炮

山茱萸

乾地黃

石韋毛

茺蔚分並等

右二十二味擣篩爲散以酒服方寸匕日再二十日知三十日病悉愈百日以上體氣康彊長服八十九十老公還如童子忌醉物羊肉鷄鯉魚豬肉蕪荑等

高陽負曰凡經方神仙所造服之療病具已論訖如是所擬纔從開闢以來無病不治無生不救也並古今出

錄驗二十
五卷中