

要而切當言病證之換易狀
皆形見於脈按之弦長洪縮
博濶伸引無盡者師嘗云此
脉者理也至若有蟲也體用
一源顯微世間得其理則家

可得而推矣是吾師有不言
言輒有此是編相符合非口
詒辨說紙上陳言不能施用
者比然則人之詒句順真轉
順時却病与醫家迥流窮源
不拘執古方而收功者舍是
奚觀焉夫吾師合生氣之和
道五常之性使疾疢不犯而
世妖祲短折歟死於扶傷令六
合咸寧蓋世收賴非古聖王

亨嘉之致治乎聖王之世即

喙息蠕動之細莫不率仰太

和沐浴玄澤矣焉師彈厥心

里以較讐是編濯疾煦寧如

沐浴而謂身至康強子孫遂

吉曰壽曰康寧曰考終者是

編之効也考師弗自秘藏以

公諸人不止一身行之欲人

人行之又以天下萬世乃

不止一方蒙澤欲舉以蒙澤

又慕千世億世蒙澤也。吾師
素魚無窮。志吾師心思之而


流而精神之而聚也。不肖門

敢序但忝衣鉢之傳若太史
公六巖穴之人欲砥行立名

非附青雲之士忍能夸施後
生則序之。鄙意云爾

至元丙子三月上巳門人羅

天臺百相書



蘭室秘藏目錄

卷之一

飲食勞倦門

飲食所傷論

勞倦所傷論

調中益氣湯

寬中喜食無厭丸

交泰丸

木香人參生薑枳术丸

木香乾薑枳朮丸

扶脾丸

和中丸

換擲丸

消積滯集香丸

黃芪湯

黃芪當歸湯

參朮湯

益智和中丸

益胃散

脾胃虛損論

三黃枳朮丸

巴豆三稜丸

白朮丸

草豆蔻丸

中滿腹脹門

中滿腹脹論

諸腹脹皆屬於熱論

中滿分消丸

中滿分消湯

廣茂瀆堅湯

半夏厚朴湯

破滯氣湯

草豆蔻湯

心腹痞門

消痞丸

失笑丸

黃連消痞丸

消痞湯

葶藶丸

卷之二

胃脘痛門

艸豆蔻丸

神聖復氣湯

麻黃豆蔻湯

酒客病論

葛花解醒湯

枳朮丸

半夏枳朮丸

橘皮枳朮丸

除溼益氣丸

除溼散

升麻黃連丸

上二黃丸

爪帶散

消渴門

消渴論

和血益氣湯

當歸潤燥湯

生津甘露湯

辛潤緩肌湯

甘草石膏湯

甘露膏

生津甘露飲子

眼耳鼻門

諸脈者皆屬於目論

內障眼論

芳辛湯

碧天丸

廣大重明湯

百點膏

選奇湯

神効明目湯

羌活退翳膏

明目細辛湯

復明散

助陽和血湯

吹雲膏

防風飲子

撲雲湯

神効黃芪湯

圓明內障升麻湯

黃芩黃連湯

蔓荆子湯

歸葵湯

救苦湯

熟乾地黃丸

益陰腎氣丸

羌活退腎丸

當歸龍膽湯

補陽湯

瀉陰火丸

升陽柴胡湯

溫衛湯

圓明膏

噙藥麻黃散

療本滋腎丸

加味滋腎丸

退腎膏

龍膽飲子

柴胡聰耳湯

羌活退腎湯

還晴紫金丹

麗澤通氣湯

溫肺湯

禦寒湯

卷之三

頭痛門

頭痛論

清空膏

徹清膏

川芎散

白芷散

碧雲散

羌活清空膏

清上瀉火湯

補氣湯

細辛散

羌活湯

養神湯

安神湯

半夏白朮天麻湯

口齒咽喉門

口齒論

羌活散

升豆蔻散

麻黃散

麝香散

治蠅散

益智木律散

蝎梢散

白牙散

刷牙藥

獨聖散

當歸龍胆散

牛牙地黃散

細辛散

立効散

牢牙散

清胃散

神功丸

桔梗湯

又方

神驗法

嘔吐門

丁香茱萸湯

白朮湯

補肝湯

吳茱萸丸

衄血吐血門

麥門冬飲子

人參飲子

麻黃桂枝湯

黃芪芍藥湯

三黃補血湯

救脉湯

止衄血法

腰痛門

川芎肉桂湯

獨活湯

破血散瘀湯

地龍散

蒼朮湯

麻黃復煎散

緩筋湯

拈痛湯

蒼朮復煎散

羌活蒼朮湯

壯本丹

加味青義丸

加味補陰丸

經閉不行有三論

經漏不止有三論

升陽除濕湯

涼血地黃湯

酒煮當歸丸

固真丸

烏藥湯

助陽湯

水府丹

丁香膠艾丸

黃芪當歸人參湯

當歸芍藥湯

柴胡調經湯

益胃升陽湯

升陽舉經湯

半產悞用寒涼之藥論

全生活血湯

當歸附子湯

調經補真丸

坐藥龍鹽膏

勝陰丹

迴陽丹

柴胡丁香湯

延胡苦練湯

桂附湯

人參補氣湯

黃芪白朮湯

白朮茯苓湯

增味四物湯

補經固真丸

溫衛補血湯

立効散

四聖散

溫經除濕湯

補氣升陽和中湯

麻黃桂枝升麻湯

大便結燥門

大便結燥論

通迷湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽湯

活血潤燥丸

潤腸湯

蘭室秘藏卷之一

元 鎮州 東垣李 晟明之 撰

明 吳郡 立齋薛 已新甫 較

飲食勞倦

飲食所傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府渾論云
陰氣者靜則神藏燥則消亡飲食自倍腸胃乃傷此
乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之
氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則為喘

嘔為腫滿為水瀉。輕則當發汗利小便使上下分消其溼解。醒湯、五苓散生姜半夏枳實白朮之類是也。如重而畜積為滿者。芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之。此其治也。食者物也。有形之血也。如生氣通天論云。因而飽食。筋脉橫觸。腸澼為痔。又云。食傷太陰厥陰。寸口大於人迎兩倍三倍者。或嘔吐。或痞滿。或下痢。腸澼當分寒熱輕重而治之。輕則內消。重則除下。如傷寒物者。半夏神麴乾薑三稜廣木巴豆之類主之。如傷熱物者。枳實白朮青皮陳皮麥蘖黃連大黃之類主之。亦有宜吐者。陰陽應象論云。在上者因而越之。爪節散之屬主之。然而不可過劑。過劑則反傷。腸胃益先因飲食自傷。又加之以藥過。故腸胃復傷。而氣不能化食愈難消矣。漸至羸困。故五常正大論云。大毒治病。十去其六。小毒治病。十去其七。凡毒治病。不可過之。此聖人之深戒也。

勞倦所傷論

調經篇云。陰虛生內熱。岐伯曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。而胃氣熱。氣薰胸

中故內熱舉痛論云勞則氣耗。勞則喘且汗出。內外皆越。故氣耗矣。夫喜怒不節。起居不時。有所勞傷。皆損其氣。衰則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢。故困熱無氣以動。惱於語言。動則喘乏。表熱自汗。心煩不安。當病之時。宜安心靜坐。以養其氣。以甘寒瀉其熱火。以酸味收其散氣。以其溫補其中氣。甘經言勞者。溫之。損者溫之。是也。金匱要略云。平人脉大為勞。脉極虛亦為勞矣。夫勞之為病。其脉浮大。手足煩熱。春夏劇。秋冬差。脉大者熟邪也。極實者氣損也。春夏劇者時助邪也。秋冬差者時勝邪也。

以黃氏建中湯治之。此亦溫之之意也。夫上古聖人飲食有節。起居有常。不妄作勞。形於神俱百歲乃去。此謂治未病也。今時之人。去聖人久遠。則不然。飲食失節。起居失宜。妄作勞役。形氣俱傷。故病而後藥之。是治其已病也。推其百病之源。皆因飲食勞倦。而胃氣元氣散解。不能滋榮百脉。灌漑臟腑。衛護周身之所致也。故蒼天之氣貴清靜。陽氣惡煩勞。噫飲食喜怒之間。寒暑起居之際。可不慎歟。

調中益氣湯

治因飢飽勞役損傷脾胃元氣不足其脉弦洪緩而沉按之中之下得時一澀其症四肢滿悶肢節疼痛難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味腹難舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便澀滯或夏月餐泄米穀不化或便後見血或便見白膿胸滿短氣咽膈不通痰唾稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安臥不思飲食並皆治之

橘皮

如腹中氣不轉運加末
香一分如無此証不加

黃藥

酒洗已上各二分

升麻

此一味為上氣不足胃氣與脾氣下流乃補上氣從陰引陽

柴胡

已上各三分

人參

有嗽者去

炙甘草

蒼朮

已上各五分

黃芪

一分

如是頭熱燥是下元陰火蒸然發也加生地黃

二分黃藥三分

如大便虛坐不得或大便了而不了腹中常逼迫皆是血虛血澀加當歸身三分無此證則去之如身體沉重雖小便數多亦加茯苓二分黃藥分

澤瀉五分蒼朮一錢時暫從摧而去溼也不可常用兼足太陰已病其脉亦絡於心中故頭溼熱相合而生煩亂

如胃氣不和加湯洗半夏五分生姜三片有嗽者

加生姜生地黃二分以製半夏之毒

如痰厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾邪所作也

如兼燥熱加黃蘖生地黃各二分

如無已上證只服前藥

右件剉如麻豆大都作一服水二大盞煎去粗稍熱食遠服之寧心絕慮靜坐少踏藥必為効耳

如夏月湏加白芍藥三分

如春月腹中痛尤宜加

如惡熱而渴或腹痛者更加芍藥五分生黃芩分

如惡寒腹痛加中桂三分去黃芩謂之桂枝芍藥

湯亦於前藥中加之

如冬月腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也只加乾

薑二分或加半夏分七以生姜少許製之

如秋冬之月胃脉四道為衝脉所逆脇下少陽脉二道而反上行名曰厥逆其証氣上衝咽不得息而喘息有音不得卧加吳茱萸湯洗去苦五分至一錢觀厥氣多少而用之亦於前藥中作一服之如夏月有此証為大熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以

黃連 酒洗

黃蘖 酒浸

知母 酒浸已上各等分

右為細末熟湯為丸如梧桐子大每服一百丸或二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時

便以美食壓之使不令胃中停畱直至下元以鴻衝脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損誑也常宜以甘溫平之甘多辛少是其治也

寬中喜食無厭丸一名寬中進食丸

資形氣喜飲食

木香 五分

青皮

人參

乾生薑

已上各一錢

炙甘草 一分

錢

白茯苓

澤瀉

梅榔

橘皮

白朮

已上各二錢

縮砂仁

猪苓

已上各二錢

枳實 四錢

艸豆蔻仁 五錢

神鞠 分炒 五錢

半夏 七錢

大麥蘖麵 一兩
炒

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每服三十五丸米湯下食遠服

交泰丸

升陽氣寫陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠惰嗜卧四肢沉困不收

乾姜

炮製三分

巴豆霜 五分

人參 去蘆

肉桂

去皮已上各一錢

柴胡 去苗

小椒 炒去汗并開閉目及子

白朮

已上各一錢

厚朴 去皮炒三分

白朮苓

秋冬加七分

苦練

酒煮

縮砂仁

已上各三錢

阜角

水洗煨去皮弦六錢

知母

四錢一半酒炒一半酒洗春夏用秋冬去之

川烏

四錢五分
炮製去皮臍

黃連

減一錢去鬚七錢秋冬

吳茱萸

湯洗七次五錢

紫菀

去苗六錢

右除巴豆霜別研外同為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九溫水送下食遠虛實加減

木香人參生姜枳朮丸

開胃進飲食

乾生姜 三分 三錢

木香 三錢

人參 三分 三錢

陳皮 四錢

枳實 一兩 炒

白朮 一兩 五錢

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服三

五十丸溫水下食前

木香乾姜枳朮丸

破除寒滯氣消寒飲食

木香 二錢 乾姜 五錢炮

枳實 一兩炒

白朮 一兩

五錢

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服三

五十丸溫水送下食前

扶脾丸

治脾胃虛寒腹中痛溏瀉無度飲食不化

乾生姜 一兩

肉桂 五分

乾薑

藿香

紅豆 一錢

已上各

白朮

茯苓

橘皮

半夏

荊子皮

炙甘草

烏梅肉

已上各

大麥蘖 炒

神鞠 各四錢

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服五

十九白湯送下食前

和中丸

補胃進食

人參

乾生薑

陳皮

已上各
一錢

乾木瓜

炙甘艸

三錢

右為細末湯浸餳餅為丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下食前

換擗丸

破滯氣消飲食

炙甘草

一錢

木香

人參

擗擗

已上各

陳皮

五錢

右為細末湯浸餳餅為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下食前

消積滯集香丸

治傷生冷硬物不消

京三稜

廣茂

青皮

陳皮

丁香皮

益智

川練子

茴香

已上各

巴豆

和皮米炒

焦五錢

右為細末醋糊為丸如菉豆大每服五十丸溫水
生姜湯任下食前服

黃芪湯

補胃除溼和血益血滋養元氣

木香

氣通去之

藿香葉

已上各

當歸

酒洗

澤瀉

已上各

陳皮

二錢已上各

人參

酒洗

澤瀉

已上各

黃芪

一兩

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞如欲汗加
生姜煎食遠熱服之

黃芪當歸湯

治熱上攻頭目沿身胸背發熱

當歸身

一錢酒洗

黃芪

五錢

右㕮咀作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

參术湯

治脾胃虛弱元氣不足四肢沉重食後昏悶

黃芩

酒洗

當歸

已上各

人參

酒洗

升麻

已上各三分

陳皮

已上各七分

青皮

已上各五分

神鞠末

七分

炙甘草

蒼朮一錢已上各

黃芪二錢

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠服

益智和中丸 李秋合

木香

黃連

生地黃

黃芪

人參

麥門冬

神鞠末

當歸身

乾生姜

陳皮

姜黃

已上各五分

縮砂仁七分

桂花一錢

桂枝

一錢五分

益智仁二錢

炙甘草二錢

麥蘖麵

三錢

艸豆蔻仁四錢

右為細末湯浸餳餅為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下細嚼亦得

益胃散

治因服寒藥過多以致脾胃虛損胃脘疼痛

人參

甘草

姜黃

厚朴已上各二錢

白豆蔻

縮砂仁

乾生姜

澤鴻已上各三錢

益智仁六錢

黃芪

陳皮七錢

右為麩末每服三錢水二盞生姜五片煎至一盞

去粗食前溫服

脾胃虛損論

陽水張先生常戒不可峻利。食藥下咽未至藥丸施化其標皮之力始開便言快也。所傷之物已去若更待一兩時辰許藥盡化開其藥峻利必有情性病去之後脾胃既損是真氣元氣敗壞。矧人之壽當時說下一藥枳實一兩。麩炒黃色為度。白朮二兩只此二味荷葉裹燒飯為丸。以白朮甘溫甘溫補脾胃之元氣。其苦味除胃中之溼熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實魁化之藥一倍。枳實味苦寒泄心下之痞悶消化胃中所傷。此一藥下胃其所傷不能即去。須待一兩時辰許食則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣。當是之時未悟用荷葉燒飯為丸之理。老年味之始得可謂奇矣。荷葉之物中央空虛象震卦之體震者動也。人感之生足少陽。甲膽也。膽者風也。先生化萬物之根蒂也。左傳云立端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽甲胆之氣也。其手少陽三焦經人之元氣也。手足經同法便是少陽元

氣生薑也。胃氣穀氣元氣甲胆上升之氣一也。異名雖多。此是胃氣上升者也。荷葉之體生於水土之下。出於污穢之中。而不為汙穢所染。挺然獨立。其色青。形乃空。清而象風木者也。食藥感此氣之化。胃氣何由不上升乎。其主意用此一味為引用。可謂遠識深慮。合於道者也。更以燒飯和藥。與白朮協力滋養穀氣而補令胃厚。再不至內傷。其朴廣美大矣。若內傷脾胃。以熱之物。酒肉之類。自覺不快。覓藥於醫者。亦不問所傷。付之集香丸、小丁香丸、巴豆大熱藥之類下之。大便下辛。

則物去。遺留食之熱性藥之熱性。重傷元氣。則七神不職。經云熱傷氣。正謂此也。其人必無氣以動而熱。即四肢不舉。傳變諸病。不可勝數。使人真氣自此衰矣。若傷生冷硬物。世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之。隨物藥下。所傷去矣。遺留食之寒性藥之寒性。重瀉其陽。去則皮膚筋肉血脉無所依倚。便有虛損之證。論言及此。令人寒心。夫辛辣薄味之藥。無故不可亂服。非止牽牛而已。至真要大論云。五味入胃。各先逐其所喜。攻者冠伐鴻也。辛味下咽。先攻薄肺。

之五氣者真氣元氣也其牽牛之辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃受邪當以苦泄其腸胃可也肺與元氣何以罪之○有夫牽牛大罪有五此其一也况胃主血所生病為所傷物者有形之物也皆是血病○物不可用者其氣其罪二也且飲食傷之於中焦止合尅化消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸胃當塞因塞用又曰寒因寒用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉真氣犯大禁四也殊不知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃

氣必死悞補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反瀉五臟必死悞補亦死其死也陰氣有餘故躁今內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也雖不即死若更旬日之間必暗損人壽數謂如人壽應百歲為牽牛之類朝損暮損其元氣消耗不得終其天壽但人不覺耳將為天年已盡此乃暗裏折人壽數故特著此論并方庶令四海聞而行之不至夭橫耳老夫之用心也○胃氣不可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者

亡。水去則榮散。穀消則亡。榮散衛亡。神無所依。仲景云。

衛

水入於經。其血乃成。穀入於胃。脈乃大行。故血不可不養。胃不可不溫。血溫胃和。榮衛將行。常有天命。穀者身之大病也。書與周禮皆云。金木水火土。穀惟脩以奉養五臟者也。內傷飲食固非細事。苟妄服食藥而輕生弱命。其可乎哉。黃帝鍼經有說。胃惡熱而喜清冷。大腸惡清冷而喜熱。兩者不和。何以調之。岐伯曰。調此者。食飲衣服亦欲適寒溫。寒無淒愴。暑無汗。飲食者。熱無灼。寒無淒。倉寒溫中適。故氣將。不

致邪僻也。是必有因用。豈可用俱寒俱熱之藥。倉卒致損。與以刃傷人者何異。內經說內傷者。其氣口脉反大於人迎一倍。二倍。三倍。分經用藥。又曰。上部有脈下部無脉。其人當吐。不吐者死。如但食不納。惡心欲吐者。不問一部。倍二部。不當正與。爪帶散吐之。但以指或以物探去之。若所傷之物去不盡者。更診其脉。問其所傷。以食藥去之。以應塞因塞用。又胃之寒因泄而下降。乃應太陰之用。其中更加升發之藥。令其元氣上升。塞因通用。因曲而為直。何為曲。內傷胃氣。

水去則榮散。穀消則亡。榮散衛亡。神無所依。仲景云。水入於經。其血乃成。穀入於胃。脈乃大行。故血不可不養。胃不可不溫。血溫胃和。榮衛將行。常有天命。穀者身之大病也。書與周禮皆云。金木水火土。穀惟脩以奉養五臟者也。內傷飲食固非細事。苟妄服食藥而輕生弱命。其可乎哉。黃帝鍼經有說。胃惡熱而喜清冷。大腸惡清冷而喜熱。兩者不和。何以調之。岐伯曰。調此者。食飲衣服亦欲適寒溫。寒無淒愴。暑無汗。飲食者。熱無灼。寒無淒。倉寒溫中適。故氣將。不

致邪僻也。是必有因用。豈可用俱寒俱熱之藥。倉卒致損。與以刃傷人者何異。內經說內傷者。其氣口脉反大於人迎一倍。二倍。三倍。分經用藥。又曰。上部有

脈下部無脉。其人當吐。不吐者死。如但食不納。惡心

欲吐者。不問一部。倍二部。不當正與。爪帶散吐之。但以

指或以物探去之。若所傷之物去不盡者。更診其脉。問其所傷。以食藥去之。以應塞因塞用。又胃之寒因泄而下降。乃應太陰之用。其中更加升發之藥。令其元氣上升。塞因通用。因曲而為直。何為曲。內傷胃氣。

是也。何為直。因而升發胃氣是也。因其飲食之內傷而使生氣增益。胃氣寬復。此乃因曲而為之直也。若分經用藥。其所傷之物。寒熱溫涼。生硬柔軟。所傷不一。難立之一法。只隨所傷之物不同。各立法治。臨時加減用之。其用藥。又當問病人從來稟氣盛衰。所傷寒物。熱物是喜食之邪。不可服。破氣藥。若乘飢困而食之。邪當益胃氣。或為人所勉勸。強食之。宜損血。而益氣也。診其脉候。傷在何臟。可與對病之藥。豈可妄瀉天真生氣。以輕喪身寶乎。且如先食熱物而不傷。繼之以寒物。因後食致前食亦不消化而傷者。當問熟食寒食。孰多孰少。斟酌與藥。無不當矣。喻如傷熱物二分。寒物一分。則當用寒藥二分。熱藥一分。相合而與之。則榮衛之氣必得周流。更有或先飲酒而後傷寒冷之食。及傷熱食冷。冷水與冰。如此不等。皆當驗其節次所傷之物。約量寒熱之劑。分數各。對証與之。無不取効。自忖所定藥方。未敢便謂能盡。性之理。藥始用。指迷辨惑耳。

治傷肉溼麵辛辣味厚之物填塞悶亂不快

枳實

五錢
炒

黃連

去頭
酒洗

大黃

溼紙
裹煨

神麴

炒

橘皮

白朮

已上各
兩

黃芩

二兩

右為極細末湯浸餳餅為丸如菉豆一倍大每服五十九白湯下臨時量所傷多少加減服之

巴豆三棱丸

一名木香見現丸

治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜

五分

木香二錢

升麻

柴胡已上各

草豆蔻

熟用
麵裹煨

香附子

炒已上各
仁

神麴

炒黃
色

石三棱

去皮
煨

京三棱

炒已上各
一兩

右為細末湯浸餳餅為丸如菉豆一倍大每服二十九溫白湯下量所傷多少加減服之

白朮丸

治傷豆粉溼麵油膩之物

白朮

拈三
分

黃芩

五錢

橘皮

七錢

神麴

炒黃
色

半夏

湯洗
七次

白朮

已上各
一兩

枳實

一錢
炒

枳實

黃色
一兩
錢

右為極細末湯浸餅為丸如菉豆大每服三十五丸白湯下素食多用乾姜故加黃芩以瀉之

艸豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛上支兩脇咽膈

不通

- | | | | |
|----|----------|-----|-------------|
| 炒鹽 | 五分 | 乾生姜 | 青皮 |
| 橘皮 | 已上各 | 麥蘖麵 | 炒黃 |
| 半夏 | 湯洗
七次 | 生黃芩 | 冬月
不用 |
| 枳實 | 炒
二兩 | 神麴 | 炒已上
各五錢 |
| | | 白朮 | 已上各
一兩 |
| | | 草豆蔻 | 麵裹煨去
皮取仁 |

右為極細末湯浸餅為丸如菉豆大每服五十

丸白湯下

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云太陰所至為中滿太陰所至為畜滿

諸溼腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同溼土

之化脾溼有餘腹滿食不化天為陽為熱主運化也

地為陰為溼主長養也無陽則陰不能生化故云藏

寒生滿病調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱

中末傳寒中。皆由脾胃之氣虛弱。不能運化精微而制水穀。聚而不散。而成脹滿。經云。腹滿脹。支膈胠腸。下厥上冒。遇在太陰陽明。乃寒溼鬱遏也。脈經所謂胃中寒。則脹滿者是也。鍼經三卷。腹滿大便不利。雜病第八。

上走胸溢。喘息喝々然。取足少陰。又云。脹取三陽。三陽者。足太陽寒水為脹。與通評虛實論說。脹暴滿按之不下。取太陽經絡。胃之募也。正同。取者瀉也。經云。中滿者瀉之於內者是也。宜以辛熱散之。以苦瀉之。淡滲利之。使上下分消其溼。正如開鬼門。潔淨府。溫衣繆刺其處。是先瀉其血絡。後調其真經。氣血平。陽布神清。此治之正也。或曰。諸脹腹大。皆屬於熱者何也。此乃病機總辭。假令外傷風寒有餘之邪。自表傳裏。寒變為熱。而作胃實腹滿。仲景以大承氣湯治之。亦有膏梁之人。溼熱鬱於內。而成脹滿者。此熱脹之謂也。大抵寒脹多而熱脹少。治之者宜詳辨之。

諸腹脹大。皆屬於熱論

諸腹脹大。皆屬於熱。此乃入益之邪。有餘之証。自天外而入。是感風寒之邪。傳裏。寒變為熱。作胃實。日晡

潮熱大渴引飲讞語是太陽明并大實大滿者大承氣下之少陽明微滿實者小承氣下之泄之則脹已此之謂也假令痰癰為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕而癰病作矣知其寒也局方用文解飲子者是也內虛不足寒濕令人中滿及五臟六腑俱有脹瀉更以脈家寒熱多少較之胃中寒則脹滿濁氣在上則生脹脹脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也正同腹滿脹脹肢膈胠脇下厥上胃過在太陰陽明胃中寒溼鬱過也太陰脹脹後不利不欲食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其氣下焦如瀉氣血自然分化不待泄溼穢如或太實太滿大小便不利從掩以寒熱藥下之或傷酒溼麵及味厚之物膏粱之人或食已便助使溼熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分消丸主之

如或多食寒涼及脾胃久虛之人。胃中寒則脹滿或藏寒生滿病。以治寒脹。中滿分消湯主之。

中滿分消丸

治中滿熱脹鼓脹氣脹水脹此非寒脹類

白朮

人參

炙甘艸

猪苓

去黑皮

姜黃

已上各一錢

白茯苓

去皮

乾生薑

砂仁

已上各二錢

澤瀉

橘皮

已上各三錢

知母

炒四錢

黃芩

去腐炒夏用一兩二錢

黃連

淨炒

半夏

湯洗七次

枳實

炒已上各五錢

厚朴姜製

右除茯苓澤瀉生姜外共為極細末入上三味和勻湯浸餳餅為丸如梧桐子大每服一百丸焙熱白湯下食遠服量病人大小加減

中滿分消湯

治中滿寒脹寒疝大小便不通陰燥足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿服中寒心下痞下焦燥寒沉厥奔豚不收

川烏

澤瀉

黃連

人參

青皮

當歸

生薑

麻黃

柴胡

乾姜

華澄茹

已上各

益智仁

半夏

茯苓

吳茱萸

升麻

已上各

黃芪

大香

厚朴

艸豆蔻仁

黃藥

已上各

五分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞食前熱服忌房室酒溼麵生冷及油膩等物

廣茂瀆堅湯

虛腫

廣茂

紅花

升麻

吳茱萸

已上各

生甘草

柴胡

澤鴻

神麴

青皮

陳皮

已上各

厚朴 生用

黃芩

黃連

益智仁

艸豆蔻仁

當歸

稍已上各

半夏

七分

如渴加

葛根

四分

右剉如麻豆大水二大盞煎至一盞稍熱服食遠
忌酒醋溼麵服二服之後中滿減半其有積不消

再服後藥

半夏厚朴湯

紅花

蘇木

已上各五分

吳茱萸

乾生薑

黃連

已上各一分

木香

青皮

已上各二分

肉桂

蒼朮

白茯苓

澤瀉

柴胡

陳皮

生黃芩

草豆蔻仁

生甘草已上各三分

京三稜

當歸梢

猪苓

升麻已上各四分

神鞠六分

厚朴

八分

半夏一錢

桃仁七箇

昆布

少許

如渴加

葛根

三分

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服此

藥二服之後前証又減一半却於前藥中加減服

之

破滯氣湯 一名木香化滯湯

破滯氣治心腹滿悶

炙甘草

四分

白擅

藿香

陳皮

大腹子

白豆蔻仁

白茯苓

桔梗

已上各

砂仁

人參

青皮

橘榔

木香

姜黃

白朮

二錢

右咬咀每服三錢水一盞煎至一盞去粗溫服不拘時

草豆蔻湯

治腹中虛脹

澤瀉

一分

木香

三分

神曲

四分

半夏

製

枳實

草豆蔻仁

黃芪

春夏去之

益智

甘草

五分

各

青皮

當歸

七分

陳皮

已上各

茯苓

右為龜末都作一服水二大盞生姜三片煎至一
盞去粗溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥
食遠

心腹痞門

消痞丸

治心下痞悶一切所傷及積年不愈者

乾生薑

神曲炒

炙甘草已上各二錢

猪苓

二錢

澤鴉

厚朴

砂仁

已上各五分

半夏湯洗

陳皮

人參

已上各四錢

枳實炒五錢

黃連

淨炒已上各六錢

黃芩

已上各六錢

姜黃

白朮

一兩已上各

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每服五七

十九至百丸白湯送下食遠服

失笑丸

消痞丸一名枳實

治右關脉弦心下虛痞惡食惱倦開胃進飲食

乾生姜

一錢

炙甘草

二錢

麥蘖曲

白茯苓

一錢

白朮

二錢

半夏曲

人參

已上各三錢

厚朴

四錢

枳實

黃連 已上 各
五錢

右為細末湯浸餅為丸梧桐子大每服五七十

丸白湯下食遠服

黃連消痞丸

治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

澤瀉

姜黃 已上 各
一錢

乾生姜 二錢

炙甘草

茯苓 已上 各
三錢

白朮 已上 各
三錢

陳皮

猪苓 已上 各
五錢

枳實 七錢

半夏

九錢

黃連 一兩

黃芩 二兩

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每服五十丸溫湯下食遠

消痞丸 一名末香
化滯丸

治困憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思

飲食

枳實 炒

當歸梢 已上 各
二分 陳皮

生姜

木香 已上 各
三錢

柴胡 四錢

艸豆蔻

炙甘草 已上 各
五錢

半夏 一錢

紅花

少許

右為粗末作一服水二錢生姜三片煎至一盞少

遠服忌酒濕麵

葶藶丸 一名人參
順氣飲子

治心下痞胸中不利

半夏 洗 厚朴 炙

石膏

青皮 已上各 當歸身 七分

白豆蔻仁

縮砂

五分

茵陳 酒製

乾葛

已上各一錢

炙甘草

羌活

黃芩

一半酒洗

苦葶藶

人參

柴胡

獨活 已上各三錢

右為細末湯浸餳餅和勻歸子內擦如米大每服

二錢臨卧一口湯下

蘭室祕藏卷三

胃脘痛門 消渴門 眼耳鼻門

海圖書會

索書號碼_____

登記號碼 404711

蘭室秘藏卷之二

元 鎮州 東垣李杲明之撰

明 吳郡立齋薛已新甫校

胃脘痛門

草豆蔻丸

治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇
冬腎與膀胱寒水旺時子能令弓實以致肺金大
腸相輔而來尅心乘脾胃此大復讐也經云大勝
必大復理之常也故人毛血脉分肉之間元氣已

絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳
鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦
痛大惡風寒目時眩不欲開腹中為寒水反乘痰
唾沫食則反出腹中常痛心胃作痛肠下縮急
有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕
或腹中鳴此脾胃虛之至極也胸中氣亂心煩不
安而為霍亂之漸咽膈不通極則噎塞有聲喘喝
閉塞或於日陽處或於暖室中少緩口吸風寒之
氣則復作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可
以回顧小便澀而時燥此藥主之秋冬寒涼大復
氣之藥也

- 神鞠末 柴胡詳腸下痛 姜黃已上各多少用之 白芷已上各四分
- 當歸身 青皮已上各六分 益智仁
- 人參
- 陳皮
- 半夏已上各一錢洗 甘草生六分 白僵蚕已上各八分 潤澤鴻小便數減半
- 炒豆蔻仁度一錢四分 麥蘖麵分炒一錢五分 桃仁七箇湯浸去皮尖
- 右除桃仁別研如泥餘為細末同研勻湯浸餌餅

為丸如梧桐子大每服五七十丸白湯下食遠服
神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之旺子能
令母實手太陰肺實反來尅土火木受邪腰背胸
膈閉塞疼痛善嘔口中涎目中泣鼻中流濁涕不
止或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒
如冰頭作陣痛目中溜火視物眩耳聾耳鳴頭
并口鼻大惡風寒喜日晴暖痘卧不安常覺痰塞
咽喉不通口不知味兩脇縮急而痛牙齒動搖不
能嚼物臍腹之間及尻臀足膝不時寒冷前陰冷
而多汗行步欹側起居艱難麻木風痺小便數氣
短喘喝少氣不足以息遺失無度及婦人白帶陰
戶中大痛牽心面色黧黑男子控睾痛牽心腹或
面色如赭食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急
腹不能努或腸鳴腋下筋急肩胛大痛此皆寒水
來復火土之讐也

乾姜 炮

黑附子

炮已上各三分

防風

人參

郁李仁

另研上各五分

當歸身

六分酒洗

半夏

湯洗

升麻

已上各
七分

藁本

已上各

甘草

已上各
八分

柴胡

已上各
三分

羌活

已上各
一錢

白葵花

五朵去
心剪碎

右件都作一服水五大盞煎至二盞入黃芪一錢
橘紅五分草豆蔻仁一錢麵裹煨熟去皮一錢同
煎至一盞再入下項藥黃藥三分酒浸黃連三分
酒浸枳殼三分生地黃三分酒洗此四味預一日
另用新水浸又以華絢辛二分川芎細末三分蔓
荊子三分作二處浸此三味并黃藥等煎正藥作
一大盞不去粗入此所浸之藥再上火同煎至一
大盞去粗熱服空心又能治嘔逆齒齦唇舌根強
硬等証如神忌肉湯宜食肉不助經絡中火邪也
大抵腎元與膀胱經中有寒氣不足者並宜服之
於月生月滿時食隔三五日一服如病急不拘時
候

麻黃豆蔻丸

治客寒犯胃心胃大痛不可忍

木香

青皮

紅花

厚朴 已上各

蘇木 三分

草澄茄 四分

縮砂仁

黃芪

白朮

升麻

半夏 湯洗

麥蘖麵

陳皮

去白

柴胡

炙甘艸

吳茱萸

炒二錢

麻黃

不去節三錢

草豆蔻仁

五錢

當歸身

已上各五分

益智仁

八分

右為細末湯浸餳餅為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下或細嚼湯下亦可

酒客病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其溼何酒病之有今之酒病者往服酒癥丸大熱之藥下之又有牽牛大黃下之是無形元氣受病反下有形陰血垂悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之况亦損腎水真陰及有形陰此俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰四是謂元氣消亡十神何依折人長命雖不即死而虛損之病成矣金匱要略云酒疽

下之久為黑疽慎不可犯此戒不若令上下分消其溼當以葛花解醒湯主之

葛花解醒湯

木香 五分

人參 去蘆

豬苓 去黑皮

白茯苓

橘皮 已上各

澤瀉 已上各

乾生姜

神鞠 炒

白朮 錢五分

蓮花青皮

縮砂仁

白豆蔻仁

葛花

已上各

右為極細末和勻每服三錢七白湯調下但得微

汗酒病去矣此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損人天命

枳朮丸

治痞消食強胃

枳實

炒黃一兩

白朮 二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如棗豆一倍大每服五十丸白湯下不拘時候量所傷多少加減服之

半夏枳朮丸

治因冷物內傷

半夏湯洗七次一兩

枳實
麸炒黃色

白朮
已上各二兩

右三味為極細末荷葉裹燒飯為丸如菉豆一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

橘皮

枳實

麸炒黃色

白朮各一兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菉豆一倍大每

服五十丸白湯下量所傷加減服之

除溼益氣丸

治傷溼麵心腹滿悶肢體沉重

紅花三分

蘿蔔子

炒熟五錢

枳實

黃色

麸炒

黃芩生用

神鞠色

炒黃

白朮

已上各一兩

右同為細末荷葉裹燒飯為丸如菉豆一倍大每

服五十丸白湯下量所傷加減服之

除溼散

治傷馬齒子并牛羊酪水一切冷物

甘艸 炙

紅花 已上各

半夏 湯洗

七次

乾生姜 已上各

車前子

澤鴻 已上各

五錢

茯苓

七錢

神鞠 炒黃色

升麻黃連丸

治多食肉口臭不欲聞其穢惡氣使左右不得近

白檀 二錢

生甘艸 三錢

生薑

取自然汗

蓮花青皮

升麻

已上各

黃連

去鬚一兩

黃芩

去腐酒洗二兩

右為極細末湯浸餅為丸如彈子大每服一丸
細嚼白湯下食後

上二黃丸

治傷熱食痞悶兀：欲吐煩亂不安

甘草 二錢

升麻

柴胡 已上各

黃連 酒洗一兩

黃芩 二兩

一方加

枳實 五錢

右為細末湯浸餅為丸如菉豆大每服五十丸

白湯下食遠

治傷冷飲者以五苓散每服二錢三錢七加生姜煎服之

治傷食兼傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺悶身重食不化者或小便不利煎去桂五苓散依前斟酌服之

爪
蒂
散

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂下部無脉此謂木鬱也飲食過飽填塞胸中胸中者太陰之分野經曰氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱則達之吐者是也

爪
蒂
赤
小
豆
已上各等分

右二味為極細末每服二錢七溫漿酒調下取吐為度若不至兩手尺脉絕無不宜便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止是胸中壅塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥吐之解云盛食填塞於胸中為

之空塞兩寸。脈當主事。兩尺脈不見其理。安在。胃中有食故以吐出之。食者物也。物者坤土也。是足太陰之號也。胸中者肺也。為物所填。肺者手太陰金也。金主殺伐也。與坤土俱在於上而旺於天。金能尅木。故肝木生發之氣伏於地下。非木鬱而何。吐去上焦陰土之物。木得舒暢。則鬱結去矣。食塞於上。脉絕於下。若不明天地之道。無由達此至理。水火者陰陽之徵兆。天地之別名也。故曰獨陽不生。獨陰不長。天之用在於地下。則萬物生長矣。地

之用在於天上。則萬物收藏矣。此乃天地交而萬物通也。此天地相根之道也。故陽火之根本於地下。陰水之源本於天上。故曰水出高源。故人五臟主有形之物。者陰也。陰者水也。右三部脉主之。偏見於寸口。食塞其上。是絕五臟之源。絕則水不下流。兩尺竭絕。此其理也。何疑之有。假令所傷前後不同。以為率。傷熱物二分。傷生冷硬物一分。功用寒藥三黃丸二停。熱藥巴豆三黃丸一停。合而服之。如熱物傷少。而寒物傷多。則寒藥少而熱。

藥多也。假令夏月大熱之時，傷生冷硬物，當用熟藥巴豆三棱丸治之。湏加三黃丸，謂天時不可伐。故加寒藥以順時令。若熱物只用三黃丸，何謂此三黃丸時藥也？假令冬天大寒之時，傷羊肉溼麵等熱物，當用三黃丸治之。湏加熱藥少許，炒豆蔻丸之類是也。為引用，又為時藥。經云：必先歲氣，無伐天。如此之謂也。餘皆倣此。

消渴門

消渴論

陰陽別論云：二陽結謂之消脈，要精微論云：癉成為消中。夫二陽者，陽明也。手陽明太陽主津，病消則目黃口乾，是津不足也。足陽明胃主血，熱則消穀，善飢。血中伏火，乃血不足也。結者，津液不足，結而不潤，皆燥熱為病也。此因數食甘美而多肥，故其氣上溢轉為消渴，治之以蘭除陳氣也。不可服膏梁芳草石藥，其氣剽悍，能助燥熱也。越人云：邪在六腑，則陽脉不和，陽脉不和，則氣留之。氣留之，則陽脉盛矣。陽脉大盛，則陰氣不得榮也。故皮膚肌肉消削是也。經云：凡

治消癰什弊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏梁之
疾也。岐伯曰：脈實病久可治。脉弦小病久不可治。後
分為三消。高消者，舌上赤裂、大渴引飲。逆調論云：心
移熱於肺。傳於膈。消者是也。以白虎加人參湯治之。
中消者，善食而瘦。自汗、大便硬、小便數。叔和云：口乾
飲水多。食飢虛癰成中消者是也。以調胃承氣三黃
丸治之。下消者，煩燥引飲。耳輪焦乾。小便如膏。叔和
云：焦煩水易虧。此腎消也。以六味地黃丸治之。總錄
所謂末傳能食者，必誤腦疽背瘡不能食者，必傳中
滿鼓脹，皆謂不治之証。潔古老人分而治之。能食而
渴者，白虎加人參湯。不能食而渴者，錢氏方白朮散。
倍加葛根治之。上中既平，不復輔下消矣。前人用藥
厥有肯綮。或曰：末傳瘡疽者何也？此火邪勝也。其瘡
痛甚而不潰，或赤水者是也。經云：有形而不痛，陽之
類也。急攻其陽，無攻其陰。治在下焦。元氣得強者生。
失強者死。末傳中滿者何也？以寒治熱，雖方士不能
廢其繩墨而更其道也。然臟腑有遠近，心肺位近，宜
朴小其服。腎肝位遠，宜制大其服。皆適其至所為故。

如渴與不及皆誅罰無過之地也。如高消中消制之太急速渴病所久而成中滿之病正謂上熱未除○中寒復生者也。非藥之罪失其緩急之制也。處方之制宜加意焉。

和血益氣湯

治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾

燥生肌肉

柴胡

炙甘草

生甘草

此治口舌乾也

麻黃根
已上各

酒當歸梢分

酒知母

酒漢防已

羌活

已上各

石膏

六分治小便赤也

酒生地黃分

酒黃連

八分治舌赤脉

黃蘖

升麻
已上各

杏仁

桃仁

已上各

紅花

少許

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服足熱溼麵酒醋等物

當歸潤燥湯

治消渴大便閉澀乾燥結硬兼喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛 一分

生甘草

炙甘草

熟地黃 三 分 各 柴胡 七 分

黃藥

知母

石膏

桃仁 沈子

當歸身

麻子仁

防風

荆芥穗 一錢 各 升麻 一錢

紅花 少許

杏仁 六箇

小椒 三箇

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服食遠忌辛熱物

生津甘露湯 一名清涼飲子

數

升麻 四分

防風

生甘草

漢防已

生地黃

五 分

各 當歸身

六 分

柴胡

羌活

炙甘草

黃芩

酒知母

酒黃芩

一錢 各

酒龍膽草

石膏

錢五分 一

紅花 少許

桃仁 五箇

杏仁 十箇

右咬咀都作一服水二盞酒一匙煎至一盞稍熱

服食遠

辛潤緩肌湯 一名清神補氣湯

前消渴証纔愈止有口乾腹不能努此藥主之

生地黃

細辛

已上各一分

熟地黃

三分

石膏

四分

黃藥

酒製

黃連

酒製七分

生甘草

知母

已上各五分

柴胡

七分

當歸身

荆芥穗

桃仁

防已

已上各一錢

升麻

五分

紅花

少許

杏仁

六箇

小椒

三箇

右咬咀者作一服水二大盞煎至一盞食遠稍熱
服之

甘草石膏湯

渴病久愈又添舌白滑微腫咽喉嚥津覺痛噃腫
時有渴喜冷飲口中白沫如膠

生地黃

細辛

已上各一分

熟地黃

黃連

三分

甘草

五分

石膏

六分

柴胡

七分

黃藥

知母

當歸身

桃仁

炒去皮尖

荆芥穗

防風 一錢 已上各

升麻 一錢 五分

紅花 少許

杏仁 六箇

小椒 二箇

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服

甘露膏 一名蘭香膏

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便

頻數

半夏湯洗 二分

熟甘草

白豆蔻仁

人參

蘭香

升麻

連翹

桔梗

已上各五分

生甘草

防風

一錢 已上各

酒知母

一分 一錢

石膏

三錢

右為極細末湯浸餌餅和勻成劑捻作薄片子日中晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下

食後

生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻舌根强硬腫痛食不能下時

有腹脹或瀉黃如糜名曰餐泄渾身色黃目睛黃甚四肢痿弱前陰如冰尻臀腰背寒面生黧色脣

一下急痛善嘯喜怒健忘

藿香

一分

柴胡

黃連

木香

已上各三分

白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香已上各五分

華澄加

生甘艸

山梔子

白豆蔻仁

白芷

連翹

姜黃已上各一錢

石膏

一錢二分

杏仁去皮

酒黃藥已上各錢五分

炙甘草

酒知母

升麻

人參已上各二錢

桔梗三錢

全蝎二箇去毒

右為細末湯浸餳餅和勻成劑捻作片子日中晒半乾擦碎如黃米大每服一錢津唾下或白湯送下食遠服

眼鼻耳門

諸脉者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脉者皆屬於目得血而能視五臟六腑精氣皆上注於目而為之精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精則為約束裏擗筋骨血氣之精

而與脈並為系上屬於腦後出於項中故邪中於項
因逢其身之虛其入深則即隨眼系入於腦則腦轉
腦轉則引目急目系急則目眩以轉矣邪中其精
其精所中不相比也則精散精散則視歧故見兩物
目者五臟六腑之精英衛魂魄之所常營也神氣之
所主也故神勞則冤鬼散志意亂是故瞳子黑眼法
於陰白眼赤脉發於陽故陰陽合傳而為精明也目
者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然
見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也夫二十

經脈三百六十五綈其血氣皆上走於面而走空竅
其精陽氣上散於目而為精其氣走於耳而為聽因
心事煩冗飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大
盛則百脉沸騰血脉逆行邪害空竅天明則日月不
明矣夫五臟六腑之精氣皆秉受於脾上貫於目脾
者諸陰之首也目者血脉之宗也故脾虛則五臟之
精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人
之神宜靜而女相火化行其令相火者包絡也主百
脉皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因動邪氣所并

而損血脉。故諸病生焉。凡醫者不理脾胃。及養血安神。治標不治本。是不明正理也。

內障眼論

凡心包絡之脉。出於心中。以代心君之行事也。與少陽為表裏。瞳子散大者。少陰心之脉挾目系。厥陰肝之脉連目系。心主火。肝主木。此木火之勢盛也。其味則宜苦。宜酸。宜涼。大忌辛辣熱物。是鴻木火之邪也。飲食中常知此理可也。鴻辛主散。熱則助火。故不可食。諸酸主收。心氣瀉木火也。諸苦鴻火熱。則益水也。

尤忌食冷水大寒之物。此則能損胃氣。胃氣行則元氣。則元氣不生。胃氣下流。胸中三焦之火反心火乘於肺上。入腦灼髓。火主散益。瞳子開大。熱之物又助火邪。此蓋不可食驗也。藥中去荒蔚子一味辛及主益睛。蓋者是助火也。故去之。乃知黃芩。黃連。鴻中焦之火。芩能鴻上焦肺中之火。以酒洗之。乃寒因熱用也。又去青葙子。為助陽火也。加五味子以收瞳人開大。且火之興氣勢。不兩立。故內經云。壯火食氣。食少火少。火生氣。壯火散氣。諸酸之物能助元氣。孫

真人云五月常服五味助五臟氣以補西方肺金法
云以酸補之以辛瀉之辛瀉氣則明矣或曰藥中有
當歸其味亦辛而甘其不去者何此辛甘一味以其
和血之勝藥况有甘味又欲以為導為諸藥之使
耳

芳辛湯

治兩眼晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫
而痛

細辛二分

芳薺

蔓荆子已上各五分

甘草

白芷

已上各一錢

防風

一錢五分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞臨臥溫服

碧石天丸

一名并珠丸

治目疾累服寒涼藥不愈兩眼蒸熱如火之熏赤
而不痛滿目紅絲血脉賁睛脅悶昏暗羞明畏日
或上下臉赤爛或冒風沙而內外背皆破洗之神
効

桔白朮二分

銅綠研七分

瓦粉炒黑一

右先研白朮銅綠令細旋卽入粉同研勻熟水和

之共為一百丸每服一丸熱湯半盞浸一二箇時
辰洗至覺微澀為度合半時辰許臨卧洗之瞑目
便睡一丸可洗十遍再用湯內坐令熱此藥治其
標若裏實者不宜用

廣大重明湯

治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼瞼痒痛抓
之至破眼弦生瘡目多眵淚隱澀難開

龍胆艸

防風

生甘草

細辛已上各一錢

右剉如咀內甘草不剉只作一鉗先以水一大碗
半煎龍胆一味至一半再入餘三味煎至少半碗
濾去粗用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次
但洗畢合眼一時去努肉泛長反痒亦驗

百點膏

張濟氏眼病醫六年以至夜瞳人視物不明有雲
氣之狀因用此藥而効

蕤仁去皮尖三分

當歸身

甘草已上各六分

防風

八分

黃連

揀盡二錢剉如麻豆大水一大碗煎至一半入藥

右件剉如麻豆大蕤仁別研如泥同熬滴在水中
不散入去沫蜜少許再熬少時為度令病人心靜
點之至目中微痛日用五七次臨臥點尤疾効名
之曰日點膏但欲多點使藥力相繼也

選奇湯

治督骨痛不可忍

炙甘草

夏月生用

羌活

防風

已上各三錢

酒黃芩

一錢冬月不用

此一味

如能食熱痛倍加之

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後服

之

神効明目湯

治眼楞緊急致倒睫拳毛及上下臉皆赤爛睛疼
昏暗晝則冷淚常流夜則眼澀難開

細辛二分

蔓荆子五分

防風一錢

葛根一分

甘艸二錢

一方加

黃芪一錢

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱臨臥

服

羌活退翳膏 一名復明膏

治足太陽寒水膜子遮睛白翳在上視物不明

椒樹

東南根二分

西北根二分

藁本

漢防已

已上二分

黃連

防風

麻黃

柴胡

升麻

生地黃

已上三分

生甘草

四分

當歸身

六分

羌活

七分

蕤仁

六箇

右用淨水一大碗先煎漢防已黃連生甘艸當歸
生地黃煎至一半下餘藥再煎至一盞去粗入銀
石器中再熬之有力為度

明目細辛湯

治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成
紐眵糊多隱澀難開眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大
便微硬

川芎

五分

生地黃

酒製

蔓荆子

六分

各

當歸梢

一分

白茯苓

一分

藁本

已上各

荆芥

二分

防風

二錢

麻黃根

羌活 已上各

細辛 少許

紅花 少許

椒 八箇 桃仁 二十箇

右㕮咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍熟臨卧服之忌酒醋濕麵

復明散

治內瘡

三分

橘皮

川芎

蒼朮 已上各

炙甘草

生地黃

連翹

柴胡 已上各

黃芪 一錢

當歸身

二錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之食後忌酒醋濕麵辛熱大料物之類助陽和血湯

治眼發之後微有上熱白睛紅隱澀難開睡多眵淚

蔓荊子

二分

香白芷 三分

柴胡

黃芪

炙甘草

當歸身

酒洗

防風

五分

升麻 七分

右咬咀都作一服水一盞半煎至八分去粗稍熱
服臨臥避風寒處睡

吹雲膏

治目中淚及迎風寒泣羞明畏日當欲閉目喜在

暗室塞其戶牖醫瘼歲久遮睛此藥多點神驗

細辛一分

升麻

蕤仁已上各三分

青皮

連翹

防風四分

柴胡五分

生甘草

當歸身已上各六分

荆芥穗一錢微取濃汁

生地黃一分

棟黃連三錢

右咬咀除連翹外用澄清淨水二椀先熬餘藥至半椀入連翹同熬至一大盞許去粗入銀石器內文武火熬滴入水成珠不散為度入煉去沫熟蜜少許熬勻用之

防風飲子

治倒睫拳毛

細辛

蔓荆子已上各葛根

防風

當歸身半分

炙甘艸

黃連

人參

右判如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食遠

服避風寒

撥雲湯

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳兩箇隱澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉細緊按之洪大無力知足太陽膀胱為命門相火煎熬逆行作寒水腎及寒瘓遮睛證呵欠善悲健忘嚏噴眵淚時自淚下面赤而白能食不大便小便數而久氣上而喘

黃芪

細辛

生薑

葛根

川芎

已上各三分

柴胡

七分

荆芥穗

藁本

生甘草

升麻

當歸身

知母

已上各一錢

羌活

防風

黃芩

已上各五錢

右咬咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗熱服食後

神効黃芪湯

治渾身麻木不仁或頭面手足肘背或腿腳麻木

不仁並皆治之如兩目緊急縮小及羞明畏日隱澀難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少精光或目中熱如火服五六次可効

蔓荆子

一錢

陳皮

去白
五分

人參

八錢

炙甘艸

白芍藥

已上各
一兩

黃芪

二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗臨卧稍

熱服

如小便淋澀加澤瀉分一服去則止

如有大便熱證每服加酒洗黃藥分

如麻木不仁雖有熱不用黃藥止加黃芪一兩通三

兩也

如眼縮急去芍藥忌酒醋麵大料物葱韭蒜辛物
如麻木甚者加芍藥一兩通用二兩

圓明內障升麻湯

一名冲和
養胃湯

治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛
飲食不節形體勞役心不得休息故上為此疾

乾姜

一錢

五味子

二錢

白茯苓

三錢

防風

五錢

白芍藥

六錢

柴胡

七錢

人參

炙甘草

當歸身 酒洗

白朮

葛根 已上各一兩

黃芪

羌活 已上各一兩五錢

右咬咀每服五七錢水三大盞煎至二大盞入黃芩黃連錢同煎數沸去粗煎至一盞熱服食遠

黃芩黃連湯

黃芩

酒洗
炒

黃連

酒洗
炒

草龍膽

酒洗四次
炒四次

生地黃

酒洗已上
一兩

右咬咀每服二錢水二盞煎至一盞去粗熱服

蔓荆子湯

治勞役飲食不節內障眼病此方如神効

蔓荆子

二錢
五分

黃藥

酒拌炒
四遍

白芍藥

三錢
已上各

炙甘草

八錢

黃芪

人參

已上各
一兩

右咬咀每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去粗

臨臥溫服

歸葵湯

一名連翹飲子

治目中溜火惡目與火隱澀難開小角緊視物昏
花迎風有淚

柴胡 二分

生甘艸

蔓荆子

連翹

生地黃

當歸身

紅葵花

人參 五分各

黃芪

酒黃芩

防風

羌活 五分

升麻 二錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後溫

服

救苦湯

治眼暴發赤腫臉高苦疼不任者

桔梗

連翹

紅花

細辛 一分各

當歸身

夏月減半

炙甘艸 五分各

蒼朮

草龍膽

已上各七分

羌活 太陽

升麻 陽明

柴胡

少陽

防風

藁本

黃連

已上各一錢

生地黃

黃藥

黃芩

知母 五分各一錢

川芎

三錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食後溫

服

若苦疼則多用苦寒者兼治本經之藥再行加減
如睛昏加知母黃藥一倍

熟乾地黃丸

治血弱陰虛不能著心致心火旺陽火甚瞳子散大少陰為火君主無為不行其令相火代之兼心包絡之脉出心系分為三道少陽相火之體無形其用在其中矣火盛則令母實己未肝旺是也心之脉挾於目系肝連目系况手足少陽之脉同出耳中至耳上角斜起於目外背風熱之盛亦從此之散大除風之熱則愈矣

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 人參二錢 | 炙甘草 | 天門冬 <small>湯洗去心</small> |
| 地骨皮 | 五味子 | 枳殼 <small>炒</small> |
| 黃連 <small>已上各三錢</small> | 當歸身 <small>酒洗焙乾</small> | 黃芩 <small>已上各五錢</small> |
| 生地黃 <small>酒洗七錢五分</small> | 柴胡 <small>八錢</small> | 熟乾地黃 <small>一兩</small> |
- 右件同爲細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸茶湯送下食後日進二服

益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯苓已上各二錢五分

生地黃

酒洗乾

牡丹皮

山茱萸

當歸梢

酒洗

五味子

乾山藥

柴胡已上各五錢

熟地黃

一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸淡鹽湯下空心

羌活退翳丸

治內障右眼小眴青翳大眴微顯白翳腦痛瞳白子散大上熱惡熱大便秘澀小便如常遇天氣暄熱頭痛睛脹可服此藥翳在大眴加葛根升麻翳在小眴加柴胡羌活是也

黑附子炮

寒水石已上各一錢

酒防己三錢

知母

酒炒

牡丹皮

羌活

川芎已上各三錢

酒黃蘖

生地黃酒洗炒

丹參

茺蔚子

酒當歸身

柴胡已上各五錢

熟地黃八錢

芍藥一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九
白湯下空心宿食未消待飢則服之藥後省語言
以食壓之

當歸龍膽草

治眼中白翳

石膏已上各一錢 蒜胡

防風 升麻已上各二錢

羌活

五味子

升麻已上各三錢

甘艸

酒黃連

黃芪已上各三錢

酒黃芩炒

酒黃藥炒

當歸身酒洗

草龍膽 酒洗

芍藥已上各五錢

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗入酒少
許臨卧熟服忌言語

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白
翳見於大眦及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝
經氣不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽
少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上升此
乃先補其陽後於足太陽太陰標中標者頭也鴻足厥

陰肝經火下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服瀉陰丸若天色變經大寒大風并勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於服經之末利空竅於目矣

肉桂

一錢
去皮

知母

炒

當歸身

酒洗

生地黃

酒炒

白茯苓

澤瀉

陳皮

已上各三錢

白芍藥

防風
已上各五錢

黃芪

人參

白朮

羌活

獨活

熟地黃

甘草

已上各一兩

柴胡

二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一大盞去粗空心

服之

瀉陰火丸

一名連藥益陰丸

石決明

三錢存性炒

羌活

甘艸

當歸梢

五味子

防風

已上各
五錢 酒炒

草決明

細黃芩

黃連

酒炒

黃藥

知母 已上各
一兩

右為細末煉蜜為丸如棗莖大每服五十丸至一百丸茶清下常多服補陽湯少服此藥多則妨飲食

升陽柴胡湯

肉桂 五分

柴胡

去苗一
錢五分

知母

酒炒如大者
加作五錢

防風

白茯苓

澤瀉

陳皮

已上各
三錢

生地黃

酒炒

楮實

酒炒微潤

黃芪

人參

白朮

已上各
五錢

甘草梢

當歸身

羌活

熟地黃

獨活

白芍藥

已上各
一兩

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服

別合一料煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸茶

清下每日與前藥各一服食遠不可飽服

如天氣熱加五味子三錢天門冬去心芍藥楮實

已上各
五錢

溫衛湯

治臭不聞香臭目中流火氣寒血熱冷淚多臍下
冷陰汗足痿弱

陳皮

青皮

黃連

木香

已上各三分

人參

甘艸炙

白芷

防風

黃藥

澤瀉

已上各五分

黃芪

蒼朮

升麻

知母

柴胡

羌活

已上各一錢

當歸身

一分錢

圓明膏

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之

方收睛圓明

訶子皮

濕紙裹煨

甘草

已上各二錢

當歸身

三錢

柴胡

生地黃

麻黃

去節撲開

黃連

已上各五錢

右七味先以水二碗煎麻黃至一碗掠去沫外六
味各咬咀如豆大篩去末入在內同熬滴水中不

散為度入熟蜜少許再熬勤點眼

噙藥麻黃散

治内外障眼

黃藥一兩 當歸身一錢

右二味同為麩末炒黑色入麝香乳香少許共為細末含水鼻內噙之

療本滋腎丸

黃藥 酒炒 知母 酒炒已上

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服一百丸至

一百五十丸空心鹽白湯下

加味滋腎丸

肉桂三分

黃連一錢

姜黃一錢

苦參三錢

苦蓼莖

酒洗

石膏

覺肚冷

勿用

黃藥

酒炒

知母

酒炒已上

右為極細末打薄麵糊為丸如梧桐子大每服一

百丸空心服白湯下食壓之

退翳膏

治黑白翳

蕤仁

升麻已上各

連翹

防風

青皮已上各

甘草

柴胡

已上各

當歸身六分

荆芥穗

一錢水半盞別浸

生地黃

一分五錢

黃連三錢

右用水一椀入前藥煎至半椀去粗更上火煎至半盞入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之

龍膽飲子

治疳眼流膿生疳醫濕熱為病

穀精艸

川芎金

蛇退皮

炙甘草

已上各

麻黃一錢五分

升麻二錢

青蛤粉

草龍膽

黃芩炒

羌活

已上各

三錢

右為細末每服二錢食後溫茶清調服之

柴胡聰耳湯

治耳中乾結耳鳴耳聾

連翹四錢

柴胡三錢

炙甘草

當歸身

人參已上各

水蛭五分炒

鹿麝香少許

董虫三箇去足

研

右除三味別研外生姜三片水二大盞煎至一盞去粗再下三味上火煎一二沸稍熱食遠服

羌活退翳湯

治太陽寒水瞖膜遮睛不能視物

羌活二兩 防風一兩

荆芥穗

煎成藥
加之

薄荷葉

四錢

藁本

已上各七錢

酒知母

五錢

黃蘗

四錢

川芎

當歸身

已上各三錢

酒生地黃

一錢

小椒

五分

細辛

少許

麻黃

二錢

用根

右㕮咀每服三錢水二大盞煎至一盞半入荆芥穗再煎至一盞去粗稍熱服食遠忌酒醋濕麵等物

還睛紫金丹

治目眶歲久赤爛俗呼為赤睛是也當以三棱針

刺目眶外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立出瞖膜亦退用手法攀出內臉向外以針刺之出血

白沙蜜三十

甘石

十兩燒七通碎
連水浸挫之

黃丹

六兩水飛

揀連

三兩小便
浸碎為末

南乳香

當歸

已上三錢各

烏魚骨

二錢

硇砂

小盞內放於瓶口上熏乾

麝香

已上一錢各

白丁香

直者五分

輕粉

一字

右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘石次下丹以柳枝攬次下餘藥以粘手為度作丸如雞頭大每用一丸溫水化開洗

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭

黃芪

四錢

蒼朮

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

已上各三錢

炙甘草

二錢

麻黃

不去節冬月加之

川椒

白芷一錢

右咬咀每服五錢生姜三片棗二枚葱白三寸同煎至一盞去粗溫服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐臥行立

溫肺湯

治鼻不聞香臭眼多眵淚

丁香 二分

防風

炙甘草

葛根

羌活已上各一錢

升麻

黃芪

已上各二錢

麻黃不去節四錢

禦寒湯

治寒氣風邪傷於皮毛令鼻壅塞咳嗽上喘之證

黃連

黃芩

羌活已上各二分

炙甘艸

佛耳草

款東花

白芷

防風

已上各三分

升麻

人參

陳皮

已上各五分

蒼朮

七分

黃芪

一錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食後熱

服

蘭室祕藏卷三卷四

頭痛門 口齒咽喉門 咳嗽門
婦人門 大便燥結門
吐血門 膽痛門



蘭室秘藏卷之三

元 鎮州 東垣李 崇明之 撰
明 吳郡 立齋薛 已新甫 校

頭痛門

頭痛論

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內眞上額交巅上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目鏡眞上抵頭面病則

頭角額痛。夫風從上受之。風寒傷上。邪從外入客於經絡。令人振寒。頭痛身重惡寒。治在風池風府。調其陰陽。不足則補。有餘則瀉。汗之則愈。此傷寒頭痛也。頭痛耳鳴。九竅不利者。腸胃之所生。乃氣虛頭痛也。心煩頭痛者。病在耳中。過在手巨陽少陰。乃濕熱頭痛也。如氣上不下。頭痛癲疾者。下虛上實也。過在足少陰巨陽。甚則入腎。寒濕頭痛也。如頭半寒痛者。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。此偏頭痛也。有真頭痛者。甚則腦蓋痛。手足寒至節死不治。有厥逆頭

痛者。所犯大寒。內至骨髓。髓者以腦爲主。腦逆故令頭痛。齒亦痛。凡頭痛皆以風藥治之者。總其大體而言之也。高顛之上。惟風可到。故味之薄者。陰中之陽。乃自地升天者也。然亦有三陰三陽之異。故太陽頭痛。惡風。脈浮緊。川芎羌活獨活麻黃之類爲主。少陽經頭痛。脉弦細。往來寒熱。柴胡爲主。陽明頭痛。自汗發熱。惡寒。脉浮緩長實者。升麻葛根石膏白芷爲主。太陽頭痛必有痰。體重則腹痛爲痰癖。其脉沉緩蒼求半夏南星爲主。少陰經頭痛。三陰三陽經不流行。

而足寒氣逆爲寒厥。其脉沉細。麻黃附子細辛爲主。
厥陰頭項痛。或吐痰沫厥冷。其脉浮緩。吳茱萸湯主
之。血虛頭痛。當歸川芎爲主。氣虛頭痛。人參黃芪爲
主。氣血俱虛頭痛。調中益氣湯少加川芎蔓荆子細
辛。其効如神。白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也。青
空膏乃風濕熱頭痛藥也。羌活附子湯治厥陰頭痛
藥也。如濕氣在頭者。以苦吐之。不可執方而治。先師
嘗病頭痛。發時兩頰青黃。暈眩。目不欲開。懶言。身體
沉重。兀兀欲吐。潔古曰。此厥陰太陰合病。名曰風痰。

以局方玉壺丸治之。更灸夾谿穴。即愈。是知方者體
也。法者用也。徒執體而不知用者弊。體用不失。可謂
上工矣。

青空膏

治偏正頭痛年深不愈者。善療風濕熱頭上壅。損
目反腦痛不止。

川芎 五錢

柴胡 七錢

黃連 炒

炙甘草 一兩

防風 去蘆

羌活 一兩

三兩去皮剉一

細挺子黃芩 半

酒製一半炒

右爲細末每服二錢七熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨臥

如苦頭痛每服加細辛二分

如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川

芎甘艸加半夏一兩五錢

如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加

柴胡一倍

如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加好

吳白芷

徹清膏

蔓荆子

細辛已上各一分

薄荷葉

川芎已上各三分

生甘草

熟甘草已上各五分

藁本

一錢

右爲細末每服二錢食後茶清調下

川芎散

治頭目不清利

川芎三分

柴胡七分

羌活

防風

藁本

生甘草

升麻已上各一錢炒

熟甘草

酒生地黃各二錢

酒黃連

酒黃芩

已上各四錢五分

右爲細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌

酒濕麪

白芷散一名鬱金散

治頭痛

鬱金一錢

香白芷

石膏已上各二錢

薄荷葉

芒硝已上各三錢

右爲極細末口含水鼻內噙之

碧石雲散

治頭痛

細辛

鬱金

芒硝已上各一錢

蔓荊子

川芎

已上各二錢

石膏

三分錢

青黛一分五錢

薄荷葉

二錢

紅豆

一箇分錢

右爲極細末口噙水鼻內噙之

羌活清空膏

蔓荊子一錢

黃連三錢

羌活

防風

甘草已上各四錢

黃芩一兩

右為細末每服一錢茶清調下食後臨臥

清上瀉火湯

皆有人年少時氣弱常於氣海三里灸之節次約五七十壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

荆芥穗

川芎

已上各二分

蔓荆子

當歸身

蒼术

已上各三分

酒黃連

生地黃

藁本

甘草

已上各五分

升麻

防風

已上各七分

酒黃藥

炙甘草

黃芪

已上各一錢

酒黃芩

酒知母

已上各兩五錢

羌活

三錢

柴胡

五錢

細辛

少許

紅花

少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去粗稍熱服食後

補氣湯

服前藥之後服此藥

柴胡

二分

升麻

三分

黃芪

八分

當歸身二錢

炙甘草四錢

紅花少許

右咬咀作二服水二盞煎至一盞去粗稍熱服食
後

細辛散

治偏正頭痛

細辛

瓦粉已上各二分

生黃芩

芍藥已上各五分

酒黃連

川芎已上各七分

炒黃芩

酒黃芩已上各一錢

炙甘草一分錢

柴胡二錢

一錢

右為麌末每服三錢水一大盞半煎至一盞取清
食後服之

羌活湯

治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草七分

澤瀉三錢

酒洗瓜蔞根

白茯苓

酒黃芩已上各五錢

柴胡七錢

防風

細黃芩

酒黃連

羌活已上各一兩

右為粗末每服五錢重水二中盞煎至一盞取清

食後臨臥通口熱服之

養神湯

治精神短不得睡項筋腫急難伸禁甘溫宜苦味

木香 捣皮

柴胡 已上各一分

酒黃芩 二分

人參

苗藥

白朮

川芎

已上各三分

升麻

四分

蒼朮

麥蘖麵

當歸身

黃連

已上各五分

甘草

半夏

已上各七分

黃芪

一錢

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一大盞去粗稍熱
服不拘時候

安神湯

治頭痛頭旋眼黑

生甘草

炙甘艸 已上各二錢

防風 二錢

五分

柴胡

升麻

酒生地黃

酒知母

已上各五錢

酒黃蘖

羌活 一兩

黃芪

二兩

右為粗末每服五錢水二大盞半煎至一大盞半加

蔓荆子五分川芎三分再煎至一盞去粗臨臥服

半夏白朮天麻湯

范天驥之內有脾胃證時顯煩燥胸中不利大便不通而又為寒氣拂鬱悶亂大作火不伸故也疑其有熱服疎風丸大便行其病不減恐其藥少再服七八十九大便復見兩行元證不瘳增以吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢閉如

在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥余料前證是胃氣已損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣與此藥而治之

黃蘖

酒洗二分

乾薑

三分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

已上各五分

炒神麴

白朮

已上各一錢

麥蘖麴

半夏

湯洗一分

橘皮

已上各一錢五分

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗臨臥服

食前一服而愈此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除黃芪甘溫瀉火補中益氣實表虛止自汗人參氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽神麴消食蕩胃中滯氣大麥麵寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃藥大苦寒酒洗以療冬天少火在泉發燥也

口齒咽喉門

口齒論

論曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其牙齒是手足陽明之所過上齦隸於坤土乃足陽明胃之脉貫絡也止而不動下齦嚼物動而不休手陽明大腸之脉所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢為病不同熱甚則齒動齦斷袒脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多作痛者有惡寒惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多

而作痛者。有惡熱飲少寒飲多而作痛者。有牙齒動搖而作痛者。有齒齦腫起為痛者。有脾胃中有風邪。但覺風而作痛者。又有牙上多為虫所餕。其齒缺少而色變為虫牙痛者。有胃中氣少不能於寒祖露其齒作痛者。有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者。痛既不一。豈可一藥而盡之哉。

羌活散

治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖肉齦袒脫疼痛

藁本

香白芷

桂枝

三分
已上各

蒼术

升麻

已上各

當歸身

六分

艸豆蔻仁

一錢

羌活

一分

羊脰骨灰

二錢

麻黃

去節根

防風

已上各

柴胡

五錢

細辛

少許

右為細末先用溫水漱口淨擦之其痛立止

草豆蔻散

治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉

防風

已上各

羊脰骨灰

熟地黃已上各五分當歸七分

艸豆蔻仁

黃連已上各三分錢三分升麻二錢五分

右為細末同前牙痛處擦之

麻黃散

治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼痛

防風

藁本

已上各三分

羊脰骨灰

當歸身

熟地黃

已上各六分

升麻

黃連

已上各一錢

羌活

五分一錢

麻黃

不去節

艸龍膽

酒洗

生地黃

已上各二錢

細辛少許

右為細末依前藥法擦之

麝香散

治熱多寒少牙露根肉齦脫血出齒動欲落疼痛

妨食忤涼少忤熱多

熟地黃二分益智仁二分當歸身

生地黃

麻黃根

酒漢防已

人參已上各三分

升麻一錢半

草豆蔻

黃連

已上各五分

一羊脰骨灰二錢

麝香少許

右為細末如前藥擦之

治蟲散 一名白芷散

治大寒犯腦牙齒疼痛及蟲漏胃經濕熱腫痛

桂枝 一分 熟地黃 二分

藁本

白芷

已上各

當歸身

黃連

四分 已上各

羌活 五分

吳茱萸 八分

艸豆蔻

黃芪

升麻 一錢

羊脛骨灰

二錢 麻黃 不去節 二錢 五分

右為細末同前擦之

益智木律散

治寒熱牙痛

木律 二分

當歸

黃連

已上各 四分

羊脛骨灰

益智皮

熟地黃

已上各 五分

草豆蔻皮

一錢 升麻 三分

五分

右為細末用度如前擦之

如寒牙痛不用木律

蠍稍散

治大寒風犯腦牙痛

白芷

當歸身

桂枝

升麻

柴胡已上各

藁本

黃芪

已上各三分

羌活

五分

草豆蔻皮

一錢

麻黃

去節一錢五分

羊脰骨皮

二錢五分

蠍梢

少許

右為細末如前法用之

白牙散

白芷

七分

升麻

一錢

石膏

一分

羊脰骨灰

二錢

麝香

少許

右為細末先用溫水漱口擦之妙

刷牙藥

麝香

一分

生地黃

酒防已

熟地黃

二分

當歸身

人參

已上各三分

草豆蔻皮

分五

升麻

一錢

黃連

已上各二錢

白豆蔻

五倍

一箇

沒石子

三箇

羊脰骨灰

五倍

一箇

右為極細末如前法擦之妙

獨聖散

治一切牙痛風痺

北地蒺藜不以多少陰乾

右為細末每用刷牙以熱漿水嗽牙外龐末敷漿水刷牙大有神効不可具述

當歸龍膽散

治寒熱停牙痛

香白芷

當歸梢

羊脰骨灰

生地黃已上各

麻黃

草豆蔻

草龍胆

升麻

黃連

已上各一錢

右為細末如前法擦之神効

牢牙地黃散

治腦寒痛及牙痛

藁本二分

生地黃

熟地黃

羌活

防已

人參三分

當歸身

益智仁四分

羊脰骨灰

香白芷

黃芪

已上各五分

麻黃

已上各一錢

吳茱萸

草豆蔻皮二分錢

升麻

一錢

右為細末如前法擦之

細辛散

治寒邪風邪犯腦牙齒痛

柴胡

防風

升麻

白芷 已上各二分

桂枝 二分

蒼朮 已上各三分

麻黃 去節半分

藁本

當歸身 四分

艸豆蔻 五分

羊脰骨灰

羌活 已上各一錢

細辛 少許

升麻 五分

右為細末先嗽後擦之佳

立効散

治牙齒痛不可忍及頭腦項背微惡寒飲大惡熱
飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五臟內盛六腑
陽道脉微小小便滑數

細辛 二分

炙甘草 三分

升麻 七分

防風 一錢

草龍膽 酒洗四分

右咬咀都作一服水一盞煎至七分去粗以匙抄

在口中燙痛處待少時則止

如多惡熱飲更加草龍胆一錢此法不定隨寒熱

多少臨時加減

若更惡風作痛加升豆蔻黃連

已上各

勿加草龍

膽

牢牙散

治牙齦肉綻有根牙痛腫痛牙動搖欲落牙齒不長牙黃口臭

羌活 一兩

草龍膽 酒洗

一兩

羊脰骨灰

二

升麻 四兩

酒洗 一兩

五錢

貼在牙齦上

清胃散

治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱

當歸身

擇細黃連

如連不好更加二分夏月倍之

生地黃

酒製上各三分

牡丹皮

五分

升麻

一錢

右為細末都作一服水一盞半煎至一盞去粗帶冷服之

神功丸

治多食肉人口臭不可近牙齒痛蝕牙齦肉將脫
牙齒落血不止

蘭香葉

如無藿
香代之

當歸身

藿香

用葉

木香

已上各一錢

升麻

二錢

生地黃

酒洗

生甘草

已上各二錢

黃連

去鬚擇淨酒洗秤

縮砂仁

已上各五錢

右同爲細末湯浸餌餅爲丸如菉豆大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澼

下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者

桔梗湯

治咽腫微覺痛聲破

當歸身

馬勃

已上各一分

白僵蚕

黃芩

已上各三分

麻黃

去節五分不

桔梗

甘草

已上各一錢

桂枝

少許

右爲麌末作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之食遠

又方

治口瘡久不愈者

黃藥

不計多少真者密塗其上

黃色

右為細末乾搗瘡上臨卧忌醋醬鹽

神驗方

治口瘡無間久新

夜間將二丸以歷緊左右交手揉三五十次但遇睡覺行之如此三五度因濕而生者一夜愈

久病諸般口瘡三二夜愈如鼻流清涕者歷之

二丸揉之數夜可愈

內經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上口為糜易老五苓散與導赤散合而飲之

嘔吐門

丁香茱萸湯

治嘔吐噦胃虛寒所致

黃藥

三分

炙甘草

丁香

柴胡

橘皮

已上各五分

升麻

七分

吳茱萸

荳朮

人參

已上各一錢

當歸身 二錢

草豆蔻仁

黃芪

已上各二錢

右為鹿末每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍

熱服食前

白朮湯

二名茯苓湯半夏湯

治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於

脾胃之間當先實其脾胃

炒神麴

二錢

陳皮

天麻

三錢

已上各

白朮

白茯苓

麥蘖麵

炒黃色

半夏

已上各五錢

右㕮咀每服五錢水二盞入生薑五片錢同煎至一盞去粗稍熱服

補肝湯

一名柴胡半夏湯

治素有風證不敢見風眼澀頭痛眼黑胸中有痰惡心兀兀欲吐遇風但覺皮肉緊手足難舉重物如居暖室少出微汗其證乃減再或遇風病即復

柴胡

七分

升麻

藁本

五分

已上各

白茯苓

二錢

炒神麴

蒼朮

一錢

已上各

半夏

二錢

生姜

十片

右為龐末都作一服水二大盞煎至一大盞去粗

稍熱服

吳茱萸丸一名木香利膈丸

治寒在膈上噎塞咽膈不通

木香

青皮

已上各二分

白殭蚕

姜黃

澤瀉

已上各四分

柴胡

已上各四分

當歸身

炙甘草

已上各六分

益智仁

人參

橘皮

升麻

黃芪

已上各八分

半夏

一錢

草豆蔻仁

吳茱萸

已上各一錢二分

麥蘖麵

一錢五分

右為細末湯浸餅為丸如菜豆大每服二三十丸溫水送下勿多飲湯恐速下細嚼亦得

劙血吐血門

麥門冬飲子

治吐血久不愈以三稜鍼於氣街出血立愈

黃芪

一錢

麥門冬

當歸身

已上各三分

生地黃

人參

已上各五分

五味子

十箇

右為龐末都作一服水二盞煎至一盞去粗熱服

不拘時

人參飲子

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬二分

人參去蘆

當歸身

已上各三分

黃芪

五味子五箇

白芍藥

甘艸

已上各一錢

右為龜末都作一服用水二盞煎至一盞去粗稍熱服

一脅者有前證以前藥投之愈繼而至冬天居大

室中臥大熱炕而吐血數次再來求治料此病久虛弱附臍有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣滲其裏之虛熱是其法也冬天居大室衣蓋單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口憶仲景傷寒論中一證太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不愈遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同予遂用之

麻黃桂枝湯

人參

益上焦元氣不足而實其表也

麥門冬保肺氣已上各三分

桂枝以補

表虛

當歸身

和血養血
各五分

麻黃去根

甘草

補其脾
胃之虛

黃芪

實表
益衛

白芍藥

已上各一錢

五味子

五箇安
其脉氣

右以水三盞先煮麻黃一味令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去粗熟服臨臥只一服而愈更不再作

黃芪芍藥湯

治鼻衄血多面黃眼澀多眵手麻木

葛根

羌活

已上各五錢

白芍藥

升麻一兩

炙甘草

二兩

黃芪三兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食後溫服六脉弦細而濶按之空虛其色必白而夭不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱滑潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

三黃補血湯

治六脉俱大按之空虛心面赤善驚上熱乃手少陰心脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻補其血

牡丹皮

黃芪

補之以防

升麻

已上各一錢

當歸

柴胡

已上各一錢五分

熟地黃

川芎

已上各二錢

生地黃

三錢

白芍藥

五錢

右咬咀如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一大盞去粗稍熱服食前

如兩寸脉芤血在上焦或衄血或嘔血與犀角地黃湯則愈

救麻湯一名人參

治吐血

甘草

蘇木

陳皮已上各五分

升麻

柴胡

蒼朮已上各一錢

當歸稍

熟地黃

白芍藥

黃芪

人參

已上各二錢

右為麌末都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍溫食前服

止衄血法

治鼻血久不止素有熱而暴作者諸藥無驗神法以大紙二張作八摺或十摺於水內濕置頂中以熱熨斗熨至一重或二重紙乾立止

腰痛門

川羌肉桂湯

丁未冬曹通甫自河南來有役人小瞿露宿寒濕之地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛已經月餘不愈矣腰痛論中說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二證屬少陽膽經外絡脉病皆去血絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得用鍼只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血以此藥主之

酒漢防已

防風已上各三分

神麴

獨活五分

川芎

柴胡

肉桂

當歸梢

炙甘草

蒼朮

已上各一錢

羌活一分錢

桃仁

五箇去皮
尖研如泥

右㕮咀都作一服好酒三大盞煎至一大盞去粗
稍熱食遠服

獨活湯

治因勞役腰痛如折沉重如山

炙甘草二錢

羌活

防風

獨活

大黃 煨

澤鴻

肉桂 已上各
二錢

當歸梢

連翹 已上各
五錢

酒漢防已

酒黃芩

已上各

桃仁

三十
箇

右㕮咀每服五錢酒半盞水一大盞半煎至一盞

去粗熱服

破血散疼湯

治乘馬所傷跌其脊骨惡血流於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活

防風

中桂 已上各
一錢

蘇木

一分
錢

連翹

當歸梢

柴胡

已上各
二錢

水蛭

二錢炒去
蟻香

少許
別研

右件分作二服每服酒二大盞水一大盞除水蛭麝香另研如泥煎餘藥作一大盞去粗上火令稍

熱調二味空心服之兩服立愈

地龍散

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下惡血在太陽經中令人腰脊痛或脰脢臂股中痛不可忍鼻塞不

通

當歸梢一分

中桂

地龍已上各四分

麻黃五分

蘇木六分

獨活

黃藥

甘草已上各一錢

羌活二錢

桃仁六箇

芍藥已上各一錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗溫服食遠

蒼朮湯

治濕熱腰腿疼痛

防風

風能勝濕

黃藥

已上各一錢始得之時寒也久不愈寒化為熱除濕止痛

柴胡二錢行經

蒼朮二錢去湿止痛

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗空心服

麻黃復煎散

治陰室中汗出懶語四肢困倦無力走住疼痛乃下焦伏火而不得伸浮而燥熱汗出一身盡痛蓋風濕相搏也以升陽發汗漸漸發之火鬱乃濕在經者亦宜發汗况正值季春之月脉緩而遲尤宜發汗令風濕去而陽升以此困倦乃退氣血俱得生旺也

白术

人參

生地黃

柴胡

防風

已上各分

羌活

黃藥

已上各錢

麻黃

去節一不令作末水五大盞煎令沸去沫煎至三盞入下項藥再煎

黃芪

已上各錢

甘艸

三錢

杏仁

三箇

緩筋湯

一名羌活湯

右咬咀都作一服入麻黃湯煎至一盞臨臥服之勿令食飽取漸次有汗則効

食不下

熟地黃

一分

生甘草

柴胡

紅花

炙甘艸

蘇木

獨活

已上各二分

藁本

升麻

黃芩

草豆蔻仁

酒黃藥

生地黃

當歸身

麻黃

已上各三分

羌活

三錢

蒼朮

五分

右為龐末都作一服水二大盞煎至一盞去粗食遠服之

拈痛湯

治濕熱為病肩背沉重肢節疼痛胸膈不利

白朮一錢五分人參去蘆苦參酒炒

升麻去蘆葛根蒼朮已上各

防風去蘆知母酒洗澤鴻

黃芩炒猪苓當歸身已上各

羌活已上各黃芩酒洗茵陳酒炒

羌活五錢黃芩酒洗茵陳酒炒

右㕮咀每服一兩水二大盞煎至一盞去粗食遠

服

蒼朮復煎散

治寒濕相合腦右痛惡寒項筋脊骨強肩背胛眼
痛膝膍痛無力行步沉重

紅花一分黃藥三分柴胡

藁本澤鴻白朮

升麻已上各羌活一錢蒼朮四兩水一椀煎

右㕮咀先煎蒼朮湯二大盞復煎前項藥至一大盞稍熱空心服取微汗為効忌酒濕麵

羌活蒼朮湯

治脚膝無力沉重

炙甘草

黃蘖

艸豆蔻

生甘草

葛根

已上各

橘皮

六分

柴胡

升麻

已上各

獨活

縮砂仁

蒼朮

一錢

防風

一錢

黃芪

知母

二錢

羌活

三分

右㕮咀分作二服水二大盞煎至一盞去粗空心

服

壯本丹 秘方

治腎虛腰痛久則寒冷此藥壯筋骨補元利小大

養丹田治腰痛之妙劑

杜仲

酒炒

肉蓯蓉

酒洗

巴戟

酒浸去

破故紙

鹽水炒

茴香

一兩

青鹽

五錢

右為末將猪腰子分開入藥在內縫住紙包煨熟

每一個一服用黃酒送下

加味青義丸

治腎虛腰痛或風寒舌之血氣相搏為痛

杜仲 姜汁浸炒水淘十二兩芝蔴同炒變破故紙色去蔴丸上焙乾為末

沉香

六兩

胡桃

去皮膈另研六兩

沒藥

另研

乳香

另研六兩

加味補陰丸

右為末用肉蓯蓉十二兩酒浸成膏和劑搗千餘

杵丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒或鹽湯任下

人參二兩

熟地

酒浸四兩

枸杞

四兩

生地四兩

歸身

三兩酒洗

龜板

二兩酒

虎脰骨

二兩

山藥

三兩微炒

兔絲子

三兩酒蒸

杜仲

二兩炒

瑣陽

二兩酒洗

骨碎補

二兩碎

肉蓯蓉

二兩酒浸

牛膝

二兩酒洗

破故紙

二兩炒

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服二錢漸加至三錢空心淡鹽湯或溫酒任下冬月加乾姜五錢

蘭室秘藏卷之四

元

鎮州

東垣李

杲明之

撰

明

吳都

立益薛

已新甫

校

婦人門

經閉不行有三論

陰陽別論云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不
月。其傳為風。消為息。貴者死不治。婦人脾胃久虛。或
形羸氣血俱衰。而致經水斷絕不行。或病中消胃熱。
善食漸瘦。津液不生。夫經者。血脉津液所化。津液既

絕為熱所燶。肌肉消瘦時見渴燥。血海枯竭病名曰血枯經絕。宜瀉胃之燥熱。補益氣血。經自行矣。此證或經適行而有子。不安為胎病者有矣。或心包脉洪數。燥作時見大便祕澀。小便雖清不利。而經水閉絕不行。此乃血海乾枯。宜調血脉。除包絡中火邪。而經自行矣。內經所謂小腸移熱於大腸。為瘻瘕。為沉月澀不利。則月事沉滯而不利。故云為瘻瘕。為沉也。或因勞心。火上行。月事不來。安心補血瀉火。經自行矣。故內經云。月事不來者。胞脈閉也。胞脈者。屬心也。

而絡於胞中。令氣上迫肺。心氣不得而故月事不來也。

經漏不止有三論

陰陽別論云。陰虛陽搏謂之崩。婦人脾胃虛損致命門脉沉細而數疾。或沉弦而洪大。有加寸關脉亦然。皆由脾胃有虧。下陷於腎。與相火相合。濕熱下迫。經漏不止。其色紫黑。如夏月腐肉之臭。中有白帶者。脉必弦細。寒作於中。有赤帶者。其脉洪數。疾熱明矣。必腰痛。或臍下痛。臨經欲行。先見寒熱往來。兩脇急

縮兼脾胃證出見。或四肢困熱心煩不得眠臥心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈。或人故貴脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中。又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病也。不行於診故脾胃飲食不調其證顯矣。而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡心之言勸諭令拒死而心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰鴻陽經自止矣。痿論云悲哀太甚則胞絡絕也。陽氣內動發則心下崩數溲血也。故本病曰大經空虛發則肌痺傳為脉瘻此之謂也。

升陽除濕湯一名調經升麻除濕湯

治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜卧四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脈緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也。脾主滋榮周身者也心主血主脈二

者受邪病皆在脉：者血之府也。脉者人之神也。
心不主令包絡代之故曰心之脉主屬心系心系
者包絡命門之脉也。主月事因脾胃虛而心包乘
之故漏下月水不調也。况脾胃為血氣陰陽之根
蒂也。當除湿去熱益風氣上伸以勝其濕又云火
鬱則發之

當歸 酒洗

獨活 已上各三分

蔓荊子 七分

防風

炙甘草

羌活

藁本 已上各一錢

柴胡

升麻

蒼朮

黃芪

已上各一錢五分

右剉如麻豆大勿令作末都作一服以潔淨新汲
水五大盞煎至一大盞去粗空心熱服待少時以
早飯壓之可一服而已如炙足太陰脾經中血海
穴二七壯而已

此藥乃從權之法用風勝濕為胃下階而氣迫於
下以救其血之暴崩也并血惡之物住後必湏黃
芪人參炙甘艸當歸之類數服以補之於補氣升
陽湯中加以和血藥便是也若經血惡物下之不

絕尤宜究其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

涼血地黃湯

治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也

黃芩

荆芥穗

蔓荆子已上各一錢

黃藥

知母

藁本

細辛

川芎

已上各二分

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風

已上各三分

生地黃

當歸

已上各五分

甘草

一錢

紅花

少許

空心服之

右咬咀都作一服水三大盞煎至一盞去粗稍熱

足太陰脾之經中血海二穴在膝膍上內廉白肉際二寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脉緩者是也炙三壯

足少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔骨後大筋

下小筋上按之應于屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌縱涎下煩逆溺難少腹急引陰痛股內廉痛婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黃如蟲女子如妊娠可灸二壯

酒煮當歸丸

治癩疝白帶下症脚氣腰已下如在氷雪中以火焙炕重；厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀刮削瘦峻之速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目

青藍如菜色目睭；無所見身重如山行步欹側不能安地腿膝枯絀大便難秘口不能言無力之極食不下心下痞煩心懊惱不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱虛欲竭嘔嘔不止胃虛之極也脉沉厥緊而澀按之空虛若脉洪大而滑按之無力猶為中寒之證况按之空虛者乎按之不鼓是為陰寒乃氣血俱虛之極也

當歸二兩

右四味剉如麻豆大以上等好酒一升半同煮至

酒盡焙乾

炙甘草

苦練生用

丁香

已上各五分

木香

升麻

已上各一錢

柴胡

二錢

炒黃鹽

全蝎

已上各三分

延胡索

四分

右與前四味藥同為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心淡醋湯下忌油膩冷物

酒濕麵

固真丸

治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目中澑火視物眩々而無所見齒皆惡熱飲痛湏得黃連細末擦之乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目中澑火腎水侵肝而上溢致目眩々而無所見齒惡熱飲者是陽明經中伏火也治法當大瀉寒濕以丸藥治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒製白石脂白龍骨以枯其濕炮乾姜

大熱辛瀉寒水以黃藥之大寒為因用又為鄉導
故云古者雖有重罪不絕人之後又為之伏其所
主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也以柴胡為
本經之使以芍藥五分導之恐辛熱之藥太甚損
其肝經故微瀉之以當歸身之辛熱大和其血脉
此用藥之法備矣

黃藥

酒洗

白芍藥

已上各

柴胡

白石脂

已上各

一錢

火燒

乾姜

四錢

當歸

酒洗

白龍

酒煮日乾

水飛為

末已上各二錢

右件除龍骨白石脂水飛研外同為細末水煮麵
糊為丸如雞頭仁大目乾空心多用白沸湯下無
令胃中停滯待少時以早飲壓之是不令熱藥犯
胃忌生冷硬物酒溼麵

烏藥湯

治婦人血海疼痛

當歸

甘草

木香已上各

烏藥

一兩

香附子

二兩炒

右咬咀每服五錢水二大盞去粗溫服食前

助陽湯 一名升陽
燥溫湯

治白帶下陰戶中痛空心而急痛身黃皮緩身重
如山陰中如水

生黃芩 橘皮 已上各

防風

高良姜 乾姜 郁李仁

甘草 已上各 柴胡 一錢 白葵花 七朵

右剉如麻豆大分作二服每服水二大盞煎至一
盞去粗食前稍熟服

水府丹

治婦人久虛積冷經候不行癥瘕塊腹中暴痛
面有黓黎黑羸瘠

硝砂紙隔沸湯 紅荳 已上各 桂心 另為

木香 乾姜 已上各 砂仁 二兩

經蝦花藥石研一兩 班狗 一百箇

生地黃汁 童子小便各一臘月狗膽一枚

芫荽三百個去頭足糯米一升炒米黃去米不用

右九味為細末同三汁熬為膏和丸如雞頭大珠
砂為衣每服一丸溫酒細嚼食前服米飲亦可孕

婦不可服

丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得
經隔少時其脉二尺俱弦緊洪按之無力其證自
覺臍下如冰求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物
多間有如屋漏水下時有鮮血右尺脉時微洪也

熟地黃

白芍藥

已上各三分

川芎

丁香

已上各四分

阿膠

六分

生艾葉

一錢

當歸

二分

右川芎為細末當歸酒洗剉熟地黃丁香為細末
艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零
二分去粗入膠再上火煎至一大盞帶熱空心服
之

黃芪當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾
捐身失血自後一次縮一十日而來今次不止其
人心窄性急多驚以予料之必因心氣不足飲食
不節得之大方曰無到彼診得掌中寒脉沉細而

緩間而沉數九竅微有不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足脾胃虛弱之證胃脘當心而痛左脇下縮急有積當脣有動氣腹中鳴下氣大便難虛證極多不能盡錄擬先治其本餘證可以皆去安心定志鎮墜其驚調和脾胃大益元氣補其血脉令養其神以大熱之劑去其冬寒凝在皮膚內少加生地黃去命門相火不致

四肢痠弱

黃連一分 生地黃三分

炒神曲

橘皮

桂枝五分各

草豆蔻仁七

黃芪

人參

麻黃不去節各一錢

當歸身

一分一錢

杏仁

研如泥五箇另

右㕮咀作二服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至二盞入諸藥同煎至一大盞於巳午之間食消盡服之一服立止其胃脘痛乃胃上有客寒與大熱藥草豆蔻丸一十五丸白湯送下其痛立止再與肝之積藥除其積之根源而愈

治婦人經脈漏下不止其色鮮紅時值七月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食沉懶困倦四肢無力大便時泄後再因心氣不足經脈再下不止惟覺氣下脫其元氣逆上全無惟覺心腹中氣下行氣短少不能言是無力以言非懶語也此藥主之

柴胡二分

炙甘草

生地黃已上各三分

橘皮

不去皮

熟地黃已上各五分

黃芪一分

蒼术

泔浸去皮

當歸身

白芍藥

白朮

已上各二錢

右十味㕮咀如麻豆大分作二服水二盞半煎至一盞去粗稍熱空心服之

柴胡調經湯

治經水不止鮮血項筋急胸痛瘠骨強痛

炙甘草

當歸身

葛根已上各三分

獨活

藁本

升麻已上各五分

柴胡

七分

羌活

蒼朮已上各一錢

紅花少許

右判如麻豆大都作一服水四大盞煎至一盞去粗空心稍熱服取微汗立止

一婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘕水泄不止穀有時不化後血塊暴下并水俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三兩行食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無勝無虛遺人夭殃無致邪無失正絕人長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之即愈下之即死大抵聖人立法且如升陽或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣此病是也當用此法治之升降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不畏哉夫人之身亦有四時天地之氣不可止認在外人亦體同天地也今經漏不止是前陰之氣血已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷以脫矣後陰者

主有形之物也前陰者精氣之戶下竭是病人周身之血氣常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也陽生陰長春夏是也在人之身令氣升浮者穀氣上行是也既病人周身血氣皆不生長穀氣又不勝其肌肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元二陰俱脫血氣將竭假令當是熟證今下焦久脫化為寒矣此病火沉久降寒濕大勝當急救之瀉寒以熱除湿以燥大升大舉以助生長補養氣血不致偏竭聖人立治之法既濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝湿是以所勝平之也當先調和胃氣次用白朮之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此便是大舉大升以助春夏二濕之久陷一下之至治也

益胃升陽湯

血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補殊不甘能生血此陽生陰長之理也故知先理

胃氣人之身穀氣為寶

柴胡

升麻 已上各

炙甘草

當歸身 酒洗

陳皮 已上各

人參 噎去之

炒神麴

已上各
錢五分 黃芪 二錢

白朮 三錢

生黃芩

少許

右㕮咀每服一錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱

如腹中痛每服加白芍藥三分 中桂 少許

如渴或口乾加葛根二分

不拘時候

升陽舉經湯

治經水不止如右尺脉按之空虛是氣血俱脫大寒之證輕手其脉數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之此法當大升浮血氣切補命門之下脫也

肉桂

去皮盛夏勿用
秋冬用

白芍藥

紅花 已上各
五分

細辛

六分

人參 去蘆

熟地黃

川芎

已上各
一錢

獨活根

黑附子

炙甘草

已上各
錢五分

羌活

藁本

去上

防風 已上各

白朮

當歸

黃芪 已上各
三錢

柴胡 三錢

挑仁 十個湯浸去
皮尖細研

右咬咀每服三錢若病勢順當漸加至五錢每服水三盞煎至一盞空心服

半產悞用寒涼之藥論

婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴去不能鎮撫也

血已虧損往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陰使二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈是禁用寒涼藥也分娩半產本氣不病是暴去其血亡血補血又

何疑。馬補其血，則神昌。常時血下降亡，令當補而升舉之。心得血而養，神不昏矣。血若暴下，是秋冬之令大旺。今舉而升之，以助其陽，則目張，神不昏迷矣。今立一方，補血養血，生血益陽，以補手足厥陰之不足也。

全生活血湯

紅花 三分

蔓荆子

細辛 已上各分

生地黃

夏月多加之

熟地黃 一錢

已上各

藁本

川芎

已上各

一錢五分

防風 諸陽既隨，何以知之

羌活

獨活

炙甘草

柴胡 去苗

當歸身 酒洗

葛根

已上各二錢

白芍藥

升麻

已上各三錢

右咬咀，每服五錢水，二盞煎至一盞，去粗食前，稍熱服。

當歸附子湯

治臍下冷痛，赤白帶下。

當歸 二分

炒鹽 三分

蟬梢

升麻 已上各

甘草

柴胡 已上各六分

黃藥

少許而引用

附子一錢

乾姜良姜

右為麩末每服五錢水五盞煎至一盞去粗稍熱服或為細末酒麵糊為丸亦可

調經補真丸

冬後一月微有地泥水泮其白帶再來陰戶中寒一服立止

獨活

乾姜炮

藁本

防風

蒼朮已上各

麻黃

不節去

炙甘艸

人參去蘆

當歸身

白朮

生黃芩

升麻已上各

黃芪

七分

良姜

澤瀉

羌活

已上各一錢

柴胡

四錢

杏仁二箇

桂枝

少許

白葵花

此養去萼

右咬咀除黃芩麻黃各另外都作一服先以水三大盞半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至一盞零七分再入生黃芩煎至一盞空心服之候

一時許可食早飯

坐藥龍鹽膏

茴香 三分

桔礬 五分

良姜

當歸梢

酒防已

木通

已上各一錢

丁香

木香

川烏

炮已上各一錢五分

龍骨

炒鹽

紅豆

肉桂

已上各二錢

厚朴

三錢

延胡索

五錢

全蝎

五箇

右為細末煉蜜為丸如彈子大縣裹蜀系在外內
丸藥陰戶內日易之

勝陰丹

為上藥力小再取三錢內加行性熱藥項下

柴胡

羌活

桔白礬

甘松

升麻

已上各二分

大椒

三奈子

已上各五個

川烏頭

破故紙

八分與蒜同
煎焙乾拌

全蝎

三個

鹿麝香

少許

右為細末依前法用

迴陽丹

羌活

全蝎

升麻根

甘松

已上各二錢

草烏頭

水蛭

炒已上各三分

大椒

桔礬

已上各五分

柴胡

川烏

已上各七分

三奈子

草撥

破故紙

炒黃鹽

為必用之物去之則不効

蒜一錢已上各

蜜魚

三個去翅足炒

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲臨經先腰脅痛甚則腹中亦痛
經縮三兩日

生地黃

二分

丁香

四分

當歸身

防風

羌活

已上各一錢

柴胡

一分錢

全蝎

一箇

右件都作一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱

服

延胡苦練湯

治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃藥

一分為引用

延胡索

苦練子

二分已上各

附子

炮

肉桂三分已上各

炙甘艸

五分五分

熟地黃

一錢

右都作一服水二大盞煎至一盞食前服
桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒

黃藥為引用 知母已上各 附子 三錢

肉桂 一錢

知母 五分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠熱

服

如少食常飽有時似腹脹夯悶加白芍藥 五分

如不思飲食加五味子 二十箇

如煩惱面上如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪一
五分 人參七分 炙甘草升麻已上各
五分

人參補氣湯

治四肢懶倦自汗無力

丁香末 二分 生甘艸梢 炙甘草已上各 三分

生地黃 白芍藥已上各 六分 熟地黃

人參 防風

羌活

黃藥

知母

升麻

已上各

柴胡 一錢

黃芪 一分

全蝎一箇

五味子二十箇

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

空心稍熱服

黃芪白朮湯

治婦人四肢沉重自汗上致頭際頭而還惡風頭
痛躁熱

細辛三分

吳茱萸

川芎

已上各

柴胡

升麻

已上各

當歸身

一分錢

黃藥

酒洗

炙甘草

羌活

已上各

五味子三錢

白朮

人參

已上各

黃芪一兩

右㕮咀每服五錢水二大盞生姜五片煎至一盞
去粗食前熱服

如腹中痛不快加炙甘草一錢汗出不止加黃藥
一錢

白朮茯苓湯

治胃氣弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾
胃之間當先實其脾胃

白朮

白茯苓

半夏一兩
各

炒麴二錢

麥蘖麵

五分
炒

右㕮咀每服五錢水二大盞入生姜五片煎至一盞去粗不拘時服

增味四物湯

治婦人血積

當歸

川芎

熟地黃

京三稜

肉桂

廣茂已上各
七分

乾漆

芍藥

右為麌末每服五錢水二大盞煎至一盞去粗食前稍熱服

補經固真湯

白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不効診得心包尺脉微其白帶下流不止叔和云崩中日久為白帶漏下時多骨末枯崩中者始病血崩久則血少復亡其陽故曰涓之物下流不止是本經血海將枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經藥為引用為使以人參甘油膩之藥潤其枯燥而滋

益津液以大辛熱之氣味藥補其陽道生其血脉
以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之

以微苦溫之藥為佐而益元氣

白葵花

去萼爛四分研

陳皮

五分不
去白

生黃芩

細研引入

郁李仁

去皮尖研如泥

甘草

炙

柴胡

已上各一錢

乾姜

細末

人參

已上各二錢

右件除黃芩外以水三盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至一盞去粗空心熱服少時以早飯壓之溫衛補血湯

治耳鳴臭不聞香臭口不知穀味氣不快四肢困倦行步欹側髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉中嘶不得臥口舌噬乾大息頭不可以回顧項筋緊脊強痛頭旋眼黑頭痛欠嚏

生地黃

白朮

藿香

黃藥

已上各一分

牡丹皮

蒼朮

王瓜根

橘皮

吳茱萸

已上各二分

當歸身

半二分

柴胡

已上各三分

熟甘草

地骨皮

已上各三分

升麻

四分

生甘草 五分

黃芪 一錢
二分

丁香 一箇

桃仁 三個

葵花 七朵

右咬咀作一服用水二大盞煎至一盞去粗食前

熟服

立効散

治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花

已上各一錢

右剉如豆大白紙裹定泥固炭火燒灰存性為細

末

如乾血氣研血竭為引好溫酒調服加輕粉一錢

如血崩不止加麝香為引好溫酒調服

四聖散

治婦人赤白帶下

川烏

炮製

生白礬

已上各一錢

紅娘子

三個

班貓

十箇

煉蜜為丸如皂子大綿裹坐之

溫經除濕湯

十月霜冷後四肢無力乃痿厥濕熱在下焦也。醋心者是濁氣不下降欲為滿也。合眼麻木作者陽道不行也。惡風寒者上焦之分皮胃中氣不行也。開目不麻者目開助陽道故陰寒之氣少退也。頭旋眩運者風氣下陷於血分不得伸越而作也。近火則有之。

黃連

一分

柴胡

草豆蔻

神曲

炒

木香

已上各二分

麻黃

不去節

獨活

當歸身

黃藥

已上各三分

升麻

五分

羌活

七分

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉

已上各一錢

黃芪

一錢

橘皮

蒼朮

已上各二分

白芍藥

一錢

右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞食遠服治肢節沉重疼痛無力之勝藥也。

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病診得六脉俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其

證閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退久則絕止常開其目此證不作懼其麻木不敢合眼致不得眠身體皆重時有痰嗽覺胸中常似有痰而不利時煩燥氣短促而喘肌膚克盛飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼為最苦觀其色脉形病相應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脉皆屬於目靈樞經云開目則陽道行陽氣遍布週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也

且麻木為風三尺之童皆以為然細較之則有區別耳久坐而起亦有麻木為如繩縛之人釋之覺麻作而不敢動良久則自己以此驗之非有風邪乃氣不行也治之當補其肺中之氣則麻木自去矣如經脈中陰火乘其陽分火動於中為麻木也當兼去其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外在上而作也當以溫劑實其皮毛身重脉緩者濕氣伏匿而作也時見燥作當升陽助氣益血微瀉陰火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之

本有邪也此藥主之

生甘草

去腎熱

酒黃蘖

鴻火除濕

白茯苓

除濕導火

澤瀉

除濕導火

升麻

行陽助經

柴胡

一錢各

蒼朮

除濕中補

升豆蔻仁

益陽退外寒

白朮

上各一錢五分

橘皮

當歸身

二錢各

白芍藥

人參

已上各三錢

佛耳草

二錢各

炙甘艸

已上各四分

黃芪

五分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠服之

麻黃桂枝升麻湯

治婦人先患渾身麻木睡覺則少減開目則已而全愈又治心中煩惱遍身骨節疼身體沉重飲食減少腹中氣不運轉

木香

生薑

已上各一分

桂枝

半夏

陳皮

草豆蔻仁

厚朴

黑附子

黃藥

已上各二分

炙甘艸

升麻

白朮

茯苓

澤瀉

已上各三分

黃芪

麻黃不去
節

人參已上各
五分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之

大便結燥門

大便結燥論

金匱真言論云。北方黑色。人通腎開竅於二陰。藏精於腎。又云。腎主大便。大便難者。取足少陰。夫腎主五液。津液潤則大便如常。若饑飽失節。勞役過度。損傷胃氣。及食辛熱味厚之物。而助火邪。伏於血中。耗散真陰。津液虧少。故大便結燥。然結燥之病。不一有熱。燥有風燥。有陽結。有陰結。又有年老氣虛。津液不足。而結燥者。治法云。腎惡燥。急食辛以潤之。結者散之。如少陰不得大便。以辛潤之。太陰不得大便。以苦泄之。陽結者散之。陰結者溫之。仲景云。小便利而大便硬。不可攻下。以脾約丸潤之。食傷太陰。腹滿而食不能化。腹響然。不能大便者。以苦藥瀉之。如血燥而不能大便者。以桃仁酒製大黃通之。風結燥而大便不行者。以麻子仁加大黃利之。如氣滯而大便不通者。以郁李仁枳實皂角仁潤之。大抵治病必究其源。不可

一盤用巴豆牽牛之類下之。損其津液燥結愈甚。復下復結極則以至導引於下而不通。遂成不救。噫可不慎哉。

通迷湯

治大便難。幽門不通。上衝吸門不開。噎塞不便。燥秘氣不得下。治在迷門。以辛潤之。

炙甘艸

紅花

已上各

熟地黃

升麻

生地黃

桃仁泥

當歸身

已上各
一錢

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗調換。擗細末五分。稍熱食前服之。

潤燥湯

升麻

生地黃

已上各

熟地黃

當歸梢

生甘草

已上各

大黃

煨

桃仁泥

麻仁

已上各

一錢

紅花

五分

右除桃仁、麻仁另研如泥外。判如麻豆大都作一服水二盞。入桃仁、麻仁泥煎至一盞去粗空心稍熱服。

熱服

潤腸丸

治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥閉塞不通全不思食及風結血祕皆令閉塞也以潤燥和血疏風自然通利矣

桃仁湯浸去皮尖一兩各
大黃煨五錢各

麻仁已上各
羌活已上各

當歸梢

右除桃仁麻仁另研如泥外搗為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心白湯下
如病人不大便為大便不通而澀其邪盛者急加

酒洗大黃以利之

如血燥而大便燥乾者加桃仁酒洗大黃

如風結燥大便不行者加麻仁大黃

如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之

如麻澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥

如寒陰之病為寒結閉而大便不通者以局方中半碗丸或加煎附子乾姜湯冰冷與之其病雖陰

寒之證常服陽藥補之若大便不通者亦當十服
中與一服藥微通其大便不令結閉乃治之大法
若病人雖是陰證或是陰寒之證其病頭燥脉實
堅亦宜與陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥止
勿加

如陰燥欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細
而遲此易為辨耳知有客邪之病亦當從權加藥
以去之

麻黃白朮湯

治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及
腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痠
軟不能舉動喘促唾清水吐痰白沫如膠時
躁熱發欲去衣須臾熱過振寒項額有時如冰額
寒尤甚頭旋眼黑目中澑火冷淚鼻不聞香臭少
腹急痛當臍中動氣按之堅硬而痛

青皮

去腐

甘草

已上各一分

升麻

已上各二分

橘紅

人參

桂枝

已上各

黃芪

白朮

厚朴

柴胡

蒼朮

豬苓

已上各三分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉

已上各四分不去節

白豆蔻

炒麴

已上各五分

麻黃

已上各五分

杏仁四個

右咬咀分作二服水二大盞半先煎麻黃令沸去沫再入諸藥同煎至一盞去粗稍熱食遠服此證宿有風濕熱伏於榮血之中其水火乘於陽道為上盛元氣短少上喘為陰火傷其氣四肢痠在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其藥治之

肝木又實其母肺金尅火凌木是大勝必有大腹其證善恐欠多嚏鼻中如有物不聞香臭目視睭睭多悲健忘少腹急痛通身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰唾涕有血目眚瘍大便不通並宜此

藥治之

陽湯一名升陽

治膈咽不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子

已上各二分

生地黃

熟地黃

黃藥

已上各三分

當歸身

甘草梢

已上各四分

蒼朮

五分

升麻

七分

黃芪

一錢

桃仁

另研十箇

右咬咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞
煎至一盞去粗稍熟食前服

活血潤燥丸

治大便風秘血秘常三燥結

當歸梢

一錢

防風

三錢

大黃

裹煨紙

羌活

已上各一錢

桃仁

如泥二兩研

麻仁

裹煨紙二兩五錢

阜角仁

燒存性得濕則去皮一兩五錢

其性

研如泥

左除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸
如梧桐子大每服五十丸白湯下三兩服後湏以
蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也
以磁器盛之紙封無令見風

潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黃

生甘艸

已上各二錢

大黃

煨

熟地黃

當歸梢

升麻

已上各一錢

桃仁

右㕮咀水二盞煎至一盞去粗食遠溫服