

頌西針

六七

						和書門類
三	八	大	四三〇三	號	類	
冊	架	函	號	類		

庫	文	閣	內
九	四		和
五	三		

內閣文庫	
番號	和 43103
冊數	3 (3)
函號	195 18



▲臨產滑胎第一 滑胎枳殼散 救生散

丹參膏 又方 丹參膏 又方

▲催生方論第二 催生如神散 又方

又方 又方 催生丹 催生萬金不傳仙丹

又方 滑石湯 磁石散 一方 又方

又方 又方 又方 又方 又方

又方 又方 催生神妙乳珠丹 一方

方 又方 一方

▲產後諸病第三 黑神散 玉露散 理
中圓 當飯散 地黃丸 清魂散 一方
一方 又方 七珍散 胡氏孤鳳散 調經
散 茯神散 七寶散
▲產後中風第四 茯苓散 小續命湯
愈風散 敗芥散 獨活湯 一方 防風湯
七物湯
▲產後血病第五 大岩蜜湯 當飯散

大黃湯 地黃散 芎藭湯 四賢湯 獨聖
散 延索散 香桂散 蓬萊木散 增損四
物湯 知母湯
▲產後瘧病第六 草菓飲子 生熟飲子
▲產後蓐勞第七 增損柴胡湯 白茯苓
散 佛手散 七賢湯
▲產後胎衣不下第八 奪命丹 如聖散
二聖散 一方 又方 又方 又方 又

方 又方 又方 又方 又方
小兒臍緒切次第 胎衣納次第

甄醫抄卷第六

性全集

婦人第六

臨產滑胎第一

凡妊者十月已滿形躰已成テ神儀悉ク具リテ氣ヲ分テ産ニ赴ク宜ク胎ヲ滑スル藥ヲ服シテ産ヲ可易_{レマス}ス

滑胎枳殼散

産月_ニ到_ラス日々_ニ此藥ヲ服ス六胎ヲヤサシテ産ヲ易ス又六七ヶ月ヨリ服ス_ニ弥吉_シ兒生_レテ則_テ瘦_セ黒_ニテ百日以後色漸_ク白_ク

婦人聖藥

肌鮮^カ身不生^レ瘡^ヲ此藥^ハ南岳^ノ道士^ノ所奉^レ
又明醫^ノ說^ト云文^ニ雖禁^ト是甚^タ有^リ効^シ 枳殼

二 甘草^一
又

右細抹^ノ每服^一錢空心^ニ沸湯^ニ可服^日
三度

救生散 今世^ニ多^ク滑胎^{枳殼散}ヲ用^フ是^アレ

トス^ニアラス^但枳殼^ハトヨク胎^ヲ瘦^ス胎氣^肥
シ^人ハ最^モ可^レ與^若胎氣^弱カ^レハ可^レ惡^カル^仍

此藥^ハ能^ク胎^ヲ易^シ氣^ヲ増^シ子^ヲ堅^シテ無^レ病^又

産易^シテ母子^共安穩^也産^月入^ス每^日

可^レ進^之 人參 訶梨勒^{炮去} 麥蘖^分 白朮

焙^判 神麴^炒 陳皮^{去裏}

右等分^ニ細末^ノ每服^三錢水^一盞入^テ七分^ニ
煎^シ空心^ニ食前^ニ温服^ス

丹參膏 此藥^ハ胎^ヲ養^産月^入テヨリ服^ス六

胎^ヲ滑^シテ産安^シ 丹參^八 川芎^當 飯

婦人聖藥

四

各八 蜀枳

右細剉合酒ニミテ一夜置テ猪脂四升入テ煎シ色赤ク血ノ如ク時新キ布ヲ以テ滓ヲ絞リ棄テ每服棗ハカリ酒入テ可服ス私ニ云ク此藥本道ノ明醫盛用之故ニ是書ニ載ス

又方

丹參膏

異說

丹參

芎藭

人參

各一

山枳

當皈

猪脂

右各細末猪脂搗合テ醋浸シテ一二三日

經テ其醋共ニヌキ火ニ居テ能練テ取下テ

又居如此スルヲ二三度シテ練堅メテ後棗

核ホトヲ温酒ニテ可服ス日ニ三度婦人孕シテ

七日ヨリ後始テ可服漸ク産ノ時近ク其氣

ツカハ棗ノ大サ一服ス日ニ五六度産餘リ近

付ハ湯ヲ以テ可服ス右血ノアカリタル時モ是ヲ

可服ス又古血ノアカリタル時ハ地黄ヲ搗絞ツテ

婦人血脈經 卷之六 五
可服又アサミモヨシ又百會巨闕ヲ可炙ス

又方

車前子

炒テ
研篩

右細抹ノ每服二錢酒ヲ以テ可服酒ヲ不服
人ハ水ニテ可服是胎ヲ滑ニ産ヲ易ス事諸藥
勝タリ又煎テ子ハくト服ス至弥吉

▲催生方論第二

夫産ノ坐臨テ久不生カッ盡ニ氣弱ク成テ在時ヲ
遷サハ諸ノ産ヲ催ル妙藥ヲ服シテカヲ助テ可

産ス

催生如神散

逆産横産諸難産ヲ治ス産前

産後ノ虚損月水不調崩中等少病ヲ治ス 百

草霜

百ノ草ヲ焼タル烟ノ炭
或云鍋釜ニキタルス

香白芷

忌火

右等分ニ細末ノ每服二錢酒半盞童子小
便半盞ト入テ少シワカシテ搗碎テ可服兩
三服ニ必ス生ル也

又方

黒大豆ヲニ破テ中ニ男ノ名ヲ書テ本如

婦人血脈經 卷之六 五

合テ男ノ口ニ水ヲ含テロウツニニ女ニ可_レ吞ス

又方 柚核ヲホシテ細末ノニ錢生湯_トニテ可_レ

服ス

又方 柚核ヲ取集テ乾テ摺リ糠ヲ土鍋ニ入テ

其上ニ置テ蒸テシメリタル時ニ皮ヲキテ中ノ實ヲ

取テ未_レニテ湯ニテ一錢可_レ服ス七ヶ月ヨリ八月ニ

度ツ、九月ヨリハ日ニニ度_ツ死_ツ可_レ服ス

催生丹 一切ノ難産ヲ治ス産婦ノ産近付テ

腰痛ク自赤ク正ク子産門ニ臨時可_レ服ス 兔

腦 去皮トク_レ可_レ研ル 乳香 二錢半 丁香 去花_ヲ 錢重

麝香一字 一字トハ一錢重サヲ四_ラリテ 其一ナリヨ_リカニス

右四味能_レ研_リ合_テ兔ノ腦ヲ以_テ丸_ニスホトヲ

計_テ研_リ合_テ○是程_ニ丸_ニテ陰干_ニシテ油

紙_ニ裹_テ風ヲ引_セスニテ持_テ每服_一丸_鈍

湯_ニテ可_レ服_ス立地_ニ産_ス則チ子_ノ手_ニ此_ノ藥_ヲ

握_テ生_ス也女子ハ右_ノ手男子ハ左_ノ手持_テ

生也

催生萬金不傳遇仙丹

草麻子 十四粒
去皮
辰

砂 雄黃 各一錢
半重
蛇蛻皮 大九二尺灰ニヤテ

右細末ノ米飲ノ子ハクトアルニテ○是程ニ丸

産ノ時臨テ先ツ山柝ヲ煎シ丸湯ヲ以テ臍

下ヲ洗イ温メテ次ニ此藥ヲ一丸臍ノ中ニ當テ

上ニ蠟紙ヲ四重五重覆テ其止ヲ廣キ布

ニテモ縮ニテモ帶ヲ以テ押テ引廻シテ可結

須臾ニ生ス生キヤカテ藥ヲ取テ鈍湯ニテ藥

跡ヲ湿シテ拭棄ヨ此藥ヲ二度用也

有効深ク是ヲ可秘ス

又方 蛇皮ヲ灰ニ焼テ半錢温酒ヲ以テ可服ス

滑石湯 横産倒産及ヒ子ノ先ツ手足ヲ指出シ

各ニ可與 阿膠 滑石 葵子
炒テ 碎ク 各一升 細末ス

右水一盞入テ一盞煎シ滓ヲ去テ二服分テ

婦人血脈金 卷六 七

婦人血脈經 卷之六
可服極テ有効

磷石散

難産、數日不生治ス

雲母

五錢ノ重サヲ

土ノケナクテ多ク
シテスリル

右温酒ニテ可服入合ニ則産ス萬ニモ不有矣

陸氏方ニ此藥既ニ五十人ヲ救與テ莫不有効

一方

横産逆産及腹中ニ子死テ不生治ス

伏龍肝

○是程ニ丸ニテ辰砂ヲ衣メ日ニホシテ毎服一丸ヲ
欲産時冷酒ニテスリトキテ可服良久ニテ生
二度可與若子腹中ニ死テ不生黑豆一合ヲ
吉醋五合入テ黑豆ノ爛ル程煮テ其汁ヲコレ
温ニテ此藥一丸スリトキテ可服須臾ニ下若遲
二度可服若胞衣不下又此藥ヲ如此可服
此藥五月五日午時合名弥吉七月七日三
月三日モ吉

一方 子腹中死シテ不生ラ活サ 桂心末二錢 麝香

當門子大丸一麝香

右研リ合テ温酒ニテ可服手ヲ以テ内ヨリ推
出ス如シ出也

一方 一切難産ヲ治ス第一也金箔 三片 兔

毛筆三ツ灰ニヤケ

右研リ合テ蠟ヲ解テ搗キ合テ○是程カ一
服ト成テ温酒ニテ可服ス

又方 諸難産ニ服ス六立地ニ生ル兔頭十二月兔頭ヲ灰ニ燒テ可服ス

右細抹シ葱ノ白根ヲ煎シ各ニ一錢ニ服ス

一方 子腹中ニ死テ不出テ一切ノ藥ニ無効可

與フ水銀半分ス 桂心末二錢

右是ヲ一服ニ温酒ニテ可服酒ヲ不飲入米
飲テ可服ス

▲産後諸病第三

黒神散

婦人ノ産後ニ惡露下ルコト不能及胞

衣不下^テ血アカリ^テ心ヲ衝キ攻メ胸塞リ苦ク

臍腹堅脹^テ擢^ツ裂カ如ク痛ニ血暈^トテ血アリ

テ目眩キ肝キエシ眼暗クロクイフサキテアカス

一切産後ノ病莫^レ不治^セ 熟乾地黄 蒲黃^炒

當皈 乾薑^{炮ス} 桂心^{去麋皮} 芍藥 甘草

各四 黑豆^{炒テ皮ヲ去リ} 半升^{古方ニ升ハ長クシテ}

右細抹之每服一二錢酒半盞童子ノ小便半

盞入テ煎シ可服此藥一切産後ノ病ヲ治ス

玉露散

産後ニ身躰壯熱ニ疼キ痛ニ頭重ク

目暗ク大便澁^リ滯^リ乳汁不下^ラ治ス 人参

白茯苓 甘草^{各半} 桔梗^焙 川芎 香白

芷^{各一} 當皈^{一分} 芍藥^{三分}

右細抹之每服一二錢水一盞入テ七分煎

滓ヲ去テ可服ホトナリ甚シク大便結^ル大

黄一二錢半ヲ加

理中圓 産後則テ血氣共ニ損ニテ五藏俄ニ
 虚ニ遍身羸瘦テ氣弱ク汗垂リテ不止治
 産後百日内常ニ服スル氣ヲツヨクシ虚ヲ補
 藏府養ニ飲食ヲ進メ下切ノ病ヲ除ク 廿
 草四 白木 人參 乾薑 各二各二
 右細抹シ煉蜜ニテ○是程ニ丸ノ每服三丸
 ツク空心ニ米飲ニテ可服新ニ産ニテマカテ
 可服七日内日々ニ三服セヨ

當取散 産後ニ氣血共ニ虚ニタル治是ヲ服
 スル惡露能ク下ル 當取 芍藥 川芎 黃
 芩 各一各一 白木 半半
 右細抹シ温酒ニテ一錢宛可服童子ノ小便ヲ
 温テ服ス弥吉シ

地黄丸 産後ニ腹痛ニ眼暗ニテ黒花ヲ見或
 發狂ニテ鬼ヲ見或胎衣不下ラ或音ヲ失ヒ物
 不言心胸脹滿シ水穀不化口咽乾キ或冷テ

婦人聖藥

夕千熱口中生瘡或喉腫痛或肝キ
 へレ夜不能睡或産後中風テ筋鈎リ
 面赤ク牙ヲクイツ或崩中或腹中豚ノ如ク
 クリアリキ臍腹鈎リ痛手足腫唇口爪
 甲青ク黒キヲ治ス 生地黄 搗絞汁ヲ取テ
 生薑 搗絞汁ト 滓ヲ可取 蒲黃 當飯 各四 又
 右石鍋ニ入テ緩火ヲ以テ地黄汁ニ生薑滓
 入テ炒リ乾カシテ生薑汁地黄滓ヲ入テ

炒乾シテ各焙リテ搗篩テ麵粉ヲ醋ヲ以テ
 糊煉テ搗合テ○是程ニ丸ヲ每服一丸食
 前ニ當飯ヲ酒ニテ煎名ニスリキテ可服ス

清魂散

産後血暈上テ氣血虚シテ血氣ニ
 著テ上リテ心神ヲ迷乱シ眼前ニ花ノ散ヲ見
 甚キ時悶絶シテ人ヲ不見知齒ヲクイツテ
 神昏クイキ冷名ニ此藥ヲ與ニ立地ニ愈也

澤蘭葉 生子上テ水邊ニ 生蟲物ナリ 人參 各一 荊芥 一又

川芎 半升

右細抹之每服一錢ヲ沸湯半盞酒半盞
入合テ搗キ立テ可與若齒クイツテ不開六
木ヲ以テロヲ子アケテ可灑藥レ喉ニ下テ
眼ヲ開テ蘇生ス

一方 産後ノ血暈ノ狂言胸熱シ口乾治
生香附子 去毫ヲ

右細抹之每服二錢水一盞姜三片棗二
个入テ七分煎シ温服ス

一方 産後ノ血暈ノ息欲絶ト人ヲ不見知言
語錯亂ト惡血不止腹中絞リ痛ニ及テ子腹
中死シテ不出治ス 紅花 十錢

右細末之ニ服ニ分テ酒一盞ヲ以テ一盞
煎シ冷テ可服滓ス一服ヲ度ニ又煎
テ可服ス

又方 産後ノ血暈ノ忽ニ氣絶ハ目昏キヲ治ス

婦人血暈

半夏

右細抹ノ水ヲ以テ○是程ニ丸シテ鼻ノ中ニ
入ヨ則チ蘊生シテ心明ナリ又細末ニノ筆
管ヲ以テ鼻ノ孔ニツヨク吹キ入ヨ此事聊カ秘重
ナリトイヘ人々助ヲ以テ為宗故ニ是ヲ記ス
也易多ク不傳之深可レ秘ス

産後ニ不言物病アリ云ク人心ニ七竅ニラノ毛
ヲリ産後虚弱ナハ敗血此七竅ヲ塞ク此

故ニ神志不能明心ノ舌通ス是依テ心氣閉塞
レハ舌強リテ不能言口七珍散是レ治ス

七珍散

人參 石菖蒲 生乾地黄 川芎

各一錢 細辛一錢 防風 辰砂別研テ各半

右細末ノ每服一錢薄荷煎物ニテ可レ服
不定時ヲ

胡氏孤鳳散

産後目ヲ閉テ不言治ス白

礬細研

右每服一錢沸湯ニテ可服ス

産後ニ鬼ヲ見事アリ此ハ血ヲツカサトル心氣
虚ニ故ニ敗血心ヲ冒ス是ニ依テ心中乾キ煩
燥ニテ起臥不安心不正故ニ忽ニ鬼神ヲ見言
語乱レ不尋常ニ調經散是ヲ治ス

調經散

沒藥

研碎

琥珀

研碎

桂心

去鹿皮各

一錢 芍藥

當散

各一

麝香

研

細辛

各半

右細抹ノ每服半錢生姜汁ト與酒合テ

煖タルニテ可服ス

茯神散

産後ニ血脉乱テ心神恍惚ニテ言

語不正睡臥不安治

茯神

一及去皮

人參

龍

齒

研

琥珀

研

赤芍藥

黃耆

牛膝

各三分

生地黃

一及半

桂心

半

右細抹ノ每服三錢水一盞入テ七分煎

滓ヲ去テ温ニテ可服不拘時

七宝散

産後ニ心神驚悸ニ藏氣弱ヲ治ス

此藥血氣ヲ調和シ虛ヲ補シ神ヲ養ヒ驚悸ヲ

治ス辰砂研ル桂心 當皈 川芎 大參

白茯苓 羚羊角各二錢 乾姜一錢

右細抹シ每服一錢米飲ニテ可服ス

▲產後中風第四

夫產後中風ニテ心慌惚死事ハ血氣乱ル心不正此故風邪被毀心ホル也

茯苓散 產後中風ニテ心ホテ神不定言

語乱物狂ハレキヲ治ス 茯苓三 芍藥二 甘

草 桂心去麋皮ヲ 當皈各一 生姜六 麥

門冬一升 大棗三十 核ノ大ニナシ

右爲散水ニ升入テ一升ニ煎テ滓ヲ去テ

二服ニ分テ一度食後ニ可服小續命湯ヲ

與ヨ

俞風散 產後中風口噤シ牙ヲクイツメ筋鈞リ

手足痿痺若ハソリテ弓ヲ張カ如ク或ハ血止リテ

目眩キ人ヲ不見知或ハ血心ヲ衝キ目昏シテ
タウレ吐瀉ノ欲死セト治ス 荊芥 少炒焙テ
細末ス

右每服二錢豆ヲ炒テ酒ニ入テ酒ノアタニリ
タルニテ可服若シ口噤シタスハ木ヲ以テ予チアケ
テシケ若ハ齒ノアゲニ此藥ヲスリヌレ若ハ鼻
孔ニ吹ケ皆効アリ立地ニ施驗

飯芥散 産後ノ中風人事ヲ不覺延ヲ吐キ手
足痠痺ヲ治ス 當飯 荊芥穗 各半分

右細抹シ每服二錢水一盞酒少し入テ七分
温ニテ可服若シ口噤シタスハコチアケテシケ
口開ハ急キ與テ令服甚有効

獨活湯 産後ノ中風ノ口噤スルニ可與フ 獨活

八 及 乾葛 六分 甘草 二分 生姜 五分
右細判ニ合テ水二升ヲ以テ一升ニ煎テ一
服分テ可服

一方 産後ノ中風ノ遍身冷スクニ口噤シ人ヲ

不見知治ス白米四又
細剉ム

右酒三升ニテ一升ニ煎之頓ニ可服立地有

効レ

防風湯 産後ノ中風腰背強直レ時反張多

風痿名ク此藥是ラ治ス防風 葛根 川芎

地黄各八 麻黄去節 甘草 桂心 獨活

防已各六 杏仁五ケ去

右細剉合水八升ニテ先麻黄ヲ煮テ沫

去テ後餘ノ藥ヲ入テ三升ニ煎之ニ服分テ

温ニテ可服汗多シ入ハ麻黄ヲ去テ煎シ

可服ス

七物湯 産後ノ中風半身不從レ言語澁リ

滯リ恍惚トノ物忘レ精神不定治獨活

當皈 芍藥 防風 川芎 玄參各二分形

桂心一分

右細剉水八升ニテ一升ニ煎之ニ服分テ三

婦人血脈不通之類

度可服二三劑可服ス

▲産後血病第五

大岩密湯

産後惡血堅リテ心痛シ冷氣ト

血ト闘テ痛ニ或ハ凝リ堅リテ血瘀トナル此病

朝ニ發テ夕ニ死シ夕ニ發テ朝ニ死ス此藥是ヲ治

獨活

生乾地黄

當皈

吳茱萸

芍

藥 乾姜

甘草

桂心

小草

各一及遠

細辛

半及

右細抹レ每服半及水ニ盞入テ一盞煎

滓ヲ去テ温服ス

當皈散

産後惡血不盡シテ腹中ニ凝堅テ

痛ムコト不可忍ヲ治ス

當皈

芍藥

桂心

各三

桃仁

百二十粒去皮尖ヲ

右細剉テ水六升ニテ二升煎シ滓ヲ去テ二

服ニ分テ温服ス

大黃湯

産後惡血堅リテ腹中ニ赤リ痛ヲ治

女入血... 六六

大黃 生乾地黄 當飯各十 川芎 芍

藥 桂心各八分 甘草 黃芩各六分 桃仁十四粒去

皮尖去

右細剉合テ水七升入テ一升半煎後大

黃ヲ入テ少煎シテ三服分テ三度可服ヲ

地黄散 產後惡血不盡テ腹中ツリ痛不

可忍治凡產後常可服生乾地黄

當飯少炒 生姜半剉

右細抹之每服一錢酒テ姜ヲ燒テ煎之

立テ可服ス

芎藭湯 產後腹痛テ不可忍治川芎

桂心 當飯 吳茱萸 茯苓 芍藥 甘草

各六分 桃仁十分

右細剉テ水七升入テ二升煎之滓ヲ去テ

二服分テ可服ス

四賢湯 產後腹中系リ痛テ不可忍治ス

婦人血... 六六

當皈 白芍藥 川芎 乾姜

右等分細抹之每服一錢温酒之可服一
方延胡索ヲ加テ用テ弥吉

獨聖散 産後腹痛不可忍治之 當皈

右細抹之每服一錢水一盞入テ七分煎
温服ス

延胡索散 産後臍下疼痛多治之 延胡

索 桂心各半 當皈一

右細抹之温酒之テ一錢宛可服

香桂散 産後臍下疼痛不止治之 川

芎 當皈各一 桂心半

右細抹之服三分テ每服一錢温酒之テ可服

蓬莪朮散 産後血海虚氣弱之テ腹藏疼

痛之胸苦痛月水不調及腹中血瘕積

聚ヲ治ス 蓬莪朮 桃仁去皮尖大小麥 大黃

紙裹テ 湿之テ炮ス 當皈焙各一 桂心 南木香 川芎

牡丹皮

延胡索炒

芍藥

各半

右細抹ノ每服一錢温酒ニテ空心可服又臥時

可服ス

増損四物湯

産後陰陽不和ニテ腫惡血盛

テ肺ニ入六忽ニ熱レ脾ニ入六寒ス故ニ忽チ寒ニニ

不レ忽ニ熱ニテホメク瘧病ニ似多此藥是テ治ス

四五服ス則チシツ元其甚有効遍身腫テ忽ニ

欲死治スル秘藥也人參 當取 芍藥

芍

乾姜

各一 又甘草

四錢

木香

一又

右細剉合テ每服四錢水一盞姜三片入テ七

分煎滓ヲ去テ温服不定時此藥ハ産後ノ

一切ノ遍身腫ヲ治ス

八母湯

産後ニ乍寒之乍熱ノ遍身ホトヲリ

心胸煩悶多治ス

知母

三又

芍藥

黃芩

各二又

桂心

甘草

各一又

右細剉合テ水五升入テ一升半煎之二服ニ

分テ可服

▲産後瘧病第六

草菓飲子 産後瘧病ノ一日一發ニ或ハ日阻

發リ或ハ二三日ニ一度發リテ寒熱多ク治ス

半夏洗テ七反 赤茯苓 甘草焙 草菓炮去

川芎 陳皮 白芷忌火 青皮去 高良

薑 紫蘓各一錢 乾葛四錢

右細剉合 每服三錢水一大盞姜三片蜜

一ツ入テ七分煎少滓ヲ去テ發日早朝服セ

然未發先ニ四服ツケテ可服必有効

生熟飲子

産後ノ瘧病ノ寒多ク治ス 肉豆

蔻 草菓仁 厚朴去テ麋皮ヲ 半夏七反 陳

皮 甘草 生姜 大棗去核

右細剉合テ半分ヲ紙裏テ水ニ湿テ熟灰

蒸テ半分ハ生テニ搗合テ每服五錢重

水二盞入テ七分煎滓去テ食前ニ服食

後一服者

▲產後蓐勞第七

夫產後ノ蓐勞ト云ハ産時血氣虛弱ニシテ飲
食未復本身羸瘦ヲ咳レ口乾キ頭重ク痛ク半
又ヒラキ痛ニ盜汗多寒熱允事瘧病ノ如クテ
背膊熱シ痛ニ手足重クシテ立居懶ク常ニ床
蓐ニ臥息ム此故ニ蓐勞ト名ク

增損柴胡湯

產後蓐勞瘦羸テ寒熱之飲

良不進腹脹ルヲ治ス 柴胡 人參 甘草

半夏 陳皮 川芎 白芍藥 各等分

右細剉合テ每服三錢水一大盞姜五片棗
一ツ入テ七分煎之滓ヲ去テ食後温服日ニ一

服

白茯苓散

產後蓐勞寒熱允下瘧病ノ如

ナルヲ治ス 白茯苓 當歸 川芎 桂心

白芍藥 黃芩 人參 熟乾地黄

右細判合^三一四錢水一盞姜二片棗二ツ入テ
七分煎^二滓^一去^テ食前^ニ可服^ス

手散 産後^ニ血氣^ニ虚損^シ勞^ニ衰^テ盜汗^多

弱^ク咳嗽^シ痰^多治^ス 當飯 川芎 黃

著^{各一}柴胡^{各一} 前胡^{各一}

右細判合^三一每服^三錢水一盞桃柳ノ枝

各三寸棗^一ツ烏梅^一姜^三片入^テ六分煎

滓^一去^テ温服^ス痰^{アル}人^ハ烏梅^ヲ除^ケ

七賢湯 産後^ノ虚勞^ニ飲食^不進^テ手足^無力^カ心

腹^支痛^ニ羸^ニ弱^キヲ治^ス此藥^ハ虚^ヲ補^シ氣^ヲ

收^ム人參 芍藥 桂心 甘草 生姜^{各一}

當飯^一双 生地黃^二双

右細判合^三一每服^三錢水一盞棗^二入^テ一盞

煎^シ滓^ヲ去^テ温服^ス日^ニ三服

▲産後胎衣不下^ラ第八

論曰胎衣不下^ラ如何答云母生子^レ畢^ツ血流^テ入^テ

婦人頭蓋^ノ血^ノ...

衣中爲血トル、トコロナリ此故不得下、下ヲ漸ク緩ク
腫滿腹中次ヲ以テ上ヲ衝キ心胸疼痛、喘急
難治、但奪命丹服ス、速衣中、血ヲ去リ血
散シ脹消シテ胎衣自下テ無憂

奪命丹

產後胎衣不下治方

附子

半又
炮去

皮
臍

牡丹皮

一又

乾漆

一分搗
研炒

人加粉

右爲末、吉醋一升ニ太黃一兩同熬テ成膏
和藥梧桐子、大サク如シテ温酒ニ下、五七圓

如聖膏

胎衣下ス治方、單麻子七枚去皮

研爲膏、足レ裡可塗、胎衣下ハ急足裡可洗不

然、腸出若腸出、件藥頂上可塗、腸又自入

二聖散

胎衣下

一卷在之
通藥也

一方

胎衣不下治ス、牛膝根搗キ絞リテ汁ヲ

可服ス

又方

麥門冬ヲ搗キ絞リテ汁ヲ可飲

又方

兔毛灰燒テ酒ニ入テ可服ス

婦人頭膏

三十八

又方 麩末ヲ酒ニ入テ可服ス

又方 胡麻油ヲ可服ス

又方 破多ヲ舌ヲ燒テ水ニテ可服

又方 青花ヲ湯解テ可服ス

又方 弓ノ弦ニテ腰ヲ結ヘ

又方 仙松子研テ可服湯ニモ廿一粒

小兒臍緒切次第臍緒ヲ六寸ニキレ切目甘草

ホヲ付ヨサテ兒ノ手ヲ引舉テカフクト三度云胎衣

納ル次第 先能洗テ又吉酒ニテ可洗其後新キ

土鍋ニ入テ蓋ヲ覆テ青絹ニ裹テ月徳方ニ日

當ル處乾ク土ヲ二尺掘テ底ニ埋テ左ノ足ニテ

度踏テ幸アラセヨト云テ黒筆ヲ具テ可埋猪犬

不掘様ニ可埋掘出シヌレハ其子有病蟻刺食

其子惡瘡出ツ神社若墓處ノ邊ニ埋ハ盲目ト成ル

流水若池邊埋其子水流テ死ス水出處井邊

埋耳不聽道邊埋果報少是ヲ能可慎者

婦人血脈經 卷第六
三十九
婆扁鵲神農皇帝ノ口傳共能可慎

頓醫抄卷第六 終

△產後脹滿第一 抵聖湯

△產後嘔逆不食方論第二 丁香散 一

方 苦辛湯

△產後霍亂第三 白朮散 附子散 高

良薑散

△產後傷寒第四 人參當歸散 增損柴

胡湯 陽且湯

△產後頭痛第五 一奇散

△產後咳嗽第六 附喘息 二母散 前

胡湯 旋覆湯 參蘓飲 一方 一方 羌

活散

△產後血崩第七 固經丸 芎藭湯 熟

乾地黄散 加減吳茱萸湯 枳木湯 漢防

已散

△產後腹痛及瀉痢方第八 調中湯

一方 桃膠散

黃連丸 黃連阿膠丸 茯苓人參散 赤石

脂丸 艾葉阿膠散

△產後大便秘結第九 麻仁丸 二子飲

△產後大小便不通第十 通秘圓

△產後諸淋方論第十一 瞿麥飲 木通

散

△產後小便數方第十二 產後小便數治

方

婦人產後諸方

婦人與產金一

△產後玉門開不合方論第十三 硫黃散

一方 玉龍湯 又方 一方 又方 又

方 又方 又方 又方 又方 又方 又

方

△產後乳汁不行方第十四 枯樓根粉

湧泉散 又方 又方 又方 又方 又方

又方 又方

△產後吹姝方論第十五 枯樓散 天南

星散

△乳癰方論第十六 瓜蒌散 又方 又

方 又方 又方 又方 又方 又方 又

方 又方 又方 又方 一方 一方 止

汗散 當眼黃耆散 琥珀散

婦人與產金一

三

頓醫抄卷第七

性全集

▲婦人第七 ▲產後脹滿第一

產後惡血散_レ逆_レ脾胃入_レ時_ハ脾胃弱_レ不
能消化_ス腹脹_レ飲食不收_ラ故_ニ吐逆_ス醫者惡血故
不知世_ノ常_ク脹滿_シ藥_ヲ與_テ忽_ニ脾胃正氣損_ラ
非_ス不_レ除_レ病_ヲ又忽_ニ人_ヲ害_ス抵聖湯可_レ與_フ

抵聖湯

產後_ノ脹滿_ヲ治_ス 赤芍藥 半夏_{七友}

澤蘭葉 人參 陳皮_{各一分} 甘草_{一錢}

右細剉テ水一盞生姜焙乾ノ半兩入テ半盞煎シ滓ヲ去テ温メ三服分テ可服ス

▲産後嘔逆不食方論第二

夫胃府ハ水穀ノ海ナリ水穀精血氣ト成テ藏府ヲ温メ壯ニス爰ニ産ニ依テ腸胃疲弱不消水穀胃乾氣逆ス故ニ嘔逆シテ不食

丁香散 産後脾胃ノ氣寒ニ心胸滿悶ヲ嘔

逆ス手足無力ラ飲食不進治ス 丁香 去花ヲ

人參 檳榔子 白朮 桂心 當皈 厚朴

姜汁ニテ纏ヨ 前胡 各三分 甘草 半 高良姜 一

右細剉合ニ每服四錢水一盞姜三片入テ七分煎シ滓ヲ去テ空心温服ス

一方 産後嘔逆不止治ス

陳皮 一 半夏麴 半 夏 粉ヲ

姜汁ニテ堅テ麴子ニ子サセテホセ 甘草 各半 藿香 三

右細抹ノ每服二錢水一盞半姜三片入テ七分煎シ可服不定時

分煎シ可服不定時

苦辛湯

產後無他病只嘔逆不食治白

木五分 生姜六分

右細劉酒一盞水一盞入下二盞煎之
服二分可服

▲產後霍亂第三

白朮散

產後霍亂吐利腹痛胸熱咽乾手

足冷熱多治白朮 陳皮 麥門冬 人

參 乾姜 各一分 甘草半

右細劉合每服四錢生姜五片水一盞入

七分煎之滓去之溫服

附子散

產後霍亂吐利不止手足冷熱多

治附子炮 白朮 當皈 吳茱萸 桂

心 人參 丁香 去花 陳皮 甘草 各半

右細抹每服二錢米飲之不定時可服

高良薑散

產後霍亂吐利腹中痛治

高良姜 當皈 草豆蔻

右等分細抹レ每服一錢米飲テ可服ス

▲産後傷寒第四

人參當皈散

産後傷寒内熱氣短頭痛

骨節疼痛多治ス 人參 當皈 生乾地黄

桂心 麥門冬

去心各
三升

白芍藥二

右細剉合每服四錢水二盞粳米一合竹

葉十葉入テ一盞煎米竹葉去後藥テ

入テ棗二ツ加テ七分煎滓去テ温服ス

增損柴胡湯

産後虚羸寒熱傷寒傷風

類多治ス飲食ラ進メ腹脹ラ去ル 柴胡二錢

人參 芍藥 半夏 甘草

去皮ラ

川芎神

方ハ等分也
各三分

右細剉合每服四錢水一盞姜二片棗

一ツ入レ七分煎滓去テ温服ス

陽且湯

産後傷風十餘日痛ク口サムク

上キくホトリ心少下堅ク脹レカシムキ汗多ク

治

桂心 芍藥

各二分

甘草

一分

黃芩

各二分

右細剉每服二錢水一盞姜三片束棗可入テ七分煎シ滓ヲ去テ温服不定時

▲產後頭痛第五

一奇散

產後頭痛ヲ治ス

當取

川芎

右細抹每服二錢水一盞入テ七分煎滓ヲ去テ温服ス

▲產後咳嗽第六 附喘息

二母散

產後惡血肺經入テ咳嗽立地

有効

知母

貝母

白茯苓

人參

各半分

桃仁

去皮尖ラ

杏仁

去皮尖ラ各一分

右細抹每服三錢水一盞半入テ八分煎

不定時可服ス

前胡湯

產後咳嗽痰子ハ氣短ヲ治ス

前胡

五味子

紫苑

貝母

各六分

桑白皮

茯苓

各八分

淡竹葉

二十葉

婦人聖藥

右細剉水二升ヲ分煎シ滓ヲ去テ食後
二服分テ可服ス

旋覆湯

産後傷風及寒暑濕被侵カ咳嗽

喘滿ニ痰涎多シテ喉塞テ坐臥不安治ス 旋

覆花 五味子 前胡 麻黄去節 赤芍藥

半夏麴 杏仁去皮尖炒 茯苓去皮 甘草焙

荆芥去梗

右谷等分麩末ノ每服四大錢水一盞半姜

五片棗一ツ入テ七分煎シ滓ヲ去テ食前
可服ス

參蘓飲

産後血肺ニ入テ面黒多喘ニ欲死

治ス 人參一丸別ニ研 蘓方木二丸剉

右先蘓方木ヲ水ニ盞ヲ以テ一盞煎シ滓

去テ其人參末ヲ搖立テ度々可服ス

一方 産後咳逆二百不留ニテ死セトスルヲ

治ス 桂心半 姜汁三

右同ク煎シニ合ニ至テ火ヲ以テ元背カク灸リテ
背ヲヨクサスリテ項ノ暖ナル處ニ此藥ヲ可塗ル

一方 産後ノ咳嗽逆ヲ治ス 乾柿クニカキ一
多クナク

右打碎テ水一盞入テ六分煎シ温服ス

羌活散 産後ノ咳逆ヲ治ス 羌活 附子炮ス

茴香炒テ各
半又 南木香 乾姜炮テ各
一分

右細抹シ每服二錢水一盞塩一捻入テ八分
煎シ可服ス服ニ則チ愈ス

▲産後ノ血崩第七

固經丸 産後ノ血崩上テ産シテ血脉損動シ

血多ク下リ小腸滿脹ニテ痛ヲ治ス 艾石脂燒テ
研ル

補骨脂又名破
故紙 木賊各半又
焙研ル 附子

炮ノ大
丸一ツ

右細抹シ陳米飲ニテ〇是程ニ丸ノ每服二

十九温ニテ食前ニ可服米飲ニテモ可服ス

芩藶湯 産後ノ血崩ヲ治ス 芩藶 當歸

婦人血崩第七

女入血... 卷七

芍藥 各等分

右剉レ合テ每服四錢水一盞半入テ七分煎少滓ラ去テ温服ス不定時ラ

熟乾地黄散 產後ノ崩中頭重ク目眩キ神

志昏ク手足煩燥ニテ不知入治ス 熟乾地

黃 伏龍肝 黃耆 赤石脂 各一又 阿膠

甘草 白朮 艾葉 川芎 人參 各半又 當

飯二右剉レ合テ每服二錢姜二片入テ七分煎

滓ラ去テ温服ス

加減吳茱萸湯 產後ニ身面虚浮ニ并テ多

フルイ或ハ痢下ニ羸瘦レ胸脹ニ痛ニ腹脇刺痛ニ嘔

吐ニ心地惡ク飲食減少治ス 吳茱萸一 桔

梗 干姜 甘草 麥門冬 防風 半夏

細辛 當飯 赤茯苓 牡丹皮 桂心 各半

婦人頭... 卷七

右判三合每服四錢水一盞半入テ七分煎
滓ヲ去テ温服ス

枳朮湯

心腹堅ク大ニテ水ヲ畏カ如ク脹多ク

氣分ト云是ヲ治ス

枳實

一又半

白朮

三又

右判三合每服四錢水一盞半入テ七分煎
滓ヲ去テ可服ス

漢防已散

産後風虚依テ氣塞リ上リ頭面

攻テ浮腫スヲ治ス

防已

猪苓

枳殼

去裏小麥

粉雜

桑白皮

各一又

商陸

山牛房也

甘草

各等分

右判三合每服四錢水一盞半姜二片入テ
七分煎滓ヲ去テ空心温服ス

△産後腹痛及瀉痢方第八

産後腸胃虚怯寒被復風冷腸胃留テ腹
中痛ニサニコニテキリ錐刀ニテ如被刺疼痛風冷太
腸入ヌハ水穀不化ニテ洞泄ト腹鳴或ハ赤白
痢トナリ脇助脹滿テ或ハ腹中ノ氣アチチ動

婦人血証

卷二

七

走テ不定處ヲ治ス速不治立地死ス調中湯
是ヲ治ス

調中湯 産後ノ一切痢病ヲ治ス 高良姜

當皈 桂心 芍藥 附子炮ス 川芎各一

甘草半

右判三合七每服二錢水二盞煎レ滓ヲ去テ温
服此藥所施勿レ不レ有レ効レ

一方 産後ニ尻腹痛ハ治方 蓮根ヲ可食ス又ア

サニ煮テ汁ヲ可服ス 又生地黃ノ汁一升酒二

升合和服之又銅ノ分リヲモシヲ燒テ酒ニ

浸シテ可服ス

桃膠散 産後下痢赤白ノ腹中釣痛ニ腰

重ク痛キヲ治ス 桃膠土器ニ燒テ研ル 沉香 蒲黃

紙ヲ阻テ燒ル
各等分

右細抹ノ每服二錢食前ニ陳米飲ヲ以テ不

定時ヲ可服ス

黃連丸

產後冷熱ノ痢赤白ノ痢ヲ治ス 黃

連六分 烏梅三 乾姜二

右細抹ノ煉蜜テ○是程丸ノ空心米飲テ 每服三十九宛可用可忌猪肉ヲ

黃連阿膠丸

產後赤白ノ痢腹中絞リ痛ヲ

治ス 黃連四 阿膠 蒲黃 梔子仁各一

當皈一 黃芩一 黃蘗皮三

右細抹ノ煉蜜テ○是程丸ノ每服六十九 宛米飲テ日ニ三度夜一度可服立地

有効ニ

茯苓人參散

產後腹痛脇助脹滿テ不能

食ヲ痢常下ヲ治ス 茯苓 人參 厚朴

各八 甘草 陳皮 當皈 黃芩各六

右細抹ノ每服三錢米飲テ日ニ三度可服

赤石脂丸

產後下痢ノ手足冷腹中疼痛

赤石脂 甘草 當飯 白朮 黃

連 乾姜 秦皮 各二 山枳 炒テ汁ヲ出テ口閉
多ク去リ目ヲ去

附子 各一

右細抹ノ煉蜜ヲ○是程ニ丸ニ每服二九一
宛酒ヲ可服ス日ニ三度可息ム猪肉ヲ冷米菘

艾葉阿膠散 產後ノ血痢ヲ治ス 艾葉三分 阿

膠十分 黃連七分 芍藥 黃蘗 甘草 各六

右細抹ノ每服三錢米飲ヲ可服ス

▲產後ノ太便秘第九

夫產後太便秘ニ事ハ產後ニ水血共下リ盡テ腸
胃虛ク乾キ津液不足也故ニ太便秘不下若結五
六日ヲ過レ燥尿藏府ニ堅リテ不下若是ヲ
熱ト思テ冷藥ヲ與レ六陽盡キ陰長テ生ス百
病ヲ最モ可レ慎ム麻仁丸是ヲ治ス

麻仁丸 產後ノ太便秘ヲ治ス 麻仁 枳

殼去裏ラ 人參 大黃 各等分

右細抹ノ煉蜜ニテ〇是程丸ノ每服二十九
若ハ二十九空心温酒ニテ可服未下數ラ
増テ可與フテハシテハシテハシテ...

二子飲 許學士云産後鬱冒上テ汗多ニ垂テ
則鬱冒ニ依テ腸胃乾テ痢結スヲ治ス 紫
蘓子 大麻子仁

右二味各五兩能洗テ細研テ水ヲ以テ研リ
立テ布ニテ絞漉其汁ニ米ヲ入テ粥ニシテ上テ煮テ

温ニテ可ニ啜シ食テ産後ノ秘結ニミテアラス老人
虚風ノ秘結スニ是ヲ與スニハ失カラ利ラ
通ス

▲産後ノ大小便不通第十

産後ニ大小便共ニ結ス事ハ血水共下リ汗多
出テ腸胃乾故ニ大小便不通

通秘圓 産後津液乾盡テ大小便不通治
芍藥 大黃 枳殼 麻子仁

右等分ニ細抹シ煉蜜ニテ〇是程ニ丸ノ每服
二十九宛沸湯ニテ可服ス一方甘草抛子
各等分是ヲ合ス

▲産後ノ諸淋方論第十一

夫産後胞中虚寒ス六小便稠シ胞中實熱
ス六小便澁リ滯シ是ヲ淋ト云也又血胞中入テ
小便ニ隨テ出ツ是ヲ血淋ト云也

瞿麥飲 産後ニ小便澁リ痛ニ或ハ血淋ヲ治ス

瞿麥 黄芩 葵子 各ニ又 通草ニ 大棗

二十

右水七升ヲ以テ二升半ニ煎シ一服ニ分テ
可服ス

木通散 産後ノ小便不通治ス 木通 麻仁

葵子 滑石 檳榔子 枳實 去裏ヲ 甘草

各半
又

右剉ニ合テ每服ニ錢水一盞半入テ七分

煎レ滓ヲ去テ可服ス

▲産後小便數方第十二

産後小便繁シテ不禁治雞尾ヲ灰焼テ每服二三錢温酒ニテ日ニ服ス

▲産後玉門開テ不合方論第十三

右産ノ時カラ盡ノ生故陰裂破テ不著合事アリ或ハ脱肛トテ尻出テ陰腫痛清水無隙出ラ淋露ト云也

硫黃散

産後陰脱破傷ヲ治ス 硫黃 烏賊

骨 各半

又 五味子 分一

右細抹ノ極テ細ヲ破出各處ニ付ヨ日ニ度可替

一方

産後陰出腫破テ不著合治 石灰

一升 炒

右湯ニ提子分リニ石炭并兩分炒テ湯ニ

入テ温ニテ陰ヲ浸メテアス如此日一二三度

究スルニ三日必愈合也此藥極テ有効所施
皆有驗諸方ニ勝タリ

玉龍湯 産後ニ陰出破多ヲ治ス四物湯ニ龍骨
末ヲ少シ入空心ニ可服極テ有効

又方 玉門ノ腫ハ桃仁ヲ研テ可付 又虵床
子ヲ炒テ布ニ裹テ温テ陰ヲ温ラセ

又方 女人陰肛脱ス治方 慎火一斤 酒一
斗ヲ以テ煮濃四升ヲ取テ別ニ三度服之

又方 鐵ヲ煮テ濃ラレステ洗之

又方 硫黃 烏賊骨 等分ニ細抹ノ付ヨ

并日自入ル

又方 多毛虫ノ自然ニ死多ヲ取テ灰ニ焼テ
猪脂解テ付之

又方 又ケタル上ヲ入ニテ艾ヲ以テ可炙ス其上
サ子カツラヲ擣絞ッテ汁ヲ可付度々入多時

出タル肉ヲ押テ臍穴ヲニ莊可炙其

後時首クアラクハタラクベカラス常ニ湯ニテツヘシ

又方 湯黄一又 烏賊骨一又 末一又 サ子カツラ一又 搗キ

絞リテ其汁ニ和シテ付之ヲ

又方 車ノ多クノ油ヲ可レ付テ即チ愈ス

又方 鐵ノ屑スカタラヲ開ノ中ニ塗レ之

▲産後乳汁不行方第十四

栝樓根粉 産後ノ乳汁不出治ス 栝樓根ヲ

搗キ篩テ米飲ニテ日ニ三服スハ乳汁出テ母子

共ニ無病シ

湧泉散 乳汁ノ不出テ生レ又乳ノ堅リ腫及

乳癰ヲ治ス 穿山甲ニ又 灰燒

右細抹メ每服ニ錢温酒ヲ以テ可服ス

又方 産後ニ無乳汁治方生鱧ニ喉服之又ラ

赤小豆ニ升煮テ汁頻ニ服之ヲ

又方 蕪ニ一把搗キ絞リテ汁服之冬ハ用根ヲ

又方 生ノ栝樓根灰燒テ搗キ篩テ方寸七ヲ

六賦テ日ニ六七度服之

又方 栝樓根ヲ白灰ニ焼テ酒ヲ以テ一錢可

吞チト子スルホト

又方 鯉魚ノ頭灰ニ焼テ酒ヲ以テ服之又方

芥ヲ常ニ可服ス

又方 黃皮ヲ灰ニ焼テカミテ可服ス

▲産後吹癩方論第十五

夫産後吹癩上云ハ兒ノ乳ヲ含テ子イリタルニ

不吸シテ吸ハクカラカシタル乳ノ房ニタリテ不散

シテ終ニ腫リ堅リテ石ノ如ク吹癩上云遲ク

治スハ乳癰トス

栝樓散 吹癩ヲ治ス 乳香 一錢 栝樓根末

一 研ル

又 右細末ノ每服一錢温酒ニテ服之

天南星散 吹癩ヲ治ス 天南星ヲ細抹ノ湯

腫ル上ニ可塗ル

乳癰方論第十六

夫乳癰ハ吹爛久メ癰ト在ナリ内脹ノ痛ヲシ
外腫堅硬シテ手モ不可近此乳癰ナリ未潰
モハ瓜蒞散ヲ用ニ即散ス若潰ハ石羔没
藥皂刺金銀花ヲ去テ當飯身ヲ用イ人參黃
芪川芎白芍藥ヲ加ヘテ煎服ス又乳岩ハ結核
驚其谷子ノ大サノ如シテ不痛不痒久則潰テ
療スルヲ難シ與乳癰不同

瓜蒞散

瓜蒞仁

青皮

各一錢

石羔

二錢

甘草

沒藥

當飯尾

皂刺

金銀花

各五分

青橘葉

汁ニセソトル

右剉合テ一服成テ一服ヲ先ツ水一盞半

酒少入半盞煎シ滓ヲ去テ温服ス

又方

蒲黃草

右莖葉ヲ能擣テ汁ヲ内服

滓ヲ腫ノ上ニ可付日ニ二度可替

又方

百合根擣テ可塗

又方 榆皮^{スリ}摩之^ラ醋^ニ和^シ乳^ノ土^ニ可^シ待^ツ

又方 地黄^ヲ擣^キ絞^リテ^テ可^シ塗^ル

又方 白丁香^水研^テ可^シ塗^ル

又方 産後^ニ乳^張テ^テ痛^キニ^ハ滑^石右^ヲ燒^テ

アテヨ

又方 産後^ニ身^腫治^方カラ竹^ノ皮^ヲ削^テ水

三升^ニ入^テ半^分煎^シ服^ス

又方 艾^ヲ三^ツ擣^テ酒^ニ和^シ服^ス

又方 木^レキ^ノ汁^ヲ可^シ服^ス

又方 藕^方ヲ^ヲ煎^シ可^シ服^ス

又方 蓮^葉ヲ^ヲ煎^シ可^シ與^フ

一方 産後^ニ尿^血治^方 龍^骨^五 又

右細^株之^ノ每^服方^寸七^三テ^ニス^クヒ^空腹^ニ酒

三^ツテ^調下^ス久^ク服^シニ^テ平^愈

一方 産後^ニ盜^汗治^方 吳^茱萸^大

右^所リ^碎テ^酒三^升ニ^浸シ^テ米^日煎^シ

可レ加ス

止汗散 産後盜汗ヲ治ス 牡蠣 小麥

麩炒テ 黄ス

右細抹ノ每服二錢煮猪肉ヲ湯ニ調ス

下ス

當皈黄耆散 産後腰脚疼痛ヲ治ス

當皈三又 黄耆 芍藥 各二又

石吹咀ノ每服四錢水一盞半姜五片入テ

七分煎ツ食前ニ可服ス

琥珀散 女人或老ニ或ハ少産前産後百

病及ヒ三十六種血冷七癥八瘕心臆刺痛ニ

卒中癱緩半身不遂カ八風十二痺等ヲ

治ス手足疼ニ乳ノ中毒結シ瘀血懷胎驚動ニ

傷テ不安ラ死胎不出胞衣不下ラ并ニ宜服ク之ヲ

沒藥三分 琥珀三又 辰砂 沉香

阿膠オ 肉桂 五味子 石斛七 芎

人參 續斷 各二下地黄 一又 皮臍ヲ

木香 分

右細抹ノ煉蜜ニテ○是程九ノ每服一丸
空心温酒ニテ調下ス食前一服可用

頓醫抄卷第七 終

天和三癸 年林鐘吉日

洛陽寺町五条

開

此書以
天性諸
為秘會
此書之
書之性
集在別

