

醫國種子

仲景傷寒論

漢書門			
一	二	三	四
冊	架	函	號
一	二	三	四

三

內閣文庫	
番號	漢 12988
冊數	14 (4)
函號	301 18



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



仲景傷寒論

辨痊濕暍脉證第一

傷寒所致太陽病痊濕暍三種宜應別論以為與傷寒相似故此見之

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痊

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痊

太陽病發熱脉沈而細者名曰痊

太陽病發汗太多因致痊

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭面搖卒口噤背反張者痊病也

太陽病關節疼痛而煩脉沈而細者此名濕痺濕痺之候其人小便不利大便反快但當利其小便濕家之爲病一身盡疼發熱身色如似熏黃濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胃滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲口燥煩也

濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死

問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也答曰發

其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也太陽中暍者身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細孔遲
小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開
前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下
之則淋甚

辨太陽病脉證第二

太陽之爲病脉浮頭項強痛而惡寒

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名爲中風

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰
陽俱緊者名爲傷寒

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲吐若躁
煩脉數急者爲傳也

傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病若發汗已身灼
熱者名曰風溫風溫爲病脉陰陽俱浮自汗出身重
多眠睡息必鼾語言難出若被下者小便不利直視
失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘖瘖若火
熏之一逆尚引日再逆促命期

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也
發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數
六故也

太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也
若欲作再經者針足陽明使經不傳則愈
太陽病欲解時從巳至未上

風家表解而不了了者十二日愈

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也
身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自
出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝
湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯
主之

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯若不上衝
者不得與之

太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此
爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治
之

桂枝本爲解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可
與之常須識此勿令誤也

若酒客病不可與桂枝湯得之則嘔以酒客不喜甘

故也 喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

太陽病下之後脉促胃滿者桂枝去芍藥湯主之若微寒者桂枝去芍藥加附子湯主之

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者爲欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其能不得小汗

出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈

服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形似瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下

滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之
 傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急及與
 桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆
 者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足温者更
 作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和讞語者
 少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主
 問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛
 拘急而譫語師言夜半手足當温兩脚當伸後如師
 言何以知此答曰寸口脉浮而大浮為風大為虛風
 則生微熱虛則兩脛攣病形象桂枝因加附子參其

同增桂令汗出附子温經亡陽故也厥逆咽中乾煩
 躁陽明內結讞語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣
 還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛
 伸以承氣湯微瀆則止其譫語故知病可愈
 太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之
 太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之
 太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主
 之
 太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解
 也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下宜麻黃湯

太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胃滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之

太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

太陽病外證未解不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在

外而反下之故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽

氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知也

脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便汗出愈

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣不足血少故也

脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯 脉浮而數者可

發汗宜麻黃湯 病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯 病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

傷寒發汗已解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜

桂枝湯

凡病若發汗若吐若下若亡血亡津液陰陽自和者必自愈

大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱者乾薑附子湯主之 發汗後身疼痛脈沈遲者桂枝加芍藥生薑人參新

加湯主之

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脉沉緊發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝白朮甘

草湯主之

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散主之

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中

懊憹梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之

若嘔者梔子生薑豉湯主之

發汗若下之而煩熱胃中空者梔子豉湯主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲

解也梔子豉湯主之

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑

湯主之

凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身

關動振振欲擗地者真武湯主之

咽喉乾躁者不可發汗

淋家不可發汗發汗必便血

瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痊

衄家不可發汗汗出必額上陷脉緊急目直視不能
眴不得眠

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧丸
病人有寒復發汗胃中冷必吐衄

本發汗而復下之此爲逆也若先發汗治不爲逆本

先下之而反汗之爲逆若先下之治不爲逆

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救
裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯
救表宜桂枝湯

病發熱頭疼脉反沈若不差身體疼痛當救其裏宜
四逆湯

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其
人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也
得裏未和然後復下之

太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出乃解但陽

脉微者先汗出而解但陰脉微者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯

太陽病發熱汗出者此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯

傷寒五六日中風往來寒熱胃脅苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之

得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具
凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡
湯必蒸蒸而振却復發熱汗出而解

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證
仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者
爲未解也與大柴胡湯下之則愈

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而
微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以
丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以
解外後以柴胡加芒硝湯主之

傷寒十三日不解過經讖語者以有熱也當以湯下
之若小便利者大便當鞭而反下利脉調和者知醫
以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反
和者此爲內實也調胃承氣湯主之

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其
外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結
者乃可攻之宜桃核承氣湯

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語一身盡
重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門

傷寒發熱畜畜惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

太陽病二日反躁反熨其背而大汗出大熱入胃胃中水竭躁煩必發讖語十餘日振慄自下利者此為欲解也故其汗從腰已下不得汗欲小便不得反嘔

欲失溲足下惡風大便鞭小便當數而反不數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則

小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讖語甚者至

噦手足躁擾捻衣摸床小便利者其人可治傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之形作傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火者必讖

語弱者發熱脉浮解之當汗出而愈

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圍血名為火邪

脉浮熱甚反灸之此爲實實以虛治因火而動必咽
燥唾血
微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實
血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也
脉浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從
腰以下必重而痺名火逆也欲自解者必當先煩乃
有汗而解何以知之脉浮故知汗出解也
燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發賁脉氣從
少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更
加桂二兩

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主
之

太陽傷寒者加溫針必驚也

太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上
脉細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中饑口
不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮
吐以醫吐之所致也此爲小逆

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近
衣此爲吐之內煩也

病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者此以發汗

令陽氣微膈氣虛脉乃數也數爲客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先其時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

太陽病六七日表證仍在脉微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之

太陽病身黃脉沈結少腹鞭小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也

問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沈名曰結胸也

何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難治

藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之因作痞也所以成結胃者以下之太早故也結胃者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胃丸

結胃證其脉浮大者不可下下之則死

結胃證悉具煩躁者亦死

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動

膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞞則爲結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃

傷寒六七日結胃熱實脉沈而緊心下痛按之石鞞者大陷胃湯主之

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胃無大熱者此爲水結在胃脇也但頭微汗出者大陷胃湯主之

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞞滿而痛不可

近者大陷胃湯主之

小結胃病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胃湯主之

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脉微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胃未止者四日復下之此作協熱利也

太陽病下之其脉促不結胃者此爲欲解也脉浮者必結胃脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細數者頭痛未止脉沈緊者必欲嘔脉沈滑者協熱利脉浮滑者必下血

病在陽應以汗解之反以冷水溼之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃湯白散亦可服

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胃心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則讖語脉弦五日讖語不止當刺期門

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脉遲身涼胃脇下滿如結胃狀讖語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之

傷寒論
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者
此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小
柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見
鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈
傷寒六七日發熱微惡寒支節煩痛微嘔心下支結
外證未去者柴胡桂枝湯主之

傷寒五六日已發汗而復下之胃脇滿微結小便不
利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心下煩者此爲未
解也柴胡桂枝乾薑湯主之

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲
食大便鞅脉細者此爲陽微結必有表復有裏也脉
沈亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外
證悉入在裏此爲半在裏半在外也脉雖沈緊不得
爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非
少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解
傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下
之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆
必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞅痛者
此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞

柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

太陽少陽併病而反下之成結胃心下鞭下利不止水漿不下其人心煩

脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漿漿汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣竝竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚瞶者難治今色微黃手足溫者易愈

心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下

痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中
虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以
他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理
中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止
者當利其小便

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞭脅
下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋
復代赭湯主之

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與
麻黃杏子甘草石膏湯

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止
心下痞鞭表裏不解桂枝人參湯主之

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可
攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞
宜大黃黃連瀉心湯

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者大柴
胡湯主之

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胃中痞鞭氣

上衝咽喉不得息者此爲胃有寒也當吐之宜瓜蒂散

病脅下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

太陽少陽併病心下鞮頸項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濡者桂枝附子湯主之若其人大便秘小便自利者去桂加白朮湯主之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗
出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草
附子湯主之

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

傷寒脉結代心動悸灸甘草湯主之

脉按之來緩時一止復來者名曰結又脉來動而中
止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而
中止不能自還因而復動者名曰代陰也得此脉者
必難治

辨陽明病脉證第三

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂
也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實
是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便
難是也

陽明之爲病胃家實是也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利
小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實
大便難者此名陽明也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反
惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

本太陽病初得時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然者是轉屬陽明也

傷寒三日陽明脉大

傷寒脉浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便

鞭者爲陽明病也

傷寒轉繫陽明者其人濇然微汗出也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也

陽明病若能食名中風不能食名中寒

陽明病若中寒者不能食小便不利手足濇然汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼痛翕翕如有熱狀奄然發狂濇然汗出而解者此水不

勝穀氣與汗共并脉緊則愈

陽明病欲解時從申至戌上

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀瘕雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此久虛故也

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛若不欬者咽不痛

陽明病無汗小便不利心中懊懣者身必發黃

陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃

陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此必大便鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日

再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃者小便不利也

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出

者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

夫實則讖語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視讖語喘滿者死下利者亦死
發汗多若重發汗者亡其陽讖語脉短者死脉自和者不死
傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脉弦者生瀉者死微者但發熱讖語者大承氣湯主之若一服利止後服

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞮鞮則讖語小承氣湯主之若一服讖語止者更莫復服
陽明病讖語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之明日不大便脉反微澁者裏虛也爲難治不可更與承氣湯也

陽明病讖語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞮耳宜大承氣湯下之
陽明病下血讖語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之澱然汗出則愈
汗出讖語者以有燥糞在胃中此爲風也須下者過

經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也
下之則愈宜大承氣湯

傷寒四五日脉沈而喘滿沈爲在裏而反發其汗津
液越出大便爲難表虛裏實久則讞語

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢讞語遺
尿發汗則讞語下之則額上生汗手足逆冷若自汗
出者白虎湯主之

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漿漿汗出大便
難而讞語者下之則愈宜大承氣湯

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不
惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讞語若加
溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣
動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中
燥猪苓湯復利其小便故也

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

若胃中虛冷不能食者飲水則噦

脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿而不去者小柴胡湯主之

陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解也

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病

過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可爲導

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯
陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘵

熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之

陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡

寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水者少少與之但以法救之渴者宜五苓散

脈陽微而汗出少者爲自和也汗出多者爲太過陽脈實因發其汗出多者亦爲太過太過爲陽絕於裏亡津液大便因鞭也

脈浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕

跌陽脈浮而漶浮則胃氣強漶則小便數浮漶相搏大便則難其脾爲約麻仁丸主之

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭乃可攻之宜大承氣湯

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難
身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯
陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯
發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯
腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯
陽明少陽合病必下利其脈不負者爲順也負者失
也互相剋賊名爲負也脈滑而數者有宿食也當下
之宜大承氣湯

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假
令已下脈數不解合熱則消穀善饑至六七日不大
便者有瘀血也宜抵當湯

若脈數不解而下不止必協熱而便膿血也

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解
故也以爲不可下也於寒濕中求之

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵
陳蒿湯主之

傷寒身黃發熱者梔子蘘皮湯主之

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軀赤小豆湯主之

辨少陽病脈證第四

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐
下吐下則悸而驚

傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發
汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸
本太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食
往來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯
若已吐下發汗溫針譫語柴胡湯證罷此爲壞病知
犯何逆以法治之

三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽去入陰故
也

傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不
嘔此爲三陰不受邪

傷寒三日少陽脉小者欲已也

少陽病欲解時從寅至辰上

辨太陰脉證第五

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛
若下之必胸下結鞕

太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者爲欲愈

太陰病欲解時從亥至丑上

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之太陰爲病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也

辨少陰脉證第六

少陰之爲病脉微細但欲寐也

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

少陰病欬而下利讖語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

少陰病脉細沈數病爲在裏不可發汗
少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱瀉
者復不可下之

少陰病脉緊至七八日自下利脉暴微手足反溫脉
緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈

少陰病下利若利自止惡寒而踈臥手足溫者可治
少陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治

少陰中風脉陽微陰浮者爲欲愈
少陰病欲解時從子至寅上

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者
灸少陰七壯

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便
血也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道
出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭爲難治

少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治
少陰病吐利躁煩四逆者死

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死
少陰病四逆惡寒而身踈脉不至不煩而躁者死

少陰病六七日息高者死

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

少陰病始得之反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯主之

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿膠湯主之

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

少陰病身體疼手足寒骨節痛脈沈者附子湯主之

少陰病下利便膿血者桃花湯主之

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

少陰病下利便膿血者可刺

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

少陰病下利咽痛胃滿心煩者猪膚湯主之

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

少陰病下利白通湯主之

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾

嘔煩者白通加猪膽汁湯服湯脉暴出者死微續者

生

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢

沈重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便

利或下利或嘔者真武湯主之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身

及不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利

止脉不出者通脉四逆湯主之

少陰病四逆其人或欬或悸或小便利或腹中痛

或泄利下重者四逆散主之

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓

湯主之

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣

湯

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下

之宜大承氣湯

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

少陰病脉沈者急溫之宜四逆湯
少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始
得之手足寒脉弦遲者此胃中實不可下也當吐之
若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯
少陰病下利脉微瀉嘔而汗出必數更衣反少者當
溫其上灸之

辨厥陰病脉證第七

厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不欲食
食則吐衄下之利不止

厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈

厥陰病欲解時從丑至卯上

厥陰病渴欲飲水者少少與之愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能

食今反能食者恐爲除中食以索餅不發熱者知胃

氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脉之其熱

續在者期之且日夜半愈所以然者本發熱六日厥

反九日復發熱三日并前六日亦爲九日與厥相應

故期之且日夜半愈後三日脉之而脉數其熱不罷

者此爲熱氣有餘必發癰膿也

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲爲寒
今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能
食此名除中必死

傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者
其喉爲痺發熱無汗而利必自止若不止必便膿血
便膿血者其喉不痺

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥
厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗
者必口傷爛赤

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自
愈厥終不過五日以熱五日故知自愈

凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷者
是也

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者
此爲藏厥非虵厥也虵厥者其人當吐虵今病者靜
而復時煩者此爲藏寒虵上入其膈故煩須臾復止
得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥
者烏梅丸主之又主久利

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便

利色白者此熱除也欲得食其病爲愈若厥而嘔胃
脅煩滿者其後必便血

病者手足厥冷言我不結胃小腹滿按之痛者此冷
結在膀胱關元也

傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多者其
病當愈四日至七日熱不除者必便膿血

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱
少陽氣退故爲進也

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者
死

傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

傷寒發熱下利至甚厥不止者死

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死
有陰無陽故也

傷寒五六日不結胃腹濡脉虛復厥者不可下此爲
亡血下之死

發熱而厥七天下利者爲難治

傷寒脉促手足厥者可灸之

傷寒脉滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之若其人內

有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯
大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒
者四逆湯主之

大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心下滿而煩
饑不能食者病在胃中當須吐之宜瓜蒂散

傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却
治其厥不爾水漬入胃必作利也

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈
不至喉咽不利唾膿血泄利不止者爲難治麻黃升

麻湯主之

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自利
也

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入
口卽吐乾薑黃芩黃連人參湯主之

下利有微熱而渴脈弱者今自愈

下利脈數有微熱汗出今自愈設復緊爲未解

下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘
者死少陰負趺陽者爲順也

下利寸脈反浮數尺中自濇者必圜膿血

下利清穀不可攻表汗出必脹滿
下利脉沈弦者下重也脉大者爲未止脉微弱數者
爲欲自止雖發熱不死

下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者
必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽
下虛故也

下利脉數而渴者今自愈設不差必圍膿血以有熱
故也

下利後脉絕手足厥冷辟時脉還手足溫者生脉不
還者死

傷寒下利日十餘行脉反實者死

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之
熱利下重者白頭翁湯主之

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏
宜四逆湯攻表宜桂枝湯

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之
下利譏語者有燥屎也宜小承氣湯

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也宜梔子豉湯
嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯

主之

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

嘔而發熱者小柴胡湯主之

傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈

辨霍亂病脉證第八

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利是名霍亂

問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂霍亂自吐下又利止復更發熱也

傷寒其脉微濇者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者此屬陽明也便必鞭十三日愈所以然者經盡故也

下利後當便鞭鞭則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也

惡寒脉微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯
小和之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯
主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱
脈微欲絕者四逆湯主之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通
脈四逆加猪膽汁湯主之

吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也
辨陰陽易差後勞復病第九

傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣少腹裏急或
引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花膝脛
拘急者燒褌散主之

大病差後勞復者枳實梔子湯主之有宿食加大黃
傷寒差已後更發熱小柴胡湯主之脈浮者以汗解
之脈沈實者以下解之

大病差後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之
大病差後喜唾久不了了胃上有寒當以丸藥溫之
宜理中丸

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之

病人脉已解而日暮微煩以病新差人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

辨不可發汗病脉證第十

舊本重集諸可與不可方治比之三陰三陽篇

中為易見也今欲便誦讀唯載有不止是三陰三陽篇者凡五十五條而不詳及如成氏也

脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節著疼目運惡寒食則反吐穀不得前

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得蹇臥不能自溫

諸脉得數動微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾胃燥而煩其形相象根本異源

脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛不可發汗發汗則寒慄不能自還

欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中飢煩
晬時而發其形似瘡有寒無熱虛而寒慄欬而發汗
蹇而苦滿腹中復堅

厥脉緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌痿聲不得前
諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死命將難
全

欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥
逆冷

傷寒頭痛翁翁發熱形象中風常微汗出自嘔者下
之益煩心中懊憹如飢發汗則致瘥身強難以屈伸
熏之則發黃不得小便久則發欬吐

辨可發汗證第十一

大法春夏宜發汗

凡發汗欲令手足俱周時出似漿漿然一時間許益
佳不可令如水流漓若病不解當重發汗汗多必亡
陽陽虛不得重發汗也

凡服湯發汗中病卽止不必盡劑

凡云可發汗無湯者丸散亦可用要以汗出爲解然
不如湯隨證良驗

夫病脉浮大問病者言但便鞭耳設利者爲大逆鞭

為實汗出而解何以故脉浮當以汗解

下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發

汗

辨發汗後病脉證第十二

發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮
衛以通津液後自愈

辨可吐病脉證第十三

大法春宜吐

凡用吐湯中病即止不必盡劑也

病胃上諸實胃中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而

反有涎唾下利日十餘行其脉反遲寸口脉微滑此

可吐之吐之利即止

宿食在上脘者當吐之

病人手足厥冷脉乍結以客氣在胃中心下滿而煩

欲食不能食者病在胃中當吐之

辨不可下病脉證第十四

脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上澁反在下

微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風汗出而反

躁煩澁則無血厥而且寒陽微不可下下之則心下

痞鞭

動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也

動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲蹠

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌

動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞也

咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下臥則欲蹠身急痛下利日數十行

諸外實者不可下下之則發微熱亡脈厥者當臍握熱

諸虛者不可下下之則大渴求水者易愈惡水者劇脈濡而芤芤反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛虛者不可下也

微則爲欬欬則吐涎下之則欬止而利不休利不休則胃中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息爲難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此爲除中口雖欲言

舌不得前

脉濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反在下
浮爲陽虛數爲無血浮爲虛數爲熱浮爲虛自汗出
而惡寒數爲痛振寒而慄微弱在關胃下爲急喘汗
而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏形如瘧
狀醫反下之故令脉數發熱狂走見鬼心下爲痞小
便淋瀝小腹甚鞭小便則尿血也

脉濡而緊濡則衛氣微緊則榮中寒陽微衛中風發
熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫爲有大熱解
肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒
起而頭眩客熱在皮膚悵快不得眠不知胃氣冷緊
寒在關元技巧無所施汲水灌其身客熱應時罷慄
慄而振寒重被而覆之汗出而冒巔體惕而又振小
便爲微難寒氣因水發清穀不容間嘔變反腸出顛
倒不得安手足爲微逆身冷而內煩遲欲從後救安
可復追還

脉浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤陽獨
下陰部者小便當赤而難胞中當虛今反小便利而
大汗出法應衛家當微今反更實津液四射榮竭血
盡乾煩而不得眠血薄肉消而成暴液醫復以毒藥

攻其胃此爲重虛客陽去有期必下如汚泥而死
脉數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却結
於藏故邪氣浮之與皮毛相得脉數者不可下下之
必煩利不止

脉浮大應發汗醫反下之此爲大逆

病欲吐者不可下嘔多雖有陽明證不可攻之

太陽病外證未解不可下下之爲逆

夫陽病多者熱下之則鞅

無陽陰强大便鞅者下之則必清穀腹滿

傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人熏之則喘不

得小便心腹滿下之則短氣小便難頭痛背強加温

針則衄

傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者脉初來

大漸漸小更來漸漸大是其候也如此者惡寒甚者

翁翁汗出喉中痛熱多者目赤脉多睛不慧醫復發

之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多者便清穀熱

多者便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小

便利者可救之小便難者爲危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制貪水

者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足温者

必下重便膿血頭痛目黃者若下之則兩目閉貪水者脉必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩躁脉數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也

下利脉大者虛也以其强下之故也設脉浮革因爾腸鳴者屬當歸四逆湯

辨可下病脉證第十五

大法秋宜下

凡服下藥用湯勝丸中病即止不必盡劑也

下利三部脉皆平按之心下鞭者急下之宜大承氣湯

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承氣湯

問曰人病有宿食者何以別之師曰寸口脉浮而大按之反澁尺中亦微而澁故知有宿食當下之宜大承氣湯

下利不欲食者以有宿食故也當下之宜大承氣湯下利差後至其年月日復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯

下利脉反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯
病腹中滿痛者此爲實也當下之宜大承氣湯
傷寒後脉沈沈者內實也下解之宜大柴胡湯
脉雙弦而遲者必心下鞭脉大而緊者陽中有陰也
可以下之宜大承氣湯

仲景立傷寒論終



刻金匱要畧緣起

仲景立傷寒論一宗復集雜病謂之金匱錄凡千帙
行世惜其失傳今其書乃金匱中之要畧也唯脉經
收集他書雖或採取醫流未之讀也此雜病論方之
祖特表而出之刻如傷寒論法然其詞氣簡古義味
深邃倘從此中透出吐氣足可驚人似與明白顯易
顛預臃胷可以欺世混俗者真不相侔也任繩甫嗣
武好學就問嘗惠酒資欲集吾儕劇飲余以聚頭啖
肉莫若援古利生片時作業莫若久遠傳經乃用其
酒資刻成願言從此入并可贊朋儕就正胸中也

