

大德重校聖濟總錄卷第一百六

十四

產後門

產後欬嗽

產後虛羸

產後汗出不止

產後蓐勞

產後泄瀉



產後欬嗽

論曰內經謂五氣所病在肺為欬產後藏府俱弱風寒乘虛而客於肺肺為華蓋位處於上其俞在背外合皮毛寒氣客之則先乘於肺肺感微寒故為欬嗽治產後欬嗽痰壅煩悶百部湯方

百部

款冬花

紫苑

去苗

貝母

知母

白薇

去心

杏仁

去皮尖  
雙入炒

蘇子

杏仁

去心

右七味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治產後欬嗽痰盛頭目不利皂莢丸方

皂莢染髮不射者水浸  
接取汁濾去滓

丁香

桂去麤皮  
各半兩

訶梨勒炮取皮  
拾枚

杏仁剝拾枚去皮  
尖雙入炒

右五味將四味搗為細末以皂莢水就銀石銚內煎

如膏即將藥和椽為丸如梧桐子大每服十九丸梅

湯下不拘時服

治產後欬嗽痰壅半夏湯方

半夏半兩生薑汁淹  
浸一宿切焙

貝母去心  
壹兩

芫胡壹兩

豬牙皂莢皮  
去

甘草各  
半兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑五片同煎

七分去滓溫服不拘時

治產後欬嗽痰涎壅悶紫苑湯方

紫苑去苗土  
壹兩半

貝母去心  
壹兩

白茯苓去黑皮  
貳兩

人參壹兩

陳橘皮去白  
半兩

杏仁炒壹兩半  
去皮尖雙入

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後肺氣虛寒欬嗽喘悶黃耆湯方

黃耆剉

桔梗炒

人參

白茯苓去黑皮

山芋各半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後欬嗽喘急煩悶此胡湯方

此胡去

麻黃去根節煎

掠去沫焙

紫蘆莖葉

陳橘皮去白

杏人去皮尖雙

右五味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治產後欬嗽連聲不絕痰涎壅盛百部丸方

百部焙半

細辛去苗葉

貝母去

甘草炙

紫苑去土

桂去麤皮

白朮

麻黃去根

五味子各半

杏人去皮尖雙

右一十味搗羅爲末和勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每

服二十九生薑蜜湯下不拘時服

治產後肺感寒欬嗽上氣咽嗌不利聲重鼻塞十味丸

方

當歸切

細辛去苗葉

桂去麤皮

蜀椒去目并閉口

甘草炙

陳橘皮去白

各壹兩

吳茱萸

湯洗去涎

人參分

桑根白皮剉

乾薑炮半

右一十味搗羅爲末鍊蜜爲丸梧桐子大每服二十

丸溫酒下生薑酒亦得不拘時

治產後欬嗽黃者湯方

黃耆劉武

人參

茯神木

麥門冬去心

桂去

陳橘皮去白

當歸切

天門冬去心

甘草炙

生乾地黄焙

五味子各壹

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑二

片棗一枚擘同煎一盞去滓溫服不拘時

治產後傷風欬嗽壯熱憎寒白前湯方

白前

桑根白皮劉

生乾地黄焙各壹

白茯苓

去黑皮地骨皮貳

麻黃去根節

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後肺寒欬嗽前胡湯方

前胡去

升麻

桂去

紫苑去

白茯苓去

五味子

麥門冬去

杏仁去尖雙人炒各壹兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後肺氣寒壅欬嗽地骨皮湯方

地骨皮剉碎 白朮剉碎

石膏碎分

桑根白皮剉碎 杏仁去皮尖雙人炒壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後肺感寒欬嗽不已吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙乾炒參分

桂去蟲皮壹兩

細辛去由葉壹兩壹分 當歸切焙參分

杏仁去皮尖雙人半兩炒

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

產後虛羸

論曰血為榮凡所滋養者皆血也氣為衛凡所充盈者皆氣也產後氣血俱虛衛任不足未滿百日失於將理致血氣愈虧不能充養故肌膚瘦瘠而虛羸也

治產後虛羸瘦瘠肌肉不淨氣血不充或寒或熱芍藥湯方

湯方

芍藥

五味子各壹兩

芎藭

牡丹去心

玄參

當歸切炒

人參

麥門冬去心微炒

白茯苓去黑皮

生乾地黄焙

白薇去苗

甘草炙各參分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

聚二枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時日三

治產後虛羸不足藏府虛冷肢體疼痛時或血露臍腹

刺痛常歸湯方

當歸切炒壹兩

芍藥

吳茱萸湯淘去涎

兩

麥門冬焙

甘草炙令赤

白芷各壹兩

生乾地黄焙 桂去

續斷

芎藭

乾薑炮裂各壹兩半

右一十一味搗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服食前日二夜一

治產後血氣衰弱日漸虛羸補不足烏雞湯方

烏雞

壹隻除翅羽腸足以水伍升煎取汁叁升

當歸切炒

人參

甘草炙

桂去

芎藭

芍藥剉

黃耆

麥門冬

去心炒各壹兩

右九味除雞外麤搗篩每服三錢匕煮雞汁一盞生

薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時

日三服

治產後虛羸補中益血羊肉黃耆湯方

羊肉

壹斤去脂膜細切以水捌盞煮取肉汁伍盞清

白茯苓去黑皮

甘草炙令赤

當歸切炒

桂去

芍藥

麥門冬去心焙 生乾地黃焙

黃耆微炙剉  
各壹兩

右九味除羊肉外麤搗篩每服三錢匕用肉汁一盞

生薑三片棗一枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時

治產後虛羸困乏肌肉不生血脉不榮人參湯方

人參

芎藭 黃耆剉

甘草炙令

生乾地黃焙各 桂去 薑皮青

乾薑炮裂  
半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕用煮羊肉汁一盞煎七

分去滓溫服不拘時

治產後血氣不調日漸羸瘦肢節煩疼面無顏色當歸  
丸方

當歸切

生乾地黃焙 澤蘭取葉各

防風去

黃耆剉 續斷各

桂去 膠皮各

人參全 地骨皮切

芍藥各  
兩半

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十

丸溫酒或米飲下不拘時

治產後虛羸短氣不能飲食熟乾地黃湯方

熟乾地黃焙  
兩

人參 五味子



白茯苓皮

去黑

鹿角膠

碎燒沙令燥

白朮

石斛根

附子炮裂去皮芎藭

各壹兩

澤蘭

續斷

黃耆

當歸切

桂去臘皮

各參分

右一十四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑

半分切棗二枚擘同煎至六分去滓不計時候溫服

治產後體虛力乏四肢羸瘦不思飲食黃耆湯方

黃耆

熟乾地黃

焙

麥門冬

去心焙各壹兩

白朮

續斷

人參

茯神木

當歸切

五味子

各壹兩

白芍藥

赤石脂

陳橘皮

焙

乾薑

炮裂各半兩

附子

炮裂去皮臍

桂去臘皮

各參分

甘草

壹分

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑

半分棗三枚擘破同煎六分去滓溫服不計時候

治產後虛羸不思飲食多臥少起續斷湯方

續斷

熟乾地黃

焙各壹兩

防風

去

人參

黃耆

剉

羌活

去

五味子

當歸切

酸棗仁

微炒各半兩

白茯苓

去黑皮

甘草

壹分

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生薑半  
分棗二枚擘破煎至六分去滓溫服日三

治產後虛羸血氣不調四肢瘦弱面色萎黃飲食減少

補益澤蘭丸方

澤蘭

赤石脂

牛膝

去苗酒切焙

人參

黃耆

剉各壹兩

熟地黃

兩半焙

白茯苓

去黑皮

木香

剉

草薢

剉

附子

炮裂去

續斷

桂

去麤皮各半分

芎藭

白木

乾薑

炮

當歸

剉

甘草

炙各半兩

乾薑

炮

右一十七味搗羅爲末鍊蜜和更杵五七百下丸如  
梧桐子大每於空心食前溫粥飲下二十九日三  
治產後虛羸月內不快顏色萎黃四肢無力調補氣血

澤蘭丸方

澤蘭

葉壹兩

燕薹

人炒黃

石膏

煨

蜀椒

去目并合口者炒出汗

白芷

乾薑

炮

藥本

去苗

人參

白木

厚朴

去麤皮

生細辛

葉

防風

去

桂皮

去麤

當歸

炒

芎藭

甘草

炙

柏子

人各半兩

右一十七味擣羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服三  
十九溫酒或米飲下不拘時服

治產後虛勞骨節疼痛寒熱往來精神恍惚夢寐驚悸  
芍藥湯方

芍藥

牡丹皮

玄參

芍藥

白茯苓去黑皮

乾薑炮

甘草炙

白薇各武兩

麥門冬去心焙膏兩半

右九味廙擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓  
溫服日三

治產後虛羸寒熱骨節疼痛四肢無力此胡湯方

此胡苗去

附子炮製去皮

黃耆各半斤

秦朮去苗土

鱉甲醋炙去裙 芍藥

桂皮去麩

牡丹皮

白茯苓去黑皮

知母焙

當歸切

桃仁去皮尖

芍藥炒各五分

右一十三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑  
五片同煎至七分去滓溫服不拘時

治產後排風補虛散血氣止痛羊肉湯方

白羊肉切壹斤

黃耆剉肉壹斤 防風去叉

桂皮去麩

當歸切

芍藥各半

大棗擘破枚

生薑切分

石八味先以水五升煮羊肉取三升澄去脂後內諸藥煎取一升半去滓食前分溫四服如人行三五里

再服

治產後虛羸寒熱往來補虛湯方

附子炮裂去皮臍

熟乾地黄焙

當歸切焙

肉苻蓉酒浸切焙

芫胡去苗

黃耆各壹兩

芍藥炒

人參

白茯苓去黑皮

芎藭各參分

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

五片棗三枚擘同煎至八分去滓溫服不拘時

治產後諸疾愈後體中虛羸無力宜服澤蘭丸補益方

澤蘭葉炒壹兩

黃耆細剉壹兩半

藥本去苗土壹兩

當歸剉焙壹兩半

白芷壹兩

防風去叉香兩半

芍藥壹兩

芎藭壹兩 桂去粗皮 參五分

柏子人壹兩

細辛去苗葉半兩

麥門冬去心焙貳兩

熟乾地黄焙壹兩壹分

甘草炙剉壹兩 石膏研如麴壹兩

五味子壹兩

石膏研如麴壹兩

右一十六味搗研為細末鍊蜜丸如梧桐子大空腹

酒下二十九漸加至三十九日再服

產後汗出不止

論曰產後汗出不止者亡血陰虛故也蓋榮弱衛強陽

加於陰氣散於表故令多汗汗不止致虛乏短氣口舌

乾燥津液耗竭則髮經水斷絕遇風則變癩病昏冒不

知人矣

辛平兩

麥門冬

加

治產後榮血虛損汗出日夕不止形體困怠附子湯方

附子炮裂去皮臍半兩

桂去盡皮

生乾地黄焙

甘草炙令赤

芍藥各壹兩

藥水

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑五片棗

五枚擘破煎至七分去滓溫服不計時不飲酢

治產後亡陰血虛汗出不止地髓湯方

生乾地黄焙

芍藥

當歸切

芍藥各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服日三

治產後血虛汗出不止甘草湯方

甘草炙分

當歸切

人參各壹兩

羊肉壹斤

去脂切碎水擘大塊

芍藥壹兩

桂去盡皮

芍藥壹兩

生乾地黄焙

右八味除肉外麤搗篩每服三錢匕以肉汁一盞煎

至七分去滓溫服不拘時

治產後虛汗不止心悸恍惚怵惕多驚茯苓湯方

白茯苓去黑皮壹兩半甘草炙黃壹兩芍藥剉炒壹兩

桂去蠹皮壹兩當歸切炒壹兩麥門冬去心焙壹兩

黃耆壹兩半剉

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

切棗二枚擘煎至八分去滓溫服不拘時

治產後喜汗不止腠理虛疎粉汗牡蠣散方

牡蠣壹斤燒研如粉麻黃根肆兩

右二味搗羅麻黃根為細末同牡蠣粉拌勻粉汗空

令密妙

治產後虛汗不止虛煩憤悶芍藥湯方

芍藥剉炒壹兩當歸切炒參分生乾地黃焙貳兩

黃耆剉壹兩白茯苓去黑皮壹兩石斛去根剉壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治產後榮血虛損汗出不止黃耆湯方

黃耆剉白木剉炒牡蠣熬為粉

白茯苓去黑皮防風去叉生乾地黃焙

麥門冬去心焙壹兩

右七味蠶搏篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓  
溫服不拘時

治產後虛汗不止煩倦少力二聖散方

麻黃根貳兩

故敗扇燒取灰  
秤半兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕煎人參湯調下不拘

時

治產後虛汗不止麻黃根湯方

麻黃根貳兩

牡蠣燒赤壹  
兩半

黃耆剉壹  
兩

人參壹兩

龍骨壹兩

枸杞根皮貳兩

右六味蠶搏篩每服三錢匕水一盞半棗二枚擘破

同煎至一盞去滓溫服不計時候

治產後虛汗不止煩熱體痛渴躁引飲人參散方

人參

芍藥剉

甘草炙

龍膽各壹兩

右四味搗羅爲散每服二錢匕麝香溫酒調服日三

治產後虛熱汗出不止石斛湯方

石斛去根

附子炮裂去  
皮臍切

白朮剉

秦艸去苗  
土

桂去蠹皮  
各壹兩

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞小麥五十粒

同煎至七分去滓溫服不拘時

產後蓐勞

論曰產蓐之後食飲起居失於常度使血氣不得其養若血虛則發熱氣虛則發寒血氣俱虛則寒熱更作日漸羸瘦故為蓐勞又產後惡露不盡亦令致此則時寒時熱腰腹刺痛甚者不能食亦不作肌膚

治產後蓐勞日漸枯瘁寒熱往來頭疼體痛口苦舌燥

柱心散方

桂去毒

厚朴去蘊皮塗此胡去

桔梗炒

紫苑去土 芍藥炒

高良薑

乾薑炮裂 白燕黃炒

陳橘皮湯浸去白焙 鱉甲去裙襴醋浸

草豆蔻參皮

右一十二味搗羅為散每服二錢匕用積豬肝十片

炙熟乘熱拌和藥末旋旋嚼溫酒下日三

治產後失於將理血氣虛損日漸困瘁少寒多熱煩渴

嗽逆痰壅減食此胡人參湯方

此胡苗

人參

生乾地黃焙各參分

桔梗炒

知母

紫苑去土

桑根白皮

枳殼去穢炒令黃

赤芍藥

桂皮去毒

當歸微炙各半兩

附子大者壹枚炮裂去皮臍



右一十二味判如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎七分去滓溫服不拘時

治產後羸勞寒熱羸瘦骨節痠痛茯苓凡方

白茯苓

去黑皮

肉苁蓉

酒浸切焙

熟乾地黄

焙各壹兩半

羚羊角

屑

當歸

切炒

枳殼

去瓤炒

桑上寄生

炒

延胡索

用各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜爲丸梧桐子大每服二十九

溫酒或米飲下不拘時服

治產後羸勞寒熱體痛力乏瘦黑豬腎湯方

豬腎

壹隻切

黃耆

切

人參

芍藥

剉碎炒各壹兩半

桂

去麤皮參分

芍藥

當歸

剉炒令香各壹兩

熟乾地黄

貳兩

右八味除腎外搗爲麤末每服二錢匕水二盞先煮

豬腎取一盞去腎入藥末生薑三片棗一枚擘同煎

七分去滓溫服不拘時

治產後羸勞寒熱日漸瘦損此胡湯方

此胡

去苗剉壹兩

甘草

剉

人參

白茯苓

去黑皮

當歸

切炒

赤芍藥

剉

枳殼

去瓤炒

厚朴

去麤皮塗薑汁炙

黃耆

剉各分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半先煮豬腎一

隻取汁一盞去腎入藥并生薑三片葱白三寸同煎  
七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞寒熱瘦瘁熟乾地黄湯方

熟乾地黄

焙壹兩半桂去蟲皮

白茯苓

去黑皮

甘草

炙

龍甲

去裙襖塗醋炙

麥門冬

去心炒

當歸

切

人參

牛膝

去苗

白朮

剉炒各壹兩

淡竹葉

壹兩切

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞肌瘦煩悶喘急多汗倦怠少力黃耆湯方

黃耆

剉

芍藥

剉

枳殼

去麩炒

牡蠣粉

各壹兩

羚羊角屑

兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞半豬腎一枚切去筋膜生薑五片同煎七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞虛衰寒熱羸瘦紫石英湯方

紫石英

別研如粉

鍾乳粉

白石英

研

熟乾地黄

焙

當歸

切

半夏

生薑自然汁製各半兩

桂

去麩

白茯苓

去黑皮各壹兩

人參

甘草

炙各分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗

一枚擘同煎七分去滓溫服不拘時  
治產後蓐勞肌肉枯瘦面無顏色或寒或熱四肢痠疼  
頭痛心煩黃者煮散方

黃耆 剉

龍甲

去密覆曬炙  
黃各壹兩

當歸 剉微炒

桑寄生

桂 去麤皮

白茯苓 去黑皮

白芍藥

人參

熟乾地黄

麥門冬 去心炒

牛膝 去苗酒浸切焙

甘草 炙各半兩

右一十二味搗為細散每服用豬腎一具切去脂膜  
先以水一盞半生薑三片棗二枚擘煎至一盞去滓

并腎却下藥末三錢匕再煎至七分溫服

治產後蓐勞疼痛寒熱頭旋眼運精神恍惚睡多驚恐  
盜汗腹痛大便不利芍藥湯方

赤芍藥

芍藥

牡丹皮

玄參

當歸 焙切

人參

五味子

麥門冬 去心炒

白茯苓 去皮

白薇

甘草 炙剉各壹兩

熟乾地黄 貳兩

右一十二味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八  
分去滓不拘時溫服

治產後蓐勞似瘧寒熱不能食豬腎湯方

豬腎

壹枚去  
脂膜切

粳米合

知母

焙分

當歸

剉焙壹  
分半

葱白伍  
莖

芍藥

參分

右六味除腎并米外剉如麻豆大以水六盞先煎豬腎七八沸內諸藥煎取四盞去滓下粳米煮熟去米空腹分溫三服如人行五六里一服服訖臥良久

治產後蓐勞寒熱體虛羸瘦不思飲食乾地黃丸方

熟乾地黃焙

人參

龍甲

醋炙去  
裙襖

肉苳蓉酒浸切  
各壹兩

白朮

炒

續斷

桂去  
皮

附子

炮裂去  
皮臍

五味子

當歸

牛膝

酒浸切焙  
各參分

羌活去  
蘆頭

白茯苓

去黑皮  
各半兩黃耆兩壹

右一十四味搗羅爲末研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下不拘時

治產後蓐勞寒熱時作肢體羸弱飲食無味白薇丸方

白薇

柏子人研

附子

炮裂去  
皮臍

龍甲醋炙去  
裙襖

當歸

黃耆

剉各  
兩

人參

桂去  
皮

石斛

去  
根

芍藥炒

牡丹皮

羌活

去蘆頭  
各參分

熟乾地黃焙

肉苳蓉酒浸切  
各壹兩

甘草炙

芍藥各壹  
兩

右二十六味搗羅為末研細鍊蜜和丸如梧桐子大  
每服二十九溫米飲下不拘時

治產後蓐勞補虛損益血氣澤蘭丸方

澤蘭壹兩

防風去

附子炮裂去

當歸切

白朮

桂去

芍藥

柏子人

熟乾地黄焙

石斛去根各

厚朴去麤皮生甘草炙

細辛去苗葉

人參

乾薑炮

牛膝酒浸

肉苁蓉酒浸

白芷

黃耆剉

續斷各

桃人去皮尖雙

右二十一味搗羅為末研勻鍊蜜和丸如梧桐子大  
每服三十九空心溫酒下

產後泄瀉

論曰產後氣血俱虛飲食易為傷動脾胃不和水穀不  
化故腹滿腸鳴而為泄瀉更遇寒氣則變為滯下矣

治產後虛冷泄瀉不止藏府冷痛腹脹滿悶附子丸方

附子炮裂去

木香炮

當歸炒

甘草炙

乾薑炮

芍藥各半

厚朴去麤皮生

吳茱萸易洗焙乾

陳橘皮去白

白朮剉

訶梨勒炮各參分

黃連去須壹兩半

右一十二味搗羅爲末薄麩糊和丸梧桐子大每服

三十九米飲下食前服

治產後泄瀉日久不止煩渴困倦不思飲食地榆散方

地榆細

桂去麩皮

草豆蔻去皮

黃連去須各參分

檳榔剉

當歸炒

肉豆蔻炮去殼

阿膠炒令燥

木香炮

烏頭炮裂去皮臍

丁香炒

枳殼去瓤炒

高良薑炒各半兩

右一十三味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下米飲

亦得空心食前

治產後冷滑泄瀉不止白堊丸方

白堊火燒壹兩

赤茯苓去皮

生乾地黃焙

乾薑炮

陳橘皮去白炒各半兩

右五味搗羅爲末以薄麩糊和丸梧桐子大每服三

十九食前米飲下

治產後日久泄瀉倦怠煩渴龍骨丸方

龍骨

甘草炙

赤石脂

烏梅肉炒

人參

黃芩去麩心

枳殼去麩炒

赤茯苓去黑皮各半兩厚朴去麩皮生薑汁炙

黃連去須各參分

右一十味搗羅爲末麩糊和丸梧桐子大每服三十

丸米飲下食前日三

治產後泄瀉久不止不思飲食厚朴湯方

厚朴去麩皮生薑汁炙貳兩

生乾地黄焙

蒼朮切焙各壹兩

當歸切炒參分

酸石榴皮半兩

右五味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前服

治產後泄瀉不止人參丸方

人參

草豆蔻人炮

訶梨勒炮法

甘草炙各壹兩

白礬熬令汁盡半兩

右五味搗羅爲末麩糊和丸梧桐子大每服三十九

米飲下食前服

治產後久瀉不止赤石脂丸方

赤石脂

人參各壹兩

乾薑炮半兩

龍骨參分

右四味搗羅爲末麩糊和丸梧桐子大每服三十九

食前米飲下

治產後水瀉不止四勝丸方

代赭

乾薑炮

龍骨各壹兩

附子炮裂去皮

右四味搗羅爲末麩糊和丸梧桐子大每服二十九

米飲下空心食前服

治產後熱瀉不止木香湯方

木香炮

黃連去須各壹兩 訶梨勒皮炮參分

龍骨火燒紅半兩

厚朴去麩皮生薑汁炙參分

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空心食前服

治產後泄瀉不止厚朴湯方

厚朴去麩皮生薑汁炙到 乾薑炮

白朮剉炒各壹兩

甘草炙半兩

陳橘皮去白炒參分

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服食前

治產後泄瀉腸滑不止阿膠丸方

阿膠炒令燥

黃蘗去麩皮到

人參

乾薑炮

當歸炒切

醋石榴皮各壹兩

右六味搗羅爲末麩糊和丸梧桐子大每服三十九

食前米飲下

治產後冷瀉不止肉豆蔻散方

肉豆蔻去殼壹兩

生薑汁貳

細麵貳



右三味搗羅二味用薑汁調作餅子慢火炙乾再焙搗羅為散每服二錢匕米飲調下空腹日三

治產後冷瀉日久不止熟艾丸方

熟艾炮肆兩

附子炮裂去皮臍

陳橘皮去白切炒

乾薑炮兩

右四味搗羅為末麩糊和丸梧桐子大每服三十九

食前米飲下

治產後泄瀉不止臍腹撮痛方

白礬燒汁盡

附子炮裂去皮臍各貳兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九

溫米飲下食前服

治產後泄瀉腹痛嘔逆不能食厚朴湯方

厚朴去麩皮生薑汁炙到貳兩

白朮微炒壹兩

右二味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心食前溫服

大德重校聖濟總錄卷第一百六十四

大德重校聖濟總錄卷第一百六十五

產後門

產後下痢

產後腫滿

產後小便不通

產後大便不通

產後下痢

論曰冷熱不調則水穀之精不化不化則腸胃虛弱冷熱之氣乘虛入客故為痢也婦人產後血氣不足腸胃俱虛冷熱之氣易為傷動故冷則色白熱則色赤二者兼之則赤白俱下

治產後赤白痢臍腹撮痛當歸湯方

當歸切炒

犀角屑

黃芩

去黑心各壹兩

黃連

去須貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後冷熱痢腹痛駐車丸方

乾薑貳兩 微炮

黃連去須 陸兩

阿膠炒別 爲末

當歸剉各 參兩

右四味除膠外搗羅爲末用多年陳醋消膠令鎔和爲丸併手丸如梧桐子大每服三十九以陳米飲下

日再服甚者加丸數

治產後赤白痢久不止臍腹疔痛地榆飲方

地榆剉焙 乾

酸石榴皮各壹 兩黃連去須 參兩

當歸剉炒 貳兩

右四味搗爲麤散每服三錢匕水一盞煎三七分去

泔食前溫服

治產後脾胃虛冷水穀不化脹滿或時寒極及下痢溫

脾丸方

乾薑炮

人參

桔梗炒

甘草炙剉各 參兩

法麴伍合 炒

桂去 陸皮 伍兩

附子炮裂去 皮兩

細辛去 芎藭 各壹兩

枳實參 剉炙 伍枚

吳茱萸湯洗焙 乾炒 伍兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九溫酒下加至三十九日三

治產後下痢赤白腹痛煩熱當歸湯方

當歸剉妙

厚朴去麤皮生薑汁炙令香

黃連去須各壹兩半

肉豆蔻去殼伍枚炮 甘草炙剉壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前

治產後下痢赤白心煩腹痛芍藥飲方

芍藥貳兩

甘草炙

阿膠炙令燥

艾葉炙

當歸剉妙各壹兩

生乾地黄兩貳剉

右六味搗為麤散每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時

治產後冷熱痢久下不止烏梅丸方

烏梅參百枚

當歸肆兩

乾薑微炮拾兩

桂皮去麤皮

附子炮裂去皮臍各陸兩 黃連去須拾陸兩

蜀椒去目并閉口者炒出汗肆兩

細辛去苗葉

人參

黃蘗各陸兩剉

右一十味除烏梅外各搗羅為末再合和勻以苦酒

漬烏梅一宿去核蒸之搗如泥盤中與藥按令相得

鍊蜜和杵二千下丸如梧桐子大每服十九食前米

飲下加至二十九日三

治產後赤白痢日久不止腸痛阿膠丸方

阿膠炒令燥

黃連去須

赤茯苓去黑皮

當歸炒

黃蘗各壹兩

乾薑叁分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下食前日再

治產後赤白痢腸腹痛烏梅黃連丸方

烏梅去核炒

黃連須去

當歸炒

阿膠炒令燥壹兩

蠟壹兩半

右五味除蠟外搗羅為末鍊蠟乘熱和丸梧桐子大每服三十九丸米飲下日三服

治產後赤白痢腸鳴腹痛黃連丸方

黃連去須

當歸炒

胡粉

阿膠

炒令燥各壹兩半

無食子貳枚

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下

治產後赤白痢日久臍腹冷疼茱萸丸方

吳茱萸

壹兩黑豆汁浸炒乾

黃連

去須壹兩半

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎為藥湯下空心食前服

治產後赤白痢膿血相兼疔痛黃耆湯方

黃耆剉壹兩

赤石脂壹兩半

阿膠炒令燥

黃連去須壹兩

黃蘗叁分

白朮壹兩剉炒

龍骨壹兩半  
火燒紅

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日二夜一

治產後赤白痢臍腹痛當歸芍藥湯方

當歸剉

芍藥

地榆

龍骨火燒  
紅

黃連去須各  
壹兩

艾葉炙

甘草炙

黃芩去黑  
心

乾薑炮

厚朴去麤皮生薑  
汁炙各參分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓

溫服食前日二

治產後下痢赤白日久羸瘦黃連湯方

黃連去  
須

甘草炙

熟艾炙

芍藥

乾薑炮

當歸剉

人參各壹  
兩

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前日三

治產後血痢結澀疔痛當歸丸方

當歸剉

白朮

甘草炙剉各  
壹兩半

桂去  
皮

人參各參  
分

桑根白皮剉

乾薑炮

細辛去葉  
各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下空心食前日三服

治產後痢赤如血煩熱渴躁腹疼阿膠散方

阿膠炒令燥

黃連去須

黃蘗

芍藥

地榆剉

甘草炙

虎杖酒浸炙剉

艾葉各壹兩半

右八味搗羅爲散每服二錢匕米飲調下食前日再服

服

治產後血痢腹痛不止訶梨勒散方

訶梨勒炮去核

阿膠炒令燥

黃蘗

地榆

甘草炙

右五味等分搗羅爲散每服二錢匕米飲調下食前

日三

治產後血痢不止牛角鰓散方

黃牛角鰓貳兩半燒灰

橡實壹兩炒

側柏葉半兩剉焙

右三味搗羅爲散每服二錢匕米飲調下空心食前

服

治產後腸胃氣虛泄痢水穀燥濕丸方

黃連去須分

烏梅肉熟貳分半

酸石榴皮



當歸剉

赤石脂各半

乾薑剉

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空腹米飲下

二十九加至三十九

治產後下痢赤白當歸湯方

當歸切

醋石榴皮炒

地榆各參

大豆黃炒

糯米合

甘草剉

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入薤白二寸切

同煎至八分去滓空心食前溫服

治產後下痢赤白久不差甘草散方

甘草半生

黃連去須炒

右二味搗羅為散每服二錢匕溫漿水調食前服

治產後痢不止木香散方

木香分

訶梨勒皮酥炒令黃

右二味搗羅為散研勻每服二錢匕米飲調下

治產後冷痢疾桂薑散方

桂去麤皮以薑汁半

阿膠炙令

當歸切焙各

右三味搗羅為細散空心以陳米飲調下二錢匕日

再服

治產後痢疾春蕨散方

右取新生蕨菜不限多少陰乾為細散每日空心陳米飲調下三錢匕

治產後冷痢疾乳薑散方

右以乾薑二兩炮搗羅為細末以人乳汁和作餅以慢火炙令黃熟研為細散每服空心陳米飲調下三錢匕

錢匕

治產後下痢久不止芸薑食方

芸薑不拘多少淨洗

右一味爛煮飽食佳

治產後血痢不止檮皮丸方

臭檮根皮剉

右一味搗羅為末水和丸如棗核大以麩裹捏作小

餽餽二七枚煮熟空腹吞之日再

治產後冷痢不止黃連散方

黃連去須乾薑炮

地榆剉各剉甘草剉烏梅肉炒

右六味搗羅為散每服一錢匕陳米飲調下食前服

治產後氣痢不止腹痛木香散方

木香剉訶梨勒半生半煨並去核壹兩壹分

當歸切肉豆蔻半兩去殼各

右五味搗羅為散每服二錢匕陳米飲調下

治產後水瀉不止厚朴湯方

厚朴去鹽皮生 白茯苓去黑皮 黃連去須各半兩

當歸剉焙 枳殼去穢炒

右五味判如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓空腹溫服

治產後下痢赤白兼下血赤石脂湯方

赤石脂 黃連去 地榆各參分

甘草炙 厚朴去鹽皮生薑汁

乾薑炮裂 當歸切焙

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入薤白三寸切

同煎七分去滓食前溫服

治產後下痢赤白久不止身面虛腫大豆飲方

大豆炒 小麥半升 蒲黃兩

吳茱萸炒

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治產後心腹脹滿飲食不消時作水痢白朮湯方

白朮 厚朴去鹽皮生 草豆蔻去

枳殼去穢 白茯苓去黑皮 木香

人參 各半兩

右七味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

三片同煎至八分去滓溫服日二

治產後冷痢臍下痛羸瘦不能食白朮散方

白朮

芍藥 炒各

木香 半炒

縮沙人

黃連 去須炒 各半兩

陳麴 炒壹兩半

厚朴 去鹽皮生薑汁多壹兩

右七味搗羅爲散每服二錢匕煎乾薑米飲調下

治產後赤白痢臍下疔痛當歸飲方

當歸 煨

赤芍藥

艾葉 炒

地榆

白龍骨

黃耆 剉各壹兩

厚朴 去鹽皮生薑汁多

黃芩 去黑心

乾薑 煨

甘草 各參分

右一十味搗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓不拘時溫服

治產後赤白痢黃連丸方

黃連 去須炒 壹兩

阿膠 炙

當歸 煨

乾薑 炮各參分

赤茯苓 去黑皮 半兩

甘草 炙剉 壹分

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心米飲下

治產後冷痢臍下痛不能食白豆蔻散方

白豆蔻

白朮

甘草炙

肉豆蔻人

芍藥

白茯苓去黑皮各參分

桂去麩皮

陳橘皮去白焙各半兩枳殼去瓤炒各參分

右九味搗羅爲散每服二錢匕空腹米飲調下

治產後血痢不止臍腹疔痛地榆湯方

地榆

芍藥各參分

木香

當歸焙切

甘草炙

阿膠炙燥各半兩

乾薑炮裂壹分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治產後赤白痢芍藥丸方

芍藥炒

艾葉各壹兩

地榆炒

當歸切

白朮各參分

龍骨碎

乾薑炮各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治產後痢疾紫桂丸方

桂去麩皮

甘遂

丁香

芫花醋炒

木香

巴豆去心皮

硝砂各等

右七味搗羅爲細末醋麩糊爲丸小菘豆大每服二  
丸至三丸溫水下加減更量虛實此丸取積最勝不  
以久近皆能化逐產後逐積滯尤妙

產後腫滿

論曰產後氣血俱虛寒濕客搏致脾胃怯弱不能播散  
諸氣使水血不分流溢肌膚故爲腫滿利其小木則病  
可愈

治產後通身腫滿氣喘煩悶防已湯方

防已

枳殼去瓤  
剉炒

桑根白皮剉

芎藭

萎蕤

當歸切焙各  
壹兩

葶藶隔紙炒  
壹分

木香半  
兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘破煎  
至七分去滓溫服以疎利腫消爲度

治產後腫滿因宿有抑鬱滯氣留結不散變爲浮腫煩  
悶欬逆惡血不行大腹皮湯方

大腹皮

赤茯苓去黑  
皮

當歸切  
焙

紫蘇莖葉

青橘皮湯浸去  
白炒甘草炙

木通剉各  
壹兩

桑根白皮剉

木香

檳榔剉

大黃剉炒各  
半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服日三

治產後浮腫煩悶羌活湯方

羌活去蘆頭

青橘皮去白麩炒各半兩

枳殼去麩炒

芎藭

生乾地黃焙

白木剉

桑根白皮各壹兩 木香

牽牛子略炒

訶梨勒皮微炒

赤茯苓去黑皮各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不拘時候

治產後腫滿喘欬防已枳殼湯方

防已剉

枳殼去麩炒

桑根白皮剉

當歸切焙各壹兩

木香半兩

紫蘇莖剉

檳榔剉各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時

治產後腫滿喘急欬貝母湯方

貝母去心

桑根白皮剉

紫苑

赤茯苓去黑皮

五味子各壹兩

杏仁去皮尖雙

人參各壹兩半

葶藶隔紙炒各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後徧身腫滿牽牛子丸方

牽牛子半生半熟

枳殼去瓢麩炒 當歸切焙

生乾地黄焙

芍藥

桑根白皮剉

木香炮

防已

訶梨勒炮去核各半兩

右九味攪羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

煎桑根白皮湯下不拘時

治產後腫滿心煩氣悶腸胃不利羚羊角湯方

羚羊角屑

延胡索

枳殼去瓢麩炒

芍藥

劉寄奴

檳榔剉

桑根白皮剉等分

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後腫滿煩悶喘欬枳殼丸方

枳殼去瓢麩炒

防已各壹兩

訶梨勒皮半兩

大黃炒壹兩

當歸切焙貳兩

郁李人去皮兩研半兩

桑根白皮剉壹兩

右七味除研外擣羅爲末拌勻鍊蜜丸如梧桐子大

每服二十九生薑紫蘇湯下不拘時

治產後通身暴腫煩悶不食商陸湯方



商陸根

兩到貳

防風

去又兩壹兩

甘草

炙半兩兩

附子

炮裂去皮壹枚

赤小豆

貳合

麻子

人合參

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一

盞去滓溫服不拘時

治產後偏身頭面浮腫乾地黃湯方

生乾地黃

焙

白朮

芍藥

赤茯苓

去黑皮各壹兩

桑根

白皮兩到貳兩

甘草

到半兩

赤小豆

伍合

黃耆

到各兩

商陸根

貳兩

右九味並生用麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至

一盞去滓溫服不拘時

治產後噴面四肢腫滿氣喘欬貝母丸方

貝母

去心壹兩

赤茯苓

去黑皮各貳兩

紫苑

桑根白皮

五味子

杏仁

去皮尖雙入炒別研膏

人參

各壹兩

大棗

壹拾枚煮熟去皮核別研膏

右八味除研二味外擣羅爲末以杏仁棗膏杵如乾

更入鍊蜜少許丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸濃煎商陸根湯下不拘時

治產後頭面浮腫兩脇痛枳殼丸方

枳殼

去瓢炒兩壹分

訶梨勒

煨去核貳兩

當歸

切焙

大黃

炒

防己

芍藥

微炒各參分

郁李人皮酒浸去木香

芎藭

甘草炙到各半兩

牽牛子壹兩炒熨取半兩用

右一十一味擣羅為末鍊蜜和丸梧桐子人每服二

十九煎桑白皮棗湯下加至三十九

治產後腫滿不能食防已湯方

防已兩貳

防風去又

芎藭

附子炮裂去皮臍

甘草炙到

當歸切焙

陳橘皮去白焙各壹兩赤小豆棗貳合

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑三

片同煎至六分去滓食前溫服

治產後血風通身浮腫柘黃湯方

柘黃

枳殼去麩炒

白朮

地丁各壹兩半

黃耆到

人參

款冬花

桔梗炒各貳兩

右八味麝臍每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時

產後小便不通

論曰產後氣血俱弱津液虛少將溫過度熱入膀胱氣

脈內燥壅塞不通始則淋瀝甚則不通令人少腹繞臍

脹痛氣滿於內亦令胞轉治法使氣得通則愈

治產後小便不通澤瀉散方

澤瀉剉貳兩

井泉石半兩研

車前子洗焙

赤茯苓去黑皮剉

當歸切炒各壹兩半

葶藶子紙上炒

甘遂生各半兩

右七味搗羅爲散每服一錢匕蜜湯溫調下食前日

再服

治產後小便不通煩悶滑石湯方

滑石

當歸切

木通剉各壹兩

冬葵子炒

黃芩去黑心

麥門冬去心焙各參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

桔梗半兩炒

甘草炙段赤剉壹分

右一十味麤搗篩每服一錢匕水七分入生薑二片

棗一枚擘煎至四分去滓不計時候量兒大小增減

溫服

治小兒脾胃氣弱乳不消化陳橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白焙

高良薑

人參各壹分

白茯苓去黑皮半兩

甘草炙分

右五味麤搗篩一二歲兒每服一錢匕水七分煎至

三分去滓食前溫服至晚三服隨兒大小增減

治小兒脾胃氣不和增寒壯熱不納乳食白豆蔻湯方

卷金一百六十五

白豆蔻皮 去 甘草 炙赤 陳橘皮 湯浸去

芎藭 枇杷葉 拭去毛炙微黃各壹分

乾木瓜 黃耆 剉 人參 各半

右八味麤搗篩每服一錢匕水七分入生薑二片棗

一枚擘破煎至四分去滓不計時候量兒大小分減

溫服

治小兒脾胃氣不和腹脇妨悶不能飲食四肢羸弱六

味人參湯方

人參 甘草 炙 丁香

黃耆 剉各壹分 陳橘皮 湯浸去白焙 訶梨勒皮 各半

黃芩 去黑心 瞿麥 穗取 當歸 切焙

冬葵子 炒 木通 剉各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日三

治產後小便不通車前子湯方

車前子 洗 瞿麥 穗取 當歸 切焙各壹兩

黃芩 去黑心洗 鬱金 各半兩剉

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時日二

治產後小便不通葵子湯方

總錄一百六十五

十九

葵子炒

石膏碎生

滑石各壹兩

貝齒肆枚

阿膠炒令燥半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治產後小便秘澀小腹疼痛當歸湯方

當歸切焙壹兩

白芷剉微炒

紫葛

芎藭各半兩

白茅根

胡荽各參分

右六味細剉每服五錢匕水一盞半入葱白五寸同煎至八分去滓溫服食後夜臥

治產後小便秘澀小腹疼痛榆白皮散方

榆白皮剉

木通剉炒

黃芩去黑心

葵子炒各半兩

芎藭

芍藥炒

滑石研

蒲黃各參分

右八味搗研爲散每服二錢匕濃煎木通湯調下

產後大便不通

論曰大腸者傳道之官變化出焉產後津液減耗胃中枯燥潤養不足糟粕壅滯故大便難而或致不通凡新產之人喜病此者由去血多內亡津液故也  
治產後大便秘澀不通臍腹堅痛十聖丸方

擯榔剉

木香

芎藭

新金一百六十五

羌活頭

去蘆

桂 去蘆皮 各壹兩

大黃 蒸切

郁李人 去皮尖別 研如膏

當歸 切

熟乾地黄 焙

人參 各貳兩

右一十味除郁李人外搗羅爲末入郁李人和勻鍊蜜爲丸梧桐子大每服二十九米飲下不拘時以利

爲度

治產後大便不通三脘湯方

大腹皮 剉

紫蘇莖葉

羌活 去蘆頭

甘草 炙

木瓜 切

芎藭

陳橘皮 去白切炒

檳榔 剉

沉香

白朮

木香 各壹兩

右一十一味盛搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治產後太便秘澁不通訶梨勒丸方

訶梨勒 煨去核

大黃 剉

當歸 切

熟乾地黄 焙

大麻人 別研如膏

人參 各壹兩半

右六味搗羅五味爲末與大麻人同研令勻鍊蜜和

丸如梧桐子大每服三十丸米飲下不拘時服

治產後大腸虛結秘澁不通厚朴丸方

厚朴 去麩皮生汁炙透 人參

陳橘皮 去白

總錄一百六十五

二二一

大黃

郁李人

去皮別研如膏各壹兩

當歸

切焙壹兩半

右六味搗羅五味爲末入郁李人膏同研令勻鍊蜜

和丸如梧桐子大每服三十九溫水下不拘時

治產後大便不通人參丸方

人參

檳榔

剉各壹兩半

當歸

切焙壹兩

厚朴

去蘊皮生薑汁炙透參分

郁李人

去雙人皮尖研如膏

兩半

右五味搗羅四味爲末入郁李人膏同研令勻鍊蜜

和丸如梧桐子大每服三十九溫水下加至三十九

不拘時

治產後大便秘澀不通大黃丸方

大黃

赤芍藥

當歸

切焙

厚朴

去蘊皮生薑汁炙透各壹兩

枳實

去瓤炒

大麻人

別研如膏

生乾地黄

焙各參分

右七味搗羅六味爲末與麻人膏同研令勻鍊蜜和

丸如梧桐子大每服二十九米飲下不拘時服

治產後大便秘澀不通調胃散方

大黃

當歸

麥門冬

去心

桃人

去雙人皮尖炒

生乾地黄

菖蒲

切

鼈甲醋炙去

芫胡去苗各

厚朴去麤皮牛

秦艸去苗

黃連去須各

桂去麤皮

吳茱萸湯洗去涎焙

右一十三味搗羅為散每服二錢匕溫水調下空心

食前服

治產後風熱大便秘澀大黃丸方

大黃剉

大麻人膏研如

當歸切焙各

生乾地黃兩焙

右四味搗羅三味為末與麻人膏研令勻鍊蜜和丸

如梧桐子大每服二十九米飲下以利為度

治產後腸胃燥熱大便秘澀郁李人飲方

郁李人去雙入皮

朴消研各

當歸切

生乾地黃兩焙

右四味將二味麤搗篩與別研者二味和勻每服三

錢匕水一盞煎至七分去滓溫服未通更服

治產後大便秘澀升麻湯方

升麻

大黃剉各

當歸切焙

生乾地黃兩焙

山梔子人

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服



治產後熱燥大便秘澀升麻湯方

升麻

枳實去麩 楚炒

黃芩去黑心 各參分

大黃剉

梔子人

杏仁去雙皮 剉炒

當歸切 焙

人參

甘草炙

生乾地黃焙各 壹兩

右一十味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去

滓食前服

治產後大便不通皂莢內藥方

豬牙皂莢生

杏仁湯退去 皮尖生

蛇蛻皮微 炙

乾薑炮各 壹兩

蜜半

右五味先搗前四味細羅爲末於銚子內熬蜜三兩

沸後下藥末不住手攪候可丸卽丸如棗核大每一

丸用綿子裹藥以麻油潤藥上內下部中仰臥便通

未通再內

治產後熱毒氣結燥大便不通壅滯氣悶疼痛腰重腸

脹大腹皮湯方

大腹皮伍枚 細剉

枳殼去麩 楚炒

赤芍藥剉各 壹兩

秦艸去苗 土

羌活去蘆頭 各半兩

天門冬去心 乾參分

生乾地黃焙壹 兩

甘草炙 參分

郁李人去皮 半兩 炒

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服得利為度

治產後大腸結燥秘澁氣壅脹悶欲死宜蜜煎導方

蜜半

右一味銚內微火煎之攪令稠如飴取出搓如手指

大小約長二寸內下部中須臾即通未通再內不妨

治產後大便不通大腸結燥腹中壅脹內藥方

皂莢不艸者壹搗去皮  
子酢炙搗為末

鹽豉半合  
研細

白蜜壹

右三味先熬蜜令消次下鹽豉皂莢末慢火煎不住

手攪候如飴即止丸如棗核大內一丸入下部中未

通可內三五丸不妨藥在內自化如得通利即隨出

治產後下部閉塞大便秘結不通以烏梅導方

烏梅拾肆  
枚

右一味溫湯浸取肉搗丸如小橫擲大每用一枚內

下部中立通

治產後大腸熱燥糟粕結梗藥勢不入大便不通宜以

皂莢導方

皂莢肥不艸者去  
皮子壹搗

右一味搗羅為末鍊蜜和丸如棗大取一丸內下部

中須臾即通

治產後大便不通七八日以上者溫中丸方

硫黃

用柳木細研  
飛過生用

右一味用水浸炊餅和丸如梧桐子大每服二十九  
或三十九丸用木香少許煎湯吞下即効

治大便不通不問老幼皆可喫中和散方

附子

壹兩一半炒  
生一半炒 大黃 壹兩一半炒  
生一半炒

右二味同碾為散每服二錢匕溫米飲調下臨臥服

大德重校聖濟總錄卷第一百六十五

大德重校聖濟總錄卷第一百六十六

產後門

產後大小便不通 產後乳汁不下

產後妬乳 產後乳結核

產後乳結癰

產後大小便不通

論曰內經謂大腸與膀胱受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸寫者也婦人大小腸本挾熱者既產之後血氣暴竭津液內涸燥熱相搏大小腸祕澀不能傳導故大小便俱不通也  
治產後大小便不通茯苓丸方

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

當歸

人參

枳殼

去瓤炒

白朮

剉炒

大麻人

別研如膏各半兩

大黃

剉炒

右八味搗羅七味為末與麻人研勻鍊蜜和丸如梧

桐子大每服二十九煎茅根湯下以利爲度

治產後風氣壅結大小便不通赤芍藥丸方

赤芍藥

壹兩

桂去麤皮

瞿麥多分

大黃剉炒壹兩半

檳榔剉

當歸炒切

羌活

去蘆頭各貳兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸米飲下以利爲度

治產後因腫滿小腹急脹大小便不通木香丸方

木香

壹兩

牽牛子

剉炒別

爲末入日幹小之

防已

陳橘皮

去白炒各壹兩半

檳榔剉

訶梨勒炮去核

羚羊角鎊各壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和杵令熟丸如梧桐子大每

服二十九煎生薑橘皮湯下以利爲度

治產後大小便不通榆白皮湯方

榆白皮

剉碎

桂去麤皮

當歸炒切

甘草

剉

滑石各壹兩

右五味搗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服以利爲度

治產後大小便不通葱膠湯方

葱白

壹握

牛膠壹片廣貳寸長肆寸

右二味剉碎以水三升和煮消盡去滓頓服

治產後冷熱不調大小便不通木香煮散方

木香炮為末

青黛研各壹兩

右二味再研令勻每服二錢匕水半盞麻油少許同

煎十餘沸和滓溫服之少頃即通未通再服

治產後臍腹壅滯腸胃燥澁大小便秘三脫散方

大腹皮剉

紫蘇莖葉

沉香

木瓜切焙

羌活去蘆頭各壹兩

白朮

芎藭

木香

甘草炙

陳橘皮去白焙

檳榔麩裏煨熟去麩各參分

右一十一味搗為麩散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服不拘時

治產後大小便不通腹脹氣急芍藥湯方

赤芍藥

芒消剉

杏仁去皮尖雙人麩炒各壹兩

大麻人參分研如膏

大黃剉炒

當歸切炒各貳兩

右六味將四味麩搗篩入大麻人同研令勻每服三

錢匕水一盞半煎至八分去滓下芒消末半錢匕溫

服以利為度

治產後大小便不通臍下妨悶兼痛石韋湯方

石韋去毛

赤芍藥各壹兩

當歸剉炒

赤茯苓

去黑皮

瞿麥

取穗各壹兩半

冬葵子

貳分炒

大黃

半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服以利爲度

治產後關格閉塞大小便不通大黃丸方

大黃

貳兩

芒消

壹兩

黃芩

去黑心

赤芍藥

杏人

去雙人皮尖楚炒

赤茯苓

去黑皮

生乾地黄

貳兩半

右七味搗羅爲末鍊蜜和杵丸如梧桐子大每服二

十九食前煎粟米飲下以利爲度

治產後大小便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩悶氣

短汗出腹滿濡臧湯方

生葛根

伍兩切無生者用乾葛貳兩

大黃

半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服以利爲度

治產後內熱大小便不通芫胡湯方

芫胡

去心

黃芩

去黑心

陳橘皮

湯浸去白切炒

澤瀉

羚羊角

銜各參分

梔子

八分

赤茯苓

去黑皮各壹兩

芒消

別研各壹兩半

右九味麤搗篩入味每服三錢匕水一盞煎至半煎主人

分去滓下芒消水半錢匕更煎一沸溫服

治產後大小便不通

梔子人

石膏

黃芩

澤瀉

此胡

赤芍藥

萎蕤

車前葉

右八味蠶搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服以利為度

治產後胸膈噎塞心下痞堅行滯氣消飲食通大小便

木香九方

木香

牽牛子

搗取末壹拾貳兩

葶澄茄

補骨脂

檳榔

飯各

右五味搗四味為末與牽牛末和勻漸滴并華水和

丸如棗豆大每服四十九茶湯熱水食後任下

治產後大小便不通臍下疼痛兼腹滿急服檳榔散方

檳榔

桂

芎藭

獨活

木香

大黃

郁李人

赤茯苓

右八味搗羅為散每服二錢匕食前溫水調下以利

為度



治產後大小便不通并腹瀉藥腹脹氣喘方

鹽半斤炒  
今變色

右一味先以漿水一斗半煎沸下鹽末在湯中攪和  
傾盆中看冷熱通手卽入盆中坐浸腰腹須臾便通  
湯或漸冷卽入新熱湯投之常令稍熱人困卽扶起  
少頃又浸

治產後大小便秘澀木通飲方

木通炒

冬葵根各分陳橘皮湯浸去

黃芩去黑

甘草炙當歸切

蒲黃微炒

瞿麥各半

陳米  
炒去

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去  
滓溫服日再

產後乳汁不下

論曰新產水血俱下暴傷津液氣脉未順所以乳汁不  
下也若能調其衝任治手太陰少陽之經不足則乳脉自  
然流行若其經虛氣脉閉而不通雖強治之亦無益也  
治產後乳無汁石鍾乳湯方

石鍾乳細研白石脂各壹分木通

消石壹分桔梗炒貳

右五味剉碎如麻豆大每服三錢匕水一盞煎七分

去滓溫服不拘時

治產後乳不流行下妳如聖散方

地膽草

栝樓根

高荳子

右三味等分搗羅爲散每服二錢匕溫葱酒調下日

三四服

治產後乳無汁漏蘆湯方

漏蘆

去蘆頭

木通

各壹兩

鍾乳

半兩

右三味搗剉如麻豆大每服三錢匕水一盞黍米半合同煎候米熟濾去滓溫服不拘時

治產後乳汁不下木通湯方

木通

鍾乳

各壹兩

漏蘆

去蘆頭

栝樓根

甘草

各壹兩

右五味搗剉如麻豆大每服三錢匕水一盞半黍米一撮同煎候米熟去滓溫服不拘時

治產後乳汁不下栝梗湯方

栝梗

漏蘆

去蘆頭

鍾乳粉

各半兩

蟾蜍

參分

右四味盛搗篩每服三錢匕水一盞煎六分去滓溫

服不拘時

治產後乳汁少或不下木通飲方

木通剉壹兩半

甘草剉

枳殼去穢炒各半兩

芍藥

漏蘆去蘆頭

桑根白皮剉

黃芩去黑心各壹兩

淡竹葉壹握切

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後乳汁少或不下豬蹄湯方

豬蹄肆隻以水伍升煮汁參升澄清

瞿麥去梗

漏蘆去蘆頭

木通剉各兩

右四味內三味麤搗篩每服三錢匕豬蹄汁一盞煎

七分去滓溫服不拘時

治產後乳無汁麥門冬散方

麥門冬焙去心

鍾乳粉

理石研

土瓜根各半兩

鱗蝟染灰乾

乾棗染灰炒

右六味搗羅爲散每服三錢匕濃煎木通湯調下不

拘時服

治產後因病乳汁少或不下豬蹄湯方

母豬蹄壹具細剉

白油麻貳合洗研細

鱗蝟染灰乾爲末

右三味先將豬蹄用水五椀煮令熟入研了油麻再

煮俱熟却入鱗蝟末略煮便傾出細絹濾澄清時煖

一盞飲之不拘時

治乳汁不下王瓜酒方

右以王瓜不計多少用酒煮至爛熟飲酒嚼王瓜下其乳脉自通

治產後乳汁不下或汁少鬼箭湯方

鬼箭羽

伍兩到碎

右一味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後乳汁不下寄生湯方

桑寄生

參兩握細到

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後乳汁不下或少栝樓酒方

栝樓

黃大者壹枚到碎

右一味熟搗令爛用好酒五盞煎取三盞去滓每服一小盞煖服不拘時

治產後乳無汁露蜂房散方

露蜂房

參枚到碎略炒

右一味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

治產後乳無汁栝樓散方

栝樓根

伍兩切焙乾

綠鐘一兩六分

右一味搗羅為散每服二錢匕以白粥飲調下溫酒

亦得早晨日午至夜各一

治產後乳無汁魚灰散方

鯉魚頭伍枚制碎  
瓦上燒灰

右一味細研為散每服二錢匕以溫酒調下早晨午

時夜臥各一

治產後乳汁少或不下王瓜根湯方

王瓜根伍兩以水伍碗同搗絞  
取汁參洗去滓不用

右一味取汁每服一盞入酒少許同煎七分溫服不

拘時

治產後乳汁不下萹苳飲方

萹苳子壹合 糯米各半

右二味用甘草半兩煎汁一升研前三味濾去滓分

作三服服之立下

又方

木通剉 鍾乳細研 麥門冬去心焙

右三味搗羅為散每服二錢匕食後溫酒調下日再

治乳無汁下乳漏蘆散方

漏蘆分 栝樓根 王瓜根各壹

木通剉貳 躑躅研散

總錄一

右五味搗研勻每服二錢匕食後溫酒調下日再服  
又方

母豬蹄壹隻

木通參兩

右二味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至  
八分去滓食後溫服并取此汁作羹亦得

產後妬乳

論曰氣血流行則上爲乳汁下爲月水上下通達不失  
常度是謂平人宜通而塞則爲痛熱氣復乘之則爲腫  
向之流行者壅遏矣儻失調治則結鞭成核身體壯熱  
甚則憎風遂爲乳癰世傳氣結乳閉亦爲妬乳者此也

治產後乳汁不泄結滯腫痛連翹湯方

連翹未開者

射干

杏仁湯去皮尖

大黃炒

芫胡去苗

甘草炙

升麻

防己

芍藥

芒消研各壹兩

右一十味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分  
去滓溫服不拘時

治產後妬乳乳汁不泄結成癰腫玄參湯方

玄參

芍藥

連翹根去

防己

射干

升麻剉

芒消

白欬

大黃劉妙各壹兩

杏仁

去皮尖雙人炒時捨核

甘草參分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎一盞

去滓溫服不拘時

治產後妬乳汁不通踈腫痛漏蘆散方

漏蘆去蘆頭

地錦

蔓荊實去白皮

黃耆剉

當歸切

威靈仙去土各壹兩

右六味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

治產後乳汁不泄結成癰腫熱痛升麻湯方

升麻

玄參

芍藥

生乾地黃焙

連翹

瞿麥取穗各壹兩

射干半兩

甘草炙壹分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治產後妬乳塗傳方

野葛

芍藥

薤白

當歸

木通各半兩

附子壹分春月不用此壹味

右六味各細剉如豆大用醋浸半日後同煎沸卽先煎豬脂八分一椀令烟出次入亂髮一分洗去垢煎令消次入松脂一兩半蠟半兩再煎沸綿布濾去滓

瓷合盛冷則以故帛傅乳上乾則易之

治產後妬乳乳汁不泄藕結成癰連翹湯方

連翹

大黃

各炒各半兩

黃耆

壹兩

犀角屑

芍藥

木通

細

升麻

黃芩

去黑心各參分

竹葉

壹握切

芒消

半兩

石一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

治產後妬乳壅結疼痛牡丹皮散方

牡丹皮

威靈仙

洗焙

黃耆

剉

桂去麤皮

大黃

酒蒸切焙

當歸

切焙各壹兩

右六味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

日三

治產後妬乳鹿角散方

鹿角

壹兩半

故靴頭

貳枚

右二味燒灰研細每服二錢匕煎當歸酒溫調下不拘時服

治產後妬乳欲成癰鐵粉散方

鐵粉

研

細辛

去苗

芎藭

人參

防風

去

乾薑

炮



黃芩去黑心

桂去蠶皮

芍藥

肉苳蓉酒浸切焙各壹兩

當歸切焙

甘草炙各貳兩

右一十二味搗羅爲散每服三錢匕酒調下日四五

服或膿血敗壞自出爲效

治產後妬乳或癰雞屎散方

雞屎炒乾壹兩

麝香半錢細研

右二味爲細散每服一錢匕煎荊芥酒溫調下不拘

時服

治產後乳汁不泄結滯不消熱腫二灰散方

蔓荊實燒存性

皂莢刺燒存性各壹兩

右二味合研爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治產後妬乳結腫不消熱痛傅乳方

升麻

木香

檀香各半兩

右三味各取成塊者逐味就沙盆內用酒少許帶濕

磨三味相等卽用鷲羽刷傅乳上如乾以水潤之常

令濕潤一日兩次傅之

治產後妬乳結滯成癰腫發熱疼痛槲皮湯洗方

槲皮細切

右一味以水一斗煮取七升通手便洗不拘時頻煖

洗之

治產後妬乳成癰腫或已破膿血未散天麻草洗方

天麻草伍兩細切

右一味以水一斗煮取七升去滓通手洗之不拘時

頻頻煖洗

產後乳結核

論曰產後乳結核者以氣血虛弱風邪搏之乳脉凝滯故結而為核日久不差蘊積生熱熱勝則腫甚則成癰也

治產後乳結核或成癰腫發熱疼痛枳殼湯方

枳殼去穢炒

芍藥

人參

黃耆剉

木通剉

當歸切

桂皮去穢

茯苓子炒去

雞骨炙

大黃剉炒各壹兩

右一十味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓

溫服不拘時

治產後乳結核堅鞭疼痛當歸散方

當歸切

芍藥

黃耆剉

茯苓子炒去

雞骨炙

附子炮裂去

枳實去穢剉桂皮去穢

人參

薏以人各壹兩

右一十味搗羅爲散每服三錢匕酒調服日三

治產後乳結核或堅鞭疼痛莽草散方

莽草葉壹兩

紫葛

大黃各半兩

赤小豆貳兩

右四味搗爲末用醋調如糊傅結核上頻易之每易

則先以熱葱湯洗

治產後乳腫熱痛外傅膏方

黃連去分

犬黃生

鼠糞妙各半兩

右三味搗羅爲末用米糊調傅乳四邊頻易之每易

先用熱葱湯洗

治產後乳結核及初結作癰服此麥門冬湯方

麥門冬去心

黃芩去黑心

黃耆剉

芍藥

赤茯苓去黑皮

甘草

木通剉各貳兩

桑寄生

防風去

人參各參兩

右一十味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入

棗二枚擘煎取一盞去滓入沙糖一棗大令銷溫服

不拘時候乳漸消減卽服後方天門冬丸

治產後乳結核天門冬丸方

天門冬去心焙木通剉

黃耆剉

防風去

生乾地黃焙

桑寄生剉

人參各壹兩

羌活去蘆頭

大黃兩

白芷

升麻各參

澤蘭去枝

茯神去

天雄炮裂去

黃芩去黑

枳實去瓢

五味子各半

右一十七味搗羅爲末鍊蜜爲丸梧桐子大每服二

十九加至三十九溫酒下日三

治產後乳結核疼痛或腫欲成癰外消膏方

伏龍肝半

大黃剉半

生薑壹分洗

右三味除薑外爲細末和勻用醋調作膏看大小攤貼病上早晚易之

治產後乳結核欲壞不壞托裏散方

威靈仙洗

當歸切

牡丹皮

芍藥剉

黃耆剉

桂去麤皮

大黃炮

右七味搗羅爲散每服三錢匕溫酒調下不拘時候

治產後乳腫或結核敗壞熱悶升麻湯方

升麻

白欬各壹兩

大黃生半

黃芩去黑皮

芒消研半

桂去麤皮

人參 黃耆劉各

右八味搗為麤末每服三錢匕水一盞煎七分去滓

溫服不拘時

治產後乳腫痛煩熱蔓荆實散方

蔓荆實劉各 甘草各半

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

治產後乳結核腫痛發熱煩悶大黃湯方

大黃劉各 芍藥 棟實破炒

馬蹄炙焦黃 各壹兩

右四味搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後乳初覺有核漸發熱痛累日不退欲成癰黃芩

湯方

黃芩圓小 甘草炙 桑寄生劉

防風去 木通劉 麥門冬去心

赤芍藥 黃耆劉 大黃各壹

右九味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時

治乳結核堅鞭當歸散方

當歸切 桂去麤皮 芍藥

人參

枳實

去瓢殼炒

莢藜子

炒去角

雞骨

各兩

木通

剉

黃耆

剉各壹兩

右九味搗羅爲散每服二錢匕空腹酒調下日再

產後乳結癰

論曰產後衝任不足氣血俱虛僭熱潛行入於足陽明之脉其直行者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣衝中衝脉右起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至胸中而散也其經爲邪熱攻衝則血爲之擊搏氣爲之留滯擊搏則痛作留滯則腫生內經所謂管氣不從逆於肉理乃生癰腫產後多有此疾者以乳汁蘊積與氣相搏故也

治產後乳癰欲結未結發熱腫痛當歸飲方

當歸

切炒

芍藥

牡丹皮

生乾地黄

焙

人參

黃耆

剉

大黃

升麻

連翹

各壹兩

右九味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服不拘時

治產後乳結核或腫痛漸成癰煩熱黃耆湯方

黃耆

剉

生乾地黄

焙

麥門冬

去心

升麻

各壹兩半

人參

赤茯苓

去黑皮各壹兩

當歸

切炒

芍藥

遠志

去心

甘草生各半兩

右一十味蠶持篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓溫服不拘時

治產後乳結癰腫痛煩熱鐵粉散方

鐵粉研別

肉荵蓉酒浸切焙

桂去盡皮

細辛去苗

芎藭

人參

防風去義

乾薑

黃芩去黑心

芍藥

當歸切炒

甘草炙剉各壹兩

右一十二味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘

時

治乳癰疼痛寒熱蛇蛻皮散方

蛇蛻皮燒灰半兩麝香貳錢

右二味研細每服二錢匕熱酒調下不拘時

治產後乳結癰膿敗壞不散發熱疼痛芍藥湯方

芍藥 桂去盡皮

黃耆剉

赤茯苓去黑皮

當歸切炒

生乾地黃切各壹兩

甘草剉

人參

麥門冬去心焙各壹兩

右九味以咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑一棗大切煎至八分去滓下朴消末一錢匕再煎

令沸溫服不拘時

治產後乳癰熱痛未結膿者甘草飲方

甘草半兩半炙半生 栝樓壹枚去皮用麩

右二味先以酒三盞煎甘草至一盞入栝樓麩煎至

一盞去滓溫服半盞如稠即以溫酒少許解之未効

再作

治產後乳癰膿潰未潰熱痛不已栝樓散方

栝樓實兩貳 敗醬細辛去苗

乾薑炮 厚朴去鹽皮生薑汁炙 桔梗炒

人參 防風去叉各半兩

右八味搗羅爲散每服三錢匕溫酒調下水一盞煎

至八分溫服亦得不拘時

治乳汁不出蘊積在內結成癰腫此名妬乳蜂房散方

露蜂房灰燒

右一味研細每服二錢匕水一盞煎至六分溫服不

拘時

治產後乳癰欲結未結膿攻疼痛黃耆膏方

黃耆剉 芎藭當歸切

黃芩去黑心 黃連去須 白欝

芍藥 防風去叉各壹兩

右八味搗羅爲末用雞子白調隨大小貼之每日一



易

治產後乳癰腫痛膿不消散托外膏方

黃耆剉壹兩半

白芷

大黃剉炒各壹兩

當歸切炒

續斷各參分

薤白切貳合

松脂貳兩別研

豬脂伍兩

生地黄汁壹升

蠟壹兩半

右一十味將前五味搗爲細末入地黄汁慢火煎漸

稠次入豬脂松脂薤蠟等再煎成膏以新布濾過新

瓷器盛候冷攤帛上看大小貼之逐日一易

治產後乳癰破後膿血不盡豬蹄湯洗方

豬蹄壹具

當歸切炒

芍藥

黃芩去黑心

獨活去蘆頭

莽草

大黃剉炒

芎藭各半兩

右八味搗羅七味爲細末將豬蹄剉洗令淨以水五

升煮熟去滓澄清內藥再煎令熱通手洗乳上令透

拭乾良久又煖洗不拘次數

治乳癰黃連膏方

黃連去須

大黃剉炒各壹分

鼠糞末半兩

右三味爲細末煮黍米粥飲調如膏於四邊傅之

治乳汁不時泄蘊積於內遂成癰漏蘆膏方

漏蘆

黃芩

去黑心 各壹兩

米粉

兩

右三味為細末新水調如膏塗之

治乳癰腫痛大黃散方

大黃

剉

棟實

各壹兩

芍藥

壹兩 壹分

馬蹄

炙剉壹兩半

右四味搗羅為散每服二錢匕空腹米飲調下蓋覆

取汗服三劑差

治乳腫初覺有異麥門冬湯方

生麥門冬

去心

黃耆

剉

防風

去

桑寄生

各壹兩半

甘草

炙參分

木通

貳兩

黃芩

去黑心

赤芍藥

各壹兩半

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入棗

二枚煎至八分去滓內乳糖一分再煎一沸去滓溫

服