



79  
1089  
—

引用書目

- 葉氏錄驗方 宋葉大廉  
痘疹世醫心法 明萬全  
保赤全書 明管憐  
醫宗粹元 明羅彥周  
萬病回春 明龔廷賢  
麻疹心法 明翁仲仁  
本草經疏  
景岳全書 明張介賓  
炮灸大法 並同前  
丹臺玉案 明孫文胤



91-1867

列傳車要方

書作崔彌木

疹科纂要 明馬之騏

本草彙言 明倪朱謨

張氏醫通 清張璐

錦囊秘錄 清馮兆張

麻疹治法綱 清朱之黯

幼科誠書 清談金章

秘方集驗 清王夢蘭

危證簡便方 清胡其重

丹方彙編 清錢峻

醫宗金鑑 清乾隆御纂

瘍醫大全 清顧世澄

麻疹纂類

櫟蔭拙者 輯

名義

細粟如麻者。俗呼爲麻。即膚疹也。三因微者其邪在府。發爲細疹。狀如蚊喙所蟄。點點赤色。俗號麩瘡。聖濟細胞遍於肌膚之上。如沸瘡泡子。見而漸沒。名爲疹子。一名膚疹。一名膚瘡。俗名麻子。或曰沙子。是也。熊氏類証北人謂之糠瘡。南人謂之麩瘡。吳人謂之痧。越人謂之瘠。古所謂麻。聞人氏所謂膚胗是也。準繩一見紅色。出而復沒。沒而復見者。謂之膚

疹。北人謂騷疹。治痘詳說天地間沴戾不正之氣故曰疹也。然其名目有異。在蘇松曰沙子。在浙江曰醋子。在江右湖廣曰麻。在山陝曰膚瘡。曰糠瘡。曰赤瘡。在北直曰疹子。名雖不同。其證則一。景岳京師內外名曰溫疹。河南名曰痧瘡。山西陝西名曰糠瘡。山左名曰疹子。江南浙江名曰痧疹。湖廣江西名曰麻疹。又名船子。福建廣東廣西雲南貴州四川俱名曰疹子。瘡醫大全厝子發疹。在梆李則名痧子。而痧脹亦名爲痧。不可不辨。王衡

案釋名。疹。診也。有結氣可得診見也。其曰麻。曰沙。曰糠。也。其他多土音習俗之訛耳。

形色

古謂麻卽疹也。疹出如麻成朵。痘出如豆成粒。皆象其形而名之也。保赤麻疹浮小而有頭粒。隨出卽收。不結膿疮。有如發風疹。疣瘡擁起如雲頭。色赤成斑。隨見隨沒者。有如粟米頭粒。三番俱見而不沒。至三日後方收漸沒者。然皆謂之麻疹。準繩通身紅赤。起而成粒。勻淨而小。斜目視之。隱

隱皮膚之下。以手摸之。磊磊肌肉之間。其形若疥。其色若丹。色貴紅潤。形貴尖聳。若色雖紅潤而不起。二便艱滯者。清熱透肌湯。如色淡不起。二便如常。此屬本虛。兼當培養氣血。亦有色黯。大便秘結。唇舌燥赤者。爲火邪內鬱。白虎湯加玄參荆芥。其有色白不分肉地。惟點粒高聳。猝時即沒者。邪熱本輕也。然有表氣本虛。而色白者。調護溫煖。越一二日。自變紅活也。若正出時。爲風寒所遏。而色白如膚。必毛竅竦栗。葛根解肌湯。或麻出成片。一被風寒。便變爲白身不發熱。而反內攻。煩躁腹痛。痰喘急者。危。如毒攻於

胃。則嘔吐清水。攻於脾。則腹脹不食。攻於肺。則鼻塞喘促。攻於心包。則脣舌焦燥。不省人事。搖頭掣手。攻於腎肝。則變黑而不救也。若色紫赤而黯。是火毒熾盛。頂粒起者。可治。宜涼血飲子。讌語煩躁者。黃連解毒湯。調益元散。枯燥不起者。難治。若頂粒焦者。無論紅淡。皆爲熱劇之候。並宜白虎湯。重用石膏。乾燥無汗。加麻黃以汗之。大便秘者。涼膈散下之。亦有麻發如雲頭大片。其形有二。一者。大片焮赤。一者。大片之上。復有小紅點粒。皆火邪熾盛所致。白虎湯加玄參竹葉。若麻出斑爛如錦紋。或出膿血。腥臭不乾。

心胸煩悶。嘔吐清水。身溫熱者。白虎湯加黃芩茅朮。若初發時。有似斑屑者。乃風寒在表。而成癰疹。概宜疎解。俟麻一透。其疹自退。切勿誤認爲斑。而與苦寒之劑。致麻內陷。而難救也。醫凡出疹見標之後。形似麻粒。大粒而尖。稀疎磊落。再後成片。紅色滋潤者。順。若初出一時湧出。不分顆粒。深紫色者。險。黑色者。逆。昔人云。痘喜稀疎。疹宜稠密。雖如潔瘡通紅一片。亦不足慮。以其出之於外。即可免夫內攻。瘡醫始見點於皮膚之上。形如麻粒。色若桃花。間有類於痘大者。此麻疹初發之狀也。形尖疎稀。漸次稠密。有顆

粒而無根暈。微起泛而不生漿。此麻疹見形之後。大異於痘也。金鑑痘瘡貴三四次出。謂出勻。麻瘡貴一齊湧出。謂出盡。麻子只要得出便輕減。以火照之。遍身如塗朱之狀。此將出之兆。出形細密。與痘瘡密者相似。但疹子隨出隨沒。非若痘子之以漸長大也。出形鮮紅。與傷寒發斑相似。但疹子粒粒成瘡。非若班之皮紅成片。如蚊迹之迹也。世醫其邪發於皮膚之上。出爲細疹。狀如蚊蚤所咬。點點紅色。赤斑遍身。甚則疊腫。有小顆粒。隨出隨沒。沒則又出。纂要案斑者。有色點而無顆粒。見保赤等。傷寒多有此証。景岳則

云痘之有疹。疹之外。又有麻疹。所謂疹即麻疹。麻疹即癰。與萬氏諸家之言左矣。是必謬說。使後人不能無迷。故舉于此。

凡疹初未見標之時。先必身熱頭疼咳嗽。或作吐作瀉。或鼻塞鼻流清涕。噴嚏。眼胞腫。腮赤。煩躁不寧。細看兩耳根下頸項連耳之間。以及背脊之下至腰間。必有三五紅點。此乃疹之報標。若無紅點之證候。當以別證論。此屢試屢驗者也。如果有紅點。與前證相同。宜用宣毒發表湯。加芫荽爲引。以托之外出。不必拘泥吐瀉。疹出而吐瀉自止。 瘡醫大全

疹期

出疹之候。初熱一日。至次日鷄鳴時。其熱即止。止存五心微熱。漸見欬嗽。鼻流清涕。或腹中作痛。飲食漸減。到申酉之間。其熱復來。如此者四日。用手滿按髮際處甚熱。其面上熱少減。二三分欬嗽連聲。面燥腮赤。眼中多淚。噴嚏頻發。或忽然鼻中出血。至五日。其熱不分晝夜。六日早時。其疹出在兩頰下。細細紅點。至午時。兩手背並腰下。及渾身密密。俱有紅點。七日並徧掀發。其鼻中清涕不流。噴嚏亦不行。七日晚。兩頰顏色漸淡。此驗出疹之要法。

世醫法 吳

水土濡弱之鄉。生氣最易崩動。故麻疹之發。自始至終。不過二三日即安。從古迄今。靡不皆然。邇來風寒。變遷有似北方氣候。即尋常麻疹。必六七日乃化。稍若熱勢未盡。或觸風寒。或犯飲食。變証百出。其危有甚於痘者。醫通

疹在痘前者。痘後必復疹。惟痘後出疹者。方爲結局。景岳

案準繩云。出於痘前者。名奶疹子。出於痘後者。名正疹子。乃知痘前者。非正疹子。故復疹也。

凡正疹由於胎毒。其出也必在出痘之後。或隔兩三年。或隔半年一年之久。甚至八九年之遠。感正疹之氣而出。次

後再不復出矣。瘍醫全

發熱

瘡疹之證。其初發熱。與傷寒相似。但疹子則面頰赤。欬嗽噴嚏。鼻流清涕。自中淚出。呵欠喜睡。或吐瀉。或手搯眉目。鼻面。宜用升麻葛根湯。一不可作傷寒。妄用汗下也。世醫心法

輕者。以瀉白散。合三味消毒散。重者。以金沸草散主之。兼泄利者。合升麻葛根湯。以白芷代葛根。此余創立治法。用之無不効者。卽十分危証。守而勿失。終於必濟。準繩 麻痘之初。必由發熱。但痘熱不過二三日。即出。麻熱有六七日。或

半月乃出。或乍涼乍熱。或壯熱經日不退。始熱之際必見面赤。眼腫多涕淚。欬嗽連聲。是其候也。熱甚經日不退曰壯熱。惟正出時爲正候。若初發壯熱至已出而熱不少衰者。其證必重。清熱透肌湯出盡而壯熱不退者。竹葉石膏湯去半夏加荆芥黑參沒後而壯熱不退者。危急需涼解爲主。其有熱數日止而復作者。有早熱而暮退者。在初發時爲邪熱未透。葛根解肌湯正出之際。而煩熱轉甚。乃邪熱未解。而復內攻也。清熱透肌湯沒後見者。爲餘邪未盡。四物湯換生地赤芍加連翹黑參亦有麻退身涼越六七

日而復熱者。非餘熱未清。卽復感風邪。當以意消息。或因大病之後。中氣虛。而然者。治本爲要。臨病之機。不可不審也。醫通瘡疹非熱不出。疹子欲出。則遍身發熱。或煩躁。或頭眩。或身拘急。及既出則身便涼。諸病悉解。此一層疹子隨收矣。如疹子旣出。熱甚不減。此毒壅遏。宜大青湯解其表。便澀者。以黃連解毒湯合白虎湯解其裏。大便不通者。順清涼飲主之。繩麻疹未出時。發熱吐瀉交作。三日內出耳後項上腰腿先出。一日出三次。二日再出六次。見黑紅活顯露形。小明淨。而頂尖不長。隨出沒三四日方收者。順

症也不治自愈。麻未出時。發熱乾霍亂。身體極熱。欲出不出。隱伏皮肉。發出不快者。險。宜升麻葛根湯加麻黃。即出。麻未出時。發熱喘促者。險。宜三拗湯加煅過石膏茶葉。名五虎湯。主之。麻未出時。發熱面先青黑。乃毒氣攻心者。逆。宜內托散消毒湯以解之。不然則必死。身體極熱。隱伏不出。或帶紫色不明。或不突起。與肉一平。或一二日就沒。喘嗽痢下者。逆。速宜解表。急即用麻黃湯以發之。胡荽酒以擦之。緩則用升麻葛根湯加石膏黃芩。以解之。麻疹正出時。身猶大熱。宜升麻葛根湯加黃芩地骨皮治之。若以手

摸之。疹色白。起手即紅者。血虛。宜養榮湯。

纂要

痧疹輯要方

櫟蔭拙者 撰

真武湯葉氏專一發散四時不正之氣及傷寒未分證候。瘡疹欲出未出並宜服之。

桔梗 荆芥 薄荷 紫蘇 乾葛 甘草 瓜萎根

牛蒡子各等分

右照常水煎。

葛根消毒湯先考藍溪公所定治初發熱。咳嗽噴嚏。鼻流清涕。眼胞腫。眼淚汪汪。面腫腮赤。欲出未出者。

葛根 升麻 荀藥 防風 荆芥 牛蒡子 桔梗

薄荷 甘草

照常水煎。加西河柳葉尤佳。○此方加連翹枳殼木通竹葉即活幼宣毒發表湯去桔梗升麻薄荷加蟬蛻木通即醫通葛根解肌湯。

透邪煎

景岳

凡麻疹初熱未出之時惟恐誤藥故云未出之先

不宜用藥然解利得宜則毒必易散而勢自輕此方爲主

當歸

二三錢

芍藥

一二錢

防風

七八分

荆芥

一錢

甘草

七分

升麻

三分

熱甚脉洪滑者加柴胡一錢○案此方用虛人及孕婦麻疹太效或加葛根牛蒡子亦可

清揚飲子

廣筆記○案繆氏諸方舊無方名盡係于翁氏所定下放此

麻疹之主方

麥門冬

三錢

西河柳

五錢

玄參

二錢

鼠粘子

葛根

各一分

知母 蟬蛻 甘草 荆芥 薄荷

各一錢

竹葉

三十片

甚者加石膏

五錢

冬米一撮又甚者加黃芩黃柏黃連

檉葉葛根湯

廣筆記

乾葛 前胡 荆芥 貝母 西河柳 玄參 知母

麥門冬 甘草

右水煎服。如冬天寒甚。痧毒鬱于內。不得透出。喘渴悶亂煩躁不定者。加麻黃。

瀉白消毒散 準繩 治疹子發熱之初。其證輕者。

桑白皮 地骨皮 各三錢 研。牛蒡子炒。荆芥各一錢半

桔梗 甘草 各一錢。浮萍二錢

右照常水煎。

加味金沸草散 準繩 治疹子發熱之初。其證重者。

旋覆花 麻黃 前胡各七錢。荆芥一兩。甘草 半夏

芍藥各五錢。鼠粘子 浮萍各七錢

生薑二片。薄荷葉三五片。水煎。

麻黃杏仁甘草石膏湯 醫通 治將發之際。風寒暴襲。氣粗喘促。腹脹。煩擾不寧。而不能出。急與此湯。即傷寒論原方。

麻黃湯 準繩 治發熱六七日以後。明是疹子。却不出此皮膚堅厚。腠理閉密。又或風寒襲之。急用此湯。調煙葉散發之。

麻黃 升麻 牛蒡子 蟬殼 甘草各一錢

右剉細。加臘茶葉一錢。水煎服。煩渴。加石膏末四錢。案痘疹全書。原

方。有人中黃。不用茶葉。

煙葉散

準繩

煙亦名西河柳亦名垂絲柳青茂時採葉晒乾爲末每服一

二錢茅根煎湯調下案已用麻黃湯調下

又不須茅根煎湯

獨聖散

廣筆記治癰疹發不出喘嗽煩悶躁亂神祕之方

西河柳葉

風乾爲末四錢

頓服立定翁氏云水砂糖調服兼可治疹後痢馬銘鞠救吳少海及其姪湯水不入矣逐口強灌之而生張守爲長郎初婚亦危矣治之亦愈

附赤煙木近世又以治癰疹熱毒不能出用爲發散之神藥蓋

熱毒熾於肺胃則發斑癧於肌肉間以肺主皮毛胃主肌肉也此藥正入肺胃心三經三經毒解則邪透肌膚而內熱自消此開發升散甘鹹微溫之功用也同石膏知母薄荷荆芥玄參牛菊子麥門冬竹葉連翹黃芩甘草之屬治癰疹發不出或雖發不透治熱甚毒熾舌生芒刺大渴譫語癰色紫黑者加入三黃石膏湯內單用及兼各藥並主癰癧首尾諸症

本草經疏

赤煙柳治癰癧聖藥也得之毒自出可不死炮炙大法

煙柳味苦微鹹氣溫無毒涼血分發癰癧解癰毒之藥也古

云瘡癰卽今之瘡疹也。此藥輕清升散。開發瘡毒。如瘡毒內閉不出。或出之甚多。難于解退。或解退後。熱發不止。或喘嗽不消。肌肉羸瘦。致成瘡瘍者多有之。以此煎湯。代茶日飲。瘡疹諸疾。漸自消減矣。

本草彙言

治瘡疹不出神方。危症用花園內觀音柳採來煎湯服。即發簡便。用花園內觀音柳採來煎湯服。即發出。

發散瘡子祕方集驗發時多挾水瀉。但宜清解。不可止瀉。用西河柳五六錢。煎湯服。或櫻桃核敲碎。煎湯服。皆效。

悶痧丹方彙編西河柳葉風乾爲細末。水調服四錢。立效。或鮮者。

五六錢煎湯服。亦效。分開頂門。有紅筋紅癩。挑破卽出。

案錦囊云

痺疼有正氣不足不能逐邪外出則毒伏於內喘脹而死者是俗名悶痧也則與王衡所載痧脹之悶痧迥別。

觀音柳。一名西河柳。乃小兒瘡疹之聖藥也。冬月用枝梗。春夏用苗葉。每用一錢。煎湯服。年力大者。多服一次。無妨。能清脾解毒。發表。若在窮鄉僻壤。醫藥不便。煎服。疹卽出現。瘡醫案檉柳。本草綱目。唯云。治腹中痞積。一切諸風。解酒毒。利小便。而不言解痧毒。嘗閱醫方類聚。中風門。引煙霞聖效方。載檉花散。治遍身風癰痒。重則昏迷不省。檉柳花無花用葉。然葉用枝。然不及用花。蛤粉當歸。甘草。各等分。右爲末。研勻。每服四錢。溫水調下。畧睡良久再服。蓋此與發痧毒之意同焉。○又案肇慶府志。檉赤柳。生水旁。皮色如絳。細葉如絲。俗呼御柳。今斯邦家園所栽御柳。乃係于享保年間所舶來。其烏檉柳無疑矣。而繆氏經疏據爾雅翼則云。凌冬不凋。今御柳

至秋末葉落則似御柳非檉然時珍所說檉柳形狀與御柳合而煙霞聖效云無葉用枝顧氏云冬月用枝梗則明是非凌冬不凋者而疹家所用爲今之御柳矣蓋木之名檉者有數種所謂凌冬不凋者別是一種繆氏牽混爲說乃令後人致疑故特辨之

痘後見疹主方廣筆記

沙參一錢桔梗一錢甘草五分貝母一錢西河柳二錢

右照常水煎

竹葉石膏湯廣筆記 痘發時多喘邪熱壅于肺故也慎勿用定喘藥

石膏二錢至一兩知母一錢至二三錢竹葉三十片西河柳許金匱

右照常水煎

蠭虎湯廣筆記 治痧不發極重者

西河柳兩許知母五錢貝母三錢玄參三錢竹葉七十

麥門冬兩許石膏一兩五錢

右照常水煎

三黃石膏加檉葉湯廣筆記 進前劑痧雖出盡煩躁不止勢尚不可保

石膏三兩知母一兩麥門冬三兩竹葉二百黃檗

黃芩 黃連 各五錢 西河柳一兩

濃煎飲之煩躁定而瘡

治瘡疹熱極內悶不出本草

真烏犀角 磨汁

半盞

西河柳五錢

牛蒡子二錢

桔梗

玄參 升麻 甘草各一錢

右水煎和汁服

單治瘡疹不起透

本草彙言

用牛蒡子研細五錢 檉榔煎湯調下立透

越脾湯 醫通治麻出而皮膚乾燥毛竅竦慄不能透卽金匱原方

消毒飲

粹元

治麻毒內攻案此方豈能治內攻但用麻黃等劑而無效者以此發之頗驗

黃芩 防風 連翹 牛蒡子 木通 桔梗 玄參  
紅花子 甘草 桑白皮

右水煎服

二仙散 粹元治麻初出不快案體虛不堪服麻黃等者以此發之太效

紅杏子 牛蒡子 川山甲

右各等分水煎服

濟生散 粹元治麻欲出不出而生雜症入口立效

紫草錢 梅蕊錢 蟬退錢 凤尾草一錢○案即貫衆

牛黃一錢 鐘金一錢

右爲末每服一錢煎麥門冬湯下。

清熱透肌湯醫通治初發壯熱至已出而熱不少衰或煩熱轉甚或熱甚欬嗽

玄參

石膏

牛蒡子

荆芥

防風

前胡

葛根

杏仁 甘草

右水煎服。

解毒快斑湯瘍醫癰疹已見形一二日內宜服

連翹

荆芥各七錢

牛蒡子

當歸

防風各六錢

蟬蛻

五箇

生地

山楂各二錢

黃芩

桔梗

乾葛

紫草

各八分

川芎

五分

觀音柳二三分爲引不可多用

化毒清表湯活幼麻已出而紅腫太甚宜用此湯

牛蒡

連翹

天花粉

地骨皮

黃連

黃芩

山梔

知母

乾葛

玄參各八分

桔梗

前胡

木通

各六分

甘草

薄荷

防風各三分

口渴加麥門冬

一錢

石膏

三錢

大便祕

加酒炒大黃

一錢二分

顧氏曰壬午年溫疹大行老少男婦傳染死者盈萬予惟

以宣毒發表湯化毒清表湯去黃連加觀音柳治之竟無死者○朱純嘏加燈心五十寸犀角三分

孟氏介石募施治癒神方瘍醫凡遇癰瘍不拘四時皆可煎服藥味分兩萬勿增損

石膏煅二兩當歸 乾葛 桑白各一兩 荆芥 桔梗

地骨皮各八錢 牛蒡子 赤芍 陳皮 薄荷各五分

枳殼六錢 貝母 甘草各四錢 紅花二三錢

共爲細末每次用末三百錢白水三鍾煎湯濾去渣服輕者

三五服重者六七服立愈照方施濟功德無窮大能起發透

表解毒清熱不傷元氣是以功有神效○朱純嘏云予見去桑皮不用可加前胡一兩防風八錢酒炒黃芩八錢連翹五錢予施此方專用朱氏加減之方

加味地骨皮散準繩治療出發熱不退飲食不進

地骨皮三錢 桑白皮二錢 麥門冬二錢 柴胡 芎藥

乾葛各一錢 甘草 生犀角屑各五分

水煎調大無比散五七分亦治喘急不止

大無比散準繩治熱毒太甚驚狂譫語引飲

滑石六兩 辰砂三錢 雄黃一錢 已上三味俱研無聲水飛如飛麪

痘疹專方

九言仲景方

粉草一

兩

右爲末每三五歲者服一錢十歲以外服二錢

涼血飲子醫通治麻疹火毒熾盛紫赤而黯

生地錢半

分

黃連五分

分

黃芩

分

荆芥

分

黑參各一錢

分

紅花三分

分

水煎服

化斑湯痘疹治疹子之出色如錦紋者

全書

人參

知母

石膏

牛蒡子

連翹

升麻

甘草

赤淡竹葉 糯米 地骨皮

水煎服以米熟爲度

大青湯保赤麻出色太紅殷微紫者血熱也宜此湯

大青

玄參

生地

石膏

知母

木通

甘草

地骨皮

荆芥

各等

分

竹葉

十二

右水煎案萬氏不用竹葉有人中黃方後云便祕者加酒蒸大黃

養血化斑湯世醫麻出色淡白者血不足也宜此湯

當歸

生地

紅花

蟬蛻

人參

各等

分

生薑一片水煎

養榮湯保赤治麻疹色白

人參

當歸

紅花

桂水

甘草

右水煎。

養榮湯

纂要以手摸之。疹色白。起手卽紅者。血虛也。宜此方。

當歸

川芎

芍藥

地黃

等分

人參

白朮

黃芪

甘草

減半

右水煎。

加味逍遙散

世醫

有一種病後瘦弱。脣白氣虛。感時氣出痧疹。

或體虛。痧出白色。少紅活者。

白朮

薄荷

陳皮

茯苓

芍藥

麥門

柴胡

當歸

甘草

丹皮

乾葛

右水煎服。

和中湯

傷醫

有一種痧。大吐大瀉。而後見者。甚輕。與作惡心乾

嘔者不同。用藥微表和中安胃爲主。

白朮

乾葛

各八分

當歸

茯苓

桔梗

各七分

芍藥

甘草

半夏

柴胡

防風

各六分

陳皮

丹皮

各五分

生姜一片。紅棗二枚。爲引。

全真一氣湯。錦囊治麻疹。陽外越而陰內竭。中氣弱而肺氣傷。其候身面俱見。面赤壯熱。喘嗽煩躁。不食洩瀉。其脉細數無

力。

熟地八錢 麥門冬三錢 脾虛者減之 白朮三錢 牛膝由二錢至三錢

五味子由八錢至一錢五分 附子由一錢至二錢

水煎冲參湯服 ○人參由二三錢加至四五錢虛極者一兩隨宜任用另煎冲入前藥

黃連解毒湯 世醫治 瘰子出未盡拂拂發熱煩悶不寧

黃連 黃芩 黃蘖 槔子

右水煎 ○纂要云麻疹沒後生瘡及眼目疾宜以此加減治之

白虎合解毒湯 準繩 治瘰子出渴甚

石膏四錢 知母 天花粉 黃芩 黃連黃山梔各一錢

生地 麥門冬各二錢 竹葉十片

水煎更磨犀角汁索湯水則與之覺胃熱渴甚宜以此方多與之胃清乃止庶免牙疳之害

人參白虎湯 纂要治 麻疹化斑發疹止渴如神

知母 石膏各一錢 桔梗 人參各五分虛者加之 甘草二分

竹葉七斤水煎 ○黃氏無桔梗甘草有天花粉葛粉粳米麥門冬

白虎湯 醫通治 邪熱內陷挾痰熱煩躁腹脹喘急或不省人事

者。

石膏 知母 甘草 穰米 玄參 竹葉

右水煎。

門冬甘露飲醫通治麻疹熱甚而渴。

麥門冬二錢 玄參 黃芩 桔梗根 連翹各一錢

甘草二分 燈心廿莖 竹葉廿片

右水煎。

涼膈散醫通治偏身青紫熱腫、喘脹氣急。

大黃二兩 芒消一兩 甘草六錢 連翹一兩 黃芩一兩

山梔八錢 薄荷七錢

竹葉十五片。水煎。右去芒消。加麻黃石膏。○金鑑本方。合消毒飲。引用燈心。名涼膈消毒散。治疹已發於外。而咽喉作痛。四順清涼飲。醫通治火壅血燥。而耗津液。大便祕結。

當歸 赤芍 甘草 大黃各一錢五分

水煎。入生白蜜一七。熱服。○又當歸散。治口舌生瘡。牙根毒發。大便祕結。於本方加川芎。爲散。生薑一片。水煎。四物湯粹元。治麻疹。首尾可用。

本方。加連翹。黃芩。防風。

卷之三

案疹後無他症者用之調理。

犀角地黃湯 醫通治火邪熾盛衄不止或失血者。

犀角一兩 生地八兩 茯苓三兩 丹皮一兩

右水煎加荆芥穗。

犀角解毒湯 回春治麻疹已出大便下血或小便下血吐血衄血。

卽犀角地黃湯合黃連解毒湯。

清寧湯 玉案治痧麻汗出太多鼻血不止。

當歸 連翹 石膏 黃連各一錢 生地 麥門冬

玄參各七分 甘草一分

浮小麥一錢煎服。

甘草 杏仁 桑葉 黃連 赤芍各二錢

三拗湯 醫通治初發之時喘者。

麻黃去節 不去 甘草生 杏仁連皮尖

右等分加石膏芽茶。

六氣煎 景岳治麻疹以大渴或大汗而致喘者必皆氣脫之候。

黃芪 肉桂 人參 白朮 當歸 甘草

水煎服。

除熱清肺湯 醫通治麻疹盡透而壯熱欬嗽大便祕結。

石膏錢 玄參 生地 茯苓 貝母 枯萎根各一錢

麥門冬 錢半 甘草五分

水煎服。

清氣化毒湯 金鑑 治疹已出。胸滿喘急。此毒氣內攻。肺金受犯。

若遲延失治。以致肺葉焦舉。

前胡 桔梗 枯萎仁 連翹 桑皮 杏仁 黃芩

黃連 玄參 甘草 麥冬

引用蘆根水煎。

清金寧嗽湯 金鑑 治已出欬嗽。乃肺爲火灼。

陳皮 前胡 甘草 杏仁 桑皮 黃連 枯萎仁

桔梗 貝母

引用生薑 紅棗水煎。

犀角解毒化痰清火丸 瘍醫 痘證欬嗽。氣喘脣紅。結熱在內。煩躁不安。或口鼻出血者。

犀角 紫草 連翹 花粉 丹皮 薄荷 甘草

貝母各一 黃連 牛蒡子錢三

生地二兩

當歸八錢

芍藥六分

共爲細末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。竹葉湯服。今去歸芍。加青黛一兩。其效更捷。

效覺

射干消毒飲醫通治麻疹欬嗽聲瘡咽喉腫痛。

射干 玄參 連翹 荆芥 鼠粘子等分 甘草減半

水煎服

玄桔湯王案治痧證咽喉腫脹。

玄參 桔梗 牛蒡子 連翹 天花粉 甘草各一錢

淡竹葉廿片煎服○醫通無花粉連翹有山荳根荆芥麥門冬名甘桔湯治咽痛口瘡。

加味涼膈散金鑑治疹已發而失音者。

薄荷 危子 玄參 連翹 甘草 桔梗 麥門冬

牛蒡子 黃芩

水煎服

兒茶散纂要治麻疹聲啞無音。

孩兒茶錢五分 硼砂二錢

右爲細末每服一匙用涼水一升調下。

二仙湯壽世治麻疹已出而復沒或出不盡心慌哭啼不止十分危急死在須臾或下利腹痛。

黃芩 芍藥各等分

水煎溫服如神。

少參鼻要方

加味黃芩湯 準繩 治疹子滯下。

黃芩 黃連各一錢半 茄藥三錢 甘草七分 滑石末三分

水煎服。若滑石不煎調服。止於一錢血痢。加地榆。○保赤。加

味黃芩湯。卽仲景原方。加升麻。凡四味。

清熱導滯湯 活幼 治毒氣流注而成痢。

黃連 黃芩 茄藥 枳殼 壓肉錢各一錢 厚朴

青皮 檳榔各六分 當歸 甘草 牛蒡子 連翹各五分

紅多者。加紅花一分。地榆五分。祕滯甚。加酒炒大黃一錢二分。

分

黃芩湯痘疹全書治火邪內迫裏急後重而爲滯下。

黃芩 黃連 赤芍 生地 木通 枳殼 甘草

當歸 人參

水煎去渣。調天水散服。初加酒大黃。微利之。○又治疹後休息痢。於本方去赤芍。生地。木通。加川芎。青皮。木香。檳榔。名黃芩湯。

芩湯

猪芩湯世醫治麻疹自利。

猪芩 澤瀉 滑石 茄芩 甘草 黃連 升麻  
右各等分水煎。○保赤。名升麻澤瀉湯。

加味四苓散 活幼 麻出之時多有自利不止者其毒亦因利而散此殊無妨如泄利過甚則與之

朱苓 木通各八 分澤瀉 茯苓各七 分

黃連 黃芩 牛蒡各五 分

燈心一團同煎食前服

溫胃飲 景岳治麻疹脾氣本弱而過用寒藥或以誤食生冷致傷脾胃而爲泄瀉者必無熱證熱脉色白氣餒

人參一至三錢 白朮一二錢 扁豆二錢 陳皮一錢或或一兩

乾薑炒一錢 甘草一錢 當歸一二錢滑

當歸泄者勿用

水煎服大嘔大吐不止者加胡椒一二分許煎熟徐徐服之  
五君子煎 景岳 治證同上

人參錢二三 白朮 茯苓各二 炙甘錢一

乾薑炒二錢

水煎服

竹茹石膏湯 痘疹全書治麻症作吐

陳皮 半夏 石膏 茯苓 竹茹 甘草

水煎○金鑑引生姜云麻疹嘔吐者由於火邪內迫胃氣冲逆也以和中清熱其吐自止

柴胡橘皮湯 世醫治邪毒壅遏嘔瀉者

柴胡 橘皮 黃芩 半夏 人參 茯苓 各等分

竹葉一團 生姜三片 水煎

加味平胃散 金鑑 治麻疹腹痛。由食滯凝結。毒氣不得宣發於外。不時曲腹啼叫。兩眉頻蹙。

本方加防風。升麻。枳殼。葛根。山楂。麥芽。

生姜燈心水煎。

茱連散 世醫 治乾嘔。

黃連 五錢 吳茱萸 二錢 青竹茹 一團

右三味同炒研細末。每服半錢。生姜湯調服。

清中安蛇湯 櫟窓自驗 治胃熱吐蛇。

黃連 姜炒三錢 黃柏 錢半 枳殼 二錢 烏梅 三箇 川椒 三十粒

右生姜水煎。原出汪苓友傷寒辨註。

葛根黃連黃芩湯 保嬰撮要 治疹後身熱不退。即傷寒論原方。

當歸養血湯 世醫 瘡子既沒。渾身壯熱。未至羸瘦。但多搐掣。煩躁不寧。此熱在心肝二經。

當歸 川芎 生地 麥門冬 木通 甘草 竹葉

燈心 梔子

水煎。便秘。加大黃。

病疹轉要方

黃連安神丸 世醫治証同前。間而服之。

黃連 二錢 當歸 二錢 龍膽 二錢 石菖蒲 一錢五分 全蝎 七分  
茯神 一錢五分

共爲細末。湯浸蒸餅杵。猪心血九硃。砂爲衣。燈心湯下。

柴胡門冬散 世醫治疹子收後熟太甚。或日久不減。

柴胡 五分 龍膽 三分 麥門冬 八分 甘草 二分 人參  
玄參 各半錢

右水煎。

柴胡四物湯 世醫治前證髮枯毛豎。肉消骨立。漸漸羸瘦者。

柴胡 人參 黃芩 當歸 川芎 生地 茯苓  
地骨皮 知母 麥門冬 淡竹葉

水煎。○金鑑於本方去人參。芎歸竹葉加甘草。生姜。燈心。名  
柴胡清熱飲。治疹後身熱。

清熱除疳丸 痘疹治疹子既沒。其毒不解。渾身發熱。漸成疳瘻。  
全書治痘瘻。燒糊爲丸。米湯下。

黃連 當歸 各二錢 龍膽 青皮 蘆薈 各一分

共爲細末。神麌糊爲丸。米湯下。

秦艽飲 誠書治疹後蒸熱。肌肉消瘦。

秦艽 前胡 知母 當歸 橘紅 鱗甲 青蒿

麥門冬 金銀花 地骨皮

右水煎

六味地黃丸加知母黃柏

誠書

治久熱成癆。

人參養胃湯

誠書

治疹後久熱作渴勞瘵。

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 黃連 茯藥 人參

茯苓 麥冬

右加棗冬米水煎服

麥門冬清肺飲

痘疹心法

治麻後欬嗽或出血或噙湯水。

知母 貝母 天門冬 桔梗半 甘草 杏仁 石膏

牛蒡子 馬兜鈴 麥門冬

右用糯米水煎

清咽滋肺湯

醫通

治麻後餘熱欬嗽聲瘡。

玄參 鼠粘子 荆芥 蔥蕤 貝母 枯萎根

馬兜鈴

桔梗

麥門冬

等分

甘草

減半

水煎服。○廣筆記無馬兜鈴有薄荷。

清金降火湯

纂要

治麻疹後熱火乘金欬嗽啞不出。

當歸 芍藥 生芍 陳皮 貝母 甘草 山梔

枯芩 玄參 麥冬 石膏 桑皮 杏仁 蘇子

黃連各等

生姜水煎。○保赤有天門冬茯苓瓜萎仁。

瀉白消毒散治法網治疹退之後微微欬嗽者此餘毒未盡也。

桑白皮 地骨皮 甘草 牛蒡子 荆芥

粳米百粒水煎或加黃連。

疹後欬嗽腹脹喘急煩躁泄瀉聲啞唇口青黑壽世

黃連 黃芩 連翹 玄參 知母 桔梗 杏仁

芍藥 麻黃 乾葛 陳皮 牛蒡子 厚朴 甘草

右水煎。

潤肺養榮湯誠書治疹後咳血

前胡 桑白皮 蘇子 橘紅 青蒿 玄參 連翹

貝母 山梔炒黑 荆芥炒黑各等分

右加茅根汁燈心藕節水煎服。

順氣寧嗽誠書治久嗽咯血

天花粉 膽南星 前胡 橘紅 側柏葉炒

白芥子 瓜萎霜 荷梗 阿膠 黃芩炒黑 丹皮各等分

右加燈心末耳水煎服得童便尤妙。

引血歸經飲

廣華記

治同前。

前胡

款冬花

黑山梔

丹皮

貝母

地骨皮

炙桑皮

橘皮

茯苓

麥門冬

風化硝

右加淡竹葉燈心水煎服。

癥後元氣不復脾胃弱宜用此方

廣筆記

芍藥

君臣

甘草

君臣

蓮肉

臣

山藥

臣

青黛

臣

臣以佐君多服必漸強慎勿輕用參术

石斛清胃散

醫通

治麻後嘔吐胃虛不食熱滯。

石斛 茯苓 橘皮 枳殼 扁豆 蕤香 丹皮

赤芍

等分

甘草

減半

生姜一片水煎。

雙和湯

醫通

治麻後羸瘦。

熟地

白芍

各一錢

黃芩

當歸

七分

川芎

各四分

肉桂

三分有

生姜

一片

紅棗

一枚

水煎。

必勝散

玉案

治癥後痢疾。

陳皮

厚朴

蒼术

茯苓

牛蒡子

澤鴻

木通各八

分

生薑一片食前煎服。

疹後泄濁及便膿血皆由熱邪內陷故也大忌止瀉宜用廣筆記

升麻葛根甘草黃連芍藥扁豆滑石

多服必自愈不便膿血者去滑石。

木通散粹元治麻證作浮腫。

木通五分通草五分地龍晒乾去土燒爲末五分

右爲末每服一錢米飲調服。

犀角湯擦窓治麻後水腫。

犀角玄參連翹柴胡升麻木通射干

甘草芒硝麥冬沈香

右水煎是原河間治結陽四肢腫滿

方予用以療疹後水氣甚効。

治疹後瘡清涼健脾記

鱉甲二錢山楂肉三錢麥門冬五錢茯苓二錢甘草七錢

橘紅二錢五分

竹葉五十片知母一錢乾葛一錢

貝母二錢柴胡一錢

渴甚者加石膏五錢不渴并知母去之。

十仙湯回春治疹後餘毒。

柴胡 葛根 玄參 黃連 黃芩 柴子 陳皮

茯苓 穀殼 生地

生姜水煎

黃連解毒湯纂要 瘰疹沒後生瘡及眼目疾宜以此加減治之。

大連翹飲纂要 治麻風瘡

連翹 瞿麥 荆芥 木通 車前 赤芍 當歸

防風 柴胡 滑石 蟬殼 甘草 山梔 黃芩

牛蒡各等分

右水煎

連翹生地散廣筆記 瘰後生瘡不已餘熱未盡故也宜此湯。

金銀花 連翹 甘草 玄參 黃連 生地

荆芥穗 鱉蟲胡麻即亞 木通

右水煎

羌活散保赤治麻後癰毒肢節疼痛

羌活 川山甲各一兩 大黃五錢 全蝎五個 白芷五錢

一葉金五條去頭足

○案卽蜈蚣 甘草一錢 乳香二錢

右爲細末每服一錢或錢半加牙皂一錢好酒送下以發汗

爲度

加味清胃散 醫通治麻疹餘毒上衝牙疳腐爛

生地錢四分 升麻錢半 丹皮錢五分 當歸 川連錢各三

右水煎更加荆芥石膏。

生犀地黃湯 廣筆記 疹後牙疳最危須內外兼治良。內服此湯。

連翹 乾葛 升麻 玄參 甘草 黃連 荆芥

生地

水煎卽以藥汁磨生犀角二三十匙同服緩則不可救。

黃龍散 廣筆記 外治

牡黃牛糞尖 煅存性研極細 梅花片腦一分

右研勻吹 醫通名無比散

龍朋散 廣筆記 治痧後口瘡

牡黃牛糞尖 一個煅製如前 明礬五分 水片 一分五厘 白硼砂錢三

皮硝錢一

右爲細末鷺翎管吹患處。

人中白散 治注綱 治疹後牙齦黑爛肉腐血出臭惡衝人名走馬疳。

疳。

人中白 煅一錢 黃柏 炒三錢

右爲末擦 內

妙參詳要方

卷之三

清胃散毒湯 瘍醫 治瘻後口瘡牙疳等患。

牡丹皮 桑皮 金銀花 甘草 生地 黃柏

連翹 沙參 茯苓 姜黃

如體虛加白朮

金花消毒飲 誠書 治瘻後諸熱口糜。

黃連 黃芩 黃柏 大黃 各等分

右加燈心水煎服為丸亦可。

除瘡散 誠書 吹瘻後牙瘡。

人中白 火煅三錢 文蛤 火煅三錢 銅青 二錢 砒末 少許

繭脫紙 燒灰一錢

右爲末米泔水拭淨吹上

牙疳最效方 誠書 是方諸疳俱宜在瘻後尤佳。

象牙末 象皮末 馬蹄 燒灰 血竭 兒茶 麝香

冰片 青黛 大紅羊絨 煅 枯礬 人中白

真珠 煅 胡黃連 各等分

右爲極細末吹爛處。

復元散 粹元治麻後鼻乾黑如烟煤

貝母 桔梗 百合 枇杷葉 各一錢 粟殼 燒一錢

阿膠炒

右爲末。每服一錢。桑白皮煎湯服。

羚羊角散保嬰撮要治瘡後餘毒不解。上攻眼目。生翳羞明。眵淚俱多。紅赤腫閉。

羚羊角 簾 黃芩 黃芪 草決明 車前子 升麻

防風 大黃 芒硝各等分

柴胡飲子醫通治瘡後。爲風熱所侵。而眼眶赤爛者。急須治之。否則爲終身痼疾。

柴胡 川芎 防風 茵藥 桔梗 荆芥 生半各一錢

甘草

五分

水煎熱服。

神應膏世醫護目方

黃柏一兩 甘草四兩 紅花二兩 真荳豆粉一兩半

右爲細末。用臘脂水和蜜水調塗兩眼四畔之瘡上。

四物湯加白朮黃芩艾葉保赤治孕婦麻疹。如胎氣上冲。急用苧麻根艾葉煎湯磨生檳榔。并服之。更多服上藥爲妙。白虎湯合升麻葛根湯纂要治孕婦麻疹。疹出不快。

右方中倍加玄參。牛蒡子。

固胎飲 築要 治孕婦麻疹熱甚。胎氣不安。若服之。腹痛腰酸。胎在必墮。卽以產法論。先用大補。次用他症藥。胎雖動而婦可生。

生地

川芎各五分

桑上羊兒藤七葉圓者一錢

當歸

人參

白芍

陳皮各一分

白朮

黃芩各一錢五分

甘草

三分

黃連

黃柏各二分

糯米

二十粒

右水煎

案此方原出于丹溪桑上羊兒藤正傳用真桑寄生今頗難採用宜以赤桑雞代之。

痧疹輯要方 終



