

文部集成

三十一




漢書門	一 二 七 〇 五
類	五〇七
號	
函	
架	
冊	

內閣文庫	和書
四 五 〇 七	五〇七
類	五〇七
號	
冊	
架	
冊	

(六十三)

內閣文庫	
番號	和 45027
冊數	50 (36)
函號	196 50



大學東
校典籍
局之印



外科集成卷三十六目錄

麻疹原委論

麻疹始出候論

麻疹部位論

麻疹形色論

麻疹戒忌論

麻疹治法總論



外科集成卷三十六

修澤舍活板

麻發熱證治論
麻咳嗽證治論
麻嚏證治論
麻嘔吐證治論
麻泄瀉證治論
麻目赤證治論
麻發不出證治論
麻不透表證治論

麻沒早證治論
麻難沒證治論
麻渴證治論
麻喘證治論
麻氣促證治論
麻瘡證治論
麻咽痛證治論
麻發搐證治論

麻失血證治論
麻譫妄證治論
麻咬牙證治論
麻脣燥證治論
麻脣舌破裂證治論
麻口臭證治論
麻舌胎證治論
麻口疳證治論

麻腹痛證治論
麻便秘證治論
麻溺瀉證治論
麻痢證治論
麻下虫證治論
麻睡證治論
麻不食證治論
麻鼻扇證治論

麻身冷證治論
 麻水畜證治論
 孕婦出麻證治論
 麻虛羸證治論
 麻後瘡證治論

外科集成卷三十六

官醫瘍科 栗崎道樞正弘編輯

麻疹第三十六

麻疹原委論
痘疹形如豆麻疹形如麻皆
胎毒言之誠是蓋以出一次則不復
出其為胎毒可知然痘出五藏疹
出心府以訛傳訛誰知其詳夫所謂胎
痘瘡論用言之極其詳矣夫所謂胎
毒者人胎胎血之初受氣於父母形
於母是父母精母血之毒已凝聚於陽

外科集成卷三十六

修澤會活板

施陰受之胎豈待飛胎之後慈火不
 節厚味不忌降生之頃其血而後
 有走毒也若以胎毒言之不論何
 實賤人俱有然於中有一等之別
 之分是以出珍有順逆險三等之
 揆其因由天地有非常之氣陰陽
 蹇阻有非滯之令鼻聞其氣傳入
 肺脈復傳於各藏漸次入命門矣
 然後五藏之邪氣內發反疹發而
 外透正疹從此而發矣疹發而熱
 之氣上蒸於肺主反疹發而熱毒
 發熱之功雖似傷寒而肺家果症
 多咳噴嚏鼻流涕眼胞腫眼淚
 注溢面腫腮赤口乾唇焦汗所潤
 疹由胎毒者赤身有微汗滋潤
 疹氣不覺粗身不焦熱則疹出必輕

若氣喘鼻乾更又鼻掀作嘔吐驚搐
 狂躁無汗者最重矣全人之人之有
 受氣於父成形於二五之精沙合
 而發乾道成男坤道成女在胎之
 先有命門則父精母血之毒藏於
 門真且確矣外形則九竅俱從逐
 藏六府外如百骸九竅俱從逐
 日漸次生長惟命門疑成於有
 刃命門人身之大樞也陰陽五行
 髮於命門之中心無聲臭之可
 也胎毒藏於命門無聲臭之可
 俟外感痘之氣發而何世人不
 之氣發出而為疹何世人不
 亦而乃隨聲附和日豈出五藏
 天府歷令千百餘年誰辨其非
 獨已特表而出之日痘與疹俱出

門或曰虛出五藏疹出內府前著
書立說極其詳悉歷余千餘年無
有議其非者今予一且邊云疹
俱出命門豈不好奇涉性借理
隱之形指此至精至密之理
倪之非用莫測度之命而
此之非是亦私相悖謬乎誠
之議者烏知後人之心
之且天下之物莫不有
未窮故其物雖存而
知有不盡也予所云疹
命門無徵而敢云然
之先疹出多矣俱不作
俟大痘已出之後或
年氣一等或三五
心時氣感而發之
一

或又問曰予言胎毒藏於命門
痰而著陰何不當出痘之時
胎毒一筆之為疹乎
待願一胎毒在命門之
出疹胎毒在命門之
氣血出此痘陰陽五行
五疔氣變而此痘陰陽
感疔氣變而此痘陰陽
不湯之理疾無痘感疹
又問今日予著定論前
出者今日予著定論前
訛謬若身是乎言痘不
際復又身是乎言痘不
疹又一名解毒疹余言
隔一兩月或隔半年
一

外科集成卷二十六

修澤舍活板

之入遇正疹之時氣感而發之際所出
則不復出得正疹回水結痂之際所出
之疹當痘出之際發熱日痘有夾疹
家風熱亦隨之而發熱故不關利
害止用藥參升而湯一劑而疹自消
取痘出必輕若失同水結痂之際復
又發熱此乃蓋下通紅看痘粒膿
漿者痘之可上蓋一厚疹也日蓋者
此疹一出可以解痘毒之毒也宜用
大連君飲加燬石膏花粉淡竹葉芥
一錢以湯解其熱極力用藥催漿
灌漿之時痘必稠密故出此疹意
過太補劑熱必稠密故出此疹意
爭久見症多透徹造化心機總意

精微之真妙不取私之家得用
之重同志者同取私之家得用
及癩疹由胎風熱等疹不在
列亦不由胎風熱等疹不在
及皮膚不疾胎見此類感風熱
及有連出不用胎者無太利
及不連出不用胎者無太利
身不連出不用胎者無太利
其出也必在胎者無太利
或至八也必在胎者無太利
次後再下胎者無太利
於風熱由胎者無太利
氣城症予每隔症俱遵
刻癩症予每隔症俱遵
加減變化每獲骨效溫疹
若出過正疹再不出溫疹

亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥

亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥
亦與痘疹相似但痘後發于藏屬陰其刑本深改難出難收而藥

改麻疹之發自始至終不過三四日
即安從古迄今靡不皆然邇來風氣
變遷有似此方氣候即尋常麻疹必
六七日乃化稍若無勞未盡或獨風
寒感犯或因過食變證百出其危甚
痘者二及此無非附見痘疹之舉措
有一簡略不詳何怪兒科之莫能舉
且以痘方混治而不知麻屬陽從陰
化故亦出內沒而不知麻屬陽從陰
陽化當列陳肉抱以取臘二者相去
天淵不特嬰孩不辨然皆為嬰孩雖
今不論男女老幼皆多患此雖當參
詳診切仍不能會此繩墨而臨證之
機活法在人心手繩墨又不可為小
聞希謂入感陽秦人愛小兒能為小

兒醫者由是隨時兼愛曲盡一貫之
道屬疹特開二症之類亦時有之
午足太陰陽明二經之類亦時有之
居多大人亦時有之類亦時有之
之類內傷併發與疔疔疔疔疔疔
野感內傷併發與疔疔疔疔疔疔
實異而熱三疔疔疔疔疔疔疔疔
及深而熱三疔疔疔疔疔疔疔疔
身細脹眼赤出沒一週許重者通
仍要紅腫眼赤出沒一週許重者通
密咽紅腫眼赤出沒一週許重者通
疾與大喉疔疔疔疔疔疔疔疔
但發班如科癰疹相逆及面而喘者
虛即發班如科癰疹相逆及面而喘者
有夾班如科癰疹相逆及面而喘者
症沈當品詳值氣疾之不正魚時全

外科集腋卷之六

修澤會活相

毒流于腸胃咽喉腫痛者為邪火干
 肺經口爛舌瘡者心脾蘊火及焦髮
 槓者崖液不蒸胃則吐熱衝大腸
 心便會成●熱蒸胃則吐熱衝大腸
 則瀉此疹之常候不必憂其吐瀉之
 不止也疹出而自正昔人云疹之
 出六府或因有此症而云然也統而
 言六府毒藏於此門體也五藏也
 六府之胎毒藏於此門體也五藏也
 大府之胎毒藏於此門體也五藏也
 毒便解所子藏之門也須若出盡則
 盡非若痘必苗之利只要發出後
 毒解也疹子未有不秀而實而後
 發者政治疹者發熱之時當察時令
 寒暄以藥發

之流行其發也先從發熱其出形
 症之明此蓋毒起于脾熱其出形
 傷寒而相類似痘而運聲不輕或兩
 之流淚或噴嚏而運聲不輕或兩
 不寧隱於皮膚之內焉或於肌肉
 之周以燈照而得見以手摸而可扪
 其形如疹其色如丹或隱隱而起者
 跡或乍見而隱隱根根起者乘
 乎癰反膚紅一失者黑紫隱伏者
 出透者萬無一失者黑紫隱伏者
 百無一生無一失者黑紫隱伏者
 利不止者毒從利去須五日必重
 次者方無餘毒內熱甚不欲食者
 不輕欲飲水者內熱甚不欲食者
 不平已出而復熱者勢可畏一出
 血即消沒者必頻大便血利者因

麻疹部位論

多陰部宜少陽部宜透陰部宜
 透者無慮若陰部多而陽部者頭面
 四肢向內者皆為陰也凡發頭至
 足起漸發四散者順如從
 處起漸發四散者順如從
 足起漸發四散者順如從

主之黃清心丸
 脈微動而發熱者此驚熱也瀉青丸
 申有救手掌心有飛時作驚惕手絳正
 熱也備急丸下之如面色青紅額正
 腹肚最甚或兼嘔吐腹疼者傷食之
 月胞腫而右頰有青筋發熱而額
 傷風之熱也宜惺石散發散之如
 手足稍微溫發熱有汗面赤而光者
 而足稍微左額有青筋者傷寒之熱
 手足稍微左額有青筋者傷寒之熱
 通治之不敢小柴胡湯也惟傷食則大便
 吳不消此畏食或吐互以藥下之如
 而足稍微左額有青筋者傷寒之熱
 而足稍微左額有青筋者傷寒之熱

紅而疹如光日出此用燥紅出致良在恭
 存不齋姬光而者出生暗潤之麻退表
 兼長多漆昔而者出三生暗潤之時
 火其手齋人出已三日生暗潤之時
 化形耳通有六時日加火真雖而
 也小後一痘出散午始花盛不進
 症而項片喜透稠出者密無縫方
 輕均上亦稀稠密無縫方為吉
 可淨腰不疏疹宜縫方為吉
 治者腿足慮大全
 色青尤見頂火
 淡若見色頂火
 白若見色頂火

嘔嘔白上形膈燥熱者者粒救人塞水喘
 吐絞虎復有散無劇難黃起也事喘攻
 瀉或湯有二下汗之治連者若搖促於
 水吐加小一之加候若解可色頭攻
 身屢黑紅者亦麻並頂毒治紫掣太
 溫血參點大危麻宜且焦調涼血煎
 熱腥竹粒皆歛赤一雲頭使秘者涼
 者莫葉若火邪者太片其
 自不麻出班爛如
 虎煎心胃煩悶
 湯加黃芩

為急驚而不用涼藥攻之遂令麻毒
 入在皮下不出後醫以滋陰為主而
 用四物等藥亦不暇救煩悶聲啞至
 包且而灰此可以知原藥水煎之
 矣全因天熱而驟用寒涼藥也
 助毒如桂枝麻黃湯最忌多汗
 壅蔽而不得出亦致內攻之類能
 人謂天氣大寒宜用辛熱如桂枝湯
 之類發之不知天氣大寒只宜置
 煖室避風寒可也且天氣雖寒而
 人身之熱毒未減也而多氣用辛熱
 豈理也哉同上●麻出之時多有
 刺不止者此益亦因利而散殊無
 妨如泄利過甚則以加味四苓散
 之切忌用參朮水訶荔補澀之藥
 壅賦

入腹脹喘滿而不得吐或救則變為
 息痲疹前後大忌只宜用老雞子
 恐惹於身之咳只宜用老雞子
 熟灰助滋味而也●麻退之
 避風寒戒水濕如或不論遠致終
 之咳嗽思瘡無有愈也調上●發
 之時既表之類一後切滅風寒冷
 生果之類如一後切滅風寒冷
 難泄遂變紫黑而究矣如極渴飲
 只宜少許蔥白湯以滋其渴耳必
 狹毛竅中常微汗潤澤可也又
 李蜂窠中常微汗潤澤可也又
 形痧疹瘡險逆等症初時難現
 紫蘇宜用破器將此種隔水煎煮

疎亦不知冬笋非上林之笋也至春二
 三月自外于土中冬月久取為羨饌
 今南人又不可引若春笋雖生長上林
 又用笋尖作引若春笋雖生長上林
 在疹門亦不可引若春笋雖生長上林
 氣若冬笋乃死氣隨之安可用乎
 ●氣若冬笋乃死氣隨之安可用乎
 小人心謹潔淨內外勿使穢汚氣息
 癩疔出疹要緊同食雞魚則終身
 痘家禁忌尤甚若食雞魚則終身
 但過天行之時又重也若生驚熱
 之命咳不止若五辛食之令生驚熱
 再桃蜂蜜香鮮之物食之若復生
 行以上通禁必待四十九日復方
 無禁也大熱未退不可與食與傷寒
 同治也


中取微香氣能助發易現全忍俗
 不即用煎水盈盆將小兒大洗大
 浴後仍加被多令小兒不覺燥
 損反致難言况疥瘡見形即不
 安理且難通達之意耳全或下
 水知者慎之勿起微形即不覺燥
 可取其病初起通達之意耳全或下
 兒不疔疔初起通達之意耳全或下
 表不疔疔初起通達之意耳全或下
 其易出若過用尖反令元氣受傷
 用氣廣損不能消毒氣以致乾濕
 泄瀉出汗心煩灌漿時每有破爛濕
 痒口瘡等患藥內引笋尖戒其所
 ●忌特指喉為習弊用笋湯之戒北
 習而冬笋光前醫用長煎時用藥
 引

類辛溫如白芷當歸紫蘇細辛川芎
 之類滯膩如猪羊牛犬雞鴛鴦及油
 汁類臭蝦之類同止貴勢之家惜
 小兒如掌珠者每見小兒多痰煩悶
 躁亂神昏輒以廣中所貨買蘇合香
 丸抱龍生黃等丸其中藥品已多不
 無剽疾辛悍之性恐有所犯切宜戒
 之身禁忌病家知禁忌者運幼科者
 頃不知禁忌香願亦變逆業幼科者
 當熟思之當於出疹之家明言未
 無所不至母以世言為迂大在未然

未免口渴煩燥渴飲冷水不妨飲
 些須以解其煩渴然不可多飲若
 再飲仍飲些須若土產有葶薺及有
 秋梨甜者並柿餅霜者不妨問與食
 之雖生喫無妨切不可與蜜糖之類
 糖餅糖飴毒火傷或極成粥以
 食之恐助毒火傷或極成粥以
 水半大鐘著飯相小半鐘和勻溫服
 俗云飽痧飯相小半鐘和勻溫服
 ●麻疹忌破氣溫補如青皮枳殼枳實厚朴
 溫滯膩破氣溫補如青皮枳殼枳實厚朴
 枳之類酸飲如五味子烏梅蒼朮厚朴
 五之類酸飲如五味子烏梅蒼朮厚朴
 五之類酸飲如五味子烏梅蒼朮厚朴
 下如玄明粉芒硝大黃巴豆牽牛之類

麻疹治法總論

證候未明是清麻疹發熱增寒壯熱鼻流
 陳皮腹亦用厚蘇葛湯去砂仁
 至足方散而減去衣被則皮膚通暢
 膝理開豁而麻疹出矣縱不出亦不
 可再汗恐致亡陽之變此宜常以蔥
 之日湯飲之其麻自出服此宜無發搗
 之證。其麻之除常宜微汗微
 升則肌腠疎而邪易透不可復用
 其有隱匿不汗之壞證用權升發得
 大汗而解者必寒壯熱無汗
 而成皮膚乾燥者必寒壯熱無汗
 與葛根解肌湯冬月越躐三拗選用



出皮及一切雜症與痘毒大同但溫
 終藥宜清涼雖然變清涼痘愛溫
 不難常道虛則補實則瀉醫家治法
 政治麻亦有血崩而用四物湯氣虛
 而用四君子湯天寒傷冷則溫中理
 中藥一服之時權宜未除諸神昏喪
 後餘熱內攻輕者未除諸神昏喪
 昏者須預防之始終以研麻根湯
 氣色須預防之始終以研麻根湯
 為主或消毒上飲解毒子欲出未出
 魚腥早矣散以解其毒則無餘矣
 時宜早矣散以解其毒則無餘矣
 不預解使之盡出或以致毒膏汗中
 爲壯熱日久枯或成驚瀉或爲瀉
 一劑或救氣喘促未有不錄乎人事

未盡者防法細大凡疹首尾皆
 不而下熱在初而變此謂少陽暹表
 不可解之也嘗先安裏解毒次微發之
 安裏解毒須發五藏防風湯是也
 難禁物知斑疹若使之斑疹併出小兒
 難禁物知斑疹若使之斑疹併出小兒
 者宜下上也集尾日下焦若不吐瀉者
 不可下也三五服能食而大便者宜
 安裏藥三五服能食而大便者宜
 內實者宜五服能食而大便者宜
 月重藥末後一服調微發之藥服之
 本抵安裏之藥多發微而藥少助
 微疏之令邪氣不壅俗而藥作益矣
 便兒易禁也身溫者頭身不者逆
 二酒宜多服防風湯之安裏者大
 便兒宜多服防風湯之安裏者大
 二酒宜多服防風湯之安裏者大
 便兒宜多服防風湯之安裏者大

可下者為癩毒一切頭下外因無根帶
 天便不實無一切頭下外因無根帶
 逆陷故禁尾不可下也
 煖蓋覆不令通風以寒未出或身
 表涼而惡寒或天冷而惡寒未出或身
 益覆不令通風也
 暄何必用蓋覆而後
 人執此二句首尾俱不取之通風乎後
 奈通風不知天令之加人身之隨
 感致便誤人知多矣大抵前人之言不
 時應變以其人所可移也
 知其變故執常而不移也
 天率以脈為主浮中沈之舉按
 之候察其虛實定其移也
 全矣同止●未顯症所用之藥外
 傷分麻湯主之大便軟積水

利之同止●因小兒真氣既盛正氣
 又正邪無餘容或因天陰或因傷表
 或因傷裏而治之生矣治當何如
 外者外治內者內治
 自出至惡寒者發之表大熱者奪
 之渴者清之便溺者下之小便
 不通者利之驚者安之泄者分之
 以通經一為哉犬抵傷寒同治最
 論諸病與癩疹不可缺也假令五
 集諸病與癩疹不可缺也假令五
 作癩疹必癩疹之但各發其所傷
 見血之數矣●前若強發之其變
 不可勝數矣●前若強發之其變
 可下者何也日者不可下者為癩未
 顯于表下則邪氣不得越此脈證
 有表而無裏故禁首不可下也

地骨皮鼠粘子湯
 鼠粘子湯
 不刺紫草茸甘
 疹治法以清涼
 熱透肌辛寒甘
 忌酸收取宜甘
 辛散芎藭芥穗
 石膏麻黃清涼
 蘗薄荷荷蟬蛻
 蕪漿生甘草苦
 黃連連堯知母
 中病則己毋太
 麻疹但據見症
 投之即至危困
 時師用苦寒降
 危亾者不可勝

之內傷積實九主之若傷冷香溫之
 補應丸主之惡寒者發之五防風蒼
 赤丸大熟者奪之此表者通言三
 陽也夫陽盛則氣必上行言奪者尙
 法不令上行也渴者清之大便者自
 虎湯小承氣湯四順飲子柴胡飲予
 之挑仁承氣湯四順飲子柴胡飲予
 選用小便不通者利之導赤散八正
 散之類當求上重則瀉青丸泄者
 驚者安之求驚丸重則瀉青丸泄者
 分寒則異功散四君瀉青丸泄者
 瀉茯苓湯已顯症證所用之藥出
 快化毒湯已顯症證所用之藥出
 風湯陽明出風快症證所用之藥出
 出心快連竟防風湯四股出不快防
 風芍藥甘草湯出風快症證所用之藥出

秋清冬寒世四時之正氣也冬應寒
 而及溫陽氣暴泄火令早行人感之
 者來春必發癩疥未出痘疹者必感
 而胎生祖見天行一時得深大者必
 即宜服三豆湯代宜化丸以預解
 之同止●暑月煩躁食後與自虎湯
 王露散熱甚與紫雪咽或生瘡與
 甘桔湯甘露飲大人小兒同治法惟
 劑大小不同耳●麻發熱之時
 遍身汗出者此毒從汗散去府開疹
 易出也●有愈中血者此毒從血解
 也●俱不可遽止之若汗出太多血
 不止者此又火起通迫太過液矣
 流血妄行矣止之當歸六黃湯加浮
 麥汗太多●人參白虎湯合黃連解毒
 湯同上●麻疹因時用藥不可誤作

傷寒妄施汗下反伐天和又須看人
 虛實如大便秘結煩熱甚而發不出
 者以酒大黃微利之如吐利不止以
 參芍之類補之經云母實母虛濕
 損不足補有餘天人性命也●右方雖
 因時制宜亦有不可拘泥者如冬月
 亦有不宜麻桂而宜石膏者正當以
 麻黃湯●王若麻桂守而不知變必有
 失●圓正●病人左右常有胡荽氣
 即能辟去穢氣疹癩出快又方荽
 酒糟蒸熱擦之自頭至足為齊若出
 見而頭面愈多者佳同上

痲退涼越六七日而復熱者非餘
 因大病之後中氣虛而然者治本
 要臨病之機不可不審也醫通●
 子欲出則遍身發熱及既出則身
 諸病悉解一層疹毒隨收矣如疹
 已出熱甚不減者黃連解毒湯
 解其表裡太便不通者互四順
 湯解其裏不通者互四順
 飲小兒便不通者互四順
 疹至只髮出得盡則毒邪解散
 和乎如髮出得盡則毒邪解散
 在灰如髮出得盡則毒邪解散
 此毒邪壅遏尚須施布待氣血
 解毒湯同●疹毒收後身有微熱
 者此虛熱也●疹毒收後身有微熱

角然退去若熱太甚或日久不減
 柴胡退去若熱太甚或日久不減
 毒合日虎門冬功熱甚者間服
 重至牛一不可調治者蓋疹子
 久元氣虛矣加少疹亦下五七日
 復重熱陰陽氣竭不脫何待哉
 者必死補血氣可也余見忽以為
 矣同●上●疹毒收後身有微熱

麻咳證治論

毛竅開而麻易出故未出之先最喜
 效甚發透其效自北若出盡及後
 而咳仍不止者清咽滋肺湯咳及後
 痰去麥冬加橘皮茯苓其有感觸風
 寒咳數煩悶逆清木眼赤咽痛且
 古生倉者甘桔湯加麥冬後見酒
 入參白虎湯去知母易麥冬以滋化
 之膚白●麻疹初起呵欠發熱惡寒
 咳喘噴嚏流痰頭眩耳赤甚根湯
 加紫蘇葛白以解肌切忌大汗咳多
 加麻黃杏仁枳殼地骨皮入門●麻疹
 功發時咳喘宜清熱透毒不得止嗽
 如疹後咳喘慎勿輕用五味子等收


飲之劑只苦梗飲以清餘熱消痰
 壅則自愈治法綱●疹退之後微發
 咳嗽者此餘毒未盡也
 王以厚白消毒飲同上

麻嚏證治論
 因麻疹初起而多嚏者是乃
 風邪激搏而然正出時有

嚏者其候必輕如後尚有嚏者邪
 熱盡解可無餘患矣邪嚏多涼者濁
 壅得泄肺邪自清最為非若匪嚏
 而竅塞不通必有風邪留滯宜辛涼
 之劑以透
 達之

麻嘔吐證治論

危嘔吐是胃中熱邪不傳發洩而作
 葛根解肌湯正出及正沒時見者消
 毒飲加枳實黃連芩芍藥更加貝母
 粘蕒根若沒後而嘔者脾胃而熱
 滯也石斛清胃散其有嘔而吐蛔者
 胃中痰熱膠固蟲無所養而上竄也
 能食即定如細飛多而不食為胃
 敗不食治通●痰多而盛乾嘔解毒
 湯傷食嘔吐西●痰多而盛乾嘔解毒
 嘔者四苓散加●人參忌用豆蔻木香
 薑桂熟藥入●疹證多有嘔吐者
 勿慮嘔吐健透所毒則嘔且止况嘔
 中便有發散之義消法綱●疹子矣
 熱吐利乃火邪內迫純是熱證不可



非寒論上焦多吐黃芩湯下香連丸中焦吐利
 者宜黃芩湯送下香連丸中焦吐利
 一多宜黃芩湯送下香連丸中焦吐利
 之症醫家必用蒼厚平胃下香砂仁
 暖胃或手足不稍冷必用桂枝肉桂溫
 其手也手足不稍冷必用桂枝肉桂溫
 而救火全以辛溫之味攻之是抱薪於
 寒之象俟疹出透而手足自溫醫不
 明此反以桂枝河達四肢之末肉桂
 可以溫經回陽誤之又誤陷人之性
 命可危
 良大全

麻瀉證治論

黃赤稠粒少水短瀉者屬熱四苓散
 加木通滑石已出人參白虎湯去知
 母易麥冬其證必多發渴其不止
 且不退雖數劑無効如瀉下清稀
 法腹不喜得溫按者屬寒胃苓湯去
 蒼朮加煨薑瀉利窘迫而腹痛脹滿
 或嘔氣如敗卵者為飲食停滯積滯
 湯加楂藥木通醫通●大抵麻疹泄
 瀉屬熱者多屬寒者少辨治宜早不
 可分其為久瀉久則正氣下陷成
 腫滿或變下利並宜積貫理中湯之
 類以理脾胃為主麻後瀉利不止食
 渴目閉四肢不溫者不治
 洞泄不知者不治
 ●狀疹之治




麻目赤證治論

正候也若後發熱之時眼光如
 熟味瀉瀉散加荆芥薄荷黑參
 旁閉不欲開更加連翹木通赤
 扁者風濕上壅也導赤散加荆
 參若為風熱所侵而眼赤爛者
 胡飲子愈須治之否則為癩疾
 生通●疔疹前夜兩眼赤紅當
 花地菊●疔疹前夜兩眼赤紅當
 等味皆可證證加減大至

全類傷風發熱咳嗽鼻塞面腫
 稠粘有沫傳泄利者有一起
 利者不可觸胃風寒及于正
 嗽食能變輕為重不可不慎
 ●麻疹多泄瀉慎勿止瀉藥用
 飲子則瀉自止且疹家不懼
 明之邪熱得解是亦表裏分
 也若疹後世瀉及使膿血皆
 陷故也後世瀉及使膿血皆
 升麻芍藥湯多服必自愈若
 氣不復脾胃虛弱宜用青蓮
 若疹後下積滯用連石薯蕷
 ●麻疹泄瀉解毒湯合四苓散
 池瀉瀉瀉者柴苓湯已出泄瀉
 虎勿蒼湯必門●麻已出泄瀉
 猪苓澤瀉白朮茯苓水煎服

麻發不出證治論

惟乾致連聲目赤發熱似傷寒之候
 為麻疹之驗將發之際或為風寒暴
 藥或因皮膚癢將發之際或為風寒暴
 出此全盛之勢未萌與後沒早不
 同如氣粗喘促腹中甘石湯或越
 而不得出急用石膏輕則升麻湯以
 湯去藥重用石膏輕則升麻湯以
 發之若因觸犯暑露風寒隱現不能
 發出以新猪矢冲湯隔篋蒸之則
 更添痰者並取猪矢灰葱白湯下
 二三錢乃煎發之
 法燒人矢亦能發之
 神丹不能復圖矣
 疹升發劑中多用麻豆知升麻性



升能升動陽氣每致邪熱上浮而
 喘逆當以紫蘇蔥白代用非升
 富慎即枯梗初起亦須酌用恐
 引濁氣於上咸為禁劑用藥之
 切辛燥之味咸為禁劑用藥之
 不為之慎重乎月止●發熱六
 以後明是珍子却不見此皮魯
 厚腠理閉密或為風寒襲之曾
 利乃伏也急開托裏矣之劑有
 湯調裡一粟散發之疥用胡荽
 刑心如一粟散發之疥用胡荽
 証之不出也者以七湯升麻丸
 解之不再出也者以七湯升麻丸

麻不透表證治論

過也越脾湯葛根解肌湯隨輕重取
 用其時有表裏不一之得微汗即
 農煎時有表裏不一之得微汗即
 粒隱心紅粟一而透表者火毒
 熾盛也白虎湯加荊芥黑參如肌
 不燥唇色淡白二便如常而不透
 中氣本虛也消毒飲加運寒木通
 前荻苓雖有蘊毒不可輕用寒涼
 用峻劑升發亦必不能復透但當
 剝使之內化腐生肌而手足背腰
 處起發而紅頭面手足背腰腹
 證必纏綿難已且有後五七日
 矣如麻兩三度而愈者此氣候之
 富非不透之出後愈者此氣候之

向安欲速効轉增危殆醫通●麻
 疹無間犬細小必得透表可無後
 患其有一種區潤赤成塊上復
 有外紅腫但頭粒不突一者羅透
 羣偏高紅腫邪留伏防有他變亞
 其中必有熟邪留伏防有他變亞
 竹葉石膏湯法牛夏以滋化之縱
 餘熟從吐洩散矣同止●荒葦乃
 麻疹之聖藥也取來●連根帶葉搗
 爛約有三錢入磁碗內用滾水半
 鍾滾白通酒半鍾同碗內泡少頃
 味自出通口服之痧出更快若無
 芫苗葉用子研服亦可再加白芝
 同研服更妙窮鄉僻壤用此或當
 醫屢試屢驗

麻沒早證治論

酸收之物一或執邪內陷或為風
 絕無紅影終變危候若沒早肌
 暖處尚未全沒急需透發之不起
 即當審其邪所觸而與內解如外
 寒所過邪反肉攻而沒早者酒毒
 加蔥頭熱服復透者甚則加麻黃
 穿山甲或越婢三拗用若不加黃
 必喘脹而灰亦有偏身紫熱腫喘
 脹氣急此毒瀉血凝半身紫熱腫
 涼痛散去芒毒瀉血凝半身紫熱
 之若腹脹帝促瀉瀉黃石膏以發
 芎藭元劇而伏喘瀉瀉黃石膏以發
 不省人事者即瀉瀉瀉瀉瀉瀉瀉瀉

誤食酸醋收斂之物伏匿壯熱喘數
 煩悶以猪膽汁製成甘煎成續片與
 之得吐微汗為効或苦瓠生甘脾煎
 湯灌之亦能取吐中便有發熱之
 義誤食豕肉喘脹氣急枳殼湯加山
 楂苾硝以下奪之誤食枳殼湯加山
 瘡消毒飲加石青馬兜鈴若得熱退
 牙安氣息漸調者方無慮或大病
 之後或洞泄不止氣本虛不能發
 越脈淡是惟當健運中氣路兼解毒
 清熱匡通麻疹既出一日而交沒
 者乃為風寒所冲麻毒內攻若不治
 胃爛而死可用
 消毒飲煎

麻難沒證治論

氣柔弱麻出不過二三日即化通來
 地運變遷未有不綿延數日者當非
 難沒之比若三四日後點燥色日隱
 令於肌腠而難沒者此必衝氣素微
 不能於肌或衣被單薄阻其發越之
 機以致綿延多日法重車散透達不
 可遽用寒涼蔽其開泄之路也
 因有虛熱宜四物湯進之如失血之
 症加犀角汁解之普渡寒航

麻渴證治論

露飲若二便清利唇色不紅而但渴
 者此必寒邪太渴脾虛不生津液而
 作渴也七味白朮散去木香那梗采
 渴而煩燥者是熱邪燦心包白虎
 湯加麥冬竹葉正沒時竹葉石膏湯
 去半夏芩湯而麻疹已出謔煩燥作
 治也醫通麻疹已出謔煩燥作
 渴有宜白虎解毒湯航謔煩燥作
 喜以水純是火邪肺魚胃心火內
 尤故也初發寒熱者發散藥中多加
 石膏花粉或葛根麥門冬散疹子出
 見渴者用人參白朮合黃連解毒湯
 門冬渴甚用之白朮合黃連解毒湯
 湯水則與之驚邪熱渴甚宜此方

麻喘證治論

多與之胃清乃止庶免牙疳之害直
 至疳厥而後清胃涼血解毒往多
 層無及慈親仁人宜早為之無
 姑息治法細如極渴欲飲水只宜
 與蔥白以滋其渴耳必須使皮
 涼微汗潤澤可也同上●發熱
 但當以棗豆豉煎服之
 白虎佐之
 冷水恐生
 腎之症

麻疹喘者熱邪壅遏肺竅氣
 道阻塞而然其證有虛實之
 別入便難治世身無大便堅
 利入便難治世身無大便堅
 多難獲効實則大便堅燥小
 身發壯熱竹葉石膏湯去半
 仁貝母冬月量加蜜炙麻黃
 應若出而無汗兼之龜板者
 抵未出而喘者易治後端者
 初矣之時喘者三柳湯加石
 喘而乾口燥者白虎湯以滋
 於麻後又宜清咽滋肺湯
 白虎湯又為切禁故日醫不
 法在人耳為通●疹發時多
 壅于肺故也慎勿用定喘藥
 劑竹葉石膏湯裡煎茗根湯


多與之胃清乃止庶免牙疳之害直
 至疳厥而後清胃涼血解毒往多
 層無及慈親仁人宜早為之無
 姑息治法細如極渴欲飲水只宜
 與蔥白以滋其渴耳必須使皮
 涼微汗潤澤可也同上●發熱
 但當以棗豆豉煎服之
 白虎佐之
 冷水恐生
 腎之症

寒甚湯毒發于內不得透出喘渴悶
亂神不寐者加麻黃凡熱盛者即
用白虎湯去入參地西河柳忌用牙
麻服之必喘即平時痧疹發不吐
壅煩悶躁亂用獨聖散治法獨

麻氣促證治論

麻氣促緣肺熱不清所致
初發正出時見之清熱透
肌湯在正及後清咽滋肺湯如喉
中有痰餉而鳴者熱邪阻逆不得
發越也見於初發正出之間除熱清
肺湯正及後見者必邪熱未透或
露風沒早餘熱內攻而
肺氣受傷也難治

外科集成卷三十六




麻瘡證治論

肺胃熱邪為風寒所襲不能
清咽滋肺湯若瘡而腫痛者射于消
毒似然瘡為麻疹之常小可與痘瘡
此例

外科集成卷三十六

修澤會治板

外科集成卷三十六



喉咽痛證治論

疹出之時咽喉腫痛者乃

治安用針刺灸上焦而然勿作喉痺

去惡血疹瘡只是咽乾作痛宜甘桔

湯射于鼠粘子湯

甘露飲治法


麻咬牙證治論

瘡症咬牙首瀉熱劑乃陽陷
 於陰故多發渴手足熱喜飲冷者麥
 門冬湯加丹皮若手足不熱而反厥
 冷喜飲熱湯此為熱邪內亢後必下
 血咽喉作痰鳴而外即與白虎湯多
 不可救
 不通

麻屑燥證治論

者其熱深紫黑而燥者其熱輕赤而燥
 隨輕重以清潤之
 者其熱深紫黑而燥者其熱輕赤而燥
 隨輕重以清潤之

外科集成卷三十六




麻唇舌破裂證治論

麻唇舌破裂者心
脾之火上衝也其色
必多淡赤初發正
加茶通黑參荊芥
見者為心脾俱絕
不活者宜難治也
醫通

外科集成卷三十六

在澤合活板




麻口臭證治論

麻疹口氣穢濁熱邪蘊隆
於胃滯胃散加石膏連翹
生甘草其有臭不可聞者此胃敗也
不洽若其人本有是證不有此例

麻口疳證治論

胃散加石膏荆芥大便秘者當歸散
 微利之外用柴根白皮煎湯漱淨以
 無比散或燒鹽散吹之如通眼色白
 者自外延入內者無膿血者齒落口
 臭者喘促痰鳴者皆為不若滿口
 唇黃赤白爛獨牙齦無恙者吐為
 日疳非牙疳也亦胃中餘熱未盡毒
 壅上焦二便必多艱澀赤散以瀉
 心脾之火外以綠袍散敷之醫通
 疹後牙齦黑爛肉腐血出臭息衝人
 者日走馬疳馬疳鳴齒之主若面頰浮
 腫環口青黑頰漏齒脫唇筋鼻壞者
 死證也如唇口之變其聲啞者日
 孤惑化蠶丸主之宜慎燥昏悶失聲




麻腹痛證治論

飲食停滯火毒內鬱或風寒壅遏或
 風寒滯滯胃氣發熱正出時
 疎表麻透自反胃而腹滿者急與
 痛者力為瀉導其痛自除時當正沒
 沒未盡而腹痛者兼清中而痛自
 止沒後則者介利餘熱其痛自愈又
 須驗其有無他證屬虛實而與
 之若熱邪內結而腹痛者通利大便
 為主常通心疹而收之復出入動
 止如常忽熱心腹絞痛而厥者是元
 氣虛弱曾受疫癘之氣肝脾無病裏
 實虧損脈以發而久也謂之中惡
 間有疰人參湯研蘇合
 香丸而進者治法綱

者死證也治法綱
 須內外兼治之良方
 外治黃龍散龍明散吹之
 初見疹標尚未出透失於清解誤用
 辛熱之劑以致毒蘊於胃鼻出氣
 腥臭必生牙疳互用犯毒清肺湯加
 石膏二錢
 錢六分


麻便秘證治論

日 期 前 後 速 宜 滑 潤 四 須 清 涼 飲 甚
 則 涼 膈 散 亦 通 利 之 俱 勿 遲 延 恐 麻
 變 焦 紫 而 難 救 也 大 但 麻 疹 自 出 至
 沒 二 便 俱 不 宜 秘 秘 即 微 利 可 也 通
 ● 麻 疹 已 出 天 小 便 閉 可 服 防 風 通
 聖 散 湯 慈 航 ● 麻 疹 端 滿 櫻 秘 者 前 胡
 枳 殼 湯 赤 茯苓 大 黃 甘 州 五 味 子 不
 煎 服 便 秘 三 四 兩 者 小 承 氣 湯 入 月
 ● 珍 出 不 快 便 秘 固 宜 急 通 用 挑 仁
 美 氣 湯 惟 此 劑 大 峻 非 真 知 其 製 結
 筋 脈 而 瘡 不 起 發 不
 宜 輕 用 也 治 法 別 不




麻溺瀉證治論

沒後見之為餘熱下匿勝脫導赤散
 加麥冬以散氣化利之仍不通者必
 大便秘鬱之故大便一通小便自利
 腎通●麻木已出譫語小便閉宜赤
 芍生羊木通苴草淡竹葉七箇右到
 水煎服蒸餅●麻諸諸溺秘者導赤
 散如消者四苓散加車前木通人門
 ●斑疹出見少熱小便不利當利
 小便入正
 取法綱



麻痢證治論

茶湯加防風枳殼下膿血者白頭翁
 湯去黃蘗加防風枳殼下膿血者白頭翁
 者枳殼湯查藥不通腹中作脹時痛
 時止者厚朴湯亦有瀉久而成痢者
 莖薑黃茶黃連人參湯自初至終痢
 不徹者必兼風寒留帶於內則宜解
 毒行帶而兼陳風質悍庶幾克應如
 痢下紫黯如鴉之類加屋漏水如雞肝
 色如黑豆汁之不食色紫晦者皆死
 甚發呢通禁口不食色紫晦者皆死
 不洽呢通禁口不食色紫晦者皆死
 不盡心慌啼味不止十餘日復沒或出
 須臾或下痢腹痛宜二仙散急死在
 麻毒流注而成痢者宜用清熱導滯



湯治如●疹出之時曾作泄利未經
 清解至疹退之後變為休息痢不問
 赤白裏急後重且夜無度此餘毒在
 大腸也以後黃芩湯送下香蓮丸
 加人參于丸藥內加之治法
 疹後痢用糖調裡藥散月止

麻下蟲證治論

麻疹下蟲多見於後世
 以胃熱少食蟲不能安而
 下也與蟲食傷中虫不能容而
 同但須調其飲食自愈非上出
 不須下
 之匪通

麻糖證治論

麻糖正出時精神困倦
 不醒者為逆蓋緣正氣虧損
 邪火內鬱正氣不勝所致若後而
 沈睡不醒者為氣血俱虛補脾養血
 為要也後須擾而反不得寐是餘
 火復燃急需滋養陰血補陽自缺亦
 有昏睡不知起止痛其夾車谷不
 知疼痛似寐非寒無問正出沒復良
 非肯光當察其兼見何
 證而與施治可也醫通

麻不食證治論

麻疹不食是邪熱熾盛不
 可強與雖數日不食亦無
 妨善在初發正出時自虎湯加煎芥
 麻透熱清自能食也及後不能食百
 斛錯屢救諒加健運之味元氣萎頓
 者急需培補防有虛羸之患
 醫通

麻鼻扇證治論

兼麻疹鼻扇者肺將絕也若
 咽喉清利無喘滿而精神不減者可
 治宜滋培肺氣為主沒後見者死
 通

麻身冷證治論

麻為肺胃邪熱所發本屬
 於陽肢體常宜溫煖若反
 清冷如冰是為逆也其有沒後遍體
 溫涼如故獨下體厥者為腎
 敗不指如利出腰以下不熱者不能
 透血反漸瘦者亦為逆候急當溫養
 脾腎或有得
 生者
 醫
 通

麻水畜證治論


畜之症者水入于肺為喘為咳空用
 葶藶以洩肺中之水若水入于胃為嘔為
 腫為脹為自利若水入于胃為嘔為
 噦為利互用猪苓澤瀉茯苓以洩之
 若水入于心為悸為驚互用赤茯苓
 木通以洩心下之水若水入肝為
 脇痛宜用芫花以洩肝水若水入于
 腎與膀胱為小便不利陰囊腫宜用
 車前子木通以洩
 膀胱之水治淋瀝

孕婦出麻治法論

之紅淡熱之重輕而與疎解之申佐
 以清冷滋血安胎為主四物湯加條
 芥艾葉煎蘇之類若胎氣上衝
 急用芩根艾葉煎湯磨檳榔續進以
 降之一切實脾行氣溫燥之藥既礙
 麻疹復傷子氣咸須禁之
 婦出麻當用四物湯倍加白朮條芩
 艾葉安胎清熱為主別胎決無厄而
 出麻易胎清熱為主別胎決無厄而
 出麻易胎清熱為主別胎決無厄而

麻虛羸證治論

止或便泄不日或身熱不除皆真元
 虧損恐成勞瘵並宜雙料湯去川芎
 以和之嗽加橘紅貝母咳加麥冬百
 分瀉加白朮扁豆食難化加砂仁
 款芩氣血俱虛合四君子湯隨證調
 之切禁寒涼傷胃之藥專力資
 培緩圖平復可也胃通●疹予已收
 其毒不解邪火拂鬱身熱晝夜
 不退髮枯膚痒漸成潰瘍以清熱除
 痘丸主之若早治以致睡則揚睛
 口鼻氣冷手足厥冷微微瘦瘵變為
 慢風不救者多矣治法網



麻後瘡證治論

麻後發瘡多緣生水澡浴
 太早不氣留治肌腠而發
 但須凡以荆防艾葉煎湯洗之勿用
 生水亦不可用瘡重塗失治必每
 歲依期而發雖日小
 悉亦須慎之
 通

外科集成卷三十六

外科集成卷三十六

終



